中國歷代醫學典



廣陵書社

中國歷代醫學典

三



廣陵書社

圖書在版編目(CIP)數據

中國歷代醫學典 / 廣陵書社編. —揚州:廣陵書社,2008.8
ISBN 978-7-80694-286-4

Ⅰ.中… Ⅱ.廣… Ⅲ.中國醫藥學—古籍—選集 Ⅳ.R2-52

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2008)第 115790 號

ISBN 978-7-80694-286-4
9 787806 942864 >

書　　名　中國歷代醫學典
編　　者　廣陵書社
責任編輯　王志娟
出版發行　廣陵書社
揚州市文昌西路雙博館附二樓　郵編 225012
http://www.yzglpub.com　E-mail:yzglss@163.com
印　　刷　揚州市文津閣古籍印務有限公司
版　　次　2008 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
規　　格　開本 /787 × 1092 毫米　1/16
印　　張　344.375
標準書號　ISBN 978-7-80694-286-4/K·154
定　　價　1500.00 圓(全八册)

出版説明

本書是對清代以前醫學的一個總結，係根據《古今圖書集成》的《博物彙編·藝術典·醫部》内容編輯而成。

《古今圖書集成》原名《彙編》，由清代陳夢雷編纂，後經雍正帝審閲，改名爲《欽定古今圖書集成》，并由户部尚書蔣廷錫等增删重編，至雍正四年告成。《古今圖書集成》收羅宏富，内容廣博，體例周詳，分類細密；全書分六彙編，三十二典，六千一百零九部，共一萬卷，集我國古代文獻之大成，號稱『清朝第一大書』（康有爲語），實際上也是我國現存最大的古代類書。

『藝術』一詞，古代含義與今不同。古代『藝』指才能，『術』指方法；『藝術』合稱則泛指各種技術技能。《博物彙編·藝術典》原分四十三部，『所紀多民用所資』，『醫部』當時是收在『藝術典』中。我社于二〇〇七年四月出版《中國歷代藝術典》是按現代藝術含義收編，祇將屬于現代藝術範疇的繪畫、游藝、戲劇等内容輯入，而農、醫、商賈、術數等部皆未入選。

本書稿共五百二十卷，爲我國歷代以來最大的一部醫學類書。先作『彙考』，然後再分列總論、醫術名流列傳、藝文、紀事、雜録、外編等，系統而全面地收録了上古至清初醫學方面的相關資料。第一卷到五百卷爲醫經注釋、臨床各科疾病的證治，第五百一卷至五百二十卷，設總論、列傳、藝術、紀事、雜録、外編等内容。『總論』從《易

經》、《周禮》及《靈樞》、《素問》等經典著作中摘録了某些有關醫學的概論性資料；『醫術名流列傳』收輯了清初以前歷代著名醫學家的傳記一千多例；『藝文』是歷代醫藥書籍中有研究價值的序和一些醫學家的詩文；『紀事』是史書、筆記中有關中國傳統醫藥的記載；『雜論』是有關書籍中記述的醫學事迹和寓言故事；『外編』是非醫學書籍中所記載的有關醫學傳説等内容。輯録了從春秋戰國到清朝初期的醫學著作百餘種，分門别類歸納集成。其結構嚴謹，層次分明，載述有據，論理精詳。其取材廣泛，既有中國醫藥學的基礎理論，又包括了中醫臨床各科疾病的證治，上采秦漢醫經及注釋，下集清初名著及文獻，堪爲醫學百科全書。在中醫學術的發展史上起到了積極的作用，有深遠的影響。

一九五九年十二月人民衛生出版社曾出版《古今圖書集成醫部全録》鉛印本，但有部分删節。此次我社新編《中國歷代醫學典》爲全本。

廣陵書社于上世紀九十年代起陸續編輯印行《中國歷代食貨典》、《中國歷代經籍典》、《中國歷代文學典》、《中國歷代禮儀典》、《中國歷代考工典》、《中國歷代藝術典》諸書，由于按類彙編，資料翔實，收録全面，具有較高的資料價值，給研究者帶來很大便利。今仍依其例，以饗讀者。

編者

二〇〇八年七月

中國歷代醫學典目錄

第一册

第一卷至第四十五卷
黄帝素問 一

第四十六卷
黄帝素問補遺 五二〇

第四十七卷至六十卷
黄帝靈樞經 五三一

第二册

第六十一卷至第六十八卷
黄帝靈樞經 六九五

第六十九卷至第七十卷
扁鵲難經 八〇七

第七十一卷至第八十八卷
脉法 八三五

第八十九卷至第九十二卷
外診法 一〇三五

第九十三卷至第一百五卷
臟腑門 一〇八五

第一百六卷至第一百十卷
經絡門 一二二七

第一百十卷
身形門 一二七七

第一百十一卷至第一百十七卷
運氣門 一二八四

第三册

第一百十八卷至第一百二十一卷
運氣門 一三六一

第一百二十二卷至第一百二十九卷
頭門 一四〇七

第一百三十卷至第一百三十三卷
面門 一四九三

第一百三十四卷至第一百三十七
耳門 一五三〇

第一百三十八卷至第一百五十卷
目門　一五六八
第一百五十一卷至第一百五十二卷
鼻門一六八八　一六八八
第一百五十三卷至第一百五十四卷
唇口門　一七一一
第一百五十五卷至第一百五十七卷
齒門　一七三一
第一百五十八卷至第一百六十卷
舌門　一七五七
第一百六十卷至第一百六十三卷
咽喉門　一七七八
第一百六十四卷至第一百六十五卷
鬚髮門　一八一六
第一百六十六卷至第一百六十九卷
頸項門　一八三〇
第一百七十卷
肩門　一八六九
第一百七十一卷
腋門　一八七七
第一百七十二卷至第一百七十四卷
脅門　一八八五
第一百七十五卷至第一百七十九卷
背脊門　一九一〇
第一百八十卷至第一百八十五卷
胸腹門　一九五五
第一百八十六卷第一百八十七卷
腰門　二〇二〇

第四册

第一百八十八卷
腰門　二〇四一
第一百八十九卷至第一百九十九卷
四肢門　二〇五〇
第二百卷至第二百六卷
前陰門　二一五二

第二百七卷至第二百十卷
後陰門 二二二五
第二百十一卷
皮門 二二六九
第二百十二卷至第二百十三卷
肉門 二二八一
第二百十四卷至第二百十五卷
筋門 二二九五
第二百十六卷
骨髓門 二三一二
第二百十七卷至第二百二十五卷
風門 二三二二
第二百二十六卷至第二百二十九卷
痹門 二四〇四
第二百二十九卷至第二百三十卷
寒門 二四四一
第二百三十一卷至第二百三十二卷
暑門 二四五六
第二百三十三卷至第二百三十四卷
濕門 二四七八
第二百三十五卷
燥門 二四九九
第二百三十六卷至第二百三十七卷
火門 二五〇八
第二百三十八卷至第二百四十二卷
痰門 二五三一
第二百四十二卷至第二百四十七卷
咳嗽門 二五七五
第二百四十八卷至第二百五十一卷
嘔吐門 二六三二
第二百五十二卷至第二百五十六卷
泄瀉門 二六六九
第二百五十七卷第二百五十八卷
霍亂門 二七一八

第五册
第二百五十九卷至第二百六十三卷
滯下門 二七三九
第二百六十四卷至第二百六十七卷
大小便門 二七八七
第二百六十八卷至第二百七十卷
淋濁遺精門 二八二三
第二百七十一卷至第二百七十七卷
血門 二八五七
第二百七十八卷至第二百七十九卷
汗門 二九二六
第二百八十卷至第二百八十二卷
渴門 二九四四
第二百八十三卷至第二百八十五卷
哮喘門 二九七四
第二百八十五卷至第二百八十七卷
疽門 二九九七
第二百八十八卷至第二百九十一卷
瘧門 三〇二一
第二百九十二卷至第二百九十四卷
厥門 三〇六五
第二百九十五卷至第二百九十七卷
癲狂門 三〇九〇
第二百九十八卷
癇門 三一一五
第二百九十九卷至第三百卷
瘟疫門 三一二七
第三百一卷至第三百二卷
癱瘓門 三一四三
第三百三卷至第三百七卷
虚勞門 三一五九
第三百八卷至第三百十一卷
腫脹門 三二一五
第三百十二卷至第三百十三卷
噎膈反胃門 三二五九

第三百十四卷至第三百十五卷
飲食門 三二八六
第三百十六卷至第三百十八卷
積聚門 三三〇九
第三百十九卷至第三百二十卷
驚悸怔忡健忘門 三三三七
第三百二十一卷
情志門 三三六一
第三百二十二卷
煩躁門 三三七四
第三百二十三卷
嗜卧門 三三八四
第三百二十三卷
不得卧門 三三八七
第三百二十四卷
聲音門 三三九六
第三百二十五卷
呃門 三四〇七
第三百二十五卷
噫氣門 三四一八
第六册
第三百二十六卷
懊憹門 三四二一
第三百二十六卷
懈惰門 三四二二
第三百二十六卷
太息門 三四二六
第三百二十七卷
中蠱門 三四二八
第三百二十七卷
中毒門 三四三三
第三百二十八卷
中惡門 三四四二
第三百二十八卷
卒中暴死門 三四四九

第三百二十九卷
諸哽門　三四五五
第三百二十九卷
五絶門　三四五七
第三百二十九卷
怪病門　三四五八
第三百二十九卷
諸蟲門　三四六二
第三百三十卷至第三百三十二卷
頤養補益門　三四七一
第三百三十三卷至第三百三十四卷
種子門　三五〇四
第三百三十五卷至第三百五十八卷
傷寒門　三五二三
第三百五十九卷至第三百六十七卷
外科癰疽疔毒門　三七六九
第三百六十八卷
外科附骨流注門　三八八一
第三百六十九卷
外科遊風丹毒斑疹門　三八九四
第三百七十卷至第三百七十一卷
外科瘍瘡癩風門　三九〇四
第三百七十二卷至第三百七十三卷
外科浸淫疥癬門　三九二七
第三百七十四卷
外科反花天泡楊梅門　三九四〇
第三百七十五卷
外科癭瘤疣痣門　三九五〇
第三百七十六卷
外科熱瘡痤痈門　三九六五
第三百七十六卷
外科湯火灸凍漆瘡門　三九六八
第三百七十七卷至第三百八十卷
外科跌打金刃竹木破傷門　三九七五
第三百八十卷
外科蟲獸傷門　四〇一三

第三百八十一卷至第三百八十三卷
婦人經脉門 四〇二二
第三百八十四卷
婦人子嗣門 四〇五八
第三百八十五卷至第三百八十六卷
婦人胎前門 四〇七二

第七册

第三百八十七卷
婦人胎前門 四一〇一
第三百八十八卷至第三百八十九卷
婦人臨産門 四一一八
第三百九十卷至第三百九十四卷
婦人産後門 四一三九
第三百九十五卷至第三百九十六卷
婦人崩漏門 四二〇五
第三百九十七卷至第三百九十八卷
婦人帶下門 四二二九
第三百九十九卷
婦人諸乳疾門 四二五二
第四百卷
婦人前陰諸疾門 四二六五
第四百卷
婦人夢與鬼交門 四二七六
第四百卷
婦人交腸門 四二七八
第四百一卷
小兒未生胎養門 四二八〇
第四百二卷
小兒初生護養門 四二八八
第四百三卷至第四百五卷
小兒診視門 四三〇二
第四百六卷
小兒臟腑形證門 四三三七
第四百七卷至第四百十卷
小兒初生諸疾門 四三四九

第四百十一卷至第四百十四卷 四三九四
小兒頭面耳目鼻病門
第四百十五卷至第四百十六卷 四四三四
小兒唇口齒舌喉病門
第四百十六卷 四四五二
小兒胸背手足病門
第四百十七卷至第四百十八卷 四四五八
小兒風寒門
第四百十九卷至第四百二十一卷 四四七七
小兒諸熱門
第四百二十二卷至第四百二十三卷 四五〇九
小兒嗽喘門
第四百二十四卷 四五三五
小兒諸卒中門
第四百二十五卷至第四百三十三卷 四五四六
小兒驚癇門
第四百三十四卷至第四百三十七卷 四六三六
小兒吐瀉門
第四百三十八卷 四六六九
小兒二便門
第四百三十九卷 四六八二
小兒心腹痛門
第四百四十卷 四六九一
小兒腫脹門
第四百四十一卷至第四百四十二卷 四七〇二
小兒食癖門
第四百四十三卷至第四百四十七卷 四七二五
小兒諸疳門
第四百四十八卷 四七七六
小兒痢門
第八册
第四百四十九卷 四七八九
小兒痢門
第四百五十卷 四七九九
小兒癗門

第四百五十一卷
小兒諸汗門 四八〇八
第四百五十一卷
小兒陰病門 四八一二
第四百五十二卷
小兒雜病門 四八一八
第四百五十三卷至第四百五十八卷
小兒瘡瘍門 四八二八
第四百五十九卷至第五百卷
痘疹門 四八八六
第五百一卷至第五百三卷
總論 五三〇〇
第五百四卷至第五百十七卷
醫術名流列傳 五三二九
第五百十八卷至第五百十九卷
藝文 五四七六
第五百十九卷
紀事 五四八四
第五百二十卷
雜録 五四九〇
第五百二十卷
外編 五四九四

元朱震亨心法

亢則害承運制

氣之來也既以極而成災則氣之乘也必以復而得平物極則反理之自然也大抵寒暑燥濕風火之氣木火土金水之形亢極則所以害其物承乘則所以制其極然則極而成災復而得平氣運之妙灼然而明矣此亢則害承運制之意原夫天地陰陽之機寒極生熱熱極生寒鬼神不測有以斡旋宰制於其間也故木極而似金火極而似水土極而似木金極而似火水極而似土蓋氣之亢極所以承之者反勝於己也夫惟承其亢而制其害者造化之功可得而成也今夫相火之下水氣承而火氣無其變水位之下土氣承而水氣無其哉土位之下木承而土順風位之下金乘而風平火熱承其燥金自然金家之疾陰精承其君火自然火家之候所謂亢而爲害承而遞制者如斯而已嘗考之六元正紀大論云少陽所至爲火生終爲蒸溽是水化以承相火之意太陽所至爲寒雪冰雹白埃是土化以承寒水之意也以至太陰所至爲雷霆驟注烈風厥陰所至爲風生終爲肅陽明所至爲散落温少陰所至爲熱生中爲寒豈非亢爲害則承遞制者歟昔者黃帝與岐伯上窮天紀下極地理遠取諸物近取諸身更相問難以作內經至於六微旨大論有極於六氣相承之言以爲制則生化外列盛衰害則敗亂生化大病諸以所勝之氣來於下者皆折其標盛也不然曷以木發而雹雪土發而驟飄木發而毀折金發而清明火發而曛昧此皆變極遞發以承所亢之意也嗚呼通天地人曰儒醫家者流豈止治疾而已當思其不明天地之理不足以爲醫工之語

審察病機無失氣宜

邪氣各有所屬也當窮其要於前治法各有所歸也當防其差於後蓋治病之要以窮其所屬爲先先苟不知出之所歸未免於無差耳故疾病之生不勝其衆要其所屬不出乎五運六氣而已誠能於此審察而得其機要然後爲之治又必使之各應於運氣之宜而不至有一毫差誤之失若然則治病求屬之道庶乎其無愧矣至真要大論曰審察病機無失氣宜意蘊諸此嘗謂醫道有一言而可以盡其要者運氣是也天爲陽地爲陰陰陽二氣各分三品謂之三陰三陽然天非純陽而亦有三陰地非純陰而亦有三陽故天地上下各有風熱火濕燥寒之六氣其斡旋運動乎兩間者而又有木火土金水之五運人生其中臟腑氣血亦與天地相爲流通是知衆疾之作而所屬之機無出乎是也然而醫之爲治當如何哉惟當察乎此使無失其宜而後可若夫諸風掉眩皆屬肝木諸痛癢瘡瘍皆屬心火諸濕腫滿皆屬脾土諸氣賁鬱皆屬肺金諸寒收引皆屬腎水此病屬於五運者也諸暴強直皆屬於風諸嘔吐酸皆屬於熱諸躁擾狂越皆屬於火諸痙強直皆屬於濕諸濇枯涸皆屬於燥諸病水液澄澈清冷皆屬於寒此病機屬於六氣者也夫惟病機之察雖曰既審而治病之施亦不可不詳故必別陰陽於疑似之間辨標本於隱微之際有無之殊者求其有無之所以殊虛實之異者責其虛實之所以異爲汗吐下投其所當投寒熱温涼用其所當用或逆之以制其微或從之以導其甚上焉以遠司氣之犯中焉以辨歲運之化下焉以審南北之宜使小大適中先後合度以是爲治又豈有差殊乖亂之失耶又考之內經曰治病必求其本本草曰欲療病者先察病機此審病機之意也六元正紀大論曰無失天信無逆氣宜五常政大論曰必先歲氣無代天和此皆無失氣宜之意也故素問靈樞之經未嘗不以氣運爲言既曰先立其年以明其氣復有以戒之曰治病者必明天道地理陰陽更勝既曰不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可以爲工矣諄諄然若有不能自已者是豈聖人私愛過計哉以醫道之要悉在乎此也觀乎原病式一書比類物象深明乎氣運造化之妙其於病機氣宜之理不可以有加矣

明虞搏醫學正傳

亢則害承迺制

或問亢則害承迺制之義何如曰王安道論之詳矣其間猶有未悉之旨請陳其略如左黃帝曰願聞地理之應六節氣位如何岐伯曰顯明之右君火之位也君火之右退行一步相火治之復行一步土氣治之復行一步金氣治之復行一步水氣治之復行一步木氣治之復行一步君火治之相火之下水氣承之水位之下土氣承之土位之下風氣承之風位之下金氣承之金位之下火氣承之君火之下陰精承之亢則害承迺制也制則生化外列盛衰害則敗亂生化大病夫五行之木土金水各一惟火有二曰君火曰相火在地理分布六方在歲時分爲六氣初氣自丑至卯始于大寒而終于春分厥陰風木主之二氣自卯至巳始于春分而終于小滿少陰君火主之三氣自巳至未始于小滿而終于大暑少陽相火主之四氣自未至酉始于大暑而終于秋分太陰濕土主之五氣自酉至亥始于秋分而終于小雪陽明燥金主之終氣自亥至丑始于小雪而終于大寒太陽寒水主之夫所謂顯明者指方位而言日出于卯之地也少陰君火始于此而右遷故曰顯明之右蓋天地左旋六氣右旋故曰退行六位之下各有己所不勝者承之于下王氏曰承猶隨也而又有妨之之義以下奉上故曰承其五行之道不亢則隨之而已一有所亢則起而尅勝之也或曰制者制何事害者害何物也曰制者制其氣之太過也害者害承者之元氣也夫所謂元氣者總而言之謂之一元分而言之謂之六元一元者天一生水水生木木生火火生土土生金金復生水循環無端生生不息六元者水爲木之化元木爲火之化元火爲土之化元土爲金之化元金爲水之化元亦運化而無窮也假如火不亢則所乘之水隨之而已一有亢極則其水起以平之蓋恐害吾金元之氣子來救母之意也六氣皆然此五行勝復之理不期然而然者矣制則生化者言有制之常如亢則制而生化不息何害之有外列盛衰者言所承者力衰而所亢者極盛制之不盡耳在天地則爲六淫在人身則爲六疾害則敗亂者言無制之變也所承者衰甚而無氣故所亢者其勢縱橫而不可遏也在天地則大塊絕滅在人身則病篤而死矣大略如斯未盡詳也學者宜參考安道之論斯備矣

六淫之邪

或問六淫之邪當從內經六氣之太過爲是也昔醫和對晉平公之文不曰風寒暑濕燥火而曰陰陽風雨晦明何也曰辭雖異而理實同焉彼謂陰淫寒疾者卽太陽寒水之令太過而爲寒疾也陽淫熱疾者卽少陽相火之令太過而爲熱疾也風淫末疾者卽厥陰風木之令太過而爲末疾也雨淫腹疾者卽太陰濕土之令太過而爲腹疾也晦淫惑疾者卽陽明燥金之令太過而爲疫疾也明淫心疾者卽少陰君火之令太過而爲心疾也或曰陰陽風雨卽爲寒熱風濕之疾彼此固胎合矣所謂晦淫惑疾與明淫心疾二者似不相符請明以告我曰歲金太過燥令大行久晴不雨黃埃被空日月冒明當爲疫癘之疾山嵐瘴氣是也惑當作疫傳寫之誤耳君火太過熱令早行火爲離明之象故曰明淫如內經所謂天明則日月不明是也少陰君火司令故曰心疾春分至小滿時大熱也有釋明爲晝明晦爲夜晦惑爲蠱惑心志皆非也夫晝明夜晦天道自然之理何淫之有其所謂蠱惑心志者亦非天地之淫邪也學者宜再思之

上古聖人仰觀天文俯察地理以十干配而爲五運以十二支合而爲六氣天以六方寓之歲以六氣紀之以天之六氣加臨於歲之六節五行勝復盈虧之理無有不驗傳曰天之高也星辰之遠也苟求其故千歲之日至可坐而致也

樓英醫學綱目

發明天元紀大論運氣經旨

按天元紀大論天有五行節乃論五運六氣之端變化盛虛之始也五運者地之木火土金水治政合於內者也三陰三陽者天之風熱濕燥寒治政合於外者也帝問五運相襲而治者其與三陰三陽外治之候如何合之鬼臾區答以五運陰陽之治乃天地之道萬物之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也故其治也物生謂之化物極謂之變陰陽莫測之謂神神用無方謂之聖其變化神聖謂之用在天則爲風熱濕燥寒三陰三陽之氣在地則風之氣爲木熱之氣爲火濕之氣爲土燥之氣爲金寒之氣爲水而成五運之形故在天之形與地相感而萬物育以爲物生之化也然天地者萬物之上下左右者陰陽之道路此在天三陰三陽之氣右旋於外以加於地也水火者陰陽之徵兆金木者生成之終始此在地

五運之形左轉於內以臨於天也天上之氣有多少地下之形有盛衰故天上多少之氣與地下盛衰之形相召而損益彰以爲物極之變也其氣之多與形之盛相召者益益爲變之盛也氣之少與形之衰相召者損損爲變之虛也蓋物生之化者天地之常氣在五運曰平氣在六氣曰常化也物極之變者天地之變氣在五運曰太過不及在六氣曰淫勝反勝相勝也其變之盛者則五運之太過六氣之淫勝也其變之虛者則五運之不及六氣之反勝相勝也凡此五運六氣所謂變化盛虛經之後篇千言萬語皆所以反覆發明此四者學者當潛心以究之也五運氣行各終期日非獨主時者言木火土金水治政各終一歲之期日不獨治歲內六步之時令也蓋經於前篇但論五運不及六氣但論主時不及治歲今始於此篇論五運六氣相召而治不獨五運也次論五運各治一歲不獨主時也

按氣有多少形有盛衰節乃覆論前節氣有多少形有盛衰上下相召之義也陰陽之氣各有多少者夫三陰三陽之氣各分多少陰多者太陰次少者少陰又次者厥陰也陽多者太陽次少者陽明又次少者少陽也形有盛衰謂五行之治各有太過不及者地五運之行各有盛衰土有太少宮金有太少商水有太少羽木有太少角火有太少徵而太者太過少者不及也上下相召者天右旋之陰陽加於地下地左轉之陰陽臨於天上上下加臨而相召治歲步也天之陰陽風熱燥濕寒又增火爲六數者在天之熱分爲暑火一氣故三陰三陽各上奉之也地之陰陽木火土金水亦增火爲六數者在地之火分爲君相二形故生長化收藏各下應之也其天之陰陽下加地氣共治歲也則應天之氣動而不息蓋地之治歲君火不主運惟五運相循環故天之六氣加之常五歲方餘一氣與地遷移一位而動不息也地之陰陽上臨天氣共治步也則應地之氣靜而守位蓋地之治步其木君相土金水無殊皆各主一步以終期故其上臨天之六氣共治也常六期齊周復於始治之步環會而靜守位也故治歲動者與治步靜者相召外旋上者與內運下者相臨則陰陽相錯而損益盛虛之變所由生也天以六爲節地以五爲制者上下相召之數也蓋天之六氣各治一歲故六期一備地之六位其君火以明相火以位故五歲一周五六相合凡三十歲爲一紀六十歲爲一周其間相錯之陰陽或氣類同多而益爲太過之盛者或氣類異少而損爲不及之虛者斯皆可見其變也甲己之歲土運統之乙庚之歲金運統之丙辛之歲水運統之丁壬之歲木運統之戊癸之歲火運統之地五運一周之數也子午之歲上見少陰熱氣丑未之歲上見太陰濕氣寅申之歲上見少陽相火卯酉之歲上見陽明燥氣辰戌之歲上見太陽寒氣巳亥之歲上見厥陰風氣者天六期一備之數也天地之數五而火熱居三是天地間熱多於寒火倍於水而人病化可推也

發明五運行大論運氣經旨

按五運行大論黃帝坐明堂至願聞其始節乃覆論前篇五運六氣所化陰陽之義也其論五天之象所經星宿爲運氣之化皆干與支同屬者及連位者齊化也土主甲己及丑未之上太陰主之者黔天之氣經於心尾己分之象而心尾者甲也己分者中宮故甲與丑連位己與未同屬齊化濕土也金主乙庚及卯酉之上陽明主之者素天之氣經於亢氐昴畢之象而氐亢者乙地昴畢者庚地故乙與卯同屬庚與酉同屬齊化燥金也水主丙辛及辰戌之上太陽主之者元天之氣經於張翼婁胃之象而張翼者丙地婁胃者辛地故丙與辰連位辛與戌連位齊化寒水也木主丁壬及巳亥之上厥陰主之者蒼天之氣經於危室柳鬼之象而危室者壬地柳鬼者丁地故壬與亥同屬丁與巳同屬齊化風木也火主戊癸及子午之上少陰主之寅申之上少陽主之者丹天之氣經於牛女戊分之象而牛女者癸地戊分者中宮故癸與子同屬戊與午連位齊化火熱也干之甲乙屬木位於東丙丁屬火位於南庚辛屬金位於西壬癸屬水位於北戊己屬土位於中宮支之寅卯配甲乙巳午配丙丁申酉配庚辛亥子配壬癸辰位東南未位西南戌位西北丑位東北爲四維配戊己故甲乙寅卯同屬木丙丁巳午同屬火戊己辰戌丑未同屬土庚辛申酉同屬金壬癸亥子同屬水也甲寅位東方首癸丑位北方尾而甲丑連位癸寅連位也丙位南之首辰位東之尾而丙辰連位也戊己位本火金水中間在天地爲門戶在四時爲長夏南連午而西連申而戊己午申連位故戊己無方位而經獨言戊分己分者表章之也辛戌皆位西之尾而辛戌連位也獨午火連申夾未土於中癸水連寅夾丑土於中者蓋濕土在中水火遊行其間在天居土前在地居土

後而土火常相混也故土旺長夏火熱之內丹溪深悟此理發明濕熱相火爲病十居八九及有濕鬱生熱熱久生濕之論良以此也其五天之象所經星宿分野獨當五運之干位不及六氣之支位者蓋干之與支卽木根本之與枝葉經言干則支在其中矣故其化皆干與支之同屬者連位齊化者是根本枝葉同化者也或曰近世獨以五運之化爲出五天之象六氣之化不言五天之象但將正化對化立說以土正化於未對化於丑金正化於酉對化於卯水正化於戌對化於辰木正化於亥對化於巳君火正化於午對化於子相火正化於寅對化於申又以未酉戌亥寅午之正化爲實無勝復丑卯辰巳子申之對化爲虛有勝復今予所釋經文一以運氣之化皆出五天之氣與彼說異者何也曰經旨皎如日星好事者繫此正化對化之說也謹按經文帝悉陳五運之干六氣之支一併設問非獨問五運不及六氣也岐伯之答亦以五天之象所經星宿一併答五運之干六氣之支非獨答五運而分出六支不答也今何爲不究經旨擅將運氣分作二義妄譔正化對化異說上亂聖經下惑後學而作軒岐之罪人也至於勝復之說經但以子午寅申辰戌六歲之紀氣化大而先天無勝復未聞未酉亥氣化少者爲實無勝復以丑未卯酉巳亥六氣之紀氣化少而後天有勝復未聞子辰申氣化大者爲虛有勝復也

按天地者萬物之上下左右者陰陽之道路也至主歲何如節乃論天右旋於外而寒暑六入以舉其地地受天六入以爲五行左轉化生人物於天之中也天地萬物之上下左右陰陽之道路者天右旋六節之位也上下謂在上者司天之位在下者在泉之位左右謂在上之左右者司天左間右間之位在下之左右者在泉左間右間之位也故天之三陰三陽於其六位右旋如巳亥歲上見厥陰而左間少陰右間太陽至如子午歲厥陰右旋下降則上見少陰而左間太陰右間厥陰常如此逐歲自上旋降於右也而北命其位言其見者謂司天之位在南而面北命其左右則西南爲左間之位東南爲右間之位而言其所見之陰陽也厥陰在上則少陽在下而左間陽明右間太陰至如厥陰右旋下降而少陰在上則陽明在下而左間太陽右間少陽常如此隨司天而旋轉也而南命其位言其見者謂地之位在北而面南命其左右則東北爲左間之位西北爲右間之位而言其所見之陰陽也自天地萬物之上下至此獨論天右旋之氣也上下相遘寒暑相臨氣相得則和不相得則病者言天之右旋遠地方位而其氣與地方位之氣相遘相臨其遘同類相生之氣則和不同類相制之氣則病也或氣雖同類相得亦病者惟相火臨於君火爲不當位故也經下篇云君位臣則順臣位君則逆逆則病近害速者是也動靜何如者帝謂天動能臨於地地靜不能臨天而難上下相遘寒暑相臨之語也岐伯答以上者右行下者左行則知天常於上自右降東南而旋迴以臨地地常於下自左升東北而循顯明木君相土金水之位循環臨於大面皆動下也故左右臨動各皆周天過則復相會也然天之右行卽曆家退度之右行其實皆如地之左行而東升西降也應地者靜此帝復難下者左行之言也岐伯答以天地之變動靜雖殊而其用之變化在地則五行麗地而載生成之形類運於內在天則七曜緯虛而列應天之精氣運於外其形類與精氣之相隨運動猶根本之與枝葉同乎一氣而不殊故但仰觀七曜之象周旋雖遠其動可知也自上下相遘至此通論天右旋地左轉之氣也地之爲下否乎者帝謂天象周旋皆轉於地下而地居其上今曰下者左行則地之左行爲下得非否乎岐伯答以地爲人之下太虛之中者則上下之義始明矣蓋以其所屬言之則司天在泉之氣屬天者爲上五行之屬地者爲下以其所在言之則司天者爲上在泉者爲下而地之五行居中岐伯以所屬言之故曰下者左行帝以所在言之故難地之左行非下也馮者附也地居太虛之中何所馮附而不墜也以大氣舉之也謂風寒暑濕燥火六節大氣旋轉於外任持其地而乾燒動潤降濕以入其體故其入也風寒在下而風居東寒居北燥熱在上而燥居西熱居南濕氣在中而居中央火於未入之前在濕上已入之後在濕下而遊行上下之間也自地之爲下至此原地氣一皆本乎天也候者診候也言天地之氣及勝復之作統貫六位難以診候唯間氣偏治一位故可隨其所在期之於尺寸左右也凡期之之法陽之所在其脈應陰之所在其脈不應故北政之歲人氣面北而寸北尺南地左間之氣在右寸右間之氣在左寸天左間之氣在左尺右間之氣在右尺所以少陰在泉則左間太陰右間厥陰而兩寸俱不應厥陰在泉則左間少陰

而右寸不應太陰在泉則右間少陰而左寸不應少陰司天則左間太陰右間厥陰而兩尺俱不應厥陰司天則左間少陰而左尺不應太陰司天則右間少陰而右尺不應也南政之歲人氣面南而寸南尺北天左間之氣在右寸右間之氣在左寸地左間之氣在左尺右間之氣在右尺所以少陰司天則左間太陰右間厥陰而兩寸俱不應厥陰司天則左間少陰而右寸不應太陰司天則右間少陰而左寸不應少陰在泉則左間太陰右間厥陰而兩尺俱不應厥陰在泉則左間少陰而左尺不應太陰在泉則右間少陰而右尺不應也從其氣則和者陰陽各當尺寸之本位也違其氣則病者陰陽或不當其位或迭移其位或失守其位或尺寸反或陰陽交也不當其位者謂陰陽之見不當尺寸本位也迭移其位者謂陰陽迭皆移轉一位也假如南政少陰司天陰皆在寸陽皆在尺也迭皆左轉者則陰皆移左而左不應陽皆移右而右應迭皆右轉者則陰皆移右而右不應陽皆移左而左應之類是也失守其位者謂本位他位皆失守不見也如陰失守則尺寸皆無陰陽失守則尺寸皆無陽非如迭移而相反相交見於他位也尺寸反者假如北政少陰司天陽在寸陰在尺而陽反見尺陰反見寸之類是也陰陽交者假如北政太陰司天陽在左陰在右而陽反見右陰反見左之類是也寒暑燥濕風火在人合之奈何其於萬物何以生化者言天外旋轉大氣六入地中生化人物其在人之臟腑形體則如何合之在萬物則如何生化之也東方生風者天六入之風居東方地體中爲生生之始也自風而生木酸肝筋心矣凡東方性用德化政令之類皆本乎風而內合人之肝氣者也故肝居左象風之生於東筋爲屈伸象風之動也南方生熱者天六入之熱居南方地體中爲生長之始也自熱而生火苦心血脾矣凡南方性用德化政令之類皆本乎熱而內合人之心氣者也故心居前象熱之生於南血爲人之神象火之明耀也中央生土者天六入之濕居中央地體中爲生化之始也自濕而生土甘脾肉肺矣凡中央性用德化政令之類皆本乎濕而內合人之脾氣者也故脾居腹象濕之生於中央肉充一身象土之充實大地也西方生燥者天六入之燥居西方地體中爲生收之始也自燥而生金辛肺皮毛腎矣凡西方性用德化政令之類皆本乎燥而內合人之肺氣者也故肺居右象燥之生於西皮毛乾於身表象氣之燥也北方生寒者天六入之寒居北方地體中爲生藏之始也自寒而生水鹹腎骨肝矣凡北方性用德化政令之類皆本乎寒而內合人之腎氣者也故腎居後象寒之生於北骨爲百體象寒之堅也五氣更立各有所先非其位則邪當其位則正者謂前五方之氣各治一部之令者也五氣更立治令皆各有所先而其所先者風之立非春令熱之立非夏令濕之立非長夏令燥之立非秋令寒之立非冬令是皆非其位之立爲勝復之邪者也風當春令立熱當夏令立濕當長夏令立燥當秋令立寒當冬令立是皆當其位之立爲本氣之正者也氣相得則微不相得則甚者言非位所立之邪生變之病其邪與治令之氣相得則病微不相得則病甚也主氣者亦謂前五方之氣各治一歲之政者也歲氣有餘則制所勝而侮所不勝如歲木治政之氣有餘則制土氣而濕化減少侮金氣而風化大行也其不及則己所不勝侮而乘之己所勝輕而侮之如歲木治政之氣不及則金氣勝侮而乘之燥化乃行土氣輕而侮之濕氣反布也侮反受邪侮而受邪寡於畏者金侮木不及從而乘之則木之子火報復其勝而侮金反受邪也侮金受邪則其不及之木寡於畏而氣復伸自天地之氣何以候至此原人氣本乎天也

發明六微旨大論運氣經旨

按六微旨大論天之道也如迎浮雲若視深淵視深淵尚可測迎浮雲莫知其極至請言其應節乃論天之陰陽右周天道之常所謂上者右行者也天道六六之節盛衰者天之三陰三陽右旋天外更治歲政每歲各一盛衰至六歲周遍通得盛衰之節六六也上下有位左右有紀者謂每歲陰陽盛衰之位上下謂司天在泉二位也左右謂司天之左間右間及在泉之左間右間爲四紀也凡天右旋之陰陽臨司天之位者其天之政盛至三之氣始布臨在泉之位者其地之氣盛至終之氣始布而上下二位有二節陰陽盛衰也臨司天之左間者其氣至四之氣盛右間者其氣至二之氣盛臨在泉之左間者其氣至初之氣盛右間者其氣至二之氣盛而左右四紀有四節陰陽盛衰也故此六節陰陽每歲各一盛衰而數得六庚申歲少陽旋來司天治之爲初六少陽之右卯酉歲陽明旋來司天治之爲六二陽明之右辰戌歲太陽旋來司天治之爲六三太陽之右巳亥歲厥陰

旋來司天治之爲六四厥陰之右子午歲少陰旋來司天治之爲六五少陰之右丑未歲太陰旋來司天治之爲六六太陰之右周而復始於少陽治之故曰六六之節盛衰也凡此三陰三陽爲治之氣皆所謂六氣之標也南面待之者明前少陽之右云云皆南面立而待之乃右居西而從西旋過東也少陽之上火氣治之中見厥陰陽明之上燥氣治之中見太陰太陽之上寒氣治之中見少陰厥陰之上風氣治之中見少陽少陰之上熱氣治之中見太陽太陰之上濕氣治之中見陽明者其火燥風寒熱濕爲治之氣皆所謂六氣之本也其中見之氣乃六氣之中氣也通前六氣之標言之則本居上標居下中氣居本標之中故曰本之下中之見也見之下氣之標也中氣者三陰三陽各猶夫婦之配合相守而人之臟腑經脈皆應之也故少陽本標之中見厥陰厥陰本標之中見少陽而互爲中氣相守則人之膽三焦少陽經亦絡肝心包肝心包厥陰經亦絡膽三焦而互交也陽明本標之中見太陰太陰本標之中見陽明而互爲中氣相守則人之胃大腸陽明經亦絡脾肺脾肺太陰經亦絡胃大腸而互交也太陽本標之中見少陰少陰本標之中見太陽而互爲中氣相守則人之膀胱小腸太陽經亦絡腎心腎心少陰經亦絡膀胱小腸而互交也本標不同氣應異象者謂太陽少陰二氣也太陽之上寒氣治之是標陽本寒不同其氣應則太陽所至爲寒生中爲溫而寒溫異象也少陰之上熱氣治之是標陰本熱不同其氣應則少陰所至爲熱生中爲寒而熱寒異象也至於脈從病反如瓜甜蒂苦葱白葉青參補蘆瀉麻黃發汗根節止汗之類皆太陽少陰本標不同之氣應異象也其有至而至有至而不至有至而太過者言陰陽旋來治歲之候至而其氣化亦應候至者爲至而至者和也候至而其氣化不至者爲至而不至旋來之氣不及也候未至而氣化先至者爲未至而至旋來之氣有餘也故氣化應候至者爲順未至而至至而不至者爲逆逆則勝復之變生變生則病作矣物生其應氣脈其應者覆說應則順之義也經所謂厥陰所至爲風生之類是物生之應厥陰之至其脈弦之類是氣脈之應也

按帝問地理之應六節氣味何如至位之易也節乃論地之陰陽左運地理之常所謂下者左行者也地理應六節氣位者地之四方分爲六步更治時令以應天外六節氣位之治也顯明之右君火之位者日出顯明卯地之右在方屬東南在時屬春分卯中之後爲君火之位也君火之右退行一步相火治之者地氣至南方相火位行令治夏至前後三之氣以應司天之政布其運主戊癸歲以應司天之政治歲也復行一步土氣治之者地氣至西南土位行令治秋分前四之氣以應司天左間之氣盛其運主甲己歲以應司天之政治歲也復行一步金氣治之者地氣至西北金位行令治秋分後五之氣以應在泉右間之氣其運主乙庚歲以應司天之政治歲也復行一步水氣治之者地氣至北方水位行令治冬至前後終之氣以應在泉之氣布其運主丙辛歲以應司天之政治歲也復行一步木氣治之者地氣至東北木位行令治春分前初之氣以應在泉左間之氣盛其運主丁壬歲以應司天之政治歲也復行一步君火治之者地氣至東南君火位行令治春分後二之氣以應司天右間之氣盛其運周歲相火代之不主歲也凡此六步治令之時各行本方之氣入於中國故木於東方治令時春氣西行而中國皆東方溫氣與在泉左間所居之氣也君相於南方治令時夏氣北行而中國皆南方熱氣與司天右間所居之氣也金於西方治令時秋氣東行而中國皆西方涼氣與司天左間所居之氣也水於北方治令時冬氣南行而中國皆北方寒氣與在泉右間所居之氣也六氣之下各有所制之氣承之者蓋五行之氣一極則一生而循環相承無一息間斷也相火之下水氣承之者夏相火極水生承之從微漸化至冬著也水位之下土氣承之者冬水極土生承之從微漸化至長夏著也土位之下木氣承之者長夏土極木生承之從微漸化至春著也木位之下金氣承之者春木極金生承之從微漸化至秋著也金位之下火氣承之者秋金極火生承之從微漸化至夏著也君火之下陰精承之者夏君火極陰精承之從微漸化至冬著也其意與陰陽家水胎於午金胎於卯等說大同小異而皆循環相承以爲胎也亢過極也亢則害承迺制制則生化外列盛衰害則敗亂生化大病者言六五之氣過極則必害作承氣乃生於下制之使不過也故制則從微化著承者自外列盛極者自外列衰而生化循環害作則敗壞撥亂而生化大病也盛衰非其位則邪當其位則正者覆明上文制則生化外列盛

衰之盛衰也蓋制亢下承生化之盛衰惟歲氣和平則其所化循序漸進從微至著而皆當六位之正其歲氣有太過不及則其所化無序或躐等陵節或乘危往勝故變或兼化而爲牛非其位之邪變或復勝而爲仝非其位之邪也木運臨卯火運臨午土運臨四季金運臨酉水運臨子所謂歲會氣之平者言此八歲皆歲與五運相會而氣和平其盛衰皆能循序當六位之正如餘歲不與運會則氣有太過不及其盛衰皆無序而非其位也或曰王氏註文釋水承火下者熱甚則涸溢象水也土承水下者寒甚則冰堅象土也風承土下者雨爲疾風吹零也金承風下者風動氣清萬物皆燥也火承金下者火煆金流也林氏校正又引木發而毀折及以厥陰所至爲飄怒大凉等語證之河間又以亢則害承迺制六字之義著書立論一家之說其說皆指六位下承之氣爲旦夕之暴作今吾子獨謂爲四時之循環必將有說通之而證其得失是非乎曰經下文制則生化外列盛衰盛衰當其位則正非其位則邪數句論下承之義親切詳備足可證其得失是非矣今經云若火之右退行一步相火治之水氣承之復行一步土氣治之木氣承之復行一步金氣治之火氣承之復行一步水氣治之土氣承之復行一步木氣治之金氣承之復行一步君火治之陰精承之一節乃下承生化之盛衰當其位則正之旨也蓋其盛衰循序不亂盛者當治之正位衰者當承之正位而各當本位之正故温當春熱當夏凉當秋寒當冬而氣候和平以爲生長收藏焉此則經之本旨論四時循環當位正化也王氏註文所釋下承之義又引林氏所引木發毀折厥陰所至爲飄怒大凉之證乃下承生化之盛衰非其位則邪者也蓋其盛衰無序而亂故木發毀折者暴亢極之木飄怒半兼暴承下之金殺同化而盛衰半非其位爲兼化之邪也厥陰所至爲飄怒大凉者暴亢極之木飄怒爲暴承下之金凉報復而盛衰全非其位爲勝復之邪也故温非春熱非夏凉非秋寒非冬而或和或乖以爲人之百病焉此則王氏林氏誤用旦夕暴作非位之邪釋經當位之正也然其非位之兼化勝復又有太過不及之殊今河間所伸王氏林氏之說以亢則害承迺制六字釋變氣之義有曰木極似金金極似火火極似水水極似土土極似木皆以亢過極則反似勝己之化者有曰制甚則兼化乃虛象者有曰治兼化但當瀉其亢甚之氣爲病本不可反誤治其兼化者諸儒此言皆謂五氣變盛之兼化若夫不及者則未之及也按五常政大論云木不及曰委和委和之紀其動緩戾拘緩其味酸辛其色白蒼其聲角商火不及曰伏明伏明之紀其動彰伏變易其味苦鹹其色元丹其聲徵羽土不及曰卑監卑監之紀其動瘍涌分潰癰腫其味酸甘其色蒼黄其聲宮角金不及曰從革從革之紀其動堅禁脅厥其味苦辛其色白丹其聲商徵水不及曰涸流涸流之紀其動堅止其味甘鹹其色黔元其聲羽宮委和所謂緛戾拘緩者緛王註謂縮短也蓋木之條達不及而極則金兼化縮短承於非位以勝之也戾肢體曲戾也拘筋脈拘強也木爲金之縮短牽引而曲戾拘強也緩筋脈緩縱也金勝木則土寡於畏故土兼化緩縱於其空隙而拘者自拘緩者自緩也酸辛白蒼角商皆木不及而天極金於非位承之兼化也伏明所謂彰伏變易者彰火化彰明也伏水化隱伏也變易火不及水兼之而或彰或伏變易不常也苦鹹元丹徵羽者皆火不及而天極水於非位承之兼化也卑監所謂瘍涌分潰癰腫者瘍癰腫土化壅塞也涌分潰木化啓坼也土化壅塞而爲瘍癰腫木兼化啓者而爲騰涌分潰其壅塞也酸甘蒼黄宮角者土不及而天極木於非位承之兼化也從革所謂堅禁脅厥者堅謂金化堅聲而爲刻也禁謂閉氣抑喉而禁忍其刻也蓋金肺太過則欲氣伸而喘喝胸憑仰息金肺不及則欲氣蓄而禁忍咳也脅昏也厥逆也金化堅禁而不及則火兼化皆脅厥逆之氣升於禁忍之處也苦辛白丹商徵者皆金不及而天極火於非位承之兼化也涸流所謂堅止者堅堅乾止定止也水少堅乾而土堅之定止也甘鹹黔元羽宮者皆水不及而天極土於非位承之兼化也凡此皆氣虛所變之兼化其治法當補本氣之虛非如氣盛兼化之法當瀉今河間倒言治兼化但當瀉其亢甚之本氣者可乎其所兼之化皆本氣不足所承者得以勝之而然不治則本氣愈衰承氣愈勝今列言兼化爲相似之虛象不可反治之者可乎此則河間誤釋太過不及所變之兼化皆爲太過也曰王氏林氏河間氏失經旨意已即命矣然六位下承之氣所以爲正化之常者爲兼化勝復之變者爲和者爲乖者之詳猶有可得聞之而一證之以經旨乎曰至誠無息者道體也陰陽五行在天地間流行一極一生而

更互相承循環無端者與道爲體也故其相承以陰陽言則冬至陰極陽生承之夏至陽極陰生承之也以五行言之則五行即陰陽之相承特有盛稱之分耳故火盛陽水盛陰木稱陽金稱陰土負陰抱陽爲沖氣其在陰陽相承則冬至陰極陽生承之始於長夏土之沖氣極木稱陽生承之次於秋金之稱陰極火盛陽生承之終於冬水之盛陰極土沖氣生承之也夏至陽極陰生承之始於春木之稱陽極金稱陰生承之次於夏君火之盛陽極陰精生承之終於夏相火之盛陽極陰生承之而一歲一周也其在五行自相承則君火相火之下陰精水氣承之水位之下土氣承之者初歲也土位之下木氣承之者二歲也木位之下金氣承之金位之下火氣承之者凡三歲周而復始也故混而陰陽分而五行常如是更互相承循環無端者實由相承之體至誠無息而然聖人在川上所謂逝者如斯夫不舍晝夜正謂此至誠無息之體也然以其相承之體言之則至誠無息隨極而承無常變和乖之殊以其流行之用言之則極於平氣之紀而當其位承之者爲正化之常而爲和極於太過不及之紀而非其位承之者爲兼化勝復之變而爲乖也其常者則循序漸進以爲四時之周流其變者則或肆威太過而暴極於非位或勢力不及而天極於非位故所承者皆隨其極制於下而蹺等陵節變其本氣以爲旦夕之暴化是故半變者本氣半衰下承半盛而爲半非位之兼化全變者本氣全衰下承全盛而爲全非位之勝復和而變者爲德化政令乖而變者爲災害皆傷也經所謂發生之紀其變振拉摧拔之類乃太過之兼化木不勝德則收氣復之類乃太過之勝復委和之紀其動緜長拘緩之類乃不及之兼化肅殺炎赫沸騰之類乃德化政令之勝復水發而雹雪木發而毀折之類乃災害皆傷之兼化厥陰所生爲飄怒大涼少陰所至爲大暄寒之類乃災害皆傷之勝復也故均是至誠無息之體但其所極所承者有常變和乖之不齊則其應見者有正化兼化勝復及微甚災祥之各異王氏林氏不分變化釋變化爲變氣何間不分虛實釋兼化爲盛皆不思之過也

按顧聞其步願聞其用節乃論天之陰陽與地之陰陽相錯而變生所謂動靜相召上下相臨陰陽相錯者也步者帝嘗問上觸地之六步也六十度有奇者地之六步繞天一周凡三百六十五度以爲一歲之日數而每步各得六十度有奇也故一日爲一度六十日八十七刻半爲一步而不盈日積二十四步凡四歲則其餘奇積盈百刻而成日於歲終以爲一紀也六氣應五行之變者帝覆取上文天道六六之節及地理應六節氣位二節之義合而問之也言天六氣風熱濕火燥寒盛衰相應地五行木君火相火土金水之治令者同一歲步而其氣錯之變何如求之也位即步也位有終始者即天六氣之盛者應地五行之治令者同在一步而其候有終始也氣有初中者即每步始終之盛而治令之氣分爲前後前半步爲初氣主地氣升後半步爲終氣主天氣降也天上地下之氣相錯於位之終始氣之初中不同而求之之法亦異也天氣始於甲地氣始於子者求位有終始之法也言天地之氣皆自甲子歲始求之者謹按其始終之時則其氣候之至可與之期也歲六氣始終早晏者蓋天地二氣之始終有步候之分其在步候則一歲六步每步天地之氣始終各治六十日八十七刻半其在歲候則每歲天地之始終各治二百六十五日二十五刻今帝先問一歲六步之氣始終之候早晏也甲子之歲始於水下一刻終於八十七刻半者甲子歲六步其天之氣少陰司天而左間太陰右間厥陰陽明在泉而左間太陽右間少陽皆各於所在之步更盛而相應地氣同治其令令初之氣則在泉左間太陽寒氣盛相應地東北木氣治令而同主春分前六十日八十七刻半始終之候早晏也二之氣始於八十七刻六分終於七十五刻者司天右間厥陰風氣盛相應地東南君火治令而同主春分後六十日八十七刻半始終之候早晏也三之氣始於七十六刻終於六十二刻半者司天少陰熱政布相應地南方相火治令而同主夏至前後六十日八十七刻半始終之候早晏也四之氣始於六十二刻六分終於五十刻者司天左間濕氣盛相應地西南土氣治令而同主秋分前六十日八十七刻半始終之候早晏也五之氣始於五十一刻終於三十七刻半者在泉右間火氣盛相應地西北金氣治令而同主秋分後六十日八十七刻半始終之候早晏也終之氣始於三十七刻六分終於二十五刻者在泉陽明燥氣盛相應地北方水氣治令而同主冬至前後六十日八十七刻半始終之候早晏也天地之氣在甲子歲六步始終之候早晏餘歲同例推之也歲

候者帝因步候而問及歲候也蓋天地於一歲之政天氣之司天在上者共主一歲地氣之主運者居中配之凡二氣之候同其始終於一歲也日行一歲月行一周天也氣始於一刻者甲子歲司天少陰熱氣在泉陽明燥氣中運太宮土氣之候始同治其歲也日行二周天氣始於二十六刻者乙丑歲司天太陰濕氣在泉陽明燥氣中運少商金氣之候始同治其歲也日行三周天氣始於五十一刻者丙寅歲司天少陽火氣在泉厥陰風氣中運太羽水氣之候始同治其歲也日行四周天氣始於七十六刻者丁卯歲司天陽明燥氣在泉少陰熱氣中運少角木氣之候始同治其歲也此天地之氣在初紀四歲始終之候餘紀同例推之也用者用前歲步始終之候求天地之氣也言天者求之本言地者求之用言人者求之歲交者言用前歲步始終之候也言求天氣者則求風寒暑濕燥火之本氣其標與中氣不必求之也言求地氣者則求木火土金水之位氣其下承之氣不必求之也言求人氣者則求氣交中所應見之氣若其不應見者不必求之也就甲子歲初之氣言之則言求天氣者求司天之熱在泉之燥泉左間之寒也言求地氣者求中運之土本部之木也言求人氣者則求氣交所應見者或熱或燥或寒或土或木五者之氣爲常非是五者皆勝復之邪變也氣交者天地二氣之交接以人之身半天樞爲界天樞之上至司天之位屬天氣主之天樞之下至在泉之位屬地氣主之天地二氣於天樞交接之界分屬人氣之所從萬物之所由故曰氣交也凡此天地始終之候亙古不易之體也初凡三十度有奇中氣同法者求氣有初中之法也言每步六十日八十七刻半其前三十日有奇則爲初氣而月屬陽主天樞已下之氣皆升後三十日有奇則爲中氣而月屬陰主天樞已上之氣皆降就甲子歲初之氣言之天樞已下者謂在泉燥氣泉左間寒氣中運土氣本部木氣皆上升也天樞已上者謂司天熱氣下降也升已而降降者流地降已而升升者騰天故高下相召升降相隨而氣盈錯雜勝復相乘由是變常化於氣交而作勝復也蓋天地之氣各皆均平則於升降之間各守界分而應歲步本位始終之常化其有盈虛多少則盈而同類多者勝勝則越出歲步之本位虛而同類少者侮侮則爲非歲步本位之氣氣乘來勝故常化變而勝復作矣凡此天地升降之氣隨時變化之用也或曰天之陰陽六節惟司天在泉二節統盛一歲餘四節獨盛一步者何也曰司天在泉二節正當天地之中其升降常在中國相持故統盛一歲餘四節各居四方其升降不在中國惟治令一方所居之氣隨春令西行夏令北行秋令東行冬令南行入歸中國盛之故此四節各隨四時之令獨盛一步也若夫勝復作而出位變常者雖不居治令之力亦入中國往復也曰天氣以風暑濕火燥寒爲序而濕居火前地氣以木火土金水爲序而土居火後夫濕土一氣其位不同何也曰在天爲氣故天以三陰三陽之氣多少爲序在地成形故地以五行之形相生爲序其以氣之多少爲序者從少漸多則陰之序始厥陰厥陰者一陰也次少陰少陰者二陰也終太陰太陰者三陰也陽之序始少陽少陽者一陽也次陽明陽明者二陽也終太陽太陽者三陽也此則天氣以陰陽之多少爲序而濕居火前也其以形之相生爲序者生生不已則其氣始於木初之氣木生火故君火爲二之氣相火爲三之氣火生土故土爲四之氣土生金故金爲五之氣金生水故水爲終之氣而復生木此則地氣以五行之相生爲序而土居火後也王太僕以少陽次太陽陳無擇以濕土生相火可謂不究經旨矣按寒暑相遘燥熱相臨風火相值其有間乎至不生不化節乃論天地陰陽之變寒濕相遘燥熱相臨風火相值其有間乎帝承上篇天地初中升降之義而問寒濕燥熱風火等氣其於升降相遘相臨相值之交接處有空隙之間否乎岐伯答以氣有勝復者言天地相遘相臨相值者凡五氣有盈虛多少常於升降之交接處強弱侵凌乘勢勝復無空隙之間也故其勝復之作於升降交接處有爲數和彰顯瀑蒸清潔淒滄之德者有爲生榮蕃茂豐備緊斂清謐之化者有爲曲直燔爍高下散落沃衍之用者有爲摧拔炎烈淫潰肅殺凝冽之變者唯變則邪氣居之於人爲病死也帝問何謂邪乎言何故謂變爲邪也岐伯答以物之生從於化物之極由乎變者言變化二氣猶陰陽晝夜之相反而物之生從化極由變故變之於化更相薄物則化者成之所由而爲正氣變者敗之所由而爲邪氣故謂變爲邪也氣有往復用有遲速者言變化之氣皆有往復其往復之期皆有遲速也如經所謂春有鳴條律暢之化則秋有霧露清涼之政者是其化氣往復之類是也冬有慘悽殘賊之

勝則夏有炎暑燔爍之復者是變氣往復之類又皆其往復之用遲者也所謂少陰所至爲大暄寒陽明所至爲散落溫者是其往復之用速者也凡變化必有此往復遲速四者播扇然後化之正風變之邪風始來薄人也成敗倚伏遊於中者即冬傷於寒春必病溫春傷於風夏必飧泄及仲景所謂伏氣伏寒之類是也帝問遲速往復播扇風所由生而化而變故因運氣盛衰之變而常然生風者耳人感其風以爲成敗者則倚伏遊行於中不於當時隨所感發作者何也岐伯答成敗倚伏生於動動而不已則變作者倚伏之義始明丹溪所謂傷寒屬內傷十居八九之論深得斯旨也言成敗倚伏遊於中者皆生於人之所動人動有節而自養則其氣和而所感者亦化氣之和來居以爲成身之生氣倚伏遊於中焉人動無節而煩勞則其氣乖而所感者亦化氣之乖來居以爲敗身之病根倚伏遊於中焉至於動而不已煩勞無休而重感變氣以啓之然後舊之倚伏者始發而變作矣期者變作之期也言變動而不以之動作也不生不化靜之爲期而死矣故曰不生不化靜之期也故動物靜則以口鼻出入之息廢而神機化滅爲期植物靜則以根柯升降之化已而氣之孤危爲期也故動物非息出入則無以生長壯老已植物非化升降則無以生長化收藏是以升降出入無器不有故動植之器乃化生之宅宇氣散則出入升降各相離分而生化息矣故無不出入無不升降化有大小自蠢動之微至天地之廣期有近遠自蜉蝣之朝生暮滅至聃彭之壽年千百凡此大小遠近四者之有

皆貴乎守常反常則災害至而靜期促矣

發明六元正紀大論運氣經旨

按六元正紀大論六化之正六變之紀至天地之氣盈虛章乃論五運六氣應見候也六化之正者常氣也六變之紀者變氣也有化有變有勝有復有用有病之六候者化之一候六化之正應見也變勝復用病五候六變之紀應見也厥陰所至爲和平流泄禁止十二節論化變病三候也曰時化司化氣化德化之常及布政令行之常者論化之候也曰氣變之常者論變之候也其曰病之常者論病之候也凡此十二變至言其變一節論勝復之二候也六氣之用至方月一節論用之一候也時化之常者六部生氣之常化也司化之常者司天在泉六位之常化也氣化之常者五運之常化也厥陰所至爲風生終爲蒲少陰所至爲熱生中爲寒太陰所至爲濕生終爲注雨少陽所至爲火生終爲蒸溽陽明所至爲燥生終爲涼太陽所至爲寒生中爲溫者其風生熱生濕生火生燥生寒生六者本氣也終爲蒲終爲注雨終爲蒸溽終爲涼四者標氣也中爲寒中爲溫二者中氣也夫本之下中之見也見之下氣之標也故其生物之德皆始於本氣終於標氣而終氣常居標本之中故言標本則中氣在其中矣惟少陰太陽言中而不言終者蓋少陰太陽中氣與標氣同故言中則標氣亦在其中矣德化之常者德生植物之常化也其次德化之常者德生動物之常化也凡此十二變者言前德化政令病變十二節之候若不當蔵步主客正位而至者則爲變氣而爲勝復也凡勝復之候至其勝

氣變德則報復以德變化則報復以化變政令則報復以政令而其氣之往復不能相移也所變之氣居高則報復亦高居下則報復亦下居後則報復亦後居前則報復亦前居中則報復亦中居外則報復亦外而其位之高下亦不能相移也由是言之則天下風寒暑濕燥火之變常不能同也南方清燥而旱北方雨濕而澇者有之中原冰雪而寒左右鬱蒸而熱者有之況地理有高下形勢有大小高者氣寒多清燥下者氣熱多雨濕小者小異大者大異而錯雜於天道不一之變矣王氏釋高下前後中外俱作人身生病之所而不及地理之分野宜程子以天下旱潦常不同之義非運氣主歲之說也風勝則動熱勝則腫燥勝則乾寒勝則浮濕勝則濡泄甚則水閉附腫隨氣所在以言其變者勝復爲病之位也假若風於高處勝則人身亦於高處病頭重而掉眩風於下處勝則人身亦於下處病足動而戰慄又如熱於高處勝則人身亦於腰上分野病腫熱於下處勝則人亦於腰下分野病腫熱皆隨六氣勝復之所在高下前後中外以言其變病之所也六氣之用各歸不勝而爲化者謂各歸不勝之方月施化也方月者假如厥陰司天之歲則陽明之位在泉右間其方月東北初之氣也太陽之位右間其方月東南二之氣也厥陰之位司天其方月正南三之氣也少陰之位在天左間其方月西南四之氣也太陰之位在泉右間其方月西北五之氣也少陽之位在泉其方月正北終之氣也故其歲施用太陰雨化施於東南二之氣太陽之位太陽寒化施於西南四之氣少陰之位少陰

熱化施於東北初之氣陽明之位陽明燥化施於正南三之氣厥陰之位厥陰風化施於西北五之氣太陰之位皆各命其所在之化以徵驗其所施之化於歲同法推之也自得其位在本位之方月施化也如厥陰之歲則太陰自得於西北五之氣本位施雨化太陽自得於東南二之氣本位施寒化少陰自得於西南四之氣本位施熱化少陽自得於正北終之氣本位施火化陽明自得於東北初之氣本位施燥化厥陰自得於正南三之氣本位施風化於歲同法推之也大者之至徐而常者六氣之盈者爲病則其勢反徐而微治法當逆之也少者之至暴而亡六氣之虛者爲病則其勢反暴而甚治法當從之也人見其氣暴烈驟用峻劑攻之則熱病未已寒病復始殊不知大者之氣反微少者之氣反甚也

發明至眞要大論運氣經旨

按至眞要大論五味陰陽之用至逆從反治節乃論內氣不調得病者之治法也蓋內氣不調而得病故所病寒熱之邪但可於其氣之微者逆治之如氣甚而逆治之則正邪格拒不能勝邪命將難全故但當從其寒熱之邪於外伏其所主之劑於中然後正邪相入而邪就擒矣東垣所謂薑附寒飲承氣熱服及仲景於白通湯加尿膿治少陰丹溪於芍藥湯皆熟炒治色目婦人惡寒之類是也

按氣調而得節乃論內氣本調因外邪得病者之治法也蓋內氣調而得病故不分寒熱之微甚或逆治之或從治之皆可更不須懼其正邪格拒正固則邪自退矣

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百三十九卷目錄
醫部彙考一百十九
運氣門九
邵弁運氣占候補遺 五運氣至之占 五運太過之占 五運不及之占 復氣應時占 五星應化占 五氣動亂占 五氣鬱發占 地理高下左右占 六氣正變占 在泉淫勝占 司天淫勝占 占六氣之勝 占六氣之復 釋亢則害承迺制 釋病機十九條
李梴醫學入門 運氣總論
藝術典第一百三十九卷
醫部彙考一百十九
運氣門九
明邵弁運氣占候補遺
五運氣至之占
帝曰余聞五運之數於夫子不合陰陽其故何也岐伯曰是明道也此天地之陰陽也夫數之可數者人中之陰陽也然所合之數可得者也夫陰陽者數之可十推之可百數之可千推之可萬天地陰陽者不以數推以象之謂也丹天之氣經於牛女戊分黔天之氣經於心尾己分
註 牛女癸也戊癸化火又癸與子同屬戊與午連位皆火分也心尾甲也甲己化土又甲與丑連位己與未同屬皆土分也
蒼天之氣經於危室柳鬼
註 危室壬地柳鬼丁地壬與亥同屬丁與巳連位齊化木也
素天之氣經於氐亢昴畢
註 氐亢乙地昴畢庚地乙與卯同屬庚與酉連位同化金也
元天之氣經於張翼婁胃
註 張翼丙地婁胃辛地丙與辰連位辛與戌同屬齊化水也
所謂戊己分者奎壁角軫則天地之門戶也
註 戊己位木火金水中間在天地爲門戶在四時爲長夏南連午西連申故戊己無方位而經獨言戊分己分也戊火連申夾未土於中癸火連寅夾丑土於中者蓋濕土在中火游行其間在天居土前在地居土後而土火常相混也
夫候之所始道之所生不可不通也
註 五氣之至各有五色經於分野氣太過則先天而至氣不及則後天而至常以寅卯前候之自然可見此占候之所始道之所生不可不通也
五運太過之占
諸壬歲木太過風氣流行脾土受邪上應歲星
註 歲星光明逆守宿屬分有災也
化氣不政生氣獨治雲物飛動草木不寧甚而搖落上應太白星
註 木餘土鬱化政不布於萬物故生氣獨治也風氣動甚草木不寧甚而搖落金來復之也故太白逆守屬星者危也
諸戊歲火太過炎暑流行金肺受邪上應熒惑星收氣不行長氣獨明雨水霜寒上應辰星
註 火獨行水折之辰星逆凌寒災於物也占辰星者常在日之前後三十度其災之發當至南方
諸甲歲土太過雨濕流行腎水受邪上應鎮星變生得位
註 謂土旺時月也
藏氣伏化氣獨治之泉涌河衍涸澤生魚風雨大至土崩潰鱗見於陸上應歲星
註 土不務德木來折之也
諸庚歲金太過燥氣流行肝木受邪上應太白星收氣峻生氣下草木斂蒼乾凋隕上應熒惑星
註 金勝而火復之也
諸丙歲木太過寒氣流行邪害心火上應辰星大雨至埃霧朦鬱上應鎮星
註 水勝土復也
上臨太陽雨冰雪霜不時降濕氣變物上應熒惑辰星
註 辰戌天符之歲水勝而火絕熒惑減燿辰星明瑩逆守宿分有災也
五運不及之占
諸丁歲木不及燥乃大行生氣失應草木晚榮肅殺而甚則剛木辟著悉萎蒼乾上應太白星
註 金侮木之不勝也
上臨陽明生氣失政草木再榮化氣乃急上應太白鎮星其主蒼早
註 丁卯丁酉歲陽明上臨是謂天刑運也木氣既少土氣無制故化氣生成急速鎮星太白潤而明蒼色之物早凋落也
復則炎暑流火濕性燥柔脆草木焦槁下體再生華實齊化上應熒惑太白

註火復其金太白滅燿也
白露早降收殺氣行寒雨害物蟲食甘黃脾土受邪
赤氣後化心氣晚治上勝肺金白氣乃屈上應熒惑
太白星
註熒惑益明太白芒滅
諸癸歲火不及寒乃大行長政不用物榮而下凝慘
而甚則陽氣不化乃折榮美上應辰星
註木盛火衰也
復則埃鬱大雨且至黑氣乃辱上應鎮星辰星
註土復於水也
諸己歲土不及風乃大行化氣不令草木茂榮飄揚
而甚秀而不實上應歲星鎮星
註木盛土抑也
復則收政嚴峻名草蒼凋蒼穀乃損上應太白歲星
註金復木也
上臨厥陰流水不冰蟄蟲來見藏氣不用白乃不復
上應歲星
註己巳己亥歲也厥陰上臨火司於地故流水不
冰蟄蟲不藏歲星如常也
諸乙歲金不及炎暑乃行生氣乃用長氣專勝庶物
以茂燥鑠以行上應熒惑星收氣乃後上應太白星
註火盛金衰也
復則寒雨暴至乃零冰雹霜雪殺物陰厥且格陽反
上行上應辰星
註水復火也
諸辛歲水不及濕乃大行長氣反用其化乃速暑雨
數至上應辰星
註土盛水衰也
上臨太陰則大寒數舉蟄蟲早藏地積堅冰陽光不
治上應鎮星
註辛丑辛未歲也土氣專盛木不得復故鎮星明
復則大風暴發草萎木零生長不鮮黃氣乃損其穀
不登上應歲星
註水復土也凡五星之變應常不應卒氣有卒然
而動者星亦不爲之變也

復氣應時占

木不及春有鳴條律暢之化則秋有霧露清涼之政
春有慘悽殘賊之勝則夏有炎暑燔爍之復
火不及夏有炳明光顯之化則冬有嚴肅霜寒之政
夏有慘悽凝慘之勝則不時有埃昏大雨之復
土不及四維有埃雲潤澤之化則春有鳴條鼓坼之
政四維發振拉飄騰之變則秋有肅殺霧露之復
金不及夏有光顯鬱蒸之令則冬有嚴凝整肅之應
夏有炎鑠燔爇之變則秋有冰雹霜雪之復
水不及四維有湍潤埃雲之化則不時有和風生發
之應四維發埃昏驟注之變則不時有飄颯振拉之
復夫五運之政猶權衡也高者抑之下者舉之化者
應之變者復之氣之常也故曰天地之動靜神明爲
之紀陰陽之往復寒暑彰其兆此之謂也

五星應化占

帝曰夫子之言歲候太過不及而上應五星今夫德
化政令災眚變易非常而有也卒然而動其亦爲之
變乎岐伯曰承天而行之故無妄動無不應卒然而
動者氣之交變也其不應焉故曰應常不應卒此之
謂也帝曰其應奈何岐伯曰各從其氣化也
註如歲星之化風應之熒惑之化熱應之是也
帝曰其行之徐疾逆順何如岐伯曰以道留久逆守
而小是謂省下
註以道謂順行留久謂過應留之日數也省下察
天下人主之善惡也
以道而去去而速來曲而過之是謂省遺過也
註已去復來逆行而速委曲經過是省其遺過
久留而環或離或附是謂議災與其德也
註如環盤旋不去也火議罪金議殺木水土議德
應近則小應遠則大
註近謂犯星猶在遠謂犯星去久大小謂應禍福
芒而大倍常之一其化甚大常之二其眚即也小常
之一其化滅小常之二是謂臨視省下之過與其德
也德者福之過者伐之是以象之見也高而遠則小
下而近則大故大則喜怒遷小則禍福遠歲運太過
則運星北越
註北越謂背而行也
運氣相得則各行以道
註無妄伐之嫌故守常而各行於中道也
故歲運太過則畏星失色而乘其母
註如木太過則土星色赤也
不及則色乘其所不勝
註如木不及則木星色白天氣制勝己地氣制己
勝天制色地制形色乘其所不勝則制勝己
帝曰其災應何如岐伯曰亦各從其化也故時至有
盛衰凌犯有逆順

註五星所至之時王相爲盛囚死爲衰東行凌犯爲順災輕西行凌犯爲逆災重也

留守有多少

註留守日多則災深留守日少則災淺

形見有善惡

註星喜潤則爲見善星怒躁憂喪則爲見惡

宿屬有勝負徵應有吉凶矣

註二十八宿十二辰有相尅相生之勝負則吉凶亦異故五星凌犯遇宿屬尅制則災不成

帝曰其善惡何謂也岐伯曰有喜有怒有憂有喪有澤有燥此象之常也必謹察之

註光色圓明不盈不縮怡然瑩然人見之喜星之喜也光色勃然臨人芒彩滿溢人見之畏星之怒也光色微耀乍明乍暗星之憂也光色迴然不彰不瑩不與衆同星之喪也澤洪潤也燥枯燥也

五氣動亂占

帝曰夫子之言五氣之變四時之應可謂悉矣夫氣之動亂獨遇而作發無常會卒然災合何以期之岐伯曰氣之動變固不常在而德化政令災變不同其候也東方生風風生木其德敷和其化生榮其政舒啓其令風其變振發其災散落南方生熱熱生火其德彰顯其化蕃茂其政明曜其令熱其變銷鑠其災燔炳中央生濕濕生土其德溽蒸其化豐備其政安靜其令濕其變驟注其災霖潰西方生燥燥生金其德清潔其化緊斂其政勁切其令燥其變肅殺其災蒼陽北方生寒寒生水其德凄沧其化清謐其政凝肅其令寒其變凍烈其災冰雪霜雹是以察其動也有德有化有政有令有變有災而物由之而人應之

五氣鬱發占

五運之氣鬱極乃發待時而作太過不及其發異也

太過者其數成不及者其數生土常以生也

土鬱之發巖谷震驚雷殷氣交埃昏黃黑化爲白氣飄驟高深擊石飛空洪水乃從川流漫衍田牧土駒化氣乃數善爲時雨始生始長始化始成雲奔雨府霞擁朝陽山澤埃昏其迺發也以其四氣雲橫天山蜉蝣生滅佛之先兆也

註雨府太陰所在也

金鬱之發天潔地明風清氣切大涼乃舉草樹浮烟燥氣以行霧霧數起殺氣來至草木蒼乾金乃有聲山澤焦枯土凝霜鹵佛乃發也其氣五夜零白露林莽聲淒佛以先兆也

水鬱之發陽氣乃辟陰氣暴舉大寒乃至川澤嚴凝寒雰結爲霜雪甚則黃黑昏翳流行氣交乃爲霜殺水乃見祥陽光不治空積沉陰白埃昏暝而乃發也其氣二火前後太虛深元氣猶靡散微見而隱色黑微黃佛之先兆也

木鬱之發太虛埃昏雲物以擾大風乃至屋發折木木有變太虛蒼埃天山一色或氣濁色黃黑鬱若橫雲不起雨而乃發也其氣無常長川草偃柔葉呈陰松吟高山虎嘯巖岫佛之先兆也

註木發無時故曰其氣無常

火鬱之發太虛驁翳大明不彰炎火行大暑至山澤燔燎材木流津廣厦騰烟土浮霜鹵止水乃涸蔓草焦黃風行惑言濕化乃後刻終大溫汗濡元府其乃發也其氣四動復則靜陽極反陰濕令乃化乃成華發水凝山川冰雪焰陽午澤佛之先兆也有佛之應而後報也皆觀其極而乃發也木發無時水隨火也

註水發在二火前後亦猶辰星之隨日也

氣有多少發有微甚微者當其氣甚者兼其下微其下氣而見可知也

註五氣兼化如水發而雹雪土發而飄驟木發而毀折金發而清明火發而驁昧皆兼下之承氣也

地理高下左右占

帝曰時之氣至有早晏高下左右其候何如岐伯曰行有逆順至有遲速故太過者化先天不及者化後天帝曰願聞其行何謂也岐伯曰春氣西行夏氣北行秋氣東行冬氣南行故春氣始於下秋氣始於上夏氣始於中冬氣始於標春氣始於左秋氣始於右冬氣始於後夏氣始於前此四時正化之常故至高之地冬氣常在至下之地春氣常在

六氣正變占

黃帝問曰六化之正六變之紀何如岐伯對曰夫六氣正紀有化有變有勝有復有用有病不同其候夫氣之所至也厥陰所至爲和平少陰所至爲暄太陰所至爲埃溽少陽所至爲炎暑陽明所至爲清勁太陽所至爲寒雰時化之常也厥陰所至爲風府爲璺啓少陰所至爲火府爲舒榮太陰所至爲雨府爲圓盈少陽所至爲熱府爲行出陽明所至爲司殺府爲庚蒼太陽所至爲寒府爲歸藏司化之常也厥陰所至爲生爲風搖少陰所至爲榮爲形見太陰所至爲化爲雲雨少陽所至爲長爲蕃鮮陽明所至爲收爲

霧露太陽所至爲藏爲周密氣化之常也厥陰所至爲風生終爲肅少陰所至爲熱生中爲寒太陰所至爲濕生終爲注雨少陽所至爲火生終爲蒸溽陽明所至爲燥生終爲凉少陽所至爲寒生中爲溫德化之常也厥陰所至爲毛化少陰所至爲羽化太陰所至爲倮化少陽所至爲羽化陽明所至爲介化太陽所至爲鱗化德化之常也厥陰所至爲生化少陰所至爲榮化太陰所至爲濡化太陽所至爲茂化陽明所至爲堅化太陽所至爲藏化布政之常也厥陰所至爲飄怒大凉少陰所至爲大暄寒太陰所至爲雷霆驟注烈風少陽所至爲飄風燔燎霜凝陽明所至爲散落溫太陽所至爲寒雪冰雹白埃氣變之常也厥陰所至爲撓動爲迎隨少陰所至爲高明焰爲驁太陰所至爲沉陰爲白埃爲晦暝少陽所至爲光顯爲彤雲爲曀陽明所至爲烟埃爲霜爲勁切爲悽鳴太陽所至爲剛固爲堅芒爲立令行之常也凡此十二變者報德以德報化以化報政以政報令以令氣高則高氣下則下氣後則後氣前則前氣中則中氣外則外位之常也

在泉淫勝占

歲厥陰在泉風淫所勝則地氣不明平野昧草乃早秀

少陰在泉熱淫所勝則焰浮川澤陰處反明

太陰在泉濕淫所勝則埃昏嚴谷黃反見黑

少陽在泉火淫所勝則焰明郊野寒熱更至

陽明在泉燥淫所勝則霧霧清瞑

太陽在泉寒淫所勝則凝肅慘慄

司天淫勝占

厥陰司天風淫所勝則太虛埃昏雲物以擾寒生春氣流水不冰

少陰司天熱淫所勝怫熱至火行其政大雨且至

太陰司天濕淫所勝則沉陰且布雨變枯槁

少陰司天火淫所勝則溫氣流行金政不平

陽明司天燥淫所勝則木乃晚榮草乃晚生名木敛生菀於下草焦上首

太陽司天寒淫所勝則寒氣反至水且冰

占六氣之勝

厥陰之勝大風數舉倮蟲不滋

少陰之勝炎暑至木乃津草乃萎

太陰之勝雨數至燥化乃見

少陽之勝暴暑消鑠草萎水涸介蟲乃屈

陽明之勝大凉肅殺華英改容毛蟲乃殃

太陽之勝凝慄且至非時水冰羽乃後化

占六氣之復

厥陰之復倮木飛沙倮蟲不榮

少陰之復赤氣後化流水不冰熱氣大行介蟲不復

太陰之復大雨時行鱗見於陸

少陽之復大熱將至枯燥焫炳介蟲乃耗

陽明之復清氣大舉森木蒼乾毛蟲乃厲

太陽之復水凝雨冰羽蟲乃死

釋亢則害承迺制

經曰亢則害承迺制則生化外列盛衰害則敗亂生化大病此數句前人解說極多能會經旨者殊少詳其文意當云亢則害害則敗亂生化大病承乃制制則生化外列盛衰只作兩下解之爲是夫天地之間五類生化互有所勝互有所制地氣制己勝天氣制勝己此以地氣之制己勝者言之也夫六氣之用各歸其所不勝而爲化故太陰雨化施於太陽太陽寒化施於少陰少陰熱化施於陽明陽明燥化施於厥陰厥陰風化施於太陰此地之四方分爲六步以應天外六節氣令之治者也天地之氣五爲盈虛惡所不勝歸所同和同者盛之異者衰之當其位則盛非其位則衰地氣左遷於中天氣右行於外內外相因盛衰相倚故曰外列盛衰也若夫亢則傷害己勝不受勝己者之施化於是有勝則有復勝復更作敗亂生化之常故上勝則天氣降而下下勝則地氣遷而上甚則易位氣交易則大變生而病作矣所謂害則敗亂生化大病者是也此一勝一制一正一變之異化也河間云亢則害承者之母氣於是承者乃起而制之是知有非位之勝復而不知制則生化外列盛衰爲當位之正化也樓氏云火亢則害水承乃制之制則生化至冬著盛是以夏之暑生冬之寒化以冬之寒制夏之暑亢恐不相及之甚是知有當位之正化而不知害則敗亂生化大病爲非位之勝復也安可卽以今日既亢之乖氣復爲後日得制之平氣耶殊不知亢制字義甚明言亢則非平言制則非亢矣生化盛衰乃當位之常敗亂生化乃非位之變也二家全不分別何也

釋病機十九條

天有五行御五位以生寒暑燥濕風人有五藏化五氣以生喜怒憂思恐故五運之氣內應人之五藏諸

風掉眩皆屬於肝諸寒收引皆屬於腎諸濕腫滿皆屬於脾諸氣膹鬱皆屬於肺諸痛癢瘡皆屬於心是也諸厥固泄皆屬於下謂下焦腎肝之疾也諸痿喘滿皆屬於上謂上焦心肺之疾也此皆五藏之疾病機由於內動者也天之三陰三陽化六氣以生寒暑燥濕風火內應人之六腑外應十二經絡諸熱瞀瘈皆屬於火手少陰心經也諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火手少陽三焦經也諸躁狂越皆屬於火足陽明胃經也諸暴強直皆屬於風足厥陰肝經也諸病有聲鼓之如鼓皆屬於熱手太陰肺經也諸病胕腫疼酸驚駭皆屬於火手陽明大腸經也諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱手太陽小腸經也諸病水液澄澈清冷皆屬於寒足少陰腎經也諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱足少陽膽經也此皆十二經絡之邪病機由於外入者也劉河間以此著書漫然不分所屬殊不深考何也樓氏但斟其治法之偏而未及乎此故并爲正之云爾

李梴醫學入門

運氣總論

太極寓分而有陰陽夫陰陽者天地之道也萬物之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也

綱紀謂生長化成收藏之綱紀也父母謂萬物未形之先也本始謂生殺皆因而有也夫有形稟氣而不爲五運陰陽之所攝者未之有也所以造化不極能爲萬物生化之元始者何也以其是神明之府故也合散不測生化無窮非神明無能也

故物生謂之化物極謂之變陰陽不測謂之神然天地者萬物之上下也左右者陰陽之道路也木火者陰陽之徵兆也金木者生成之始終也陰陽五行流爲十干十五化之運寒暑燥濕風火之氣周流於天地之間而爲萬物之原人則稟其精而囿於兩間所以具五藏六腑以應五運六氣之數也五運者金木水火土也

水寒火熱故爲陰陽之徵兆金殺木生故爲生成之始終木言陽氣觸地而生火言燬然盛而變化萬物金言陰氣慘止萬物而斂敏水言潤養萬物土言含吐萬物將生者出將死者歸

六氣者風火暑濕燥寒也

六氣皆有一化也木化風主於春陽氣鼓舞爲天號令君火化熱主於春末夏初行暄淑之令而不行炎暑君德也相火化暑主於夏炎暑大行金化清燥清涼乃行金爲丙婦帶火之氣故燥也水化寒嚴凜乃行土化濕與土潤溽暑濕化行也蓋濕則土生乾則土死泉出於地中濕化信矣

聖人仰觀五天雲色

欽天之氣經於中央臨甲己之位立爲上運奉天之氣經於西方臨乙庚之位立爲金運凡天之氣經於北方臨丙辛之位立爲水運稽天之氣經於東方臨丁壬之位立爲木運丹天之氣經於南方臨戊癸之位立爲火運此五氣之色上經二十八宿下應十二分位所以古人占天望氣則和氣之災疫應在於何方了然預知之矣凡占當於正月初一日若太過之紀寅初看不及之紀寅末看平治之紀寅正看如蒼氣爲風丹爲熱黃爲濕素爲燥黑爲寒其氣之色有兼見者又當分其微甚而推之

天干取運地支取氣天干有十配合則爲五運地支十二對衝則爲六氣所以然者天有陰陽地亦有陰陽

天有陰故能降地有陽故能升

天以陽生陰長地以陽殺陰藏

生長者天之道藏殺者地之道天陽主生故以陽生陰長地陰主藏故以陽殺陰藏

陽中有陰陰中有陽人在氣交之中身半以上天之分也天氣主之身半以下地之分也地氣主之其生五其氣三三而成天三而成地二而成人三而三之則爲九九九制會故生九竅九藏而應之也天有三百六十五日人有三百六十五節節天有五行御五位以生寒暑燥濕風人有五藏化五氣以生喜怒思憂恐在天爲元生神在人爲道道生智在地爲化化生五味神在天爲風在地爲木在人爲怒神在天爲熱在地爲火在人爲喜神在天爲濕在地爲土在人爲思神在天爲燥在地爲金在人爲憂神在天爲寒在地爲水在人爲恐寒暑五氣更立各有所先非其位則邪當其位則正陰陽之神不可得而見也干支之迹可得而求之也

大地陰陽以象不以數推惟甲子干支則可測焉

天氣始於甲地氣始於子天地相合則爲甲子故甲子者干支之始也天氣終於癸地氣終於亥天地相

合則爲癸亥故癸亥者干支之末也陰陽相間剛柔相須是以甲子之後乙丑繼之壬戌之後癸亥繼之三十年爲一紀六十年爲一週有主運焉有客運焉有主氣焉有客氣焉主運主氣萬載而不易客運客氣每歲而迭遷自天干兄弟次序言之甲乙東方木也丙丁南方火也戊己中央土也庚辛西方金也壬癸北方水也

甲者草木始甲而出乙者陽尚屈也丙乃萬物炳然著見而强丁適陽强與陰氣相爭也戊陽土也萬物生而出之萬物伐而入之己陰土也無所爲而自得也庚乃陽更而續也辛乃陽極而更新也壬乃陽氣生之妊而爲胎與子同意癸乃萬物閉藏懷孕於其下揆然萌芽天之道也

故木爲初之運火爲第二運土爲第三運金爲第四運水爲第五運此主運也

詩曰大寒木運始行初清明前三火運居芒種後三土運是立秋後六金運推立冬後九水運伏周而復始萬年如或問曰木火土金水天道左旋自然之序也然君火生土土復能生相火火復生金其義何在曰相火非土不成未見庸空能聚火金在鑛非火不能煅出所以河圖火七居西金九居南互顯其成能也認眞五行六氣總一氣也故木焚則爲火絞則爲水石擊則爲火鎔則爲水洲渚之內江河競注大海之中火光常起皆情之本有也又何疑土中火火中金乎

自其夫婦配合言之甲與己合而化土乙與庚合而化金丙與辛合而化水丁與壬合而化木戊與癸合而化火故甲己之歲土運統之乙庚之歲金運統之丙辛之歲水運統之丁壬之歲木運統之戊癸之歲火運統之此客運也

詩曰甲己化土乙庚金丁壬木位盡成林丙辛便是長流水戊癸離宮號曰心蓋甲己之歲正月建丙寅丙火生土故爲土運乙庚之歲正月建戊寅戊土生金故爲金運丙辛之歲正月建庚寅庚金生水故爲水運丁壬之歲正月建壬寅壬水生木故爲木運戊癸之歲正月建甲寅甲木生火故爲火運

假如甲己年甲爲土運初之運卽土也土生金二之運卽金也金生水三之運卽水也水生木四之運卽木也木生火五之運卽火也每一運各主七十二日零五刻此天干在上爲陽所以主乎運也又以地支循環次序言之寅卯屬春木也

寅者演也正月陽上陰下律管飛灰以候之爲演事之始也卯者茂也二月陽氣盛而孳茂也

巳午屬夏火也

巳者起也四月正陽無陰物畢盡而起午者長也五月陽尚未屈陰始生而爲主物皆長大矣

辰戌丑未四季土也

辰者震也三月陽已過半萬物盡震而長戌者滅也九月萬物皆衰滅矣丑者紐也陰尚執而紐之十二月始終之際也未者味也六月物成而有味也

申酉屬秋金也

申者身也七月物體皆成也酉者緧也八月萬物皆緧縮收斂

亥子屬冬水也

亥者劾也十月陰氣劾殺萬物此地之道也子者北方寒水陰位一陽肇生之始故陰極則陽生妊而爲胎十一月辰也

故風爲初之氣火爲二之氣暑爲三之氣濕爲四之氣燥爲五之氣寒爲終之氣此主氣也

詩曰大寒厥陰氣之初春分君火二之隅小滿少陽分三氣大暑太陰四相呼秋分陽明五位是小雪太陽六之餘

自其對衝定位言之子對午而爲少陰君火丑對未而爲太陰濕土寅對申而爲少陽相火卯對酉而爲陽明燥金辰對戌而爲太陽寒水巳對亥而爲厥陰風木

君火司午火本熱而其氣當午位陰生之初故標寒而屬少陰也水居北方子位水本寒而其氣當陽生之初故標熱而屬太陽也土應長夏未之位未乃午之次故曰太陰相火司於寅寅乃丑之次故曰少陽木居東方震在人主肝處鬲下陰位木必待陰而後生故屬厥陰金居西方兌在人主肺居鬲上陽位金必待陽而後發故屬陽明也

故子午之歲君火主之丑未之歲濕土主之寅申之歲相火主之卯酉之歲燥金主之辰戌之歲寒水主之巳亥之歲風木主之此客氣也

詩曰子午少陰君火天陽明燥金應在泉丑未太陰濕土上太陽寒水雨連綿寅申少陽相火旺厥陰風木地中聯卯酉却與子午反辰戌巳亥到皆

然如卯酉年司天卽子午年在泉卯酉年在泉卽子午年司天辰戌年與丑未年同例巳亥年與寅申年同例

假令子午少陰君火司天（午位）陽明燥金司地（子位）上者右行太陰濕土爲天之左間厥陰風木爲天之右間所以面南而命其位也下者左行太陽寒水爲地之左間少陽相火爲地之右間所以面北而命其位也一氣在上（司一歲之天又主上半年）一氣在下（司一歲之地又主下半年）二氣在左二氣在右（司人與萬物）地之左間爲初之氣

要訣每年退二便是客鄰如子司天後二支戌太陽寒水爲初之氣亥爲二氣子爲三氣丑爲四氣寅爲五氣卯爲六氣又逐年年辰逐日日辰皆名司天

天之右間爲二之氣司天爲三之氣天之左間爲四之氣地之右間爲五之氣司地爲終之氣每一氣主旺六十日八十七刻半有奇

卯酉年陽明司天太陰在泉初氣太陰二氣少陽三氣陽明四氣太陽五氣厥陰六氣少陰辰戌年太陽司天太陰在泉初氣少陽二氣陽明三氣太陽四氣厥陰五氣少陰六氣太陰丑未年太陰司天太陽在泉初氣厥陰二氣少陰三氣太陰四氣少陽五氣陽明六氣太陽寅申年少陽司天厥陰在泉初氣少陰二氣太陰三氣少陽四氣陽明五氣太陽六氣厥陰巳亥年厥陰司天少陽在泉初氣陽明二氣太陽三氣厥陰四氣少陰五氣太陰六氣少陽

此地支在下爲陰所以主乎氣也然客運之流行也有太過焉有不及焉太過之年甲丙戊庚壬五陽干也不及之年乙丁己辛癸五陰干也太過其至先大寒前十三日交名曰先天不及其至後大寒後十三日交名曰後天平氣之年正大寒日交不先不後名曰齊天

甲子辰年大寒日寅初一刻交初之氣春分日子時末交二之氣小滿日亥時末交三之氣大暑日戌時末交四之氣秋分日酉時末交五之氣小雪日申時末交終之氣所謂一六天也巳酉丑年大寒日巳初一刻交初之氣春分日卯時末交二之氣小滿日寅時末交三之氣大暑日丑時末交四之氣秋分日子時末交五之氣小雪日亥時末交終之氣所謂二六天也寅午戌年大寒日申初一刻交初之氣春分日午時末交二之氣小滿日巳時末交三之氣大暑日辰時末交四之氣秋分日卯時末交五之氣小雪日寅時末交終之氣所謂三六天也亥卯未年大寒日亥初一刻交初之氣春分日酉時末交二之氣小滿日申時末交三之氣大暑日未時末交四之氣秋分日午時末交五之氣小雪日巳時末交終之氣所謂四六天也

客氣之升降也有正化焉有對化焉正化之歲謂午未寅酉辰亥之年也對化之歲謂子丑申卯戌巳之年也正化者令之實從木其數生對化者令之虛從標其數成

水一火二木三金四土五皆以陰陽而配若考其深義則水生於一天地未分萬物未成之初莫不先見於水故草木子實人蟲胎卵未就皆水也及水聚而形質皆備陰陽而後成物故物之小而味苦者火之兆也物熟則甘土之味也甘極則淡反本也人稟陰陽先生二腎草木子實大小雖異其中皆有兩以相合與人腎同是以萬物非陰陽合體則不能化生故次二曰火既陰陽合體然後有春生而秋成故次三曰木次四曰金木火金水莫不因土而成故次五曰土三陰三陽正化者從本生數對化者從標成數

假令甲子年甲爲土運統主一年子爲君火專司一歲一期三百六十五日零二十五刻正合乎周天三百六十五度四分度之一也

周天者天周地位非周天之六氣也天體至圓周圍三百六十五度四分度之一天行健一日一夜周三百六十五度四分度之一又進過一度日行速健次於天一日一夜周三百六十五度四分度之一恰好然天多進一度則日爲退一度二日天進二度則日爲退二度積至三百六十五日四分日之一則天所進過之度又恰周得本數而日所退之度亦恰退盡本數遂與天會而成一年是謂一年一周天月行遲一日一夜行三百六十五度四分度之一行不盡比天爲退了十三度有奇至二十九日半強恰與天相值在恰好處是謂一月一周天五日爲一候三候成一氣卽十五日也三氣成一節節謂立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至此八節也三八二十四氣而分四時一歲成矣春秋言分者陰陽中分其氣異也冬夏言至者陰陽至此而極其氣同也天亦無候以風雨霜

露草木之類應期可驗而測之故曰候言一候之日以五運之氣相生而值之即五日也書曰朞三百六旬有六日以閏月定四時成歲即其義也

一朞之中主運以位而相次於下客運以氣而周流於上客氣加於主運之上主氣臨於客氣之下天時所以不齊民病所由生也

辰戌年初之客氣少陽相火加主氣厥陰風木二之客氣陽明燥金加主氣少陽相火四之客氣厥陰風木加主氣太陰濕土五之客氣少陰君火加主氣陽明燥金終之客氣太陰濕土加主氣太陽寒水已上皆客氣加於主運之上舉此二年爲例也抑論主氣春溫夏暑秋涼冬寒風以動之火以溫之暑以蒸之濕以潤之燥以乾之寒以堅之皆天地正氣之運行惟客加於主乃有逆從淫勝然後春有凄風夏有伏陰秋有苦雨冬有慈陽風勝則地動火勝則地固暑勝則地熱濕勝則地泥燥勝則地乾寒勝則地裂氣候不齊癘疾時降

六甲年土運太過則雨濕流行濕病乃生腎水受邪治當除濕以補腎六己年土運不及則木氣乘旺反見風化風病乃行治當益脾以平木六丙年水運太過則寒氣大行寒病乃生心火受邪治當逐寒以補心六辛年水運不及則土氣乘旺反見濕化濕病乃行治當補腎以除濕六戊年火運太過則熱氣大行熱病乃生肺金受邪治當降火以補肺六癸年火運不及則水氣乘旺反見寒化寒病乃行治當補心以逐寒六庚年金運太過則燥氣流行燥病乃生肝木受邪治當清燥以補肝六乙年金運不及則火氣乘旺反見燥化燥病乃行治當補肝以清燥此客運之治法也太陽寒水治宜辛熱陽明燥金治宜苦溫少陽相火治宜鹹寒厥陰風木治宜辛涼此六氣之治法也然運氣之所以有變者氣相得則和不相得則病又有相得而病者以下臨上不當位也五行相生者爲相得相尅者爲不相得上臨下爲順下臨上爲逆

假令上臨火火臨木木臨水水臨金金臨土皆爲以下臨上不當位也父子之義子爲下父爲上以子臨父不亦逆乎

司天尅運則順運尅司天則逆氣尅運則順運尅氣則逆運氣相同曰天符

戊子戊午戊寅戊申年運氣皆火丙辰丙戌年運氣皆水己丑己未年運氣皆土乙卯乙酉年運氣皆金丁巳丁亥年運氣皆木六十年中有此十二年天符也又戊子日戊爲火運子爲少陰君火司天運與司天同火是爲天符此日得病速而危困也更遇當年太歲亦是天符或是歲會其病尤困

天氣生運曰順化

甲子甲午甲寅甲申年火下生土也壬辰壬戌年水下生木也乙丑乙未年土下生金也辛卯辛酉年金下生水也癸巳癸亥年木下生火也六十年中有此十二年順化也

天氣尅運曰天刑

庚子庚午庚寅庚申年火下尅金也戊辰戊戌年金上生水也癸丑癸未年火上生土也己卯己酉年土上生金也辛巳辛亥年水上生木也子臨父位於理未當六十年中有此十二年小逆也

運尅天氣曰不和

丙子丙午丙寅丙申年水上尅火也甲辰甲戌年土上尅水也辛丑辛未年水上尅土也癸卯癸酉年火上尅金也己巳己亥年金上尅木也六十年中有此十二年不和也

運臨木氣之位曰歲會

子水位也丙子年水運臨之午火位也戊午年火運臨之卯木位也丁卯年木運臨之酉金位也乙酉年金運臨之辰戌丑未土位也甲辰甲戌己丑己未年土運臨之六十年中有此八年歲會也又丙子日丙爲水運子爲水支是運與支同水乃名歲會年月日時同如遇此日得病不死但執持而徐緩更會年月時合天符歲會其病尤甚

天符歲會相合曰太乙天符

戊午乙酉己未己丑六十年中有此四年太乙天符也又戊午日戊爲火運午是少陰君火司天又是火支乃名太乙天符此日得病主死

運與四孟月相同曰支德符

寅屬木孟春月也壬寅年木運臨之巳屬火孟夏月也癸巳年火運臨之申屬金孟秋月也庚申年金運臨之亥屬水孟冬月也辛亥年水運臨之六十年中有此四年支德符也

運與交同日相合曰干德符

甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合一年遇此二干天地德合亦爲平氣之歲也

太過之運加地氣曰同天符

庚子庚午年運同司地燥金壬寅壬申年運同司地風木甲辰甲戌年運同司地濕土六十年中有此六年同天符

不及之運加地氣曰同歲會

辛丑辛未年運臨司地寒水癸卯癸酉年運臨司地君火癸巳癸亥年運臨司地相火六十年中有此六年同歲會也

大要陽年先天時化則己強而以氣勝實主勝客也故不勝者受邪陰年後天時化則己弱而以氣休衰客勝主也故勝己者來尅被尅之後必待時而復也行復於所勝則己不可前故待得時則子當旺然後子爲母復讎也

又云陽年太過則傳所不勝而乘所勝陰年不及則所勝妄行而所生受病假令肝木有餘則時已氣盛反薄肺金而乘其脾土肝木不及則土無所畏遂自妄行乃凌其腎水此五行生尅之理蓋勝至則復復已而勝故無常氣而不息若復而不勝則是生意已傷而有窮盡矣

經曰亢則害承迺制制則生化外列盛衰害則敗亂生化大病

亢者過極而不退也當退不退始則災害及物終則災害及己承猶隨也以下奉上有防之之義制尅勝之也制則生化者言有所制則六氣不至於亢而爲平平則萬物生而變化無窮矣生者自無而有化者自有而無外列盛衰者六氣分布主治迭爲盛衰害而無所制則敗壞乖亂之政行爲災爲變生化幾乎息而爲萬物之大病大病即災變也萬物皆病天地其能位乎此亢害承制皆莫或使然而自不能不然者也以天時言之春時冬令不退即水亢極而害所承之木然火爲木之子由是乘土而制水則木得化生之令而敷榮列秀於外但草木蟲育自有各年盛衰不同苟無制而木被其害則冬入於春生化幾息而爲天地間之災變豈非攻令敗亂之極乎以人身言之心火亢甚口乾髮燥身熱則脾土失養肺金受害由是水乘而起以復金母之讎而制心火汗出髮潤口津身涼而平矣苟腎水愈微而不能上制心火愈勝而不能下退則神去氣孤而災害至也

又曰有餘而往不足隨之不足而往有餘從之知迎知隨氣可與期

言六甲有餘已則不足不足已則有餘若餘已復餘少已復少則天地之道變矣

又曰出入廢則神機滅升降息則氣立孤危故非出入則無以生長壯老已非升降則無以生長化收藏是以升降出入無器不有四者常守反之則災害至

出入者天地之呼吸也升降者天地之化氣也毛羽倮鱗介及飛走蚑行者皆生氣根於身中以神爲動靜之主故曰神機金玉土石草木皆生氣根於外假氣以成立故曰氣立根於中者生源繫天其所動浮皆神氣爲機發之主故其所爲也物莫之知是以神舍去則機息根於外者生源繫地故其生長化成收藏皆造化之氣所成立故其所出也物亦莫知是以氣止息則造化之道絕矣九竅橫者皆有出入去來之氣竅豎者皆有陰陽升降之氣往復於中壁窻戶牖皆承來氣衝擊於人陽升則井寒陰升則井煖以物投井及葉墜空中翻翻不疾皆陰氣所凝也虛管溉滿捻土懸之水固不出爲無升氣而不能降也空瓶小口頓溉不入爲氣不出故不能入也由是觀之升無所不降降無所不升無出則不入無入則不出羣品之生升降出入生氣之常也若有出無入有入無出有升無降有降無升則反生化之常道而神去氣孤非災害而何

雖然逆順災害盡皆天之氣運所爲也地在人之下大氣舉之也天六動而不息地五靜而有守

天以六氣臨地地以五位承天然天氣不加君火以六加五則五歲而餘一氣乃君火不立歲氣但以名奉天耳故曰君火以名相火以位言相火代君火而用事故五歲而右遷若地以五承六則當六歲乃備盡天元之氣故六期而循環周而復始五歲一周則五行之氣遍六期一備則六氣之位周五六相合故三十年一紀之則六十年矣

推之曆日依節交氣常爲每歲之主氣又曰地氣若司天在泉左右兩間輪行而居主氣之上者曰天氣客氣也客氣乃行歲中天命主氣祇奉客氣之天而已客勝主則從主勝客則逆二者有勝而無復矣

主勝則瀉主補客客勝則瀉客補主也

經曰先立其年以明其氣每年先立運氣審其太過不及然後以地之主氣爲本天之客氣加臨於上爲標以求六化之變如氣之勝也微者隨之甚者制之氣之復也和者平之暴者奪之皆隨勝氣安其屈伏以平爲期抑考褚氏有曰大撓作甲子隸首作數志歲月日時遠近故以當年爲甲子歲冬至爲甲子月朔爲甲子日夜半爲甲子時積一十百千萬亦有條而不紊皆人所爲也人嬰異氣疾難預擬吾未見其是也吁此一偏之見也不知天時非凡夫可度人身資大化有生明堂詩曰甲膽乙肝丙小腸丁心戊胃己脾鄉庚屬大腸辛屬肺壬屬膀胱癸腎藏三焦亦向壬宮寄胞絡同歸入癸方

詩言人秉天地壬之氣而生膀胱命門秉癸之氣而生腎秉甲之氣而生膽秉乙之氣而生肝秉丙之氣而生小腸秉丁之氣而生心秉戊之氣而生胃秉己之氣而生脾秉庚之氣而生大腸秉辛之氣而生肺此天干也地支亦然

又云肺寅大卯胃辰經脾巳心午小未中申膀酉腎心胞戌亥三子膽丑肝通觀此二詩則天地人身無時不相流通

經曰天氣通於肺地氣通於嗌風氣通於肝雷氣通於心穀氣通於脾雨氣通於腎六經爲川腸胃爲海九竅爲水注之氣也

故一氣不合不能生化天有六氣人以三陰陽而上奉之

以六經言之則三陰三陽以十二支分之則有六陰六陽陰從上降生於午而極於亥謂之六陰陽從下起生於子而極於巳謂之六陽

地有五行人以五臟腑而下應之臟爲陰而其數奇以應五運蓋五行質具於地而氣則行於天也腑爲陽而其數偶以應六氣蓋六淫雖降於天而勢必充於地也子午爲天地之中正君火位焉手少陰心午居之足少陰腎子居之辰戌爲七政之魁罡寒水位焉

太陽寒水有子位而居於辰戌者水伏於土而水由地中行故戌爲六戊天門辰爲六己地戶

手太陽小腸戊居之足太陽膀胱辰居之然火從水化木隨腎至故少陰爲臟位與太陽隔而氣相合爲腑也丑未爲歸藏之標本濕土位焉足太陰脾未居之手太陰肺丑居之卯酉爲日月之道路燥金位焉足陽明胃酉居之手陽明大腸卯居之然子隨母居土旺金盛故太陰爲藏位與陽明隔而氣相合爲腑也巳亥爲天地之門戶風木位焉

卯雖木之正分爲陽明燥金所居然木生在亥故居於亥而對化於巳也

足厥陰肝亥居之手厥陰心胞絡巳居之寅申握生化之始終相火位焉

少陽相火佐脾雖有午位君火居之故居寅火生於寅也

足少陽膽寅居之手少陽三焦申居之然相火寄於肝腎膽者肝之腑心胞絡者腎之配故厥陰爲藏位與少陽隔而氣相合爲腑也

三陰三陽名異而體則一也陰陽氣盛則冒之太寅爲少陽卯爲陽明辰爲太陽午爲少陰未爲太陰亥爲厥陰

南政三陰司天則皆寸不應三陰在泉則皆尺不應北政三陰司天則皆尺不應三陰在泉則皆寸不應不應者皆爲沉脈也

此言六氣以君火爲尊五運以濕土爲重故甲己土運爲南政蓋土以成數貢金木水火之運位土居中央君尊南面而行令餘四運以臣事之北面而受令所以有別也然此論其常也若天行時病則有不必拘者經曰天地之氣勝復之作不形於診也天地以氣不以位故不當以脈診但以形證察之

由此觀之經絡臟腑脈病藥治無非運氣之所爲也非祇一歲也雖一時一刻之短而五行之氣莫不存非特一物也雖一毫一芒之細而五行之化莫不載上達於天則有五星倍減之應下推於地則有草木蟲育之驗奈何俗醫不知醫之源者全然不識運氣爲何物不知醫之變者又泥時日執鈐方以害人要之有在天之運氣有在人之運氣天時勝則舍人之病而從天之時人病勝則舍天之時而從人之病張子曰病如不是當年氣看與何年運氣同只向某年求活法方知都在至真中扁鵲曰陰淫寒疾卽太陽寒水之令太過陽淫熱疾相火之令太過風淫末疾

木令太過雨淫腹疾濕令太過霖久晴不雨當爲疫癘風痹明淫心疾君火初令太過經曰必先歲氣勿伐天和又曰不知年之所加氣之盛衰不可以爲工學者合而觀之更精於脈證乃自得之噫儒之道博約而已矣醫之道運氣而已矣學者可不由此入門而求其蘊奥耶

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百四十卷目錄

醫部彙考一百二十

運氣門十

汪機運氣易覽 學五運六氣綱領 五行生死順逆之圖 干支五行所屬之圖 二十四氣之圖 運氣說 論四時氣候 六十年交氣日刻之圖 六十年交氣日刻 論六十日交氣日刻 五行生成數之圖 六化之圖 生成數論 論交六氣時日 六化之圖 論主氣 論客氣 六氣標本之圖 論標本 五運六氣樞要之圖 起司天在泉 井客氣 五天五運起例之圖 論五天五運之氣 月建之圖 論月建 五音建運之圖 論五音建運 紀運太過不及平氣之圖 論紀運 五運太少齊同化之圖 論太少氣運相臨同化 五運齊化歌 五運兼化歌 逐年平氣歌 五運太過勝己司天抑平歌 五運不及己所合司天助運歌 音運不及勝己司天得政歌 己司天兼化歌 音運不及勝己司天得政歌 運化勝復同之圖 論五行勝復 論勝復 運化先後天歌 論六十年客氣 交六氣時日之圖 論天地六氣 六氣正化對化之圖 六氣遷移加臨之圖 交主氣時日歌 四間氣之圖 六十年氣運相臨之圖 六十年主客加臨天氣 天符之圖 論天符 歲會之圖 論歲會 同天符同歲會之圖 論同天符同歲會 干德符 手足經所屬之圖 論手足經

藝術典第一百四十卷

醫部彙考一百二十

運氣門十

明汪機運氣易覽

學五運六氣綱領

或問五運六氣內經講論諸方所略其理奧妙未易造入願發明焉丹溪曰學醫之初宜須先識病機之變化論人形而處治若便攻於運氣恐流於馬宗素之徒而云某年生人某日病於某經用某藥治之之類也

或問人之五臟六腑外應天地司氣司運八風動靜之變人氣應焉豈不切當苟不知此爲醫未造其理何以調之曰楊太受亦如此說蓋五運六氣須每日候之記其風雨晦明而有應時作病者有伏氣後時而病者有故病衝而動者體認純熟久久自然造其至極

丁元吉氏撰運氣提綱曰提綱之作一本內經及劉溫舒論奧語約而事義多者復註其下正註不足則旁註易見者但旁註旨深者列爲圖名目用墨抹之

經論陰之所在則脈不應兼三陰而言非獨指少陰也王太僕於太陰厥陰下註以少陰近其位致然反遺本氣左右不以位取人所向義亦率合故啓馬宗素諸書皆隨君火所在言之此丹溪所謂失經義之類今不從

五行生死順逆之圖



歌曰

木火土金水

五行周而復始互相生水火金木土五賊周而復始互相尅

干支五行所屬之圖



歌曰

甲乙寅卯木東藏丙丁巳午火南方庚辛申酉金西屬壬癸子亥水北鄉戊己辰戌丑未土寄旺四季位中央

二十四氣之圖



五日謂之候三候成一氣大小閏月但依曆交之凡四時寒暑溫涼盛於季月然差正位三十日有奇也

運氣說

五運六氣之說不見於儒者之六經而見於醫家之素問夫素問乃先秦古書雖未必皆黃帝岐伯之言然秦火已前春秋戰國之際有如和緩秦越人輩雖甚精於醫其察天地五行之用未能若是精密也則其言雖不盡出於黃帝岐伯其旨亦必有所從授矣且夫寒暑濕燥風火者天之陰陽三陰三陽上奉之木火土金水者地之陰陽生長化收藏下應之而五運行於其間則五之化氣也天數終於五六居之地數終於六七居之戊己土也化氣必以五故甲己化土而居其首土生金故乙庚次之金生水故丙辛次之水生木故丁壬次之木生火故戊癸次之此化氣之序也地之三陰三陽亦五行耳而火獨有二王行之妙理也蓋木旺於東火旺於南金旺於西水旺於北而土旺於四維戊附於戌而在乾己附於辰而在巽而未之對衛在丑故辰戌丑未寄肝之位也未在西南其卦爲坤其時爲長夏以其處四時之中呂氏月令謂之中央假如太角甲木之化爲啓坼而變爲摧拉太徵戊火之化爲暄煥而變爲炎烈正化之爲變者然也少角丁木木氣不足清勝而熱復少徵癸火火氣不足寒勝而雨復邪化之爲復者然也寒甚而爲陽焰是爲火鬱熱甚而爲凄清是爲金鬱抑而不伸者然也水鬱而發則爲冰雪土鬱而發則爲飄驟鬱而怒起者然也風淫所勝則尅太陰熱淫所勝則尅陽明凌其所勝者然也相火之下水氣承之濕土之下風氣承之極則有反者然也摧拉之變不應皆天悉皆大風炎烈之變不應薄海悉皆燔灼清氣之勝不應宇宙無不明潔雨氣之復不應山澤無不蒸潤鬱也發也淫也承也其理皆然凡此者其應非有候則有不時而應者矣其至非有時則有卒然而至者矣是故千里之遠其變相似者有之百里之近其變不同者亦有之即其時當其處隨其變而占焉則吉凶可知況素問所以論天地之氣化者將以觀其變而救民之疾也夫大而天地小而人之一身五行之氣皆在焉天地之氣有常無變則人亦和平而無災天地之氣變而失常則疾癘之所從出也是故木氣勝則肝以實病脾以虛病火氣勝則心以實病肺以虛病此醫者所能致察儒者不得其詳也至於官天地理陰陽順五行使冬無愆陽夏無伏陰秋無苦雨春無淒風和平之氣行於兩間國無水旱之災民無妖孽之疾此儒者所當察醫者未必能知也素問亦略言之矣五行之精是爲五緯與運氣相應有歲星有辰星以此察其行之逆順而占其吉凶然必曰德者福之過者罪之則是運氣之和平而爲休祥有德者召之也運氣之乖戾而爲疾害有過者致之也雖然其說略而未詳吾儒之經則詳矣洪範九疇始於五行中於皇極終於五福六極聖人建極於上以順五行之用是以天下之民有五福而無六極有五福皆可以康寧矣無六極皆免於疾病矣此其道固有行乎運氣之外者是以大舜成周之時嘗見之由庚之詩作而陰陽得由其道華黍之詩作而四序不失其和由儀之詩作而萬物各得其宜此建皇極順五行使民有五福而無六極之驗矣是故素問則知有洪範方伎之流也知有洪範不知有素問亦未許爲通儒

論四時氣候

六氣終始早晏五運太少盈虛厎之以至理考之以至數而垂萬古無有差異也經曰五日一候應之應五行也故三候成一氣即十五日也三氣成一節節謂立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至此八節也四方二十四氣而分主四時一歲成矣春秋言分者以月氣言之則二月半初氣終而交二之氣八月半四氣盡而交五之氣若以四時之氣言之則陰陽寒暄之氣到此可分之時也晝夜分五十刻亦陰陽之中分也故經曰分則氣異是也冬夏言至者以六氣言之則五月半司天之氣至其所在十一月半在泉之氣至其所在以四時之令言之則陰陽之氣至此極至之時也夏至日長不過六十刻陽至此而極冬至日短不過四十刻陰至此而極皆天候之未變故經曰至則氣同是也天自西而東轉其日月五星循天從東而西轉故白虎通曰天左旋日月星辰右行又曰日爲陽月爲陰行有分紀周有道理日則晝夜行天之一度一度有百刻即一日月則晝夜行天之十三度有奇者謂復行一度之中作十九分分之得七一度有百刻作十九分分之得七每一分該五刻強五七三十五刻強是月晝夜行天十三度有十度五刻強大率月行疾速終以二十七日月行一周天是將十三度及十九分分之七數總之則二十九日半行天三百八十七度有奇計月行疾之數比日行遲之數則二十九日日方行天二十九度月已先行一周天三百六十五度外又行天之二十二度反少

七度而不及日也陰陽家說謂日月之行日有前後遲速不等固無常準則有大小月盡之異也本三百六十五日四分度之一卽二十五刻（見日行三百六十五日零二十五刻當爲一歲矣）當爲一歲自除歲外之餘卽有三百六十日又除小月所少之日六日止有三百五十四日而成一歲通少十一日二十五刻乃盈閏爲十二月之制則有立首之氣氣乃三候之至月半示斗建之方乃十二辰之方也閏月之紀則無立氣建方皆他氣但依曆以八節見之推其所餘乃成閏天度畢矣故經曰立端於始表正於中推餘於終而天度畢矣者此之謂也觀天之杳冥豈復有度乎乃日月行一日之處指二十八宿爲證而記之曰度故經曰星辰者所以制日月之行也制謂制度也天亦無候以風雨霜露草木之類應期可驗而測之曰候言一候之日亦五運之氣相生而值之卽五日也如環無端周而復始書曰期三百六旬有六日以閏月定四時成歲卽其義也醫工之流不可不知經曰不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可以爲工矣

六十年交氣日刻之圖



歌曰

欲知交氣早晏時漏下一刻甲子初終于八十七刻半二氣續此而起歟盡于七十五刻是念六刻半三氣居六十二刻六分始終五十刻四氣居五氣三十七刻半六氣二十五刻除自是轉至戊辰首復與漏下一刻如申子辰初相會合巳酉丑初同刻途寅午戌初氣不異亥卯未初當共儲四歲一小周三合六甲六徧良弗虛十五小周爲一大周則六十年矣

六十年交氣日刻

圖自寅順觀至子爲甲子歲初氣子至戌爲二氣自亥至酉爲三氣酉至未爲四氣自申至午爲五氣午至辰爲六氣自巳至卯起乙丑歲初氣餘歲繼此推之則氣起同刻三歲相合義自見矣然晝夜百刻當分算於十二時每一時該八刻零三分

愚按六氣每氣主六十日八十七刻半例申子辰年初之氣始於大寒寅初刻至春分日子正之中是初之氣纔滿六十日八十七刻半也二之氣卽始於是日子時八十七刻六分至小滿日戌正四刻是二之氣纔滿六十日八十七刻半也三之氣已後並倣此按圖推之所謂八十七刻半者十二時共有百刻甲子年大寒日寅初刻交初之氣至二月半子時五刻纔滿六十日八十七刻半乃值子時之五刻也百刻而除八十七刻半剩下十二刻半算入二之氣內仍該找七十五刻湊作八十七刻半自前子時六刻交二之氣數起至七十五刻乃值戌時四刻也百刻而除七十五刻剩下二十五刻算入三之氣內仍該找六十二刻半湊作八十七刻半也自前戌時五刻交三之氣數起至六十二刻半乃值酉時之五刻也百刻而除六十二刻半剩下三十七刻半算入四之氣內仍該找五十刻湊作八十七刻半也自前酉時六刻交四之氣數起至五十刻乃值未之四刻也百刻而除五十刻剩下五十刻算入五之氣內仍該找三十七刻半湊作八十七刻半自前未之五刻交五之氣數起至三十七刻半乃值午時五刻百刻而除三十七刻半剩下六十二刻半算入六之氣內仍該找二十五刻湊作八十七刻半也自前午之六刻交六之氣數起至二十五刻乃值辰之四刻也百刻而除二十五刻剩下七十五刻算入乙丑歲之初氣內矣

論六十日交氣日刻

夫日一晝一夜十二時當均分於一日故上設銅壺貯水漏下浮箭箭分百刻以度之雖日月晦明終不能逃也是以一日之中有百刻之候也夫六氣通主一歲則一氣主六十日八十七刻半乃知交氣之時有早晏也故此立圖以明之冬夏日有長短之異則晝夜互相推移而日出入時刻不同然終於百刻也其氣交之刻則不能移甲子之歲初之氣始於漏水下一刻寅初終於八十七刻半子正之中也二之氣復始於八十七刻六分終於七十五刻戌正四刻也三之氣復始於七十六刻終於六十二刻半酉正之中也四之氣復始於六十二刻六分終於五十刻未正四刻也五之氣復始於五十一刻終於三十七刻半午正之中也六之氣復始於三十七刻六分終於二十五刻辰正四刻也此之謂一周天之感度餘刻交入乙丑歲之初氣矣如此而轉至戊辰年初之氣復始於漏水下一刻則四歲而一小周也故申子辰氣會同者此也巳酉丑初之氣俱起於二十六刻氣皆起於五十一刻亥卯未之氣俱起於七十六刻氣皆起於同刻故謂之三合者義由此也

五行生成數之圖



歌曰
一六水兮二七火三八
從來木爲佐四九金鄉
土五窮緣無成數十難
坐五運不及生可推若
逢太過成必隨六氣生
用驗正化成參對化更
無疑

生成數論

聖人立法以推步蓋不能逃其數觀其立數之因亦皆出於自然一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土者以水北方子位子者陽生之初一陽數也故水曰一火南方午位午者陰生之初二陰數也故火曰二木居東方東陽也三者奇之數亦陽也故木曰三金居西方西陰也四者偶之數亦陰也故金曰四土應西南長夏五者奇之數亦陽也故土曰五由是論之則數以陰陽而配者也然水生於一天地未分萬物未成之初莫不先見於水以今驗之則草木子實未就人蟲胎卵胚胎皆水也豈不以水爲一及其水之聚而形質莫不備陰陽之氣在中而後成故物之小而味苦者火之兆也物熟則甘土之味也甘極則反淡淡木味也然人稟父母陰陽生成之化故先生兩腎左腎屬水右腎屬火則火因水而後見故火次二蓋草木子實大小雖異其中皆有兩以相合與人腎同亦陰陽之兆故萬物非陰陽合體則不能生化也既陰陽合體然後有春生而秋成故木次三金次四蓋水有所屬火有所藏木有所發金有所別莫不皆因土而後成故金木水火土之成數皆兼土數五也水六火七木八金九土常以五之生數不可至十者土不待十以成是生成之數皆以合之則萬物豈能逃其數哉三陰三陽正化者從本生數對化者從標成數五運之紀則太過者其數成不及者其數生各取其數之生成多少以占政令氣化勝復之交作蓋明諸用也

論交六氣時日

經曰顯明日也之右卯位君火之位君火之右辰位退行一步一步六十日八十七刻半相火治主也之復行一步土氣治之復行一步金氣治之復行一步水氣治之復行一步木氣治之乃六氣之主位也自十二月中氣大寒日交木之初氣次至二月中氣春分日交君火之二氣即前君火之位次至四月中氣小滿日交相火之三氣即前君火之右退行一步相火治之謂也次至六月中氣大暑日交土之四氣次至八月中氣秋分日交金之五氣次至十月中氣小雪日交水之六氣每氣各主六十日每日八十七刻半總之三百六十五日二十五刻共周一歲也若若字作餘理似須也歲外之餘餘者於三百六十五日除去五日作餘及小月之日小月有六日則不及也除前餘日五日又除小月六日日亦除之共除十一日止有三百五十四日不及三百六十五日也但推之曆日依節令交氣常爲每歲燥濕寒暑風火之主氣乃六氣之常紀此謂地之陰陽靜而守位者也氣應之不同者又有司天在泉左右四間之客氣假如子午少陰君火司天則必卯酉陽明燥金在泉之右間厥陰亥木子之左間太陰丑土卯之右間少陽寅相火卯之左間太陽辰水經曰左右者陰陽之道路此之謂也客氣亦有寒暑燥濕風火之化乃行歲中之天命輪居主氣之上主氣則當祇奉客之天命動而不息者也合而言之司天通主上半年在泉通主下半年分而言之每氣各主六十日有奇奇者八十七刻半客勝主則從主勝客則逆二者有勝而無復每年以司天前第三位爲在泉第四位爲初之氣假如子爲少陰君火司天子前第三位卯爲陽明燥金在泉第四位辰爲初之氣辰與戌對同屬太陽寒水主大寒後至春分六十日有奇辰即卯之左間也次巳爲二之氣巳與亥對同屬厥陰木主春分後至小滿六十日有奇巳即午之右間也次午爲三之氣午與子對同屬少陰火主小滿後至大暑六十日有奇即司天氣也次未爲四之氣未與丑對同屬太陰土主大暑後至秋分六十日有奇未即午之左間也次申爲五之氣申與寅對同屬少陽相火主秋分後至小雪六十日有奇申即酉之右間也次酉爲終之氣酉與卯對同屬陽明燥金主小雪後至大寒六十日有奇即在泉氣也

按六氣司天之歲位在南故面北而言左右在泉者位在北故面南而言左右如丑未歲土司天面北而言左右丑之左間相火寅右間君火子辰戌歲水在泉面南而言左右辰之左間厥陰巳木右間陽明卯金故曰左厥陰右陽明也是歲客之初氣厥陰亥木二氣少陰子火三氣即司天丑土四氣少陽相火寅五氣陽明卯金終氣即在泉辰水此司天在泉左右之四間客氣加於主氣者餘皆倣此

草廬吳澂曰天地陰陽之運往過來續木火土金水始終終始如環斯循六氣相生之序也歲氣起於子中盡於子中故曰冬至子之半天心無改移子午之歲始冬至燥金三十日然後禪於寒水以至相火日

各六十者五而小雪以後其日三十復終於燥金丑未之歲始冬至寒水三十日然後禪於風木以至燥金日各六十者五而小雪以後其日三十復終於寒水寅申以下皆然如是六十年至千萬年氣序相生而無間非小寒之末無所於授大寒之初無所於承隔越一氣不相接續而截自大寒爲次年初氣之首也此造化之妙內經祕而未發啓元子闕而未言近代楊子建昉推而得之茲說與經不合然極有理謹附於此俾學者知之

六化之圖



歌曰

君熱金清燥水寒木化風相行炎暑令土濕雨同功

六化論

夫五行在地成形（金木水火土）在天爲氣而氣有六乃天之元氣然後三陰三陽上奉之（少陰君火太陰濕土厥陰風木少陽相火太陽寒水陽明燥金）謂之六氣皆有一化木之化風主於春君火之化熱主春末夏初行暄淑之令應君之德相火之化暑主於夏炎暑乃行金之化清與燥主於秋清涼乃行（白露清氣也金爲庚辛辛爲西歸而八之氣故燥久雨霜霪西風而驕燥之兆也西風而雨燥濕爭也而乃自晴）水之化寒主於冬嚴凜乃行土之化濕與雨主於長夏（六月）土生於火長在夏中既成而王土潤溽暑濕化行也（經曰地氣上爲雲天氣下爲雨雨出地氣雲出天氣則土雨之化見矣）凡春溫夏暑秋涼冬寒皆天地之正氣（六氣司化之令）其客行於主運則自有逆順淫勝之異由是氣候不一豈可一定而論之夫陰陽四時氣候則始於仲月而盛於季月故經曰差三十度而有奇又言氣令盛衰之用其在四維四維者辰戌丑未四季月也蓋春氣始於二月盛溫於三月夏氣始於五月盛暑於六月秋氣始於八月盛涼於九月冬氣始於十一月盛寒於十二月則氣差明矣然五月夏至陰氣生而反大熱十一月冬至陽氣生而反大寒者蓋氣自下生推而上之也故陰生則陽上而愈熱陽生則陰上而愈寒夏井清涼冬井溫和則可驗矣

論主氣

地氣靜而守位故春溫夏暑秋涼冬寒爲歲歲之常令四時爲六氣之所生也厥陰木爲初氣者方春氣之始也木生火故少陰君火少陽相火次之火生土故太陰土次之土生金故陽明金次之金生水故太陽水次之皆相生而布其令莫不咸有緒焉木爲初氣主春分前六十日有奇（奇凡十七刻半）自斗建丑正至卯之中天度至此風氣乃行也君火爲二氣主春分後六十日有奇自斗建卯正至巳之中天度至此暄淑乃行也相火爲三氣主夏至前後各三十日有奇自斗建巳正至未之中天度至此炎熱乃行也土爲四氣主秋分前六十日有奇自斗建未正至酉之中天度至此雲雨乃行濕蒸乃作也金爲五氣主秋分後六十日有奇自斗建酉正至亥之中天度至此清氣乃行萬物皆燥也水爲六氣主冬至前後各三十日有奇自斗建亥正至丑之中天度至此寒氣乃行也六氣旋環以成一歲之主氣也天之六氣客之每歲轉居於其上以行天令者也是故當其時而行變之常也非其時而行變之災也如春行夏秋冬之令冬行春夏秋之令此客加主之變也故有德化政令之常有暴風疾雨迅雷飄電之變冬有爍石之熱夏有淒風之清此無他天地之氣勝復鬱發之致也此則五麗乎太過不及之徵耳

論客氣

六氣分上下左右而司天令十二支分節令時日而司地化上下相召而寒暑燥風火與四時之氣不同者蓋相臨不一使然也六氣司於十二支有正對之化厥陰司於巳亥謂厥陰木也木生於亥故正化於亥對化於巳也卯雖爲正木之分乃陽明金對化也生謂從生而順於巳少陰司於子午謂少陰爲君火位尊正得南方離位故正化於午對化於子也太陰司於丑未謂太陰爲土土屬中宮寄於坤位西南而居未分故正化於未對化於丑也少陽司於寅申謂少陽相火位卑於君火雖有午位君火居之火生於寅故正化於寅對化於申也陽明司於卯酉謂陽明爲金酉爲西方屬金故正化於酉對化於卯也太陽司於辰戌謂太陽爲水雖有子位以爲君火對化乃伏土中即六戊天門戊六己地戶辰是也故水雖土用正化於戌對化於辰也此天之陰陽台地之十二支動而不息者也但將年律起當年司天相對一氣爲在泉餘氣爲左右間用在泉後一氣爲初之氣主六十日有奇至司天爲三之氣主上半年（自大寒日後通主上）

半年至在泉爲六氣主下半年自大暑日後通主下半年經曰歲半已前天氣主之歲半已後地氣主之者此也天之六氣客也將此客氣布於地之六氣步位之上則有氣化之異矣經曰上下有位左右有紀者謂司天曰上位在南方則面北立左右乃左西右東也在泉曰下位在北方則面南立左右乃左東右西也故上下而左右殊經曰少陽之右陽明治之乃南面而立以閱之意也非論上下左右之位而與顯明之右君火治之之意同謂南面視之指位而言也

六氣標本之圖



六氣之本少陰午太陰未少陽寅陽明酉太陽戌厥陰亥

歌曰

子君丑土卯金標辰水猶偕巳木調申相亦原茲數內餘稽正化本然條

論標本

三陰三陽天之六氣標也金木水火土地之五行本也生長化收藏太陰濕土少陽相火爲標本同至於少陰君火太陽寒水則陰陽寒熱互相不同何也蓋君火司於子午午者一陰始生之位火本熱而其氣當陰生之初故君火屬少陰也水居北方子午者一陽始生之位水本寒而其氣當陽生之初故寒水屬太陽也此水火之標本以異者此也土者乃西南維未之位應於長夏之月未乃午之次爲陰矣故土曰太陰相火司於寅寅乃丑之次爲陽矣故相火曰少陽木者位居東方震在人主肝雖陽處膈下居陰之位故屬厥陰也金西方兌在人主肺雖陰藏居膈上處陽之位故屬陽明也經曰少陽太陰從本治少陰太陽從標治陽明厥陰不從標本從乎中治陽明之中太陰也太陰陽明爲表裏而相合厥陰少陽爲表裏而相合少陽厥陰之中少陽也

五運六氣樞要之圖



起司天在泉井客氣

子午少陰地太陰丑未壠寅申少陽屬陽明卯酉厥辰戌太陽配厥陰巳亥居中主司天位依此順數諸進三司地位進四客之初

如遇子午歲少陰乃司天除本位數至第三陽明爲在泉第四太陽即客氣初氣次厥陰復次少陰自大寒後主上半年次太陰次少陽終陽明自大暑後主下半年每氣六十日八十七刻半布於生氣之十餘同主客之圖

五天五運起例之圖



論五天五運之氣

天分五氣地列五行五氣分流散於其上經於列宿下合方隅則命之以爲五運

丹天之氣經於牛女奎壁四宿之上下臨戊癸之位立爲火運

蒼天之氣經於心尾角軫四宿之上下臨甲己之位立爲土運

素天之氣經於亢氐昴畢四宿之上下臨乙庚之位立爲金運

元天之氣經於張翼婁胃四宿之上下臨丙辛之位立爲水運

玄天之氣經於危室柳鬼四宿之上下臨丁壬之位立爲木運

五氣所經二十八宿與十二分野相臨灼然可見戊爲天門乾之位也巳爲地戶巽之位也自房至畢十四宿爲陽主晝自昴至心十四宿爲陰主夜通一日也若以月建法論之則立運之因又可見矣蓋丙者火之陽建於甲己歲之首正月建丙寅丙火生土故

五天氣立運

五行之氣散流於天之五方紀於五天因此而命名立運

歌曰

南子金素元氐昴畢前水元張翼婁胃戀未蒼危室柳鬼宿火丹牛女奎壁羞土斟心尾角軫度下臨運位上經天

甲己爲土運戊者土之陽建於乙庚歲之首正月建戊寅戊土生金故乙庚爲金運庚者金之陽建於丙辛歲之首正月建庚寅庚金生水故丙辛爲水運甲者木之陽建於戊癸歲之首正月建甲寅甲木生火故戊癸爲火運壬者水之陽建於丁壬歲之首正月建壬寅壬水生木故丁壬爲木運是五運皆生於正月建干豈非日月歲時相因而制用哉

開闢以來五氣乘承元會運世自有氣數天地萬物所不能逃近世當是土運是以人無疾而亦濕比與勝國時多熱不同（勝國時火運）如俗稱楊梅瘡自南行北人物雷同土濕生徵當曰徵瘡五運六氣南北二政豈獨止於一年一時而已哉

十干所化五行由五天氣各臨其位而生化或謂十二生肖中惟龍善變屬辰每位自建寅干支數至三遇辰隨所屬化之（如甲寅至丙辰化火丙寅至戊辰化土）或謂甲剛木尅己柔土爲夫婦成土乙柔木嫁庚剛金成金丁陰火配壬陽水成木丙陽火娶辛柔金成水戊陽土要癸陰水成火二說意近似而理非自然

月建之圖



歌曰

甲己丙爲寅餘年更酌斟
乙庚當起戊丙辛向庚尋
戊癸先生甲丁壬復建壬
甲己歲正月建丙丙火生
甲己土餘以類推則立運
之理皆相合共逐歲月干
德符用此例起

論月建

夫十二支爲十二月則正月寅二月卯是也甲己之歲正月建丙寅乙庚之歲正月建戊寅丙辛之歲正月建庚寅丁壬之歲正月建壬寅戊癸之歲正月建甲寅乃用十干建於寅上觀其注甲子年爲首亦因六十甲子內初建者先建之次建者次建之故丙寅爲初戊寅爲次依先後循而轉之可見也前六十甲子納音圖中立位既終復轉於其上以終其紀者明矣建時則用日干同法若五運陰年不及之歲大寒日交初氣其日時建干與年干合者謂之干德符當爲平氣非過與不及也略舉此以明其用而已圖具於後

五音建運之圖



十干起運化氣歌

甲己土運乙庚金丁壬之歲木當臨丙辛化熱常居
水戊癸須將火運尋
五音建運歌
羽水音兮徵火音土宮角木及商金年干建運陰陽位太是陽兮少是陰

論五音建運

五音者五行之聲音也土曰宮其位甲己之歲宮土也中和之道無往而不理又總堂室奧階而謂之宮所圖不一蓋土亦以通貫於金木水火主於四季衆於四臟皆總之之意故五運從十干起甲爲土也土生金故乙次之金生水故丙次之如此五行相生而轉甲爲陽乙爲陰亦相間而數如環無端在陽年曰太在陰年曰少陽年太過爲司天所抑陰年不及爲年支所合皆曰平氣

金曰商其位乙庚之歲商強也謂金性之堅強也

水曰羽其位丙辛之歲羽舒也陽氣將復萬物萃育而舒生也

木曰角其位丁壬之歲角觸也象諸陽氣觸動而生也

火曰徵其位戊癸之歲徵止也言物盛則止也

紀運太過不及平氣之圖



歌曰

發生委和敦和角赫
曦伏明升平徵敦阜
卑監備化宮流行涸
流靜順羽堅成從革
審平商太過不及平
氣紀
每句二位初太過次
不及末平氣

論紀運

十干之中五陰五陽也立爲五運太過不及互相乘之其不及之歲則所勝者來尅蓋運之虛故也則其間自有歲會同歲會亦氣之平外有年辰相合及交氣日時干相合則得爲己助號曰平氣乃得歲氣之平其物生脈應皆必合期無先後也聖人立名以紀之假令辛亥歲水運當爲平氣何也辛爲水運陰年遇亥屬北方水相佐則水氣乃平假令癸巳年火運亦曰平氣何也癸爲火運陰年巳屬南方火相佐則火氣乃平每年交初氣於年前大寒日假令丁亥年交司之日遇日朔與壬合名曰干德符符者合也便爲平氣若交司之時遇壬亦曰干德符除此交初氣日時後相遇皆不相濟也餘倣此所謂合者甲己合乙庚合丙辛合丁壬合戊癸合是也又陰年中若逢月干皆符合相濟若未逢勝而見干合者亦爲平氣若行勝己後行復畢逢月干合者卽得正位故平氣之歲不可預紀之十干之下列以陰陽年而紀者乃大槩設此庶易知也平氣紀須以當年之辰日時依法推之是以太角歲曰發生太過少角歲曰委和不及角歲曰敷和平氣太徵歲曰赫曦太過少徵歲曰伏明不及正徵歲曰升平平氣太宮歲曰敦阜太過少宮歲曰卑監不及正宮歲曰備化平氣太商歲曰堅成太過少商歲曰從革不及正商歲曰審平平氣太羽歲曰流衍太過少羽歲曰涸流不及正羽歲曰靜順平氣各以紀之氣之平則同正化無過與不及也又詳太過運中有爲司天之氣所抑者亦爲平氣則赫曦之紀寒水司天二年戊癸堅成之氣二火司天四年庚子庚午庚寅庚申皆平氣之歲也

五運太少齊同化之圖



論太少氣運相臨同化

其運其氣或太或少乃輪主歲時而更盛更衰也上達於天則有五星倍減之應下推於地則有五嵗耗育之驗其五穀五果五味五色之化類豈有一歲而無者惟成熟有多少色味有厚薄耳蓋金木水火土並行其化互有休囚旺相不同遇陽年則氣旺而太過遇陰年則氣衰而不及太過已勝則欲齊其所勝之化不及已弱則勝者來兼其化太過歲謂木王齊金化金庚齊火化火戊齊水化水丙齊土化土甲齊木化也不及歲謂木丁兼金同化金乙兼火同化火癸兼水同化水辛兼土同化土己兼木同化也其司天與運相臨間有逆順相刑相佐司天則同其正抑運則反其平如是五氣平正則無相陵犯也太過之歲五運各主六年乃五六三十陽年也太角謂六壬年逢子午寅申二火司天壬子午寅申則木運爲逆者火居其上也子午居其上爲逆太徵謂六戊年或逢寅水司天正抑其火乃爲平氣之歲上羽與正徵同也戊寅戊辰戊午戊申之類太宮謂六甲年也太商謂六庚年也皆平氣之歲也

內逢子午寅申二火司天正抑其金復爲平氣之歲上徵與正商同也庚子庚午庚寅庚申逢辰戌水司天爲逆庚辰庚戌水乃金之子也居上爲逆太羽謂六丙年也不及歲五運各主六年乃五六三十陰年也少角謂六丁年也逢巳亥木司天爲運氣得助上角同正角也丁巳丁亥正角之類逢卯酉金司天與運兼化上商同正商也丁卯丁酉逢丑未土司天以木不及金兼化則土得其政上宮同正宮也丁丑丁未正宮己丑己未之類少徵謂六癸年也內逢卯酉金司天以火不及水兼化則金得其政上商同正商也癸卯癸酉少宮謂六己年也內逢丑未土司天爲運得其助上宮同正宮也己丑己未逢巳亥木司天與運兼化上角同正角也己巳己亥少商謂六乙年也內逢卯酉金司天爲運得其助上商同正商也乙卯乙酉逢巳亥木司天以金不及火兼化則木得其政上角同正角也乙巳乙亥少羽謂六辛年也逢丑未土司天與運兼化上宮同正宮也辛丑辛未內言上者乃司天之令其五太五少歲所紀不同者蓋遇不遇也如君火相火寒水常爲陽年司天濕土燥金風木常爲陰年司天然六十年中各有上下臨遇或司天勝運或運勝司天或運當太過不務其德而淫勝其所不勝或運當不及而避其所勝不兼其化其他太乙天符歲會同天符同歲會已具他論不復贅也

按經曰氣相得則和乃木火相臨金水相臨水木相臨火土相臨土金相臨皆上生下司天生運故曰相得不相得則病乃木土相臨土水相臨木火相臨火金相臨乃上尅下司天尅運爲不相得則病土臨火火臨木木臨水水臨金金臨土乃運生司天以下臨

上爲逆故病亦微又如木居金土位火居金水位土居水木位金居火木位乃運尅司天或司天尅運如是者爲不相得故病甚也

五運齊化歌

五行太過名齊化凡遇陽年卽可推勝己若臨逢我旺彼雖尅我我齊之

齊如木欲齊金是也

五運兼化歌

五行不及爲兼化年值陰兮候用占我氣已衰行正令其間勝己必來兼

兼謂强者兼弱而同化如水兼火是也

逐年平氣歌

平氣細將推非惟不及時陽年天抑運陰運合年支假令戊辰陽年火太過而水司天抑之乃平癸巳陰年火不及而巳屬火得其佐亦平

五運太過勝己司天抑平歌

上羽正徵同戊火逢水氣上徵正商同庚金火運是上徵謂歲逢太過不及以本運太少音爲下司天音爲上或司天勝其正化亦同於正非音有上正也此己太過勝己在上抑平之故上音與正音同

五運不及己所合司天助運歌

上角同正角丁運木司天上宮同正宮己運土氣懸上商同正商乙運金氣焉

己所合在上助己故上音同

音運不及勝己司天兼化歌

木氣運逢己上角同正臨土氣運逢辛上宮同正侵金氣運逢丁上商同正尋

勝己在上兼化故正音從司天

音運不及勝己司天得政歌

上角緣何同正角火兼乙化木司時上宮而只同正宮金兼丁化土氣司上商必然同正商水兼癸化金司之

己不及復爲勝己所制遇不勝己在上得政己全弱故正宮亦從司天

運化勝復同歌

勝復同分不及年運衰勝己必加愈母讎子旺還當復子化隨時反勝焉如丁年木不及金清化來勝則子火爲復反熟化勝金餘倣此

運化勝復同圖之圖



論五行勝復

或曰元豐四年歲在辛酉陽明司天爲上商少陰在泉爲下徵天氣燥地氣熱運得少羽歲木不及所謂涸流之紀而反河決大水何也曰少角之歲木不及侮而乘之者金也金不務德故以燥勝風時則有白露早降收氣早行其變爲肅殺其災爲蒼隕名爲少角而實與太商之歲同少徵之運歲火不及侮而乘之者水也水不務德故以寒勝熱時則寒雰凝慘地裂堅冰其變爲溪涸其災爲霜雹名爲少徵而實與太羽之歲同少宮之運歲土不及侮而乘之者木也木不務德故以風勝濕時則有大風飄暴草偃砂飛其變爲振發其災爲散落名爲少宮而實與太角之歲同少商之運歲金不及侮而乘之者火也火不務德故以熱勝燥時則有火炎焦槁炎赫沸騰其變爲銷鑠其災爲燔焫名爲少商而實與太徵之歲同少羽之運歲水不及侮而乘之者土也土不務德故以濕勝寒時則有泉湧河衍涸澤生魚其變爲驟注其災爲霧漫名爲少羽而實與太宮之歲同通乎此則知歲在涸流之紀而河決大水則可以類推之也非徒如是而已天地之間或得其沖氣而生或觸其乖氣而夭未有能逃乎五行者也所謂沖氣者不相勝復而已所謂乖氣者勝復更作而已方其乖氣之爭狠戾已形忿怒已萌處乎此而求勝乎彼也雖有剛強勇悍之氣又豈能常勝哉故己有復之者伺乎其後矣是故木勝則金復以救土而名木不榮火勝則木復以救金而冰雹乃零土勝則木復以救水而倮蟲不育金勝則火復以救木而流水不冰水勝則土復以救火而鬱殺不登夫暴虐無德者災及之侮而乘之者侮反受邪出乎崩者反乎爾未有勝而不復者也勝之微者復亦微勝之甚者復亦甚其猶空谷之響乎故曰五運之氣猶權衡也高者抑之下者舉之化者應之勝者復之化者應之氣之平也五氣之相得也勝者復之氣之不平也五氣之相賊也氣平而相得者所以道其常氣不平而相賊者所以觀其變古之明乎此而善攝生者何嘗不消息盈虛以道御神也無失天信無逆氣宜抑其有餘而不翼其

勝助其不勝而不贊其復是以喜怒悲憂恐有所守而莫能亂精神魂魄意有所養而莫能傷春風秋雨冬涼夏暑雖天道屢變如凶荒扎瘥豈能成其患哉

論勝復

運有盛衰氣有虛實更相迎隨以司歲也故經曰有餘而往不足從之不足而往有餘從之者此也故運互有太少勝復之變作矣太過則先天時化以氣勝實故不勝者受邪不及則後天時化以氣衰虛故勝己者來尅被尅之後必待時而復也行復於所勝則己不可前故待得時則子當旺然後子爲母復讎如木運少角歲金清化來勝則子火爲復（復亦勝也火反勝金故曰勝復同也）反熱化勝金也火運少徵歲水寒化來勝則子土爲復反濕化勝水也土運少宮歲木風化來勝則子金爲復反清化勝木也金運少商歲火熱化來勝則子水爲復反寒化勝火也水運少羽歲土濕化來勝則子木爲復反風化勝土也故言勝復同者此也元玉論六氣有正化對化之司若正司化令之實甚則勝而不復對司化令之虛微則勝而有復勝甚則復甚勝微則復微所謂邪氣化日也（言大全勝甚復甚勝微復微）如是氣不相得則邪氣中人而疾病矣然天地之氣亦行勝復故經曰初氣至三氣天氣主之勝之常也四氣盡終氣地氣主之復之常也蓋勝至則復復已而勝故無常氣乃止復而不勝則是生氣已絕故曰傷生也又歲氣太過則不勝者受邪若得其實而反欺侮其所不勝己者運不及所勝者來尅承氣之虛又爲不勝己者凌侮如是終畢受邪以元非勝己之氣必自傷也已矣故經言侮反受邪此之謂也如是不一則在氣候以別之也

運化先後天歌（氣有餘先天時而至行化　氣不足後天時而至行化）

運化宜精別其行氣後先後天從不及太過主先天

論六十年客氣

司天在泉四間氣紀步各主六十日八十七刻半客行天令居於主氣之上故有溫涼寒暑曚暝明晦風雨霜雪電雹雷霆不同之化其春溫夏暑秋涼冬寒四時之正令豈能全爲運與氣所奪則當其時自有微甚之變矣布此六十客氣列於主位之下者使知其氣之所在之大法也其天符歲會平氣支干逆順氣與運相生相尅客勝主勝災化分野交時先後淫勝鬱復嘉祥災變各各不同而六氣極則過亢災害生矣故氣極則反由是所承之氣居下以乘之經所謂相火之下水氣承之是也又有中見之氣從之經所謂少陽之上火氣治之中見厥陰是也蓋陽極則陰生陰極則陽生斯互相濟之妙用也其中見者乃手足經六合臟腑相乘之化是也在天地間氣自應之矣

交六氣時日之圖



歌見六氣遷移加臨圖內

論天地六氣（圖在主氣客氣文內）

五行陰陽之氣以布八方蓋天氣降而下地氣遷而上地之氣靜而常天之氣動而變其六氣之源則同六氣之緒則異何哉蓋天地之氣始於少陰而終於厥陰經曰少陰所謂標厥陰所謂終是也地之氣始於厥陰木而終於太陽水經曰顯明之右君火之位是也故天之六氣及合地十二支以五行正對化爲其緒則

少陰司子午太陰司丑未少陽司寅申陽明司卯酉如是而已

地之六氣及合天之四時風熱暑濕燥寒爲緒則

厥陰風木主春少陰君火主春末夏初少陽相火主夏太陰濕土主長夏陽明燥金主秋太陽寒水主冬地氣終始之因如是而已

經曰天有陰陽地亦有陰陽者乃上下相臨也天氣動而不息故五歲而右遷地氣靜而守位天氣不加於君火則五歲而餘一氣右遷相火之上以君火不立歲故也地之紀五歲一周天之紀六朞一備五歲一周則五行之氣遍六朞一備則六氣之位周與干加支之緒小同取陰陽相錯上下相乘畢其紀之之意也以五六相合故三十年一紀則六十年矣

六氣正化對化之圖



歌曰

午火寅火同酉屬金未土戌位生水伏天亥木生正方由十二支分半餘皆對化求

少陰正化午對化子太陰正化未對化丑少陽正化寅對化申陽明正化酉對化卯太陽正化戌對化辰厥陰正化亥對化巳

六氣遷移加臨之圖



交主氣時日歌

厥陰之氣大寒初君火春分二上居小滿少陽三候主太陰大暑四交諸秋分五定陽明位寒暑終於小雪歇

客行天命有寒暑燥濕風火之化主當祖奉之客勝則從主勝則逆二者自以多少爲勝而無復與常勝殊

四間氣之圖



四間

此以客氣論之司天爲三氣在泉爲終氣餘爲左右間司天左爲四氣右爲二氣在泉左爲初氣右爲五氣

歌曰

如推四間居何地標準司天與在泉左四天爲同右二左初右五列泉邊

六十年氣運相臨之圖



六十年主客加臨天氣

午子初寒霜雪冰二風雨蟲三暑烘四雨霪零走雷電五濕風兮燥寒終未丑初蟲二疵疫雷雨電雹三氣中四乃炎沸五涼燥大寒凝剋六之功熱風時氣申寅初是二雨三爲災亢攻四風霧露五寒早寒風雨蟲六驗工酉卯初風雨二熱疫三發涼風四雨漂涼風雨蟲五能致蟲蟲不冰應六宮塩疫戌辰初濕涼二寒熱冰雹三所通四風雨蟲五濕熱寒雪地濕六不空亥巳初霧昧二雨熱熱風雨蟲三却同暴雨

歌曰

六十年中紀運歌運尅氣者爲不和氣如生運名順化運被氣尅天刑多小逆見之運生氣運合則天符過

小逆如己卯歲雖金與土相得然子臨父位爲逆

溽濕熱用四雨五六蟄不冰窮

此皆客行天令居上故有是不同之化然平氣至必當其期過不及則先後其候於交氣期各差十三日而應

天符之圖



論天符

司天者司直也主行天之令上之位也歲運者運動也主天地間人物化生之氣中之位也在泉者主地之化行乎地中下之位也一歲之中有此上中下三氣各行化令而氣偶符會而同者則同其化雖無尅復之變則有中病徐暴之異是謂當年之中司天之氣與中氣運同者命曰天符符之爲言合也天符共十二年中又有與當年十二律五行同者又是歲會命曰太乙天符太乙者尊之之號也謂一者天會二

者歲會三者運會上有四年不論陰年陽年皆曰天符爲執法歲會爲行令太乙天符爲貴人邪之中人則執法者其病速而危行令者其病徐而持貴人者其病暴而死蓋以氣令中人則深矣歲會干律同而非天令言行令者象方伯無執法之權故無速害病但執持而已

歲會之圖



論歲會

夫當年十干建運與年神十二律五行相會故曰歲會氣之平也故不以陰年陽年乃是取四時正月之中爲四值承歲子午卯酉是也而土無正位各寄旺四季之末一十八日有奇則通論承歲辰戌丑未是也外有四年壬寅皆木庚申皆金是二陽年癸巳皆火辛亥皆水是二陰年是運與年辰相會而不爲歲會者謂不當四年正中之令故也除二陽年則癸巳辛亥二陰年雖不名歲會亦上下五行相佐皆爲平氣之歲物生脈應皆必合期無先後矣歲會八年中內四年與司天氣同已入太乙天符

同天符同歲會之圖



天符太乙天符歲會

同天符同歲會總歌

司天與運及年支三位相衆太乙符運合年支名歲會土辰四正必同途在泉合運陰同歲陽則同天符可呼惟有天符何意取司天合運是其區

論同天符同歲會

運氣與在泉合其氣化陽年曰同天符陰年曰同歲會六十年中太乙天符四年天符十二年歲會八年同天符六年同歲會六年分言之共三十六年合言之止二十七年經言二十四歲者不言歲會也變行有多少病形有微甚生死有早晏按經推步可知也符合也太乙符之之號惟辰戌丑未寄位子午卯酉四正位主歲會者餘不當正中之合故耳邪之中人太乙暴而死歲會徐而持天符速而危

干德符無論無圖請其歌便諸其義故錄於此

不及年月干符同未逢行勝氣亦平行勝已後行復畢本氣即得正德位年前大寒交初氣其日干合年干位交氣時干或合之二者皆爲平氣至

註　如丁酉歲木運不及當金行勝正月建壬與丁合此木逢勝己卯歲土不及當木行勝金復至九月建甲與己合土乃還位此行勝己後亦行後已畢也年日時除交初氣餘雖相遇不相濟合謂甲與己合之類是也

手足經所屬之圖



手足經歌

太陽小腸足膀胱陽明大腸足胃當少陽三焦足膽匹太陰肺分足脾方少陰心經足腎部厥陰包絡足肝鄉

藏腑所屬地支歌

子腎午心辰膀胱丑脾酉腸戌小腸未肺巳肝亥包絡卯胃中焦寅膽房

論手足經

經言人五藏十二節皆通乎天氣者乃論手足經三陰三陽也其十二經外循身形內貫藏腑以應十二月即十二節也五藏爲陰六腑爲陽一陰一陽乃爲一合即六合也夫少陰之經主心與腎二藏者蓋心屬火而少陰冬脈其本在腎又君火正司于午對化於子是以腎藏亦少陰主之五藏爲陰不可言陽水隨腎至故太陽爲腑則手太陽小腸足太陽膀胱也太陰之經主脾與肺二藏者蓋脾屬陰土而太陰脈

在肺又土生金子隨母居故肺太陰主之金隨肺至故陽明爲腑則手陽明大腸足陽明胃也厥陰之經主肝與心包絡二臟者蓋肝屬木又生火子隨母居故心包厥陰主之火隨心包而至故少陽爲腑則手少陽三焦足少陽膽也其手足經者乃手經脈自兩手起足經之脈自兩足起也以十二辰言之蓋陰生於午陰上生故曰手經陽生於子陽下生故曰足經所以紀上下也又心肺心包在上屬手經肝脾腎在下屬足經亦其意也臟腑同爲手足經乃一合也心包非臟三焦非腑也經曰膻中者臣使之官喜樂出焉在胷主兩乳間爲氣之海然主爲君也三焦者決瀆之官水道出焉三焦者有名無形上合心主下合於右腎主竭道諸氣名爲使者也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百四十一卷目錄
醫部彙考一百二十一
運氣門十一
汪機運氣易覽論六氣爲病論治法六氣爲病歌
六氣主客補瀉歌
五藏所入之味歌
六氣所宜之味歌
北政論
南北政之圖
南政司天之圖
南北政尺寸脈候不應之圖論氣運加臨尺寸脈候不應交反說
尺寸交反死候歌
尺寸交反死候歌
逐年客運之圖
論大運主運太少相生之圖
論大運主運太少相生五運都主運上下太少相生之圖
更客之圖
論九宮分野五行納甲之圖
千支納音
論九宮分野五行納甲之圖
太陰從本從標之圖
少陰從本從標之圖
太陽從本從標之圖
陽明從中之圖
厥陰從中之圖
汪宦六氣標本論發明運氣標本病治
喻昌醫門法律運氣格言申明內經法律一中治病不先審氣之非
方

藝術典第一百四十一卷
醫部彙考一百二十一
運氣門十一
明汪機運氣易覽
論六氣爲病

厥陰所至爲裏急筋緩縮急支痛軟戾脅痛嘔泄少陰所至爲瘍疹身熱惡寒戰慄驚惑悲笑喬妄鼽衄血污太陰所至爲稽飲痞隔中滿霍亂吐下身重腑腫肉泥按不起少陽所至爲嘔嘔瘍耳鳴嘔涌溢食不下驚躁昏昧目不明暴注瞤瘛惡病暴死陽明所至爲鼽衄面黑目不明口糜咽腫喉痹頷痛齒寒痙好笑數欠顏黑太陽所至爲寒浮虛瘧揭尻陰股膕腨足病太陽所至爲鼽嚏浮虛瘧揭尻陰股膕腨足病太陽所至爲鼽嚏項背腰尾如重狀脛痠腰痛寒熱頭痛目似脫項如拔

論治法

主客之氣皆能致其疾下是主氣上是客氣經曰木位之主其瀉以酸其補以辛厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之火位之主其瀉以甘其補以鹹少陰之客以甘瀉之以酸收之少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹軟之土位之主其瀉以苦其補以甘太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之金位之主其瀉以辛其補以酸陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦緩之水位之主其瀉以鹹其補以苦太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之此六氣主客之補瀉也客勝則瀉客補主主勝則瀉主補客應隨當緩當急以治之也而本經又有六氣司天在泉淫勝之治法有司天在泉反勝之治法有歲運上下所宜藥食之治法如是不一各依疾苦順其運令以藥石五味調治之爲工者當明其歲令察其形證診其脉息別其陰陽依經旨以拯救之何患疾之不差耶

五運之中又有必折其鬱氣先取化源之法元珠以爲太陽司天取九月瀉水之源陽明司天取六月瀉金之源少陰少陽司天取三月瀉火之源太陰司天非歲氣者亦須原其所感形證脉候未必盡爲運氣所作在工以明之庶免拘泥運氣也

六氣爲病歌

厥陰筋緩縮裏急緩戾支脅痛嘔泄少陰寒熱慄疹瘍驚惑悲笑喬鼽衄太陰積飲否滿中身重腑腫霍亂別少陽喉痹嘔瘍耳鳴涌溢驚躁擊暴注瞤瘛目不明瞤瘛惡病暴死滅陽明鼽嚏皴揭浮尻陰股膕是病切太陽寒汗若屈伸流泄禁止腰痛折

論治法

主客之氣皆能致其疾下是主氣上是客氣經曰木位之主其瀉以酸其補以辛厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之火位之主其瀉以甘其補以鹹少陰之客以甘瀉之以酸收之少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹軟之土位之主其瀉以苦其補以甘太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之金位之主其瀉以辛其補以酸陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦緩之水位之主其瀉以鹹其補以苦太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之此六氣主客之補瀉也客勝則瀉客補主主勝則瀉主補客應隨當緩當急以治之也而本經又有六氣司天在泉淫勝之治法有司天在泉反勝之治法有歲運上下所宜藥食之治法如是不一各依疾苦順其運令以藥石五味調治之爲工者當明其歲令察其形證診其脉息別其陰陽依經旨以拯救之何患疾之不差耶

五運之中又有必折其鬱氣先取化源之法元珠以爲太陽司天取九月瀉水之源陽明司天取六月瀉金之源少陰少陽司天取三月瀉火之源太陰司天

取五月瀉土之源厥陰司天取年前十二月瀉木之源乃用鹹迎而取之之法也故曰無失天信無逆氣宜無翼其勝無贊其復是謂主治者此也蓋用之治有法存焉然病有久新方有大小有毒無毒而宜其制此用之大法也或者以爲歲運太角木壯土衰迎取之當瀉其肝經而益其脾胃此非通論也何哉豈有人人臟腑皆同者假如肝元素虛脾氣太盛遇此太角之運肝木稍實脾氣得平方獲安和若便瀉肝補脾所謂實實虛虛損不足而益有餘如此而死者醫殺之耳是不察其誤反害人增疾尤甚也何則天下事物之理益之則運而損之則速若服一藥取其效則緩而微若食一發病之物俄頃而應由是觀之成難毀易可不謹哉

六氣主客補瀉歌

木主酸瀉辛補之火主甘瀉鹹補施土主苦瀉甘味補金主辛瀉酸補爲水主鹹瀉苦順是六氣補瀉客後隨辛補酸瀉甘緩厥甘瀉酸收少陰知鹹補甘瀉鹹軟相甘補苦瀉甘緩脾酸補苦瀉肺經施苦補鹹瀉於水推更以苦堅以辛潤同極太陽尤其宜

二火之氣雖殊其用則一木用辛補酸瀉經註辛味散故補酸味收故瀉新校正云自爲一義今未詳法復司氣可犯無犯如夏寒甚則可以熱犯熱不甚則不可用

五臟所入之味歌

酸主收之屬肝臟苦堅入心甘緩脾辛性味散能調肺鹹則軟兮於腎宜

六氣所宜之味歌

鹹寒二火木辛涼甘熱當令治太陽苦折太陰宜苦熱陽明之味苦溫嘗

論六病

明陰陽運轉之六氣辯南北哉政之尊卑察主客勝負之由審淫勝鬱復之變須在脈候然後爲工矣五運不及則所勝者來尅五運太過則不勝者受邪天地六氣五相臨遇應則順否則逆氣相得則和不相得則病惟天地勝復之氣不形於診者乃初氣終三氣天之勝四氣盡終氣地之復蓋以氣不以位故不以形證觀察也餘則當知六脈故經曰厥陰之至其脈弦少陰之至其脈洪少陽之至其脈大而浮陽明之至其脈短而濇太陽之至其脈大而長至而和則平至而甚則病至而反者病至而不至者病未至而至者病陰陽易者危不當其位者病迭易其位者病失守其位者危此之謂也然人之生也雖五行備於一身生氣根於內亦隨天地之氣變舒也何以明之謂如春脈弦夏脈洪秋脈毛冬脈石是也夫人感運氣而生亦曰感運氣而疾經曰逆之則變生變生則病物生其應也氣脈其應也當立歲氣以論別之平人氣象論曰太陽脈至洪大而長少陽脈至乍數乍疏乍短乍長陽明脈至浮大而短難經引此亦論三陰三陽之脈者乃以陰陽始生之淺深而言之也六脈者蓋言運與氣時復臨遇正當行令當其司化之時而應故脈之動不相同若交運交氣時日及期而見無相先後不及太甚方謂之平若差之者當知其病也







右太陰居左此不可易也其少陰則主兩寸尺厥陰司天在泉當在右故右不應太陰司天在泉當在左故左不應依南政而論尺寸也若覆其手診之則陰沉於下反沉爲浮細爲大也又經曰尺寸反者死陰陽交者死先立其年以知其氣左右應見然後乃可言死生之逆順者更在診以別其反詳其交而後造死生之微也

南北政尺寸脈不應之圖

南北政尺寸脈不應

不應謂陰之所在脈乃沉細不應本脈也若覆手診之則沉爲浮細爲大矣尺寸本無上下今以上下字言之以別南北政司天在泉所主耳

歌曰

南政寸上尺居下北政寸上尺下推三陰司天不應上在泉于下不應之太陰須診左寸尺厥陰右手尺寸持少陰脈兼兩寸尺此理微妙誠難知

論氣運加臨尺寸脈候不應交反說

經曰陰陽交者死謂歲當陽在左脈反見右歲當陰在右脈反見左左右交見是謂交若左獨然或右獨然是不應非交也惟寅申巳亥辰戌丑未八年有之經曰尺寸反者謂歲當陰在寸而脈反見於尺歲當陽在尺而脈反見於寸尺寸俱反方謂之反若尺獨然或寸獨然是不應非反也惟子午卯酉四年有之蓋造化之氣變常則氣血紛擾而爲病矣經曰先立其年以知其氣左右應見乃可以言生死之逆順也

舉此爲例餘歲同法粗工不知呼爲寒熱攻寒令熱脈不變而熱疾已生制熱令寒脈如是而寒疾又起欲求其適安可得乎夭枉之因率由此也凡三陰三陽司天在泉上下南北二政或左或右兩手寸尺其脈沉下沉下不相應者覆手則沉爲浮細爲大矣

尺寸交反死脈

如太陰司天陰脈歲當見左寸反見右寸其右寸本然陽脈而移左寸曰陰陽交反者死若左獨陰脈不見或右獨不見乃不應陰氣止疾而已尺同惟寅申巳亥辰戌丑未八年有之少陰司天陰脈歲當見兩寸反見兩尺其尺本然陽脈而移兩寸曰尺寸反反者死尺同尺寸獨義同前惟子午卯酉四年有之

尺寸交反死脈歌

左寸交右右交左右尺交左左交右兩手反移兩尺居兩尺反移兩寸守

按脈不應專指三陰言然少陰君主也故主兩寸兩尺所以少陰司天兩寸不應少陰在泉兩尺不應子之左丑屬太陰故太陰司天左寸不應太陰在泉左尺不應子之右亥屬厥陰故厥陰司天右寸不應厥陰在泉右尺不應但看三陰所在司天主寸在泉主尺不論南政北政此要法也

一人病診左尺不應以爲腎氣絕死在旦夕更醫診之察色切脈則面戴陽氣口弦而長乃傷寒三陽合病也又方涉海爲風所驚遂血鬱而神懾爲熱所搏乃吐血升許且骨痛煩渴譫語投小柴胡湯減參加生地俟其胃實以承氣湯下之而愈適是年歲運左尺當不應此天和脈非腎絕也

大運主運太少之圖



大運主運太少歌○水初火二土期二金四相雖五木參此號歲中之主運靜而不動匪虛談

主運　太角初

主運　少角初

大運主運時日歌○大寒木運始交真清明前三火用親芒種十朝應見土立秋念二值金辰立冬四日宜言水每運此十三朝五刻輪

逐年客運之圖

逐年客運歌○假令甲己年爲例却用當年土作初五運頭生臨主位逐年做此次加諸

客運　甲己　上初





客運　甲己　上初

于經未見其用姑載之以備參考庶爲全書耳

論大運主運太少相生

運有大運有主運當年年干建運通主一年此爲大運或太角或少角俱從大寒日始以次相生至羽而終每運各主七十三日零五刻總五運之數則三百六十五日零二十五刻而成一歲此爲主運主運太少皆依大運陽年屬太陰年屬少上生至角而止下生至羽而止上下相生皆須太少相因不可失序假如甲運太宮土也上生太宮者少徵火生少徵者太角木此謂上生至角是也又太宮土下生者少商金

金生太羽木此謂下生至羽是也甲與己合己從少宮上下相生焉又如乙運少商金也上生少商者太宮土生太宮土者少徵火生少徵火者太角木此亦謂上生至角也又少商下生者太羽水此亦謂下生至羽也乙與庚合庚從太商上下相生焉又如丙運太羽水也上生太羽者少商金生少商金者太宮土生太宮土者少徵火生少徵火者太角木此謂上生至角也丙與辛合辛從少羽上生焉又如丁運少角木也少角下生者太徵火火生少宮土土生少商金金生少羽水此謂下生至羽也丁與壬合壬從太角下生焉又如戊運太徵火也上生太徵火者少角木也又角太徵下生者少宮土土生太商金金生少羽水此亦謂上生至角下生至羽也戊與癸合癸從少徵上下相生焉是以逐年主運皆依大運或太角爲初則太羽爲終或少角爲初則少羽爲終經於各條大運角下註一初字羽下註一終字又以示人主運角羽之太少初終也甲乙丙壬癸五年皆太角木爲初運主七十三日自大寒日起至春分後十三日止也少徵火爲二運主七十二日自春分後十三日起至小滿後二十五日止也太宮土爲三運主七十三日自小滿後二十五日起至大暑後二十七日止也少商金爲四運主七十三日自大暑後二十七日起至秋分後四十九日止也太羽水爲終運主七十三日自秋分後四十九日起至大寒而終也戊己庚辛丁五年皆少角木爲初運太徵火爲二運少宮土爲三運太商金爲四運少羽水爲終運也按天元玉冊又有歲之客運行於主運之上與六氣主客之法同故曰歲中客運者常以應於前二十日爲初運

申子辰歲大寒日寅初交亥卯未歲大寒日亥初交寅午戌歲大寒日申初交巳酉丑歲大寒日巳初交此五運相生而終歲度也然於經未見其用以六氣言之則運亦當其主氣以行天令蓋五行之運一主其氣當四而無用不行生化者乎然當年大運乃過主一歲如司天過主上半年之法天元玉冊言五運之客五主一年則經所載者乃逐年之主運也明矣當以玉冊爲法

大運主運太少相因歌

先分大運過不及大運五音生歲音五音生已倒推上太少相因逢角尋角初羽終起歲運太少次生復下臨木歲角初同大運太少次生亦下侵

當年大運爲主將歲主運上下因之名太少五音假令太宮爲大運上見太徵火火上見少角木則歲初運自少角起下生至少羽水終惟木陽年初運自太角起陰年自少角起下生亦以太少隨之

五運邪正化度歌

五運太過惟一化正乃陽兮當勿差尅己己生同化度運如不及却爲邪

度日也一化陽歲大運

論正化度邪化度

假如甲子年屬火爲熱化司天甲屬土爲雨化司運卯屬金爲清化司地熱化雨化清化皆司天司運司地之本氣故曰正化度（度日也）又甲屬陽爲太過太過則無勝亦無復是以無邪化度也凡遇陽年爲太過而五行多以成數言故曰熱化七雨化五清化九也

又如辛卯年屬金爲清化司天辛水運爲寒化司運子火熱化司地清化寒化熱化皆司天司運司地之本氣故亦曰正化度但辛水屬陰爲不及不及則土之化雨必來尅之水弱不敵而水之子乃木之風化必來爲母復讎而尅土然雨所尅風化所復非司天司運司地之本氣故曰邪化度也雨化風化雖非本然一勝一負理之必然故云凡遇陰年不及而五行多以生數言故曰清化四寒化一熱化二也

論主運上下太少相生

假如甲年屬陽土爲太宮則以太宮土爲主故太宮之所生與夫所生太宮者皆從少不從太也是以太宮土所生者乃少商金少商金所生者乃少羽水遇羽則終矣又所生太宮土者乃少徵火所生少徵火乃太角木遇角則止矣凡遇陽年上下相生皆從少故曰太少上下相生也又如己年屬陰土爲少宮則以少宮土爲主故少宮土之所生與夫所生少宮土者皆從太不從少也是以少宮土所生者乃太商金太商金所生者乃少羽水遇羽則終矣又所生少宮土者乃太徵火所生太徵火者乃少角木遇角則止矣凡遇陰年上下相生皆從太故曰太少上下相生也又不拘陽年陰年皆於角下註一初字羽下註一終字蓋每年皆以角木爲初運羽水爲終運故也年年如是不改故爲主運正如主氣每年皆以木爲初運水爲終氣年年如是不改故曰主氣也

災宮之圖



災宮歌

年逢不及有災宮辛一丁三己五同七數少商即乙并癸九仍將土寄二坤衝二乃土寄位非災宮之數

論九宮分野

論曰五運不及之歲則有災宮所向之位故不可一槩而論災也經云九星懸朗七曜周旋乃天所主之九星分野故少角歲云災三宮東宮震位天衝司也少徵歲云災九宮南室離位天英司也少宮歲云災五宮中室天禽司也寄位二宮坤位少商歲云災七宮西室兌位天柱司也少羽歲云災一宮北室坎位天蓬司也首以運氣不及之方言之按天元玉冊曰天蓬一水正之宮也天芮二土神之應宮也天衝三木正之宮也天輔四木神之應宮也天禽五土正之宮也天心六金神之應宮也天柱七金正之宮也天任八火神之應宮也天英九火正之宮也下以應九州之分野謂燕冀兌青揚荆豫梁雍也

五行納甲之圖



歌曰

五行舉一爲例干支陽夫甲子陰妻乙丑甲子能娶乙丑隔八三生金兮假如子之一辰其中而含五音甲金丙水戊火庚土壬木相臨

干支納音

干支首甲子陽先陰後順輪假如甲子陽乙丑陰陽娶陰同類爲妻如甲子娶乙丑是也生子謂甲子隔八生壬申壬申生庚辰三皆金金即子餘子義同次向戊子火三生至木木三生至水水三生至土土三生終復自甲午金三生至戊午火依序轉畢十二辰各含五音如子之一辰甲子金丙子水戊子火庚子土壬子木是也六甲共納六十音隔八非第八如甲子至癸酉通十除前位名納甲法運氣則不及爲用

少陽從本之圖



太陰從本之圖



少陰從本從標之圖



太陽從本從標之圖



陽明從中之圖



厥陰從中之圖



汪宦六氣標本論

夫經之立法意溢言表者多矣余嘗觀運氣微旨篇六化圖序及夫少陽之上火氣治之中見厥陰云云之說經旨既祕而未發而釋者又謬言滋惑但其曰木之下中之見也見之下氣之標也又有從本從標從末從中之治昭然三氣分疊則微旨猶有可究者於是援引經旨參以己見附以標本同異從舍之治未敢自以爲是然亦可爲迷心傳註者之一悟也

發明運氣標本病治

素問六微旨篇帝曰願聞天道六六之節盛衰何也岐伯曰上下有位左右有紀故少陽之右陽明治之陽明之右太陽治之太陽之右厥陰治之厥陰之右少陰治之少陰之右太陰治之太陰之右少陽治之此所謂氣之標蓋南面而待之也故曰因天之序盛衰之時移光定位正立而待之此之謂也少陽之上火氣治之中見厥陰陽明之上燥氣治之中見太陰太陽之上寒氣治之中見少陰厥陰之上風氣治之中見少陽少陰之上熱氣治之中見太陽太陰之上濕氣治之中見陽明所謂本也本之下中之見也見之下氣之標也標本不同氣應異象至眞要大論篇帝曰六氣標本所從不同奈何岐伯曰氣有從本者有從標本者有不從標本者也少陽太陰從本少陰太陽從本從標陽明厥陰不從標本從乎中也故從本者化生於本從標本者有標本之化從中者以中氣爲化也王註曰少陽之本火太陰之本濕本末同故從本也少陰之本熱其標陰太陽之本寒其標陽本末異故從標從本陽明之中太陰厥陰之中少陽本末異中不同故不從標本從乎中也滑註曰陽明本燥標陽中濕厥陰本風標陰中火惟此二經本末與中不同故治從本宜謂六氣者行乎天地之間而施德化政令者也若夫平氣之歲如丁卯庚午甲辰己丑戊己未丙子之類謂之平氣之歲是也物生脉應氣化各得其常若當歲氣有太過不及之偏則有勝負鬱發淫乘之變人居氣交之中感之而爲病焉其治也有從乎本從標從本從中之異其說雖見運氣諸篇而實與經藏證治相爲表裏者也考之經以天之六化之氣寒暑燥濕風火爲本以三陰三陽之位爲標所謂中見者以陰陽表裏之相遘者互相取之因天之序盛衰之時移光定位正立而待之其化氣則尊之面南爲本而上居以應天其本之下以中見之氣面北而中處以應人其中見之下以標下三陰三陽爲標居之於下以應地經於標之一氣未嘗愚竊推之標之位猶有地之六氣應之如初風木二君火三相火四濕土五燥金而終寒水地氣之下應者既異則三陰三陽之加臨亦從其化矣所謂標本不同氣應異象者此也又造化之理陽主進故以九爲老陰主退故以六爲老故凡本氣之所在必審本位之陰陽而進退之俱由風木而左旋當其見下之一氣以爲標之所治則標本中見三才之氣可列矣標本同者從本有互相爲標本者則亦互相從標本不同者從乎中焉如少陽之上火氣爲本中見厥陰風木以風爲中氣而少陽爲標則以少陽左位陽明以爲地氣風木之所始循次左行至見下標位當其三氣相火應之此標本俱火故從本之火也又如太陰之上濕氣爲本中見陽明燥金以燥爲中氣而太陰爲標則以太陰右位少陰以爲地氣風木之所始循次左行至見下標位其四氣濕土應之此標本俱濕故從本之濕也是少陽太陰標本俱同故從化生於本者論也又如少陰之上熱氣爲本中見太陽寒水以寒爲中氣而少陰爲標少陰宜右退而左數之則終氣寒水當標之位而標之少陰亦從寒化矣此本熱而標寒故少陰所至爲熱生中爲寒治者或從熱而從寒也又如太陽之上寒氣爲本中見少陰熱氣以熱爲中氣而太陽爲標太陽宜左進而順數之則二氣君火當標之位而標之太陽亦從熱化此本寒而標熱故太陽所至爲寒生中爲濕治者或從寒而從熱也是少陰太陽互爲標本故以標本之化之者論也又如陽明之上燥氣爲本中見太陰濕土以濕爲中氣而陽明爲標從陽明左位太陽數起循次左行至見下標位當其四氣濕土應之則標之陽明亦從濕化矣此本燥而標濕爲標本不同故不從標本從乎中之濕也又如厥陰之上風氣爲本中見少陽火氣以火爲中氣而厥陰爲標從厥陰右位太陽數起循次左行至見下標位當其五氣燥金應之則標之厥陰亦從燥化矣此本風而標燥亦爲標本不同故不從標本從乎中之火也是陽明厥陰標本不同故以中氣爲化者論也此皆有自然之法象存焉而豈人意所可損益者哉槩而言之太陰陽明從乎濕也少陰太陽從熱而從寒也厥陰少陽從乎火也今以太陰陽明從濕之治言之有手太陰肺臟受濕而爲喘急或聲音如從瓮中所出等證治用葶藶木通之類又有足太陰脾臟受濕而爲痞滿等證治用大消痞丸之類或爲四肢浮腫肉按如泥等證治用胃苓湯之類或爲肢體沉重嗜臥等證治用蒼术羌活之類又有足陽明胃腑因於飲水不散而爲胃腹脹滿漱水不嚥等證治用五苓散加半夏之類甚者用犀牛甘遂之類又有陽明胃經受濕而爲面目浮腫等證治用蒼术羌活之類又有手陽明濕勝而爲濡瀉等證治用五苓散之類此皆太陰陽明從濕之治也又以少陰太陽從熱從

寒之治而言之有手少陰心熱而爲心神不足不安者治用硃砂安神丸之屬或爲瘡瘍或爲日中發熱熱見血脈者治用黃連瀉心湯之屬又有胃腑實熱乘心而爲譫語者治用大承氣湯之屬又有傷寒下早心臟結熱而爲痞滿者治用黃連枳實之屬經曰中滿者瀉之於內者此也若心下痞鞕者大承氣湯主之又有少陰心火亢極而爲惡寒戰慄者此本熱而標似寒也治用散火之劑又有少陰心臟虛寒而爲惡寒者治用人參附子赤石脂之屬王太僕益火之原以消陰翳者此也又有少陰腎熱而爲遺精者治用珍珠丸加椿根皮之屬或爲躁心者治用知母之屬有傷寒熱傳少陰腎經而爲口燥舌乾等證治用桂枝湯之屬又有少陰腎寒而爲身體骨節痛手足寒脈沉者治用附子湯之屬經曰脈沉而病反者其診何如岐伯曰脈至而從按之不鼓諸陽皆然者此也又有手足太陽小腸膀胱腑寒而爲冷淋小便數起不通得寒戰而解者治用生附湯之屬或爲小便清白或爲小便不禁或爲久下帶濁等證治用薑附之屬又有太陽膀胱經虛寒而脈浮自汗微惡寒小便數煩心攣急等證治用桂枝加附子湯之屬又有太陽小腸膀胱腑熱而爲溺祕等證治用黃蘗知母之屬經曰小腸移熱於膀胱膈腸不便者此也或爲熱淋赤濁溺血等證治用黃蘗知母梔子經曰胞移熱於膀胱爲癃溺血者此也又有太陽膀胱火邪而爲足膝紅腫者治用當歸生地黃黃蘗龍膽草防己蒼朮紅花之屬又有傷寒足太陽經惡寒發熱頭項強痛傳入膀胱之腑而爲小便赤澀者此本寒而標熱也先用麻黃湯解之後用五苓散利之經曰病發而有餘本而標之先治其本後治其標者此也又有足太陽經外邪鬱熱入裏傳變瀉利清穀或爲腹脹而惡寒發熱頭疼身痛表證猶在者此本熱而標寒也先用薑附湯溫之後用桂枝湯解之經曰病發而不足標而本之先治其標後治其本者此也此皆少陰太陽從熱從寒之治者也又以厥陰少陽從火之治言之有手厥陰經熱而爲掌熱者治用柴胡黃芩黃連連翹之屬又有少陽三焦腑熱等證治用三補丸之類又有足厥陰肝熱而爲脅痛者治用當歸龍膽丸之類或爲熱從左脅起者治用抑青丸之類又有小兒肝受風熱而爲驚搐者治用鎮驚丸之類又有足少陽膽熱而爲口苦者治用柴胡黃芩之類又有肝熱則口苦膽熱而爲貪睡者治用生酸棗仁苦荼之類又有手足少陽經鬱熱不散而爲耳聾胃脅痛等證治用小柴胡湯之類或爲耳鳴治用清氣化痰丸之類或爲瘰癧者治用破結散之類或爲發斑者治用連翹防風湯之類或爲寒熱瘧疾者治用清脾飲之類或爲喉痹者治用甘桔湯加防風荊芥梔子紫蘇天花粉之類此皆厥陰少陽從火之治者也故小學云肝膽由來從火治三焦心主都無異脾胃常從濕處求肺與大腸同濕類心腎小腸與膀胱寒熱隨宜俱熱類即其義也若夫二子之註隨文釋義而已如標位屬陽者則曰標陽屬陰者則曰標陰殊不知標有風火熱濕燥寒六氣之異乃以陰陽二字統之可乎抑考之經有云明乎標本萬舉萬全不知標本是謂妄行蓋標本之說上窮天文下察地理中紀人事其爲道也甚大其爲理也甚微其取用也無窮其推行也有準明乎此者通乎三才也

醫門法律　臣喻昌著

運氣格言

大凡物理有常有變運氣所主者常也異於所主者皆變也常則如本氣變則無所不至而各有所占故其候有從逆淫鬱勝復太過不及之變其法皆不同若厥陰用事多風而草木榮茂此之謂從天氣明潔燥而無風此之謂逆太虛埃昏流水不冰此之謂淫大風折木雲物混擾此之謂鬱山澤焦枯草木凋落此之謂勝大暑燔燎蝗爲災此之謂復山崩地震埃昏時作此之謂太過陰霖無時重雲晝昏此之謂不及隨其所變疾厲應之皆視當時當處之候雖數里之間但氣候不同而所應全異豈可膠於一定

歲運有主氣有客氣常者爲主外至者爲客初之氣厥陰以至終之氣太陽者四時之常序也故謂之主氣惟客氣不載其目故說者多端或以甲子之歲天數始於水下一刻乙丑之歲始於二十六刻丙寅歲始於五十一刻丁卯歲始於七十六刻者謂之客氣此乃四分曆法求大寒之氣何與歲運又有相火之下水氣乘之土位之下風氣乘之謂之客氣此亦主氣也與六節相須不得爲客凡所謂客者歲半以前天政主之歲半以後地政主之四時常氣爲之主天地之政爲之客逆主之氣爲害暴逆客之氣爲害徐調其主客無使傷診此治氣之法也

少角之運歲木不及侮而乘之者金也金不務德故以燥勝風時則有白露早降收氣率行其變爲肅殺

其災爲蒼隕名爲少角而實與太商之歲同少徵之運歲火不及侮而乘之者水也水不務德故以寒勝熱時則有寒雰凝慘地積堅冰其變爲凜冽其災爲霜雹名爲少徵而實與太羽之歲同少宮之運歲土不及侮而乘之者木也木不務德故以風勝濕時則有大風飄暴草偃沙飛其變爲張發其災爲散落名爲少宮而實與太角之歲同少商之運歲金不及侮而乘之者火也火不務德故以熱勝燥時則有火延焦槁炎赫沸騰其變爲銷鑠其災爲燔焫名爲少商而實與太徵之歲同少羽之運歲水不及侮而乘之者土也土不務德故以濕勝寒時則有泉涌河衍涸澤生魚其變爲驟注其災爲霖潰名爲少羽而實與太宮之歲同通乎此則知歲在涸流之紀而河決大水固可以類而推之也

天地之間氣有偏勝而無以救之則萬物之所存者幾希矣是故風熱燥濕寒五者各司一氣生長化收藏五者各司一時以順相乘然後能循環以相生以逆相勝然後能循環以相救故曰五氣之運猶權衡也高者抑之下者舉之化者應之勝者復之化者應之氣之平也五氣之相得也勝者復之氣之不平也五氣之相賊也氣平而相得者所以通其常氣不平而相賊者所以觀其變古之明乎此而善攝生者何常不消息盈虛以道御神耶

太陽司天之政歲宜以苦燥之溫之陽明司天之政歲宜以苦辛汗之清之散之又宜以鹹少陽司天之政歲宜以鹹宜辛宜酸滲之泄之瀆之發之觀氣寒溫以調其氣太陰司天之政歲宜以苦燥之溫之甚者發之泄之不發不泄則濕氣外盛肉潰皮坼而水血交流少陰司天之政歲宜鹹以奪之而調其上甚則以苦發之以酸收之而安其下甚則以苦瀉之厥陰司天之政歲宜以辛調之以酸潤之

歲以陽爲首寅引也少陽之氣始於泉下引陽升而在天地人之上五穀草木皆甲坼於此時也至立夏少陰之火熾於太虛則草木盛茂垂枝布葉乃陽之用陰之體此所謂天以陽生陰長經言歲半以前天氣主之在乎升浮也至秋而太陰之運初自天而下逐陰降而徹地則金振燥令風厲霜飛品物咸殞其枝獨在若予毫毛至冬則少陰之氣復伏於泉下水冰地坼萬物周密陰之用陽之體也此所謂地以陽殺陰藏經言歲半以後地氣主之在乎降沉也

天元紀大論等篇以年歲之支干分管六氣蓋已失先聖之旨矣年歲之支干天下皆同且通四時不變也天氣之溫暑寒涼民病之虛實爽耳東西南北之殊方春夏秋冬之異候豈有皆同之理其妄延可知也近世傷寒鈐法則以得病日之干支爲主其源亦出於此決不可用蓋金木水火土之氣各主一時當時則爲主氣爲司天非其時而有其氣則爲客氣與時正相反者則爲在泉謂其氣伏於黃泉之下而不見也治法用熱遠熱用寒遠寒所謂必先歲氣毋伐天和也春時木氣司天則四方皆溫夏時火氣司天則四方皆熱夏秋之交土氣司天則四方皆濕秋則皆涼冬則皆寒民病往往因之此理之易見者其有氣與時相反者則所謂客氣者也故治法亦有假者反之之說觀此則運氣之說思過半矣

如太陰雨化施於太陽太陽寒化施於少陰少陰熱化施於陽明陽明燥化施於厥陰厥陰風化施於太陰凡淫勝在我者我之實也實者與邪也反勝在彼者我之虛也虛者假邪也此六氣之虛實即所謂有無也然天地運氣雖分五六而陰陽之用水火而已故陽勝則陰病陰勝則陽病瀉其盛氣責其有也培其衰氣責其無也求得所本而直探其隧則排難解紛如拾芥也設不明逆順盈虛之道立言之意而鑿執不移所謂面東者不見西牆面南者不覩北方察一曲者不可與言化察一時者不可與言大未免虛虛實實遺人害矣

六氣之分屬陰者三濕燥寒是也屬陽者二風熱而已使火無君相之化則陰勝於陽而殺甚於生矣此二火之所以必不可無也若因惟火有二便謂陽常有餘而專意抑之則伐天之和伐生之本莫此爲甚此等大義學者最當詳察

三陽所在其脈無不應者氣之盈也三陰所在其脈有不應者以陽氣有不及氣之虛也然三陰之列又惟少陰獨居乎中此又陰中之陰也所以少陰所在爲不應蓋亦應天地之虛耳豈君不主事之謂乎

五行勝復之理不期然而然天地萬物固無往而非五行而亢害承制又安往而不然哉故求之於人則五臟更相平也五志更相勝也五氣更相移也五病更相變也故火極則寒生寒極則濕生濕極則風生風極則燥生燥極則熱生此皆其化也弗承制之在天地者出乎氣化之自然而在人亦有之則在挽回運用之得失耳使能知其徵得其道則把握在我何

害之有設承制之盛衰不明似是之眞假不辨則敗亂可立而待也

故凡以太陽之人而遇流行之紀以太陰之人而逢赫曦之紀強者有制弱者遇扶氣得其平何病之有或以强陽遇火則炎烈生矣陰寒遇水則冰霜及矣天有天符歲有歲會人得無人和乎

申明內經法律

百病之起多生於本六氣之用則有生於標者有生於中氣者太陽寒水本寒標熱少陰君火本熱標寒其治或從本或從標審寒熱而異施也少陽相火從火化爲本太陰濕土從濕化爲本其治但從火濕之本不從少陽太陰之標也陽明燥金金從燥化燥爲本陽明爲標厥陰風木木從風化風爲本厥陰爲標其治不從標本而從乎中中者中見之氣也蓋陽明與太陰爲表裏其氣互通於中是以燥金從濕土之中氣爲治厥陰與少陽爲表裏其氣互通於中是以風木從相火之中氣爲治亦以二經標本之氣不合故從中見之氣以定治耳若夫太陽少陰亦互爲中見之氣者然其或寒或熱標本其明可以不求之於中耳至於諸病皆治其本惟中滿與大小二便不利治其標蓋中滿則胃滿胃滿則擧食之氣不能行而臟腑皆失所稟故無暇治其本先治其標更爲本之本也二便不通乃危急之候諸病之急無急於此故亦先治之舍此則無有治標者矣至於病氣之標本又自不同病發而有餘必累及他臟他氣先治其本不使得入他臟他氣爲善病發而不足必受他臟他氣之累先治其標不使累及本臟本氣爲善又如病爲本工爲標工不量病之淺深病不擇工之藏否亦是標本不得也緣標本之說錯出難明故此述其大略云

一申治病不先歲氣之律

凡治病不明歲氣盛衰人氣虛實而釋邪攻正實實虛虛醫之罪也

不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可以爲工矣蓋不知歲運之盛衰自不知人氣之虛實失時反候五治不分邪僻內生工不能禁也夫治病不知氣之至與不至而失其時反其候則五運之治盛衰不分其有邪僻內生病及於人者雖醫工莫能禁之緜其不知時氣也

不知合之四時五行因加相勝釋邪攻正絕人長命蓋不知邪正虛實而妄施攻擊奪人眞元殺人於冥冥之中故爲切戒

必先歲氣無伐天和無盛盛無虛虛而遺人夭殃無致邪無失正絕人長命此內經諄諄示戒學者可不求師講明蓋歲有六氣分主有南面北面之政先知六氣此六氣所在人脈至尺寸應之太陰所在其脈沉少陰所在其脈鉤厥陰所在其脈弦太陽所在其脈大而長陽明所在其脈短而濇少陽所在其脈大而浮如是六脈則謂天和不識者呼爲病脈攻寒令熱脈不變而熱疾已生制熱令寒脈如故而寒病又起欲求其適安可得乎天柱之來率緜於此不察虛實但用攻擊盛盛虛虛致邪失正遺人夭殃絕人長命也

方

附子山茱萸湯（三因方下同）

六甲年敦阜之紀病宜此主之

附子炮　山茱萸各一錢半　半夏　肉豆蔻各一錢二分半　木瓜　烏梅各一錢　丁香　藿香各七分半

右剉作一貼入薑七片棗二枚水煎服

黃連茯苓湯

六丙年湊衍之紀病宜此主之

黃連　赤茯苓各一錢二分半　麥門冬　車前子各五分半

右剉作一貼入薑七片棗二枚水煎服

麥門冬湯

六戊年赫曦之紀病宜此主之

麥門冬　白芷　半夏　竹葉　鍾乳粉　桑皮　紫菀茸　人參各一錢　甘草五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

牛膝木瓜湯

六庚年堅成之紀病宜此主之

牛膝　木瓜各一錢　白芍藥　杜仲　枸杞子　菟絲子　黃松節　天麻各七分半　甘草五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

苓术湯

六壬年發生之紀病宜此主之

白茯苓　白术　厚朴　青皮　乾薑炮　半夏　草果　甘草各一錢

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

紫菀湯

六乙年從革之紀病宜此主之

紫菀茸　白芷　人參　黃芪　地骨皮　杏仁　桑白皮　甘草各一錢

右剉作一貼入薑三片棗一枚水煎服

蓯蓉牛膝湯

六丁年委和之紀病宜此主之

肉蓯蓉　牛膝　木瓜　白芍藥　熟地　當歸　甘草各一錢

右剉作一貼入薑三片烏梅一箇水煎服

白朮厚朴湯

六己年卑監之紀病宜此主之

白朮土炒　厚朴　半夏製　桂心　藿香　青皮各一錢　乾薑炮　甘草炙各五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

五味子湯

六辛年涸流之紀病宜此主之

味子　附子炮　巴戟　鹿茸　山萸　熟地　杜仲炒各一錢

右剉作一貼入薑七片鹽少許水煎服

黃芪茯神湯

六癸年伏明之紀病宜此主之

黃芪　茯神　遠志　紫河車　棗仁炒各一錢

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

正陽湯

子午之歲病宜此主之

白薇　元參　川芎　桑白皮　當歸　白芍藥　旋覆花　甘草炙各一錢

右剉作一貼入薑五片水煎服

備化湯

丑未之歲病宜此主之

木瓜　茯神各一錢半　牛膝　附子炮各一錢二分半　熟地黃　覆盆子各一錢　甘草七分

右剉作一貼薑五片水煎服

升明湯

寅申之歲病宜此主之

紫檀香　車前子炒　青皮　半夏製　酸棗仁　薔薇　甘草各一錢

右剉作一貼入薑五片水煎服

審平湯

卯酉之歲病宜此主之

遠志　紫檀香各一兩半　天門冬　山茱萸各一錢二分半　白朮　白芍藥　甘草各一錢

右剉作一貼入薑五片水煎服

靜順湯

辰戌之歲病宜此主之

白茯苓　木瓜各一錢二分半　附子炮　牛膝各一錢　防風　訶子　乾薑炮　甘草炙各七分半

右剉作一貼水煎服

敷和湯

巳亥之歲病宜此主之

半夏　五味子　枳實　白茯苓　訶子　陳皮　乾薑炮　甘草炙各一錢

右剉作一貼入棗二枚水煎服

火併湯古今醫統下同

治風勝燥制

天南星二兩半　桔梗七錢半　梔子仁一兩三味入太陰肺經助燥化制其風　黃連八錢半此一味入少陰心經瀉火抑母之甚母者木也此實則瀉其子也　青皮二錢半以引諸藥至風勝之地　防風三錢　薄荷一錢二味散風勢

右爲粗末每服七錢半水一大盞薑三大片煎七分去查溫服

風併湯

治水勝濕制

蒼朮二兩米泔水浸一宿炒　白朮二兩半麩炒　甘草五錢炙三味入太陰脾經助土以制水之甚　吳茱萸五錢　乾薑五錢七分二味入厥陰肝經瀉木以抑母甚母者木也此實則瀉其子也　附子炮一錢一字引諸藥至水之地

右爲粗末每服七錢大棗一枚水一盞煎七分去查溫服

溫併湯

治火勝寒制

黃蘗二兩半鹽水炒　知母一兩二味入少陰腎經助寒化以制火甚　黃芩五錢酒炒　梔子仁四錢二味入太陰脾經助濕化以抑母甚　黃連一錢薑汁炒引諸藥至火勝之地

右爲粗末每服七錢燈心七根蓮子五枚水一盞煎七分溫服

燥併湯

治土勝風制

川芎一兩米醋炒　當歸一兩半酒洗二味入厥陰肝經助風化以制其濕　南星一兩湯炮七次　桑白皮蜜炙七錢二味瀉燥奪母　大棗五枚引諸藥至濕地　川芎辭八錢以散濕

右爲粗末每服七錢薑五片水一盞煎七分溫服

寒併湯

治金淫勝制

肉桂二兩入少陰心經助熱化以制金甚　當歸一兩半酒洗助木生火以制燥甚　澤瀉一兩入少陰腎經瀉寒以抑母　獨活六錢與澤瀉同　桔梗三錢半引諸藥至燥勝之地

右爲粗末每服六錢水一盞煎七分溫服燥易則止

霧漏濇併湯

治火勝陰精制

天門冬去心三兩淨蜜湯浸　生地黃二兩半酒洗入陰精助水化以制熱甚　柴胡五錢　連翹黃芩各二錢二味入霧漏濇抑甚　地骨皮　黃蘗各二錢二味引諸藥至熱勝之地

右爲粗末每服七錢燈心一撮水一盞煎七分溫服

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百四十二卷目錄

醫部彙考一百二十二

頭門一

黃帝素問 金匱真言論 五藏生成篇 脈要精微論 平人氣象論 藏氣法時論 宣明五氣論 通評虛實論 刺熱篇論 腹中論 風論 厥論 奇病論 脈解論 四時刺逆從論 標本病傳論 氣交變大論 六元正紀大論 至眞要大論 示從容論 方盛衰論 五亂論

靈樞經 終始篇 經脈篇 脈論 五亂論 大惑論

扁鵲難經 頭痛 厥頭痛 眞頭痛

張機金匱要略 頭痛 頭眩 頭搖 額黑

華佗中藏經 頭痛 腦痛 頭眩頭腦 額汗 厥色

王叔和脈經 頭痛 頭眩

脈訣 頭痛

孫思邈千金方 風眩

嚴用和濟生方 眩運之證當分內外所因 頭病評治 頭痛論治

寶鏡卿瘡瘍全書 發腦 頭後蜂窩散法 杭對口疽 疑際發頂門癰 發髮毒 蝕瘡

藝術典第一百四十二卷

醫部彙考一百二十二

頭門一 諸傷寒頭痛六經皆有而頭痛汗一證亦散汗門故俱不復贅

黃帝素問

金匱真言論

春氣者病在頭

註 所謂氣者言四時五藏之氣而爲病者也肝俞在頸項而春氣在頭者春氣生升陽氣在上也故病在氣者病在頭

五藏生成篇

診病之始五決爲紀欲知其始先建其母所謂五決者五脈也是以頭痛巔疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎

註 始者邪始在三陰三陽之氣分也五決者審別五藏陰陽之經氣以決其病也欲知其病之始在某經先分立五藏爲根本審其邪病某經之氣某藏之經也少陰巨陽相爲表裏陽氣生於水藏水腑之中而上出於巔頂實者邪實虛者正虛是以頭痛巔疾乃邪氣實於上而使正氣虛於下也蓋邪之中人始於皮毛氣分留而不去則轉入於經是以過在巨陽少陰之經而甚則入腎蓋經絡受邪則內干藏腑矣

心煩頭痛病在腦中過在手巨陽少陰

註 心部於表君火之氣外受於邪則心煩於內矣太陽之氣受邪則頭痛於上矣手太陽之脈循咽下腦手少陰之脈出肩心系下腦絡小腸病在腦中是過在手太陽少陰之經矣

青脈之至也長而左右彈有積氣在心下支胠名曰肝痹得之寒濕與疝同法腰痛足清頭痛

註 脈長而彈弦而急也弦則爲減諸急爲寒此得之寒濕而陽氣受傷故弦急也心下爲腦脇下爲胠內腦下連於兩胠邪在心下支胠間故脈左右彈也清濕地氣之中人也必從足始足厥陰之脈從足上腘入毛中過陰器抵小腹布脇肋故病證與疝痛相同而腰痛足冷也厥陰與督脈會於巔故頭痛也

脈要精微論

頭者精明之腑頭傾視深精神將奪矣得強則生失強則死

註 諸陽之神氣上會於頭諸髓之精上聚於腦故頭爲精髓神明之腑髓海不足則頭爲之傾神氣衰微則視深目陷也得腑氣之強則生失強則腑壞而藏將絕矣

推而外之內而不外有心腹積也推而內之外而不內身有熱也推而上之上而不下腰足清也推而下之下而不上頭項痛也

註 推詳其脈之偏於外內上下也推而外之者以左右三指向外以按之脈偏盛向內而不外者此邪在心腹間而成積也推而內之者以左右三指向內以候之脈偏盛於外而不內者邪在外而身有熱也推而上之者以三指平按而審之上而不下者其氣上盛下虛當主腰足清冷也推而下之下而不上者其氣下盛上虛當主頭項痛也

平人氣象論

寸口之脈中手短者曰頭痛

註此以寸口而候外因之病也夫寸爲陽尺爲陰寸口之脈中手短者此惟在寸之陽部故主頭痛

藏氣法時論

肝病者兩脅下痛引少腹令人善怒虛則目眩眩無所見耳無所聞善恐如人將捕之氣逆則頭痛耳聾不聰頰腫

註病者邪氣實也肝脈布脇肋抵少腹故兩脅下痛引少腹靈樞經曰肝氣實則怒肝藏血而開竅於目肝虛故眩眩無所見少陽經脈入耳中故無所聞膽病者心下澹澹如人將捕之厥陰與督脈會於巔肝氣逆故頭痛少陽氣逆故耳不聰而頰腫也

宣明五氣論

五邪所亂邪入於陽則狂邪入於陰則痹搏陽則爲巔疾搏陰則爲癌

註邪入於陽則陽盛陰不勝其陽則脈流薄疾并乃狂邪入於陰閉而不行則萌者而爲痹痛之證邪氣與陽氣搏擊于上則爲頭痛巔頂之疾足之少陰上繫于舌絡于橫骨終于會厭邪搏于陰則厥不能發發不能下故不能開闔而爲癌

通評虛實論

帝曰脈實滿手足寒頭熱何如岐伯曰春秋則生冬夏則死脈浮而滿滿而身有熱者死帝曰其形盡滿何如岐伯曰其形盡滿者脈急大堅尺澁而不應也如是者故從則生逆則死帝曰何謂從則生逆則死岐伯曰所謂從者手足溫也所謂逆者手足寒也

註腎主生氣之原膀胱爲太陽之腑脈實滿者少陰之寒氣充于外也手足寒者少陰之生氣虛于內也頭熱者太陽之氣發越于上也腎與膀胱陰陽竝交咸主生氣若盛于外則反虛于內矣春時陽氣微上陰氣微下秋時陰氣微上陽氣微下陰陽二氣交相資生故主生冬時陰氣盡出於外夏時陽氣盡虛于內故主死言陰陽之根氣不可虛脫者也

刺熱篇

肝熱病者小便先黃腹痛多臥身熱熱爭則狂言及驚脇滿痛手足躁不得安臥庚辛甚甲乙大汗氣逆則庚辛死其逆則頭痛員脈引衝頭也

註此言內因之熱先者謂先有此內因之熱而先見是證也肝主疎泄故小便赤黃肝脈環陰器抵少腹而上故腹痛也肝藏魂魂傷故多臥木火主氣故身熱也此言內因之病始在氣分先下而上由內而外又感外淫之邪內干五臟與內因之熱交爭則魂傷而狂言肝藏魂也東方肝木其病發驚駭肝脈布脅肋故脅滿痛風木之熱甚故淫于四末也入臥則血歸于肝肝氣傷而不能納血故不得臥也庚辛金尅肝木故甚庚辛不死起于甲乙大汗者正勝邪而外出也氣逆者熱淫而反內逆也員員周轉也肝藏之熱發于外而與形熱相應熱甚而上逆于頭故頭痛而員轉也蓋三陽之脈上循于頭肝熱與少陽交爭因脈引而上衝於頭也

心熱病者先不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩悶善嘔頭痛面赤無汗壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死

註心志喜恐勝之先不樂者爲恐所傷也此言內因之熱又感外因之邪外內交爭熱干神藏故卒然煩痛也少陰病者欲吐不吐故善嘔心爲陽中之太陽故頭痛心之華在面故面赤心主血故無汗也壬癸水尅心火故甚壬癸不死起於丙丁大汗者正勝邪而外出也逆則死矣

脾熱病者先頭重頰痛煩心顏青欲嘔身熱熱爭則腰痛不可用俛仰腹滿泄兩頷痛甲乙甚戊己大汗氣逆則甲乙死

註陰氣從足上行至頭故先頭重陽明之脈循頰故頰痛也脾脈絡于心故心煩而顏青熱邪干胃故欲嘔脾主肌肉故身熱也陽病者腰反折不能俯陰病者不能仰陰陽內外交爭故腰痛不可用俛仰也腹者脾土之郭郭故腹滿泄胃之悍氣上衝頭者循牙車下人迎故頷下痛也脾病者加於甲乙甲乙不死起於戊己如反逆而內干於藏則不能外出而汗解矣

肺熱病者先渐然厥起毫毛惡風寒舌上黃身熱熱爭則喘咳痛走胷膺背不得太息頭痛不堪汗出而寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死

註皮毛者肺之合藏氣熱於內故渐然寒慄於外而惡風寒蓋熱甚則寒也肺上連於喉竅故舌黃藏真高於肺主行榮衛陰陽故身熱也內因之熱與外感之熱交爭干於肺藏故喘咳不得太息肺主胷中之氣氣傷故痛走胷背也五藏之應天者肺而手陽明之脈上循於頭故頭痛不堪熱爭於

內故汗出而身寒也肺金病丙丁火尅之丙丁不死起於庚辛大汗者正勝邪而外出也如氣逆則遇勝尅之日卽死矣

腹中論

帝曰病熱而有所痛者何也岐伯曰病熱者陽脈也以三陽之動也人迎一盛少陽二盛太陽三盛陽明入陰也夫陽入於陰故病在頭與腹乃臚脹而頭痛也

註病熱者陽脈盛也陽脈盛者三陽之氣動之也三陽俱盛當主病熱頭痛腹爲陰陰中之至陰脾也如陽入於陰又病在頭與腹故腹臚脹而頭痛蓋陽入於陰是三陽之氣而非三陽之經脈若病在經脈而隨經下入於裏陰者則痛而不脹此病在氣分而陽氣下入於腹中故脹而不痛也

風論

風氣循風府而上則爲腦風風入係頭則爲目風眼寒

註風府穴名在項後中行乃督脈陽維之會上循於腦戶故風氣客於風府循脈而上則爲腦風足太陽有通頂入於腦者正屬目本名曰眼系風入於頭干太陽之目系則爲目風足太陽寒水主氣故爲眼寒也

新沐中風則爲首風首風之狀頭面多汗惡風當先風一日則病甚頭痛不可以出內至其風日則病少愈

註以水灌首曰沐新沐則首毛腠開中風則風入於首之皮膚而爲首風矣頭乃諸陽之會因沐中風則頭首之皮腠疎而陽氣弛故多汗惡風也風者天之陽氣人之陽氣以應天之風氣諸陽之氣上出於頭故先一日則病甚頭痛不可以出戶內蓋風將發而氣先病也至其風發之日氣隨風散故其病少愈

厥論

巨陽之厥則腫首頭重足不能行發爲眴仆

註巨陽太陽也足太陽脈起於目內眥上額交巔從巔入絡腦還出別下項循背俠脊抵腰中下貫臀入腘中循腨內出外踝之後是以厥逆於上則爲首腫頭痛厥逆於下則爲足不能行神氣昏亂則爲眴仆太陽爲諸陽主氣此病在經而轉及於氣分故曰發

奇病論

帝曰人有病頭痛以數歲不已此安得之名爲何病岐伯曰當有所犯大寒內至骨髓髓者以腦爲主腦逆故令頭痛齒亦痛病名曰厥逆

此論腦骨髓之爲病也夫在地爲水在天爲寒寒生水水生鹹鹹生腎腎生骨髓故所犯大寒之氣而內至骨髓也諸髓皆屬於腦故以腦爲主髓邪上逆則入於腦是以頭痛數歲不已尚乃骨之餘故齒亦痛也此下受之寒上逆於巔頂故名曰厥逆

脈解論

陽明所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫者陽明并於上上者則其孫絡太陰也故頭痛鼻鼽腹腫也

註此明陰陽之氣上下升降內外出入行於脈外之氣分也氣分者皮膚肌腠之間上謂皮膚之上也夫諸脈之浮而常見者皆絡脈也足太陰之脈亦見於皮膚之上而無所隱是以陽明之氣并於上則迫於陽明之孫絡與太陰之經脈也迫於陽明之孫絡則頭痛鼻鼽迫於太陰之經脈則腹腫也

四時刺逆從論

太陽濇則病積善時巔疾

註濇者多血少氣微有寒血病之謂積血多而凝泣故成積也

標本病傳論

肝病頭目眩脇支滿三日體重身痛五日而腹三日腰脊少腹痛脛痠三日不已死冬日入夏早食

註病先發於肝則頭目眩脅支滿三日而之脾則體重身痛五日而之胃則腹三日而之腎則腰脊少腹痛三日不已死夏早食乃寅卯時木氣絕而不生也冬日入乃申酉時金氣旺而木氣絕也

氣交變大論

歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄食減體重煩寃腸鳴腹支滿上應歲星甚則忽忽善怒眩冒巔疾

註歲木太過則制勝其土氣故民應之而爲脾病也飧泄食減腸鳴腹滿皆脾土之病脾主肌肉四支故體重煩寃者土傷而不能制水水氣上乘於心也歲星木星也木運太過諸壬歲也淫勝太甚則反自傷善怒肝志之病也厥陰與督脈會於巔故眩冒巔疾

歲金不及炎火迺行復則陰厥且格陽反上行頭腦戶痛延及腦頂發熱民病口瘡甚則心痛

註六乙之歲金運不及則所勝之火氣乃行金弱火亢水乃復之秋冬之時陽氣應收藏於陰臟因寒氣厥逆且格陽於外致陽反上行而頭腦戶痛延及腦頂發熱水寒之氣上乘迫其心火外炎故民病口瘡甚則心痛

五常政大論

木太過曰發生發生之紀是謂啓敕土疎泄蒼氣達陽和布化陰氣迺隨生氣淳化萬物以榮其化生其氣美其政散其令條舒其動掉眩巔疾其經足厥陰少陽其臟肝脾其病怒太角與上商同上徵則其氣逆其病吐利

註敕布也啓布陽和發生萬物之象也土得其制化故主疎泄蒼氣木氣也厥陰之上風木治之是以陽和布化於上而陰氣乃隨於下也掉眩巔疾風氣淫於上也怒肝氣盛也如壬子壬午壬寅壬申四歲木運有餘而上臨火氣子居母上則其氣逆逆於上則吐逆於下則利也

六元正紀大論

帝曰五運之化太陽之政何如岐伯曰辰戌之紀也初之氣地氣遷氣乃大溫草乃早榮民乃厲溫病乃作身熱頭痛嘔吐肌腠瘡瘍

註五運謂五行之化運辰戌歲主太陽司天加臨之間氣初氣始於少陽地氣遷者謂上年在泉之終氣而交於今歲司天之初氣也歲前之終氣乃少陰君火今歲之初氣乃少陽相火二火相交故氣大溫草乃早榮者長氣盛也春始交而大溫故民病厲溫病乃作爲身熱頭痛嘔吐瘡瘍

少陽之政寅申之紀也初之氣地氣遷風勝乃搖寒乃去候乃大溫草木早榮寒來不殺溫病乃起其病氣怫於上血溢目赤欬逆頭痛血崩脇滿膚腠中瘡

註初之間氣乃少陰君火主氣乃厥陰風木故風搖候溫草木得生長之氣而早榮也少陽司天而又值君火主氣故雖有時氣之寒來而不能殺二火之溫熱也血溢目赤欬逆頭痛膚瘡等證皆風火之爲病也

至眞要大論

歲太陰在泉草乃早榮濕淫所勝則埃昏巖谷黃反見黑至陰之交民病衝頭痛

註太陰在泉辰戌歲也土爲草木之所資生故草乃早榮黃乃土色黑乃水色土勝濕淫故黃反見黑至陰之交乃三氣四氣之交土司令也民病衝頭痛乃膀胱經病蓋膀胱乃水津之腑土氣淫勝而水臟水腑皆爲病也

太陰司天濕淫所勝胕腫骨痛陰痹陰痹者按之不得腰脊頭項痛時眩大便難

註太陰司天丑未歲也胕腫陰痹感寒濕之氣病在陰者名曰痹故按之不得也腎主骨而膀胱爲之腑故腰脊頭項骨痛腎開竅於二陰故大便難也

少陽司天火淫所勝民病頭痛發熱惡寒而瘧

註少陽司天寅申歲也少陽之火在天爲暑故民病頭痛寒熱而瘧也

太陽司天寒淫所勝血變於中發爲癰瘍民病厥心痛嘔血血泄鼽衄善悲時眩仆

註太陽司天辰戌歲也心痛眩仆乃寒凌心火逼其火熱上炎水火寒熱交爭也

帝曰六氣相勝奈何岐伯曰厥陰之勝耳鳴頭眩憒憒欲吐胃鬲如寒大風數舉

註三陰三陽主歲之氣淫勝而爲民病者宜以所勝之氣味平之耳鳴頭眩木淫於上也憒憒欲吐胃氣如寒胃土病也大風數舉淫於下而上也

太陰之勝火氣內鬱瘡瘍於中流散於外病在胠脅甚則心痛熱格頭痛喉痹項强獨勝則濕氣內鬱寒迫下焦痛留頂互引眉間胃滿足下溫頭重足脛胕腫飲發於中胕腫於上太陰之復濕變乃舉體重中滿飲食不化陰氣上厥胷中不便飲發於中欬喘有聲頭項痛重而掉瘈尤甚

註陰濕之氣淫於外則火氣內鬱而瘡瘍於中濕熱之氣流散於外則及於風木而病在胠脅甚則心痛者木甚而傳於火也熱格頭痛喉痹項强者風火之氣與濕氣相雜從頸項而上於巔頂也獨盛者陰濕之氣復盛於歲半以後也濕氣在中故內鬱而迫於下焦痛留頂而互引眉間者風火之氣留於巔頂傳於陽明之經而下及於胃滿也足下溫頭重者風火之氣流於下也飲發於中胕腫於上者水從下而中中而上也復謂三陰三陽之氣受所勝之氣勝制鬱極而復發也頭項痛重而掉瘈尤甚所謂因於濕首如裹濕熱不攘大筋緛短小筋弛長緛短爲拘弛長爲痿也

太陽之勝凝慄且至熱反上行頭項肉頂腦戶中痛太陽之復厥氣上行心胃生寒胃腦不利心痛痞滿頭痛善悲時眩仆

註太陽寒水氣勝故凝慄且至熱反上行者太陽之氣隨經上入腦還出別下項也厥氣上行者鬱逆之氣上行而欲復歲半以前之氣也心胃生寒胃腦不利心痛痞滿頭痛善悲時眩仆者厥氣上行從下而中中而上也

陽明之復清氣大舉病生胠脇氣歸於左善太息甚則心痛痞滿腹脹而泄嘔苦炅噦煩心病在鬲中頭痛

註陽明之復發於本位主令之時是以病生胠脇氣歸於左者金乘木也心痛痞滿腹脹而泄乘火土也腑病者善太息嘔苦木受金刑腑亦病也炅噦肺氣逆也炅噦煩心病在鬲中者陽明之氣上逆也頭痛厥陰病也

厥陰司天客勝則耳鳴掉眩

註風木之客氣勝於上是以耳鳴掉眩

少陰司天客勝則鼽嚏頸項強肩背瞀熱頭痛

註少陰司天初之氣乃太陽寒水二之氣乃厥陰風木三之氣乃少陰君火鼽嚏耳聾目瞑厥陰之氣勝也頸項強肩背瞀熱頭痛太陽之氣勝也

少陽司天客勝則丹胷外發及爲丹熛瘡瘍嘔逆喉痹頭痛

註少陽司天初氣三氣乃君相二火二之氣乃太陰濕土丹胷即斑疹因火熱而發於外者也丹熛即赤遊發於外而欲遊於內者也瘡瘍癰腫頭痛諸證亦皆感濕熱而生蓋亦自上而下從外而內也

著至教論

三陽獨至者是三陽并至并至如風雨上爲巔疾下爲漏泄

註獨至者三陽合并而爲一陽也三陽并至則陽氣上行而爲巔疾下行而爲漏泄

示從容論

雷公曰於此有人頭痛筋攣骨重怯然少氣噦噫腹滿時驚不嗜臥此何藏之發也厥淫而弦切之石堅不知其解復問所以三藏者以知其比類也帝曰夫從容之謂也夫年長則求之於腑年少則求之於經年壯則求之於藏今子所言皆失八風菀熱五藏消鑠傳邪相受夫浮而弦者是腎不足也沉而石者是腎氣內著也怯然少氣者是水道不行形氣消索也炅噦煩冤者是腎氣之逆也一人之氣病在一藏也若言三藏俱行不在法也

註厥陰根起於大敦經氣與督脈上會於巔頂而主筋頭痛筋攣厥陰經氣之爲病也少陰根起於湧泉爲生氣之原而主骨骨重少氣少陰經氣之爲病也太陰根起於隱白與胃以膜相連噦噫腹滿時驚不嗜臥太陰經氣之爲病也其脈浮者開脈也弦者樞脈也石堅者閭脈也雷公不解其因復問以三藏之脈證以知其比類於杳冥焉從容者氣之謂也言經脈當求之於氣也三陰者長女中女少女也太陰爲長女故當求之於腑腑陽而主開也少陰爲少女故當求之於經經氣內連臟腑外絡形身主外內出入之樞也厥陰處於兩陰中之交盡故爲中女是以求之於臟臟陰而主閉也此因三陰之氣而見於證之頭痛筋攣脈之浮弦而石故當求之於三陰氣之開闔樞若止論其脈證非從容之謂也八風菀熱入之陽氣行於上下四旁也五藏消鑠傳邪相受謂五行之氣運於天地之中有相生而有勝勍也夫浮而弦者此腎氣之出於肝脾而腎不足也沉而石者是肝脾之氣下歸於腎主腎氣內著也夫在泉之水隨氣而運行於天表是以怯然少氣者乃水道不行故使形氣之消索也炅噦煩冤者是腎氣之上逆於心肺也此五藏之三陰總歸於一氣一氣而復貫通於五藏者也如天道之氣交陰陽之離合而後能從容中道若言肝脾腎三藏俱行不在陰陽離合之法也

方盛衰論

氣上不下頭痛巔疾

註氣者一陽之氣也氣上不下頭痛巔疾陽氣自下而直上於巔頂也

靈樞經

·終始篇

病生於頭者頭重

註天地四方之氣各有所生之本位故生於頭者頭重也

·經脈篇

膀胱足太陽之脈起於目內眥上額交巔其支者從巔至耳上角其直者從巔入絡腦還出別下項循肩

膊內挾脊抵腰中入循脊絡腎屬膀胱是動則病衝頭痛目似脫項如拔是主筋所生病者痔瘧狂癲疾頭顱項痛

膕足少陽之脈起於目鋭眥上抵頭角下耳後循頸行手少陽之前至肩上却交出手少陽之後入缺盆其支者從耳後入耳中出走耳前至目鋭眥後是主骨所生病者頭痛頷痛目鋭眥痛缺盆中腫痛

海論

腦爲髓之海其輸上在於其蓋下在風府髓海有餘則輕勁多力自過其度髓海不足則腦轉耳鳴脛痠眩冒目無所見懈惰安臥

註腦爲髓之海氣在頭者止之於腦故其輸上在於其蓋下在督脈之風府是髓海之上通於天而下通於經水也精液補益腦髓而下流陰股故髓海有餘則足脛輕健而多力度骨度也髓從骨空循度而上通於腦故有餘則自過其度矣髓海不足則津液竭精液者所以濡空竅者也是以耳爲之鳴目無所見液脫者骨屬屈伸不利故脛痠而懈惰安臥

五亂篇

黃帝曰經脈十二者別爲五行分爲四時何失而亂何得而治岐伯曰五行有序四時有分相順則治相逆則亂故氣亂於心則煩心密默俛首靜伏亂於肺則俯仰喘喝接手以呼亂於腸胃則爲霍亂亂於脾脛則爲四厥亂於頭則爲厥逆頭重眩仆

大惑論

黃帝問於岐伯曰余嘗上清冷之臺中階而顧匍匐而前則惑余私異之竊內怪之獨瞑獨視安心定氣久而不解獨博獨眩被髮長跪俛而視之後久之不已也卒然自上何氣使然岐伯對曰五臟六腑之精氣皆上注於目而爲之精裹擷筋骨血氣之精而與脈并爲系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢其身之虛其入深則隨眼系以入於腦入於腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目眩以轉矣

扁鵲難經

頭痛

脈來一呼再至一吸再至不大不小曰平一呼三至一吸三至爲適得病前大後小即頭痛目眩前小後大即胷滿短氣

註一息四至是爲平脈一呼三至一吸三至是一息之間脈六至比之平人多二至故曰適得病未甚也前後非言尺寸猶十五難前曲後居之前後以始末言也

厥頭痛

手三陽之脈受風寒伏留而不去則名厥頭痛

眞頭痛

入連在腦者則名眞頭痛

註眞頭痛其痛甚腦盡痛手足青至節死不治蓋腦爲髓海眞氣之所聚卒不受邪受邪則死

漢張機金匱要略

頭痛

師曰病人語聲嘶嗽然細而長者頭中痛

陽病十八頭痛項腰脊臂脚掣痛

脈緊頭痛風寒腹中有宿食不化也

乾嘔吐涎沫頭痛者茱萸湯主之

吐後渴飲得水而貪飲者文蛤湯主之兼主微風脈緊頭痛

頭眩

諸肢節疼痛身體尪羸脚腫如脫頭眩短氣溫溫欲吐桂枝芍藥知母湯主之

肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺尿小便數所以然者以上虛不能制下故也此爲肺中冷必眩多涎唾甘草乾薑湯以溫之若服湯已渴者屬消渴

心下有痰飲胷脇支滿目眩苓桂朮甘湯主之

心下有支飲其人苦冒眩澤瀉湯主之

卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者半夏加茯苓湯主之

假令瘦人臍下有悸吐涎沫而癲眩此水也五苓散主之

趺陽脈緊爲傷脾風寒相搏食穀即眩穀氣不消胃中苦濁濁氣上流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸

陽明病脈遲者食難用飽飽則發煩頭眩小便必難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脈遲故也

穀疸之爲病寒熱不食食即頭眩心胸不安久久發黃爲穀疸茵陳蒿湯主之

頭搖

病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目赤獨頭動搖卒口噤背反張者痓病也若發其汗者寒濕相得其表益虛即惡寒甚發其汗已其脈如蛇

額黑

黃家日晡所發熱而反惡寒此爲女勞得之膀胱急
少腹滿身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如
水狀大便必黑時溏此女勞之病非水也腹滿者難
治硝石礬石散主之

華佗中藏經

頭痛

肝氣逆則頭痛耳聾頰赤其脈沉而急浮而急亦然
主脇肢滿小便難頭痛眼眩

頭目久痛卒視不明者死

熱病三五日頭痛身熱食如故脈直而疾者八日死

腦痛

病腦痛其脈緩而大者死

頭眩頭腫

膽虛則傷寒寒則恐畏頭眩不能獨臥膽有水則從
頭腫至足也

上焦虛則不能制下遺便尿頭面腫

額汗

上焦實熱則額汗出能食而氣不利舌乾口焦咽閉
之類腹脹脇肋痛

脈色

病頭目痛其脈澁短者死

赤色見於耳目額者五日死

晉王叔和脈經

頭痛

小便難苦目眩頭痛腰背痛

足厥陰與少陽氣逆則頭目痛耳聾不聰頰腫

頭眩

病先發於肝者頭目眩脇痛支滿
肝脈沉之而急浮之亦然苦脇下痛有氣支滿引少
腹而痛時肝中風者頭目瞤兩脇痛行常僵令人嗜
甘如阻嬉狀

脈訣

頭痛

頭痛短澁應須死浮滑風痰必易除

唐孫思邈千金方

風眩

徐嗣伯曰夫風眩之病起於心氣不定胃上蓄實故
有高風面熱之所爲也痰熱相感而動風風心相亂
則悶瞀故謂之風眩大人曰癲小兒則爲癎其實則
一此方療治萬無不愈但恐證候不審或致差違大
都忌食十二屬肉而貫脈爲患發多氣急氣急則死
不可救故此一湯是輕重之宜勿因此便謂非患所
治風眩湯散丸煎凡有十方凡人初發宜急與續命
湯也因急時但度灸穴便火針針之無不瘥者初得
針竟便灸最良灸法次列於後余業之以來三十餘
年所救活者數十百人無不瘥矣後人能曉此方幸
勿參以餘術焉

宋嚴用和濟生方

眩運之證當分內外所因

素問云諸風眩掉皆屬於肝則知肝風上攻必致眩
運所謂眩運者眼花屋轉起則眩倒是也由此觀之
六淫外感七情內傷皆能致此當以外證與脈別之
風則脈浮有汗項強不仁寒則脈緊無汗筋攣拳痛
暑則脈虛煩悶濕則脈細沉重吐逆及其七情所感
遂使臟氣不平鬱而生涎結而爲飲隨氣上逆令人
眩運眉稜骨痛眼不可開寸脈多沉此爲異耳與夫
疲勞過度下虛上實金瘡吐衄便利及婦人崩中去
血皆令人眩運當隨其所因治之乃活血也

頭病評治

夫人頭者諸陽之所聚諸陰脈皆至頸而還衝諸陽
脈皆上至頭耳則知頭面皆屬陽部也且平居之人
陽順於上而不逆則無頭痛之患陽逆於上而不順
衝壅於頭故頭痛也風寒在腦邪熱上攻痰厥腎厥
氣虛氣攻皆致頭痛前方已有治法但氣虛氣攻頭
痛愈而復作延引歲月者多有之矣偏正頭風婦人
氣盛血虛產後失血過多氣無所主皆致頭痛惟蝎
附丸治氣虛氣攻頭疼尤合造化之妙其間所用附
子取其助陽以扶虛鍾乳取其補陽以鎮墜全蝎取
其鑽雖之義蔥涎則取通行其氣湯使用以椒鹽蓋
椒能下達鹽能引用使虛氣歸於其下對證用之無
不作效者矣

頭痛論治

夫頭者上配于天諸陽厥之所聚凡頭痛者血氣俱
虛風寒暑濕之邪傷于陽經伏留不去者名曰厥頭
痛蓋厥者逆也逆塞而衝于頭也痛引腦巔甚而手
足冷者名曰真頭痛非藥之能愈又有風熱痰厥氣
虛腎厥新沐之後露臥當風皆令人頭痛治法當推
其所自而調之無不切中者矣

寶漢卿瘡瘍全書

發腦

此發腦者伏陽結滯邪毒上壅或生玉枕之端或在

風池之穴或多或少大小不同形如硬癬漸至潰爛遍生髮中痛如刀劍赤腫無膿逆則黃水出順有白膿來治法以當歸川芎人參赤芍連翹桔梗天花粉升麻酒炒黃芩山梔金銀花黃芪乾葛之類以意消息治之外用紫金錠水磨搽之或大者以膏藥貼之一日三次宜服蠟礬丸

頭後蜂窠散注

此證發於頭後如是蜂窠者急宜救之若漸赤腫痛起者得療痰發者必難治矣急用調治之若或流於兩肩者決不可療也治法與發腦者同

枕疽

此毒蓋因風熱上攻入於內發此疽疾量人年紀老少用藥人年五十以上難治少壯可治更服內疎黃連湯十數貼加羌活金銀花荊芥或千金托裏散又宜服黃礬丸外貼金絲膏治法與對口瘡同

腦疽

此毒受在腎藏虛實熱壅上腦戶結伏成毒也初起三日者剃去髮以艾炷如豆大者灸五壯外用圍藥庶能消矣當用三香內托散定痛消毒飲治之

對口瘡

此毒因虛陽上攻熱入於腦故生此疽正近咽喉之所諸陽之會間速宜調治初起用千金內托散加羌活金銀花煎服多服蠟礬丸護心散

髮際發

此證生頸後兩邊左右鬢髮邊發生急宜救之如核硬而發者急宜取去病根如腦心發者熱氣上攻於腦四畔邊漸赤腫硬連於耳項寒熱疼痛若不急療毒入血肉腐壞爲膿水頭中出血者氣喘及痰發者難治治法同前宜加減用引經藥

頂門癰

此癰受在六腑與陰陽不調氣上熱壅而成瘍毒傷於腦經於是毒證不可輕忽先用敗毒流氣飲後服內托流氣飲治之

發鬢毒

此毒受在手陽明經氣虛風熱上壅風毒成瘡當用清心流氣飲次用內托流氣飲治之此證客於會合之前灌在關後形如米粒漸次赤腫遍身潮熱

鬢疽

此疽受在脾胃心肺熱氣結成當用敗毒流氣飲清肝流氣飲治之或腎緩之命亦難生矣慎之慎之

崔紫虛脈訣

頭痛之脈

頭痛陽弦浮風緊寒風熱洪數濕細而堅氣虛頭痛雖弦必濇痰厥則滑腎厥堅實風寒暑濕氣鬱生涎下虛上實皆運而眩風浮寒緊濕細暑虛涎弦而滑虛脈則無

許叔微本事方

頭痛

腦逆故令頭痛齒亦痛乃厥逆頭痛也邪氣逆上陽經而作痛甚則發厥頭痛齒亦痛宜白附子散

厥頭痛即腎厥巔頂痛不可忍宜玉眞丸

朱肱活人書

頭痛屬外感傷寒者多

頭痛者陽證也太陽證頭痛發熱惡寒無汗麻黃湯有汗桂枝湯若已發汗未發汗頭痛如破者連鬚葱白湯不止者葛根葱白湯陽明證頭痛不惡寒反惡熱胃實也調胃承氣湯少陽頭痛小柴胡湯太陰少陰並無頭痛仲景只有厥陰證吳茱萸湯

楊士瀛直指方

頭部外證論

發於喉舌頭面腦項眉背胸腹四肢大節女子妬乳數者爲險他處爲緩

五發皆令人頭痛惡心寒熱氣急拘攣宜五香散五香湯

金劉完素六書

腦風

氣循風府而上則爲腦風項背怯寒腦戶極冷以此爲病神聖散主之

雷頭風

夫治雷頭風者諸藥不效爲與證不相對也夫雷頭者震卦主之震仰盂故予製藥內加荷葉謂象其震之形其色又青乃述類象形也當煎局方中升麻湯

頭風

頭風痛經云若不吐瀉久則瞽目而不治用瓜蒂散吐之二吐而差

頭風後有眼疾眼有牛明可救者防風散吐之

新沐中風爲首風頭面多汗惡風當先一日甚至其風日則少愈大川芎丸主之

腎虛伀寒頭疼

腎盛犯大寒頭疼齒亦痛痛之甚數不已者是也以天南星丸主之

頭眩

諸風掉眩皆屬肝木風氣甚而頭目眩運者由風木旺必是金衰不能制木而木復生火風火皆屬陽多爲兼化陽主乎動兩動相搏則爲之旋轉如春分至小滿爲二之氣乃君火之位自大寒至春分七十三日爲初之氣乃風木之位故春分之後風火相搏則多起飄風俗謂之旋風是也四時皆有之由五運六氣千變萬化衝盪擊搏推之無窮安得失時而便謂之無也但有微甚而已人或乘車躍馬登舟環舞而眩運者其動不正而左右紆曲故經曰曲直動搖風之用也眩運而嘔吐者風熱甚故也

張從政儒門事親

頭證吐法

仲景曰大法春宜吐蓋春時陽氣在上人氣與邪氣亦在上故宜吐也涌吐之藥或丸或散中病則止不必盡劑過則傷人然則四時有急吐者不必直待春時也如仲景傷寒論中以葱根白豆豉湯以吐頭痛萬全方以鬱金散吐頭痛眩運頭風余常用吐方皆是仲景方用瓜蒂散吐傷寒頭痛用葱白豆豉湯以吐雜病頭痛夫上涌之法名曰撩痰撩之一字自有擔縱卷舒一工吐陳下一婦人半月不止涎至數斗命懸須臾倉皇失計求予解之予使煎麝香湯下咽立止蓋瓜蒂即死吐者瓜蒂也所以立解如藜蘆吐者不止以葱白湯解之以石藥吐者不止以甘草貫衆解之諸草木吐者可以麝香解之余之撩痰者以釵股雞羽探引不出以藜投之投之不吐再投之且投且探無不出者吐至昏眩慎勿驚疑如發頭眩可飲冰水立解如無冰時新汲水亦可彊者可一吐而安弱者可作三次吐之庶無損也

頭痛

夫頭痛不止乃三陽之受病也三陽者各分部分頭與項痛者是足太陽膀胱之經也攢竹痛俗呼爲偏頭痛者是少陽經也如痛久不已則令人喪目以三陽受病皆胸膈有宿痰之致然也先以茶調散吐之後以香蘇散白虎湯投之則愈然頭痛不止可將葱白鼓豆豉湯吐之吐訖可服川芎薄荷辛凉清上搜風丸香芎散之類仲景曰葱根豆豉亦吐傷寒頭痛叔和云寸脈急而頭痛是也

又一法治頭痛不愈者可煎連鬚葱白豆豉湯多服之後吐爲效吐後可服川芎薄荷湯辛凉之劑清上之藥疎風丸散之類仲景云傷寒頭痛脈寸口急而頭痛是也

夫病亦目經年不愈者是頭風所加之令人頭痛可用獨聖散八正散之類三陽熱鬱頭痛不敢見日光置冰頂上宜汗吐下

頭眩

夫頭風眩運手足痲痹胃脘痛皆風寒濕三氣雜至合而爲痹也在上爲之停飲可用獨聖散吐之吐訖後服清上辛凉之藥凡眩運多年不已胷膈痰涎壅塞氣血頗實吐之甚效

夫婦人頭風眩運登車乘船亦眩運眼澁手痲髮退健忘喜怒皆胷中有宿痰之使然也可用瓜蒂散吐之吐訖可用長流水煎五苓散大人參半夏丸兼常服愈風餅子則愈矣

頭風眩運可用獨聖散吐之吐訖可用清上降火之劑防風通聖散加半夏南星

雷頭

夫雷頭懶于乃俗之謬名也此疾是胷中有寒痰冬沐之致然也可以茶調散吐之吐訖冷痰三二升次用神芎丸下三五行然後服愈風餅子則愈矣雷頭者是頭上赤腫結核或如生薑片酸棗之狀可用鍼鍼刺而出血永除根本也

又云大凡人病雷頭懶于俗呼之謬名也頭痛昏眩皆因沐髮而得之卽爲首風此因邪風在於胷中熱甚化而爲痰風之所致也可以茶調散吐之吐訖次用藏用丸下之後可服烏荊丸若是雷頭者上部多有赤腫結核或面熱無汗經云火鬱發之開導之決之可用鍼鍼出血則愈靈樞經云奪血者無汗奪汗者無血血汗俱蕩豈不妙哉衰老者可用凉膈解毒消風散熱爲治年壯者可以蕩滌積熱大黃牽牛氣血宣通便無壅滯而愈

頭風之甚者久則目昏偏頭痛者屬少陽相火久則自束小大便祕澁皆宜出血而用大承氣湯大下之

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百四十三卷目錄
醫部彙考一百二十三
頭門二

李杲十書　辨頭痛證治大法　大頭痛
朱震亨心法　眩頭痛證治　頭痛厥法　頭眩　頭痛厥法　大頭病　頭風　頭腫
羅謙甫衛生寶鑑　頭痛　厥法
危亦林得效方　頭痛　厥法
徐春甫古今醫統　頭痛　頭痛大法分內外之因　分經用藥治頭痛法　眩運宜審三虛　眩運須分標本　頭重大頭瘟　腦疽　眩運宜審四氣　頭痛大法　頭痛厥法　眩運須分標本　頭重大頭瘟　腦疽　癰發有不可治
虞摶醫學正傳　眩運　偏頭痛　溫病頭痛死
戴思恭證治要訣　頭痛　眩運
樓英醫學綱目　頭重痛　厥法　腦疽癰疽　頭眩　頭痛
王綸明醫雜著　頭痛
李梴醫學入門　頭痛　頭風證　頭重　頭振　頭生白屑　眩運定　厥疽
李中梓醫宗必讀　頭痛　雷頭風　大頭風　頭痛厥法
龔信古今醫鑑　頭痛　諸診
薛己醫案　頭痛　頭眩　腦疽　腦疽炎法
方賢奇效良方　頭眩　頭痛頭風　大頭風論
張三錫醫學準繩六要　頭痛　雷頭風　頭振　頭眩
陶華六書　頭痛　頭眩

藝術典第一百四十三卷
醫部彙考一百二十三
頭門二
元李杲十書
辨頭痛證治大法

內證頭痛有時而作有時而止外感頭痛常常有之直須傳入裏實方罷此又內外證之不同者也

金匱真言篇曰東風生於春病在肝俞在頭項故春氣者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽膀胱之脈起於目內眥上額交巔直入絡腦還出別下項病衝頭痛足少陽膽經之脈起於目銳眥上抵頭角病頭角額痛夫風從上受之風寒傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛耳鳴九竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者病在腦中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也如氣上不下頭痛巔疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也如頭半邊痛者先取手少陽陽明後取足少陽陽明此偏頭痛也有真頭痛者甚則腦盡痛手足寒至節死不治有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓者以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛凡頭痛皆以風藥治之者總其大體而言之也高巔之上惟風可到故味之薄者陰中之陽乃自地升天者也然亦有三陰三陽之異故太陽頭痛惡風厥浮緊川芎羌活獨活麻黃之類為主少陽經頭痛厥弦細往來寒熱柴胡為主陽明頭痛自汗發熱惡寒脈浮緩長實者升麻葛根石膏白芷為主太陰頭痛必有痰濕重或腹痛為痰癖其脈沉緩蒼朮半夏南星為主少陰經頭痛三陰三陽經不流行而足寒氣逆為寒厥其脈沉細麻黃附子細辛為主厥陰頭項痛或吐痰沫厥冷其脈浮緩吳茱萸湯主之

血虛頭痛當歸川芎為主氣虛頭痛人參黃芪為主氣血俱虛頭痛調中益氣湯少加川芎蔓荊子細辛其效如神白朮半夏天麻湯治痰厥頭痛藥也青空府乃風濕熱頭痛藥也羌活附子湯治厥陰頭痛藥也如濕氣在頭者以苦吐之不可執方而治先師嘗病頭痛發時兩頰青黃眩運目不欲開懶言身體沉重兀兀欲吐潔古曰此厥陰太陰合病名曰風痰以局方玉壺丸治之更灸俠谿穴卽愈是知方者體也法者用也徒執體而不知用者弊體用不失可謂上工矣

三陽頭痛羌活防風荊芥升麻葛根白芷柴胡川芎芍藥細辛蔥白連鬚分兩旋加若陰證頭痛只用溫中藥足矣乃理中薑附之類也

風寒傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛或風寒之邪伏留陽經為偏正頭痛宜三五七散芎辛湯芎芷香蘇散如聖餅子

心煩頭痛者病在腦中乃濕熱頭痛也宜清空膏小清空膏又用吐法

厥逆頭痛當有所犯大寒內至骨髓髓以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛乃厥逆頭痛也羌活附子湯厥者逆也邪氣逆上陽經而作痛甚則發厥頭痛齒亦痛宜白附子散

氣血虛而邪氣逆上為頭痛

頭痛耳鳴九竅不利兩太陽穴痛甚乃氣虛頭痛也宜順氣和中湯黃芪益氣湯

血虛頭痛自魚尾上攻而痛宜當歸補血湯加味四物湯肩尖後近髮際曰魚尾

氣血俱虛頭痛宜加味調中益氣湯安神湯

大病後氣虛頭痛四柱散加茶一撮煎服

大頭痛

夫大頭痛者雖爲在身之上熱邪伏於內又感天地四時非節癘疫之氣所著所以成此疾至於潰裂膿出而又染他人所以謂之疫癘也大抵足陽明邪熱太甚資少陽相火爲之熾炙在少陽或在陽明甚則逆傳太陽視其腫勢在何部分隨其經而取之濕熱爲腫木盛爲痛此邪發於首多在兩耳前後所先見出者爲主爲根治之宜早藥不宜速恐過其病上熱未除中寒已作有傷人命矣此疾是自內而之外也是爲血病況頭部受邪見於無形之處至高之分當先緩而後急先緩者謂邪氣在上所著無形之分既著無形所傳無定若用重劑大瀉之則其邪不去反過其病矣雖用緩藥若急服之或食前或頓服咸失緩之體則藥不能升騰徐潰無形之邪或藥性味形狀擬象服餌皆須不離緩體及寒藥或炒或酒浸之類皆是也後急者謂前緩劑已經高分瀉邪氣入中是到陰部人於中染於內之有形質之所若藥不速去反損陰分此中治却爲客熱所當急也治客以急此之謂也治主以緩先緩謂也謂陽邪在上陰邪在下各爲本家病不從先後錯其緩急不惟不能解其紛而復致其亂矣此所以治主當緩治客當急謂陽分受陽邪陰分受陰邪者主也陽分受陰邪陰分受陽邪者客也凡所謂急者當急去之此治客以急也假令少陽陽明之爲病少陽者謂邪出於耳前後也陽明者首面大腸也先以黃芩黃連甘草通炒剉煎少少不住服呷之或一劑畢再用大黃或酒浸或煨又以鼠黏子新瓦上炒殺咀煎成去粗納芒硝各等分亦時時呷之當食後用徐得微利若邪氣已只服前藥如不已再服後藥依前次第用之取利已却止如陽明渴者加石膏少陽渴者加栝蔞根陽明行經加升麻葛根芍藥之類選而加之太陽行經加羌活荊芥防風之類選而加之竝與上藥相合用之不可獨用散者散也此一節亦見病機氣宜大凡治雜病先調其氣次療諸疾無損胃氣是其要也若血受病亦先調氣謂氣不調則血不行又氣爲之綱夫也夫不唱婦不隨也如婦人病經先柴胡以行經之表次四物以行經之裏亦先氣而後血也不能飲而渴不能食而小便黃或澀皆因胃氣虛而生熱有形之物不入火炎上而渴戊就癸而化所以小便黃赤或如棗汁法當補胃以錢仲陽白术散乾葛木香藿香等藥治之

朱震亨心法

各種頭痛證治

頭痛多主於痰痛甚者火多有可吐者可下者諸經氣滯亦作頭痛

清空膏治諸頭痛除血虛頭痛不可治

血虛頭痛自魚尾上攻頭痛用芎歸湯古追涎藥

頭風屬痰者多有熱有風有血虛在左屬風荊芥薄荷屬血虛川芎當歸在右屬痰蒼术半夏屬熱酒芩爲主又屬濕痰川芎南星蒼术

偏頭風在左而屬風者用荊芥薄荷此二味卽是治之主藥有君臣佐使之分凡主病者爲君而多臣次之佐又次之須要察其兼見何證而佐使之如有痰卽以二陳湯治痰而佐之他證皆倣此又須察識病情全在活法出入加減不可執方

頭痛多主於痰痛甚者火多宜清痰降火用二陳湯加白芷川芎爲主

肥人多是濕痰宜半夏蒼白术

瘦人是熱與血虛宜四物湯加酒芩防風

勞役下虛之人似傷寒發熱汗出兩太陽穴痛甚此相火自下衝上宜補中益氣湯加川芎當歸甚者加知母黃蘗蔓荊子細辛

頭痛如破酒炒大黃半兩茶煎服

頭痛連眼痛此風痰上攻須用白芷開之

偏頭痛者頭半邊痛者是也

如頭半寒痛者亦偏頭痛也

頭痛須用川芎如不愈各加引經藥

太陽川芎陽明白芷少陽柴胡太陰蒼术少陰細辛厥陰吳茱萸

如感冒頭痛宜防風羌活藁本白芷

如氣虛頭痛宜黃芪酒洗生地黃南星秘藏安神湯

如風熱在上頭痛宜天麻蔓荊子川芎酒製黃芩

如苦頭痛用細辛

如形瘦蒼黑之人頭痛乃血虛宜當歸川芎酒芩

如頂巔痛宜藁本防風柴胡東垣云頂巔痛須用藁

本去川芎

頭風用熱藥者多間有挾熱而不勝熱劑者宜消風散茶調散服之

頭風發動頂後兩項筋緊弔起痛者看其人挾寒挾虛宜三五七散

素問論頭風者本於風寒入於腦髓也本事方論婦人患頭風者十居其半或者婦人無巾以禦風寒焉耳男子間有患者若經年不愈者宜灸顖會百會前頂上星等穴差

頭痛脈法

腎厥頭痛其脈舉之則弦按之則堅

頭痛左手脈數熱也脈澀有死血也右手脈實有痰積也脈大是久病

頭眩

頭眩痰挾氣虛併火治痰爲主挾補氣藥及降火藥無痰則不作眩痰因火動又有濕痰者有火痰者濕痰者多宜二陳湯火者加酒芩挾氣虛者相火也治痰爲先挾氣藥降火如東垣半夏白朮天麻湯之類眩運不可當者以大黃酒炒爲末茶湯調下即止或用黑錫丹鎮墜之皆急則治其標也火動其痰用二陳加黃芩蒼朮羌活散風行濕

眩者言其黑運轉旋其狀目閉眼暗身轉耳聾如立舟船之上起則欲倒蓋虛極乘寒得之亦不可一途而取軌也又風則有汗寒則掣痛暑則熱悶濕則重滯此四氣乘虛而眩運也

又或七情鬱而生痰動火隨氣上厥此七情致虛而眩運也淫慾過度腎家不能納氣歸原使諸氣逆奔而上此氣虛眩運也吐衄漏崩肝家不能收攝榮氣使諸血失道妄行此血虛眩運也

要尋致病之因隨機應敵其間以升降鎮墜行氣爲最不可妄施汗下識者將有採薪之憂

有早起眩運須臾自定日以爲常者正元飲下黑錫丹

傷濕頭運腎著湯加川芎名除濕湯

疎風川芎茶調散

有痰青州白丸子

眩運者中風之漸也如肥白人氣虛而挾痰者四君子湯倍蜜炙黃芪加半夏橘紅或少加川芎荊芥穗以清利頭目也黑瘦人二陳湯加片芩薄荷入竹瀝薑汁童便服

如痰盛而挾氣虛者二陳湯加人參白朮黃芪或少加炮附子煎入竹瀝薑汁服

如體瘦血虛而痰火兼盛者二陳湯合四物加片芩薄荷煎入竹瀝薑汁童便服

如諸般眩運挾風則加防風荊芥天麻秦艽等藥挾熱加片芩黃連梔子之類挾寒加乾薑官桂附子之屬無有不安者也

痰在上火在下火炎上而動其痰也此證屬痰者多蓋無痰不能作眩也雖有因風者亦必有痰又曰火動其痰二陳湯加黃芩蒼朮羌活挾氣虛者亦以治痰爲主兼補氣降痰藥

頭眩脈法

左手脈數熱多脈濇有死血

右手脈實有痰積脈大是久病

久病之人氣血俱虛而脈大痰濁不降也

大頭病

大頭病乃濕熱在高巔之上用羌活及酒炒黃芩酒蒸大黃隨病加減切不可服降藥

羅謙甫衛生寶鑑

頭痛

太陽頭痛惡風寒并諸血虛頭痛川芎

少陽頭痛脈弦細寒熱柴胡

陽明頭痛自汗發熱惡寒白芷

諸氣虛諸氣血俱虛頭痛黃芪

太陰頭痛必有痰體重或腹痛爲痰癖半夏

厥陰頭痛項痛其脈浮微緩知欲入太陽病矣必有痰

少陰頭痛手三部三陽經不流行而足寒氣逆爲寒厥矣

頭風

頭風爲肝經風盛木自搖動故木尅脾土金來尅之是子能與母復讎也使梳頭有雪皮見肺之證也肺主皮毛大便實瀉青丸主之虛者人參消風散主之

頭腫

頭大此邪熱客心肺上攻頭目爲腫盛俗云大頭天行病其證頭面腫盛目不能開上喘咽喉不利舌乾口燥治用試效方普濟消毒飲子或加防風薄荷川芎當歸身㕮咀或大便硬加酒煨大黃一錢或二錢以利之如腫勢盛大宜鍼刺之

危亦林得効方

頭痛

痰厥頭痛宜上清白附子丸定風餅子芎辛導痰湯
眞頭痛者其痛上穿風府陷入泥丸宮不可以藥愈
朝發夕死夕發朝死蓋頭中人之根根氣先絕也
脈法
頭痛浮滑易除短濇不愈
明徐春甫古今醫統
頭痛
濕家病身疼發熱面黃而喘頭痛鼻塞其脈大自能飲食腹中和病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中即愈有所勞倦穀氣衰少脾氣下陷頭痛發熱其或發熱惡寒寒熱間作或蒸蒸躁熱發於肌肉之間始得之氣高而喘身熱而煩其脈洪大而頭痛或渴不止皮膚不仁風寒而生寒熱亦與傷寒相似此李明之主於內經勞倦形氣不足脾胃論之所由作也自內而之外熱者然也
補中益氣湯治內傷勞役元氣下陷發熱一切內虛之證頭痛加蔓荊子三分痛甚加川芎五分頭痛腦痛加藁本五分細辛三分諸頭痛併用此四味足矣
頭痛有痰沉重惰倦者乃太陰痰厥頭痛加半夏五分生薑三分
一日太陽受病邪在皮膚故頭項強痛腰脊強
凡瘟病發於三陽者多而三陰者少脈浮頭痛發熱者太陽也宜人參羌活散加葛根葱白生薑紫蘇汗之自汗身痛者九味羌活湯大頭瘟爲天行邪氣客於太陽陽明少陽之經頭目俱腫而爲病也太陽病發於頭上幷腦後下項及目後赤腫者是也治宜荊防敗毒散羌活藁本行經三陽經俱受邪幷發於頭面耳鼻者以普濟消毒飲或連翹散消毒散外用清涼救苦散敷之
頭痛大法分內外之
頭痛自內而致者氣血痰飲五臟氣鬱之病東垣論曰氣虛血虛痰厥頭痛之類是也自外而致者風寒暑濕之病仲景傷寒東垣六經之類是也
風寒暑濕火熱皆外邪氣血痰飲五臟之證皆內邪宜隨其氣血痰飲七情內火分虛實寒熱而調其內治其外也然氣血而用補宜用東垣之法若三因等方用附子以治氣虛此則從陽虛立意非人身乎和之血氣也若夫年久偏正頭風者多因內挾痰涎風火鬱遏經絡氣血壅滯之證然亦有血虛者須宜分別以治之
分經用藥治頭痛法
太陽頭痛惡風寒川芎爲引導
陽明頭痛自汗發熱惡寒白芷
少陽頭痛往來寒熱而脈浮弦者柴胡
太陰頭痛體重痰實及腹痛半夏
少陰頭痛三陰三陽經不流行而足寒逆爲厥頭痛細辛
厥陰頭痛項痛脈微浮緩欲入太陽其疾痊然亦當用川芎
氣虛頭痛用黃芪
血虛頭痛用當歸
氣血俱虛頭痛黃芪當歸
傷寒太陽頭痛麻黃湯桂枝湯
陽明頭痛白虎湯
少陽頭痛小柴胡湯
陽明頭痛大便多祕或可下之
太陰頭痛脈浮桂枝湯脈沉理中湯
少陰頭痛脈浮微麻黃附子細辛湯
厥陰頭痛外傷本經桂枝麻黃各半湯嘔而微吐清水吳茱萸湯
偏頭風諸家不分所屬故藥多不效
如因感冒而頭痛者宜加防風羌活藁本葛根升麻柴胡之類
風熱上攻天麻蔓荊子川芎酒芩苦頭痛加細辛
痰厥痛甚者吐之火者清之散之虛者補之
壯實熱痛大便結燥者大承氣湯
頭面瘡腫有熱脈弦數者涼膈散去硝黃加桔梗根殼荊芥薄荷如項巔痛者宜加藁本酒炒升柴
面上紅腫因氣實連頭痛者胃風湯
嚏鼻之法則吐法之義也經云濕氣在上以苦吐之故邪在胃中服而吐之邪在頭上嚏而嚏之張子和點目出淚嚏鼻流涕皆同乎吐之義也
眩運宜審三虛
肥人眩運氣虛有痰瘦人眩運血虛有火傷寒吐汗下後必是陽虛故餓經云上虛則眩此三者責其虛也
眩運宜審四氣
眩運挾風則有汗寒則掣痛暑則熱悶濕則重滯此四氣乘虛而眩運也七情鬱而生痰動火氣因上厥此七情致虛而眩運也淫慾過度腎家不能納氣歸元使諸氣逆奔而上此氣虛眩運也吐血或崩漏肝

家不能收攝榮氣使諸血失道此血虛眩運也要尋致病之因隨機應變其間以鎮墜下行爲最不可妄施汗下

玉機微義云眩運一證皆稱爲上盛下虛所致而不明言其所以然之故夫所謂虛者氣血虛也所謂盛者痰涎風火也原病之由有氣虛者乃清氣不能上升或汗多亡陽當升陽補氣有血虛者乃因亡血過多陽無所附當益陰補血此皆不足之證有因痰涎鬱遏者宜開痰導鬱重則吐下有因風火所動者宜清上降火有因外感而得者嚴氏雖分四氣之異皆當散邪此皆有餘之證也

鎮墜藥治眩運須分標本

世所謂氣不歸元而用丹藥鎮墜沉香降氣之法香燥散氣其不歸之氣豈能因此而復耶凡用鎮墜所謂急則治其標也若謂使氣歸元必無是理既曰歸元豈肯復作凡鎮墜少止又復眩者此氣未歸元而未治其本也要氣歸元必求其本緩而治之

經曰百病皆生於風寒暑濕燥火之動而爲疑者岐伯歷舉病機一十九條而屬火者五此非相火爲病之出於臟腑者乎考諸內經少陽病爲痰癎太陽病時眩仆少陰病眥暴痛鬱冒不知人非諸熱脅痰之屬火者乎少陰嘔逆厥氣上行膀胱病衝頭痛太陽病厥氣上衝胃少腹控睾引臍脊上衝心少陰病氣上衝胃嘔逆非諸逆衝上之屬火者乎

頭目眩運眼前黑暗如坐舟車兀兀欲吐者痰也消渴數飲其人必眩背寒而嘔者因利虛故也

頭重

玉機謂人稟中和之氣而生有三曰元精曰元氣曰元神三者本身中之眞精眞氣眞脈也夫精乃臟腑之眞元非營血之比故曰天癸人之精血常不足加之數奪其眞資化失則營氣乃虛虛則衛氣不固精滑脫腎氣竭而陰微不能與胃氣上升以接清陽之氣故病多頭重或氣痛弱而食少元氣下陷脈即微弱外散欲絕而虛洪或見損脈此實元精不足之所致非有外感賊邪之病也

經曰因於濕首如裹聲如從室中言濕熱不已熏蒸於上則頭重目黃而鼻塞也故東垣云濕淫所勝助風以乎之爲濕邪之襲於上者也

大頭瘟

治大頭瘟不宜速攻則邪氣不伏反攻其內而傷人也且頭空虛之分既著空虛則無所不至也所以治法當先緩而後急則邪伏也緩治以清熱消毒虛者兼益元氣胃虛食少者兼助胃氣內實熱盛者大便祕結以酒浸大黃下之乃宜熱而泄其毒也此爲先緩後急之法若先從鼻腫次腫於目又次腫於耳至頭上絡瞞後結塊則止不散必出膿血後愈

腦疳

腫痛未作膿者宜陰濕消毒黃連消毒飲之類

大痛或不痛或癢未者毒甚者隔蒜灸之更用解毒藥

腫痛便祕者邪在內也宜泄之

不甚痛或不作膿者虛也托裏爲主不作膿及不潰俱宜托裏

膿成而痛者鍼之更以托裏

膿潰而多及不斂者大補氣血煩躁飲冷脈實而痛宜瀉火

頭面赤腫

經云身半已上腫天之氣也身半已下腫地之氣也乃邪客心肺之間上攻頭目而爲腫此感四時不正之氣也與脊梁積熱之證不同脩黃之劑非大便祕實不可用若不審其因及辨其虛實表裏枭用攻之必致有誤常見儌僥之時驀驀之人多患之乃是胃氣有損邪氣從之不可不察常治邪在表者用葛根牛蒡子湯入參敗毒散或普濟消毒飲子邪在裏者五利大黃湯栀子仁湯表裏俱不解者防風通聖散表裏俱解而腫不退者犀角升麻湯腫甚者砭患處出惡血以泄其毒十日外自愈若噦出膿血即愈欲其作膿者用托裏消毒散欲其收斂者用托裏散此法最爲穩當五七日咽喉閉塞言語不出頭面不腫食不知味者不治時毒者爲四邪毒之氣感之於人也其候發於鼻面耳項咽喉赤腫無頭或結核有根令人堋寒發熱頭痛或肢體痛恍惚不寧咽喉閉塞人不識者將爲傷寒便服解藥一二日腫氣益增方悟始求瘡醫原夫此疾古無方論世俗通爲丹癗病家惡言時毒切恐傳染考之經曰人身忽輕變赤狀如塗丹謂之丹毒此風熱惡毒所爲與時毒特不同耳蓋時初狀如傷寒五七日間乃能殺人治者宜精辨之先論脈滑數浮洪沉緊弦濇若其候盛浮數者邪在表也沉濇者邪氣深也氣實之人急服化毒丹以攻之熱實不利大黃湯下之有表證者解毒升麻湯以發之年高氣弱者五香連翹湯主之又於鼻內

嚏通氣散取十餘嚏作效若嚏藥不嚏者不可治如嚏出膿者治之必愈左右之人每日用嚏藥嚏之必不傳染其病人亦每日用嚏藥三五次以洩熱毒此治時毒之良法也經三四日不解者不可大下尤宜和之犀角連翹散之類至七八日小大便通利頭面腫起高赤者可服托裏散黃芪散宜鍼鎌出血洩其毒氣十日外不治自愈也此病若五日以前精神昏亂咽喉閉塞語聲不出頭面不腫食不知味者必死殊不知病有陰有陽有可汗有可下有微甚有逆從不可不審也如裏實而不利者下之表實而不散者解之表裏俱實而不解者解表攻裏表裏俱解而不消者和之腫甚煩痛者砭去惡血更用消毒之劑不作膿或不潰者托之饑年普患者不宜用峻利當審治之

癰發有不可治

腦上諸陽所會穴則髓出右頗後一寸三分毒銳者不治餐深及寸餘者不治

廣搏醫學正傳

眩運

內經曰諸風掉眩皆屬肝木又曰歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄食減甚則忽忽善怒眩冒巔疾雖高氣化之所使然未必不由氣體之虛矣耳其爲氣虛肥白之人濕痰滯於上陰火起於下是以痰挾虛火上衝頭目正氣不能勝敵故忽然眼黑生花若坐舟車而旋運也甚而至於卒倒無所知者有之丹溪所謂無痰不能作眩者正謂此也若夫黑瘦之人軀體薄弱眞水虧欠或勞役過度相火上炎亦有時時眩運何濕痰之有哉大抵人肥白而作眩者治宜清痰降火爲先而兼補氣之藥人黑瘦而作眩者治宜滋陰降火爲要而帶抑肝之劑抑考內經有曰風勝則地動風木太過之歲亦有因其氣化而爲外感風邪而眩者治法宜祛風順氣伐肝降火爲良策焉外有因墜損而眩運者胷中有死血迷閉心竅而然是宜行血清經以散其瘀結各類推而治之無有不痊者也

偏頭痛

偏頭痛在右二陳湯加川芎白芷防風荊芥薄荷升麻在左二陳湯合四物湯加防風荊芥薄荷細辛蔓荊子柴胡酒芩

溫病頭痛死脈候

溫病二三日體熱腹滿頭痛食飲如故脈直而疾八日死

溫病四五日頭痛腹滿而吐脈來細而強十二日死

戴思恭證治要訣

頭痛

諸頭痛有因氣因痰因虛及外感四氣或酒食所傷或作勞失力以致頭痛不問何證疑似之際竝可與如聖餅子烏苓湯外有臭毒頭痛吃一味炒香附愈荊公解痛字義云宜通而塞則爲痛有偏正表腦風服川烏附不愈用蓮子草烏而愈者此乃以毒攻毒之意不可不知

有上焦熱頭痛宜敗毒散去柴胡加甘菊花如其素有頭風眩運不可謂其無痛而不以爲風切宜詳審未宜遽作虛治若投補劑愈甚別又無疾所失血等患又非諸般病後卒然得此是風氣分曉宜小續命湯加全蝎三四箇

偏正頭風作痛痛連於腦常如牽引之狀發則目不可開眩運不能攙棗宜芎辛湯每服加全蝎五箇間進太陽丹及如聖餅子或用大茶調散八生散追風散大三五七散覺上瞞有熱大茶調散竝一字散

痰作頭痛其人嘔吐痰多者宜芎辛湯或芎辛湯去茶芽導痰湯加芎半錢八生散亦可用有病此發作無時俗名痰飲頭風氣不順停痰上攻頭痛順氣爲上二陳湯導痰湯竝有加減法

頭痛挾熱項生磊塊作痛宜都梁丸

有爛頭風痒而痛者於服頭風藥外用烏酢磨鐵銹塗生薑汁亦可揩擦

怒氣傷肝及肺氣不順上衝於腦令人頭痛宜沉香降氣湯井蘇子降氣湯下養正丹或用芎附飲

因虛頭痛此爲腎厥頭痛宜用正元散或大三五七散入鹽煎服或於正元散入炒椒十五粒下來復丹間進黑錫丹有服諸藥不效其痛愈甚宜茸硃丹緣鹿茸生於頭頭病而治以鹿茸蓋以類相從也

眩運

痰飲頭風七氣失血中酒等病皆能眩運已各見本證今獨舉不兼他病見眩運者是皆虛損也然有不時眩運者有早起眩運須臾自定日以爲常者正元飲下黑錫丹

有因虛致運雖運醒時面常欲近火欲得煖手按之蓋頭面乃諸陽之會陽氣不足故耳

有頭風證耳內常鳴頭上有如鳥雀啾啾之聲切不

可全謂耳鳴爲虛此頭腦挾風所爲也有眩運之甚搥頭則屋轉眼常覩見黑花常如有物飛動或見物爲兩宜小三五七散或芎附湯生料正元飲加鹿茸一錢下靈砂丹或用正元飲炒川椒十五粒下茸砂丸若不效則獨用鹿茸一味每服半兩用無灰酒三盞煎至一盞去滓入麝香少許服會有頭疼痛不愈服茸硃丹而效者

樓英醫學綱目

頭重痛

脈動作頭重痛熱氣潮者屬胃宜調胃承氣湯下之即愈

頭搖

風頭旋者別無疾痛不自覺知常常頭自搖者是也肝風盛則搖頭治法同頭風

頭眩

成無己云眩者非眩而見其眩謂眼黑眩也運者運爲運轉之運世謂之頭旋是也

頭痛脈法

病若頭痛目痛脈急短濇者死

腦癰癤疽

正腦上一處起爲腦癰及腦疽腦鑠竅在大椎骨上入髮際生腦癰皮薄易得破穴急破急出膿不害腦疽皮厚難得破穴須急發內毒使破穴方可

腦鑠一處初起如橫木搥土起頂門下止大椎發腫如火燒其色青黑如靴皮大硬不見膿即損外皮如犬咬去肉之狀難愈

左額右額發赤疽不拘大小狀如桃李急宜藥貼破見膿無害右額角一處發毒疽及惡瘡爲近太陽穴如腫滿太陽即成虛損爲近穴而難消不可破如破後傷外風水即能害人亦宜用藥潰膿後速斂合瘡口如經冬月即成冷瘻緣此處近太陽穴上至額角都爲險處

左右太陽穴或發疽瘡及腫五七日不潰毒氣流入眼胞或眼眼合不開用藥貼破破後慎外風水風水所入即損其睛甚損眼睛而成大疾

王綸明醫雜著

頭痛

久頭痛病略感風寒便發寒月須重綿厚帕包裹若此腐蓋熱本熱而標寒也世人不識準用辛溫解散之藥皆時得效其認爲寒殊不知因其本有鬱熱毛竅常疎故風寒易入外寒束其內熱閉並而爲痛辛熱之藥雖能開通散其標之寒邪然只熱清熱病本益深急宜先用辛涼

眩運或云眩冒眩言其黑運言其轉冒言其昏其義一也

凡眩運言亂汗多下利時時自冒者虛極難治

頭重

傷寒頭重不能舉有三證太陽病深頭重不能舉陰陽易病亦頭重不能舉皆危證也

頭搖

傷寒陽脈不和則頭爲之搖有心臟絕者亦搖頭痓病風盛則搖頭皆凶證也

有裏病而搖頭者亦重證也

頭生白屑

頭生白屑肺之證也肺主皮毛故因風熱而頭皮燥癢生白屑消風散主之

眩運定脈

肝脈溢大必眩運宜預防之

腦疽

五發證瘍腫作痛煩渴引冷宜黃連消毒散當歸羌活湯清熱消毒飲

若腫痛口渴好飲熱湯爲腎虛陽火熾宜托裏消毒散托裏益氣湯腎氣丸

李中梓醫宗必讀

頭痛

經之論頭痛風也寒也虛也運氣論頭痛十條傷寒論太陽頭痛一條皆六氣相侵與真氣相薄經氣逆上干於清道不得運行壅遏而痛也頭爲天象六腑清陽之氣五臟精華之血皆會於此故天氣六淫之邪人氣五賊之變皆能相害或蔽覆其清明或瘀塞其經絡與氣相薄鬱而成熱脈滿而痛若邪氣稽留脈滿而氣血亂則痛乃甚此實痛也寒濕所侵真氣虛弱雖不相薄成熱然邪客於脈外則血泣脈寒卷縮緊急外引小絡而痛得溫則痛止此虛痛也因風痛者抽掣惡風因熱痛者煩心惡熱因濕痛者重重而天陰轉甚因痰痛者昏重而欲吐不休因寒痛者細急而惡寒戰慄氣虛痛者惡勞動其脈大血虛痛者喜熨惕其脈芤頭痛自有多因而古方每用一藥何也高巔之上惟風可到味之薄者陰中之陽自地升天者也在風寒濕者固爲正用即虛與熱者亦假引經須知新而暴者但名頭痛深而久者名爲頭風頭風必害眼者經所謂東風生於春病在肝目者肝之竅肝風動則邪害空竅也察內外之因分虛實之證胃中洞然則手到病去矣

風濕挾熱頭痛上連眉目及腦痛偏正頭痛年深不愈宜以清空膏主之痛甚加細辛

痰厥頭痛太陰脈緩清空膏去羌活防風加半夏天麻

陽明頭痛發熱惡熱面渴白虎湯倍加白芷

腎厥頭痛即經所謂下虛上實其脈堅之則弦按之則堅主真丸來復丹

傷食頭痛胃滿噯酸噫敗卵臭惡食雖發熱而身不痛香砂枳术丸

傷酒頭痛葛花解醒湯

怒氣傷肝頭痛沉香降氣散蘇子降氣湯

頭痛九竅不利屬氣虛補中益氣湯加芎藭川芎細辛

眉火後近髮際目魚尾魚尾上攻頭痛屬血虛四物湯加薄荷

凡勞役動作即頭痛者胃熱也酒炒大黃五錢濃茶煎服

心頭頭痛清空膏加麥門冬升參

上熱頭痛目赤下寒足跗爲甚大便微祕既濟解毒湯

偏頭風乃半邊頭痛也左爲血虛右屬氣熱芎犀丸極效

真頭痛手足青至節且發夕死夕發旦死蓋腦爲髓海受邪則死灸百會穴猛進大劑參附亦有生者

雷頭風

雷頭風頭痛而起核塊或頭中如雷鳴震爲雷震仰盂用青荷葉者象震之形與色也清震湯主之有因痰火耳如雷鳴熟半夏一兩大黃煨二兩大麻黃苓各六錢薄荷葉三錢甘草三錢水泛丸葉豆大臨臥茶吞二錢痰利爲度

大頭風

大頭痛頭大如斗此感天地非時之氣甚而潰裂出膿此邪客上焦普濟消毒飲子主之輕者名發頤腫在兩耳前後甘桔湯加薄荷荊芥風黏子連翹黃芩

頭痛脈法

寸口緊急或短或弦或浮皆頭痛浮滑爲風痰易治短濇爲虛難治浮弦爲風浮洪爲火細或緩爲濕

頭痛諸診

頭痛陽強浮風緊寒風熱洪數濕細而堅氣虛頭痛

雖弦必濇痰厥頭痛腎厥堅實又曰寸口緊急或短或浮或弦皆主頭痛

薛己醫案

頭痛

久病頭痛略感風寒便發寒月須重綿厚帕包裹者此屬鬱熱本熱而標寒也若用辛溫解表之藥暫時得效誤認爲寒殊不知因其本有鬱熱毛竅常疎故風寒易入外寒束其內熱閉逆而爲痛辛熱之藥雖能散其標之寒邪然以熱濟熱病本益深惡寒愈甚矣當瀉火凉血爲主而佐以辛溫散表之劑以從法治之則可愈而根可除也若有感冒發散之後還宜調理正氣則因其病機而補益之庶無復作之患也

頭眩

頭目眩運若右寸關脈浮而無力脾肺氣虛也用補中益氣湯若左關尺脈數而無力肝腎氣虛也用六味地黃丸若右寸尺脈浮大或微細陽氣虛也用八味地黃丸血虛者四物湯加參苓白朮氣虛者四君子湯加當歸黃芪肝經實熱者柴胡清肝散肝經虛熱者六味地黃湯脾氣虛弱者補中益氣湯脾虛有痰者半夏白朮天麻湯外證砭血過多者芎歸湯發熱惡寒者聖愈湯大凡發熱則眞氣傷矣不可用苦寒藥恐復傷脾胃也

腦疽

腫痛未作膿者宜除濕消毒大痛或不痛或麻木者毒甚也隔蒜灸之更用解毒藥腫痛便祕者邪在內也泄之不甚痛或不作膿者虛也托裏爲主膿成脹痛者針之更以托裏上部脈數實而痛宜降火上部脈數虛而痛宜滋陰降火爲主尺部脈數而作渴滋陰降火不作膿或不潰者托裏藥主之膿清或不斂或多者大補氣血煩躁飲冷脈實而痛者宜瀉火

腦疽屬膀胱經積熱或濕毒上湧或陰虛火熾或腎水虧損陰精消涸初起腫赤痛甚煩渴飲冷脈洪數而有力乃濕熱上湧當用黃連消毒散并隔蒜灸以除濕熱漫腫微痛渴不飲冷脈洪數而無力乃陰虛火熾當用六味丸及補中益氣湯以滋化源若口舌乾燥小便頻數或淋漓作痛乃腎水虧損急用加減八味丸及前湯以固根本引火歸經若不成膿不腐潰陽氣虛也四君加歸芪不生肌不收斂脾氣虛也十全大補湯若色黯不潰或潰而不斂乃陰精消涸名曰腦爍爲不治若攻補得宜亦有可愈治者審焉

腦疽灸法

李氏云腦疽及頸項有疽不可用隔蒜灸恐引毒上攻宜灸足三里穴五壯氣海穴三七壯仍服凉血化毒之藥或以騎竹馬穴法灸之凡頭項咽喉生疽古法皆爲不治若用此法多有生者如五香連翹漏蘆等湯國老膏萬金散皆可選用

註前證屬膀胱經濕熱上壅或陰火上炎若因濕熱則病氣有餘元氣不足當用黃連消毒散以除濕毒補中益氣湯以滋化源若因陰火則元氣病氣俱不足當用補中益氣湯及六味地黃丸以滋腎水若腎水乾涸中傳未證急用加減八味丸及補中益氣湯以固根本引火歸源若色黯不潰或潰而不斂名曰腦爍不治大凡腫焮痛甚宜活命飲隔蒜灸之解散瘀血拔引鬱毒但艾炷宜小而少若欲其成膿腐潰生肌收斂並用托裏爲主

鬢疽

鬢疽屬肝膽二經怒火或風熱血虛所致若發熱作渴者用柴胡清肝散腫焮痛甚者用仙方活命飲若大勢已退餘毒未散用參芪歸朮爲主佐以川芎白芷金銀花以速其膿膿成仍用參芪之類托而潰之若欲其生肌收斂腎虛者六味丸血虛者四物加參芪或血燥或水不能生木者用四物湯六味地黃丸氣虛者用補中益氣湯皆當滋其化源爲善

焮痛或發熱者祛風清熱焮痛或發寒熱或拘急者發散表邪作膿焮痛者托裏消毒膿已成作痛者鍼之不作膿或成膿而不潰者並宜托裏不斂或膿清者宜峻補

方賢奇效良方

頭眩

丹溪論曰眩運分之爲二皆由痰火爲病以此分爲二也眩運雖屬痰火未嘗不由腎虛兼風邪所得蓋痰者本流動之物又因火動而助其愈盛火性炎上得風則愈熾風火兩動痰之愈作經云諸風掉眩皆屬肝木原病式云風火皆屬乎陽多爲兼化陽主乎動而兩動相搏則爲旋轉也若人患此頭旋目眩卒然惡心欲吐眼花視物不的如屋旋轉起則運倒其病所苦何經所受而致此曰靜順清謐水之化也動亂撓擾火之用也腦者地氣之所生故藏陰於目爲瞳子系腎水至陰所主二者喜靜謐而惡動擾靜謐則清明內持動擾則掉搖散亂故腦轉目眩此之謂也靈樞經云五臟六腑之精氣皆上注於目爲之精

也筋骨氣血之精與脈并系於目上屬於腦出於項中故邪之中項者乘其身形之虛深則隨目系以入於腦入於腦則腦轉腦轉則目系急目系急則目眩也乃心腎不交風火兼化而致然也夫風者有內外之分風從外入者則兼化也由內之外者乃火之生風也醫者察審內傷外感之由脈浮自汗項强不仁爲傷風脈緊無汗筋攣痛爲感寒脈虛煩悶者爲暑脈沉滯吐逆者爲濕寸脈俱沉此爲異耳至於七情內傷者使臟氣不平鬱而生涎結而爲飲隨氣上攻令人頭運眉稜骨痛目不可開其證婦人得之蓋婦人性多偏怒經曰天之氣日風人之氣日怒怒則傷肝木木動生風令人頭目旋運皆由此矣婦人本陰血主之因產難崩漏虧損致其陽氣無依爲眩運也男子患此或因金瘡吐衄便利之損或酒醉行房勞傷精血使氣不能歸元而諸氣逆上是爲頭目眩運也學者於此當分標本別其盛衰用藥施治如鼓應桴無不效矣

頭痛頭風大頭風

頭痛爲病靈樞云厥頭痛取足六經手少陰眞頭痛其腦盡痛手足寒至節死不治難經曰手三陽之脈受風寒伏留而不去名厥頭痛入連在腦者名眞頭痛內經云寸口脈中手短者曰頭痛脈經云陽弦則頭痛又云寸口脈浮中風發熱頭痛脈緊頭痛是傷寒脈緊上寸口者風頭痛脈訣云頭痛短濇應須死浮滑風痰皆易除內經云東風生於春病在肝俞在頭項故春氣者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽膀胱之脈起於目內眥上額交顛上入絡腦還出別下項病衝頭痛又足少陽膽之脈起於目鋭眥上抵頭角病在頭角額痛夫風從上受之風寒傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛耳鳴九竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者病在腦中過在乎巨陽少陰乃濕熱頭痛也如氣上而不下頭痛巔疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也如頭半寒痛者先取手少陽陽明後取足少陽陽明此偏頭痛也有眞頭痛者甚則入連於腦乎足寒至節者旦發夕死夕發旦死有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓者以腦爲主腦逆故令頭痛齒亦痛東垣云凡頭痛皆以風藥治之者總其大體而言之也高巔之上惟風可到緩藥之薄者陰中之陽乃自地升天者也然亦有三陰三陽病證者太陽頭痛惡風脈浮緊川芎羌活獨活麻黃之類爲多少陽頭痛脈弦緩往來寒熱柴胡爲冬陽明頭痛自汗發熱惡寒脈浮緩長實者升麻葛根石膏白芷爲多太陰頭痛必有痰體重腹痛爲痰癖其脈沉緩蒼朮半夏南星爲多少陰頭痛三陰三陽經不流行兩足寒氣逆爲寒厥其脈沉細麻黃附子細辛爲多厥陰頭痛項痛吐痰或吐涎沫厥冷其脈浮緩吳茱萸湯主之諸血虛頭痛當歸川芎爲多諸氣虛頭痛人參黃芪爲多爲多者主治實藥也兼見何證以佐使藥治之此立方大法也氣血俱虛頭痛者用調中益氣湯中少加川芎蔓荊子細辛其效不可盡述半夏白朮天麻湯治痰厥頭痛藥也清空膏乃風濕熱頭痛藥也羌活附子湯治厥逆頭痛也如濕氣在頭者以苦吐之不可執方而治所論頭痛大法甚詳著矣世之方論又言頭風病名何以此不見發明蒭言其略凡邪令人頭痛者其邪一也但有新久去留之分耳淺而近者名頭痛其痛卒然而至易於解散速安也深而遠者爲頭風其痛作止不常愈後遇觸復發也皆當驗其邪所從來而施治之觀於訣效方載潔古老人壯歲時病頭痛每發時兩頰青黃運眩目不欲開懶於言語身體沉重兀兀欲吐食數日方過乃曰此太陰厥陰合而爲病名曰風痰以水煮金花丸更灸俠谿二穴各二七壯不旬日愈以是觀之豈非頭風乎於此不言風者是言經之本也世言風者是言經之標也何不明少陽厥陰頭痛者令人偏頭痛其經肝膽風木爲邪也後人遂以此而名頭風可謂不求其本歟潔古云夫大頭風證者是陽明邪熱太甚資實少陽相火而爲之也多在少陽或在陽明或傳太陽視其腫勢在何部分隨經取之濕熱爲腫水盛爲痛此邪見於頭風在兩耳前後所主其病也治之大不宜藥速速則過其病所謂上熱未除中寒復生必傷人命此病自外之內者是血病況頭部分受邪見於無形迹之部當先緩而後急先緩者謂邪氣在上若無形之分部既著無形無所不至若用重劑速下過其病難已雖用緩藥若急服之或食前或頓服皆失緩體則藥不能除病當徐徐浸漬無形之邪也或藥性味形體不離緩體是也且急治者謂緩劑已瀉邪氣入於中是到陰部染於有形質之所若不速去則損陰也此急治却爲客邪當急去之治客以急也且治主病當緩者

謂陽邪在上陰邪在下本家病也若急治之不能解分而益亂也治客以急者謂陽分受陰邪陰分受陽邪此客氣急除去之也假令少陽陽明爲邪出於耳之前後也陽明爲邪者首大腫也先以黃芩黃連甘草湯通炒煎少少不住服服畢不愈用新瓦上炒鼠黏子待香同大黃煎去滓內芒硝俱各等分亦時時呷之無令飲食在前得微利則邪氣去若陽明行經之藥升麻葛根芍藥甘草太陽行經羌活防風之類是也又以東垣治驗其所論製方自有來矣天之四時民多疫癘初覺頭寒體重次傳頭面腫盛目不能開上喘咽喉不利舌乾口燥俗云大頭天行親戚不相訪問慮其傳染之故得此病者五六日醫以承氣加藍根下之稍緩翌日其病如故再下之又緩終莫能愈潔古謂之曰夫身半已上天之氣也身半已下地之氣也此邪熱客於心肺之間令人頭目頭項腫盛以承氣下之瀉胃中之實熱是誅罰無過而不知適其所至爲故遂處方用藥黃芩黃連味苦寒瀉心胞熱以爲君橘紅苦平元參苦寒生甘草甘寒人參甘溫瀉火補氣以爲臣連翹風粘子薄荷味辛平板藍根味苦寒馬勃白殭蠶味苦平散腫消毒以爲佐升麻柴胡平行少陽陽明二經不得伸桔梗味辛溫爲舟楫不令下行共爲細末一半用白沸湯調時時呷下一半用蜜爲丸噙化之服盡良愈如大便硬者加酒煨大黃一錢或二錢以利之腫勢甚者宜砭刺之是皆深得病機之道詳盡立論處方以爲後人之規焉

張三錫醫學準繩六要

頭痛

傷寒頭痛脈浮而緊身形拘急惡寒吝强身大熱傷寒頭痛也冬用麻黃湯餘月羌活沖和湯

傷風頭痛脈緩而浮或左脈微急證兼鼻塞眼脹目赤傷風頭痛也宜解肌冬月桂枝湯餘月十味芎蘇飲

火頭痛寸口脈洪而大證兼口乾目赤等火證者上焦實火也宜清散兼降川芎茶調散之類加酒芩連梔子石膏勢盛而脈實者用熱大黃以瀉火也丹溪法用酒大黃半兩茶煎服

食鬱頭痛右關寸脈滑而實證兼嘔吐惡心心下痞悶或寒熱如瘧乃食鬱頭痛也治須消導二陳湯加山楂厚朴枳實神麴

痰厥頭痛兩寸脈滑而弦或惡心吐清水昏重乃痰厥頭痛也半夏白朮天麻湯

濕熱頭痛脈數而濡或兩寸脈沉伏而數身重肢節重或四肢面目浮腫乃濕熱頭痛也此多見於酒客宜散濕解熱二陳二朮酒芩羌獨防風之類不已用嚏鼻法濕家一身盡痛發熱面黃而喘鼻塞心煩頭痛者濕在上也瓜蒂散內鼻中吐之

氣虛頭痛右脈大而無力或按之不數或弱或弦或兩尺洪盛四肢怠惰無力飲食不思口淡無味乃氣虛頭痛也四君子湯加黃芪蔓荊子或調中益氣湯加蔓荊子重者加細辛

血虛頭痛左脈大而無力或濡細而數自魚尾上攻於頭是血虛頭痛也四物倍川芎加酒芩

腳氣頭痛脈細而緩或濡弱節痛大便祕或吐逆腳脉軟弱而頭痛者屬腳氣當從腳氣治

陽明證額痛及眼或兼鼻塞脈浮而長陽明受病也升麻葱白白芷主之

自汗脈洪口渴屬陽明裏證也白虎解毒承氣選用三陰脈至頸胷而還不循於頭惟厥陰循喉嚨之後上連目系頂巔故有頭痛證多嘔吐涎沫四肢厥冷

脈多沉伏吳茱萸湯主之

脈沉而細足寒氣逆或身微熱而頭痛者屬裏虛受寒乃太陽脈似少陰也麻黃附子細辛湯主之以附子溫中麻黃散寒加細辛是汗劑之重者

頭久痛非火即風腦上有痰也濃煎茶一椀取吐苦水出乃止不損人待渴自止

平人頭痛屬火與痰者多

風熱在上脈浮洪而痛者宜天麻荊子台芎酒芩

少陽偏頭痛便祕者或可下之

瘡毒頭痛脈弦數會病梅瘡而痛不止或咽中痛或臂腳有一塊痛屬瘡毒愈毒湯多服自止

大法曰高巔之上惟風可到一切痰火氣血頭痛須加風藥如荊芥川芎薄荷羌活白芷藁本之類即前各加引經藥是也

手三陽足三陽脈皆上循於頭故諺曰六陽會首是也六陰脈躋頸而還惟厥陰上入吮嗓連目系出額是頭病當於七經辨之緣邪著本經或有火有痰脈道不利所以作痛各見所部以太陽在後陽明在額挾鼻與齒少陽兩角厥陰屬巔頂而多吐涎尋風尋火或在氣或在血辨其虛實表裏得病情也

頭搖

頭搖屬風屬火高年病後辛苦人多屬虛因氣血虛而火犯上鼓動也

頭眩

眩運悉屬痰火但分虛實多少而治

肥人脈沉滑屬濕痰白朮半夏天麻湯妙

瘦人脈弦數乃陰虛相火上炎也宜滋陰降火如兩手脈伏面色痿黃憔悴屬氣虛生涎濁氣泛上其涎亦令頭眩悞見於鬱悒之人及婦女華宜舒鬱

中年之人大病初起元氣未復起則眩倒脈必緩弱或右手寸關大而無力宜補中益氣倍參芪加天麻有痰加二陳有火加炒黃蘗

夏月頭眩偶冒暑勞形脈虛細煩悶口渴屬傷暑先以六一散後用大劑生脈加黃蘗

眩運上實下虛所致所謂下虛者血與氣也所謂上實者痰火泛上也急則治痰火緩則補元氣

脈弦實有力口煩渴壯盛之人屬實痰實火或過飲恣口所致宜降火化痰酒芩梔于二陳枳桔薄荷荊芥黃芩花粉出入不愈心加酒炙大黃二三錢妙

中宮濕痰壅塞清道因頭眩脈必緩弱宜平胃滲濕風痰眩運頭痛惡心吐酸水半夏南星白附子生爲末滴水丸桐子大以生薑爲衣陰乾每服十丸至二十丸薑湯下

頭面喜暖手按則運定此陽虛也大劑參芪

痰盛氣虛六君子加黃芪少佐炮附子煎成入竹瀝薑汁

天麻荊芥穗薄荷乃消上焦風熱妙品非治本藥也

因痰治痰因火治火或補氣或補血或滋陰要在變而通之

亡血家作眩苓歸湯胃中有死血飲韭汁酒良

上焦風熱作眩脈浮數兼頭痛眼赤作寒熱者防風通聖散出入

兩手脈緩大無力飲食減而微渴大便三四日一行亡血人乃大虛證參芪歸朮芍藥作大劑濃煎下連蘗丸二十粒連藥皆盡汁妙冬加乾薑少許更以薑汁羹糊丸

冬月胃寒鼓激痰涎亦作眩運宜從寒治

早起眩運須臾自定乃胃中老痰使然古方用黑錫丹劫之藥用桂附沉磁黑錫盧巴故紙茴香陽起金鈴木香大辛大熱恐劫不開轉增病耳不若蒙石鎮墜之藥徐徐取效更慎口腹爲佳

古方用鹿茸五錢酒煎湯加麝少許治元陽虛眩運必虛而無火者宜之

眩運悉屬虛火泛上鼓動其痰上潮衝動目系故耳鳴目系轉覺房屋俱動是也且腦爲髓海腦實氣旺火自不能上升所以少年無運病也亦有稟賦怯弱而有此者又不可以常理論丹溪曰眩運乃中風之漸中年之後大病之餘必加補養斷酒色方保無虞產後血運亦屬虛肥白者補氣黑者補血各加童便薑汁竹瀝以降泛上虛火也忌涼劑

雷頭風

頭痛腫起核塊或作赤腫或作寒熱拘急皆風熱挾火炎上所致雷屬相火故名古方用升麻葛朮加荷葉名升麻湯莫若荊防敗毒散爲便

陶華六書

頭痛

頭痛者寒邪入足太陽經上攻於頭此表證也頭痛脈浮緊無汗惡寒可發汗頭痛脈浮緩有汗惡寒宜解肌照前時令用藥陽明病不惡寒反惡熱五六日不大便胃實燥渴熱氣上攻於頭目脈實者調胃承氣下之少陽頭痛者小柴胡和之濕家鼻塞頭重者瓜蒂散嚏鼻黃水出即愈痰涎頭痛胃滿寒熱者瓜蒂散吐之厥陰乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之

三陽雖有頭疼不若太陽專主也三陰無頭痛惟厥陰有頭痛者是脈系絡於頂巔也若痛連於腦手足俱青爲真頭痛必死矣

大凡頭痛屬三陽乃邪氣上攻也太陽專主頭痛陽明少陽亦有之三陰絡上不過頭惟厥陰循喉嚨之後上連目系頂巔故有頭痛乾嘔吐涎沫之證却無身熱亦與陽證不同雖然風濕在少陰濕溫在太陰其經從足走至胃中而還及頭痛過於陰毒是又不可拘也若兩感於寒太陽少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴與夫頭痛極甚又連於胃手足寒者則爲真頭痛不可治矣

太陽病頭痛發熱惡寒無汗麻黃湯有汗桂枝湯已發汗未發汗頭痛如破者葛根葱白湯

太陽病下之脈細數者頭痛未止連鬚葱白湯

陽明頭痛不惡寒反惡熱六七日不大便胃實氣攻於上也少與調胃承氣湯

少陽頭痛脈弦發熱小柴胡湯

頭痛發熱心煩梔于黃芩湯

天行勞復頭痛四肢痛葱頭湯

頭眩

頭眩者少陽半表裏之間表邪傳裏表中陽虛故頭眩又有汗下後而眩目者亦陽虛所致少陰下利止時頭眩時時自冒此虛極而脫也太陽病若下之因復發汗以此表裏俱虛其人必冒冒家汗自出而愈陽明病頭眩不惡寒能食而欬甘草乾薑茯苓白朮湯少陽證目眩小柴胡湯太陽病發汗後汗出不解心下悸頭眩身瞤筋惕振振欲擗地者眞武湯吐汗下後虛而脈沉數心下痞滿動氣衝咽喉不得息身振搖筋肉惕久則成痿茯苓桂枝白朮甘草湯是也風家亦有眩者風主運動故也其或諸逆發汗劇者言亂目眩而死也

發汗過多或虛弱人微發汗或傷風自汗妄用大青龍湯便有厥逆筋惕肉瞤之證竝屬眞武湯亟者去芍藥有熱者去附子應發汗而腹中左右有動氣者竝不可汗汗之則筋惕肉瞤或頭眩汗出不止其後最逆先宜防風白朮牡蠣湯次服小建中湯十救一二吐下之後心下逆滿氣上衝胷起則頭眩脈沉緊身振搖者茯苓桂枝白朮甘草湯久而成痿者逕用心下痞滿者枳桔湯加茯苓甘草

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百四十四卷目錄
醫部彙考一百二十四
頭門三
王肯堂證治準繩頭痛總論　諸頭風　真頭痛　大頭病　頭風病　腐頭重　頭痛　頭痛脈法　脈運　百會痛　頭門　頭痛　太陽痛　鬚毛脊寒脊痛　赤色　痛　痛在頭痛頭腦用托裏消毒散加減法
陳實功外科正宗頭痛　腦痛論　腦痛看法　腦痛治法　腎虛鬱冒　腎虛鬱冒看法　腎虛鬱冒治法　腎虛頭　透腦痧　玉枕痧　白禿瘡
喻昌醫門法律溫熱上干於頭宜審下法　頭　頭
張介賓景岳全書頭痛　頭風　論治
陳士鐸石室秘錄頭痛治法　腦痛治法　頭面腫　痛頭痛　頭角生瘡

明王肯堂證治準繩

頭痛總論

醫書多分頭痛頭風爲二門然一病也但有新久去留之分耳淺而近者名頭痛其痛卒然而至易於解散速安也深而遠者爲頭風其痛作止不常愈後遇觸復發也皆當驗其邪所從來而治之

世俗治頭痛不從風則從寒安知其有不一之邪乎試考內經論頭痛所因以明之如風從外入振寒汗出頭痛新沐中風爲首風當先風一日頭痛不可以出內大寒內至骨髓髓以腦爲主腦逆故頭痛齒亦痛少陽司天之政初之氣風勝乃搖候乃大溫其病氣怫於上頭痛二之氣火反鬱白埃四起其病熱鬱於上頭痛少陽司天火淫所勝民病頭痛發熱惡寒如瘧藏金不及炎火乃行復則陰厥且格陽反上行頭腦戶痛延及腦頂發熱太陽之勝熱反上行頭項頂巔腦戶中痛目如脫太陽之復心痛痞滿頭痛太陰司天濕淫所勝腰脊頭項痛時肫太陰在泉濕淫所勝病衝頭痛目似脫項似拔太陰之復頭項痛重而掉瘛尤甚陽明之復欬嘔煩心病在膈中頭痛傷寒一日巨陽受之頭項痛腰脊強靈樞謂風痹股脛躄足如履冰時如入湯煩心頭痛時肫悲恐短氣不出三年死凡此皆六氣相侵與清陽之眞氣相薄而痛者也至於頭痛甚則腦蓋痛手足寒至節死頭痛巔病下虛上實注以腎虛不能引膀胱之氣故爾心煩頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生心熱病者辛心痛煩悶頭痛面赤刺手少陰太陽肺熱病者頭痛不堪汗出而寒刺手太陰陽明腎熱病者項痛員濞濞然刺足少陰太陽靈樞謂厥頭痛面若腫起而煩心取足陽明太陰厥頭痛頭脈痛心悲善泣取血與厥陰厥頭痛員員頭重而痛取手足少陰厥頭痛意善忘按之不得取頭面左右動脈後取足太陰厥頭痛項先痛腰脊爲應先取天柱後取足太陽厥頭痛頭痛甚耳前後脈湧有熱瀉出其血後取足少陽頭

痛不可取於腧者有所擊墮惡血在於內若肉傷痛未已可側取不可遠取也頭痛不可刺者大痹爲惡日作者可令少愈不可已頭半寒痛先取手少陽陽明後取足少陽陽明勝胱足太陽所生病頭顱頂腦戶中痛腎足少陽所生病頭痛凡此皆臟腑經脈之氣逆上亂於頭之清道致其不得運行壅遏經隧而痛者也蓋頭象天三陽六腑清陽之氣皆會於此三陰五臟精華之血亦皆注於此於是天氣所發六淫之邪人氣所變五賊之逆皆能相害或蔽覆其聰明或瘀塞其經絡因與其氣相薄鬱而成熱則脈滿滿則痛若邪氣稽留則脈亦滿而氣血亂故痛甚是痛皆爲實也若寒溫所侵雖眞氣虛不與相薄成熱然其邪客於脈外則血泣脈寒寒則脈縮卷緊急外引小絡而痛得溫則痛止是痛爲虛也如因風木痛者則抽掣惡風或有汗而痛因暑熱痛者或有汗或無汗則皆惡熱而痛因濕而痛者則頭重而痛遇天陰尤甚因痰飲而痛者亦頭昏重而痛憒憒欲吐因寒而痛者絀急惡寒而痛各與本臟所屬風寒濕熱之氣兼爲之狀而痛更有氣虛而痛者遇勞則痛甚其脈大有血虛而痛者善驚惕其脈乳用是病形分之更兼所見證察之無不得之矣

三陽頭痛羌活防風荊芥升麻葛根白芷柴胡川芎芍藥細辛連翹菊白

陰證頭痛只用溫中藥如理中薑附之類

風濕熱頭痛上薤損目及腦痛偏正頭痛年深不愈竝以清空膏主之如苦頭痛每料中加細辛二錢如太陰脈緩有痰名曰痰厥頭痛去羌活防風川芎甘

草加半夏一兩半如偏頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍如發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白虎湯加白芷

頭旋眼黑頭痛宜安神散川芎散

熱厥頭痛雖嚴寒猶喜風寒微來暖處或見煙火其痛復作宜清上瀉火湯後用補氣湯

風熱頭疼石膏散荊芥散

冬月大寒犯腦令人腦痛齒亦痛名曰厥逆出奇病論中宜羌活附子湯

頭痛胃中痛食減少咽燥不利寒冷脈左寸弦急宜麻黃吳茱萸湯

濕然在頭而頭痛者必以苦吐之輕者用透頂散嚏鼻取涎

新沐中風爲首風頭面多汗惡風當先風一日則病甚至其風日則少愈大川芎丸主之

風氣循風府而上則爲腦風項背怯寒腦戶極冷神聖散主之

凡治頭痛皆用芎芷羌防等辛溫氣藥升散者由風木虛不能升散而土寡於畏得以壅塞而痛故用此助肝木散其壅塞也若風盛疎散太過而痛服辛散藥反甚者則宜用酸溫收而降之乃愈乳香盞落散之類是也

血虛頭痛白魚尾上攻頭痛當歸川芎主之當歸一兩酒一升煮取六合飲至醉效

當歸川芎連翹熟苹各二錢水煎去查入龍腦薄荷末二錢乘沸泡之鼻吸其氣候溫卽服服卽安臥效

氣血俱虛頭痛者於調中益氣湯加川芎蔓荊子細辛其效如神

痰厥頭痛眼黑頭旋惡心煩亂半夏白朮天麻湯主之痰厥頭痛非半夏不能療眼黑頭旋風虛內作非天麻不能解天麻苗謂之定風草獨不爲風所搖以治內風之神藥內風者虛風是也黃芪甘溫瀉火補元氣實表虛止自汗人參甘溫調中補氣瀉火二朮甘溫除濕補中益氣澤瀉茯苓利小便導濕橘皮苦溫益氣調中而升陽炒麴消食蕩胃中滯氣麥芽寬中助胃氣乾薑辛熱以滌中寒黃蘗苦寒用酒洗以療冬日少火在泉而發躁也

鼻齆腹腫頭痛病在胃經云陽明所謂客孫脈則頭痛鼻齆腹腫者陽明并於上上者則其孫絡太陰也故頭痛鼻齆腹腫也

動作頭重痛熱氣潮者屬胃丹溪云頭痛如破酒炒大黃半兩茶煎服妻全善云病在胃而頭痛者必下之方愈也如孫兆以利膈藥下張學士傷食頭痛郭茂恂以黑龍丹下其嫂產後汚血頭痛皆下咽卽安是也

心煩頭痛病在膈中過在手巨陽少陰東垣清空膏之類治之

頭痛巔疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎許學士謂之腎厥頭痛也其脈舉之則弦按之則堅用玉眞丸治之就復卷用正元散或大三五七散入鹽煎服或於正元散內入炒椒十五粒下來復丹間進黑錫丹有服諸藥不效其痛愈甚宜菲硃丹

素問曰頭痛巔疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎徇蒙指九目眩耳鼻下實上虛過在足少陽厥陰甚則入肝下虛者腎虛也故腎虛則頭痛上虛者肝虛也故肝虛則頭運徇蒙者如以物蒙其首掐搖不定目眩耳聾皆運之狀也故肝厥頭運腎厥巔痛不同如此肝厥宜鉤藤散

傷食頭痛胃膈痞塞噯酸噁敗卵臭畏食雖發熱而身不痛宜治中湯加砂仁一錢或紅丸子

傷酒頭痛惡心嘔吐出宿酒昏冒眩運宜葛花解醒湯

怒氣傷肝及肝氣不順上衝於腦令人頭痛宜沉香降氣散并蘇子降氣湯下養正丹

上熱頭目赤腫而痛胃膈煩悶不得安臥身半已下皆寒足脈尤甚大便微祕宜既濟解毒湯

外有臭毒頭痛喫一味炒香附愈

頭痛連睛痛石膏鳳菊子炒爲末茶清食前調下

頭風搐鼻白芷散川芎散如金散瓜蒂神妙散火筒散鬱金散

雷頭風

頭痛而起核塊者是也或云頭如雷之鳴也爲風邪所客風動則作聲也張子和用茶調散吐之次用神芎丸下之然後服烏荊丸及愈風餅子之類衰者用涼膈散消風散熱

頭上赤腫結核或如酸棗狀用鈹針出血則愈亦有因痰火者痰生熱熱生風故也痰火上升壅於氣道猶乎風化則自然有聲輕如蟬鳴重如雷聲故名雷頭風也用半夏牙皂薑汁煮一兩大黃酒浸透濕紙包煨再浸再煨三次二兩白礬醬連翹橘紅桔梗天麻各五錢片芩酒炒七錢薄荷葉三錢白芷青黛石

粉草各一錢末之水浸蒸餅爲丸如菜豆大食後臨臥茶吞二錢以痰利爲度然後用清痰降火煎藥調理

眞頭痛

天門眞痛上引泥丸夕發旦死旦發夕死蓋腦爲髓海眞氣之所聚卒不受邪受邪則死不可治古方云與黑錫丹灸百會猛進參沉烏附或可生然天柱折者亦難爲力矣

大頭病

頭腫大如斗是也是天行時疫病也東垣監濟源稅時長夏多疫鴈初覺憎寒體重次傳面目腫盛目不能開上喘咽喉不利舌乾口燥俗云大頭天行遂處方用黃連黃芩味苦寒瀉心肺間熱以爲君橘紅元參苦寒生甘草甘寒瀉火補氣以爲臣連翹鼠黏子薄荷葉苦辛平板藍根味甘寒馬屁勃白殭蠶味苦平散腫消毒定喘以爲佐升麻柴胡苦平行少陽陽明二經不伸之氣桔梗辛溫爲舟楫不令下行共爲細末用湯調時時服之拌蜜爲丸噙化服盡良愈乃施其方全活甚衆名普濟消毒飲子或黑白散甘桔湯加鼠黏子連翹大黃元明粉白殭蠶荊芥

頭風屑

羅謙甫云肝經風盛木自搖動尚書云滿招損老子云物壯則老故木陵脾土金來尅之是子來爲母復仇也使梳頭有雪皮見肺之證也肺主皮毛大便實瀉青丸主之虛者人參消風散主之

萬病紫苑丸治頭多白屑每服三丸至五七丸薑湯下

按上治法必有風熱上攻頭目脘痛諸證而後用之若止是白屑但宜白芷零陵香之屬外治而已

頭重

頭重何因得之曰因天之濕淫外著也因人之濕痰上蒸也因在下之陰氣逆於上也皆得而頭重何以言之頭象於天其氣極清地氣重濁地者陰也土濕也若外著內蒸必壅蔽清道致氣血不利沉滯於經隧脈絡故重內經曰陽氣者因於濕首如裹是外濕蔽著者也又曰脾熱病者先頭重是胃脈引其熱上於頭也

頭搖

頭搖風也火也二者皆主動會之於巔乃爲搖也內經曰徇蒙招尤目瞑耳聾下實上虛過在足少陽厥陰註謂徇疾也蒙目不明招掉搖不定也尤甚也目疾不明首掉尤甚又太陰之復頭項痛重掉瘛尤甚註謂濕氣內逆太陽上留胃中而掉瘛也靈樞謂督脈之別長強虛則頭重高搖之然病機有謂諸風掉眩皆屬肝木夫頭之巔足太陽之所過督脈與厥陰之所會是故三經所逆之火留聚於此者皆從風木而爲掉搖也張仲景又言心絕者亦直視搖頭也

頭痛脈法

浮緊爲太陽　弦細少陽　浮緩長陽明　沉緩太陰　沉細少陰　浮緩厥陰　浮弦爲風　浮洪爲火　右寸滑或大或弦有力皆痰火積熱　細或緩兼體重者濕　左脈不足血虛　右脈不足氣虛　左右俱不足氣血俱虛　右寸緊盛食積　右關洪大爲胃熱上攻　寸口弦細爲高上有風涎冷痰或嘔吐　沉細爲陰毒傷寒但頭痛身不熱也　病苦頭疼目痛脈急短滑者死

眩運

眩謂眼黑眩也運如運轉之運世謂之頭旋是也內經論眩皆屬肝木屬上虛丹溪論眩主於補虛治痰降火仲景治眩亦以痰飲爲先也

趙以德曰丹溪先生主火而言者道也然道無所之而不在道之謂何陰陽水火是也其順淨清謐者水之化動擾撓亂者火之用也腦者地氣之所生故藏於陰目之瞳子亦腎水至陰所主所以二者皆喜靜謐而惡動擾靜謐則清明內持動擾則掉擾散亂是故腦轉目眩者皆由火也靈樞曰五藏六腑之精氣皆上注目而爲之精筋骨血氣之精與脈并爲目系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢其身之虛其入深則隨眼系以入於腦入於腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目眩以轉矣所謂邪者風寒濕熱內外之諸邪也然諸邪盡謂以火之所成眩者何內經謂諸風掉眩皆屬肝木者是專言風邪矣原病式釋之曰風火皆屬陽多爲兼化陽主乎動兩動相搏則頭目爲之眩運而旋轉火本動也焰得風則自然旋轉於是乎掉眩掉搖也眩昏亂旋運也此非風邪之因火所成者歟然風有內外外入者兼火化者則如是若內發者尤是因火所生之風也及諸篇中考之有謂厥陰司天客勝耳鳴掉眩厥陰之勝者亦然此司天之氣從上受者外入者也又謂發生之紀與歲木運太過皆掉眩巔疾善怒肝肺太過善忘忽忽眩目眩巔疾又徇蒙招尤過在足少陽厥陰者言目

瞤動蒙暗也巢氏亦謂脅下痛頭眩者肝實也此或得於肝臟應天氣者所動或因本臟虛實之氣自動皆名之爲風非火之烈焰何能上於巔也至於木鬱之發甚則耳鳴眩轉目不識人善暴僵仆者尤是肝木中火發之甚也此天氣內應於臟與肝虛實之氣動者是皆名內發之風者也又謂太陽之勝熱反上行頭項項腦中痛曰如脫註文謂寒氣凌逼陽不勝之太陽之氣標在於巔入絡於腦故病如是謂太陽司天善悲時眩仆靈樞謂邪在心者病亦同二者皆是邪逼於心下致神志不安則悲心火不行則妄動上炎謂太陰之復陰氣上厥飲發於中頭項胃痛而掉慄尤甚註文謂濕氣內逆寒氣不行太陽上留故爲是病謂太陰在泉病衝頭痛目似脫註文云亦是足太陽病也謂太陰司天頭項痛善眩靈樞邪在腎頸項時眩此皆濕邪害腎逼太陽之氣留於上而然也至於金匱要略謂心下有支飲其人苦冒眩者亦是格其心火不行而上衝也謂尺脈浮爲傷腎趺陽脈緊爲傷脾風寒相搏食穀即眩謂陽明脈遲食難用飽飽則發煩頭眩二者因脾胃虛而陽氣不足所以外見遲緊之脈內受濕飲之鬱而不足之微陽始與所鬱之熱并而衝上於頭目也用此比類言之則眩運之病非一邪而可終若夫太乙天眞元氣皆得胃脘之陽以行於周身分三陰三陽之經脈六氣應天之陰陽運行於表者謂之六化布五行於五臟屬之氣應地之陰陽運行於裏者謂之五陽雖然表裏固分爲二及乎一經合一臟相通氣而行則表裏必似二而一一而二者也悉如其天之有德有化有用有變於氣交者備在身形之中經曰成敗倚伏皆生於動動之清靜則生化治動之躁亂則苛疾起自此言之掉眩由人氣所動者豈止如金匱所云濕飲而已若此五陽六化妄動而病者又可勝數哉且夫凡有過節即隨其所動經臟之氣而妄起因名曰厥陽之火厥陽之火有五謂之五邪五邪之變逐勝尅之病作又或腎水不足或精血傷敗不能制其五陽之火獨光或中土虛衰不能隄防下氣之逆則龍雷之火得以震動於巔諸火上至於頭重則搏擊爲痛輕則旋轉爲眩運矣夫如是比類之道在經有之諸治病循法守度援物比類化之冥冥循上及下何必守經不引比類是知不明也其此之謂歟或曰治諸邪當何如曰夫火因動而起但各從其所動之因而治之因實熱而動者治其熱因邪搏擊而動者治其邪因厥逆逼上者下治所厥之邪因陰虛而起者補其陰抑其陽按而收之因陽虛而氣浮上者則補其陽斂其浮游之氣因五志而動者各安其臟氣以平之因鬱而發者治其所鬱之邪開之發之因精血不足者補之不已則求其屬以衰之因勝尅而動者從勝衰之氣而補瀉之中氣虛衰而動者補其土以安之上焦清明之氣虛不能主持而動者亦當補中焦之穀氣推而揚之因五臟六腑上注之精氣不足而動者察其何者之虛而補之如是雖不專治其火而火自息矣凡治百病之由火而生者皆然非唯掉眩而已嚴氏云外感六淫內傷七情皆能眩運當以脈證辨之

風則脈浮有汗項強不仁局方消風散本事川芎散羚羊角散都梁丸青州白丸子

寒則脈緊無汗筋攣掣痛不換金正氣散加芎止白芍藥甚則薑附湯濟生三五七散

暑則脈洪大而虛自汗煩悶黃連香薷飲十味香薷飲消暑丸

濕則脈細沉重吐逆涎沫腎著湯加川芎名除濕湯滲濕湯濟生芎朮散

風熱羌活湯鉤藤散

寒濕芎朮除眩湯或理中湯仍吞來復丹甚者養正丹

七情相干眩運欲倒用十四友丸安腎丸二藥夾和以和劑七氣湯送下仍間用乳香泡湯下

有氣虛者乃清氣不能上升或汗多亡陽所致當升陽補氣黃芪人參白朮川芎當歸甘菊花柴胡升麻之類直指方云淫欲過度腎家不能納氣歸元使諸氣逆奔而上此眩運出於氣虛也宜益氣補腎湯

有血虛者乃因亡血過多陽無所附而然當益氣補血芎歸湯之類

中脘伏痰嘔逆眩運旋覆花湯主之金匱方卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者半夏加茯苓湯主之假令瘦人臍下有悸吐涎沫而頭眩此水也五苓散主之又云心下有支飲其人苦冒眩澤瀉白朮湯主之澤瀉五兩白朮二兩水二升煮一升分溫再服支飲之證短氣倚息形如腫是也痰閉不出者吐之

青黛散嚏鼻取涎治眩神效

頭風眩運可用獨聖散吐之吐訖可用清上辛涼之藥防風通聖散加半夏等味仲景云此痰結胃中而

致也

大小便結滯者微利之河間搜風丸

體虛有寒者溫之仲景云風虛頭重眩苦極不如食味暖肌補中益精氣白朮附子湯主之

肝厥狀如痌疾不醒嘔吐醒後頭痛運發熱用麻黃鉤藤皮石膏乾葛半夏麴柴胡甘草枳殼甘菊爲麤末每服四錢水一鍾半生薑三片棗一枚同煎至八分去查溫服

百會疽

或問百會穴生疽何如曰此名玉頂發初如麥米頓增痛楚寒熱大作由虛陽浮泛宜以鹽湯下八味丸引火歸源甚則黑錫丹或元氣素厚六陽經受風邪風火相扇臟腑熱毒上攻而然者宜黃連消毒飲兼玉樞丹勝金丹更以附子切片置湧泉穴灸五壯以洩其毒七日無膿者死

頂門癰

或問頂門生癰何如曰此屬太陽經風熱所致一名佛頂疽穴名上星由臟腑陰陽不調熱毒上壅而成宜服活命飲加苓連梔子藥本清熱之劑及紫金丹烏金散奪命丹汗之虛者十全大補湯加羌活稍遲潰爛黑陷惡證多脈大神昏二便閉結者不治

額疽

或問當額生疽何如曰此屬陽明胃積熱宜服活命飲加升麻桔梗羌活水酒煎服壯實者一粒金丹下之老弱者十全大補湯或十宣散黃芪內托散托之過時潰爛腦髓出者死

太陽疽

或問南太陽生疽何如曰此名勇疽亦名腦發疽屬足陽明胃經狀如伏鼠寒熱併作而目浮腫宜活命飲加升麻桔梗爲金散十一日刺得黃白膿者生清稀黑血者及潰爛透腦者死

鬚毛瘡廣瘡

或問頭上生瘡狀如葡萄痛甚久而無膿何如曰名鬚毛瘡治法與癩頭瘡同必須詳驗其瘡若中陷而四畔高起色如黃蠟者廣瘡也

赤色疽

鬼遺云赤色疽發頭額及腦前并手掌中十日不穴者死七日可刺出赤血七日未有膿不可治也不穴者不作穴而東攻西擊也

癰疽頭痛頭眩用托裏消毒散加減法

初腫頭痛發熱邪在表也加川芎羌活若外邪在表而元氣實者暫用人參敗毒散　頭痛惡寒表虛也去金銀花連翹加參芪　體倦頭痛或眩運中氣虛也去三味加柴胡升麻如不應暫用補中益氣湯加蔓荊子　日晡頭痛或發脏運陰血虛也去三味加熟地黃如不應佐以六味丸　夢泄遺精頭運頭痛或痰喘氣促腎虛不能納氣也去三味併川芎佐以六味丸如不應大虛寒也用八味丸

陳實功外科正宗

頭痛

頭痛者風火濕痰四者皆能致之又楊梅瘡毒上攻亦有此證或婦人產後梳洗當風太早亦致之名曰頭風宜用天麻餅子三聖散二方毋論病之新久受之眞似並效

腦疽論

夫腦疽者俗稱對口是也但所發不同其源有二得於濕熱交蒸從外感受者輕五臟蘊結從內發外者重其理何也濕熱之爲病天行氣候寒暑不調節序溫凉陰陽失度凡有體虛者易於侵襲項後雖屬督脈又主太陽寒水司行之道所有侵襲氣血必凝凝則後必爲腫此從外感受者其患初起有頭疼生正穴二四日間多作癢痛始生寒熱口和而乾色紅根活瘡勢漸高形不散大時止時疼易膿易腐飲食知味起坐尋常外勢雖可畏而內無七惡之證相干此屬陽證其由從外來矣故多不治可愈所有五臟蘊結而成者重其源有五蓋心主血故心緒煩擾煽動不寧以致火旺而沸騰行於項間與寒水交滯而爲腫者一也肝統筋故惱怒傷肝項乃三陽統筋之所肝傷則血脈不潮筋無榮養凝結爲腫故項緊急強痛不能轉側其患未潰前肉色紫暗堅硬漫腫破流血水木痛無膿此等之證皆肝氣受傷者二也脾主肌肉故思慮傷脾脾氣日損又或膏粱損胃胃汁乾枯以致中脘否塞氣不運行逆於肉裏乃生壅腫其患外皮雖腐而內堅不潰口燥舌乾飲食不進根腳走散膿穢色敗此等之證皆脾氣受傷者三也肺主皮毛故憂鬱傷肺肺傷則毛竅閉塞腠理不通氣不舒暢縱橫經絡結而爲腫其形瘡多平陷色淡不華皮腐脂流形如湯潑氣粗短促面微鼻掀咳嗽生痰殷殷發嗽此等之證皆肺氣受傷者四也腎主骨髓故悉慾傷腎腎傷則真陰之氣敗矣真陰一敗相火自生此火最能自升自降或動或靜煎熬藏腑消鑠

津液更變形容改換聲音瘡形紫黑脈數乖度煩躁口乾隨飲隨渴此等之證皆腎氣受傷者五也凡治此證必內分虛實外辨陰陽體順天時察其病理七日以前瘡勢未成者當通竅以汗發之七日以後病勢已成治當兼補以托之此則毒不內攻必無變證如藥攻利太過元氣受傷毒多難出又敷圍涼藥氣血冰凝則肌肉多死反難腐潰予常治此及諸發背初起未成者用披鍼當頂點入知痛處出其惡血通其瘡竅隨插蟾酥條直至瘡底外用膏蓋內服萬靈丹或蟾酥丸發其大汗解散內蘊之毒次日患上或腫或不腫或痛或不痛仍插仍貼直至患頂腫高根脚突起四圍裂縫有膿方住插藥輕淺者九日後吐出病根堅硬不化之物毒甚者不能頓然脫落亦可漸腐成膿爲轉重就輕之良法外用玉紅膏長肉內服補托收斂其患不久自愈如陽證輕淺者候自腐潰不用前法鍼刺如不腫不疼灸亦不痛陰證尤當速用不必遲延此爲移深居淺之大法也

腦疽看法

初起頂高根活色紅皮薄作疼焮熱腫不開散者順已成無論偏正瘡形獻起疼痛發熱易腐易膿者順已潰膿稠肉色紅活瘀腐易脫焮腫漸消痛減者順潰後腐脫新肉便生瘡口漸斂凝結癡膿作痒者順初生一點黃泡或似疙瘩不腫不疼自不知覺者逆已成不發高腫亦不焮痛瘡頂軟陷根脚平散者逆已潰膿清肉色紫黑外皮不腐內生臭穢不食者逆腐肉雖盡新肉不生瘡口散大軟陷無神色敗者逆

腦疽治法

初起有頭或無頭大痛或不痛俱隔蒜灸兼服解毒已成堅硬發熱焮痛口乾便祕者邪在內也宜泄之堅腫不痛發熱惡寒頭疼四肢拘急者兼發表攻裏腫硬日深形色紫黑外皮不腐內膿不潰宜行拔法腫強頭面焮熱口燥惡心嘔吐者邪在上也宜清之焮熱腫痛紅色光亮疼苦有時內膿脹痛者急開之將潰不潰微熱微紅不作腐潰者脾胃虛也宜補之潰後腐肉不脫膿水清稀腫痛仍作者當大養氣血大便多溏小便短濇自汗食少脈細身涼溫中健脾

鬢疽論

夫鬢疽者乃手少陽三焦相火妄動又兼腎水不能制火或外受風熱所感但此經多氣少血肌肉相薄凡有患最難腐潰此皆起於情性急暴房慾血虛火動肝氣凝結而成疽之初起寒熱交作頭眩痛徹太陽甚則耳目連鬢通腫治法不可妄用鍼灸必分陰陽表裏邪正虛實治之庶不有悞且如初見瘡時多寒少熱口乾作渴好飲熱湯六脈虛數無力又兼患上堅硬多不焮痛無潰無膿瘡根流散此等之證乃正氣虛而邪氣實也治以托裏爲主消毒佐之如清肝養血湯托裏消毒散之類是也又見證時熱多寒少頭眩作痛口燥舌乾渴欲飲冷二便祕澀六脈沉實有力瘡亦焮腫疼痛發熱易腐易膿根脚不開腫焮在外此乃正氣實而邪氣虛也治以消毒爲主托裏佐之如梔子清肝湯鼠黏子湯之類是也大抵正氣勝則實邪氣勝則虛必然一勝則一負邪正不並立欲其虛而不待損而自虛矣又有未見瘡時先作渴證或一年半載日久日重然後發爲鬢疽其形色多紫黑瘡多平陷堅硬無膿毒流耳項又兼氣味不正形容不澤精神不明飲食不進者俱爲不治

鬢疽看法

初起無口乾寒熱飲食有味舉止尋常發瘡者順已成瘡頭腫起根脚不散形色紅活焮痛潰膿者順已潰膿稠色鮮紅活腫消痛止項便頭輕口和者順潰後瘀肉易腐新肉易生瘡口易平飲食有味者順初起瘡頭如粟頂軟不高色紫根散木痛食少者逆已成瘡形紫黑軟陷無膿足冷身涼便利脈虛者逆已潰膿水清稀多生臭穢壞肉不腐新肉不生者逆潰後飲食厭餐發熱口乾不眠肉削皮麤者逆

鬢疽治法

初起焮腫堅硬內熱口乾脈數有力邪實也當利之已成增寒壯熱四肢拘急脈浮者邪在表也宜散之赤腫作痛血凝滯也散血清肝色黯漫腫升陽助胃已潰堅腫不退脈細而數日晡發熱者宜滋陰健脾肝膽怒火上攻心煩作躁腮頰紅熱者宜抑陰降火已潰膿清腫痛猶甚虛煩食少者宜養氣血健脾胃潰後氣血俱虛身涼脈細大便多溏者宜峻補溫中潰後不斂新肉生遲瘡口淡白膿水不止健中補脾

蟮拱頭

蟮拱頭俗名腦猪是也患小而稟受悠遠皆父精母血蓄毒而成生後受毒者只發一次其患腫高破之又腫皆稟受時原有皮膜相裹毒雖出而膜未除故愈又發腫甚膿熟者用鍼刺破以三品一條鉛插入孔內化盡內膜自愈又有不膿而不收口者此必風槩患口宜敗銅散搽之兼戒口味自愈

透腦疽

透腦疽發在額上髮際之間多發寒熱頭疼如斫不可忍耐先用萬靈丹發汗解散風邪次宜清托

玉枕疽

玉枕疽生在腦後枕骨中堅而難潰痛引肩項鼻塞氣竄此太陽膀胱濕熱凝滯而成初起有表證者便宜解表有裏證者即與通利潰後宜補托久則宜收斂此爲一定治法不可混亂妄投藥餌致其危亡也

白禿瘡

白禿瘡因腠髮腠理司開外風襲入結聚不散致氣血不潮皮肉乾枯發爲白禿久則髮落根無榮養如禿斑光潤不癢內血已潮以薑蘸潤肌膏常擦其髮漸生禿斑乾枯作癢者內必有蟲宜用麥饘散搽之蟲死風散髮生可愈後忌動風發物等件

醫門法律 臣 喻昌 著

濕熱上干於頭宜審下法

金匱治上焦之濕本內經濕上甚爲熱之義而分輕重二證輕者但發熱面赤而喘頭痛鼻塞而煩邪在上焦裏無別病者但內藥鼻中嚏去濕熱所釀黃水而已以鼻竅爲腦之門戶故即從鼻中行其宣利之法乃最神最捷之法也重者身熱足寒時頭熱面赤皆濕上盛爲熱之明徵濕熱上盛故頭熱面赤目赤濕熱上盛故陽氣上壅不下通於陰而足寒內經原有上者下之之法邪從下而上必驅之使從下出一定之理也其證輕者裏無別病但嚏其黃水從清陽之鼻竅而下出則其重而裏多危證者必驅其黃水從前後二陰之竅而出所可意會也金匱於本文之下增若發其汗者二十四字垂戒初不以下爲戒又可意會也但下法之難不推其所以不可汗之故即不得其所以用下之權仲景以其頭搖口噤背張幾幾陽之欲亡若更發其汗重虛衛外之陽惡寒必轉甚若發汗已其脈如蛇真陽脫離頃刻死矣由是推之濕上甚爲熱之重者非用下法難以更生而下法必以溫藥下之庶幾濕去而陽不隨之俱去耳此非無徵之言也仲景即於本篇申一義云下之額上汗出微喘小便利者死豈非因下而奪其陽之大戒乎

頭眩

諸風掉眩皆屬於肝若木勝則四肢強直而爲掉風動於上而爲眩脾土受邪肝之實也若木衰則血不養筋而爲掉氣虛於上而爲眩金邪乘木肝之虛也因誤汗致心悸頭眩身瞤動無可奈何者用真武湯爲救法夫汗雖出而熱不退則邪未盡而正已大傷況裏虛爲悸上虛爲眩經虛爲瞤身振振搖無往而非亡陽之象所以行真武把關坐鎮之法也

少陰病下利止而頭眩時時自冒者死蓋陽回利止則生若利止更加眩冒則其止也乃陰已先亡故陽無依附浮越於上而神氣散亂時時自冒也

額黑

女勞疸額上黑謂身黃加以額黑也黑爲北方陰晦之色加於南方離明之位此必先有胃熱脾寒之濁氣下流入腎益以女勞無度而後成其由來非一日肘後謂因交接入水所致或有所驗然火炎薪爛額色轉黑雖不入水其能免乎故脾中之濁氣下趨入腎水土互顯之色但於黃中見黑滯耳若相火從水中上炎而合於心之君火其勢燎原烟燄之色先透於額乃至微汗亦隨火而出於額心之液且外亡矣

景岳全書 臣 張介賓 著

頭痛

凡診頭痛者當先審久暫次辨表裏蓋暫病者必因邪氣久病者必兼元氣暫病有表邪者此風寒外襲於經治宜疎散最忌清降有裏邪者此三陽之火熾於內治宜清降最忌升散此治邪之法也其久病者則或發或愈或以表虛者微感則發或以陽勝者微熱則發或以水虧於下而虛火乘之則發或以陽虛於上而陰寒勝之則發所以暫病者當重邪氣久病者當重元氣此固其大綱也然亦有暫病而虛者久病而實者又當因脈因證而詳辨之不可執也

頭痛有各經之辨凡外感頭痛當察三陽厥陰蓋三陽之脈俱上頭厥陰之脈亦會於巔故仲景傷寒論則惟三陽有頭痛厥陰亦有頭痛而太陰少陰則無之其於辨之之法則頭額顳顬雖三陽俱有所會無不可痛然太陽在後陽明在前少陽在側此又各有所主亦外感之所當辨者也至若內傷頭痛則不得以三陽爲拘矣如本經所言下虛上實過在足少陰巨陽若厥病篇所論則足六經及手少陰少陽皆有之矣奇病論曰腦者陰也髓者骨之充也凡痛在腦者豈非少陰之病乎此內外之異不可不察也

外感頭痛自有表證可察蓋其身必寒熱脈必緊數或多清涕或兼欬嗽或兼脊背痠痛或兼項強不可以左右顧是皆寒邪在經而然散去寒邪其痛自止如川芎細辛蔓荊子柴胡之類皆最宜也若寒之甚

者宜麻黃桂枝生薑葱白紫蘇白芷之類隨其虛實而加減用之

火邪頭痛者雖各經皆有火證而獨惟陽明爲最正以陽明胃火盛於頭面而直達頭維故其痛必甚其脈必洪其證必多內熱其或頭腦振振痛而兼脹而絕無表邪者必火邪也欲治陽明之火無如白虎湯加澤瀉木通生地麥冬之類以抑其至高之勢其效最速至若他經之火則芍藥天花粉芩連知蘗龍膽梔子之類無不可擇而用之但治火之法不宜佐以升散蓋外邪之火可散而去內鬱之火得升而愈熾矣此爲忌也

陰虛頭痛即血虛之屬也凡久病者多有之其證多因水虧所以虛火易動火動則痛必兼煩熱內熱等證治宜壯水爲主當用滋陰八味煎加減一陰煎玉女煎之類主之火微者宜六味地黃丸四物湯三陰煎左歸飲之類主之

陽虛頭痛即氣虛之屬也久病者亦有之其證必戚戚悠悠或羞明或畏寒或倦怠或飲食不甘脈必微細頭必沉沉遇陰則痛逢寒亦痛是皆陽虛陰勝而然治宜扶陽爲主如理陰煎理中湯十全大補湯補中益氣湯之類皆可擇用或以五福飲五君子煎加川芎細辛蔓荊子之類以升達陽氣則又最善之治也

痰厥頭痛諸古方書皆有此等名目然以余論之則必別有所兼之因但以頭痛而兼痰者有之未必因痰頭痛也故兼痰者必見嘔惡胃滿骨脹或欬嗽氣粗多痰此則不得不兼痰治之宜二陳湯六安煎和胃飲平胃散加川芎細辛蔓荊子之類主之如多痰兼火者宜用清膈煎或二陳湯六安煎加黃芩天花粉之類主之火甚者加石膏亦可如多痰兼虛而頭痛者宜金水六君煎或六君子湯加芎辛之類酌而用之

頭眩

眩運一證虛者居其八九兼火兼痰者不過十中一二耳原其所由則有勞倦過度而運者有饑飽失時而運者有嘔吐傷上而運者有瀉泄傷下而運者有大汗亡陽而運者有驕目驚心而運者有焦思不釋而運者有被毆被辱氣奪而運者有悲哀痛楚大叫大呼而運者此皆傷其陽中之陽也又有吐血衄血便血而運者有癰膿大潰而運者有金石破傷失血痛極而運者有男子縱慾氣隨精去而運者有婦女崩淋產後去血而運者此皆傷其陰中之陽也再若大醉之後濕熱相乘而運者傷其陰也有大怒之後木肆其強而運者傷其氣也有痰飲留中治節不行而運者脾之弱也此亦有餘中之不足也至若年老精衰勞倦日積而忽患不眠忽苦眩運者此營衛兩虛之致然也由此察之虛實可辨矣即如內經之言亦無非言虛而何後世諸家每多逞臆說其於病情經義果相合否指南若此後學能無誤乎因摘其尤者悉之如左

河間之論眩運獨取至眞要大論一句曰諸風掉眩皆屬肝木風主動故也所謂風氣甚而頭目眩運者由風木旺必是金衰不能制木而木復生火風火皆屬陽陽主乎動兩動相搏則爲之旋轉故火本動也焰得風則自然旋轉也此釋風木之義固然似矣然不知至眞要論之言乃言運氣藏氣所屬之理非所以悉眩運之病情也必若口問篇衛氣篇決氣篇經脈篇海論等議方爲最切最近之論何河間一無引證而獨言風火二字以該眩運一證豈無失乎

又若丹溪之論眩運曰痰在上火在下火炎上而動其痰也此證屬痰者多蓋無痰不能作眩雖因風者亦必有痰挾氣虛者亦宜治痰爲主兼用補氣降火之藥若據此論則凡屬眩運無非痰證也何軒岐之言絕然不及痰飲而但曰上氣不足頭爲之苦傾目爲之眩曰上虛則眩曰督脈虛則頭重高搖之曰髓海不足則腦轉耳鳴而眩冒凡此者豈皆痰證耶又若余前章所列諸證無非眩運之由亦豈皆痰證耶故在丹溪則曰無痰不能作眩當以治痰爲主而兼用他藥余則曰無虛不能作眩當以治虛爲主而兼酌其標孰是孰非余不能必俟明者正之

頭痛之病上實證也頭眩之病上虛證也故內經分別甚明曰頭痛巔疾上實下虛又曰上實下虛爲厥巔疾此以邪氣在上所以爲痛故曰上實也至若眩運之病則曰上氣不足又曰上虛則眩未聞言上之實也而後世諸家如嚴用和楊仁齋輩有曰結而爲飲隨氣上逆者有曰疲勞過度下虛上實者有曰腎家不能納氣使諸家氣逆奔而上者即如朱丹溪亦曰痰在上火在下凡此皆言上實也何與內經相反若此隱此實後人之不明耳夫眩運之證或爲頭重或爲眼黑或爲腦髓旋轉不可以動求其言實之由不過謂頭重者爲上實而不知頭本不重於往日而

惟不勝其重者乃甚於往日耳上力不勝陽之虛也豈上實乎又何氣不歸元及諸氣逆奔之有蓋上實者宜降宜抑上虛者最不宜再伐生氣此上實上虛之旨有不可不辨而誤則害矣

頭眩有大小之異總頭眩也於此察之可得虛實之情矣何以言之如今人之氣稟薄弱者無論少壯或於勞倦或於酒色之後每忽有耳鳴如磬或頭眩眼黑倏頃而止者乃人所常有之事至於中年之外多見眩仆卒倒等證亦人所常有之事但忽運而忽止者人皆謂之頭運眼花卒倒而不醒者人必謂之中風中痰不知忽止者以氣血未敗故旋見而旋止即小中風也卒倒而甚者以根本既虧故遽病而難復即大頭眩也且必見於中年之外而較之少壯益又可知於此察之則其是風非風是痰非痰而虛實從可悟矣何今人不識病機但見眩仆不論等證無不謂之風痰而非消即散吾恐幾微之氣有不堪再加剋削矣深可悲也

論治

頭眩雖屬上虛然不能無涉於下蓋上虛者陽中之陽虛也下虛者陰中之陽虛也陽中之陽虛者宜治其氣如四君子湯五君子煎歸脾湯補中益氣湯如兼嘔吐者宜聖术煎大加人參之類是也

陰中之陽虛者宜補其精如五福飲七福飲左歸飲右歸飲四物湯之類是也

然伐下者必枯其上滋苗者必灌其根所以凡治上虛者猶當以兼補氣血爲最如大補元煎十全大補湯及諸補陰補陽等劑俱當酌宜用之

眩運證凡有如前論首條所載病源者當各因其證求而治之其或有火者宜兼清火有痰者宜兼清痰有氣者宜兼順氣亦在乎因機應變然無不當以治虛爲先而兼治爲佐也

古法之治眩運亦有當察者丹溪曰濕痰者多宜二陳湯火者加酒芩挾氣虛者相火也治痰爲先挾氣藥降火如東垣半夏白朮天麻湯之類

眩運不可當者以大黃酒炒爲末茶湯調下

火動其痰用二陳加黃芩蒼朮羌活散風行濕附錄曰有早起眩運須臾自定日以爲常者正元散下黑錫丹

傷食頭運腎著湯加川芎名除濕湯

有痰者青州白丸子

愚謂古法之治眩運如半夏白朮天麻湯治脾痰也二陳湯加黃芩治熱痰也青州白丸治風痰寒痰也腎著湯治痰也此外如大黃末之治眩運不可當惟痰火上壅者宜之黑錫丹之重墜惟氣實於上者宜之弟恐眩運一證實痰實火者無幾而亦非上盛之病此古方之有宜否用者不可不審

石室祕錄臣陳士鐸著

頭痛治法

常治法者謂以常法而治之者也如人病頭疼則以頭疼常法治之是也何必頭疼而治之於兩足乎雖頭疼實有治之兩足而愈者然彼必常治之而不愈然後以變法治之非可以捨常法而先求之於變法也故一遇頭疼即以川芎五錢白芷蔓荊子甘草半上治者治上焦之證也如頭疼而風入太陽經也用川芎細辛白芷柴胡半夏甘草各一錢芍藥三錢治之蓋風雖犯太陽治法不可全治太陽當上清其邪故用白芷川芎細辛三味以散之又用白芍甘草柴胡以清肝膽之火膽經與肝經入於頭絡故用此數味以散邪去火又加半夏去痰甘草和中相濟而有成也又頭痛一方用川芎一兩蔓荊子二錢水煎服立愈蓋川芎補血蔓荊子去風也

完治者如病頭疼腦痛不必支刀破囫而治之也頭痛用黃酒一升入細辛一兩白芷一兩煮酒一醉而愈

此等治法世人不知亦不敢用今爲開導之頭痛至終年累月其邪深入於腦可知一二錢之散藥安能上至巔頂而深入於腦中必多用細辛川芎白芷以大散之也或疑散藥太多必損眞氣恐頭痛未除而眞氣先行散盡誰知風邪在頭非多用風藥必難成功有病則病受之何畏哉一醉而愈此方信而不必疑者也惟是既愈之後必須用熟地芍藥當歸各五錢川芎一錢山茱萸麥門冬各三錢水煎服四劑爲妙

如人病頭痛者人以爲風在頭不知非風也亦腎水不足而邪火衝入於腦終朝頭運似頭痛而非頭痛也若只治風則痛更甚法當大補腎水而頭痛頭運自除方用熟地萸肉各一兩山茱萸四錢北五味麥冬各二錢元參川芎當歸山藥各三錢二劑即愈此方妙在治腎而不治風尤妙在治腎而兼治肝也肝木不平則肺金失化源之令而腎水愈衰今補肝又

補腎子母相資自然上清頭目況又入麥冬五味以滋肺金之清肅乎所以下喉即安然也

頭痛有神方用川芎沙參各一兩蔓荊二錢細辛五錢水二碗煎八分加黃酒半碗調勻早晨服之一劑未不再疼此方妙在用沙參蓋沙參補陰原不入腦今用於川芎之中而蔓荊細辛直走於巔則沙參不能下行不得不同羣共入於腦中夫腦痛者因腦陰之虛風得留之而不去今補其腦則風不能存而腦痛自愈而頭痛亦除矣此方不特治頭痛兼治腦疼無不神效

頭痛之證止消用蓖麻子一粒搗碎同粟肉此須同搗勻九如黃豆大外用絲綿裹之納入鼻孔少頃必有清涕流出即將丸藥取出不可久放其中頭疼即愈未不再發倘久留在中必致腦髓流出又成不可藥救之證切記切記

如人頭疼法當用輕清之品少少散之無不立效如小柴胡湯之方是也然而小柴胡湯世人不知輕重之法予再酌定之可永爲式方用柴胡黃芩半夏甘草各一錢人參五分此小柴胡湯予更加人參五分茯苓二錢更爲奇妙蓋氣足則邪易出而汗易發世人見用人參便加失邪匪獨醫者不敢用即病者亦不敢服相沿而不可救藥者滔滔皆是安得布告天下醫人詳察其病源而善用之也

腦痛治法

腦痛用黃酒一升白芍三兩辛夷桔梗各三錢郁李仁麥冬柴胡各五錢甘草一錢水三碗煎湯入前酒飲之一醉而愈量好者再飲之以酒必以醉爲度

腦痛之病乃風入膽經也膽應於腦故腦痛人以爲用柴胡太多過於辛散不知有白芍和之則不散氣而轉能散邪辛夷郁仁皆入膽之妙品桔梗甘草又入肺之妙藥膽病何以又兼治肺不知鼻上通於腦腦熱則必下流清水久則必成鼻淵矣兼治其肺則肺氣清肅自去平膽木之旺而清涕不致下行此立方之神妙有如此

頭面腫

有人忽頭面腫如斗大看人小如三寸飲食不思呻吟如睡此痰也用瓜蒂散吐之而頭日之腫消又吐之而見人如故矣後用人參白朮茯苓半夏各三錢甘草一錢陳皮五分水煎服二劑愈

癩頭瘡

有癩頭洗方用蝸牛數十條以癩頭洗之二次必全愈亦神方也水三碗煎蝸牛三十條足矣

頭角生瘡

如人有頭角生瘡當日即頭重如山第二日即變生青紫第三日青至身上即死此乃毒氣攻心而死也此病多得之好吃春藥蓋春藥之類不過一丸食之即強陽善戰非用大熱之藥何能致此世間大熱之藥無過附子與陽起石之類是也二味俱有大毒且陽起石必須火煅而後入藥是燥乾之極自然尅伐津液況窮工極巧於婦女博歡則筋骸氣血俱動久戰之後必大洩盡情水去而火益熾矣久之貪歡必然結成大毒火氣炎上所以多發在頭角太陽之部位也初起之時若頭重如山便是此惡證急不待時速以金銀花一斤煎湯飲之數十碗可少解其毒可保性命之不亡而終不能免其瘡口之潰爛也再用金銀花元參各二兩當歸二兩生甘草一兩煎湯日用一劑服至七日瘡口始能收斂而愈此種病世間最多而人最不肯忌服春藥也痛哉

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百四十五卷目錄

醫部彙考一百二十五

頭門四



方一古鄉古敗散二烏丸鵝頭丸外花酒桂枝芍藥知母湯甘草乾薑湯
茶桂术甘湯半夏加茯苓湯小柴胡湯文蛤散茵陳蒿湯梔石膏散小柴胡湯用芍藥玉真丸用芍石膏湯
梔白木甘草湯小芍藥湯葛根散
一字經金散白附子散上清白附子丸羌活附子湯加味調中益氣湯安神湯羌定風餅子清空膏小清空膏不臥散芍藥湯
加聖餅子三生丸防風散
一粒金丹鳥散又方黃芪益氣湯加味四物湯當歸補血湯
聖散又方芎藭散
參湯固神散防風湯又方茵芋湯鵝頭酒
大三五七散又方茯神湯頭防風散又方摩頂散
入頂散又方杏仁膏大豆酒又方將軍散
又方茵芋湯又方犀角湯防風散菊睿圓
天雄散菊花酒紫石英散
花蛇散芎藭湯香芎丸升麻湯藏用
丸獨聖散大頭病方大頭時氣方頭
通方加味六君子湯補中益氣湯制黃
湯光活膀胱湯荊防敗毒散通聖消毒
散清涼救苦散芎芍散涼中化痰丸
急風散都梁丸雞鳴散
雷砂丸
錢乳丹氣和中湯加味調中益氣湯人參
順氣散芷附丸當歸活血湯本事
方延胡餅子丁香散孔香餅
烏麥餅子天麻羌活丸白术飲淡明散淡痰丸
加味二陳湯十全大補湯白虎湯安神
黃附子細芎湯吳茱萸湯
散清上寫火湯補氣湯又方
石膏散附子散石膏吳茱萸
湯散透頂散大川芎丸神聖散
落調中益氣湯半夏白术天麻湯正元散
來復丹草珠丹
丸子荊花解醒湯

藝術典第一百四十五卷

醫部彙考一百二十五

頭門四

方一

古鄉古敗散中藏經下同

治頭風血風

荊芥穗一斤　乾菊花半斤　白术炒二兩

川芎四兩

右同爲細末食後茶調二錢

二烏丸

治風痰脏運

川烏頭　草烏頭　青鹽各四兩　黑豆半升

右用水二升同煮四味水耗卽以溫水添之候川烏頭半軟四破之更煮以透爛爲度去皮同煎烏頭竝黑豆於石臼或木臼內搗令極爛不見白星卽就丸乾卽以煮藥水添濕同搗煮時留一盡以下水以備添勿令煮乾也丸如梧子大每服三二十丸鹽酒鹽湯任下食前

鵝頭丸聖惠方

治頭風脏運

鵝頭一枚炒黃　眞蔺茹　白术各一兩　川椒半兩炒去汗

右爲末蜜和丸梧子大每酒下二十丸

松花酒奇效良方

治風頭旋腦皮腫痹

松花幷臺春三月取五六寸如鼠尾者不拘多少

右蒸細切一升用生絹囊貯以酒三升浸五日每日空心暖飲五合晚食再服

桂枝芍藥知母湯仲景下同

治中風頭脏短氣溫溫欲吐者

桂枝　知母　防風各四兩　芍藥三兩　甘草　麻黃　附子炮各二兩　白术　生薑各五兩

右九味以水七升煮取二升溫服七合日三服

甘草乾薑湯

治肺中冷頭脏多涎唾

甘草四兩炙　乾薑二兩炮

右㕮咀以水三升煮取一升五合去滓分溫再服

茶桂术甘湯

治痰飲胷脅支滿目脏

茯苓四兩　桂枝　白术各三兩　甘草二兩

右四味以水六升煮取三升分溫三服小便則利

半夏加茯苓湯

治卒嘔吐心下痞膈間有水脏悸者

半夏一升　生薑半斤　茯苓三兩一方四兩

右三味以水七升煮取一升五合分溫再服

文蛤散

治微風頭痛

文蛤五兩

右一味杵爲散以沸湯五合和服方寸匕

茵陳蒿湯

治穀疸頭脏

茵陳蒿六兩　梔子十四枚　大黃二兩

右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味煮取三升去滓分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色

正赤一宿腹減黃從小便去也
硝石礬石散
治女勞疸身盡黃額上黑
硝石　礬石燒等分
右二味爲散以大麥粥汁和服方寸匕日三服病隨大小便去小便正黃大便正黑是候也
小柴胡湯
柴胡半斤　半夏半升　黃芩　人參　甘草　生薑各三兩　大棗十二枚
右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服
茯苓桂枝白朮甘草湯
茯苓四兩　桂枝去皮　白朮　甘草炙各二兩
右四味以水六升煮取三升去滓分溫三服
小芎辛湯濟生
治風寒濕在腦頭痛眩運嘔吐及眉稜眼眶痛
川芎三錢　細辛　白朮各一錢半　甘草一錢
右剉作一貼入生薑五片茶芽少許水煎服
川芎散綱目下同
治偏頭痛神效
甘菊　石膏　川芎　白殭蠶生各六錢
右爲細末每三錢茶清調下
玉眞丸
內經曰頭痛巔疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎許學士曰腎厥頭痛也此藥主之
硫黃二兩　石膏煅　半夏製　硝石各一兩
右爲末薑汁糊和丸梧子大陰乾每二三十九薑湯或米飲下
川芎石膏湯
治熱厥頭痛
川芎　石膏各等分
右剉水煎服
喝起散本草
治風寒頭痛孀人血風攻腦忽運倒
蒼耳嫩心陰乾
爲末酒服二錢此藥多達腦蓋善通頂門末服煎服皆佳
川芎茶調散得效下同
治偏正頭痛及頭風鼻塞聲重
薄荷二兩　川芎　荊芥各一兩　羌活　白芷
甘草各五錢　防風　細辛各二錢半
右爲末每二錢食後茶清調下或剉取七錢作一貼入茶少許煎服亦佳偏頭痛取細末以葱涎調貼兩太陽穴特效
一字輕金散
治偏正頭風痛夾腦風眉稜骨痛牽引兩眼抽掣疼痛迸出或生翳膜視物不明
川芎　白芷　藁香　荊芥　旋覆花　石膏
防風各五錢　南星　川烏生各二錢半　草烏一錢半
右剉細共搗爲末每一字茶清調下神效偏頭一邊痛鼻塞不聞香臭服此藥數次嚏出一涎稠膿卽愈
白附子散
治風寒入腦令腦逆頭痛齒亦痛或牽引兩眼遂至失明
白附子一兩　麻黃留節　川烏　南星各五錢
全蝎五箇　乾薑　硃砂　麝香各二錢半
右爲末溫酒調五分服服訖去枕臥少時效
上清白附子丸
治風痰盛頭痛目眩旋運欲倒嘔噦惡心神思昏憒常服除風化痰清利頭目
白附子炮　半夏製　川芎　甘菊花　南星炮
白殭蠶炒　陳皮去白　旋覆花　天麻各一兩
全蝎炒半兩
右爲末薑汁浸蒸餅和丸梧子大薑湯下三十丸
定風餅子
治痰厥頭痛嘔吐眩運
川烏　川芎　南星　半夏　白茯苓　白附子
乾薑　天麻　甘草生用各等分
右爲末薑汁糊和丸芡實大捏作餅子硃砂爲衣每一餅細嚼薑湯下
加味調中益氣湯東垣下同
治氣血俱虛頭痛其效如神
黃芪蜜炒一錢　人參　蒼朮　甘草炙各七分
陳皮　當歸身　川芎各五分　木香　葵荊子
細辛　柴胡　升麻各三分
右剉作一貼水煎服
安神湯
治氣血虛而有火頭痛頭旋眼黑
黃芪一錢半　羌活　黃藥酒浸各一錢　柴胡

升麻　生地黃酒浸　知母酒浸各五分　防風二分半　生甘草　炙甘草各二分

右兌水煎數沸入川芎蔓荊子各三分再煎至半食後溫服東垣丹溪治虛熱頭痛大率皆以酒芩酒連酒蘗加風劑也

羌活附子湯

治大寒犯腦令人腦痛齒亦痛名曰腦風

麻黃　附子　防風　白芷　白殭蠶炒各一錢

黃蘗炒　羌活　蒼朮各七分　黃芪炙　升麻　甘草炙各五分

右剉作一貼食後水煎服若有寒嗽加佛耳草三分

清空膏

即古方追涎藥治風濕熱偏正頭痛

黃芩三兩半生半酒炒　甘草炙一兩半　防風　羌活　黃連酒炒各一兩　柴胡七錢　川芎五錢

右爲末每二錢茶清調成膏臨臥抹口內少用白湯送下此膏治諸般頭痛皆效惟血虛頭痛從魚尾相連痛者不治

小清空膏（丹溪下同）

治證同上

片芩細切酒拌曬乾

右爲末茶清調下二錢酒亦可

不臥散

治頭痛不可忍

延胡索七枚　青黛二錢　猪牙皂角二兩

右爲末用水調成小餅子如杏仁大令病人仰臥以水化開以竹管送入男左女右鼻孔中覺藥味至喉少酸令病人坐口咬銅錢一箇涎出盈盆即愈

如聖餅子

治風寒伏留陽經氣厥痰厥一切頭痛

天南星　乾薑　川芎　川烏　生甘草各一兩

半夏製　天麻　細辛　防風各五錢

右爲末薑汁麵糊和丸芡實大捏作餅子每五餅細嚼茶清溫酒任下

三生丸（得效方下同）

治痰厥頭痛

半夏　白附子　天南星各等分

右爲末薑汁浸蒸餅和丸菉豆大食後薑湯下四五十丸

防風散

治積熱上衝頭痛如火

羌活　防風　當歸　生大黃　川芎　山梔子　薄荷各一錢　蟬殼　甘草各五分

右剉作一貼入燈心二十莖苦竹葉十片水煎服

太陽丹

腦寒之病皆因邪攻於上焦令人頭痛晝夜不寧此藥主之

龍腦二錢　石膏二兩　川芎　川烏炮　白芷　甘草各一兩

右爲末煉蜜同麪麴糊和勻每一兩作十八丸黃丹爲衣每服二三丸食後以葱茶煎湯嚼下

芎烏散（入門下同）

治頭痛

川芎　烏藥各等分

右爲末每二錢以燒秤錘淬酒調服亦治產後頭痛

又方

治感寒濕眩運頭極痛

川芎二錢　白朮炒　附子生各一錢　甘草生　橘皮各五分

右剉作一貼入薑七片棗二枚水煎服

一粒金嚏鼻法

治風涎偏正頭痛

蓽撥末三錢入猪膽內拌勻候乾　川芎　白芷　藁本　青黛　延胡索各二錢

右爲末水和爲丸如芡實大令病人臥用一丸水化灌入鼻中覺藥味至喉少酸令病人坐口咬銅錢一箇當涎出盈盆即愈

當歸補血湯（醫鑑）

治血虛頭痛

生乾地黃酒炒　白芍藥　川芎　當歸　片芩酒炒各一錢　防風　柴胡　蔓荊各五分　荊芥　藁本各四分

右剉作一貼水煎服

七生丸（同春下同）

治男女八般頭風及一切頭痛痰厥腎厥傷寒傷風頭痛並治

川芎　川烏　草烏　南星　半夏二味洗去滑　白芷　石膏俱生用等分　加細辛　全蝎各減半

右爲細末研取韭菜自然汁和丸梧子大噐生葱茶清送下七丸或九丸

黃芪益氣湯

治氣虛頭痛

黃芪蜜炒一錢　人參　白朮　半夏製　陳皮各七分　當歸酒洗　川芎　藁本　甘草各五分　黃蘗酒炒　升麻　細辛各三分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

加味四物湯

治血虛陰火上衝頭痛

當歸　川芎　生乾地黃　黃蘗　知母　黃芩　黃連已上五味俱酒炒　蔓荊子　梔子炒各七分

右剉作一貼水煎服

六聖散

諸頭痛總治之要藥也治頭風牙痛赤眼腦瀉耳鳴偏正頭風疼鼻塞聲重

乳香　沒藥　川芎　雄黃　白芷各二錢　芒硝五錢

右爲末令病人仰臥口含凉水取藥少許噴入鼻內即效

四神散良方下同

治婦人血風眩運頭痛

甘菊　當歸　旋覆花　荊芥穗各等分

右爲末每二錢葱白三寸茶末一錢煎水調下

芎辛導痰湯

治痰厥頭痛

半夏製二錢　川芎　細辛　南星炮　陳皮　赤茯苓各一錢　枳殼麩炒　甘草各五分

右剉作一貼薑七片水煎服

芎藭酒千金方下同

治腦風頭重頸項强眼眩疏淚出善欠目欲眠睡憎風劇者耳鳴滿眉眼疼悶吐逆眩倒不自禁諸風乘虛經五臟六腑皆爲癲狂諸邪病悉主之

芎藭　辛夷　天雄　人參　天門冬　柏子仁　磁石　石膏　茵芋　山茱萸　白頭翁　桂心　秦艽各三兩　松蘿　羚羊角　細辛　薯蕷　葛蒲　甘草各二兩　雲母一兩燒令赤末爲粉

防風四兩

右二十一味㕮咀以酒二斗漬七日初服二合漸加至五合日三有女人少時患風眩發則倒地爲婦積年無兒服此酒并將紫石門冬丸服之眩瘥生兒平復

人參湯

治頭眩屋轉眼不開

人參　當歸　防風　黃芪炙　麥門冬　芎藥各二兩　獨活　白朮　桂心各三兩

右九味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

防風湯

治風眩嘔逆水漿不下食輒嘔起卽眩倒發有時手足厥冷

防風　防己　附子炮　乾薑　甘草生各一兩　桂心　蜀椒各二兩

右七味㕮咀以水四升煮取一升分二服日三古今錄驗有白朮一兩　又方

治頭風眩欲倒眼旋屋轉腦痛

防風　枳實　杏仁研　芎藭各三兩　白茯神　前胡　生薑　半夏　麻黃各四兩　細辛二兩

竹瀝三升

右十一味㕮咀以水六升合竹瀝煎取二升七合分三服頻服三兩劑佳

茵芋湯

治風虛眩眼暗

茵芋一兩　人參　甘草　蓯蓉　黃芪　茯苓　泰艽　厚朴　烏喙各二兩　防風六兩　山茱萸　枳實各三兩

右十二味㕮咀以水一斗煮取二升半分五服强者一日夜盡劇劣分五服二日盡

鴟頭酒

治風頭眩轉面上遊風

飛鴟頭五枚　獨活二兩　茯神　防風　芎藭　薯蕷各四兩　葛根　桂心　遠細辛　人參　天雄炮　乾薑　枳實　貫衆　蜀椒各三兩　山茱萸一升　麥門冬　石楠各五兩

右十八味㕮咀絹裹盛清酒四斗漬六宿初服二合日再服稍加以知爲度一本無茯神麥門冬石楠有天門冬石膏

大三五七散

治頭風眩運口喎目斜耳聾

天雄炮　細辛各三兩　山茱萸　乾薑各五兩　薯蕷　防風各七兩

右六味治下篩酒服五分匕日再不知稍加

小三五七散

治頭風目眩耳聾

天雄炮三兩　薯蕷七兩　山茱萸五兩

右三味治下篩以清酒服五分匕日再不知稍增以知爲度

茯神湯

治風眩倒屋轉吐逆惡聞人聲

生薑三兩　茯神　獨活各四兩　遠志　防風

黃芪製各五兩　甘草炙　人參　當歸　牡蠣

白朮　蓯蓉　附子各二兩

右十三味㕮咀以勞水一斗二升煑取三升服五合一日夜盡

防風散

治頭面風在眉間得熱如蟲行或頭眩運目中淚出

防風五兩　桂心　天雄　細莘　朱砂　乾薑

人參　烏頭炮　附子炮各二兩　莽草　茯苓

當歸各一兩

右十二味治下篩酒服方寸匕日三

又方

治風頭眩惡風吐冷水心悶

防風二兩　澤瀉　天雄　細莘　附子　薯蕷

茯苓各一兩　白朮土炒二兩半　桂心一兩半

乾薑半兩

右十味治下篩酒服方寸匕常令酒氣相接則脫巾帽解髮梳頭百過復投一升酒便洗手足須臾自熱解髮以粉粉之快然便熟眠愈亦可洗頭面汗出一本有澤蘭無澤瀉

又方

治風眩翻倒無定

獨活六兩　石膏　蒴藋各四兩　枳實三兩

右四味㕮咀以清酒八升煮取四升頓服之以藥滓熨頭覆眠取汗覺冷又內鐺中炒令熱熨之一本有楮實無枳實

又方

治患頭眩運經久得瘥後四體漸羸食無味好食黃土

麴二斤　白朮三斤

右二味爲末酒和併手丸如梧桐子大曝乾飲服三十丸日三斷食土爲效

又方

治頭中五十種病

巴戟天　白菊花　芎藭　乾薑　防風　石楠

白朮　烏頭炮　附子炮　細莘　薯蕷　蜀椒

人參　桔梗　秦艽　澤瀉　甘草生　天雄炮

栝蔞根　山茱萸　乾地黃　羌活各等分

右二十二味治下篩以酒服方寸匕日三

摩頭散

治同前

蘭茹　半夏　蜀椒各六分　烏頭炮八分　桂心七分　莽草四分　附子炮　細莘各一兩

右八味治下篩以大酢和摩頭記日數三日頭膚痛四五日後一著藥如前十日以酢漿洗頭復摩藥即愈若生息肉併喉咽中息肉大如棗欲塞以藥摩之即愈耳鼻齒有疾並用之良

入頂散

治頭面脹滿腦瘈偏枯發作有時狀似刀刺失聲陰陰然疼面目變青

山茱萸　芎藭　防風　獨活各一兩半　細莘

莽草　白朮　薯蕷　牛膝　石楠　甘草生各一兩　烏頭炮　通草　菖蒲　附子炮　麻黃

天雄炮　蜀椒　桔梗各一兩六錢

右十九味治下篩酒服方寸匕日三

杏仁膏

治上氣頭面風頭痛胷中氣滿賁豚氣上下往來心下煩熱產婦金瘡諸病

杏仁二升去皮尖雙仁者不用

右一味搗研以水一斗濾取汁令盡以銅器盛置煻火上從旦煑至日入當熟如脂膏下之空腹酒服一方寸匕日三不飲酒者以米飲服之愼猪魚蒜酢

大豆酒

治頭風

大豆二升炒令無聲

右一味先以一斗二升瓶盛清酒九升乘豆熱即傾著酒中密泥頭七日溫服之

又方

治中風頭痛發熱耳頰急

麻黃　葛根　石膏　桂心各三兩　附子炮

芍藥　甘草　秦艽　防風各二兩　生薑五兩

右十味咬咀以水一斗煮取三升分三服溫覆取汗

薯蕷散

治頭目有風牽引目睛疼痛偏視不明

薯蕷三兩　細辛一兩半　秦艽　天雄各二兩
獨活　桂心　山茱萸各二兩半

右七味治下篩酒服方寸匕日三

又方

治頭中痛身熱風熱

竹瀝三升　升麻　生薑　杏仁各三兩　芍藥
柴胡各四兩　石膏　生葛根各八兩

右八味咬咀以水六升合竹瀝煮取二升七合分三服

菊花散

治頭面遊風

菊花一兩　細辛　附子　桂心　乾薑　巴戟
人參　石楠　天雄　茯苓　秦艽　山茱萸
防己　防風　白朮　薯蕷各三兩　蜀椒五合

右十七味治下篩酒服方寸匕日三

又方

治頭面上風

松脂　石鹽　杏仁　蜜蠟爲末各一兩　薰陸香
二兩　蓖麻仁三兩

右六味熟搗作餅淨剃百會上髮貼藥餅上安紙
三日一易若瘡刺藥上不久風定

頭風散

治頭風

附子一枚中形者　鹽如附子大

右二味治下篩沐頭竟以方寸匕摩頂上日三

沐頭湯

治肺勞熱不問冬夏老少頭生白屑搔癢不堪然
肺爲五藏之蓋其勞損傷肺氣衝頭頂致使頭癢
多生白屑搔之隨手起人多患此皆從肺來世呼
爲頭風也

大麻子　秦椒各三升　皂莢屑五合

右三味熟研內泔中漬一宿去滓以木匕攪百徧
取勞乃用沐頭髮際更別作皂莢湯澡之然後敷
膏

又方

治證同上

甘菊花　獨活　茵芋　防風　細辛　蜀椒
皂莢　杜蘅　莽草　桂心

右十味各等分可作湯沐及熏之

又方

治證同上

猪椒根三兩　麻黃根　防風各二兩　細辛
茵芋各一兩

右五味咬咀以水三斗煮取一斗去滓溫以沐頭

犀角湯

治風毒熱頭面腫

犀角屑　生薑各二兩　苦參　栝蔞根　防風各
一兩　石膏六兩　竹葉二握　黃芩　青木香
升麻各三兩　防己一兩半

右十一味咬咀以水七升煮取二升分三服相去
十里久內消不利

防風散

治頭面徧身風腫

防風一兩　白朮三兩　白芷一兩

右三味治下篩酒服方寸匕日三

續命湯

治風脏發則煩悶無知口沫出四體角弓目反上
口噤不得言

竹瀝一升五合　生地黃汁一升　生薑　防風
麻黃各四兩　龍齒煅四兩　防己三兩　附子炮
三分　石膏十兩　桂心二兩

右十味咬咀以水一斗煮取三升分三服有氣加
附子一兩紫蘇子五合橘皮半兩已服續命湯口
開四肢尚未好定而心中尚不除者紫石湯主之
方見後紫石煮散是也

小續命湯

防風一錢二分　桂枝　杏仁去皮尖炒研　川芎
酒洗　白芍酒炒　人參　甘草炙　麻黃　黃芩
酒炒　防風各八分　附子四分

右爲末每服三錢加薑棗煎

薯蕷湯

治心中驚悸而四肢緩頭面熱心胷痰滿頭目眩
目如欲搖動

薯蕷　麥門冬　人參各四兩　生地黃　前胡
芍藥各八分　枳實　遠志去心　生薑各三分
茯苓　茯神各六分　半夏五分　甘草　竹葉各
二分　黃芩二分　秫米三合

右十六味咬咀取江水高舉手揚三百九十下量取三斗煮米減一斗內半夏復減九升去滓下藥煮取四升分四服無江水處以千里東流水代之攪手令上頭也泰中無江水涇渭水可用諸葛灌劍猶尚取之

防風湯

服前湯後四體尚不涼冷頭目眩轉者服之此湯大勝宜長將服但藥中小小消息隨冷暖耳仍不除癒者依此方

防風　石膏　人參　赤石脂　生薑　寒水石　龍骨　茯苓各三分　桂心二分　紫石一分

右十味咬咀以水八升煮取三升分三服凡用井華水者取清淨也今用江水無泥又無砂穢源泉遠涉順勢歸海不逆上流用以治頭必歸於下也

薯蕷圓

治頭目眩冒心中煩鬱驚悸狂癲

薯蕷二十八分　甘草二十分　大豆黃卷七分　鹿角膠　桂心各七分　乾地黃　神麴　當歸　人參各十分　麥門冬　防風　黃芩　芎藭　白朮各六分　柴胡　桔梗　白茯苓　芎藭　杏仁各五分　白斂　乾薑各三分　大棗一百枚取膏

右二十二味爲末合白蜜棗膏丸如彈丸先食服一丸日三

天雄散

治頭目眩運屋轉旋倒

桂心三分　天雄　防風　芎藭　人參　獨活　葛根各三分　莽草四分　白朮　遠志　薯蕷　茯神　山茱萸各六分

右十三味治下篩先食以菊花酒服方寸匕日二漸加至三匕以知爲度

菊花酒

治頭面病

九月九日取甘菊花曝乾

右一味爲末以米釀中蒸作酒

紫石英散

治頭眩運大人風引小兒驚癇瘛瘲日數十發醫所不療者

紫石英　滑石　白石脂　凝水石　赤石脂　石膏各六兩　甘草　桂心　牡蠣粉各五分　大黃　龍骨　乾薑各四兩

右十二味治下篩爲粗散盛以韋囊懸於高涼處欲用取三指撮以新汲井水三升煮取一升二合大人頓服未百日兒服一合未能者縣沾著口中熱多者日四五服以意消息

升麻湯　局方

治頭痛

升麻　蒼朮各一兩　荷葉一箇全者

右爲細末每服五錢水一盞煎七分溫服食後或臨臥

白花蛇散　總錄下同

治腦風疼痛時作時止及偏頭風

白花蛇酒浸去皮骨一兩　石膏　荊芥各二兩　天南星漿水煮軟切炒一兩　地骨皮二錢半

右爲末每服一錢茶下日三服

芎黃湯

治頭目眩運

大黃　荊芥穗　川芎　防風各等分

右爲粗末大作劑料水煎去滓服之以利爲度

香芎丸

治頭痛

香附子炒　川芎　石膏水飛　白芷　甘草　薄荷已上各一兩　川烏半兩炒去皮臍

右爲細末每服二錢溫酒茶清調下無時

搜風丸

一名人參半夏丸治頭痛眩

蛤粉二兩　人參　茯苓　藿香　薄荷　南星各半兩　半夏　乾薑　生礬　凝水石各一兩

右爲細末與藏用丸末各中停水丸如豌豆大每服三十丸生薑湯下

藏用丸

大黃　黃芩各二兩　滑石　黑牽牛各四兩

右爲末水丸桐子大每服五七十丸食後溫水下

獨聖散　元戎下同

一名瓜蒂散治頭痛服藥鍼灸久不愈者以其濕氣在上也

瓜蒂不拘多少

右爲細末每服一錢或二錢蘿汁調下服之或用少許吹入鼻中清水徐徐出一晝夜濕盡痛止一方加麝金少許

大頭病方

兼治喉痹

人間治疫有仙方一兩殭蠶二大黃薑汁爲丸如彈大井花調蜜便清涼

大頭時氣方

馬牙硝　寒水石　鼠黏子　鬼臼　川大黃　鬼箭草各等分　腦子少許

右七味爲細末用新井華水一盞藥末一二錢入腦子喫外一半留用新水調稠雞翎掃在腫處在風涼處坐

頭運方丹溪下同

治痰火眩運清火利痰極效

南星　半夏　甘草　桔梗　陳皮各一錢　枳殼七分　茯苓　黃芩各八分

右咀水二盞薑七片煎八分食後服

加味六君子湯

治氣虛痰甚風邪眩運不休者

人參　白朮　茯苓各一錢　陳皮　半夏各一錢五分　荊芥穗　甘草各五分

右水二盞薑三片棗二枚煎一盞去滓入竹瀝二匙溫服

補中益氣湯

治煩勞內傷身熱心煩頭痛惡寒懶言惡食脉洪大而虛或喘或渴或陽虛自汗或氣虛不能攝血或瘧痢脾虛久不能愈一切清陽下陷中氣不足之證

黃芪蜜炙錢半　人參　甘草炙各一錢　陳皮　白朮土炒　當歸各五分　升麻　柴胡各三分

薑三片棗二枚煎頭痛加蔓荊子痛甚加川芎腦痛加藁本細莘

荊黃湯

治風熱眩運

大黃酒炒　荊芥穗　防風各二錢

右剉水煎服以利爲度

羌活勝濕湯醫統下同

治脊臂項强腰如折項如拔上衝頭痛此足太陽經不行此藥主之

羌活　獨活各一錢　藁本　防風各一錢五分　川芎　荊子　炙甘草各四分

右水二盞煎八分食後溫服

荊防敗毒散

治大頭天行時疫頭痛發散瘟邪

荊芥穗　防風　羌活　獨活　前胡　枳殼炒　茯苓　薄荷　炙甘草　川芎　牛蒡子　桔梗　人參各等分

水煎服內熱加黃連渴加天花粉

通聖消毒散

治時行疫癘頭面腫盛目不能開鼻塞口乾舌燥內外有熱或咽喉腫痛不利或內實大便不利煩躁脉洪數

防風　荊芥穗　牛蒡子　甘草　川芎　當歸　白芍藥　黃芩　薄荷　梔子　桔梗　滑石末　麻黃憎寒拘急無汗脉浮數者用之　連翹　芒硝大便堅實者加之　大黃酒浸內實大便堅硬者用之內虛大便溏者不可用

右水煎溫服細呷之

清涼救苦散

治大頭瘟腫甚者以此藥敷之

芙蓉葉　霜桑葉　白蘞　白芨　大黃　黃連　山慈姑　赤小豆　黃芩　黃蘗　白芷　雄黃　芒硝　南星　金線重樓各等分

右爲末蜜水調敷腫處以翎頻掃之

莘芎散

治熱痰壅塞頭目不清語音不出服藥不解乃是熱兼風痰所致服此即愈

細莘　川芎　防風　桔梗　白朮土炒　羌活　桑白皮炒　薄荷葉各一兩　甘草五分

右水二盞薑三片煎八分食後溫服

溫中化痰丸

治停痰留飲胷膈痞滿頭目眩運惡心咳嗽痰涎等證

陳皮　青皮　良薑　乾薑炮各二兩

右爲細末酢煮糊丸梧桐子大每服三十丸空心米飲送下

急風散

治男婦偏正頭痛夾腦頭風太陽穴痛坐臥不安生川烏去皮臍　辰砂研各一兩　南星洗二兩

右爲細末酒調塗貼痛處小兒貼顖門

都梁丸百一選方

治風吹項背頭目昏眩及腦痛婦人胎前產後傷風頭痛

白芷大塊白者洗去土淨沸湯泡四五次剉用

右剉以蘿蔔汁浸曬乾爲末煉蜜丸如彈子大每

服一丸細嚼以茶清或荊芥湯下

九龍丸（聖惠）

治婦人男子八般頭風一切頭痛

川芎　川烏　石膏　白芷　草烏　南星　半夏各半兩　細辛　全蝎各二錢半

右爲末韭汁丸梧桐子大每服五十丸茶清下

牙皂散（本事方）

治偏正頭風痛

猪牙皂角去筋　香白芷　白附子各等分

右爲末每服二錢食後茶清調下右痛右側臥左痛左側臥

飛虎散（良方下同）

治風熱痰火偏正頭風疼痛

白附子　白芷　荊芥　石膏煅　川芎　天麻　薄荷　防風各半兩　蒼术米泔浸　兩頭尖黑心者不用各一錢

右爲細末每服一錢食後溫酒或茶清調下

通天散

治偏正頭痛并夾腦風熱壅滯

赤芍藥　川芎　黃連　黃芩　延胡索　皂角　當歸　乳香各等分

右爲末用紙撚蘸藥入鼻中得噴神效

靈砂丹（俗藥）

治風熱鬱結氣血蘊滯頭目昏眩鼻塞聲重清涕口苦舌乾咽燥不利胃腑痞悶咳嗽痰實腸胃燥澀小便赤黃陰虛心火熾甚及偏正頭痛遍身痲木痛癢一切風證竝宜治之

明天麻　獨活　羌活　細辛　石膏煅　防風　連翹　薄荷各二兩　川芎　梔子　荊芥穗　大黃生　當歸　黃芩　全蝎去毒微炒　菊花　人參　白术各五錢　甘草生　寒水石生　桔梗各二兩　砂石二錢半　滑石四兩

右爲末煉蜜和勻朱砂二兩爲衣每兩作十九每服一丸細嚼茶清下

青火金針

治頭風牙痛赤眼腦瀉耳鳴

火硝一兩　青黛　薄荷　川芎各等分

右爲末口噙冷水勿嚥此藥吹鼻

赤火金針

治同前

火硝一兩　雄黃　乳香　沒藥　川芎　石膏各一錢　全蝎一對

用法如前

升氣和中湯（寶鑑）

治年高氣弱清氣不能上升頭昏悶本無表邪因發汗數次表氣愈虛故苦頭痛惡風不喜飲食氣短脈弱弦細而微宜升陽氣

黃芪錢半　人參一錢　白术　陳皮　當歸　白芍藥各五分　甘草　升麻　柴胡各三分　川芎　細辛　蔓荊子各一分

右咀水二盞煎一盞食後溫服

加味調中益氣湯（東垣）

治氣血兩虛頭痛其效如神

陳皮　黃蘗酒炒各二分　升麻　柴胡各四分　人參　甘草炙　蒼术各六分　黃芪一錢　川芎六分　細辛二分　蔓荊子三分　當歸一錢

右咀水二盞煎一盞溫服

人參順氣散（活人）

治頭痛憎寒壯熱四肢疼痛

麻黃　乾葛　甘草炙　白术炒　人參　桔梗　白芷各一錢　白薑炮五分

右咀分二服水一盞薑三片葱白二寸同煎連進取汗

葱附丸（嚴氏）

治元氣虛壅上攻頭痛

大附子一箇製

右爲末葱汁爲丸梧桐子大空心茶下

當歸酒（元戎）

治血虛頭痛欲裂

當歸一兩　酒一升

煮取六合服

珍珠散

治風熱上攻頭痛目眩鼻塞用此嚏之

盆硝七錢半　滑石一兩　乳香五分　冰片少許

右研勻用一字口含水嚏鼻中

本事方

治八般頭風

草烏尖　細辛各等分　黃丹少許

右爲末嚏鼻立效

延胡餅（秘方）

治頭痛不可忍

延胡索十枚　猪牙皂角肥實者二枚　青黛二錢
右爲末水和成小餅子如杏仁大用時令患人仰臥以水化開用竹管送入男左女右鼻中覺藥至喉小酸令患人坐却令咬定銅錢一箇於當門齒當見涎出成盆便愈

丁香散（良方下同）

治頭痛不止

丁香一錢　白芷半兩　瓜蒂一兩
右爲細末用半字吹入鼻即瘥

乳香餅

治氣攻頭痛不可忍者

乳香一錢　蓖麻子十四粒
右同搗爛作餅貼太陽穴上如痛定急去之解開頭髮出氣

決明散

治頭痛

決明子爲末
水調貼太陽穴一方用決明築梳去頭風明目

烏麥餅子

治久病頭痛諸藥不效

烏麥麵半斤　吳茱萸二兩
爲末和勻水調作餅子入鑿上鑿熟乘熱分頭髮蓋在頭上如帽子外以厚帛包裹一時熱氣入腦而痛即止冷則去之未愈更換熱者無不愈也

天麻羌活丸

治頭目風眩邪氣鼓作或時旋運

明天麻　羌活　白芷　藁本　芎藭　白芍藥　麻黃　細辛各二兩　牛黃　麝香並另研各一分
右爲細末煉蜜爲丸皂角子大不拘時薄荷煎酒下一二丸

白朮飲

治風邪在胃頭旋不止復加嘔逆

白朮土炒　厚朴薑製　甘菊花各半兩　防風
白芷　人參各一兩
右咀每服五錢水盞半薑五片煎八分食遠服

滾痰丸

治痰火頭眩目運如坐舟車胷滿背脹一服立止

青蒙石煅酢淬七次一兩　沉香五錢　黃芩
大黃酒蒸各半斤
右爲細末滴水如梧桐子大每服七八十丸量人強弱加減

加味二陳湯

治氣鬱痰火眩運

甘草五分　陳皮　半夏　人參　茯苓　黃芩
川芎各一錢
右水二盞薑三片煎七分木香五分磨汁兌入藥內食後服

十全大補湯

治氣血兩虛頭眩運痛

人參　白朮炒　茯苓　甘草炙　熟地黃酒洗
川芎　芍藥炒　黃芪　當歸酒洗　肉桂各等分
右咀每服八錢水二盞薑三片棗一枚煎服

茯神湯

治七情所感氣血不足臟氣不行鬱而生涎結爲痰飲留於心經則有怔忡四肢緩弱頭目眩運

人參　黃芪製　半夏　麥門冬　山藥　前胡
熟地黃各一錢　枳殼一錢五分　甘草炙七分
遠志甘草水煮薑汁炒七分　茯苓　茯神各二錢
右作二服水盞半薑五片秫米一小撮煎一盞服

麻黃附子細辛湯（仲景下同）

治傷寒少陰頭痛始得之反發熱脈沉者

麻黃　細辛各二兩　附子一枚炮
先煮麻黃去沫納諸藥煎

吳茱萸湯

吳茱萸一升　人參三兩　生薑六兩　大棗十二枚
右四味以水五升煮取二升溫服七合日三服

白虎湯

知母去皮一兩半　甘草一兩　糯米一合　石膏四兩亂紋者另爲末
右剉如麻豆大粳米拌勻另水一盞煎至六分去查溫服無時日三四服或眩嘔者加半夏半兩薑汁製過用之

安神散（東垣下同）

黃芪　羌活　黃蘗酒炒各一兩　防風二錢半
知母酒炒　生地黃酒浸　柴胡　升麻各五錢
炙甘草　生甘草各三錢
每服半兩水二盞煎至一盞半加蔓荊子半錢川芎三分再煎至一盞臨臥去查熱服東垣丹溪治虛熱頭痛大率皆以酒芩酒連酒蘗加風劑也

清上瀉火湯

昔有人年少時氣弱常於氣海三里節次灸之約五七十壯至年老添熱厥頭痛雖冬天大寒猶喜寒風其頭痛則愈微來煖處或見煙火其痛復作五七年不愈皆灸之過也

羌活三錢　酒知母　酒黃芩各一錢半　黃芪炙甘草　酒黃蘗各一錢　防風　升麻各七分　柴胡五錢　藁本　酒黃連　生地黃　生甘草各五分　川芎　荆芥穗各二分　蔓荆子　蒼朮當歸各三分　細辛　紅花各少許

右剉如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞去查稍熱食後服

補氣湯

服前藥之後服此藥

黃芪八分　甘草炙　當歸各二錢　細辛少許　柴胡　升麻各二分　麻黃炒　苦丁香各五分

右水煎服

川芎散 實鑑下同

治頭風偏正頭痛昏眩妙方

川芎　細辛　羌活　槐花　甘草炙　香附子　石膏各半兩　荆芥　薄荷　菊花　防風去叉　茵陳各一兩

右爲末每服二錢食後茶清調下日三服忌動風物

石膏散

治證同上

川芎　石膏亂紋好者　白芷各等分

右爲細末每服四錢熱茶清調下

荆芥散 本事

治頭風

荆芥　石膏煆存性等分

右爲細末每服二錢薑三片葱白三寸和鬚使水一盞煎至七分食後服

又方

治一切頭疼並皆治之

茵陳揀淨五兩　麻黃　石膏煆存性各二兩

右爲末每服一錢臘茶調下食後服服畢仰臥箐時

麻黃吳茱萸湯 東垣

蒼朮一錢　麻黃　羌活各五分　藁本　柴胡　升麻　黃芪蜜製　當歸　黃蘗　黃連　黃芩各二分　半夏　川烏頭　蔓荆子各一分　吳茱萸三分　紅花　細辛各少許

水二盞煎至一盞去查食遠稍熱服

透頂散 本事

治偏正頭風夾腦風并一切頭風不問年深日近

細辛表白者三莖　瓜蒂七箇　丁香三粒　糯米七粒　腦子　麝香各一黑豆大

右將腦麝乳鉢內研極細却將前四味研勻另自治爲末然後入乳鉢內溫起腦麝令勻用瓦罐子盛之謹閉罐口患人隨左右嗞之一大豆許良久出涎一升許則安

大川芎丸 河間下同

治頭風旋運眩急外合陽氣風寒相搏胃腑痰飲偏正頭疼身體拘倦

川芎一斤　天麻四兩

右爲末煉蜜丸每兩作十丸每服一丸細嚼食後茶酒下

神聖散

治腦風邪氣留連不散項背怯寒頭痛不可忍者

麻黃去節　細辛去苗　乾葛生一半炒一半　藿香葉各等分

右爲末每服二錢煮荆芥薄荷酒調下茶調亦得並治血風證

乳香壺落散 實鑑

治男子婦人偏正頭疼不可忍者

御米殼去蔕四兩　陳皮　甘草炙　桔梗去蘆　柴胡去苗各一兩

右爲細末每服二錢水一鍾入燈心十莖長四指同煎七分去查食後溫服

順氣和中湯 綱目

治氣虛頭痛

黃芪一錢半　人參一錢　白朮　陳皮　當歸芍藥各五分　甘草炙　升麻　柴胡各三分　蔓荆子　川芎　細辛各二分

水二盞煎至一盞去查食後溫服一服減半再服而愈

玉壺丸 和劑

治風痰吐逆頭痛目眩胷膈煩滿飲食不下及咳嗽痰盛嘔吐涎沫

天南星　半夏生各一兩　天麻半兩　頭白麪三兩

右爲細末滴水爲丸如梧桐子大每服三十丸用水一大盞先煎令沸下藥煮五七沸候藥浮卽熟漉出放溫別用生薑湯下不計時候服局方有白朮五錢雄黃水飛三錢半亦名玉壺丸治證同

水煮金花丸 濂古

治證同上

南星生　半夏生各一兩　天麻　雄黃各一錢　白麪三兩

右爲細末滴水爲丸每服五十丸至百丸先煎漿水沸下藥煮令浮爲度漉出淡漿水浸另用生薑湯下本草有寒水石一兩煅

調中益氣湯 東垣下同

治頭眩

黃芪一錢　人參　炙草　當歸　白朮各半錢　白芍藥　柴胡　升麻各三分　五味子十五粒　橘皮二分

水二盞煎至一盞去查食後溫服

半夏白朮天麻湯

治頭眩

天麻五分　半夏湯洗錢半　白朮一錢　人參　蒼朮　黃芪　澤瀉　茯苓各五分　乾薑三分　神麯一錢炒　橘皮　大麥蘗各錢半　黃蘗二分

右㕮咀每服半兩水二盞煎至一盞去查食前熱服一服而愈

正元散

治下元氣虛臍腹脹滿心脅刺痛泄利嘔吐自汗陽氣甚微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋久下冷利少氣羸困一切虛寒頭旋目眩

紅豆炒　乾薑炮　陳皮留白各三錢　甘草炙　人參　白朮　茯苓去皮各二兩　肉桂去麤皮　川烏炮去皮尖各半兩　附子炮去皮尖　烏藥　山藥薑汁浸炒　川芎　乾葛各一兩　黃芪炙一兩半

右爲細末每服三錢水一盞薑三片棗一枚鹽少許煎七分食前溫服常服助陽消陰正元氣溫脾胃進飲食

來復丹 和劑

治上盛下虛裏寒外熱伏暑泄瀉如水頭痛目眩硝石一兩同硫黃爲末入磁碟內以微火炒用柳篦攪不可火太過恐傷藥力再研極細名二氣末太陰元精石研飛　舶上硫黃透明者各一兩　五靈脂水澄去砂曬乾　青皮去白　陳皮去白各二兩

右用五靈脂二橘皮爲末次入元精石末及前二氣末拌勻好酢打糊爲丸豌豆大每服三十丸空心米飲下

茸硃丹 襲氏

治頭眩

好辰砂　草烏　瞿麥　黃藥子各一兩

右爲麤末磁碗一箇以薑汁塗炙數次入砂在內上鋪諸藥復以盞蓋了撅一小坑安碗在內用熟炭五斤煆令火盡吹去草藥灰取辰砂研細或只獨用辰砂末每服一錢半淡薑湯下或加用鹿茸猛去毛切片酒浸爲末三兩和黃犢肉丸如梧桐子大每服三四十丸人參湯下空心服熟砂有毒更宜斟酌

鉤藤散 本事

治肝厥頭運清頭目

鉤藤鉤　陳皮　半夏　麥門冬　茯苓各一兩　石膏　人參　菊花　防風各半兩　甘草二錢半

右爲粗末每服四錢水一鍾半薑七片煎八分溫服

治中湯 良方

治頭眩

人參　乾薑　白朮土炒各三錢　甘草炙一錢　青皮　陳皮各一錢五分

水二鍾煎一鍾不拘時服

紅丸子 和劑

壯脾胃消宿食去膨脹止眩運

京三稜浸軟切片　蓬莪朮煨　青皮去白　陳皮去白各五斤　乾薑炮　胡椒各三斤

右爲末用酢麪糊丸如梧桐子大攀紅爲衣每服三十丸食後薑湯送下小兒臨時加減與服

葛花解醒湯 東垣

治飲酒太過嘔吐痰逆頭目痛眩心神煩亂胷膈痞塞手足顫搖飲食減少小便不利

青皮去瓤三錢　木香五分　橘紅　猪苓去皮

人參　茯苓各一錢半　神麯炒　澤瀉　乾薑
白朮各二錢　白豆蔻　葛花　砂仁各五錢
右爲極細末每服三錢白湯調服但得微汗則酒
病去矣此蓋不得已而用之豈可恃此酗飲成病
自損元氣惟病酒者宜之

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百四十六卷目錄
醫部彙考一百二十六
頭門五
方二 宣竅散 蘇子降氣湯 養正丹 開痞散 川芎散 蜜人 嗏鼻藥 如聖散 白芷散 既濟解毒湯 瓜蒂神祐散 大 倒散 一滴金丸 治八般頭風方 沖和膏 斗門頭 又方 治頭風髓子 秘方 痛方 茶調散 茶酒散 川芎散 菊花散 大追 風散 止痛太陽丹 仙靈脾湯 點頭散 芎藭丸 胡 盧巴丸 細辛散 芎藭湯 透頂散 酒方 清震湯 茶調散 神芎丸 烏荊丸 愈風餅子 黑白散 京膈散 黑錫丹 普濟消毒飲子
青州白丸子 天麻半夏湯 人參前胡湯 養正丹 香橘飲 滋陰健脾湯 芎朮湯 人參 補虛飲 防風散 清神養榮湯 沃雪湯 防風飲子 川芎丸 川芎散 芎歸散 川芎散
羌活湯 蔓荊子散 羌活湯 芎朮除眩湯 益氣補腎湯 補腎養榮湯 芎歸湯 中丸 荻灰湯 柴胡半夏湯 玉液湯 防己散 羚羊湯 人參丸
蘇痰丸 天南星丸 青黛散 神芎散 卷 金散 防風通聖散 搜風丸 白朮附子湯
沉香磁石丸 控涎丹 選奇湯 上清散 胃風湯 丸 咏 羌活湯 麻黃湯 桂枝湯
桂枝麻黃各半湯 十味香蘇飲 人參半 夏丸 芎芷香蘇散 折法半夏湯 川芎散 人參消風散 萬全散 七神散 芎芷 紅豆散 四君子湯 六君子湯 五苓散 升麻湯 芎
逍遙散 導痰丸 二陳湯 香蘇散 芎附飲 十四友 一字散
丸 勢羊角散 消風散 澤瀉白朮湯 黃 連香蘇飲 組傳經驗方 加減芎芷湯 葡 花茶調散

藝術典第一百四十六卷
醫部彙考一百二十六
頭門五
方二
沉香降氣散 約 說
治陰陽壅滯氣不升降頭目不清或痛或眩胃膈痞塞喘促短氣
沉香二錢八分　砂仁七錢半　甘草炙五錢半
香附子鹽水炒去毛六兩二錢五分
右爲極細末每服二錢入鹽少許沸湯調服不拘時淡薑湯下亦得
蘇子降氣湯 和劑局方 下同
治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛頭目痛眩胃膈噎塞并久年肺氣至效
紫蘇子炒　半夏湯泡各二錢半　前胡去蘆
甘草炙　厚朴去皮薑製炒　陳皮去白各一錢
當歸去蘆一錢半　沉香七分
水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服虛冷人加桂五分黃芪一錢
養正丹
治上盛下虛氣不升降元陽虧損氣短身羸頭旋屋轉及中風涎潮不省人事傷寒陰盛自汗脅青婦人血海久冷
水銀　黑鉛去滓淨秤與水銀結砂子　硫黃研
朱砂研細各一兩
右用黑盡一隻火上鎔黑鉛成汁次下水銀以柳條攪次下朱砂攪令不見星子放下少時方入硫黃末急攪成汁和勻如有餘以醋灑之候冷取出研極細煮糯米糊丸菉豆大每三十九鹽湯棗湯任下
既濟解毒湯 寶 鑑
治上熱頭目赤腫而痛胃膈煩悶不得安臥身半以下皆寒足脈尤甚大便微祕
大黃酒煨大便利勿用　黃連酒炒　黃芩酒炒
甘草炙　桔梗各二錢　柴胡　升麻　連翹
歸身各一錢
右�咀作一服水二鍾煎至一鍾去查食後溫服忌酒濕麵大料物及生冷硬物
白芷散 東垣 下同
治風頭痛嗆鼻
石膏打碎　芒硝　香白芷　鬱金各二錢
薄荷三錢
右爲細末口含水嗆鼻若證在太陽加羌活二錢防風一錢紅豆二粒爲末嗆之
川芎散
治頭痛
蔓荊子　川芎各一錢二分　鬱金　芒硝
細辛根各一錢　石膏一錢三分　薄荷葉二錢
紅豆一粒　青黛二錢半
右爲末擂鼻 丹 溪
瘦人擂鼻藥
治頭痛
軟石膏　砂硝各半錢　腦子　檀香皮　荊芥
薄荷葉各一錢　白芷　細辛各三錢

右爲細末嗡鼻
如聖散寶鑑
治眼目偏痛頭風
麻黃灰半兩　盆硝二錢半　麝香　腦子各少許
右爲細末嗡之
又方
治證同上
楊梅青　硝石　伏龍肝
各等分爲末嗡鼻
瓜蒂神妙散初問
治偏正頭目昏眩及偏正頭痛
焰硝　雄黃　川芎　薄荷葉　道人頭即香耳子
藜蘆各一分　天竺黃一錢半
右爲細末口內含水鼻中嗡一字神驗
火筒散初虞世
治頭風
蚯蚓糞四錢　乳香二錢　麝香少許
右爲末用紙筒自下燒上吸煙嗡鼻內
一滴金丸奇效良方
治首風及偏正頭風
人中白　地龍各一錢
右爲細末用羊膽汁和丸如芥子大每用一丸新汲水一滴化開滴入兩鼻中
治八般頭風本事方
草烏尖　細辛等分　黃丹少許
右爲細末用葦管嗡入鼻中
斗門方
治卒頭上痛
皂莢
右爲末吹鼻嚏即止
又方聖惠下同
治風頭痛每天欲陰風雨先發者
桂心一兩
爲末以酒調如膏用傅頂上幷額角
治頭風餅子
五倍子　全蝎　土狗各七箇
右爲末醋調作如錢大餅子發時再用醋潤透貼
太陽穴上炙熱貼之仍用帕子縛之吸濃茶睡覺即愈
冲和膏元珠下同
治偏正頭風腦痛幷眼痛者
紫荊皮炒五兩　獨活去節炒三兩　白芷　苦蒲各一兩　赤芍藥炒二兩
右爲末葱頭煎濃湯調塗
祕方茶調散
治風熱上攻頭目昏痛及頭風熱痛不可忍
片芩二兩酒拌炒三次不可令焦　小川芎一兩
荊芥穗四錢　白芷五錢　細茅茶　薄荷各三錢
頭纐及腦痛加細辛藁本蔓荊子各三錢右爲細末每服二三錢用茶清調下
茶調散子和
治頭痛頭眩
瓜蒂不拘多少　好茶中停
右爲細末每服二錢薑汁調下空心用之
川芎散奇效良方下同
治風盛腦壅鼻塞清涕濕氣上攻眼目多淚生瞆及偏正頭痛
川芎　柴胡各二錢　細辛　半夏麴　甘菊花
人參　前胡　防風　甘草炙各一錢　薄荷少許
右作一服水二鍾薑三片煎至一鍾食後服
菊花散
治風熱上攻頭痛不止
甘菊花　旋覆花並去梗　防風去蘆　蔓荊子
枳殼去瓤麩炒　川羌活去蘆　石膏　甘草炙各一錢半
右作一服水二鍾薑五片煎一鍾不拘時服
大追風散
治久新偏正頭疼肝臟久虛血氣衰弱風毒上攻頭目眩運心煩百節痠疼鼻塞聲重項背拘急皮膚瘙癢面上遊風狀若蟲行一切頭風兼治婦人血風攻注此藥消風化痰清利頭目
川烏炮去皮臍　防風　川芎　荊芥　石膏煅
白殭蠶炒去絲　甘草炙各一兩　白附子炮
全蝎去毒炒　羌活　地龍去土炒　天南星
天麻　白芷各五錢　乳香研　沒藥研　雄黃
草烏炮各二錢半
右爲細末每服半錢臨睡細茶湯調服
止痛太陽丹
治頭痛
天南星　川芎各等分
右爲細末用連鬚葱白同搗爛作餅貼太陽痛處

點頭散
治偏正頭疼常服除根
川芎二兩　香附子四兩炒去毛
右爲細末每服二錢食後用茶清調服

芎犀丸
治偏正頭疼一邊鼻不聞香臭常流清涕或作臭氣一陣服芎蝎等藥不效者服此不十服愈及治噴嚏稠濃
川芎　朱砂研內以一兩爲衣　石膏研各四兩
人參　茯苓　甘草　細辛各二兩　犀角生
片腦研　梔子各一兩　阿膠炒一兩半　麥門冬去心三兩
右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸或二丸食後細嚼茶酒任下

葫蘆巴丸
治氣攻頭痛如破
蘆葫巴炒　三稜剉醋浸炒乾　乾薑炮各一兩
右爲細末每服二錢不拘時溫生薑湯或溫酒調服及治癖瘧痰後頭痛

細辛散 東垣
治火逆頭痛
柴胡二錢　白芍藥　生黃芩各五分　黃芩酒炒一錢　瓦粉　細辛各二分　甘草炙一錢半
每服三錢水煎食後溫服

仙靈脾浸酒方
治偏頭風手足不遂皮膚不仁
仙靈脾一斤
右細剉以無灰酒二斗浸之春五夏三秋七冬十日取出藥每日隨性煖酒飲之常令醺醺不得大醉酒盡再合合時忌雞犬見之

清震湯 保命集
治雷頭風頭面疙瘩憎寒拘急發熱狀如傷寒
升麻　蒼朮米泔浸一宿各四錢　荷葉一箇全者
用水二鍾煎八分食後服

茶調散
一名二仙散治證同上
大黃　黃芩各二兩　牽牛　滑石各四兩
右爲細末滴水爲丸如小豆大溫水下十五丸每服加十丸以利爲度日三服

神芎丸 和劑
治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫或有瘡癤咽膈不利大小便閉澀一切風熱之證並宜服之
大黃生　黃芩各二兩　牽牛生　滑石各四兩
黃連　薄荷葉　川芎各半兩
爲末滴水丸梧桐子大每服五十丸食後溫水送下

烏荊丸 和劑方
治諸風縱緩言語謇澀偏身痲痛皮膚搔癢并婦人血風頭疼眼運及腸風臟毒下血不止或病風攣搐頭領寬緩不收六七服瘥
川烏炮去皮臍一兩　荊芥穗二兩
右爲末醋糊丸如梧桐子大每服二十丸酒湯任下有疾食空時日進三四服無疾早晨一服

愈風餅子 和劑
川烏炮半兩　川芎　甘菊花　白芷　防風　細辛　天麻　羌活　荊芥　薄荷　甘草炙各一兩
右爲細末水浸蒸餅爲劑捏作餅子每服三五餅細嚼茶酒送下不計時候

涼膈散
治大人小兒煩躁熱渴頭眩面熱唇焦咽燥舌腫喉痹目赤鼻衄頷頰結硬口舌生瘡譫語狂妄腸胃燥澀便溺閉結睡臥不安一切風壅
梔子仁　連翹　薄荷　黃芩　甘草各一兩半
大黃　芒硝各半兩
右爲粗末每一兩水二盞竹葉七片煎至一盞去滓入蜜少許食後服加薑煎亦得去六經熱減大黃芒硝加桔梗甘草人參防風治肺經邪熱咳嗽有痰加半夏涼膈與四物各半服龍盆血洩熱名雙和散錢氏去連翹加藿香石膏爲瀉黃散寶鑑連翹四兩硝黃各二兩餘各一兩

黑錫丹 和劑方
治眞頭痛
沉香　附子製去皮臍　葫蘆巴酒浸炒　肉桂各半兩　茴香炒　破故紙　肉豆蔻煨　金鈴子蒸去皮核　木香各一兩　黑錫去滓　硫黃各二兩
與黑錫結砂子
右爲末同研勻酒煮麪糊和丸如梧桐子大陰乾以布袋擦令光瑩每服四十九空心鹽鹽湯送下一方有陽起石半兩巴戟一兩

普濟消毒飲子 東垣
治大頭病
黃芩　黃連各半兩　人參三錢　橘紅　元參　柴胡　桔梗　甘草生各二錢　連翹　鼠黏子　板藍根　馬屁勃各一錢　白殭蠶炒　升麻各七分
右共爲細末用湯調時時服或拌蜜爲丸噙化或加防風薄荷川芎當歸身咬咀如麻豆大每服五錢水煎去查熱服之食後時時服之如大便硬加酒煨大黃一錢或二錢以利之腫熱甚者宜砭刺之

黑白散 古
治大頭病如神
烏黑蛇酒浸　白花蛇去頭尾酒浸　雄黃二錢
大黃煨半兩
右爲極細末每服一二錢白湯調無時

青州白丸子 和劑方
治男婦手足癱瘓風痰壅盛嘔吐涎沫昏運欲倒及小兒驚風婦人血風
半夏七兩水浸洗　南星三兩　白附子二兩
川烏半兩去皮臍竝生用
右爲末以生絹袋盛於井華水內擺出如未出者更以手搓出如有滓更研再入絹袋擺盡爲度置磁盆中日曬夜露至曉撮去荷水別用井水攪又曬至來日早再換新水攪如此法春五日夏三日秋七日冬十日去水曬乾後如玉片研細以糯米粉煎粥清丸棗豆大薑湯下二十丸無時如癱瘓風溫酒下小兒驚風薄荷湯下三五丸

天麻半夏湯 醫學綱目
治風痰眩運欲吐
天麻　半夏製各一錢　橘皮　柴胡各七分　黃芩酒炒　白茯苓　前胡　甘草炙各五分　黃連三分
右剉作一貼入薑二片水煎服

人參前胡湯 丹溪心法下同
治風痰頭運目眩
半夏麴一錢　紫蘇　枳殼　赤茯苓　南星炮　前胡　橘紅　甘草炙各八分　木香　人參各三分
右剉作一貼入薑五片水煎服

補虛飲
治氣鬱涎盛面熱忪悸及風虛眩運
人參　麥門冬　山藥各一錢　白茯苓　茯神各八分　半夏製　黃芪各七分　熟地黃　前胡各五分　枳殼　遠志薑製　甘草炙各三分
右剉入薑五片秫米一撮水煎溫服

香橘飲
治氣虛眩運
半夏製二錢　陳皮　白茯苓　白术炒各一錢　木香　丁香　縮砂研　甘草炙各五分
右剉作一貼入薑五片水煎服

滋陰健脾湯 同春
治臨事不寧眩運嘈雜此心脾虛怯也此治氣血虛損有痰飲作眩運之仙劑
白术炒一錢五分　陳皮鹽水洗去白　半夏製　白茯苓各一錢　當歸　芍藥　生地黃各七分　白茯神　人參　麥冬　遠志製各五分　川芎　甘草各三分
右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

芎术湯 醫學入門
治目雨中濕頭重鼻塞眩運
川芎　白术　半夏薑製各二錢　甘草炙五分
右剉作一貼入薑七片水煎服

川芎丸 丹溪心法下同
清頭目止旋運消風化痰
桔梗五兩　川芎　薄荷各三兩二錢半　細辛　防風　甘草各一兩二錢半
右爲末蜜和每一兩半作五丸每一丸茶清嚼下

防風散
治頭目不清或眩運去風明目
防風　川芎　白芷　甘菊　甘草各一兩
右爲末每二錢茶清調下

清神養榮湯 集略
清頭目聰耳竅助精神止眩運
麥門冬　當歸各一錢二分　川芎一錢　薄荷　甘菊　羌活　梔子各五分　白芷七分　甘草四分　升麻二分
右剉作一貼薑三片茶一撮煎服

沃雪湯 類聚
治頭目昏眩精神不爽咽乾鼻塞薄荷三兩　甘草一兩四錢　天花粉二錢七分

荊芥穗　白鹽各一兩二錢　縮砂一錢
右爲末每一錢湯點服
川芎散（醫學正傳）
治頭目不清利或眩運
酒炒黃連　酒炒片芩各一兩　羌活　生甘草
防風　藁本　升麻各五錢　柴胡三錢半　川芎
錢半　生乾地黃　甘草各七錢半
右爲末每二錢食後茶清調下
川芎散（本事方）
治風眩頭運
山茱萸一兩　山藥　甘菊花　人參　小川芎
茯神各半兩
右爲細末每服二錢酒調下無時日三服不可誤
用野菊花
芎藭散
治風頭旋眼目昏痛眩運倦怠心忪
芎藭　前胡　白殭蠶炒　人參各一兩　蔓荊
天麻酒浸焙　防風去叉各半兩
右爲細末每服二錢食後溫酒調下
防風飲子
療風痰氣發即頭旋嘔吐不食
防風　人參　橘皮各二兩　生薑四兩　白朮
茯神各三兩
右剉碎以水六升煮取三升去滓分溫四服一日
令盡忌醋桃李雀肉蒜麪
羌活湯（東垣）
治風熱壅盛上攻頭目昏眩

羌活　防風　黃芩酒洗各一兩　柴胡七錢
黃連酒煮一兩　黃蘗酒炒　瓜蔞酒洗各半兩
甘草炙七錢　白茯苓五錢　澤瀉三錢
右爲粗末每服五錢水煎取清或先臥後食通口
熱服之日二服
仙朮芎散
治風熱壅塞頭目運眩消痰明耳目清神
川芎　連翹　黃芩　山梔子　菊花　藿香葉
防風　酒大黃　當歸　白芍藥　桔梗各七分
石膏　滑石各一錢半　蒼朮　甘草各一錢
薄荷葉　縮砂仁　荊芥各四分
右作一服水二鍾煎至一鍾食後服
蔓荊子散
治風頭旋運悶起則欲倒
蔓荊　甘菊花　半夏湯泡　羚羊角屑　芎藭
枳殼麩炒　茯神去木　黃芩　防風各七錢半
麥門冬去心焙　石膏各一兩　地骨皮　赤箭
細辛　甘草炙各半兩
右㕮咀每服三錢水一盞生薑半兩煎至六分去
查不拘時溫服忌熱麪飴糖羊肉
羌活湯
治風頭眩筋脈拘急痰涎壅滯肢節煩疼
羌活　前胡去苗　石膏研　芎藭　枳殼麩炒
茯苓去皮　黃芩去黑心　甘菊花　細辛去葉
防風　甘草炙剉　蔓荊子　麻黃去根節煮掠去
沫焙各一兩
右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片雞蘇二葉同
煎至七分去查不拘時服
芎朮除眩湯（直指方）
治感濕感寒頭重眩運
附子生　白朮　川芎各半兩　官桂　甘草炙各
二錢半
右剉每服三錢薑七厚片同煎食前服
益氣補腎湯
治氣虛眩運
人參　黃芪各一錢二分　白朮二錢　山藥
山萸肉各一錢半　白茯苓一錢　甘草炙五分
水二鍾棗二枚煎八分食前服
補肝養榮湯
治血虛眩運
當歸　川芎各二錢　甘菊花一錢　甘草五分
芍藥　熟地黃　陳皮各一錢半
水二鍾煎八分食前服若腎虛氣不降者去菊花
入前補腎湯
芎歸湯
治產後去血過多眩運不省及傷胎崩中金瘡拔
齒去血過多懸虛心煩眩運頭重目暗舉頭欲倒
川芎　當歸各等分
每服五錢水煎不拘時服
守中丸
一名五芝地仙金髓丸治風頭眩腦轉目系急忽
然倒仆
人參　白朮　甘菊花　枸杞子　山藥各二兩
白茯苓去皮十兩　麥門冬去心三兩　生地黃二

十斤絞取汁
右爲細末先用生地黃汁於銀器內入酥二兩白蜜二兩同煎逐旋掠取汁上金花令盡得五升許於銀器內拌炒前七味藥漸漸令盡候乾入白蜜同搗數千杵丸如梧子大每服五十丸空心溫酒送下服百日後五臟充滿肌膚滑潤此藥須擇四季旺相日或甲子日修合

旋覆花湯 濟生

旋覆花　半夏　橘紅　乾薑各一兩　檳榔　人參　甘草　白朮各半兩

右剉每服一兩薑水煎服

柴胡半夏湯

治風證不敢見風眼澀頭痛有痰眼黑惡心兀兀欲吐風來覺皮肉緊手足重難舉居暖處有微汗便減如見風即復作一名補肝湯

柴胡　蒼朮各錢半　半夏二錢半　升麻五分　白茯苓二錢　炒麴　藁本各一錢

右作一服水二鍾薑五片煎至一鍾食遠服

玉液湯

治七情所傷氣鬱生涎隨氣上逆頭目眩運心嘈忪悸眉稜骨痛

半夏肥大者六錢湯泡七次切作片

右作一服水一鍾半生薑十片煎至八分去查入沉香末少許不拘時溫服

漢防己散

治上焦風痰攻注頭目旋運心神煩亂

漢防己　麥冬去心焙　前胡各一兩　旋覆花　半夏製　防風　細辛　甘草炙各半兩　人參　赤茯苓　芎藭　羚羊角屑　枳實麩炒　荊芥各七錢五分

右㕮咀每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去查不拘時溫服忌飴糖羊肉

羚犀湯

治暗風頭旋眼黑昏眩倦怠痰涎壅盛骨節疼痛

細辛半兩　羚羊角屑　旋覆花　紫菀　石膏　甘草炙各一兩　前胡七錢半　犀角屑二錢五分

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎七分去查食後溫服

人參丸

治風頭旋目眩痰逆惡心胃膈痞滯咳嗽痰涎喘滿嘔逆不欲飲食

人參　白朮土炒　旋覆花炒　甘草炙各一兩　麥冬焙　枳殼麩炒　前胡各二兩　木香半兩

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服五十丸食後溫生薑湯下

祛痰丸

治風頭旋痰逆惡心胃膈不利

南星生　半夏生　赤茯苓去皮　陳皮去白　乾薑炮各等分

右爲細末麵糊丸如梧子大每服五十丸不拘時溫米飲送下

天南星丸

治風虛痰頭目旋運肢節拘急

南星炮　附子炮去皮臍　白附子炮　旋覆花　細辛　半夏湯泡　芎藭各半兩　天麻一兩

右爲細末麪糊丸如梧子大每服三十丸加至五十丸不拘時用荊芥薄荷煎湯下

青黛散 千金

治頭痛眩運

豬牙皂角一箇　延胡索一分　青黛少許

右爲末水調豆許鼻內灌之其涎自出先仰臥灌鼻候喉中酸味卽起身涎出口咬錢銅一文任流下

神芎散

治一切風熱上攻頭目眩痛上壅鼻塞并牙關悶痛

川芎　鬱金　荊芥　薄荷　紅豆各等分

右爲細末入盆硝研勻鼻內嗑之力慢加藥

鬱金散

治頭痛眩運

鬱金　滑石　川芎各等分

右爲細末每服一二錢空心用蔥汁調服此木鬱達之之法也若胃中有宿痰宜瓜蒂散吐之

防風通聖散 河間 下同

治頭痛

防風　川芎　當歸　芍藥　大黃　麻黃去節　薄荷　連翹　芒硝各半兩　滑石三兩　甘草二兩　石膏　黃芩　桔梗各一兩　荊芥　白朮　梔子各二錢半

右爲末每服二錢水一大盞生薑三片煎至六分溫服涎嗽加半夏製半兩不可無生薑同煎

搜風丸

治邪氣上逆風熱上攻頭目眩運大小便祕結

人參　薄荷　茯苓　南星各半兩　牽牛二兩

蛤粉　大黃　黃芩　滑石各二兩　寒水石

半夏　乾薑　白礬生各一兩　藿香二錢五分

右爲末滴水丸小豆大每服十丸生薑湯下加至二十丸日三服

白朮附子湯仲景

治風虛頭重眩苦極不知食味

白朮二兩　附子一兩半炮去皮　甘草炙一兩

每服五錢薑五片棗一枚水一鍾半煎至七分去滓溫服

沉香磁石丸

治上重下虛頭目眩運耳鳴耳聾

沉香別研　蔓荊子　青鹽研　甘菊花各半兩

巴戟去心　胡盧巴　山藥炒　陽起石火煅研

川椒去目炒　山茱萸去核　附子炮去皮臍

磁石火煅醋淬細研水飛各一兩

右爲細末用酒煮米糊和丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心用鹽湯送下

控涎丹三因方

治痰眩

甘遂去心　紫大戟去皮　白芥子眞者各等分

右爲末麥糊丸如桐子大臘乾臨臥淡薑湯或熱水下五七丸至十丸痰猛氣實加丸數不妨

選奇湯東垣

治風火頭痛眩運

酒黃芩一錢冬不用如能食熱痛者加之　防風　羌活　甘草各三錢夏生冬炙

每服三錢水煎稍熱食後時時服

上清散奇效良方

治頭痛眉骨痛眼痛不可忍者

川芎　鬱金　芍藥　荊芥穗　芒硝各半兩

薄荷葉　乳香　沒藥各一錢　片腦半錢

右爲細末每用一字鼻內嚏之若眉心井眉梁骨疼者用二陳湯煎飲下青州白丸子立驗

胃風湯東垣

胃風者胃虛而風邪乘之也風屬肝木能尅脾土故頭痛眩此方主之

柴胡　羌活　草豆蔻　藁本　蒼朮　蔓荊子

黃蘗　當歸　炙草各五分　麻黃不去節　葛根

各一錢　升麻　白芷各一錢二分

加薑棗煎

九味羌活湯元素

治傷寒傷風憎寒壯熱頭痛身痛項痛脊强嘔吐口渴太陽無汗及感冒四時不正之氣溫病熱病

羌活　防風　藁本各錢半　細辛五分　川芎

白芷　生地黃　黃芩　甘草各一錢

加生薑葱白煎

如風證自汗者加白朮黃芪

食滿去地黃加枳殼桔梗

喘加杏仁

夏加石膏知母

汗下兼行加大黃

麻黃湯仲景下同

治傷寒太陽證邪氣在表發熱頭痛身痛腰痛骨節痛項背强惡寒惡風

麻黃去節三兩　桂枝二兩　杏仁去皮尖及雙仁者七十枚　甘草炙一兩

先煮麻黃數沸去沫內諸藥煎熱服覆取微汗中病卽止不必盡劑無汗再服

桂枝湯

治太陽中風陽浮而陰弱發熱頭痛自汗惡風惡寒鼻鳴乾嘔

桂枝　芍藥　生薑各三兩　甘草炙二兩　大棗十二枚

熱服須臾啜熱稀粥以助藥力溫覆取微似汗不可令如水淋漓汗出病差停後服服一劑盡病證猶在者更作服

桂枝麻黃各半湯

卽桂枝麻黃二湯合爲一方也

右服法同桂枝湯

十味香蘇飲百一

消暑氣和脾胃清頭目止痛眩

香薷一兩　人參　陳皮去白　白茯苓　白朮

乾木瓜　白扁豆炒去殼　黃芪　厚朴薑汁製炒黑色　炙甘草各半兩

右爲細末每服二錢不拘時熱湯或冷水調下

人參半夏丸資鑑

化痰墜涎止嗽定喘療風痰食痰一切痰逆嘔吐痰厥頭痛或風氣偏正頭痛或風塞頭目昏眩或

耳鳴鼻塞咽乾胃腸不利
人參　白茯苓　南星　薄荷各半兩　寒水石
白礬生用　半夏　薑屑各一兩　藿香二錢半
蛤粉二兩
右爲末米麵糊爲丸如桐子大每服三十丸薑湯下食後日三服白湯亦得一方加黃連半兩黃藥二兩尤效又治酒病調和臟腑殊妙

芎芷香蘇散得效方

治證同上
川芎七錢　半夏六錢　枳殼三錢　甘草二錢
陳皮三錢半　桔梗二錢半　紫蘇葉　白茯苓
乾葛　柴胡各半兩
每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎八分不拘時溫服

新法半夏湯和劑

治脾胃氣弱痰飲不散嘔逆酸水腹脇脹痛頭眩惡心不思飲食
縮砂仁　神麴炒　陳皮去白　草果仁各一兩
白豆蔻仁　丁香各半兩　甘草二兩半生半炙
大半夏四兩湯洗七次切作兩片白礬末一兩沸湯浸一晝夜洗去礬候乾一片切作兩片薑汁浸一晝夜隔湯頓焙乾爲末薑汁拌成餅炙黃用
右爲細末每服二錢先用生薑自然汁調成膏入炒鹽湯不拘時點服

川芎散子和劑

香附子炒　川芎　石膏水飛　白芷　甘草
薄荷各一兩　川烏半兩炮去皮臍
右爲細末每服二錢溫酒茶清調下無時

萬全散

治瘡氣時毒大頭疔瘡蛇犬咬等證
嫩柏根　水坑根　狸咬根　烏苞根　青王父
生藍葉　溪楓根　穿山蜈蚣
右薄荷煎服及調雄黃末服或合七神散最妙

七神散

治證同上
紫花子　紫金藤　金腦香　大小青　仙人薯
土木香　百丈光即土人參
右薄荷煎去查調雄黃末服

瀉青丸

治頭風屑
當歸焙　草龍膽焙　川芎　川大黃煨　梔子
羌活　防風
右各等分爲末煉蜜爲丸雞頭大每服一丸煎竹葉湯同砂糖溫水化下

人參消風散寶鑑

治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩疼肌肉蠕動目眩旋運耳嘯蟬鳴眼澁好睡鼻塞多嚏皮膚頑麻燥癢癮疹又治婦人血風頭皮腫癢眉骨疼旋欲倒痰逆惡心
芎藭　羌活　防風　人參　白茯苓　藿香葉
白殭蠶炒　荊芥　甘草炙　蟬殼去土各二兩
厚朴去皮薑製　陳皮去白各半兩
右爲細末每服二錢茶清調下

如久病偏頭風每日三服便覺輕減
如脫著沐浴暴感風寒頭痛聲重寒熱倦疼用荊芥茶清調下半盞
小兒虛風目澁昏倦及急慢驚風用乳香荊芥湯調下亦得

紅豆散

治頭重
麻黃根炒　苦丁香各半錢　羌活燒　連鬚各三錢　紅豆十粒
右五味爲細末鼻內嗑之又治頭內如蟲蛀譬名天白蟻用茶子細末吹鼻中

四君子湯

治一切陽虛氣弱脾衰肺損食少頭旋體瘦面黃皮聚毛落脈來細軟
人參　白朮土炒　茯苓各二錢　甘草一錢
薑三片棗二枚煎

六君子湯

治氣虛痰眩脾虛鼓脹
即四君子湯加半夏陳皮

五苓散仲景

治水氣上蒸頭重眩
豬苓　茯苓　白朮炒各十八銖　桂半兩　澤瀉一兩六銖半
右爲末每服三錢服後多飲熱水汗出而愈

逍遙散局方

治血虛肝燥骨蒸勞熱欬嗽潮熱往來寒熱口乾便澁月經不調頭熱目眩
當歸酒拌　白芍酒炒　白朮土炒　柴胡　茯苓

各一錢　炙甘草五分
加煨薑薄荷煎
二陳湯
治痰飲爲患或嘔逆惡心或頭眩心悸或中脘不快或食生冷飲酒過度脾胃不和並宜服之
半夏湯洗七次　橘紅各五兩　白茯苓三兩
炙甘草一兩半
右㕮咀每服四錢水一盞薑七片烏梅一枚煎六分不拘時熱服
香蘇散
治一切感冒暑氣皮膚蒸熱頭痛頭重自汗肢倦或煩渴或吐瀉
厚朴去皮薑汁炒　黃連薑汁炒　香薷四兩
甘草半兩
右爲末每服四錢水煎不犯鐵器慢火煎之井中沉令極冷頓服之乃效
升麻湯局方
治頭重痛
升麻一兩　蒼朮一兩　荷葉一箇全者
右爲細末每服五錢水一盞煎七分溫服食後或
燒全荷葉一箇研細調煎藥服亦妙
芎星湯
治一切風虛寒痰頭痛目眩
附子生去皮臍　烏頭生　南星　乾薑　川芎
甘草炙　細辛等分
右剉每服四錢薑五片茶少許煎服
導痰丸
治痰火眩運
法製硝同萊菔水煮化去菌餘濾令結入臘月牛膽內風化五錢一作一兩只風化硝亦可　蒙石二兩趁碎　焰硝二兩同蒙石入小砂罐內瓦片蓋之鐵線縛定鹽泥固濟曬乾火煆紅候冷取出
右爲末神麴糊丸梧子大每服二五十丸白湯下一字散濟生方
治寒痰頭痛目眩
雄黃　細辛各半兩　川烏尖生五箇
右爲細末每服一字薑汁茶芽煎湯不拘時服
芎附飲三因方
治肝氣上逆頭痛眩運
川芎二兩　香附四兩
右爲細末每服二錢不拘時茶湯調服
十四友丸
補諸虛理頭眩益氣血斂心氣治怔忡不寧精神昏憒睡臥不安
柏子仁另研　遠志湯浸去心酒灑蒸　熟地黃
酸棗仁炒香　紫石英明亮者　白茯苓去皮
茯神去木　人參　黃芪蜜炙　阿膠蛤粉炒
當歸酒洗　肉桂去粗皮各一兩　龍齒二兩
辰砂別研二錢半
右爲末煉蜜丸如梧子大每服三四十丸食後棗湯送下
羚羊角散
治一切頭眩
羚羊角　茯神各二錢半　芎藭　防風　白芷
甘草　半夏湯洗各半兩　枳殼　附子各二錢半
右爲粗末每服四錢水一鍾生薑五片慢火煎七分
消風散寶鑑
治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩疼肌肉蠕動目眩旋運耳鳴蟬鳴眼澀好睡鼻塞多嚏皮膚頑痲燥癢癮疹又治婦人血風頭皮腫癢眉骨疼旋欲倒瘀逆惡心
茯苓去皮　白殭蠶炒　藿香　荊芥穗　芎藭
羌活　防風　人參　甘草炙　蟬殼各二兩
厚朴去皮薑製　陳皮去白各半兩
右爲細末每服二錢茶清調下如久病偏頭風每日三服便覺輕減如脫著沐浴暴感風寒頭痛聲重寒熱倦疼用荊芥茶清調下半盞小兒虛風目澀昏倦及急慢驚風用乳香荊芥湯調下亦得
澤瀉白朮湯仲景
治水濕上蒸眩運
澤瀉五兩　白朮二兩
水二升煮一升分溫再服
黃連香薷飲和劑方
治伏暑引飲頭痛目眩口燥咽乾或吐或瀉並皆治之如有搐搦加羌活煎服
黃連四兩薑汁同炒令黃色　白扁豆微炒半斤
香薷去土一斤　厚朴去皮薑汁炙熟半斤
右㕮咀每服三錢水一盞入酒少許煎七分沉冷不拘時服
祖傳經驗方正傳

治頭風熱痛不可忍者

黃芩二兩酒拌炒三次不可令焦　小川芎一兩
細茶芽三錢　薄荷葉二錢半　荆芥穗四錢
白芷半兩

右爲細末每服二錢白湯或茶清調下

加減芎辛湯 醫鑑

治頭風攻目

川芎　細辛　白芷　蔓荆子　藁本　牙皂角
羌活　防風　荆芥穗　桔梗　石膏　甘菊花
薄荷　甘草各五分

右剉作一貼水煎服

菊花茶調散 丹溪心法

治頭風鼻塞或偏正頭痛

甘菊花　川芎　荆芥穗　羌活　白芷　甘草各
一兩　防風七錢半　細辛五錢　蟬殼　薄荷
白殭蠶各二錢半

右爲細末每服二錢茶清食後調下

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百四十七卷目錄

醫部彙考一百二十七

頭門六

方三 養血祛風湯 清運化痰湯 黑將軍散 仙术通神散 碧雲散 六合湯 天香散 麝香天麻丸 吳茱萸湯 通頂煙 石膏鼠黏子散 麝香茶芽散 烏罌散 韭根丸 烏香散 玉女煎 雙玉散 吹鼻六神散 六味地黃丸 四物湯 三聖散 人黃散 三陰煎 左歸飲 五福飲 加減一陰煎 金水六君煎 六安煎 和胃飲 清膈煎 滋陰八味煎 理陰煎 當歸黃芪湯 內疏黃連湯 內托復煎散 五君子煎 升麻牛蒡子散 二神丸 隔蒜灸法 十宣散 槐花酒 清涼飲 仙方活命飲 人參敗毒散 五香連翹湯 托裏散 加減八味丸 參苓白术散 托裏消毒散 八珍湯 葛根牛蒡子湯 梔子仁湯 五利大黃湯 國老膏 黃連清熱消毒散 羌活當歸湯 檳榔散 松脂膏 貝母膏 加味平胃散 螵蛸散 漏蘆湯 防風通聖散 萬應鼠頭丸 黃連救苦湯 解毒天漿散 內托千金散 廻毒銀花散 梅花五氣丹 小保安湯 大保安湯 陽春酒 桑木灸法 神妙拔根方 三品一條鎗 上品 中品 下品 玉紅膏 敗銅散 大乙膏 天麻餅子 保安萬靈丹 柴胡清肝湯 鼠黏子湯 加味逍遙散 梔子清肝湯 清肝解鬱湯 茯苓內托散 升陽益胃散 定痛消毒飲 三香內托散 固藥 救苦拔毒膏 敗毒流氣飲 內托流氣飲 清心流氣飲 敗毒流氣飲 清肝流氣飲 麥餞散 諸瘡一掃光 潤肌膏

藝術典第一百四十七卷

醫部彙考一百二十七

頭門六

方三

養血祛風湯 醫鑑

婦人頭風十居其半每發必掉眩如立舟車之上蓋因肝虛風襲故也

川芎 防風 荊芥 羌活 蔓荊子 旋覆花 細辛 藁本 石膏 半夏 生乾地黃 當歸 甘草各五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

清運化痰湯

止眩運

橘紅 半夏製各一錢半 枳實麩炒 白术 茯苓各一錢 黃芩酒炒 川芎各八分 白芷 羌活各七分 防風 細辛 南星製各六分 甘草三分

右剉一劑生薑三片水煎以此作丸亦可血虛加當歸一錢半氣虛加人參七分有熱加黃連六分

黑將軍散 馭方

治因痰火太盛眩運難當

大黃酒炒

爲末清茶調下或用大黃酒浸九蒸九曬爲末水丸如菉豆大每服百丸食後臨臥清茶送下神效

仙术通神散

治風熱上壅頭旋目眩起則欲倒

防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 薄荷葉 連翹 石膏 黃芩 桔梗 滑石麪 甘草 荊芥 白术 梔子 藿香 砂仁 甘菊花 蒼术

如風熱上攻頭目昏眩悶痛痰喘咳嗽加甘菊花人參砂仁寒水石

碧雲散 東垣

治頭痛

細辛 鬱金 石膏 芒硝各一錢 薄荷二錢 青黛一錢五分 蔓荊子 川芎各一錢二分 紅豆一箇

右爲極細末口噙水鼻內嗃之

六合湯

治血虛風眩

生地 當歸 川芎 白芍 秦艽 羌活

水煎服凡失血過多血虛眩運只以芎歸二味煎服

天香散

治年久頭風不得愈者

南星製 半夏製 川烏去皮 白芷各二錢

右作一服水二鍾加生薑自然汁小半盞煎一盞食遠服

麝香天麻丸

治風痰氣厥頭疼目眩旋運四肢倦怠精神不爽睡臥不寧

麝香二錢研 天麻酒浸 防風 芎藭各一兩 南星一枚重一兩者先用白礬湯泡洗七次然後用水煮令軟切片焙乾 甘菊花三分

右爲細末煉蜜和丸如鷄頭實大每服一丸不拘時細嚼荊芥湯送下

吳茱萸湯（仲景）

治嘔涎頭痛

人參一兩　吳茱萸一升　棗二十枚　生薑一大兩

右以水五升煎取三升每服七合日三服

通頂烟

治諸頭風如斧劈痛不可忍者

川烏一兩

右爲末燒烟熏椀內熱茶清泡椀內烟氣服之大效

石膏鼠黏子散

治偏正頭疼連眼疼

石膏　鼠黏子炒各等分

右爲細末每服二錢食後用溫酒或茶清調服

麝香茶芽散

治諸般頭疼百藥不效者

麝香少許　茶芽一兩　川芎　細辛　荊芥

川烏　甘草各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至八分去查不拘時溫服

烏罌散

治諸般頭疼不可忍者

川烏炮去皮臍　御米殼蜜炒　橘皮各等分

右㕮咀每服三錢水一盞半煎七分去查不拘時溫服

韭根丸

治頭疼眼睛如刀刺

全蝎糯米炒　大川芎去皮尖微炒各等分

右爲細末用韭根取汁和丸如梧桐子大每服十五丸食後用薄荷茶清送下

烏香散

一名太乙麝香湯治風邪客於腦頭痛至甚及偏正頭疼夾腦風連眉骨項頸上徹腮頰疼痛不可忍者

草烏生一兩（鹽炒）　新茅茶　細辛去苗各二兩

右剉如麻豆大每服三錢水一盞半入眞麝香一捻同煎八分去查熱服一方無麝共爲細末茶清調下食後服

玉女煎（景岳全書）

治水虧火盛六脈浮洪滑大少陰不足陽明有餘煩熱乾渴頭痛目眩牙疼失血等證如神若大便溏泄者乃非所宜

生石膏三五錢　熟地二五錢或一兩　知母　牛膝各錢半　麥冬二錢

水一鍾半煎七分溫服或冷服

如火之盛極者加梔子地骨皮之屬亦可

如多汗多渴者加北五味十四粒

如小水不利或火不能降者加澤瀉一錢五分或茯苓亦可

如金水俱虧因精損氣者加人參二三錢尤妙

雙玉散

治熱痰欬嗽喘急煩渴頭痛

石膏　寒水石等分

右爲極細末每服二錢人參湯或隨證用引調下

吹鼻六神散

治頭腦疼痛

焰硝提淨五錢　白芷　雄黃另研　乳香製

沒藥製　薄荷葉各一錢

右爲細末磁罐收貯左吹左右吹右先令病人口含水吹之其氣上行須臾覺效或兩鼻皆吹之

六味地黃丸

治腎水虧損小便淋閉頭目眩運壯水制火之劑也

熟地黃八兩蒸擣　山茱萸肉　山藥炒各四兩

丹皮　澤瀉　白茯苓各三兩

右爲細末和地黃膏加煉蜜爲丸桐子大每服七八十九空心食前滾白湯或淡鹽湯任下

四物湯（局方）

治血虛營弱一切血病眩運當以此爲主

熟地黃　當歸各三錢　川芎一錢　芍藥二錢

水二鍾煎服

三聖散

治男婦頭痛不論新久但夏月欲重綿包裹者亟效

鬧楊花淨末　權樹花淨末各一錢　大楓子白肉去油五分

共研每服六分葱酒調服洗浴發汗自愈

人黃散（正傳）

治四時疫癘大頭天行等病

糞缸瞼蓋風露中年遠者水飛一兩　甘草三錢
辰砂　雄黃各一錢半
右爲細末每服二錢煎薄荷桔梗湯送下日三五服煎藥甘草桔梗茯苓藥本白朮各半錢水煎服
大頭天行病從頤頷腫熱者又名鼸鼠瘟東垣有方用羌活酒炒黃芩酒蒸大黃加減水煎服十五六日服小柴胡湯不愈者仍用陳皮紫蘇發散而愈又法酒炒黃芩黃連爲君炙甘草爲佐水煎細細呷之再加鼠黏子酒蒸大黃煎入芒硝亦細細頓與服之微利爲度腫減後去後三味只服前藥屬少陽加瓜蔞根若陽明加升麻芍藥葛根甘草太陽羌活荊芥防風頭痛加黃芩

三陰煎 景岳全書下同

此治肝脾虛損精血不足及營虛失血頭痛目眩等病故曰三陰有火者宜一陰煎無火者宜此主之

當歸一三錢　熟地三五錢　炙甘草一錢　芍藥酒炒　橘仁各二錢　人參隨宜
水二鍾煎七分食遠服

如噁惡者加生薑三五片
汗多煩躁者加五味子十四粒
汗多氣虛者加黃芪一二錢
小腹墜痛加枸杞二三錢
如有脹悶加陳皮一錢
如腰膝筋骨無力加杜仲牛膝
左歸飲

此壯水之劑也凡頭目痛眩係命門之陰衰陽勝者宜此方加減主之

熟地二三錢或至一二兩　山藥　枸杞各二錢
山茱萸一二錢 畏酸者少用之　茯苓錢半　炙甘草一錢
水二鍾煎七分食遠服

五福飲

凡五臟氣血虧損而眩運者此能兼治之足稱王道之最

人參　熟地黃各隨宜　當歸二三錢　白朮炒一錢半　炙甘草一錢
水二鍾煎七分食遠溫服或加生薑三五片凡治氣血俱虛等證以此爲主或宜溫者加薑附宜散者加升麻柴葛

加減一陰煎

火之甚者宜用此方

生地黃　芍藥　麥冬各二錢　熟地黃三五錢　知母　地骨皮各一錢　炙甘草五七分
水二鍾煎服

如躁煩熱甚便結者加石膏二三錢
如小水熱澀者加梔子一二錢
如火浮於上者加澤瀉一二錢或黃芩一錢
如血燥血少者加當歸一二錢

金水六君煎

治肺腎虛寒水泛爲痰或年邁陰虛血氣不足外受風寒欬嗽嘔惡多痰喘急頭痛目眩等證神效

熟地黃三五錢　陳皮一錢半　半夏　當歸　茯苓各二錢　炙甘草一錢
水二鍾生薑三五七片煎七八分食遠溫服

如大便不實而多溫者去當歸加山藥
如痰盛氣滯胃脘不快者加白芥子七八分
如陰寒盛而嗽不愈者加細辛五七分
如兼表邪寒熱者加柴胡一二錢

六安煎

治風寒欬嗽頭痛頭旋

陳皮一錢半　半夏二三錢　茯苓二錢　甘草　杏仁各一錢去皮尖研　白芥子五七分 老年氣弱者不用
水一鍾半加生薑三五七片煎七分食遠服

凡外感風邪欬嗽而寒氣盛者多不易散宜加北細辛七八分或一錢
若冬月嚴寒邪盛者加麻黃桂枝亦可
若風勝而邪不甚者加防風一錢或蘇葉亦可
若頭痛鼻塞者加川芎白芷蔓荊子皆可
若兼寒熱者加柴胡蘇葉
若風邪欬嗽不止而兼肺胃之火者加黃芩一二錢甚者再加知母石膏所用生薑只宜一片
凡寒邪欬嗽痰不利者加當歸二三錢老年者尤宜若氣血不足者當以金水六君煎與此參用

和胃飲

治寒濕傷脾霍亂吐瀉及痰飲水氣胃脘不清噁惡脹滿頭運腹痛等證此卽平胃散之變方也凡噁吐等證多有胃氣虛者一開蒼朮之氣亦能動噁故以乾薑代之

陳皮　厚朴各一錢半　乾薑炮一二錢　炙甘草一錢
水一鍾半煎七分溫服此方凡藿香木香丁香茯

茶半夏扁豆砂仁澤瀉之類皆可隨宜增用之若胃腹有滯而兼時氣寒熱者加柴胡

清膈煎

治痰因火動氣壅喘滿內熱煩渴上盛眩運等證

陳皮錢半　貝母二三錢微敲破　膽星一二錢

海石　木通各二錢　白芥子五七分

水一鍾半煎七分溫服

如火盛痰不降者加童便一小鍾

如渴甚者加天花粉一錢

如熱及下焦小水不利者加梔子一錢半

如熱在上焦頭面紅赤煩渴喜冷者加生石膏二三錢

如痰火上壅而小水不利者加澤瀉一二錢

如痰火閉結大便不通而兼脹滿者加大黃數錢或朴硝一二錢酌宜用之

滋陰八味煎

治陰虛火盛頭痛頭旋下焦濕熱等證此方變丸爲湯即名滋陰八味煎

山藥　山萸肉各四兩　丹皮　白茯苓　澤瀉　黃檗鹽水炒　知母鹽水炒各三兩　熟地黃八兩

蒸搗

右加煉蜜搗丸梧桐子大或空心或午前用滾白湯或淡鹽湯送下百餘丸

理陰煎

此理中湯之變方也凡脾腎中虛以致眩運等證宜剛燥者當用理中六君之類宜溫潤者當用理陰大營之類欲知調補當先察此此方通治眞陰虛弱脹滿嘔噦痰飲惡心吐瀉腹痛婦人經運血滯等證又凡眞陰不足或素多勞倦之輩因而忽感寒邪不能解散或發熱或頭身疼痛或面赤舌焦或難渴而不喜熱飲或背心肢體畏寒但脈見無力者悉是假熱之證若用寒凉攻之必死宜速用此湯照後加減以溫補陰分托散表邪連進數服使陰氣漸充則汗從陰發而寒邪不攻自散此最切於時用者也神效不可盡述

熟地黃二五七錢或一二兩　當歸二三錢或五七錢　乾薑炒黃色一二三錢　炙甘草一二錢

水二鍾煎七八分熱服或加肉桂一二錢此方加附子卽名附子理陰煎再加人參卽名六味回陽飲治命門火衰陰中無陽等證若風寒外感邪未入深但見發熱身痛脈數不洪凡內無火證素稟不足者但用此湯加柴胡一錢半或二錢連進一二服其效如神若寒凝陰盛而邪有難解者必加麻黃一二錢放心用之或不用柴胡亦可恐其清利也此寒邪初感溫散第一方惟仲景獨知此義第仲景之溫散首用麻黃桂枝二湯余之溫散卽以理陰而及大溫中飲爲增減此雖一從陽分一從陰分其跡若異然一逐於外一托於內而用溫則一也學者當因所宜酌而用之

若陰勝之時外感寒邪脈細惡寒或背畏寒者乃太陽少陰證也加細辛一二錢其者再加附子一二錢眞神劑也或并加柴胡以助之亦可

若陰虛火盛其有內熱不宜用溫而氣血俱虛邪不能解者宜去薑桂單以二味加減與之或止加人參亦可

若治脾腎兩虛木乏爲痰或嘔或脹者於前方加茯苓一錢半或加白芥子五分以行之

若泄瀉不止及腎泄者少用當歸或并去之加山藥扁豆吳茱萸破故紙肉豆蔻附子之屬

若腰腹有痛加杜仲枸杞

若腹有脹滯疼痛加陳皮木香砂仁之屬

五君子煎

治脾胃虛寒嘔吐泄瀉頭重頭眩而兼濕者

人參二三錢　白朮土炒　茯苓各二錢　炙甘草一錢　乾薑炒黃一二錢

水一鍾半煎服

內疏黃連湯（保分集　下同）

治腦疽嘔呃心逆發熱而煩脈沉而實腫硬木悶而皮肉不變色根深大病在內臟腑祕澀當急疏利之

黃連　白芍藥　當歸身　檳榔　木香　黃芩

薄荷　桔梗　甘草　山梔各一兩　連翹二兩

右除檳榔木香二味爲細末外並剉每服一兩水一盞半煎至一盞先哯二三服次每服加大黃一錢再服加一錢以利爲度如有熱證止服黃連湯大便祕澀加大黃覺無熱證少煎汝藥內托復煎散時時服之如實無熱及大小便通止服復煎散稍有熱證却服黃連湯祕則加大黃如此內外皆通營衛和調則經絡自不遏絕矣

內托復煎散

治腦疽潰膿於外根盤不深形證在表其脈多浮

痛在皮肉邪氣盛則必侵於內急須內托以救其裏也

黃芪　芍藥　黃芩　白术土炒　茯苓　人參
甘草　柳桂　地骨皮　防己　當歸各一兩
防風二兩

右㕮咀先煎蒼术一斤用水五升煎至三升去术滓入前藥十二味再煎至三四盞絞取清汁作三四服終日服之又煎蒼术滓爲湯去滓再依前煎服十二味滓此除濕散鬱熱使胃氣和平如或未已再作半料服之若大便祕及煩熱少服黃連湯如微利及煩熱已過却服復煎散半料如此使營衛俱行邪氣不能內侵也

當歸黃芪湯

治頭項瘡瘍癰腑已行而痛不可忍者

當歸　黃芪　地黃　地骨皮　川芎　芍藥等分

右㕮咀每服一兩水一椀煎至五分去滓溫服

如發熱者加黃芩

煩熱不能臥者加梔子

如嘔是濕氣侵胃也

升麻牛蒡子散

治時毒頭面腫及項胷腮有瘡脈浮洪表候者

升麻　牛蒡子　桔梗　生甘草　葛根　元參
麻黃　連翹各一錢

右㕮咀薑三片水二盞煎八分取微汗

二神丸

治腦疽脾胃虛弱飲食不消大便溏泄必服之

破故紙四兩微炒黃色　肉果肥大者二兩生用
用大棗四十九枚老生薑四兩切片水浸棗薑煎至水乾爲度取棗肉爲丸桐子大每服七十丸清米湯空心送下

隔蒜灸法

治一切瘡毒大痛或不痛或癢木如痛灸至不痛不痛灸至痛其毒隨火而散以暢達拔引鬱毒此從治之法也有回生之功

大蒜去皮切三文錢厚

右安瘡頭上用艾壯於蒜上灸之三壯換蒜復灸未成者即消已成者亦殺其大勢不能爲害如瘡大用蒜搗爛攤患處將艾鋪上燒之蒜敗再換如不痛或不作膿及不起發或陰瘡尤宜多灸灸而仍不痛不作膿不起發者不治此氣血虛極也

十宣散

治頭瘡脈緩濇身倦怠惡寒或脈弦或緊細者皆宜用之散風寒助陽氣也

人參　當歸酒拌　黃芪鹽水炒各一錢　白芷
川芎　甘草炙　桔梗各一錢　厚朴薑製五分
防風　肉桂各三分

作一劑水二鍾煎八分服

槐花酒

治發背腦疽及一切瘡毒不問已成未成但煩痛者並治之用槐花四五兩微炒黃乘熱入酒二鍾煎十餘沸去查熱服未成者二三服已成者一二服

清凉飲

治積熱腦瘡煩躁飲冷煩痛脈實大便閉結小便赤澀

大黃炒　赤芍藥　當歸　甘草各二錢

作一劑用水二鍾煎八分食前服

仙方活命飲

治腦疽未作膿者內消已成膿者即潰此排膿止痛消毒之聖藥也

穿山甲蛤粉炒黃色　甘草節　防風　赤芍藥
沒藥　白芷　當歸尾　乳香　皂刺炒各一錢
天花粉　貝母各八分　金銀花　陳皮各三錢

作一劑用酒一椀同入瓶內紙糊瓶口弗令泄氣慢火煎數沸去查分病在上下食前後服之能飲酒者再飲二三杯尤好

人參敗毒散

治腦疽煩痛發寒熱或拘急頭痛脈數有力

人參　羌活　獨活　前胡　柴胡　白茯苓
桔梗　枳殼　川芎　甘草各一錢

作一劑用水二鍾煎八分食遠服

五香連翹湯

治腦疽初覺一二日便厥逆咽喉閉塞寒熱

沉香　木香　麝香另研　連翹　射干　升麻
丁香　獨活　桑寄生　甘草炙各一錢　大黃
木通　乳香各一錢五分

每服五錢水一鍾煎八分溫服取利

托裏散

治腦疽飲食少思或不腐不收斂

人參　黃芪鹽水拌炒　川芎　白术炒　茯苓
當歸酒拌　芍藥各一錢　厚朴薑製　白芷

甘草各五分
作一劑水二鍾煎八分服
加減八味丸
治腦疽瘡後及將瘥口乾渴甚則舌或生黃及未患先渴此腎水枯竭不能上潤以致心火上炎水火不能既濟故心煩躁作渴小便頻數或白濁陰痿飲食不多肌膚漸消或腿腫脚先瘦服此以生腎水降心火諸證頓止
五味子炒二兩半　山茱萸肉酒浸杵膏　山藥各一兩　熟地八兩酒拌銅器蒸半日搗膏　丹皮桂心去皮　澤瀉切片蒸焙　白茯苓各半兩
爲細末入二膏加煉蜜少許丸梧子大每服六七十九五更初未言語前或空心用鹽湯送下
參苓白朮散
治頭瘡脾胃不和飲食不進或嘔吐泄瀉凡大病後皆宜服此藥以調理脾胃
人參　白茯苓　白扁豆薑汁拌炒　薏苡仁炒
白朮土炒　蓮肉去心皮　砂仁炒　桔梗炒
山藥　甘草炙各二兩
爲細末每服三錢用石菖蒲煎湯下
托裏消毒散
治頭瘡已攻發不消者宜服此藥未成即消已成即潰腐肉易去新肉易生如有瘡口宜貼膏藥斂即不用切不可用生肌之藥
人參　黃芪鹽水拌炒　當歸酒拌　白芍藥炒
川芎　白朮土炒　白茯苓各一錢　甘草五分
白芷　金銀花各七分
作一劑用水二鍾煎至八分瘡在上下食前後服之
八珍湯
調和營衛順理陰陽滋養血氣進飲食補虛退熱此氣血虛之大藥也
當歸酒洗　川芎　白芍藥炒　熟地黃　人參
白朮　白茯苓各一錢　甘草炙五分
右水二盞薑二片棗二枚煎八分食前服
葛根牛蒡子湯
治時毒腫痛脈數而少力者
葛根　管仲　甘草　江西豆豉　牛蒡子半生杵炒各二錢
作一劑水一鍾半煎八分食後服
梔子仁湯
治時毒腫痛大便祕結脈沉數
鬱金　枳殼麩炒去穰　山梔仁炒　牛蒡子炒
升麻　大黃煨各等分
右爲細末每服三錢蜜水調下
五利大黃湯
治時毒煩熱腫赤痛煩渴便祕脈實數
大黃煨　黃芩　升麻各二錢　芒硝　梔子各一錢二分
作一劑水一鍾半煎六分空心熱服
國老膏
治腦疽及一切癰疽能消腫逐毒使毒不內攻其效不可具述
甘草大者二斤
右搥碎河水浸一宿揉令漿汁濃去盡筋滓再用絹濾過銀石器內慢火熬成膏用器收之每服一二匙無灰酒或白湯亦可曾服燥藥丹劑者亦解之按本事方每甘草一斤分作三服溫酒調下今云一二匙恐力少也
黃連清熱消毒散
治腦疽
黃連　黃芩　黃蘗酒洗　人參　獨活　防風
蒺本　甘草炙　當歸梢　蘇木　甘草梢生
陳皮各五分　知母酒炒四分　桔梗　連翹
羌活　防己酒洗　黃芪　當歸身酒洗　生地黃酒洗各一錢　澤瀉七分
右俱作一服水二盞煎減一半去滓入酒少許再煎食後溫服投劑之後不得飲水必再作膿效遲初患三日者服之立效
羌活當歸湯
治腦疽
黃芩酒炒　黃連酒炒　當歸身酒浸　炙甘草各一兩　防風　梔子仁　羌活　黃蘗酒浸　連翹各五分　澤瀉　獨活　蒺本各三錢
右㕮咀分作四服水一小椀先浸一時許入酒一匙煎至八分去查大溫服食後日二服和查計六服三日服盡去查清藥調下後檳榔散
檳榔散
治腦疽
檳榔
右爲細末將羌活當歸湯調下

松脂膏

治頭瘡經年月不瘥

松脂　黃連各七錢半　黃芩　苦參各一兩

蛇牀子二錢半　大黃　白礬枯各半兩　水銀一兩半　胡粉半兩合水銀入少水同研令無星爲度

右爲細末研勻用臘猪脂調傅瘡上大效

貝母膏

治頭瘡瘡

貝母　半夏生　南星　五倍子　白芷　黃蘗

苦參各二錢半　虢丹煆一錢半　雄黃一錢

右爲細末先以蜂房白芷苦參大腹皮荊芥煎湯熏洗拭乾卽用蜜水調傅兩三次後乾摻藥

加味平胃散

治一切惡瘡頭上瘡

蒼朮二錢　厚朴　陳皮　甘草各一錢

爲細末加入膩粉清油調傅之甚妙

螵蛸散

治頭上生瘡俗曰粘瘡

海螵蛸二錢　白膠香　輕粉各半兩

爲細末研勻先用清油潤瘡後摻藥只一上可

漏蘆湯

治頭上惡瘡幷腦疽

生黃芪　連翹　沉香　漏蘆各一兩　粉甘草半兩　大黃一兩

右爲細末每服二錢薑棗湯調下

防風通聖散

治癩頭瘡

防風　荊芥　連翹　麻黃　薄荷葉　川芎

當歸　白芍　白朮　炒山梔　大黃酒蒸　芒硝各五錢　石膏　桔梗各一兩　甘草二兩　滑石三兩

右爲末酒浸焙乾凡三次食後白湯調服日三服至頭有汗效

萬應鍼頭丸 濟生方

治一切腦背疽惡毒大瘡欲死者一粒卽愈

麝香二錢　血竭 如煩者用散者不用非眞也　蟾酥 舌試之辣者

輕粉　硇砂各三錢　片腦一錢　蜈蚣一對全用

右爲極細末煉蜜和丸爲劑如瘡有頭者用鍼頭挑破微有血出將藥一黍米大放挑開瘡內上用紙花周圍唾津濕貼瘡上不過時刻卽愈忌雞鵝酒麪一切發熱之物

黃連救苦湯 外科正宗下同

治腦疽發鬢發頤及天行時毒初起憎寒壯熱頭面耳項俱腫服之未成者卽消已成者自潰

黃連　升麻　乾葛　柴胡　赤芍藥　川芎

歸尾　連翹　桔梗　黃芩　羌活　金銀花

防風　甘草節各一錢

水二椀煎八分臨服入酒一杯食後服

解毒天漿散

治腦疽積毒日深堅腫木硬口燥舌乾惡心煩渴六脈沉實有力大便閉結不通者並宜服之

石決明生研　殭蠶　山甲土炒　連翹　羌活

乳香　甘草　金銀花　黃連　當歸尾各一錢

天花粉新鮮未曬者四兩石臼內搗爛投水一椀攪勻絞去查用　大黃三錢　防風一錢

右花粉淨汁一椀半同藥煎至八分入酒一杯空心熱服行過三次方用飲食忌食煎炒發物

內托千金散

治腦疽發背諸毒惡瘡已成不消者服之易潰

白芍藥　黃芪製　川芎　當歸　防風　桔梗

人參　天花粉　金銀花各一錢　肉桂　白芷

甘草各五分　乳香　沒藥二味痛甚加入

右水二椀煎八分臨服入酒一小杯食遠服

廻毒銀花散

治腦疽及一切發陰瘡不起色變紫黑者急宜服之

金銀花連枝葉二兩　黃芪生四兩　甘草生一兩

右咀用細酒二十兩同藥入小口砂罐內密封重湯內煑盡三香爲度取起濾清服之蓋煖患上其瘡漸漸高腫此轉陰爲陽吉矣後用托藥潰膿如服後不痛不起瘡頭流出黑水此眞陰不治

梅花五氣丹

治腦疽發背諸般疔腫初起寒熱交作筋骨疼痛有似傷風惡心嘔吐但未成膿者並宜服之

梅花片　麝香各五分　輕粉　辰砂各六分

乳香　沒藥　血竭　明雄黃各一錢　眞蟾酥二錢端午日用頭男乳調膏

右前藥各研極細對準分數於端午日辰時製度候至午時將上藥九味和入蟾酥膏內向日九之如茄子大一時內曬乾用川椒二十七粒燈心二十七段同藥收於磁罐內養之以蠟封口不泄藥

氣爲妙凡遇惡瘡大毒開器取出一枚先用美饌食飽次用無根水漱淨口內中含水一口少頃待溫用葱白五寸同水嚼爛嚥下隨將藥餅安放舌下睡於煖處以被覆蓋藥化苦水徐徐嚥之瘡勢大者二三餅亦可藥盡其汗即到如淋諸病若失如冬月天寒難汗噙後將葱白湯催之亦妙凡治無有不效如暗疔人所不知覺及知覺而大危者毒氣入裏入便昏沉一中便倒不能依法服藥急用連鬚葱白七箇煎酒一杯研藥五餅灌下藥氣到心其功如湯潑雪患者即便甦醒此爲外科第一奇方也

小保安湯

治腦疽及一切發已潰流膿時平常服之庶不更變

人參　白朮　當歸身　白茯苓　川芎　黃芪　陳皮　桔梗　麥門冬各一錢　半夏　甘草　藿香各五分　薑三片棗二枚水二茶杯煎八分食遠服

大保安湯

治腦項及一切發癰疽惡瘡大毒已潰之後膿水出多氣血虛弱精神短少飲食少思坐臥不寧煩躁不眠晝則安靜夜則發熱及大病後虛陽煩渴等證

人參　白朮　當歸　白茯苓　川芎　白芍藥　山茱萸肉　黃芪　山藥　牡丹皮　熟地黃　五味子各一錢　肉桂　甘草　麥門冬　熟附子各五分　煨薑三片大棗二枚蓮肉七粒水煎食前後服

陽春酒

治腦疽諸發已潰流膿腐盡特脾胃虛弱肌肉生遲或氣血原不足以致肉色淡白不能長發收斂宜服此酒生長肌肉強健脾胃美悅顏色滋潤皮膚凡大瘡後飲此不惟却病亦且延壽

人參　白朮　熟地黃各五錢　歸身　天門冬　枸杞各三錢　柏子仁　遠志各二錢五分

右上藥用絹袋寬貯以無灰好酒五斤磁罐內浸至一伏時每早午晚各飲一杯熱服如夏月天炎易壞不堪久服將藥分作五分每次用酒一斤隨便浸服亦效如酒將完藥尚有味再添酒浸飲之若藥淡無味不必再浸

桑木灸法

治諸瘡毒堅而不潰潰血不腐新肉不生疼痛不止

新桑木長七寸擘指大

一頭燃著向患上灸之火盡再換每次灸木五六條肉腐爲度

神妙拔根方

治腦疽發背陰證初起不腫高不燄熱灸不疼其病將來難愈必致壞人十日以前用披鍼當頂挿入知痛處方止隨用蟾酥條挿至孔底每日二條膏蓋三日後加添挿藥共根高腫作疼外用神妙照法轉陰爲陽挿照七日其瘡裂縫流膿至十三日其根自脫如日多根深蓄固不能脫者披鍼取之內用玉紅膏不脫者自脫不斂者自斂此法百人百話再無不愈者

三品一條鎗

上品去十八般疼中品去五漏翻花癮癰氣核下品治瘰癧疔瘡發背癰疽等證此爲古之三品錠子藥同而分兩不同治病故有分別今注一條鎗本方三品以上之證並皆用之俱各相應況又藥品簡易而不繁是曰三品一條鎗之說也

上品

明礬二兩　信石一兩五分　雄黃三錢　乳香沒藥各三錢五分

中品

白礬二兩　信石一兩三錢　雄黃二錢　乳香沒藥各三錢

下品

白礬二兩　信石一兩五錢　雄黃一錢　乳香沒藥各二錢五分

此礬二味共爲細末入小罐內加炭火煅紅青烟已盡旋起白烟片時約上下紅徹住火取罐頓地上一宿取出約有此礬淨末一兩加前雄黃二錢四分乳香一錢二分共研極細厚糊調稠搓成如線條陰乾凡遇前證有孔者紙入孔內無孔者先用鍼放孔竅早晚挿藥二次挿至二日後孔大者每挿十餘條挿至七日患孔藥條滿足方住以後所患四邊自然裂開大縫共至十四日前後其疔核癰癤痔漏諸管自然落下隨用湯洗上玉紅膏處者兼服健脾之藥

玉紅膏

治癰疽發背諸般潰爛等瘡用在已潰流膿時先用甘草湯洗再用猪蹄湯淋洗患上軟絹攝淨用抿脚挑膏於掌捺化逼搽新腐肉上外以太乙膏蓋之大瘡早晚洗換二次內兼服大補脾胃嫂藥其腐肉易脫新肉即生瘡口自斂此乃外科收斂藥中之神藥也

白芷五錢　紫草二錢　甘草一兩二錢　歸身　白蠟各二兩　血竭　輕粉各四錢　麻油一斤

先用當歸紫草甘草白芷四味入油內浸三日大杓內慢火熬藥微枯色細絹濾清將油復入杓內煎滾下整血竭化盡次下白蠟微火亦化先用茶鍾四枚預頓水中將膏分作四處傾入鍾內候片時方下研極細輕粉每鍾內投和一錢攪勻候至一伏時取起不得加減致取不效

敗銅散

治蟯拱頭已破後膿水不乾愈之又發久不收口

化銅舊罐

右爲末洗淨患上香油調搽

太乙膏

治發背癰疽腦瘡及一切惡瘡跌撲傷損濕痰流毒風濕風溫遍身筋骨走注作痛內傷風鬱心腹胃背攻刺作疼腿脚酸軟腰膝無力湯潑火燒刀傷棒毒五損內癰七傷外證俱貼患處又男子遺精婦人白帶俱貼臍下臟毒腸癰亦可丸服諸般瘡癤血風癩證諸藥不止疼痛者並效

肉桂　白芷　當歸　元參　赤芍藥　生地黃　大黃　土木鼈各二錢　阿魏　沒藥末各三錢

輕粉四錢　槐枝　柳枝各一百投　血餘一兩　乳香末五錢　東丹四十兩

右上十味井槐柳枝用眞麻油足秤五斤將藥浸入油內春五夏三秋七冬十候日數已畢入潔淨大鍋內慢火熬至藥枯浮起爲度住火片時用布袋濾淨藥查將油秤準足數將鍋展淨復用細絹將油又濾入鍋內要潔淨爲美將血餘投下慢火熬至血餘浮起以柳棒攪看似膏餘化之象方算熬熟淨油一斤將飛過黃丹六兩五錢徐徐投入火加大些夏秋亢熱每油一斤加丹五錢不住手攪候鍋內先發青烟後至白烟疊疊旋起氣味香馥者其膏已成即便住火將膏滴入水中試軟硬得中如老加熟油若稀亦加炒丹每各少許漸漸加火務要冬夏老嫩得宜爲佳候烟盡掇下鍋來方下阿魏切成薄片散於膏面上化盡次下乳沒輕粉攪勻傾入水內以柳棍摟成一塊再換冷水浸片時乘溫每膏半斤扯拔百轉成塊又換冷水投浸隨用時每取一塊銅杓內復化隨便攤貼至妙

天麻餅子　瘡瘍全書下同

治頭痛因風火濕痰上攻及楊梅瘡毒所致兼治頭目昏眩項背拘急肢體煩痛肌肉蠕動耳鳴蟬鳴鼻塞多嚏皮膚頑痲瘙癢癮疹又治婦人頭風作痛眉稜骨疼牙齒腫痛痰逆惡心並皆治之

天麻　草烏湯泡去皮　川芎　細辛　蒼术　甘草　川烏湯泡去皮　薄荷　甘松　防風　白芷　雄黃　白附子去皮各五錢　全蠍三錢

右爲細末寒食麵打糊搗稠如寒豆大捻作餅子每服二三十餅食後細嚼葱頭湯送下屬火熱痰痛者茶湯下甚者日進二服忌諸般發物

保安萬靈丹

治癰疽初起憎寒壯熱頭眩惡心四肢拘急者

茅术八兩　全蠍　石斛　明天麻　甘草炙　當歸　川芎　羌活　荆芥　防風　北細辛　麻黃　川烏湯泡去皮尖　草烏湯泡去皮尖　何首烏各一兩　明雄黃六錢

右爲細末煉蜜丸彈子大每藥一兩分作四丸一兩作六丸一兩作九丸三等作下以備年歲老壯病勢緩急取用預用朱砂六錢研細爲衣磁罐收貯如惡瘡初起二三日之間或癰疽已成至十朝前後但未出膿者狀若傷寒頭疼煩渴拘急惡寒肢體疼痛惡心嘔吐四肢沉重恍惚悶亂坐臥不寧皮膚壯熱又治傷寒四時感冒傳變疫證但惡寒身熱表證未盡者俱宜服之用連鬚大葱白九枝煎湯一茶鍾將藥一丸乘熱化開通口服盡被蓋出汗爲效如服後汗遲再用葱白湯催之後必汗如淋洗漸漸退下覆蓋衣物其汗自收自斂患者自然爽快其病如失但病未成者隨即消去已成者隨即高腫潰膿如諸疾無表證相兼不必發散者只用熱酒化服此方原載於諸風癱瘓門予每用之發散瘡毒其功甚捷故移錄於此詳觀此方治腫瘍甚效者何也凡瘡皆起於榮衛不調氣血凝滯乃生癰腫觀此藥性專發散又能順氣搜風通行經絡所謂結者開之況瘡毒又乃日積月

累結聚所發苟非甘溫辛熱發泄以汗疏通安能得效所謂發散不遠熱正合此方之意無謬也服後避風當食稀粥忌冷物房事孕婦勿服

柴胡清肝湯

治鬢疽初起未成者毋論陰陽表裏俱可服之

川芎　當歸　白芍藥　生地黃　柴胡　黃芩　山梔　天花粉　防風　牛蒡子　連翹　甘草節各一錢

水二鍾煎八分食遠服

鼠黏子湯

治鬢疽初起熱多寒少頭眩作痛口燥咽乾渴常飲冷二便祕澀六脈沉實有力煩悶疼痛者

鼠黏子　桔梗　當歸　甘草梢　赤芍　連翹　元參　地骨皮　防風　天花粉　木通各一錢　大黃炒二錢

水二鍾煎八分食前服查再煎服

加味逍遙散

治鬢疽七日以上根盤深硬色紫潰痛者

白朮　茯苓　牡丹皮　白芍藥　柴胡　陳皮　當歸　山梔　貝母　天花粉各八錢　甘草生　紅花　羚羊角各五分

水二鍾淡竹葉二十片煎八分食後服

梔子清肝湯

治少陽經虛肝火風熱上攻遂成鬢疽痛連頸項　胃乳太陽等處或寒熱晡甚胃滿口苦舌乾

牛蒡子　柴胡　川芎　白芍　石膏　當歸　山梔　丹皮各一錢　黃芩　黃連　甘草各五分

水二鍾煎八分食後服

清肝解鬱湯

治暴怒傷肝憂思鬱結致肝火妄動發爲鬢疽頭眩痛徹太陽胃瘍疳連兩脅嘔酸水皆服之

當歸　白芍藥　茯苓　白朮　貝母　熟地黃　山梔子各一錢　半夏　人參　柴胡　牡丹皮　陳皮　香附　川芎各六分　甘草四分

水二鍾薑三片煎八分食遠服

茯苓內托散

治鬢疽已成堅而不潰潰而不斂氣血俱虛身涼脈細飲食少思口淡無味及形體消瘦者

歸身　黃芪製　川芎　白芍藥　陳皮　白朮　山藥　熟地　白茯苓　人參各一錢　熟附子　甘草　肉桂　牡丹皮　地骨皮各五分

薑三片棗二枚水二鍾煎八分食遠服

升陽益胃散正傳

治一切惡瘡發背腦疽等證

人參　陳皮　獨活　防風　防風梢　黃連　黃蘗　蘇木　當歸梢　漢防己各五分　桔梗　連翹　知母　生地黃　生甘草　黃芩各一錢　炙甘草　羌活　藁本　黃芪各一錢五分　當歸三錢　澤瀉七分

右細切分作二服每服用水二大盞浸半日煎至一盞滴酒數十點去查臨臥溫服忌飲水再作膿效遲初患二三日者服之立消作膿者立潰隨病上下食前後服

定痛消毒飲瘡瘍全書下同

治腦疽并一切癰疽疼痛不禁

人參　當歸　升麻　川芎　白芍藥　桔梗　白茯苓　半夏　柴胡　甘草　羌活　防風　白芷　天花粉　枳殼　厚朴

右剉薑三片煨心三十莖空心服

三香內托散

治證同上

人參　木香　黃芪炙　厚朴　甘草炙　紫蘇　官桂　烏藥　白芍藥　白芷　川芎　防風　枳殼　乳香

右薑三片棗二枚水煎不拘時服

圖藥

治上證毒勢散漫

雄黃末二錢　白芨末一兩

右和勻用蟹搗汁調敷留孔時用水潤之

救苦拔毒膏

用敷前證

雄蜈蚣一二條以葱白二寸同搗極爛　雄黃末　白芨末各一錢

和勻敷患處留孔乾用水潤之何爲雄蜈蚣背上有白紋者是也對口瘡發鬢發疽之證亦治

敗毒流氣飲

治證同上

人參　乾葛　枳殼　桔梗　甘草炙　柴胡　細莘　薄荷　川芎　羌活　白芍藥　獨活　紫蘇　天花粉　防風　白芷

右薑三片棗一枚水煎食後服

內托流氣飲
治前證不消
人參　木香　黃芪炙　厚朴　甘草炙　紫蘇
官桂（冬加夏減）　檳榔　烏藥　枳殼　當歸　川芎
芍藥　白芷　桔梗
右薑三片棗二枚煎服一方有細辛鼠黏防風無木香官桂檳榔治證同
或熱加柴胡黃芩去官桂
或痛加延胡索五靈脂乳香
或瀉痢加附子人參白朮土炒澤瀉
胃氣不順加陳皮茯苓半夏山藥
嘔吐加生薑藿香

清心流氣飲
治發鬚毒
茯苓　防風　甘草炙　柴胡　羌活　川芎
紫蘇　連翹　赤芍藥　人參　白芷　前胡
獨活　山梔
右水煎服

敗毒流氣飲
治鬚疽
紫蘇　桔梗　枳殼　甘草炙　白芷　川芎
生地黃　乾葛　麥冬　當歸　白芍藥　柴胡
天花粉　鼠黏子　薄荷
右水煎食後服

清肝流氣飲
治證同上
桔梗　枳殼　甘草炙　防風　前胡　羌活
生地黃　黃芩　獨活　川芎　當歸　白芍藥
小柴胡　青皮　白茯苓
右薑三片棗一枚煎服仍時時服蠟礬丸

麥餞散（外科正宗下同）
治燒瘡頭毛脫落白斑如癬瘡痂壘壘纍起瘡甚猶若蟲行
小麥一升炒枯黃色乘熱入鉢內　入硫黃細末四兩　白礬細末一兩攪勻待冷取起　再入烟膠半斤　川椒三兩　生礬　枯礬各二兩
右共碾細末以葱湯洗沐瘡痂潔淨用麻油調搽以匾帛戴之隨後作疼發腫忍之三日後其痂漸漸而脫愈之後不復作其髮亦生戒諸發物

諸瘡一掃光
治燒瘡髮脫作癢
苦參　黃蘗各一斤　烟膠一升　明礬　枯礬
木鼈肉　蛇牀子　硫黃　樟冰　水銀　輕粉
點紅椒　楓子肉各二兩　白礬五錢
右共爲細末每一錢加倒挂塵二分燈窩宿油調搽自愈

潤肌膏
治燒瘡乾枯白斑作癢髮脫
麻油四兩　當歸五錢　紫草一錢
右同熬藥枯濾淨將油再熬加黃蠟五錢化盡傾入椀內頓冷搽擦患上漸愈矣

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百四十八卷目錄

醫部彙考一百二十八

頭門七

單方

藝術典第一百四十八卷

醫部彙考一百二十八

頭門七

單方

頭痛八月朔日收取百花頭上露磨墨點太陽穴立止點膏肓穴治勞瘵謂之天灸時珍

頭風腦痛元精石末入羊膽中陰乾水調一字吹鼻中立止千金方

頭痛欲死硝石末吹鼻內卽愈炮炙論

偏頭風痛硇砂末一分水潤豉心一分搗丸皂子大綿包露出一頭隨左右納鼻中立效聖惠方

頭痛頭風如神丹光明硫黃硝石各一兩細研水丸芡子大空心嚼一丸茶下普濟方

腎虛頭痛用硫黃一兩胡粉爲末飯丸梧子大痛時冷水服五丸卽止

又方用硫黃末食鹽等分水調生麪糊丸梧子大每服薄荷茶下五丸

又方用硫黃六錢烏藥四錢爲末蒸餅丸梧子大每服三五丸食後茶清下

頭忽眩運經夕不瘥四體漸羸飲食無味好食黃土用朮三斤麴三斤搗篩酒和丸梧子大每服用二十九日三服忌菘菜桃李青魚外臺秘要

腦風頭痛不可忍遠志末嗃鼻宣明方

少陽頭痛太陽頭痛不拘偏正小淸空膏用片黃芩酒浸透曬乾爲末每服二錢茶酒任下東垣

偏正頭風防風白芷等分爲末煉蜜丸彈子大每嚼一丸茶調下普濟方

太陽頭痛羌活防風紅豆等分爲末嗃鼻玉根微義

偏正頭風痛不可忍者延胡索七枚青黛二錢牙皂二箇去皮子爲末水和丸如杏仁大每以水化一丸灌入病人鼻內隨左右口咬銅錢一箇當有涎出成盆而愈永類方

凡人登車船煩悶頭痛欲吐者宜用徐長卿石長生車前子車下土李根皮各等分搗碎以方囊繫半合於衣帶及頭上則免此患肘後方

頭痛欲裂當歸二兩酒一升煎取六合飲之日再服外臺秘要

氣虛頭痛川芎爲末臘茶調服二錢甚捷曾有婦人產後頭痛一服卽愈集簡方

風熱頭痛川芎一錢茶葉二錢水一鍾煎五分食前熱服簡便方

頭風化痰川芎洗切曬乾爲末煉蜜丸如小彈子大不拘時嚼一丸茶清下經驗方

偏頭風痛京芎細剉浸酒日飲之斗門方

風熱上衝頭目邅眩或胷中不利川芎槐角子各一兩爲末每服三錢用茶清調下胷中不利以水煎服保命集

首風旋運及偏正頭疼多汗惡風胷膈痰飲川芎一斤天麻四兩爲末煉蜜丸如彈子大每嚼一丸茶清下宣明方

頭面諸風香白芷切以蘿蔔汁浸透日乾爲末每服二錢白湯下或以嗃鼻直指方

偏正頭風百藥不治一服便可天下第一方也香白芷炒二兩五錢川芎炒甘草炒川烏頭半生半熟各一兩爲末每服一錢細茶薄荷湯調下談埜翁試效方

頭痛嗃鼻高良薑生研頻嗃卽止普濟方

偏頭風痛蓽茇爲末令患者口含溫水隨左右痛以左右鼻吸一字有效經驗良方

一品丸治氣熱上攻頭目昏眩及治偏正頭痛大香附子杵去毛水煑一時搗曬焙乾研爲末煉蜜丸彈子大每服一丸水一盞煎八分服女人醋湯煎之奇效良方

偏正頭風香附子炒一斤烏頭炒一兩甘草二兩爲末煉蜜丸彈子大每服一丸葱茶嚼下本事方

氣鬱頭痛用香附子炒四兩川芎藭二兩爲末每服二錢臘茶淸調下常服除根明目華佗中藏經加甘草一兩石膏二錢半漱漿方

頭風睛痛香附子一兩藿香葉甘草各二錢爲末每服二錢沸湯入鹽調下聖惠方

頭風旋運痰逆惡心懶食眞零陵香藿香葉莎草根炒等分爲末每服二錢茶下日三服本事方

頭風白屑零陵香白芷等分水煎汁入雞子白攪勻

傳數十次終身不生聖惠方
又方水蘇羹汁或燒灰淋汁沐之普濟方
頭項風强八月後取荊芥穗作枕及鋪牀下立春日去之則愈千金方
風熱頭痛荊芥穗石膏等分爲末每服二錢茶調下永類鈐方
頭目諸疾一切眼疾血勞風氣頭痛頭旋目眩荊芥穗爲末每酒服三錢龍樹論
風熱頭痛熱結上焦致生風氣瘰癧頭疼用水蘇葉五兩皂莢炙去皮子三兩芫花醋炒焦一兩爲末煉蜜丸梧子大每食後服二十丸荊芥湯下聖惠方
白菊花酒治丈夫婦人久患頭風眩悶頭髮乾落胃中痰壅每發即頭旋眼昏不覺欲倒者是其候也先灸兩風池各二七壯并服此酒及散永瘥其法春末夏初收白菊軟苗陰乾擣末空腹取一方寸匕和無灰酒服之日再服漸加三方寸匕若不飲酒者但和羹粥汁服亦得秋八月合花收暴乾切取三大斤以生絹袋盛貯三大斗酒中經七日服之日三次常令酒氣相續爲佳圖經
風熱頭痛菊花石膏川芎各三錢爲末每服一錢半茶調下簡便方
頭風久痛斬艾揉爲丸時時嗅之以黃水出爲度青囊
頭風面瘡癢出黃水艾二兩醋一升砂鍋煎取汁每薄紙上貼之一日二次上御藥院方
氣攻頭痛胡蘆巴炒三稜酒浸焙各半兩乾薑炮二錢半爲末薑湯或溫酒每服二錢濟生方
痰厥頭痛牛蒡子炒旋覆花等分爲末臘茶清服一錢日二服聖惠方
頭痛連睛牛蒡子石膏等分爲末茶清調服醫方摘要
頭面忽腫熱毒風氣內攻或連手足赤腫觸著痛者牛蒡子根一名蝙蝠刺洗淨研爛酒煎成膏絹攤貼腫處仍以熱酒服一二匙腫消痛減斗門方
頭風掣痛不可禁者牛蒡莖葉搗取濃汁二升無灰酒一升鹽花一匙頭糖火煎稠成膏以摩痛處風毒自散摩時須極力令熱乃效冬月用根德生堂方
頭風白屑牛蒡葉搗汁熬稠塗之至明日用皂莢水洗去聖惠方
諸風頭運蒼耳葉曬乾爲末每服一錢酒調下日三服若吐則以蜜丸梧子大每服二十丸十日全好矣經驗方
頭風熱痛決明子炒研茶調敷兩太陽穴乾則易之一夜即愈醫方摘元
雷頭風腫不省人事地膚子同生薑研爛衝酒熱服取汗即愈聖濟總錄
頭風白屑王不留行香白芷等分爲末乾摻一夜篦去聖惠方
頭風疼痛葶藶子爲末以湯淋汁沐頭三四度即愈肘後方
偏正頭痛鱉腸草即旱蓮草取汁滴鼻中聖濟總錄
頭風作痛用蘋蘿根二升以酒二升煮服汗出止金方
頭風旋運起倒無定蘋蘿獨活白芷石膏各一兩枳實炒七錢半每服三錢酒一盞煎六分服聖惠方
腦痛眉痛穀精草二錢地龍三錢乳香一錢爲末每用五分燒烟筒中隨左右熏鼻聖濟總錄
偏正頭痛用穀精草一兩爲末以白蠟糊調攤紙花上貼痛處乾換集驗方
偏正頭痛用穀精草末銅綠各一錢硝石半分隨左右嗑鼻聖濟方
濕熱眩運不可當者酒炒大黃爲末茶清服二錢急則治其標也丹溪纂要
風氣頭痛不可忍者乳香蓖麻仁等分搗餅隨左右貼太陽穴解髮出氣甚驗
又方用蓖麻油紙剪花貼太陽亦效
又方蓖麻仁半兩猪肉十五枚去核搗塗紙上捲筒插入鼻中下清涕即止德生堂方
八種頭風蓖麻子剛子各四十九粒去殼雀腦芎一大塊搗如泥糊丸彈子大線穿挂風處陰乾用時先將好末茶調成膏子塗盡內後將炭火燒前藥烟起以盞覆之待烟盡以百沸葱湯點盡內茶藥服之後以棉被裹頭臥汗出避風袖珍方
諸風頭痛黎蘆一莖研末入麝香少許吹鼻聖惠方
又方黎蘆半兩黃連三分喘鼻
頭風頭痛用臘月烏頭一升炒令黃末之以絹袋盛浸三斗酒中逐日溫服
又方用附子炮石膏煅等分爲末入腦麝少許每服五分茶酒任下
又方用附子一枚生去皮臍葉豆一合同入銚子內煮豆熟爲度去附子食菜豆立瘥每箇可煮五次後爲末服之

風毒頭痛攻注頭目痛不可忍大附子一枚炮去皮爲末以生薑一兩大黑豆一合炒熟用酒一盞煎七分調附末一錢溫服

又方治二三十年頭風不愈者用大川烏頭生去皮四兩天南星炮一兩爲末每服二錢細茶三錢薄荷七葉鹽梅一箇水一盞煎七分臨臥溫服

治頭痛連睛者生烏頭一錢白芷四錢爲末茶服一字仍以末嚏鼻效

風寒頭痛風寒客於頭中清涕項筋急硬胃中寒痰嘔吐清水用大附子或大川烏頭二枚去皮蒸過川芎藭生薑各一兩焙研以茶湯調服一錢或剉片每用五錢水煎服隔三四日一服或加防風一兩

又方治風寒流注偏正頭痛年久不愈最有神效用大附子一箇生切四片以薑汁一盞浸炙再浸再炙汁盡乃止高良薑等分爲末每服一錢腦茶清調下忌熱物少時（三因必效方）

年久頭痛川烏頭天南星等分爲末葱汁調塗太陽穴（經驗方）

頭風痛如斧劈難忍川烏頭末燒烟熏盌內溫茶泡服之（集簡方）

痰厥頭痛如破厥氣上衝痰塞胃膈炮附子三分釜墨四錢冷水調服方寸匕當吐卽愈忌豬肉冷水

腎厥頭痛大附子一箇炮熟去皮生薑半兩水一升半煎分三服

氣虛上壅偏正頭痛不可忍者大附子一枚炮去皮臍研末葱汁麪糊丸菉豆大每服十九茶清下

蝎附丸治氣虛頭痛最合造化之妙附子助陽扶虛鍾乳補陽鎮墜全蝎取其鑽透葱涎取其通氣湯使用椒以達下鹽以引用使虛氣下歸對證用之無不奏效大附子一枚剜心令空入全蝎去毒五枚在內以餘附末同鍾乳粉二錢半白麪少許水和作劑包附煨熟去皮研末葱涎和丸梧子大每椒鹽湯下五十丸

腎氣上攻頭項不能轉移椒附丸主之用大熟附子一枚爲末每用二錢以椒二十粒用白麪填滿椒口水一盞半薑七片煎七分去椒入鹽空心點服椒氣下達以引逆氣歸經也（本事方）

偏正頭風草烏頭四兩川芎藭四兩蒼术半斤生薑四兩連鬚生葱一把搗爛同入瓷瓶封固埋土中春五夏三秋五冬七日取出曬乾揀去葱薑爲末醋麪糊和丸梧子大每服九丸臨臥溫酒下立效（經驗方）

久患頭風草烏頭尖生用一分赤小豆三十五粒磨香一字爲末每服半錢薄荷湯冷服更隨左右嚏鼻（指南方）

風痰頭痛體虛傷風停聚痰飲上駛頭痛或偏或正草烏頭炮去皮尖半兩川烏頭生去皮尖一兩藿香乳香三皂子大爲末每服二錢薄荷薑湯下食後服（三因方）

女人血風頭痛草烏頭梔子等分爲末自然葱汁隨左右調塗太陽及額上勿近眼避風

風痰眩運頭痛氣鬱胃腦不利白附子炮去皮臍半斤石膏煅紅半斤朱砂二兩二錢半龍膽一錢爲末粟米飯丸小豆大每服三十丸食後茶酒任下（御藥院方）

偏正頭風白附子白芷豬牙皂角去皮等分爲末食後茶清服仰臥少頃（本事方）

痰厥頭痛白附子天南星半夏等分生研爲末生薑自然汁浸蒸餅丸菉豆大每服四十丸食後薑湯下（濟生方）

風痰頭痛不可忍天南星一兩荊芥葉一兩爲末薑汁糊丸梧子大每食後薑湯下二十丸

又方上清丸用天南星茴香等分生研末鹽酢糝糊丸如上法服（經效濟世方）

白禿頭瘡先花末豬脂和敷之立效（集效方）

八般頭風二次見效半夏末入百草霜少許作紙撚燒烟就鼻內嚏之口中含水有涎吐去再含（痛生資鑑）

頭風久痛荊芥草煎湯沐之勿令入目（聖惠方）

溫熱頭痛黑牽牛七粒砂仁一粒研末井華水調汁仰灌鼻中待涎出卽愈（聖濟總錄）

熱病頭痛發熱進退用大栝蔞一枚去瓤細剉置磁盌中用熱湯一盞泡之蓋定良久去滓服（聖惠方）

痰熱頭風悪栝蔞一箇赤玉瓜子七箇焙牛蒡子焙四兩爲末每食後茶或酒服三錢忌動風發熱之物

頭痛發汗藥旋覆花虎頭骨酥炙等分爲散欲發時以溫酒服二錢暖臥取汗立瘥（聖濟總錄下同）

頭風熱痛山豆根末油調塗兩太陽

頭上白屑山豆根浸油日塗之

洗頭風痛新逼草瓦上燒存性研末二錢熱酒下牙關緊者斡口灌之

目赤頭旋眼花面腫風熱上攻用排風子焙甘草炙菊花焙各一兩爲末每服二錢臥時溫水下

頭風腦痛百靈藤十斤水一石煎汁三斗入糯米三

斗作飯候冷拌神麴炒末九兩同入瓶中如常釀酒經三五日更炊糯米冷投之待熟澄清每溫飲一小盞服後渾身汗出爲效聖惠方下同

頭風白屑羊蹄草根杵同羊膽汁塗之永除

頭上白癍獨根羊蹄勿見婦女雞犬風日以陳醋研如泥生布擦赤傳之日一次肘後方

頭瘡不瘥菖蒲末油調傅之日三夜一次法天生意

頭上惡瘡以黃泥包豆豉煨熟取出爲末以薺菜油調傅之保幼大全

頭風白屑瓦松曝乾燒灰淋汁熬洗不過六七次聖惠方

頭面諸瘡芝麻生嚼傅之普濟方

頭皮虛腫薄如蒸餅狀如裹水以口嚼小麥麨傅之肘後方

頭風畏冷蕎麥粉二升水調作二餅更互合頭上微汗卽愈經驗方

頭風風眼蕎麥作錢大餅貼眼四角以米大艾炷灸之卽效如神

頭風頭痛大豆三升炒熟至微烟出入瓶中以酒五升沃之密封七日溫服千金方下同

頭風疼痛豉湯洗頭避風取汗瘥

茯苓酒治頭風虛眩暖腰膝主五勞七傷用茯苓粉阿麴米釀酒飲之

黃卷散治頭風濕痹筋攣膝痛胃中積熱大便閉澁用大豆黃卷炒一升酥半兩爲末食前溫水服一匙日二服普濟方

菊花酒治頭風明耳目去痿痹消百病用甘菊花煎汁同麴米釀酒或加地黃當歸枸杞諸藥亦佳

頭風苦痛用大蒜七箇去皮先燒紅地以蒜逐箇於地上磨成膏子却以殭蠶一兩去頭足安蒜上椀覆一夜勿令透氣只取蠶研末噹入鼻內口中含水甚效

頭風作痛萇蔓子一分大黃三分爲末噹鼻

偏正頭痛生蘿蔔汁一蜆殼仰臥隨左右注鼻中神效王荊公病頭痛有道人傳此方簽時遂愈也以此治人不可勝數如宜

年久頭風菜服子生薑等分搗取汁入麝香少許噹入鼻中立止普濟方

頭運吐逆胃冷生痰也用川乾薑炮二錢半甘草炒一錢二分水一鍾半煎減半服累用有效傳信適用方

一切頭瘡雞腸草燒灰和鹽傅之食療

風痰頭痛苦瓠膜取汁以葦管灌入鼻中其氣上衝腦門須臾惡涎流下其病立愈除根勿以昏運爲疑乾者浸汁亦效其子爲末吹入亦效年久頭風亦愈普濟方

腦漏流膿破瓢白雞冠花白螺螄殼各燒存性等分血竭麝香各五分爲末以好酒釅濕熟艾連藥揉成餅貼在頂門上以熨斗熨之以愈爲度

頭面風腫杏仁搗膏雞子黃和杵塗肩上厚裹之乾則又塗不過七八次愈也心鏡

痰厥頭痛如破者烏梅肉三十箇鹽三撮酒三升煮一升頓服取吐卽愈肘後方

風虛頭痛欲破杏仁去皮尖臛乾研末以水九升研濾汁煎如麻腐狀取和羹粥食之七日後大汗出諸風漸減此法神妙可深祕之須愼風冷猪雞魚蒜酢千金方下同

風裂腦疼項强穿土地作坑煅赤以水灑之令冷鋪生桃葉於內臥席上以項著坑上蒸至汗出良久卽瘥

頭項强痛乃肝腎二臟受風也用宣州木瓜二箇取蓋去瓤沒藥二兩乳香二錢半二味入木瓜內縛定飯上蒸三四次爛研成膏每用三錢又入生地黃汁半盞無灰酒二盞暖化溫服

白禿頭瘡乾桃一兩黑豆一合爲末臘豬脂調搽患上

頭痛不止楊梅爲末以少許噹鼻取嚏妙

頭上禿瘡三月三日收未開桃花陰乾與桑椹赤者等分作末以豬脂和先取灰汁洗去痂卽塗之食療

頭風作痛楊梅爲末每食後薄荷茶服二錢或以消風散同煎服或同搗末以白梅肉和丸彈于大每食後葱茶嚥下一丸朱氏集驗

頭上肥瘡一百五日寒食節收桃花爲末食後以水半盞調服方寸匕日三甚良崔元亮海上方

頭面癬瘡生白果肉切斷頻擦取效御氏經驗方

頭上白癍花椒末豬脂調傅三五度便愈

頭風作痛吳茱萸煎濃湯以新棉染頻拭熨根良千金翼方

氣虛頭痛用上春茶末調成膏置瓦盞內覆轉以巴豆四十粒作二次燒煙熏之曬乾乳細每服一字別入好茶末食後煎服立效普方大成

濕家頭痛瓜蒂末一字噹入鼻中口含冷水取出黃

水愈（活人書）

頭腦鳴響狀如蟲蛀名天白蟻以茶子爲末吹入鼻中取效（醫方摘要）

偏頭痛黃蠟三兩鎔化以紙闊二寸長五寸在蠟上拖勻蘄艾薄鋪於上捲爲筒左痛插右耳右痛插左耳中火燃之烟氣透腦痛即止至重不過二次（急救方）

偏正頭風天陰風雨即發桂心末一兩酒調塗於額上及頂上（聖惠方）

氣厥頭痛不拘老少及產後頭痛天台烏藥川芎等分爲末每服三錢臘茶清調下產後鐵錘燒紅淬酒調下（濟生方）

頭目風熱上攻用龍腦末半兩南硼砂末一兩頻嗃兩鼻（御藥院方）

頭腦疼痛片腦一錢紙捲作撚燒烟熏鼻吐出痰涎即愈（壽域方）

卒病頭痛皂角末吹鼻取嚏（斗門方）

頭風白屑桑灰淋汁沐之神良（聖惠方）

頭風白屑楮木作枕六十日一易新者（外臺）

風痰頭痛不可忍梔子末和蜜濃傅舌上吐即止（兵部手集）

頭風疼痛白棘倒鉤四十九箇燒存性丁香一箇麝香一皂子大爲末隨左右嗃鼻（聖惠方）

風虛眩運大頭鷹閉殺去毛煑食以骨燒存性酒服（便民食療）

頭風疼痛蚱蟬二枚生研入乳香朱砂細末各半分丸小豆大每用一丸隨左右納鼻中出黃水爲效（聖濟總錄）

頭風旋運蟬殼一兩微炒爲末非時酒下一錢白湯亦可（聖惠方）

偏正頭痛久不除者晴明時將髮分開用麝香五分皂角末一錢薄紙裹置患處以布包炒鹽於上熨之冷則易如此數次更不再發（簡便單方）

老人風眩用白羊頭一具如常治食之

頭目虛運車風一箇即鷹頭也去毛焙川芎一兩爲末酒服三錢（選奇方）

太陽中暍身熱頭痛而脈微弱此夏月傷冷水水行皮中所致瓜蒂二七箇水一升煑五合頓服取吐（金匱要略）

風熱頭痛地龍炒研薑汁半夏餅赤茯苓等分爲末一字至半錢生薑荊芥湯下（普濟方）

頭風疼痛龍珠丸用五月五日取蚯蚓和腦麝杵丸梧子大每以一丸納鼻中隨左右先塗薑汁在鼻立愈（總錄）

偏正頭痛不可忍者聖惠方龍香散用地龍去土焙乳香等分爲末每以一字作紙撚燈上燒烟以鼻嗅之或每用一捻於香爐上慢火燒之以紙筒引烟入鼻熏之口噙冷水有涎吐去仍以好茶一盞點呷即愈

頭風白屑作癢狗頭骨燒灰淋汁沐之（聖惠方）

頭風痹痛用臘月烏雞屎一升炒黃爲末絹袋盛漬五升酒中一七溫服令醉（千金方）

頭風白屑新下烏雞子三枚沸湯五升攪作三度沐之甚良（集驗）

頭風掣疼湖南押衙顏思退傳方用蠟二斤鹽半斤香油一兩相和於鏇鑼中鎔令相入揑作一兜鍪勢可合腦大小蓋至額其痛立止也（經驗方）

頭風白屑烏羊屎煎汁洗之（聖惠方）

雷頭風病羊屎焙研酒服二錢（普濟方）

頭上瘡癬蜂房研末臘猪脂和塗之效（聖惠方）

頭身俱痛煩悶者用頭垢豆許水服囊盛蒸豆熨之（肘後方）

偏正頭風不拘遠近諸藥不效者如神用白芷芎藭各三錢爲細末以黃牛腦子調二末入於瓷器內加酒頓熟乘熱食之盡量一醉醒則其病如失甚驗（保壽堂方）

頭上生瘡海螵蛸白膠香各二錢輕粉五分爲末先以油潤淨乃搽末二三次即愈（衛生易簡方）

八般頭風黃魚鰾燒存性爲末臨臥以葱酒調服二錢

偏正頭風并夾頭風連兩太陽穴痛用白殭蠶爲末葱茶調服方寸匕（聖惠方）

葉椿治頭風用白殭蠶高良薑等分爲末每服一錢臨臥時茶服日二服

卒然頭痛白殭蠶爲末每用熟水調下二錢立瘥（斗門方）

赤燒頭瘡出膿晝開夜合馬蹄燒灰生油調塗神效（聖惠方下同）

頭風白屑作癢蠶沙燒灰淋汁洗之

頭癢生瘡白鴿屎五合酢煎二三沸杵爛傅之日三上

頭瘡白癢鴿屎研末傅之先以酢泔洗淨亦可燒研

摻之

頭瘡熱瘡風濕諸毒用五倍子白芷等分研末摻之

膿水即乾如乾者以清油調塗衛生易簡方

鬼舐頭瘡取小兒尿和臘猪脂傅之千金方

頭痛至極童便一盞豉心半合同煎至五分溫服聖濟總錄

頭痛不可忍方大蒜一顆去皮研取自然汁令病人仰臥垂頭以銅筯點少許滴入鼻中急令嚥入腦眼中淚出瘥奇效良方下同

治頭痛方水調決明子末貼兩太陽穴一方作枕去頭風明目

治偏頭疼方鬱金一顆苦壺盧子一合爲細末用白絹子裹藥末一錢於新汲水內浸過滴向患處鼻中得黃水出即瘥

簏中方治頭風及腦掣痛不可忍者以此齊摩之極效方用牛蒡華搗取濃汁二升無灰酒一升鹽花一匙慢火熬令稠成膏以摩痛處其風毒自散亦治時行頭痛摩時須令極熱乃得速效冬月無苗以根代之

雷頭風方歌曰雷頭風發聽斯言猪糞將來不用錢細搗羅爲極細末溫酒調下便安然

祕方貼頭風熱痛用大黃矾硝各等分爲末井底泥和捏作餅貼兩太陽穴

又方治頭目眩運大黃荆芥穗防風各等分水煎服以利爲度

又方治失血過多眩運不醒芎藭當歸酒浸等分每服四錢水煎溫服甚者加附子

卒頭痛如破非冷非風是胃腦有痰厥氣上衝所致名爲厥頭痛吐之即差單煮茗飲一二升須臾吐吐畢又飲如此數過須吐痰涎盡乃止不損人待渴即差本草下同

偏正頭痛人中白地龍炒等分爲末羊膽汁丸芥子大每新汲水化一丸注鼻中嚏之名一滴金普濟方

偏正頭風氣上攻不可忍用全蝎二十一箇地龍六條土狗三箇五倍子五錢爲末酒調攤貼太陽穴上德生堂經驗方

癩頭瘡用黃連末傅之累效普濟

眉稜骨痛屬風熱與痰白芷片芩酒炒等分爲末每服二錢茶清調下升溪雜要

治風頭眩心肺浮熱手足無力筋骨煩疼言語似澀一身動搖用烏驢頭一枚揉洗如法蒸令極熟細切更於豉汁內煮着五味調點少酥食之效普救良方下同

偏正頭疼方歌曰白芷須經日曬香草烏等分炒令黃半錢細末藁茶點此是頭疼決捷方

又方歌曰老少頭風總一般良薑細莘等勻蠶白梅湯點三分許纔發之時服便安儒門事親下同

頭痛不止丁香一錢白芷半兩瓜蒂一兩爲細末每用半字吹入鼻中即瘥

頭風方苦丁香川芎藜蘆各等分右爲細末噙水鼻內嗑之

治頭風方服荆瀝不限多少取瘥止千金方下同

又方七月七日麻勃三斗麻子一石末相和蒸之沸湯一石五斗三徧淋之熬取一石漬神麴二十斤令發釀黍米兩石五斗熟封三七日服清一升百日身中溼皮八風胃腦五藏骨髓伏風百病悉去

治卒中惡風頭痛方搗生烏頭以大酢和塗放布上薄痛處須臾痛止日夜五六薄逐痛處薄之搗烏頭須去皮

又方鹽一升爲末以麻油二升煎一宿令消盡塗頭石鹽尤良

又方芥子爲末酢和傅頭一周時

又方蜀椒二升以水煮取汁沐髮良

治頭項强不得顧視方蒸好大豆一斗令熨包內囊中枕之

枕頭方治頭風頭痛百藥不效者食茱萸葉細剉灑酒拌勻以絹袋盛之於甑中蒸熟乘熱分作二包更換枕頭以效爲度

又熨法治風頭痛雖重綿厚帛不能禦風寒者艾葉揉如綿用帛夾住包頭上用熨斗熨艾使熱氣入內良久即愈

治偏頭風痛雄黃細莘等分爲末左邊痛嗅入右鼻右邊痛嗅入左鼻立效斗門方下同

治頭風端午日採蒼耳二兩茵陳一兩甘草半兩爲末每服三錢熱酒或茶調下

治頭痛蒼耳川芎當歸等分爲末每服三錢臨臥茶清調下

熊腦髓作油摩頭可去白屑本草下同

腦縫開裂方人大熱發頭熱者令腦縫裂開取黑虱三五百枚搗碎敷之

治頭上風屑極燥癢無時此乃氣虛風邪侵於皮表而生用黎蘆不拘多少爲末先洗頭須避風候未至

十分乾時用末糝之須用入髮至皮方得緊縛之兩日夜次日即不燥癢如尚有些少可再用一次立效本事方

頭上生瘡如癩防風通聖散爲末酒浸焙三次食後白湯調服日三丹溪心法下同

癩頭瘡方鹽湯溫洗淨以一上散敷之久不愈者神效

癩頭瘡宜服酒歸飲外用雄黃水銀等分爲末臘猪脂半生半熟調敷之濕爛者燕窩土黃蘗爲末乾糝入門

白疣頭瘡宜神應膏醫鑒

頭面瘡密陀僧硫黃各一錢輕粉少許右爲末猪脂調敷丹溪心法下同

頭面瘡以臘月馬脂油塗擦極妙

頭面瘡松皮灰五錢黃丹白膠香各二錢半枯白礬大黃黃蘗各一錢二分右爲末熟油調敷

大頭天行殭蠶一兩錦紋大黃二兩薑汁丸彈子大新汲泉水和生蜜調服外用井底泥調大黃芒硝末敷之

頭重如山用羌活根燒三錢連麴三錢紅豆錢半右爲末嗃鼻若爲飲除濕藥則過所誅罰無過故於鼻取之猶鳥在高巔之上必射而取之也東垣

壯實人氣實有痰或頭痛或眩運大黃酒浸三次爲末茶調服丹溪心法

頭瘡方用好紫霄炭燒通紅入水淬之又燒又淬以水熱爲度取所淬之水日日洗之使熱毒宣發而愈外以胡荽子伏龍肝懸龍尾黃連白礬爲末調敷又服酒炒通聖散效懸龍尾屋梁塵也

白疣臘梨灰窰內燒過紅土墼四兩百草霜一兩雄黃一兩膽礬六錢榆皮三錢輕粉一錢爲末猪膽汁調剃頭後搽之百發百中神方也土墼乃燒石灰窰中流結土查也輕虛而色赭積德堂方

頭瘡白疣取牛皮竈岸爲末麻油調塗或和輕粉少許

白疣頭瘡百草霜和猪脂塗之又頭上諸瘡以酢湯洗淨百草霜入膩粉少許生油調塗立愈證類本草

治赤髮禿落油磨銅錢末塗之即生普濟方

頭上生蝨銅青明礬末摻之摘元方下同

頭上生蝨水銀和蠟燭油揩之一夜皆死

頭上生蝨銀朱浸酢日日梳頭

又方包銀朱紙以盌覆燒之茶清洗下烟子擦之包頭一夜至旦蝨盡死積德堂方

白疣頭瘡雄黃猪膽汁和塗之聖濟錄

乾濕頭瘡白礬半生半煅酒調塗之生生編

白疣頭瘡皂礬楝樹子燒研搽之普濟方

頭瘡白疣貫衆白芷爲末油調塗之

又方貫衆燒末油調塗

小兒疣瘡白頭翁根搗傅一宿作瘡半月愈肘後方

白疣慘痛陳香薷二兩水一盞煎汁三分入胡粉猪脂半兩和勻日日塗之子母秘錄

白疣頭瘡五月收漏蘆草燒灰猪膏和塗之聖濟總錄

白疣頭瘡葶藶末塗之聖惠方

白疣頭瘡糞藍煎汁頻洗聖濟錄

白疣蟲瘡藜蘆末猪脂調塗之肘後方

頭生蟣蝨藜蘆末摻之直指方

小兒白疣瘡雞窠草和白頭翁花燒灰臘月猪脂和傅之以酢泔洗淨

眉鍊頭瘡用小麥燒存性爲末油調傅儒門事親

頭瘡生蛆頭皮內時有蛆出以刀刮破擠絲瓜葉汁搽之蛆出盡絕根小山怪證方

小兒白疣瘡方用吳茱萸鹽醃過炒研酢和塗之活幼口議

雞屎白疣甜瓜蔓連蒂不拘多少以水浸一夜砂鍋熬取苦汁去查再熬如餳盛收每剃去痂疕洗淨以膏一盞加半夏末二錢薑汁一匙狗膽汁一枚和勻塗之不過三上忌食動風之物儒門事親

鬈毛毒瘡生頭中初生如蒲桃痛甚黃蘗一兩乳香二錢半爲末槐花煎水調作餅貼於瘡口普濟方

頭瘡生瘡楸葉搗汁頻塗聖惠方

頭耳諸瘡眉癬燕窩瘡並用肥皂煅存性一錢枯礬一分研勻香油調塗之摘元方

臘梨頭瘡不拘大人小兒用獨核肥皂去核塡入沙糖入巴豆二枚紮定鹽泥包煅存性入檳榔輕粉五七分研勻香油調搽先以灰汁洗過溫水再洗拭乾乃搽一宿見效不須再洗普濟方

白疣頭癬熊白敷之

細莘主風頭痛腦痛治頭面風不可闕也又治足少陰腎經苦頭痛煎服末服皆佳

川芎治厥陰經頭痛在腦偏頭痛細剉酒浸服之或煎服或末服並佳又主風邪入腦頭痛治頭面風不可闕也

防風主大風頭眩痛又主頭面去來風煎服末服皆佳治上部風邪之仙藥也湯液下同

葛根主傷寒中風頭痛煎服之效乃陽明經頭痛藥也

甘菊治風眩頭痛取花爲末酒調服一錢日再服或多取釀酒或浸酒服之又取嫩莖葉作羹作菜食亦良白菊尤佳

白芷治陽明頭痛在額煎服末服並佳

麻黃主風寒頭痛去節煎服本草

藁本治巔頂痛腦齒痛引諸藥至頂上煎服末服並佳丹溪心法

半夏主頭眩足太陰痰厥頭痛非此不能除煎服之東垣

夏荊子主風頭痛腦鴻煎服之本草

蔓荊子太陽經頭痛之要藥能散風邪除頭昏目暗丹溪心法

山茱萸主頭風腦骨痛又治肝虛眩運乃肝臟藥也煎服之本草下同

羌活治賊風頭痛眩運乃太陽頭痛主藥也又主風毒頭連齒痛劑煎服之

荊芥治頭風荊芥穗石膏煅等分爲末每二錢以薑葱煎水調下名荊芥散

葱白連鬚者治傷寒頭痛煎服出汗卽效太陽經藥也

菉豆治頭風頭痛作枕枕之佳

薄荷治頭風又治風熱頭痛爲清上切要藥煎服末服並佳

石膏治熱厥頭痛陽明頭痛大效石膏川芎白芷等分爲末每三錢茶清調下名石膏散

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百四十九卷目錄
醫部彙考一百二十九
頭門八
鍼灸
導引
醫案

藝術典第一百四十九卷
醫部彙考一百二十九
頭門八
鍼灸

素問曰熱病始於頭首者刺項太陽而汗出止
刺頭中腦戶入腦者死
刺家不診聽病者言在頭頭疾痛爲藏鍼之刺至骨
病已上無傷骨肉及皮皮者道也
黃帝問曰余聞風者百病之始也以鍼治之奈何岐
伯對曰風從外入令人振寒汗出頭痛身重惡寒治
在風府調其陰陽不足則補有餘則瀉
邪客於足太陽之絡令人頭項肩痛刺足小指爪甲
上與肉交者各一痏立已不已刺外踝下三痏左取
右右取左如食頃已
靈樞曰病在上者下取之病在下者高取之病在頭
者取之足病在腰者取之腘
手心主之別名曰內關去腕二寸出於兩筋之間循
經以上繫於心包絡心系實則心痛虛則爲頭強取
之兩筋間也
督脈之別名曰長強挾脊上項散頭上下當肩胛左
右別走太陽入貫膂實則脊強虛則頭重高搖之挾
脊之有過者取之所別也
陽逆頭痛胃滿不得息取之人迎
其足太陽有通項入於腦者正屬目本名曰眼系頭
目苦痛取之在項中兩筋間入腦
熱病面青腦痛手足躁取之筋間以第四鍼於四逆
筋蹙目浸索筋於肝不得索之金金者肺也
熱病頭痛顳顬目瘈脈痛善衄厥熱病也取之以第
三鍼視有餘不足寒熱痔
厥頭痛面若腫起而煩心取之足陽明太陰
厥頭痛頭脈動心悲善泣視頭動脈反盛者刺盡去
血後調足厥陰
厥頭痛貞貞頭重而痛嘔頭上五行行五先取手少
陰後取足少陰
厥頭痛意善忘按之不得取頭面左右動脈後取足
太陰
厥頭痛項先痛腰脊爲應先取天柱後取足太陽
厥頭痛頭痛甚耳前後脈湧有熱瀉出其血後取足
少陽
真頭痛頭痛甚腦盡痛手足寒至節死不治
頭痛不可取於臉者右所擊陷惡血在於內若肉傷
痛未已可則刺不可遠取也
頭痛不可刺刺者大甚爲惡目作者可令少愈不可已
頭半寒痛先取手少陽陽明後取足少陽陽明
厥挾脊而痛至頂頭沉沉然目眩眩然腰脊強取足
太陽腘中血絡
奇邪之所在皆爲不足故上氣不足腦爲之不滿耳
爲之苦鳴頭爲之苦傾目爲之眩補足外踝下留之
目眩頭傾補足外踝下留之
氣在於頭者取之天柱大杼不知取足太陽營輸
甲乙日自乘無刺頭
甲乙經曰頭痛目窗及天衝風池主之
厥頭痛孔最主之
厥頭痛面腫起商丘主之
頭腦中寒鼻鼽目泣神庭主之
頭痛身熱鼻窒喘息不利煩滿汗不出曲差主之
頭痛目眩顈項強急胷脅相引不得傾側本神主之
頭項痛重暫起僵仆鼻窒鼽鼽喘息不得通通天主之
頭項惡風汗不出悽厥惡寒嘔吐目系急痛引頷頭
重頭痛玉枕主之
煩滿不得視口沫泣出兩目眉頭痛臨泣主之
腦風頭痛惡見風寒鼽鼽鼻窒喘息不通承靈主之
頭痛身熱引兩頷急腦空主之
頭重目瞑悽厥寒熱汗不出陶道主之
身熱頭痛進退往來神道主之
頭痛如破身熱如火汗不出瘈瘲寒熱汗不出惡寒
來急腰股相引痛命門主之
頸項痛不可以俛仰頭痛振寒瘈瘲氣實則脊滿俠
脊有井氣熱汗不出腰背痛大杼主之
風眩頭痛鼻不利時嚏清涕自出風門主之
熱病頭痛身重懸顱主之

善嚏頭痛身熱領厭主之

熱病頭痛引目外眥而急煩滿汗不出引頷齒面赤皮痛懸癰主之

熱病偏頭痛引目外眥懸釐主之

頭目瞳子痛不可以視挾項强急不可以顧陽白主之

頭風痛鼻齆衄眉頭痛善嚏目如欲脫汗出寒熱面赤頰中痛項椎不可左右顧目系急瘛瘲攢竹主之

頭眩病身熱汗不出上脘主之

頭痛振寒清冷淵主之

頭痛項背急消濼主之

風眩頭痛少海主之

熱病先頭重額痛煩悶身熱熱爭則腰痛不可以俛仰胃滿兩頷痛甚善泄饑不欲食善噫熱中足清腹脹食不化善嘔泄有膿血若嘔無所出先取三里後取太白章門主之

厥頭痛面浮腫煩心狂見鬼善笑不休發於外有所大喜喉痹不能言豐隆主之

頭重鼻衄及瘛瘲汗不出煩心足下熱不欲近衣項痛目窗鼻及小便皆不利至陰主之

暴病頭痛身熱痛肌肉動耳聾惡風目眥爛赤項不可以顧髀樞痛泄腸澼束骨主之

頭痛顏青者顱會主之

風眩引頷痛上星主之取上星者先取譩譆後取天牖風池

頂上痛風頭重目如脫不可左右顧百會主之

風眩目眩顱上痛後頂主之

頭重項痛目不明風到腦中寒重衣不熱汗出頭中惡風刺腦戶主之

頭痛項急不得傾倒目眩鼻不得喘息舌急難言刺風府主之

頭眩目痛頭半寒玉枕主之

腦風目瞑頭痛風眩目痛腦空主之

頭痛引頸簇陰主之

風頭耳後痛煩心及足不收失履口喝僻頭項搖瘛牙車急完骨主之

眩頭痛重目如脫項似拔狂見鬼目上反項直不可以顧暴聾足不任身痛欲折天柱主之

眩頭痛刺絲竹空主之

神庭禁不可刺

上關禁不可刺深深則令人耳無所聞

顱息刺不可多出血

左角刺不可久留

人迎刺過深殺人

頭維禁不可灸

承光禁不可灸

腦戶禁不可灸

風府禁不可灸

瘖門禁不可灸

絲竹空禁不可灸

神庭在髮際直鼻督脈足太陽陽明之會禁不可刺令人癲疾目失精灸三壯

曲差一名鼻衝俠神庭兩旁各一寸五分在髮際足太陽脈氣所發正頭取之刺入三分灸五壯

本神在曲差兩旁各一寸五分在髮際足少陽陽維之會刺入三分灸三壯

頭維在額角髮際俠本神兩旁各一寸五分足少陽陽維之會刺入五分禁不可灸

上星一穴在顱上直鼻中央入髮際一寸陷者中可容豆督脈氣所發刺入三分留六呼灸三壯

顱會在上星後一寸骨間陷者中督脈氣所發刺入四分灸五壯

前頂在顱會後一寸五分骨間陷者中督脈氣所發刺入四分灸五壯

百會一名三陽會在前頂後一寸五分頂中央旋毛中陷可容指督脈足太陽之會刺入三分灸三壯後頂一名交衝在百會後一寸五分枕骨上督脈氣所發刺入四分灸五壯

强間一名大羽在後頂後一寸五分督脈氣所發刺入三分灸五壯

腦戶一名匝風一名會額在枕骨上强間後一寸五分督脈足太陽之會此別腦之會不可灸令人瘖

風府一名舌本在頂上入髮際一寸大筋內宛宛中疾言其肉立起言休其肉立下督脈陽維之會禁不可灸灸之令人瘖刺入四分留三呼

五處在督脈旁去上星一寸五分足太陽脈氣所發刺入三分不可灸

承光在五處後二寸足太陽脈氣所發刺入三分禁不可灸

通天一名天白在承光後一寸五分足太陽脈氣所發刺入三分留七呼灸三壯

絡却一名强陽一名腦蓋在通天後一寸三分足太陽脈氣所發刺入三分留五呼灸三壯
玉枕在絡郤後七分俠腦戸旁一寸三分起肉枕骨入髮際三寸足太陽脈氣所發刺入三分留三呼灸三壯
臨泣當目上眥直入髮際五分陷者中足太陽少陽陽維之會刺入三分留七呼灸五壯
目窻一名至榮在臨泣後一寸足少陽陽維之會刺入三分灸五壯
正營在目窻後一寸足少陽陽維之會刺入三分灸五壯
承靈在正營後一寸五分足少陽陽維之會刺入三分灸五壯
腦空一名顳顬在承靈後一寸五分俠玉枕骨下陷者中足少陽陽維之會刺入四分灸五壯
天衝在耳上如前三分刺入三分灸三壯
率谷在耳上入髮際一寸五分足太陽少陽之會嚼而取之刺入四分灸三壯
曲鬢在耳上入髮際曲隅陷者中鼓頷有空足太陽少陽之會刺入三分灸三壯
浮白在耳後入髮際一寸足太陽少陽之會刺入三分灸二壯
竅陰在完骨上枕骨下搖動應手足太陽少陽之會刺入四分灸五壯
完骨在耳後入髮際四分足太陽少陽之會刺入二分留七呼灸七壯
瘖門一名舌橫一名舌厭在後髮際宛宛中入繫舌本督脈陽維之會仰頭取之刺入四分不可灸灸之令人瘖
天柱在俠項後髮際大筋外廉陷者中足太陽脈氣所發刺入二分留六呼灸三壯
風池在顳顬後髮際陷者中足少陽陽維之會刺入三分留三呼灸三壯
千金方曰凡孔穴主對者穴名在上病狀在下或一病有數十穴或數病共一穴皆臨時斟酌作法用之其有須鍼者即鍼刺以補瀉之不宜鍼者直宜灸之然灸之大法但其孔穴與鍼無忌即下白鍼若溫鍼訖乃灸之燔鍼白鍼皆須妙解知鍼知藥固是良醫神庭水滿主寒熱頭痛喘渴目不可視
頭維大陵主頭痛如破目痛如脫
崑崙解谿曲泉飛揚前谷少澤通里主頭眩痛
竅陰強間主頭痛如錐刺不可以動
腦戸通天腦空主頭重痛
消濼主寒熱瘧頭痛
攢竹承光臂臑絲竹空瘈脈和髎主風頭痛
上星主風頭眩顏青
顱會主風頭眩頭痛顏青
天牖風門崑崙關元關衝主風眩頭痛
合谷五處主風頭熱
前頂後頂顖厥主風眩偏頭痛
玉枕主頭半寒痛
天柱陶道大杼孔最後谿主頭痛
目窻中渚完骨命門豐隆太白外丘通谷京骨臨泣小海承筋陽陵泉主頭痛寒熱汗出不惡寒
保命集曰頭痛不可忍鍼足厥陰太陽經原穴
凡瘡瘍可灸刺者須分經絡部分血氣多少俞穴遠近若從背而出當從太陽五穴隨證選用或刺或灸泄其邪氣凡太陽多血少氣至陰通谷束骨崑崙委中從髎而出者當從少陽五穴選用凡少陽少血多氣竅陰夾谿臨泣陽輔陽陵泉從髀而出者當從陽明五穴選用凡陽明多血少氣厲兌內庭陷谷衝陽解谿從腦而出者初覺腦痛不可忍且欲生瘡也腦者髓之海當灸刺絕骨以泄邪氣腦者舍也故脈浮者從太陽經依前選用脈長者從陽明經依前選用脈弦者從少陽經依前選用論曰諸經各有井滎俞經合井主心下滿及瘡者色榮主身熱及瘡赤色俞主體重節痛瘡黃色經主欬嗽寒熱瘡白色合主氣逆而泄瘡黑色隨經病而有此證者或宜灸宜鍼以泄邪氣經曰邪氣內蓄則腫熱宜砭射之也內經曰夫辯氣之息者宜以鍼開除之氣脈血聚者宜石而泄之王注曰石砭也可以破大癰出膿今以鈹鍼代之凡瘡瘍已覺微漫腫硬皮血不變色脈沉不痛者當外灸之引邪氣出而方止如已有膿水者不可灸當刺之淺者亦不可灸經曰陷者灸之如外微覺木硬而不痛者當急灸之是邪氣深陷也淺者不可灸愼之
儒門事親曰大頭病以砭鍼刺腫處出血即效
丹溪心法曰頭風頭痛鍼百會立愈又灸顱會前頂上星百會
醫學綱目曰陽迎頭痛腦滿不得息取之人迎陽迎即陽逆也又云肝氣逆則頭痛耳鳴頰腫取穴者是

瘀血腫滿處取之也

偏正頭風取絲竹空沿皮向外透率谷風池橫鍼入寸半透風府合谷半寸已上穴未愈再取解谿三里中脘各灸五十壯

正頭風百會一分灸七壯上星二分灸七壯二穫鍼出血亦得合谷不愈再取神庭灸七壯太陽在兩額角眉後紫脈上三穫鍼出血亦得

醉頭風內攢竹一穴印堂一分灸五壯攢竹一分沿皮橫透魚腰三里竅中灸風門沿皮向外一寸

頭風面腫項强不得回顧天牖五分留七呼不宜補亦不宜灸若灸之則面腫脹合當取下穴讀講上六分留三呼瀉五吸後取天牖風池即瘥此古流注之法

頭風後谿京骨

頭痛嘔吐神庭一分印堂在兩眉中沿皮透左攢竹補三吸轉墻元穴退鍼沿皮透右攢竹補三吸

風痰頭痛豐隆五分灸亦得

腎厥頭痛湧泉三分彈鍼出血

偏正頭痛取阿是穴鍼之即愈

雷頭風取上顖百會風池

頭重如石取印堂一分沿皮透攢竹先左後右彈鍼出血

眩運取神庭上星顖會前頂後頂腦空風池陽谷大都至陰金門申脈足三里

眩運怕寒春夏常著綿帽暫去即發取百會上星風池豐隆

資生方曰腎厥頭痛灸關元百壯

厥逆頭痛齒亦痛灸曲賓七壯

腦痛腦旋腦瀉腦熱腦冷皆灸顖會

薛己醫案曰李氏云腦疽及頭項有疽不可用陽蒜灸恐引毒上攻宜灸足三里穴五壯氣海穴三七壯仍服凉血化毒之藥或以騎竹穴法灸之凡頭項咽喉生疽古法皆爲不治若用此法多有生者如五香連翹瀉黃等湯國老膏萬金散皆可選用

註 前證屬膀胱經或濕熱上壅或陰火上炎若因濕熱則病氣有餘元氣不足當用黃連消毒散以除濕毒用補中益氣湯以滋化源若因陰火則元氣病氣俱不足當用補中益氣湯及六味地黃丸以滋腎水若腎水乾涸中傳未盡急用加減八味丸及補中益氣湯以固根本引火歸源若色黯不潰或潰而不斂名曰腦漏不治大凡瘍腫痛甚宜活命飲隔蒜灸之解散於血按引鬱毒但艾炷宜小而少若欲其成膿腐潰生肌收斂並用托裏爲主

古今醫鑑曰神庭穴在髮際前上五分灸三壯上星穴在髮際上一寸半灸三壯後頂百會風池已上諸穴隨灸一處可愈

導引

保生秘要曰頭痛導引用手法百會掐六十四度擦亦如數兼運後功

運功左疼意想左乳下一大筋扯過右乳下右疼則扯過左乳下每行十二度

頭痛顳膽念於患處推下至湧泉止

頭重目花導引觀空坐定閉氣以兩手心掩耳擊天鼓次擦湧泉穴次以手按膝端坐呵氣九口如法定神

運功意定鉉雍舌頂上齶俟液徐生頻咽丹田復想歸膽雙睛運轉而頭輕目無花矣

頭運腦痛及痰滯導引單搭膝坐二指點開耳門及口眼鼻七竅之處躬身微力前努使眞氣上升腦邪自散矣

運功注膽念想頭上痛處分兩邊運至心口開下念膽輪幹旋通關緊行至滯痰處著意多運週流遍腹顳膽念

神運頭眩導引此證情慾所傷氣衰血少心火上攻痰飲串肺爲患日久變成瘡瘵於肩井穴揑九九之數摩亦如之兼用後功自愈

運功緊閉地戶安神伏氣按腦及耳大運要倚坐足屈勿交神氣自廻得液有津咽下定神

跌運導引於肩井穴環跳穴揑之九九摩之九九自然而愈

運功急按耳門及腦門仍遍顖門定元神若氣轉廻心清爽愼運發語固命根

眩運閉口定神伏氣按腦門及耳戶口大運之人要

屈足勿教伸直恐氣難溫和遂咽津遍大竅津下竅自通其神自存霎時而省人事

揚胎運按顖門迭氣下丹田又有運不省人事者以手遍於顖門

臘梨瘡取湧泉之水從脚肋而上致頭頂瘡處洗之一月可除又將面前撥下以至脚指頭而出每次行二十四遍要本童子念三教先生四個字若大人有面紅亦如此法

醫案

墨莊漫錄曰王文公安石爲相日奏事殿中忽覺偏頭痛不可忍遽奏上請歸治疾裕陵令且在中書偃臥已而小黃門持一小金杯藥少許賜之云左痛即灌右鼻右即反之左右俱痛並灌之即時痛愈明日入謝上曰禁中自太祖時有此數十方不傳人間此其一也因并賜此方蘇軾自黃州歸過金陵安石傳其方用之如神但目赤少時頭痛即愈法用新羅葛取自然汁入生龍腦少許調勻鼻頭使人滴入鼻竅輒耕錄曰任子昭云向寓都下時鄰家兒患頭疼不可忍有回回醫官用刀割開額上取一小蟹堅硬如石尚能活動頃焉方死疼亦遄止當求得蟹至今藏之夏雪蓑云嘗於平江閶門見過客馬腹膨脹倒地店中偶有老回回見之於左腿內割取小塊出不知何物也其馬隨即騎而去信西域多奇術哉

儒門事親曰丹霞僧病頭痛常居暗室不敢見明其頭熱痛以布圍其頭上置冰於其中日易數次熱不能已諸醫莫識其證求見戴人戴人曰此三陽經蓄熱故也乃置炭火於煖室中出汗涌吐三法併行七日方愈僧願從者曰此神仙手也

彭城張叟年六十餘歲病熱厥頭痛以其用涌藥時已一月間矣加之以火其人先利臟腑年高身困出門見日而仆不知人家人驚惶欲揉撲之戴人曰大不可援續與西瓜凉水蜜雪少頃而蘇蓋病人年老涌泄目脈易亂身體內有炎火外有太陽是以跌仆若是撲之便不救矣惟安定神思以凉水投之待之以靜靜便屬水自然無事若他醫必惑足以知戴人之諳練

一婦人年四十餘病額角上耳上痛鳴呼爲偏頭痛如此五七年每痛大便燥結如彈丸兩目赤色眩運昏澀不能遠視世之所謂頭風藥併子風藥白龍丸芎犀丸之類連進數服其痛雖稍愈則大便稍閉兩目轉昏澀其頭上鍼灸數千百矣連年著灸其兩目且將失明由病而無子一日問戴人戴人診其兩手脈急數而有力風熱之甚也余識此四五十年遍察病目者不問男子婦人患偏正頭痛必大便澀滯結硬此無他頭痛或額角是三焦相火之經及陽明燥金勝也燥金勝乘肝則肝氣鬱肝氣鬱則氣血壅氣血壅則上下不通故燥結於裏壽至失明治以大承氣湯令河水煎三兩加芒硝一兩煎成頓令溫分作三五服連服盡蕩滌腸中垢滯結燥積熱下泄如湯二十餘行次服七宣丸神功丸以潤之菠菱葵豬羊血爲羹以滑之後五七日十日但遇天道晴明用大承氣湯夜盡一劑是痛隨利減也三劑之外目豁首輕燥澤結釋而愈後生三子

東垣十書曰范天騭之內有脾胃證時顯煩躁胷中不利大便不通而又爲寒氣怫鬱悶亂大作火不伸故也因其有熱服疎風丸大便行其病不減恐其藥少再服七八十九大便復見兩行原證不瘥增以吐逆食不能停痰唾稠粘湧出不止眼黑頭旋惡心煩悶氣短促上喘無力以言心神顛倒目不敢開如在風雲中頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不得安臥余料前證是胃氣已損復下兩次則重虛其胃而痰厥頭痛作矣乃用黃蘗二分酒洗乾薑三分澤瀉白茯苓天麻黃芪人參蒼朮各五分炒神麯白朮各一錢麥蘗麵半夏橘皮各一錢五分每服五錢煎去查熱服食前一服而愈此頭痛苦甚謂之足太陰痰厥頭痛也

元好問記曰予素飲酒於九月中患腦之下項之上出小瘡後數日腦項痛木強勢外漸瘍醫送處五香連翹湯至八日不下而云不可速療十八日得膿出用藥或砭刺三月乃可平四月如故予記醫經云凡瘡見膿九死一生果如醫言則當有束手待斃之悔矣乃請李明之診且謂膏粱之變不當投五香事已無及當先用火攻之策然後用藥以大艾炷如桃核許者攻之至百壯乃覺痛次爲處方云是足太陽膀胱之經其病逆當反治脈中得弦緊按之洪大而數又且有力必當伏其所主而先其所因其始則同其終則異可使破積可使潰堅可使氣和可使必已必先歲氣無伐天和以時言之可收不可汗經與病俱禁下法當結者散之鹹以耎之然受寒邪而禁鹹諸苦寒爲君爲用甘寒爲佐酒熱爲因用爲使以辛溫

和氣血大辛以解結爲臣三辛三甘益元氣而和血脈滲淡以導濕扶持秋令以益氣瀉火以入本經之藥和血且爲引用既以通經爲主用君以黃芩黃連黃蘗生地黃知母酒製之本經羌活獨活蘗本防風防已當歸連翹以解結黃芪人參甘草配諸苦寒者三之一多則滋營氣補土也生甘草瀉腎火補下焦元氣人參橘皮以補胃歸尾去惡血生地黃補血酒製防已除膀胱留熱澤瀉助秋令去酒之濕熱凡此諸藥必得桔梗爲舟楫乃不下沉投劑之後疽當不痛不拆食進體健予如言服之投牀大解日出乃寤以手捫瘡腫減七八至瘡痂都斂十四日而已世醫用技豈無取效者至於治效之外乃能歷數體中不言之祕乎生所見唯明之一人而已此方名黃連消毒飲

柏參謀名德字仲實年六十一歲壬子年二月間患頭痛不可忍晝夜不得眠郎中曹通甫邀予視之其人云近在燕京初患頭昏悶微痛醫作傷寒解之汗出後痛轉加復汗解病轉加而頭愈痛遂歸每遇郡邑名醫用藥一同到今痛甚不得安臥惡風寒而不喜飲食診其六脈弦細而微氣短而促語言而懶內經云春氣者病在頭年高氣弱清氣不能上升頭面故昏悶此病本無表邪因發汗過多清陽之氣愈虧損不能上榮亦不得外固所以頭苦痛而惡風寒氣短弱而不喜食正宜用辛溫藥內經云陽氣者衛外而爲固也今年高氣弱又加發汗衛外之氣愈損故以黃芪甘溫補衛實表爲君人參甘溫當歸辛溫補血氣白芍酸寒固衛氣而爲臣白朮陳皮炙甘草苦甘溫養胃氣生發陽氣上實皮毛肥腠理爲佐柴胡升麻苦平引少陽陽明之氣上升通百脈灌溉週身者也川芎蔓荊子細辛辛溫體輕浮清利空竅爲使也明年春赴名之六盤山曹郎中以古風見贈云東垣李明之蚤以能醫鳴易水得與訣爲竭黃金籯一燈靜室窮內經黃帝扶岐伯鬻日儲月積不易售半世豈但三折肱所長用藥有活法舊方堆案白魚生得不聞李延同居且同病一下一汗俱得明早平乃知古人一證有一方後世以方合證此理殊未明公心審是者俗子直以異己喧謗聲先生飲恨臥黃壤門生賴汝卓卓號中英活人事業將與相一旦在己權非輕連年應名天策府麻臺草木皆欣榮好藏漆葉青粘散莫使樊何獨擅名

丹溪心法曰一老婦患赤白帶下年半頭眩坐之不得睡之則安專治赤白帶帶愈其眩亦安

一男子年七十九歲頭目昏眩而重手足無力吐痰口口相續左手脈散大而緩右手脈緩而大不及於左重按皆無力飲食略減而微渴大便三四日一行衆人皆與風藥言至春深必死予曰此大虛證當以補藥作大劑服之衆怒而去予教用人參當歸身黃芪芍藥白朮濃煎作湯使下連蘗丸三十粒如此者服一年半而精力如少壯時連蘗丸冬加乾薑少許餘三時皆依本法連蘗皆薑汁炒爲細末又以薑汁熬糊爲丸

古今醫統曰一婦人忽眩運不能動診其脈兩尺浮大而滑知風痰眩運而兼火也以半夏白朮天麻湯下滾痰丸一百粒卽愈

醫學綱目曰一子患七年搖頭三年下血百方無效予思之乃肝血液盛外有風熱乘之肝屬木木盛而脾土爲木所尅脾與肺是子母俱爲肝所勝而血遂潰於大便故便血不止遂處一方但損肝祛風而益脾只數服而後愈十餘日血止而下白膿遂得以安用防風三兩瓜蔞根黃芪蜜炒羌活白芍藥各五錢犀角屑甘草各二錢牛蛇蛻炙赤釣藤鉤子麻黃各一錢右爲末棗肉和丸梧子大食後薄荷湯下五七十丸只二服頭搖卽止便血隨愈

俯職學士張居易嗜酒散誕不爲名利拘束忽發熱頭疼俾翰林醫官治之十日愈甚諸學士共議召孫孫至脈之曰餘人皆曰傷寒故作此疾也張學士好酒多痰食所傷也今疾非傷寒而右手脈甚數左手脈平和此必傷酒食而作頭痛宜喫食藥五七丸俟之半日進退決矣孫遂用食藥經食久膈漸寬頭痛遂減再進利膈藥遂獲安大凡陽邪頭疼經十日豈得不變發熱而狂亂故知非傷寒乃食病之過也

一老婦人頭痛歲久不已因視其手足有血絡皆紫黑遂用三稜鍼盡刺出其血如漿汁者數盞後視其受病之經灸刺之而得全愈卽經所謂大痹爲惡及頭痛久痹不去身視其血絡盡出其血是也

一男子因憂思勞苦發作眩運眼暗耳鳴面赤口乾發熱氣喘有汗不食六脈洪數用十全大補湯去桂加生地黃薑炒黃連麥門冬五味子陳皮酒炒黃蘗如母而愈

薛己醫案曰閻老梁厚齋氣短有痰小便赤濇足跟作痛尺脈浮大按之則濇此腎虛而痰飲也用四物

送六味丸不月而康仲景先生云氣虛有飲用腎氣丸補而逐之誠開後學之矇矙濟無窮之天柱腎氣丸即六味丸也

都憲孟有涯氣短痰連服辛香之劑痰盛遺尿兩尺浮大按之如無余以爲腎家不能納氣歸源香燥致甚耳用八味丸料三劑而愈

孫都憲形體豐厚勞神喜怒面帶陽色口渴吐痰或頭目眩運或熱從腹起左三脈洪而有力右三脈洪而無力余謂足三陰虧損用補中益氣加麥門五味及加減八味丸而愈若人少有老態不耐寒暑不勝勞役四時迭病皆因少時血氣方長而勞心虧損或精血未滿而御女過傷故其見證難以悉狀此精氣不足但滋化源其病自痊又若飲食勞役七情失宜以致諸證亦當治以前法設或六淫所侵而致諸證亦因真氣內虛而外邪乘襲尤當固胃氣爲主蓋胃爲五臟之根本故黃蘗知母不宜輕用恐復傷胃氣也大凡雜證屬內因乃形氣病氣俱不足當補不當瀉傷寒雜屬外因亦宜分其表裏虛實治當審之

昌平守王天成頭運惡寒形體倦怠得食稍愈勞而益甚寸關脈浮大此脾肺虛弱用補中益氣湯加蔓荊子而愈後因勞役發熱惡寒諸語不寐得食稍安用補中益氣湯而痊

大尹祝支山因怒頭運拗內筋攣時或寒熱日晡熱甚此肝火筋攣氣虛頭運用八珍加柴胡山梔牡丹皮二十餘劑而愈

上舍顧桐石會飲於周上舍第問余曰向孟有涯陳東谷俱爲無嗣納龍已而得疾皆頭運吐痰並用蘇合香丸惟有涯得生何也余曰二證因腎虛不能納氣而爲頭運不能制水而爲痰涎東谷專主攻痰行氣有涯專於益火補氣故耳後余應杭人之請桐石房勞過度亦患前證或用清氣化痰愈甚頓曰我病是腎虛不能納氣歸源治者不悟而歿惜哉

先兄體貌豐偉唾痰甚多脈洪有力殊不耐勞遇風頭運欲仆口舌破裂或至赤爛誤食葷蒜少許口瘡益甚服八味丸及補中益氣加附子錢許即愈停藥月餘諸證仍作此命門虛火不歸源也

一婦人患頭偏腫痛不可當發熱作渴喜冷內服清熱外敷寒涼色黯不瘥胃中氣噎此陽氣虛寒彼泥素有痰火不受溫補余用參芪各五錢甘桂各二錢一劑頓腫起而潰又用大補藥而愈凡瘡疽腫高痛甚煩渴飲冷此病氣元氣俱有餘宜用清熱消毒散仙方活命飲爲主若腫高痛甚口乾飲熱此病氣有餘元氣不足宜用托裏消毒散參芪四補散爲主若漫腫微痛食少體倦此病氣元氣俱不足宜用六君補中二湯壯其脾胃則未成者消已成者潰已潰者斂矣

一人腦疽十餘日面目腫閉頭瘁如斗脈洪數煩躁飲冷此膀胱濕熱所致用黃連消毒飲二劑次飲槐角酒二椀頓退以指按下腫則復起此膿已成於頸額肩頰各刺一孔膿並出口目始開更以托裏藥加金銀花連翹三十餘貼愈

一人患腦疽勢劇脈實用黃連消毒散不應以金銀藤二兩水二鍾煎一鍾入酒半盞服之勢去三四再服漸退又加黃蘗知母瓜蔞當歸甘草節數劑而潰合香丸惟有涯得生何也余曰二證因腎虛不能納氣而爲頭運不能制水而爲痰涎東谷專主攻痰行氣有涯專於益火補氣故耳後余應杭人之請桐石房勞過度亦患前證或用清氣化痰愈甚頓曰我病是腎虛不能納氣歸源治者不悟而歿惜哉

先兄體貌豐偉唾痰甚多脈洪有力殊不耐勞遇風頭運欲仆口舌破裂或至赤爛誤食葷蒜少許口瘡益甚服八味丸及補中益氣加附子錢許即愈停藥月餘諸證仍作此命門虛火不歸源也

一婦人患頭偏腫痛不可當發熱作渴喜冷內服清熱外敷寒涼色黯不瘥胃中氣噎此陽氣虛寒彼泥素有痰火不受溫補余用參芪各五錢甘桂各二錢一劑頓腫起而潰又用大補藥而愈凡瘡疽腫高痛甚煩渴飲冷此病氣元氣俱有餘宜用清熱消毒散仙方活命飲爲主若腫高痛甚口乾飲熱此病氣有餘元氣不足宜用托裏消毒散參芪四補散爲主若漫腫微痛食少體倦此病氣元氣俱不足宜用六君補中二湯壯其脾胃則未成者消已成者潰已潰者斂矣

一人腦疽十餘日面目腫閉頭瘁如斗脈洪數煩躁飲冷此膀胱濕熱所致用黃連消毒飲二劑次飲槐角酒二椀頓退以指按下腫則復起此膿已成於頸額肩頰各刺一孔膿並出口目始開更以托裏藥加金銀花連翹三十餘貼愈

一人患腦疽勢劇脈實用黃連消毒散不應以金銀藤二兩水二鍾煎一鍾入酒半盞服之勢去三四再服漸退又加黃蘗知母瓜蔞當歸甘草節數劑而潰止加黃芪川芎白芷桔梗數劑愈

一人腦疽其頭數冬痛不可忍服消毒藥不應更以金銀花服之即熟睡覺而勢去半再數劑而消

杜碧溪亦名醫也自病腦疽療之不愈丹溪往視之曰何不服防風通聖散曰已服數劑丹溪曰合以酒調之碧溪乃自悟以爲不及

一人頭面腫痛服硝黃敗毒之劑愈甚診之脈浮數邪在表尚未解用荊芥敗毒散二劑勢退大半更以葛根牛蒡子湯四劑而瘥此惡脈發表藥也

頭面赤腫瘁痛服涼藥不應者須砭鍼去血再用本方必效一人年三十患肩毒服人參敗毒散二劑更服十宣散去參柱加金銀花天花粉四劑而潰因怒動肝火風熱上壅頭面青腫瘁痛飲荊防敗毒散加芩連薄荷二劑不應急砭鍼患處去黑血盞許仍以一劑勢退大半再服人參敗毒散四劑而愈

泰和二年四月民多疫癘初覺憎寒體熱次傳頭目腫盛日不能開上喘咽喉不利舌乾口燥俗云大頭天行視成不通染之多殆一人病此五六日醫以承氣加藍根下之稍緩翌日其病如故下之又緩終莫能愈漸至危篤東垣曰身半以上天之氣也身半以下地之氣也此邪熱客於心肺之間上攻頭目腫盛以承氣泄胃中之實熱是誅罰無過不知適其至所爲故遂制普濟消毒飲子

一男子患腦疽腫痛脈數以黃連消毒散二劑少退與仙方活命飲二劑而止再以當歸芍藥川芎金銀花黃蘗知母而潰又以托裏藥而愈

一男子腦疽頭項俱腫雖大潰腫痛益甚兼作瀉煩

躁不睡飲食少思其勢可畏診其脈毒尚在與仙方活命飲二劑腫痛退半與二神丸及六君子湯加五味子麥門冬酸棗仁四劑諸證少退飲食少進睡亦少得及與參苓白朮散數服飲食頓進又與十全大補湯加金銀花白芷桔梗月餘而瘥

一老人色赤腫痛脈數而有力與黃連消毒散二劑少退更與清心蓮子飲四劑而消

一婦人膿熟不潰腹痛欲嘔飲食少思急鍼之與托裏藥而愈

一婦人患之不甚痛不作膿以托裏消毒散膿成鍼之補以托裏藥亦愈

一老人膿清兼作渴脈軟而濇寸以爲氣血俱虛用八珍湯加黃芪五味子彼不信乃服降火之劑果反作嘔少食始信服香砂六君子湯四劑嘔止食進仍投前湯月餘而愈

一男子未潰兼作渴尺脈大而無力以四物湯加黃蘗知母麥門冬黃芪四劑而渴減又與加減八味丸渴止瘡潰更用托裏藥兼前丸而愈

一男子腫痛脈數以荊防敗毒散二劑而痛止更以托裏消毒藥而消

一男子煩腫疼痛發熱飲冷脈洪數與凉膈散二劑而止以金銀花散四劑而潰更以托裏藥而愈

一老婦稟實潰而痛不止脈實便祕以清凉飲二劑而止更以托裏消毒藥而愈

一男子腫硬不作膿惟瘡頭出水痛甚以仙方活命飲二劑痛止而膿成鍼之更以托裏藥而愈常治膿濇補而不應及不痛或木悶堅硬者俱不治

一男子膿將成微痛兼渴尺脈大而無力此陰虛火動之證彼謂心經熱毒自服清凉降火藥愈熾求治乃以四物湯加黃蘗知母五味子麥門冬黃芪及加減八味丸渴止瘡潰更以托裏藥兼前丸而愈中藏經云癰疽瘡腫之作皆五藏六腑蓄毒不流非獨榮衛壅塞而發其行也有處其主也有歸假令發於喉舌者心之毒皮毛者肺之毒肌肉者脾之毒骨髓者腎之毒發於下者陰中之毒發於上者陽中之毒外者六腑之毒內者五藏之毒故內曰壞外曰潰上曰從下曰逆發於上者得之速發於下者得之緩感於六腑者易治感於五藏者則難治也觀此則疽發於腦者乃膀胱督脈陰氣不足陽火熾甚而出也豈可專泥於心火而不滋益陰氣耶

一人素不慎起居飲食煩赤腫痛尺脈洪數以黃連消毒散二劑濕熱頓除惟腫硬作痛以仙方活命飲二劑腫痛悉退但瘡頭不消投十宣去桂加金銀花葉本白朮茯苓陳皮以托裏排膿彼欲全消自製黃連解毒散二服反腫硬不作膿始悟仍用十宣散加白朮茯苓陳皮半夏腫少退仍去桂又四劑而膿成腫勢亦退纔以八珍湯加黃芪五味子麥門冬月餘膿潰而愈夫苦寒之藥雖治陰證尤當分表裏虛實大第時宜豈可始末悉用之然煩腫赤痛尺脈數按之則濡乃膀胱經濕熱壅盛也故用黃連消毒散以解毒除濕顧腫硬作痛乃氣血凝滯不行而作也遂用仙方活命飲以散結消毒破血也其瘡頭不消蓋因熱毒熏蒸氣血凝滯而然也宜用甘溫之劑補益陽氣托裏以腐潰之況此證原屬督脈經因虛火盛而出若不審其因專用苦寒之藥胃氣已傷何以腐化收斂矣何不致於敗耶凡瘡易消散易腐潰易收斂皆氣血壯盛故也

一婦年將七十形實性急好酒腦疽纔五日脈緊急又濇急用大黃酒煨細切酒拌炒爲末又酒拌人參炒入薑煎調一錢服過兩時再與得臥而上半身汗睡覺病已失此亦內托之意蓋此治因性急因好酒兼因其脈而制此方脈緊急且濇由其性急嗜酒以傷其血而然故用大黃以洩酒熱入參以養氣血也

一婦腦左腫痛左鼻出膿年餘不愈時或掉眩如坐舟車許叔微曰肝虛風邪襲之然也以川芎一兩當歸三錢羌活旋復花細辛防風蔓荊子石膏藁本荊芥穗半夏麴乾地黃甘草各半兩每服一兩一料而愈按此條認作肝虛風邪襲之而治以去風清熱養血祛痰之劑因其掉眩痛偏於左也經曰諸風掉眩皆屬肝木又病偏左乃肝膽所主又曰風從上受之又曰無痰不成眩暈又曰肝藏血又曰風乃陽邪故方以風熱痰血而主治者理也

一老患此色赤腫痛脈數有力與黃連消毒飲二劑少退更與清心蓮子飲四劑而消

一婦人冬間患此腫痛熱渴余用清熱消毒藥潰之而愈次年三月其舌腫大遍身發疔如葡萄不計其數手足尤多乃脾胃受毒也先各刺出黑血隨服奪命丹七粒出臭汙瘡熱益甚便祕二日與大黃芩連各三錢升麻白芷山梔薄荷連翹各二錢生甘草一錢水煎三五沸服之大小便出臭血甚多下體稍退乃磨入犀角汁再服舌本及齒縫出臭血諸毒乃消

更以犀角地黃湯而愈

以上治案皆足太陽經積熱挾風挾濕挾虛者其進退出入可以用黃連消毒散之活法也

陳錄判母年七十餘於冬至後腦出疽形可既面大衆瘍醫診視俟瘡熟以鍼出膿因皆侍妾瘡輒內陷凹一韭葉許面色青黃不澤四肢逆冷汗出身清時復嘔吐脈極沉細而遲蓋緣衰老之年嚴寒之時病中苦楚飲食淡薄已滌肥濃之氣獨存瘦悴之形加之暴怒精神愈損故有此寒變也病與時同與瘍醫議連製五香湯一劑加丁香附子各五錢劑盡瘍復大發隨證調治而愈內經曰凡治病必察其下謂察時下之宜也諸痛癢瘡瘡皆屬心火言其常也如瘡盛形羸邪高痛下始熱終寒此反常也固當察時下之宜而權治故曰經者常也法者用也醫者意也隨所宜而治之可收十全之功矣按此條年老冬寒理宜溫補茲用五香湯加丁附以辛散何也蓋因其怒氣鬱結阻碍陽氣不得營運致阻凹陷且脈極沉細而遲其爲氣鬱可知故用五香以開結丁附以助陽則鬱散陽復疽乃大發此亦因其性脈而爲治也

錦衣葉夫人患腦疽口乾舌燥內服清熱外敷寒涼色黯不斂胃中氣噎證屬陽氣虛寒彼疑素有痰火不受溫補予以參芪各五錢黃桂各二錢一劑頓然腫潰又用大補藥而愈

一人膿將成微痛兼渴尺脈大而無力此陰虛火動之證彼謂心經熱毒自服清涼降火藥愈熾復求治乃以四物湯加黃檗知母五味麥冬黃芪及加減八味丸渴止瘡潰更以托裏藥兼前丸而愈

一人腦疽作渴脈雖洪按之無力予咬咀加減八味丸與之彼不信自用滋陰等藥七惡并至而歿精要曰患疽雖二有熱皆因虛而得之愈後作渴或先渴後疽非加減八味丸不能治

一人腦患疽發熱口渴醫用苦寒藥膿水益多發熱益甚面目赤色唇舌燥烈小便淋痛晝夜不寐死在反掌請予治之乃以加減八味丸料加參芪歸朮麥冬甘草煎服之熟睡半日覺來諸證悉退不數劑而瘡愈予曰病雖愈當固其本元彼不經意且不守禁欠年患中風後患背疽而歿

一老人膿清兼作渴脈軟而濇予以爲氣血俱虛用八珍湯加黃芪五味彼不信乃服降火之劑果反作嘔少食始信服香砂六君子湯四劑嘔止食進仍投前湯月餘而愈

一人頭項俱痛雖大潰腫痛益甚兼作瀉煩躁不睡飲食少思其勢可畏診其脈毒尚在與仙方活命飲二劑腫痛退半與二神丸及六君子湯加五味麥冬酸棗仁四劑諸證少退食頗進睡少得及與參苓白朮散數服飲食頗進又與十全大補湯加金銀花白芷桔梗月餘瘥

舉人潘光甫年踰四十患腦疽腫煩診其脈沉靜予謂此陽證陰脈斷不起已而果然蓋瘡疽雖屬心火尤當分表裏虛實果元氣充實內有實火者寒劑或可責效若寒涼過度使胃寒脾弱陽證變陰或結而不潰或潰而不斂陰陽乖戾水火交爭死無日矣

侍御朱南皐患發疽腫痛發熱日晡尤甚此肝膽二經血虛火燥也用四物湯加元參柴胡桔梗炙草治之而愈又因勞役發熱畏寒作渴自汗用補中益氣湯去柴升加五味麥冬炮薑而瘥

州守胡廷器年七十患前證腫煩作痛頭目俱脹此腎水不足肝膽火盛而血燥也用六味丸料四劑瘡頭出水而愈後因調養失宜仍腫痛煩熱喘渴脈洪大而虛此脾胃之氣傷也用補中益氣以補脾胃用六味地黃丸以補腎肝而痊

一男子患此煩腫作痛發熱以小柴胡湯加連翹金銀花桔梗四劑而消

一男子因怒後髮際腫痛發熱以小柴胡湯加連翹金銀花天花粉桔梗四劑根畔俱消惟痛頭作痛以仙方活命飲二劑痛止膿成針之更以托裏消毒藥而愈

一男子頭面煩腫作痛時仲冬脈弦緊以托裏溫經湯汗之而消

一男子腫痛寒熱拘急脈浮數以荊防敗毒散二劑表證悉退更以托裏消毒散潰之而安

一男子膿熟不潰脈痛針之而止更以托裏消毒散而愈凡瘡膿熟不潰屬氣血虛也若不托裏必致難瘥

一男子作膿煩痛發嘔少食以仙方活命飲一劑而止以六君子湯加當歸桔梗皂角刺潰而愈

一男子膿清不斂以托裏散加五味子麥門冬而斂

一老人腫痛發熱膿清作渴脈軟而濇此血氣俱虛也欲補之彼見作渴發熱乃服降火之劑果作嘔少食復求治投六君子湯四劑嘔止食進仍用補藥月餘而愈夫患者臟腑氣血上下各有虛實兒陰證似

陽陽證似陰豈可以發熱作渴而槩用寒凉之劑常治患者正氣虛邪氣實以托裏爲主消毒佐之正氣實邪氣虛以攻毒爲主托裏佐之正氣虛邪氣實而專用攻毒則先損胃氣宜先用仙方活命飲托裏消毒散或用灸法俟邪氣退正氣復更酌量治之大抵正氣奪則虛邪氣勝則實蓋邪正不並立一勝則一負其虛不待損而自虛矣若發背腦疽疔毒及患在四肢必用灸法拔引鬱毒以行瘀滯尤不可專於攻毒診其脈而辨之庶不有誤

一男子腫焮痛甚發寒熱服十宣散愈熾診之脈數而實此表裏俱有邪也以荊防敗毒散加芩連大黃二劑少愈更以荊防敗毒散四劑而消大抵瘡瘍之證腫焮痛甚寒熱往來或大便祕結小便澀赤心神憒悶恍惚不寧皆邪熱之實也豈可補哉東垣云瘡疽之發其受之有內外之別治之有寒溫之異受之外者法當托裏以溫劑反用寒藥則是皮毛始受之邪引入骨髓受之內者法當疏利以寒劑反用溫劑托裏則是骨髓之病上徹皮毛表裏通潰共爲一瘡助邪爲毒苦楚百倍輕則危殆重則死矣

維揚俞黃門年踰三十冬月鬢患毒腫焮煩躁便祕脈實此膽經風熱壅上而然也馬氏云瘡瘍之證熱壅而不利者大黃湯下之遂以一劑便通瘡退更以荊防敗毒散二劑再以十宣散去桂加天花粉金銀花數劑而愈

大宗伯羅公耳後髮際患此焮痛脈數以小柴胡湯加桔梗牛蒡子金銀花四劑而愈

趙宜人年踰七十患鬢疽已潰焮腫痛甚喜冷脈實大便祕澀東垣云煩躁飲冷身熱脈大精神昏悶者皆臟腑之實也遂以清凉飲一劑腫痛悉退更以托裏消毒藥三十餘劑而平若謂年高潰後投以補劑實實之禍不免矣

外科正宗曰一男人腦疽十餘日視其瘡勢頗甚根連左右耳項並腫紅赤焮熱脈浮而數先用黃連消毒散二服退其大勢根脚稍定後用托裏消毒散數服不覺腐潰但診脈浮無力詢之患者年過五旬久艱嗣息房中又有妾人多兼思慮勞慾太過損傷元氣故也又瘡形勢大止能起發不能培養爲膿更用十全大補湯加桔梗白芷倍人參白朮各三錢外用桑木灸法早晚二次灸之又塗紫霞膏數日患者頭面俱腫雙目合縫形狀可畏然後腐潰並作膿出日至數升如此半月因前藥不勝其事內加煩躁不寧五心煩熱飲食漸少等證此以膿水出多氣血走泄爲虛火假證之故雖變不妨隨用聖愈湯一服不應又進一服加熟附子二錢方應前證悉退次以人參養榮湯加麥冬五味參朮常倍至三錢調理月餘後至腦骨腐肉連髮片片脫下其狀狼狽不可觀瞻凡相視者無不點頭驚訝又恐腐潰深大補不及事每日粥食中用人參三錢凡餐分入同煑食之以接補脾元後方元氣漸醒調理四月方愈彼後一年反生一子以承後嗣

一男子患鬢疽三日焮腫寒熱脈浮數以荊防敗毒散一劑表證悉退腫痛仍作已欲作膿以托裏消毒散膿潰又以益氣養榮湯加麥冬五味斂而愈

一男子患鬢疽五日頂高根若錢大形色紅活此肝經濕熱爲患用麻子大艾灸七壯以梔子清肝湯二服腫勢稍止以蟾酥餅膏貼灸上更以柴胡清肝湯加白芷黃芪天花粉數服膿潰腫消半月收斂

一男子渴疾三年寒熱半月自以爲瘧鬢間忽生一小瘡三四日外形如粟瘡平堅硬色暗不澤又兼脈洪數而無力此水竭火旺之證也終難潰斂辭不敢治復請醫視爲易治用針刺腫上去紫血鍾許內服解毒藥次日邊旁愈腫醫者謂腫高屬陽易治彼家懽悅又三日腮項俱腫口噤不食用針又刺腫上日加昏憒又復請視予曰死將及矣但此證未病先作渴腎水已竭外形如粟裏可容谷形色紫黑氣敗血衰脈洪無力元氣內敗如此干涉豈有不死者彼家方信晚矣共二十一日而歿

一男子腫焮五六日彼欲內消外敷凉藥內服大黃泄氣等劑隨後焮腫雖退乃生寒熱惡心乾嘔肩膊牽强診之脈數無力此內虛毒氣入裏凉藥之過也東垣云瘡疽之發受之有內外之別治之有寒溫之異受之外者法當托裏以溫劑反用寒藥攻利損傷脾胃多致內虛故外毒乘虛入裏受之內者法當疏利以寒劑反用溫劑托裏初病則是骨髓之毒誤用溫劑使毒上徹皮毛表裏通潰共爲一瘡助邪爲毒苦楚百倍輕則變重重則死矣前證既出寒藥之過以托裏健中湯二服嘔吐全止又以十全大補湯加白芷數服而原瘡漸起又以人參養榮湯間服腐潰膿稠兩月餘瘡口收斂

一婦人患此腫硬寒熱口乾焮痛脈洪大有力此表裏俱實也以防風通聖散一劑行二次前證稍退又

一劑大行數次熱退渴止惟原瘡腫硬用銀針點破插入蟾酥條內服托裏消毒散漸潰膿而安

一男子患此三四日頂高根活且無表裏之證此肝經濕熱爲患用針挑破瘡頂以蟾酥餅蓋貼內服加味逍遙散加皂角針數服頭出微膿根腫亦消

景岳全書曰先君壽峯公少壯時頗好酒因致酒病自四旬之外遂絕戒不飲後至七旬因除夜之樂飲一小杯而次早眩運不能起先君素善吐法有記在痰飲門因吐去清痰而眩運頓愈原其所由則一杯之酒何遽爲痰不過以惡酒之臟而忽被酒氣則眞陰清氣爲之淆亂而然吐去痰飲酒氣可除吐能升氣清陽可復此非治痰而實以治亂耳故志此以見其義

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百五十卷目錄

醫部彙考一百三十

面門一

黃帝素問上古天眞論　六節藏象論　脈要精微論　五藏生成篇　玉版論要　著至敎論　診要經終論　脈解篇　藏氣法時論　風論　厥論　熱論　骨空論　氣交變大論　六元正紀大論　至眞要大論

靈樞經本輸篇　邪氣藏府病形篇　終始篇　經脈篇　經別篇　厥論　雜病篇　壽夭篇　陰陽二十五人篇

扁鵲難經面色

張機金匱要略面色　面青面赤

傷寒論慌怖之色

華佗中藏經五色脈論　脈訣規正面色形證訣死法

王叔和脈訣五藏察色歌　諸病生死歌　五藏死色歌

竇漢卿瘡瘍全書面發毒　痔瘻毒　發顏毒　頰癰　鴉胎癰

劉完素六書胃虛面黃

張從政儒門事親面黃腫　面赤　面色

李杲十書面青　面腫　面熱　面色　面鼻準爲肺則黑

朱震亨心法面病　面熱　面鼻準爲肺則黑

羅天益衛生寶鑑面熱

戴思恭證治要訣面風

李梴醫學入門面病　面黃陽證　面上雜病　搭腮腫

龔信古今醫鑑面病專屬胃

薛己醫案痔毒

徐春甫古今醫統面熱面寒　面腫面浮　面色　痔瘻

樓英醫學綱目面黃陽證

王肯堂證治準繩面部所屬　頰病　頰腫　頰瘡　頰癰　頰潰　頰爭又名　承漿癰

陳實功外科正宗膀風　勃劑通鼻竅　白屑風　骨頭黑子　痣　腮女人面生黑斑　時毒　時毒治法　骨槽風

張介賓景岳全書神色論　面色　面腫有盛實浮　面虛浮　面上凍瘡　面瘡

陳士鐸石室秘錄勃劑　面上凍瘡　面瘡

醫部彙考一百三十

面門一

黃帝素問

上古天眞論

女子五七陽明脈衰面始焦

註陽明之脈榮於面故其衰也面焦夫氣爲陽血爲陰故女子先衰於脈而男子先衰於氣也

六七三陽脈衰於上面皆焦

註三陽之脈盡上於頭三陽脈衰故面皆焦

丈夫六八陽氣衰竭於上面焦

註平脈篇曰寸口脈遲而緩緩則陽氣長其色鮮其顏光陽氣衰故顏色焦

六節藏象論

心者生之本神之變也其華在面

註十二經脈三百六十五絡其氣血皆上於面心主血脈故其華在面也

脈要精微論

夫精明五色者氣之華也赤欲如白裏朱不欲如赭白欲如鵝羽不欲如鹽青欲如蒼璧之澤不欲如藍黃欲如羅裹雄黃不欲如黃土黑欲如重漆色不欲如地蒼五色精微象見矣其壽不久也

註此言色生於氣氣生於藏欲其氣華於色而不欲藏象之見於外也赤如白裏朱白如鵝羽青如蒼璧黃如羅裹雄黃黑如重漆乃五藏之氣章華於色也赤如赭白如鹽青如藍黃如土黑如地蒼此五藏之精象見於外也夫藏者藏也如五藏之眞色見而不藏則其壽不久矣明者五藏之神明言五色之發乎五藏之精氣神也

夫精明者所以視萬物別白黑審短長以長爲短以白爲黑如是則精衰矣

註五藏主藏精者也精有所藏而後能視萬物審短長如精微象見於外則精氣內衰視物昏瞑而壽不久矣此反結上文之義而言視精明者由藏精之所資也

肝脈搏堅而長色不青當病墜若搏因血在脅下令人喘逆其耎而散色澤者當病溢飲溢飲者渴暴多飲而易入肌皮腸胃之外也

註肝主血而主色脈盛而色不見者血蓄於下也當病墜傷或爲手搏所傷因血凝脅下故令人喘逆蓋肝脈貫膈上注肺血積於下則經氣上逆而爲喘也其不及而色澤者當病溢飲

胃脈搏堅而長其色赤當病折髀其耎而散者當病食癉

註足陽明之脈從氣衝下髀抵伏兔下足跗髀傷

故脉盛而色赤也飲食於胃由中焦之腐化胃氣不足故當病食痹

脾脉搏堅而長其色黃當病少氣其耎而散色不澤者當病足胻腫若水狀也

註五臟元眞之氣脾所主也濕熱太過則色黃脉盛而少氣矣其不及當病足脛腫脾氣虛故足腫也若水狀而非水病故其色不澤

腎脉搏堅而長其色黃而赤者當病折腰其耎而散者當病少血至令不復也

註腰者腎之腑腰傷故腎脉盛也傷於骨者其色赤黃則外應於肌肉間也其不及當病少血蓋腎爲牝臟受五臟之精而藏之腎之精液復上入心而爲血精虛至令不復化赤而爲血也

五臟生成篇

凡相五色之奇脉面黃目青面黃目赤面黃目白面黃目黑者皆不死也

註奇脉奇經衝任之脉色也衝任爲經血之海五臟之血皆歸於肝故外榮於目面主氣色目主血色目之五色而俱見面黃者五臟之陰而俱得胃脘之陽也

面青目赤面赤目白面青目黑面黑目白面赤目青皆死也

註經云人無胃氣者死面無黃色無胃土之陽矣面之青黑赤色皆臟邪乘陽純陰無陽故皆死也

玉版論要篇

色夭面脫不治百日盡已

註五經之脉見於色氣血衰則面色脫而夭然不澤故至百日五臟之氣盡而已矣

診要經終論

少陰終者面黑

註心之華在面面黑者火氣滅而水氣脫矣

刺熱篇

肝熱病者左頰先赤

註肝屬木而位居東方故左頰先赤

肺熱病者右頰先赤

註肺屬金而位居西方故右頰先赤

腎熱病者頤先赤

註腮下謂之頤腎屬水而位居北方故頤先赤

欬論

久欬不已則三焦受之欬而腹滿不欲食飲此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也

註水聚於胃則上關於肺而爲欬欬則肺舉肺舉則液上溢故使人涕唾水氣上乘故面浮腫而氣逆也

風論

以冬壬癸中於邪者爲腎風腎風之狀多汗惡風面痝然浮腫脊痛不能正立其色炲隱曲不利診在肌上其色黑

註風邪干於腎則水氣上升故面痝然浮腫風行則水渙也

首風之狀頭面多汗惡風

註頭乃諸陽之會因沐中風則頭面之皮腠疎而陽氣弛故多汗惡風也

厥論

陽明之厥則癲疾欲走呼腹滿不得臥面赤而熱妄見而妄言

註癲狂走呼妄言妄見陽明之脉病也其脉循腹屬胃絡脾經氣厥逆故腹滿胃不和不得臥也陽明乃燥熱之經經氣上出於面故面赤而熱

少陽之厥則暴聾頰腫而熱脅痛胻不可以運

註足少陽之脉起於目銳眥從耳後入耳中下頰車循胷過季脅出膝外廉循足跗故逆則暴聾頰腫脅痛足胻不可以運行

脈解篇

少陰所謂面黑如地色者秋氣內奪故變於血也

註秋時陰氣正出則內奪其所藏之陰陰氣上乘故面黑如地色也

鍼解篇

人齒面目應星

註人面有七竅以應七星

骨空論

數髓空在面俠鼻

註言面之俠鼻間而有數處之髓空也

氣交變大論

歲水不及濕迺大行上臨太陰則大寒數舉陽光不治民病寒疾於下復則大風暴發草偃木零生長不鮮面色時變筋骨併辟肉瞤瘛目視䀮䀮物疎璺肌肉胗發氣並鬲中痛於心腹

註六癸之歲水運不及土乃勝之若辛丑辛未歲司天之氣上臨太陰濕土則太陽寒水在泉水弱土勝木後復之陽明屬土主面故面色時變

六元正紀大論

金鬱之發民病欬逆心脅滿引小腹善暴痛不可反側嗌乾面塵色惡

註此受司天在泉之勝制鬱極乃發以報復其歲氣如庚子庚午歲太商金運而上臨少陰庚寅庚申歲太商金運而相火司天乙巳乙亥歲少商金運而君火在泉則金氣皆鬱矣欬逆嗌乾肺病也靈樞經曰足少陽是動病心脅痛不能轉側甚則面有微塵體無膏澤又曰肝是動則病腰痛嗌乾面塵脫色蓋金氣復而肝木病也

至眞要大論

帝曰天氣之變何如岐伯曰陽明司天燥淫所勝筋骨內變民病左胠脅痛寒清於中感而疵大涼華候欬腹中鳴注泄鶩溏心脅暴痛不可反側嗌乾面塵腰痛丈夫癩疝婦人少腹痛目昧眥瘍痓極轉病本於肝太衝絕死不治帝曰治之奈何岐伯曰燥淫所勝平以苦溫佐以酸辛以苦下之帝曰邪氣反勝治之奈何岐伯曰燥化於天熱反勝之治以辛寒佐以苦甘

註陽明司天卯酉之歲也燥金淫勝於上則肝血傷而面塵蓋金淫於上故病本於肝太衝肝經之俞穴脉也肝氣已絕故死不治苦溫能勝清金辛能潤燥燥必內結故以酸苦泄之

歲陽明在泉燥淫所勝甚則嗌乾面塵身無膏澤足外反熱

註陽明在泉于午歲也面有微塵體無膏澤足外反熱少陽病嗌乾面塵乃足厥陰病蓄金勝而肝癢病也

岐伯曰太陽司天寒淫所勝民病厥心痛嘔血血泄鼽衄善悲時欠仰胸腹滿手熱肘攣掖腫心瘈瘲大動胸脅門戟不安面赤目黃善噫嗌乾甚則色始渴而欲飲病本於心神門絕死不治所謂動氣却其藏也帝曰善治之奈何岐伯曰司天之氣風淫所勝平以辛涼佐以苦甘以甘緩之以酸寫之帝曰邪氣反勝治之奈何岐伯曰寒化於天熱反勝之治以鹹冷佐以苦辛

註太陽司天辰戌歲也太陽為諸陽之首即君火之陽然本於在下之寒水今寒淩心火逼其火熱上炎故面赤也

太陰司天客勝則首面肘腫

註此濕淫於上也

靈樞經

本輸篇

手太陽當曲頰足少陽在耳下曲頰之後

邪氣臟腑病形篇

岐伯曰諸陽之會皆在於面邪中於面則下陽明邪中於頰則下少陽

註諸陽之會皆在於面者精陽之氣皆上於面而走空竅也

黃帝問於岐伯曰首面與身形也屬骨連筋同血合於氣耳天寒則裂地凌冰其卒寒或手足懈惰然而其面不衣何也岐伯答曰十二經脈三百六十五絡其血氣皆上於面而走空竅其氣之津液皆上熏於面而皮又厚其肉堅故天熱甚寒不能勝之也

註氣血皆上於面天熱甚寒不能勝之謂陰陽寒暑之氣皆從下而上也

面熱者足陽明病

註衛氣之悍熱太過而上行於面也

終始篇

少陰終者面黑太陰終者善嘔嘔則逆逆則面赤不逆則上下不通上下不通則面黑

註而黑者氣色外脫也

經脈篇

足少陰之脈動則病嗌不欲食面如漆柴

手厥陰之脈動則病心中熱面赤目黃

足少陽之脈動則病口苦甚則面微有塵

足厥陰之脈動甚則面塵脫色

手少陰氣絕其面黑如漆柴

手陽明之脈其支者上頸貫頰

足陽明之脈循頤後下廉出大迎循頰車上耳前

手太陽之脈其支者循頸上頰又支者別頰上頰病則頰腫

手少陽之脈其支者直上出耳上角以屈下頰至頰又支者過客主人前交頰是病則頰腫

足少陽之脈其支者加頰車下頸

足厥陰之脈其支者從目系下頰裏

經別篇

足少陽之正繞髀入毛際合於厥陰別者入季脇之間循胃裏屬膽散之上肝貫心以上挾咽出頤頷中散於面繫目系合少陽於目外眥

註按足少陽之脉起於目鋭眥循頭面而下行於足跗少陽之別繞髀上行至目鋭眥而合於少陽之經是經脉與經別交相逆順而行者也

手少陰之正別入於淵液兩筋之間屬於心上走喉嚨出於面合目內眥

註手少陰之正上出於面亦與足太陽相合於目內眥之睛明水火上下之相交也

厥論

厥頭痛面若腫

註陽明之氣上出於面厥氣上逆於頭故爲頭痛面腫

雜病篇

厥胃滿面腫

註本經曰中於面則下陽明蓋中於面之皮膚則面腫

海論

氣海有餘者氣滿胃中悗息面赤

註氣上逆故面赤也

陰陽二十五人篇

木形之人小頭長面火形之人廣肩鋭面土形之人圓面大頭金形之人方面白色水形之人面不平

註面長者木之體長也面鋭者火之炎上鋭且小也面圓者土之體圓也面方者金之體方也面不平者水面有波也

足太陽之上血少氣多則面多肉血氣和則美色

註足太陽之脉起於目內眥循兩眉而上額交巔血少氣多則面多肉氣之所以肥腠理也血氣和者謂經脉皮膚之血氣和調則顏色鮮美也

手太陽之上血氣盛則面多肉以平血氣皆少則面瘦惡色

註手太陽之脉其上行者循於顴頰耳鼻目眥之間是以皮膚之血氣盛則面多肉以平血氣皆少則面瘦色惡太陽爲諸陽主氣也

扁鵲難經

面色

十三難曰五藏有五色皆見於面

十六難曰假令得肝脉其外證善潔面青善怒得心脉其外證面赤口乾善笑得脾脉其外證面黃善噫善思善味得肺脉其外證面白善嚏悲愁不樂欲哭得腎脉其外證面黑善恐欠

二十四難曰手少陰氣絕則脉不通脉不通則血不流血不流則色澤去故面色黑如黧此血先死壬日篤癸日死

四十七難曰人面獨能耐寒者何也然人頭者諸陽之會也諸陰脉皆至頸胸中而還獨諸陽脉皆上至頭耳故令面耐寒也

漢張機傷寒論要略

面色

問曰病人有氣色見於面部願聞其說師曰鼻頭色青腹中痛苦冷者死鼻頭色微黑者有水氣色黃者胃上有寒色白者亡血也設微赤非時者死其日正圓者死不治又色青爲痛色黑爲勞色赤爲風色黃者便難色鮮明者有宿飲

陽毒之爲病面赤斑斑如錦文

陰毒之爲病面目青

男子面色薄者主渴及亡血卒喘悸脉浮者裏虛也

男子脉虛沈弦無寒熱短氣裏急小便不利面色白

時目瞑兼衄小腹滿此爲勞使之然

面赤如醉者此爲胃熱上熏也

寸口脉微而澀微者衛氣衰澀者榮血不足衛氣衰則面色黃榮血不足則面色青又曰陰陽俱虛則面色青白

心傷者其人勞倦即頭面赤而下重心中痛而自煩發熱當臍跳其脉弦此爲心臟傷所致也

腸間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脉沈緊得之數十日醫吐下之不愈木防己湯主之虛者即愈實者三日復發復與不愈者宜木防己湯主之去石膏加茯苓芒硝湯主之

裏水一身面目黃腫其脉沈小便不利故令病水假如小便自利此亡津液故令渴也

酒疸下之久久爲黑疸目青面黑心中如噉蒜虀狀大便正黑皮膚爪之不仁其脉浮弱雖黑微黃故知之

病人面無血色無寒熱脉沈弦者衄浮弱手按之絕者下血煩欬者必吐血

下利脉沈而遲其人面少赤身有微熱

面赤色者陽氣怫鬱在表當解之發汗則愈

下利清穀者必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也

面瘦面腫

腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上

汗其足逆冷面反瘦
黃汗其脉沈遲身發熱胷滿四肢頭面腫久不愈必致癰膿
寸口脉沈滑者中有水氣面目腫大有熱名曰風水
夫水病人目下有臥蠶面目鮮澤脉伏其人消渴病
水腹大小便不利其脉沈絕者有水可下之
肺癰上氣面浮肩息其脉浮大不治
肺癰胷滿脹一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭
酸辛熬逆上氣喘鳴迫塞葶藶大棗瀉肺湯主之

傷寒論

愧怖之色

問曰人愧者其脉何類師曰脉浮而面色乍白乍赤
問曰人病恐怖者其脉何狀師曰脉形如循絲纍纍
然其面白脫色也

華佗中藏經

五色脉論

面青無右關脉脾絕木尅土面赤無右寸脉肺絕火
尅金面白無左關脉肝絕金尅木面黃無左尺脉腎
絕土尅水面黑無左寸脉心絕水尅火五絕者死凡
五絕當時卽死非其時則半歲死耳五色雖見而五
脉不見卽非死者矣

臟腑虛實寒熱見於面色

肝氣逆則頭痛耳聾頰赤其脉沈而急浮而急亦然
心脉大甚則胷中滿而煩瀼瀼面赤目黃也
凡心病狂言汗出躁身厥冷其脉當浮而大反沈濡
而滑其色當赤反黑者水尅火死不可治也
凡赤黑色入口必死面目赤黃亦死赤如血亦死
又憂愁思慮太過心氣內去其色反和而盛者不出十日死
又心虛則恐懼多驚憂思不樂胷腹中若痛言語顛悵惡惡寒恍惚面赤目黃喜雌診其脉左右寸口兩虛而微者是也
脾病則面色萎黃
又云脾病面黃目赤者可治青黑色入節半歲而死
色如枳實者一月死
脾正熱則面黃目赤骨滿
胃熱則面赤如醉人四肢不收持不安眠語狂目亂便硬者是也
胃脉堅而長其色黃赤病折腰
久欬而見血身熱而短氣脉當澀今反浮大色當白今反赤者火尅金十死不治也
又云面白目青此謂經亂也
又云面黃色白者可治
腎病手足冷面赤目黃小便不禁骨節煩痛小腹結痛氣上衝心脉緩當沈而滑今反浮大其色當黑其翕翕少氣兩耳若聾精自出飲食少便下清脉遲可治
又云腎病其色青黃連耳左右其人年三十許百日死
上焦實則食已虛虛則還出膨脹而不樂處則不能制下遺便溺頭面腫也

察面色形證決死法

黑或如馬肝色墨之如青近則如黑者死
面目直視者死
面青人中反者三日死
面無光牙齒黑者死
面青目黑者死
面白目黑者十日死
面赤眼黃卽時死
面黑目白者八日死
面青目黃者五日死
面黑直視者死
面黑脣青者死
病人黑色出於天中天庭者死
面青目白者死
面黃目白者死
面目俱白者死
面目青黑者死
面青脣黑者死
面色黑滿不能反側者死
面色蒼黑卒腫者死
晉王叔和脉訣

五臟察色歌

心臟歌曰順視雞冠色凶看瘀血凝
註雞冠色赤瘀血赤而黑者赤乃本色爲順黑則水來尅火爲凶
心脉歌曰大實由來面赤風燥痛面色與心同
註心脉大實蓋心家熱則生風故面赤而身有風也有風有熱故燥痛面色與心色同赤之甚也
肝臟歌曰翠羽身將吉顏同枯草殃
註肝木色青翠羽青而紅枯草青而白紅屬心火

白屬肺金木生火故吉金尅木故殃

腎臟歌曰色同烏羽吉形似炭煤危

註腎水色黑烏羽黑而青是水生木故吉炭煤黑而黃是土尅水故危

肺臟歌曰猪膏凝者吉枯骨命難全

註肺金色白而光澤白者金也光澤者水也金能生水故吉枯骨之色白而不澤白者金也不澤者內失其水火就燥也火來尅金故命難全

脾臟歌曰瘡氣冬爲積皮黃四體昏

註脾之積名曰瘡氣在胃脘覆大如盤久不愈令人四肢不收致發黃疸飲食不消肌膚黃瘦

雜病生死歌

中風口噤遲浮吉急實大數三魂孤魚口氣粗難得

瘡面赤如妝不久居

註中風口噤脈遲浮乃病脈相應故吉急實大數乃風熱之極故三魂孤口如魚口之張脾氣絕也氣粗肺氣絕而呼出氣聚也面赤如妝火盛也

病人頭面青黑暗汗透毛端恰似珠

註六陽氣俱絕者則陰與陽相離陰陽相離則腠理泄絕汗乃出大如貫珠轉出不流則氣先死

察色觀病生死歌

面黃目青酒亂顏邪風在胃袞其身面黑目白命門敗困極八日死來侵面色忽然變之青進之如黑卒難當面赤目白憂息氣待過十日定存亡面赤目青衆惡傷榮衛不通立須亡黃黑白色起入目更兼口鼻有災殃面青目黃中特死餘候須看兩日強目無精光齒齦黑面白目黑亦災殃口如魚口不能閉氣出不返命飛揚肩息直視及脣焦面腫蒼黑也難逃妄語錯亂及不語尸臭元知壽不高人中盡滿兼脣青二日須知命必傾兩頰額赤人病久口張氣直命難停

五臟死色歌

肝臟歌曰面腫蒼黑舌卷青四肢乏力眼如盲泣下不止是肝絕八日應當命必傾

心臟歌曰面黧肩息直視看又兼掌腫沒文斑狂言亂語身悶熱一日之內到冥間

脾臟歌曰膀趺腫滿面浮黃泄痢不覺污衣裳肌肉粗澀兼唇反一日十二內災殃

肺臟歌曰口鼻氣出不復迴脣反無文黑似煤皮毛焦乾爪枯折途程三日定知災

腎臟歌曰面黑齒痛目如盲白汗如水腰折頰皮肉濡却髮無澤四日應當命不存

寶漢卿痘瘍全書

面發毒

此證多起於房勞太過乘虛風入經絡陽明經虛發於面也或面生瘡瘢患者欲求速愈而以毒藥敷點或以艾火灸之或以針刀刺之或犯尸神惡宿或破後房事不戒或受狂風霜雪寒露暴戾之氣或服金石草木諸物惡毒相攻相反之劑以致病證日劇殊不知面爲諸陽之首禁火禁刀禁毒況干目口鼻之官總係一處比四肢不同若不保重命亦難生何也面爲陽火氣入之熏蒸肌肉刀針刺之即傷經絡毒藥點之暴劑皮肉轉轉爲患繼之以風邪入之則頭面虛腫目鼻腫脹患處日腐其臭穢難聞脾胃日削寒熱交作痛楚萬狀難以盡言若有五善而無七惡外敷清涼拔毒之藥內服參朮內托之劑每合犀角鬱金散服之以拔積毒其命方可保也否則難生

痄腮毒

此毒受在牙根耳脣通於肝腎氣血不流壅滯頰腮是風毒證先用清肝流氣飲後用托裏流氣飲治之

發隕毒一名流注

傷寒後餘毒不散汗發不透故發此疽在耳後一寸三分或在心窩兩肋在身者可治在耳後相連咽喉毒氣內攻難進飲食藥餌鼻流清膿兩耳閉塞者死無即生用二十四味流氣飲熱服出汗次服千金內托散患上用鐵箍散將薑汁好酢加蜜少許和勻火上熬熱調藥搽四向空中出毒時用餘汁溫潤之

穿腮

一名骨槽風一名穿珠一名附骨一名穿喉一名牙槽風此毒因憂思驚慮太陽受證結於大腸之間邪毒交生灌於經絡之內初起生於耳下及項間隱隱皮肉之內略有小核漸長如李子之狀便覺紅腫或上或下或左或右牙關口噤不開急用鵝毛探出風痰即服驅風破毒散立愈此證小兒亦生者其故何也蓋氣虛弱感風寒暑熱相結成疳或忿食肥甘生冷脯物餘穢積成於牙縫不能潔洗去垢漸爛至臭膿血淋漓日久則氣血凝滯結成多骨而出甚至爛漫穿腮急用珍珠冰片散搽之

頷癰

此毒生於頷上不爲風頷下要成漏瘡不可輕易當用敗毒流氣飲再用內托清肝飲

面風毒

此毒氣血壅上結聚成毒當用鬚疽藥治之先用敗毒流氣飲後用清肝流氣飲治之外用圍藥敷之

頰疽

此毒生於頰車之上多者皆出於附骨亦名附骨疽若不速治漸蝕其骨久後必致成漏終不能痊治用內托散加羌活獨活水煎服次用十奇散加川椒細莘桔梗青皮外用圍藥搽之

鴉嘴瘡

鴉嘴者久中邪熱臟腑虛寒血氣少腠理不密發於皮膚之上相生如錢竅後爛似鴉嘴日久將來損傷難治小兒同前其治法用陰蝕瘡之藥治之

金劉完素六書

胃疽面黃

食已如饑胃熱能消穀陽明脈終心火上行心憎煩面黃小便赤澀茯苓加減湯主之

元張從政儒門事親

面黃腫

凡病面黃身熱肌瘦寒熱往來如瘧更加涎嗽不止喘滿面腫或身體俱熱自汗經云病名傷寒夾勞之證也治之奈何病在上者其高者因而越之可用防己散吐之吐後切用通解丸一服次服人參黃芪散當歸飲子加減小柴胡擇而用之經謂男女之證皆同類用其治法也依此調治無不取效

李杲十書

面赤

諸病面赤雖伏火熱禁不得攻裏爲陽氣怫鬱邪氣在經宜發表之經曰火鬱則發之是也瘡瘍亦然

面腫

虛風痲木牙關緊急目內蠕動胃中有風獨面腫宜升麻胃風湯

面熱

面熱者胃病也飲食不節則胃病胃病則氣短精神少而生大熱有時如火上行獨燎其面

面色

肝病面青脈弦皮急多青則痛形盛骨痛耳聾口苦舌乾往來寒熱而嘔已上是形盛當和之以小柴胡湯也如形衰骨搖而不能安於地此乃膝筋治之以羌活湯本草云羌活爲君也應證取以少陽如久者發爲癰癤宜以鑱鍼刺絕竹穴復以小柴胡湯治之

心病面赤脈洪身熱赤多則熱暴病壯熱惡寒痲黃加知母石膏黃芩湯主之此證如不發汗久不愈爲癰也淹疾顓腫面赤身熱脈洪緊而消瘦婦人則亡血男子則失精

脾病面黃脈緩皮膚亦緩黃多則熱氣勝形也傷寒論是爲濕溫其脈陽浮而弱陰小而急治在太陰濕溫自汗白虎湯加蒼朮主之如久不愈爲溫癘重賜白虎加桂枝主之淹疾肉消食少無力故曰熱消肌肉宜以養血涼藥內經曰血生肉

肺病面白皮澀脈亦澀多白則寒暴病澀瘧氣虛痲黃加桂枝令少汗出也傷寒論曰夏傷於暑汗不得出爲痒若久不痊爲風瘧形衰面白脈澀皮膚亦澀形羸氣弱形淹衛氣不足

腎病面黑牙凉脈沈而滑多黑則痹暴病形冷惡寒三焦傷也治之以薑附湯或四逆湯久不愈爲癘暴氣衛上吐食夜發俗呼謂之夜瘧太陽經桂枝證形衰淹疾黑癉羸瘦風痹痿厥不能行也

又云肺寒則面白生痰喘欬唾嘘

又云肺病面白而不澤則爲脫氣脫血脫津脫液脫精脫神

朱震亨心法

面寒

面寒者胃虛也

面熱

面熱因鬱熱

面鼻得冷則黑

諸陽聚於頭則面爲陽中之陽鼻居面中央而陽明起於額中一身之血運到面鼻到面鼻陽部皆爲至清至精之血矣酒性善行而喜升大熱而有峻急之毒多酒之人酒氣重蒸面鼻得酒血爲極熱熱血得冷爲陰氣所搏汗濁凝結滯而不行宜其先爲紫而後爲黑色也須用融化滯血使之得流滋生新血可以運化病乃可愈予爲酒製四物湯加炒片芩茯苓陳皮生甘草酒紅花生薑煎調五靈脂末飲之氣弱者加黃芪無有不應者

面部凶證

人有病面上忽見紅點者多死

羅天益衛生寶鑑

面熱

如人患面熱脈洪大而有力此乃陽明經多血多氣

因膏粱積熱而致先以調胃承氣湯七錢加黃連三錢犀角一錢疎下三兩行次以升麻黃連湯治之而愈

明戴思恭證治要訣

面風

兩頰赤腫其狀如痱名頭面風酒調消風散食後服仍以杏仁去殼揩之

李梴醫學入門

面寒

胃中有寒濕則面不能耐寒先以附子理中湯次用升麻附子湯

面戴陽證

面戴陽者浮火所衝也又曰面戴陽者面雖赤而不紅活乃下虛也醫者不察誤用凉藥則氣消而成大病矣

面上雜病

凡風刺粉刺黯黯痤痱酒皶肺風諸瘡皆屬面上之病

風客皮膚痰漬臟腑則面生黯黯脾肺風濕搏熱則生瘡紅紫或腫升麻胃風湯加減用之

搭腮腫

腮腫亦名痄腮因風熱或膏粱積熱而作宜升麻黃連湯或升麻胃風湯或荊防敗毒散腫久不消欲作膿宜托裏消毒散腮頰齒牙唇口俱腫出血者宜清胃散加石膏

龔信古今醫鑑

面病專屬胃

手足六陽之經雖皆上至頭而足陽明胃之脉起於鼻交頞中入齒挾口環唇循頰車上耳前過客主人維絡於面上故面病專屬於胃其或風熱乘之則令人面腫或面鼻色紫或風刺癮疹或面熱或面寒隨其經證而治之

若面唇紫黑宜升麻白芷湯

薛己醫案

時毒

時毒者爲四時邪毒之氣感之於人也其候發於鼻面耳目焮赤腫痛重則咽喉頸項亦腫或漫腫無頭或結核有根令人憎寒發熱頭痛或肢體痛恍惚不寧咽喉閉塞醫人不識謂之傷寒便服解熱之劑一二日間腫勢益增始知藥誤原夫此疾古無方論初發狀如傷寒五七日間乃能殺人若能延至十日之外不治自愈也五日以前精神昏亂咽喉閉塞語聲不出頭面益腫食不知味者必死之候治之無功矣然此疾有陽有陰有可汗有可下粗工不識但云熱毒只用寒凉之藥殊不知病有微甚治有逆從不可不審也

脉浮數者邪在表也葛根牛蒡子湯解毒升麻湯升麻牛蒡子散之類以發之脉沈實而便祕者邪氣在裏也宜梔子仁湯脉沈澀者邪氣入深也宜漏蘆湯大黃湯

表實而不解者散之以芩連敗毒散

裏實而不利者下之以五利大黃湯

表裏俱實而不解者宜解表攻裏並施以通聖消毒散

表裏俱解而不消者和之以劫瘴消毒飲

腫甚焮痛者砭去惡血更用消毒以普濟消毒飲次用七神散

頭面耳項赤腫作痛咽乾發熱脉浮數以黃連敗毒散次以劫瘴消毒散七神散

若腫痛發熱作渴而脉實便祕者先以五利大黃湯次以追疔奪命湯又次以水邊嫩柏根水煎入酒和服

腫痛發熱脉浮數以芩連敗毒散次以退熱消毒飲又次以七神散

焮腫脹痛作渴寒熱便祕脉數按之緊實以通聖消毒散次以芩連消毒散又次以七神散

腫勢已盛大熱脉實者先宜砭去惡血次以洗瘴散洗之消腫散刷之却以蛇不見根同白梅搗傅牙齗含去涎初服追疔奪命湯次服七神散萬病解毒丸表邪已解腫尚不退脉滑而數乃瘀血欲作膿也以托裏消毒潰之若脉浮數或洪數者不可托之只宜消之以烏苞子根水煎服又以谷藤根水煎服及用祛瘴散服之又宜於鼻內嗃以通氣散取十餘嚏作效如嗃藥不作嚏者不可治之證也如嚏出膿者治之必愈左右之人每日嚏藥嗃之必不傳染其病人亦每日用嚏藥三五次以泄熱毒此治時毒之良法也

經三四日不解者不可大下猶宜和解之犀角連翹散之類至七八日大小便通利頭面腫起高赤者可服托裏散黃芪散

徐春甫古今醫統

面熱面寒

經曰面熱者足陽明病面寒者爲胃寒陽明胃經氣盛有餘則身以前皆熱況其人素食膏粱積熱於胃陽明經多血多氣本實則風熱上行諸陽皆會於頭目故面熱之病生矣

面腫面浮

面腫屬肝風胃火面浮屬脾土肺金面腫與浮最宜分別腫則爲實因風火上炎紅腫而熱或按而痛此邪有餘脈必急躁緊實面浮則爲虛因脾傷勞役飲食失節水土不調脾氣輸散不常肺氣傳布失度故面虛浮眼下如臥蠶之狀或有氣喘皆其候也此正氣不足脈必虛弱或浮而無力

面色

久病人面色轉黃此欲愈也

病人面紅難愈

不病人面色紅有肺火

瘦人面紅血虛有火

瘦人面白色如枯骨此血虛氣弱當防瘀火病作亦難治

面黃者乃脾胃濕熱病黃而兼青色者爲木尅土主死不治

不病人面色如灰塵眼下青黑即有病至不能治病應愈面色如煤不開者終必死

女人面兩顴煩紅色名曰帶紅花此肺金燥火所乘心火尅肺大腸膀胱無蔭故多淫而無子

女人面色青者性惡多怒

疹腮

疹腮牙病而及於腮頰俱腫是也

樓英醫學綱目

面戴陽證

傷寒少陰證面戴陽者下虛故也宜通脈四逆湯加葱白九葦煎服

面赤色爲陽氣怫鬱在表故用葱白以通陽氣也

王肯堂證治準繩

面部所屬

面統屬諸陽

註靈樞曰諸陽之會皆在於面

又屬足陽明胃經

註素問曰五七陽明脈衰面始焦髮始墮六八陽氣衰竭於上面焦髮鬢頗白靈樞曰邪中於面則下陽明中藏經曰胃熱則面赤如醉人素問又曰已食如饑者胃疸面腫曰風註胃陽明之脈行於面故耳

又屬足太陽膀胱經

註靈樞曰足太陽之上血多氣少則面多小理血少氣多則面多肉肥而不澤血氣和則美色俱有餘則肥澤俱不足則瘦而無澤

又統屬手少陰心經

註素問曰心者生之本神之變也其華在面又曰心之合脈也其榮色也

又以五色候五臟故面青屬肝

註素問曰生於肝如以縞裹紺故青欲如蒼璧之澤不欲如藍註縞繒之精白者紺深青揚赤色又曰青如翠羽者生如草茲者死註茲滋也如草初生之色也

赤屬心

註素問曰生於心如以縞裹朱故赤欲如白裹朱不欲如赭註赭赤土也又曰赤如雞冠者生如鮒血者死註鮒血凝血也

黃屬脾

註素問曰生於脾如以縞裹苦萸實故黃欲如羅裹雄黃不欲如黃土又曰黃如蟹腹者生如枳實者死

白屬肺

註素問曰生於肺如以縞裹紅故白欲如鵝羽不欲如鹽又曰白如豕膏者生如枯骨者死

黑屬腎

註素問曰生於腎如以縞裹紫故黑欲如重漆色不欲如地蒼又曰黑如烏羽者生如始者死註始煤也又曰五臟六腑固盡有部視其五色黃赤爲熱白爲寒青黑爲痛

或曰升麻加黃連湯治面熱升麻加附子湯治面寒有何依據答曰出自仲景雲岐子註傷寒論中辨葛根湯云尺寸脈俱長者陽明受病也當二三日發以其脈俠鼻絡目故身熱目疼鼻乾不得臥此陽明經受病也始於鼻交頞中從頭至足行身之前爲表之裏陽明經標熱本實從標脈浮而長從本脈沉而實陽明爲病主蒸蒸而熱不惡寒身熱爲標病陽明本實者胃中燥鼻乾曰疼爲本病陽明爲肌肉之本禁不可發汗在本者不禁下發之則變黃證太陽主表榮衛是也榮衛之下肌肉屬陽明二陽併病葛根湯

主之衛者桂枝榮者麻黃榮衛之中桂枝麻黃各半湯主之榮衛之下肌肉之分者葛根湯主之又名解肌湯故陽明爲肌肉之本非專於發汗止汗之治桂枝麻黃兩方互併爲一方加葛根者便作葛根湯故榮衛肌肉之次也桂枝芍藥生薑甘草大棗止汗麻黃桂枝生薑甘草發汗葛根味薄獨加一味者非發汗止汗也從葛根以解肌故名葛根湯錢仲陽制升麻湯治傷寒瘟疫風熱壯熱頭痛肢體痛瘡疹已發未發用葛根爲君升麻爲佐甘草芍藥安其中氣朱奉議作活人書將升麻湯列作陽明經解藥予診楊氏婦陽明經標本俱實先攻其裏後瀉經絡中風熱故用升麻湯加黃連以寒治熱也尼長老陽明經標本俱虛先實其裏次行經絡故用升麻湯加附子以熱治寒也仲景乃羣方之祖信哉

面塵運氣面塵有二一曰燥金制肝經云陽明司天燥淫所勝民病嗌乾面塵又云金鬱之發嗌乾面塵宜治以濕劑是也二曰火經云少陽之復厥氣上行面如浮塵目乃瞑宜治以寒劑是也

運氣面赤皆屬寒經云太陽司天寒淫所勝民病面赤目黃治以熱劑是也

脈緊者寒也或面白善嚘或面色惡皆寒也以羌活防風甘草藁本四味瀉足太陽少加附子以通其脈

面色惡悲恐者更加桂附

面痛皆屬火蓋諸陽之會皆在於面而火陽類也心者生之本神之變其華在面而心君火也暴痛多實久痛多虛高者抑之鬱者開之血熱者凉血氣虛者補氣不可專以苦寒瀉火爲事

題屬手足少陽三焦膽手太陽小腸經之會又屬手少陰心經

註靈樞曰心病者顏赤喬岳曰心絕則虛陽上發面赤如脂按如脂者如女人以粉傅面以丹傅顏也夫白者肺之候丹者心之候發明謂之火尅金是從所不勝來者爲賊邪其病不治故脈訣云面赤如妝不久居也

又屬足少陰腎經

註靈樞曰腎病者顏與顏黑

頰屬手足少陽三焦膽手太陽小腸足陽明胃經之會

註素問曰少陽之脈色榮頰前熱病也註足少陽部在頰色赤色也前當依甲乙經作筋靈樞曰邪氣中於頰則下少陽又曰少陽氣至則嚼頰又曰少陽之厥則暴蹇頰腫而熱又曰上部地兩頰之動脈註在鼻孔下兩旁近於巨髎穴之分動應於手足陽明脈氣之所行也巨髎直兩目瞳子

又屬足厥陰肝經

註素問曰肝病氣逆則頰腫

頰瘍

或問頰骨內卒然而痛經宿而痛甚寒熱大作何如曰此頰骨肉疽也屬上焦與陽明經鬱火所致宜活命飲加升麻桔梗乾葛水酒煎服仍與烏金散奪命丹汗之可消按經曰心病者顏赤又曰腎病者顏與顏黑然則當察其色赤者宜以黃連安神丸降心火補心丸養心血黑者宜以地黃丸滋腎水未可專委之陽明鬱火也

頰瘍

或問頰腮生瘡何如曰此名金腮瘡初如米粒漸大如豆久而不治潰蝕透頰屬陽明經初宜勝金丹活命飲加升麻桔梗黃連消毒散選用壯實者一粒金丹下之治不得法潰爛不斂口吐臭痰喘急神昏者死

痱腮

或問腮腋生毒何如曰此名腮頷發肌肉浮而不著骨者名痱腮俱屬陽明風熱所致急服活命飲加元參芩連水酒煎服及紫金丹汗之

痱腮屬足陽明胃經或外因風熱所乘或內因積熱所致若腫痛寒熱者白芷胃風湯內熱腫痛者升麻黃連湯外腫作痛內熱口乾者犀角升麻湯內傷寒凉不能消潰者補中益氣湯發熱作渴大便祕結者加味清凉飲表裏俱解而仍腫痛者欲作膿也托裏散若飲食少思胃氣虛弱也六君子湯肢體倦怠陽氣虛弱也補中益氣湯膿毒既潰腫痛不減熱毒不解也托裏消毒散膿出反痛氣血虛也人參內托散發熱痛熱陰血虛也八珍湯惡寒發熱氣血俱虛也十全大補湯若腫煞痛連耳下者屬手足少陽經當清肝火若連頤及耳後者屬足少陰經虛火當補腎水患此而有不治者多泥風熱執用尅伐之藥耳

發頤

或問顴骨之下腮頷之上耳前一寸三分發疽何如曰此名發頤古云不治之證屬陽明經熱毒上攻宜活命飲加升麻桔梗黃連水酒煎服紫金丹奪命丹汗之壯實者一粒金丹下之老弱者十全大補湯黃

芪內托散人參養榮湯若治不得法延及咽喉潰爛穿口不食者死

按經云腎熱者頤先赤故頤屬足少陰腎經也而今醫師以耳後一寸三分發銳毒者名曰發頤則是少陽分野薛氏亦以爲屬足少陰經當補腎水者何也蓋腎爲相火之宅宅完且固而火得歸息焉則治腎正所以治少陽也此證傷寒汗出不徹者多患之亦有雜證客熱久而不散而發於頤者宜以藥速消散之失治成膿則費手矣若又服尅伐之藥而不滋補其氣血即穿口穿喉而死

面遊風

或問面遊風毒何如曰此積熱在內或多食辛辣厚味或服金石剛劑太過以致熱壅上焦氣血沸騰而作屬陽明經初覺微痒如蟲蟻行搔損則成瘡痛楚難禁宜服黃連消毒散去人參加薄荷梔子及活命飲加桔梗升麻紫金丹烏金散選用外用祛風潤肌之劑敷之

牙叉發

鬼遺云左右牙叉骨接處發癰疽脹攻骨及牙關張口不得因諸風熱上攻或多食燒炙之物所爲或因患牙癰即從牙縫中破出膿血切忌外風水觸犯按此係陽明經鬱熱治宜清胃散甘露飲防風通聖涼膈之屬量虛實表裏用之若服寒涼過多火不歸源者服理中之劑佐以薑附始安

承漿癰

或問地角下生疽何如曰是名頷癰屬陽明胃經積熱所致用白芷升麻湯活命飲加升麻桔梗更服紫金丹汗之壯實者一粒金丹下之

陳實功外科正宗

肺風粉刺酒皶鼻

三名同種粉刺屬肺皶鼻屬脾總皆血熱鬱滯不散所謂有諸內形諸外宜眞君妙貼散加白附子敷之內服枇杷葉丸黃芩清肺飲

雀斑

雀斑乃腎水不能榮華於上火滯結而爲斑當以六味地黃丸以滋化源外以玉容丸早晚搽洗漸愈

白屑風

白屑風生於頭面耳項髮中初起微痒久則漸生白屑壘壘而起脫之又生此皆起於熱體當風風熱所化治當消風散面以玉肌散搽洗去以當歸膏潤之髮中作痒有脂水者宜翠雲散搽之自愈

發頤

傷寒發頤亦名汗毒此因原受風寒用藥發散未盡日久傳化爲熱不散以致項之前後結腫疼痛初起身熱口渴者用柴胡葛根湯清熱解毒患上紅色熱甚者如意金黃散敷之初起身涼不渴者牛蒡甘桔湯散之患上微熱不紅疼痛者仲和膏和之腫深不退欲作膿者托裏消毒散已潰氣血虛弱食少者補中益氣湯以此治之未成者消已成者潰已潰者斂亦爲平常王道之法也用之最穩

黑子

黑子痣名也此腎中污氣混滯於陽陽氣收束結成黑子堅而不散凡人生此終爲不吉面部不善者去之宜細銅管將痣套入孔內撚六七轉令痣入管一拔便去有痣浮淺不能拔者用針挑損痣上搽冰蟬散少許糊紙蓋之三日自脫或灰米膏點之亦可落後珍珠散乾摻生皮而愈忌發酵無斑

疿腮

疿腮乃風熱溫疫所生有冬溫後天時不正感發傳染者多兩腮腫痛初發寒熱以柴胡葛根湯散之外敷如意金黃散在裏內熱口乾二便不利者四順清涼飲利之表裏俱解腫仍不消必欲作膿托裏消毒散膿成者即針之體虛人衰服補托自愈

女人面生黧黑斑

黧黑斑者水虧不能制火血弱不能華肉以致火燥結成斑黑色枯不澤朝服腎氣丸以滋化源早晚以玉容丸洗面斑上日久漸退兼戒憂思動火勞傷等件但此生於夫主不利疑事不決者常有之

時毒

夫時毒者天行時氣之病也春當溫而反寒夏宜熱而反涼秋當涼而反熱冬宜寒而反溫此四時不正之氣感於人發成斯疾也自有陰陽表裏寒熱虛實分治初起與風寒相類惟頭面耳項發腫爲異其患既得寒熱交作體強頭眩脈浮緊數者爲邪在表以荊防敗毒散或萬靈丹發汗以散之如兩目鼻面漸次傳腫者乃正陽明受病其患嫩腫發熱便祕口乾多熱少寒脈數有力爲邪在裏五利大黃湯四順清涼飲下之又頭角兩耳前後結腫者乃手少陽經受之其患耳鳴筋痛寒熱嘔吐口苦咽乾煩躁時甚當以知母石膏湯小柴胡湯和之通用防風通聖散加牛蒡元參解毒攻裏勞役困荒治門閭巷傳染者普

濟消毒飲藿香正氣散以安之表裏俱解腫尚不消宜砭去惡血腫熱甚者如意金黃散敷之微熱不紅堅硬者沖和膏選而用之自後仍不消者必欲作膿宜托裏消毒散加白芷皂角針托之已潰體倦食少者補中益氣湯膿穢脾虛食而嘔吐者香砂六君子湯潰而不斂者十全大補湯又有毒中三陽自頂之以上俱發腫者光如水色雙目合縫唇似豬形口角流涎腫不消潰聲音不出飲食不入咽喉腫閉牙關難開破流臭水穢氣連綿不絕者犯此俱爲不治

時毒看法

初起寒熱交作頭面一處作腫紅赤發熱疼痛者易已成高腫發熱疼痛有時語聲清朗湯藥易入者輕已潰膿稠堅腫漸消疼痛漸減飲食漸進身溫者吉潰後膿水漸止腫退肌寬神彩精寧睡臥安穩者順初起多寒少熱頭面耳項俱腫光如水晶不熱者險已成漫腫無頭牙關緊閉湯水不入聲音不出者逆已潰膿水清稀氣味敗臭腫痛不除如尸發胖者死潰後臭水淋漓腫不知痛手足多冷常出譫言者死

時毒治法

寒熱交作頭眩體痛六脈浮緊邪在表也宜汗散之頭面赤腫作痛口燥咽乾大便祕實邪在裏也下之外有寒熱內亦口乾脈弦有力表裏俱實發表攻裏表裏俱解腫痛仍不消者乃瘀血凝滯宜砭去惡血砭血之後腫痛仍作不消者已欲作膿宜托裏健脾腫痛日多而脹痛者已有膿急針之更兼補托脾胃潰後腫痛不減膿清腥穢脾胃弱也更宜溫中健脾饑年時毒流行傳染者忌用攻發當和解宜養正氣

骨槽風

骨槽風初起生於耳前連及腮頰痛隱筋骨久則漸漸漫腫寒熱如瘧牙關緊閉不能進食此得於鬱怒傷肝致筋骨緊急思慮傷脾致肌肉腐爛膏粱厚味致膿多臭穢初則堅硬難消久則瘡口難合初宜艾灸腫頂及耳垂下五分各灸七壯膏貼以泄內毒眞君妙貼散敷腫上牙關內腫用線鍼刺去惡血冰硼散搽之使內外毒氣得解宜服降火化痰清熱消腫之劑潰後當托裏藥中加麥冬五味外腐者玉紅膏使木升火降脾健金清乃愈又有外腐不合虛熱不退堅腫不消形焦體削者死

景岳全書 臣張介賓著

辨色總論

形者氣之質色者神之華有諸中必形諸外故但知面中形色之常變則凡虛實寒熱凶吉死生之兆已可得其七八而再證以脈再察以因則病無遁情矣凡醫之所貴者在必能無差欲能無差在確有眞見使不有獨見之明則何以隔垣能觀而通神明之理經曰神乎神耳不聞目明心開而志先慧然獨見口弗能言俱視獨見昭然獨明若風吹雲故曰神又曰粗守形上守神故上古使僦貸季理色脈而通神明是可見形中之色無難辨也而色中之神不易言也學者於此必能以神會神斯云神矣又安能以筆格盡哉

面色

面色之辨經言已詳諸所未盡猶當兼察也

病人面赤本皆屬火若滿面微紅而氣盛者此火證無疑也

病人兩顴鮮赤如脂如縫而餘地不赤者此陰虛也仲景曰面戴陽者下虛故也婦人尤多見之

病人面紅不退者邪盛病進爲難愈

病人面白色者氣虛也或白兼淡黃而氣不足者必失血也

病人面白有枯色者血氣俱敗也若證有痰火則尤爲難治

病人面青或兼白者必陽虛陰勝之病

久病人面轉黃蒼此欲愈也

病人面黃潤而微赤者必主濕熱

病人面黃而兼青者此木邪犯土多不可治

病人面色青蒼者多主疼痛

女人面色青者必肝強脾弱多怒少食或經脈不調

面腫有虛實辨

面腫有虛實腫者爲實浮者爲虛實腫者或熱或痛乃因風火上炎此以邪之有餘也脈必緊數證必寒熱風則散之火則清之壅滯祕結則通之利之邪去而腫自消也虛浮者無痛無熱而面目浮腫此或以脾肺陽虛輸化失常或以肝腎陰虛水邪泛溢然浮而就上其形虛軟者多由乎氣腫而就下按而成窩者多由乎水治氣者須從脾肺虛則補之實則順之治水者須從脾腎虛則化之實則瀉之然水氣雖分上下而氣即水之母水即氣之質故有相因之化而亦有相因之治也凡虛浮在氣者雖曰氣虛然亦有虛實之異不可執也蓋虛而浮者多因於脾此或以勞倦或以色慾或以瀉痢或以中寒而脈必微弱氣

必虛餒者是也實而腫者多因於胃或木火熾盛而濕熱上浮或縱酒縱食而陽明壅滯此其脈必滑數證必多熱是也然此證雖浮而不痛不腫自與前證有異虛實即辨則或補或瀉或利或清所當詳酌而爲之治也

面虛浮

面目虛浮有因色慾過度陰虛氣越而致者宜用六味地黃湯或八味地黃湯或加減八味丸

若因勞倦傷脾氣虛不斂而面目虛浮者宜參苓白朮散歸脾湯或十全大補湯

若因飲酒過度濕熱上乘而面目浮腫者宜葛花解醒湯或七味白朮散

若因瀉痢不止脾腎氣虛而面目浮腫者宜胃關煎或溫胃飲

若因飲食不節陽明壅實二便祕結而頭面滿脹者宜廓清飲惟小兒多有此證甚者宜木香檳榔丸下之

若陽明實熱胃火上浮或煩熱乾渴而頭面浮腫者宜抽薪飲或白虎湯或大分清飲利之

凡風熱腫痛此必疹瘍時毒癰瘡之證當察治之甚者防風通聖散主之

石室祕錄臣陳士鐸著

粉刺

粉疵之證乃肺熱而風吹之要亦氣血不和多成此疵雖無關大病然書生嬌女若生此病亦欠丰致我有一方爲之添容方用輕粉黃芩白芷白附子防風各一錢各爲細末蜜調爲丸於每日洗面之時多擦數遍臨睡之時又重洗面而擦之不須三日自然消痕滅瘢矣

面上凍瘡

面上凍瘡乃人不能耐寒而肌膚凍死忽遇火氣乃成凍瘡方用黃犬屎露天久者變成白色用炭火煅過爲末陳石灰各等分以麻油調敷雖成瘡而爛敷上即止痛生肌若雖凍而不成瘡者不必用此藥止消荊芥煎湯洗之三日愈

面瘡

明治法者明示人之病證而不必暗治之也如生瘡毒於面頰間是也有瘡俱照瘡毒之法消之但不可如發背肺癰重證而治之也今有治小瘡毒神方金銀花當歸蒲公英各一兩生甘草三錢荊芥連翹各一錢水煎服一劑輕二劑消三劑愈此明治之妙法也然頭面上切不可用升藥蓋下病宜升而上病不宜升宜用降火之藥

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百五十一卷目錄
醫部彙考一百三十一
面門二
方一　升麻黃連湯　升麻附子湯　冲和順氣湯　升麻胃風湯　犀角升麻湯　加味消毒飲　治面熱　升麻　乾葛各一錢　白芷七分　白芍　甘草各五分　黃連酒炒四分　犀角　川芎　荆芥穗　薄荷各三分
方一　升麻黃連湯
升麻　乾葛各一錢　白芷七分　白芍　甘草各五分　黃連酒炒四分　犀角　川芎　荆芥穗　薄荷各三分
藝術典第一百五十一卷
醫部彙考一百三十一
面門二
方一　升麻黃連湯　升麻附子湯　冲和順氣湯　升麻胃風湯　犀角升麻湯　加味消毒飲　治面熱　升麻　乾葛各一錢　白芷七分　白芍　甘草各五分　黃連酒炒四分　犀角　川芎　荆芥穗　薄荷各三分

右剉先用水半盞浸川芎荆芥穗薄荷外都作一貼水二盞煎至一盞入浸三味再煎至七分去滓食後溫服忌酒麵五辛

升麻附子湯 入門

治面寒

升麻　附子炮　葛根　白芷　黃芪炙各七分　人參　草豆蔻　製甘草各五分　益智仁三分

右剉作一貼入連鬚葱白三莖同煎服食前

冲和順氣湯 鑑

治面虛腫

葛根一錢五分　升麻　白芷　防風各一錢　黃芪八分　人參七分　甘草四分　白芍藥　蒼朮各三分

右剉作一貼入薑三片棗三枚水煎服早飯後午飯前

升麻胃風湯 東垣

治胃毒風腫

升麻二錢　白芷一錢二分　甘草一錢五分　當歸　葛根　蒼朮各一錢　麻黃不去節五分　柴胡　藁本　羌活　黃蘗　草豆蔻各三分　蔓荆子二分

右剉作一貼入薑二片棗二枚水煎服食後

犀角升麻湯 本事

治陽明胃經風熱毒面上腫

犀角一錢五分　升麻　羌活　防風各一錢　川芎　白附子　白芷　黃芩　甘草各五分

右剉作一貼水煎食後臨臥各一服

加味消毒飲 醫林

治搭腮腫

荆芥　防風　惡實　甘草　連翹　羌活各一錢

右剉作一貼水煎服醫鑑一名驅風解毒散

藥連翹得效方下同

治面上熱毒惡瘡

黃蘗製　黃連　胡粉炒各等分

右爲細末豬脂調勻頻塗瘡上

硫黃膏

治面上生瘡或鼻臉赤紫及風刺粉刺諸藥不效

生硫黃　白芷　瓜蔞根　臘粉各五錢　全蝎三箇　蟬殼五枚　芫青七枚去翅足

右爲末另以香油黃蠟和合如面油法火上熔熬取下乃入藥末在內和勻每用少許臨臥洗面後塗面上勿近眼數日亦自消風刺粉刺一夕見效

白附子散 醫鑑下同

治面上熱瘡或斑點

白附子　蜜陀僧　白茯苓　白芷　官粉各等分

右爲末蘿蔔煎湯洗面後羊乳調成膏敷患處明早洗去無羊乳則以人乳代

清上防風湯

清上焦火治頭面瘡癤風熱毒

防風一錢　連翹　白芷　桔梗各八分　荆芥　梔子　黃連酒炒　枳殼　薄荷各五分　甘草生三分　酒炒片芩　川芎各七分

右剉作一貼水煎入竹瀝五匙服

玉容散

治面上黯黯或生燥瘡或生痤痱粉刺之類並皮膚瘙癢能去垢膩

皂角一斤　升麻二兩六錢五分　白芷　白芨　天花粉　菉豆粉各三錢三分半　甘松　縮砂　白丁香各一錢六分半　楮實子一兩六錢五分　糯米三合半

右爲末和勻常用洗面一方加樟腦二錢

連翹散

治面生瘡嘴瘡俗名粉刺

連翹　川芎　白芷　片黃芩　川黃連　沙參　荊芥　桑白皮　梔子　貝母　甘草各七分

右剉作一貼水煎食後服回春一名清肺散

紅玉散

治面上一切酒刺風刺黑黶斑子

白芨三分　白芷　藿香　牙皂各二錢　甘松　木賊　細莘　三柰子　白丁香　杏仁　蜜陀僧各一錢　花粉　白茯苓各一錢半　樟腦五分

右爲末臨臥用津唾調或乳汁調敷面上明早溫水洗去其面如玉

玉容西施散醫林

治證同上

菉豆粉二兩　白附子　白芨　白蘞　白殭蠶　白芷　天花粉各一兩　甘松　三柰子　茅香各五錢　零陵香　防風　藁本各二錢

肥皂角一梃去皮絃

右爲細末每洗面用之面色如玉

塗容金面方醫鑑下同

朱砂　乾胭脂各一錢　官粉三錢　小腦五錢　烏梅肉五箇　川芎少許

右爲細末臨睡時津唾調搽面上天明溫水洗面美如童顏乃神仙妙用之法

白礬散

治粉刺

枯白礬一兩　生硫黃　白附子各二錢

右爲末津唾調搽臨臥上藥明早洗去

又方回春

治粉刺及鼻皶

雄黃　鉛粉各一錢　硫黃五分

右爲末臨臥乳汁調塗明早溫水洗去

洗面藥方

治面有黯黯或生瘡及粉刺之類並去皮膚瘙癢垢膩潤澤肌膚

皂角三斤去皮絃子另搗　菉豆八合揀淨另搗　糯米一升二合　甘松七錢　白芨二兩肥者剉　楮實五兩　三柰子　縮砂連皮　升麻　白丁香　臘月收揀淨各五錢

右七味同爲細末訖和菉豆糯米粉及皂角末一處攪勻用之效

面油摩風膏

治證同上

麻黃二分　升麻根二錢去皮　羌活去皮一兩　防風二錢　當歸身　白芨各一錢　白檀五分

右以綿裹定前藥於銀石器中用油五兩同熬得所澄清去查以黃蠟一兩再煎熬爲度

瑩肌如玉散

香白芷七錢　麻黃去節二錢　白蒺藜　白芨　白丁香　白牽牛　小椒　白蘞各一兩　升麻　當歸稍各五錢　白附二錢五分　楮實子四錢　白茯苓三錢　連翹一錢五分

右爲細末每用五分多少洗之

葶藶大棗瀉肺湯仲景下同

治肺癰面目浮腫

葶藶熬令黃色搗丸如彈子大　大棗十二枚

右先以水三升煑棗取二升去棗內葶藶煑取一升頓服

木防己湯

治支飲心下堅痞面色黧黑

木防己三兩　石膏十二枚雞子大　桂枝二兩　人參四兩

右四味以水六升煑取二升分溫再服

木防己加茯苓芒硝湯

服前藥不愈此方主之

木防己　桂枝各二兩　人參　白茯苓各四兩　芒硝三合

右五味以水六升煑取二升去查內芒硝再微煎分溫再服微利則愈

四物湯

治陰血虛損面黃或腫

熟地　當歸各三錢　川芎一錢　芍藥二錢

右水二鍾煎服

八珍湯局方

治氣血兩虛面黃或腫
人參　白朮　茯苓　白芍藥各二錢　熟地黃　當歸各三錢　川芎　炙甘草各一錢
右水煎服

十全大補湯
治證同上兼陽虛者
人參　白朮　茯苓　芍藥各二錢　熟地　當歸各三錢　川芎　黃芪　炙甘草　肉桂各一錢
右水煎服

人參養榮湯局方
治虛腫
人參　黃芪　當歸　白朮　製甘草　桂心　陳皮各一錢　熟地　五味子　白茯苓各七分　白芍一錢五分　遠志五分
右薑棗水煎服

補中益氣湯東垣
治證同上
人參　黃芪炒　白朮炒　甘草製各一錢五分　陳皮五分　當歸一錢　升麻　柴胡各三分
右薑棗水煎空心午前服

參苓白朮散
治證同上
人參　山藥炒　白扁豆去皮薑汁炒　蓮肉去心　一斤八兩　桔梗炒黃色　白茯苓去皮　砂仁　薏仁炒　製甘草各一斤　白朮二斤米泔浸炒
右爲細末每服二錢米湯調下或加薑棗水煎服或煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心米飲白湯任下

六君子湯
治證同上
人參　白朮炒　白茯苓　製甘草　陳皮　半夏各一錢五分
右水煎服

逍遙散元戎
治陰虛面熱
當歸　芍藥　白朮　茯神　甘草　柴胡各等分
右薑水煎服

六味地黃丸金匱
治陰虛面熱
熟地黃八兩蒸搗　山茱萸肉　山藥炒各四兩　澤瀉　丹皮　白茯苓各三兩
右爲細末和地黃膏加煉蜜爲丸桐子大每服七八十丸空心食前滾白湯或淡鹽湯任下

八味地黃丸古
治腎陽虛火上炎面熱
六味地黃丸　加肉桂　製附子各一兩
右丸法如前

加減八味地黃丸陳氏
治證同上
六味地黃丸　加肉桂一兩　五味子炒四兩　澤瀉切片蒸五次焙用
右丸法如前

黃芪散良方
治氣虛面腫
黃芪蜜製　糯米炒　阿膠炒各等分
右爲細末每服二錢米飲調下

葛花解醒湯東垣
治酒鼾
人參　白朮炒　白茯苓　縮砂仁　白豆蔻　葛花各一錢　青皮炒　陳皮　豬苓　澤瀉各七分　神麯　木香各五分
右生薑五片水二鍾煎七分食遠稍熱服

調胃承氣湯仲景
治時毒面腫又治面熱
大黃去皮酒浸四兩　甘草炙二兩　芒硝八兩
右三味㕮咀以水三升煮取一升去滓內芒硝更上微火煮令沸少少溫服

大黃湯
治證同上
丹皮　瓜蔞仁各三錢　桃仁去皮尖　大黃煨　芒硝各二錢
右水二鍾煎一鍾食前服

麻黃湯仲景
治證同上
麻黃　桂枝各三兩　甘草一兩　杏仁七十個
右四味以水九升先煮麻黃減二升去沫內諸藥煮取二升半去查溫服八合

小柴胡湯
治證同上又治肝病寒熱往來如瘧面色青
柴胡　半夏各八兩　人參　黃芩　生薑　甘草各三兩　大棗十二枚劈

右七味以水一斗二升煑取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

葛根湯

治時毒面腫

葛根四兩　麻黃去節　生薑各三兩　桂去皮

芍藥　甘草炙各二兩　大棗十二枚劈

右七味㕮咀以水一斗先煑麻黃葛根減二升去沫內諸藥煑取三升去滓溫服一升

荊防敗毒散 河間

治證同上

柴胡　荊芥穗　防風　羌活　獨活　前胡

川芎　枳殼　人參　甘草　桔梗　茯苓各等分

右切細加薄荷葉水一盞煎七分去滓溫服

小續命湯 千金

治證同上

麻黃去節　人參　黃芩　芍藥　川芎　防己

炙甘草　杏仁炒　官桂各一兩　防風一兩半

附子炮去皮臍五錢

右㕮咀每服五錢用水一鍾半加薑五片棗一枚煎八分溫服

排風湯 局方

治證同上

防風　白朮　當歸酒浸　芍藥　肉桂　杏仁

川芎　白蘚皮　甘草炙各一錢　麻黃去節

茯苓　獨活各三錢

右分二服薑三片水二鍾煎七分食遠服

羌活勝濕湯

治風濕面腫時毒痄腮

羌活　獨活各二錢　藁本　防風各一錢五分

蔓荊子　川芎　炙甘草各五分

右水二鍾煎八分食後溫服

白虎湯 仲景

治陽明熱壅面腫熱時毒發頤

石膏一斤碎　知母六兩　甘草二兩　糯米六合

右四味以水一斗煑米熟去滓溫服一升日三服

甘露飲

治肺熱時毒

枇杷葉去毛　生地　熟地　天冬　黃芩　麥冬

石斛　茵陳　枳殼各一錢　炙甘草五分

右作一服水二鍾煎七分食後服

普濟消毒飲 東垣

治時毒

酒黃芩　酒黃連各五錢　人參三錢　橘紅

元參　生甘草　桔梗　柴胡各二錢　板藍根

薄荷　連翹　鼠黏子　馬屁勃各一錢　升麻

白殭蠶炒各七分

右爲細末半用湯調時時服之半用蜜丸噙化服盡良愈

烏金散 三因

治時毒

黃丹炒　細墨烟各一兩

右爲末研勻每服三錢食後先用水漱口待心中熱渴欲水便以冷水調下

萬病解毒丹

治證同上一名玉樞丹一名紫金錠

山慈姑 俗名金燈籠　去皮洗極淨焙二兩　文蛤 一名五倍子

搥破洗刮內浮焙乾二兩　千金子 一名續隨子　去殼揀

色極白者用紙包裹換紙研數拾次去盡油以紙無油成霜爲度一兩　麝香揀盡血毛皮細研三錢

紅芽大戟去蘆根洗淨焙乾一兩五錢

右各研爲細末和勻以糯米粥爲劑每料分作四十粒於端午重陽七夕合如欲急用辰日亦得於木臼中杵數百下不得令婦人孝子不具足人雞犬之類見之切宜祕惜不可廣傳輕之無效

紫金丹

治證同上

川烏炮　草烏炮各一兩　五靈脂　骨碎補

木鼈子去殼　青皮　金毛狗脊　防風　烏藥

自然銅酢焠七次　地龍去土　葳靈仙　茴香

陳皮　黑牽牛各半錢　乳香　紅娘子　沒藥

麝香各二錢五分　禹餘糧酢炒四兩

右爲細末酢麪糊爲丸如桐子大每服十丸至二十丸溫酒調下

柴胡梔子散

治證同上

柴胡　梔子炒　丹皮各一錢　白茯苓　川芎

白芍藥　當歸　牛蒡子炒各七分　甘草五分

右水煎服

附子理中湯 仲景下同

治面寒

人參　白朮土炒　乾薑炒　炙甘草各三兩

附子一二三錢或炮用亦可
右水煎服
四逆湯
治證同上
炙甘草二兩　乾薑炮三兩　生附子一枚破八片
右㕮咀以水三升煮取一升二合分二次溫服
薤附湯良方
治證同上
乾薑一兩　附子一枚生用
右每服五錢水煎服
奪命丹
治時毒面腫
鱉酥酒化　輕粉　麝香各五分　枯礬　銅綠
寒水石煅　乳香　沒藥各一錢　硃砂三錢
蝸牛二十個另研無亦可
右爲末用蝸牛或酒糊搗丸菉豆大每服一三丸
溫酒葱湯下
冲和膏
治證同上
紫荆皮炒五兩　獨活炒三兩　赤芍藥炒二兩
菖蒲　白芷各一兩
右爲末葱頭煎湯調搽
升麻湯
治證同上
川升麻　桔梗炒　薏苡仁　地榆　赤芍藥炒
黃芩炒　牡丹皮　生甘草各一錢
右水二鍾煎八分食遠服
溫胃飲景岳全書下同
治脾腎氣虛面目浮腫
人參一二三錢或一兩　白朮炒一二錢或一兩
扁豆炒三錢　當歸一二錢　焦乾薑一二三錢
陳皮　甘草各一錢
右水二鍾煎七分食遠溫服
胃關煎
治證同上
熟地三五錢或一兩　山藥炒　扁豆炒各二錢
炙甘草一二錢　焦乾薑　白朮炒各一二三錢
吳茱萸製五七分
右水二鍾煎七分食遠溫服
廓清飲
治陽明藥實二便祕結頭面滿脹者
枳殼二錢　厚朴一錢五分　大腹皮一二錢
白芥子五七分或一二錢　茯苓連皮　澤瀉各一
三錢　陳皮　蘿蔔子生搗各一錢加不應硝食者去之
右水一鍾半煎七分食遠溫服
大分清飲
治胃火煩湯頭面浮腫者
茯苓　澤瀉　木通各二錢　梔子炒或佐　猪苓
枳殼　車前子各一錢
右水一鍾半煎八分食遠溫服
抽薪飲
治陽明實熱上炎面頭面浮腫者
黃芩　石斛　木通　梔子炒　黃蘗各一二錢
枳殼　澤瀉各錢半　小甘草二分
水一鍾半煎七分食遠溫服內熱甚者冷服更佳
托裏消毒散來垣下同
治面頰一切腫毒
人參隨證增減　黃芪鹽水拌炒　當歸　川芎
芍藥炒　白朮炒　茯苓各一錢　甘草　連翹各
五分　金銀花　白芷各七分
右水煎服
梔子仁湯
治證同上
豆豉百粒　梔子　赤芍　大青　知母各一錢
升麻　柴胡　黃芩　石膏　杏仁　甘草各二錢
右水煎服
人參敗毒散
治證同上
人參　白茯苓　枳殼炒　甘草　川芎　羌活
獨活　前胡　柴胡　桔梗各等分
右薑三片水一鍾半煎服或爲細末沸湯點服
消風散局方
治證同上
荆芥穗　炙甘草　人參　川芎　防風　羌活
蟬蛻炒　薄荷　殭蠶炒　茯苓各二錢　陳皮
厚朴各一錢
右爲末每服二三錢茶清調下
如意金黃散
治證同上
天花粉十斤　黃蘗　薑黃　大黃各五斤　白芷
三斤　厚朴　陳皮　甘草　蒼术　南星各二斤

右以上共爲咀片曬極乾燥磨三次方用密絹羅廚篩出磁瓷收貯勿令泄氣

眞君妙貼散

治證同上

明淨硫黃十斤爲末　蕎麪　白麪各五斤

右共一處用清水微拌乾濕得宜木箱內曬成麪片單紙包裹風中陰乾收用臨時再研極細用新汲水調敷

冰蛸散

治證同上

大田螺五枚去殼曬乾　冰片一分　硇砂二分

白礬一錢二分麪裹煨熟

右用曬乾螺肉切片同煨熟白礬研爲細末加硇片再研小罐密收

黃芪內托散

治證同上

川芎　當歸　黃芪各二錢　白朮炒　金銀花

天花粉　牙皂鍼各一錢　甘草　澤瀉各五分

右水二鍾煎八分食前服

翠雲散

治證同上

銅綠　膽礬各五錢　輕粉　石膏煅各一兩

右共研極細末磁罐收貯濕瘡乾摻乾瘡公猪膽汁調點三日點三次其瘡自乾而愈

柴胡葛根湯

治證同上

柴胡　天花粉　乾葛　黃芩　桔梗　牛蒡子　連翹　石膏各一錢　甘草五分　升麻三分

右水二鍾煎八分不拘時服

牛蒡甘桔湯

治證同上

牛蒡子　桔梗　陳皮　天花粉　黃連　川芎　赤芍　甘草　蘇木各一錢

右水二鍾煎八分食後服

玉容丸

甘松　山柰　細辛　白芷　白蘞　白殭蠶　白芨　防風　荆芥　山梔仁　藁本　天麻　羌活　獨活　陀僧　枯礬　檀香　川椒　菊花各一錢　紅棗肉七枚

右爲細末用去淨弦膜皂角一斤同搥作丸如秋冬加生蜜五錢如皮膚麤糙加牛骨髓二錢早晚洗之肌膚自然瑩潔如玉溫潤細膩

玉肌散

菉豆半升　滑石　白芷　白附子各二錢

右共爲細末每用三匙早晚洗面時湯調洗患上

灰米膏

治面身黑痣黑醬及粉刺

石灰一塊

右用醲水調稠將白糯米插入灰內留半米在外經一宿候米色變如水晶痣上用鍼微微撥破置少許水晶者於上半日醬痣之汗自出乃去藥自落矣二三日勿著水

珍珠散

治證同上

琥珀　珍珠粉　鐵粉　花粉　硃砂　寒水石　牙硝　大黃酒浸　生甘草各等分

右爲末每服二錢薄荷湯調下

消腫散

治證同上

大黃　水仙子　山藥　芎根　青露　小赤豆　寒水石　水蠱　香蛤粉　花蕊石

右將前藥搗和如乾加酢蜜調勻

勝金丹

治證同上

麝香　白礬製各五分　眞蟾酥一錢　雄黃　辰砂　乳香　沒藥　血竭各一錢五分　天龍去頭足製　全蝎炮製　穿山甲炙各二錢　殭蠶去絲炙五錢

右爲細末和勻每服三分赤沙糖調葱頭酒送下

七聖散

治證同上

枳殼去瓤麩炒　天麻各一兩　大黃　地骨皮　白蒺藜　芎藭各五錢　薏苡仁七錢五分

右爲細末每服二錢溫水調下不拘時忌食生冷油膩猪雞

追疔奪命湯

治證同上

羌活　獨活　青皮多用　防風多用　赤芍藥　黃連　細辛　甘草節　蟬蛻　脚連（即雞爪黃連）　殭蠶各等分　加河車　澤蘭　金銀花

右㕮咀每服五錢先將一服加澤蘭少用紮金銀

花各一兩生薑十片同藥擂爛好酒鏇之熱服不喫酒者水煎爲妙然後用酒水各一盞半生薑十片煎之熱服汗出爲度病退減後再加大黃二錢煎之熱服再以利一兩次去餘毒爲妙

有膿加何首烏白芷

便祕加青木香大黃牽牛梔子

刼瘴消毒散

治證同上

百丈光（即天狐一名土人參）　苦花子　金腦香　大小青　紫金藤　生藍葉　水棠根　烏苞根　嫩柏根　青王叉　山烏豆　雞屎子　晚祥西　狸咬柴　土木香　臭木待根

右薄荷煎服

洗瘴散

治證同上

柏葉　朴葉　柳枝　連叉葉

右水煎淋洗之

祛瘴散

治證同上

苦花丁（一名苦花椒）

右擂水服夏月冷服冬月溫服

連翹敗毒散

治發頤初腫服此消之

連翹上　羌活　獨活　荊芥　防風　柴胡　桔梗　川芎　牛蒡子新瓦上炒研　歸尾酒洗　天花粉俱中　紅花酒洗　蘇木　升麻　甘草俱下

右用水酒各一鍾同煎至一鍾去滓徐徐溫服

未消加穿山甲蛤粉炒一錢

腫至面者加香白芷一錢漏蘆五分

大便燥實者加酒浸大黃一錢五分壯者倍用之

凡內有熱或寒熱交作者倍用柴胡加酒洗黃芩一錢酒炒黃連一錢

加味消毒飲子

治搭腮癰

防風　荊芥　連翹　牛蒡子　羌活　甘草等分

右爲麤末水煎三兩服散毒然後用藥塗腮腫處切不可先便用藥塗致毒氣入喉中不救

內托消毒散

治發頤有膿不可消者已破未破服之

黃芪上　人參　防風　白芷　川芎　當歸　桔梗　連翹　升麻　柴胡　銀花　甘草節俱中

右用水酒各一鍾同煎一鍾去滓徐徐溫服

瘡破者以眞武膏貼之四圍赤腫不退者仍以後藥塗之兼服蠟礬丸最妙

消毒救苦散

治面頰瘡癤消腫散毒

大黃三錢　黃芩　黃連　黃蘗　白蘞　白芨　芙蓉葉　大薊根　南星　半夏　紅花　歸尾　檀花　赤小豆　白芷各一錢五分　矾硝　雄黃另研末各一錢

右爲末用米酢調塗傅四圍畱頭如乾卽又傅

敷毒方

治發頤時毒

見腫消　生白芨　白蘞　土大黃　生大薊根　野苧麻根

右共搗成餅入矾硝一錢和勻貼腫上畱頭勿貼如乾卽換之若更加山慈菇金線重樓根尤妙

百合散

治頤頦瘡一名獨骨瘡

百合　黃蘗各一兩　白芨二錢五分　蓖麻子五十粒研

右爲末用矾硝水和作餅貼之日三五次

二金散

治大人小兒蝕透腮頰初生如米豆名含腮瘡

雞內金　鬱金

右等分爲末先用溫漿水盥漱了貼之

芙蓉敷方

治腮頷腫痛或破成瘡

芙蓉葉不拘多少

右搗爛傅之以帛紮定日一換

神效方

治痄腮

赤小豆不拘多少

右爲細末以新汲水調敷瘡上及四邊赤腫處乾則再傅之

塗面方

塗斷鬚不令生瘡

猪苓　麻黃　桂枝　白蒺藜　白蘞　白附子　連翹　防風　白芷　當歸身　白芨　升麻根

右等分爲末洗面用之臨臥唾調少許塗面上

白附丹

治男子婦人面上黑斑點

白附子一兩　白芨　白蘞　白茯苓　密陀僧

白石脂　定粉研細各等分

右爲細末用洗面藥洗淨臨睡用人乳汁如無用牛乳或雞子清調和丸如龍眼大逐旋用溫漿水磨開傅之

祛風白芷散

治面上風癬瘡

白芷三錢　黃連　黃蘗　黃丹各二錢　白茯苓一錢五分　輕粉一錢

右爲細末用油調搽癬瘡上或加孩兒茶二錢麝香二分亦可

升麻牛蒡子散 郭氏

治時毒瘡疹脈浮洪在表者瘡發於頭面胷膈之際

升麻　牛蒡子炒　桔梗　甘草　葛根　元參

麻黃一錢　連翹二錢

右㕮咀薑三片水二盞作一服

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百五十二卷目錄

醫部彙考一百三十二

面門三

方二　鉛紅散　天麻散　升麻牛蒡子散　芩連敗毒散　葛根牛蒡湯　返魂丹　漏蘆湯　五利大黃丸　防風通聖散　通聖消毒散　柏湯丸　芩連消毒飲　瀉脾大升陽湯三黃瀉中湯　葛葉湯　七白散　天水散　破棺散　五皮散　當歸補血湯　十補丸　涼膈散　梔子仁湯　異功散　神效黃芪湯　升陽益胃湯　茯苓滲濕湯　大藎絲子丸　五皮散　又方　羌活當歸散　菊花散　白蘚皮湯　荊芥散　何首烏丸　透冰丹　清震湯　連翹子散　苗陳散　大連翹散　防風散　羚角湯　人參蛤蚧散　菊花散　又方　馬頭酒　清涼摩青　王不留行湯　犀角湯　抵毒散　參朮內托散　犀角鬱金散　清肝瀉脾托裏流氣飲　千金內托散　不換金散　馨風破毒散　又方　清熱消痰散　珍珠冰片散　白蘚散　硫黃散　連子衛矛方　黃連消毒散　仙方活命飲

藝術典第一百五十二卷

醫部彙考一百三十二

面門三

方二

鉛紅散

治風熱上攻陽明經絡面鼻紫皂斑刺癮疹

船上硫黃　白礬灰各五錢

右爲末少許入黃丹染與病人面色同每上五分津液塗之

天麻散

治頭頂痛頭面腫拘急風傷榮衛發燥熱

炙甘草二兩　川芎　細辛　苦參　地骨皮　菖蒲　何首烏　蔓荊子　薄荷葉　杜錢絮　牛蒡子　荊芥穗　蚵蛄草　蔵靈仙　防風　天麻各一兩

右爲末每服二三錢蜜水調下茶水亦可不計時

升麻牛蒡子散

治時毒

升麻　赤芍藥　乾葛　青木香　甘草　防風　白芷　荊芥　牛蒡子　桔梗　金銀花　元參　麻黃　連翹　藍葉

右薄荷煎服

芩連敗毒散

治時毒腫發熱左脈浮數者

防風　荊芥穗　黃連　黃芩　連翹　羌活　獨活　柴胡　前胡　川芎　桔梗　金銀花　藍葉　元參　升麻　牛蒡子　赤芍藥　白芷　甘草　乾葛　青木香

右生薑薄荷煎服發熱無汗加麻黃

葛根牛蒡湯

治時毒腫痛而便利調和者

葛根　貫衆　甘草　豆豉　牛蒡子半生半炒各二錢

右水煎服

返魂丹

治時毒瘴氣疔瘡惡疳　黃丹　山甲炮　白礬枯　銅青　乳香　沒藥輕粉　蟾酥各一錢　麝香二分五釐

右爲末酒煮麵糊九胡椒大每服二丸葱白一根嚼爛裹丸溫酒吞下

漏蘆湯

治時毒頭面紅腫咽喉閉塞水藥不下或素有臟腑積熱發爲腫毒疙瘩一切腫瘍惡瘡便實者

漏蘆　升麻　大黃　黃芩　青木香　藍葉　元參　牛蒡子　桔梗　連翹　甘草　苦參

右薄荷煎服

五利大黃湯

治時毒瘧赤腫痛煩渴便祕脈實數者大效

大黃　黃芩　升麻　梔子　芒硝

右薄荷煎服加連翹元參大青甘草名梔子仁湯加減解毒丸

治時毒疔瘡瘴氣癰疽發背無名腫毒解砒霜光粉鳳尾蛇犬蜈蚣白蟻蜂蠆菌菰惡瘡等毒可以磨服可以磨塗大效如神

五倍子三兩　山慈姑二兩　大戟一兩五錢　朱砂　雄黃各三錢　麝香二錢　續隨子去殼一兩

右爲末林米粉糨糊杵搗爲丸印作錠子陰乾每服一錠井華水磨化服冬月薄荷湯磨化服一切腫毒米泔水磨塗或用芙蓉葉搗汁磨塗更妙凡修合此藥要端午七夕重陽日或選天德月德日德天醫日最佳合時要淨室焚香至誠修製勿令孝婦雞犬見之效驗不可具述

漏蘆散

治藏腑積熱發爲腫毒時疫疙瘩頭面洪腫咽嗌堵塞水藥不下一切危惡疫癘

漏蘆　升麻　大黃　黃芩各一兩　板藍葉元參各二兩

右爲麤末每服二錢水煎服熱甚加芒硝二錢半

消毒丸

治時毒疙瘩惡證

大黃　牡蠣煅　白殭蠶炒各一兩

右爲細末煉蜜丸彈子大新水化下一丸無時用桔梗鼠粘子湯化下尤妙

防風通聖散

治時毒熱毒便祕熱燥若時毒饑饉之後胃氣虧損者須當審察非大滿大實不用

防風　當歸　川芎　白芍藥　大黃　芒硝連翹　薄荷　麻黃　桔梗　石膏　滑石黃芩各一兩　甘草二兩　白朮　山梔子荊芥蘸各二錢五分

右水煎服或爲末白湯調下量人虛實

通聖消毒散

治時毒腫痛表裏俱實者

防風　荊芥　連翹　赤芍藥　歸尾　青木香黃芩　麻黃　梔子　牛蒡子　黃連　黃藥石膏　滑石　大黃生　朴硝　川芎　桔梗元參　藍葉　甘草

右薄荷煎服大便利去大黃朴硝

中和湯

治時毒脈浮在半表半裏者

菖蒲　牛蒡子　川芎　羌活　防風　漏蘆荊芥　麥門冬　前胡　甘草各等分

右㕮咀每服一兩水煎服

芩連消毒飲

治時毒發熱惡寒頭項腫痛脈洪數

防風　荊芥　連翹　柴胡　牛蒡子　黃芩川芎　羌活　桔梗　藍葉　射干　青木香黃連　甘草　金銀花　白芷

右薄荷煎服

瀉陰火升陽湯東垣下同

治肌熱煩熱面赤食少喘咳痰盛

羌活　甘草　黃芪　蒼术各一兩　升麻八錢柴胡一兩半　人參　黃芩各七錢　黃連酒炒石膏各五錢秋深不用

右㕮咀每服一兩或五錢水煎服

三黃補血湯

治六脈俱大按之空處面赤善驚上熱乃手少陰心脈也此氣盛多而亡血以甘寒鎮墜之劑大瀉其氣以墜氣浮以辛甘微苦峻補其血

丹皮　黃芪　升麻各一錢　柴胡錢半　熟地川芎各二錢　生地三錢　當歸　白芍各五錢

右㕮咀如麻豆大每服五錢水二大盞煎至一大盞去查稍熱服食前

補中湯

治面黃汗多目赤四肢沉重減食腹中時時痛欬嗽兩手寸脈短右手脈弦細兩尺澀關脈虛

升麻　柴胡　當歸各二分　神麯炒三分　澤瀉四分　大麥蘗　蒼术各五分　黃芪二錢五分炙甘草八分　五味子二十箇　紅花少許

右㕮咀分作二服水二盞煎至一盞去查食遠服

菊葉湯

治一切風頭目昏眩嘔吐面目浮腫者

菊花去梗　羌活　獨活　旋覆花　牛蒡子甘草各等分

右爲末每服二錢水一盞生薑三片同煎至七分去查溫服食後

密補固眞丹

治脾腎眞元虛損面黧身悴目黃口燥髮墮爪退風虛偏枯中滿腸氣一切脾胃虛證常服補養宣通氣血

天南星五錢　半夏製　神麯　麥蘗　茴香炒三稜炮　白附子　乾生薑　川烏頭生各一兩巴豆七箇　牽牛三兩　代赭石二兩　官桂一分

右爲末水和丸小豆大每服十九加至五十九溫水下除泄瀉外並加大黃一兩

天水散

治面熱

滑石六兩　炙甘草一兩

右爲極細末水調服

七白散

治面上黯黯

白蘞　白朮　白牽牛　白附子　白芷　白芍白殭蠶各等分

右爲末用洗面

破棺散

治厥陰面目俱青心下硬四肢冷脈細而欲絕用之

硫黃酒煮　朱砂研各一兩

右二味酒丸雞頭大入室中勿令人知同病人身長掘一坑深一尺入粟稈火燒坑子極熱醋五升沃氣出衣被鋪坑以酒化一丸服之後令病人坑上臥少時汗出

五皮散

治男子婦人脾胃停滯頭面四肢悉腫心腹脹滿上氣促急胃腸煩悶痰涎上壅飲食不下行步氣奔狀如水病先服此藥能疎理脾氣消退虛腫切不可亂服瀉水等藥以致脾元虛損所患愈甚此藥平良無毒多服不妨

生薑皮　桑白皮　陳橘皮　大腹皮　茯苓皮各等分

右爲麤末每服三錢水一盞半煎至八分去查不計時候溫服忌生冷油膩硬物

當歸補血湯

治血氣損傷或妄服峻劑致氣血益虛肌熱大渴引飲目赤面紅脈洪大而虛重按全無此病多得於饑飽勞役者

黃芪蜜炙一兩　當歸酒炙三錢

右水煎服

十補丸

治腎臟虛冷面頰黧黑足寒耳聾膝軟小便不利等證

附子炮　五味各二兩　山茱萸　山藥　桂心　牡丹皮　鹿茸炙　澤瀉　茯苓各一兩

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服六七十丸鹽湯送下

涼膈散

治上焦積熱煩渴面赤頭昏咽燥喉痛口瘡便溺赤澁並宜服之

連翹去心四兩　大黃　朴硝　山梔子　黃芩　薄荷葉各一兩

右爲末每服五七錢水煎

梔子仁湯

治時毒腫痛大便祕結等證

鬱金　枳殼麩炒　升麻　山梔子仁炒各等分

右每服五錢水煎服

異功散

治久瘀不已或腹痛少食面腫氣逆又治脾胃虛弱飲食少思面黃等證

人參　白茯苓　白朮　甘草　陳皮各等分

右每服三五錢薑棗水煎服

神效黃芪湯

治頭面手足癱木不仁目緊縮小及羞明畏日或視物不明

黃芪二兩　人參八錢　陳皮五錢　甘草炙

白芍藥　蔓荊子各一兩

右每服五錢水煎臨臥熱服如癱木不仁雖有熱證不用黃蘗更加黃芪

升陽益胃湯

治脾胃虛弱四肢怠惰時值秋燥之令體重節痛口乾燥飲食無味大便不調小便頻數兼見肺病洒淅惡寒面色惡而不和乃陽氣不伸故也當升陽益胃

羌活　獨活　防風各五錢　柴胡　甘草炙

人參　半夏　黃芪炙各一兩　白茯苓　澤瀉

白朮各三錢　白芍藥　黃連　陳皮各四錢

右每服三五錢薑棗水煎服

茯苓滲濕湯 寶鑑

治黃疸寒熱嘔吐渴欲飲水身體面目俱黃小便不利全不思食不得臥

茵陳七分　白朮　黃連　猪苓　陳皮　澤瀉

蒼朮米泔浸一宿炒各五分　白茯苓六分　山梔子炒　防己　秦艽　葛根各四分

右水二鍾煎七分食前服

大菟絲子丸 和劑

治腎氣虛損五勞七傷脚膝痠疼面色黧黑目眩耳鳴心忡氣短時有盜汗小便滑數

菟絲子洗淨酒浸　肉桂去麤皮　附子炮去皮

鹿茸去毛酥炙　澤瀉　石龍芮去土各一兩

石斛去根　熟地黃　防風去蘆　白茯苓去皮

牛膝酒浸一宿焙乾　山萸肉　肉蓯蓉酒浸焙

杜仲去麤皮炒去絲　補骨脂去毛酒炒　沉香

蕈澄茄　巴戟去心　茴香炒各三兩　五味子

桑螵蛸酒浸微炒　覆盆子去枝葉并蓼　菖蓼各半兩

右爲細末酒煮麵糊丸如桐子大每服二十丸空心溫酒鹽湯送下

又方

治酒皶雀斑等疾亦可點痣最妙

黃丹五文　硇砂三十文研極細末　巴豆十粒去殼心膜紙搥去油　酒藥餅五十文罐子盛

右同入餅藥罐子中慢火煎兩三沸取下綿入研細生礬灰三錢雞子清調勻雀斑用小竹棒挑藥點患處緩覺小腫即洗去不洗恐藥力太猛

又方

治面上風瘡

大楓油五十文　草烏一箇爲末　輕粉一百文　麝香一百文

右先將草烏入油內熬令勻取出少時下輕粉麝香末攪勻每用少許擦患處令熱旬日瘥一方無輕粉用生薑擦患處傳藥

五皮散（和劑）

治風濕客於脾經氣血凝滯以面目虛浮四肢腫滿

五加皮　地骨皮　生薑皮　大腹皮　茯苓皮各等分

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分熱服

導滯通經湯（資生經）

治脾濕有餘及氣不宣通面目手足浮腫

木香　白朮　桑皮　陳皮各五錢　白茯苓去皮一兩

右㕮咀每服五錢水二盞煎一盞去查溫服空心食前

蓼蘆丸

治肺氣咳嗽面目浮腫喘促不安小便赤色

甜葶藶隔紙炒　貝母煨黃色　木通各一兩　杏仁去皮尖雙仁炒　防己各二兩

右爲細末用棗肉和丸如梧桐子大每服五十丸桑白皮煎湯食前送下

元參升麻湯

治心脾壅熱舌上生瘡木舌舌腫或連面頰兩項腫痛

元參　升麻　犀角　赤芍藥　桔梗　貫衆　黃芩　甘草各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半煎七分去查不拘時服

羌活當歸散

治風毒血熱頭面生瘡或赤腫或成塊或癮疹瘙瘍膿水淋漓

羌活　當歸　川芎　黃連酒浸炒　鼠黏子蒸　防風　荊芥　甘草　黃芩酒炒　連翹　白芷

升麻各一錢

右用酒拌曬乾水煎服

菊花散

治一切風頭眩目昏面浮腫

菊花　旋覆花　牛蒡子　羌活　獨活　甘草炙各等分

右㕮咀每服五錢水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

白鮮皮湯

治肺受風面白色枯頰時赤皮膚乾燥鼻塞乾痛此爲虛風

白鮮皮　麥冬　白茯苓　杏仁去皮尖雙仁炒細辛　白芷各一兩半　桑皮　石膏研各二兩

右每服三錢水三盞先煮大豆三合取汁一盞去豆下藥煎至七分去查不拘時服

大楓油

治肺風面赤鼻赤

草烏尖七箇　大楓油五十文　眞麝香五十文

右以草烏尖爲末入麝研勻次用大楓油磁盒子盛於火上調勻先以生薑擦患處次用藥擦之一日二三次兼服後何首烏丸卽除根本

何首烏丸

治肺風面赤鼻赤

何首烏一兩五錢　防風　黑豆去皮　荊芥　地骨皮洗各一兩　桑白皮　天仙藤　苦參　赤土各五錢

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服三四十丸食後茶清下一方有藥本一兩

透冰丹

治一切風毒上攻頭面腫癢痰涎壅塞心胷不利口舌乾澁風毒下注腰脚沉重腫痛生瘡大便多祕小便赤澁

川大黃　山梔子　蔓荊子　白茯苓　益智子　白芷　蔻靈仙洗焙乾各五錢　麝香研一錢　香墨煆酢淬訖細研一錢　茯神半兩　川烏二兩

河水浸半月焙乾鹽炒　天麻　仙靈脾葉洗焙
右爲細末煉蜜和如麥飣相似以眞酥塗杵臼搗萬杵如乾旋入蜜令得所和成劑每服旋丸如梧子大用薄荷自然汁同溫酒化下兩丸如卒中風涎潮昏塞煎皂莢白礬湯放溫化四丸灌之癱瘓風每日服三五丸漸覺有效常服一丸疎痰利鬲用溫酒下食後服或小兒驚風入臙粉少許薄荷汁化下半丸立效治瘰癧葱湯化下一丸忌動風毒物

冬瓜子散
治面鼻酒皶如麻豆疼痛黃水出
梔子仁二兩　冬瓜子仁　柏子仁　白茯苓
葵子微炒　枳實麩炒各一兩
右爲細末每服二錢食後米飲調下

荊芥散
治肺風皶疱
荊芥穗二兩　防風　杏仁去皮尖　白殭蠶炒
蒺藜炒去刺　炙甘草各一兩
右爲細末每服二錢食後茶清調下

蒺麻子膏
治酒皶鼻及肺風面赤生瘡
蒺麻子　輕粉　滑石　硫黃俱研　黃蠟各二錢
右以麻油一兩熬成膏以磁器盛之每用小許塗於患上最妙

茵陳散
治牙齒疼痛面上赤腫疼痛及去骨槽風熱
茵陳　白殭蠶　連翹　半夏　荊芥穗　麻黃　升麻　獨活　大黃　薄荷　黃芩　丹皮　射干羌活各二錢半　細辛五錢　牽牛一兩
右爲細末每服三錢水一盞先煎湯熱下藥末攪一攪急瀉出食後連查熱服

大追風散
治久新偏正頭疼肝臟久虛血氣衰弱風毒上攻頭目眩運心煩百節痠疼鼻塞聲重項背拘急皮膚瘙癢面上遊風狀如蟲行一切頭風兼治婦人血風攻注此藥消風化痰清利頭目
川烏炮去皮臍　防風　白殭蠶炒去絲　川芎
石膏煅　甘草炙　荊芥各一兩　南星　天麻
地龍去土炒　全蝎去毒炒　白附子炮　羌活
白芷各五錢　乳香另研　沒藥另研　草烏炮
雄黃各一錢五分
右爲細末每服半錢臨睡時候用細茶湯調勻送下

清震湯 保命
治頭面疙瘩增寒拘急發熱狀如傷寒
升麻　蒼朮用米泔水浸一宿各四錢　荷葉一箇全者用之
右用水二鍾煎八分食後服

人參蛤蚧散 寶鑑
治三二日間肺氣上喘咳嗽咯唾膿血滿面生瘡遍身黃腫
蛤蚧一對全者河水浸五宿逐日換水洗去腥氣酥炙黃色　炙甘草三兩　杏仁去皮尖炒五兩
人參　白茯苓　貝母　桑白皮　知母各二兩
右共爲細末用磁器內盛每日如茶點服最妙

菊花散 千金方 下同
治頭面遊風
菊花一兩　細辛　附子　桂心　乾薑　巴戟
人參　石楠　天雄　白茯苓　秦艽　防己
防風　白朮　山茱萸　薯蕷各三兩　蜀椒五合
右十七味治下篩酒服方寸匕日三

又方
治頭面上風
松脂　石鹽　眞蜜蠟　杏仁各一兩　藁本香二兩　蒺藜仁三兩
右六味熟擣作餅淨剃百會上髮貼膏膏上安紙三日一易若瘡刺藥上不久風定

犀角湯
治風毒熱頭面腫
犀角　生薑各二兩　苦參　栝蔞根　防風各一兩　石膏六兩　黃芩　青木香　升麻各三兩　防己一兩五錢　竹葉二握
右十一味㕮咀以水七升煮取二升分三服相去十里久內消不利

防風散
治頭面徧身風腫
防風二兩　白芷一兩　白朮三兩
右三味治下篩酒服方寸匕日三

摩膏
治頭中二十種病面上游風髮禿落者
蜀椒　莽草各二兩　桂心　蘭茹　附子　細辛

各一兩五錢　半夏　乾薑各一兩

右八味㕮咀以生豬肪二十兩合擣令肪消盡藥成先沐頭令淨然後以藥摩頗上日一卽愈如非十二月合則用生烏麻油和塗頭皮沐頭令淨乃用之一頃生髮如昔必效一方無蜀椒莽草半夏乾薑

王不留行湯

治頭面久瘡去蟲止痛

王不留行　東引茱萸根皮　桃東南枝各五兩　蛇牀子　牡荊子　苦竹葉　蔌黎子各三升

大麻仁一升

右八味㕮咀以水二斗半煮取一斗洗瘡日再並療癰疽妬乳月蝕瘡爛

鴟頭酒

治風頭眩轉面上遊風

飛鴟頭五枚　獨活二兩　茯神　枳實　乾薑　葛根　桂心　貫衆　天雄炮　蜀椒　人參　細辛各三兩　薯蕷　芎藭各四兩　山茛一升

石楠一作石膏　麥門冬去心各五兩一作天門冬

右十八味㕮咀絹囊盛清酒四斗漬六宿初服二合日再服補和以知爲度一方無茯神

清涼拔毒散瘡癤癰疽書下同

治面毒

白芨　雄黃　麝香　乳香　山慈姑　天花粉　黃蘗　烏藥

右爲末雞子清調敷蜜水潤之

參朮內托散

補托前證

人參　白朮　粉甘草　犀角屑　貝母　黃連　防風　黃芩酒炒　羌活　桔梗　當歸　生地　白芍　前胡　天花粉

右㕮咀水二鍾薑三片煎服因病之逆從而加減之

犀角鬱金散

治前證能托積毒

犀角屑　鬱金　眞珠　牛黃　粉甘草　乳香　眞粉　辰砂

煉蜜爲丸噙化

清肝流氣飲

治疼腫毒

枳殼　桔梗　黃芪　前胡　羌活　生甘草　石膏　防風　川芎　白芍藥　荊芥　白芷　生地　薄荷

右水煎服

托裏流氣飲

補托前證

人參　黃芪　當歸　川芎　白芍藥　甘草炙　防風　厚朴　烏藥　官桂　木香

薑三片棗一枚煎服患處用圍藥敷之

千金內托散

治發頤

桔梗　厚朴　白芷　防風　人參　黃芪炙　川芎　甘草　當歸　官桂　黃芩　白朮炒　水煎服

不換金散

治證同上

半夏　厚朴　蒼朮　陳皮　人參　白茯苓　藿香　木香

右㕮咀水煎溫服後再服乳香護心散仍貼金絲膏

驅風破毒散

治骨槽風

白礬　巴豆去殼油　紅內硝　草烏尖　薄荷　猪牙皂角各等分

右爲細末吹之

又方

治證同上

天麻　防風　草烏　華茇　細辛　乳香另研　川芎　硼砂　薄荷　麝香另研

溫水漱口或鼻內吹之

清熱消瘀散

治證同上

乾葛　升麻　生甘草　貝母　黃連　黃芩　白茯苓　桔梗　薄荷　防風　荊芥　羌活　青皮　牡丹皮　當歸　白芍　生地　鼠黏子

水二鍾煨心三十棗煎服

虛加人參白朮牛久加草龍膽

熱加柴胡前胡

珍珠冰片散

治證同上

珍珠製　紅絨末　人中白煅　雞內金煅存性

銅青　青靛　黃連　孩兒茶　細茶各一錢
枯礬二錢　冰片五分　麝香二分
右爲細末先用蚌水澈淨患處每摻入之一日夜一二十次方愈男婦皆然并服煎劑

白礬散（景岳全書下同）

治面上肺風
白礬　硫黃　乳香各等分
右爲末綿裹擦之或加茄汁調敷患處更妙

硫黃散

治面生粉瘡
硫黃　輕粉各一錢　杏仁五分
右爲末用蜜酒調於臥時塗上早洗去效或用津唾調搽更妙

連子衝衝方

治雀斑
白芷　甘菊花去梗各三錢　白果二十箇　紅棗十五箇　珠兒粉五錢　猪胰一箇
右將珠粉研細餘俱搗爛拌勻外以蜜拌酒釀頓化入前藥蒸過每晚搽面早洗去

黃連消毒散（東垣）

治時毒面腫
川黃連炒　羌活各一分　黃芩　黃蘗　桔梗　藁本　防己各五分　當歸尾　連翹　防風　獨活　知母炒　生地黃各四分　人參　甘草各三分　黃芪　蘇木　陳皮　澤瀉各二分
右水煎服

仙方活命飲

治證同上
穿山甲蛤粉炒黃　白芷　防風　花粉　乳香　赤芍藥　當歸尾　沒藥研　貝母　皂刺　甘草各一錢　金銀花　陳皮各三錢
右酒一碗煎數沸溫服

穿山甲蛤粉炒黃　白芷　防風　花粉　乳香　赤芍藥　當歸尾　沒藥研　貝母　皂刺　甘草各一錢　金銀花　陳皮各三錢
右酒一碗煎數沸溫服

清陽散火湯

治骨槽風牙根盡處結腫連及耳項作痛
升麻　白芷　黃芩　牛蒡子　連翹　石膏　防風　當歸　荆芥　白蒺藜各一錢　甘草五分
水二鍾煎八分食後服

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百五十三卷目錄
醫部彙考一百二十三
面門四
單方
鍼灸
導引
醫案

單方

益母草入面藥令光澤五月五日採根葉曝乾搗末水和作團如雞子大大火燒一炊久經一伏時取出磁器中再研餘收之使如澡豆法能去風刺粉刺令面悅澤本草下同

瓜蔞根悅澤人面療手面皺作粉常塗之妙

白芷去黯黯疵瘢潤澤顏色可作面脂常用

指爪破面取生薑汁調輕粉傅之便無瘢痕得效

蓼本去黯皰酒皺粉刺潤澤顏色可作沐藥面脂本草下同

土瓜根去面上痞瘺爲細末漿水和勻入夜漿水洗面傅藥朝復洗之仍得光潤皮急白日光華射人

白茯苓去黯黯及產婦黑皰如雀卵爲細末蜜和常常塗面良

桑葉治面上肺瘡瘡如大風瘡取葉洗淨蒸熟日乾爲末水調二錢服日三名綠雲散

蜜常傅面如花色久傅之佳

眞珠除黯黯瘢點令面潤澤好顏色研爲粉和乳汁常塗之

白殭蠶滅黯黯瘢痕令面色好爲末常塗之又與衣魚鷹屎白等分爲末和乳汁塗瘢痕便滅

覆盆子令人好顏色久食之佳蓬蘽同功

烏梅肉去黑點黑痣蝕惡肉和諸藥以點之

面生雀子瘢取梅肉櫻桃枝豬牙皂角紫背浮萍等分爲末如常法洗面其瘢自去入門

栗上薄皮搗爲末蜜和塗面令皮肉急縮可展又治老人面皺本草下同

菟絲子苗去面黯及粉刺瘢點搗苗取汁常塗之

杏仁去面黯搗爲末和雞子白夜臥塗面明早溫酒洗之

傷風面腫杏仁搗爛傅之

冬瓜仁令面光澤好顏色去黑瘢黑黯可作面脂常用

冬瓜取仁三五升去皮搗爲末蜜丸空心服三十丸久服令人面潔如玉

葱白主傷風面目浮腫煎湯飲之洗之

鸜鵒屎去面上黯黯黧痣瘢疵皰皯雀卵斑取屎白猪脂調塗

熊脂主面上黯黯黑瘢悅澤人面可塗之兼食之

羚羊膽主面多黯黯如雀卵色取膽和酒煮沸以塗拭之日三即瘥

大猪蹄令老人面光澤猪蹄一具治如食法煮漿如膠夜以塗面曉以漿水洗即面皮急矣

鹿角炙爲末酒服二錢日二久服面色如花

鹿角以漿水濃磨如泥塗面令不皺兼去瘡皰光華可愛

年少氣盛面生皰瘡糜鹿脂塗之即瘥

又方被打頭面青腫羊肉牛肉或猪肉炙令熱貼腫上即愈

時行腮腫用柏葉末調蚯蚓糞塗之升眞方

疔腮腫痛酢調石灰傅之簡便方

腮頰熱腫赤小豆末和蜜塗之一夜即消或加芙蓉葉尤妙

風熱腮腫絲瓜燒存性研末水調搽之臞月新方

面皯鷹屎白二分胡粉一分蜜和傅之外臺

滅面上痕用鷹屎白和人精傅日三千金

又方鷹屎白二兩殭蠶一兩五錢爲末蜜和傅聖惠

又方鷹屎白白附子各一兩爲末酢和傅日三五次痕滅止總錄

面色黧黑牡蠣粉研末蜜丸梧子大每服三十丸白湯下日一服並製其肉食之普濟方

面黧即黑子也羚羊膽牛膽各一枚酢二斤同煮三沸頻塗之外臺

面黑令白馬珂白附子珊瑚鷹屎白等分爲末每夜人乳調傅旦以漿水洗之聖惠下同

面瘡黯皯烏蛇肉二兩燒灰膩猪脂調傅

面黑黯皯羚羊膽牛膽各一個醇酒三升煮三沸夜夜塗之肘後方

消滅瘢痕以猪脂三升飼烏雞一隻二日後取屎同

白芷當歸各一兩煎十沸去查入鷹屎白五錢調傅（外臺）

雀斑面皰雞卵酢浸壞取出傅之（聖惠下同）

消滅瘢痕雞子五七枚煮熟取黃炒黑拭塗日三久自滅

面上黑黯白殭蠶末水和搽之

粉滓面黯令人面色好用白殭蠶黑牽牛細辛等分爲末如澡豆日用之（千門）

黥刺雕青以白馬汗搽上再以汗調水蛭末塗之（儒門事親）

酸漿水能白人膚體如繒帛去黯黯黑子以煖漿水洗面以布揩黑子令痛水研白檀取汁塗之

硃砂好顏色水飛爲末井華水點少許傅之

面上瘡瘢大風用乾螃蟹末以生油調傅約半日瘡瘢腫起以軟帛拭去藥以棘針挑破近下令水出乾不得剝其瘡皮不可以藥近口眼若是尖瘡瘢子即勿用此別用枯礬末以治之極效

面上木痱用牛皮膠化和肉桂末厚塗之一二分良（葉氏摘元方）

身面印文刺破以酢調赤土傅之乾又易以黑滅爲度（千金方）

面黑令白白羊乳三斤羊脂三訓和搗每夜洗淨塗之旦洗去（總錄）

滅諸瘢痕大鼠一枚以臘豬脂四兩煎至銷盡濾淨日塗三五次先以布拭赤要避風（普濟方）

面上黯點取白蜜和茯苓末塗之七日便瘥也（孫真人食忌）

人面黧黑皮厚狀醜用羚羊脛骨爲末雞子白和敷旦以白梁米泔洗之三日如素神效（財寶方下同）

面上施瘡用雞子浸於三歲苦酒中三宿待軟取白塗之

面黑令白雞子三枚酒浸密封四七日每夜以白傅面如雪白也（普濟方下同）

塗面駐顏雞子一枚開孔去黃留白入金華胭脂及硃砂少許紙封與雞抱之俟別卵抱出以塗面洗之半年尚紅也

面黑令白土蜂子未成頭翅者炒食併以酒浸傅面（聖惠方）

雀斑面皰七月七日取露蜂子於漆椀中水酒浸過濾汁調胡粉傅之（普濟方）

面上皴皰黯黯用木蘭皮細切以三年酢漿漬之百日曬乾搗末每漿水服方寸匕日三服肘後用梔子仁一斤（古今錄驗方）

身面白皶鮎魚半斤一頭去腸以粳飯鹽椒如常作鮓以荷葉作三包裹之更以荷葉重包令臭爛先以布拭赤乃炙鮓包乘熱熨令汗出以綿衣裹勿令見風以癒爲度（總錄）

白礬治粉刺白礬末酒調塗之（肘後方）

面上粉瘡銅綠爲末晚時切生薑蘸擦之

面腫爲風宜用羌活防風升麻白芷牛蒡子之屬外杵杏仁如膏傅之

面上細瘡常出黃水桃花陰乾加當歸或杏花作末洗面

密陀僧治面上黯黯斑點細研爲末人乳調塗每夜用之亦令面生光華又治面鼻赤皰（本草下同）

石灰去面上黑子瘕肉及粉刺

面上黃水瘡併目生瘡三月三日取桃花陰乾爲末每食後熟水下方寸匕日三次良或浸酒飲之亦良

面上五色瘡用溫鹽湯新綿浸揩瘡上日五六度即癒（本草）

面上粉刺用不語唾塗之或搗菟絲子汁塗之或以白礬末少許酒調塗之

面黑令白冬瓜一箇竹刀去皮切片酒一升半水一升煮爛濾去滓熬成膏瓶收每夜塗之（聖濟總錄）

面裏皮痛何首烏末薑汁調成膏傅之帛蓋以火炙鞋底熱熨之

面赤酒皶生附子川椒野葛少許剉酢浸一宿取出用猪脂同煎以附子黃爲度去滓時時塗之

又方硫黃半兩蝸牛殼自死枯乾小者爲上木香各半兩虢丹半兩俱爲末杏仁半兩去皮研膏入臘月猪脂調成膏夜臥時用漿水先洗面令乾以藥塗患處平明洗去濕癬以米泔水洗却上前藥

搭腮腫赤小豆爲末雞子清調貼之酢調貼之亦效（銅目）

又方石灰炒熱於地下窖冷如此七次爲末酢調傅立消（醫鑑）

又方細辛草烏等分爲末入蚌粉猪脂調傅腫處口含白梅置腮邊良久腫退出涎患消矣（丹溪心法）

面赤用好黃蘗剉碎四兩人乳浸拌勻以日曬乾再浸拌勻如此六七次爲妙然後爲細末臨臥茶清或湯調下二錢有奇效

痱腮用柏葉車前草柏子仁杵碎熱傅患處或用雞子清調赤小豆末

凡伸欠頰車蹉但開不能合以酒飲之令大醉睡中吹皂角末嚏其鼻嚏透卽自正三因方

汗出中風面腫或連頭項或連手足用牛蒡子研爛酒煎成膏貼之並服三匙本草下同

頭面腫大疼痛以大黃二兩同殭蠶一兩爲末薑汁和丸彈子大服

飯氣熏面浮腫以久用炊布燒灰傅之卽消

葳蕤治面上黑䵟久服令好顏色

面黑用女苑鉛丹爲末酒服男女二十日黑從大便出

面上黑斑蒼耳葉爲末服之

天門冬同蜜搗丸日用洗面去黑

面上雀斑用山柰同鷹屎白密陀僧蓖麻仁爲末夜塗旦洗之

面上風刺粉刺白牽牛酒浸爲末塗之

面上紫皰羊蹄根同薑汁椒末穿山甲灰泡擦之

面上黑斑桑耳焙乾研每食後熱湯服一錢一月愈摘元方

頭面風腫杏仁搗膏雞子黃和杵塗帛上厚裹之乾則又塗不過七八次愈千金方

面上皶皰䵟黯夏枯草燒灰入紅豆洗之

面上粉刺著蓬子酢浸揩面令人光澤

雀斑用桃花同冬瓜仁研蜜塗之粉刺如米同丹砂末服令面紅潤

香瓣瘡生面頤耳下浸淫出水用羖羊鬚荊芥乾薑燒入輕粉搽

耳腮痱腫及喉下諸腫用蝸牛同麪研傅之

面上毒瘡初起者急尋水蜒蚰一二條用醬少許共搗塗紙上貼之卽退紙上留一小孔出氣此乃凌漢章祕傳極效方也淡埜翁試驗方

喘嗽面浮並四肢浮者蛤蚧一雌一雄頭尾全者法酒和蜜塗之炙熟紫團人參似人形者半兩爲末化蠟四兩和作六餅每煑糯米薄粥一盞投入一餅攪化細細熱呷之普濟方

面上紫塊如錢大或滿面俱有野大黃四兩取汁穿山甲十片燒存性川椒末五錢生薑四兩取汁和研生絹包擦如乾以酢潤濕數次如初累效陸氏積德堂方

少年面皰粉刺面䵟用浮萍日接盦之並飲汁少許外臺

又方用紫背萍四兩防己一兩煎濃汁洗之仍以萍於斑點上熟擦日三五次物雖微末其功甚大不可小看普濟方

身面疣目杏仁燒黑研膏擦破日日塗之千金方

身面瘢痕用禹餘糧半夏等分爲末雞子黃和傅先以布拭赤勿令見風三十日自滅十年者亦能滅去聖濟錄

頭面諸瘡芝麻生嚼傅之普濟方

䵟黯皶皰銀杏同酒糟嚼塗之

面黑令白用白楊皮同桃花白冬瓜子服之

身面白癜以酒服生芝麻油一合一日三服至五斗瘥忌生冷猪雞魚蒜等百日千金方

身面白丹白瓷瓦末和猪脂塗之梅師方

瘢痕凸起熱瓦頻熨之千金方

痣黶疣贅花鹻礦灰以小麥稈灰汁煎二味令乾等分爲末以針刺破水調點之三日三上卽去須新合乃效聖濟錄

身面赤疵常以銀揩令熱久久自消千金翼

面黶黑痣以草劃破銅綠末傅之三日勿洗水自落厚者再上之聖濟錄

身面疳瘡出黃汁者葵根燒灰和猪脂塗之食療本草

粉滓面䵟雲母粉杏仁等分爲末黃牛乳拌略蒸夜塗旦洗聖濟錄

少年面皰水銀胡粉等分研臘猪脂和夜塗旦拭勿見水三度瘥肘後方

菌桂養精神久服面生光華常如童子

肺風面瘡用蓖麻子大棗瓦松白果肥皂爲丸日三次

面上瘢痕用蒺藜子山梔子各一合爲末酢和夜塗旦洗之救急方

面瘡用絲瓜牙皂燒擦

金腮瘡初生如米豆大久則穿蝕用雞內金鬱金傅之

面皰用馬藺子花杵傅之佳肘後方

疣痣瘤贅用石灰一兩桑灰淋汁熬成膏刺破點之普濟方

身面洪腫甘遂二錢生研爲末以豶猪腎一枚分爲臠入末在內濕紙包煨令熟食之日一服至四五服當覺腹鳴小便利是其效也肘後方

黑子疣贅續隨子熟時點之自落普濟方

頭面忽腫熱毒風氣內攻或連手足赤腫觸著痛者牛蒡子根一名蝙蝠刺洗淨研爛酒煎成膏絹攤貼腫處仍以熱酒服一二匙腫消痛減斗門方

面上雀斑菎麻子仁密陀僧硫黃各一錢爲末用羊髓和勻夜夜傅之摘元方

面上瘢靨取鐵掃帚地上自落葉並子煎湯頻洗數次自消壽域神方

面上黯黯白附子爲末臥時漿水洗面以白蜜和塗紙上貼之久久自落衛生易簡方

黑氣上面半夏焙研米酢調敷不可見風不計遍數從早至晚如此三日皂角湯洗下面瑩如玉也摘元方

面上生瘡曼陀羅花曬乾研末少許貼之自愈衛生易簡方

頭風面瘡瘡出黃水艾二兩酢一升砂鍋煎取汁每薄紙上貼之一日上二次御藥院方

面上黯黯艾灰桑灰各三升以水淋汁再淋至三遍以五色布納於中同煎令可丸時每以少許傅之自爛脫或與藜灰汁同熬膏點之甚妙外臺秘要

粉刺黑斑五月五日收帶根天麻紫花者曬乾燒灰以商陸根搗自然汁加酸酢和搜灰作餅炭火煅過收之半年方用入面藥甚能潤肌閨閣事宜

身面疣目用蠟紙卷硫黃末少許點之焠之有聲日去普濟方

身面瘊子用白礬地膚子等分煎水頻頻洗之多能鄙事

面多黯黯雀卵色苦酒漬朮日日拭之極效肘後方

面黃食少男婦面無血色食少嗜臥蒼朮一觔熟地黃半觔乾薑炮一兩春秋七錢夏五錢爲末糊丸梧子大每溫水下五十丸濟生拔萃方

身面卒腫洪滿用皂莢去皮炙黃剉三升酒一斗漬透煑沸每服一升一日三服肘後方

鼻面酒皶用南方沒石子有孔者水磨成膏夜夜塗之甚效危氏得效方

面上膿瘡柳絮膩粉等分以燈盞油調塗之普濟方

面上惡瘡不可名識者柳葉或皮水煑汁入少鹽頻頻洗之肘後方

面上粉刺瘟子如米粉用桃花丹砂各三兩爲末每服一錢空心井水下日三服十日知二十日小便當出黑汁面色瑩白也聖惠方

身面水腫坐臥不得取東引桑枝燒灰淋汁煑赤小豆每饑即飽食之不得喫湯飲梅師方

面上痣疵寒食前後取桑條燒灰淋入石灰熬膏以自己唾調點之自落也皆效方

身面石疽狀如痤癤而皮厚以穀子搗傅之外臺秘要

虛肥面腫積年氣上如水病但脚不腫用穀楮葉八兩以水一斗煑取六升去滓納米煑粥常食之勿絕外臺秘要

面黯皯皰枸杞子十斤生地黃三斤爲末每服方寸匕溫酒下日三服久則童顏聖惠方

頭面錢癬槿樹皮爲末酢調重湯頓如膠傅之王仲勉經效方

身面浮腫用烏豆一升水五升煑汁三升入酒五升更煑三升分溫三服不瘥再合千金方

又方烏頭煑至皮乾爲末每服二錢米飲下建炎初吳內翰女孫忽發腫凸吳檢外臺得此方服之立效百一選方

身面疣目七月七日以大豆拭疣上三過使本人種豆於南向屋東頭第二溜中豆生葉以熱湯沃殺即愈外臺秘要

身面卒腫脈洪大用菟絲子一升酒五升漬二三宿每飲一升日三服不消再造肘後方下同

面瘡粉刺菟絲子苗絞汁塗之不過三上即瘥屢驗

面上風刺黑牽牛酒浸三宿爲末先以薑汁擦面後用藥塗之摘元方

面上粉刺瘟子如米粉黑牽牛末對入面脂中日日洗之聖惠方

面上雀斑黑牽牛末雞子清調夜傅旦洗心鑑方

面黑令白苦蔞穰三兩杏仁一兩猪脈一具同研如膏每夜塗之令人光潤冬月不皴聖濟錄

面生粉刺酒皶白蔹二分杏仁半分雞屎白一分爲末和雜水塗之或拭面一方無雞屎肘後方

身面卒腫生猪肝一具細切酢洗入蒜酢食之勿用鹽本草

面麤醜黑皮厚黯黯者猪脈五具蕪菁子二兩杏仁一兩土瓜根一兩醇酒浸之夜塗旦洗老者少少者白神驗肘後方下同

水氣身面浮腫商陸一升水二斗煑取一斗去滓羊肉一斤切入內煑熟下葱豉五味調和如臛法食之

身面疣目每月望日子時以禿帚掃疣目上三七遍聖惠方

身面疣目牛口涎塗之自落千金

面上皯皰鹿角尖磨濃汁厚傅之神效本草

面上風瘡鹿角尖磨酒塗之聖惠方下同

面瘡黯皰烏蛇肉二兩燒灰臘猪脂調傅

滅瘢痕以凍凌頻熨之良千金方

身面腫滿雞子黃白相合塗腫處乾再上肘後方

身面瘢痕馬齒莧湯日洗二次聖惠方

令面光華三月三日收桃花七月七日收雞血和塗

面上三二日後脫下則光華顏色也聖濟總錄

面生黯黯乾柿日日食之普濟方

頭面癬瘡生白果仁切斷頻擦取效經驗

食茶面黃川椒紅炒碾末糊丸梧子大每服十丸茶湯下簡便方

面上黶子七月七日午時取甜瓜葉七枚直入北堂中向南立逐枚拭黶即滅去也淮南萬畢術

身面疣目盜酸酒酵洗而呪之曰疣疣不知羞酸酒酵洗你頭急急如律令呪七遍自愈外臺

身面浮腫小便不利喘急用胡葱十莖赤小豆三合硝石一兩以水五升煑葱豆至熟同擂成膏每空心溫酒服半匙聖惠方

面黶痣點蔓菁子研末入面脂中夜夜塗之亦去面皺或取油用亦妙聖惠方

面上黑子芫荽煎湯日日洗之小說

鍼灸

素問曰肝氣逆則頭痛耳聾不聰頰腫取血者

心熱病者先不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩悶善嘔頭痛面赤無汗壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死刺手少陰太陽

脾熱病者先頭重頰痛煩心顏青欲嘔身熱熱爭則腰痛不可用俛仰腹滿泄兩頷痛甲乙甚戊己大汗氣逆則甲乙死刺足太陰陽明

帝曰有病腎風者面胕痝然壅害於言可刺不岐伯曰虛不當刺不當刺而刺後五日其氣必至

靈樞經曰頰痛刺足陽明曲周動脈見血立已不已按人迎於經立已

厥胷滿面腫脣漯漯然暴言難甚則不能言取足陽明

厥頭痛面若腫起而煩心取之足陽明太陰

頰痛刺手陽明與頰之盛脈出血

手太陽之脈是動則頷腫不可以顧所生病者目黃頰痛三焦手少陽之脈所生病者頰痛膽足少陽之脈所生病者頷腫心主手厥陰之脈是動則病面赤目黃胃足陽明之脈是動則病洒洒振寒顏黑足少陰之脈是動則病饑不欲食面如漆柴皆視其盛虛熱寒陷下取之也

千金方曰面赤頰中痛取攢竹斷交玉枕

面赤腫取上星頤會前頂腦戶風池

面惡風寒頰腫痛取巨窌天窻

面皮熱取天突天窻

面赤熱取腎腧內關

面蒼黑取行間面塵黑取太衝

顳顬痛頷顱熱痛面赤取中渚

面皮赤痛取懸釐

古今醫統云陷谷面腫目壅腫刺出血立愈

頰腫口急頰車痛不可以嚼頰車針灸皆可

面頷腫生瘡合谷列缺地倉皆可取之

少陰絡治面黑齒長而垢腹脹閉

太陽絡太陰絡治腹脹閉不得息善噫嘔逆則面赤不逆則面黑

導引

養性書曰摩面光澤熱摩手心頻拭額上謂之修天庭連髮際七遍而上自然光澤所謂手宜在面是也

醫案

丹溪心法曰朱奶兩腮熱腫隔壅之病也用乾葛桔梗蘇葉各一錢半升麻一錢甘草炙七分薄荷一錢薑一片水煎服

衛生寶鑑曰楊郎中之內五十一歲身體肥盛己酉春患頭目昏悶面赤熱多服清上藥不效請予治之診其脈洪大而有力內經云面熱者手陽明病脈經云陽明經氣盛有餘則身已前皆熱況其人素膏粱積熱於胃陽明多血多氣本實則風熱上行諸陽皆

會於頭故面熱之病生矣先以調胃承氣湯七錢黃連二錢犀角一錢疏利三兩行徹其本熱次以升麻加黃連湯主之

一婦人年幾三十憂思不已飲食失節脾胃有傷面色黧黑不澤環唇尤甚心懸如饑狀又不欲食氣短而促大抵心肺在上行榮衛而光澤於外左顯而不宜藏肝腎在下養筋骨而强於內當隱而不見脾胃在中主傳化精微以灌四旁沖和而不息其氣一傷則四藏失所憂思不已氣結而不行飲食失節氣耗而不足使陰氣上溢於陽中故黑色見於面又經云脾氣通於口其華在唇今水反來侮土故黑色見於唇此陰陽相反病之逆也上古天眞論云陽明脈衰於上面始焦故知陽明之氣不足非助陽明生發之劑無以復其色故以沖和順氣湯主之內經曰上氣不足推而揚之以升麻苦平葛根甘溫白地升天通行陽明之氣爲君人之氣以天地之風名之氣薑而不行者以辛散之防風辛溫白芷甘辛溫以散滯氣爲臣蒼朮苦辛甸除陽明經之寒白芍藥之溫酸安太陰經之怯弱十劑云補可去弱人參羊肉之屬人參黃芪甘草甘溫補益正氣爲臣至眞要大論云辛甘發散爲陽生薑辛熱大棗甘溫和榮衛開腠理致津液以復其陽氣故以爲使每服早飯後午飯前取陽升之時使人之陽氣易達故也數服而愈

儒門事親曰陳君俞頭項偏腫連一目若半壺診其脈洪大戴人曰內經云面腫者風此風來陽明經也陽明氣血俱多風腫宜汗解先與通聖散去硝黃入薑葱豉煎服取徹汗次日以草莖刺鼻中出血其腫

立消

李杲十書曰泰和年東垣監納濟源稅時長夏多疫癘初覺憎寒體重次傳面目腫盛目不能開上喘咽喉不利舌乾口燥俗云大頭天行親戚不相訪問如染之多不救張縣丞亦得此證至五六日醫以承氣湯加藍根下之稍緩翌日其病如故下之又緩終莫能愈漸至危篤或曰李明之存心於醫可以請治遂命診視具說其由曰夫身半已上天之氣也身半已下地之氣也此雖邪熱客於心肺之間上攻頭而爲腫盛以承氣下之瀉胃中之實熱是誅伐無過殊不知適其病所爲故遂處方用黃連黃芩味苦寒瀉心肺間熱以爲君橘紅元參苦寒生甘草甘寒瀉火補氣以爲臣連翹鼠黏子薄荷葉苦辛平板藍根味甘寒馬屁勃白殭蠶味苦平散腫消毒定喘以爲佐升麻柴胡味苦平行後急者謂前緩劑已經高分瀉邪氣入於中是到陰部染於有形質之所若不速去反損陰也此却爲客邪當急去之是治客以急也且治主當緩者謂陽邪在上陰邪在下各本家病也若急治之不惟不能解其紛而反致其亂矣此所以治主當緩也治客當急者謂陽分受陽邪陰分受陰邪主也陰分受陽邪陽分受陰邪客也凡所謂客者當急去之此治急以客也假令少陽陽明之爲病少陽爲邪者出於耳前後也陽明者首面大腫也先以黃芩黃連甘草通炒過剉煎少少不住服呷之或服畢再用大黃或酒浸或煨又以鼠黏子新瓦上炒香咬咀煎去查內芒硝各等分亦細細呷之當食後用徐得微利及邪氣已只服前藥如不已再服後藥依前次第用之取大便利邪已即止如陽明渴者加石膏少陽渴者加瓜蔞根湯陽明行經加升麻葛根芍藥之類太陽行經加羌活防風荊芥之類選而加之並與上藥均合不可獨用散也

醫學綱目曰許學士醫檢正患鼻頰間痛或痲痹不仁如是數年忽一日連口脣頰車髮際皆痛不開口言語飲食皆妨得頰與頰上常如糊手觸之則痛此足陽明經絡受風毒傳入經絡血凝滯而不行故有此證或以排風小續命透髓丹之類與之皆不效製犀角升麻湯瞻之數日愈夫足陽明胃也經云腸胃爲市又云陽明多血多氣胃之中腥羶五味無所不納如市廛無所不有也以其腐熟飲食之毒聚於胃此方以犀角爲主解飲食之毒也陽明經脈環脣挾舌起於鼻交頞中循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱今所患皆一經絡也故以升麻佐之餘藥皆滌除風熱升麻黃芩專入胃經

或問一人年五十忽顧骨上初覺如松子漸大如胡桃不甚腫微赤微癢或云痰核或云結毒或作癰治何如曰皆非也是名顴瘡屬陽明經積熱所致用紫金丹烏金散活命飲加製過南星服之而消按經曰心病者顴赤又曰腎病者顴與顏黑然則當察其色赤者宜以黃連安神丸降心火補心丸養心血黑者宜以地黃丸滋腎水未可專委之陽明鬱火也

薛己醫案曰一人年逾三十夏月熱病後患頤毒積日不潰氣息奄奄飲食少思大便不禁診脈如無經曰脈息如無似有細而微者陽氣衰也齊氏曰飲食不入大便滑利腸胃虛也以六君子加炮薑肉豆蔻

破故紙數劑而泄稍止食稍進更加黃蘗當歸肉桂乃潰而膿水清稀前藥每服加熟附子一錢數劑泄止食進膿漸稠再以十全大補湯加酒炒烏藥白芷月餘而愈

地官陳用之患前證服發散之劑寒熱已退腫痛不消此血疑滯而欲作膿也用托裏消毒散而膿成又用托裏散而潰但膿清作渴乃氣血虛也用八珍加麥門冬五味子三十餘劑而愈

上舍盧懋樹患此而尺脈數證屬腎經不足誤服消毒之劑尅損元氣而不能愈予用補中益氣六味丸料而痊

上舍熊棟卿頤後患之膿清體瘦遺精盜汗脯熱口渴痰氣上湧久而不愈脈洪大按之微細屬腎氣虧損所致遂用加減八味丸料並十全大補湯而愈

一婦人素內熱因怒耳面至頸項腫痛寒熱此肝膽經火燥而血虛用柴胡梔子散而腫痛消用加味逍遙散而寒熱退用八珍湯加丹皮而內熱止

平江陳氏因驚懼後常用手指甲拄搯兩頰遂兩頰破損心中懊憹不安脈數而實諸藥不愈用活幼口議牛黃清心凉膈丸數服如失

老母年七十餘累歲患頰車痛每多言傷氣不寐傷神則大發發之至劇則上連頭下至喉內及牙齦皆如針刺火灼不可手觸乃至口不得開言語飲食並廢自覺目中火光如閃電尋常涎唾稠粘如絲不斷每勞與餓則甚得臥與食則稍安知其虛也始以清胃散犀角升麻湯人參白虎湯羌活勝濕湯加黃芩甘桔皆不效後改用參芪白朮芎歸升柴甘桔之類稍佐以芩梔連翹鼠黏空腹進之飯而食遠則服加減甘露飲始漸安第老人性躁不耐閒勞而多言時有之不能除去病根然發亦稀少即發亦不如往歲之劇矣

從之婦因喪子鬱結復多與鹿角膠諸種子藥或於食後臨臥輒進之以至積成胃熱遂患面痛如老母證服清胃散甘露飲大加石膏過當而見虛證又服參芪等補藥過當而復見火證門人施生以越鞠加山梔連翹貝母橘紅之屬開其鬱結而始向安

孫兆治一人滿面黑皰相者斷其死孫診之曰非病也乃因登涸感非常臭氣而得去至臭無如至香令用沉香檀香碎勞焚於爐中安帳內以熏之明日面皰漸變旬日如故蓋腎臭腐屬水脾臭香屬土今夫廁臭者腐臭也故聞之則入腎而面黑沉香者香臭也故熏之則脾土勝腎水而皰還也

浙全夫人忽一日面上生黑斑數點日久滿面俱黑徧求醫治不效忽遇一草澤醫入云夫人中食毒治之一月平復後校其方止用生薑汁服之問其故云食斑蝥蓋此物常食半夏苗中毒故以薑解之

又治尼長老六十一歲身體瘦弱十月間病頭面不耐寒氣弱不敢當風行諸治不效診之其脈皆弦細而微其人年高素食茶果而已陽明之經本虛脈經云氣不足則身以前皆寒慄又加看誦損氣由此胃氣虛經絡之氣亦虛不能上榮頭面故惡風寒先以附子理中丸溫其中氣次以升麻湯加附子主之

徐考功兄湖廣人年踰三十患時毒耳面瘃腫寒熱拘急其脈浮洪此邪在表也以荊防敗毒散加牛蒡子元參治之漸愈更以升麻葛根連翹桔梗川芎金銀花牛蒡子而平復齊氏云宜於鼻內嗑通氣散取十餘噦作效用噦藥不噦者不可治如噦出膿血治之必愈如左右看病之人每日用噦藥噦之必不傳染

一婦人夫邪已解腫尚不消診之脈滑而數乃瘀血作膿也以托裏消毒散潰之而愈

一婦人腫痛用硝黃之劑攻之稍緩翌日復痛診之外邪已退亦瘀血欲作膿亦以前藥潰之愈

一人表俱解惟腫不消以托裏消毒散四劑膿成針之而愈

一人患時毒腫痛發熱作渴脈實便閉以五利大黃湯下之諸證悉退以葛根牛蒡子湯四劑而痊

一人患時毒服表散藥愈熾發熱便祕診其脈沈而實此邪在裏也以大黃湯下之裏證悉退以葛根牛蒡子湯浮腫亦消惟赤腫尚存更以托裏藥潰之而愈

一人患時毒瘃腫脹痛作渴煩熱便祕脈數按之尤實用防風通聖散一劑諸證頓退以荊防敗毒散加元參牛蒡黃芩二劑而瘥

周舉人母冬月頭面耳項俱腫痛甚便祕脈實此表裏俱實也服防風通聖散不應遂砭患處出黑血仍投前藥即應又以荊防敗毒散而瘥蓋前藥不應者毒血疑聚上部經絡藥力難達故也惡血既去其藥自效或拘用寒遠寒及年高畏用硝黃而用托裏與夫辛涼消毒之劑或不砭泄其毒專假藥力鮮不危矣

一婦人頭面俱赤腫燉痛甚盛其脈浮數此形證俱在表也以乎昔胃氣有損不可用發表之劑宜用潔古法托裏以防邪毒之內侵作內托復煎散一劑終日飲之兩日而平

少宰李蒲汀患前證用發散之藥耗損元氣患處不消體倦惡寒食少口乾用補中益氣加桔梗及托裏消毒散而愈

秋官陳同野患前證元氣素弱脈微細而伏此形病俱虛也用參朮芎歸陳皮柴胡升麻炙甘草以升舉陽氣用牛蒡元參連翹桔梗以解熱毒二劑腫消而脈亦復矣苟以脈微細爲屬陰以腫赤爲屬陽而藥之鮮有不悞者

一婦人前證潰後腫赤不消食少體倦膿清色白乃脾肺氣虛也先用六君加桔梗芎歸後用益氣湯加桔梗而斂

一男子前證表裏俱解腫痛尚不退以葛根升麻湯二劑而消

一男子患前證腫痛發寒熱診其脈浮數以荊防敗毒散二劑少愈以人參敗毒散二劑勢減半又二劑而痊

一男子耳面赤腫作痛咽乾發熱脈浮數先以荊防敗毒散二劑勢退大半又以葛根牛蒡子湯四劑而痊

一男子頭面腫痛服硝黃敗毒之劑愈甚診之脈浮數邪在表尚未解用荊防敗毒散二劑勢退大半更以葛根牛蒡子湯四劑而痊內經云身半已上腫天之氣也身半已下腫地之氣也乃邪客心肺之間上攻頭目而爲腫此感四時不正之氣爲患與夫膏粱積熱之證不同硝黃之劑非大便祕實不可用若不審其因不辨其虛實表裏概用攻之必致有悞常見饑饉之際芻蕘之人多患之乃是胃氣有損邪氣從之爲患不可不察予常治邪在表者用葛根牛蒡子湯人參敗毒散或普濟消毒飲子邪在裏者五利大黃湯梔子仁湯表裏俱不解者防風通聖散表裏俱解而腫不退者犀角升麻湯如腫甚者砭患處出惡血以泄其毒或用通氣散取嚏以泄其毒十日外自愈若嚏出膿血即愈欲其作膿者用托裏消毒散欲其收斂者用托裏散此法最爲穩當五七日咽喉腫閉言語不出頭面不腫食不知味者不治

一男子服表散藥愈熾發熱便祕診其脈沈實此邪在裏也以大黃湯下之裏證悉退以葛根牛蒡子湯浮腫亦消惟赤腫尚存更以托裏藥潰之而愈齊氏云時毒者爲四時邪毒之氣而感之於人也其候發於鼻面耳項咽喉赤腫無頭或結核有根令人憎寒發熱頭痛或肢體痛甚者恍惚不寧咽喉閉塞庸人不識將爲傷寒便服解藥一二日腫氣增益方悟始求瘡醫原夫此疾古無方論世俗通爲丹癍病家惡言時毒切恐傳染考之於經曰人身忽經變赤狀如塗丹謂之丹毒此風熱惡毒所爲與夫時毒特不同耳蓋時毒初狀如傷寒五七日間乃能殺人治者宜精辨之先診其脈滑數浮洪沈緊弦濇皆其候也蓋浮數者邪氣在表也沈濇者邪氣深也氣實之人忽服化毒丹以攻之熱實不利大黃湯下之其有表證者解毒升麻湯以發之或年高氣輭者五香連翹湯主之又於鼻內嚏通氣散取十餘嚏作效若嚏藥不嚏者不可治如嚏出膿血者治之必愈左右看病之人每日用嚏藥嚏之必不傳染其病人每日亦用嚏藥三五次以泄熱毒此治時毒之良法也經三四日不解者不可大下宜和解之服犀角連翹散之頓至七八日大小便通利頭面腫起高赤者可服托裏散黃芪散宜針鎌砭割出血泄其毒氣十日外不治自愈此病若五日已前精神昏亂咽喉閉塞語聲不出頭面不腫食不知味者必死治之無功矣然而此疾有陰有陽有可汗有可下常見醫工但云熱毒就用寒藥殊不知病有微甚治有逆從不可不審矣

一人冬月病頭面赤腫耳前後尤甚痛不可忍發熱惡寒牙關緊急涕唾稠粘飲食難下不得安臥醫砭腫上四五十針腫赤不減痛益甚予診其脈浮緊按之洪緩知爲寒襲皮毛鬱遏經絡熱不得升聚而赤腫且夫天令寒凜之時腠理閉汗不出血氣强肉堅濇善用針者不得取四厥必待天溫又云冬月閉藏用藥多少針石也宜以苦溫之劑溫經散寒所謂寒緻腠理以苦發之以辛散之

外科正宗曰一男子耳項腫痛發寒熱脈浮數以荊防敗毒散一劑寒退熱存又以連翹消毒飲一劑便行三次內熱頓退餘腫不消本方去大黃加川芎數劑而愈

一男子先發寒熱次日頭面俱腫又二日口噤湯水不入診之脈洪數而有力此表裏俱實也又咽喉妨礙湯藥難下先用針刺咽間去惡血鍾許牙關稍開以防風通聖散一劑徐徐服之便去三四次腫上砭

去惡血以金黃散敷之次日腫勢稍退又以普濟消毒飲二劑面腫漸消惟兩耳下堅腫不退此必作膿又以托裏消毒散數服候膿熟而針之次以十全大補湯去肉桂加陳皮十餘劑而斂

一男子牙根腫痛次傳腮項俱腫頓生寒熱此陽明濕熱上攻用荊防敗毒散加石膏一劑寒熱頓退惟腮腫不消以針刺牙根腫上出毒血以冰硼散擦之外敷眞君妙貼散內服牛蒡子湯數服而愈

一男子冬月耳面赤腫發熱口乾脈洪實而便祕此三陽蘊熱證也必捨時從證治之以五利大黃湯一劑便行二次赤腫稍退內熱稍疎又以升麻解毒湯二服腫亦消而病愈此爲用寒遠寒之意也

一婦人冬月面腫咽痛口噤難開診脈洪數有力又見房中煖氣如烘此因爐火盛也以黃連解毒湯加元參一劑次日腫消咽利又用二劑其疾痊安

一男子勞甚費間腫硬肉色不變予曰勞傷氣血濕痰凝滯之證與夫外感時毒不同又診脈細數而無力爲內傷損病治當養氣血調經脈理勞續損治之彼欲內消自服仙方活命飲二服腫不覺消脾胃已損又請一醫乃行攻利復損臟腑數日後飲食不進便泄不止腫硬愈堅痰涎愈甚復請視之辭不可治予曰凡療理病有主末治有權宜此病初起肉色不變者血不足也堅硬不熱者脾胃弱也脈細數而無力正氣衰也豈可用前有餘之藥以攻不足之病後又强投溫中補劑不應而死

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百五十四卷目錄

醫部彙考一百三十四

耳門一

黃帝素問 生氣通天論 金匱眞言論 陰陽應象大論 五臟生成篇 診要經終論 玉機眞臟論 通評虛實論 熱論 厥論 脈解篇 刺禁論 鍼解篇 氣交變大論 五常政大論 六元正紀大論 至眞要大論
靈樞經 邪氣臟腑病形篇 經脈篇 經筋篇 脈度篇 熱病篇 口問篇 師傳篇 決氣篇 海論 五閱五使篇 本臟篇 衛氣篇 陰陽二十五人篇
扁鵲難經 耳能聞聲之故
華佗中藏經 腎氣通耳 耳聾 耳部因證
皇甫謐甲乙經 腎氣通耳 耳焦枯
楊士瀛直指方 耳聾
竇漢卿瘡瘍全書 耳風毒 耳門癰 耳根癰 發耳 石疽
嚴用和濟生方 耳論治
劉完素六書 耳聾 耳鳴
李杲十書 耳注聾 耳鳴耳聾 耳之體屬腎 用屬肺
朱震亨心法 耳聾 耳鳴 耳腫痛
羅天益衛生寶鑑 耳聾 卒聾 聰耳 耳中生瘡
危亦林得效方 耳鳴
方賢奇效良方 論耳鳴耳聾
虞摶醫學正傳 耳病 診法
戴思恭證治要訣 耳病
樓英醫學綱目 耳目受陽氣以聰明 耳病屬陰肝 運氣耳聾有四 運氣耳鳴皆屬風火 運氣耳痛皆屬熱
李梴醫學入門 耳聾有新舊之異 耳聾有三 耳聾有痰火風濕氣閉虛勞 精脫氣脫之不同 耳鳴 聰耳 耳聾

龔信古今醫鑑 耳病論 治法

龔廷賢萬病回春 耳聾脈證

藝術典第一百五十四卷

醫部彙考一百三十四

耳門一

黃帝素問

生氣通天論

陽氣者煩勞則張精絕辟積於夏使人煎厥目盲不可以視耳閉不可以聽憒憒乎若壞都汨汨乎不可止

註 此言煩勞而傷其陽氣也蓋陰陽之要陽密乃固煩勞則陽氣外張陰不得陽之溫固則精自出而絕於內矣秋冬之陽氣收藏於內夏則陽氣張浮於外故益虛而煎厥也精氣虛故目盲不可以視耳閉不可以聽也

又曰陽不勝其陰則五臟氣爭九竅不通

註 五臟爲陰九竅爲水注之器乃精氣所注之門戶如陰甚而陽不能勝之則五臟之氣交爭於內而九竅爲之不通

金匱眞言論

南方赤色入通於心開竅於耳

註 邪氣臟腑病形篇曰其別氣走於耳而爲聽別氣者心主之氣也故曰心開竅於耳也

陰陽應象大論

北方生寒在臟爲腎在竅爲耳

註 腎氣通於耳腎和則耳能聞五音矣故腎氣開竅於耳

人年五十體重耳目不聰明矣

註 年五十而精液血液皆虛虛則不能并於上而耳目不聰明矣

智者有餘有餘則耳目聰明

註 有餘則陽氣充故耳目聰明也

天不足西北故西北方陰也而人右耳目不如左明也

註 天不足西北者陽中之陰不足也在人則左爲陽而右爲陰陰不足於上故右耳目不如左明也

東方陽也陽者其精并於上并於上則上盛而下虛故使耳目聰明而手足不便也西方陰也陰者其精并於下并於下則下盛而上虛故其耳目不聰明而手足便也故俱感於邪其在上則右甚在下則左甚此天地陰陽所不能全也故邪居之

註 此言天地陰陽與人身之左右俱有所不能全也故人當配天地以養頭足而勿使邪居之

五臟生成篇

徇蒙招尤目冥耳聾下實上虛過在足少陽厥陰甚則入肝

註 厥陰肝臟開竅於目少陽經脈上出於耳邪實

於下而經氣不能上通是以目冥耳聾正氣虛於上致動視而昏冒搖掉之甚也此始傷氣而致正虛於上過在經而復邪實於下也

診要經終論

少陽終者耳聾百節皆縱目睘絕系絕系一日半死其死也色先青白乃死矣

註 手足少陽經脈皆循於耳經氣絕故耳聾也少陽主骨諸節皆屬於骨少陽氣終故百節皆縱手足少陽之脈皆至目銳眥終則牽引於目故目如驚而邪視也少陽屬腎腎藏志目系絕則志先絕故一日半死也青者甲木之氣外脫白者三焦之榮內亡也

玉機眞臟論

脾不及則令九竅不通名曰重强

註 經曰五臟不和則九竅不通今脾氣不足則五臟之氣皆不和矣夫胃爲陽土而氣强脾爲陰土而氣弱脾弱而不得稟水穀之氣則胃氣益强故名重强蓋言脾氣虛而不能爲胃行其津液者胃强脾弱臟腑之剛柔不和也

通評虛實論

凡治暴厥而聾偏塞閉不通內氣暴薄也不從內外中風之病故瘦留著也

註 暴厥而聾厥氣上逆上竅不通也偏塞閉結厥氣下逆下竅不通也此內外暴薄而爲外竅之不通也如不從內之憂怒外之中風而多病夭者此緣形弱氣衰牆基卑薄故肌肉瘦而皮膚薄著也

五臟不平六腑閉塞之所生也頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也

註 夫五臟之氣久逆而不得和平者六腑閉塞之所生也六腑不和則九竅爲之不利蓋臟腑陰陽表裏相應是以證見於外者病本於內閉塞於內者而外竅爲之不通

熱論

傷寒三日少陽受之少陽主膽其脈循脅絡於耳故胷脅痛而耳聾九日少陽病衰耳聾微聞

註 少陽之氣主樞主膽膽氣升則諸陽之氣皆升所謂因於寒欲如運樞也諸陽之氣從樞脅而出於膚表太陽主表陽明主肌少陽主胷脅胷脅痛而耳聾者病在氣而見有形之經證也

其病兩感於寒者三日則少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人六日死

註 少陽與厥陰爲表裏故見少陽之耳聾厥陰之囊縮而厥水漿不入穀氣絕也不知人者神氣傷也此臟腑皆病榮衛不行故盡氣終而死也

厥論

手太陽厥逆耳聾泣出項不可以顧腰不可以俛仰治主病者

註 手太陽所生病者耳聾小腸主液故逆則泣出也夫心主血脈小腸主液而爲心之表小腸氣逆則津液不能榮養於經脈是以項不可以顧腰不可以俛仰蓋腰項之間乃脈絡經俞之大會也

少陽之厥則暴聾頰腫而熱脅痛胻不可以運

註 足少陽之脈起於目銳眥從耳後入耳中下頰車循胷過季脅出膝外廉循足跗故逆則暴聾頰腫脅痛足胻不可以運行

脈解篇

太陽所謂耳鳴者陽氣萬物盛上而躍故耳鳴也

註 此言陽氣之更盛也春三月所謂發陳天地俱生萬物以榮是以天地萬物之氣皆盛上而躍然而人之陽氣亦榮盛於上是以經脈上壅而耳鳴也

太陽所謂浮爲聾者皆在氣也

註 此申明經氣之有別也如陽氣盛上而所謂耳鳴者因氣而病經也若所謂浮爲聾者皆在氣

刺禁論

刺客主人內陷中脈爲內漏爲聾

註 此言刺客主人太過則誤中內陷交過之脈而爲耳內漏而聾也

鍼解篇

人髮齒耳目五聲應五音六律

註 髮齒耳目共六齒又爲六六之數而髮之數不可數矣律呂之數推而廣之可千可萬而萬之外不可數矣此言天地人之相應通變之無窮也

氣交變大論

歲火太過炎暑流行金肺受邪民病瘧少氣欬喘血溢血泄注下嗌燥耳聾

註 諸戊之歲火運太過火勝則尅金故金肺受邪肺乃水之生源火熱鑠金水源已竭腎開竅於耳故腎虛而耳聾

歲金太過燥氣流行肝木受邪民病兩脅下少腹痛目赤痛眥瘍耳無所聞

註諸庚之歲金運大過燥氣流行則肝木受病耳無所聞者肝虛也

五常政大論

厥陰司天風氣下臨脾氣上從體重肌肉萎食減口爽目轉耳鳴

註目轉耳鳴風淫於上也

六元正紀大論

少陽司天民病聾瞑

註聾瞑者風熱之氣乘於內也

厥陰司天三之氣耳鳴掉眩

註耳鳴掉眩乃風病行於上也

木鬱之發甚則耳鳴眩轉

註耳鳴眩轉乃風氣之爲病也

少陽所至爲喉痹耳鳴嘔涌

註此秋病之常也

木鬱之發民病胃脘當心而痛上支兩脇鬲咽不通食飲不下甚則耳鳴眩轉目不識人善暴僵仆

註此受司天在泉之制勝鬱極乃發以報復其歲氣如丁卯丁酉歲少角木運而上臨陽明壬子壬午歲太角木運而陽明在泉則木氣皆鬱矣胃脘咽鬲食飲不下木勝而土傷也上支兩脇耳鳴眩轉仆不識人風氣之爲病也

至真要大論

厥陰司天客勝則耳鳴掉眩

註風木之客氣勝於上故耳鳴掉眩

厥陰之勝耳鳴頭眩憒憒欲吐胃鬲如寒

註耳鳴頭眩木淫於上也憒憒欲吐胃氣如寒胃土病也

少陽之勝熱客於胃煩心心痛目赤欲嘔嘔酸善飢耳痛渴赤善驚譫妄少腹痛下沃赤白治以辛寒佐以甘藏以甘瀉之

註少陽之勝舍於三焦故熱客於胃蓋三焦之原皆出於胃間也三焦與心主包絡相合故煩心心痛三焦之脈上入耳中絡目銳眥故淫上而爲耳痛

少陰司天客勝則胕腫頸項强肩背脊熱頭痛少氣發熱耳聾目瞑

註少陰司天二之氣乃厥陰風木耳聾厥陰之氣勝也

少陽司天客勝則丹胷外發及爲丹熛瘡瘍嘔逆喉痹頭痛嗌腫耳聾血溢內爲癉癰主勝則胃滿欬仰息甚而有血

註少陽司天初氣三氣乃君相二火耳聾等證皆風火之爲病也

歲太陰在泉民病耳聾渾渾焞焞嗌腫喉痹

註太陰在泉辰戌歲也民病耳聾等證乃三焦經病

靈樞經

邪氣藏腑病形篇

心脈微濇爲耳鳴

註南方赤色入通於心開竅於耳心脈微濇乃心氣虛故耳鳴

十二經脈三百六十五絡其血氣皆上於面而走空竅其別氣走於耳而爲聽

註別氣者心腎之氣別走於耳而爲聽也

經脈篇

小腸手太陽是主液所生病者耳聾目黃頰腫

三焦手少陽是動則病耳聾渾渾焞焞嗌腫喉痹

註凡此皆經脈所循之部分而爲病

手陽明之別者入耳合於宗脈實則龢聾

註實則氣滯而爲龢聾之病

經筋篇

手太陽之筋其支者入耳中直者出耳上下其病則耳中鳴痛引頷

註此太陽之筋所過而爲病也

脈度篇

腎氣通於耳腎和則耳能聞五音矣五藏不和則七竅不通

註五藏常內閱於七竅五藏不和故七竅爲之不通

熱病篇

熱病不知所痛耳聾不能自收口乾陽熱甚陰願有寒者熱在髓死不治

註不知所痛者外因之熱入於內也耳聾不能自收口乾者腎藏之熱乘於上也陽熱甚陰願有寒者內熱交爭於外也熱在髓者外熱交爭於內也病深入內故死

口問篇

黃帝問曰人之耳中鳴者何氣使然岐伯曰耳中宗脈之所聚也故胃中空則宗脈虛虛則下溜脈有所竭者故耳鳴

註肺朝百脈宗脈者百脈之宗肺所主也耳者宗脈之所聚也百脈之血氣水穀之所生也故胃中空則宗脈虛虛則脈氣下溜夾脈中之血氣有所竭故耳鳴也

上氣不足耳爲之苦鳴

註此言膀胱所藏之津液不足不能灌精濡空竅正氣不足而生奇邪之病也

師傳篇

腎者主爲外使之遠聽視耳好惡以知其性

註腎開竅於耳故主爲外言其聽之遠也

決氣篇

精脫者耳聾液脫者骨屬屈伸不利色夭腦髓消脛痠耳數鳴

註腎主藏精開竅於耳故精脫者耳聾液涸澤於骨補益腦髓故液脫者骨屬屈伸不利不能潤澤皮膚故毛色夭焦也腎主骨而骨髓上通於腦故腦髓消而脛痠耳鳴

海論

髓海不足則腦轉耳鳴

註髓海不足則精液竭精液者所以濡空竅者也是以耳爲之鳴

五閱五使篇

耳者腎之官也

本藏篇

黑色小理者腎小粗理者腎大高耳者腎高耳後陷者腎下耳堅者腎堅耳薄不堅者腎脆耳好前居牙車者腎端正耳偏高者腎偏傾也

註耳者腎之候故視耳而知腎也

衛氣篇

足少陽之標在耳竅籠之前而出於頭氣之衝竅籠者耳也

註標猶樹之稍秒足少陽之標出於頭氣之衝

陰陽二十五人篇

手少陽之上血氣盛則耳色美血氣少則耳焦色惡

註手少陽之脈其上行者出走耳前交頰上至目銳皆是以皮膚之血氣盛則耳色美氣血皆少則耳焦色惡也

扁鵲難經

耳能聞聲之故

四十難曰肺主聲耳者腎之竅而反聞聲其意何也然腎者北方水也水生於申申者西方金金者肺肺主聲故令耳聞聲

註肺金也聲出於金故肺主聲舉屬於肺不能聽聲耳屬於腎而反能聞聲音果何如邪腎屬北方水水長生在申西方申酉戌申正金臨官之地金在藏爲肺肺主聲耳雖屬腎水水生於肺金之位故令耳能聞聲

漢華佗中藏經

腎氣通耳

腎者精神之舍性命之根外通於耳

耳聾

肝氣逆則頭痛耳聾頰赤其脈沉而急浮而急亦然病耳無聞其脈浮大而濇者死

耳部凶證

黑色起於耳目漸入於口者死

赤色見於耳目額者五日死

腎絕耳乾者六日死

晉皇甫謐甲乙經

腎氣通耳

腎氣通於耳耳和則能聞五音矣經曰腎在竅爲耳然則腎氣上通於耳下通於陰也

耳焦枯

耳焦枯受塵垢者病在骨

宋楊士瀛直指方

耳聾

腎通乎耳所主者精氣調和腎氣充足則耳聞而聰若勞傷氣血風邪藥虛使精脫腎憊則耳轉而聾又有氣厥而聾者有挾風而聾者有勞傷而聾者蓋十二經脈上絡於耳其陰陽諸經適有交并則臟氣逆而爲厥厥氣搏入於耳是爲厥聾必有時見眩運之證耳者宗脈之所附脈虛而風邪乘之風入於耳之脈使經氣否而不宣是爲風聾必有時見頭痛之證勞役傷於血氣淫欲耗其精元瘦悴力疲昏昏憒憒是爲勞聾有能將適得所血氣和平則其聾暫輕其或日就勞傷風邪停滯則爲久聾又有耳鳴風邪與氣相擊其聲嘈嘈眼或見火爲虛鳴熱氣乘虛隨脈入耳不散濃出爲膿耳人耳間有津液輕則不能爲害若風熱搏之津液結紐成核塞耳亦令暴聾謂之耵耳前是數者腎脈可推風則浮而盛熱則洪而實虛則澀而濡風爲之疎散熱爲之清利虛爲之調養邪氣並退然後以通耳調氣安腎之劑主之

竇漢卿瘡瘍全書

耳風毒

耳風毒受在心經因腎氣不流行壅在心經致傷於耳五種耳痔耳蕈耳癰耳濕耳爛可用清肝流氣飲後用定痛降氣湯治之如遇耳痔耳蕈先用鍼刺破用紅玉膏點之耳脹痛用虎耳草汁滴入耳內痛即止耳疔以燒酒滴疔根上方得脫隨用苦茶洗解酒毒

耳門癰

耳門癰受在肝經毒氣傳注血不周流此是惡毒證也當用煎藥治之

耳根癰

耳根癰受在腎經絡怒氣傷心凝滯肝經風熱壅盛成毒也當用眉風藥治之或用清肝流氣飲活法治之

發耳

其瘡生於耳邊又名熱毒發疽五六月間漸長如蜂窠皮紫者亦熱諸處如火燒痛不可忍十日可刺無膿者十一日死若瘡不硬刺見白膿者不死黃膿出者不死無時出鮮血者及赤膿者死食不知味多說語者亦死在二十日之間便見凶吉煎藥用千金內托散隨時增損之

石疽

石疽難與石癰何惟石疽深寒客於經絡血氣結聚不散隱於皮內腫按之如石此毒連頸項之間內先潰爛方出皮膚恐髓出頸項者即死用排膿內補十宣散待膿盡內補散懣心乳香護心散仍貼金絲膏湯甚加五味天花粉乾葛麥冬烏梅初起須用艾火灸患上三四十壯發於額面者不可治矣

嚴用和濟生方

耳論治

夫耳者腎之所候腎者精之所藏腎氣實則精氣上通開五音而聰矣若疲勞過度精氣先虛於是乎風寒暑濕得以外入喜怒憂思得以內傷遂致聾聵耳鳴熱壅加之出血出膿則成聾耳底耳之患候其顏煩色黑者知其耳聾也亦有手少陽之脈動厥而聾者耳內煇煇焞焞也手太陽脈動厥而聾者耳內氣滿也大抵氣厥耳聾尚易治精脫耳聾不易藥愈諸證既殊治各有法

耳者腎之候腎乃宗脈之所聚其氣通於耳腎氣和平則開五音而聰矣腎氣不平則耳爲之受病也醫經云腎氣通耳心寄竅於耳風寒暑濕燥熱得之於外應乎腎憂愁思慮得之於內生瘡或爲聤耳或爲腫痛六淫傷之調乎腎七情所感治乎心醫療之法寧心順氣欲其氣順心寧則耳爲之聰矣宜用局方妙香散以石菖蒲煎湯調服以順心氣參丹蜜砂以寧心君調腎之藥菟蓉圓

金劉完素六書

耳聾

聾之爲病俗醫率以慓悍燥烈之藥治之往往謂腎水虛冷故也夫豈知水火之陰陽心腎之寒熱榮衛之盛衰猶權衡也一上則必一下是故高者抑之下者舉之此平治之道也夫心火本熱虛則寒矣腎水本寒衰則熱矣腎水既少豈能反爲寒病耶經言足少陰腎水虛則腹滿身重濡瀉瘡瘍流水腰股痛發腘腨股膝不便煩冤足痿清厥意不樂大便難善恐心惕如人將捕口苦舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心心痛黃疸腸澼下血脊臂股肉後廉痛痿厥嗜臥足下熱而痛以此見腎虛爲病皆是熱證經又曰有所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣內伐謂伐腹中之陰氣也水不勝火以熱舍於腎中也經又曰骨痿者生於大熱也又曰腎熱者色黑而齒槁凡色黑齒槁之人必身瘦而耳焦也所以然者水虛則火實而熱亢極則害承乃制故反兼水之黑也腎水衰少不能潤澤故黑乾焦槁也齒耳屬腎故甚也如瘡瘍熱極無液則肉乾焦而色黑也然則水衰爲熱明矣豈可反言寒耶故仙經以息爲六字之氣應於三陰三陽臟腑之六氣寶則行其本化之字瀉之衰則行其勝己之字瀉之是爲殺其鬼賊也所謂六字之氣者肝噓心呵相火唏脾呼肺咽腎本吹也故吹去腎寒則生熱呵去心熱則生寒故曰春不呼夏不嘻秋不噓冬不呵四時常有唏謂三焦無不足八節不得吹謂腎臟難得實然以吹驗之吹去腎水寒氣則陽熱暴甚而目脹昏眩虛爲熱證明矣豈可反言腎虛而以熱藥養水耶況水少不能勝火又服熱藥寧無損歟經言以寒治熱謂寒養水而瀉火以熱治寒謂熱助火而抵水也經雖或言以熱治熱謂病氣熱甚能與寒藥交爭而寒藥難下故反熱服順其病熱熱病既消寒性乃發則病熱除愈如承氣湯寒藥反以熱服之愈是也傷寒同法經曰寒因熱用熱因寒用亦是治熱類也故治病之道瀉實補衰平而已矣或謂病

熱爲火實水虛反言腎虛爲冷心迷正理不敢用對證寒藥誤以食前服其助陽熱藥欲令下部水勝退上焦心火食後兼服微凉之藥而退火熱豈知十益不及一損也病本熱而無寒又得熱藥則病熱轉甚食後雖服大寒之藥亦難解其勢之甚也況以微凉乎豈不詳熱藥證中止言治寒助熱安有養水瀉火之言哉經言五臟以平爲期及夫一法無問五臟生尅興衰一槩言熱爲實寒爲虛者通言陽氣之興衰也假令下部寒者謂下焦火氣之虛也故以熱藥補之非助腎水之藥爾由水虛不能反爲寒也凡諸疾之所起也不必臟腑興衰變動相乘而病但乘內外諸邪所傷即成病矣大凡治病必求所在病在上者治其上病在下者治其下中外臟腑經絡皆然病氣熱則除其熱寒則退其寒六氣同法瀉實補虛除邪養正平則守常醫之道也豈可見病已熱而反用熱藥復言養水而勝心火者可謂道在邇而求諸遠事在易而求諸難深可戒哉所以或言腎虛而下部冷者非謂腎水虛也所謂腎有兩枚經曰七節之旁中有小心楊上善注太素曰人之脊骨有二十一節從下第七節之旁左者爲腎右者爲命門命門者小心也難經言心之原出於太陵然太陵穴者屬手厥陰包絡相火小心之經也元珠言刺太陵穴曰此瀉相火小心之原也然則右腎命門爲小心乃手厥陰相火包絡之臟也仙經曰先生右腎則爲男先生左腎則爲女謂男爲陽火女爲陰水故也或言女子左腎爲命門者誤也難經止言右腎爲命門男子以藏精女子以繫胞豈相反也然右腎命門小心爲手厥陰包絡之臟故與手少陽三焦合爲表裏神脈同出見手右尺也二經俱是相火相行君命故曰命門爾故仙經曰心爲君火腎爲相火是言右腎屬火而不屬水也是以右腎火氣虛則爲病寒也君相雖爲二火論其五行之理則一於爲熱也夫五行之理陰中有陽陽中有陰孤陰不長獨陽不成但有一物全備五行遞相濟養是謂和平交互尅伐是謂興衰變亂失常災害由生是以水少火多爲陽實陰虛而病熱也水多火少爲陰實陽虛而病寒也故俗以熱藥欲養腎水勝退心火者豈不誤歟至如或因悉慾而卽病或因久而成病者俗以爲元氣虛損而病寒者皆誤也然諸所動亂勞傷乃爲陽火之化神狂氣亂而爲病熱者多矣故經言消癉熱中及夫熱病陰陽發易房勞之病證也所以熱病未復及大醉以不禁入房而爲禍甚速者陽熱易爲暴甚故也夫太乙天眞元炁非陰非陽非寒非熱也是以精中生氣氣中生神神能御其形也由是精爲神氣之本形體之充固則衆邪難傷衰則諸疾易染何正言元氣虛而爲寒爾故老人之氣衰多病頭目昏眩耳鳴或聾上氣喘欬涎唾稠粘口苦舌乾咽嗌不利支體焦痿筋脈拘攣中外燥濕便溏秘結此皆陰虛陽實之熱證也俗悉言老弱爲虛冷而無熱也縱見熱證雖云少水不勝多火而反言腎水虛則爲寒此乃舉世受誤之由也但須臨時識其陰陽虛實則無橫夭之冤慎不可妄以熱藥養其眞氣則眞氣何由生也故西山記曰餌之金石當有速亡之患內經言石藥發癲狂熱甚之所生也或欲以溫藥平補者經言積溫成熱則變生熱疾故藥物不可妄服也夫養眞氣之法飲食有節起居有常不妄作勞無令損害陰陽和平自有益矣仙經雖有服餌之說非其人不可也況乎齋於氣味平和無毒之物但以調其氣爾眞修道者以內事爲功外事爲行非服餌而望成於道也故仙經又曰服餌不備五味四氣而偏食之久則腑藏偏傾而生其病矣然則豈可誤服熱藥而求其益所謂聾者由水衰火實熱鬱於上而使聽戶元府壅塞神氣不得通泄也其所驗者仙經言雙手閉耳如鼓音是謂鳴天鼓也由脈氣流行而閉之於耳氣不得泄衝鼓耳中故聞之也或有壅滯則天鼓微聞天鼓無聞則聽戶元府閉絕而耳聾無所聞也故一法舍浸針砂酒以磁石附耳欲導其氣令通泄也或問曰聾既爲熱或服乾薑生薑附子醇酒之類辛熱之物而或愈者何也答曰欲以開發元府而令耳中鬱滯通泄也故養生方言藥中其效則如開攢百樂音由陽氣開衝耳中也凡治聾者通其所宜若熱證已退而聾不已者當以辛熱發之三兩服不愈者則不可久服恐熱極而成他病耳若聾有熱證相兼者宜以退風散熱凉藥調之熱退結散而愈然聾甚閉絕亦爲難矣慎不可攻之過極反傷正氣若非其病不可服其藥飲食同法當所宜者過度則反傷正氣病已則止藥欲求不病無損而已矣故經云大毒治病十去其六小毒治病十去其七常毒治病十去其八無毒治病十去其九穀肉果菜食養盡之勿令過度反傷其正不盡行復如法故曰必先歲氣無伐天和無貿貿無虛虛而邀人天殃無致邪無失正絕人長命

陽氣煩勞積於夏令人熱厥目眥不可視耳閉不可聽人參散主之

耳者蓋非一也以竅言之是水也以聲言之金也以經言之手足少陽俱會其中也有從內不能聽者主也有從外不能入者經也有若蟬鳴者有若鐘聲者有若火熇熇狀者各隨經見之其間虛實不可不察也假令耳聾者腎也何謂治肺肺主聲鼻塞者肺也何謂治心心主臭如推此法皆從受氣爲始腎受氣於巳心受氣於亥肝受氣於申肺受氣於寅脾王四季此法皆長生之道也

耳鳴

耳鳴有聲非妄聞也蓋耳爲腎之竅交會手太陽少陽足厥陰少陰少陽之經若水虛火實而熱氣上甚客其經絡衝於耳中則鼓其聽戶隨其脈氣之微甚而作諸音聲也經言陽氣萬物盛上而躍故耳鳴是也

元李杲十書

耳聾聲

心厥虛邪熱風相合妄聽妄聞耳聾聲膽與三焦之經同出於耳銅人云刺關衝出血湧支溝脈浮大而弦初小柴胡湯後大柴胡湯此證是太陽與少陽爲病前客後主也

耳鳴耳聾

經曰頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也胃氣一虛耳目口鼻俱爲之病矣

經曰陽氣者煩勞則張精絕辟積於夏使人煎厥目眥耳閉潰潰乎若壞都故蒼天之氣貴清淨陽氣惡煩勞病從脾胃生者一也

脈弦洪緩而沉按之中之下得時一濇其證耳鳴耳聾者調中益氣湯

經曰頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也此胃弱不能滋養手太陽小腸手陽明大腸故有此證然亦止從胃弱而得之故聖人混言腸胃之所生也或曰子謂混言腸胃之所生亦有據乎予曰經云脾不及令人九竅不通謂脾爲死陰受胃之陽氣能上升水穀之氣於肺上充皮毛散入四藏今脾無所稟不能行氣於藏腑故有此證此則脾虛九竅不通之謂也雖言脾虛亦胃之不足所致耳

耳之體屬腎用屬肺

耳者上通天氣腎之竅也乃腎之體而爲肺之用蓋肺長生在子子乃腎之舍而肺居其中而能聽音聲也故精脫者耳聾此明爲清氣所奉於天而心勞腎損則受邪也

朱震亨心法

耳聾

耳聾皆屬於熱少陽厥陰熱多當用開痰散風熱通聖散滾痰丸之類

大病後耳聾須用四物湯降火

陰虛火動耳聾者亦用四物湯

因鬱而聾者以通聖散內大黃酒煨再用酒炒三次

後入諸藥通用酒炒

聾病必用龍膽丸四物湯養陰

濕痰者神芎丸檳榔丸

耳鳴

耳鳴因酒過者大劑通聖散加枳殼柴胡大黃甘草

南星桔梗青皮荊芥不愈用四物湯妙

耳鳴必用龍膽丸食後服

氣實人檳榔神芎丸下之

耳內閧閧然亦是陰虛亦有氣閉者蓋亦是熱氣閉者耳鳴也

耳腫痛

耳濕腫痛凉膈散加酒炒大黃黃芩酒浸防風荊芥羌活服腦麝少濕加枯礬吹

羅天益衛生寶鑑

耳聾

黃帝鍼經云精脫者則耳聾夫腎爲足少陰之經而藏精氣通乎耳耳者宗脈之所聚也若精氣調和則腎臟強盛耳開五音若勞傷氣血兼受風寒損於腎臟而精脫精脫則耳聾也然五藏六腑十二經脈有絡於耳者其陰陽經氣有相併時併則臟逆名之曰厥氣搏於耳之脈故令聾其腎病精脫耳聾者其候顏額色黑手少陽之脈動其氣厥逆而耳聾者其證耳內煒煒焞焞也手太陽厥而耳聾者其候聾而耳內氣滿也宜以滋腎散治之

卒聾

夫卒耳聾者由腎氣虛爲風邪所乘搏於經絡隨其血脈上入耳正氣與邪氣相搏故令耳卒聾也宜以蒲黃穿治卒聾也

脣耳

夫耳者宗脈之所聚腎氣之所通足少陰之經也若勞傷氣血熱氣乘虛入於其經邪隨血氣至耳熱氣

聚則生膿汁謂之聹耳也

耳中生瘡

夫耳內生瘡者爲足少陰之經其氣通於耳其經虛則風熱乘之隨脈入於耳與氣血相搏故令耳內生瘡也

危亦林得效方

耳鳴

耳鳴皆是腎精不足陰虛火動也痰火者鳴甚腎虛者微鳴宜補腎丸黃芪丸大補丸滋腎通氣湯或六味地黃丸

明方賢奇效良方

論耳鳴耳聾

耳聾屬足少陰腎經寄竅於耳而腎之所主者精精氣調和腎氣充足則耳自聰矣且耳聾所感不一有勞傷氣血風邪乘熱使精脫腎憊而聾者有挾風而聾者有勞損而聾者蓋十二經脈上絡於耳其諸經適有交併則臟氣逆而爲厥厥氣搏入於耳爲厥聾耳者宗脈之所附脈虛而風邪乘之風入於耳使經氣否而不宣爲風聾勞役傷於血氣淫慾耗其精元瘦悴力疲昏昏聵聵爲勞聾或人善調養氣血和平不妄作勞其證漸愈或不能謹避勞傷精氣神風邪停滯則爲久聾之證又有耳觸風邪與氣相搏其聲嘈嘈聒聒或見光爲虛鳴有熱氣乘虛隨脈入耳聚熱不散膿汁出爲膿耳俗醫多用懍悍燥熱之藥制之往往爲腎水虛冷故也夫心火本熱虛則寒矣腎水本寒衰則熱矣腎水既少豈能反爲病耶故一法用酒浸針砂一日至晚去針砂將酒含口中用磁石一塊綿裹塞耳在左塞左在右塞右欲導其氣而通泄也或問曰聾既爲熱或服乾薑生薑附子醇酒之類性熱之物而或愈者何也答曰欲以開發元府而令耳中鬱滯通泄也凡治聾者適其所宜若熱證退而聾不已者當以辛熱之劑發散疾止即已不可久服恐熱極而成他病爾若聾有熱證相兼者宜以退風散熱調之退結散熱而愈然聾甚悶經亦爲難已慎不可攻之過極反傷正氣若非其病不可服其藥飲食同法當所宜者過度則反傷正氣病已即止藥欲求不病無損而已矣又言老人之氣衰多病頭目昏眩耳鳴或聾上氣等證此皆陽實陰虛之證也俗言老弱爲虛冷而無熱也縱有熱證或云少水不勝多火而反言腎水虛則爲寒此乃舉世受惑之由者也

虞搏醫學正傳

耳病

內經曰腎者作強之官技巧出焉又曰耳爲腎之外候又曰腎通竅於耳又曰心通竅於耳夫腎之爲臟水臟也天一生水故有生之初先生二腎而一陰藏於其內而又有相火存乎命門之中也相火每挾君火之勢而侮所不勝經所謂一水不能勝二火是矣其或嗜慾無節勞役過度或中年之後大病之餘腎水枯涸陰火上炎故耳瘈耳鳴無日而不作也或如蟬噪之聲或如鐘鼓之響甚爲可惡早而不治漸而至於龍鍾艮可嘆哉治法宜瀉南方之火補北方之水無有不安者焉錢仲陽曰腎有補而無瀉厥有旨哉

診法

左寸洪數心火上炎兩尺洪數相火上炎其人必遺精夢泄兩耳或鳴或聾

戴思恭證治要訣

耳病

耳爲腎竅耳病皆屬於腎腎虛故耳中或如潮聲蟬聲或暴聾無聞宜鳴聾散或嚼蠟用酒下及黃蠟粥食之

腎經久虛耳中潮聲蟬聲無休止特妨害聽聞者當墜氣補腎正元飲磁黑錫丹兼進安腎丸

風毒攻耳致生膿者名聹耳

樓英醫學綱目

耳目受陽氣以聰明

人之耳目猶月之質必受日光所加始能明耳目亦必須陽氣所加始能聰明是故耳目之陰血虛則陽氣之加無以受之而視聽之聰明失耳目之陽氣虛則陰血不能自施而聰明亦失然則耳目之聰明必須血氣相須始能視聽也

耳病屬腎肝

耳以竅言之腎水也經云腎主耳在藏爲腎在竅爲耳又云腎氣通於耳腎和則耳能聞五音矣又云精脫者耳聾故羅謙甫以精脫耳聾必顴頰色黑也經云肝虛則目眩眩無所見耳無所聞善恐治用四物湯加防風羌活柴胡菖蒲茯神等分煎服二十餘帖却用杜壬蠶蛾散開之肝虛則生聾補之是也

運氣耳聾有四

一曰濕邪傷腎三焦聾經云太陰在泉濕淫所勝民

病耳聾渾渾焞焞治以苦熱是也

二曰燥邪傷肝聾經曰歲金太過燥氣流行肝木受邪民病耳聾無所聞是也

三曰火邪傷肺聾經云歲火太過炎暑流行肺金受邪民病耳聾是也

四曰風火炎擾於上聾經云少陽司天之政風熱參布雲物沸騰民病聾瞑三之氣炎暑至民病熱中聾瞑治以寒劑是也

運氣耳鳴皆屬風火

經云厥陰司天風行太虛雲物搖動目轉耳鳴三之氣天政布氣乃時舉民病耳鳴又云厥陰之勝耳鳴頭眩又云少陽所至爲耳鳴治以辛寒是也

運氣耳痛皆屬熱

經云少陽之勝耳痛治以辛寒是也

李梴醫學入門

耳聾有新舊之異

耳聾須分新舊新聾多熱少陽陽明火多故也宜散風熱開痰鬱之劑舊聾多虛腎常不足故也宜滋補兼通竅之劑脈證以腎爲主遲濡爲虛浮動爲火浮大爲風沉濇爲氣數實爲熱

耳聾有三

厚味動胃火則左右俱聾忿怒動膽火則左耳聾色慾動相火則右耳聾三者忿怒爲多

耳聾有痰火風濕氣閉虛勞精脫氣脫之不同

痰火因膏粱胃熱上升兩耳蟬鳴熱鬱甚則氣閉漸聾眼中流火宜二陳湯加黃蘗木通萹蓄瞿麥因酒者通聖散加南星枳殼大黃或滾痰丸

風聾因風邪入耳必內作癢或兼頭痛風熱或因鬱者防風通聖散先將大黃酒煨又酒炒三遍後入諸藥俱用酒炒煎服風壅連頭目不清者清神散風虛者排風湯桂香飲芎芷散

濕聾因雨水浸漬必內腫痛涼膈散加羌活防風俱用酒炒或五苓散加陳皮枳殼紫蘇生薑濕痰神芎丸痞塞不通必兼眩運實人因怒者當歸龍薈丸虛人因思者妙香散憂滯者流氣飲子加菖蒲上盛下虛者祕傳降氣湯加菖蒲

虛聾因久瀉或大病後風邪乘虛入耳與氣相搏嘈嘈而鳴或時眼見黑花陰虛者四物湯加知蘗菖蒲遠志或腎氣丸加磁石故紙菟絲子黃蘗陽虛者八味丸益腎散磁石湯

勞聾昏昏聵聵瘦瘁乏力因勞力脫氣者補中益氣湯加菖蒲有火者加知蘗茯苓因房勞脫精者人參養榮湯加知蘗或補骨脂丸如久聾腎弱氣虛絕不聞者難治

大要調氣與開關通竅腎水竅耳而能聞聲者水生於金也肺主氣一身之氣貫於耳故能聽聲凡治諸聾宜先調氣開鬱間用磁石羊腎丸開竅蓋聾皆痰火鬱結非磁石鎮墜烏桂椒辛菖蒲辛散流通則老痰鬱火難開然亦刼劑也愈後以通聖散和之可也

耳鳴

耳鳴乃是聾之漸也惟氣閉多不鳴便聾風熱鳴者解毒湯加生地知母或通聖散痰火鳴甚當歸龍薈丸挾濕神芎丸或青木香丸腎虛微鳴滋腎丸氣虛四君子湯下血虛四物湯下陰虛虎潛丸

聤耳膿耳耳疼

聤膿疼皆風熱湊也聤耳原有油液風熱搏結成核以致鳴聾外用猪脂地龍鍋煤等分薑汁和丸棗核大綿裹入耳令潤挑去重者內服柴胡聰耳湯膿耳風熱上壅外用枯礬五分陳皮胭脂俱燒灰各二分麝五釐爲末吹耳重者內服犀角飲子耳疼如蟲走者風盛乾痛者風熱或屬虛火有血水者風濕外用蛇蛻燒存性爲末吹入枯礬末亦可疼甚用吳萸烏頭尖大黃搗爛盦足心重者內服東垣鼠黏子湯

龔信古今醫鑑

耳病論

夫耳者腎之竅也其爲病亦有數種有氣厥而聾者有挾風而聾者有勞傷而聾者有熱氣乘虛隨脈入耳而爲膿耳者有耳出津液風熱搏之結核塞耳亦令暴聾而爲聤耳者然又有左聾者有右聾者有左右俱聾者不可不分經而治之也

治法

夫左耳聾者因有所忿怒過度則動少陽膽火故從左起以龍薈丸主之右耳聾者因有所色慾過度則動太陽膀胱相火故從右起以六味地黃丸主之左右俱聾者因有所醇酒厚味過度則動足陽明胃火故從中起以通聖散滾痰丸主之蓋左耳聾者婦人多有之以其多忿怒故也右耳聾者男子多有之以其多色慾故也左右俱聾者膏粱之家多有之以其多肥甘故也總三者而論之忿怒致耳聾者爲多

痰火上升兩耳蟬鳴漸欲聾宜加減龍薈丸鍼砂酒通用利氣湯復聰湯

龔廷賢萬病回春

耳聾脈證

耳病腎虛遲濡其脈浮大爲風洪動火賊沉濇氣凝數實熱塞久病聾者專於腎責暴病浮洪兩尺相同或兩尺數陰火上衝

左耳聾宜龍膽湯右耳聾宜滋陰地黃湯左右耳俱聾宜酒製通聖散清聰化痰丸

腎虛耳聾宜六味地黃丸本方加遠志菖蒲黃檗知母並鹽水炒亦治陰虛火動而聾

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百五十五卷目錄
醫部彙考一百三十五

耳門二

張三錫醫學準繩六要 耳鳴聾總論 陰虛耳聾 氣閉耳聾 肝火耳聾 痰火耳聾 氣虛耳聾 風熱耳聾 虛聾 肝火耳聾
徐春甫古今醫統 耳聾有六候 耳聾耳鳴屬熱者多 氣虛耳聾當見於大病之後 耳聾當以通氣開鬱爲主 耳聾治法宜鴻南方補北方
王綸明醫雜著 耳鳴 耳瘡
趙獻可醫貫 論耳 諸病 耳瘡 膿耳
王肯堂證治準繩 論耳 耳發 耳內瘡 耳後疽 耳根毒
吳崑醫方考 耳病方論
陳實功外科正宗 耳痢 百蟲入耳 黑疔
喻昌醫門法律 耳鳴
張介賓景岳全書 論證 論治
陳士鐸石室祕錄 耳聾 耳痰 耳鳴
方一 補中益氣湯 四物湯 四君子湯 八珍湯 六味丸 大安腎丸 小安腎丸 滾痰丸 沉香降氣散 指迷七氣湯 流氣飲子 蘇子降氣湯 養正丹 復原通氣散 防風通聖散 排風湯 不換金正氣散 正元散 木香檳榔丸 越鞠丸 平補鎮心丹 五苓散 二陳湯 青木香丸 小柴胡湯 一粒金丹 人參散 妙香散 烏金散 歸脾湯 四生散 京屬散 逍遙散 柴金丹 調中益氣湯

藝術典第一百五十五卷
醫部彙考一百三十五

耳門二

明張三錫醫學準繩六要

耳鳴聾總論

耳鳴耳聾須分新久虛實忽因大怒大醉而聾或鳴者屬痰火分輕重治中年及體虛或病後有此悉屬虛但分氣血耳古方有用鼠膽猫尿凌霄花等杵汁滴耳者有用杏仁去皮加鹽蒸熱捻油滴者有用蓖麻子去皮加棗子一個同搗加乳汁和丸綿裹塞耳者有蒜瓣剜空納巴豆炮熟綿裹塞耳者有用雄黃巴豆末葱涎和錠捲紙塞耳者有以蜀椒巴豆菖蒲松脂以蠟鎔作筒子塞耳者有用細莘蒲黃麴末杏仁和丸塞耳者加有龍腦椒目者無非辛熱散結透竅有餘暴起者或可取效若元氣不足腎陰虧損虛火挾痰泛上閉住其竅而聾鳴者雖日滴時塞如蟻撼石終莫能動須大補氣血滋陰制火使大氣上行充塞乎頭則九竅通利聾聵咸除難經曰腎氣通於耳耳和則知五音矣腎氣不得通於耳則耳不和而聾得上通於耳則耳和而聰觀此則虛實判然矣

腎虛耳中潮聲蟬聲無休止時妨害聽聞者當墜氣補腎正元飲嚥黑錫丹間進安腎丸有熱者龍齒散腎臟風耳鳴夜間如打鼓聲四肢抽掣痛耳內覺有風吹奇癢宜黃芪丸

耳屬腎人所共知也然少陽膽經循脅絡耳故傷寒邪傳少陽則耳聾脅痛是也婦女鬱悒既久則耳前後生瘰癧馬刀暴怒氣逆則耳卒聾皆相火客於本經而然不獨腎也

耳聾耳鳴有痰有火有氣虛有陰虛有肝火少壯悉屬痰火中年必是陰虛

陰虛耳聾

兩尺脈大或左脈大或左脈虛大體瘦色黑兼見口乾腸燥而耳鳴或聾者手足心必熱屬陰虛六味丸坎離丸主之

氣閉耳聾

耳聾著惱而成通氣散效茴香木香人參延胡索陳皮菖蒲各一錢羌活殭蠶川芎蟬蛻各五分穿山甲二錢甘草錢半爲細末每服三錢溫酒調下

肝火耳聾

左脈弦急而數屬肝火其人必多怒耳鳴或聾宜平肝代木龍膽瀉肝湯不已龍薈丸

痰火耳聾

右關脈滑而數屬痰火鬱於上焦宜清痰降火二陳酒芩連柴胡枳殼或竹瀝薑汁下滾痰丸佳

氣虛耳聾

右脈大而無力或濡而細證兼倦怠口中無味等內傷證者屬氣虛恆見勞碌之人或中年病後得此宜加減益氣聰明湯

風熱耳聾

耳根連牙牀腫痛屬上焦風熱陽明少陽二經受病清胃兼辛涼散之升柴芷翹荊防薄荷甘桔枳殼酒芩連元參花粉赤芍鼠黏生地等類頻緩服勢盛加酒蒸大黃腫已消但出水膿不止用紅末子吹之耳門瘡鼠黏子湯佳

耳中忽然大痛如有蟲在內走奔或出血或出水或乾痛不可忍用蛇蛻燒存性以鵝翎管吹入耳中立止

大病後及勞碌耳聾或鳴當作虛治須分氣血一補陰一益氣

虛聾

耳出膿汁或聾而鳴屬上焦風熱蔓荊子散佳方用蔓荊生地赤芍甘菊桑皮木通麥冬升麻前胡炙甘草赤茯苓棗煎服

耳鳴聾皆是陰虛火動滋腎丸虎潛丸或滋陰百補丸俱好

肝火耳聾

脈弦而濡或數其人多飲屬肝經風熱木香檳榔丸耳根連及項或腫多在左邊脈弦數屬肝火恆見於婦女宜平肝降火兼舒鬱柴胡青皮香附撫芎梔子酒芩連歸芍貝母連翹元參主之

若腫而發熱有表證者荊防敗毒散主之

耳下結久硬且脹著惱便甚屬鬱越鞠丸主之

徐春甫古今醫統

耳聾有六候

諸書論聾證有六候有氣聾火聾風聾厥聾勞聾陰聾又有脬耳膿耳大抵耳屬足少陰腎經腎寄竅於耳也腎通耳所主者精精氣調和腎氣充足則耳聞而聰若勞傷血氣精脫腎憊必主耳聾且十二經脈上絡於耳其陰陽諸經適有交併則臟氣入於耳而爲厥是謂厥聾必有眩運相兼耳者宗脈之所附脈虛而風邪乘之經氣痞而不宣謂之風聾必有頭痛之證瘀疫傷於氣血淫慾耗其精元瘦瘁力疲昏昏聵聵而閉閉然者是爲勞聾必兼虛怯等證此好色腎虛者有之有痰火上升鬱於耳中而鳴有熱乘虛隨脈入耳結爲膿汁謂之膿耳或耳間有津液風熱搏之結硬成核塞耳亦令暴聾此爲聆耳前是數者皆當推其腎脈風則浮盛熱則洪大虛則濇而微風者散之熱者清之腎虛者補益之痰火者涼而降之各隨其宜而治之豈有不聰聽者也

耳聾耳鳴屬熱者多

俗云老人多是虛冷而無熱此世之誤也凡老人之氣衰多病頭目昏眩耳鳴或聾上氣喘咳涎唾稠粘口苦舌乾筋痿脈促二便祕結此皆陰虛陽實之證故經云人年四十而陰氣自半惟是孤陽獨盛見證皆火又以熱藥與之是以益火也大寒之藥故不可服而惟以溫平調理計出萬全

氣虛耳聾當見於大病之後

凡人大病之後而耳聾者多是氣虛若老人耳聽漸重亦是氣虛重而兼鳴者亦有痰不宜峻補

耳聾當以通氣開鬱爲主

耳聾證乃氣道不通痰火鬱結壅塞而成聾也凡用清痰降火之藥須兼味辛行氣通竅之藥方得治法之要古方用酒浸鉄砂一日至晚去鉄砂將酒含口中用緊磁石一塊綿裹塞耳左聾塞左右聾塞右此欲導其氣而通其閉也若峻用痰火藥則反傷脾胃亦不能開其塞若急補氣虛則火愈上而亦不能開惟以前法痰火藥中佐以辛溫之味緩緩平治自然痊愈予見攻之太過反傷正氣變生他疾者有之此又不可不察也

耳聾治法宜瀉南方補北方

憂愁思慮則傷心心虛血耗必致耳聾耳鳴房勞過度則傷腎腎虛精竭亦必致耳聾耳鳴藥宜瀉南方補北方滋陰降火爲主心虛當寧心順氣宜辰砂妙香散平補鎮心丹選用之腎虛者宜益精補腎肉蓯蓉丸

王綸明醫雜著

耳鳴

耳鳴證或鳴甚如蟬或左或右時時閉塞世人多作腎虛治不效殊不知此是痰火上升鬱於耳中而爲鳴鬱甚則壅閼矣若遇此證但審其平昔飲酒厚味上焦素有痰火只作清痰降火治之大抵此證多先有痰火在上又感惱怒而得怒則氣上少陽之火客於耳也若腎虛而鳴者其鳴不甚其人多慾當見勞怯等證

註 按前證若血虛有火用四物湯加山梔柴胡若中氣虛弱用補中益氣湯若血氣俱虛用八珍湯加柴胡若怒便聾而或鳴者屬肝膽經氣實用小柴胡湯加芎歸山梔虛用八珍湯加山梔若午前甚者陽氣實熱也小柴胡湯加黃連山梔陽氣虛用補中益氣湯加柴胡山梔午後甚者陰血虛也四物湯加白朮茯苓若腎虛火動或痰盛作渴者必用地黃丸經云頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也脾胃一虛耳目九竅皆爲之病

耳瘡

耳瘡屬手少陽三焦經或足厥陰肝經血虛風熱或

肝經燥火風熱或腎經虛火等因若發熱焮痛屬少陽厥陰風熱用柴胡梔子散若內熱癢痛屬肝經風熱用小柴胡湯加山梔川芎若內熱口乾屬腎經虛火用加味地黃丸如不應用加減八味丸餘當隨證治之

趙獻可醫貫

論耳諸病

耳者腎之竅足少陰之所主人身十二經絡中除足太陽手厥陰其餘十經絡皆入於耳惟腎開竅於耳故治耳者以腎爲主或曰心亦開竅於耳何也蓋心竅本在舌以舌無孔竅因寄於耳此腎爲耳竅之主心爲耳竅之客爾以五臟開於五部分陰陽言之在腎肝居陰故耳目二竅陰精主之在心脾肺居陽故口鼻舌三竅陽精主之靈樞曰腎氣通於耳腎和則能聞五音五臟不和則七竅不通故凡一經一絡有虛實之氣入於耳者皆足以亂其聰明而致於聾聵此言暴病者也若夫久聾者於腎亦有虛實之異左腎爲陰主精右腎爲陽主氣精不足氣有餘則聾爲虛若其人瘦而色黑筋骨健壯此精氣俱有餘固藏閉塞是聾爲實乃高壽之兆也二者皆稟賦所致不須治之又有乍聾者經曰不知調和七損八益之道早衰之節也其年未五十體重耳目不聰明矣是可畏也其證耳聾面頰黑者爲脫精腎憊用安腎丸八味丸蓯蓉丸薯蕷丸選而用之若腎經虛火面赤口乾痰盛內熱者六味丸主之此論陰虛者也至於陽虛者亦有耳聾經曰清陽出上竅胃氣者清氣元氣春升之氣也同出而異名也今人飲食勞倦脾胃之氣一虛不得上升而下流於腎肝故陽氣者閉塞地氣者冒明邪害空竅令人耳目不明此陽虛耳聾須用東垣補中益氣湯主之有能調養得所氣血和平則其耳聾漸輕若不知自節日就煩勞即爲久聾之證矣

又有因虛而外邪乘聾者如傷寒邪入少陽則耳聾脅痛之類當各經分治之

又有耳痛耳鳴耳痒耳膿耳瘡亦當從少陰正竅分寒熱虛實而治之者多不可專作火與外邪治耳鳴以手按之而不鳴或少減者虛也手按之而愈鳴者實也王節齋云耳鳴聲如蟬或左或右或時閉塞世人多作腎虛治不效殊不知此是痰火上升鬱於耳而爲鳴甚則閉塞矣若其人平昔飲酒厚味上焦素有痰火只作清痰降火治之大抵此證多先有痰火在上又感惱怒而得則氣上少陽之火客於耳也若腎虛而鳴者其鳴不甚其人必多慾當見勞怯等證惟薛立齋詳分縷悉云若血虛有火用四物湯加山梔柴胡若中氣虛弱用補中益氣湯若血氣俱虛用八珍湯加柴胡若怒便聾而或鳴者屬肝膽經氣實用小柴胡湯加川芎當歸山梔虛用八珍湯加山梔若午前甚者陽氣實熱也小柴胡加黃連山梔陽氣虛用補中益氣湯加柴胡山梔午後甚者陰血虛也四物加白朮茯苓若腎虛火動或痰盛作渴者必用地黃丸

耳中閧閧然是無陰也又液脫者腦髓消脛痠耳數鳴宜地黃丸

腎虛耳中潮聲蟬聲無休止時妨害聽聞者當墜氣補腎正元飲嚥黑錫丹間進安腎丸腎臟風耳鳴夜間睡著如打戰鼓更四肢抽掣痛耳內覺風吹奇痒宜黃芪丸腎者宗脈所聚耳爲之竅血氣不足宗脈乃虛風邪乘虛隨脈入耳氣與之搏故爲耳鳴先用生料五苓散加製枳殼橘紅紫蘇生薑同煎吞青木香丸散邪風下氣續以芎歸飲和養之耳中耵聹耳鳴耳聾內有汚血宜柴胡聰耳湯

其餘耳痛耳痒耳腫耳聤等證悉與薛氏論相參用之

耳瘡

羅謙甫曰耳內生瘡者爲足少陰是腎之經也其氣通於耳其經虛風熱乘之隨脈入於耳與氣相搏故令耳門生瘡也曾青散主之黃連散亦可內服鼠黏子湯

膿耳

耳膿即聤耳用紅綿散麝香散內服柴胡聰耳湯通氣散如壯盛之人積熱上攻膿水不瘥紅綿散麝香散不宜用收斂太過也宜三黃散效

王肯堂證治準繩

論耳

耳屬足少陰腎經

中藏經曰腎者精神之舍性命之根外通於耳素問曰腎在竅爲耳腎和則耳能聞五音矣又曰腎者主爲外使之遠聽視耳好惡以知其性故耳好前居牙車者腎端正註牙車即頰車穴也在耳下曲頷端陷中耳偏高者腎偏傾耳高者腎高耳後陷者腎下耳堅者腎堅耳薄不堅者腎脆元珠曰

耳薄而黑或白者腎敗也

又屬手少陰心經

素問曰南方赤色入通於心開竅於耳又曰手少陰之絡會於耳中

又屬手太陰肺經

李東垣曰耳本主腎而復能聽聲者聲爲金是耳中有肺水土生於申也王太僕曰手太陰肺之脈其絡會於耳中肺虛則少氣不能報息是以耳聾也

又屬足厥陰肝經

素問曰肝病氣逆則耳聾不聰朱丹溪曰耳聾屬熱少陽厥陰熱多

又屬手足少陽三焦膽手太陽小腸經之會

靈樞曰少陽根於竅陰結於窻籠窻籠者耳中也

素問曰一陽獨嘯少陽厥也其終者耳聾嘯耳中鳴如嘯聲也膽及三焦脈皆入於耳故氣逆上則耳中鳴又曰少陽主膽其脈循脅絡於耳故傷寒三日少陽受之則胷脅痛而耳聾九日少陽病衰耳聾微聞也又靈樞曰手太陽所生病者耳聾目黃

又屬手足陽明大腸胃經

素問曰頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也靈樞曰聾而痛者取手陽明聾而不痛者取足少陽又曰耳者宗脈之所聚也胃中空則宗脈虛虛則下溜脈有所竭者故耳鳴

又屬足太陽膀胱經

素問曰太陽所謂耳鳴者陽氣萬物盛上而躍故耳鳴也

又屬手足少陰心腎太陰肺脾足陽明胃經之絡

素問曰此五絡皆屬於耳中上絡左角邪客之則病

耳前屬手足少陽三焦膽足陽明胃經之會

素問曰上部人耳前之動脈在耳前陷者中動應於手手少陽脈氣之所行也

耳後屬手足少陽三焦膽經之會

李東垣曰少陽者斜出於耳前後也

耳下曲頰屬足少陽膽陽明大腸經之會又屬手太陽小腸經

靈樞曰手太陽當曲頰

曲頰前屬足少陽膽陽明大腸經之會

前寸許屬手陽明大腸經

曲頰後屬足少陽膽經

靈樞曰足少陽在耳下曲頰之後

趙以德曰耳者腎之竅足少陰經之所主然心亦寄竅於耳在人身十二經絡中除足太陽手厥陰外其餘十經脈絡皆入於耳中蓋腎治內之陰心治外之陽合天地之道精氣無處而不交通故清淨精明之氣上走空竅耳受之而聽斯聰矣因此耳屬二臟之竅也於是諸經稟其陰陽五行精明者皆上入之所以宮商角徵羽之五音從斯辨矣經曰積陽爲天積陰爲地清陽出上竅是也若二氣不調則交通不表故陽氣者閉塞地氣者冒明而陽氣之閉塞者或因煩勞陰虛氣浮或因衞氣不下循脈積聚於上或得於邪風與陽並盛或因熱淫之勝或因三焦之火獨光而耳中渾渾焞焞或因經臟積熱所致或因大怒氣上而不下夫如是者皆由心氣虛實不調虛則不能治其陽下與陰交實則恃陽強而與陰絕經曰至陰虛天氣絕是也而地氣之冒明者或憂愁不解陰氣閉塞不與陽通或內外濕飲痞隔其氣不得升降則耳中亦渾渾焞焞或腎精脫若熱病之精脫二者尺脈絕則死或耳中因二氣不和結乾耵聹塞之夫如是皆由腎氣不和虛則陰氣微不能上交於陽而陽是暴實則陰氣逆不納其陽也

暴聾之病與陰陽隔絕之未甚經脈欲行而未通衝擊其中鼓動聽戶隨其氣之微甚而作嘈嘈風雨諸聲者則可隨其邪以爲治補不足瀉有餘務使陰陽和平自然清淨之氣上走耳中而聽斯聰矣曰若子所表言水火同開此竅何原病式之非溫補耶曰心在竅爲舌以舌非孔竅因寄竅於耳則是腎爲耳竅之主心爲耳竅之客以五臟開竅於面部分陰精陽氣言之在腎肝居陰故耳目二竅陰精主之在心肺脾居陽故口舌鼻三竅陽氣主之所以陰精主者貴清涼而惡煩熱陽氣主者貴溫暖而惡寒涼潔古老人嘗有是論信耳目之不可以溫補也

風虛耳聾排風湯桂星散羊腎羹魚腦膏磁石丸薑蠍散

風熱耳聾犀角飲子芍藥散犀角散茯神散

耳因鬱聾輕者吞來復丹重者吞養正丹凡治耳聾皆當調氣

氣逆耳聾有三肝與手太陽少陽也經云肝氣逆則頭痛耳聾不聰頰腫又云太陽所謂浮爲聾者皆在

氣也羅謙甫云手太陽氣厥而耳聾者其候聾而耳內氣滿也手少陽氣厥而耳聾者其候耳內渾渾焞焞此皆氣逆而聾也治法宜四物湯吞龍荟丸降火及復元通氣散調氣是也

耳聾面頰黑者爲精脫腎虛羅謙甫云經曰精脫者則耳聾夫腎爲足少陰之經乃藏精而氣通於耳耳者宗脈之所聚也若精氣調和則腎臟强盛耳聞五音若勞傷氣血兼受風邪損於腎臟而精脫者則耳聾也然五臟六腑十二經脈有絡於耳者其陰陽經氣有相併時併則臟氣逆名之曰厥厥氣相搏入於耳之脈則令聾其腎病精脫耳聾者其候顏色黑手少陽之脈動則氣厥逆而耳聾者其候耳內渾渾焞焞也手太陽厥而耳聾者其候聾而耳內氣滿也宜以燒腎散主之

燒腎散益腎散補腎丸蓯蓉丸肉蓯蓉丸桑螵蛸湯

腎虛有寒者宜之

本事地黃湯腎虛有熱者宜之

耳聾少氣盜乾者爲肺虛東垣曰臟氣法時論云肺虛則少氣不能報息耳聾盜乾註云肺之絡會於耳中故聾此說非也蓋氣虛必寒盛則氣血俱滯而不行也耳者宗氣也肺氣不行故聾也宜生脈散瞬下蠟彈丸

勞聾宜益氣聰明湯

頭目不清清神散

氣閉不通通氣散祕傳降氣湯加葛蒲

耳發

或問耳輪生疽何如曰是名耳發疽屬手少陽三焦經風熱所致或赤或紫熱如火痛徹心是也十日刺出黃白膿者生刺之無膿時出鮮血飲食不下神昏狂躁者死小兒耳竅旁生者相傳指月而生恐未必然大抵風濕熱毒成瘡故名月蝕瘡瘡

耳內瘡

或問耳中生毒何如曰耳中所患不同皆由足少陰手少陽二經風熱上壅而然其證有五曰聤耳亦曰耳濕常出黃膿有耳風毒常出紅膿有纏耳常出白膿有耳疳生瘡臭穢有震耳耳內虛鳴常出清膿雖有五般其源一也皆不寒熱有耳草耳痔則不作膿亦不寒熱外無腫腫但耳塞不通已上纏綿不已令人耳聾活命飲黃連消毒飲治之若寒熱間作內外紅腫疼痛日增者爲耳癰用活命飲加升麻桔梗紫金丹烏金丹壯實者一粒金丹下之若寒熱大作痛楚難禁者疔也作疔治之

耳後疽

或問耳後一寸三分生疽古云不治之證今有一人年二十四歲耳後結塊如拳肉色不變亦不甚痛七日不食何如曰此名耳後毒非瘰也隔蒜灸之活命飲加柴胡桔梗升麻八陣散下之愈

耳根毒

或問耳根結核何如曰是名耳根毒狀如瘰核按之不動而微痛腫足少陽膽經兼三焦經風熱所致用活命飲加升麻柴胡水酒煎服或烏金散汗之壯實者一粒金丹汗之老弱者黃芪內托散汗宜散托之

吳崑醫方考

耳病方論

耳以司聽匪聽弗聰也君子有思聰之責者胡然而使衰如乎故考方論

腎熱耳中膿血不聞人聲者千金腎熱湯主之蓋耳者腎之竅故腎熱則令人病耳生膿出血不聞人聲也是方也磁石能引肺金之氣下降於腎腎得母氣自然清肅而熱日愈生地汁麥門冬白芍藥所以滋腎陰而瀉腎熱乃葱白者所以引腎氣上通於耳也牡蠣鹹寒能軟堅而破結氣得葱白引之入耳則能開聽戶而消膿血乃白朱甘草大棗者健脾之品也所以培萬物之母益土氣而制腎邪爾

勞聾氣聾風聾虛聾毒聾久聾耳鳴者千金補腎丸主之蓋勞聾者勞火鼓其聽戶也氣聾者經氣滯塞於聽戶也風聾者風熱閉其聽戶也虛聾者氣血虛耗而神不用也毒聾者膿血障礙妨於聽戶也久聾者病非一日邪氣痹聚也凡是聾者勢必耳鳴故總繫其耳鳴也味之甘者可以補虛亦可即勞人參黃芪羊腎山萸乾地黃菟絲巴戟薤蓉澤瀉芎藭當歸茯苓甘草芍之味甘之品也能療虛聾勞聾味之辛者可以驅風亦可以順氣防風細辛菖蒲遠志丹皮石斛芍之味辛之品也能療氣聾風聾性之毒者可以開結毒亦可以療久痹蛇牀桂心附子乾薑芍之辛溫微毒之品也能療毒聾久聾

三十年久聾用故鐵三十斤以水七斗浸三日取汁入物釀米七斗如常造酒法俟熟取磁石一斤研末浸酒中三日乃以飲取醉以綿裹磁石內耳中覆頭一臥酒醒去磁石即蓬崑謂磁石引鐵物類之相感

也金石之性寒可使主內熱金石之性重可使鎮祛氣其釀於酒欲其無所不之既飲其酒復以磁石內耳欲其內外交感而聽戶隨開爾

耳聾用人髮燒灰存性每用分許吹入耳中卽癒此濕者燥之之意而必以人髮者近取諸身而自足也他如白礬赤石脂鴿糞皆可枯夾用之

陳實功外科正宗

耳病

耳病乃三焦肝風妄動而成大人由虛火實火之分小兒有胎熱胎風之別虛火者耳內蟬鳴或兼重聽出水作痒外無膿腫此屬虛火妄動之證也四物湯加牡丹皮石菖蒲及腎氣丸主之實火者耳根耳竅俱腫甚則寒熱交作疼痛無時宜柴胡清肝湯治之又有耳挺結於竅內氣脈不通疼痛不止以梔子清肝湯爲治外用黃綠藥插入挺肉縫旁化盡乃愈小兒胎熱或浴洗水灌竅中亦致耳竅作痛生膿初起月間不必擦藥治早項內生腫候毒盡自愈如月外不瘥以紅綿散治之則安矣

百蟲入耳

百蟲入耳乃偶然候入之如蠅蚊細蟲入耳以麻油數點滴入竅中蟲亦自死取出如螻蛄等大蟲入者以肉炙香安耳邊其蟲聞香自出有蟲夜間暗入者切勿驚慌喊叫逼蟲內攻宜正坐點燈光向耳竅其蟲見光自出對面有人見其蟲不出

黑疔

黑疔生於耳竅之內黑硬腐爛破流血水疼及腮頰宜先鍼刺次行發汗仍照疔類調治

醫門法律 臣喻昌著

耳鳴

人身有九竅陽竅七眼耳鼻口是也陰竅二前後二陰是也陽氣走上竅而下入於陰位則有溺泄腹鳴之候陰氣走下竅而上入於陽位則有窒塞耳鳴之候故人當五十以外腎氣漸衰於下每每從陽上逆而腎之竅開於耳耳之聰司於腎腎主閉藏不欲外泄因肝木爲子疏泄母氣而散於外是以謀慮鬱怒之火一動陰氣從之上逆耳竅窒塞不清故能聽之用不凝而聽遠不無少礙高年之體大率類然較之聾病一天一淵聾病者其竅中另有一膜遮蔽外氣不得內入故以開竅爲主而方書所用石菖蒲麝香等藥及外填內攻等法者皆爲此而設至於年高陰氣不自收攝越出上竅之理從無一人言及反以治少壯耳聾藥及發表散氣藥兼帶陰虛爲治是以百無一效不知陰氣至上竅亦隔一膜不能越出竅外止於竅中汩汩有聲如蛙鼓蚊鑼鼓吹不已以故外入之聲爲其內聲所混聽之不清若氣稍不逆上則聽稍清氣全不逆上則聽全清矣昌悟明此理凡治高年逆上之氣屢有奇效方中大意全以磁石爲主以其重能達下性主下吸又能制肝木之上吸故也而用地黃龜膠羣陰之藥輔之更用五味子山茱萸之酸以收之令陰氣自旺於本宮不上觸於陽竅繇是空曠無礙耳之於聲似谷之受響萬籟之音尚可細聆豈更與人聲相拒艱於遠聽耶此實至理所在但醫術淺薄之輩不能知之試觀人之收視而視愈明返聽而聽愈聰者然後知斯言非臆說也

人兩腎之竅雖開於耳而腎氣上入耳際亦爲隔膜所礙不能越於耳外止於耳根下少則微鳴多則大鳴甚且將聚耳之筋觸之跳動直似撞穿耳輪之象者然實必不可出也設陰氣能出耳外而走陽竅則陰陽相混非三才之理矣故耳之用妙在虛而能受也外入之氣隨大隨小至耳無礙惟內觸之氣咕咕有聲所以外人之氣僅通其半若鬱怒之火動內氣轉增則外入之氣轉混必內氣漸走下竅上竅復其虛而能受之體然後清清朗朗聲入卽通無壅礙也方書指爲少陽膽厥陰肝二經熱多所致是說左耳分部然少陽之氣能走上竅其穴皆絡於腦巔無觸筋沖耳之理不當與厥陰混同立說其通聖散一方汗下兼用乃治壯火之法丹溪所取亦無確見惟滾痰丸一方少壯用之多效者則以大黃黃芩沉香之苦最能下氣而蒙石之重墜大約與磁石之用相倣也昌所以不用此方者以其大損脾胃且耗胃中氤氳之氣也至於腎虛耳鳴指作勝胱相火上升則陽火必能透出上竅而爲鳴也尤見丹溪無據之談易言水中有火原說眞火坎中一點眞陽卽眞火也高年之人腎水易竭眞火易露故腎中之氣易出難收況有厥陰之子爲之挹取乎則壯水之主以制陽光如盞中加油而燈燄自小誠爲良法乃云作腎虛治不效者知其泛論世人不爲老人立法也夫收攝腎氣原爲老人之先務豈丹溪明哲而爲此等議論乎

景岳全書 臣張介賓著

論證

耳聾證諸家所論雖悉然以余之見大都其證有五

曰火閉曰氣閉曰邪閉曰竅閉曰虛閉

凡火閉者因諸經之火壅塞清道其證必閧閧熇熇或脹或悶或煩或熱或兼頭面紅赤者是也此證治宜清火火清而閉自開也

氣閉者多因肝膽氣逆其證非虛非火或因恚怒憂鬱氣結而然治宜順氣氣順心舒而閉自開也

邪閉者因風寒外感亂其營衛也解其邪而閉自開

竅閉者必因損傷或挖傷或雷炮震傷者或患脖耳潰膿不止而壞其竅者宜用開通之法以治之也

虛閉者或以年衰或以病後或以勞倦過度因致精脫腎虧漸至聾閉是非大培根本必不可也

凡此數者有從外不能達者其病在經有從內不能通者其病在臟當各隨其宜而治之自無不愈者然暴聾者多易治久聾者最難爲力也

耳聾證總因氣閉不通耳蓋凡火邪風邪皆令氣壅壅則閉也怒則氣逆逆則閉也竅傷則氣窒窒則閉也虛則氣不充不充則閉也凡邪盛氣逆而閉者實閉也氣有不及而閉者虛閉也然實閉者少而虛閉者多且凡屬實邪固令耳竅不通使果正氣强盛斷不至此惟經氣不足然後邪氣得以奪之此正邪之所湊其氣必虛之謂也故卽係實邪而病至聾閉者亦無不有挾虛之象所以凡治此證不宜峻攻如古法之用通聖散神芎丸凉膈散木香檳榔丸之屬皆不可輕用蓋恐攻之未必能愈反傷脾胃則他變踵至矣治此之法凡火壅於上者自宜清降兼陰虛者亦宜補陰此陽證之治也若無火邪止由氣閉則或補或開必兼辛溫之劑方可通行此陰證之治也然此二者皆當以漸調理但無欲速庶乎盡善

耳鳴當辨虛實凡暴鳴而聲大者多實漸鳴而聲細者多虛少壯熱盛者多實中衰無火者多虛飲酒味厚素多痰火者多實質清脈細素多勞倦者多虛且耳爲腎竅乃宗脈之所聚若精氣調和腎氣充足則耳目聰明若勞傷血氣精脫腎憊必至聾聵故人於中年之後每多耳鳴如風雨如蟬鳴如潮聲者是皆陰衰腎虧而然經曰人年四十而陰氣自半半卽衰之謂也又以易義參之其象尤切易曰坎爲耳蓋坎之陽居中耳之聰在內此其所以相應也今老人之耳多見聰不內居而聲聞於外此正腎元不固陽氣漸渙之徵耳欲求來復其勢誠難但得稍緩卽已幸矣其惟調養得宜而日培根本乎

論治

火盛而耳鳴耳閉者當察火之微甚及體質之强弱而清之降之火之甚者宜抽薪飲大分清飲當歸龍荷丸之類主之火之微者宜徙薪飲兼陰虛者宜加減一陰煎清化飲之類兼痰者宜清膈飲主之

氣逆而閉者宜六安煎加香附丹皮厚朴枳殼之類主之

氣逆兼火者宜加山梔龍膽草天花粉之類主之

氣逆兼風寒者加川芎細莘蘇葉菖蒲蔓荊子柴胡之類主之

傷寒外感發熱頭痛不解而聾者當於傷寒門察證治之邪解而耳自愈也但傷寒耳聾雖屬少陽之證然必因虛所以有之故仲景亦以爲陽氣虛也是以凡遇此證必當專顧元氣有邪者兼以散邪且可因耳之輕重以察病之進退若因治而聾漸輕者其病將愈聾漸甚者病必日甚也其有聾閉至極而絲毫無聞者此其腎氣已絕最是大凶之兆

虛閉證凡十二經脈皆有所主而又惟肝腎爲最若老年衰弱及素稟陰虛之人皆宜以大補元煎或左歸右歸丸肉蓯蓉丸或十全大補湯之類主之

若憂愁思慮太過而聾者宜平補鎮心丹辰砂妙香散之類主之

若陽虛於上者宜補中益氣湯歸脾湯之類凡諸補劑中或以川芎石菖蒲遠志細莘升麻柴胡之類皆可隨宜加用但因虛而閉或已久者終不易愈

竅閉證非因氣血之咎而病在竅也當用法以通之

石室祕錄 臣陳士鐸著

耳聾

耳聾者腎經病也論理該用六味地黃丸內加柴胡五錢甘菊白芍各二兩當歸枸杞麥冬各三兩北五味三錢今不用此而用鼠膽一枚龍齒冰片麝香硃砂各一分乳香朝腦各半分各研爲絕細末以人乳爲丸如梧子大外用絲綿裹之不可太大塞入耳之深處至不可受而止塞三日取出卽耳聰未不再聾不必三丸但鼠膽最難得覓一大鼠先以竹籠養之後以紙爲匣子引其藏身內用果品令其自食久之忽然用棒椎擊死立時取膽則膽在肝中也否則再不可得也乾者可用只消用水調化俱入藥末中則一樣也實耳聾者亦用此方神效又方用珍珠一粒外用龍骨末一分以蜜調之丸在珠上外用丹砂爲衣綿裹塞耳中卽愈神方也一月後取出再用六味

地黃丸一料末不再聾

耳癢

耳中作癢以木刺之尚不足以安其癢必以鐵刀刺其底錚錚有聲始覺快然否則癢極欲死此腎肝之火結成鐵底於耳中非湯藥可救予立一方用龍骨一錢皂角刺一條燒灰存性冰片三分雄鼠膵一枚先將前藥爲末後以鼠膵水調勻而後以人乳再調如厚糊一般將此藥盡抹入耳孔內必然癢不可當必須人執其兩手癢定而自愈矣愈後服六味丸三十斤可也

耳鳴

耳中聞螞蟻鼓鬬之聲者此則非祟乃腎水耗盡又加怒氣傷肝所致方用柴胡白芍于梔子各三錢熟地山茱萸白芍各二兩麥冬一兩水煎服方中純是補腎平肝之聖藥飲之數日其戰鬬之聲漸遠服一月即愈

方一

補中益氣湯東垣

治氣虛清氣下陷濁氣上升耳聾不聞聲

黃芪一錢　白朮　人參各三分　炙甘草五分　當歸身酒製　橘皮　升麻　柴胡各二分　水二盞煎至一盞溫服欬嗽去人參

四物湯

治血虛耳聾

熟地二錢　川芎八分　當歸身　白芍各一錢　右爲粗末水煎

四君子湯

治氣虛耳聾

白朮二錢　人參　茯苓各一錢　炙甘草五分　薑棗水煎

八珍湯

治氣血兩虛而聾者

人參　白朮　茯苓　炙甘草　熟地黃　當歸　白芍　川芎　水煎服

六味丸

治腎經不足頭運耳聾等證

熟地黃八兩　山茱萸肉　乾山藥　牡丹皮　白茯苓　澤瀉各三兩　右各另爲末和地黃膏加煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心食前滾湯下

大安腎丸

治腎經久積陰寒膀胱虛冷下元衰憊耳重常服補元陽益腎氣

肉桂去粗皮不見火　川烏頭炮去皮臍各一斤　桃仁麩炒　白蒺藜炒去刺　巴戟去心　山藥　茯苓　肉蓯蓉酒浸炙　石斛去根炙　萆薢　白朮　破故紙各四十八兩　右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十丸溫酒或鹽湯下空心食前

小安腎丸

治腎氣虛乏下元冷憊精神昏憒耳作蟬鳴等證　川練子鹽四兩水四升同煮候乾切焙　香附子　川烏頭各一斤　縮砂十二兩　熟地黃八兩　川椒去目及閉口者微炒出汗四兩　右六味爲細末酒糊爲丸如桐子大每服二十丸空心臨臥鹽湯酒任下

滾痰丸

治耳聾耳鳴耳痒等證之由於痰火實盛者

大黃蒸少頃翻過再蒸少頃取出不可過　黃芩各八兩　沉香　青蒙石煅如金色　百藥煎各五錢　右爲末水丸如梧桐子大白湯食後空心服此方用百藥煎乃得之方外祕傳蓋此丸得此藥乃能收攝周身頑涎聚於一處然後利下甚有奇功

沉香降氣散

治陰陽壅滯氣不升降耳竅閉塞

沉香二錢八分　砂仁七錢五分　香附子鹽水炒去毛六兩二錢五分　甘草炙五錢五分　右爲極細末每服二錢入鹽少許沸湯調服不拘時

指迷七氣湯

治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯耳竅閉塞

香附子二錢　青皮去瓤　陳皮去白　桔梗　蓬朮　官桂　藿香　益智仁　半夏湯洗七次　甘草炙各一錢　水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾食遠服

流氣飲子

治五臟不和三焦氣壅耳閉無聞

紫蘇葉　青皮去白　當歸　芍藥　半夏湯洗

烏藥　茯苓　桔梗　川芎　黃芪　枳實麩炒各一錢　木香　防風去蘆　檳榔　陳皮去白炙甘草　大腹子連皮　枳殼麩炒各五分　生薑三片紅棗一枚水煎不拘時服

蘇子降氣湯

治虛陽上攻氣不升降上盛下虛耳聾等證

紫蘇子炒　半夏湯泡各二錢五分　前胡去蘆炙甘草　厚朴去皮薑炙炒　陳皮去白各一錢當歸去蘆一錢五分　沉香七分

水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

養正丹

治上盛下虛氣不升降元陽虧損

水銀　黑錫去滓淨秤與水銀結砂子　硫黃研硃砂研細各一兩

右用黑盞一隻火上鎔黑鉛成汁次下水銀以柳條攪次下硃砂攪令不見星子放下少時方入硫黃急攪成汁和勻如有燄以醋灑之候冷取出研極細末煮糯米糊丸菜豆大每三十丸鹽湯漱湯任下

復原通氣散

治氣不宣流或成瘡癤耳聾耳痒

舶上茴香炒　穿山甲蛤粉炒　延胡索　陳皮白　牽牛炒　甘草炙各一兩　木香不見火兩半

右爲細末每服二錢用熱酒調食後服不用酒者煎南木香湯調下

防風通聖散

治證同上

防風　川芎　當歸　白芍藥　大黃　薄荷葉　麻黃去節　連翹　芒硝各五錢　石膏　黃芩桔梗各一兩　滑石三兩　甘草二兩　荊芥穗　白朮　梔子各二錢半

右爲末每服一錢水一大盞生薑三片煎六分溫服

排風湯

治風虛冷溫邪氣入臟重耳不聞人聲此湯聰耳明目通臟腑

白鮮皮　當歸酒浸一宿　肉桂去粗皮　防風　白芍藥　杏仁去皮尖麩炒　炙甘草　芎藭白朮各二兩　獨活　麻黃去節　茯苓各三兩

右爲粗末每服三錢水一盞半薑四片煎八分去滓溫服不拘時

不換金正氣散

治耳瘡出膿水

蒼朮炙　橘皮去白　半夏麴　厚朴薑炙　藿香各二錢　甘草炙一錢

生薑五片紅棗二枚煎服

正元散

治證同上

紅豆炒　乾薑炮　陳皮去白各三錢　人參　白朮　炙甘草　茯苓去皮各二兩　烏藥去木附子炮去皮尖　山藥薑汁浸炒　川芎　乾葛各一兩　黃芪炙一兩五錢　肉桂去麤皮　川烏炮去皮各五錢

右爲細末每服三錢薑三片棗一枚鹽少許煎七分食前溫服

木香檳榔丸（御藥）

治證同上

木香　檳榔　枳殼麩炒　杏仁去皮尖炒研青皮去瓤各一兩　半夏麴　皂角去白酥炙椰李仁去皮各二兩

右爲細末別以皂角四兩用漿水一椀搓採熬膏更入熟蜜少許和丸梧子大每服五十丸食後薑湯下

越鞠丸

治證同上

香附炒　蒼朮米泔水浸一宿炒　川芎各二兩山梔炒　神麴各一兩五錢

右爲末滴水丸梧子大每服一百丸白湯下

平補鎮心丹（和劑）

治虛人耳聾

酸棗仁去皮炒二錢半　車前子　白茯苓去皮麥門冬去心　肉桂去粗皮不見火　五味子茯神去木各一兩二錢半　龍齒　熟地黃酒蒸天門冬去心　山藥薑汁炒　遠志去心甘草水煮各一兩半　人參　硃砂細研爲衣各五錢

右爲末煉蜜丸如桐子大每服三十丸空心米湯溫酒任下

五苓散（傷寒）

治痰水上逆耳聾耳聵

豬苓　茯苓　白朮炒各十八銖　肉桂半兩　澤瀉一兩六銖半

右爲末每服三錢服後多飲熱水汗出而愈

二陳湯

治痰火耳聾

茯苓　陳皮　半夏各一錢　甘草五分

生薑二片水煎服

青木香丸

治痰水耳聾

黑牽牛二百四十兩炒令香取頭末一百二十兩　檳榔用酸粟米飯裹濕紙包火中煨令紙焦去飯　補骨脂炒香　葶藶茄各四十兩　木香二十兩

右爲細末清水滴爲丸如菉豆大每服三十丸茶湯熱湯任下

小柴胡湯仲景

治虛人肝火耳聾

柴胡八兩　半夏八兩　人參　黃芩　生薑　甘草各三兩　大棗十二枚劈

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

一粒金丹東垣

治耳鳴耳聾或耳中生瘡

草茇以猪膽汁拌勻入膽內懸待陰乾　青黛　延胡索　白芷　川芎各一兩

右爲細末用無根水爲丸每用一丸以無根水化開隔鼻內更以銅錢咬口內出涎

人參散

人參　炙甘草　龍齒各二兩　犀角屑　生地　白茯苓去皮各一兩　麥門冬去心一兩五錢

右咬咀每服五錢水一中盞煎至七分去滓溫服不拘時

妙香散良方

山藥薑汁炒　茯苓　茯神　黃芪炙　遠志炒各一兩　人參　桔梗　炙甘草各五錢　木香煨二錢五分　辰砂三錢另研　麝香一錢另研

右爲細末每服一錢不拘時溫酒調下

烏金散三因

黃丹炒　細墨燒各一兩

右爲細末研勻每服三錢食後先用水漱口待心中熱渴欲水便以冷水調下

歸脾湯濟生

人參　茯神　黃芪炙　酸棗仁炒研　龍眼肉　白朮各二錢五分　木香　炙甘草各五分

水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾服薛新甫加遠志當歸各一錢

四生散和劑

黃芪　川羌活　蒺藜　白附子各等分生用

右爲末每服二錢薄荷酒調下

涼膈散

梔子　連翹　薄荷　黃芩　甘草各一兩五錢　大黃　芒硝各五錢

右爲麤末每一兩水二盞竹葉七片煎至一盞去滓入蜜少許食後服

逍遙散元戎

當歸　白芍　白朮　柴胡　甘草　茯神各等分

右薑水煎服

紫金丹本事

淡豆豉好者二錢用水略潤少時以紙挹乾研膏　白礬水飛半錢

右用豉膏于和礬同杵極勻如麻子大每服五九至十九量大小與之並用臘茶清極冷吞下臨臥以知爲度

調中益氣湯東垣

黃芪一錢　人參　甘草　當歸　白朮各五分　五味子十五粒　白芍　柴胡　升麻各三分　橘皮二分

右水二盞煎一盞去滓服食前

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百五十六卷目錄

醫部彙考一百三十六

耳門三

方二桂星散　磁石羊腎丸　諸神散　磁石
蔥豉湯方　魚腦骨　羊腎羹　磁石丸
蟲螺散　犀角飲子　芍藥散　茯苓
解倉飲子　補腎丸　犀角散　牛蒡
搜絲丸　肉蓯蓉丸　桑螵蛸湯　益腎散　羊腎丸　安腎丸　地黃丸　蠟彈丸
九通氣散　菟絲丸　菖蒲散　通神散
散通耳出　追風散　蓖麻丸　透耳筒
雄黃散　耳聾方　蝦蟆骨　鼠
膿丸　蔥麻子丸　久聾方　耳聾雞卵方
通耳丹　通氣散　耳聾方　勝金透關散
通黃膏　龍膽膏　蘆薈丸　龍齒散　黃芪
丸　芎蠍飲　柴胡湯　芎芷散　麝香
散　耳鳴湯　開方　生犀丸　解熱飲子　鼠
鉛子　湯　白薇飲子　菖蒲煎子　麝香
氣散　蔓荊子散　松花散　白蓮散
散　禹餘糧丸　蟾酥丸　菖蒲散
子　耳聾方　香附散
丸　耳應方　三黃散　悶痘散
甘青散　黃連散　柴胡湿子　當歸川
穹散　加味　地黃丸　大補丸
鉞砂酒　通明利氣湯　加減龍膏丸
聰化痰丸　滋腎通氣湯　黃連湯　滋陰地黃湯　黃芪湯　清
明耳散　補骨脂丸　聰耳湯
地黃湯　吹耳散　遠志湯　紅棉散　抵聖散
柴胡清肝散　寒耳丹
散　牽牛內托散　麝香佛手散　木銀　胡粉
散　牽牛內托散　仙方活命飲　膏　消毒
遠志酒　清肝瀉氣飲　黃連消毒散
散　定痛降氣湯　燒石

藝術典第一百五十六卷

醫部彙考一百三十六

耳門三

方二

桂星散　準繩

治風火閉塞耳竅不聞

辛桂　川芎　當歸　石菖蒲　細辛　木通　木香　白蒺藜炒去刺　麻黃　甘草炙各一錢　白芷稍　天南星煨製各一錢五分

右水二鍾葱白二根紫蘇五葉薑五片煎至一鍾食後服一方加全蠍去毒一錢

磁石羊腎丸

治風虛不爽時有重聽或有風痹之狀

磁石二兩火煅醋淬七次用葱子一合木通三兩入水同煎一晝夜去葱并木通　川椒去目　防風　石菖蒲去枝　遠志肉　白朮炒　白茯苓　細辛　菟絲子酒浸　川芎　山藥炒　木香　當歸身　鹿茸酒浸一宿炙　黃芪製　川烏炮各一兩　石菖蒲一兩五錢　肉桂六錢五分　熟地黃九蒸二兩

右爲細末用羊腎兩對去膜以酒煮爛和諸藥末搗以煮腎酒打糊和丸如梧子大每服百十丸空心溫酒鹽湯任下仍服清神散二藥相間服忌牛肉雞鴨子

清神散

治氣壅頭目不清耳常重聽

甘菊花　白殭蠶炒各半兩　羌活　荆芥穗　木通　川芎　防風各四錢　木香一錢　甘草石菖蒲各一錢五分

右爲細末每服二錢食後茶清調服

磁石浸酒方

治風邪之氣干於腦或入於耳久而不散經絡壅塞不能宣利使人耳中悶悶然或作旋運

磁石五兩搗碎水淘去赤汁　山茱萸　天雄炮去皮臍各二兩　木通　防風　薯蕷　遠志去心　菖蒲　芎藭　細辛　蔓荊子　白茯苓　肉桂　乾薑炮　甘菊花各一兩　熟地黃三兩

右剉細和勻以生絹袋盛用酒二斗浸七日每日任性飲之以瘥爲度

魚腦骨

治風著年久及耳鳴

鯉魚腦二兩　當歸焙　白芷　菖蒲　細辛　附子炮去皮臍各半兩

右除魚腦外爲細末以魚腦置銀器中入藥在內微火煎候香遽去滓傾入磁器中候凝丸如梧桐大綿裹塞耳中一方無菖蒲石羊腎脂同魚腦先蒸次下諸藥

羊腎羹

治證同上

杜仲去麁皮炙黃　黃芪各半兩　磁石五兩搗碎水淘去赤汁綿裹煎不得到鍋底　羊腎一隻去脂膜切　肉蓯蓉一兩酒浸一宿去皮炙乾

右以水三大椀先煮磁石取汁二大椀下杜仲等又煎取一盞半去滓入羊腎粳米一合葱白薑椒

鹽酢一如作羹法空心服

磁石丸

磁石煅酢淬七次　防風　羌活　木通　白芍　黃芪鹽水浸焙　桂心各一兩　人參半兩

右爲末用羊腎一對去脂膜搗爛打酒糊爲丸如桐子大每服五十丸空心溫酒鹽湯下

薑蠍散

治耳聾氣塞腎虛等證

全蠍四十九個去毒泡濕

右以糯米半升於大瓦鋪平將蠍鋪米上焙令米黃爲度去米不用又切生薑四十九片每片置蠍再焙薑焦爲度去薑不用將蠍研爲細末三五日前每日先服黑錫丹二五服臨服藥時令夜飯半飽服時看其人酒量勿令大醉服已令熟睡勿得叫醒却令人輕喚如不聽得濃煎葱白湯一椀令飲五更耳中聞百十攢笙響便自此聞聲一方無糯米製銀石器中炒

犀角飲子

治風熱上壅耳內聾閉畏聽掣痛膿血流出

犀角鎊　木通　石菖蒲　甘菊花　赤芍藥　元參　赤小豆炒各二錢　甘草炙一錢

右水二鍾薑五片煎至一鍾不拘時服

芍藥散

治熱壅生風耳內痛與頭相連膿血流出

赤芍　白芍　川芎　木鼈子　當歸　大黃　甘草各一錢五分

右水二鍾煎至一鍾食後服

犀角散

治風毒壅熱心胃痰滯兩耳虛聾頭重目眩

犀角屑　甘菊花　前胡　枳殼麩炒黃　羌活　石菖蒲　澤瀉　木通　生地黃各五錢　麥門冬去心二兩　甘草炙二錢五分

右爲末每服二錢水煎去滓食後溫服

茯神散

治上焦風熱耳忽聾鳴四肢滿急胃膈痞悶不利

茯神　麥門冬各一兩　羌活　防風　蔓荊子　苡仁　石菖蒲　五味子　黃芪各五錢　薄荷　甘草各二錢五分

右爲末每服三錢生薑三片水煎去滓食後溫服

解倉飲子

治氣虛熱壅或失饑冒暑風熱上壅耳內聾閉徹痛膿血流出

赤芍　白芍各五錢　當歸　炙甘草　大黃蒸　木鼈子去殼各一兩

右剉末每服四錢水煎食後臨臥服

檳榔神芎丸

治濕痰耳聾

大黃生　黃芩各二兩　牽牛　滑石各四兩　檳榔二兩

右爲末滴水丸桐子大每服十丸次加十丸白湯下

蕤腎散

治腎虛耳聾

磁石一兩煅酢淬七次研飛　附子一兩炮去皮　巴戟一兩　川椒一兩去目及閉口者微炒出汗

右爲末每服用猪腎一枚去筋膜細切葱白韭白各一分入散藥一錢鹽花一字和勻用十重濕紙裹於塘灰火內煨熟空心細嚼酒解薄粥下之十日效寶鑑方無巴戟

蓯蓉丸 濟生 下同

治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴

肉蓯蓉酒浸焙　山茱萸肉　石龍芮　石菖蒲　菟絲子酒浸蒸焙　羌活　鹿茸去毛酒蒸焙　石斛　磁石火煅酢淬水飛　附子炮各一兩　全蠍去毒七個　麝香半字

右爲末蜜丸桐子大每服百丸空心鹽酒鹽湯任下

益腎散

治腎虛耳聾

磁石製　巴戟　川椒開口者各一兩　石菖蒲　沉香各五錢

右爲細末每服二錢用猪腎一隻細切和以葱白少鹽井藥溫紙十重裹煨令香熟空心細嚼溫酒送下

補腎丸

治腎虛耳聾

巴戟去心　乾薑炮　白芍藥　山茱萸　桂心　遠志去心　細辛　菟絲子酒製　澤瀉　石斛　黃芪　乾地黃　當歸　蛇牀子　人參　甘草　牡丹皮　肉蓯蓉酒浸　附子炮各二兩　防風一兩五錢　石菖蒲一兩　茯苓五錢　羊腎二枚

右爲細末以羊腎研爛細酒煮麪糊丸如桐子大每服五十丸空心鹽酒送下

肉蓯蓉丸

治腎虛耳聾

肉蓯蓉酒浸焙　菟絲子酒浸　山芋　白茯苓　人參　官桂　防風　熟地黃　白芍藥　黃芪各五錢　附子炮去皮臍　羌活　澤瀉各二錢半

羊腎一對薄切去筋膜炙乾

右爲細末煉蜜和丸如桐子大每服三十丸空心用溫酒送下

桑螵蛸湯

治虛損耳聾

桑螵蛸炙十枚　當歸　白朮米泔浸炒　官桂　白茯苓去皮　附子炮　荊子　磁石火煅酢淬　菖蒲　乾地黃焙各一兩　大黃剉炒　細辛　川芎　牡丹皮各五錢

右㕮咀每服三錢七先以水三盞煮豬腎一隻取汁一盞去腎入藥煎至七分去滓食前溫服

羊腎丸

治腎虛耳聾或勞頓傷氣中風虛損腎氣升而不降或耳鳴

山茱萸　乾薑　巴戟　白芍藥　澤瀉　桂心　北細辛　菟絲子酒浸　遠志　乾地黃　黃芪　石斛　附子　當歸　牡丹皮　蛇牀子　甘草　蓯蓉酒浸　人參各二兩　菖蒲一兩　防風一兩　五錢　茯苓五錢

右爲末以羊腎一對研細以酒煮麪糊丸梧子大食前鹽酒下三十丸至五十丸立效

安腎丸

治虛弱耳聾

大安腎丸四兩　眞磁石五錢酢煅　石菖蒲　羌活各五錢

右三件爲末爲丸梧子大每服四五十丸鹽湯溫酒任下

地黃丸

治勞損耳聾

大熟地黃洗焙　當歸　川芎　辛桂　菟絲子酒浸三日蒸乾搗末　川椒出汗　故紙炒　白芷　白蒺藜炒杵去刺　胡盧巴炒　石菖蒲　杜仲薑製炒去絲各二錢五分　磁石火煅酢淬七次研細

水飛三錢七分五釐

右件藥爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十丸以葱白溫酒空心吞下晚飯前再服一服

蠟彈丸三四

治肺虛耳聾

白茯苓二兩　山藥炒三兩　杏仁炒一兩五錢去皮尖

右三味研爲末和勻用黃蠟一兩鎔和爲丸如彈子大鹽湯嚼下有人止以黃蠟細嚼點好建茶送下亦效山藥茯苓杏仁皆入於太陽山藥大補陰氣惟杏仁利氣乃補中有通也少氣咳乾者門冬人參五味湯嚼下

通氣散

治氣閉耳聾

穿山甲二錢　茴香　木香　全蠍　元胡索　陳皮　菖蒲各一錢　羌活　白殭蠶　川芎　蟬蛻各一錢　甘草一錢五分

右件藥爲細末每服三錢不拘時候溫酒調下

復元通氣散

治諸氣溫耳聾腹癰便癰瘡疽無頭止痛消腫

青皮　陳皮各四兩　甘草炙三寸半　連翹一兩

右爲末熱酒調服

菖蒲散

石菖蒲一兩一寸九節者　蒼朮五兩生用

右剉成塊子置瓶內以米泔浸七日取出蒼朮只將菖蒲於甑上蒸三兩時取出焙乾搗爲細末每服二錢糯米飲調服日三次或將蒸熟者作指頭大塊子食後置口中時時嚼動嚥津亦可

通神散

治耳聾

全蠍一枚　地龍　土狗各二個　麝香一字

明礬半生半煅　雄黃各五錢

右爲細末每用少許葱白蘸藥引入耳中閉氣面壁坐一時三日一次

通耳法

磁石緊者豆大一塊　穿山甲燒存性爲末一字

右二味用新綿裹了塞所患耳內口中銜少生鐵覺耳內如風雨聲即愈

追風散

治耳聾

蓼蘆　雄黃　川芎　石菖蒲　全蠍　白芷

藿香葉　鵝不食草　薄荷　苦丁香各等分
麝香少許
右爲細末每用些少吹鼻中如無鵝不食草加片腦少許

蓖麻丸
治耳聾
蓖麻子去殼　松脂　黃蠟　杏仁去皮雙仁炒各五錢　乳香　食鹽　巴豆炒各二錢五分
右件藥搗如膏捻如棗核樣以黃蠟薄捲之大針劃兩三眼子兩頭透用塞耳經宿黃水出愈
透耳筒
治證同上
椒目　巴豆　菖蒲　松脂各一錢
右件藥爲末擬令薄捲作筒塞耳內一日一易

雄黃散
治證同上
雄黃　防風　礬石　石菖蒲　烏頭　川椒開口者炒出汗各二錢五分　大棗核十枚
右爲末以香爐中安艾一彈子大次著黃蠟末半錢於艾上復以藥二錢匕著艾上火燃之以筒引耳熏之

耳聾方
一豆三猫不出油麝香少許用眞修煉蜜爲丸麥粒大綿裹綻子耳中投

鯽魚膽膏
治證同上
鯽魚膽一箇　烏鹽脂少許　生油半兩
右和勻內樓葱管中七日滴入耳內

蠐螬膏
治證同上
蠐螬七枚焙　淡豆豉二十一粒揀大者焙乾
巴豆七粒去心膜不去油
右先研蠐螬淡豉令細別研巴豆成膏同研勻捏如小棗核狀用葱白小頭取孔以藥一粒在內用薄綿裹定臨臥時置耳中一宿取出未通再用以通爲度

鼠膽丸
治證同上
皂角一挺　生地龍中者一條　全蠍三箇焙　遠志去心
磁石火煅醋淬七次研細水飛　乳香各二錢
右爲細末以黃蠟溶和爲丸塞耳中

久聾方
天雄二錢五分　附子一枚
右爲細末將雞子開一孔取出黃用清和藥仍入殼中封固令雞抱之候雛出藥成取出以綿裹塞耳中取瘥爲度

耳聾雞卵方
新雞卵一箇　巴豆一粒去心膜
右先以雞卵上開一孔將巴豆納卵中以紙兩重麪粘貼蓋却與雞抱以其餘卵雛出爲度取汁滴於耳內日二次

通耳丹
治耳聾
安息香　桑白皮　阿魏各一兩五錢　硃砂五分
右用巴豆七箇蓖麻仁七箇大蒜七箇研爛入藥末和勻棗核大每用一枚塞耳內

通氣散
治耳聾
穿山甲　螻蛄各五錢　麝香一錢
右爲細末以葱涎和劑塞耳或爲細末葱管盛少許放耳中

耳聾方
水銀二錢五分　蚯蚓中者一條
右就樸葱叢內以一莖去尖頭入水銀蚯蚓在內卽繫却頭勿令傾出候蚓化爲水滴入耳中

勝金透關散
善治前證
川烏頭炮一箇　細辛各二錢　膽礬五分　鼠膽一具
右爲細末用鼠膽調和勻再焙令乾研細入麝香半字鵝毛管吹入耳中吹時口含茶清待少時

蒲黃膏
治卒耳聾
細辛　蒲黃各一分　杏仁湯浸去皮尖雙仁
麝末各三分

右爲細末研杏仁如膏和捻如棗核大綿裹塞耳中日一易

龍腦膏

龍腦一錢二分研　椒目五錢　杏仁二錢半

右件搗研合勻觸裹棗核大塞耳中日一易

蘆薈丸良方下同

治疳積火盛耳閉耳鳴耳瘡等證

蘆薈　胡黃連　黃連炒焦　木香　白蕪荑炒

青皮各五錢　當歸　茯苓　陳皮各一兩五錢

甘草炙七錢

右爲末米糊丸桐子大每服七八十丸米湯下

龍齒散

治腎虛熱毒乘虛攻耳致耳內常鳴如蟬聲不可專服補藥

龍齒　人參　白茯苓　麥門冬　遠志各半兩

丹砂　鐵粉　龍腦　牛黃　麝香各二錢半另研

右爲細末研勻每服半錢七食後用沸湯調服日三次

黃芪丸

治證同上

黃芪一兩　沙苑蒺藜炒　羌活各五錢　黑附子大者一箇　羯羊腎一對焙乾

右爲細末酒糊丸如桐子大每服四十丸空心食前煨葱鹽湯下

芎歸飲

治證同上

川芎　當歸　細辛各五錢　石菖蒲　官桂

白芷各三錢

每服三錢水二盞入紫蘇葉棗煎至一盞去滓不拘時服如虛冷甚者酌量加生附子

柴胡聰耳湯

治耳中乾耵耳鳴致聾

柴胡三錢　連翹四錢　水蛭五分炒研　蚯蚓三箇去翅足研　麝香少許研　當歸身　人參　炙甘草各一錢

右除另研外以水二盞入薑三片煎至一盞稍熱下水蛭等末再煎二三沸食遠稍熱服

芎芷散

治風入耳虛鳴

白芷　石菖蒲炒　蒼术　陳皮　細辛　木通　厚朴　半夏製　桂　紫蘇　炙甘草各一分

川芎二分

右剉散每服三錢薑五片葱白二根食後臨臥服

麝香散

治耳內虛鳴

麝香五分　全蝎十四箇　薄荷十四葉裹麝香令蝎瓦上焙乾

右爲細末滴水捏作梃子塞耳內極妙

耳鳴沸鬧方

吳茱萸　巴豆去皮炒　乾薑　石菖蒲　磁石細辛各一分

右爲末用鵝脂和少許以綿裹塞耳中以鹽五升布裹蒸熨耳門令暖氣通入耳內冷即易之如此數次瘥後常以亂髮捲塞耳中愼風一方無磁石

生犀丸

治耳中策策疼痛

犀角鋑　牛黃研　南星　白附子炮　乾薑炮

丹砂研　半夏洗　龍腦研　沒藥研　乳香研

烏蛇酒浸去皮骨炙　官桂各二錢半　防風

當歸焙　麝香研各五錢

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服二十丸空心溫酒送下

解熱飲子

治氣虛熱壅耳內聾閉徹痛膿血流出

赤芍　白芍各五錢　當歸　川芎　炙甘草

大黃蒸　木鼈子去殼各一兩

右剉散每服四錢水一盞煎至七分食後臨臥服

鼠黏子湯

治耳內痛生瘡

桔梗五錢　桃仁一錢　柴胡　黃芪各三分

連翹　酒黃芩　鼠黏子　當歸梢　生地黃

黃連各二分　蒲黃　炙甘草　龍膽草　昆布

蘇木　生甘草各一分　紅花少許

右水二盞煎至一盞去滓稍熱服食後忌寒藥利大便

白龍散

治小兒腎臟盛而有熱熱氣上衝於耳津液結滯則生膿汁有因沐浴水入耳內水濕停積搏於血氣蘊積成熱亦令耳膿汁出謂之聹耳久而不愈則成聾

白礬枯　黃丹　龍骨各五錢　麝香一錢

右研極細末先以綿杖子展盡耳內膿水用藥一字分摻兩耳日二次勿令風入

杏仁膏

治耳中汁出或痛或膿

杏仁不拘多少炒令赤黑

右研成膏薄綿裹內耳中日三四度易之或亂髮裹塞之亦妙

菖蒲梃子

治耳中痛

菖蒲一兩　附子炮去皮臍五錢

右爲細末每用不以多少油調滴耳內效一法用酢丸如杏仁大綿裹置耳中日三易一法搗菖蒲自然汁灌耳神效

通氣散

治聾耳

椒李仁去皮研　芍藥　人參各五錢　大黃　山芋　官桂去皮各一兩　檳榔三枚　牡丹皮　木香　細辛去苗　炙甘草各二錢五分

右爲細末研勻每服一錢匕空心溫酒調服

蔓荊子散

治內熱耳出膿汁

蔓荊子　赤芍藥　生地黃　桑白皮　甘菊花　赤茯苓　川升麻　麥門冬去心　木通　前胡　炙甘草各一錢

右水二盞薑三片紅棗二枚煎至一盞食後服

松花散

治前證

枯礬五錢　麻勃　木香　松脂　臙脂各二錢半

右搗羅細末先以綿杖子淨拭後用藥吹入耳

白連散

治前證

枯礬　鶴鬯骨　黃連去鬚　龍骨各一兩

右爲細末以綿裹棗核大塞耳中日三易

麝香散

治前證

桑螵蛸一箇炙　麝香一字

右爲末研令勻每用半字摻耳如有膿先用綿杖子撚乾一法用麝香少黃丹多研勻入耳

禹餘糧丸

治前證

禹餘糧火燒酢淬七次　鶴鬯魚骨　釜底墨　伏龍肝各二錢五分　生附子

右件爲末以綿裹如皂角子大塞耳日再易之如不瘥者內有蟲也

葱涎膏

治耵聹塞耳聾不可强挑

葱汁三合　細辛去苗　附子炮去皮各二錢

右以細辛附子爲末葱汁調如棗核大塞耳中

耳聹方

龍骨　枯礬　臙脂　海螵蛸各等分　麝香少許

右爲細末先繳耳淨將藥乾吹

菖蒲散

治前證

菖蒲焙　狼毒　磁石火煅酢淬　附子炮去皮　枯礬各五錢

右爲細末以羊髓和少許綿裹塞耳中

竹蛀散

治前證

苦竹蛀末　枯礬各二錢　臙脂五分　麝香一錢

右研極細以綿杖子拭之用鵝毛管吹一字入耳

蠍倍散

治前證

全蠍燒存性三錢　五倍子炒一兩　枯礬一錢　麝香少許

右爲細末研勻每用少許吹耳中一方加乾臙脂

立效散

治前證

陳橘皮燈上燒黑一錢爲末　麝香少許

右研勻每用少許先以綿拭耳內膿淨吹之

香附散

治前證

香附去毛研爲末

右以綿杖送入耳

附子丸

治耳聾出膿疼痛及耵聹塞耳

附子炮去皮臍　菖蒲米泔浸焙　蓖麻仁另研　枯白礬　松脂各一兩研　乾臙脂半兩　杏仁二兩去皮尖雙仁炒另研

右爲細末研勻鎔黃蠟和撚如棗核大針穿一孔令透塞耳中日一換或治耵聹不用黃蠟只搗成膏綿裹如棗核大塞耳

耳癰方

密陀僧一錢　輕粉五分　麝香一字

右爲細末先以綿拭耳內膿却摻藥

三黃散

治耳內流膿

雄黃　硫黃　雌黃各等分

右爲細末以少許吹入耳中

二聖散

治耳內出膿水

羌活　白附子炮各一兩

右爲細末用猪羊腎各一隻切開每隻入藥末五分不得著鹽濕紙裹煨熟五更初溫酒嚼下續喫粥壓之

無憂散

治前證

黃芪　木通　桑白皮　陳皮各一兩　胡椒

白朮　木香各五錢　牽牛頭末四兩

右俱爲細末每服三五錢食後以薑汁調下

曾青散

治耳內瘡

雄黃七錢五分　曾青五錢　黃芩二錢五分

右爲細末研勻每用少許納耳中有膿汁用綿杖子拭乾用之

黃連散

治前證

黃連五錢　枯白礬七錢五分

右爲細末每用少許綿裹納耳中

柴胡梔子散

治三焦及足少陽經風熱耳內作痒生瘡或出水疼痛或胷乳間作痛或寒熱往來

柴胡　梔子炒　牡丹皮各一錢　茯苓　川芎　芍藥　當歸　牛蒡子炒各七分　甘草五分

右水煎服一名梔子清肝散

當歸川芎散

治手足少陽經血虛瘡證或風熱耳內痒痛生瘡出水或頭目不清寒熱少食或婦女經水不調胷膈不利腹脅痞痛

當歸　川芎　柴胡　白朮　白芍藥各一錢

山梔炒一錢二分　牡丹皮　白茯苓各八分

葛荊子　甘草各五分

右水煎服

若肝氣不平寒熱加地骨皮

肝氣實加柴胡黃芩

氣血虛加參芪歸地

脾虛飲食少思加苓朮

脾虛胷膈不利加參芪

痰滯胷膈不利加朮半

肝氣不順胷膈不利或小腹痞滿攻痛加青皮

肝血虛胷膈不利或小腹痞滿痛加肉桂

肝血虛寒小腹時痛加肉桂

日晡發熱加歸地

加味地黃丸

治肝腎陰虛瘡證或耳內痒痛出水或眼昏疲氣喘嗽或作渴發熱小便亦澀等證

乾山藥　山茱萸肉　牡丹皮　澤瀉　白茯苓

熟地黃　生地黃　柴胡　五味子各另爲末等分

右將二地黃搗碎酒拌濕杵膏入前末和勻加煉蜜爲丸如桐子大每服百丸空心白湯下不應用加減八味丸

立驗散

治蜬蚰入耳

川芎　白芷　夜明沙炒　猪牙皂角炙　南星炮各七錢五分　百部　白丁香　藜蘆各四錢

草烏五錢　砒霜另研　葷麻各二錢　海金沙二錢五分

右爲細末研勻臨時更用鉛丹調色勻磁器收如蜬蚰入耳取少許酢調以細翎蘸藥入耳微吹令藥氣行立出藥不得多多卽蜬蚰成水不出如蠍螯先點少酢在螯處摻藥半字許瘵令熱卽效

加減滾脊丸

治痰火上升耳鳴

麝香五分　草龍膽酒洗　當歸酒洗　梔子炒黃芩　青皮各一兩　木香二錢半　大黃酒蒸青黛　柴胡各五錢　蘆荇　牛膽　南星各三錢

右爲末神麯糊和丸菜豆大薄湯下二十丸日三服七日後用鉄砂酒以通其氣一本無牛膽

鉄砂酒

治證見上

鉄砂一兩　穿山甲末一錢

右以穿山甲拌鉄砂養一晝夜揀出山甲將鉄砂以酒一椀煎三四日嚥酒口內外用磁石一塊綿

裹塞耳忌怒

通明利氣湯

治虛火痰氣鬱於耳中或閉或鳴痰火熾盛痞滿煩躁

貝母一錢五分　陳皮一錢二分五釐　黃連　黃芩並酒浸　又用猪膽汁拌炒七分五釐　黃蘗酒炒　梔子炒　元參酒洗各一錢　蒼朮鹽水炒　白朮　香附童便炒　生乾地黃薑汁炒　檳榔各五分　川芎四分　木香二分五釐　甘草二分

右剉作一貼入薑三片水煎入竹瀝五匙服

復聰湯 丹溪

治痰火上攻耳鳴耳聾

半夏　赤茯苓　陳皮　甘草　萹蓄　木通　瞿麥　黃蘗鹽炒各一錢

右剉作一貼入薑三片水煎

大補丸 醫鑑

治耳鳴欲聾

黃蘗八兩剉人乳拌勻曬乾再用鹽水炒褐色

右搗爲末水丸梧子大空心鹽湯下百丸一名獨勝丸

滋腎通氣湯 同春下同

治腎虛耳鳴欲聾

當歸　川芎　白芍藥　生乾地黃酒炒各一錢　知母　黃蘗　黃芩並酒炒　柴胡　白芷　香附炒各七分

右剉作一貼空心水煎溫服

龍膽湯

治忿怒動膽火致左耳聾

黃連　黃芩炒　梔子炒　當歸　陳皮　牛膽　南星各一錢　龍膽　香附各八分　元參七分　青黛　木香各五分　乾薑炒黑三分

右剉作一貼入薑三片水煎入元明粉三分服

滋陰地黃湯

治色慾動相火致右耳聾

熟地黃一錢五分　山藥　山茱萸肉　白芍藥　當歸　川芎各八兩　牡丹皮　澤瀉　白茯苓　石菖蒲　遠志　知母鹽酒炒　黃蘗鹽酒炒各六分

右剉作一貼水煎服空心亦治大病後耳聾

清聰化痰丸

治飲食厚味挾怒氣以動肝胃之火致耳聾耳鳴壅閉不聞聲音

橘紅去白鹽水洗　赤茯苓　蔓荊子各一兩　片芩酒炒八錢　黃連酒炒　白芍藥酒浸煨　生地黃酒洗　柴胡　半夏薑製各七錢　人參六錢　青皮酢炒五錢　生甘草四錢

右爲末葱湯浸蒸餅和丸菉豆大茶清下百丸

黃龍散

治沐浴水入耳中成膿耳亦治小兒聤耳

枯白礬　龍骨煅　黃丹水飛　乾臙脂燒灰　海螵蛸煅一錢　麝香少許

右爲末先以紙撚拭乾膿水乃以綿撚蘸藥入耳日日易之

補骨脂丸 入門

治勞損耳聾

磁石煅酢淬一兩二錢五分　熟地黃　當歸身　川芎　肉桂　菟絲子　川椒　破故紙　杜仲　白蒺藜　胡盧巴　白芷　菖蒲各二錢

右爲末蜜丸梧子大空心葱白湯下五十丸

聰耳湯 醫鑑

治耳重聽不清

黃蘗酒炒一錢　當歸身酒洗　白芍藥酒炒　生地黃酒洗　川芎　知母酒炒　陳皮　烏藥　白芷　防風　羌活酒洗　獨活酒洗　薄荷　蔓荊子　藁本酒洗各一錢　細辛七分

右剉作一貼水煎食後服服後低頭睡一時

地黃湯 本草

治腎經熱右耳聽事不眞每心中著意則轉覺重虛而鳴疼痛

磁石煅淬爲末二兩　生乾地黃酒洗一兩五錢　甘草五錢　枳殼　羌活　桑皮　防風　黃芩　木通各一兩

右爲粗末每四錢水煎日二服

荊芥連翹湯 同春

治兩耳腫痛由腎經有風熱

荊芥穗　連翹　防風　當歸　川芎　白芍藥　柴胡　枳殼　黃芩　梔子炒　白芷　桔梗各七分　甘草五分

右剉作一貼水煎食後溫服

紅綿散 丹溪

治膿耳

枯礬　海螵蛸各一錢　乾臙脂五分　麝香一字
右研勻先以綿撚子拭去耳膿水盡却以紙撚蘸藥摻入耳中卽乾一方無海螵蛸
抵聖散 東垣
治耳中膿出經年不愈
鷓鴣骨二錢　乳香二錢　枯白礬　乾臙脂
輕粉各一錢　麝香五分
右細末或摻入或吹入耳中
明礬散 丹溪
治腎經熱上衝於耳使津液凝滯爲稠膿清汁或沐浴水入耳停滯爲膿但不疼若不差變成膿
枯白礬　龍骨各三錢　黃丹二錢　麝香少許
乾臙脂一錢
右爲末先去膿水次吹藥入
吹耳散 同上
治腎經風熱耳內出膿汁
乾臙脂　海螵蛸　枯白礬　龍骨　赤石脂
蜜陀僧煅　膽礬　青黛　硼砂　黃連各一錢
龍腦二分　麝香一分
右爲細末先去膿水次吹藥入
元參貝母湯 腎
治耳熱出汁作痒乃腎火上炎也
防風　貝母　天花粉　黃蘗鹽水炒　白茯苓
元參　白芷　蔓荊子　天麻　半夏製各一錢
甘草五分
右剉作一貼入薑三片水煎食後服
塞耳丹 得效

治氣壅塞聾聵
石菖蒲一寸　巴豆肉一粒　全蝎一箇
右爲末葱涎和如棗核大綿裹塞耳
柴胡清肝散
治肝膽二焦風熱瘡瘍或怒火憎寒發熱或瘡毒結於兩耳前後或身外側至足或胃乳小腹下或兩股內側至足等證
柴胡　黃芩炒　人參各三分　山梔炒　川芎各五分　連翹　桔梗各四分　甘草二分
右水煎服
麝香佛手散
治五般耳出血水者
麝香少許　人牙煅過存性出火毒
右爲細末每用少許吹耳內卽乾及治小兒痘瘡出現而醫者酒調一字服之卽出
水銀膏
治月蝕瘡在兩耳上及竅旁隨月盈虛以爲消長
水銀二錢五分　胡粉研　松脂　黃連去鬚爲末各五錢
右先熬猪脂令沸下松脂諸末及水銀攪令勻磁盒盛先以鹽湯洗淨瘡塗敷日三五度
胡粉散
治月蝕瘡
胡粉炒微黃　白礬　虢丹煅　黃連淨　輕粉各二錢　臙脂一錢　麝香少許
右爲末先以溫漿水入鹽洗拭後摻藥如瘡乾麻油調敷

黃芪內托散
治耳腫痛
川芎　當歸　黃芪各二錢　白朮　金銀花
天花粉　皂角針各一錢　甘草　澤瀉各五分
右水三鍾煎八分食前服
仙方活命飲
治前證
穿山甲蛤粉炒黃　白芷　防風　赤芍　花粉
歸尾　乳香　沒藥　川貝母　皂角刺　甘草各一錢　金銀花　陳皮各三錢
酒一椀煎數沸溫服
托裏消毒散
治前證
人參隨證加減　黃芪鹽水拌炒　當歸　川芎
白芍藥炒　白朮炒　白茯苓各一錢　金銀花
白芷各七分　甘草　連翹各五分
右水煎服
參芪內托散
治前證
人參　黃芪蜜炙　當歸　川芎　厚朴薑炙
防風　桔梗炒　白芷　紫草　官桂　木香
甘草等分
右入糯米一撮水煎服
十宣散
治前證
人參　黃芪製　當歸各二錢　川芎　甘草炙
桔梗　白芷　防風　厚朴各一錢　桂心二分

右爲細末每服一錢或二錢木香湯下

黃連消毒散

治前證

黃連炒　羌活各一分　黃芩　黃蘗　桔梗

藁本　防己各五分　當歸尾　連翹　防風

獨活　知母炒　生地黃各四分　人參　甘草各

三分　黃芪　蘇木　陳皮　澤瀉各二分

右㕮咀爲粗末煎服

遠志酒

能托散諸毒

遠志不拘多少用米泔浸洗椎去心

右爲末每服三錢用好酒一鍾調遲少頃澄清飲之以滓敷患處

清肝流氣飲 齊癆至書下同

治耳痔耳蕈耳癰耳濕耳爛

枳殼　桔梗　黃芩　小柴胡　青皮炒　前胡

羌活　薄荷　生地黃　烏藥　甘草生　防風

川芎　白芷　石膏　赤芍

右㕮咀水煎服

定痛降氣湯

前證服流氣飲後即服此方

紫蘇葉　厚朴　陳皮　甘草生　半夏　前胡

川芎　防風　白芍藥　白芷　當歸身　黃蘗

知母　乳香　小柴胡

右薑三片棗一枚煎服不拘時

煉石散

治耳旁石疽堅如石塊其色不變

鹿角燒灰八兩　白蘞三兩　粗厲黃石二斤

右用好酢五升先燒石通紅淬酢中再燒再淬酢盡方止爲末加二味末將剩下酢調如泥塗上消軟灸處亦塗之

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百五十七卷目錄
醫部彙考一百三十七
耳門四
單方
鍼灸
導引
醫案
藝術典第一百五十七卷
醫部彙考一百三十七
耳門四
單方
耳腫風毒腫起出血取柳蟲糞化水取清汁調白礬末少許滴之（肘後）
聹耳出水苦竹蛀屑狼牙白薇等分爲末和勻頻摻之（聖惠）
耳膿作痛因水入耳內者如聖散用煎幹內蛀末膩粉各一錢麝香五分爲末以綿杖繳盡送藥入耳以綿塞定有惡物放令流出甚者三度必愈（普濟方下同）
聹耳出膿水雞蟲屎研末同麝香少許吹之
蜈蚣入耳炙猪肪摭耳自出
百蟲入耳椒末一錢酢半盞浸良久少少滴入自出（續十全方）
老人耳聾猪腎一對去膜切以粳米二合葱白二根薤白七根人參二分防風一分爲末同煮粥食（奉親養老方）

蚰蜒入耳濕生蟲研爛塗耳邊自出或攤紙上作燃安入耳中亦出（衛生寶鑑）
腎虛耳聾用鹿腎一對去脂膜切以豉汁入粳米二合煮粥食亦可作羹（聖惠方）
卒耳聾黃蠟不拘多少和茯苓末細嚼茶湯下（普濟方）
耳聾用鵝油半匙磁石一小豆大麝香少許和勻以綿裹成錠子塞耳中口含生鐵少許用三五枚即有效（肘後）
痔耳出膿用天鵝油調草烏末入龍腦少許和敷立效無則以雁油代之（通玄）
聹耳出膿蜈蚣末吹之（聖惠）
腎虛耳聾烏雄雞一隻治淨以無灰酒三升煮熟乘熱食三五隻效
聹耳出汁陳皮燒研一錢麝香少許爲末日摻之
聹耳出汁青橘皮燒研末綿包塞之
聹耳流水或膿血取柑子嫩葉七個入水數滴杵取汁滴之即愈
聹耳出汁胡桃仁燒研狗膽汁和作挺子綿裹塞之（普濟方）
傷耳成瘡出汁者用胡桃杵取油內入耳（肘後）
聹耳出膿檳榔末吹之（肘後）
聹耳出膿楠木燒研以綿杖繳入（聖惠方）
耳卒熱腫棟實五合搗爛綿裹塞之頻換
耳痛有膿柳根細切熟搗封之燥即易之
耳卒聾閉巴豆一粒蜈蚣針刺孔通氣塞之取效（肘後方）
耳鳴耳聾一二十年者用柘根二十觔菖蒲五斤各以水二石煮取汁五斗故鐵二十斤煅赤以水五斗浸取清水合水一石五斗用米二石釀二斗如常釀酒成用真磁石三斤爲末浸酒中三宿日夜飲之取醉而眠聞人聲乃止
聹耳出膿蟬蛻半兩燒存性麝香五分炒爲末綿裹塞之追出惡物效（海上）
耳卒聾閉蚯蚓入鹽安葱內化水點之立效（勝金）
聹耳出膿生地龍釜上墨生猪脂等分研勻葱汁和捻作挺子綿裹塞之聖惠方用地龍爲末吹之
耳中耵聹乾結不出用白蚯蚓入葱管中化爲水滴耳令滿不過數度即易挑出
蜒蚰入耳地龍爲末入葱內化水滴入則蜒蚰亦化爲水（聖惠方）
耳聾氣閉蚯蚓川芎各兩半爲末每服二錢麥門冬湯下服後低頭伏睡一夜一服三夜立效（聖濟總錄）
月蝕耳瘡望夜取冤屎納蝦蟇腹中同燒末敷之（肘後方）
聹耳出汁故綿燒灰綿裹塞之（聖惠方）
聹耳出膿用狗膽一枚枯礬一錢調勻綿裹塞耳內三四次即瘥一方加臘猪脂調和（古今良方）
滴耳聾閉蝸牛音用蝸牛一兩石膽鍾乳粉各二錢五分爲末盛盆盛之火煅赤研末入片腦一字每以油調一字滴入耳中無不愈者（聖惠方）
蜒蚰入耳蝸牛椎爛置於耳邊即出也（瑣碎錄）
耳中有物不出用弓弩弦長三寸打散一頭塗好膠拄著耳中徐徐粘引出（聖惠方）
久聾不聽錄松脂三兩巴豆一兩和搗成丸薄綿裹

塞一日二度（梅師方）

耳聾鼠脂半合青鹽一錢蚯蚓一條同和化以綿蘸捻滴耳中塞之（聖惠方）

耳聾不聽雞矢白炒半升烏豆炒一升以無灰酒二升乘熱投入服取汗耳如鼓聲勿訝（外臺方）

耳中惡瘡雞矢白研敷之（聖惠方）

聤耳有蟲膿血日夜不止用鯉魚鮓三斤鯉魚腦一枚鯉魚腸一具洗切烏麻子炒研一升同搗入器中微火炙暖布裹貼耳兩食頃有白蟲出盡即愈慎風寒（千金）

耳聾取鯉魚膽汁滴入耳中（本草）

耳聾取生鯉魚腦髓綿裹塞耳（直指）

又方用竹筒盛生鯉魚腦於炊飯處蒸之令烊注耳中

耳暴聾以鯉魚腦髓二兩粳米三合和鹽醬煑粥食（入門）

久聾取鼠膽汁令病人側臥瀝汁入耳令盡須臾膽汁從下耳出初灌益聾半日乃瘥能治三十年老聾但鼠膽難得鼠纔死膽便消矣或三月初三日前有之（入門）

鼠腦髓綿裹塞耳亦治聾（直指）

耳聾取蛇膏塞耳中神效（千金方）

耳內忽大痛如有蟲在內奔走或血水流出痛不可忍蛇脫皮燒存性爲末吹入耳中立愈（正傳）

耳痛出膿水取杏仁熬赤爲末葱涎和丸綿裹入耳中日三易（本草方）

耳聾用芥子搗爲末人乳汁和丸綿裹塞耳日兩易（本草方）

耳聾取雄猫尿滴入耳中左滴左右滴右如猫不放尿取生薑擦其齒即放尿（綱目）

氣閉耳聾眞麝香爲末以葱管吹入耳內後將葱塞耳內耳自聰（同春）

積年耳聾取驢生脂和川椒熟搗綿裹塞耳妙不可言一方用生薑不用川椒（本草）

耳聾用巴豆一粒去心皮螫蝥一枚去翅足二物合搗膏綿裹塞耳中再易甚驗

耳卒腫出膿并底耳及治耳聾出膿用枯礬研細每以葦筒吹少許入耳中日三四度或以綿裹棗核大塞耳一方先以食鹽摻之次入礬末尤妙一方先以紙纏去耳中汁次以礬末粉耳中次以食鹽末粉耳中食久乃起不過再度末瘥一方不用鹽

又方商陸生者洗淨以竹刀削如棗核大塞耳中亦治耳內生瘡

膿水出耳中白礬煅爲末入麝香少許綿裹塞耳中（本草）

耳內流膿腫痛已消膿尚不止用此方摻之神效用上白明礬煅枯三錢乾胭脂二錢麝香一分五釐共研爲極細末磁罐密收用時先以新綿作毬絞盡耳內膿再用濕綿毬滾藥送入至耳底日二三次自愈（外科正宗）

又方磁石生研細綿裹納聾耳中別用鐵砂末納不聾耳中自然通聽（直指）

耳聾石菖蒲一寸巴豆肉一粒合搗作丸綿裹塞耳日一易

耳痛取菖蒲自然汁灌耳神效（本草下同）

耳聾耳鳴生地黃灰火煨綿裹塞耳數易之以瘥爲度

水入耳取薄荷自然汁點入立效（經驗）

耳聾耳鳴蓖麻子去皮四十九粒大棗肉十個入人乳和搗令勻每取作棗核大綿裹塞耳中覺熱爲度一日一易名棗子錠（得效）

久聾甘遂半寸綿裹塞耳中甘草半寸嚼口中即通（綱目）

又方甘遂末吹入左耳甘草末吹入右耳亦效須兩人各處脩製乃效（丹溪下同）

又方巴豆肉十四箇研爛鵝脂半兩鎔化作丸綿裹塞耳中

久聾取得龜尿盛青葱管中滴入耳中取尿法以明鏡照龜淫發放尿又艾灸其尻亦放

又方用蠟紙一張剪作四片每一片於筯上緊捲抽却筯以蠟紙捲之安耳中然之待火欲至耳急除去當有惡物出在殘紙上日一角用了以蠟塞定

又方用附子以醇酢煑一宿削如棗核以綿裹塞耳中

又方取龜一枚安於盒中荷葉上養之專看葉上有尿收取滴耳中

耳中有蟲鯉魚腦和桂末搗勻綿裹塞之（千金方）

聤耳出膿石首魚頭中石魷研末或燒存性研摻耳（集周方）

耳疳出汁雞子黃炒油塗之甚妙（談埜翁方）

耳疳出膿用抱出雞子殼炒黃爲末油調灌之疼即

止（杏林摘要）

蚰蜒入耳牛乳少少滴入即出若入腹者飲一二升即化爲水（聖惠方）

底耳出膿海螵蛸半錢麝香一字爲末以綿杖繳淨吹入耳中（普濟方）

耳瘡腫痛五倍子末冷水調塗濕則乾摻之（海上名方）

聹耳出膿五倍子末吹之或用五倍子焙乾一兩全蠍燒存性三錢爲末摻耳中

耳卒痛鹽三五斤蒸熱裹以青布枕之冷復易熱者立效（綱目）

聹耳出汁夜明沙二錢麝香一字爲末拭淨摻之（聖惠方）

底耳疼痛桑螵蛸一箇燒存性麝香一字研末每用半字摻入神效有膿先繳淨（經驗方）

百蟲入耳小便少少滴之（聖惠方下同）

勞聾已久童子小便乘熱少少頻滴之

熏耳治聾蠶退紙作撚入麝香二錢入筆管燒煙熏之三次即開（肘後方）

百蟲入耳入乳滴之即出（聖惠方）

多年耳聾重者用三兩度初起者一上便效用驢前腿脛骨打破向日中曝出髓以瓷盒盛收每用綿點少許入耳內側臥候藥行其髓不可多用以白色者爲上黃色者不堪

又方驢前腿脛骨髓以針沙一合水二合浸十日取清水少許和髓攪勻滴少許入耳中外以新磚一塊燒赤潑醋鋪磁石末一兩在磚上枕上至曉如此三度即通（普濟方）

塞耳治聾花青巴豆仁蓖麻仁各一枚研末丸棗核大綿裹塞之（聖惠方）

聹耳出膿蜘蛛一箇臙脂坯子半錢麝香一字爲末用鵝翎吹之

耳暴聾閉全蠍去毒爲末酒服一錢以耳中聞水聲即效（楊氏產寶雜錄）

膿耳疼痛蠍梢七枚去毒焙入麝香半錢爲末挑少許入耳中日夜三四次以愈爲度（楊氏家藏）

物入耳中以麻纏剪令頭散著膠粘上徐引出之（千金）

百蟲入耳藍汁葱汁韭汁萵苣汁雞冠血酸醋香油稻稈灰汁俱灌入耳中（本草下同）

又方桃葉挼細塞耳

又方白膠香燒煙熏入耳

又方猪肉少許炙香置耳孔邊

又方麻油作煎餅側臥以耳枕之

又方以火照之

又方以刀兩口於耳上相擊作聲

又方白礬雄黃等分爲細末香油調成膏每用皂角子大塞耳

蜒蚰入耳硇砂膽礬等分研細鵝翎管吹一字入耳中蟲化爲水

又方雞一隻去毛足以油煎令黃筋穿作孔枕之

又方綠礬爲末水調灌耳

又方雄黃爲末醋調灌耳

又方驢乳二合灌耳中其蟲從左耳入右耳出

蜈蚣及蟻入耳猪胆一指大炙令香安耳邊即出

又方用生薤汁或韭汁灌耳中即出

又方大蒜汁灌耳中即出

又方鯽鯉甲燒灰爲末水調濾過滴入耳中

飛蛾入耳醬汁灌入耳即出或以鵝管極氣吸之出

或擊銅器於耳邊

蒼蠅入耳最害人速用皂子蟲研爛生鱔血調灌入耳中

耳中出血名曰耳衄以龍骨吹入若左關脈弦洪內服柴胡清肝散尺脈躁或弱服六味地黃丸

聹耳膿血綿裹車轄脂塞之（外臺秘要）

諸蟲入耳車缸脂塗孔中自出（梅師方）

多年老聾衛生家寶方勝金透關散用活鼠一枚繫定熱湯浸死破喉取膽眞紅色者是也用川烏頭一箇炮去皮華陰細辛二錢膽礬半錢爲末以膽和勻再焙乾研細入麝香半字用鵝翎管吹入耳中口含茶水日二次十日見效末除根本

久聾臘月取鼠膽二枚熊膽研一分水和旋取菉豆大滴耳中日二次（增廣）

虛損昏聾大羊尾骨一條水五椀煮減半入葱白五莖荊芥一握陳皮一兩薑三兩煮熟取汁搜麪作索餅同羊肉四兩熟和五味食（多能鄙事）

暴耳聾者川椒巴豆葛蒲松脂以蠟鎔爲筒子內耳中一日一易或用雄黃一錢巴豆肉一箇研細葱涎和作錠子紙捲塞耳中或用凌霄花葉杵自然汁滴耳中

凍耳用橄欖燒灰清油調敷雀腦亦可

凍耳成瘡用柏葉二兩微炙爲末杏仁四十九枚湯浸去皮研成膏亂髮兩雞子大食鹽乳香各半兩細

研黃蠟一兩五錢清油一斤右先煎油令沸卽下亂髮以消盡爲度次下諸藥煎令焦黃濾去滓更以綿重濾過再以慢火煎之後下乳香黃蠟等攪令稠稀得所於磁器盛每用鵝翎旋取塗之

又方柏白皮榆白皮桑白皮杏仁湯浸去皮各二兩甘草一兩羊腦髓半斤俱剉以羊腦髓煎令黃濾去滓於磁器盛每日用鵝翎蘸藥塗之

諸蟲入耳雞冠血滴入卽出勝金方

蜒蚰入耳生油調雞心血滴入卽出總錄

耵聹年久耳聾用鍊成雞肪五兩桂心十八銖野葛六銖同以文火煎三沸去查每用少許以葦筒炙鎔傾入耳中如此十日耵聹自出長寸許也千金翼

耳中出血龍骨末吹入之三因方

諸蟲入耳以紙塞耳鼻畱蟲入之耳不塞閉口不言少頃蟲當出也集元方

聹耳出膿穿山甲燒存性入麝香少許吹之三日水乾卽愈鮑氏小兒方

耳內疼痛穿山甲二箇夾土狗二箇同炒焦黃爲末每吹一字入耳內亦治耳聾普濟方

耳鳴耳聾卒聾及腎虛耳內如風水鐘鼓聲穿山甲一大片以蛤粉炒赤蠍梢七箇麝香少許爲末以麻油化蠟和作梃子綿裹塞之攝生方

耳衄血一月不止刺羊血熱飲卽瘥聖惠方

滴耳治聾鯽魚膽一枚烏驢脂少許生麻油半兩和勻納入樓葱管中七日取滴耳中日二次聖惠方

擦落耳鼻頭髮瓶盛泥固煅過研末以擦落耳鼻乘熱蘸髮灰綴定軟帛縛住勿令動自生合也經驗良方

耳痛不可忍用磨刀鐵漿滴入耳中卽愈

北山經憲翼之水其中多元龜其狀如龜而鳥首虺尾其名曰旋龜其音如判水佩之不聾山海經下同

西山經符禺之山有木焉名曰文莖其實如棗可以已聾

陰山之中多彫棠其葉如榆葉而方其實如赤菽食之已聾

鍼灸

素問曰暴聾氣蒙耳目不明取天牖

邪客於手陽明之絡令人耳聾時不聞音刺手大指次指爪甲上去端如韭葉各一痏立聞不已刺中指爪甲上與肉交者立聞其不時聞者不可刺也耳中生風者亦刺之如此數左刺右右刺左

耳聾刺手陽明不已刺其通脈出耳前者

邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡者皆會於耳中上絡左角五絡俱竭令人身脈皆動而形無知也其狀若尸或曰尸厥刺其足大指內側爪甲上去端如韭葉後刺足心後刺足中指爪甲上各一痏後刺手大指內側去端如韭葉後刺手心主少陰銳骨之端各一痏立已不已以竹管吹其兩耳髣其左角之髮方一寸燔治飲以美酒一杯不能飲者灌之立已

肝病者虛則目䀮䀮無所見耳無所聞善恐如人將捕之取其經厥陰與少陽氣逆則頭痛耳聾不聰頰腫取血者

肺病者虛則少氣不能報息耳聾嗌乾取其經太陰足太陽之外厥陰內血者

靈樞經云人之耳中鳴者何氣使然岐伯曰耳者宗脈之所聚也故胃中空則宗脈虛虛則下溜脈有所竭者故耳鳴補客主人手大指爪甲上與肉交者也

又云上氣不足耳爲之苦鳴補足外踝下畱之

又云髓海不足則腦轉耳鳴審守其輸調其虛實

又云手太陽之筋其病肩髀引頸而痛耳中鳴其痛轉筋者治在燔針刼刺之以知爲度以痛爲輸

手太陽之脈所生病者耳聾目黃頰腫視盛虛熱寒陷下調之也

熱病身重骨痛耳聾而好瞑取之骨以第四鍼五十九刺骨病不食齧齒耳青索骨於腎不得索之土土者脾也

甲乙經曰手太陽厥逆耳聾治主病者

耳中有乾擿禁不可灸

耳門耳中有膿禁不可灸

頸痛項不得顧耳目不明風池主之

肩背痛暴聾氣蒙耳目不開天牖主之

熱病汗不出耳鳴聾無所聞陽谷主之

耳聾鳴竅陰主之

暴病頭痛身熱痛肌肉動耳聾束骨主之

頭風耳後痛完骨主之

癲疾多言耳鳴實則聾徧歷主之

耳鳴取耳前動脈

聾而不痛取足少陽聾而痛取手陽明

耳鳴百會及頷厭顱息天窻大陵徧歷前谷後谿皆

主之
耳痛聾鳴上關主之刺不可深
耳聾鳴下關及陽谿關衝披門陽谷主之
耳聾鳴頭領痛耳門主之
頭重領痛引耳中懵懵嘈嘈和髎主之
聾耳中癰漫癰漫者若風聽會主之
耳聾填填如無聞懵懵嘈嘈若蟬鳴頰頰鳴聽宮主之下頰取之譬如破聲刺此
聾腎風及會宗下空主之
耳聾無聞天空主之
耳聾嘈嘈無所聞天容主之
耳鳴無聞肩貞及完骨主之
耳中生風耳鳴耳聾時不聞商陽主之
聾及耳中不通合谷主之
耳聾兩頰額痛中渚主之
耳渾渾焞焞無所聞外關主之
卒氣聾四瀆主之
千金方曰耳痛耳聾嘈嘈上關下關四白百會顱息腎風耳門領厭天窻陽谿關衝液門中渚
耳聾嘈嘈若蟬鳴天容聽會聽宮
耳暴聾天牖四瀆
耳前痛少商
耳痛曲池
渾渾焞焞聾無所聞外關會宗
耳鳴前谷後谿仍取徧歷大陵
領痛引耳嘈嘈耳鳴無聞腕骨陽谷肩貞竅陰俠谿
風聾鳴商陽刺入一分留一呼灸三壯左取右右取左如食頃
醫學綱目曰耳聾耳鳴或疼或痒或聆耳聽會主之
穴在耳珠前陷中瀉八吸
腎風針入半寸瀉七吸或合谷或三里
又法腎風在耳前陷後按之引耳中令病人先以錢二十四文口咬側臥取之針透令病人閉口搖頭其怒氣從耳出
聽會中渚臨泣針法如前
耳虛鳴腎俞太谿
灸耳暴聾蒼耳長七分一頭切平一頭削尖將尖頭插耳中於平頭上灸七壯重者二七壯覺耳內熱即效
景岳全書曰風聾灸上星七壯令氣通耳中即愈
耳聾痛腎風灸七壯
耳聾合谷灸七壯或外關聽宮腎俞徧歷
東醫寶鑑曰耳鳴取液門耳門中渚上關完骨臨泣陽谷前谷後谿陽谿徧歷合谷大陵太谿金門
耳聾取中渚外關和髎聽會聽宮合谷商陽中衝

導引

養性書曰以手摩耳輪不拘遍數所謂修其城郭以補腎氣以防聾聵也
養耳力者常飽
保生祕要曰定息以坐塞兌咬緊牙關以脾腸二指捏緊鼻孔睜二目使氣串耳通竅內覺哄哄有聲行之二三日竅通爲度
時常將兩耳返聽於歸元取靜或存息閉口鼻氣意想從耳出又收返聽耳自然聰耳病凡搓掌心五十度熱閉耳門空觀天又搓又閉又觀如此六度耳重皆然兼以後功無不應驗
用意推散其火男則逆收藏於兩腎間女則逆歸於兩乳下或耳中或按耳門內若蟬鳴咽津液降氣自安
耳痛想火燒兩腎又升腎水洗之或按耳戶使鳴數次咽津液氣下即安
耳病以意散其火逆歸藏於兩腎內或耳中有物即以意取出之
景岳全書曰凡耳竅或損或塞或震傷以致暴聾或鳴不止者即宜以手中指於耳竅中輕輕按捺隨捺隨放隨放隨捺或輕輕搖動以引其氣捺之數次其氣必至氣至則竅自通矣凡值此者若不速爲導引恐因而漸閉而竟至不開耳

醫案

丹鉛續錄云王萬里時患耳痛魏文靖公勸以服青鹽鹿茸煎雄附爲劑且言此藥非爲虛損服之爲不觀易之坎爲耳坎水藏在腎開竅於耳在志爲恐恐則傷腎故爲耳痛氣陽運動常顯血陰流行常幽血在形如水在天地間故坎爲血卦是經中已著病證矣竟餌之而良愈
沈存中云予爲河北察訪使時病赤目四十餘日黑睛旁黯赤成瘡晝夜痛楚百療不瘥郎官丘革相見

問予病目如此曾耳中痒否若耳中痒卽是腎家風有四生散療腎風每作二三服卽癒閭里號爲聖散予傳其方合服之午時一服臨臥一服目反大痛至二鼓時乃能眠及覺目赤稍散不復痛矣更進三四服遂平安如常是時孫和甫學士帥鎭聞予說大喜曰吾知所以自治目矣向久病目嘗見呂吉甫參政云頃目病久不癒因服透冰丹乃癒如其言修合透冰丹一劑試服了二三十服目遂愈乃知透冰丹亦療腎風耳

聖惠曰有人耳痒一日一作可畏直挑剔出血稍愈此乃腎臟虛致浮毒上攻未易以常法治也宜服透冰丹勿飲酒啖濕麵蔬菜雞猪之屬能盡一月爲佳不能戒無效

墨客揮犀蟲之類能入耳者不獨蜣蜋如壁虱螢火卽頭蟲皂莢蟲皆能入耳爲害余有外親曾爲蟲入耳自謂必死乃極其家所有恣情耗蕩凡數年家業遂破蟲出疾愈驗之乃卽頭蟲也又有人爲蜣蜋入耳遇其極時不覺以頭撞柱至血流不知云痒甚不可忍蜣蜋入耳往往食髓至冬又能滋生凡蟲入耳者惟用生油灌之爲妙

薛己醫案曰先君嘗睡間有蟲入耳痛聲將生囊擦猫鼻其尿自出取尿滴耳內蟲卽出而愈

百戶張錦謂予曰耳內生瘡不時作痛痛而欲死痛止如故診其脈皆安靜予謂非瘡也話間痛忽作予度其有蟲入耳令囘急取猫尿滴耳果出一臭蟲遂不復痛或用麻油滴之則蟲死難出或用炒芝麻枕之則蟲亦出但俱不及猫尿之速也

文選姚海山耳根赤腫寒熱作痛此屬三焦風熱也但中氣素虛以補中益氣加山梔炒黃芩牛蒡子治之而愈

一儒者因怒耳內作痛出水或用祛風之劑筋攣作痛肢體如束此肝火傷血也用六味丸料數服愈

舉人毛石峰子年二十耳內出水或作痛年餘矣脈洪數左尺益甚此屬肝腎二經虛熱也用加減八味丸料一劑而愈

一男子每入房耳內或作痒或出水常以銀簪探入甚喜陰涼此屬腎經熱也用加減八味丸而愈

一婦人因怒發熱每經行卽兩耳出膿兩太陽作痛以手按之痛稍止怒則胃脘乳房脹痛或寒熱往來或小便頻數或小腹脹悶此皆屬肝火血虛也先用梔子清肝散二劑又用加味逍遙散數劑諸證悉退又以補中益氣加五味而全愈

一婦人經行後因怒氣勞役卽發寒熱耳內作痛余以經行爲血虛用八珍湯加柴胡怒氣爲肝火用加味逍遙散勞役爲氣傷用補中益氣湯加山梔而愈

一婦人耳內作痛或腫潰寒熱面色素青黃經行則變赤余以爲怒氣傷肝鬱結傷脾用加味歸脾湯加味逍遙散而愈

一婦人耳內腫痛寒熱口苦耳內出水潰連頸項飲食少思此肝火甚而傷脾也用小柴胡湯加山梔牡丹皮稍愈用加味逍遙散及八珍湯加柴胡山梔牡丹皮調補肝脾而全愈

一婦或耳內外作痛或項側結核內熱晡熱月經不調唾痰少食胷膈不利余以爲鬱怒傷肝脾朝用歸脾湯以解脾鬱生脾氣夕用加味逍遙散以清肝火生肝血而愈

太卿魏莊渠癸卯仲冬耳內作痛左尺洪大而澀余曰此腎水枯竭不能生肝木當滋化源彼不信仍雜用衆補之劑余謂其壻陸時若曰莊渠不能生腎水來春必不能起至明年季春十八日復請治昏憒不語頤耳之分已有膿矣且卵縮便數方信余言求治辭不克用六味丸料壹鍾陰莖舒出小便十減六七神思頓醒余曰若砭膿出庶延數日爲立嗣之計否則膿從耳出死立待矣或謂不砭可生者余因辭歸翌日果耳內出膿至二十一日己未火日而卒

憲副姜時川癸卯冬右手寸口浮數而有痰口內若有奢然余曰此胃火傳於肺也當薄滋味愼起居以禦之甲辰秋尺脈洪數而無力余曰此腎金不能生腎水無根之火上炎也宜靜調養滋化源以治之彼云今喉耳不時燥痛咳體不時發熱果是無根之火殆無疑矣後會劉古峽云姜公之病已如脅料遂拉同往視候果腫潰脈愈洪大又誤以爲奢毒而投苦寒之劑卒於仲春二十八日乃藥之促其亡也否則尚能延至仲夏

一男子耳後漫腫作痛肉色不變脈微數以小柴胡湯加芎歸桔梗四劑腫少起更以托裏消毒散數劑脈滑數此膿已成矣宜針之彼畏而不肯用因痛極始針之出膿梳許以托裏藥兩月餘而始愈凡癒不起者托而起之不成膿者補而成之使不內攻膿成而及時針之不數日卽愈矣常見患者皆畏針痛而不肯用又有恐傷良肉而不肯用殊不知瘡雖發於

肉薄之所若膿成其腫亦高寸餘瘡皮又厚分許用針深不過二分若發於背腫高必有三四寸入針止於寸許況患處肉已壞矣何痛之有何傷之慮怯弱之人及患附骨疽待膿自遍以致大潰不能收斂氣血遂盡而亡者爲多矣

證治準繩曰一人勞倦耳下熾腫惡寒發熱頭疼作渴右脈大而軟當服補中益氣湯彼自用藥發散遂致嘔吐始信予用六君子湯更服補中益氣湯而愈大抵內傷榮衛失守皮膚間無氣滋養則不任風寒胃氣下陷則陽火上衝氣喘發熱頭痛脈大此不足證也誤作外感表實而反瀉之寧免虛虛之禍東垣云內傷右脈大外感左脈大當以此別之

一婦耳下腫痛發寒熱與荊防敗毒散四劑表證悉退以散腫潰堅湯數劑腫消大半再以神效瓜蔞散四劑而平

一人肝經風熱耳下腫痛熱脈浮數以薄荷丹治之而消

一婦因怒耳下腫痛以荊防敗毒散加連翹黃芩四劑而愈予嘗治此句日不消者以益氣血藥及飲遠志酒並效無膿自消有膿自潰

一婦因怒耳下熾痛頭痛寒熱以荊防敗毒散加黃芩表證悉退但飲食少思日晡發熱東垣云雖有虛熱不可大攻熱去則寒起遂以小柴胡加地骨皮芎藭茶朮陳皮十餘貼愈大年春後復腫堅不潰用八珍湯加香附柴胡地骨皮桔梗服至六七貼以爲延緩仍服人參敗毒散勢愈盛又服流氣飲則盜汗發熱口乾食少至秋復來診視氣血虛極辭之果歿

一人每怒耳下腫或脅作痛以小柴胡湯加青皮紅花桃仁四劑而愈

一女性急好怒耳下常腫痛發寒熱肝脈弦急投小柴胡湯加青皮牛蒡子荊芥防風而寒熱退更以小柴胡湯對四物湯數劑而腫消其又欲除病根予謂肝內主藏血外主榮筋若恚怒氣逆則傷肝肝主筋故筋蓄結而腫須要自加調攝庶可免患否則肝逆傷不能藏血血虛則難瘥矣後不戒果結三核屢用追蝕不斂而歿

一人遠途勞倦發熱脈大無力耳下患腫此勞損也宜補中益氣養榮湯自然熱退腫消彼不聽服降火藥及必效散果吐瀉不食而死夫勞倦損氣氣衰則火旺火乘脾土故倦怠而熱此元氣傷也丹溪曰宜補形氣調經脈其瘡自消不可汗下若不詳脈證經絡受病之異而輒用峻厲之劑鮮不危矣

迺府耳後髮際患腫一塊無頭肉色不變按之微痛予謂瘰結脈軟而時見數經曰脈數不時見瘰也非瘰也仲景云微弱之脈主血氣俱虛形精不足又曰沉遲軟弱皆宜托裏遂用參芪歸朮川芎炙甘草以托裏少加金銀花白芷桔梗以消毒彼謂不然內飲降火消瘰外貼涼藥覺寒徹腦患處大熱頭愈重食愈少復請治以四君子湯加藿香炮乾薑數劑食漸進膿成刺之更以十全大補湯去桂炙以豆豉餅又月餘而愈

羅宗伯耳後髮際患毒熾痛脈數以小柴胡湯加桔梗牛蒡子金銀花四劑而愈

一人耳後患毒脈證俱實宜用內疏黃連湯彼以嚴冬不服寒劑竟至不起

一人耳後寸餘發一毒名曰銳疽熾痛寒熱煩躁喜冷此膽經蘊熱而然先用神仙活命飲一劑勢減二三時值仲冬彼惑於用寒之禁自用十宣托裏之藥勢漸熾耳內膿潰喉腫閉藥不能下而歿

寓意草曰王王原昔年感證治之不善一身津液盡爲邪熱所鑠究竟十餘年熱未盡去右耳之竅常閉今夏復病感纏綿五十多日面足浮腫臥寐不寧耳間氣往外觸蓋新熱與舊熱相合狠狽爲患是以難於去體豐者不察其綢繆膠結之情治之苦不中窾延至秋深金寒水冷病方自退然淺者可退深者莫繇遽退也面足浮腫者肺金之氣爲熱所壅失其清肅下行之權也臥寐不寧者胃中之津液乾枯不能內榮其魂魄也耳間大氣撞出者久閉之竅氣來不覺今病體虛羸中無阻隔氣逆上衝始知之也外病雖愈而飲食藥餌之內調者尚居其半特挈二事大意爲凡病感者明善後之法爲蓋人當感後身中之元氣已虛身中之邪熱未淨於此而補虛則熱不可除於此而清熱則虛不能任即一半補虛一半清熱終屬模糊不得要領然舍補虛清熱外更無別法當細辨之補虛有二法一補脾一補胃如瘧痢後脾氣衰弱飲食不能運化宜補其脾傷寒後胃中津液久耗新者未生宜補其胃二者有霄壤之殊也清熱亦有二法初病之時熱爲實熱宜用苦寒藥清之大病後之熱爲虛熱宜用甘寒藥清之二者亦霄壤之殊也人身天真之氣全在胃口津液不足即是虛生津液即是補虛故以生津之藥合甘寒瀉熱之藥而治

感後之虛熱如麥門冬生地黃牡丹皮人參梨汁竹瀝之屬皆爲合法仲景每用天水散以清虛熱正取滑石甘草一甘一寒之義也設誤投參芪苓朮補脾之藥爲補導不併邪熱而補之乎至於飲食之補但取其氣不取其味加五穀之氣以養之五菜之氣以充之每食之間便覺津津汗透將身中蘊蓄之邪熱以漸運出於毛孔何其快哉人皆不知此理急於用肥甘之味以補之目下雖精采健旺可喜不思油膩阻滯經絡邪熱不能外出久久充養完固愈無出期矣前哲有鑑於此尊食淡茹蔬使體暫虛而邪易出乃爲貴耳前藥中以浮萍屬脾用苓朮爲治以不寐責心用棗仁茯神爲治總以補虛清熱之旨未明故詳及之

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百五十八卷目錄

醫部彙考一百三十八

目門一

黃帝素問　金匱真言論　生氣通天論　評熱病論　風論　氣交變大論　五常政大論　六元正紀大論　至眞要大論　診要經終論　脈要精微論　平人氣象論　玉機眞藏論　三部九候論　經脈別論　藏氣法時論　宣明五氣篇　血氣形志篇　經脈篇　脈度篇　五藏生成篇　五色篇　玉版論要篇　診解篇　陰陽別論　陰陽應象大論　陰陽離合論　陰陽類論　方盛衰論　脈解篇　熱論　刺熱篇　評熱病論　逆調論　邪氣藏府病形篇　標本病傳論　天元紀大論　五運行大論　六微旨大

註 少陰在泉卯酉歲也目瞑者熱甚陰虛畏陽光也

陽明司天燥淫所勝筋骨內變民病左胠脅痛寒清於中感而瘧大涼革候欬腹中鳴注泄鶩溏心脅暴痛不可反側嗌乾面塵腰痛丈夫癩疝婦人少腹痛目昧皆傷

註 陽明司天卯酉歲也燥金淫勝於上則肝血傷而不能榮於目故目昧皆傷

太陽司天寒淫所勝血變於中發爲癰瘍民病厥心痛嘔血血泄鼽衄善悲時眩仆胃腹滿手熱肘攣腋腫心澹澹大動胃脘不安面赤目黃善噫嗌乾

註 太陽司天辰戌歲也太陽爲諸陽之首即君火之陽然本於在下之寒水今寒氣反從上而至是上下皆寒而太陽運居於中寒凌心火逼其火熱上炎故面赤目黃善噫嗌乾

帝曰六氣相勝奈何岐伯曰少陽之勝熱客於胃煩心心痛目赤欲嘔嘔酸善饑耳痛溺赤善驚諺妄暴熱消鑠少腹痛下沃赤白帝曰六氣之復奈何岐伯曰少陽之復大熱將至枯燥燔爇驚瘛欬衄心熱煩躁便數憎風厥氣上行面如浮埃目乃瞤瘛火氣內發上爲口糜嘔逆血溢血泄發而爲瘧惡寒鼓慄寒極反熱嗌絡焦槁渴飲水漿色變黃赤少氣脈萎化而爲水傳爲胕腫甚則入肺欬而血泄尺澤絕死不治

註 少陽之氣舍於三焦故熱客於胃蓋三焦之原皆出於胃間也三焦之脈上入耳中絡目銳眥故淫上而爲耳痛目赤少陽之火復發於秋冬之時是以枯燥燔爇驚瘛欬衄熱乘心肺也便數憎風表裏皆熱也面如浮埃面微有塵也手足少陽之脈皆上系於目故目乃瞤瘛

少陰司天客勝則鼽嚏頸項強肩背脊熱頭痛少氣發熱耳聾目瞑

註 少陰司天二之氣乃厥陰風木目瞑諸證厥陰之氣勝也

診要經終論

太陽之脈其終也戴眼反折瘛瘲其色白絕汗乃出出則死矣

註 戴眼目上視也反折背反張也瘛瘲手足屈伸也陽氣者柔則養筋太陽之經氣已絕是以筋脈急而戴眼反折手足牽引也手太陽主液膀胱者津液之所藏絕汗者津液外亡也色白者亡血也津液外脫則血內亡矣

少陽終者耳聾百節皆縱目睘絕系絕系一日半死其死也色先青白乃死矣

註 手足少陽經脈皆循於耳經氣絕故耳聾少陽主骨諸節皆屬於骨少陽氣終故百節皆縱手足少陽之脈皆至目銳眥終則牽引於目故目如驚而邪視也系絕目絕系也系絕則志先絕故一日半而死青者甲木之氣外脫白者三焦之榮內亡也

陽明終者口目動作善驚妄言色黃其上下經盛不仁則終矣

註 手足陽明之脈皆挾口承目故口目動作而牽引歪斜色黃陽明之土氣外脫也上下經盛胃氣已絕而無柔和之氣肌膚不仁者榮衛之氣外絕也

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

十二經脈三百六十五絡其血氣皆上於面而走空竅其精陽氣上走於目而爲睛

註 夫十二經脈三百六十五絡之血氣始於足少陰腎生於足陽明胃主於手少陰心朝於手太陰肺精陽氣者心腎神精之氣上走於目而爲睛腎脈微滑爲骨痿坐不能起則目無所見

註 骨痿坐不起熱傷腎氣也目無所見熱傷骨精也

經脈篇

大腸手陽明之脈是主津液所生病者目黃口乾鼽衄喉痹肩前臑痛大指次指不用

註 津液竭則火熱盛故目黃口乾鼽衄喉痹諸證皆大腸經脈所循之部分病也

心手少陰之脈是主心所生病者目黃脅痛臑臂內後廉痛厥掌中熱痛

註 心系上系於目心火盛故目黃臑臂掌中皆心脈所循之部分心病而外及於經脈也

小腸手太陽之脈是主液所生病者耳聾目黃頰腫頸頷肩臑肘臂外後廉痛

註 耳聾目黃頰腫諸證皆經脈所循之部分而爲病也

膀胱足太陽之脈是動則病衝頭痛目似脫項如拔脊痛腰似折髀不可以曲腘如結踹如裂是爲踝厥

是主筋所生病者痓瘛狂癲疾頭顱項痛目黃泪出

註衝頭痛目似脫諸證病在太陽之氣也目黃泪出皆經脈所循之部分而爲病也

心主手厥陰心包絡之脈是動則病心中熱甚則憺憺大動面赤目黃喜笑不休

註心中熱諸證經氣之爲病也

三焦手少陽之脈是主氣所生病者汗出目銳眥痛頰腫耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不用

註少陽乃一陽初生之氣故主氣所生病者汗出目銳眥痛等證皆經脈所循之部分而爲病也

膽足少陽之脈是主骨所生病者頭痛頷痛目銳眥痛

註頭痛諸證乃經脈所循之部分而爲病也

五陰氣俱絕則目系轉轉則目運目運者爲志先死志先死則一日半死矣

註心系上繫於目系目系轉者心氣將絕也火之精爲神水之精爲志神生於精火生於水故志死而神先絕也一日半者一二日之間陰陽水火之氣終於天地始生之數也

脈度篇

蹻脈氣不榮則目不合

註謂流溢於脈外之氣不榮於目也

癲狂篇

目眥外決於面者爲銳眥在內近鼻者爲內眥上爲外眥下爲內眥

註眥謂四際瞼睫之本也

狂目妄見耳妄聞善呼者少氣之所生也

註心腎水火之氣上下相濟腎氣少則心氣亦虛矣心腎氣虛是以目妄見耳妄聞善呼者虛氣之所發也

熱病篇

熱病目不明熱不已者死

註此內熱甚而外內不清也

師傳篇

肝者主爲將使之候外欲知堅固視目小大

註肝乃將軍之官故主爲將堅固者五臟之有堅脆也

目下果大其膽乃橫

註目乃肝之竅故目下以候膽

決氣篇

氣脫者目不明

註目之精明五色者氣之華故氣脫則目不明

五癃津液別篇

五臟六腑心爲之主耳爲之聽目爲之候肺爲之相肝爲之將脾爲之衛腎爲之主外故五臟六腑之精液盡上滲於目心悲氣并則心系急心系急則肺舉肺舉則液上溢夫心系與肺不能盡舉乍上乍下故泣而出矣

註心爲君主之官乃五臟六腑之主耳目者上之空竅津液之所注也將相衙者爲君主之臣使也腎主外者腎主藏津液所以灌精濡空竅者也心悲氣并者心悲則臟腑之氣皆上并於心聽令於君主也氣并於心則心系急心系急則肺舉肺乃心之蓋也肺舉則液上溢肺主氣而水隨氣行也心系與肺不能盡舉乍上乍下下則爲泣上則泣出矣

五閱五使篇

目者肝之官也肝病者皆青

註官之爲言司也言閱所司之色則知其臟之病矣

論疾診尺篇

視人之目窠上微癰如新臥起狀其頸脈動時欬按其手足上窅而不起者風水腹脹也

註足太陽之脈起於兩目而下出於頸項太陽之上寒水主之太陽之氣運行於膚表此水隨氣而溢於皮膚之間故目窠微腫頸脈動而腹脹欬者水蓄於皮毛而動其肺氣也風水者因外受於風風行而水湧也

目赤色者病在心白在肺青在肝黃在脾黑在腎黃色不可名者病在胃中

註此以目色而候五臟之血氣也五臟之血氣行於脈中而變見於寸口五臟之血氣變見於色而出於目中蓋五臟之精皆上注於目而爲之睛也前節視目窠以知皮膚之水此節視目色以知五臟之陰皆從外以知內也黃色不可名者色黃而有黑白青赤之間色也病在胃中者五臟之氣皆從內腦而出故所見之色若是

診目痛赤脈從上下者太陽病從下上者陽明病從外走內者少陽病

註太陽爲目上綱故目脈從上下者主太陽病陽明爲目下綱故從下上者主陽明病少陽之脈循

目鉄眥故從外走內者主少陽病上節視目色以知五藏之陰此診目脈以知三陽之氣夫色爲陽脈爲陰此陰陽之變換也

衛氣行篇

平旦陰盡陽氣出於目目張則氣上行於頭夜則氣行於陰而復合於目

註平旦氣出於陽而目張暮則氣入於陰而目瞑

大惑論

帝曰予嘗上於清冷之臺中階而顧衢而前則惑予私異之竊內怪之獨瞑獨視安心定氣久而不解獨博獨眩髮長跪俛而視之後久之不已也卒然自上何氣使然岐伯對曰五藏六腑之精氣皆上注於目而爲之精精之窠爲眼骨之精爲瞳子筋之精爲黑眼血之精爲絡其窠氣之精爲白眼肌肉之精爲約束裹撷筋骨血氣之精而與脈并爲系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢其身之虛其入深則隨眼系以入於腦入於腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目眩以轉矣邪其精所中不相比也則精散精散則視岐視岐見兩物目者五藏六腑之精也營衛魂魄之所常營也神氣之所生也故神勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑眼法於陰白眼赤脈法於陽也故陰陽合傳而睛明也目者心之使也心者神之舍也故神精亂而不轉卒然見非常處精神魂魄散不相得故曰惑也

註清冷之臺東苑之臺名也惑眩亂也精精明也

窠藏也眼者瞳子黑白之總名也骨之精爲瞳子腎之精也筋之精爲黑眼肝之精也血之精爲絡心之精也窠氣之精爲白眼肺之精也約束者目之上下綱肌肉之精爲拘束脾之精也裹撷筋骨血氣之精心主包絡之精也包絡之精與脈并爲目系上屬於腦後出於項中是諸脈皆上系於目會於腦出於項此脈系從下而上從前而後也若邪中於項則隨眼系入於腦入於腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目眩以轉矣邪其精者其精爲邪所中則不相比密而精散矣精散則視岐而見兩物矣夫心藏神腎藏志肝藏魂肺藏魄脾藏意此五藏所藏之神志也目者五藏六腑之精也是故瞳子黑眼法於陰白眼赤脈法於陽故陰陽相合傳於目而睛明也夫心者五藏之專精也目者其竅也華色者心之榮也故目乃心之使心者神之舍也神精亂而不轉則卒然見非常處精神魂魄散不相得故曰惑也

海論

髓海不足則腦轉耳鳴脛痠眩冒目無所見懈怠安臥

註髓海不足則精液竭精液者所以濡空竅者也是以耳爲之鳴目無所見液脫者骨屬屈伸不利故脛痠而懈怠安臥

扁鵲難經

目盲

二十難曰脫陽者見鬼脫陰者目盲

目瞑

二十四難曰三陰氣俱絕者則目眩轉目瞑目瞑者爲失志失志者則志先死死卽目瞑也

漢張機金匱要略

目瞑

男子脈虛沉弦無寒熱短氣裏急小便不利面色白時目瞑兼衄少腹滿此爲勞使之然

目黯

五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷房室傷飢傷勞傷經絡榮衛氣傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑緩中補虛大黃䗪蟲圓主之

目眩

夫失精家少腹弦急陰頭寒目眩髮落脈極虛芤遲爲清穀亡血失精桂枝龍骨牡蠣湯主之

目赤

病者身熱足寒頸項强急惡寒時頭熱面赤目赤獨頭動搖卒口噤背反張者痙病也若發其汗者寒濕相得其表益虛卽惡寒甚發其汗已其脈如蛇病者脈數無熱微煩默默但欲臥汗出初得之三四日目赤如鴿眼七八日目四眥黑若能食者膿已成也赤小豆當歸散主之

目泣

腸上病痩滿喘欬吐發則寒熱背痛腰疼目泣自出其人振振身瞤劇必有伏飲

目暈黃

尺脈浮目睛暈黃衄未止暈黃去目睛慧了知衄今止

目不識人

寸口脈浮而緊緊則爲寒浮則爲虛寒虛相搏邪在皮膚浮者血虛絡脈空虛賊邪不瀉或左或右邪氣

反緩正氣卽急正氣引邪喎僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經卽重不勝邪入於腑卽不識人邪入於臟舌卽難言口吐涎

直視不能眴

衄家不可汗汗出必額上陷脈緊急直視不能眴不得眠

目如脫

欬而上氣此爲肺脹其人喘目如脫狀脈浮大者越婢加半夏湯主之

目腫

寸口脈沉滑者中有水氣面目腫大有熱名曰風水視人之目裏上微擁如蠶新臥起狀其頸脈動時時欬按其手足上陷而不起者風水

夫水病人目下有臥蠶面目鮮澤脈伏其人消渴病水腹大小便不利其脈沉絕者有水可下之

華佗中藏經

察目色以辨死候

黑色起於耳目鼻上漸入於口者死赤色見於耳目額者五日死黑白色入口鼻目中者五日死面青目黑者死面白目黑者十日死面赤眼黃卽時死面黑目白者八日死面青目黃者五日死頭目久痛卒視不明者死面黑直視者死面青目白者死面黃目白者死面目俱白者死面目青黑者死陰陽俱絕目眶陷者死榮衛耗散面目浮腫者死心絕於腎肩息回盼目直者一日死肝絕汗出如水恐懼不安伏臥目直面青者八日死又曰卽時死

晉王叔和脈訣

目病脈

三部俱弦肝有餘目中疼痛苦痃虛怒氣滿胷常欲叫醫蒙瞳子淚如珠

肝耎并弦本沒邪緊因筋急有些些細看浮大更兼實赤痛昏昏似物遮溢關過寸口相應目眩頭重與筋疼芤時眼暗或吐血四肢癱瘓不能行濇則緣虛血散之肋脹脅滿自應知滑因肝熱連頭目緊實弦沉痃癖基微弱浮散氣作難目暗生花不耐看

三部俱浮肺臟風鼻中多水唾稠濃壯熱惡寒皮肉痛嗓乾雙目淚酸疼

積氣胷中寸脈伏當關腸癖常瞑目

察目色以辨病之生死

欲愈之病目眥黃眼胞忽陷定知亡耳目口鼻黑色起入口十死七難當面黃目青酒亂頻邪風在胃衰其身面黑目白命門敗困極八日死來侵面色忽然望之青進之如黑卒難當面赤目白憂息氣待過十日定存亡面赤目青衆惡傷榮衛不通立須亡黃黑白色起入目更兼口鼻有災殃面青目黃中時死餘候須看兩日强目無精光齒齦黑面白目黑亦災殃肩息直視及脣焦面腫蒼黑也難逃

面腫蒼黑舌卷青四肢乏力眼如盲泣下不止是肝絕八日應當命必傾

面黑齒痛目如盲自汗如水腰折頻皮肉濡却髮無澤四日應當命不存

唐孫思邈千金方

病因并治法

凡人年四十五已後漸覺眼暗至六十已後還漸目明治之法五十已前可服瀉肝湯五十已後不可瀉肝目中有疾可傅石膽散等藥無病不可輒傅但補肝而已目病肝中有風熱令人眼昏暗者當灸肝腧及服除風湯圓散數十劑當愈

生食五辛　接熱飲食　熱餐麪食　飲酒不已

房室無節　極目遠視　數看日月　夜視星火

夜讀細書　月下看書　抄寫多年　雕鏤細作

博奕不休　久處烟火　泣淚過多　刺頭出血多

右十六件並是喪明之本養性之士宜熟愼焉又有馳騁畋獵冒涉風霜迎風追獸日夜不息亦是傷目之媒也恣一時之浮意爲百年之痼疾可不愼歟凡人少時不自將愼年至四十卽漸昏暗若能依此愼護可得白首無他所以人年四十已去常須瞑目勿顧他視非有要事不宜輒開此一術愼護之極也其讀書博奕等過度患目者名曰肝勞若欲治之非二年閉目不視不可得瘥徒自瀉肝及作諸治終是無效人有風疹必多眼昏先攻其風其暗自愈

鼻洞者濁下不止傳爲鼽瞢瞑目得之氣厥足陽明有俠鼻入於面者名曰懸顱屬口對入係目本視有過者取之損有餘益不足反者益甚足太陽有通項入於腦者正屬目本名曰眼系頭目苦痛取之在項兩筋間入腦乃別陰蹻陰陽相交陽入陰出陽交於銳眥陽氣盛則瞋目陰氣絕則瞑目

宋楊士瀛直指方

眼屬五臟

首尾赤眥屬心滿眼白睛屬肺其烏睛圓大屬肝其上下肉胞屬脾而中間黑瞳一點如漆者腎實主之

目爲肝之外候

目者肝之外候肝取木腎取水水能生木子母相合故肝腎之氣充則精彩光明肝腎之氣乏則昏蒙運乾心者神之舍又所以爲肝腎之副焉蓋心主血肝藏血血能生熱凡熱衝發於眼皆當清心凉肝

風熱

風腫則軟熱腫則硬烏輪突起裏熱刺痛爲熱眼大凡眼患多生於熱治法以清心凉肝調血順氣爲先

眼胞合

熱氣蓄聚而傷胞所以胞合宜羚羊角散洗眼湯

自生腎

凡腎起於肺家受熱輕則朦朧重則生翳難腎自熱生然治法先退腎而後退熱者謂熱極生腎若先去赤熱則血爲之冰而腎不能去矣

偷鍼

脾間積熱兼宿食不消則生偷鍼泰皮剉和砂糖煎水調大黃末一錢服利之即消

服眼藥法

凡補腎治眼之藥必須於五更初腎氣開未言語前服之乃效

嚴用和濟生方

目病論治

經云五藏六腑之精氣皆上注於目而爲之精精之窠爲眼骨之精爲瞳子屬腎筋之精爲黑眼屬肝血之精爲絡裏屬心氣之精爲白睛屬肺肉之精爲約束屬脾眼通五藏氣貫五輪由此觀之人能善自調攝養氣存神安心惜視然後心氣通暢肝氣和平精氣上注於目則目不致有疾矣倘將養失宜六淫外傷七情內鬱嗜慾不節飲食無度徹夜奕博熱啖煎炙久視勤書憂鬱悲泣皆能病目目之爲病睛之色赤者病在心色白者病在肺色青者病在肝色黃者病在脾色黑者病在腎方論載有五輪八廓內障外障青盲雀盲倒睫拳毛努肉攀睛風沿爛眼能近視不能遠視能遠視不能近視等證茲不及備敘治之之法須洞察形證細究根源自無失誤病眼之人切忌當風看日喜怒房勞飲酒食熱惟當寬緩情性謹慎調護自無不痊矣

寶漢卿瘡瘍全書

上下眼丹

此毒受在心肝氣毒上攻壅而聚此丹毒當用清心流氣飲治之兼服黃連敗毒丸外敷搽藥

漏睛瘡

夫漏睛瘡者肝臟毒氣小腸邪風外攻腎端灌於瞳人初生疼痒漸成膿水其色如痘日久睛皆氣敗肝絕難救之證慎之宜先服黃芪當歸川芎生地白芍黃芩薄荷荊芥連翹白芷升麻桔梗天花粉之類次用黃連地骨皮當歸煎湯溫洗治方關要惟補腎宣肝爲急不可輕視也

金劉完素六書

眼論

素問云目得血而能視手得血而能握其證足厥陰之經絡所主也肝臟若受虛而即補腎實而即瀉心夫人之眼目者似天地之日月也若人無雙目豈能辨別賢愚天無日月萬物安能照耀是以眼通五臟氣貫五輪外應肝候肝臟虛而風邪鬱風邪鬱而熱蘊衝火炎上行故攻目昏澁瘀痛赤絲皆發榮衛實則能視榮衛虛則昏暗凡人多餐熱物或嗜食五辛坐濕當風凌寒冒暑將息失度者皆衰目之源也

目泣

風氣與陽明入胃循脈上目皆津液所生爲泣也

目黃

風氣與陽明入胃循脈而上目皆肥人氣不外洩爲熱中目黃之病也

風眼寒證

風入系頭則血脈凝滯不能上下通流於目令風寒客之爲風眼寒也

目盲

陽氣煩勞積於夏令人熱厥目盲不可視耳閉不可聽人參散主之

目瞑

膽受胃熱循脈而上於腦陽絡溢血妄行在鼻竅則衄蟁目瞑者定命散主之

論目昏赤腫腎膜皆屬於熱

目昧不明目赤腫痛腎膜皆瘍皆爲熱也及目瞑俗謂之眼黑亦爲熱也然平白日無所見者熱氣鬱之甚也或言目昧爲肝腎虛冷者誤也是以妄謂肝主於目腎主瞳子故妄言目昧爲虛而冷也然腎水多陰也虛則當熱肝木春陽也虛則當冷腎陰肝陽豈能同虛而爲冷者歟或通言肝腎之中陰實陽虛而無由目昧也俗妄謂肝腎之氣衰少而不能至於目也不知經言熱甚目瞑眼黑也豈由寒爾又如仲景

言傷寒病熱極則不識人乃目盲也正理曰由熱甚怫鬱於目而致之然也然皮膚之汗孔者謂泄氣液之孔竅也一名氣門謂泄氣之門也一名腠理者謂氣液出行之腠道紋理也一名鬼神門者謂幽冥之門也一名元府者謂元微府也然元府者無物不有人之臟腑皮毛肌肉筋膜骨髓爪牙至於世之萬物盡皆有之乃氣出入升降之道路門戶也夫氣者形之主神之母三才之本萬物之元道之變也故元陽子解清靜經曰大道無形非氣不足以長養萬物由是氣化則物生氣變則物易氣甚即物壯氣弱即物衰氣正即物和氣亂即物病氣絕即物死經曰出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危故非出入則無以生長化收藏是以升降出入無氣不有人之眼耳鼻舌身意神識能爲用者皆由升降出入之通利也有所閉塞者不能爲用也若目無所見耳無所聞鼻不聞臭舌不知味筋痿骨痹齒腐毛髮墮落皮膚不仁腸不能滲泄者悉由熱氣怫鬱元府閉密而致氣液血脈榮衛精神不能升降出入故也各隨鬱結微甚而察病之輕重也故知熱鬱於目無所見也故目微昏者至近則轉難辨物由目之元府閉小也隔緜視物之象也或視如蠅翼者元府有所閉合者也或目昏而見黑花者由熱氣甚而發於目亢則害承乃制而反出其泣氣液昧之以其至近故雖視而亦見如黑花也及衝風泣而目暗者由熱甚而水化制之也故經言厥則目無所見夫人厥則陽氣并於上陰氣并於下陽氣并於上則火獨光也陰氣并於下則足寒足寒則腫也夫一水不勝五火故目嘗而盲是以衝風泣下而不止夫風之中於目也陽氣內守於睛是火氣燔目故見風泣下

論目分表裏易治難治辨

眼之爲病在腑則爲表當除風散熱在臟則爲裏宜養血安神暴發者爲表而易治久病者在裏而難愈除風散熱者瀉青丸主之養血安神者定志丸婦人熟乾地黃丸是也或有體肥氣盛風熱上行目皆澀者槐子散主之此由胃中氣濁上行也重則爲痰厥亦能損目常使胃中氣清無此病也又有因目疾服藥多而損氣者久之眼漸昏弱乍明乍暗不欲視物此目少血之驗也熟乾地黃丸消風散定志丸相須而養之或有視物不明見黑花者此謂之腎氣弱也宜補腎水駐景丸是也或有暴失明者謂眼居諸陽交之會也而陰反閉之此風邪內滿當有不測之疾也腎膜者風熱重而有之或斑入眼此肝氣盛而發在表也腎膜已生在表明矣當發散而去之反疏利則邪氣內蓄爲腎則深也邪氣未定謂之熱腎而浮邪氣已定謂之冰腎而沉邪氣牢而深者謂之陷腎當以漸發之物使其邪氣再動腎膜乃浮輔以退腎之藥則自去也病久者不能速效當以歲月除之成無已明理論

目直視

傷寒直視何以明之直視者視物而目睛不轉動者是也若目睛轉者非直視也水之精爲志火之精爲神目者心之使也神所寓焉肝之外候也精神榮焉鍼經曰五臟六腑之氣皆上注於目而爲之精精之窠爲眼骨之精爲瞳子筋之精爲黑睛血之精爲絡氣之精爲白睛肌肉之精爲約束裏撚筋骨血氣之精與脈并爲系上屬於腦五臟血氣調和精氣充榮則目和而明矣傷寒目直視者邪氣擁盛冒其正氣使神智不慧臟精之氣不上榮於目則目爲之直視傷寒至於直視爲邪氣已極證候已逆多難治經曰衄家不可發汗汗出則額上陷脈急緊直視不能眴不得眠以肝受血而能視亡血家肝氣已虛目氣已弱又發汗亡陽則陰陽俱虛所致也此雖錯逆其未甚也逮乎狂言反目直視又爲腎絕直視搖頭又爲心絕皆臟氣脫絕也直視讝語喘滿者死下利者亦死又劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脈弦者生濇者死皆邪氣盛而正氣脫也其或有目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者是非直視也此爲內實也可用大承氣湯大柴胡湯下之直視爲不治之疾目中不了了爲可治之候二者形證相近其爲工者宜熟視之

元張從政儒門事親

風衝泣下

夫風衝泣下者俗呼風冷淚者是也內經曰太陽經不禁固也又曰熱則五液皆出肝熱故淚出風衝於外火發於內風火相搏出此泣下也治之以貝母一枚白斂者胡椒七粒不犯銅鐵研細臨臥點之愈聖人雖言目得血而能視然血亦有太過不及也太過則目壅塞而發痛不及則目耗竭而失明故年少之人多太過年老之人多不及然年少之人間有不及而年老之人其間亦有太過者不可不察也夫目之內皆太陽經之所起血多氣少目之銳皆少陽經

也血少氣多目之上綱太陽經也亦血多氣少目之下綱陽明經也血氣俱多然陽明經起於目兩旁交頞之中與太陽少陽俱會於目惟足厥陰肝經連於目系而已故血太過者太陽陽明之實也血不及者厥陰之虛也故出血者宜太陽陽明蓋此二經血多故也少陽一經不宜出血血少故也刺太陽陽明出血則目愈明刺少陽出血則目愈昏要知無使太過不及以血養目而已凡血之爲物太多則溢太少則枯人熱則血行疾而多寒則血行遲而少此常理也目者肝之外候也肝主目在五行屬木木之爲物太茂而蔽密太衰而枯瘁矣夫目之五輪乃五臟六腑之精華宗脈之所聚其白睛屬肺金肉輪屬脾土赤脈屬心火黑水神光屬腎水兼屬肝木此世俗皆知之矣及有目疾而不知病之理豈知目不因火則不病何以言之白輪變赤火乘肺也肉輪赤腫火乘脾也黑水神光被腎火乘肝與腎也赤脈貫目火自甚也能治火者一句可了故內經曰熱勝則腫凡目暴赤腫起羞明隱澁淚出不止暴腎目瞼皆火熱之所爲也治火之法在藥則藏寒吐之下之在鍼則神庭上星顖會前頂百會血之腎者可使立退痛者可使立已昧者可使立明腫者可使立消惟小兒不可刺顖會爲肉分淺薄恐傷其骨然小兒木在上火在下故目明老人火在上水不足故目昏內經曰血實者宜決之又經曰虛者補之實者瀉之如雀目不能夜視及內障暴怒大憂之所致也皆肝主目血少禁出血止宜補肝養腎至於暴赤腫痛皆宜以鈹鍼刺前五穴出血而已次調隱油以塗髮根甚者雖至於再

至於二可也量其病勢以平爲期

經云風氣與陽明入胃循脈而上至目內皆則寒中而泣出此中風寒淚出也河間當歸湯主之東垣云水附木勢土爲眼澁爲眵爲冷淚此皆由肺金之虛而肝木寡於畏也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百五十九卷目錄
醫部彙考一百三十九
目門二
李杲十書 瞳子散大 青白腎 倒睫拳毛 諸脈者皆屬於目論 目赤腫盛 陽虛以致目病 能近視不能遠視 能遠視不能近視
朱震亨心法 治目睛昏痛
危亦林得效方 氣輪 風輪 肉輪 血輪 水輪 天廓 地廓 大瞼 木廓 風廓 胃廓 山廓 澤廓 內障二十三證 目證 浮腎 沉腎 偏月腎 寒花腎 黑花腎 瓦斯變 雷頭風 黃心腎 胎患 青風內障 綠風烏風 黑風 肝虛目暗 高風雀目 混睛 外障四十五證 肝厥 筋熱 努肉 攀睛 黑睛如珠 雨晦 釘睛 陷睛 水翻深 玉腎 浮漏 願逆生 花腎 白陷 水翻深 玉腎 浮漏 願逆生 腎虛 視物 雞肉 睛翳 蟹睛 疼痛 笑起 瞳高 風起 鳴偏 睛翳 出蟹睛 疼痛 笑起 瞳高 風起 鳴偏 瞼垂 睜不開 風牽 瞼蠕動 瞼轉筋 瞼腫 瞼硬 瞼癢 瞼瘡 瞼赤爛 瞼風 瞼生瘡 瞼生瘡 瞼生瘡

不明矣夫五臟六腑之精氣皆禀受於脾上貫於目脾者諸陰之首也目者血脈之宗也故脾虛則五臟之精氣皆失所司不能辯明於目矣心者君火也主人之神宜靜而安相火化行其令相火者包絡也主百脈皆榮於目既勞役運動勢乃妄行又因邪氣所并而損血脈故諸病生焉凡醫者不理脾胃及養血安神治標不治本是不明正理也

肝木旺則火之勝無所畏懼而妄行也故脾胃先受之或病目而生內障者脾攝血胃主血心主脈脈者血之府也或曰心主血又曰脈主血肝之竅開於目也治法以地黃丸當歸湯之類是也

目赤

發熱惡熱而渴但目赤者病藏也手太陰肺不足不能管領陽氣也宜以枸杞生地黃熟地黃之類主之脈洪大甚則嘔血先有形也

陰盛陽虛以致目病

陽不勝其陰乃陰盛陽虛則九竅不通令青白醫見於大皆乃足太陽少陰經中鬱遏足厥陰肝經氣不得上通於目故青白醫內阻也當於太陽少陰經中九原之下以益肝中陽氣衝天上行此當先補其陽後於足太陽太陰標中瀉足厥陰肝經火下伏於陽中乃久治也經云陰盛陽虛則當先補其陽後瀉其陰此治法是也每日清晨以腹中無宿食服補陽湯食遠服泄陰丸臨臥服連藥益陰丸若天色變經大寒大風并大勞役或飲食不調精神不足或氣弱俱不得服候體氣和平天氣如常服之先補其陽使陽氣上升過於肝經之末利空竅於眼目矣

能近視不能遠視

能近視不能遠視者陽氣不足陰氣有餘乃氣虛而血盛也血盛者陰火有餘也氣虛者元氣虛弱也此老人桑榆之象也

能遠視不能近視

能遠視不能近視者陽氣有餘陰氣不足也乃血虛氣盛血虛氣盛者皆火有餘元氣不足火者元氣穀氣眞氣之賊也元氣之來也徐而和細如線邪氣之來也緊而強如巨川之流不可遏也

朱震亨心法

治目睛腎痛

眼黑睛有腎皆用黃蘗知母

眼睛痛知母黃蘗瀉腎火當歸養陰水

眼中風淚出食後吞龍荅丸數錢日三次

冬月眼暴發痛亦當解散不宜用凉藥

目昏屬血少神勞腎虛也宜養血補水安神以調之

凡昏弱不欲視物內障見黑花瞳子散大皆裏病也

眼疾所因不過虛實二者而已虛者眼目昏花腎經眞水之微也實者眼目腫痛肝經風熱之甚也實則散其風熱虛則滋其眞陰虛實相因則散熱滋陰兼之此內治之法也至於日久熱壅血凝而爲攀睛瘀肉腎膜赤爛之類不假點洗外治之法則何由而得痊乎

大槩眼病屬風熱與血少神勞腎虛

危亦林得效方

氣輪

病因凌寒冒暑愛飲寒漿肌體虛疎寒邪入內其候或痛或昏僂在白睛筋多腫赤視日如隔霧看物似生煙日久不治變成白膜黑暗難開

風輪

病因喜怒不常作勞用心晝視遠物夜讀細書其候皆頭尤澀睛內偏疼視物不明胞弦緊急宜去風藥

肉輪

病因多食熱物好喫五辛遠道奔馳食飽耽眠風積痰壅其候眼胞赤腫昏蒙多淚倒睫澀痛瘀血侵睛宜疎風醒脾藥

血輪

病因七情煩勞內動於心外攻於目其候赤筋纏睛白膜侵睛胞腫難開昏澀日久不治失明愈深宜洗心凉血藥

水輪

病因勞役過度嗜慾無厭內傷七情加之多餐酒麵好啖鹹辛因動腎經通於黑水其候冷淚鎮流於瞼上飛蠅相逐於睛前積聚風盛或澀或痒結成腎障常多昏暗宜用補腎藥

天廂

病因雲中射鴈月下看書多食腥膻侵冒寒暑其候視物生烟皆疼難開不能辨認

地廂

病因濕瘡頭上冷灌睛眸其候眼弦緊急瘀血生瘡

火廂

病因心神恐怖赤脈侵睛血灌瞳人其候瞼頭紅腫睛內偏疼熱淚如傾

水廂

病因勞力爭鬬擊棒開弓驟騎强力生病其候常多昏暗睛弦淚多

風廓

病因枕邊窻穴有風不能遮閉坐臥當之腦中風邪其候黑睛多痒兩瞼常爛或昏多淚

雷廓

病因失枕睡臥酒後行房血脈滿溢風邪內聚其候眥頭赤腫瞼內生瘡倒睫牽毛遮睛努肉

山廓

病因擡刺磕損致令肉生兩瞼瞤閉雙睛若不早治永沉昏暗瘀血侵睛

澤廓

病因春不宣解冬聚陽毒多餐熱物致令腦脂凝聚血淚攻潮有如霧籠飛蜂黑花常見

內障二十三證

內障有圓瞤冰瞤滑瞤澀瞤散瞤橫開瞤浮瞤沉瞤偃月瞤裹花瞤黃心瞤黑花瞤胎患五風變雷頭風驚振綠風烏風黑風青風肝虛雀目高風雀目肝虛目暗

圓瞤

在黑珠上一點圓日中見之差小陰處見之卽大視物不明轉見黑花此由肝腎俱虛而得宜補肝散補腎丸

冰瞤

如冰凍堅實旁觀自透於瞳人內陰處及日中看之其形不同疼而淚出此肝膽病宜通肝散

滑瞤

有如水銀珠子俱微含黃色不疼不痛無淚遶繞瞳人

澀瞤

微如赤色或聚或開兩旁微光瞳人上如凝脂色時復澀痛無淚出

散瞤

形如鱗點或瞼下生粟日夜痛楚瞳人最疼常下熱淚此二證皆肝肺相傳宜八味還睛散

橫開瞤

上橫如劍脊下面微微甚薄不赤不痛此病稀少

浮瞤

上如冰光白色環繞瞳人生自小眥頭至黑珠上不痛不痒無血色相潮

沉瞤

白點藏在黑水下向日細視方見其白眼睛疼痛晝輕夜重間或出淚宜空青丸

偃月瞤

膜如凝脂一邊厚一邊薄如缺月其色光白無瑕疵前四證並皆難治

裹花瞤

周回如鋸齒四五枚相合赤色刺痛如鍼視物如烟晝則痛楚多淚昏暗

黃心瞤

四邊皆白但中心一點黃團團在黑珠上時下澀淚此兩證肝肺風熱宜還睛散墜瞤丸

黑花瞤

其狀青色大小眥頭澀痛頻頻下淚口苦蓋膽受風寒宜凉膽丸

胎患

初生觀物轉睛不快至四五歲瞳人潔白昏蒙不見延至年高無藥可治由胎中受熱致損也

五風變

五色變爲內障頭痛甚卽無淚日中如坐暗室常自憂嘆此毒風腦熱所致

雷頭風

此熱毒之氣衝入眼睛中牽引瞳人或微或大或小黑暗全不見物

驚振

因病目再被撞打變成內障日夜疼痛不能視三光

綠風

初患頭旋兩額角相牽瞳人連鼻兩皆痛或時紅白花起肝受熱則先左肺受熱則先右肝肺同病則齊發先服羚羊角散羚羊角丸後服還睛散

烏風

眼雖痒痛而頭不旋但漸漸昏暗如物遮定全無瞳障或時生花此肝有實熱宜瀉肝散

黑風

此與綠風相似但時時黑花起乃腎受風邪熱攻於眼宜凉腎散

青風

此眼不痛不痒瞳人儼然如不患者但微有頭旋及生花轉加昏蒙宜服還睛散

肝虛雀目

因肝虛血少時時花起或時頭疼年深則雙目盲小

兒因疳得之宜蛤粉丸

高風雀目

與前證雖同但纔至黃昏便不見物經年瞳子如金色名曰黃風不治

肝虛目暗

遠視不明眼前花子頻起皆目赤痛有時看一成二宜補肝散

外障四十五證

外障有肝臟積熱浸睛努肉攀睛兩瞼粘睛膜入水輪釘腎根深黑腎如珠花腎白陷水瑕深腎玉腎浮滿順逆生腎鶏冠蜆肉瞼生風粟胞肉膠凝漏睛膿出蚤睛疼痛突起睛高風起喎偏倒睫拳毛風牽瞼出神祟疼痛旋螺尖起鴿眼凝睛轆轤轉關被物撞打撞刺生腎血灌瞳人眯目飛塵飛絲天行赤目赤眼後生腎胎風赤爛風赤瘡疾衝風淚出暴風客熱瞼硬睛痛痛如鍼刺痒極難任瞳人乾缺黃膜上衝赤膜下垂小眥赤脉小兒通睛小兒胎中生贅小兒青盲偷鍼

肝臟積熱

眼先患赤腫疼痛怕日羞明淚澀難開忽生腎膜初患一目不見以致兩目齊患此肝臟積熱宜石決明散

混睛

白睛先赤後癢痛淚下閉澀難開年深則睛變成碧色滿目如凝脂赤脈橫貫宜地黃散

努肉攀睛

或眼先赤爛多年肝經爲風熱所衝而成或用力作勞而得或癢或痛自兩眥頭努出筋膜心氣不寧憂慮不已遂乃攀睛宜二黃散定心丸

兩瞼粘睛

此乃爛弦風也雙目赤爛或癢或痛經年不愈

膜入水輪

此因黑珠上生瘡稍安其痕不沒侵入水輪雖光未絕終亦難治

釘腎根深

心肝留熱致使眼疼痛生腎膜經久其色如銀釘人黑睛不可治

黑腎如珠

此起在黑水上如小黑豆疼痛淚出不可用點藥乃腎虛受風熱而得宜先服羚羊角散後服補腎丸

花腎白陷

白腎旋繞瞳人點點如花白鱗砌者此因肝肺伏藏積熱宜點磨腎膏後服羚羊角散

水瑕深腎

黑水內橫深瑕盤青色沉沉入痛楚無時此五臟俱受熱宜服清凉散

玉腎浮滿

黑珠上浮玉色不疼痛腎根不紅不宜鍼割但服還睛散點磨腎膏即愈

順逆生腎

凡腎自下生上者爲順自上而生下者爲逆順則易安逆則難治宜服車前散點磨腎膏

雞冠蜆肉

腎生瞼內如雞冠蜆肉或青或黑須翻出看之阻碍痛楚怕日羞明蓋脾經先受熱後有所傳宜服石決明散

瞼生風粟

兩瞼上下初生如粟米大漸大如米粒或赤或白不甚疼痛此肝壅瘀血所成宜服消毒飲

胞肉膠凝

眼胞皮肉有似膠凝腫高如桃李時出熱淚乃風毒所注宜服消風散點花草膏

漏睛膿出

眥頭結聚生瘡流出膿汁無腎障不疼痛因心氣不寧并風熱在瞼中宜白薇丸

蟹睛疼痛

如大豆子出黑珠上疼痛不可忍又名損腎宜石決明散

突起睛高

風毒流注五臟不能消散忽然突起癢痛乃熱極所致宜瀉肝散

風起喎偏

偏風牽引雙目喎斜淚出頻頻却無腎膜不癢不痛宜消風散荊芥湯調下或蟬花無比散

倒睫拳毛

淚出涓涓腎膜漸生眼皮漸急睫倒難開瞳人如刺樣痛此胛受風熱先服瀉肝散後服五退散

風牽瞼出

上下瞼俱赤或翻出一瞼在外此胛受風毒宜五退散若年深瞼內俱赤則不治

神祟疼痛

舊無根因忽然疼痛或如鍼刺或如火炙兩太陽穴掣痛早輕晚重先宜末福湯次服石決明散

旋螺尖起

目痛生瞖膜尖起而赤似旋螺先服通肝散次服石決明散

鶻眼凝睛

輪硬而不能轉側此爲鶻眼凝睛不可治

轆轤轉關

睛藏上下驗不能歸中所以言之爲轆轤也亦難治宜服天門冬飲子及瀉肝散

被物撞打

目被撞打疼痛無時瞳人被驚昏暗濛濛眼眶停留瘀血宜貼地黃膏次服石決明散

撞刺生瞖

因撞刺生瞖疼痛或兼風熱轉加痛楚昏暗不見宜先服經效散次服石決明散

血灌瞳人

瞳人爲血灌注痛如錐刺皆無瞖膜視物不明由肝氣閉血無所歸而得宜引血歸肝服通血丸車前散

眯目飛塵飛絲

塵埃入目粘睛不脫或被飛絲所侵或被砂石所苦疼痛隱澀揩擦不開宜用瞿麥散

天行赤目

目忽赤腫晨昏痛澀長幼相似此天行時疾宜服瀉肝散洗以五行湯

赤眼後生瞖

此證輕則無妨重則疼痛而白睛紅色乃生瞖膜此由五臟積熱宜貼地黃膏次服瀉肝散

胎風赤爛

小兒初生便有此證至三四歲雙目紅而弦邊赤爛時復癢痛先用湯泡消風散洗之後以龍腦膏點之

風赤瘡疾

眼兩瞼似朱砂塗而生瘡黑睛端然無所染此因脾臟風熱久不調治則生瞖膜宜服五退散洗以湯泡散

衝風淚出

至冬月尤甚此因肺虛遇風冷而發宜白殭蠶散

暴風客熱

眼爲暴風熱所攻白睛起障覆黑珠瞼腫癢痛宜服瀉肝散清肺散

瞼硬睛痛

瞼中紅赤而堅硬眼睛疼痛而淚出怕日羞明宜通肝散若有瞖障點春雪膏

痛如鍼刺

睛忽然疼痛如鍼刺雙目根緊急坐臥不安此熱毒在心宜先服洗心散次服還睛散

癢極難任

眼癢極甚瞳子連眥頭皆癢不能收瞼此因膽受風熱得之宜服驅風一字散

瞳人乾缺

眼睛乾澀全無淚液始則疼痛後來稍定或白或黑不見物此證不可治

黃膜上衝

黑睛從下生黃膜上衝疼痛甚至閉澀難開此脾受風食毒而作宜服犀角飲

赤膜下垂

眼中有膜自上垂下遮黑睛名垂簾膜望風淚出怕日羞明此客邪上衝用百點膏點之次服通肝散

小眥赤脈

小眥牛生赤脈漸漸衝眼急宜早治此三焦積熱宜服犀角飲忌熱毒物及房事

小兒通睛

嬰兒雙眼睛逼者欲觀東邊則見西邊苦振掉頭腦則睛方轉此肝受驚風宜服牛黃丸

小兒胎中生贅

眼瞼中生贅子初生如麻子大月漸如豆懸垂瞼內此脾經風熱所攻宜服五退散加減

小兒聾盲

胎中受風五臟不和嘔吐黃汁兩眼一同視物不明無治法

偷鍼

目眥瘍俗謂之偷鍼眼眥生小皰細紅點如瘡以鍼刺破即差

眼病禁忌

酒色七情最宜痛斷一凡眼疾忌雞魚酒麵糯米鹹酸熱油諸般毒物眼乃一身之主不能忌口藥亦無功自陷此身也每日白羹精豬肉嚥飯或山藥蘿蔔菜果皆可啖

氣虛光散

凡眼疼痛不生糞此元氣憊腎經虛夜間小便二三次耗傷陽氣致生內障或腦脂流下或瞳人開大此

皆腎憊黑水散也宜服八味丸或十全大補湯加枸杞子甘菊

羞明怕日

眼不得開羞明怕日乃風熱率閉所致芎芷香蘇散加前胡連翹葱白三莖煎服

眼生瞖翳

凡眼有血紅或有紅絲及生翳此是熱眼宜服經效散

眼不明

五臟精明聚於目目精全則目明

明戴思恭證治要訣

眼證類治

眼病不一爛泌惡日羞明腎膜澀痛雀目韜針內外障等證難以枚舉今特舉赤眼數種患眼者不問遠年近月有上諸證並可用四物湯下生熟地黃丸傳洗之劑當求之專科四物湯加入蒸熟大黃一塊如栗子大尤妙

有久視損目肝血不足以致見物不明眼中常見煙焰起此當益血宜生熟地黃丸

有因茹素致目少光或成雀目蓋食能生精虧之則目無所資而減明

眼疾諸證醫家多用治眼流氣飲此則專門之業也尋常赤眼用黃連碾末先用大菜頭一箇切了蓋剜中心作一竅入連末在內復以蓋遮住竹簽簽定慢火內煨熟取出候冷以菜頭中水滴入眼中

赤眼有數種氣毒赤者熱壅赤者有時眼赤者無非血壅肝經所致蓋肝主血通竅於眼赤眼之病大率皆由於肝並黑神散消風散等分白湯調食後睡時服仍用豆腐切片傅其上鹽就者可用酸漿者不可用卽烏豆傅盒之意

風熱赤甚者於黑神散消風散二藥中放冷睡時冷調洗肝散或菊花散服仍進四物湯內地黃用生芍藥用赤只須半貼食後作一服却加入赤茯苓半錢醉將軍卽酒蒸大黃是也早辰鹽湯下養正丹二三十粒

若不便於過涼之劑則不必用洗肝散宜以二錢黑神散一錢消風散

若赤眼久而不愈用諸眼藥皆無效早起則以蘇子降氣湯下黑錫丹臨睡則以消風散下三黃丸日中則以酒調黑神散此數藥不獨治久赤諸眼疾皆治之

若眼暈生花則屬肝虛宜隨證用補肝益腎之劑或正坐他病以致眼花合就其所得之病隨證施治之

又有氣眼纔怒氣則赤痛宜服酒調復元通氣散

又有頭風眼偏正頭痛眼不可開多淚羞明宜決明散

眼眶骨痛

痛有二證眼屬肝有肝虛而痛纔見光明則眶骨痛甚宜生熟地黃丸又有肝經停飲一證發則眉稜骨痛眼不可開晝靜夜劇宜導痰飲或芎芷湯去茶芽或二陳湯吞青州白丸子

樓英醫學綱目

目總論

經云瞳子黑眼法於陰白眼赤脈法於陽故陰陽合傳而精明此則眼具陰陽也又曰五臟六腑之精氣皆上注於目而爲之精精之窠爲眼骨之精爲瞳子筋之精爲黑眼血之精爲絡其窠氣之精爲白眼肌肉之精爲約束裏撗筋骨氣血之精而與脈幷爲系上屬於腦後出於項中此則眼具五臟六腑也後世以內外眥屬心上下兩瞼屬脾白眼屬肺黑眼屬肝瞳子屬腎論之五輪蓋本諸此也又有八廓之說無義無據今刪之不入焉

藏腑主目有二一曰肝經云東方青色入通於肝開竅於目藏精於肝又云人臥血歸於肝肝受血而能視又云肝氣通於目肝和則目能辨五色也二曰心經云心合脈諸脈者皆屬於目是也至東垣又推之而及於脾

人乳汁治目中功多何也人心主血肝藏血肝受血則能視蓋水入於經其血乃成又曰上則爲乳汁下則爲月水故知乳汁卽血也用以點目豈不相宜哉

通治眼病

誠哉河間之言也目盲耳聾鼻不聞臭舌不知味手足不能運用者皆由其元府閉塞而神氣出入升降之道路不通利故先賢治目昏花如羊肝丸用羊肝引黃連等藥入肝解肝中諸鬱蓋肝主目肝中鬱解則目之元府通利而明矣故黃連之類解熱鬱也椒目之類解濕鬱也芜蔚之類解氣鬱也芎歸之類解血鬱也木賊之類解積鬱也羌活之類解經鬱也磁石之類解頭目鬱墜邪氣使下降也蔓菁子下氣通中理亦同也凡此諸劑皆治氣血鬱結目昏之法而

河間之言信不誣矣至於東垣丹溪治目昏用參芪補血氣亦能明者又必有說通之蓋目主氣血氣血盛則元府得利出入升降而明虛則元府無以出入升降而昏此則必用參芪四物等劑助氣血運行而明也

楞緊瞳散

陽主散陽虛則眼楞緊急而爲倒睫拳毛陰主斂陰虛不斂則瞳子散大而爲目昏眼花故東垣治眼楞緊急用參芪補氣爲君佐以辛味疏散之品而忌芍藥五味子酸收之類是也治瞳子散大用地黃補血爲君佐以酸味收斂之品而忌羌蔚子青葙子之類是也

腎主骨之精爲瞳子散大者因腎水虛骨枯而心包絡之火得以乘之也

熟地黃丸治血弱氣虛不能養心致火旺於陰分瞳子散大少陰爲火君主無爲不行其令相火代之與心包絡之脈出心系分爲三道少陽相火之體無形其用在其中矣火盛則能令母實乙木肝旺是也其心之脈挾目系肝之脈連目系況手足少陽之脈同出耳中至耳上角斜起終於目外小眥風熱之盛亦從此道來上攻頭目致偏頭腫悶瞳子散大視物昏花血虛陰弱故也法當養血凉血益血收火散火而除風熱則愈矣

內障

內障在睛裏昏暗與不患之眼相似唯瞳人裏隱隱青白者無隱隱青白者亦有之

內障先患一目次第相引兩目俱損者皆有腎在黑睛內遮瞳子而然今詳通黑睛之脈者目系也目系屬足厥陰足太陽手少陰三經蓋此三經藏腑中虛則邪乘虛入經中鬱結從目系入黑睛內爲腎龍木論所謂腦脂流下作腎者卽足太陽之邪也所謂肝氣衝上成腎者卽足厥陰之邪也故治法以針言之則當取三經之腧穴如天柱風府太衝通里等穴是也其有手巧心審諦者能用針於黑眼裏撥其腎爲效尤捷也以藥言之則當補中疏通此三經之鬱結使邪不入目系而愈

飲食不節勞傷形體脾胃不足內障眼病宜人參補胃湯益氣聰明湯圓明內障升麻湯復明散右四方治目不明皆氣虛而未脫故可與參芪中微加連翹苦氣旣脫則黃蘗等凉劑不可施經云陽氣者煩勞則張精絕目盲不可以視耳閉不可以聽之類是其證也

外障（在睛外遮睛）

經云診目痛赤脈從上下者太陽病從下上者陽明病從外走內者少陽病按此論表裏之腎明矣用以治證如鼓應桴也

凡赤脈腎初從上而下者屬太陽以太陽主表其病必連眉稜骨或腦項痛或半邊頭腫痛是也治法宜溫之散之溫則臘茶隨川附等分煎服立愈古人嘗以此證用川附一錢作一服隨愈然則簡要夏枯散東垣選奇湯之類是也

赤脈腎初從下而上者或從內眥出外者皆屬陽明以陽明主裏其證多熱或便實是也治法宜下之寒之下則局方流氣飲溫白丸加黃蘗黃連錢氏瀉青丸之類累用累驗寒則一味黃連羊肝丸之類也

目赤

運氣目赤有二一曰風助火鬱於上經云少陰司天之政二之氣陽氣布風乃行寒氣時至民病目瞑目赤氣鬱於上而熱又云少陽司天之政初之氣風勝乃淫候乃大溫民病氣怫於上目赤是也

二曰火盛經曰火太過曰赫曦赫曦之紀民病目赤又云火鬱之發民病目赤心熱又曰少陽司天之政三之氣炎暑至目赤又云少陽之勝目赤是也

三曰燥邪傷肝經云歲金太過燥氣流行民病目赤又曰陽明司天燥氣下臨肝氣上從脇痛目赤是也

目昏

運氣目昏有四一曰風熱經云少陰司天之政風熱參布雲物沸騰太陰橫流寒時至往復之作民病鼽嚏此風熱參布目昏也

二曰熱經云少陰在泉熱淫所勝病目瞑治以鹹寒此熱勝目昏也

三曰風又云歲水不及濕乃大行復則大風暴發目視眩眩此風勝目昏也

四曰燥經云陽明司天燥淫所勝目眛眥瘍治以苦熱是也

腎膜

腎膜者風熱重則有之或斑瘡後亦生腎此肝氣盛而發在表也宜發散而去之若反疏利則邪氣內蓄爲腎益深邪氣未定謂之熱腎而浮邪氣已定謂之冰腎而沉邪氣牢而深者謂之陷腎當用煽發之物使其邪氣再動腎膜乃浮佐之以退腎之藥而能自

去也病久者不能速效宜以歲月除之

新醫所生宜表散羌活退醫湯血虛有熱宜神仙退雲丸若冰醫久不去宜羚羊角散欲煞陷醫亦羚羊角散兼服神仙退雲丸

倒睫拳毛

倒睫拳毛卽眼睫毛倒入眼中央由目緊急皮縮之所致也蓋伏熱內攻陰氣外行當去其內熱幷火邪使眼皮緩則毛立出醫自退用手法攀出內驗向外刺以三稜鍼出熱血以左爪甲迎住鍼鋒立愈

赤爛

目眶赤爛歲久俗呼爲赤瞎是也當以三稜鍼刺目眶外以瀉濕熱卽愈

爛弦風者風沿眼系上有積熱自飲食中挾怒氣而成積而久也眼沿因膿潰而腫其中生細小蟲遂年久不愈而多癢者是也用還睛紫金丹以銀釵股點之若癢者又當去蟲以絕根本又與防風通聖散去硝黃爲細末酒拌臘乾依法服之禁諸厚味

讀書損目

內經曰目得血而能視然久視傷血亦能損目久視傷血血主肝故勤書則傷肝肝傷則風熱自生熱氣上騰致目昏不可專服補藥宜服益血鎮肝明目藥自愈宜服地黃丸

直視

直視者視物而目睛不轉動者是也若目睛動者非直視也傷寒直視者邪氣壅盛臟腑之氣不上榮於目則爲之直視多難治虛家不可發汗發汗則目直視不能瞬不能瞬猶未甚也逮狂言及目直視搖頭皆臟腑氣衰絕也卽死

肝虛雀目

雀目者日落卽不見物也此屬肝虛

李梴醫學入門

眼分表裏

外因風中腦戶濕潰頭上熱遇冷灌瞳中或久處煙火或食後向火或醉後失枕血滯痰壅或冒砂塵或撞刺仆損湯泡火燒皆傷目之標內因五辛炙煿酒麪濕熱痰火房室損精勞役傷氣泣涕刺頭傷血暴喜暴怒暴驚極目遠視夜書細字鏤刻博奕傷神皆傷目之本初起在腑爲表當除風散熱久則入臟爲裏當養血安神然內因初卽入裏外因久亦帶表宜詳悟之

五輪八廓

表證多屬三陽部分裏證多屬三陰部分要知以肝爲主表裏虛實不過五行生尅之理八廓不必深泥舊說七十二證今纂註於內更不重複俾便覽焉

白屬肺烏珠屬肝

白屬肺氣之精曰氣輪氣證十情氣滯則血凝紅膜薄如傘紙日久變成白膜者難治

熱證白睛潤濕浮而赤腫筋多重者生紅花腎痛澀有淚羞深睛變碧色滿目如凝脂赤絡橫直如絲宜四物湯去芎換土當歸加甘草

虛證白睛枯槁氣沉而濁

烏珠屬肝筋之精曰風輪風證睛閃兩瞼不歸中如轆轤轉關難治

熱證赤暈浮漿重者烏珠忽然如針刺痛雙目緊急或突出豆許如蟹睛者忌點或生膿似旋螺尖突起或周圍生膿如鋸齒如聚花四五枚相合赤色刺痛或生膿四邊皆白中間一點黃心或生膿如玉色浮滿不痛者忌針割或生青色膿兩皆澀痛或膿如冰色堅實旁觀逼透瞳人

虛證輕者枯黃遠睛重者烏珠上一點圓膿日中見之差小陰處見之差大或一點黑膿如小豆疼痛淚出者忌點又肝虛雀目曉明晚暗乃所禀血虛有火也年深則盲黃風雀目者火衰土盛終當變黃脹而死宜平胃散以平土氣四物湯以補肝虛經年瞳子色如金者不治

不治之證如生膿上橫如劍脊下面微微甚薄不赤不痛或浮膿如水光白色瞭遠瞳人初生自小眥頭至烏珠上不痛癢無血色相潮或如凝脂一邊厚一邊薄如缺月色光無瑕或生膿經年如銀釘釘入烏珠或因他病生膿初甚微後遍睛俱白

內外眥屬心與小腸

內眥屬心外眥屬小腸血之精曰血輪熱證輕者赤脈纏眥重者赤脈漸漸侵睛或眥頭結聚生瘡流出膿汁涎水粘睛上下乃風熱留瞼中宜白薇丸

氣證努肉攀睛或先赤爛多年肝熱所衝或用力作勞有傷肝氣而成或痛或癢兩眥努出心氣不寧憂思不已遂乃攀睛或起筋膜宜大黃黃芩防風薄荷等分入蜜煎服或定心丸

上下胞屬胃與脾

肉之精曰肉輪又上胞瞼內銳眥係足太陽經脈風證輕者胞弦緊急重者上下瞼似硃塗而生瘡久

則生瞖乃風熱也或眼皮有如膠凝腫似桃李時出熱淚乃風毒也宜點花草膏又爛弦風癢甚雙手揩揉日久兩瞼赤爛粘滯經年不安宜三稜針刺目眶外以湯漉熱內服消風散桑白皮煎湯調服又倒睫拳毛淚出涓涓瞖膜漸生乍愈乍發經年不安眼皮漸急如針刺痛瞳人不安乃脾受風熱當去內熱退火邪令眼皮緩則毛出瞖退外用手法翻內瞼向外以三稜針橫刺用左手爪迎其針鋒出血再用木鼈子搗爛綿包成條左患塞右右患塞左鼻中其毛自分先宜瀉肝散後服五退散又上下瞼俱翻出或一瞼翻出在外乃脾風熱也

熱證輕者瞼紅赤硬睛疼淚出羞明重者兩瞼上下初生如粟漸大如米或赤或白不甚疼痛堅硬乃肝壅瘀血也宜加味荊黃湯又瞼內生如雞冠蜆肉或青或黑阻礙睛痛乃脾風熱也須翻出看之用觀音草每日輕輕刮去毫釐血出用金匙挑洗風毒藥水按而止之刮後不時將藥水點入則不復腫

瞳子屬腎水

骨之精曰水輪虛證瞳人散大視物不眞火盛則瞳人焦黃虛冷則瞳人青綠少勞則痛

熱證瞳人內湧輕者如不患眼人但微有頭旋生花或勞力轉加昏蒙或頭旋相牽瞳人連鼻腦皆痛時起紅白或黑花吐逆肝熱則先左肺熱則先右肝肺熱則左右齊發重則生瞖瞳人上如疑脂色澀痛無淚或滑瞖如水銀珠子微含黃色遞遞瞳人或散瞖形如魚鱗點或瞼下起粟子而爛瞳人痛甚又白瞖旋遶瞳人點點如白花鱗砌皆肝肺相傳風熱也又黑水上橫深瑕盤青色沉沉深入痛甚乃五藏風熱也或血灌瞳人無瞖其痛如刺乃肝血無歸宜通血丸又瞳人被物撞打驚痛昏暗眼眶停留瘀血宜貼地黃膏次服決明散如撞刺生瞖經久復被物撞轉加昏暗者難治經效散救之又飛絲沙塵入眼瞳人不安單瞿麥爲末鵝涎調敷或新筆蘸京墨點之又湯泡火燒熨痛者不可用冷藥卽點待一日後以五行湯溫娛洗地黃膏敷之

風證則瞳人青或瞳人連眥頭皆癢不能收瞼乃膽受風熱宜防風一字散

不治證瞳人乾缺痛澀無淚或白藏在黑水下向日細視方見或兩眼相傳疼痛早輕夜重或內障五色相間頭痛無淚日中如坐暗室或雷頭風熱毒氣衝入睛中牽引瞳人或微或大不見

八廓寄位

乾爲天廓位兩邊白睛中間屬肺與大腸坎爲水廓位瞳子屬腎艮爲山廓位神光屬膽震爲雷廓位白睛上截向小眥屬小腸巽爲風廓位烏珠瞳八外屬肝離爲火廓位大小眥屬心與命門坤爲地廓位上下瞼屬脾胃兌爲澤廓位白睛下截向大眥屬膀胱

婦人小兒

婦人活血爲主有孕忌用麝點小兒眼患多是胎毒及食毒內服敗毒散外洗解毒湯切忌鈹鍼針灸

小兒初生胎風雙目紅而眶邊赤爛至三四歲不愈宜消風散桑白皮煎湯下又小兒通睛欲觀東邊則見西畔若振掉頭腦則睛方轉此肝受驚風宜牛黃丸又小兒眼胞患斑瘡熱氣衝透睛中疼痛淚出瞽如銀片腫澀難開宜柴胡散神瞽散又小兒瞼中初生如麻仁日漸如豆懸垂瞼內乃風熱攻脾宜五退散加減又小兒疳眼初起澀癢久生瘡瞽腫痛乃肝風所衝或痢後虛熱上攻者俱忌點宜還睛散

小兒不治證胎中受風五藏不和嘔吐黃汁兩睛青盲不明及初生視物近看轉睛不快至四五歲瞳人枯白昏蒙不見

暴赤腫痛澀癢

或飲食積熱或天行赤目長幼相似或傷寒後餘熱以致血熱瘀壅則目暴赤腫痛爲熱痒爲風澀爲毒不可概用凉藥因成內障亦不可誤用溫藥助熱致令昏澀眵淚努肉攀睛等證以成外障決明散主之又有睡覺目赤腫艮久無事者血復散於四肢也宜地黃粥又或讀書鍼刺過度而痛者名曰肝勞但須閉目調護又中惡祟卒痛如鍼刺或如火炙及太陽穴痛早輕夜重宜決明散

瞽膜胗昏屬表

暴赤後熱流肺經輕則矇朧而已稍重則生雲膜如黃膜從下生而上衝黑睛痛澀難開乃脾受風食毒可治如赤膜從上生下遮覆黑睛名垂簾膜乃客熱上衝也難治又重則生瞽障狀如珍珠碎米紅色自下而上者易治狀如梅花葉白綠自上而下者難治治法宜先去瞽而後清熱若先去熱則瞽難去眵淚熱而交流兩瞼赤者屬肝熱之甚食後吞當歸龍膽丸肝虛客熱迎風冷淚者歸葵湯水賊散

眵淚熱而交流兩瞼赤者屬肝熱之甚或衝風淚出由熱甚而水化制之也又肺受風寒遇風冷則流淚

尤甚者白殭蠶散風淚不止食後吞當歸龍膽丸數粒

目昏者熱鬱也甚則白日無所見故傷寒熱極則目盲而不識人目昏者至近則轉難辨物或視如隔簾如蠅翅或見黑花皆目之元府閉塞榮衛精神不能升降也若患風疹者必多眼暗攻其風則暗自去

夫脾家受毒則眼白亦腫神勞則眼睛亦痛心熱則血灌瞳人傷風則淚亦出虛煩則眼亦昏勞力則皆亦赤生瘡乃風熱侵肺黃乃酒傷於脾最宜活變

昏睛羞明

上虛屬肝虛必頭運目眩耳聾下虛屬腎虛必眼花睛痛耳鳴若昏花者傷氣昏暗者傷血熱證亦有羞明怕日但內虛全不敢近陽光

內障黑花瞳人散杳

黑花者腎虛也五色花爲腎虛客熱青花膽虛紅花火盛散杳者瞳人散大視物杳冥也

內障昏朦外無腎膜因腦脂下凝烏珠轉白或如金色或萊豆色或如雲煙或見五色治比外障更難如腦脂凝結瞳人反背者不治

近視陰虛遠視陽虛

能近視不能遠視者看一成二屬肝腎虛宜腎氣丸

地芝丸或加降火之劑

能遠視不能近視者屬心虛宜定心丸

冷淚睛疼

有肝虛客熱迎風冷淚者歸葵湯古木賊散

睛疼有火者滋腎丸無火杞菊丸

外因風熱濕痰

外因風則胞白兩眼拘急牽引喎斜癢而清淚肝風毒菊花散腎風毒白蒺藜散明目流氣飲撥雲散白殭蠶散防風一字散犀角飲選用

熱則珠突胞硬腫紅刺痛洗肝散洗心散還睛散通肝散瀉肝散決明散羚羊角散蔓荊散加味荊黃散瀉青丸凉膽丸墜痹丸選用

濕則食減身倦地氣冒明如雲霧掩日或忽然不見或略見不明宜鹽木散單蒼木膏濕熱甚者神芎丸

暴寒則目瞤不明皆熱所爲也人參敗毒散疼者升麻葛根湯歷考眼科無寒而有虛豈寒澀血而不上攻耶挾痰者則痛甚宜小省風湯南星丸

內傷氣血

內傷七情氣壅藤纏胞腫而韈酸澀微赤木香流氣飲加川芎蒺藜風與氣搏癢澀渾多淚者羌活石膏散因過思勞神大志丸育神夜光丸因驚恐者定心丸因怒者當歸龍膽丸

內傷飲食勞倦損陷胃氣火盛血脈沸騰益氣聰明湯磁砂丸還睛丸氣弱甚者單人參膏補中益氣湯

如脾胃熱兼有宿食者泰艽大黃爲末沙糖調服利之脾胃濕傷內外障者椒目丸鹽木散傷熱酒胃氣污濁血死目盲者蘇木煎湯調人參末連鼻與手掌紫黑者四物湯加桃仁紅花蘇木煎湯調人參末服

內傷色慾腎氣虛者補腎丸腎精虛者益陰腎氣丸肝血虛者養肝丸生熟地黃丸肝腎虛者駐景丸

夫五臟六腑精華皆禀於脾注於目故理脾胃則氣上升而神清也又肝之系雖總於目而照徹光彩實腎精心神所主故補精氣安神者乃治眼之本也

風熱兼虛

熱爲風冷所乘則眼中不赤而弦赤爛風與熱并則內外浮赤而癢甚大槩表病肥人多風熱防風黃芩湯火爲君黃連當歸養血爲臣升柴白芷消腫止痛爲使白睛紅者加白豆蔻少許瘦人血虛宜四物龍膽湯或加羌活蔓荊荊芥元參山梔仁菊花爲佐

裏證肥人多風虛防風一字散四生散補肝散還睛丸瘦人血虛挾風通血丸明目地黃丸滋陰地黃丸熟地黃丸通用羊肝丸久甚者退翳丸活命羊肝丸

眼病惟火

眼不過虛實而已白輪癢赤火乘肺也肉輪赤腫火乘脾也黑珠五色花翳腎虛火也神光青睛被腎肝虛火也赤脈瘀血貫目澀痛心火自甚也故童子水在上則視明瞭老人火在上則視昏眊實火氣有餘宜前風熱藥中加枳殼杏仁以破氣虛火血不足宜前養陰藥中加知母黃蘗以降火黑睛有翳者倍之蓋散有餘之火在於破氣降不足之火在於養陰

陽衰宜溫

勞慾過度或凉藥過多致渾身手足痲木九竅不利兩目緊急青白腎見大皆視物無力者宜補陽湯黃芪湯或加黃蘗或菊睛丸經曰壯水之源以鎮陽光滋陰是也益火之主以消陰翳養陽是也今人不分陰陽專以龍腦辛香石藥搽點而不知辛散損明也

點洗宜慎

凡暴赤腫血壅氣凝者一時連點三五次亦可如氣血稍虛者宜服藥以塞其源藥水洗之生有雲膜方可用點若無腎膜縱久但可洗之却忌過用凉藥冷

水洗血眼化爲水至於針刀火烙古人忌用惟太陽經熱生翳針痣可刺去血如爛瞽用茜草根燒灰燈心草蘸點之須臾大痛以百節草刮去他如金針撥轉瞳人等法另是一家傳授

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百六十卷目錄

醫部彙考一百四十

目門三

倪維德原機啓微 淫熱反尅之病 風熱不制之病 七情五賊勞役饑飽之病 血爲邪勝凝而不行之病 氣爲怒傷散而不聚之病 血氣不分澀而送結之病 熱積必潰之病 膀胱不能抗陰之病 脇肋不能匡陽之病 心火聚金水被反制之病 內感外觸之病 奇經客邪之病 爲物所傷之病 強勝耗竭陰之病 亡血過多之病 誤汗爲害之病

方賢奇效良方 目論

張三錫醫學準繩六要 目病不宜用涼藥

王綸明醫雜著 論外治忌寒涼

龔信古今醫鑑 目病

虞搏醫學正傳 雜目

明倪維德原機啓微

淫熱反尅之病

青粱之變滋味過也氣血俱盛稟受厚也亢陽上炎陰不濟也邪入經絡內無禦也因生而化因化而熱熱爲火火性炎上足厥陰肝爲木木生火母旺子子以淫勝耦發反尅而肝開竅於目故肝受尅而目亦受病也其病略多毗燥緊澀赤脈貫睛臟腑祕結者爲重重者芍藥清肝散主之通氣利中丸主之略多毗燥緊澀赤脈貫睛臟腑不祕結者爲輕輕者減大黃芒硝芍藥清肝散主之黃連天花粉丸主之少盛服通氣利中丸目眶爛者內服上藥外以黃連爐甘石散收其爛處兼以點眼春雪膏龍腦黃連膏嗑鼻碧雲散攻其淫熱此治淫熱反尅之法也非膏粱之變非氣血俱盛非亢陽上炎非邪入經絡毋用此也用此則寒涼傷胃生意不上升反爲所害也

風熱不制之病

風動物而生於熱譬以烈火焰而必吹此物類感名而不能違間者也因熱而名是爲外來久熱不散感而自生是爲內發內外爲邪爲病則一淫熱之禍條列於前益以風邪害豈纖止風加頭痛風加鼻塞風加腫脹風加涕淚風加腦顛沉重風加眉骨酸疼有一於此羌活勝風湯主之風加癢則以杏仁龍膽草泡散洗之病者有此數證或不服藥或誤服藥醫必隨之而生醫如雲霧醫如絲縷醫如秤星或一點或三四點而至數十點者醫如螺螯者爲病久不去治不如法至極而至也爲服寒涼藥過多脾胃受傷生意不能上升漸而至也然必要明經絡庶能應手醫凡自內嘗而出爲手太陽足太陽受邪治在小腸膀胱經加葛荊子蒼朮羌活勝風湯主之自銳嘗客主人而入者爲足少陽手少陽手太陽受邪治在膽與三焦小腸經加龍膽草藥本少加入參羌活勝風湯主之自目系而下者爲足厥陰手少陰受邪治在肝經心經加黃連倍加柴胡羌活勝風湯主之自抵過而上者爲手太陽受邪治在小腸經加木通五味子羌活勝風湯主之熱甚者兼用治淫熱之藥嗑鼻碧雲散俱治已上之證大抵如開鍋蓋法嗑之隨效然少力而銳宜不時用之以聚其力雖然始者易而久者難漸復而復漸復而又復可也急於復者則不治今世醫用磨醫藥者有之用手法揭醫者有之噫醫猶疴也奚斯愈乎庸者用此非徒無益增害猶甚愚者受此欣然而不悟可嘆也哉故置風熱不制之病治法

七情五賊勞役饑飽之病

陰陽應象大論曰天有四時以生長收藏以生寒暑燥濕風寒暑燥濕風之發也發而皆宜時則萬物俱生寒暑燥濕風之發也發而皆不宜時則萬物俱死故曰生於四時死於四時又曰人有五臟化爲五氣以生喜怒憂悲恐喜怒憂悲恐之發也發而皆中節則九竅俱生喜怒憂悲恐之發也發而皆不中節則九竅俱死故曰生於五臟死於五臟目窺之一也光明視見納山川之大及毫芒之細悉雲霄之高盡泉沙之深至於鑒無窮爲有窮而有窮又不能爲窮反而聚之則乍張乍斂乍動乍靜爲一泓一點之微者豈力爲強致而能此乎是皆生生自然之道也或因七情內傷五賊外攘饑飽不節勞役異常足陽明胃之脈足太陰脾之脈爲戊己二土生生之原也七情五賊總傷二脈饑飽傷胃勞役傷脾戊己既病則生生自然之體不能爲生生自然之用故致其病曰七情五賊勞役饑飽之病其病紅赤瞤珠痛痛如鍼刺應太陽眼睫無力常欲垂閉不敢久視久視則酸疼

生瞤皆成陷下所陷者或圓或方或長或短或如點或如縷或如錐或如鑿證有具此者柴胡復生湯主之黃連羊肝丸主之睛痛甚者當歸養榮湯主之助陽活血湯主之加減地黃丸主之決明益陰丸主之加當歸黃連羊肝丸主之龍腦黃連膏主之已上數方皆羣隊升發陽氣之藥其中有用黃連黃芩之類者去五賊也嗆鼻君雲散亦可見用最忌大黃芒硝牽牛石膏梔子之劑犯所忌則病愈振

血爲邪勝凝而不行之病

血陰物類地之水泉性本靜行其勢也行爲陽是陰中之陽乃坎中有火之象陰外陽內故行也純陰故不行也不行則凝凝則經絡不通經曰足陽明胃之脈常多氣多血又曰足陽明胃之脈常生氣生血手太陽小腸之脈斜絡於目皆足太陽膀胱之脈起於目內皆二經皆多血少氣血病不行血多易凝靈蘭祕典論曰脾胃者倉廩之官五味出焉五味淫則傷胃胃傷血病是爲五味之邪從本生也又曰小腸者受盛之官化物出焉遇寒則阻其化又曰膀胱者州都之官津液藏焉遇風則散其藏一阻一散血亦病焉是爲風寒之邪從末生也凡是邪勝血病不行不行漸滯滯則易凝凝則病始外見以其斜絡目皆也以其起於目內皆也故病環目青黯如被物傷狀重者白睛亦黯輕者或成斑點然不痛不癢無淚眵眊燥羞澀之證是曰血爲邪勝凝而不行之病此病初起之時大抵與傷風證相似一二日則顯此病也川芎行經散主之消凝大丸子主之睛痛者更以當歸養榮湯主之如此則凝復不滯滯復能行不行復行邪消病除血復如故無不愈也

氣爲怒傷散而不聚之病

氣陽物類天之雲霧性本動聚其體也聚爲陰是陽中之陰乃離中有水之象陽外陰內故聚也純陽故不聚也不聚則散散則經絡不收經曰足陽明胃之脈常多氣多血又曰足陽明胃之脈常生氣生血七情內傷脾胃先病怒七情之一也胃病脾病氣亦病焉陰陽應象大論曰足厥陰肝主目在志爲怒怒甚傷肝傷脾胃則氣不聚傷肝則神水散何則神水亦氣聚也其病無眵淚痛癢羞明緊澀之證初但昏如霧露中行漸空中有黑花又漸覩物成二體久則光不收遂爲廢疾蓋其神水漸散散而又散終而盡散故也初漸之次宜以千金磁硃丸主之鎮墜藥也石斛夜光丸主之資補藥也益陰腎氣丸主之壯水藥也有熱者滋陰地黃丸主之此病最難治餌服上藥必要積以歲月必要無饑飽勞役必要驅七情五賊必要德性純粹庶幾易效不然必廢廢則終不復治久病光不收者亦不復治一證因爲暴怒神水隨散光遂不收都無初漸之次此一得永不復治之證也一證爲物所擊神水散如暴怒之證亦不復治俗名爲青盲者是也病者多不爲審察曰目昏無傷始不經意及成醫亦不識直曰熱致竟以涼藥投殊不知涼藥又傷胃況不知涼爲秋爲金肝爲春爲木涼藥又傷肝往往致廢而然後已病者猶不以藥非而委之曰命也醫者猶不自悟其藥而贊之曰病拙吁二者俱此誰其罪乎予累見也故兼陳涼藥之誤

血氣不分混而遂結之病

輕清圓健者爲天故首象天重濁方厚者爲地故足象地飄騰往來者爲雲故氣象雲過流循環者爲水故血象水天降地升雲騰水流各宜其性故萬物生而無窮陽平陰祕氣行血隨各得其調故百骸理而有餘反此則天地不升降雲水不騰流各不宜其性矣反此則陰陽不平祕氣血不行隨各不得其調矣故曰人身者小天地也難經曰血爲榮氣爲衛榮行脈中氣行脈外此血氣分而不混行而不阻也明矣故如雲騰水流之不相雜也大抵氣血如此不欲相混混則爲阻阻則成結結則無所去還故隱起於皮膚之中遂爲疣病然各隨經絡而見疣病自上眼瞼而起者乃手少陰心脈足厥陰肝脈血氣混結而成也初起時但如豆許血氣衰者遂止不復長亦有久止而復長者盛者則漸長長而不已如杯如盞如碗如斗皆自豆許致也凡治在初須擇人神不犯之日大要令病者食飽不饑先汲冷井水洗眼如冰勿使氣血得行然後以左手持銅箸按眼瞼上右手翻眼皮令轉轉則疣肉已突換以左手大指按之弗令得動發復以右手持小眉刀尖略破病處更以兩手大指甲捻之令出則所出者如豆許小黃脂也恐出而根不能斷宜更以眉刀尖斷之以井水再洗洗後則無恙要在手疾爲巧事畢須按以防風散結湯數服即愈此病非手法則不能去何則爲血氣初混時藥自可及病者則不知其爲血氣混也比結則藥不能及矣故必用手法去去畢必又以升發之藥散之藥手皆至庶幾了事

熱積必潰之病

積者重疊不解之貌熱爲陽陽平爲常陽淫爲邪常邪則行行則病易見易見則易治此則前篇淫熱之病也深邪則不行不行則伏因伏而又伏日漸月聚勢不得不爲積也積已久久積必潰潰始病見病見則難治難治者非不治也爲邪積久此潰已深何則潰猶敗也知敗者庶可以救其病隱溷不自在稍覺耗燥視物微昏內眥穴開竅如鍼目按之則沁沁膿出有兩目俱病者有一目獨病者目屬肝內眥屬膀胱此二經積邪之所致也故曰熱積必潰之病又曰漏睛眼者是也竹葉瀉經湯主之大便不硬者減大黃或用蜜劑解毒丸主之不然藥誤病久終爲枯害

陽衰不能抗陰之病

或問曰人有晝視通明夜視罔見雖有火光月色終爲不能視物者何也答曰此陽衰不能抗陰之病諺所謂雀盲者也問曰何以知之答曰黃帝生氣通天論曰自古通天者生之本本於陰陽天地之間六合之內其氣九州九竅五藏十二節皆通乎天氣又曰陰陽者一日而主外平旦人氣生日中而陽氣隆日西而陽氣已虛氣門乃閉又曰陽不勝其陰則五藏氣爭九竅不通故知也問曰陽果何物耶答曰凡人之氣應之四時者春夏爲陽也應之一日者平旦至昏爲陽也應之五藏六腑者六腑爲陽也問曰陽何爲而不能抗陰也答曰人之有生以脾胃中州爲主也靈蘭秘典曰脾胃者倉廩之官在五行爲土土生萬物故爲陽氣之原其性好生惡殺遇春夏乃生長遇秋冬則收藏或有憂思恐怒勞役饑飽之類過而不節皆能傷動脾胃脾胃受傷則陽氣下陷陽氣下陷則於四時一日五藏六腑之中陽氣皆衰陽氣既衰則於四時一日五藏六腑之中陰氣獨盛陰氣既盛故陽不能抗也問曰何故夜視罔見答曰目爲肝肝爲足厥陰也神水爲腎腎爲足少陰也肝爲木腎爲水水生木蓋亦相生而成也況怒傷肝恐傷腎肝腎受傷亦不能生也晝爲陽天之陽也晝爲陽人亦應之也雖受憂思恐怒勞役饑飽之傷而陽氣下陷遇天之陽盛陰衰之時我之陽氣雖衰不得不應之而升也故猶能晝視通明夜爲陰天之陰也夜爲陰人亦應之也既受憂思恐怒勞役饑飽之傷而陽氣下陷遇天陰盛陽衰之時我之陽氣既衰不得不應之時伏也故夜視罔所見也問曰何以爲治答曰鎮陰升陽之藥決明夜靈散主之問曰病見富貴乎貧賤者乎答曰憂思恐怒勞役饑飽富貴者甚乎惟其貧賤者不能免甚也問者稱善

陰弱不能配陽之病

五藏無偏勝虛陽無補法六腑有調候弱陰有强理心肝脾肺腎各有所滋生一藏或有餘四藏俱不足此五藏無偏勝也或浮或散是曰陽無根益之欲令實翻致不能禁此虛陽無補法也膀胱大小腸三焦膽包絡俾之各有主平祕永不危此六腑有調候也衰弱不能濟遂使陽無禦反而欲匹之要以方術盛此弱陰有强理也解精微論曰心者五藏之專精目者其竅也又爲肝之竅腎主骨骨之精爲神水故肝木不平內挾心火爲勢妄行火炎不制神水受傷上爲內障此五藏病也勞役過多心不行事相火代之五藏生成論曰諸脈皆屬於目相火者心包絡也主百脈上榮於目火盛則百脈沸騰上爲內障此虛陽病也膀胱小腸三焦膽脈俱循於目其精氣亦皆上注而爲目之精精之窠爲眼四腑一衰則精血盡敗邪火乘之上爲內障此六腑病也神水黑眼皆法於陰白眼赤脈皆法於陽陰齊陽俾故能爲視陰微不立陽盛卽淫陰陽應象大論曰壯火食氣壯火散氣上爲內障此弱陰病也其病初起時視覺微昏常見空中有黑花神水淡綠色次則視岐視一成二神水淡白色可爲沖和養胃湯主之益氣聰明湯主之千金磁硃丸主之石斛夜明丸主之有熱者瀉熱黃連湯主之久則不視神水純白色永爲廢疾也然廢疾亦有治法先令病者以冷水洗眼如冰氣血不得流行爲度用左手大指次指按定眼珠不令轉動次用右手持鴨舌鍼去黑睛如米許鍼之令入白睛甚厚欲入甚難必要手準力完重鍼則破然後斜回鍼首以鍼刀刮之障落則明有落而復起者起則重刮刮之有至再三者皆爲洗不甚冷氣血不凝故也障落之後以縣裹黑豆數粒令如杏核樣使病目垂閉覆眼皮上用軟帛纏之以睛珠不得動移爲度如是五七日纔許開視視勿勞也亦須服上藥庶幾無失此法治者五六不治者亦四五五藏之病虛陽之病六腑之病弱陰之病四者皆爲陰弱不能配陽也噫學者愼之

心火乘金水衰反制之病

天有六邪風寒暑濕燥火也人有七情喜怒悲思憂恐驚也七情內名六邪外從從而不休隨名見病此心火乘金水衰反制之原也世病目赤爲熱人所共

知者也然不審其赤分數等治各不同有白睛純赤如火熱氣炙人者乃淫熱反尅之病也治如淫熱反尅之病有白有赤而腫脹外睫虛浮者乃風熱不制之病也治如風熱不制之病有白睛淡赤而細脈深紅縱橫錯貫者乃七情五賊勞役饑飽之病也治如七情五賊勞役饑飽之病有白睛不腫不脹忽如血貫者乃血爲邪勝凝而不行之病也治如血爲邪勝凝而不行之病有白睛微變青色黑睛稍帶白色白黑之間赤環如帶謂之抱輪紅者此邪火乘金水衰反制之病也此病或因目病已久抑鬱不舒或因目病悞服寒凉藥過多或因目病時內多房勞皆能內傷元氣元氣一虛心火亢盛故火能尅金金乃手太陰肺白睛屬肺水乃足少陰腎黑睛屬腎水本尅火水衰不能尅反受火制故視物不明昏如霧露中或睛珠高低不平其色如死甚不光澤赤帶抱輪而紅也口乾舌苦眵多羞澀稍有熱者還陰救苦湯主之黃連羊肝丸主之川芎決明散主之無口乾舌苦眵多羞澀者助陽活血湯主之神驗錦鳩丸主之萬應蟬花散主之有熱無熱俱服千金磁硃丸鎮墜心火滋益腎水榮養元氣自然獲愈也噫天之六邪未必能害人也惟人以七情召之而致也七情匿召六邪安從反此者豈止能避而已哉猶當役之而後已也

內急外弛之病

陰陽以和爲本過與不及病皆生焉急者緊縮不解也弛者寬縱不收也緊縮屬陽寬縱屬陰不解不收皆爲病也手太陰肺爲辛爲金也主一身皮毛而目之上下睫之外者亦其屬也手少陰心爲丁手太陽小腸爲丙丙丁爲火故爲表裏故分上下而目之上下睫之內者亦其屬也足厥陰肝爲乙乙爲木其脈循上睫之內火其子也故與心合心肝小腸三經受邪則陽火內盛故上下睫之內緊縮而不解也肺金爲火尅受尅者必衰衰則陰氣外行故目之上下睫之外者寬縱而不收也上下睫既內急外弛故睫毛皆倒而刺裏睛既受刺則深赤生瞖此瞖者睛受損也故目所病者皆具如羞明沙澀畏風怕日沿爛或痛或癢生眵流淚之證俱見有用藥夾施於上睫之外者欲弛者急急者弛而睫毛無倒刺之患者非其治也此徒能解厄於目前而終復其病也何則爲不審過與不及也爲不能除其病原也治法當攀出內瞼向外速以三稜鍼亂刺出血以左手大指甲迎其鍼鋒復以黃芪防風飲子主之無比蔓荊子湯主之決明益陰丸主之菊花決明散主之嗃鼻碧雲散亦宜兼用如是則緊縮自弛寬縱漸急或過不及皆復爲和藥夾之治忍勿施也徒爲苦耳智者宜審此

奇經客邪之病

人之有五臟者猶天地之有五嶽也六腑者猶天地之有四瀆也奇經者猶四瀆之外別有江河也奇經客邪非十二經之治也十二經之外別有治奇經之法也繆刺論曰邪客於足陽蹻之脈令人目痛從內眥始啓元子王冰註曰以其脈起於足上行至頭而屬目內眥故病令人目痛從內眥始也鍼經曰陰蹻脈入鼽屬目內眥合於太陽陽蹻而上行故陽蹻受邪者內眥卽赤生脈如縷縷根生於瘀肉瘀肉生黃赤脂脂橫侵黑睛漸蝕神水此陽蹻爲病之次第也或兼銳眥而病者以其合於太陽故也銳眥者手太陽小腸之脈也銳眥之病必輕於內眥者蓋枝蔓所傳者少而正受者必多也俗呼爲攀睛卽其病也還陰救苦湯主之撥雲退瞖丸主之梔子勝奇散主之萬應蟬花散主之磨障靈光膏主之消瞖復明膏主之朴硝黃連鱸甘石泡散主之病多藥不能及者宜治以手法先用冷水洗如鍼內障眼法以左手按定勿令得動移略施小眉刀尖剔去脂肉復以冷水洗淨仍將前藥餌之此治奇經客邪之法也故并論其經絡病始

爲物所傷之病

志於固者則八風無以窺其隙本於密者則五臟何以受其邪故生之者天也召之者人也雖生弗召莫能害也爲害不已召之甚也生氣通天論曰風者百病之始也淸靜則肉腠閉拒雖有大風苛毒弗之能害陰陽應象大論曰邪風之至疾如風雨故善治者治皮毛夫肉腠固皮毛密所以爲害者安從其來也今爲物之所傷則皮毛肉腠之間爲隙必甚所傷之際豈無七情內移而爲衛氣衰憊之原二者俱召風安不從故傷於目之上下左右者則目之上下左右俱病當總作除風益損湯主之傷於眉骨者病自目系而下以其手少陰有隙也加黃連除風益損湯主之傷於額者病自抵過而上傷於耳中者病自銳眥而入以其手太陽有隙也加柴胡除風益損湯主之傷於額交巔耳上角及腦者病自內眥而出以其足太陽有隙也加蒼朮除風益損湯主之傷於耳後耳角耳前者病自客主人斜下傷於頰者病自銳眥而

入以其手少陽有際也加枳殼除風益損湯主之傷於頭角耳前後及目銳眥後者病自銳眥而入以其足少陽有際也加龍膽草除風益損湯主之傷於額角及巔者病自目系而下以其足厥陰有際也加五味子除風益損湯主之諸有熱者更當加黃芩衆服加減地黃丸傷甚者須從權倍加大黃瀉其敗血六節藏象論曰肝受血而能視此蓋滋血養血復血之藥也此治其本也又有爲物暴震神水遂散更不復治故并識之於此

傷寒愈後之病

傷寒病愈後或有目復大病者以其清陽之氣不升而餘邪上走空竅也其病隱澀赤脹生翳羞明頭腦骨痛宜作群隊升發之劑餌之數服斯愈傷寒論曰冬時嚴寒蓋類深藏君子固密不傷於寒觸冒之者乃名傷寒其傷於四時之氣者皆能爲病又生氣通天論曰四時之氣更傷五藏五藏六腑一病則濁陰之氣不得下清陽之氣不得上今傷寒時病雖愈濁陰清陽之氣猶未來復濁陰清陽之氣未復故餘邪尚熾不休故其走上而爲目之害也是以一日而愈者餘邪在太陽二日而愈者餘邪在陽明三日而愈者餘邪在少陽四日而愈者餘邪在太陰五日而愈者餘邪在少陰六日而愈者餘邪在厥陰七日而復是皆清陽不能出上竅而復受其所害也當爲助清陽上出則治人參補陽湯主之羌活勝風湯主之加減地黃丸主之嗇鼻碧雲散亦宜用也忌大黃芒硝苦寒通利之劑用之必不治

強陽搏實陰之病

強者盛而有力也實者堅而內充也故有力者強而欲搏內充者實而自收是以陰陽無兩強亦無兩實惟強與實以偏則病內搏於身上見於盛竅也足少陰腎爲水腎之精上爲神水手厥陰心包絡爲相火火強搏水水實而自收其病神水緊小漸小而又小積漸之至竟如菜子許又有神水外圍相類蟲蝕者然皆能視而不昏但微覺眊燥羞澀耳是皆陽氣強盛而搏於陰陰氣堅實而有禦雖受所搏終止於邊鄙皮膚也內無所傷動治法當抑陽綏陰則愈以其強也故可抑以其實也故可緩而弗宜助助之則反勝抑陽酒連散主之大抵強者則不易入故以酒爲之導引欲其氣味投合入則可展其長此反治也還陰救苦湯主之療相火藥也亦宜用嗇鼻碧雲散然病世亦間見醫者要當識之

亡血過多之病

六節藏象論曰肝受血而能視宣明五氣篇曰久視傷血氣厥論曰膽移熱於腦則辛頗鼻淵傳爲鉅鐵瞑目經刺論曰冬刺經脈血氣皆脫令人目不明由此推之目之爲血所養者明矣手少陰心生血血榮於目足厥陰肝開竅於目肝亦多血故血亡目病男子衄血便血婦人產後崩漏亡之過多者皆能病焉其爲病睛珠痛珠痛不能視羞明隱澀眼瞤無力眉骨太陽因爲酸疼當作芎歸補血湯主之當歸養榮湯主之除風益損湯主之滋陰地黃丸主之諸有熱者加黃芩婦人產漏者加阿膠脾胃不佳惡心不進食者加生薑復其血使得其所養則愈然要忌鹹物宣明五氣篇又曰鹹走血血病無多食鹹故忌

斑疹餘毒之病

東垣李明之曰諸斑疹皆從寒水逆流而作也子之初生也在母腹中母呼亦呼母吸亦吸呼吸者陽也而動作生焉饑食母血渴飲母血飲食者陰也而形質生焉陰具陽足十月而降口中惡血因啼即下却歸男子生精之所女子結胎之處命宗所謂元牝元關者也此血俾伏而不時發或因乳食內傷或因濕熱下溜營氣不從逆於肉理所俾伏者乃爲所發初則膀胱壬水挾胥逆流而尅小腸丙火故頸項已上先見也次則腎經癸水又尅心火故胷腹已下後見也終則二火熾盛反制寒水故胷腹已下後見也至此則五藏六腑皆病也七日齊七日盛七日謝三七二十一日而愈者七爲火數故也愈後或有病疽病瘡者是皆餘毒尚在不去者今其病目者亦然所害者與風熱不制之病稍同而異總以羚羊角散主之便不鞕者減硝黃未滿二十一日而病作者消毒化斑湯主之此藥功非獨能於目蓋專於斑者之藥也不問初起已著服之便令消化稀者則不復出方隨四時加減

深痓爲害之病

衛氣少而寒氣乘之也元氣微而飲食傷之也外乘內傷釀而成之也父母以其純陽也故深冬不爲裘父母以其惡風也故盛夏不解衣父母以其數饑也故飼後強食之父母以其或渴也故乳後更飲之有愚戇而爲父母者又不審其寒暑飲食也故寒而不爲暖暑而不能凉飲而不止渴食而不濟饑而小兒幽元衝獸抱疾而不能自言故外乘內傷因循積漸

釀而成疳也渴而易饑能食而瘦腹脹下利作警警聲日遠不治遂生目病其病生瞖睫閉不能開眵淚如糊久而膿流竟枯其目何則爲陽氣下走也爲陰氣反上也治法當如陰陽應象大論曰清陽出上竅濁陰出下竅清陽發腠理濁陰走五臟清陽實四肢濁陰歸六腑各還其原不反其常是其治也當作升陽降陰之劑茯苓瀉濕湯主之升麻龍膽草飲子主之此藥非專於目幷治已上數證然勿後後則危也爲父母者其審諸

方賢奇效良方

目論

夫眼者乃五臟六腑之精華如日月麗天昭明而不可揜者也其首尾赤眥屬心其滿眼白睛屬肺其烏睛圓大屬肝其上下肉胞屬脾而中間黑瞳一點如漆者腎實主之是隨五臟各有證應然論其所主則瞳子之關係重焉何以言之目者肝之外候也肝取木腎取水水能生木子肝母腎焉有子母而能相離者哉故肝腎之氣充則精彩光明肝腎之氣乏則昏蒙眩運烏輪赤暈刺痛浮漿此肝熱也膽生清淚枯黃遶睛此肝虛也瞳人開大淡白偏斜此腎虛也瞳人焦小或帶微黃此腎熱也一虛一實以此驗之然人知肝腎之氣相依而行孰知心者神之舍又所以爲肝腎之副焉所謂一而二二而一者也何則心主血肝藏血血能生熱凡熱衝發於眼皆當清心凉肝又不可固執水生木之說特眼者輕膜裹水照徹四方遡源反本非天一之水又果孰爲之主宰乎析而論之則拘急牽颼瞳青胞白癢而清淚不赤不疼是之謂風眼烏輪突起胞硬腫紅眵淚濕漿裏熱刺痛是之謂熱眼眼渾而淚胞腫而軟上壅朦朧酸澀微赤是之謂氣眼其或風與熱幷則癢而浮赤風與氣搏則癢澀昏沉血熱交聚故生淫膚粟肉紅縷偷針之類氣血不至故有眇視胞垂雀眼盲障之形淡紫而隱紅者爲虛熱鮮紅而妬赤者爲實熱兩眥呈露生努肉者此心熱血旺白睛紅膜如紙傘者此氣滯血凝熱證瞳人內湧白睛帶濕色浮而赤也冷證瞳人青綠白睛枯槁氣沉而濁也眼熱經久復爲風冷所乘則赤爛眼中不赤但爲痰飲所注則作疼肝氣不順而挾熱所以羞明熱氣蓄聚而傷胞所以胞合吁此外證之大概然爾五臟不可闕一脾與肺獨無預何耶曰白睛帶赤或紅筋者其熱在肺上胞下胞或目脣間如疥點者其熱在脾脾主味也五味之秀養諸中則精華發於外肺主氣也水火升降榮衛流轉非氣孰能使之前所謂五臟各有證應者於此又可推矣雖然眼之爲患多生於熱其間用藥大抵以清心凉肝調血順氣爲先有如腎家惡燥設遇虛證亦不過以當歸地黃輩潤養之輕用溫藥不可也況夫肺能發燥肝亦好潤古方率用杏仁柿乾飴糖砂蜜爲佐果非潤益之意乎至於退瞖一節尤關利害凡瞖起於肺家受熱輕則朦朧重則生瞖眞珠瞖狀如碎米者易散梅花瞖狀如梅花瓣者難消雖瞖自熱生然治法先退瞖而後退熱者謂熱輕生瞖若先去赤熱則血爲之冰而瞖不能去其有赤眼與之凉藥過多又且滌之以水不反掌而冰凝眼特一團水耳水性清澄尤不可規規於點洗喜怒失節嗜慾無度窮役眼力泣涕過傷凌寒衝風當暑冒日不避煙火飲啖熱多此皆患生於腑臟者也專事點洗可乎哉有能靜坐澄神愛護目力放懷息慮心逸日休調和飲食以養之斟酌藥餌以平之明察秋毫斷可必矣

張三錫醫學準繩六要

目病不宜用凉藥

目病多用凉藥世俗之見也又謂目得血而能視遂浪恃滋陰不知五臟六腑之精華皆上注於目而精華悉禀氣於脾胃飲食化生滋榮各臟腑上榮於目苦寒傷胃四物泥膈中氣受虧飲食少而運化遲氣血不生精華俱耗而目眚轉甚矣

王綸明醫雜著

論外治忌寒凉

眼赤腫痛古方用藥內外不同在內湯散用苦寒辛凉之藥以瀉其火在外點洗則用辛熱辛凉之藥以散其邪故點藥莫要於冰片而冰片大辛熱以其性辛甚故借以拔出火邪而散其熱氣古方用燒酒洗眼或用乾薑末生薑汁點眼者皆此意也蓋赤眼是火邪內炎上攻於目故內治用苦寒之藥是治其本如鍋底之去薪也然火邪既客於目從內出外若外用寒凉以阻逆之則鬱火內收不得散矣故點眼用辛熱而洗眼用熱湯是火鬱則發因而散之從治法也世人不知冰片爲劫藥而誤認爲寒嘗用點眼遂致積熱入目而昏暗瘴瞖故云眼不點不瞎者此也又不知外治忌寒凉而妄將冷水冷物冷藥浥洗致昏瞎者有之

按前證若體倦少食視而昏花或飲食勞倦益甚者脾胃虛也用補中益氣湯駁多緊澁赤脈貫睛或臟腑祕結者用芍藥清肝丸若赤贅布白畏日羞明或痛如刺者上焦風熱也用黃連飲子若久視生花畏日遠視如霧者神氣傷也用神效黃芪湯大凡午前甚而作痛者東垣助陽活血湯午後甚而作痛者黃連天花粉丸午後甚而不痛者東垣益陰腎氣丸能近視不能遠視地芝丸能遠視不能近視定志丸故東垣先生云五臟六腑之精氣皆稟受於脾上貫於目脾者諸陰之首也目者血脈之宗也故脾虛則五臟之精氣皆失所司不能歸明於目矣心者君火也主人之神宜靜而安相火代行其令相火者包絡也主百脈皆榮於目既勞役運動勢乃妄行又因邪氣所幷而損血脈故諸病生焉凡醫者不理脾胃及養血安神治標不治本是不明正理也若槩用辛凉寒苦之劑損傷眞氣促成內障之證矣

龔信古今醫鑑

目病

世謂目病而痛多由火熱及血太過予竊謂目病固由火熱然外無風寒閉之目亦不病雖病亦不甚痛蓋人感風寒則腠理閉密火熱不得外泄故上走竅而目病矣散其外之風寒則火熱瀉而痛自止洗肝散之類用凉藥內退火熱雖係一治然過多則傷脾胃不食泄瀉甚不可治也出血之治亦不可常用蓋傷其本故也目得血而能視血少則目昏矣若因血虛而目暗者則滋陰地黃丸養肝丸皆可服也

龔溥醫學正傳

崔目

問崔目之證暮則不見物至曉復明何也曰肝虛也經曰目得血而能視肝既無血則目瞀而不明矣其暮暗而曉復明者何也曰木生於亥而旺於卯絕於申至於酉戌之時木氣衰甚故暝至於卯之分木氣稍盛而目復明矣曰崔目終變爲黃賬而死何也曰木絕於申乃水土長生之地木衰而土盛故變爲黃賬宜平胃散以平土氣四物湯以補肝虛

第一百四十卷 目門

徐春甫古今醫統五輪病證　八廓病證　八廓辯　七十二證歌　目門
脈訣規正　七表八裏　九道三焦　十二經絡　陰陽
氣血　虛實　寒熱　表裏　內傷　外感　不內外因
內傷外感　不內外因　內傷不足　內傷有餘　外感
風寒　外感風熱　外感暑濕　外感燥火　外感瘟疫
內傷飲食　內傷七情　內傷勞倦　內傷房室　內傷
過極　內傷不及　內傷痰飲　內傷瘀血　內傷氣鬱
內傷食積　內傷酒毒　內傷蟲積　內傷水腫　內傷
脹滿　內傷泄瀉　內傷痢疾　內傷噎膈　內傷反胃
內傷嘔吐　內傷吞酸　內傷呃逆　內傷霍亂　內傷
轉筋　內傷腹痛　內傷心痛　內傷胸痛　內傷脇痛
內傷腰痛　內傷背痛　內傷頭痛　內傷眩暈　內傷
中風　內傷痿證　內傷厥證　內傷痙證　內傷癲證
內傷狂證　內傷疝氣　內傷遺精　內傷白濁　內傷
淋證　內傷小便不通　內傷大便不通　內傷大便
下血　內傷小便下血　內傷吐血　內傷衄血　內傷
咳嗽　內傷喘急　內傷痰喘　內傷氣喘　內傷哮喘
內傷肺痿　內傷肺癰　內傷胸痹　內傷心悸　內傷
怔忡　內傷健忘　內傷驚悸　內傷不寐　內傷多夢
內傷盜汗　內傷自汗　內傷發熱　內傷寒熱　內傷
往來寒熱　內傷潮熱　內傷骨蒸　內傷虛煩　內傷
消渴　內傷口舌　內傷咽喉　內傷齒痛　內傷鼻病
內傷耳病　內傷目病　內傷面病　內傷唇病　內傷
舌病　內傷牙病　內傷喉病　內傷鼻病　內傷耳病
內傷目病　內傷面病　內傷唇病　內傷舌病　內傷
牙病　內傷喉病　內傷頭病　內傷項病　內傷肩病
內傷背病　內傷腰病　內傷腹病　內傷脇病　內傷
胸病　內傷乳病　內傷腋病　內傷手病　內傷臂病
內傷肘病　內傷腕病　內傷足病　內傷膝病　內傷
股病　內傷陰病　內傷肛病　內傷腸病　內傷胃病
內傷膽病　內傷脾病　內傷肺病　內傷心病　內傷
腎病　內傷膀胱病　內傷三焦病　內傷包絡病　內
傷肝病　內傷經絡病　內傷氣血病　內傷陰陽病
內傷虛實病　內傷寒熱病　內傷表裏病　內傷內
外因病　內傷不內外因病　內傷內外因病　內傷
外感病　內傷內傷病　內傷不足病　內傷有餘病
內傷七表八裏九道三焦十二經絡陰陽氣血虛實
寒熱表裏內傷外感不內外因內傷外感不內外因
內傷不足內傷有餘外感風寒外感風熱外感暑濕
外感燥火外感瘟疫內傷飲食內傷七情內傷勞倦
內傷房室內傷過極內傷不及內傷痰飲內傷瘀血
內傷氣鬱內傷食積內傷酒毒內傷蟲積內傷水腫
內傷脹滿內傷泄瀉內傷痢疾內傷噎膈內傷反胃
內傷嘔吐內傷吞酸內傷呃逆內傷霍亂內傷轉筋
內傷腹痛內傷心痛內傷胸痛內傷脇痛內傷腰痛
內傷背痛內傷頭痛內傷眩暈內傷中風內傷痿證
內傷厥證內傷痙證內傷癲證內傷狂證內傷疝氣
內傷遺精內傷白濁內傷淋證內傷小便不通內傷
大便不通內傷大便下血內傷小便下血內傷吐血
內傷衄血內傷咳嗽內傷喘急內傷痰喘內傷氣喘
內傷哮喘內傷肺痿內傷肺癰內傷胸痹內傷心悸
內傷怔忡內傷健忘內傷驚悸內傷不寐內傷多夢
內傷盜汗內傷自汗內傷發熱內傷寒熱內傷往來
寒熱內傷潮熱內傷骨蒸內傷虛煩內傷消渴內傷
口舌內傷咽喉內傷齒痛內傷鼻病內傷耳病內傷
目病內傷面病內傷唇病內傷舌病內傷牙病內傷
喉病內傷鼻病內傷耳病內傷目病內傷面病內傷
唇病內傷舌病內傷牙病內傷喉病內傷頭病內傷
項病內傷肩病內傷背病內傷腰病內傷腹病內傷
脇病內傷胸病內傷乳病內傷腋病內傷手病內傷
臂病內傷肘病內傷腕病內傷足病內傷膝病內傷
股病內傷陰病內傷肛病內傷腸病內傷胃病內傷
膽病內傷脾病內傷肺病內傷心病內傷腎病內傷
膀胱病內傷三焦病內傷包絡病內傷肝病內傷經
絡病內傷氣血病內傷陰陽病內傷虛實病內傷寒
熱病內傷表裏病內傷內外因病內傷不內外因病
內傷內外因病內傷外感病內傷內傷病內傷不足
病內傷有餘病

五輪病證

血輪病因心經火熱驚恐所生宜瀉心涼肝所病大小眥赤爛多生浮腫血滿瞳人大眥先赤小眥左眼先病傳右眼皆屬心

氣輪病因肺熱白睛紅腫多主瘀血有淚白瞼侵睛名曰氣障而亦因侵冒寒暑憂思所生宜宣肺補心

風輪病因肝經積熱憑氣太盛所生病則昏暗黑花頭痛流淚宜瀉肝補肺

肉輪病因脾胃勞倦飲食不節熱毒厚味所生病則上下瞼澀眼胞腫起努肉侵睛外生小塊在廓名曰偷瞼倒睫拳毛皆屬於脾宜瀉肝清脾

水輪病因腎經虛弱酒色太過相火所成病則眼目青暗頭痛冷淚覩人物若煙視太陽若水久而失治青盲內障宜補腎補肝

八廓病證

開泉廓屬小腸經病主瘀肉侵睛

水穀廓屬脾經病主頭額常痛眵淚多黑花

會陰廓屬腎經病主昏暗淚生睛痛

抱陽廓屬命門病主瞼肉赤腫睛痛多瘀血

清淨廓屬膽經病主兩眥癢痛淚出

傳道廓屬大腸經病主昏朦多淚

津液廓屬膀胱經病主血絲侵睛努肉生瞼

養化廓屬肝經主赤筋拳毛倒睫

五輪病證

明徐春甫古今醫統

血輪病因心經火熱驚恐所生宜瀉心涼肝所病大小眥赤爛多生浮腫血滿瞳人大眥先赤小眥左眼先病傳右眼皆屬心

氣輪病因肺熱白睛紅腫多主瘀血有淚白瞼侵睛名曰氣障而亦因侵冒寒暑憂思所生宜宣肺補心

風輪病因肝經積熱憑氣太盛所生病則昏暗黑花頭痛流淚宜瀉肝補肺

肉輪病因脾胃勞倦飲食不節熱毒厚味所生病則上下瞼澀眼胞腫起努肉侵睛外生小塊在廓名曰偷瞼倒睫拳毛皆屬於脾宜瀉肝清脾

水輪病因腎經虛弱酒色太過相火所成病則眼目青暗頭痛冷淚覩人物若煙視太陽若水久而失治青盲內障宜補腎補肝

八廓病證

開泉廓屬小腸經病主瘀肉侵睛

水穀廓屬脾經病主頭額常痛眵淚多黑花

會陰廓屬腎經病主昏暗淚生睛痛

抱陽廓屬命門病主瞼肉赤腫睛痛多瘀血

清淨廓屬膽經病主兩眥癢痛淚出

傳道廓屬大腸經病主昏朦多淚

津液廓屬膀胱經病主血絲侵睛努肉生瞼

養化廓屬肝經主赤筋拳毛倒睫

八廓辯

經云眼屬五臟六腑百脈之精而具明故五輪之說有所本也八廓之說無義可據綱目所以刪之甫考八廓乃後世龍木禪師論五行八卦配合之意於義不切奈何傳誤既久俗習一辭遽爾釐剔似爲脫簡夫何世謂眼科開口五輪八廓若遺言者卽謂弗工姑存而辯之以俟杜漸

七十二證歌

冏冰滑澀散浮沉白翳黃心橫翳新聚花黑偃兼風變驚振雷頭雀目生緣烏青黑黃風障胎患傷寒熱後昏肝經積熱混睛膜努肉攀睛兩眼粘黑翳如珠花翳陷冰霞深翳入冰輪釘翳根深浮玉翳偶然逆順忽然成雞冠蜆肉瞼生粟胞肉膠凝與漏睛蠻睛突起迎風淚倒睫拳毛碧翳分鵲眼凝睛神崇痛旋螺突起纏轆形打傷撞損風牽瞼血灌瞳人脹目塵天行赤眼暴赤翳胎赤風眩客熱侵瞼硬睛疼痛如刺瞳人乾缺癢難任黃膜上衝赤膜下瞼中生贅與通睛疳眼斑瘡青膜障青盲起坐更生星血翳包睛女子逆早晨午後有其因痛極愈寒與傷損七十二候此分明

圓翳

圓翳初起如輕煙薄霧不痛不癢漸而失明名曰內障或先病一目後則俱病此是腦脂流下肝風衝上宜以金鍼撥之服防風散

冰翳

冰翳初患頭額眉瞼遍痛眼中赤澀此由肝臟積熱久成內障其翳如冰瞳人漸大宜服還睛丸

滑瞖

滑瞖初患不癢不痛先病一目後乃相牽漸漸失明有瞖如水銀珠子亦由腦脂流下肝風上衝宜決明散

澀瞖

澀瞖先病一目後兩目俱病如雲霧朦罩不見三光陰看則大陽看則小瞳人欲散宜還睛丸

散瞖

散瞖初因風熱上攻久而生瞖漸而失明其瞖如雲霧布散太虛滿如帛蒙物遂成內障宜服蟬花無比丸

浮瞖

浮瞖初患一目久則俱病亦因肝風上衝腦脂流下瞖如銀色宜服蒙瞖丸

沉瞖

此因肝臟勞熱常見黑花年久凝結成瞖色青白瞳人若沉如在水中宜還睛丸

白瞖黃心

此由勞傷太過虛熱上攻有時昏黮不能辯物久成內障白瞖中黃宜服參茯還睛丸

橫瞖

此證瞳人有膜青白色其瞖上下皆平中有如橫劍之狀宜服還睛丸

棗花

此證頭旋腦熱痛癢不休眼前常見黃黑花眼中有瞖參差如棗花宜服參茯還睛丸

黑圓瞖

此證頭旋腦熱眼黑生花肝膽積熱風火上衝腦脂結成瞖如烟色隱隱深沉如水之中不能視物宜服瀉肝散

偃月瞖

此證爲肝腎俱勞致生瞖障如偃月白色不能辯物服蒙瞖丸

五風變化

此證乃是虛勞內熱嘔吐傷睛腦熱生風令目失明初覺宜服除風湯後服補腎丸

驚振

此因五臟虛勞肝氣內促熱上衝腦毒氣流下眼中而成白瞖故成內障宜服鎮肝丸

雷頭風

此證因熱毒上衝於頭及面目頸項俱腫痛故曰雷頭風久而毒氣入目致令失明瞳人漸大宜服瀉肝散

高風雀目

此因臟腑熱極腎水不滋金不制木肝氣損目久則變爲青盲不見宜服瀉肝散

綠風

此證頭旋額痛眼內多赤常見紅黑不定皆因肝風熱盛致令瞳人綠閉久則無見宜服還睛丸

烏風

此證不痛不癢漸漸昏暗是由氣澀使然眞如烏風宜服補腎丸

青盲

此證多因酒色太過內傷腎氣不痛不癢漸失其明眼目俱不傷損有似常人只因一點腎氣不充故無所見有謂瞳人反背有謂瞖膜遮蒙皆非也宜服還睛滋腎之藥

黑風

此證頭旋腦痛眼澀生花往來黑暈乃是肝臟虛勞致使失明瞳人漸小宜補肝丸

黃風

此證多因胃火太盛上衝頭目初病痛澀久則昏花如霧漫天紅焰煌煌漸至失明宜瀉胃散決明散

胎患

此證因母懷孕之時酸甘太過酒色不禁移毒於胎致生目疾或赤或爛或膜或瞖宜服清凉散

傷寒熱病後黑昏

此因熱病愈後臟氣未痊餘熱未盡或多食毒味致令眼前黑暗瞳人開大視物不明宜服熊膽丸

肝經積熱

此因肝經熱甚毒氣入腦下注於目赤澀生瞖或聚或散初輕而漸重宜服酒調散瀉肝散

混睛

此證初起不痛不癢漸覺昏朦亦因勞神太過熱熾生風肝邪爲瞖而成內障久則失明宜養血瀉肝散

努肉攀睛

此因心肺二經火邪衝目至有內眥肉息漸起攀睛久而不退必定失明宜服洗心瀉肺湯外點老膿散及用手法去之

瞼生風粟

此因脾胃積熱肝木生風致使兩瞼內生風粟如粟

于磨搽目珠痛成瞖障久久漸昏流淚不止宜先以燈草去粟去血後服清脾退熱除風之藥

黑瞖如珠

此因肝經積熱勞作瞖虛致使冷痛出淚烏睛上邊黑瞖凸起如珠宜服除風湯後服補腎丸

花瞖白陷

此證初患頭痛腫澁淚出難開眼中白瞖如碎米或如魚鱗陷凹爲肝風太盛血氣俱虛宜用疎風活血湯外點熊膽膏

冰霞深瞖

此因肺熱肝風致令黑睛生白瞖如冰霞之象不宜鉤割宜服羌蔚子散

膜入冰輪

此證虛勞之過肝臟風熱年久烏睛變爲白衣漸入冰輪若有血根血筋難治宜服活血湯鎮心丸

釘瞖外障

此因心火肝風上炎入目致使赤腫有淚怕日羞明疼痛太甚生瞖如釘高突如粟宜服除熱瀉心湯後服定志丸

玉瞖浮睛

此因熱鬱不退使生白膜如玉凝睛或痛或腫久則滿睛失明宜服退瞖湯

逆順生瞖

此因五臟虛勞風熱壅蔽時常赤腫至漸生瞖或從上生或從下生上下交貫甚則厚如努肉侵及瞳人白睛紅者先服知母飲後服補虛人參丸

雞冠蜆肉

此因脾胃積熱毒氣入腦而流於目以致目生肉瞖如雞冠蜆肉之狀鉤割可去宜服羌蔚子丸搜風湯

兩瞼粘膜

此因脾胃熱毒壅於胞致使兩瞼澁赤多眵如膜或眼皮番出胬角不開宜服凉血活血湯外用消風湯洗

胞肉凝脂

此因脾胃伏熱風邪上衝久則眼胞內生肉瞖如粟米破爛如桃膠之象雖內服藥必先去餘肉及瘀血點退毒瞖方可

拳毛倒睫

此因脾肺熱壅致令眼弦瘡澁日以手揩以致倒睫有因勞倦思慮太過致令脾氣下陷而睫倒則毛拳反內眼珠受害漸生瞖膜久而不起必致失明宜以方法健起眼皮先服細辛湯後服補脾藥

碧瞖

此因風熱久亢而生碧瞖淡青色於黑睛上不痛不癢久則失明宜服退瞖散

鵲眼凝睛

此因五臟風熱結積而然所患眼目忽然疼痛眼珠脹硬轉迴不隨血氣凝滯不能榮轉宜鍼合谷諸穴以引氣血通流後用摩風膏塗之宜服搜風湯

神祟眼痛

此因心火積鬱血熱爲病或日輕夜重或好惡不常久久延患謂之邪祟宜服安心丸養心補血湯

旋螺尖起

此因腎水不足肝火有餘上注目中初覺脹痛漸生腎虛于起至黑睛高突如旋螺宜服瀉肝散補腎丸

轆轤展睛

此因臟腑壅毒致目之患兩瞼上下各開番反不相遮蔽睛出狀如轆轤惟直視不能轉動急用瀉肝散麥門冬湯

打撞傷損

若因跌打傷損積血注目者宜數止血藥內宜行血當歸川芎湯其或物傷眼珠突出可從容以手輕輕托進緩緩揉定不可洗面及目若有汚血在面上可用熱酒淋絹封貼面上少時取下血自去宜地黃酒除風湯

迎風冷淚

此證肝風入目陽氣內伏外面迎風則淚隨出內風以應外風亦各從其類也至夏月陽氣在外則不出淚則風亦在外故也若久而肝虛夏月亦有淚也宜服細辛羌蔚子散

白膜侵睛

此證肝虛肺盛故有白膜侵上黑睛白珠多赤亦肺有火邪先服瀉肺散後服蒙花散

青膜內障

此爲肝風太過入目生青膜蔽睛如霧如烟此因熱久生風致有此障久而不退必致失明宜點八寶散服瀉肝養金之藥

羞明怕日

此蓋因脾經濕熱鬱目中瞼不能開疼痛流淚怕日羞明此則內火所惡外火而然也宜服瀉脾散及去水穀地廓三焦濕熱

小兒痘瘡

此因痘毒未盡餘熱在目故目害只宜清涼解毒不須點藥

漏睛膿血

此因五臟積熱毒鬱不散以致目內生瘡膿血泛流久則清漿因而成漏甚者破陷失明宜服黃芪湯

蟹睛突起

此因五臟熱毒所攻至令烏睛上有黑瞖突起如蟹睛之狀初起急服桔梗飲後服補睛丸有用小鍼刺蟹睛上流出清水以藥點之而愈者

風牽出瞼

此因脾胃積熱肝經風盛致患赤瞼相牽甚則眼胞掉出治宜刺去瘀血烙以燈燧宜服黃芪湯

血灌瞳人

此因外物觸傷不曾散行敗血以致血灌瞳人或腫或脹疼痛難開不治則失明宜服止痛沒藥散後用活血散點以七寶膏

眯目飛塵

此因飛塵入目粘貼瞼皮睛上疼痛滲澀難開不能視物治須翻出眼皮用綿拭淨方點藥宜服寧心丸

天行赤眼暴瞖

此因運氣所加風火淫鬱大槩患眼赤腫淚出而痛或致頭額俱痛漸生瞖障遮蔽瞳人紅紫不散必有瘀血宜去之可服瀉肝散鎮心丸

天行赤眼

亦因運氣流行忽然疼痛淚出鼻塞不利初患一目後復相傳或二七後亦不愈不宜去血宜服瀉肝兼散邪外用洗藥

爛弦風瞼

此因脾胃積熱風邪相干致患眼弦赤爛小兒皆因胎氣風熱之毒宜用碧雲膏塗之後服黃芪湯

暴風客熱

此因三焦積熱久則攻目忽然白睛紅腫壅蔽烏睛痛癢不一淚出難開先用洗肝散後服補肝丸

瞼硬睛疼

此因風熱凝滯鬱結不散久則生瞖不能視物宜煨鹽煎洗點以紫金膏服活血清熱疏風之劑

痛如鍼刺

此證先惟頭痛淚出漸至痛如鍼刺此是心經伏火鬱蒸太過久則瞖膜蔽睛急宜洗心涼膈

瞳人乾缺

此因腎虛肝熱致令瞳人乾缺上下短長斜偏不正久而損目失明先宜洗肝散後服補腎丸

風癢難任

皆因風熱太盛所以癢澀難任或有迎風便癢久則兩瞼赤爛宜去瘀血洗以煨鹽煎服補肝湯

黃膜上衝

此證初患赤澀淚出漸而白睛下邊黃膜衝上烏睛遮蔽瞳人皆因肝風胃熱所致則宜點文推雲服瀉脾散

赤膜下垂

此證赤痛發歇年久漸至黑睛上邊生有赤膜垂下如紅霞之狀俗云倒垂簾瞖則宜點武推雲服清涼散

瞼中生贅

此證脾胃積久而發出以致瞼內生贅如粟如黍或有血塊俱以手法去瘀血服活血清熱藥而愈

血瞖包睛

此證多因心經熱壅肝臟虛勞致有赤脈侵睛赤肉擁簇黑睛如橡斗包裹之狀有因上下瞼有粟而致有瘀血者先去瞼內瘀血後服活血湯及退雲散

小兒疳眼

此證多是飲食炙煿甘辛積熱以致脾胃成疳上攻眼目赤澀烏珠有瞖久漸變白宜速治療若不早除多成固疾初服清熱飲次服五疳丸

早晨疼痛

此因虛陽上攻頭風注目早晨血氣皆從上行故虛陽得風火而勢益盛故疼痛也宜服芎藭散及白蒺藜散

午後昏矇

此因陰虛不足滯而不行血至午後則歛而氣不充其血故也此皆陰虛腎弱先服回陽養血湯後服滋腎丸

女人血氣逆流

此證得之經血不通氣血逆行而上攻於目故目每害之滿眼紅筋或如血瞖包睛之狀甚者血灌瞳人治此者但只通經而目隨愈宜服破血通經之藥

痛極憎寒

目痛憎寒乃爲陽虛而生外寒宜固衛氣兼治目痛若或發熱而憎寒者必有外感宜從羌活湯發散之不須治目而目痛自愈今專是科者但見憎寒輒用

附子此之謂不知本者

起坐生花

此證眼前黑花簇飛不疼不痛無脹無淚蓋是腎肝虛憊氣不充周以致視有如無視無若有氣血不足水木不榮此皆不宜點藥可服補腎湯及羊肝丸益腎丸之屬

甫按七十二證古者有之茲錄之以成全書至於論治則又不可執於是而昧法之大綱也夫大綱者標本也氣血也風火也知此三者目病其庶幾乎

行血爲治目之綱

經曰目得血而能視故血爲目之主血病則目病血衰則目脹血少則目澀血熱則目腫所以古人治目惟取神庭上星顖會前頂百會血故腎者可使立退病者可使立已昧者可使立明腫者可使立消今人亦有去血之法惟可施於暴熱暴腫又不宜以爲法之常也何則今人多是七情之鬱火氣血之耗損故去血太多而目愈槁無所滋榮病益熾矣所以彌年不愈終久失明卒致不治也爲今治者只以活血凉血爲上策而滋陰降火以收功此蓋治目之大綱固無所損而必收十全之功醫者不可以不審也

散熱爲治目之要

按河間云目病屬火故其理也病之始起可以峻用寒凉或兼七情鬱滯氣血停凝以致熱壅而爲目病者則當於苦寒劑中而加之以辛溫之藥而發散之導滯開鬱而氣血風火豈不從而發散者乎故曰散熱爲要亦表裏之意也

腫痛昏瞑

目病發壅腫兩瞼如桃合而爲一痛不可忍者宜用防風通聖散下之立愈

血氣壅腫四物湯加龍膽草防己防風羌活之屬實熱上衝而痛黃連瀉火當歸補血心煩加梔子便祕加大黃

久病目昏當用八珍湯加羌活防風甘菊佐之不可服寒凉之藥

王肯堂證治準繩

五輪

金之精騰結而爲氣輪木之精騰結而爲風輪火之精騰結而爲血輪土之精騰結而爲肉輪水之精騰結而爲水輪氣輪者目之白睛是也內應於肺西方庚辛申酉之金肺主氣故曰氣輪金爲五行之至堅故白珠獨堅於四輪肺爲華蓋部位至高主氣之升降少有怫鬱諸病生焉血隨氣行氣若怫鬱則火勝而血滯火勝而血滯則病變不測火尅金金在木外故氣輪先赤金尅木而後病及風輪也金色尚白故白澤者順也風輪者白內青睛是也內應於肝東方甲乙寅卯厥陰風木故曰風輪目竅肝肝在時爲春春生萬物色滿宇宙惟目能變故屬竅於肝也此輪清脆內包膏汁有涵養瞳神之功其色青故青堂者順也世人多黃濁者乃濕熱之害唯小兒之色最正至長食味則泄其氣而色亦易矣血輪者目兩角大小眥是也內應於心南方丙丁巳午火心主血故曰血輪夫火在目爲神光火衰則有昏瞑之患火炎則有焚燎之殃雖有兩心而無正輪心君主也通於大眥故大眥赤者實火也心包絡爲小心小心相火也代君行令通於小眥故小眥赤者虛火也若君主拱默則相火自然清寧矣火色赤唯紅活爲順也肉輪者目睛是也中央戊己辰戌丑未之土脾主肉故曰肉輪脾有兩葉運動磨化水穀外亦有兩脾動靜相應開則萬用如陽動之發生閉則萬寂如陰靜之收斂土藏萬物而主靜故脾合則萬有寂然而思睡此藏納歸靜之應也土爲五行之主故四輪亦爲脾所包涵其色黃得血而潤故黃澤爲順也華元化云目形類九竅神居中而前如日月之麗東南而晚西北也內有大絡六謂心肺脾肝腎命門各主其一中絡八謂膽胃大小腸三焦膀胱各主其一外有旁支細絡莫知其數皆懸貫於腦下連藏腑通暢血氣往來以滋於目故凡病發則有形色絲絡顯見而可驗內之何藏腑受病也外有二竅以通其氣內有諸液出而爲淚有神膏神水神光眞氣眞元眞精此皆滋目之源液也神膏者目內包涵膏液如破則黑稠水出是也此膏由膽中滲潤精華所結成者能涵養瞳神衰則有損神水者由三焦而發源先天眞一之氣所化在目之內雖不可見然使觸物損破則見黑膏之外有似稠痰者是也在目之外則目上潤澤之水是也水衰則有火勝燥暴之患水竭則有目輪大小之疾耗涸則有昏眇之危虧者多盈者少是以世無全精之目神光者謂目自見之精華也夫神光發於心源於膽火之用事神之在人也大矣在足能行在手能握在舌能言在鼻能嗅在耳能聽在目能視神舍心故發於心焉眞血者卽肝中升運滋目經絡之血

也此血非比肌肉間易行之血因其脈絡深高難得故謂之真也真氣者蓋目之經絡中往來生用之氣乃先天真一發生之元陽也大宜和暢少有鬱滯諸病生焉真精者乃先後天元氣所化精汁起於腎施於膽而後及瞳神也凡此數者一有所損目則病矣大槩自圓而長外有堅殼數重中有清脆內包黑珊神膏一函膏外則白珊神水水以滋膏水外則皆血血以滋水膏中一點黑瑩是膽所聚之精華唯此一點燭照鑒視空闊無礙者是曰水輪內應於腎北方壬癸亥子水也妙在三膽汁腎氣心神也五輪之中四輪不鑒唯瞳神乃照物者風輪則有包衛涵養之功風輪有損瞳神不久留矣或曰瞳神水也氣也血也膏也曰非也非血非氣非水非膏乃先天之氣所生後天之氣所成陰陽之妙道水火之精華血養水水養膏膏護瞳神氣爲運用神則維持喻以日月理實同之而午前則小午後則大亦隨天地陰陽之運用也大抵目竅於肝主於腎用於心運於肺藏於脾有大有小有圓有長亦由稟受之異男子右目不如左目精華女子左目不如右目光彩此各得其陰陽氣分之主也然聰愚佞直柔剛壽夭亦能驗目而知之神哉豈非人身之至寶乎

八廓

八廓應乎八卦脈絡經緯於腦貫通藏腑達血氣往來以滋於目廓爲城郭然各有行路往來而匡廓衛衆之意也乾居西北絡通大腸之腑藏屬肺肺與大腸相爲陰陽上運清純下輸精粕爲傳送之官故曰傳道廓坎正北方絡通膀胱之腑藏屬於腎腎與膀胱相爲陰陽主水之化源以輸津液故曰津液廓良位東北絡通上焦之腑藏配命門命門與上焦相爲陰陽會合諸陰分輸百脈故曰會陰廓震正東方絡通膽腑藏屬於肝肝膽相爲陰陽皆主清淨不受濁穢故曰清淨廓巽位東南絡通中焦之腑藏屬肝肝與中焦相爲陰陽肝絡通血以滋養中焦分氣以化生故曰養化廓離正南方絡通小腸之腑藏屬於心心與小腸相爲藏腑爲陽受盛之胞故曰胞陽廓坤位西南絡通胃之腑藏屬於脾脾胃相爲藏腑主納水穀以養生故曰水穀廓兌正西方絡通下焦之腑藏配腎腎絡腎與下焦相爲藏腑關主陰精化生之源故曰關泉廓藏腑相配內經已有定法而三焦分配肝腎者此目之精法也蓋目專竅於肝而主於腎故有三絡之分別焉左目屬陽陽道順行故廓之經位法象亦以順行右目屬陰陰道逆行故廓之經位法象亦以逆行察乎二目兩背之分則昭然可見陰陽順逆之道矣

開導說

夫目之有血爲養目之源充和則發生長養之功全而目不病虧滯則病生矣猶物之有水爲生物之澤時中則灌溉滋生之得宜而物秀旱潦則物壞矣皆一氣使之然也是故天之六氣不和則陰陽偏勝旱潦承之水之盈虧不一物之秀槁不齊雨暘失時而爲物害也譬之山崩水湧滂沛妄行不循河道而流任其所之不得已而疏塞決隄以泄其溢使無淪溺昏墊之患人之六氣不和水火乖違淫亢承之血之旺衰不一氣之升降不齊營衛失調而爲人害也蓋由陰虛火盛炎熾錯亂不遵經絡而來鬱滯不能通暢不得已而開溢導瘀以泄其餘使無脹潰損珠之患與戰理同其所有六謂迎香內眸上星耳際左右太陽穴也內眸正隊之衝鋒也其功雖遲漸收而平順兩太陽擊其左右翼也其功次之上星穴絕其餉道也內迎香抵賊之巢穴也成功雖速乘險而征耳際擊其遊騎耳道遠功卑智者不取此實拯危之良衛挫敵之要機與其閉門捕賊不若開門逐之爲良法也蓋病淺而邪不勝正者固內治而邪自退矣倘或六陽炎熾不若開導通之縱使其虛雖有所傷以藥內治之功而補其所虧庶免瘀滯至極而有潰爛枯凸之患惜乎開導之法利害存焉有大功於目而人不知有隱禍於目而人亦不知其摧鋒挫銳臨大敵而拯禍亂此其功之大也耗液傷膏弱光華而乏滋生此其禍之隱也惟能識證之輕重目之虛實而伐之無過不及之弊庶可爲醫之良者

點服藥說

病有內外治各不同內疾已成外證若無點之何益外有紅絲赤脈若初發乃微邪退後乃餘賊點亦可消服之猶愈內病始盛而不內治只泥外點者不惟徒點無功且有激發之患內病既成外病已見必須內外夾攻點服並行奈之何人有愚拗不同有喜服而畏點者有喜點而畏服者不知內疾既發非服不除外疾既成非點不退溶其流不若塞其源伐其枝不若斬其根揚湯止沸不如釜底抽薪此謂治本也內病既發不服而除者吾未之見也物垢須濯鏡垢須磨脂膏之釜不經洗滌烏能清淨此謂治標也若

外癥既成不點而去者吾亦未之見也若內障不服而點者徒激其火動其血氣反損無益服而點者亦然外障服而不點病初發浮嫩不定者亦退既已結成者服雖不發不長所結不除當內外夾攻方盡其妙

鉤割針烙說

鉤者鉤起之謂割割去也針非砭針之針乃針撥瞳神之針烙卽熨烙之烙此四者猶斬刈之刑剪戮兇頑之法也要在審斷明而詳奪定然後加刑先減巨魁次及從惡則情眞罪當而良善無侵濫之憂強暴無猖獗之患在治法乃開泄鬱滯滌除瘀積之術也要在證候明而部分當始可施治先伐標病後去本病則氣和血寧而精膏鮮傷耗之患輪廓無誤損之失如鉤先須識定何處皮肉筋脈浮淺而手力亦隨病輕重行之如針先須識定內障證候可針歲月已足氣血寧定者方與之庶無差謬針後當照證內治其本或補或瀉各隨其證之所宜若只治其標不治其本則氣不定不久復爲害矣割如在氣血肉三輪者可割而大背一塊紅肉乃血之英心之華也若誤割之則目盲因神在而傷者死有割傷因而惹風乃元虛之人犯燥證盛者潰爛爲漏爲枯凡障若掩及風輪之重厚者難可割亦宜輕輕旁淺淺披起及諸病如攀睛努肉雞冠蜆肉魚子石榴赤脈虬筋內睥粘輪等證可割餘病及在風輪之淺者誤割之則珠破而目損烙能治殘風潰眩瘡爛濕熱久不愈者輕則不須烙而治自愈若紅障血分之病割去者必須用烙定否則不久復生在氣分之白者不須用烙凡針烙皆不可犯及烏珠不惟珠破亦且甚痛雖有惡障厚者鉤割亦宜輕輕淺淺披去外邊其內邊障底只點藥緩伐久自潛消若鍼割風毒流毒瘀血等證當以活法審視不可拘於一定針瞳神反背又與內障之針不同在心融手巧輕重得宜口傳親見非筆下之可形容大抵鉤割針烙之治功效最速雖有撥亂反正乃乘險救危要在心小而膽大證的而部當必兼內治方盡其術

論目痛

目痛有二一謂目眥白眼痛一謂目珠黑眼痛蓋目眥白眼疼屬陽故晝則疼甚點苦寒藥則效經所謂白眼赤脈法於陽故也目珠黑眼疼屬陰故夜則疼甚點苦寒則反劇經所謂瞳子黑眼法於陰故也夏全善云夏枯草治目珠疼至夜則疼甚者神效或用苦寒藥點眼上反疼甚者亦神效蓋目珠者連目本目本又名目系屬厥陰之經也夜甚及用苦寒點之反甚者夜與寒亦陰故也丹溪云夏枯草有補養厥陰血脈之功其草三四月開花遇夏至陰生則枯蓋稟純陽之氣也故治厥陰目疼如神者以陽治陰也予周師目珠疼連眉稜骨痛及頭半邊腫痛遇夜則作用黃連膏子點上則反大疼諸藥不效灸厥陰少陽則疼頓止半月又作又灸又止者月餘遂以夏枯草二兩香附二兩甘草四錢同爲細末每服一錢五分用茶清調服下咽則疼減大半至四五日夏愈又一男子年六十歲亦目珠連眉稜骨痛夜甚用苦寒劑點亦甚與前證皆同但有白瞖二點在黑目及外背與瞖藥皆不效亦以此藥間東垣選奇湯又加四物黃連煎服并灸厥陰少陽而安

天行赤熱

目赤痛或睥腫頭重怕熱羞明淚涙交流等證一家之內一里之中往往老幼相傳者是也然有虛實輕重不同亦因人之虛實時氣之輕重何如各隨其所以而分經絡以發病有變爲重病者有變爲輕病者有不治而愈者不可槩言此專爲天時流行熱邪相感染而人或素有目疾及痰火熱病水少元虛者則爾我傳染不一其絲脈雖多赤亂不可以爲赤絲亂脈證常時如是之比若感染輕而源清邪不勝正者則七日而自愈蓋火數七故七日火氣盡而愈七日不愈而有二七者乃再傳也二七不退者必其犯觸及本虛之故防他變證矣

暴風客熱

非天行赤腫爾我感染之比又非寒熱似瘡目痛則病發病發則目痛之比乃素養不清躁急勞苦客感風熱卒然而發也雖有腫脹乃風熱夾攻火在血分之故治亦易退非若腫脹如杯等證久積退遲之比

火脹大頭

目赤痛而頭面浮腫皮肉燥赤也狀若大頭傷寒夏月多有此患有濕熱風熱濕熱多淚而睥爛風熱多脹痛而憎寒若失治則血滯於內雖得腫消而目必有變矣

羞明怕熱

謂當明熱之處而目痛澀畏難不能開也凡病熱者十之六七皆有此患病源在於心肝脾三經總而言之不過一火燥之熱病在陽分是以怕熱見熱則惡

之而濕痛思避蓋己之精光弱而不能勝彼之光是以處暗之所則清爽怕熱無不足之證蓋明有不足之證若目不赤痛而畏明者乃不足之證爲血不足腦汁少而絡弱不能運精華以敵陽光之故今人皆稱怕日蓋明者俗傳音近之誤蓋日熱二音類近習俗呼誤已久不察其理遂失其正只以怕熱蓋明論之其理灼然可見夫明字所包已廣何用再申日字若以日字專主陽光言之則怕熱一證無所歸矣

驗硬腫疼

不論有膿無膿但兩驗堅硬而睛疼頭或疼者尤急乃風熱在肝肝虛血少不能營運於目絡水無所滋火反乘虛而入會痰燥濕熱或頭風夾搏故血滯於脾肉腫因火擊而疼輕則內生椒瘡重則爲腫脹如杯察血瀝睛等證治當傅退稍輭翻脾開導之吉若堅硬之甚且漸漸麤起而痛及頭腦難已退而復來其脹日高難傳治不退不輭者此頭風欲成毒也宜服通肝散二冰散若有障膜用春雪膏點之

赤痛如邪

每目痛則頭亦痛寒熱交作如瘧狀凡病發則目痛目痛則病發輕則一年數發重則一月數發蓋肝腎俱虛之故熱者內之陰虛火動邪熱也寒者營衛虛外之腠理不實而覺寒也若作風寒瘧病或用峻劑之治則血愈虛而病愈深矣宜小柴胡合四物湯主之不效則活血益氣湯

氣眼

總怒氣則目疼宜酒調復元通氣散

痛如針刺

目珠痛如針刺病在心經實火有餘之證若痛驟然一二處如針刺目雖不赤亦是心經流火別其痛在何部分以見病將犯其經矣宜服洗心散次服還睛散及乳香丸補肝散等按此證多有體勞目勞營氣不上潮於目而如針刺之痛者宜養其營若降火則殆矣

熱結膀胱

目病則小便不通利而頭疼寒熱者方是若小便清利者非也乃熱蒸於膀胱先清利其水後治其目則愈矣蓋太陽經脈循目絡上行巔頂故頭疼火極則傢水化又血虛者表疎故發寒熱熱甚則水氣閉澀而神水被蒸乏潤安得不竭

大小雷頭風

此證不論偏正但頭痛倏疾而來疼至極而不可忍身熱目痛便祕結者曰大雷頭風若痛從小至大大便先澀後燥小便先清後澀曰小雷頭風大者害速小者稍遲雖有大小之說而治則同若一失緩禍變不測目必損壞輕則凹凸重則結毒宜早爲之救免於禍成世人每慮此患害速故疑於方犯惑於鬼祟深泥巫祝而棄醫治遂致禍成悔無及矣

左右偏頭風

左邊頭痛右不痛曰左偏風右邊頭痛左不痛曰右偏風世人往往不以爲慮久則左發損左目右發損右目有左損反攻右右損反攻左而二目俱損者若外有赤痛淚熱等病則外證生若內有昏眇眩運等病則內證生矣凡頭風痛左害左痛右害右此常病易知者若難知者左攻右右攻左痛從內起止於腦則攻害也遲痛從腦起止於內則攻害也速若痛從中間發及眉梁內上星中發者兩目俱害亦各因其人之觸犯感受左右偏勝起患不同遲速輕重不等然風之害人尤慘若能保養調護亦可免患愚者騃縱不知戒忌而反觸之以致患成而始悔良可痛哉

陰邪風

額板骨眉稜骨痛也發則多於六陽用事之時元虛精弱者則有內證之患若兼火者則有外證之病

陽邪風

腦後枕骨痛也多發於六陰用事之月發則有虛運耳鳴之患久而不治內障成矣

卒腦風

太陽內如椎似鑽一團而痛也若痛及目珠珠外有赤脈縱貫及瘀滯者必有外之惡證來矣若珠不赤痛只自覺視如雲遮霧障漸漸昏眇者內證成矣急早治之以免後慮

顛頂風

天靈蓋骨內痛極如椎如鑽也陽分痛尤甚陰分痛稍可夾痰濕者每痛多眩運若痛連及珠子而脹急瘀赤者外證之惡候若昏眇則內證成矣成內證者尤多於外者

遊風

頭風痛無常位一飯之頃遊易數徧而不能度其何所起止也若痛緩而珠赤有障起者必變外障痛甚而脹脈緊急者必有瘀滯之患久而失治不赤痛而昏眇者內證來成外證者多然爲害遲如各風耳

邪風

人素有頭風因而目病或素目病因而頭風二邪並立搏爽而深入腦袋致傷肝膽諸絡故成此患頭痛則目病目病則頭痛輕則一年數發重則一月數發頭風目病常並行而不相悖也非若雷頭風風火搏激而瘀滯之急者又非若天行赤熱傳染之邪客風暴熱之風火寄旅無定及諸火脹頭痛之比此專爲自家本病久成者非若彼之標病新來之輕者若赤痛脹急則有外證之候若無赤痛而只內脹及赤痛不甚無瘀滯之證而只昏眇者內證成矣

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百六十二卷目錄

醫部彙考一百四十二

目門五

王肯堂證治準繩論目赤 赤血灌睛 赤脈貫睛 邪犯胞廓 赤絲亂脈 赤脈貫瞳神 赤絲見脈 目珠俱青 淫目腫脹 體脈如杯形如蝦座狀如魚泡 鎖喉痧睛 自覺珠突出眶 旋螺泛起 旋螺尖起 辨珠論目 辨若蟲行 辨外障 黃膜上衝 垂簾睛 花翳白陷 赤膜下垂 黃油障 凝脂腎狀如懸 翳障 玉粒分經 銀星獨見 聚開障 聚星陷陣 渤波腎 聚星陷陣 瑪瑙內鄉 連珠外腎 劍脊腎 冰瑕腎 腎外障 水晶障 魚鱗障 馬蛭損勞 肉腠蚕 睛冠蚬肉 魚子石榴 輪上一顆如赤豆 睛中一點似銀星 五花障 論內障 青盲內障 絲風內障 黑風內障 烏風內障 黃風內障 內障 銀風內障 絲風內障 烏風內障 偃月內障 脅月內障 如金內障 障 絲於雅神 垂簾誤睛 瞳神散腎內障 冰消腎內障 沉腎內障 偃月傍睛 浆花障 浮腎內障 沉腎內障 偃月傍睛 白腎黃心 黑花腎

藝術典第一百六十二卷

醫部彙考一百四十二

目門五

明王肯堂證治準繩

論目赤

內經目赤有二一曰風助火鬱於上經云少陰司天之政二之氣陽氣布風乃行寒氣時至民病目瞑目赤氣鬱於上而熱又云少陽司天之政初之氣風勝乃逆候乃大溫其病氣怫於上目赤是也二曰火盛經曰火太過曰赫曦赫曦之紀其病目赤又云火鬱之發民病目赤心熱又曰少陽司天之政三之氣炎暑至民病熱中目赤又云少陽之勝目赤是也三曰燥邪傷肝經云歲金太過燥氣流行民病目赤又云陽明司天燥氣下臨肝氣上從脅痛目赤是也

目赤暴作雲腎痛不可忍宜四物龍膽湯

眼赤暴發腫散熱飲子瀉青丸

肝臟實熱眼赤疼痛竹葉湯龍膽飲決明子湯麥門冬湯瀉肝散羊肝丸服寒涼藥太過目赤而不痛內服助陽和血補氣湯外用碧天丸洗之

目赤腫足寒者必用時時溫洗其足并詳赤脈處屬何經灸三里臨泣崑崙等穴立愈

瘀血灌睛

瘀血灌睛為病最毒若人偏執己見不用開鎌者其目必壞初起不過紅赤次後紫脹及後則白珠皆脹起甚則脹形如蝦座蓋其病乃血灌睛中瘀塞不通在脾則腫脹如杯椒瘡之患在珠則白輪涌起凝脂腎黃簇上衝痕凹成窟花腎白陷鴿眼凝睛等惡證出也失治者必有青黃膜出凹凸之禍凡見白珠赤紫脾腫虬筋紫脹傳點不退必有瘀滯在內可翻睥內視之若睥內色暈泛浮椒瘡或粟瘡者皆用導之之法則吉不然將有變證生焉宜服宣明丸分珠散麥門冬湯通血丸及膝歸糖煎散等劑

血灌瞳神

謂視瞳神不見其黑瑩但見其一點鮮紅甚則紫黯色也病至此亦甚危且急矣初起一二日尚可救遲則救亦不愈不但不愈恐其人亦不久蓋腎之眞一有傷膽中精汁皆損故一點元陽神氣靈光見其血之英色而顯於腎部十患九不治者今人但見瘀血灌睛便呼為血灌瞳神謬矣

色似臙脂

不論上下左右但見一片或一點紅血儼似臙脂抹者是也此血不循經絡而來偶然客遊肺膜之內滯成此患若欲速愈者略略於相近處睥內開導治之或就於所滯之處開之亦好若畏開者內外夾治亦退只是稍遲獨於內治亦退其效尤遲亦有寡欲慎火者不治自愈若犯禁而變則瘀滯轉甚因而感激風熱者他證生焉

赤脈貫睛

或一赤脈或二三赤脈不論粗細多少但在這邊氣輪上起貫到風輪經過瞳外接連那邊氣輪者最不易治且難退而易來細者稍輕粗者尤重從上下者重從下上者稍輕貫過者有變證絲粗及有旁絲虬亂者有變證凡各障外有此等脈罩者雖在易退之證亦退遲也貫雖未連而侵入風輪或一半或三分之二之一皆不易退蓋得生氣之故也此證專言脈已挂侵風輪之重非比赤絲亂脈止在氣輪之輕者今人但見絲脈便呼為赤脈貫睛非也夫絲脈在風輪氣輪上下粗細連斷為病各有緩急常變不同既不能明其證又何能施療乎

赤絲亂脈

謂氣輪有絲脈赤亂久久常如是者然害各不同或因目痛火雖退不守禁戒致血滯於絡而赤者或因胃風沙烟瘴親火伺熱鬱氣勞心恣酒嗜燥竭視勞

瞻而致有所鬱滯而赤者有痛不痛有淚無淚有羞明不羞明爲病不等蓋病生在氣輪白珠上有絲脈縱橫或稀密粗細不等但常常如是久而不愈者是也非若天行客風等證之暴塞赤脈貫睛之難惡者比若只赤亂或昏眵濕緊不爽或有微微淚濕者輕因而犯戒者變重若脈多赤亂兼以枯澁而緊痛淚濕而爛膿者重驗之當以大脈爲主從何部分而來或穿連某位即別其所患在何經絡或常或變自病合病等證分其生尅承制然後因其證而投其經以治之治外者細脈易退大脈亂紫者退遲雖點細而脈大者必須耐久去盡方已庶無再來之患不然他日犯禁其病復發若有別證火亦循此而至凡絲脈沿到風輪上者病尤重而能變若因其滯而日積月累一旦觸發脈紫脹及脾腫者用開導之凡見絲脈虬紫內服外點點時細縮不點即脹久亦然及因而激動滯病變者珠雖不紫脾雖不腫亦有積滯在內深處乃積滯尚輕而在絡中幽深之所故未脹出耳揭開上脾深處看之其內必有不平之色在焉因其滯而量其輕重略略導之不可過則有傷眞血亦虧膏澀目中昏弱之患

目珠俱青

目珠俱青證乃目之白珠變青藍色也病在至急蓋氣輪本白被鬱邪蒸逼走散珠中膏汁遊出在氣輪之內故色變青藍膽神必有大小之患失治者膽神損而爲終身痼疾矣然當各因其病而治其本夫頭風者風邪也傷寒瘧疾痰火熱邪也因毒者毒氣所攻也餘倣此

論目腫脹

肝經實熱眼赤腫痛麥門冬湯瀉肝散龍膽飲風熱上攻目赤腫痛金絲膏琥珀煎滌風散白睛腫脹痛地黃丸桑白皮散洗眼青皮湯元參丸瀉肺湯朱砂煎

腫脹如杯

謂目赤痛睜脹如杯覆狀是邪在木火之有餘蓋木尅土火生土今肝邪實而傳脾土土受木尅而火不能生火邪反乘虛而爲炎燥之病其珠必疼尤重而睜亦急硬若暴風客熱作腫者必熱淚多而珠疼稍緩然風熱自外客感易退治亦易愈若木火自內攻擊則病亦退遲重則疼滯閉塞血灌睛中而變證不測矣須用開導之法輕則敷治而退重則必須開導此大意也若敷治不退及退而復來併開導不消而復發痛連頭腦而腫愈高睜愈實者此風熱欲成毒之候也

形如蝦蟆

因瘀滯已甚血脹無所從出遂致瘀起氣輪狀如蝦蟆甚則吐出睜外者病尤急非比魚泡氣分之可緩者療血灌睛證與此證病雖一種灌睛則槩言而未至於極此則極矣有牛邊脹起者有通珠俱被脹起蓋定烏珠者又有大皆內近鼻梁處脹出一片如皮如肉狀似袋者乃血脹從額前中落來故脹起於大皆裏白上寬皮也不可割爲血之英華在此處誤割者爲漏爲瞎不可不辨認仔細只用開導血漸去而皮漸縮小皆脹出如袋者亦然其病大意是血氣兩盛之患宜以開導爲先次看餘證從而治之在肺部最重久則移傳於肝而風輪有害也

狀如魚泡

氣輪努脹不紫不赤或水紅或白色狀如魚泡乃氣分之證金火相搏所致不用鍼導唯以清涼則自消復若有微紅及赤脈者略略於上睜開之不可過此亦是通氣之說雖不通亦可若頭痛淚熱及內燥而赤脈多者防有變證宜早導之庶無後患

鵲眼凝睛

有項強頭疼面瞼赤燥之患其狀目如火赤綻大脹於睜間不能斂運轉動若廟塑凶神之目猶鵲鳥之珠赤而綻凝者疑定也乃三焦關格陽邪實盛亢極之害風熱壅囲諸絡澁滯目欲爆出矣大宜於內迎香太陽兩睜上星等處要隘之所並舉而劫治之

因風成毒

初發時乃頭風濕熱瘀血灌睛瞼硬睛疼等病失於早治難治不得其法遂致邪盛搏爽成毒睜與珠通行脹出如拳似碗連珠帶腦痛不可當先從烏珠爛起後爛氣輪有爛沿上下瞼并腦及額上肉盡空而死若飲食少脾泄臟絡者死尤速若能飲食而臟調者死遲人至中年患此者百無一二可生若患頭疼腫脹珠凸等證治退復發再治再發痛脹如前者即成此患若已成者雖治之脹少退痛少止決又發發時再治至於數四終當一發不復退矣既成此證必無可生之理永成者十分用心調攝療治得宜猶有可生凡目病但見頭腦痛甚珠及睜脹而瘀努硬緊雖敷鍼亦不輒總開時略軟少頃如故者皆此病來也宜向內尋其源而救之庶無噬臍之悔

旋螺泛起

氣輪自平水輪自明惟風輪高泛起也或只半邊泛起者亦因半邊火來之故乃肝氣獨盛膽液滯而木道澀火鬱風輪故隨火脹起或在下或在上或在兩旁各隨其火之所來從上脹者多非比旋螺尖起已成證而俱凸起頂尖不可醫者乃止言風輪脹起者耳

旋螺尖起

乃氣輪以裹烏珠大槩高而綻起如螺螄之形圓而尾尖視烏珠亦圓而中尖高故曰旋螺尖起因亢滯之害五氣壅塞故脹起烏珠在肝獨盛內必有瘀血凸起可以平治夫於內平之法則瘀雖退而氣定膏凝不復平矣病甚膏傷者珠外亦有病如橫醫玉醫冰醫沉滑等證在焉蓋初起特本珠欲凸之候因服寒涼之劑救止但失於戕伐木氣故血雖退而絡凝氣定不復平也

神珠自脹

目珠脹也有內外輕重不同若輕則自覺目內脹急不爽治亦易退重則自覺脹痛甚甚則人視其珠亦覺漸漸脹起者病亦發見於外已甚大凡目珠覺脹急而不赤者火尚微在氣分之間痛者重重則變赤痛脹急重者有瘀塞之患疼滯甚而脹急珠覺起者防鶻眼之禍若目不赤止覺目中或脹或不脹時作時止不一者爲火無定位遊客無常之故有風邪濕熱氣勝怫鬱者皆有自脹之患但經血部至於痛者皆重而有變矣

珠突出眶

烏珠忽然突出眶也與鶻眼證因滯而慢慢脹出者不同其故不一有因眞元將散精華衰敗致絡脈俱損痒極揩擦而出者其人不久必死有因酒醉怒甚及嘔吐極而掙出者有因患火證熱極而關格亢極而脹出者有因怒甚吼喊而掙出者此皆因水液衰少精血耗損故脈絡澀脆氣盛火極火無所從出出而竅澀泄之不及故涌脹而珠出亦有因打撲而出者凡出雖離兩瞼而脈皮未斷者乘熱捺入雖入脈絡損動終是光損若突出猶含在瞼中者易入光不損若離瞼脈絡皮俱斷而出者雖華佗復生不能救矣

論目痒

因風而痒者驅風一字散因火而痒者類於赤痛求降火之劑因血虛而痒者四物湯

痒若蟲行

非若常時小痒之輕乃如蟲行而痒不可忍也爲病不一須驗目上有無形證決其病之進退至如有障無障皆有痒極之患病源非一有風邪之痒有血虛氣動之痒有虛火入絡邪氣行動之痒有邪退火息氣血得行脈絡通暢之痒大凡有病之目常時又不醫治而自作痒者痒一番則病重一番若醫治後而作痒病必去速若痒極難當時時頻作目覺低陷者命亦不久有極痒而目脫者死期至矣痒而淚多者血虛夾火大抵痛屬實痒屬虛雖有火亦是邪火乘虛而入非其本病也

論外障

在睛外遮暗如內經診目痛赤脈從上下者太陽病從下上者陽明病從外走內者少陽病按此論表裏之醫明矣用以治病如鼓應桴也

凡赤脈醫初從上而下者屬太陽以太陽主表其病必連眉稜骨痛或腦頂痛或半邊頭腫痛是也治法宜溫之散之溫則蠟茶鹽川附等分煎服立愈薛立齋常以此證用川附一錢作一服隨愈一方附子半兩芽茶一大撮白芷一錢細辛川芎防風羌活荊芥各半錢煎服神效散則簡要夏枯草散必與退雲丸相兼服東垣選奇湯羌活除醫湯之類是也

赤脈醫初從下而上者或從內眥出外者皆屬陽明以陽明主裏其證多熱或便實是也治法宜下之寒之下則局方流氣飲錢氏瀉青丸局方溫白丸加黃連黃蘗之類累用累驗寒則一味黃連羊肝丸之類是也

赤脈醫初從外眥入內者爲少陽以少陽主半表裏治法宜和解之神仙退雲丸羌活退醫湯消醫散之類是也

醫膜者風熱重則有之或斑入眼此肝氣盛而發在表也醫膜已生在表明矣宜發散而去之若反疏利則邪氣內蓄爲醫益深邪氣未定謂之熱醫而浮邪氣已定謂之冰醫而沉邪氣牢而深者謂之陷醫當以焮發之物使其邪氣再動醫膜乃浮佐之以退醫之藥而能自去也若病久者不能速效宜以歲月除之

新醫所生表散方東垣羌活除醫湯有熱者退雲丸之類

焮發陷醫保命羚羊角散之類用之在人消息若陰

虛有熱者兼服神仙退雲丸

瞖除盡至其年月日期復發者或間一月或二月一發皆爲積滯如脈滑者宜溫白丸加黃連草龍膽如東垣五積散服之

黃膜上衝

在風輪下際次位間神膏之內有瞖生而色黃如牛皮人指甲內際白嚴相似與凝脂瞖同一氣脈但凝脂瞖在輪外生點藥可去者此則在膏內熱蒸起點藥所不能除若漫及瞳神其珠必損不可誤認爲涌波可緩者之證此是經絡阻塞極甚三焦關格火土邪之盛實者故大便祕小便澀而熱蒸從膏內作膿潰起之禍也失治者日有凹凸之患宜通神瀉胃湯神消散皂角丸犀角飲選用

赤膜下垂

初起甚薄次後甚大大者病急其患有障色赤多赤脈貫白輪而下也烏珠上半邊近白際起障一片仍有赤絲牽絆障大絲粗赤甚澀澀珠疼頭痛者病急而有變絲細少色微赤珠不疼頭不痛者緩而未變亦有珠雖不疼頭亦不痛若無他證或只澀赤而生薄障障上仍有細絲牽纏或赤膜兩邊絲下仍起星數點此星亦是凝脂之微病也此等皆是火在內滯之患其病尚輕治亦當善蓋無形之火潛入膏內故作是疾非比有形血熱之重也若障上有絲及星生於絲梢皆是退遲之病爲接得絲脈中生氣故易生而難退雖然退遲瞖薄絲細赤不甚者只用善逐之足矣甚者不得已而開導之大抵白珠上半邊有赤脈生起垂下到鼻赤脈不論多寡但有疼痛虬赤便是凶證來了若是絲少赤微但從上而落者退亦遲治當耐心若貫過瞳神者不問粗細聯斷皆退遲此證是濕熱在腦幽隱之火深潛在絡故有此脈之赤四圍雖無瘀血其深處亦有積滯絲滯尚深而火尚伏故未甚耳一旦觸發則其患迸發疾亦盛矣內無澀滯外無此病輕者消散重者開導此定法也內服炙肝散外用紫金膏點之大服通肝散神消散皂角丸

凝脂瞖

此證爲病最急起非一端盲瞽者十有七八在風輪上有點初起如星色白中有凹如針刺傷後漸長大變爲黃色凹亦漸大爲窟者有初起如星色白無凹後漸大而變色黃始變出凹者有初起便帶鵝黃色或有凹或無凹後漸漸變大者或初起便成一片如障大而厚色白而嫩或色淡黃或有凹或無凹而變者或有障又於障內變出一塊如黃脂者或先有痕凹後變出凝脂一片者所變不一禍則一端大法不問星障但見起時肥浮脆嫩形大而色黃善變而速長者即此證也初起時微小次後漸大甚則爲窟爲漏爲蟹睛內潰精膏外爲凹凸或氣極有聲爆出稠水而破者此皆鬱遏之極蒸鑠肝膽二絡清氣受傷是以漫及神膏潰壞雖遲不過旬日損及瞳神若四圍見有瘀滯者因血阻道路清汁不得升運之故若四圍不見瘀赤之甚者其內絡深處必有阻滯之故凡見此證當作急曉夜醫治若遲待長大蔽滿烏珠雖救得珠完亦帶病矣去後珠上必有白障如魚鱗外圓瞖等狀終身不能脫若結在當中則視昏眇凡目病有此證起但是頭疼珠痛一便燥澀即是急之極甚若二便通暢禍亦稍緩有一於斯猶爲可畏也

花瞖白陷

因火鑠絡內膏液蒸傷凝脂從四圍起而漫神珠故風輪皆白或微黃視之與混障相似而嫩者大法其病白輪之際四圍生漫而來漸漸厚闊中間尚青未滿者瞳神尚見只是四圍高了中間低了些此金剋木之禍也或有就於脂內下邊起一片黃膜此二證夾攻尤急亦有上下生起名順逆障內變爲此證者此火土鬱遏之禍也亦有不從浴際起只是凝脂瞖色黃或不黃初小後大其細條如瞖或細顆如星這邊起一箇那邊起一箇四散生將起來後纔長大牽連混合而害目此木火禍也以上三者必有所滯治當尋其源濬其流輕則清涼之重則開導之若病漫及瞳神不甚厚重者速救亦有挽回之理但終不得如舊之好凡疾已甚雖瞳神隱隱在內亦不能救其無疾止可救其凹凸而已如母飲子桑白皮湯

蟹睛

謂眞睛膏損凝脂瞖破壞風輪神膏綻出黑顆小則如蟹睛大則如黑豆甚則損及瞳神內視瞳神亦如杏仁棗核狀者極甚則細小如無者至極則青黃牒出者此證與黑瞖如珠狀類而治大不同夫黑瞖如珠源從膏內生起非若此因破而出故大不同然有虛實二證虛者輕而不疼來遲去速實者堅而多痛來速去遲其視有二其治則一雖有妙手難免瘢靨之患

斑脂瞖

其色白中帶黑或帶青或焦黃或微紅或有細細赤脈絆睪有絲絆者則有病發之患以不發病者論大略多者粉青色結在風輪邊旁大則掩及瞳神掩及瞳神者目亦減光雖有神手不能除去治者但可定其不垂不發亦須內外夾治得氣血定久瘕結牢固庶不再發若治欠固或即偶犯則斑迹發出細細水泡時起時隱甚則發出大泡起而不隱又甚則於本處作痛或隨絲生障或蟹睛再出矣其病是蟹睛收回結疤於風輪之側非若瑪瑙內傷因內傷氣血結於外生之證猶有可消之理故治亦不同耳

黃油障

生於氣輪狀如脂而淡黃浮嫩乃金受土之濕熱也不腫不疼目亦不昏故人不求治無他患至老只如此略有目疾發作其證則為他病之端矣揭開上瞼目上邊氣輪上有黃油者是濕熱從腦而下目必有病又非兩旁可緩之比或有頭風之患然此病為患又緩治亦容易但不治者恐貽後患故宜預自保重而去之瘡風目上有此者又重與常人不同

狀如懸膽

有腎從上而下貫及瞳神色青或斑上尖下大薄而圓長狀如膽懸以此得名蓋腦有瘀熱肝膽脊汁有損變證急來之候宜作緊醫治若服帶細細赤脈紫脹而來者尤急頭疼者尤惡內必有滯急向四圍尋其滯而通之庶免損壞之患

玉粒分經

此證或生於脾或生於氣輪生於氣輪者金火亢承之證燥熱為重生於脾者濕熱為重由土之燥滯其形圓小而顆堅淡黃色或白肉色當辨其所生部分而治之故曰玉粒分經初起不疼治亦易退亦有輕而自愈者若恣酒色嗜辛熱火毒多怒忿躁急之人及久而不治因而積久者則變大大而堅堅而疼或變大而低潰色白或淡黃如爛瘡相似者證尚輕若復不知禁忌且犯戒者則爛深爛深復至於不戒不治者則變為漏矣不可誤認為聚瘡

銀星獨見

烏珠上有星獨自生也若連萃而相生相聚者不是星蓋星不能大大而變者亦不是有虛實自退不退之證虛實者非指人之氣血而言乃指絡間之火而言若絡間之虛火客遊因而鬱滯於風輪結為星者其火無源不得久滯火退氣散膏清而星自消若火有源而來氣實壅滯於絡者則水不清故星結不散其色白圓而顆小浮嫩者易退易治沉澀堅滑者宜作急治之恐滯久氣定治雖退而有迹為冰瑕矣夫星者猶天之有星由二氣而結其大小亦由積受盛衰之所致無長大之理故人之患星亦由火在睛分故為星星亦不能大若能大者此必是各障之初起也障猶雲雲隨天地之氣而聚散障因人之激戒而消長即如凝脂一證初起白顆小而圓嫩儼然一星不出一二日間漸漸長大因而觸犯遂致損目若誤認為星則謬於千里矣亦有凝脂雖成因無根客火鬱在膏中作此一點無所觸犯善於護養水清而退者便謂是星退醫者亦謂是星退遂誤認為星終身執泥不改者誤人多矣每見世人用愚夫蠢婦執草掄絲朝燈對日呪咀詭魘謂之結眼間有凝脂水晶銀星虛火聚開瞽障等證偶然而退遂以為功駭羨相傳眇醫藥藥智者尚蒙其害況愚人乎夫人之目因氣血不能清順是故壅滯而生病焉調養緘護尚恐無及乃反勞掙強視搏此陽光即無病之目精強力盛者且不能與之敵而況病目能無損乎雖停病自退者光亦渺茫難醒大凡見珠上有星一二顆散而各自生過一二日看之不大者方是若七日而退者火數盡之故若連萃黃串相生及能大者皆非星也又有一等愚人看各色障瞽亦呼為星者抑又謬之甚矣

聚開障

謂障或圓或缺或厚或薄或如雲似月或數點如星痛則見之不痛則隱聚散不一來去無時或月數發或年數發乃腦有濕熱之故痰火人患者多久而不治方始生定因而觸犯者有變證生成不退各隨所發形證而驗之鎮心丸退血散連翹散磨膏美玉散

聚星障

烏珠上有細顆或白色或微黃微黃者急而變重或烏珠上密密相聚或散漫或一同生起或先後逐漸而生由一而二而三而四四而六七八十數忽生起者初起者易治生定者退遲能大者有星相聚大而作一塊者有凝脂之變聯綴四散傍風輪白際而起變大而接連者花腎白陷也若兼赤脈爬絆者退遲若星腎生於絲盡頭者亦退遲進速且有變蓋接得脈絡生氣之故此證大抵多由痰火之患能保養者庶幾可愈斷喪犯戒者變證生焉宜羚羊角散

垂簾障

生於風輪從上邊而下不論厚薄但在外色白者方是若紅赤乃變證非本病也有初起水膏不清而便成此者有起先赤色火退後膏澀結為此者因其自上而下如簾之垂故得此名有證數般相似緩急不同治亦各異不可誤認混呼而誤人一努肉初生亦在風輪上邊起但色如肉且橫厚不同一偃月侵睛亦在上邊起是氣輪膜內垂下白色而薄與此在外有形者不同一赤膜下垂因瘀滯火實之急者不同此則只是白障漫漫生下來而為混障者間有紅亦是略略微紅而已因其觸犯搏動其火方有變證其病從上而下本當言順何以逆稱蓋指火而言火本炎上今反下垂是其逆矣羌活除翳湯

湧波翳

障從輪外自下而上故曰湧波非黃膜上衝從內向上之急證者可比白者緩而不變赤者急而有變亦有激犯變發他證者就於此障之內變出黃膜治宜先去上衝後治此證則萬無一失矣流氣飲

逆順障

色赤而障及絲脈赤亂縱橫上下兩邊生來若是色白而不變者乃是治後凝定非本證生來如是治亦不同若色浮嫩能大或微黃色者又不是此證乃花翳白陷也凡見風輪際處由白珠而來無數粗細不等赤脈周圍圈圓侵入黑睛黑睛上障起昏澀者即此證必有瘀滯在內蓋滯於左則從左而來滯於右則從右而來諸絡皆有所滯則四圍而來脾雖不赤腫疼雖不障痛亦有瘀滯於內不可輕視若傷於膏水則有翳嫩白大而變為花翳白陷若燥澀甚者則下起一片變為黃膜上衝之證若頭疼珠痛脹急者病又重而急矣消翳散

陰陽翳

烏珠上生二翳俱白色一中虛一中實兩翳連串如陰陽之圖若白中略帶焦黃色或純白而光滑沉澀者皆不能去盡若有細細赤絲絆者退尤遲大抵此證非心堅耐久不能得其效也羌活退翳散

瑪瑙內傷

其障薄而不厚圓斜不等其色昏白而帶焦黃或帶微微紅色但如瑪瑙之雜者是雖生在輪外實是內傷肝膽眞氣清液受傷結成此翳最不能治盡或先有重病退後結成者久久耐心醫治方得減薄若要除淨須華佗更生可也

連珠外翳

與聚星似是而非蓋聚星在可治之時而色亦不同此其凝定之證形色沉滯堅澀等狀雖有妙手久治亦難免跡滯如冰瑕之患也

劍脊翳

亦名橫翳色白或如糙米色者或帶微微焦黃色者但狀如劍脊中間略高兩邊薄些橫於風輪之外者即此證也厚薄不等厚者雖露上下風輪而瞳神被掩視亦不見薄者瞳神終是被掩視亦昏眊較之重者稍明耳縱色嫩根浮者亦有癥痕若滑澀根深沉者雖有妙手堅心止可減半若微微紅絲罩絆者尤為難退易來以上不論厚薄非需之歲月必無功耳七寶湯皂角丸生熟地黃丸

冰瑕翳

薄薄隱隱或片或點生於風輪之上其色光白而甚薄如冰上之瑕若在瞳神旁側者視亦不礙光華若掩及瞳神者人看其病不覺自視昏眊渺茫其狀類外圓翳但甚薄而不圓又似白障之始但經久而不長大凡風輪有痕凹者點服不久不曾補得水清膏足及凝脂聚星等證初發點服不曾去得盡絕并點片腦過多障跡反去不得盡而金氣水液凝滯者皆為此證大抵雖治不能速去縱新患者必用堅守確攻久而方退若滑澀沉深及患久者雖極治亦難盡去

圓翳外障

薄而且圓其色白大小不等厚薄不同薄者最多間有厚者亦非堆積之厚比薄者稍厚耳十有九掩瞳神亦名遮睛障病最難治為光滑深沉之故有陰陽二證之別陽者明處看則不甚鮮白暗處看則明亮而大陰者暗處看則昏淺明處看則明大然雖有陰陽驗病之別而治法則同雖堅心久治亦難免終身之患

水晶障

色白如水晶清瑩見內但高厚滿珠看雖易治得效最遲蓋雖清而滑根深氣結故也乃初起膏傷時內服寒涼太過外點冰片太多致精液凝滯結為此病非比白混障之浮嫩可治者當識別之庶無舛誤其名有三曰水晶曰玉翳浮瞞曰冰輪如冰凍之堅若旁斜細看則白透睛瞳內陰處與日中看其形一同治雖略減難免終身之患

魚鱗障

色雖白澀而不光亮狀帶鼓斜故號魚鱗乃氣結膏凝不能除絕者如凝脂醫損及大片病已甚不得已大用寒涼及冰片多點者往往結爲此也

馬蝗積

與努肉大同小異蓋殺伐內外藥治皆同但努肉有不用割而治愈故曰小異也亦有是努肉先起後變爲重其狀兩頭尖薄中間高厚肉紅色若馬蝗狀橫臥於中四邊有薄薄肉油紫赤筋脈圍遶乃血分之病久久方成最不易治且難去而易來風病人每多患此治之必先用鉤割十去五六方用殺伐之藥則有功不割則藥力不敵病勢徒費其力然割須用烙其根處不爾則朝去暮生枉受痛楚多則有激邪之禍變證出焉外雖劫治內須平治不然外雖平而內必發徒勞無功此狀乃橫條非若努攀漫積之謂也

努肉

多起上輪有障如肉或如黃油至後漸漸厚而長積赤瘀努起如肉或赤如硃凡性躁暴悖恣嗜辛熱之人患此者多久則漫珠積肉視亦不見治宜殺伐久久自愈積而無瘀甚惡證及珠尚露者皆不必用鉤割之治一日努肉攀睛或先赤爛多年肝經爲風所衝而成或用力作勞有傷肝氣而得或痒或痛自兩眥頭努出心氣不寧憂慮不已遂乃攀睛或起筋膜宜服洗刀散及二黃散定心丸

肺瘀

由眥而起貫過氣輪如皮似筋橫帶至於風輪光亦不損甚則掩及瞳神方礙瞻視大抵十之八九皆由大眥而起有赤白二證赤者血分白者氣分其原在心肺二經初起如薄薄黃脂或赤脈數條後漸漸大而厚赤者少白者多雖赤者亦是白者所致蓋先有白而不忌火毒辛熱故傷血而赤非血分之本病也治赤雖退其質不退必須殺伐殺伐之治雖不見形勢之惡久而且痛功亦遲緩不若一割即去烙之免其再發大抵眼科鉤割一法唯此患最爲得效

雞冠蜆肉

二證形色相類經絡相同治亦一法故總而言之非二病同生之謂也其狀色紫如肉形類雞冠蜆肉者即是多生睥眥之間然後害及氣輪而遮掩於目治者須用割治七八後用殺伐不然藥徒費功若割亦用烙定方好其目大眥內有紅肉一塊如雞冠蜆肉者乃心經血部之英華若誤割者輕則損目重則喪命慎之抽風湯決明散

魚子石榴

二證經絡同治法亦同故總而言之亦非二病同生魚子障非聚星之比又非玉粒之比其狀生肉一片外面纍纍顆顆叢生於目或淡紅色或淡黃色或肉色狀如石榴子綻露於房其病紅肉顆或四或六或八四角生來障滿神珠視亦不見已上二證俱是血部瘀實之病目疾惡證治用割割後見三光者方可伐治三光瞑黑者內必瞳神有損不必治也

輪上一顆如赤豆

氣輪有赤脈灌注直落風輪風輪上有顆積起色紅初如赤小豆次後積大專爲內有瘀血之故急宜開導血漸通顆亦漸消病到此十有九損若白珠上獨自有顆鮮紅者亦是瘀滯上下無絲脈接貫者只用點服自消若有接貫者必絡中有血灌來宜向所來之處尋看量其輕重而導之若白輪有紅顆而脹急澀痛者有變而急痛連內而根深接內者火疳也又非此比若白珠雖有紅顆而珠不疼雖疼不甚者病輕治亦易退善消可矣

睛中一點似銀星

白點一顆如星光滑當睛中蓋定雖久不大不小旁視瞳神在內只是小些正視光華亦損乃目痛時不忌房事及服滲泄下焦寒涼之藥過多火雖退而腎絡氣滯膏凝結爲此病雖服藥不退點亦不除終身之患也

五花障

生於神珠之上斑斑雜雜蓋五臟經絡間之氣俱傷結爲此疾其色或白或如糙米色或肉色中帶焦黃微紅藍碧等色斑爛駁雜不一若中有一點黑色者乃腎絡氣見雖治不能盡去此狀與斑脂醫瑪瑙內傷形略相似斑脂醫乃破而結成瘢痕不能去者瑪瑙內傷乃小而薄未掩瞳神之輕者此則高厚顯大生在膏外可退故不同耳

混障

謂漫珠皆一色之障也患之者最多有赤白二證赤者易治於白者赤者怕赤脈外爬白者畏光滑如苔有此二樣牽帶者必難退而易發若先因別證而成混障則障去而原病見矣若無別證到底只是一色者若混障因而犯禁觸發者則變證出先治變證後治本病一云混睛證白睛先赤而後痒痛迎風有淚

閉澀難開或時無事不久亦發年深則睛變成碧色滿目如凝脂赤絡如橫赤絲此毒風積熱宜服地黃散外點七寶膏

驚振外障

目被物撞觸而結爲外障也與傷在膏上急者不同初撞目時亦有珠疼澀脹之苦爲其傷輕而疼自消故痛雖止而不戒禁有所觸發其火致水不清氣滯絡澀而生外障有撞雖輕反不知害有所觸犯遂爲外障者有撞重不戒反觸而變爲凶疾者凡外障結而珠疼頭痛及腫脹者皆是惡證防變急宜治之治見爲物所傷條

黑瞖如珠

非蟹睛木疳之比木疳是大者生則瞳損不可治此則至大方損珠而後損瞳神也又非蟹睛因破流出之比此肝氣有餘欲泛起之患故從風輪際處發起黑泡如珠子圓而細或一或二或三四五六多寡不一其證火實盛者痛虛緩者不痛治亦易平若長大則有裂目之患先服羚羊角散後服補腎丸

木疳

生於風輪者多其色藍綠青碧有虛實二證虛者大而昏花實者小而痛澀非比蟹睛因破而出乃自然生出者大小不一亦隨其變長也

論內障

在睛裏昏暗與不患之眼相似唯瞳神裏有隱隱青白者無隱隱青白者亦有之

內障右眼小者青白腎大者亦微顯白腎腦痛瞳子散大上熱惡熱大便澀後痞難小便如常遇熱暖處頭疼睛脹能食日沒後天陰暗則昏此證可服滋陰地黃丸腎在大者加萬根升麻腎在小者加柴胡羌活

青風內障

視瞳神內有氣色昏蒙如晴山籠淡煙也然自視尚見但比平時光華則昏蒙日進急宜治之免變綠色變綠色則病甚而光沒矣陰虛血少之人及竭勞心思憂鬱忿恚用意太過者每有此患然無頭風痰氣夾攻者則無此患病至此亦危矣不知其危而不急救者盲在旦夕耳羚羊角湯白附子湯補腎磁石丸羚羊角散還睛散

綠風內障

瞳神氣色濁而不清其色如黃雲之籠翠岫如藍靛之合滕黃乃青風變重之證久則變爲黃風雖曰頭風所致亦由痰濕所攻火鬱憂思忿怒之過若傷寒瘧疫熱蒸先散瞳神而後綠後黃前後並無頭痛者乃痰濕攻傷眞氣神膏耗涸是以色變也蓋久鬱則熱勝熱勝則肝木之風邪起故瞳愈散愈黃大凡病到綠風危極矣十有九不能治也一云此病初患則頭旋兩額角相牽瞳神連鼻扇皆痛或時紅白花起或先左而後右或先右而後左或兩眼同發或吐逆乃肺之病肝受熱則先左肺受熱則先右肝肺同病則齊發先服羚羊角散後服還睛散

黑風內障

與綠風候相似但時時黑花起乃腎受風邪熱攻於眼宜涼腎白附子丸補腎磁石丸還睛散

黃風內障

瞳神已大而色昏濁爲黃也病至此十撫一人可救者

銀風內障

瞳神大成一片雪白如銀其病頭風痰火人偏於氣忿怒鬱不得舒而傷眞氣此乃癇疾恐金丹不能爲之返光矣

絲風內障

視瞳神內隱隱然若有一絲橫經或斜經於內自視全物亦有如碎路者乃絡爲風攻鬱其眞氣元府有一絲之遏故視亦光華有損久而不治則變重爲內證之篤矣

烏風內障

色昏濁景滯氣如暮雨中之濃烟重霧風痰人嗜欲太多敗血傷精腎絡損而膀汁虧眞氣耗而神光墜矣

偃月內障

視瞳神內上半邊有隱隱白氣一灣如新月覆垂向下也乃內障欲成之候成則爲如銀腎腦漏人及腦有風寒不足陰氣怫鬱者患之與偃月侵睛在輪膜中來緩者不同

仰月內障

瞳神下半邊有白氣隱隱一灣如新月仰而從下生向上也久而變滿爲如銀內障乃水不足木失培養金反有餘故精液虧而元氣鬱滯於絡而爲病也

如銀內障

瞳神中白色如銀也輕則一點白亮如星似片重則瞳神皆雪白而圓亮圓亮者一名圓腎內障有仰月

偃月變重爲圓者有一點從中起視漸昏而漸變大不見者乃鬱滯傷乎太和清純之元氣故陽光精華爲其閉塞而不得發見亦有濕冷在腦腦油滴落而元精損鬱閉其光非銀風內障已散大而不可復收之比年未過六十及過六十而血氣未衰者攝治之皆有復明之理

如金內障

瞳神不大不小只是黃而明瑩乃是元氣傷滯所成因而痰濕陰火攻激故色變易非若黃風之散大不可醫者

綠映瞳神

瞳神乍看無異久之專精熟視乃見其深處隱隱綠色自視亦漸覺昏眇病甚始覺深綠而變有氣動之患蓋痰火濕熱害及於清純太和之元氣也久而不治反有觸犯者爲如金青盲等證其日中及日映紅光處看瞳神有綠色而彼自視不昏者乃紅光爍於瞳神照映黑紅相射而光映爲綠之故非綠色自生之謂及春夏瞳神亦覺色微微綠瑩者乃肝膽清純之正氣而視亦不昏不可誤認爲此但覺昏眇而瞳神綠色明處暗處看之皆一般氣濁不清者是此證也

雲霧移睛

謂人自見目外有如蠅蚋旗旆蚊蝶縈環等狀之物色或青黑粉白微黃者在眼外空中飛揚撩亂仰視則上俯視則下也乃元府有傷絡間精液耗澀鬱滯清純之氣而爲內障之證其原皆屬腎肝黑者膽腎自病白者因痰火傷肺金之清純不足黃者脾胃清純之氣有傷其絡蓋瞳神乃先天元陽之所主裏聚五臟之精華因其內虛而見其狀虛弱不足人及經產去血太多而悲哭太過深思積慾者每有此病小兒疳證熱證瘧疾傷寒日久及目痛久閉蒸傷精液清純之氣亦有此患幼而無知至長始曉氣絡已定治亦不愈今人但見此證則曰鬼神現像反泥於禳禱而不求內治他日病愈盛而狀愈多害成而不可救矣

圓翳內障

黑睛上一點圓日中見之差小陰處見之則大或明或暗視物不明醫者不曉以冷藥治之轉見黑花此因肝腎俱虛而得也宜服皂角丸合生熟地黃丸及補肺散補腎丸鎮肝丸虎睛丸聚寶丸化毒丸青金丹捲雲膏

氷翳內障

如冰凍堅實旁覷自透於瞳神內陰處及日中看之其形一同疼而淚出此因膽氣盛遂使攻於肝而得之宜服七寶丸皂角丸合生熟地黃丸通肝散羊肝丸瀉肝丸分珠散

滑翳內障

有如水銀珠子但微含黃色不疼不痛無淚遮遮瞳神宜服皂角丸生熟地黃丸還睛丸羊肝丸黃連膏

澀翳內障

微如赤色或聚或開兩旁微光瞳神上如凝脂色時復澀痛而無淚出宜服皂角丸生熟地黃丸

散翳內障

形如鱗點或瞼下起粟子而爛日夜痛楚瞳神最疼常下熱淚此二證皆肝肺相傳宜服皂角丸生熟地黃丸八味還精散四物湯發精散磨風膏宜肺湯青金散雄猪散

浮翳內障

上如氷光白色環遠瞳神初生自小黃頭至黑珠上不痒不痛無血色相潮宜服皂角丸合生熟地黃丸宜肺湯七寶散白萬膏細辛散川芎散

沉翳內障

白點藏在黑水下向日細視方見其白或兩眼相傳疼痛則早輕夜重間或出淚宜服皂角丸及生熟地黃丸靈寶丹皮睛丹羊肝丸美玉散二和散

右自圓翳以下七證雖有治法終難奏功唯金針撥之爲善

偃月侵睛

風輪上半邊氣輪交際從白膜內隱隱白片瀰漫蓋向下來其色粉青乃非內非外從膜中而來者初不以爲意久之始下風輪而損光或沿偏風輪周匝而爲聚花爲害最遲人每忽之常中其患乃腦有風濕久滯鬱中微火攻擊腦油滴下親火嗜燥好酒暴怒激走其鬱者爲變亦急凡髮經水不待乾而濕蒸及痰火人好燥厭濕熱物者皆有此患墜睛丸

聚花障

甚薄而白起於風輪周匝從白膜之內四圍環布而來也凡性躁急及患痰火竭視勞瞻耽酒嗜辛傷水濕熱之人多罹此患久則始有目急乾澀昏花不爽之病犯而不戒甚則有瞳神細小內障等變或因人觸激火入血分淚而赤痛者亦在變證之例雖有聚

花鋸齒之說實無正形又有二十四枚四十枚之數百無一二不必拘拘泥於此說凡見白圈傍青輪際從白膜四圍圈圓而來即是此證若白而嫩在風輪外四圍生起珠赤痛者是花腎白陷不可誤認爲此一云此候周圍如鋸齒四五枚相合赤色刺痛如針覩物如烟晨輕晝則痛楚迎風有淚昏暗不見宜皂角丸生熟地黃丸桑白皮湯薤仁散

白腎黃心

四邊皆白但中心一點黃大小眥頭微赤時下澀淚圈圈在黑珠上乃肝肺相傳停留風熱宜服還睛散及皂角丸合生熟地黃丸

黑花腎

其狀青色大小眥頭澀痛頻頻下淚口苦不喜飲食蓋膽受風寒宜凉膽丸還精丸四物湯瀉寶丸青金散皂角丸生熟地黃丸

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百六十三卷目錄
醫部彙考一百四十三
目門六
王肯堂證治準繩 五風髮成內障 瞳神散大 瞳神收斂小 瞳神偏斜 瞳神收側 瞳神緊小 瞳神散大而風輪反爲牽牽 瞳神收斂 瞳神偏斜 瞳神緊小 瞳神收側 瞳神散大 瞳神緊小 瞳神偏斜

病治失其中寒熱過傷及開導針烙炮炙失當傷其血氣耗其光華而昏者已上皆宜培養根本乘其初時而治之久則氣脈既定難治不愈若目在痛時而昏者此因氣塞火壅絡不和暢而光澀譬之煙不得透火反不明如目暴痛愈後尚昏者血未充足氣未和暢也宜謹慎保養以免後患若目病愈久而昏眇不醒者必因六欲七情五味四氣聰視哭泣等故有傷目中氣血精液脈絡也宜早調治久則雖治亦不愈矣若人年未五十目又無痛赤內障之病及翳喪精元之過而視昏眇無精彩者其人不壽凡人年在富強而多喪眞損元竭視苦思勞形縱味久患頭風素多哭泣婦女經產損血者目內外別無證候只是昏眊月復月而年復年非青盲則內障來矣

睛黃視眇

風輪黃亮如金色而視亦昏眇爲濕熱重而濁氣熏蒸清陽之氣升入輪中故輪亦色易好酒嗜食濕熱燥膩之人每有此疾與視瞻昏眇證本病不同

乾澀昏花

目自覺乾澀不爽利而視物昏花也乃勞瞻竭視過慮多思飢酒恣燥之人不忌房事致傷神水目上必有如細細赤脈及不潤澤等病在焉合眼養光良久則得淚略潤開則明爽可見水少之故若不謹戒保養甚則有傷神水而枯澀之愛生矣治惟滋陰養水略帶抑火以培其本本正則清純之氣和而化生之水潤若誤認火實用開烙針瀉之法治之則有緊縮細小之患

起坐生花

內外別無證候但其人動作少過起坐少頃或久坐或久立久眠久視便覺頭弦目花昏運也乃元氣弱陰精虧損水少液傷脈絡衰疲之咎怯弱證陰虛水少痰火人每多患此

螢星滿目

自見目前有無數細細紅星如螢火飛伏撩亂甚則如燈光掃星之狀其人必飢酒嗜燥勞心竭腎痰火上升目絡澀滯精汁爲六賊之邪火熏蒸所損故陽光散亂而飛伏水不勝火之患久而不治內障成矣非若起坐生花證與有火人昏花中亦帶螢星之輕者此言其時時屢見螢星之重者耳宜養肝丸麋羊羌活湯菊睛丸明目生熟地黃丸石決明丸加減駐景丸補腎磁石丸千金神麴丸三仁五子丸補肝丸補腎丸麋羊角飲薏仁丸熟乾地黃丸摩頂膏決明丸白龍粉煮肝散服椒方青葙散

暴盲

平日素無他病外不傷輪廓內不損瞳神倏然盲而不見也病致有三曰陽寡曰陰孤曰神離乃痞塞關格之病病於陽傷者緣忿怒暴悖恣酒嗜辛好燥膩及久患熱病痰火人得之則煩躁祕渴病於陰傷者多色慾悲傷思竭哭泣太頻之故患則類中風中寒之起傷於神者因思慮太過用心罔極憂傷至甚驚恐無措者得之患則其人如癡騃病發之狀屢有因頭風痰火元虛水少之人眩運發而醒則不見能保養者亦有不治自愈病復不能保養乃成痼疾其證最速而異人以爲魘魅方犯鬼神爲祟之類泥於巫禱殊不知急治可復緩則氣定而無用矣

青盲

目內外並無障翳氣色等病只自不見者是乃元府幽邃之源靈過不得發此靈明耳其因有二一曰神失二曰膽澀須訊其爲病之始若傷於七情則傷於神若傷於精血則損於膽皆不易治而失神者尤難有能保眞致虛抱元守一者屢有不治而愈若年高及疲病或心腎不清足者雖治不愈世人但見目盲便呼爲青盲者謬甚夫青盲者瞳神不大不小無缺無損仔細視之瞳神內並無些少別樣氣色儼然與好人一般只是自看不見方爲此證若有何氣色即是內障非青盲也

雀盲

俗稱也亦曰雞盲本科曰高風內障至晚不明至曉復明也蓋元陽不足之病或云既陽不足午後屬陰何未申尚見子後屬陽何丑寅未明曰午後雖屬陰日陽而時陰陽分之陰且太陽明麗於天目得其類故明至酉日沒陰極而暝子後雖屬陽夜陰而時陽陰分之陽天地晦黑理之當暝雖有月燈而不見者月陰也燈亦陰也陰不能助內之陽病輕者視亦稍見病重者則全不見至寅時陽盛日道氣升而稍明卯時日出如故若人調養得宜神氣融和精血充足陽光復盛不治自愈若不能愛養反致喪眞則變爲青盲內障甚則有陰陽乖亂否塞關格爲中滿而死者食以牛豬之肝治以補氣之藥即愈益見其元氣弱而陽不足也

眞睛膏損

此證乃熱傷眞水以致神膏缺損若四圍赤甚痛極

者由絡間瘀滯火燥了神膏若凝脂腎碎壞神膏而缺者是熱爍了神膏爲病尤急若四圍不甚赤痛不是凝脂所損者爲害稍緩乃色慾煩躁恣辛嗜熱之故大略是蒸鬱鑠損了肝膽絡分之病其狀風輪有證或痕或凹長短大小不一或凹小如針刺傷者或凹大如簪脚刺傷者或痕如指甲刻傷者或風輪周匝有痕長甚者凡有此等皆係內有鬱滯熱蒸之甚鑠壞了神膏之故急須早治勿使深陷爲窟而蟹睛突出若至深大縱蟹睛未出而腎滿亦有白翳如氷瑕腎等病結焉乃藥氣填補其膏故有此癥若久服久點方得水清膏復若治少間怠則白翳終身難免淺小者方得如故深大者亦有微微之迹蓋神膏乃先天二五精氣妙凝自然至精至粹者今以後天藥物之氣陳而補其缺損乃於濁中熏陶其含蘊之清也非譏娶之精需以歲月鮮能復其初焉

膏傷珠陷

謂目珠子覺低陷而不鮮綻也非若青黃膜出諸漏等病因損破膏流水耗而凹低之比蓋內有所虧目失其養源枯絡傷血液耗澀精膏損涸之故所致不一有恣色而竭腎水者有嗜辛燥而傷津液者有因風瘀濕熱久鬱而蒸損精膏者有不當出血而誤傷經絡及出血太過以致膏津不得滋潤涵養者有哭損液汁而致者有因竅內漏泄其絡中眞氣及元氣弱不能升載精汁運用者大抵係元氣弱而膏液不足也凡人目無故而自低陷者死期至矣若目至於外有惡證內損精膏者不治

神水將枯

視珠外神水乾澀而不瑩潤最不好識雖形於言不能妙其狀乃火鬱蒸膏澤故精液不清而珠不瑩潤汁將內竭雖有淫淚盈珠亦不潤澤視病氣色乾澀如蜒蚰唾涎之光凡見此證必有危急病來治之稍緩則神膏乾澀神膏乾澀則瞳神危矣夫神水爲目之機要其病幽微人不知之致變出危證而救之已遲其狀難識非心志巧眼力精雖師指不得盡其妙若小兒素有疳證糞如鴨溏而目疾神水將枯者死熱結五十以外人糞如羊矢而目病神水將枯者死熱結膀胱證神水將枯者蓋下水熱蒸不清故上亦不清證其源而流自清矣一云瞳神乾缺證其睛乾澀全無淚液或白或黑始則疼痛後來稍定而黑不見此證不可治療宜瀉肝散

轆轤轉關

目病六氣不和或有風邪所擊腦筋如拽神珠不待人轉而自驀然察上驀然察下下之不能上上之不能下或左或右倏易無時蓋氣搏激不定筋脈振惕緩急無常被其牽拽而爲害輕則氣定脈偏而珠歪如神珠將反之狀甚則翻轉而爲瞳神反背矣宜用牛蒡子丸還睛丸退血散雄猪散聚寶丹天門冬飲子瀉肝散之類

雙目睛逼

亦曰睨目此證謂幼時所患目珠偏斜視亦不正至長不能愈者患非一端有因脆嫩之時目病風熱攻損腦筋急縮者有因驚風天弔帶轉筋絡失於散治風熱遂致凝滯經絡而定者有因小兒眠之牖下亮處側視久之遂致筋脈滯定而偏者凡有此病急宜乘病嫩血氣未定治之若至長經絡血氣已定不復愈矣此專言幼患至長不可醫者非神珠將反急病之比

神珠將反

謂目珠不正人雖要轉而目不能轉乃風熱攻腦筋絡被其牽縮緊急弔偏珠子是以不能運轉甚則其中自聞聒聒有聲時嚮血分有滯者目亦赤痛失治者有反背之患與雙目睛逼初起狀相似而不同

瞳神反背

因六氣偏勝風熱搏急其珠斜翻側轉白向外而黑向內也藥不能療止用鍼治須久久精熟能識其向入何皆或帶上帶下之分然後撥之則療在反掌否則患者徒受痛楚醫者枉費心機今人但見目盲內障或目損風水二輪壞而膏雜白掩黑者皆呼爲瞳神反背謬矣夫反背實是斜翻烏珠向內豈有珠正向外而可謂之反背者哉

青黃膜出

風輪破碎內中膏汁塵出也不治者甚則膏盡珠凹有因自破膜出而火氣得以舒泄內外不治致氣定而脹出不收者有醫以寒涼逐退內火外失平治滯定爲凸起者乃不治之病初起由風熱攻擊及撞損眞膏等害血氣瘀滯亢極攻碎神珠神珠之中膏汁俱已潰爛而出縱有妙手不復可救但求免其凹凸而已珠上膏水斑雜結爲醫狀如白混障者南人呼爲白果即華元化復生何能爲也

珠中氣動

視瞳神深處有氣一道隱隱裊裊而動狀若明鏡遠

照一縷清煙也患頭風痰火病鬱久火勝搏激動其絡中眞一之氣遊散飄耗急宜治之動而定後光冥者內證成矣

倒睫拳毛

眼睫毛倒捲入眼中央是也久則赤爛毛刺於內神水不清以致障結且多碜澀淚出之苦人有拔去剪去者有醫以夾板腐去上睫者得效雖速殊不知內病不除未幾復倒譬之草木枯瘦則枝葉萎垂即朝摘黃葉暮去枯枝徒傷其本徒速其槁不若培益糞壤滋調水土本得培養則向之黃者翠而垂者聳矣夾之一治乃劫法耳其經久睫壞而寬甚者藥攻甚遲不得已而夾去之內當服藥以治其本不然未幾而復寬睫矣拔剪之法未聞其妙屢有內多濕熱外傷風邪致爛弦極醜一毛俱無如風疾者有毛半斷者有夾而復睫云是尚寬復夾至於二四目亦急縮細小徒損無益終莫之悟愚之甚也

睥急緊小

謂眼楞緊急縮小乃倒睫拳毛之漸也若不會治而漸自縮小者乃膏血精液澀耗筋脈緊急之故若治後而急小者乃治之之故患者多因睥寬倒睫夾去上睥失於內治愈後復倒復夾遂致精液損而脈不舒睥肉壞而血不足目故急小有不當割導而頻數開導又不能滋其內以致血液耗而急小者凡因治而愈者若不乘時滋養則絡定氣滯難治不復愈矣宜神效黃芪湯有暨撥雲湯小角緊急連翹飲子

睥肉粘輪

目內睥之肉與氣輪相粘不開難於轉運有熱燥血湧者目必赤痛有熱退血散失於治療者其狀雖粘必白珠亦痛止須用鑷割之治若亦痛時生粘者必有瘀滯宜漸導漸鑷如別病雖退而粘生不斷亦須鑷割漸開仍防熱血復粘生合須用藥時分之排風散

胞肉膠粘

兩睥膩沫粘合難開夜臥尤甚輕則如膠粘刷重則結硬必得潤而後可開也其病重在睥肺濕熱之故夫肺主氣氣化水爲淚淚爲熱擊而出邪熱蒸之混濁不清出而爲睥土燥濕所滯遂阻膩凝結而不流燥甚則結硬而痛故當以清凉滋潤爲主雖有障在珠亦是水不清內滯之故非障之慾久而不治則有瘡爛之變內則有椒瘡粟瘡羞明瘀滯等證生矣

睥翻粘瞼

乃睥翻轉貼在外瞼之上如舌舐脣之狀乃氣滯血澓於內皮急系弔於外故不能復轉有自病塞翻而轉有因翻睥看病爲風熱搏滯不得復返而轉大抵多風濕之滯所致故風疾人患者多治亦難愈非風者易治宜用鑷剔開導之法

睥輪振跳

謂目睥不待人之開合而自牽拽振跳也乃氣分之病屬肝睥二經脈絡牽振之患人皆呼爲風殊不知血虛而氣不順非純風也若有濕爛及頭風病者方是風邪之故久而不治爲牽弔敗壞之病

血瘀睥泛

謂睥內之肉紫淤浮泛如臭血壞泛之狀其色紫黑泛起甚則細細如泡無數相連成片蓋睥絡血滯又不忌火毒燥膩致積而不散其血皆不瑩澤而淤泛睥內肉壞或碎睥出血因而冒風風傷其血血滯澀而睥肉不得潤澤此乃久積之病也非比暴疾治以活血爲上甚者方以劫治輕者止用殺伐之治足矣

睥虛如毯

謂目睥浮腫如毯狀也目尚無別病久則始有赤絲亂脈之患火重甚皮或紅目不痛濕痰與火夾搏者則有淚有眵爛之候乃火在氣分之虛證不可誤認爲膿如杯覆血分之實病以兩手掌擦熱拭之少平頃復如故可見其血不足而虛火壅於氣也

風沿爛眼

風沿眼系上腦有積熱自飲食中挾怒氣而成頑痰痞塞濁氣不下降清氣不上升由是火益熾而水益降積而久也眼沿因膿潰而腫於中生細小蟲絲遂年久不愈而多癢者是也用紫金膏以銀釵脚指去油膩點之試問若果癢者又當去蟲以絕根本蓋紫金膏只是去濕與去風凉血而已若前所謂飲食挾怒成痰又須更與防風通聖散去硝黃爲細末以酒拌勻曬乾依法服之禁諸厚味及大料物方盡諸法之要

風弦赤爛

乃目睥沿赤爛垢膩也蓋血虛液少不能滋養睥肉以致濕熱滯於睥絡常時赤爛如是者非若迎風因邪乘虛之比久而不治則拳毛倒入損甚則赤爛濕垢而舉毛皆壞若先有障而後赤爛者乃經絡澀滯神水不清而爛治其障通其脈絡而自愈有因毛倒而拔剪損動精液引入風邪以致壞爛各因其源而

潛之一法劫治以小烙鐵掩紙燕桐油燒紅烙之爛濕而瘡者頗復其效若失於內治終難除根

迎風赤爛

謂目不論何風見之則赤爛無風則否與風弦赤爛入睥絡之深者不同夫風屬木木强土弱弱則易侵因邪引邪內外夾攻土受木尅是以有風則病無風則愈赤爛者土木之正病耳赤者木中火證爛者土之濕證若赤濕盛者爛勝赤若火燥盛者赤勝爛心承肺承者珠亦痛赤爲此專言見風赤爛之患與後迎東迎西迎風冷熱淚證入內之深者又不同

皆赤爛

謂赤爛雖皆有之目無別病也若目有別病而赤爛者乃因別火致傷其皆又非此赤勝爛者火多乃勞心憂鬱忿悖無形之火所傷爛勝赤者濕多乃恣燥嗜酒哭泣過多冒火衝煙風熱熏蒸有形所傷病屬心絡甚則火盛水不清而生瘡於皆邊也要分大小二皆相火君火虛實之說內服洗刀散菊花通聖散點以爐甘石散二聖沙紫金膏洗以黃連散

論目淚

運氣淚出皆從風熱經曰厥陰司天之政三之氣天政布風乃時舉民病泣出是也

迎東

謂目見東南二風則溫痛淚出西北風則否與迎風赤爛迎風淚出未同而本異各證不論何風便發此二證則有東西之別以見生尅盧賁之爲病迎風之淚又專言其淚不帶別病而本病之深者又非迎東迎西有別病之比故治亦不同迎東與迎西又不同迎東乃肝之自病氣盛於血發春夏者多非若迎西因虛受尅而病發也

迎西

謂目見西北二風則溫痛淚出見東南風則否乃肝虛受尅之病秋冬月發者多治當補肝之不足抑肺之有餘

迎風冷淚

不論何時何風見則冷淚交流若赤爛障翳者非也乃水木二家血液不足陰邪之患與熱淚帶火者不同久而失治則有內障視眇等陰證生焉與無時冷淚又不同此爲發盧因邪引邪之患無時冷淚則內虛腎自傷之患也

迎風熱淚

不論何時何風見之則流熱淚若有別證及分風氣者非也乃肝膽腎水木之精液不足故因虛致不密而風邪引出其淚水中有隱伏之火發故淚流而熱久而不治反有觸犯者則變爲內障如螢星滿目等證也

無時冷淚

目不赤不痛苦無別病只是時常流出冷淚甚則視而昏眇也非比迎風冷淚因虛引邪病尚輕者蓋精液傷耗肝膽氣弱胥濕腎水不足幽隱之病已甚久而失治則有內障青盲視瞻昏眇之患精血衰敗之人性陰毒及悲傷哭泣久鬱者又如產後悲泣太過者每多此疾且爲患又緩人不爲慮往往罹其害而禍成也悔已遲矣

無時熱淚

謂目無別病只是熱淚不時常流也若有別病而熱淚流出者乃火激動其水非此病之比蓋肝膽腎水耗而陰精虧涸乃勞心竭意過慮深思動其火而傷其汁也故血虛胥液不足人哭泣太傷者每每患此久而失治觸犯者變爲內障因其爲患微緩故罹害者多矣肝虛還睛補肝丸枸杞酒二妙散肝實洗肝湯羚羊角散肝熱決明子方涼膽丸風熱羌活散青葙子丸風冷羌活散風濕菊花散蟬蛻餅子川芎丸外點眞珠散乳汁煎

目中溜火惡日與火隱澀小角緊久視昏花迎風有淚連鼻飲子主之

氣塞如痰

睥內如痰白沫稠膩甚多拭之即有者是痰火上壅脾肺溷熱所致故好酒嗜燥怫鬱者每患此疾若覺脾腫及有絲脈虫赤者必滯入血分防瘀血灌睛等變生矣

論目瘡疣

內經運氣目皆瘡瘍有二一曰熱經云少陰司天之政三之氣大火行寒氣時至民病目赤皆瘍治以寒劑是也二曰燥經云歲金太過民病目赤腫皆瘍又云陽明司天燥淫所勝民病目脉皆瘍治以溫劑是也

實熱生瘡

輕重不等痛癢不同重則有堆積高厚紫血瞼爛而腥臭者乃氣血不和火實之邪血分之熱尤重如瘀滯之證宜涸水湯每每流於睥皆成瘡血散而瘡自除動勞濕熱人每患睥當成瘡無別痛腫證者亦輕

而無妨若火盛瘡生堆重帶腫痛者又當急治恐濁氣沿於目內而病及於珠若先目病後生瘡必是熱沿他經凡見瘡生當驗部分以別內之何源而來因其輕重治之

椒瘡

椒瘡生於脾內纍纍如瘡紅而堅者是也有則沙瘡開張不便多淚而痛今人皆呼爲粟瘡誤矣粟瘡亦生在脾但色黃輭而易散此則堅而難散者醫者率以龍麝燈心等物出血取效效雖速不知目以血爲榮血損而光華有衰弱之患輕則止須善治甚重至於纍纍連片疙瘩高低不平及血瘀滯者不得已而導之中病即止不可太過過則血損恐傷眞水失養神膏大槩用平劑之法退而復來者乃內有瘀滯方可量病漸導若初治便用開導者得效最速切莫過治

粟瘡

生於兩脾細顆黃而輭者是今人稱椒瘡爲粟瘡非也椒瘡紅而堅有則礙睛沙澀不便未至於急粟瘡見若目痛頭疼者內必有變證大意是濕熱鬱於土分爲重椒瘡以風熱爲重二證雖皆屬於血分一易散一不易散故治亦不同有素好濕熱燥厥者亦有粟瘡其睛雖赤而痛不甚者雖有必退與重者不同又不可誤認爲玉粒玉粒乃淡黃色堅而消遲爲變亦遲者

脾生痰核

乃脾外皮肉有贅如豆堅而不疼火重於痰者皮或色紅乃痰因火滯而結此生於上脾者多屢有不治自愈有恣嗜辛辣熱毒酒色斲喪之人久而變爲癆漏重疾者治亦不同若初起切治則頃刻平復矣

木疳

證治見目門五外障中

火疳

生於脾皆氣輪爲害尤急蓋火之實邪在於金部火尅金鬼賊之邪故害最急初起如椒瘡櫺子一顆小而圓或帶橫長而圓如小赤豆次後漸大痛者多不痛者少不可誤認爲輪上一顆如赤豆之證因瘀積在外易消者此則從內而生也

土疳

謂脾上生毒俗呼偷針眼是也有一目生又一目者有止生一目者有邪微不出膿血而愈者有犯觸辛熱燥臟風沙煙火爲漏爲爭敗者有緩未實因風乘虛而入頭腦俱腫目亦赤痛者其病不一隨宜治之巢氏曰凡眼內眥頭忽結成泡三五日間便生膿汁世呼爲偷針此由熱氣客在眥間熱搏於津液所成但其勢輕者小小結聚汁潰熱歇乃瘥謹按世傳眼眥初生小泡視其背上即有細紅點如瘡以鍼刺破眼睥即瘥故名偷鍼實解太陽經結熱也人每試之有驗然巢氏但具所因而不更分經絡其諸名實所過者多矣

金疳

初起與玉粒相似至大方變出禍患生於脾內必礙珠澀痛以生障瞽生於氣輪者則有珠痛淚流之苦子後午前陽分氣升之時尤重午後入陰分則病略清寧久而失治違戒反觸者有變漏之患

水疳

忽然一珠生於脾眥皆氣輪之間者多若在風輪目必破損有虛實大小二證實者小而痛甚虛者大而痛緩狀如黑豆亦有橫長而圓者與木疳相似但部分稍異色亦不同黑者屬水青綠藍碧者屬木久而失治必變爲漏頭風人每有此患風屬木肝部何以病反屬水蓋風行水動理之自然頭風病目每傷瞳神瞳神之精膏被風攻變鬱久則火勝其清液爲火擊散走隨其所傷之絡結滯爲疳也疳因火滯火兼水化化因邪勝不爲之清潤而反爲之燔熱濕熱相搏而爲漏矣故水疳屬腎與膀也

論漏睛

眥頭結聚生瘡流出膿汁或如涎水粘睛上下不痛仍無腎膜此因心氣不寧并風熱停留在瞼中宜服五花丸白薇丸歌曰原因風熱瞼中停凝結如膿似淚傾驅毒除風無別病黃連膏子點雙睛合用糖煎散三和散蓯蒙花散

大眥漏

大眥之間生一漏時流血水其色紫暈腫脹而疼病在心部火之實毒治法宜補北方瀉南方

小眥漏

小眥間生一漏時流血水色鮮紅病由心包絡而來相火橫行之候失治則神膏損而明喪矣當於北方中補而抑之

陰漏

不論何部生漏但從黃昏至天曉則痛脹流水作青黑色或腥臭不可聞日間則稍可非若他證之長流

乃幽陰中有伏隱之火隨氣升而來故遇陰分即病重治當溫而清之

陽漏

不論何部分生漏但日間脹痛流水其色黃赤遇夜則稍可非若他漏長流也治當補正氣清金火

正漏

有漏生於風輪或正中或略偏病至此目亦危矣若初發破洩則流出如痰白膏猶爲可救至於日久而深則流出青黑膏汁損及瞳神卽有金丹妙藥難挽先天二五元精喪明必矣病屬肝腎二部目竅於肝主於腎故曰正漏耳

偏漏

漏生在氣輪金堅而位旁爲害稍遲故曰偏漏其流如稠濁白水重則流膿久而失治水泄膏枯目亦損矣

外漏

生於兩牌之外或流膿或流稠臭水脹痛則流出不脹則略止其害目遲於各漏久而失治則脾壞氣泄膏水耗損目亦壞矣

竅漏

乃目旁竅中流出薄稠水如膿腥臭拭之卽有久則目亦模糊也人嗜燥肮酒痰火濕熱者每患此疾久而不治亦有暗傷神水耗涸神膏之害與氣竭如痰相似彼輕此重如痰乃在外水不清瞼內欲出不得出者此則從內邪氣熏蒸而出欲罷不能者治亦深淺遲速不同

能遠視不能近視

祕要云陰精不足陽光有餘病於水者故光華發見散亂而不能收斂近視治之在心腎心腎平則水火調而陰陽和順陰陽和順則收斂發用各得宜也夫血之所化爲水在身爲津液在目爲膏汁若貪淫恣慾饑飽失節形厥甚勞過於悲泣皆斲耗陰精陰精虧則陽火盛火性炎而發見陰精不能制伏挽回故越於外而遠照不能治之而反觸激者有內障之患

能近視不能遠視

祕要云此證非謂稟受生成近覷之病乃平昔無病素能遠視而忽然不能者也蓋陽不足陰有餘病於火者故光華不能發越於外而收斂近視耳治之在膽腎膽腎足則神膏厚神膏厚則經絡潤澤經絡潤澤則神氣和暢而陽光盛矣夫氣之所用謂之火在身爲運用在目爲神光若肮酒嗜燥頭風痰火忿怒暴悖者必傷神損氣神氣弱必發用衰發用衰則經絡澀滯經絡澀滯則陰陽偏勝而光華故不能發達矣

神光自見

謂目外自見神光出現每如電閃掣甚則火焰發明時發時止與視瞻有色之定者不同乃陰精虧損清氣怫鬱元府太傷孤陽飛越神光欲散內障之重者非若螢見痰火之輕也

黑夜精明

夫人體大地之陰陽晝明夜晦理之常也今晦暝之中倏忽見物是背於陰陽矣乃水火不交精華關格乖亂不和陽光飛越之害不能培養陰精以留制陽光而自以爲精華之盛至於光墜而言始悔之不已

晚乎

視正反邪

謂物本正而目見爲邪也乃陰陽偏勝神光欲散之候陽勝陰者因恣辛嗜酒怒悖頭風痰火氣傷之病陰勝陽者因色慾哭泣飲味經產血傷之病此內之元府鬱滯有偏而氣重於半邊故發見之火亦偏而不正耳治用培其本而伐其標久而失治內障成焉

視定反動

謂物本定而目見爲動也乃氣分火邪之害水不能救之故上旋眩運振掉不定光華欲墜久則地石亦覺振動而不定內障成矣恣酒嗜燥頭風痰火人陰虛血少者屢有此患

視物顛倒

謂視器物皆振動而倒植也譬之壞舞後定視則物皆移動而倒植蓋血氣不正陰陽反復真元有傷陰精衰弱陽邪上干廉眩而運掉有一年數發有一月數發者若發則視倒而視冥不醒者神光墜矣須因其所發時令及別其因虛因風因痰因火而治之若以風取不足爲慮反斲喪而激觸者內障之患終莫能逃

視一爲二

謂一物而目視爲二卽內經所謂視岐也乃精華衰亂偏陰敗壞病在腎膽腎膽真一之精不足而陽光失其主倚故視一爲二若目赤痛者乃火壅於絡陰精不得升運以濟神光故反爲陽邪錯亂神光而岐其視瞻諸目痛時見一燈火爲二三燄也

視瞻有色

非若螢星雲翳二證之細點長條也乃目凡視物有大片甚則通行當因其色而別其證以治之若見青綠藍碧之色乃肝腎不足之病由陰虛血少精液衰耗膽汁不足氣弱而散故視亦見其色怯弱證人眼前每見青綠色益見其陰虛血少之故也若見黃赤者乃火土絡有傷也痰火濕熱人每有此患夫陰虛水少則賊火得以燥鑠而清純太和之氣爲之乖戾不和故神光乏滋運之化源而視亦因其本而見其色也因而不能滋養反有觸犯者內障生焉若見白色者病由金分元氣有傷及有痰涎阻滯道路者皆有此患若視有大黑片者腎之元氣大傷膽之所養不久盲矣

視赤如白

謂視物却非本色也因物者形之病與視膽有色空中氣色不同或觀太陽若冰輪或視燈火反粉色或視粉牆如紅如碧或看黃紙似綠似藍等類此內絡氣鬱元府不和之故當因其色而別之以知何臟腑乘侮之爲病而施治

光華暈大

謂視日與燈焰皆生紅暈也甚則通紅而人物在燈光之下亦大矣皆是實火陽邪發越於上之害諸絡必有滯瀝輕者暈小而淡重者暈大而濃治雖外證已退目視尚有暈者陽邪未平陰精未盛猶宜滋養化源而尅制其火耳

目閉不開

足太陽之筋爲目上綱足陽明之筋爲目下綱熱則筋縱目不開

直視

視物而目睛不轉動者是也若目睛動者非直視也傷寒直視者邪氣壅盛冒其正氣使神氣不慧臟腑之氣不上榮於目則目爲之直視傷寒至於直視爲邪氣已極證候已逆多難治經曰衄家不可發汗發汗則額上陷脈緊急直視不能眴不能眠以肝受血而能視亡血家肝氣已虛目氣已弱又發汗亡陽則陰陽俱虛所致此雖錯逆其未甚也逮狂言反目直視又爲腎絕直視搖頭又爲心絕皆臟腑氣脫絕也直視讝語喘滿者死下利者亦死又劇者發狂則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脈弦濇者死皆邪氣盛而正氣脫也素問曰少陽終者其百節縱目冥絕系王註曰冥謂直視如驚貌目系絕故目不動而直視

上視

經云瞳子高者太陽不足戴眼者太陽已絕太陽之脈其終也戴眼反折瘛瘲

驚振外障

證治見目門五外障中

驚振內障

因病目再被撞打變成內障日夜疼痛淹淹障子赤膜遶目不能視三光亦如久病內障宜補肝丸補腎丸石決明丸及皂角丸合生熟地黃丸

物損眞睛

謂被物觸打徑在風輪之急者物大則狀大物小則狀小有黃白二色黃者害速白者稍遲若尖細之物觸傷淺小者可治可消若粗厲之物傷大而深及缺損神膏者雖愈亦有瘢痕若觸及破膏者必有膏汁或青黑色或白色如痰者流出爲害尤急緩然急治瞳神雖在亦難免敧側之患綻甚而瞳神已去者不治物有尖小而傷深膏破者亦有細細黑顆如蟹睛出愈後有瘢且如草木刺金石屑苗葉尖針尖觸在風輪淺而結顆黃者狀如粟瘡愈而有變白者狀如銀星爲害稍緩每見耘苗人竹木匠往往誤觸竹絲木屑苗葉在風輪而病者若飛揚之物重大而打破風輪者必致青黃牒出輕而膏破者膏汁流出黑顆爲蟹睛又輕而傷淺者黑膏未出有白膏流出狀如稠痰凝在風輪欲流不流嫩白如凝脂者此是傷破神珠外邊上層氣分之精膏也不可誤認爲外障若視昏者瞳神有大小敧側之患久而失治目必枯凸大凡此病不論大小黃白但有淚流赤脹等證者急而有變珠疼頭痛者尤急素有痰火風濕新喪之人病已內積未至於發今因外傷而激動其邪乘此爲害痛甚便澀者最凶又如木竹芒刺誤觸斷在風輪膏內者必聹夜脹痛難當急宜取出物若粗大入深者於此損處必有膏出爲蟹睛治亦有瘢取遲膏水滯結障生者物去而治障障自退障若大而厚者雖退亦有迹失取而攻損瞳神者不治若刺傷斷在氣輪皮內取遲者必有瘀血灌脹取去物而先導之後治餘證大抵此證物尖細者傷亦小易退而全好粗大者傷亦大難退而有迹小者能大大者損目風輪最急氣輪次之其小物所觸淺細者年少精強及善於護養性情純緩之人亦有不治而愈者必其內外別無他證也

振胞瘀痛

謂偶被物擣打而血停滯於瞼睥之間以致脹痛也緩而失治則脹入珠內瘀血灌睛而睛有損壞之患狀亦與腹如杯覆同外治開導敷治亦同內治不同蓋脹如杯覆因火從內起而後壅滯此因外觸凝滯脈道阻塞而後瀦及神珠或素有痰火風邪因而激動乘虛爲患又當驗其形證絲絡各隨其經而治之

觸傷眞氣

乃被物擣打而目珠痛痛後覩復如故但過後漸覺昏矇也蓋打動珠中眞氣絡瀰滯而鬱遏精華不得上運損及瞳神而爲內障之急若初覺昏暗速治之以免內障結成之患若疾已成瞳神無大小散倒者猶可撥治內宜調暢氣血使無凝滯此證既成即謂振內障

飛絲入目

謂風殿遊絲偶然撞入目中而作痛也若野蠶蜘蛛木蠹之絲患尚遲若遇金蠶老鸛絲其目不出三日迸裂今人但患客風暴熱天行赤熱痛如針刺一應火實之證便呼爲天絲眼不知飛絲入目乃人自知者但遲遲不及不意中被其入也入目之時亦自知之倏然而痛淚湧難開豈可以之混治他證乎

物偶入睛

謂偶然被物落在目中而痛也凡人被物入目不可乘躁便擦須按住性待淚來滿而擦則物潤而易出如物性重及有芒刺不能出者急令人取出不可揉擦擦則物愈深入而難取若入深須翻上睥取之不取則轉運阻礙氣滯血凝而病變芒刺金石穀角之物失取礙久及擦重者則壞損輪膏如痕凹凝脂等病輕則血瘀水滯爲痛爲障等病有終不得出而結於睥內者必須翻而尋看因其證而治之此與睛目飛揚不同飛揚細沙擦睛已成證者此則未成證若已成證則大同小異終彼輕而此重也

睛目飛揚

因出行間風吹沙土入目頻多揩拭以致氣血凝滯而爲病也初起瀰濕赤脈大後淚出急澁漸漸重結爲障翳然有輕重赤白亦因人之感受血氣部分或時令之寒熱不同耳或變或不變亦隨人之戒觸所致當辨形證別經絡而施治

妊娠目病

其病多有餘要分血分氣分氣分則有如旋螺泛起瞳神散大等證血分則有如瘀血凝脂等病蓋其否隔陰陽瀰滯與常人不同爲病每多危急人不知慮屢見臨重而措手不及者內伐又恐傷胎泄氣不伐又源不澄病不去將奈何吁能知其胎繫固否善施內證外劫之治則百發百中矣

產後目病

產則百脈皆動氣血俱傷太虛不足邪易以乘肝部發生之氣甚弱血少而膽失滋養精汁不盛則目中精膏氣液皆失化源所以目病者多然輕重內外不同有勞瞻竭視悲傷哭泣而爲無時冷淚內障昏眇等證有發不密引入風邪爲溫爛頭風者有因處沐髮濕氣歸腦而爲內障諸病者有因虛勞役恣辛嗜熱及患熱病而傷目血爲外障者皆內不足所致善知愛護者疾微而不變不知保養反罹斁喪則變重不一大抵產後病宜早治莫待其久久則氣血定而病深治亦不易其外證易知者人皆知害而早治其內證害緩者人多忽之比其成也爲無及之悔者多矣參看目痛條亡血過多之病

因風

謂患風病人目疾也風在五行爲木在臟爲肝在竅爲目本乎一氣久風則熱勝熱勝則血弱風久必鬱鬱則火生火性炎上故患風人未有目不病者然各因其故而發有日淺而鬱未深爲偏喎歪斜者有入腑而腑反濕勝而亦爛者有血虛筋弱而振搐者有不禁反傷精神及恣燥嗜熱助邪乖亂清和融純之氣氤鬱而爲內障者有風盛血滯結爲外障如努肉等證者加以服餌香燥之藥肌酒辣辛陰愈虧而火愈熾病變瘀變重者治各因其證而伐其本內外常劫不同大抵風病目者當去風爲先不然目病雖退而復來難治至再至三風不住目病終無不發之理

因毒

謂人生瘡瘍腫毒累及目病也夫六陽火燥有餘水不能制致亥亂無拘氣滯血壅而始發瘡瘍腫毒火性炎上目竅高火所從泄濁能害清理之自然肝膽清淨融和之府瘡毒難阻濁亂之邪邪既熾盛侵攪清和因素熟喪肝腎有虧陰虛血少髓之精汁不充化源弱而目絡少滋故邪得乘虛入目而爲害若病目正在病毒之時治毒愈而目亦愈若毒愈而目不愈者乃邪入至高之深處難以自退當潛其流澄其源因而觸激甚者有瘀滯之變

因他

謂因思別病而害及目也所致不同有陰病而陰自傷有陽病而陽自損有寒病熱藥太過傷其神氣有熱病寒藥太過耗其精血補者瀉之瀉則損其元瀉者補之補則助其邪針砭之泄散真氣炮炙之激動火邪實實虛虛損不足益有餘之故不同亦各因人觸犯感受臟腑經絡衰旺隨其所因而入爲病內外輕重不等當驗其標而治其本譬如傷寒陽證熱鬱蒸損瞳神內證也熱盛血滯赤痛淚澁者外證也陰證脫陽目盲內證也服薑附溫熱之劑多而火燥赤澁者外證也嗇疾之熱損瞳神內證也火滯於血而赤澁外證也瀉利後昏眇爲穀氣之土府清純之氣傷不能發生長養津液耗而膏汁不得滋潤內證也山嵐瘴氣目昏者邪氣蒙蔽正氣外證也蠱脹中滿赤痛者陰虛難制陽邪內證也氣證多怫鬱弱證多昏花皆內證也痰證之臟沫火證之赤澁皆外證也餘倣此宜蔘靈丸明目生熟地黃丸合皂角丸芫蔚子丸

痘疹餘毒

痘疹爲毒最重爲自稟受以來蘊積惡毒深久之故古稱曰百歲瘡謂人生百歲之中必不能免一發則諸經百脈清純太和之氣皆爲其擾亂一番正氣大虛而邪得以乘之各因所犯而爲疾況目又清純之最者過於肝膽肝膽爲清淨之府邪正不並立今受濁邪熏灼則目有失發生長養之源而病亦易侵皆由人不能救而且害之之故也或於病中食物太過懷藏太暖誤投熱藥多食甘酸而致病者或於病後因虛未復恣食辛葷燥臟竭視勞瞻好烘多哭衝冒風沙煙瘴而致病者有爲昏蒙流淚之內證者有爲赤爛星障之外證者有餘邪蘊積爲凝脂黃膜花翳蟹睛等證之重而目凹凸者有餘邪偶流爲赤絲羞明微星薄翳等證之輕而病自消者輕重淺深亦各隨人之犯受所患不一當驗其證而審其經以治之不可執一反有激變之禍蓋痘疹之後人同再造比之常人不同若有所誤貽害終身行斯道者宜加謹焉大抵治之早則易退而無變遲則雖無變恐血氣凝定即易治之證亦退遲矣今人但見痘後目疾便謂不治不知但瞳神不損者縱久遠亦有可治之理惟久而血定精凝障翳沉滑澁損者則不治耳

時復

謂目病不治忍待自愈或治失其宜有犯禁戒傷其脈絡遂致深入又不治之致搏爽不得發散之故或年之月月之日如花如潮至期而發至期而愈久而不治及因激發遂成大害未發者問其所發之時令以別病本在何經位已發者當驗其形證絲脈以別其何部分然後治之

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百六十四卷目錄

醫部彙考一百四十四

目門七

趙獻可醫貫　論目爲火病腎肝同治
吳崑醫方考　目病方論
陳實功外科正宗　眼丹　眼泡菌毒
張介賓景岳全書　論證　論治　升陽散火辨
陳士鐸石室祕籙　論古　目痛腫　眼花猝倒　目生星　視物倒置　眼生長肉
努肉華睛
方一　越婢加半夏湯　蛤粉丸　熏方　神鞞丸　瓜子散　補肝蕪菁子散　梔子仁煎　地黃散　補肝散　陽丹　陰丹　一九丹　二八丹　三七丹　四六丹　陰陽丹　清涼丹　日精丹　月華丹　光明丹　白龍丹　爐甘石散　紫金錠子　熊膽膏錠　開明膏　消腎復明膏　爐甘石膏　夜光膏　黃連膏　叉方　叉方　日精月華光明膏　碧玉散　乳香散　吹雲膏　金露膏　寶鑑春雪膏

藝術典第一百六十四卷

醫部彙考一百四十四

目門七

明趙獻可醫貫

論目爲火病腎肝同治

經曰五臟六腑之精皆上注於目而爲之精故治目者以腎爲主目雖肝之竅子母相生腎肝同一治也華元化云目形類丸瞳神居中而前如日月之麗東南而晦西北也有神膏神水神光眞氣眞血眞精此滋目之源液也神膏者目內包涵膏液此膏由膽中滲潤精汁積而成者能涵養瞳神衰則有損神水者由三焦而發源先天眞一之氣所化目上潤澤之水是也水衰則有火勝燥暴之患水竭則有目輪大小之疾耗澀則有昏眇之危虧者多盈者少是以世無全精之目神光者原於命門通於膽發於心火之用事也火衰則有昏瞑之患火炎則有焚燥之殃雖有兩心而無正輪心君主也通於大眥故大眥赤者實火也命門爲小心小心相火也代君行令通於小眥故小眥赤者虛火也若君主拱默則相火自然清寧矣眞血者卽肝中升運滋目注絡之血也此血非比肌肉間易行之血卽天一所生之水故謂之眞也眞氣者卽目之經絡中往來生用之氣乃先天眞一發生之元陽也眞精者乃先後天元氣所化精汁起於腎施於膽而後及瞳神也凡此數者一有損目則病矣大槩目圓而長外有堅殼數重中有清脆肉包黑稠神膏一函膏外則白稠神水水以滋膏水外則皆血血以滋水膏中一點黑瑩是腎膽所聚之精華惟此一點燭照鑑視空闊無窮者是曰水輪內應於腎北方壬癸亥子水也五輪之中惟瞳神乃照或曰瞳神水耶氣耶血耶膏耶曰非氣非血非水非膏乃先天之氣所生後天之氣所成陰陽之妙蘊木火之精華血養水水養膏膏護瞳神氣爲運用神卽維持喻以日月理實同之男子右目不如左目精華女子左目不如右目光彩此皆各得其陰陽氣分之正也

許學士東垣祕要等所論遠視近視之證皆陰弱不能配陽內障之病其病無眵淚痛痒羞明緊澀之證初但昏如霧露中行漸空中有黑花又漸暗視物成二體久則光不收遂爲廢疾患者皆宜培養先天根本乘其初時而治之況此病最難療服藥必積歲月絕酒色淫慾毋饑飽勞役驅七情五賊庶幾有效不然必廢終不復也世不知此始曰目昏無傷略不經意及病成醫亦不識直曰熱致竟用凉藥殊不知凉藥又傷胃況凉爲秋爲金肝爲春爲木又傷肝矣往往致廢而後已病者不悟藥之過諉之曰命也醫者亦不自悟而曰病拙悲夫

吳崑醫方考

目病方論

眼五官之一也匪明則無以作哲故眼重焉醫眼有專科亦以其重耳今考名方十四首夫人酌其宜而用之則復明之一助也

眼痛赤腫者消風養血湯主之蓋痛者邪氣實也赤者風熱傷血也腫者風熱注之也是方也荊芥菊花蔓荊白芷麻黃防風川芎可以消風亦可以去熱風熱去則赤腫去矣桃仁紅花當歸芍藥草石決明可以消瘀可以養血亦可以和肝瘀消則不痛養血和肝則復明乃甘草者和諸藥而調目氣也

腎虛目暗不明者益陰腎氣丸主之蓋精生氣氣生神故腎精一虛則陽光獨治陽光獨治則壯火食氣無以生神令人目暗不明王冰曰壯水之主以制陽光故用生熟地黃山萸五味歸梢澤瀉丹皮味厚之屬以滋陰養腎滋陰則火自降養腎則精自生乃山藥者所以益脾而培萬物之母茯神者所以養神而生明照之精柴胡者所以升陽而致神明之氣於精

明之窠也孫思邈云中年之後有目疾者宜補而不宜瀉可謂開斯世之矇矣東垣此方其近之

療本滋腎丸此亦治腎虛目暗之方也蓋眼者肝之竅肝木臟也得水則榮失水則枯故用黃蘗知母之味厚者以滋腎水所謂虛則補其母也是方也雖曰補腎亦瀉之之類也脾强目暗者宜主之脾胃壞者非所宜也

血弱不能養心心火旺盛肝木自實瞳子散大視物不清者乾熟地黃丸主之蓋肝者心之母心火旺盛故令肝木自實肝主風心主火瞳子散大風火動搖之象也瞳子者主照物今而散大宜其視物不清矣越人云實則瀉其子虛則補其母火是肝之子故用芩連骨皮生地以瀉火水是肝之母故用熟地門冬五味以滋水內經曰陽氣者精則養神故又以人參甘草益其陽氣而枳殼者所以破其滯泥柴胡者所以升其清陽也清升而目自明矣經曰目得血而能視故又以當歸佐之

青白目翳者補陽湯主之蓋陽不勝其陰則生目翳所謂陰盛陽虛則九竅不通乃陰埃障日之象也是方也人參黃芪白朮茯苓甘草陳皮甘溫益氣之品也固所以補陽柴胡羌活獨活防風辛溫散翳之品也亦所以補陽知母當歸生熟地黃芍藥澤瀉雖曰養陰亦所以濟夫羌防柴獨使不散其眞陽耳是亦所以補陽也用肉桂者取其辛熱熱者火之象可以散陰翳辛者金之味可以平肝木蓋眼者肝木之竅以故用之

百點膏者蓋欲使藥力相繼耳按熊仁能散結氣當歸能活滯血防風能散風黃連能攻熱甘草能和氣血乃蜜則潤之而已

凡患風熱眼脏紅爛者光明洗眼方良蓋銅性清肅可以勝熱明目黃連苦燥可以瀉熱堅膚艾葉辛溫可使驅風勝濕杏仁辛潤可使利氣澤皮

諸目疾翳障青盲者本事羊肝丸主之蓋眼者肝之竅肝木自實而病眼邪害空竅也越人云實則瀉其子故用黃連以瀉心能瀉其心則子食氣於母而肝弗實矣目豈不瑩然而明乎然必濟以羊肝者取其爲血氣之屬同類相從用之補肝非若草木之性偏一而失沖和也

一切內障類說羊肝丸主之蓋夜明沙能攻目中翳障木賊能散目中翳熱乃羊肝者同類相從能引四物入肝而利其竅也

目昏多淚眞人明目丸主之蓋腎主目之瞳子腎水虛竭故令目昏肝之液爲淚肝有風熱故令淚出是方也生地所以涼肝熱地所以補腎乃川椒者味辛而熱可以療肝腎之痹氣痹氣者濕熱著而不散之氣也又於空心之時以鹽飲吞之宜其直達肝腎之區矣病在標而治其本可謂神於病情者此其所以爲眞人之方歟

腎膜遮睛龜龍點眼方良蓋豬膽汁者甲木之精也可以榮潤乙竅冰腦者辛溫之品也可以旋開目翳猪膽膜皮者化爛之品也可以消去翳膜

兩瞼赤濕流淚疼痛不能視物夜不可近燈二百味花草膏主之夫內熱則瞼赤肝熱則出泣微熱則痒熱甚則痛或痛或痒皆火之故也氣熱則神濁昏冒故令晝不能視物陽勝者惡火故令不可以近燈光此經所謂天明則日月不明邪害空竅也羯羊膽苦物足以勝熱蜜潤物足以濟火然曰入口不曰入眼則固服食之劑耳用之者使頻頻嚥之藥力相繼爲良

目疾者戒沐頭宜濯足崐謂此二句者先哲之格言也太極之道動而生陽靜而生陰沐頭則上動矣必生陽而損目況夫濕氣難乾乘風而梳拂不已則風濕襲於首而併於目甚者至於喪明此沐頭之宜戒也然何以宜濯足也足太陽之經根於足之小指端上貫於睛明足少陽之經根於足大指岐骨間上貫於瞳子髎足陽明之經根於足中指內間上貫於承泣易曰水流濕火就燥若能以溫水濯其兩足則頭目間之熱邪亦能引之而下況夫溫濯之餘勝理疏泄又足以瀉經中之邪是亦去病之一助也故曰宜濯足

陳寶功外科正宗

眼丹

眼丹乃脾經有風胃經多熱共結爲腫風多者則浮腫易消熱甚者則堅腫難散初起宜用金黃散敷之有表證者荊防敗毒散有裏證者清胃散加大黃利之如後不散必欲作膿宜換膏貼之膿成者卽針遲則眼頭自破然此乃睛明穴肉空難斂之所故成漏者多

眼胞菌毒

菌毒者乃脾經蘊熱凝結而成其患眼胞內生出如菌頭大帶小漸長垂出甚者眼翻流淚亦致昏蒙治

宜用軟綿紙蘸水瘡之眼泡上少頃用左手大指甲佃於患根右手以鈹針尖頭齊根切下血出不妨隨用翠雲靛磨濃塗之其血自止內服涼膈清脾飲二服仍忌海腥煎炒椒薑火酒等件不發

景岳全書 臣張介賓著

論證

眼目一證雖古有五輪八廓及七十二證之辨余嘗細察之似皆非切當之論徒資惑亂不足憑也以愚論之則凡病目者非火有餘則陰不足耳但辨以虛實二字可盡之矣蓋凡病紅腫赤痛及少壯暫得之病或因積熱而發者皆屬之有餘其既無紅腫又無熱痛而但或昏或澀或眩運或無光或年及中衰或酒色過度以致羞明黑暗瞪視無力珠痛如摳等證則無非水之不足也虛者當補實者當瀉此固其辨矣然而實中亦有兼虛者此於腫痛中亦當察其不足虛中亦有兼實者又於衰弱內亦當辨其有餘總之虛實殊途自有形氣脈色可證可辨也知斯二者則目證雖多無餘義矣

眼科有風熱之說今醫家凡見火證無論有風無風無不稱爲風熱多從散治而不知風之爲義最當辨析夫風本陽邪然必有外感方是眞風因風生熱者風去火自息此宜散之風也若本無外感止因內火上炎而爲癢爲痛者人亦稱爲風熱蓋木屬肝肝主風因熱極而生風者熱去風自息此不宜散者也如果風由外感必見頭痛鼻塞或爲寒熱或多涕淚或筋骨痠疼而脈見緊數方可兼散如無表證則陰火熾於上者則凡防風荊芥白芷升麻川芎細莘薄荷羌活之類皆不宜用雖曰亦有芩連梔蘗自能清火然宜升者不宜降用散者是也宜降者不宜升用清者是也若用藥不精未免自相掣肘致可速者反遲病輕者反重躭視日久而醫障損明無所不致又孰能辨其由然哉此不可不察其陰陽升降之道也

眼目之證當察色以辨虛實經曰黃赤者多熱氣青白者少熱氣故凡治黃赤者宜清肝瀉火治青白者宜壯腎扶陽此固不易之法也至於目黃一證尤宜辨其虛實不可謂黃者必由熱也蓋有實熱而黃者有虛寒而黃者實熱之黃如造麴然以濕熱內蓄鬱蒸而成熱去則黃自退非清利不可也若虛寒之黃則猶草木之凋以元陽日剝津液消索而然其爲病也既無有餘之形氣又無煩熱之脈證惟因乾涸所以枯黃其衰已甚使非大加溫補何以回生切不可因其色黃槩執爲熱而再加清利鮮不危矣

醫障當分虛實大都外障者多由赤痛而成赤痛不已則或爲努肉或爲瘢癭此皆有餘之證治當內清其火外磨其障若內障者外無雲醫而內有蒙蔽綱目謂其有醫在黑睛內遮瞳子而然龍木論又云嚼脂流下作醫者足太陽之邪也肝風上衝作醫者足厥陰之邪也故治法以鍼言之則當取三經之俞如天柱風府太衝通里等穴是也又聞有巧手妙心能用金鍼於黑眼內撥去雲醫取效最捷者此雖聞之而實未見其人也又有所謂內障者察其瞳子則本無遮隔惟其珠色青藍或微兼綠色或瞳人散大別無熱壅等證而病目視不明或多見黑花等證此悉由腎氣不足故致瞳子無光若有所障而內實無障也治當專補腎水氣虛者尤當兼補其氣又有七情不節肝氣上逆或挾火邪而爲矇昧不明若有所障者雖其外無赤痛然必睛珠脹悶或口鼻如煙此亦有餘之證氣逆者先當順氣多火者兼宜清火若氣不甚滯火不甚盛必當滋養肝血然有餘者多暴至若因循日積者多不足也又當以此辨之

論治

火證眼目赤痛或腫或澀或羞明脹悶凡暴病而火之甚者宜抽薪飲加減主之火之微者宜徙薪飲黃芩黃連湯之類主之

若陰虛而火盛者宜加減一陰煎瀉白散滋陰地黃丸之類主之

若久病不已或屢發而多火者宜黃連羊肝丸明目羊丸肝或因本還睛丸之類主之

若眞陰不足本無火證而但目視無光及昏黑倦視等證悉由水虧血少而然宜濟陰地黃丸左歸丸之類主之或兼微火者宜明目地黃丸固本還睛丸之類主之

若陰中之陽虛者宜大補元煎左歸飲人參養榮湯十全大補湯之類主之

若風熱腫痛之證察其果有外感方可從散宜芎莘散明目細莘湯助陽和血湯之類擇而用之

若風熱相兼者宜芍藥清肝散當歸龍膽湯蟬花散之類主之

醫障遮睛凡火有未清者宜蟬花散八味還睛散之類主之

退腎諸藥如白蒺藜木賊蕎蒙花蛇蛻蟬蛻青葙子

草決明石決明夜明砂之類皆所宜用然欲退翳於已成終屬費力不若早杜其源也

點眼諸方載者固多然皆不若金露散之爲妥也或用丹砂散亦妙若火連五臟熱毒深遠而凡過用寒凉點洗者多致留邪大非良法若火邪不甚而暴爲赤痛者用雞子黃連膏其效甚捷或黃連膏

目眶歲久赤爛俗呼爲赤瞎當以三稜鍼刺眼眶外出血以瀉濕熱而愈或用洗爛弦風赤眼方亦妙

升陽散火辨

凡治火之大法有曰升陽散火者有曰滋陰降火者夫火一也而曰升曰降皆堪治火然升則從陽降則從陰而升降泥用能無誖乎抑何者宜升何者宜降而用有辨乎此千古之疑竇亦千古之兩端而未聞有達之者夫火之爲病有發於陰者有發於陽者發於陰者火自內生者也發於陽者火自外致者也自內生者爲五內之火宜清宜降者自外致者爲風熱之火宜散宜升者今人凡見火證無分表裏必曰木火同氣動輒稱爲風熱多用升陽升火之法嗚呼此似近理孰得非之而不知至理所在無容混也夫風熱之義其說有二有因風而生熱者有因熱而生風者因風生熱者以風寒外閉而火鬱於中此外感陽分之火風爲本而火爲標也因熱生風者以熱極傷陰而火達於外此內傷陰分之火火爲本而風爲標也經曰治病必求其本可見外感之火當先治風風散而火自息宜升散不宜清降內生之火當先治火火滅而風自清宜清降不宜升散若反而爲之則外感之邪得清降而閉固愈甚內生之火得升散而燔燎何當此其內因外因自有脈證可詳辨也余閱方書所見頭目口齒咽喉臟腑陰火等證悉云風熱多以升降並用從逆兼施獨不慮升者礙降降者礙升乎從者忌逆逆者忌從乎經曰高者抑之下者舉之寒者熱之熱者寒之又曰病生於內者先治其陰後治其陽反者益甚此病生於陽者先治其外後治其內反者益甚此自不易之正理故余之立方處治宜抑者則直從乎降宜舉者則從乎升所以見效速而絕無躭延之患亦不過見之真而取之捷耳若今人之輕病致重重病致危而經年累月日深日甚以致不救者謂非兩端之誤者乎明者於此最當辨也

論古

東垣曰能遠視不能近視者陽氣不足陰氣有餘也乃氣虛而血盛也血盛者陰火有餘氣虛者氣弱也此老人桑榆之象也能近視不能遠視者陽氣有餘陰氣不足也乃血虛氣盛也血虛氣盛者皆火有餘元氣不足也火者元氣之賊也王海藏曰目能遠視責其有火不能近視責其無水宜東垣地芝丸主之目能近視責其有水不能遠視責其無火東垣定志丸主之愚謂此二子之說在東垣以不能近視爲陽不足不能遠視爲陰不足在海藏以能遠視不能近視責其有火無水能近視不能遠視責其有水無火何二子之言相反也豈無是非之辨哉觀劉宗厚曰陽氣者猶日火也陰氣者金水也先儒謂金水內明而外暗日火外明而內暗此自不易之理也然則內明者利於近外明者利於遠故凡不能遠視者必陰勝陽也不能近視者必陽勝陰也由此言之則海藏是而東垣非矣若以愚見評之則但當言其不足不必言其有餘故曰不能遠視者陽氣不足也不能近視者陰氣不足也豈不甚爲明顯若東垣以陰氣有餘陽氣有餘皆謂之火則能視者皆火病也海藏云能近視責其有水能遠視責其有火則當責者亦是病也此等議論余則未敢服膺

王節齋曰眼赤腫痛古方用藥內外不同在內湯散則用苦寒辛凉之藥以瀉其火在外點洗則用辛熱辛凉之藥以散其邪故點藥莫要於冰片而冰片大辛熱以其性辛甚故借以拔出火邪而散其熱氣古方用燒酒洗眼或用乾薑末生薑汁點眼者皆此意也蓋赤眼是火邪內炎上攻於目故內治用苦寒之藥是治其本如鍋底之去薪也然火邪既客於目從內出外若外用寒凉以阻逆之則火鬱內攻不得散矣故點藥用辛熱而洗眼用熱湯是火鬱則發因而散之從治法也世人不知冰片爲切藥而誤認爲寒常用點眼遂致積熱入目而昏暗障翳故云眼不點不瞎者也又不知外治忌寒凉而妄將冷水冷物冷藥混洗致昏瞎者有之愚按節齋之論甚屬有理然寒凉點眼之法亦非盡不可用但用之有宜否耳蓋點以寒凉用治火也若火之微者其勢輕其邪淺或偶觸烟火風熱或素有標病邪在膚腠之間而熱不深者即用黃連膏之類暫爲清解亦可去熱浮熱去而目自愈無不可也若火之甚者本於五臟而熾及三陽欲以一星之寒凉濟此炎炎之盛勢其果能否此其解熱之功毫無所及而閉熱之害惟目受之矣故凡病火眼之甚者點以寒凉痛必連珠正由火鬱

而然耳所以久點寒凉而不效者未有不致於壞目此王節齋之論有不可不察而凡治癰疽外證者亦當並識此義

石室秘錄 臣陳士鐸著

目痛腫

目痛者肝經之病宜治肝矣而余偏不治肝方用黃連一錢花椒七粒明礬三分荆芥五分生薑一片水煎半椀乘熱洗之一日洗七次明日即愈此治火眼之法如此若虛火之眼又不如是用人乳半鍾生地二錢蔴黃仁五分去殼取一分研碎明礬半分水半鍾同入乳煎藥取汁少許洗七次明日即愈虛火之眼紅而不痛不澀無淚無賙是也有火者紅腫如含桃淚出不止酸痛羞明多賙是也又治目痛方用柴胡防風各二分黃連三分花椒三粒明礬一分水半鍾飯鍋蒸洗眼如神一日洗三次二日即止痛又一方最妙以人乳一合大棗一枚明礬入參黃連各三分水半鍾同煎二沸即取起洗眼無論虛眼實眼奇妙每日洗七次三日即愈

目痛而澀無淚紅赤人以爲熱不知非熱也乃腎水虧而虛火衝上耳方用六味地黃湯加柴胡一錢白芍甘菊花當歸各三錢治之一劑輕二劑全愈此亦上病治下之法

目痛法當用輕清之品少少散之無不立效如小柴胡湯之方是也然而小柴胡湯世人不知輕重之法予再酌定之可永爲式方用柴胡黃芩半夏甘草各一錢陳皮五分此小柴胡湯予更加人參五分茯苓二錢更爲奇妙蓋氣足則邪易出而汗易發世人見用人參便覺失色匪獨醫者不敢用即病者亦不敢服相沿而不可救滔滔皆是安得布告天下醫人詳察其病源而善用之也

目腫而痛亦是火證然必看其賙多淚多紅腫而痛如有物針觸一般用柴胡白蒺藜炒梔子各三錢半夏甘草各一錢水煎服此方之妙全在直散肝膽之鬱火火散則熱自退不攻之攻勝於攻不下之下勝於下也一劑奏功不必再服

目之紅腫乃風火入於肝膽之中濕氣不散合而成也初起之時即用舒肝膽之藥而加去濕散火之品自然手到功成無如人止知散邪而不知合治之法所以壅結而不能速效少不慎疾或恣慾於房闈或留情於聲色或冒觸於風寒遂變成爛眼流淚證莊則努肉攀睛有之今定一方即於初起之三五日內連服二劑立愈方用柴胡白芍白蒺藜半夏各三錢甘菊花二錢白朮五錢荆芥甘草草決明各一錢水煎服一劑輕二劑愈有熱者加梔子三錢無熱者不必加入此方之妙在火風濕同治而又佐之治目之品所以藥入口而目即愈也

眼花猝倒

眼花猝倒非中於惡則中於疾然中惡中疾實可同治蓋正氣之虛而後可以中惡中氣之餒而後可以疾迷然則二證皆氣虛之故故補其氣而中氣正氣自回或加以祛痰之品逐邪之藥無有不奏功頃刻者方用人參三錢白朮五錢附子半夏南星白薇各一錢水煎服下喉即愈此方妙在補氣之藥多於逐痰驅邪中氣健於中邪氣消於外也

目生星

眼目中生星久不能去止可去暫時者方用白蒺藜三錢水煎洗之三日即無星

視物倒置

如人病傷筋力將肝葉倒轉視各物倒置人又無病用諸藥罔效必須將人倒懸之一手執木頭棍劈頭打去不必十分用力輕輕打之然不可先與之言必須動其怒氣使葉開張而後擊之彼必婉轉相避者數次則肝葉依然相順矣更有一法以黃酒一壺令病人飲之大醉以竹轎擡之故意跌翻亦必愈也

眼生長肉

有人眼內長肉二條長一寸如線香之粗出於眼外此乃祟也雖是肝膽之火無祟則不能長此異肉法當藥點之冰片黃連甘草各一分硼砂半分各研細末無聲爲度用人乳少許點肉尖上覺眼珠火炮出一時收入而愈更須服煎藥用白芍五錢柴胡甘草陳皮各一錢炒梔子二錢白芥子茯苓白朮各三錢水煎服此方妙在舒肝膽之氣而又瀉其火與痰則本源已探其驪珠又何愁怪肉之重長耶

努肉攀睛

努肉攀睛乃瞎病失治而生肉人不知避忌將眼皮翻轉以取凉快誰知風邪中之則眼毛倒生而攀睛矣此等最忌動刀一動刀則不可內治矣法當用丸散以消之然非服至半年不能奏效當歸半斤柴胡四兩丹皮三兩蔴黃白芍枸杞子蒺藜各一斤草決明四兩家園甘菊花茯苓麥門冬天門冬各十兩各爲末蜜爲丸每日饑服一兩一料少愈二料全痊最

忌房事能斷慾者一料全愈不必須二料三料也

方一

越婢加半夏湯

治寒火眼赤腫或喘欬目如脫

麻黃六兩　石膏半斤　生薑三兩　甘草二兩　半夏半升　大棗十五枚

右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升溫分三服

蛤粉丸

治風熱目赤

地膚子五錢　決明子一升

二味爲末以米飲汁和丸食後服二十九至三十丸日日服至瘥止

熏方

治眼睥赤爛

蒼朮四兩米泔水浸一宿切作片焙乾爲末

每服三錢猪肝二兩批開摻藥在內麻線縛定粟米一合水一碗砂鍋內煮熟熏眼候溫臨臥服大效又方蒼朮一兩搗羅爲末每服一錢不計時

神麴丸

主明目夜讀細書一名磁石丸

神麴四兩　磁石二兩　光明沙一兩

右三味爲末煉蜜爲丸如梧子大米飲服三九日三不禁常服益眼力衆方不及學者宜知此方神驗不可言當祕之

瓜子散

補肝治眼漠漠不明一名十子散

冬瓜子　青葙子　羌蔚子　枸杞子　牡荊子　蒺藜子　菟絲子　蕪菁子　決明子　地膚子　柏子仁各二合　牡桂　蔓莫根各二兩　薏仁一合一本二合　車前子一兩　細辛半兩一本兩半

右十六味治下篩食後以酒服方寸匕日二神驗

補肝蕪菁子散

常服明目

蕪菁子三升淨淘以清酒三升煮令熟曝乾

右治下篩井華水和服方寸匕稍加至三匕無所忌可少少作服之令人充肥明目洞視水酒任服

梔子仁煎

治肝實熱目背痛如刺

梔子仁　決明子　薤仁　車前葉　秦皮各一兩　六銖　石膏一兩碎如豆　苦竹葉　細辛半兩　赤蜜三合

右九味㕮咀以井花水三升煮取七合去滓下蜜更煎取四合以綿濾之乾器貯密封勿使草芥落中以藥汁細細仰臥以傅目中

地黃散

治心肝壅熱目赤腫痛赤筋白翳遮睛散在四邊易治若遶遮黑睛多致失明及治瘡疹入目者

生地黃　熟地黃　當歸　生大黃各七錢五分　穀精草　蒺藜　黃連　木通　防風　生犀角　木賊　元參　羌活　蟬蛻　粉草各半兩

右爲末每服半錢羯羊猪肝汁食後調服

補肝散

治三十年失明

蒺藜子七月七日收陰乾不拘多少

右搗末食後水服方寸匕此眞神方也人多不能知又治積年失明神驗勿輕視之以決明子杵爲末食後以粥飲服方寸匕

陽丹

治諸般外障赤脈貫睛怕日羞明沙澀難開泡弦赤爛星翳混睛

黃連　黃蘗各一兩　生大黃　黃芩　防風　龍膽草各五錢　當歸　連翹　羌活　梔子　白菊花　生地黃　赤芍　苦參各三錢　蒼朮　麻黃　川芎　白芷　細辛　千里光　龍腦荷　荊芥　木賊各一錢半

一方加鷄柏樹根不拘多少此一味藥樹生梗上有小刺葉如石榴葉根色如黃芩單用亦可點洗石藥以井水洗淨剉碎以井水浸於銅器內春三夏二秋四冬五日曬常將手挪出藥味曬出藥力熟絹濾淨留清汁一碗以飛羅雷湯汁三碗以淬藥却用銹銅鍋子一箇裝打碎甘石一斤在內新瓦蓋上松炭固濟燒令透極紅色鉗出少時淬入

藥汁內煅淬三次就將留下清汁飛細碾令千萬餘下澄清去濁曬乾再碾令無聲爲度細絹重羅過磁器收貯聽用入後藥

爐甘石一錢　麝香三釐　片腦一分

右爲細末次入片腦碾嫩熟絹羅過磁器收貯點眼如有瞖膜配合陰丹一九二八三七四六等丹

陰丹

治瞖膜遮睛血灌瞳人拳毛努肉爛弦風眼諸般眼疾大效如神

密陀僧二分半　爐甘石一兩　銅青一錢九分

硇砂六分二釐半　沒藥二分　青鹽　乳香各三分七釐半　熊膽一分二釐半

八味用黃連五錢龍膽草二錢半煎汁濾淨將前藥和一處入汁碾細嫩曬乾再碾極細後入

白丁香　螵蛸　白礬生　輕粉各一分七釐半

硼砂二分半　雄黃　牙硝　黃丹　血竭　硃砂各一分二釐半　鉛白霜　粉霜　鷹條　膽礬各七釐半

一方有黃連六分二釐胡連腦荷細莘薑粉草烏各一分二釐半按已上六味並無去瞖之功不用更妙恐有礙眼作痛害眼之禍也一方有石蟹貝齒元明粉眞珠琥珀各二分按已上五味或多或少皆可增入以有磨瞖消膜之功不可缺也右各另製細末依方秤合和勻研令無聲至千萬餘下磁器收貯聽用如有瞖膜配合陽丹一九二八三七四六等丹點眼大效如神

一九丹

陰一分　陽九分　硼九釐　礬生五釐

二八丹

陰二分　陽八分　硼八釐　礬生四釐

三七丹

陰三分　陽七分　硼七釐　礬生三釐

四六丹

陰四分　陽六分　硼六釐　礬生二釐

陰陽丹

陰五分　陽五分　硼五釐　礬生一釐

清涼丹

陽一錢　硼一分　礬生一釐

已上六丹俱用麝香三釐片腦一分研勻點眼

日精丹

治一切火熱赤眼爛弦風等證夫日者陽也陽主輕清故其丹輕也專治一切眼目稍輕者用此丹也

黃連二兩　黃蘗三兩　龍膽草　防風　大黃　赤芍藥　黃芩　當歸　梔子各五錢　白菊花　腦荷各二錢

一方加鷄柏樹根不拘多少爲妙右浸藥水煅淬爐甘石收貯諸法悉同陽丹

製過爐甘石一兩　朱砂　硼砂各二錢　麝香三分　白礬上一分

右爲極細末每末一錢加片腦一分研細羅過點眼如有瞖膜配和月華丹對勻點之

月華丹

治諸般瞖膜努肉等證夫月者陰也陰主重濁故其丹重也專治一切眼目稍重者用此丹

製過爐甘石一兩　硃砂　硼砂各二錢　眞珠　白丁香　珊瑚　琥珀　水晶　瑪瑙　石蟹　貝齒　硇砂各二分　乳香　沒藥　光明粉　輕粉　青鹽　膽礬　海螵蛸　蚺蛇膽　黃丹　山猪膽　白礬生　雄黃　熊膽　牛黃各一分　麝香三分

右二十七味各另修製淨秤合和勻碾令千萬餘下磁器收貯臨用時每末一錢加梅花片腦一分研勻羅過點眼

如瞖膜重厚者加硇砂少許

如瞖膜薄輕者對和日精丹

光明丹

治一切眼目瞖膜努肉爛弦赤眼毦燥緊澀羞明惡日

製過爐甘石三錢　硃砂　硇砂各一錢　麝香一分　片腦三分

右各另製細末秤合和勻碾令千萬餘下羅過點眼如瞖膜加石蟹眞珠各三分硇砂白丁香熊膽牛黃琥珀貝齒各一分研細和勻點眼要紅加硃砂一錢

白龍丹

治一切火熱眼及瞖膜努肉

爐甘石一錢　元明粉五分　硼砂三分　片腦一分

右研細末點眼

爐甘石散

治一切外障白睛傷破爛弦風眼療濕熱風爛住痛明目去瞖退赤除風大效

爐甘石一錢　片腦一分　黃連二分半

右以黃蘗一兩黃連五錢煎濃汁濾淨投入製甘石二兩內曬乾以汁盡爲度依方秤合和勻研爲細末乳汁和調鴨毛刷爛處一方以覆盆子根皮卽甜勾根洗淨砍爛取汁和乳汁調刷爛處大效

紫金錠子

治一切眼疾不分遠年近日諸般瞖膜血灌瞳仁努肉攀睛拳毛倒睫積年赤瞎暴發赤腫白睛腫脹沙澀難開眊燥緊澀怕日羞明眵多矇淚爛弦風痒視物昏花迎煙淚出目中溜火諸般目疾

爐甘石　黃丹各半斤　黃連麪　硃砂各一兩

當歸　硼砂各半兩　海螵蛸　白丁香　白礬

硇砂　輕粉　貝齒　眞珠　石蟹　乳香去油

沒藥去油　熊膽　麝香各一錢二分半　片腦二錢臨用時加入

右除腦麝外餘各另製爲末秤合和勻入黃連水碾至千萬餘下日乾次入麝香研細羅過又次入片腦再研復羅入後膏搜和作錠子陰乾

黃連一斤　當歸　生地各四兩　防風　黃蘗

龍膽草各二兩　蕤仁半兩　冬蜜八兩另熬酥乾爲度　鵝梨汁　訶子各八枚　猪胰子四枚以稻草挪洗去膏膜乾淨無油爲度再用布包搗爛入藥

右將黃連等八味洗淨剉碎以水浸於銅器內春五夏三秋四冬七濾去滓以滓復添水熬三次取盡藥力以密絹綿紙重濾過澄去砂土慢火煎熬槐柳枝各四十九條互換一順攪不住手攪盡枝條如飴糖相類入蜜和勻磁器盛放湯瓶口上重湯蒸頓成膏復濾淨滴入水中沉下成珠可丸爲度待數日出火毒再鎔化入末和勻杵搗爲丸錠陰乾金箔爲衣每以少許新汲水浸化開鴨毛蘸點眼大眥內又可以熱水泡化洗眼藥水冷又煖洗日洗五七次日點十餘次大效

熊膽膏錠

治風熱上攻眼目昏花眵多矇淚眊燥緊澀痒極難忍努肉攀睛沙澀難開瞖膜覆瞳目眶歲久赤爛俗呼爲赤瞎是也當以稜針刺目眶外以瀉濕熱如倒睫拳毛乃內瞼眼皮緊當攀出內瞼向外以稜針刺出血以瀉伏火使眼皮緩則毛立出瞖膜亦退一切目疾悉皆治之

爐甘石六兩　黃丹三兩　黃連一兩　當歸

珠砂　硼砂各二錢　白丁香　海螵蛸　白礬

片腦臨時加入　眞熊膽　輕粉各一錢　乳香

沒藥　麝香各五分

右除腦麝餘各另製細末秤合和勻入黃連末當歸末水調勻綿絹濾淨去滓入末碾至千萬餘下曬乾入麝香碾極細羅過次入片腦碾勻復羅却入後膏成劑

川黃連半斤　龍膽草　防風　當歸　生地黃

冬蜜同煎製煉各二兩　訶子八枚去核研末

蕤仁二錢半　鵝梨四箇取汁　猪胰子二箇同前製入

右九味洗淨剉碎以井水浸於銅器內或磁器內春五夏二秋三冬七日濾去滓以滓復煎三四次取盡藥力以熟密絹開綿紙在上濾過澄清去砂土慢火煎熬槐桑柳枝各四十九條長一尺攪不住手互換攪盡枝條待如飴糖相類入蜜和勻磁椀盛放湯瓶口上蒸頓成膏復濾淨滴入水中沉下成珠可丸爲度待數日出火毒再鎔化入末和勻杵爲丸錠陰乾金箔爲衣每以少許井水化開鴨毛蘸點眼又以熱湯泡化洗眼

開明膏

治眼目昏花視物不明或生雲瞖白膜內外障眼風赤冷淚一切眼疾

黃丹二兩　青鹽五錢　海螵蛸飛　硃砂　硼砂各一錢半　訶子二枚去核研末　冬蜜四兩熬一大沸去沫取淨者　槐柳枝各四十九條

右將蜜煉沸濾過磁器盛放湯瓶口上入黃丹訶子蒸熬紫色重湯頓成膏槐柳枝一順攪不住手互換攪令條盡滴水中不散爲度再又濾淨入後膏和劑

川黃連研末二兩羅過　槐柳枝各五錢

右入水二大椀熬一椀濾去滓以淨汁再熬稀稠得所入蜜藥和勻磁器盛頓湯瓶口上重湯成膏放在地上數日出火毒次入前藥末攪勻點眼昔人曾以此藥救人大效

消瞖復明膏

治眼目昏花瞖膜遮睛內外障眼一切眼疾

青鹽二錢半　海螵蛸　眞珠各七分半　熊膽

麝香各二分　黃丹一兩　片腦五分臨時加入

訶子二枚去核研　槐柳枝各四十九條　冬蜜熬一沸去白沫濾淨四兩

右將蜜和黃丹煉至紫色旋下餘藥熬至滴水沉下成珠爲度除腦麝成膏後入

川黃連二兩五錢　防風　當歸身　龍膽草　生地黃各五錢　木賊　白菊花各二錢五分　薤仁一錢　杏仁五分

右如前熬膏入蜜和勻磁椀盛放湯瓶口上蒸頓成膏濾淨入腦麝和勻點又以熱湯泡化洗眼

爐甘石膏

治眼目昏花視物不明

爐甘石　代赭石　黃丹各一兩　冬蜜八兩

訶子二枚取末　槐柳枝各四十九條

右爲細末入黃連末再碾至千萬餘下却以蜜煉去白沫入末同熬成膏槐柳條攪不住手濾淨入後膏子和劑

黃連研末一兩於銅鍋水熬成膏濾去滓淨

右入前蜜藥磁椀盛放湯瓶口上蒸頓成膏槐柳枝一順攪不住手互換枝條攪盡濾淨出火毒點眼又以熱湯泡化洗眼

夜光膏

治赤脈翳膜昏花餘證同上

黃丹四兩　爐甘石二兩　青鹽六錢　鵝梨十枚取汁　冬蜜一斤煉一沸

右將丹石碾細末以青鹽另碾末却將鵝梨汁和蜜熬稀稠入甘石黃丹煉紫色次入青鹽熬勻槐柳枝攪不住手入後膏和劑

川黃連八兩　當歸二兩　訶子四枚去核研末　豬膽子二箇如前搓洗

右各洗剉水浸三五宿濾去滓以滓復煎取盡藥力以熟絹綿紙濾淨澄去沙土慢火煎熬以槐柳枝各四十九條一順攪不住手待如飴糖濾淨入前蜜藥磁器盛放湯瓶口上重湯頓成膏候出火毒每以少許點眼大皆以熱湯泡化洗眼凡修合眼藥宜臘月妙正月十一月次之餘月不宜

黃連膏

治目中赤脈如火溜熱炙人餘同上

川黃連八兩　片腦一錢

右以黃連去蘆刮去黑皮洗淨剉碎以水三大椀貯於銅鍋或磁器內煎文武火熬減大半椀濾去查以查復煎濾淨澄清入薄磁器盛放湯瓶口上重湯蒸頓成膏熬鎔再復濾淨待數日出火毒臨時旋加片腦以一錢爲率酌量加之以少許點眼大皆內又方加熊膽蚺蛇膽各少許更妙

又方

治前證

黃連八兩　杏仁　菊花　梔子　黃芩　黃檗　龍膽草　防風　當歸　赤芍藥　生地各一兩

右以水煎濃汁去滓再煎濾淨椀盛放湯瓶口上重湯蒸頓成膏滴入水中可丸爲度以陽丹收爲丸臨用加片腦少許研井水化開鴨毛蘸點眼

又方

治前證

川黃連　鷄柏根各多用　田茶菊　地薄荷　嫩柏葉　苦花子　苦參根　地胡椒　七層樓　地荒荽　千里光（即黃蛇草）各等分

右以水煎去滓濾淨復煎候汁如稀飴樣入冬蜜相停即以椀盛放湯瓶口上重湯蒸頓成膏入陽丹一兩和勻更入硃砂硼砂各一錢片腦麝香各一分爲妙

日精月華光明膏

治腎膜努肉諸般眼疾大效

爐甘石　黃丹各八兩　菉豆粉炒黑四兩　黃連一兩　當歸　硃砂　硼砂　元明粉　決明粉各二錢　輕粉　白礬　白丁香　片腦　海螵蛸　自然銅　硇砂各一錢　麝香　樟腦各半錢　熊膽　沒藥　滴乳香　鷹條　雄黃　青鹽　膽礬　銅青　牙硝　山猪膽各二分半

一方有貝子煅貝齒石燕石蟹水晶眞珠瑪瑙琥珀珊瑚各一錢若加此九味要去菉豆粉不用有豆粉即半眞半僞右各另製細末依方秤合和勻碾至千萬餘下熟絹羅過入後膏子成劑

鷄柏根一斤　黃連半斤　龍膽草　生地黃　黃檗　苦參各二兩　大黃　黃芩　山梔子　赤芍藥　防風　菊花　元參　當歸各一兩　羌活　木賊　蒺藜　連翹　蔓荊子　細辛　川芎　白芷各五錢　夜明沙　蛇蛻　蟬蛻各二錢半

一方福建地有後十一味草藥在內用之效速他處無此草藥不用亦效

苦花子　地薄荷　地西瓜　田茶菊　七層樓

千里光　鐵梗子　地園荽　地胡椒　蛇不見
水楊梅根皮各生採一握搗爛另煎取濃汁入前藥
同煎成膏　冬蜜半斤
右各洗淨剉碎入井水於銅器內浸三宿慢火煎熬濃汁濾去滓以滓再煎再濾慢火煎熬槐柳桑枝攪熬如飴糖入蜜和勻更入羯羊膽雄猪膽各二枚和勻磁椀頓放湯瓶口上蒸成膏復濾淨滴沉水中成珠爲度待數日出火毒再鎔化入諸藥末和勻杵爲丸錠陰乾金箔爲衣每少許井水化開鴨毛蘸點又以熱湯泡化洗眼神效

碧玉散

治眼睛臚脹紅赤昏暗羞明怕日隱澀難開疼痛風痒頭重鼻塞腦鼻痠疼瞖膜努肉眵淚稠粘拳毛倒睫一切眼證

蒴藋花　腦薄荷　羌活　川芎　細莘　防風
荊芥　蔓荊子　白芷各一錢　風化硝　青黛
石膏煅　川黃連各三錢　鵝不食草三兩
右爲細末吹鼻中一日吹二次

乳香散

治內外障眼攀睛瘀肉倒睫拳毛瞖膜遮睛一切目疾

防風　荊芥　細莘　藁本　白菊花　石菖蒲
天麻　蔓荊子　川芎　白芷　羌活　赤小豆
瓜蔕　漢防己　菟絲子　穀精草　自然銅製
鬱金　當歸　石膏煅　乳香　沒藥　雄黃
蛇蛻炒焦　蟬蛻炒焦　川山甲燒　鷄子蛻炒
腦薄荷各五分　麝香　片腦各半分
右爲細末每用少許吹鼻中

吹雲膏

治視物睛困無力隱澀難開睡覺多眵目中淚下及迎風下泣羞明怕日常欲閉目喜在暗室塞其戶牖瞖膜遮睛此藥多點神效

黃連三錢　蕤仁　升麻各三分　青皮　連翹
防風各四分　細莘一分　柴胡五分　當歸身
生甘草各六分　生地錢半　荊芥穗一錢取濃汁
右剉除連翹外用淨水二椀先熬諸藥去半椀入連翹熬至一大盞去滓入銀盞內文武火熬至滴入水成珠加熟蜜少許熬勻點之

金露膏

除昏退瞖截赤定疼

蕤仁搥碎　黃丹各一兩　黃連半兩　蜜六兩
右先將黃丹炒令紫色入蜜攪勻下長流水四升以嫩柳枝五七莖一把束定攪之次下蕤仁候滾十數沸下黃連用柳枝不住手攪熬至升七八合笊籬內傾藥在紙上慢慢滴之勿令塵污如有瘀肉加硇砂末一錢上火上慢開入前膏子內用龍木論云患傷寒熱病後切不可點恐損目也斯言可以爲藥禁云

寶鑑春雪膏

治風熱上攻眼目昏暗痒痛隱澀難開多眵熱淚羞明疼痛或生瞖膜

黃連四兩剉用童便二升浸一宿去黃連以汁焠甘石　南爐甘石十二兩煅用黃連汁焠　硇砂一錢細研水調在盞內頓乾爲度　好黃丹六兩水飛
乳香　鰞鯽骨燒存性　當歸各三錢　麝香
輕粉各少許　白丁香五分
右各研另貯先用好蜜一斤四兩煉去蠟却下甘石末不住手攪次下丹次下諸藥末不住手攪至紫金色不粘手爲度搓作挺子每用一粒新水磨化時時點之忌酒濕麵蕎麥

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百六十五卷目錄
醫部彙考一百四十五

目門八

方二

銅青湯　拜堂散　重洗方　嗃鼻藥
宣明丸　分珠散　麥門冬湯　通血丸
膽歸糖煎散　車前散　眞珠散　退血散
點睛雞仁膏　魚膽傅眼膏　金絲膏　琥
珀煎　瀉肝散　救睛丸　搜風散　注製黑
豆　還睛丸　糖煎散　田螺膏　洗障散
洗腎散　土硃膏　清涼膏　地黃膏　驟風
一字散　人參羌活散　菩薩散　黃芩黃連
湯　復明散　羌活退腎丸　羚羊角湯　杏
仁方　羚羊角散　羚羊角散　還睛散　蘆
薈丸　大黃瀉肝散　堅腎丸　磁石丸　補
肝散　補肝散　補腎丸　生熟地黃丸　通
肝散　八味還睛散　空青丸　涼膽丸　又
方　除風湯　本事方　羅漢應夢丸　神仙
碧霞丹　遠志丸　固本還睛丸　還睛丸
仙木散　夢靈丸　五退還光丸　空青丸
雞仁丸　觀音丸　八子丸　靈圓丹　磨腎
丸　退腎丸　石決明散　韓相進靈丹　又
方　甘菊湯　太陰元精石散　猪肝散　蟬
花散　開明散　草龍膽散　單服蒼朮法
點眼金絲膏　龍腦膏　散血膏　清涼膏
洗眼方　又方　羌活除腎湯　撥雲湯　流
氣飲　撥雲散　神仙退雲丸　本事方　羌
活退腎湯　又方　補陽湯　連蘗益陰丸
升陽泄陰丸　通脾瀉胃湯　神消散　皂角
丸

藝術典第一百六十五卷
醫部彙考一百四十五

目門八

方二

銅青湯 準繩下同

治風弦赤眼

銅青豆大　防風寸許　杏仁二粒去尖不去皮

右各細切於盞中新汲水浸湯瓶上頓令極熱洗之如痛加當歸數片

拜堂散

治風赤眼

五倍子不拘多少

右研極細末貼破赤處

熏洗方

治風眼爛弦臨洗加輕粉少許凡時氣赤眼自外而入非臟腑病者不必服藥熏洗足矣

川黃連去毛　川芎去蘆　荊芥穗各一錢半

蔓荊子一錢去膜　五倍子三錢剪碎去垢銚內火炒待赤色鋪紙地上用蓋片時出火氣

右剉碎作三服每服用生絹一小方洗淨入藥絹內以線紮定水煎仍以紙糊瓶口勿令氣出却於無風處就瓶口紙上破小孔向眼熏之候氣稍平揭去紙就瓶口熏之氣溫傾藥水出用淨絹蘸洗如此三次爲驗仍避風毒

嗃鼻藥

治目風熱腫赤難開

雄黃　辰砂各二錢半　片腦　麝香各少許

細莘半兩

右爲細末口含水少許嗃鼻中

宣明丸

治眼內血貫瞳神赤腫澀痛大熱上壅

赤芍藥　當歸　黃連　生地黃　大黃　川芎

薄荷　黃芩各等分

右爲末煉蜜丸梧子大每服三十丸食後米飲下

分珠散

治眼患血灌瞳神惡血不散

槐花　白芷　地黃　梔子　荊芥　龍膽草

甘草　黃芩　當歸　赤芍藥各一錢

右水煎服春加大黃瀉肝夏加黃連瀉心秋加桑白皮瀉肺

麥門冬湯

治血灌瞳神昏澀疼痛及轆轤轉關外障

麥門冬去心焙　大黃酒炒　黃芩　桔梗剉炒

元參各一兩　細莘去苗　芒硝研各半兩

右剉碎每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓下芒硝少許食後溫服

通血丸

治血灌瞳神

生地黃　赤芍藥　甘草各五錢　川芎　防風

荊芥　當歸各一兩

右爲末煉蜜丸如彈子大食後荊芥薄荷湯嚼下血既散而歸肝又恐目生花須再用前還睛散服之

膽歸糖煎散

治血灌瞳神及暴赤目疼痛或生醫膜

龍膽草　細莘　當歸　防風各二兩

右用沙糖一小塊同煎服

車前散

治肝經積熱上攻眼目逆順生醫血灌瞳神羞明多淚

車前子炒　蕎蒙花去枝　草決明　菊花去枝

白蒺藜炒去刺　龍膽草洗淨　黃芩　羌活

粉草各等分

右爲細末每服二錢食後米湯調服

眞珠散

治眼血灌瞳神生障翳

硃砂一兩　龍腦一分　眞珠　水晶　琥珀　馬牙硝各半兩

右同研如粉以銅筯取如半小豆大點之

退血散

治前證

當歸　赤芍藥　木賊　防風　細辛　龍膽草各等分

㕮咀白水煎先熏熱熏眼後溫服

點睛薏仁膏

治風熱眼飛血赤脈痒痛無定

薏仁去皮細研半兩　好酥一栗子大

右將薏仁與酥和研勻攤椀內用艾一小團燒烟出將椀覆烟上熏待艾烟盡即止重研勻每以麻子大點兩眥頭日二度

魚膾傳眼膏

治飛血赤脈作痛及暴赤眼澁

鯉魚膾五枚　黃連去鬚研末半兩

右以膾汁調黃連末內磁盒盛飯上蒸一次取出如乾入蜜少許調似膏塗傳目眥日五七度

金絲膏

治風熱上攻目赤腫痛

黃連二兩　大黃　黃蘗　龍膽草　山梔仁

當歸各一兩　青竹葉一百片切　大棗二十枚去核　燈心切　硼砂明者　乳香研各二錢五分

右用水五升不拘冬夏浸一時辰取出於銀石器內慢火熬不令大沸候盡汁掇下火放冷用絹絞取汁於無風塵處澄一時辰去滓於銀器內用慢火熬令減半入白蜜半斤同攪以手挑起有絲則止放冷再以夾絹袋濾過用磁盒盛之每取一茶脚許研龍腦一字極細入膏同研一二千遍令勻取少許點之

琥珀煎

治風毒衝目腫赤痒痛

乳香另研二錢　薏仁另研半兩　滑石另研　鉛丹另研各二兩　黃連另研　青皮各一兩　黃芩去黑心　白蜜各四兩　木鼈子十枚去殼　槐枝　柳枝並用新青者各十枝每枝長寸半

右將槐柳枝青皮黃芩滑石以水三椀同煎至兩椀去滓下乳香薏仁鉛丹木鼈子與蜜同熬如琥珀色却下黃連末再煎至一椀半用熟絹濾去查入磁器內密封繩繫墜井底一宿出火毒每用銅筯點以目瀝爲度熬點俱忌鐵器

瀉肝散

治前證

升麻　大黃　赤芍藥　黃芩　薄荷　梔子　木賊　陳皮　黃連　砂硝　菊花　五靈脂　甘草　防風　萆薢　細辛各等分

右爲細末每服二錢爲散亦可水煎服食後老人加枳殼厚朴

救睛丸

治睛腫旋螺突出青盲有翳

蒼朮　枳實　甘草生　川芎　荊芥穗　蟬蛻　薄荷　當歸　木賊　草決明　穀精草各等分

右爲末煉蜜丸彈子大每服一丸食後茶清磨下

搜風散

治旋螺尖起外障

防風　大黃　天門冬　五味子　桔梗　細辛　赤芍藥　菟蔚子各等分

右水煎食後服

法製黑豆

治前證

大黃　黃連　黃芩各半兩　甘草　蕎蒙花　砂硝各一兩

右爲末用黑豆一升水三椀入藥熬乾將豆每服二十粒細嚼清米泔送下

還睛丸

治前證

川芎　白蒺藜　白朮　木賊　羌活　菟絲子　熟地黃　甘草各等分

右爲細末煉蜜丸如彈子大空心熟湯嚼下

糖煎散

治風毒攻眼赤腫昏花隱澁難開

龍膽草　防己　大黃　荊芥穗　甘草　防風　赤芍藥　土當歸各一兩　川芎半兩

右㕮咀爲散每服四錢水一盞沙糖一小塊同煎服

田螺膏

治眼睛腫脹突出及赤眼生膚膜

大田螺七枚去殼　撮地金錢多　生地黃根
田茶菊葉
右同搗爛貼太陽穴及眼胞上然此方不可輕用愼之

洗障散
治障眼及眼胞赤腫腎膜遮睛
田茶菊　七層樓　鐵梗子　雞屎子
右水煎椀盛入鹽少許泡去查洗眼

洗腎散
治同上
赤梗酸枇草
右搗爛沸湯泡濾清洗眼神效

土硃膏
治患眼赤腫閉合
土硃三分　石膏煅一分　片腦少許
右爲末新汲水入蜜調敷眼皆頭尾及太陽處更以梗子煎湯調洗氣飲末服之

清凉膏
治暴赤火眼腫痛難開及障眼并打撲傷損眼
大黃　朴硝　黃連　黃藥　赤芍藥　當歸
細辛　薄荷　芙蓉葉各等分
右爲末用生地黃汁雞子清蜜同調勻貼太陽穴及眼泡上

地黃膏
治赤腫疼痛外障等眼
大黃　黃藥　黃連　黃芩　赤芍藥　當歸
葉豆粉　芙蓉葉　薄荷各等分
右製貼法俱同上

驅風一字散
治目痒極難忍
川烏炮　川芎　荆芥各五錢　羌活　防風各二錢半
右爲末每服二錢食後薄荷湯調下

人參羌活散
治肝熱眼澁痒昏朦
羌活　獨活　人參　川芎　柴胡　地骨皮
桔梗　枳殼　赤茯苓　前胡　天麻　甘草
右水煎服或加防風荆芥

菩薩散
治風毒攻眼昏淚瞤痒
蒼术　防風　蒺藜炒各二兩　荆芥二兩半
甘草鹽水炒七錢半
右末每服一錢入鹽少許沸湯調下或用消風散夾和亦佳

黃芩黃連湯
治內障
黃芩酒洗炒　生地黃酒洗　草龍膽酒洗炒四次
各一兩　黃連去鬚酒洗炒七錢
右咬咀每服二錢水二盞煎數沸去滓再煎至一盞熱服午後晚間俱不可服唯午飯時服之方效

復明散
治內障
黃芪一錢半　生地黃　柴胡　連翹　甘草炙各一錢　當歸二錢　蒼术　川芎　陳皮各五分
黃藥三分
水二大盞煎至一盞去查稍熱服食後忌酒濕麪辛熱大料之物

羌活退翳丸
治內障右眼小眥青白腎大眥微顯白腎腦痛瞳子散大上熱惡熱大便澁或時難小便如常遇天熱煖處頭痛晴服能食日沒後天陰則昏暗此證亦可服滋陰地黃丸
熟地八錢　生地酒製　黃藥酒製　羌蔚子
當歸身酒製　丹參各半兩　柴胡半兩或三錢
黑附子炮　寒水石生用各一錢　牡丹皮三錢
芍藥一兩三錢　防己酒製二錢　知母酒製
羌活　川芎各三錢
右爲細末煉蜜丸如小豆大每服五七十丸空心白湯送下如宿食未盡候餓時服之忌語言隨後以食壓之東垣蘭室祕藏方云腎在大眥加葛根升麻腎在小眥加柴胡羌活是也一名地黃丸

羚羊角湯
治青風內障勞倦加昏重頭旋腦痛眼內痛澁者
羚羊角　人參　元參　地骨皮　羌活各一兩
車前子一兩半
右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服要全善云此方并後羚羊角散補肝散羚羊角飲子皆以羚羊角元參細辛羌活防風車前子爲君蓋羚羊角行厥陰經藥也丹溪云羚羊角入厥陰經甚捷是也元參細辛行少陰經藥也海藏云元參治空中氤氳之氣無根之火爲聖藥也羌活

防風車前子行太陽經藥也如筋脈枯澁者諸方中更加夏枯草能散結氣有補養厥陰血脈之功嘗試之有驗然此諸方又當悟邪之所在若氣脫者必與參膏相半服之氣虛者必與東垣補胃人參湯益氣聰明湯之類相半服之血虛者必與熟地黃丸之類相兼服之更能內觀靜守不干塵累使陰氣平伏方許作效

杏仁方

治肝腎風虛瞳人帶青眼多黑暗潤澤臟腑洗垢開光能驅風明目

杏仁五枚去皮尖

右於五更初就牀端坐勿言勿呼息慮澄神嚼杏仁一粒勿嚥逐一細嚼五粒候津液滿口分爲三嚥直入肝腎惟在久而成功

羚羊角散

治綠風內障頭旋目痛眼內痛澁者

羚羊角　防風　知母　人參　茯苓　元參　黃芩　桔梗　車前子各一兩　細辛二兩

右爲末以水一盞散一錢煎五分食後去相溫服

羚羊角散

治綠風內障

細辛二錢　白菊花　川烏炮　川芎　車前子　防風各五錢　羌活　半夏　羚羊角　薄荷各二錢半

右生薑煎服或爲末荊芥湯調服

選睛散

治眼瞤膜皆澁淚出瘀血努肉攀睛　野菊花　野麻子　川芎　草龍膽　草決明　石決明　荊芥　枳實　茯苓　木賊　炙甘草　白蒺藜　川椒炒去子　仙靈脾　茵陳各半兩

右爲細末每服二錢食後茶清調下日三服忌雜魚肉及熱麪蕎麥等物一方有楮實子無仙靈脾茵陳枳實三味

蘆薈丸

治黑水疑腎內障不痛不痒微有頭旋目澁者

蘆薈　甘草各二錢半　人參　牛膽各半兩　柏子仁　細辛各一兩　靡羊角二兩蜜炙

右爲末煉蜜丸如桐子大空心茶清下十九

大黃瀉肝散

治烏風

梔李仁　荊芥各二錢半　甘草　大黃各五錢

右水煎食後服

墜腎丸

治偃月內障及微有頭旋額痛

青羊膽　青魚膽　鯉魚膽各七箇　牛膽半兩　熊膽二錢半　石決明一兩　麝香少許

右爲細末麪糊爲丸如桐子大每服十丸空心茶清下

磁石丸

治頭風內障頭旋惡心嘔吐

磁石燒赤酢淬二次　五味子　牡丹皮　乾薑　元參各一兩　附子炮半兩

右爲末煉蜜丸如桐子大食前茶下十丸

補肝散

治肝風內障不痛不痒眼見花發黃白黑赤或一物二形難辨　羚羊角　防風各三兩　人參　白茯苓各二兩　細辛　元參　車前子　黃芩炒　羌活各一兩

右爲末食後米飲調服一錢

補肝散

治圓腎內障

熟地黃　白茯苓　白菊花　細辛　白芍藥　柏子仁　甘草　防風　柴胡

右水煎食後服

補腎丸

治圓腎內障

巴戟　山藥　破故紙炒　丹皮　茴香各五錢　肉蓯蓉　枸杞子各一兩　青鹽一錢半

右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十丸空心鹽湯下

生熟地黃丸和劑

治肝虛目暗膜入水輪眼見黑花如豆累累數十或見如飛蟲者治不瘥或視物不明混睛冷淚翳膜遮睛內外障眼並皆治之

釵石斛　枳殼　防風　牛膝各六兩　生地黃　熟地黃　羌活　杏仁各四兩　菊花一斤

右爲末煉蜜丸如桐子大每服三十丸以黑豆三升炒令烟盡爲度淬好酒六升每用半盞食前送下或蒺藜湯下

通肝散

治冰翳內障

梔子　蒺藜炒　枳殼　荊芥各四錢　車前子
牛蒡子炒各二錢　甘草四錢
右爲末每服二錢苦竹葉湯食後調下

八味還睛散

治散醫內障

蒺藜炒　防風　甘草炙　木賊　梔子各四錢
草決明八錢　青葙子炒　蟬蛻各二錢
右爲末每服二錢麥門冬湯調食後服

空青丸

治沉醫細看方見其病最深

空青一錢一本用一銖　細莘　五味子　石決明研
車前子各一兩　知母　生地黃　防風各二兩
右爲細末煉蜜丸如桐子大每服十丸空心茶湯下

凉膽丸

治眼狀青色大小眥頭澀痛頻頻下淚口苦少飲食兼治黑花醫

黃連洗不見火　黃芩　荊芥　龍膽草各半兩
蘆薈　防風各一兩　黃蘗　地膚子各二錢半
右爲細末煉蜜和丸如梧子大每服二十丸食後薄荷湯送下

又方

治內障

川烏　地黃　白朮　茯苓　石決明　杏仁
川芎　菟絲子各三兩　當歸　防風　荊芥
蔓荊子各半兩
右爲末猪膽汁和丸如梧子大每服三十丸麥門冬湯下

除風湯

治五風變成內障頭旋偏腫痛瞳人結白者

羚羊角　車前子　芍藥　人參　茯苓　大黃
黃芩　芒硝各一兩
右爲末水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服

本事方

治內障

白羯羊肝只用子肝一片薄切新瓦上焙　熟地黃
兩半　菟絲子　蕤仁　澤瀉　防風　車前子
麥門冬　地膚子去殼　黃芩　細莘　白茯苓
五味子　杏仁炒　桂心炒　枸杞子　茺蔚子
苦葶藶　青葙子各一兩
右爲細末煉蜜丸如桐子大每服三四十丸溫湯下日三服不拘時候張臺卿嘗苦目暗京師醫者令灸肝俞遂轉不見物因得此方眼目遂明一男子內障醫治無效因以餘劑遺之一夕燈下語其家曰適偶有所見如隔門縫見火者及旦視之眼中醫膜俱裂如線張云此藥靈勿妄與人忽之則無驗予益信之且欲廣其傳也

羅漢應夢丸

治內障及因病赤眼食鹹物而得者

夜明沙淨　當歸　蟬蛻洗　木賊去節各等分
右爲末用羯羊子肝四兩水煮爛搗如泥入前藥末搗和丸如桐子大每服五十丸食後熟水下百日眼如故

神仙碧霞丹

治內障

當歸　沒藥各二錢　血竭　白丁香　硼砂
片腦　麝香各一錢　馬牙硝　乳香各半錢
黃連三錢　銅綠一兩半爲衣
右爲細末熬黃連膏和丸如雞頭實大每用新汲水半盞於磁盒內浸常用每一丸可洗四五日大病不過一月小病半月冷淚三日見效

遠志丸

清心明目益肝退醫

遠志水浸去心曬乾薑汁蘸焙　白蒺藜炒去刺
車前子　細莘各七錢半　全蠍五枚　茺蔚子
熟地黃洗焙　茯神去木　川芎　人參　琥珀
蘆薈研　生地　蔓荊子各半兩　蟬蛻一兩洗焙
右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服五十丸空心用米飲臨睡用菖蒲湯下

固本還睛丸

治遠年一切目疾內外醫膜遮睛風弦爛眼及老弱人目眵多糊迎風冷淚視物昏花等證

天門冬　麥門冬　生地黃　熟地黃各三兩
白茯苓　枸杞子　人參　山藥各一兩五錢
川牛膝　釵石斛　草決明　杏仁　白菊花
菟絲子酒煮焙　枳殼炒各一兩　羚羊角屑
烏犀角屑　青葙子　防風各八錢　五味子
甘草炙　蒺藜　川芎　黃連各七錢
右爲末煉蜜丸梧子大每服五十丸鹽湯下

還睛丸

治眼目昏醫

蟬蛻　蒼朮　熟地黃　川芎　蒺藜炒各一兩　羌活　防風　菟蔚子　木賊　白菊花　荊芥　蔓荊子　杏仁　菟絲子酒煮焙　石決明煅　蛇皮酒浸洗淨焙各五錢

右爲末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼薄茶下

仙朮散

治眼中腎膜

蛇皮用皂角水洗　木賊　蟬蛻　防風　羌活　蒺藜炒　穀精草　川芎　杏仁另研　甘草各二錢五分　蒼朮一兩二錢半

右爲細末每服一錢食後蜜湯下

蒙靈丸

治內外障眼

防風蜜炙　威靈仙　枸杞子　蒼朮米泔浸　蕤仁去殼　石決明水一升煮乾　蚌粉飛過　穀精草各一兩　菊花二兩

右爲細末用雄猪肝一具竹刀切去筋膜和藥搗千餘杵入麪少許共搗丸梧桐子大每服三十丸食後鹽湯下忌煎煿酢豆腐等毒物

五退還光丸

治內外障眼

蟬蛻炒　蛇蛻炒　猪前爪燒存性　草決明　刺蝟皮數炒去刺　蒼朮泔水浸炒乾　枳實　防風各一兩　蠶蛻半兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服二十丸茶清送下一日二服

空青丸

治肝腎久虛目暗漸生腎膜

空青研細水飛　眞珠研各二錢半　犀角屑　羚羊角屑　防風　防己　升麻各半兩　人參　麥門冬去心焙　菟蔚子　陽起石細研　前胡各一兩　虎睛一對

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服五丸加至十丸麥門冬煎湯送下溫椒湯亦得

蕤仁丸

治內外障眼

蕤仁三兩　車前子　黃連各二兩　青葙子浸黃芩　秦艽　生地　羚羊角末　防風各兩半　人參　天門冬焙　升麻　苦參炒　白菊花　地膚子　元參炒　羌活　決明子炒　地骨皮　甘草炙　丹砂各一兩二錢半　麥門冬去心焙七錢半

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服二十丸加至三十丸食後煎百合湯送下但有瞳人不拘內外腎並治之

觀音丸

治內外障失明或欲結青光內障或赤脈疼痛

血竭　熊膽研各二錢　人參　蟬蛻皂角水洗焙各半兩　地骨皮洗曬　木賊去節童便浸焙　蒼朮童便浸二宿曬　鷹爪黃連去鬚　威靈仙　蔓荊子　菟蔚子　蟬蛻洗曬　車前子　川芎　當歸　羌活　石決明煅半生各一兩　蠶蛻紙二十幅炒焦

右爲細末用羯羊肝一具去筋膜慢火煮半生半熟帶血性和藥同搗以粟米粉用肝汁煮糊丸如梧子大每服七八十丸食後溫米泔或石菖蒲湯送下

八子丸

治風毒氣眼腎膜遮睛不計久新及內外障眼

青葙子　車前子　五味子　枸杞子　地膚子　菟蔚子　決明子炒　覃蘼子炒　麥冬去心焙　細辛去苗　官桂去粗皮　生地黃焙　赤茯苓　澤瀉去土　防風去叉　黃芩去黑心各一兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸加至三十丸茶清送下溫米飲亦得日三

靈圓丹

治男子婦人攀睛腎膜痒澁羞明赤筋碧暈內外障瘀肉風赤眼

蒼朮米泔浸四兩　川芎　柴胡　羌活　獨活　白附子　遠志去心　甘菊花　石膏　青葙子　防風　全蠍　青皮　陳皮　荊芥　木賊去節　仙靈脾酥炙　楮實　黃芩　甘草各一兩

右爲細末水浸蒸餅丸如彈子大每服一丸食後細嚼荊芥湯或茶清送下日二服忌酒麪

磨腎丸

治眼生諸般腎膜大效

木賊　黃連　川芎　穀精草　當歸　白芷　赤芍藥　蟬蛻　荊芥　防風　羌活　大黃　獨活　黃芩　白菊花　生地　石膏煅　龍蛻　梔子　青葙子　蠶退　石決明煅　草決明　甘草　蔓荊子各等分

右爲末米糊丸桐子大每服三十丸食後茶清下

退翳丸

治一切翳膜

黃連一兩　白菊花　夜明沙　車前子　蟬蛻　連翹各五錢　蛇蛻一條炒

右爲末米泔煮猪肝丸如梧子大每服三十丸薄荷湯下

石決明散

治障膜

石決明煅　枸杞子　木賊　荆芥　晚桑葉　穀精草　粉草　金沸草　蛇蛻　蒼术　白菊花各等分

右爲末每服二錢茶清調食後服

韓相進靈丹

去內外障

防風　石決明　威靈仙　薏仁　蛤粉　蒼术　穀精草　枸杞子　甘草　菊花各一兩

右爲末用雄猪肝一具竹刀批開去膜擂極爛和藥爲丸如菜豆大每服三十丸鹽湯下

又方

治內外障有淚

羌活　甘草　蒼术　川芎　木賊　石決明　菊花　石膏　蒺藜　蛇蛻　旋覆花　蟬蛻　青葙子　楮實各等分

右爲細末煉蜜丸龍眼大食後茶清湯嚼下

甘菊湯

治內外障瞽一切眼疾　甘菊花　升麻　石決明研　旋覆花　芎藭　大黃炒各半兩　羌活去蘆　梔子仁　地骨皮　石膏碎　木賊炒　青葙子　車前子　荆芥穗　黃芩　防風去蘆　草決明炒　甘草炙各一兩　黃連去鬚二錢半

右剉碎每服三錢水一盞蜜少許同煎至七分去滓夜臥食後溫服

太陰元精石散

治內外障眼

甘草四兩　眞元精石一兩細研　蟬蛻洗去土　菊花去枝梗各一兩　石決明煅　羌活各半兩

右爲細末每服一錢食後麥門冬湯調下

猪肝散

治內外障瞽眼

夜明沙末二錢七

右用猪肝二兩批開以夜明沙末摻在肝內麻繩縛定用水一盞煮令肝轉白色取出爛嚼用煮肝湯送下食後服

蟬花散

治肝熱內搏上攻眼目瞽瞀遮睛赤腫疼痛昏暗視物不明隱澀難開多生眵淚內外障眼

蟬蛻洗淨去土　菊花去梗　穀精草洗去土　白蒺藜炒　防風不見火　羌活　蕤蒙花去枝草決明炒　黃芩去土　川芎不見火　蔓荆子　山梔子去皮　荆芥穗　木賊草　甘草炙各等分

右爲細末每服二錢用茶清調服或荆芥湯入茶少許調服亦可食後臨臥皆可服　開明散

治風毒氣眼朦瀛障膜

甘菊花去萼二兩　防風　羌活　蒺藜炒去刺　川芎　天麻　白茯苓　蒼术童便浸一宿焙　蟬蛻各半兩　荆芥穗　菟蔚子　華陰細辛　甘草炙各二錢半

右爲細末每服二錢食後鹽湯調服

草龍膽散

治上焦風熱毒氣攻衝眼目暴赤疼痛羞明多眵迎風有淚瞽瞶努肉攀睛

龍膽草　木賊　甘草炙　菊花　草決明微炒各二兩　香附子炒　川芎各四兩

右爲細末每服二錢用麥門冬熟水入砂糖少許同煎食後調服或米泔調服亦可

單服蒼术法

補下元明目治內外障

金州蒼术揀大塊刮令淨秤一斤分作四分一分用無灰好酒浸三日一分用米醋浸三日一分用童便浸三日一日兩換一分用米泔浸五日一日一換

右浸日數足漉出更不淘洗切作片或曬或焙乾入黑芝麻三四兩同入銼上炒令甘香搗爲細末以前浸藥餘酒煮糊爲丸如桐子大若酒少入醋些少丸每服四五十丸白湯或酒送下

點眼金絲膏

治男婦目疾遠年近日瞽膜遮睛攣毛倒睫黑花爛弦迎風冷淚及赤眼腫痛努肉攀睛

硇砂研　晉礬研　青鹽研各一錢　乳香細研

片腦研各二錢　當歸劑淨洗　黃丹研各半兩
黃連一兩
右用好蜜四兩除片腦外和七味內入青竹筒內油單紙裹筒口五七重緊繫定入湯瓶中文武火煮一週時取出劈破新綿濾去藥滓方下片腦和勻磁瓶收貯再用油單紙五七重封繫瓶口埋露地內去火毒候半月取出每用粟米大點眼

龍腦膏

治遠年近日醫膜遮障攀睛瘀血連眶赤爛視物昏暗隱澀多淚等證

爐甘石揀粉紅梅花色佳用乾鍋子盛煅七次入黃連水淬七次　黃連搥碎水浸一宿去滓將煅紅爐甘石淬七次同黃連水細研飛過候澄下去上面水暴乾再用乳鉢研極細羅過用三錢　龍腦草洗淨日乾不見火研末一錢　桑柴皮羅過二錢　黃丹羅過半錢

右同白蜜四兩一處入在黑磁器內文武火慢熬以竹篦子攪如漆色不粘手爲度切勿犯生水仍不用鐵器熬藥藥成依舊以磁器盛頓每用如皂子大新冷水半盞化開先三日不用每日洗數次無妨藥盡須用紙蓋不可犯塵灰截赤眼極效

散血膏

治赤腫不能開睛痛熱淚如雨

紫金皮　白芷　大黃　薑黃　南星　大柏皮
赤小豆　寒水石
右爲細末生地黃汁調成膏敷眼四圍

清涼膏

生南星　薄荷葉各半兩　荊芥　百藥煎各二錢
右爲末井水調成膏貼眼角上自然清涼

洗眼方

治昏膜止疼去風

滑石少許　秦皮　杏仁　黃連　甘草　防風
當歸鬚各等分
右爲末水一盞煎至半盞去滓時時帶溫洗

又方

治前證

黃連　黃芩　黃蘗三味各等分　銅綠半斤
爐甘石一斤
右將後二味同碾細末羅過將前三味濃煎調末爲丸臨時用冷水浸開洗之

羌活除腎湯 東垣下同

治太陽寒水腎膜遮睛不能視物

麻黃根二錢半　薄荷二錢　生地黃酒洗一錢
當歸根　川芎各三錢　黃蘗四錢　知母五錢酒製　荊芥穗七錢煎成方入　藁本七錢　防風一兩　羌活一兩半　川椒五分　細辛少許
右㕮咀每服三錢水三大盞煎至一盞半入荊芥穗再煎至一盞去滓食後稍熱服忌酒濕麪

撥雲湯

治足太陽膀胱爲命門相火煎熬逆行上眼皮下出黑白腎隱澀難開而無疼痛此欲作寒水腎及寒膜遮睛外證呵欠善悲健忘噯噫時自淚下面赤而白能食不大便小便數而欠氣上而喘一服神效

細辛葉　蕎根　川芎各五分　生薑　甘草梢
川升麻　藁本　知母　當歸身　荊芥各一錢
防風　羌活　黃蘗各錢半　黃芪　柴胡各七分
水二大盞煎至一盞稍熱服食後

流氣飲 和劑

治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗視物不明常見黑花當風多淚怕日羞明堆睛赤腫隱澀難開或生障翳倒睫拳毛眼弦赤爛及婦人血風眼及時行暴赤腫眼泡紫黑癰作眼病並宜服之

大黃煨　川芎　甘菊花　牛蒡子炒　細辛
防風　山梔　白蒺藜炒去刺　黃芩　蔓荊子
荊芥　木賊　甘草炙　元參各一兩　草決明一兩半　蒼术米泔浸一宿三兩
右搗羅爲末每服二錢半臨臥時用冷酒調下小兒有患只令乳母服之

撥雲散 資壽

治因眼發溫熱不退而作腎膜遮睛昏暗羞明隱澀難開

川芎　龍腦草　楮實　薄荷　羌活　荊芥穗
石決明　草決明　蒼术　大黃　甘草　連翹
木賊草　蕤蒙花　川椒　甘菊花　地骨皮
桔梗　石膏　白芷　白蒺藜　檳榔各一兩
石燕一對
右搗羅細末每服二錢溫茶清一盞調下食後日三服忌雜魚鳥諸肉

神仙退雲丸 東垣

治一切腎臟內外障昏無睛者

川芎　當歸各一兩半　犀角酒洗　川楝子　蟬蛻洗　薄荷不見火　甘菊花各半兩　枳實　瓜蔞仁生者六錢　蛇退　薔薇花　荊芥穗各二錢此三味同甘草焙乾去甘草不用　地骨皮洗　白蒺藜微炒去刺　生地黃酒洗焙乾　羌活各一錢　川木賊一兩半去節童便浸一宿焙乾

右爲細末煉蜜和丸每一兩作十丸米泔湯調服日進二三丸食後婦人當歸湯下有氣者木香湯下使之在人消息

本事方

治諸眼患因熱病後毒氣攻眼生翳膜遮障服此藥逐旋消退不犯刀針

青葙子　防風　根殼各一兩　羌蔚子　細辛　黃連各半兩　枸杞子　澤瀉　生地黃　石決明各一兩半　車前子　當歸　麥門冬去心各二兩

右各如法修事焙乾爲末煉蜜丸如梧子大每服三十丸飯飲吞下忌一切熱毒物

羌活退翳湯

治前證

羌活　五味子　黃連　升麻　當歸身各二錢　石膏二錢半　黃芩　黃蘗酒炒　龍膽草酒洗　白芍藥　甘草各五錢　柴胡　黃芪製各三錢　防風一錢半

右剉細分作二服水二盞煎至一盞入酒少許去渣臨臥熱服忌言語

又方

治前證

川芎　羌活　旋覆花　防風各二兩　甘草生　蒼术米泔浸一宿去皮日乾不可見火　楮實　楮葉並八月採陰乾各一兩　甘菊花　枳實　蟬蛻　木賊各二錢半

右木臼中杵爲末茶清調下二錢早食後臨臥各一服治暴赤眼忌濕麪及酒楮實須眞無實者取葉不爾諸藥無效合時不得焙及犯鐵器予觀此方取楮葉必無實者蓋陰陽二合相匹配耳有實者陽也無實取葉者陰也所以不得眞楮實者悉無效

補陽湯東垣

治前證

柴胡二兩　獨活　甘草梢　熟地黃　人參　黃芪一本作黃芩　羌活　白术各一兩　白芍藥　澤瀉　防風　陳皮去白各半兩　當歸身酒製　生地炒　白茯苓　知母炒黃各三錢　肉桂一錢

右爲粗末每服半兩水二盞煎至一盞去滓溫服空心使藥力行盡方許食

連蘗益陰丸

治前證

羌活　獨活　甘草根炒　當歸身酒製　防風　五味子各半兩　石決明燒存性五錢　黃連酒洗或拌劑炒　草決明　黃芩　黃蘗　知母各一兩

右爲細末煉蜜爲丸如菜豆大每服五十丸漸加至百丸爲止臨臥清茶送下常以助陽湯多服少服此藥一則妨飲食二則力大如升陽湯不可多服

升陽泄陰丸

一名升陽柴胡湯治前證

羌活　獨活　甘草根炒　當歸身去蘆酒洗　白芍藥　熟地黃各一兩　人參去蘆　黃芪　生地黃酒洗炒　白术土炒　楮實酒炒各半兩　肉桂半錢　知母酒炒如大暑加一錢　白茯苓　澤瀉　陳皮　防風各三錢　柴胡去苗一錢半

右咬咀每服五錢水煎熱服另合一料煉蜜丸如桐子大食遠茶清送下每日五十丸與前藥各一服不可飽服如天氣熱甚加五味子二錢或半兩天門冬去心半兩楮實亦加半兩右上三方合治一證空心補陽湯臨臥連蘗丸食遠升陽泄陰丸

通脾瀉胃湯

治前證

防風　大黃　元參　知母各一兩　天門冬　黃芩各一兩半　麥門冬　羌蔚子各二兩　每服五錢水一盞煎五分去滓食遠溫服

神消散

治眼內黃膜上衝赤膜下垂

黃芩　蟬退　甘草　木賊各五錢　穀精草　蒼术各一兩　龍退三條炒

右爲末每服二錢夜臥冷水調下

皂角丸

治內外一切障膜此藥能消膜退翳如十六般內障同生熟地黃丸用之神效

龍退七條　蟬退　元精石　穿山甲炒　當歸　白术　白茯　穀精草　木賊各一兩　白菊花

刺蝟皮蛤粉炒　龍膽草　赤芍　連翹各兩半
猬猪爪三十枚蛤粉炒　人參　川芎各半兩
右末一半入猪牙皂角二挺燒灰和勻煉蜜丸桐子大每服三十丸空心食前杏仁湯下一半入仙靈脾一兩爲末和勻每服用猪肝夾藥煮熟細嚼及用原汁送下日三

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百六十六卷目錄

醫部彙考一百四十六

目門九

方三

菩薩膏　治內外障

滴乳香　硼砂各二錢　片腦半錢　白蜜一兩

熟仁四十九粒去皮熬　蕪荑四十九粒

右先將蕪荑熟仁研去油入諸藥再研取沙蜜於

立應散　又方　日精月華光明膏　菩薩膏　蛤粉丸　滴乳丸　金粟膏　真珠散　夜明丸　元參湯　排風散　連翹飲子　木賊散　菊花散　用巧丸　白蒺藜散　止淚散　內消散　又方　明目地黃丸　地黃丸　益本滋腎丸　石決明丸　三仁五子丸　決明丸　磁石丸　白朮散　補肝丸　補腎丸　補肝湯　留氣丸　補腎丸　白朮羊肝丸　石決明丸　三仁五子丸　羚羊角丸　決明丸　磁石

或昏花澁緊作痛畏明或卒見非常之處等證其功效與六味還少丹相似

五味子　麥門冬　枸杞子　熟地黃　肉蓯蓉
山萸　山藥　當歸　甘菊花　巴戟肉各等分

右爲末煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心白湯下

補肝散千金

治目失明

青羊肝一具去膜薄切以新瓦瓶入肝於中炭火炙之爲極細末　蔓子一合熬令香

右爲末食後服方寸匕日二加至三匕不過一二劑能一歲可夜讀細書

養肝丸錢氏生

治肝血不足眼目昏花或生眵淚

當歸酒洗　車前子酒蒸焙　防風去蘆　川芎
白芍藥　蒺藜子另研　熟地酒蒸焙　枳實各等分

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服七十丸熟水送下不拘時一方無川芎枳實

地黃丸

治用力勞心肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸生翳膜兼肝腎風毒熱氣上衝目痛久視傷血血主肝故勤書則傷肝而目昏肝傷則木生風而熱氣上湊目昏亦盛不宜專服補藥當益血鎮肝而目自明矣

熟地黃一兩半　甘菊花　防風　硃砂　羌活
桂心　沒藥各半兩　決明子　黃連各一兩

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服三十丸食後熟水下日三一名菊花丸

補肝湯

治肝虛兩脅滿痛筋脈拘急不得喘息眼目昏暗面多青色

防風　細辛　柏子仁　白茯苓　官桂　山萸
蔓荊子　桃仁去皮尖雙仁炒　甘草微炒各等分

右㕮咀每服五錢水一盞半大棗二枚劈破同煎至八分溫服無時日再

雷翁丸

治男婦肝經不足風邪內乘上攻眼睛淚出羞明怕日多見黑花腎膜遮睛瞼生風粟或痒或痛隱澁難開兼久患偏正頭風牽引兩目漸覺細小視物不明皆因腎水不能既濟肝木此藥久服大補腎臟添目力

枸杞子　菊花各二兩　肉蓯蓉　牛膝　巴戟酒浸一宿去皮心各一兩　川椒三兩去目　黑附子以青鹽二錢汁水三升同煮水盡去皮臍

右爲細末浸藥酒煮麵糊和丸梧子大每服十丸空心酒送下

補肝丸

治眼昏暗將成內障

菟爵子　青葙子　枸杞子　五味子　決明子
杏仁　茯苓各一兩　地黃三兩　菟絲子二兩
山藥　車前子　地骨皮焙　柏子仁　大黃
黃芩　黃連　人參　細辛　防風　甘草炙各一兩半

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服二十丸加至三十九食後米飲下

石決明丸

治前證

石決明　槐子　肉蓯蓉酒浸一宿去鱗甲炙乾
菟絲子酒浸三日曝乾另研爲末　陽起石酒煮七日細研水飛過　熟地黃各一兩　桂心半兩

磁石一兩半火煅酢淬七次細研水飛過

右爲細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧子大每服二十丸旋加至三十丸食前鹽湯下

益本滋腎丸

治前證

黃蘗　知母俱酒洗炒各等分

右爲極細末滴水丸如桐子大每服一百五十丸空心熱湯下服後以乾物壓之

補腎丸

治腎氣不足眼目昏暗瞳人不明漸成內障

磁石煅酢淬七次水飛過二兩　石斛去根一兩
菟絲子酒蒸二次二兩　五味子　熟地黃酒蒸
枸杞子　覆盆子酒浸　楮實子　車前子酒蒸
肉蓯蓉酒浸焙各一兩　沉香　青鹽二味另研各半兩

右爲末煉蜜丸如桐子大每服七十丸空心鹽湯下

羚羊羌活湯

治肝腎俱虛眼見黑花或作蠅翅

羚羊角屑　羌活　黃芩　附子去皮臍　人參
澤瀉　秦艽　山茱萸　車前子　決明子微炒

青箱子　柴胡各兩半　黃芪二兩　甘草炙一兩
每服五錢水一盞半煎至八分去滓不拘時溫服
日再

石決明丸

治肝虛血弱日久昏暗
知母焙　山藥　熟地黃焙　細辛各一兩半
石決明　五味子　菟絲子酒浸一宿另搗爲末各
一兩
右爲細末煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心米
飲送下

駐景丸

治肝腎虛眼昏瞖
熟地黃　車前子各二兩　菟絲子酒蒸五兩
右爲末煉蜜丸桐子大每服五十丸食前白茯苓
石菖蒲湯任下又方加枸杞子一兩半尤佳

白附子散

治發散初起黑花昏瞖內障
荊芥　白菊花　防風　木賊　白附子　粉草
蒼朮　人參　羌活　蒺藜
右水煎食後服

補腎磁石丸

治腎肝氣虛上攻眼目昏暗遠視不明時見黑花
漸成內障
磁石火煅紅酢淬　甘菊花　石決明　肉蓯蓉酒
浸切焙　菟絲子酒浸一宿慢火焙乾各一兩
右爲細末用雄雀十五隻去毛嘴足爾肚腸以青
鹽二兩水三升同煮令雄雀爛水欲盡爲度取出
先搗如膏和藥末爲丸如梧子大每服二十丸空
心溫酒送下

三仁五子丸

治肝腎不足體弱眼昏內障生花不計近遠
柏子仁　薏苡仁　酸棗仁　五味子　菟絲子酒
製　枸杞子酒蒸　覆盆子酒浸　車前子酒浸
肉蓯蓉　熟地黃　白茯苓　當歸　沉香各等分
右爲細末煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心用
鹽酒送下

羚羊角散

治肝臟實熱眼目昏暗時多熱淚
羚羊角鎊　羌活　元參　車前子　瓜蔞仁
黃芩　山梔仁各半兩　細辛二錢半　胡黃連
菊花各七錢半
右爲細末食後竹葉煎湯調服二錢

薏仁丸

治眼見黑花飛蠅澀痛昏暗漸變青盲
薏仁去皮　地膚子　細辛　地骨皮　人參
石決明洗淨別搗羅　白茯苓　白朮各二兩
熟地黃焙　楮實各三兩　空青另研　防風各一
兩半　青羊膽一枚　石膽研如粉半兩　鯉魚膽
五枚
右爲細末研勻以膽汁同煉蜜搜和丸如桐子大
每服二十丸食後米飲送下

摩頂膏

治肝腎虛風上攻眼生黑花或如水浪
空青研　青鹽研各半兩　槐子　木香　附子各
一兩　牛酥二兩　旱蓮草自然汁一升　鵝脂四
兩　龍腦半錢　丹砂二錢半研
右爲細末先以旱蓮草汁牛酥鵝脂銀器中熬三
五沸下諸藥末煎減一半即止盛磁器中臨臥用
舊鐵鐵一片重二三兩蘸藥於頂上摩二十徧令
入髮數中次服決明丸忌鐵器

又方

治眼前見花黃黑紅白不定
附子炮裂去皮臍　木香各一兩　朱砂二錢半
龍腦半錢　青鹽一兩半　牛酥二兩　鵝脂四兩
右將前藥爲末同酥脂以慢火熬成膏每用少許
不拘時頂上摩之

決明丸

治眼見黑花不散
決明子　甘菊花各一兩　防風去蘆　車前子
苜蓿　細辛　梔子仁　蔓荊子　元參　薯蕷
白茯苓各半兩　生地黃七錢半
右爲細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧子大每服
二十丸食後煎桑枝湯送下日三

白龍粉

治腎水衰虛肝經邪熱視物不明或生障腎努肉
攀睛或迎風淚出眼見黑花或如蠅飛或如油星
或睛澀腫痛或痒不可忍並皆治之
硝三斗
右於二九月造一大罐入硝熟水化開以綿濾過
入銀器或石器內煎至一半已上就鍋內放溫傾
銀盆內於露地放一宿次日結成塊子於別水內

洗淨再用小罐熬水化開熬入蘿蔔二箇切作片子同煮以蘿蔔熟爲度傾在磁器內撈去蘿蔔不用於露地露一宿次日結成塊子去水於日中曬一日去盡水入好紙袋盛放於透風日處挂曬至風化開成用逐旋於乳鉢內研極細點眼如常法亦名元明粉

羚肝散

治眼生黑花漸成內障及翳睛偏視風毒攻眼腫痛澁痒短視倒睫雀目

羌活　獨活　青箱子　甘菊花各一兩

右爲細末每服三錢七羊子肝一葉剖細淡竹葉數片同裹如粽子別用雄黑豆四十九粒米泔一椀銀石器內同煮黑豆爛泔乾爲度取肝細嚼溫酒下又將豆食盡空心日午夜臥服

服椒方

治肝腎虛風上攻眼目生黑花頭目不利能通神延年

川椒一斤揀淨去目及合口者

右於銚內炒令透於地上鋪淨紙二重用新盆合定周迴用黃土培之半日去毒出汗然後取之曝乾爲度只取椒於磁盒子內收每日空心新汲水下十粒

芎藭散

治目暈昏澁視物不明

芎藭　地骨皮　荆芥　何首烏去黑皮　菊花　旋覆花　草決明　石決明　甘草炙各一兩　青箱子　蟬蛻去土　木賊各半兩　白芷二錢半

右爲細末每服一錢七食後米泔水調下

磁石丸

治眼因患後起早元氣虛弱目無腎膜視物昏暗欲成內障

磁石二兩煅酢淬七次搗碎細研水飛　菟絲子酒浸五日曝乾別研爲末三兩　肉蓯蓉酒浸一宿刮去皴皮炙乾　補骨脂微炒　巴戟去心　石斛　遠志去心　熟地黃各一兩　木香　五味子　甘草炙赤　桂心各半兩

右爲細末研勻煉蜜和搗二三百杵丸如梧子大每服三十丸食前溫酒送下一方有扶神無遠志石斛

四物五子丸

治心腎不足眼目昏暗

當歸酒浸　川芎　熟地黃　白芍藥　枸杞子　覆盆子　地膚子　菟絲子酒浸炒　車前子酒蒸量虛實加減各等分

右爲細末煉蜜和丸如桐子大每服五十丸不拘時鹽湯送下

杞菊丸

治男子腎臟虛耗水不上升眼目昏暗遠視不明漸成內障

枸杞子四兩酒蒸　茯苓八兩去皮　當歸二兩　菟絲子四兩酒浸蒸　青鹽一兩另研

右爲細末煉蜜和丸如桐子大每服七十丸食前用白湯送下

瑞竹四神丸

治腎經虛損眼目昏花補虛益損及雲腎遮睛甘州枸杞子一斤揀色赤滋潤者以酒一杯洞之分作四分一分同川椒一兩炒一分同小茴香一兩炒一分同芝麻一合炒一分獨炒

右炒過將川椒等篩去不用再加熟地黃白术白茯苓各一兩共爲細末煉蜜和丸如梧子大每服五七十丸空心溫酒送下或加甘菊花一兩

夜光丸

一名雙美丸治眼目昏暗及諸疾兼退腎膜

蜀椒去目并合口者炒出汗一斤半搗末一斤甘菊花取末一斤

右和勻取肥地黃十五斤切搗研絞取汁八九升許將前藥末拌浸令勻曝稍乾入盤中攤曝三四日內取乾候得所卽止勿令太燥入煉蜜二斤同搗數千杵丸如梧桐子大每服三十丸空心日午熟水下久服目能夜視髮白再黑還神強志延年益壽一方用熟地黃二兩酒浸九蒸九曝食後細嚼新漸米十粒以湯送下或茶下亦得

薔蘼花散

治冷淚昏暗

薔蘼花　甘菊花　白蒺藜　石決明　白芍藥　木賊去節　甘草炙各等分

右爲細末每服一錢茶清調下服半月後加至二錢局方有羌活無芍藥甘草治風氣攻注昏腫者還睛補肝丸

治肝虛兩目昏暗衝風淚下

白术　細辛去苗　芎藭　決明子微炒　人參

羌活去蘆　當歸切焙　白茯苓去皮　苦參
防風去叉　官桂去粗皮　地骨皮　五味子
元參　黃芩去黑心　車前子微炒　青葙子
菊花　甘草炙各等分
右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服三十丸加至四十丸不拘時米飲下

補肝丸

治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗痒痛隱澁難開多眵酒淚怕日羞明時發腫赤或生翳障
遠志去心　地膚子　菟蔚子　白茯苓去皮
防風去蘆　決明子　蔓荊子　人參各一兩
山藥　青葙子　柴胡去苗　柏子仁炒　元參
地骨皮　甘草炙　車前子　細辛去苗　甘菊花
各半兩
右爲細末蜜水煮糊丸如桐子大每服三十丸食後用米湯下日三

眞珠煎

治肝虛寒目瞤瞤不見物
眞珠二錢半細研　鯉魚膽二枚　白蜜二兩
右合和銅器中微火煎取一半新綿濾過磁瓶中盛每以銅筯點如黍米著目眥卽淚出頻點取瘥

金絲膏

治一切目疾昏暗如紗羅所遮或疼痛
宣黃連半兩剉碎水一盞浸一宿取汁再添水半盞浸澤經半日絞取汁與前汁放一處澤別用水半盞浸　蜜一兩　白礬一字　井鹽一分如無以青鹽代之
山梔子好者二錢搥碎與黃連澤同煮五七十沸取盡力沫濾去澤與前黃連汁一處入餘藥
右用銀磁器內熬十餘沸用生絹上鋪細紙數重再濾過用時常點

蛤粉丸

治雀目日落不見物
蛤粉細研　黃蠟等分
右鎔蠟搜粉爲丸如棗大每用猪肝一片二兩許批開裹藥一丸麻繰纏入罐內水一椀煮熟傾出乘熱熏目至溫喫肝以愈爲度

瀉肺飲

治肝虛雀目恐變成內障
防風　黃芩　桔梗炒　芍藥　大黃炒各一兩
右剉碎每服三錢匕水一盞半煎至一盞入芒硝半字去澤放溫食後臨臥服

猪肝散

治雀目
蛤粉　黃丹　夜明沙各等分
右末猪肝切開入藥末用線縈米泔水煮熟不拘時喂服原汁送下

夜明丸

治雀目青盲
夜明沙　木賊去節　防風　田螺殼　青木香
細辛各等分
右爲末爛煮猪肝用末藥於淨沙盆內研令極勻丸如桐子大每服三十丸米飲或酒下

轉光丸

治肝虛雀目青盲
生地黃　白茯苓　川芎　蔓荊子　熟地黃
防風　山藥　白菊花　細辛各等分
右爲末煉蜜和丸如梧子大每服二十丸空心桑白皮湯送下

瀉膽散

治瞳人乾缺外障神水將枯
元參　黃芩　地骨皮　麥門冬　知母各一兩
黃芪　菟蔚子各一兩半
每服五錢水一盞煎五分去澤食後溫服

天門冬飲子

治轆轤轉關
天門冬　菟蔚子　知母各二兩　五味子　防風
各一兩　人參　茯苓　羌活各一兩半
每服五錢水一盞煎五分去澤食後溫服

元參瀉肝散

麥冬二兩　大黃　黃芩　細辛　芒硝各一兩
元參　桔梗各一兩半
右水煎食後服

青黛散

治眼倒睫神效
槐樹上黃直棘針　刺蝟皮炒焦　白芷　青黛各等分
右爲細末口噙水左眼倒睫左鼻內嗑之右眼倒睫右鼻內嗑之

四退散

治倒睫拳毛
蟬退　蛇退酢煮　猪蹄退炒　蠶退　荊芥各二

錢半　川烏炮　穿山甲燒　粉草各半兩
右爲末每服一錢淡鹽湯調下一方加防風石決明草決明各五錢

起睛膏

治前證

木鼈子去殼一錢　自然銅五分製
右搗爛爲條子嗤鼻又以石燕末入片腦少許研水調敷眼弦上

連翹飲子

治目中濡火惡日與火隱澀小角緊久視昏花迎風有淚

連翹　當歸　紅葵花　薤荊　人參　甘草生　生地黃各三分　柴胡二分　黃芩酒製　黃芪　防風　羌活各半錢　升麻一錢
右剉每服五錢水二盞煎至一盞去滓食後稍熱服

排風散

治兩瞼粘睛外障

天麻　桔梗　防風各二兩　五味子　烏蛇　細辛　芎藭　乾蠍各一兩
右爲細末每服一錢食後米飲調下

龍膽丸

治眼兩胞粘睛赤爛成瘡

苦參　龍膽草　牛蒡子各等分
右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九食後米泔下

菊花通聖散

治兩瞼潰爛或生風粟　白菊花兩半　滑石三兩　石膏　黃芩　甘草　桔梗　牙硝　黃連　羌活各一兩　赤芍藥　防風　川芎　當歸　大黃　薄荷　白蒺藜　連翹　麻黃　芒硝各半兩　荊芥　山梔子各二錢半
右㕮咀每服三錢水一盞半生薑三片同煎七分食後服

柴胡散

治眼眶澀爛因風而作用氣藥燥之　柴胡　羌活　防風　赤芍藥　桔梗　荊芥　生地黃　甘草
右水煎服

黃連散

治眼爛弦風　黃連　防風　荊芥　赤芍　五倍子　蔓荊子　覆盆子根（即懸勾根）
右煎沸入鹽少許濾淨又入輕粉末少許和勻洗眼亦效

爐甘石散

治爛風眼

爐甘石不拘多少
右先用童便煅淬七次次用黃連濃煎汁煅淬七次再用穀雨前茶芽濃煎煅淬七次又併三汁餘者合一處再煅淬三次然後安放地上一宿出火氣細細研入冰片麝香點上神妙煅時須用好紫銷炭極大者鑿一穴以安爐甘石

當歸飲子

治目淚不止　滑石半兩　當歸　大黃　柴胡　人參　黃芩　甘草　芍藥各一兩
右剉細每服三錢至五錢水一盞生薑三片同煎七分去滓溫服

枸杞酒

治肝虛當風眼淚

枸杞最肥者二升
右搗破內絹袋置罐中以酒一斗浸訖盛封勿洩氣候三七日每日取飲之勿醉

二妙散

養肝氣治目昏視物不明淚下　當歸　熟地黃各等分
右爲細末每服二錢匕不拘時無灰酒調下

洗肝湯

治肝實眼　人參　黃芩　赤茯苓　芎藭　山梔仁　柴胡　地骨皮　甘菊花　桔梗炒各一兩　黃連去鬚　甘草炙各半兩
右㕮咀每服三錢水一盞入苦竹葉七片煎至七分去滓食後服

瀉肝湯

治目熱淚生糞者脾肝受熱故也　桑白皮一兩　地骨皮二兩　甘草五錢炒
右㕮咀每服三錢白水煎食後服

木賊散

治眼出冷淚實則用此
木賊　蒼术　蒺藜　防風　羌活　川芎　甘草
右水煎服
決明子方
治肝經熱止淚明目治風赤眼
決明子　按令淨
右每朝一匙空心水吞下百日見夜光一方取決明作菜食之
羌活散
治目風冷淚久不瘥
羌活去蘆二兩　木香　官桂去粗皮　胡黃連
山藥　升麻　艾葉焙各一兩　牛膝酒浸切焙
山茱萸去核　白附子炮各七錢半
右剉每服三錢水一盞煎至八分去滓食後溫服日三
羌活散
治風氣攻眼昏澁多淚
羌活　川芎　天麻　旋覆花　藁本　防風
蟬蛻洗　甘菊花　細辛　杏仁去皮各一兩
炙甘草半兩
右爲細末每服二錢新水一盞半煎食後服
菊花散
治目風淚出
蒼术四兩肥者用銀石器入皂莢一寸河水煮一日去皂莢取术銅刀刮去黑皮曝乾取三兩　菊花
木賊新者　草決明洗曝乾　荊芥穗　旋覆花
甘草炙各一兩　蟬蛻洗焙七錢半　蛇蛻洗炙二錢半
右爲細末用不津器盛每服一錢臘茶半錢同點
空心臨臥時服
蟬蛻餅子
治目風冷淚去腎暈
蟬蛻洗焙　木賊新者　甘菊花各一兩　芎藭
荊芥穗各二兩　蒼术泔浸焙三兩　甘草炙半兩
右爲細末煉蜜和捏作餅子如錢大每服一餅食後細嚼臘茶送下日三
阿膠散
治目有冷淚流而不結者肝經受風冷故也
阿膠　馬兜鈴各兩半　紫菀　款冬花各一兩
甘草半兩　白蒺藜二錢半炒　糯米一兩
右咬咀每服二錢水一盞半煎八分溫服不拘時候
本事方
治頭風冷淚
甘菊花　決明子各二錢　白术　羌活　川芎
細辛　白芷　荊芥穗各半兩
右爲細末每服一錢食後溫湯調下日三
又方
治前證
川芎　甘菊　細辛　白芷　白术各等分
右爲末蠟丸如黍米大夜臥服一九日中一時辰
換一九二方馬安常傳
川芎丸
治風盛隔塞鼻塞清涕熱氣攻眼下淚多聚齒間緊急作頭痛
川芎　柴胡各一兩　半夏麴　甘草炙　甘菊
人參　前胡　防風各半兩
右每服四錢水一盞生薑四片薄荷五葉同煎七分去查溫服
銀海止淚方
蒼术米泔浸一兩半　木賊去節二兩　香附子炒去毛
右爲末煉蜜丸如桐子大食後鹽湯下三九
治冷淚方
夏枯草　香附子各等分
右爲細末麥門冬湯調下
立應散
治冷淚
樑斗子一箇　甘草三錢
右爲細末每服二錢熟水調下
楮實散
治冷淚
楮實子炒　夏枯草　甘草各半兩　香附子炒
夏桑葉各一兩
右爲細末熟水調服不拘時
白殭蠶散
治衝風淚出
殭蠶炒　粉草　細辛　旋覆花　木賊各五錢
荊芥二錢半　嫩桑葉一兩
右水煎食後溫服
真珠散

治肝虛目風淚出
眞珠研　丹砂研各三分　乾薑研二分　貝齒五枚以炭火煅爲細末
右研極細令勻以熟絹帛羅三遍每仰臥以少許點眼中合眼少時
乳汁煎
治風淚澁痒
人乳一升　黃連去鬚研取末七錢半　粳仁研爛一兩　乾薑炮爲末二錢半
右除乳外再同研極細以乳漬一宿明旦內銅器中微火煎取三合綿濾去滓每以黍米大點眥中勿當風點
止淚散
治風眼流淚不止
鑪甘石一錢　海螵蛸三分　片腦五釐
右研細點眼大眥頭目井口淚自收二藥燥要加腦和則不澁也
麝香散
治眼冷淚不止
香附子　川椒目各等分　蒼朮　麝香各少許
右爲細末吹鼻中
消毒飲
治瞼生風粒目瘡疣
大黃　荊芥　牛蒡子　甘草
右水煎食後溫服
五花丸
治漏睛膿出目停風熱在胞中結聚膿汁和淚相雜常流涎水久而不治至烏珠墜落
金沸草四兩　巴戟三兩　川椒皮　枸杞子
白菊花各二兩
右末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸空心鹽酒下
白薇丸
治漏睛膿出
白薇五錢　防風　蒺藜　石榴皮　羌活各三錢
右末米粉糊丸梧子大每服二十丸白湯下
又方
治眼膿漏不止
黃芪　防風　大黃　黃芩各三兩　遠志去心
人參　地骨皮　赤茯苓　蒲黃各二兩
右每服五錢水煎食後服
加味四物湯
治打損眼目
當歸　川芎　白芍　熟地　防風　荊芥各等分
右㕮咀爲散每服三錢水一盞半煎至一盞再入生地黃汁少許去滓溫服再以生地黃一兩杏仁二十枚去皮尖研細用綿子裹藥敷在眼上令乾再將瘦猪肉薄切貼於眼上再服局方黑神散
局方黑神散
蒲黃　熟地黃　肉桂　當歸　赤芍藥　白蘞
甘草各等分
右爲末童子小便生地黃汁相和調服
內消散
治傷損眼
羌活　獨活　蘇木　紅內消　當歸　川芎
大黃　釣藤　白芷　紅花　桃仁　甘草節
赤芍藥　生地黃　瓜蔞根　紫荊皮　金鎖匙
血竭草
右水煎食後服次用生地黃一兩杏仁五十枚搗爛貼眼上夜以瘦猪肉貼之
又方
治前證
羌活　獨活　紅內消　蘇木　赤芍藥　釣藤
白芷各五錢　甘草節三錢　地榆　花粉各四錢
右㕮咀每服三錢白水煎食後服
經效散
治撞刺生瞖
大黃　當歸　芍藥各半兩　粉甘草　連翹各二錢半　北柴胡一兩　犀角一錢
右水煎食後服
一線散
治打撲傷損眼胞赤腫疼痛
芙蓉葉　生地黃各等分
右搗爛敷眼胞上或爲末以雞子清調勻敷之
又方
治目被物刺損有瞖
生地黃　生薄荷　生巨蕖　生王當歸　砂硝
右不拘多少研爛貼太陽兩穴
前胡犀角湯
治傷寒兩目昏暗或生浮瞖
前胡去蘆　犀角屑　蔓荊子　青葙子　菊花
防風去叉　梔子仁　麥門冬去心　生地黃焙

羌活去蘆　決明子微炒　車前子微炒　細莘
甘草炙各一兩　黃芪一兩半
右剉每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後溫
服

茺蔚子丸
治時氣後目暗及有瞖膜
茺蔚子　澤瀉各一兩半　枸杞子　青葙子
枳殼去瓤麩炒　生地黃焙各一兩　石決明
麥門冬去心焙　細莘　車前子各二兩　黃連去
鬚三兩
右爲細末煉蜜丸梧子大每服三十丸食後漿水
送下

瀉肝散
治天行後赤眼外障
知母　黃芩　桔梗各一兩半　茺蔚子　大黃
元參　羌活　細莘各一兩
右剉每服五錢水一盞半煎至五分去滓食後溫
服

七寶散
治風眼除瘀熱
當歸　芍藥　黃連　銅綠各二錢細研　白礬
甘草各一錢　杏仁七粒去皮
右㕮咀以水同放磁盞內於鍋中頓煎至八分去
滓澄清臨臥洗之

撥雲散
治男婦風毒上攻眼目昏暗瞖膜遮障羞明熱淚
隱澀難開眶痒赤痛瞼眥紅爛瘀肉侵睛

羌活　防風　柴胡　甘草炒各一兩
右爲細末每服二錢水一盞半煎至七分食後薄
荷茶清調服菊花湯調亦可忌醃魚鮓鹽醬濕麪
炙煿發風等毒物

蟬殼散
治眼目風腫及生瞖膜等疾
蟬殼　地骨皮　黃連去鬚　白朮　牡丹皮
蒼朮米泔浸切焙　菊花各一兩　龍膽草半兩
甜瓜子半升
右爲細末每服一錢荊芥煎湯調下食後臨臥各
一服大治時疾後餘毒上攻眼目甚效忌熱麪炒
豆酢醬等

曾青散 扇方
治怕日羞明隱澀眵淚或痒或痛
曾青四兩　蔓荊子二兩　白薑炮　防風各一兩
右爲末每以少許嗃鼻中立效

又方 衛生方
治多年障瞖
花蘂石水飛焙　防風　川芎　菊花　白附子
牛蒡子各一兩　甘草炙半兩
右爲末每服五分臘茶下

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百六十七卷目錄

醫部彙考一百四十七

目門十

方四　鎮肝丸　菊花決明散　通氣利中丸　黃連天花粉丸　黃連瘟
甘石散　龍膽瀉肝湯　犀角地黃湯　防風饮子　洗心散
碧雲散　羌活膀風湯　杏仁龍膽草泡散
柴胡復生湯　當歸養榮湯　助陽活血湯
黃連羊肝丸　決明金陰丸　川芎行經散
消痰大丸子　千金磁珠丸　石斛夜光丸
益陰補氣丸　防風散結湯　滋陰地黃丸
避險救苦湯　竹葉瀉經湯　瀉肺解毒丸　決明夜靈散
治卻發目湯　益氣聰明湯　瀉熱黃連湯
菊花決明散　神驗御鴿丸
黃芪防風饮子　無比壽荊子
胃扇螂花散　栀子勝奇散　磨障豐光
湯　發表退翳丸　除風益損湯　加減地黃
青　消翳復明膏　人參補肺湯　柳陽酒連散　當歸補血
九　羌活膀胱湯　明目細辛湯　四物龍膽湯
防風饮子　洗心散

藝術典第一百六十七卷

醫部彙考一百四十七

目門十

方四

鎮肝丸 良方下同

治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗痒痛隱澁難開多眵灑淚怕日羞明時發腫赤或生翳障並皆治之

遠志去心　地膚子　菟蔚子　白茯苓去皮

防風去蘆　決明子　蔓荊子　人參各一兩

山藥　青葙子　柴胡去苗　地骨皮　元參

車前子　甘菊花　栢子仁炒　甘草炙各五錢

細辛去苗一分

右爲細末蜜水煮糊丸如梧桐子大每服三十九食後用米湯送下日三服

萬壽地芝丸

治目能近視不能遠視

天門冬去心　生薑焙各四兩　甘菊花二兩

枳殼去瓤炒三兩

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服一百丸食後用茶清或溫酒送下此藥能治風熱

芍藥清肝散 原注陰陽 微下同

治睆多耽燥緊澁羞明赤脈貫睛臟腑祕結者

白朮炒　川芎　防風　桔梗　羌活　滑石麪

石膏　芒硝各三分　甘草炙　荊芥　白芍藥

前胡　薄荷　黃芩各二分五釐　柴胡　山梔

知母各二分　大黃四分

右㕮咀作一服水二鍾煎至一鍾食後熱服此方治淫熱反尅而作也風熱不制之病熱甚大便硬者從權用之蓋苦寒之藥也苦寒敗胃故先以白朮之甘溫甘草之甘平主胃氣爲君次以川芎防風荊芥桔梗羌活之辛溫升散清利爲臣又以芍藥前胡之微苦薄荷黃芩山梔之微苦寒且導且攻爲佐終以知母滑石石膏之苦寒大黃芒硝之大苦寒蔽逐淫熱爲使大便不硬者減大黃芒硝此逆則攻之之法也大熱服者反治也

通氣利中丸

治前證

白朮一兩　白芷　羌活　滑石末另入各五錢

黃芩　牽牛頭末各一兩五錢　大黃二兩五錢

右除滑石蜜牛另研極細末外餘合爲細末入上藥和勻滴水爲丸如桐子大每服三十丸加至百丸食後臨睡茶湯送下方以白朮苦甘溫除胃中熱爲君白芷辛溫解利羌活苦甘平微溫通利諸節爲臣黃芩微苦寒療熱滋化元滑石甘寒滑利小便以分清濁爲佐大黃苦寒通大便瀉諸實熱牽牛苦寒一說味辛利大便除風毒爲使逆攻之法也風熱不制之病熱甚而大便硬者亦可兼用然牽牛有毒非神農藥今與大黃並用者取其性猛烈而快也大抵不宜久用久用傷元氣蓋從權之藥也量虛實加減

黃連天花粉丸

治前證

黃芩　梔子　天花粉各四兩　甘菊花　川芎

黃連　薄荷各一兩　連翹二兩　黃蘗六兩

右爲細末滴水爲丸如梧桐子大每服五十丸加至百丸食後臨睡茶湯下此方爲淫熱反尅臟腑不祕結者作也風熱不制之病稍熱者亦可服以黃連天花粉之苦寒爲君菊花之苦甘平爲臣川芎之辛溫薄荷之辛苦爲佐連翹黃芩之苦微寒黃蘗梔子之苦寒爲使合之則除熱清利治目赤腫痛

黃連瘟甘石散

治眼眶破爛長日羞明餘治同上

爐甘石一斤　黃連四兩　龍腦量入

先以爐甘石置巨火中煆通紅爲度另以黃連用水一碗磁器盛貯納黃連於水內却以通紅爐甘石淬七次就以所貯磁器置日中曬乾然後同黃連研爲細末欲用時以一二兩再研極細旋量入龍腦每用少許井華水調如稠糊臨睡以筋頭蘸敷破爛處不破爛者點眼內皆銳皆尤佳不宜使入眼內此方以爐甘石收濕除爛爲君黃連苦寒爲佐龍腦去熱毒爲使諸目病者俱可用病宜者治病不宜者無害也奇經客邪之病量加矸硝泡湯滴眼瘀肉黃赤脂上

龍腦黃連膏

治目中赤脈如火溜熱炙人餘治同上

黃連半斤　龍腦一錢

右先剉黃連令碎以水三大碗貯磁器內入黃連於中用文武火慢熬成大半碗濾去滓入薄磁碗內重湯頓成膏半盞許龍腦以一錢爲率用則旋量入之以筋頭點入眼內不拘時此方以黃連治目痛解諸毒爲君龍腦去熱毒爲臣乃君臣藥也諸目痛者俱宜用

蕤仁春雪膏

治紅赤羞明毘燥癢痛沙澀

蕤仁去油四錢　龍腦五分

右先以蕤仁研細入龍腦和勻用生好眞蜜一錢二分再研調勻每用筋頭點內皆銳皆此方以龍腦除熱毒爲君生蜜解毒和百藥爲臣蕤仁去暴熱治目痛爲使此藥與黃連爐甘石散龍腦黃連膏子並用

嚏鼻碧雲散

治腫脹紅赤昏暗羞明隱澀疼痛風癢鼻塞頭痛腦酸外醫攀睛眵淚稠粘

鵝不食草二錢　青黛　川芎各一錢

右爲細末先噙水滿口每用如米許嚏入鼻內以淚出爲度不拘時候此方以鵝不食草解毒爲君青黛去熱爲佐川芎大辛除邪破留爲使升透之藥也大抵如開鎖蓋法常欲使邪毒不閉令有出路然力少而銳嚏之陡效宜常嚏以聚其力諸目病俱可用

羌活勝風湯

治眵多毘燥緊澀羞明赤脈貫睛頭痛鼻塞腫脹涕淚腦巔沉重眉骨酸疼外醫如雲霧絲縷秤星螺蓋

黃芩　白朮各五分　柴胡七分　枳殼　羌活　川芎　白芷　獨活　防風　前胡　桔梗　薄荷各四分　荊芥穗　甘草各三分

右作一服水二盞煎至一盞去滓熱服此方爲風熱不制而作也夫疲不利者皆脾胃不足之證故先以枳殼白朮調治胃氣爲君羌活川芎白芷獨活防風前胡諸治風藥皆主升發爲臣桔梗除寒熱薄荷荊芥清利上焦甘草和百藥爲佐柴胡解熱行少陽厥陰經黃芩療上熱主目中赤腫爲使

又治傷寒愈後之病熱服者熱性炎上令在上散不令流下也生醫者隨醫所見經絡加藥醫凡自內皆而出者加蔓荊子治太陽經加蒼朮去小腸膀胱之濕內皆者手太陽足太陽之屬也自銳皆而入客主人斜下者加龍膽草謂膽草味苦與膽味合少加人參益三焦之氣加藥本乃太陽經風藥銳皆客主人者足少陽手少陽手太陽之屬也凡自目系而下者倍加柴胡行肝氣加黃連瀉心火目系者足厥陰手少陰之屬也自抵過而上者加木通導小腸中熱五味子酸以收斂抵過者手太陽之屬也

杏仁龍膽草泡散

治風上攻毘燥赤癢

龍膽草　當歸尾　黃連　滑石末　赤芍藥　杏仁去皮尖各一錢

右以白沸湯泡頓蘸洗冷熱任意不拘時候此方以龍膽草黃連苦寒去熱毒爲君當歸尾行血杏仁潤燥爲佐滑石甘寒泄氣赤芍藥苦酸除癢爲使惟風癢者可用

柴胡復生湯

治紅赤羞明淚多眵少腦巔沉重睛珠痛應太陽眼睫無力常欲垂閉不敢久視久視則酸疼醫陷下所陷者或圓或方或長或短如縷如錐如鑿

五味子二十粒　藁本　蔓荊子　川芎　羌活　獨活　白芷各三分五釐　白芍藥　炙甘草　薄荷　桔梗各四分　柴胡六分　蒼朮　茯苓　黃芩各五分

右作一服水二盞煎至一盞去滓食後熱服此方以藁本蔓荊子爲君升發陽氣也川芎白芍藥羌

活獨活柴胡白芷爲臣和血補血療風行厥陰經也甘草五味子爲佐爲協諸藥斂臟氣也薄荷桔梗蒼术茯苓黃芩爲使爲清利除熱去濕分上下實脾胃二土療目中赤腫也此病起自七情五賊勞役饑飽故使生意下陷不能上升今主以羣隊升發輔以和血補血導入本經助以相協收斂用以清利除熱實脾胃如此則治理可推也睛珠痛甚者當歸養榮湯主之

當歸養榮湯

治睛珠痛甚不可忍餘治並同上

防風　白芷各七分五釐　白芍藥　熟地黃　當歸　川芎各一錢　羌活七分五釐

右作一服水二盞煎至一盞去滓食後熱服此方以七情五賊勞役饑飽重傷脾胃脾胃者多血多氣之所脾胃受傷則血亦病血養睛睛珠屬腎今生意已不升發又復血虛不能養睛故睛痛甚不可忍以防風升發生意白芷解利引入胃經爲君白芍藥止痛益氣通血承接上下爲臣熟地黃補腎水眞陰爲佐當歸川芎行血補血羌活除風引入少陰經爲使血爲邪勝睛珠痛者及亡血過多之病俱宜服也服此藥後睛痛雖除眼瞼無力常欲垂閉不減者助陽活血湯主之

助陽活血湯

治眼瞼無力常欲垂閉餘治同上

黃芪　炙甘草　防風　當歸各五分　白芷　蔓荊子各四分　升麻　柴胡各七分

右作一服水二盞煎至一盞去相稍熱服此方以黃芪治虛勞甘草補元氣爲君當歸和血補血爲臣白芷蔓荊子防風主療風升陽氣爲佐升麻導入足陽明足太陰脾胃柴胡引至足厥陰肝經爲使心火乘金水衰反制者亦宜服也有熱者兼服

黃連羊肝丸

黃連羊肝丸

治目中赤脈紅甚賭多餘治同上

黃連一錢　白羯羊肝一箇

右先以黃連研爲細末將羊肝以竹刀刮下如糊除去筋膜入擂盆中研細入黃連末爲丸如梧桐子大每服三五十丸加至七八十丸茶清湯下此方以黃連除熱毒明目爲君以羊肝肝與肝合引入肝經爲使不用鐵與刀者忌鐵器也金尅木肝乃木也一有金氣肝則長而不受蓋專治肝經之藥非與羣隊者比也肝受邪者並皆治之睛痛者加當歸

決明益陰丸

治惡日畏火沙澀難開賭淚俱多久病不痊者並皆療之餘治同上

羌活　獨活　當歸尾酒製　五味子　防風　甘草炙各五錢　黃連酒製　草決明　黃芩　黃蘗　知母各一兩　石決明煅三錢

右爲末煉蜜丸桐子大每服五十九加至百丸茶湯下此方以羌活獨活升清陽爲君黃連去熱毒當歸尾行血五味子收斂爲臣石決明明目磨障草決明益腎療盲防風散滯祛風黃芩去目中赤腫爲佐甘草協和諸藥黃蘗助腎水知母瀉相火爲使此蓋益水抑火之藥也內急外弛之病並皆服之

川芎行經散

治目中青黑如物傷狀重者白睛如血貫

枳殼　川芎　當歸　柴胡　炙甘草各六分　白芷　防風　荊芥穗　薄荷　獨活　蔓荊子　羌活各四分　紅花少許　茯苓三分　桔梗五分

右作一服水二盞煎至一盞去相大熱服食後此方以枳殼甘草和胃氣爲君白芷防風荊芥穗薄荷獨活祛療風邪升胃氣爲臣川芎當歸紅花通行滯血柴胡去結氣茯苓分利除濕爲佐蔓荊子羌活引入太陽經桔梗利五臟爲使則胃脈調小腸膀胱邪皆去凝自行也見熱者以消凝大丸子主之

消凝大丸子

治證同上或有賭淚沙澀者並皆療之

川芎　當歸　桔梗　炙甘草　菊花　連翹各七錢　防風　荊芥　羌活　藁本　薄荷各五錢　滑石　石膏　白朮　黃芩　山梔各一兩

右先將滑石石膏另研餘作細末和勻煉蜜爲劑每劑一兩分八丸每服一丸或二丸茶湯嚼下此方消凝滯藥也君以川芎當歸治血和血臣以羌活防風荊芥藁本薄荷桔梗療風散邪引入手足太陽經佐以白朮甘草滑石石膏調補胃虛通泄滯氣除足陽明經熱使以黃芩山梔連翹菊花去煩熱淫熱反尅風熱不制者俱宜服也

千金磁硃丸

治神水寬大漸散昏如霧露中行漸覩空中有黑花漸覩物成二體久則光不收及內障神水淡綠色淡白色者

磁石吸針者二兩　辰砂一兩　神麴四兩

右先以磁石置巨火中煅醋淬七次曬乾另研極細二兩辰砂另研極細一兩生神麴末三兩與前藥和勻更以神麴末一兩水和作餅煮浮爲度搜入前藥煉蜜爲丸如梧桐子大每服十丸加至三十丸空心飯湯下此方以磁石辛鹹寒鎮墜腎經爲君令神水不外發也辰砂微甘寒鎮墜心經爲臣肝其母此子能令母實也肝實則目明神麴辛溫甘化脾胃中宿食爲佐生用者發其生氣熟用者斂其暴氣也服藥後俯視不見仰視漸覩星月者此其效也亦治心火乘金水衰反制之病久病屢發者服之則永不更作空心服此午前更以石斛夜光丸主之

石斛夜光丸

治證同上

天門冬焙　人參　茯苓各二兩　石斛　山藥　枸杞　菟絲子酒浸　甘菊花各七錢　麥門冬　熟地黃各一兩　杏仁去皮尖　牛膝浸七錢半　生地黃一兩　蒺藜　肉蓯蓉　川芎　炙甘草　枳殼麩炒　青葙子　防風　黃連　烏犀角鎊　五味子炒　羚羊角鎊各五錢　草決明八錢

右爲細末煉蜜丸桐子大每服三五十丸溫酒鹽湯任下此方滋補藥也補上治下利以緩利以久不利以速也故君以天門冬人參菟絲子之通腎安神强陰填精也臣以五味子麥門冬杏仁茯苓枸杞子牛膝生熟地黃之斂氣陰濕凉血補血也佐以甘菊花蒺藜石斛肉蓯蓉川芎甘草枳殼山藥青葙子之療風治虛益氣祛毒也使以防風黃連草決明羚羊角生烏犀之散滯泄熱解結明目也陰弱不能配陽之病並宜服之此從則順治之法也

益陰補氣丸

治證同上

熟地黃三兩　當歸尾酒製　牡丹皮　五味子　乾山藥　山茱萸　柴胡各五錢　茯苓　澤瀉各二錢五分　生地黃酒製炒四兩

右爲末煉蜜九如桐子大水飛辰砂爲衣每服五七十丸空心淡鹽湯下此方壯水之主以鎮陽光氣爲怒傷散而不聚氣病血亦病也肝得血而後能視又目爲心之竅心主血故以熟地黃補血衰當歸尾行血牡丹皮治積血爲君茯苓和中益眞氣澤瀉除濕瀉邪氣生地黃補腎水眞陰爲臣五味子補五臟乾山藥平氣和胃爲佐山茱萸强陰益精通九竅柴胡引入厥陰經爲使蜜劑者欲泥膈難下也辰砂爲衣者爲通於心也然必兼于金磁硃丸服之庶易爲效

滋陰地黃丸

治證同上睛多乾燥者並皆治之

黃連一兩　黃芩　歸身酒製　熟地黃各五錢　生地黃酒製一兩五錢　人參　地骨皮各二錢　五味子　炙甘草　天冬焙　枳殼　柴胡各三錢

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服百丸食後茶湯下日三服此方治主以緩緩則治其本也以黃連黃芩苦寒除邪氣之盛爲君當歸身辛溫生熟地黃苦甘寒養血凉血爲臣五味子酸寒體輕浮上收神水之散大人參甘草地骨皮天門冬枳殼苦甘寒瀉熱補氣爲佐柴胡引用爲使也亡血過多之病有熱者亦宜服

防風散結湯

治目上下睛隱起肉疣用手法除病後服之

防風　羌活　白芍藥　當歸尾　茯苓　蒼朮　獨活　前胡　黃芩各五分　炙甘草　防己各三分　紅花　蘇木各少許

右作一服水二盞煎至一盞熱服相再煎方以防風羌活升發陽氣爲君白芍藥當歸尾紅花蘇木破凝行血爲臣茯苓瀉邪氣蒼朮去上濕前胡利五臟獨活除風邪黃芩療熱滋化爲佐甘草和諸藥防己行十二經爲使病在上睛者加黃連柴胡以其手少陰足厥陰受邪也病在下睛者加羹本蔓荊子以其手太陽受邪也

竹葉瀉經湯

治眼目隱澀稍覺昏燥視物微昏內眥開竅如鍼目痛按之浸浸膿出

柴胡　梔子　羌活　升麻　炙甘草　黃連　大黃各五分　赤芍藥　草決明　茯苓　澤瀉　車前子各四分　黃芩六分　青竹葉十片

右作一服水二盞煎至一盞食後稍熱服之此方逆攻者也先以行足厥陰肝足太陽膀胱之藥爲

君柴胡羌活是也二經生意皆總於脾胃以調足太陰足陽明之藥爲臣升麻甘草是也肝經多血以通順血脈除肝邪之藥勝肢經多濕以利小便除勝肢濕之藥爲佐赤芍藥草決明澤瀉茯苓車前子是也總破其積熱者必攻必開必利必除之藥爲使梔子黃芩黃連大黃竹葉是也

蜜劑解毒丸

治證同上

杏仁去皮尖二兩研　山梔十兩　石蜜煉一斤

大黃五兩

右蜜丸梧桐子大每服三十丸加至百丸茶湯下

此方以甘潤治燥爲君謂燥爲熱之原也山梔子微苦寒治煩爲臣謂煩爲熱所產也石蜜甘平溫安五臟爲佐爲其解毒除邪也大黃苦寒性走不守瀉諸實熱爲使爲攻其積不令其重疊不解也

決明夜靈散

治目至夜則昏雖有燈月亦不能覩

石決明另研　夜明砂另研各二錢　生猪肝一兩（不食猪肉者以白羊肝代之）

右二藥末和勻以竹刀切肝作一片以上藥鋪於一片肝上以一片合之用麻皮纏定勿令藥得泄出淘米泔水一大椀貯砂罐內不犯鐵器入肝藥於中煮至小半椀臨睡連肝藥汁服之此方以決明益腎經益精爲君夜明沙升陽主夜明爲臣米泔水主胃肝爲佐肝與肝合引入肝經爲使

沖和養胃湯

治內障初起視覺微昏空中有黑花神水變淡綠色或一或二神水變淡白色久則不覩

神水變純白色

柴胡七錢　人參　當歸酒浸　炙甘草　白朮　升麻　葛根各一兩　五味子二錢　白芍六錢　茯苓三錢　防風五錢　羌活　黃芪各一兩半　乾生薑一錢

右每服六錢水三盞煎至二盞入黃連黃芩各一錢再煎至一盞去滓稍熱食後服此方因肝木不平內挾心火故以柴胡平肝人參開心黃連瀉心火爲君酒製當歸棗百脈五味斂百脈之沸心包絡主血白芍藥順血脈散惡血爲臣白茯苓瀉膀胱之濕羌活清利小腸之邪甘草補三焦防風升膸之降爲佐陰陽皆總於脾胃黃芪補脾胃白朮健脾胃升麻葛根行脾胃之經黃芩退壯火乾生薑壯火爲導爲使此方逆攻順從反異正俱宜

益氣聰明湯

治證同上并治耳聾耳鳴

黃芪製　人參各半分　甘草炙五分　升麻　葛根各三分　蔓荊子一錢五分　芍藥　黃蘗酒炒各一錢

右每服四錢水二盞煎至一盞去相臨睡熱服五更再煎服此方以黃芪人參之甘溫治虛勞爲君甘草之甘平承接和協升麻之苦平微寒行手陽明足陽明足太陰之經爲臣葛根之甘平蔓荊子之辛溫皆能升發爲佐芍藥之酸微寒補中焦順血脈黃蘗之苦寒治腎水勝肢之不足爲使酒製又炒者因熱用也或有熱可漸加黃蘗春夏加之盛暑倍加之加多則不效脾胃虛者去之熱倍此者瀉熱黃連湯主之

瀉熱黃連湯

治內障證同上有胳淚耗燥

升麻五錢　黃芩酒炒　黃連酒洗　柴胡酒炒生地黃酒洗各一兩　龍膽草三錢

右每服三錢水二盞煎至一盞去滓午食前熱服午後服之則陽逆不行臨睡休服爲反助陰也此方治主治客之劑也治主者升麻主脾胃柴胡行肝經爲君生地黃涼血爲臣爲陽明太陰厥陰多血故也治客者黃連黃芩皆療濕熱爲佐龍膽草專除眼中諸疾爲使爲諸濕熱俱從外來爲客也

還陰救苦湯

治目久病白眼微變青色黑睛稍帶白色黑白之間赤環如帶謂之抱輪紅視物不明昏如烟霧中睛白高低不平其色如死甚不光澤口乾舌苦睡多羞澀上焦應有熱邪

升麻　蒼朮　甘草炙　柴胡　防風　桔梗　黃連　黃芩　黃蘗　知母　連翹　生地黃　羌活各五錢　龍膽草三錢　藁本四錢　川芎一兩　紅花一錢　歸尾七錢　細辛二錢

右每服七錢水二盞煎至一盞去滓熱服此方以升麻蒼朮甘草諸主元氣爲君爲損者溫之也以柴胡防風羌活細辛藁本諸升陽化滯爲臣爲結者散之也以川芎桔梗紅花當歸尾諸補行血脈爲佐爲導者行之也以黃連黃芩黃蘗知母連翹生地黃龍膽草諸去除熱邪爲使爲客者除之也

奇經客邪之病強陽搏陰之病服此亦俱驗

菊花決明散

治證同上

草決明　石決明東流水煮一時另研極細入藥　木賊　防風　羌活　蔓荊子　菊花　甘草炙　川芎　石膏另研極細入藥　黃芩各五錢

右爲細末每服二錢水盡半煎至八分連末服食後此方以明目除翳爲君草決明石決明木賊草也以散風升陽爲臣防風羌活蔓荊子甘菊花也以和氣順血爲佐甘草川芎也以療除邪熱爲使黃芩石膏也內急外弛之病亦宜其治

神驗錦鳩丸

治證同上兼口乾舌苦脘多羞澀上焦邪熱

川羌活　瞿麥　草決明　雞仁去皮各三兩　黃連　牡蠣洗火煅粉　甘菊花各五錢　防風　細辛　白蒺藜炒去尖各五兩　白茯苓四兩　肉桂二兩　羯羊肝一箇竹刀薄批炙令焦忌鐵　蕪荑子二升水淘浮絹袋盛飯蒸一伏時曬乾　斑鳩一箇跌死去皮毛腸嘴爪文武火連骨炙乾

右爲細末煉蜜爲劑杵五百下丸如桐子大每服二十丸加至二五十丸空心溫湯下此方以甘菊花草決明主明目爲君以雞仁牡蠣黃連蒺藜除濕熱爲臣以防風羌活細辛之升上瞿麥茯苓之分下爲佐以斑鳩補腎羊肝補肝肉桂導羣藥入熱邪爲使此方制之大者也腎肝位遠服湯藥散不厭頻多之義也

萬應蟬花散

治證同上

蟬蛻去土五錢　蛇蛻炙二錢　川芎　防風　當歸　白茯苓　羌活　炙甘草各一兩　蒼术四兩　赤芍藥二兩　石決明東流水煮一伏時另研極細兩半

右爲細末每服二錢食後臨臥時濃米泔調下熱茶清亦可一方加蒺藜名蟬花無比散此方制之複者也奇之不去則偶之是爲重方也今用蟬蛻又用蛇蛻者取其重蛻之義以除翳爲君也川芎防風羌活皆能清利頭目爲臣也甘草蒼术通主脾胃又脾胃多氣多血故用赤芍藥補氣當歸補血爲佐也石決明鎮墜腎水益精還陰白茯苓分陰陽上下爲使也亦治奇經客邪之病

黃芪防風飲子

治眼稜緊急以致倒睫拳毛損睛生瞖及上下瞼眥赤爛羞澀難開眵淚稠粘

黃芩　蔓荊子各五分　細辛二分　葛根錢半　炙甘草　黃芪　防風各一錢

右作一服水二盞煎至一盞去滓大熱服此方以蔓荊子細辛爲君除手太陽手少陽之邪肝爲二經之母子平母安此實則瀉其子也以甘草葛根爲臣治足太陰手陽明之弱肺爲二經之子母薄子單此虛則補其母也黃芪實皮毛防風散滯氣用之以爲佐黃芩療濕熱去目中赤腫爲之使也無比蔓荊子湯

治證同上

細辛葉三分　黃芪　人參　生甘草各一錢　黃連　柴胡各七分　蔓荊子　當歸　葛根　防風各五分

右作一服水二盞煎至一盞去滓稍熱服此方爲肺氣虛也黃芪人參實之爲君心受邪也黃連除之肝受邪也柴胡除之小腸受邪也蔓荊子除之爲臣當歸和血葛根解除爲佐防風療風散滯生甘草大瀉熱火細辛利九竅用葉者取其升上之意爲使也

撥雲退翳丸

治陽蹻受邪內眥卽生赤脈縷縷根生瘀肉瘀肉生黃赤脂脂橫侵黑睛漸蝕神水銳眥亦然俗名攀睛

川椒皮七錢　地骨皮　荊芥穗　菊花各一兩　木賊草去節　蔷蒙花　蔓荊子各二兩　黃連　薄荷葉　楮桃仁　蟬蛻各五錢　川芎　當歸　白蒺藜去刺炒各兩半　甘草　蛇蛻各炙三錢　天花粉六錢

右爲細末煉蜜成劑每兩作八丸每服一丸食後臨睡細嚼茶清下一方有枳實五錢羌活一兩無楮桃仁此方爲奇經客邪而作也難經曰陽蹻脈者起足跟中循外踝上行入風池風池者腦戶也故以川芎治風入腦以菊花治四肢游風一療其上一平其下爲君蔓荊子除手太陰之邪蟬蛻蛇蛻木賊草蔷蒙花除鬱爲臣薄荷葉荊芥穗白蒺藜諸療風者清其上也楮桃仁地骨皮諸逼小便者利其下也爲佐黃連除胃中熱天花粉除腸中熱甘草和協百藥川椒皮利五藏明目諸所病處

血亦病故復以當歸和血爲使也楮桃仁卽楮實子也

梔子勝奇散

治證同上并有眵淚羞澀難開

蛇蛻　草決明　荆芥穗　蒺藜炒　蔷蒙花　穀精草　菊花　防風　羌活　川芎　甘草炙　蔓荆子　木賊草　山梔子　黃芩各等分

右爲細末每服二錢食後臨睡熱茶清調下此方以蛇蛻之鹹寒草決明之鹹苦爲味薄者通逼者通其經絡也川芎荆芥穗之辛溫白蒺藜穀精草之苦辛溫菊花之苦甘平防風之甘辛爲臣爲氣辛者發熱發熱者升其陽也羌活之苦甘溫蔷蒙花之甘微寒甘草之甘平蔓荆子之辛微寒爲佐爲氣薄者發泄發泄者清利其諸關節也以木賊草之甘微苦山梔子黃芩之微苦寒爲使爲味厚者泄泄者攻其壅滯有餘也

磨障靈光膏

治證同上

黃連剉如豆大一兩童便浸一宿曬爲末　黃丹水飛三兩　當歸末二錢　麝香另研　乳香另研末各五分　輕粉另研　硇砂另研　白丁香取末　海螵蛸末各一錢　龍腦少許末　盧甘石六兩另以一兩黃連剉置水中燒爐甘石通紅淬七次

右先用好白沙蜜十兩或銀器沙鍋內熬五七沸以淨紙搭去浮面除黃丹外下餘藥用柳木攪勻次下黃丹再攪慢火徐徐攪至紫色却將乳香麝香輕粉硇砂和勻入上藥內以不粘手爲度急丸如皂角子大以紙裹之每用一丸新汲水化開旋入龍腦少許時時點瞖上此方以黃連去邪熱主明目爲君以黃丹除熱除毒爐甘石療濕收散爲臣以當歸和血脈麝香乳香諸香通氣輕粉殺瘡爲佐以硇砂之能消海螵蛸之磨瞖白丁香之主病不移龍腦之除赤脈去外障爲使也

消瞖復明膏

治證同上

黃丹飛四兩　訶子八箇去核取末　薏仁五錢　海螵蛸三錢取末　青鹽另研　木賊草各一兩　白沙蜜一斤先將蜜熬數沸紙搭去浮面却下黃丹用棍攪勻旋下餘藥將至紫色取出　黃連十兩　杏仁七十五箇去皮尖　龍膽草二兩

右通入磁器內水一斗浸之春秋五日夏三日冬十日入鍋內文武火熬至小半升濾去柤重湯頓成膏子却入前藥熬之攪成紫色入龍腦一錢每用少許點上藥乾淨水化開用此方以黃連爲君爲療邪熱也薏仁杏仁龍膽草爲臣爲除赤痛潤燥解熱毒也黃丹青鹽龍腦白沙蜜爲佐爲收濕爛益腎氣療赤腫和百藥也訶子海螵蛸木賊草爲使爲澀則不移消障磨瞖也

除風益損湯

治目爲物傷者

熟地黃　當歸　白芍藥　川芎各一錢　葉本前胡　防風各七分

右作一服水二盞煎至一盞去滓大熱服此方以熟地黃補腎水爲君黑睛爲腎之子此虛則補其母也以當歸補血謂目爲血所養今傷則血病白芍藥補血又補氣謂血病氣亦病也爲臣川芎治血虛頭痛葉本通血去頭風爲佐前胡防風逼療風邪俾不凝留爲使兼治亡血過多之病傷於眉骨者病自目系而下以其手少陰有隙也加黃連療之傷於顴者病自抵過而上傷於耳者病自銳眥而入以其手太陽有隙也加柴胡療之傷於頰交顱耳上角及腦者病自內眥而出以其足太陽有隙也加蒼朮療之傷於耳後耳角耳前者病自客主人斜下傷於頰者病自銳眥而入以其足少陽有隙也加龍膽草療之傷於額角及巔者病自目系下以其足厥陰有隙也加五味子療之凡傷甚者從權倍加大黃瀉其敗血眵多淚多羞澀赤腫者加黃芩療之

加減地黃丸

治證同上

生地黃　熟地黃各半斤　牛膝　當歸各三兩　枳殼二兩　杏仁　羌活　防風各一兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服三十丸空心食前溫酒送下淡鹽湯亦可此方以地黃補腎水眞陰爲君夫腎水不足者相火必盛故生熟地黃退相火也牛膝逐敗血當歸益新血爲臣麩炒枳殼和胃氣調胃爲多血生血之所是補其原杏仁潤燥謂血少生燥爲佐羌活防風俱升發清利大除風邪爲七情五賊饑飽勞役之病睛痛者與當歸養榮湯兼服傷寒愈後之病及血少血虛血亡之病俱宜服也

人參補陽湯

治傷寒餘邪不散上走空竅其病隱澀赤脹生翳羞明頭痛骨痛

羌活　獨活各六分　白芍藥　生地　澤瀉各三分　人參　白朮　白茯苓　黃芪　炙甘草

當歸　熟地酒洗焙各四分　柴胡　防風各五分

右作一服水二盞煎至一盞去相熱服此方分利陰陽升降上下之藥也羌活獨活爲君者導陽之升也茯苓澤瀉爲臣者導陰之降也人參白朮大補脾胃內盛則邪自不容黃芪防風大實皮毛外密則邪自不入爲之佐也當歸熟地黃俱生血調目得血而能視生地黃補腎水謂神水屬腎白芍藥理氣柴胡行經甘草和百藥爲之使也

抑陽酒連散

治神水緊小漸如菜子許及神水外圍相類蟲蝕者然皆能視物不昏微有乾燥羞澀之證

蔓荊子　前胡　羌活　白芷　甘草各四分

黃芩酒製　梔子　寒水石　黃連酒製各五分

防己　生地　獨活　黃藥　防風　知母各三分

右作一服水二盞煎至一盞去滓大熱服此方抑陽緩陰之藥也以生地黃補腎水眞陰爲君獨活黃藥知母俱益腎水爲臣蔓荊子羌活防風白芷羣隊升陽之藥爲佐者謂既抑之令其分而更不相犯也生甘草黃芩梔子寒水石防己黃連不走之藥爲使者惟欲抑之不欲祛除也諸用酒製者爲引導也

當歸補血湯

治男子衄血便血婦人產後崩漏亡血過多致睛珠痛疼不能視物羞明酸澀眼瞼無力眉骨太陽俱各酸痛

當歸　熟地黃各六分　川芎　牛膝　白芍藥　炙甘草　白朮　防風各五分　生地黃　天門冬各四分

右作一服水二盞煎至一盞去滓稍熱服惡心不進食者加生薑煎此方專補血故以當歸生地黃爲君川芎牛膝白芍藥爲臣以其祛風續絕定痛而通補血也甘草白朮大和胃氣用以爲佐防風升發生地黃補腎天門冬治血熱謂血亡生風燥故以爲使

羌活湯（三因）

治風毒上攻眼目昏澀腎膜生瘡及偏正頭疼目小黑花累累者

羌活　川芎　天麻　旋覆花　青皮　南星炮製本各一兩

右爲末每服二錢水煎入薑三片薄荷七葉此足太陽厥陰藥也

明目細辛湯（東垣）

治兩目發赤微痛羞明畏日怯風怕寒火眼瞼成紐腫糊多隱澀而難開眉攢腫悶鼻塞涕唾稠粘大便祕澀

麻黃　羌活各三錢　防風二錢　藁本　茯苓　當歸尾各一錢　川芎　細辛　蔓荊子各五分

荊芥穗一錢五分　生地黃一錢酒製　椒八箇　桃仁二十箇　紅花少許

右咬咀分作四服每服水煎食後熱服此足太陽厥陰手少陰藥也

四物龍膽湯（機要）

治目赤暴發雲腎疼痛不可忍

四物湯各五錢　羌活　防風各二錢　龍膽草酒拌炒焦　防己各二錢

右咬咀作數服水煎此足厥陰太陰太陽藥也

防風飲子

治拳毛倒睫

黃芪　甘草　人參各一錢　葛根　細辛葉　防風　蔓荊子各五分　當歸七分五釐

右咬咀作一服水煎食後服此足太陽陽明手足太陰藥也

洗心散（局方）

治風壅壯熱頭目昏痛熱氣上衝口苦唇焦咽喉腫痛心神煩躁多渴五心煩熱小便赤澀大便祕滯

大黃煨　甘草　當歸　芍藥　麻黃　荊芥穗各六錢　白朮五錢

右爲末每服二三錢生薑薄荷湯煎服此足太陽陽明厥陰手足太陰經藥也今人多用之故收入然以白朮合大黃入心故名洗心而佐以麻黃荊芥亦是表裏藥

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百六十八卷目錄

醫部彙考一百四十八

目門十一

方五　明目流氣飲　洗肝散　瀉青丸　青金丸　神芎丸　龍膽飲子　明目地黃丸　加減駐景丸　定志丸　神效黃芪湯　人參補胃湯　遠志飲　益陰丸　滋陰腎氣丸　菊花丸　驅風丸　羊肝丸　湯泡散　撥子散　撥百點膏　圓明膏　撥子散　立勝散　陽湯　還睛丸　廣大重　萃雷鼻方　蠟光膏　神效明目湯　明湯　五秀重明丸　升陽柴胡湯　芎藭湯　當歸湯　四生散　三味蘆薈丸　珊瑚散　九味蘆薈丸　抵聖散　止痛散　桔梗丸　菊花散　本事方　桑白皮散　大黃丸　元參丸　海藏洗眼　青皮湯　又方　朱砂煎　洗眼　青皮湯　定痛飲　決明子丸　乳香丸　住痛神寧丸　又方　救苦散　一捻金　點眼金華水　貴牛黯煎肝散　二水散　加味八正散　治風眼方　又方　明散　補肝散　桃子丸　上涌散　荣白丸　加味知母湯　散墜散子　竹葉湯　龍膽飲　決明子湯　退赤散　退赤丸　救　李門冬湯　瀉肝散　退赤方　去赤腫方　碧天丸　針頭丸　苦丸　滌風散　蔻恶瞿立效方　湯泡散　洗眼　蜜棚枝　腫　又方　犀角飲　炙肝散　洗肝散　桑　荣金膏　知母飲子　雞距丸　防風瀉肝散　白皮湯　琥珀散　磁石丸　七寶湯　清涼散　洗刀　散　二黃散　七寶丸　南硼砂散　抽風湯　地黃散

藝術典第一百六十八卷

醫部彙考一百四十八

目門十一

方五

明目流氣飲局方

治風熱上攻眼目視物不明常見黑花當風多淚隱澁難開

大黃煨　牛蒡子炒　川芎　菊花　白蒺藜炒　細辛　防風　元參　山梔　黃芩　甘草炙　荊芥　木賊各一兩　草決明一兩半　蒼术泔汁浸一宿炒二兩

右爲末每二錢臨臥用溫酒調下此手三陰足陽明太陰藥也

洗肝散

治風毒上攻暴作赤目腫痛難開隱澁瞀淚

薄荷葉　當歸　防風　羌活　山梔仁　甘草　大黃　川芎各二兩

右爲末每二錢食後滾水調下此足太陽厥陰手足太陰藥也

瀉青丸錢氏

治目暴發赤腫疼痛

當歸　龍膽草酒拌炒焦　川芎　山梔　大黃　羌活　防風

右爲末蜜丸雞頭子大每服一二丸此足太陽少陽太陰厥陰藥也

青金丸

治風毒攻眼成外障腎膜

眞銅青　薏仁去皮尖與銅青同浸二宿去水碾　石決明淨水磨澀乾　生犀角淨水磨紙上飛過各一錢　龍腦研　白丁香水研飛去滓　海螵蛸水飛過各五分

右將銅青薏仁先研如糊次入白丁香研次入四味研極細用好墨研濃汁於淨器中和爲丸菜豆大每用人乳汁化開點眼常以龍腦養於磁器中

神芎丸

治濕熱內甚目赤腫或白睛黃色

大黃　黃芩各二兩　牽牛頭末　滑石各四兩　薄荷　黃連　川芎各五錢

右爲末水丸如小豆大溫水下十九至十五二十丸此足陽明厥陰藥也

龍膽飲子東垣

治肝眼流膿生疳腎濕熱爲病

黃芩炒　蛤粉　羌活　龍膽草酒炒焦各三錢　蛇蛻皮　穀精草　川鬱金　炙甘草各五分

升麻二錢　麻黃一錢五分

右爲細末每二錢食後茶調服一名消腎散此足太陽陽明手足太陰藥也已上六方宜隨表裏而輕重之亦不可例用

明目地黃丸局方

治男女肝腎俱虛風邪所乘熱氣上攻目腎遺精目澁多淚

牛膝酒浸三兩　石斛　枳殼炒　杏仁去皮炒　防風各四兩　生地黃　熟地黃各一斤

右爲末煉蜜丸如梧子大每三十丸食前鹽湯下

此足太陽例又氣藥也

加減駐景丸簡易

治肝腎氣虛兩目昏暗視物不明

熟地　當歸各五兩　楮實子　川椒炒各一兩　車前子炒　五味子　枸杞子各二兩　菟絲子酒製半斤

右爲末蜜糊丸如梧子大每三十丸食前溫酒下

肝爲相火有瀉無補況陰水虛而陽火實病目者多故此二方蓋補肝之陰虛也頗有理故收入

定志丸 局方

治眼不能近視反能遠視者

茯苓　人參各三兩　遠志去心　菖蒲各二兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大以硃砂爲衣每服七丸至二三十丸溫米飲下食後日三服此手太陰少陰藥也

神效黃芪湯 東垣下同

治渾身痲木不仁或頭面或手或腿脚痲木不仁兩目緊急縮小及羞明畏日或視物無力

黃芪二兩　人參八錢　炙甘草　白芍各一兩

蔓荊子三錢　陳皮五錢

右㕮咀每服五錢水煎臨臥熱服

人參補胃湯

治勞役所傷飲食不節內障昏暗

卽前黃芪湯減陳皮芪再減半加黃蘗一兩酒拌透

右㕮咀每服三四錢水煎食遠稍熱服後兩目廣大視物如童時覺兩脚踏地不知高下蓋冬天多服升陽藥故也病減住服此手足太陰少陰藥也

連蘗益陰丸

石決明煅三錢　羌活　獨活　甘草　歸尾製

防風　五味子各五錢　草決明　黃芩　黃蘗

知母　黃連酒拌炒各一兩

右件於石臼中杵爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服五十丸漸加至百丸食遠茶清送下常多服補陽湯少服此丸

滋陰腎氣丸

此壯水之主以鎭陽光

熟地三兩　生地四兩　澤瀉　茯苓各二兩半

當歸尾　山茱萸　柴胡　五味子　山藥各五錢

右件於石臼中杵爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服五七十丸鹽湯空心服此少陰藥也

菊睛丸 局方

治肝腎不足眼目昏暗常見黑花多淚

枸杞子三兩　蓯蓉酒浸炒　巴戟去心各一兩

甘菊花四兩

右爲末煉蜜爲丸如梧子大每服五十丸溫酒鹽湯食遠任下

補陽湯

治陽不勝其陰乃陰盛陽虛則九竅不通今青白瞖見於大眥及足太陽少陰經中鬱遏足厥陰肝經氣不得上通於目故青白瞖內阻也當於太陽少陰經中九原之下以益肝中陽氣衝天上行此乃先補其陽後補足太陽太陰標中標者頭也瀉足厥陰肝經火下伏於陽中乃次治也內經云陰盛陽虛則當先補其陽後瀉其陰此治法是也每日清晨以腹中無宿食服補陽湯臨臥服益陰丸若天色變大寒大風并勞役積日飲食不調精神不足或氣弱俱不得服候時氣和平天氣如常服之乃先補其陽使陽氣上升通於肝經之末利空竅於目矣

羌活　獨活　甘草　人參　熟地黃　黃芪

白朮炒各一兩　澤瀉研爲末　陳皮　白芍

防風各五錢　生地黃炒　白茯苓　知母炒

歸身酒製各三錢　柴胡三兩　肉桂去皮一錢

右同爲麤末每服五錢水三盞煎至一盞去滓空心宿食消盡服之

還睛丸 龍目論

治眼內赤澀有花或白或黑或紅皆因肝臟積熱肺受風邪初患之時宜令鍼治諸穴內服此方

人參　桔梗　黃芩　熟地黃　防風　茺蔚子

車前子　知母各二兩　元參五錢　五味子

細莘各二兩五錢

右爲末煉蜜爲丸如梧子大空心茶下十丸按本論治內障諸方與此相類者數多姑存此法

羊肝丸 本事方

菟絲子　車前子　麥門冬　決明子　茯苓

五味子　枸杞子　茺蔚子　苦葶藶　蕤仁

地膚子　澤瀉　防風　黃芩　杏仁炒　細莘

桂心　青葙子各一兩　熟地黃一兩五錢

白羯羊肝只用子肝一片薄切新瓦上炒乾

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服三四十丸溫水下日三次此足太陽少陰手太陰少陰藥也

湯泡散 局方

治肝經風熱上壅眼目赤澀睛疼多淚

赤芍藥　當歸　黃連等分

右爲末每二錢湯頓熱洗日三五次御藥院方加荊芥

立勝散 三因

治風熱攻眼隱澀羞明腫痛

黃連　秦皮　防風　黃芩等分

右㕮咀水煎熱用新羊毫筆蘸刷洗眼

百點膏（東垣下同）
張濟民眼瞤以至遮瞳人視物不明如覺雲氣遮障以此方治之
川黃連二錢以河水一碗煎至半碗再入後藥
防風根八分　生甘草梢　當歸身各六分
薤仁去皮尖三分
右剉如麻豆大薤仁另研如泥同熬滴入水中不散去滓沫入好蜜少許再煎少時爲度極要病人心靜點之點至目微痛爲度一日點五七次臨臥點尤妙名曰百點膏但欲多點使藥力相續

圓明膏
治內障生翳及瞳子散大皆勞心過度飲食失節所致
歸身三錢　柴胡去苗　麻黃去蘆　黃連去鬚　生地各五錢　訶子皮濕紙裹煨　甘草各二錢
右七味先以水二碗熬麻黃至一碗去沫外六味各㕮咀如豆大節去沫子秤入內同煎滴水中不散去滓沫入蜜少許再熬點之

槐子散（河間）
治體肥氣盛風熱上行目昏澀
槐子　黃芩　木賊　蒼朮各等分
右爲細末食後茶調下

拔萃喻鼻方
治偏頭疼眼疾
蒼耳頭　薄荷葉　鹽硝　石膏各一錢亂文者
乳香　華陰細辛　貫芎各五分
右爲極細末早午夕三時嗅鼻實鑑方無蒼耳乳香細辛有桔梗荊芥

蟾光膏
治遠年病目不通道路退去雲膜須用十二月開成日合
白砂蜜四兩用隔年葱根去鬚皮切短與蜜一同熬去白沫候葱熟爲度以綿濾淨紙取蠟面　黃丹　密陀僧各水飛二錢生用　爐甘石火煅五錢水飛
已上三味研極細傾入前蜜中桃柳無節者各一枝攪勻

當歸　赤芍藥　黃連去蘆淨各二兩　川芎　杏仁泡去皮尖各五錢　秦皮　訶子皮　防風　石膏　元精石　井泉石　無名異　代赭石　元參
右㕮咀用雪水或長流水五升於銀器內熬至二升濾去滓淨再熬至一升傾入前藥蜜內銀器內慢火熬紫金色時再下後藥勿令過火

乳香　沒藥　琥珀　硃砂　薤仁各三錢
已上五味先乾研極細入薤仁研細水飛澄清極細方傾入前藥一同復熬以筯點藥於水中不散爲度勿令過與不及取下於土中埋七日取出置於銀器或磁器中如法收貯臨用再添入後細藥以桃柳枝攪勻

南硼砂　珍珠　大片龍腦　珊瑚枝各一錢
麝香五分
右五味研極細入藥中封定如有取不盡藥用淨水斟酌洗瀝熬過另於洗眼藥中或膏子稠了傾些少調解

神效明目湯
治眼稜緊急致倒睫拳毛損目及上下瞼赤爛睛赤疼痛昏暗冷淚常流夜則眼澀難開睫淚皆滿眼

葛根錢半　甘草炙　防風各一錢　細辛二分
蔓荊子五分
右作二服水煎臨臥稍熱服一法加黃芪一錢

廣大重明湯
治兩目瞼皆燃熱赤腫作痛楞生瘡多睫淚隱澀不能開視及眼瞼痒搔之至破者並皆治之

草龍膽酒炒　防風　生甘草　細辛各一錢
右各杵如麻豆大只甘草不剉先以水一椀半煎草龍膽一味至一半再入餘三味煎至少半椀濾去滓用清帶熱洗以重湯坐令熱日用五七次每洗畢合目須臾如努肉泛長及痒亦驗

五秀重明丸
治瞳膜遮睛隱澀昏花常服清利頭目

乾菊開頭五百朵　荊芥穗五百穗　木賊去節五百莖　楮實子　川椒各五百粒炒去目
右爲末煉蜜爲丸彈子大每服一丸細嚼徐徐嚥下

升陽柴胡湯
治前證
羌活　獨活　甘草根　歸身　熟地黃　白芍藥各一兩　人參　黃芪　白朮　楮實子酒拌生地黃酒炒各五錢　澤瀉　陳皮　白茯苓
防風　知母酒製各三錢（夏月五錢）　柴胡一錢五分

肉桂五分
右每服五錢水煎稍熱服食後另合一料煉蜜爲丸如桐子大食遠茶清送下五十丸每日與前藥各一服如天氣熱甚加五味子三錢或五錢天門冬五錢更加芍藥楮實子各五錢

芎莘湯
治兩目晝夜隱澀難開羞明畏日目赤視物昏暗神效
芎藭　蔓荊子各五分　防風一錢五分　甘草
白芷各一錢　細莘五分
右作一服水煎臥時稍熱服

當歸湯 保命
治風熱上攻瞳子散大
當歸身　黃芩　白芍藥各二錢　黃連　柴胡各一錢　熟地黃　甘草炙各三錢
右分三服水煎臨臥溫服

珊瑚散
治眼赤痛生翳障遠視不明癢澁
珊瑚七錢五分　硃砂五錢　龍腦五分
右碾極細每以銅筋取少許日點三四度效

九味蘆薈丸
治三焦及肝膽風熱目生雲翳或瘴癰耳內生瘡寒熱作痛或肝火肌體消瘦發熱作渴飲食少思肚腹不調或肝疳口內生瘡牙齦潰爛或口齒蝕落頰顋腐爛發熱口渴飲食少用下部生瘡等證
胡黃連　當歸　芍藥　龍膽草酒浸炒　蘆薈各一兩　木香　甘草炙各三錢　蘆薈五錢
右爲末茯神糊丸麻子大每服五七十丸滾湯下

四生散
治腎風上攻眼目作痒或作昏花
白附子　黃芪　獨活　蒺藜各等分
爲末每服二錢用豬腰子一枚批開入藥濕紙包裹煨熟細嚼鹽湯下風癢酒下

三味蘆薈丸
治黑水疑腎內障不痛不痒微有頭旋脹澀者
蘆薈　甘草各一錢　羚羊角鎉炙二兩
右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大空心茶清下十丸

止痛散 保命
治兩額角痛目睛痛時見黑花及目赤腫痛脈弦作內障也得之於饑飽勞役
柴胡一兩五錢　甘草炙七錢半　瓜蔞根二兩
當歸　生地各一兩　黃芩四兩一半酒浸一半炒
右爲麤末每服三錢水一盞半薑三片棗一枚臨臥熱服小便不利加茯苓澤瀉各五錢

桔梗丸 保命
治太陽經衛虛血實目腫赤瞼重頭中濕淫腐腎睛痛肝風盛眼黑腎虛
桔梗一斤　牽牛頭末二兩
右爲細末煉蜜丸如桐子大每服四五十丸至一百丸食前溫水下日二次

抵聖散
治目偏風牽疼痛
大黃劉炒　蔓荊子　甘菊花　土瓜根　防風　青皮　黃連去鬚　前胡　丹參　吳藍　陳皮　蔵蕤各一兩　決明子微炒　冬瓜子　青葙子　地膚子　車前子各一兩五錢
右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食
木賊各一兩　甘草炙五錢
右爲細末每服二錢食後茶清調服

菊花散 本事
治肝腎風毒氣上衝眼痛
甘菊花　牛蒡子炒各八兩　白蒺藜去刺一兩　甘草一兩五錢　防風三兩
右爲細末每服二錢熟水調下食後臨臥服

本事方
治睛疼難忍者
川當歸　防風　細莘　薄荷各等分
右爲末每服二錢麥門冬煎水調下食後日午夜臥各一服

桑白皮散 濟生
治肺氣壅塞毒熱上攻眼目白睛腫脹日夜疼痛心胃煩悶
桑白皮　元參　升麻　旋覆花去枝梗　杏仁　赤芍藥　甘菊花去枝梗　栝蔞蓼炒　防風　黃芩　枳殼去瓤麩炒　甘草炙各一兩
右㕮咀每服四錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓食後溫服

大黃丸
治白睛腫脹痛不可忍
大黃劉炒　蔓荊子　甘菊花　土瓜根　防風　青皮　黃連去鬚　前胡　丹參　吳藍　陳皮　蔵蕤各一兩　決明子微炒　冬瓜子　青葙子　地膚子　車前子各一兩五錢
右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食
荊芥穗二兩　芎藭　羌活去蘆　楮實麩炒

前用溫酒送下
元參丸
治肺臟積熱白睛腫脹遮蓋瞳人開張不得赤澁疼痛
元參　川升麻　漢防己　羚羊角屑　沙參
車前子　梔子仁　桑根白皮　杏仁湯浸去皮尖雙仁炒黃各一兩　大麻仁　大黃微炒各兩半
右爲細末煉蜜和丸如桐子大每服二十丸食後以溫水送下臨臥時再服
瀉肺湯
治暴風客熱外障白睛腫脹
羌活　元參　黃芩各一兩半　地骨皮　桔梗
大黃　芒硝各一兩
右剉每服五錢水一盞煎至五分去滓食後溫服
朱砂煎
治眼白睛腫起赤澁疼痛
朱砂細研　杏仁湯浸去皮尖　青鹽各二錢半
馬牙硝細研　黃連研末各五錢
右研勻綿裹以雪水三合浸一宿濾入磁盒中每用以銅筯點之
洗眼青皮湯
治眼白睛腫起赤磣痛痒
青皮去麤皮　桑根白皮　葳蕤各一兩　大黃
元參　梔子仁　青鹽湯燈下各五錢　竹葉一握
右以水二大盞煎至一盞半入鹽濾去滓微熱淋洗冷卽再煖
又方
治睛痛難忍者
白芷　細辛　防風　赤芍藥各等分
右爲末每服三錢水一盞入沙糖二錢同煎至七分去滓不拘時溫服
決明子丸
治風熱上衝眼目或因外受風邪疼痛視物不明
決明子炒　細辛去苗　青葙子　蒺藜炒去角
菟蔚子　芎藭　獨活　羚羊角鎊　川升麻
防風各五錢　元參　枸杞子　黃連各三兩
菊花一兩
右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸加至三十丸淡竹葉煎湯送下
乳香丸
治眼疼頭痛或血攻作筋急遍身疼痛
五靈脂二錢　乳香另研　沒藥另研　夏蠶沙
草烏各五錢　木鼈子五枚
右爲末酒煮麪糊丸梧桐子大每服七丸薄荷茶湯下如頭疼連進三服卽止
住痛解毒丸
硼砂五兩　川芎　荊芥　砒硝　白芷　石膏
菊花各一兩　沒藥五錢　麝香少許
右爲細末米糊丸梧桐子大溫湯下
定痛飲
防己一兩　當歸　黃芩各五錢
右㕮咀水一盞半煎至一盞入紅酒半盞溫服
救苦散
治眼睛痛不堪忍
川芎　當歸　防己　防風各五錢
右爲細末每服二錢熱酒調服
一捻金
治眼睛痛
乳香　沒藥　黃連　雄黃　盆硝各等分
右爲細末鼻內嗑之一方加腦麝少許點眼金華水
治肝臟有熱血脈壅滯津液不榮目中澁痛
黃連末一分　硇砂豌豆大研　乳香黑豆大研
銅綠一字煆　臘粉一錢匕研　杏仁七枚去皮尖雙仁研　龍腦研　滑石研　艾灰研各半錢匕
青古老錢三文與諸藥同浸
右九味研細令勻與古老錢在綿子內以井華水浸三七日後點目眥頭
黃牛膽煎
治眼澁痛
白蜜三兩　黃牛膽汁　鯉魚膽汁　猪膽汁
羊膽汁各半合　胡黃連末　青皮末　熊膽
川黃連各二錢半
右將諸藥末與蜜并膽汁和勻入瓷瓶內以油紙封頭牢繫坐飯甑中蒸待飯熟爲度用新淨綿濾過每以銅筯取如麻子大點目眥日二三度
二术散
治驗硬睛疼去翳障
蟬蛻　白术　黃連　枸杞子　蒼术米泔浸炒
龍膽草　地骨皮　牡丹皮各等分
右爲末每服一錢食後荊芥湯下

治氣眼方
石決明　草決明　楮實子　香附子　木賊
甘草　蟬蛻去足　川芎各等分
右爲細末茶清下

又方
石決明　草決明　香附子　蚌粉各等分
右爲細末每服二錢茶清調下

通明散
治氣眼凡人之目必患後損其經絡喜怒哀樂之情有傷於心發作不時此乃氣輪受病故也
升麻　山梔子各一兩半　細辛　川芎　白芷
防風　羌活　草決明　白蒺　夏枯草各一兩　楊梅皮　蟬蛻去土　五倍子各五錢
甘草一錢
右㕮咀每服三錢水一盞半淡竹葉七片同煎食後溫服

補肝散
治眼痛如針刺外障
人參　白茯苓　芎藭　五味子　藁本各一兩
細辛　羌蔚子各一兩五錢
右爲細末每服一錢空心米飲調服

加味八正散
治心熱衝眼赤腫澁痛熱淚羞明
瞿麥　萹蓄　滑石　車前子　甘草　梔子仁
木通　大黃　桑白皮　燈心　苦竹葉　生地
右水煎食後服

參芪羚角湯
治風牽眼偏斜外障
羚羊角鎊　防風　五味子　赤茯苓　人參各一兩　黃芪　羌蔚子　知母各一兩五錢
右水煎食後服

槐子丸
治肝虛風邪所攻致目偏視
槐子仁二兩　酸棗仁微炒　覆盆子　柏子仁
車前子　蔓荊子　羌蔚子　牛蒡子　葵菜子各一兩
右爲末煉蜜丸梧子大每服三十丸空心溫白湯送下

上清散
治頭風痛眉骨痛眼痛
川芎　鬱金研　赤芍藥　荊芥穗　薄荷葉
芒硝各五錢　乳香另研　沒藥另研各一錢
腦子另研五分
右爲細末每用一字鼻內嗑之甚妙

蒙石丸
治前證挾痰濕動輒呃逆者
薄荷葉三錢　大黃酒蒸九次二兩　酒芩七錢
殭蠶　酒天麻　陳皮鹽爽去白　桔梗各五錢
半夏牙皂薑汁爽一兩　白芷　青蒙石各二錢
右末之滴水丸如菜豆大食後臨臥茶吞二錢

加味知母湯
治風牽眼外障
知母二錢　黃芪去蘆　白朮　羌活　防風
明天麻　甘菊花　山茱萸肉　炒荊子　藁本
川芎　當歸各一錢　細辛　甘草各五分
水二鍾煎至一鍾溫分二服日三頭面腫加牛蒡子炒研二錢

散熱散子 係命
治眼赤暴發腫
防風　羌活　黃芩　黃連各一兩
共爲末每服半兩水二盞煎食後溫服

大膽祕加大黃一兩
痛甚加川當歸地黃
煩躁不得臥加梔子一兩

竹葉湯
治肝臟實熱目赤腫痛
淡竹葉　黃芩去黑心　犀角屑　木通各一兩
車前子　黃連去鬚　元參各一兩二錢五分
芒硝二兩　梔子仁　大黃微炒各一兩五錢
右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後溫服

龍膽飲
治同前
龍膽草　梔子仁各二錢　防風　茵陳　川芎
元參　荊芥　甘菊花　楮實　甘草各一錢
右爲細末每服一錢半食後茶清調下

決明子湯
治肝臟實熱目皆生赤肉澁痛
決明子炒　柴胡去苗　黃連去鬚　苦竹葉
防風去叉　升麻各七錢半　細辛去苗二錢半
菊花　甘草炙各一錢

右㕮咀每服五錢水一盞半煎八分去滓食後溫服

麥門冬湯

治肝實熱毒氣上熏於目赤腫痛痒

麥門冬去心　秦皮去粗皮　赤茯苓去黑皮　蔵爇各一兩五錢　大黃　升麻各一兩

右剉片每服五錢水一盞半入竹葉十片煎至八分去滓入硝末一錢更煎令沸空心溫服

瀉肝散

治肝熱赤眼腫痛

梔子仁　荆芥　大黃　甘草各等分

右每服二錢水煎食後服

退赤散

大黃　黃芩　黃連　白芷　赤芍藥　當歸　山梔子各等分

右剉爲散桑白皮同煎食後服

退赤丸

生地黃　草決明　黃芩　當歸　白朮　木通　連翹　甘草各等分

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服四十丸淡竹葉煎湯吞下

退赤方

山梔子一兩　當歸酒浸五錢　大黃煨　甘草炙各二錢

右㕮咀爲散每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服

去赤脈方

赤芍藥二兩　川芎　熟地黃　當歸　山梔子各一兩

右㕮咀爲散水煎服

治目疾累服寒凉不愈兩目蒸熱有如火熏赤而不痛紅絲血脈滿目貫睛昏悶昏暗羞明畏日或上下瞼赤爛或不服風土而內外銳眥皆破以此洗之

瓦粉炒一兩　銅綠七分　枯白礬二分（是一錢中五分之一）

右研銅綠白礬令細旋旋入瓦粉研勻熱水和之共爲九每用一丸熱湯半盞浸一二箇時辰洗至覺微澁爲度少合眼半時辰許臨臥更洗了瞑目就睡尤神妙一丸可洗十日如再用湯內頓熱此藥治其標爲裏熱已去矣裏實者不宜用此當瀉其實熱

針頭丸（木事）

治男婦室女小兒諸般赤眼

川烏尖　白殭蠶各七枚去嘴俱懷乾　硼砂十文

右爲末用猪膽汁拌藥成軟塊攤碗內荆芥艾各一兩皂角小者一莖燒將藥椀覆熏之常將膏藥攪勻轉又攤又熏以皂角荆芥艾盡爲度搜成塊用油紙裹入地中出火毒冬天兩日夜夏天一夜春秋一日夜取出丸如針頭大每一丸點眼中

救苦丸（保命）

治眼暴赤發脹痛甚者

黃連一兩　川當歸二錢　甘草一錢

右剉細水半椀浸一宿以火熬約至減半綿絞去查淨再熬稠膏攤椀上倒合以物蓋之用熟艾如彈子大底下燃之熏膏子艾盡爲度入下項藥

硃砂一錢飛　腦子五分　乳香　沒藥各等分

右研入膏和丸如米大每用兩丸點眼兩角仰面臥藥化方起

滌風散

治風毒攻眼赤腫痒痛

黃連去鬚　蔓荆子各五錢　五倍子三錢

右剉細分三次新汲水煎濾清汁以手沃洗

蔵惡眼立效方

明礬好者黑豆大　山梔子一枚剝去皮

右咬碎用淨絹帛包定以井水小半盞浸之候水浸透水黃洗眼一二十次一宿次早無事立效

湯泡散

治肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸生瞖膜

銅青二錢　杏仁　防風　黃連去鬚　赤芍藥　當歸尾各五錢　薄荷葉三錢

右剉散每用二錢極沸湯泡乘熱先熏後洗冷則再煖用日兩三次一方入白鹽少許開目沃洗鹽亦散血

垂柳枝煎

治風赤眼

垂柳枝　桃枝　枸杞枝　桑枝各七莖每莖長二寸　馬牙硝二錢五分細研　竹葉四十九片　黃連去鬚　決明子各五錢　龍腦細研五分

右除硝龍腦外以槳水二大盞於銅器中煎至一半去滓以綿濾淨入硝入龍腦攪勻更煎令稠每

以銅筯頭取如小豆許點眼日三五次
又方
治一切風赤眼眼皮上瘙痒赤爛久治不效此藥之功不可具述
輕粉十字　白蜜　白蠟各三銖　臘月猪脂五錢
右先銼猪脂成油漸下蜜次下蠟候三味總化成油入輕粉攪令勻不時搽眼赤皮上
犀角飲
治黃膜上衝
犀角二兩　白附子炮　麥門冬各二錢五分
車前子　羌活　黃芩各五錢
右水煎食後溫服
炙肝散
治外障赤肉翳膜遮睛不明
石決明洗淨　穀精草各四兩　甘草炙二兩
皂角炙去皮弦子二錢半　黃芩　木賊各五兩
蒼木米泔浸七日切片焙半斤
右爲細末每用猪肝一葉去筋膜割數縫摻藥末五錢於縫內仍摻鹽一錢合定用旋著濕柳枝三四條架起慢火炙香熟早晨空心冷喫盡仍喫冷飯一盞壓之仍於三里穴灸二三七壯三日後有淚下爲驗七日翳膜必退每旦用新水漱口
洗眼紫金膏 初刻
治遠年近日翳膜遮障攀睛努肉昏暗淚多瞻視不明或風氣攻注瞼生風粟或連睫赤爛怕日羞明隱澀難開
黃連去鬚五錢　赤芍藥　當歸　硃砂另研
乳香另研　硼砂另研各二錢半　雄黃飛二錢
麝香另研五分
右爲細末入研藥拌勻再研煉蜜丸如皂角子大每用一丸安淨盞內沸湯泡開於無風處洗眼令閉目少時候三兩時再煖熱依前洗一貼可洗三五次不得犯銅鐵器內洗如暴赤眼腫者不可洗
知母飲子
治風熱外障
知母　羌蔚子各二兩　防風　細辛各一兩半
桔梗　大黃　茯苓　芒硝各一兩
右每服五錢水一盞煎至五分去滓食後溫服
薏仁散
治目生花翳多年不退
薏仁湯浸去皮　秦艽去苗各一兩　枳殼炒黃
赤茯苓各一兩五錢　川大黃炒五錢　車前子
青葙子　赤芍藥各七錢五分　柴胡去苗一兩
右爲細末每服三錢水一盞煎六分連滓熱服
洗肝散
治花翳
川芎　當歸尾　赤芍藥　防風　生地　木賊
白蒺藜　蟬蛻　羌活　薄荷　蘇木　甘菊花
紅花各五錢　甘草三錢
右㕮咀每服三錢水一盞半松絲十餘根煎服外用通明散七寶膏爐甘散點
桑白皮湯
治目生花翳白點狀如瑞花
桑白皮　木通各一兩五錢　澤瀉　犀角屑
黃芩　茯神　元參　旋覆花　大黃炒各一兩
甘菊花五錢　甘草炙二錢五分
右爲細末每服二錢七水一盞煎六分連滓溫服
琥珀散
治目積年生花翳
琥珀　珊瑚　硃砂　白硇砂　馬牙硝各五錢
鮫鯽魚骨五錢於粗石磨去其澀用好者一錢
真珠末一兩
右研極細令勻每日三五次點
雞距丸
治花翳淚出
乾蠮炮七錢五分　薏仁細研　雞舌香　胡粉各五錢　黃連一兩研末　礬石熬研一錢二分半
右爲細末粟肉丸如雞距注眼大皆日再
防風瀉肝散
治蟹眼睛疼
防風　遠志　桔梗　羚羊角　甘草　赤芍藥
細辛　人參　黃芩各等分
右爲細末溫水調服
磁石丸
治肝腎虛蟹眼睛疼
黃芪　青鹽　人參　紫巴戟　菟蓉　附子
木香　沉香　防風　牛乳　牛膝　覆盆子
桂心　乾蠮　遠志　熟地黃　茯苓　磁石
苁蓉　陳皮　白朮　川芎　檳榔　大腹皮
白芷　青皮　烏藥　獨活各等分
右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫鹽

湯送下

七寶丸

治內障冰翳如冰凍堅結睛上先以鍼撥取之後以此藥散翳

石決明搗研細二兩　羌蔚子　人參各一兩　琥珀搗研七錢五分　龍腦二錢五分研　熊膽　眞珠搗研各五錢

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服十五丸加至二十九食前茶清下

七寶湯

治內障橫翳橫著瞳人中心起如劒脊鍼撥後用

羚羊角鎊　犀角鎊各一兩　胡黃連　車前子　石決明刮洗搗研　炙甘草各五錢　丹砂另研

右除丹砂決明外麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓入丹砂末五分決明末一字再煎兩沸食後溫服

清凉散

治冰瑕深翳

蔓荆子　荆芥穗　苦竹葉　甘草生各五錢　梔子二錢五分

右薄荷水煎服

洗刀散

治風熱弦爛眼目赤腫內外障翳羞明怕日倒睫出淚兩瞼赤爛紅筋瀝血宜用此藥

防風　連翹　羌活　獨活　草決明　蔓荆子　木賊　元參各一兩　當歸　荆芥穗　滑石研　薄荷　麻黃　白朮　赤芍藥　大黃各五錢　黃芩　川芎　梔子仁　桔梗　石膏　芒硝　蝉蛻　菊花　蒺藜各四錢　甘草　細辛各二錢

右藥同煎食後服再用清凉洗眼之藥

二黃散

治努肉攀睛

黃芩　大黃　防風　薄荷各等分

右水煎入蜜少許食後服

定心丸

治努肉攀睛

石菖蒲　枸杞子　白菊花各五錢　辰砂二錢　遠志二錢五分　麥門冬去心一兩

右爲末煉蜜丸如桐子大每二十丸食後熟水下

南硼砂散

治努肉瘀突及痘瘡入眼生瞽膜

南硼砂一錢　片腦一分

右研細末點眼用元參麥門冬生地黃煎湯調洗心散末服

抽風湯

治雞冠蜆肉外障

車前子　防風　桔梗　大黃　細辛　黃芩　元參　芒硝

右水煎食遠服

地黃散

治混睛或白睛先赤而後痒痛迎風有淚隱澀難開

生地黃一兩　芍藥　土當歸　甘草各五錢

每服三錢水一盞半煎至七分食後溫服

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百六十九卷目錄

醫部彙考一百四十九

目門十二

方六　七寶膏　羚羊角飲子　補腎丸　退熱飲子　青葙子丸　琥珀煎　荊防菊花散　白蘚皮湯　菊花散　磨光散　甘菊花散　道人開障散　搖雲散　五退散　朱僧藝醫方　珍珠退腎散　決明子散　眞珠散　開明丸　秘傳去腎聖金膏　捲簾散　瞻水丸　眞珠膏　雞子殼散　羌活退腎膏　蠍附散　玉餅子　療五十年腎方　清心流氣飲　黃連敗毒散　搽藥　如意金黃散　荊防敗毒散　清胃散　京腸清脾飲　翠雲錠

單方一

藝術典第一百六十九卷

醫部彙考一百四十九

目門十二

方六

七寶膏

治混睛外障

眞珠　水晶　貝齒各一兩　石決明　琥珀各七錢五分　空青　瑪瑙　龍腦各五錢

右爲細末研勻水五升石器內煎至一升去滓再煎至一盞入蜜半兩煎和爲膏每至夜臥時點之早晨不得點

羚羊角飲子

治黑腎如珠外障

防風二兩　羚羊角　五味子　細莘　大黃　知母　芒硝各一兩

右剉碎每服五錢水一盞煎至五分去滓食後溫服

補腎丸

治證同上

乾地黃一兩半　人參　茯苓　細莘　五味子　肉桂　桔梗各一兩　山藥　柏子仁各二兩半

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服十丸空心茶下

退熱飲子

治膜入水輪外障

防風　黃芩　桔梗　茺蔚子各二兩　大黃　元參　細莘　五味子各一兩

右剉碎每服一錢水一盞煎五分去滓食後溫服

青葙子丸

治肝心毒熱丁腎入黑睛

青葙子　藍實　枳殼去瓤麩炒　大黃剉炒　菊花　甘草炙各二兩　草決明　黃連去鬚　茺蔚子　細莘　麻黃去根節　車前子各兩半　鯉魚膽　雞膽各一枚陰乾　羚羊角鎊三兩

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服二十丸食後茶清送下日三兼治內外一切眼病

琥珀煎

治眼生丁腎久治不瘥

琥珀　龍腦各二錢五分　貝齒　硃砂各五錢　馬牙硝煉過者七錢五分

右同研如麪以水一大盞別入白蜜一兩攪和入通油磁瓶內用重湯煑以柳木篦煎取一合已來即住以綿濾於不津磁瓶中盛之或銅器亦得每取少許點之一方爲細末點

荊防菊花散

治眼中膚腎侵及瞳神如蠅翅狀

白菊花　防風去叉　木通　仙靈脾　木賊　荊芥去梗　甘草炙各等分

右爲末每服一錢食後茶清調下

白蘚皮湯

治目膚腎睛及瞳神上有物如蠅翅狀令人視物不明

百合二兩　白蘚皮　蒜冬花　車前子　柴胡　枳殼去瓤麩炒　黃芩去黑心各一兩　菊花　蔓荊子各一兩五錢　甘草炙五錢

右剉碎每服五錢水一盞半煎八分去滓食後溫服臨臥再服

菊花散

治肝受風毒眼目昏矇漸生腎膜

蟬蛻　木賊各一兩　蒺藜炒　羌活各三兩　白菊花四兩　荊芥　甘草各二兩

右爲末每服二錢食後茶清調下

磨光散

治諸風攻眼消磨瞖膜
蒺藜炒　防風　羌活　菊花　甘草　草決明
石決明煅　蟬蛻　蛇蛻炒　川芎各等分
右爲末每服一錢麥門冬湯食後臨臥服
甘菊花散
治肝氣壅塞瞖膜遮睛隱澁難開
木賊　防風去叉　白蒺藜　甘草炙各五錢
木香二錢五分　甘菊花一兩
右爲細末每服一錢匕不拘時沸湯點服
道人開障散
治諸障瞖
蛇蛻洗焙剪細　蟬蛻洗焙　黃連去鬚各五錢
菜豆一兩　甘草二錢生
右剉細每服二錢食後臨臥新水煎服
撥雲散
能散風毒退瞖障及赤爛弦者
羌活　防風　川芎　白蒺藜　荆芥　蟬蛻
甘菊花各二兩
右爲細末每服二錢食後桑白皮煎湯調服
五退散
治眼中瞖障
蛇蛻　蟬蛻　蠶蛻　猪腿蹄　鼈鯉甲　防風
菊花　草決明　石決明　甘草各等分
右爲細末每服二錢食後薄荷煎湯調服
朱佾熬瞖方
蟬蛻洗曬　蒺藜炒去角各五錢　防風　川芎
甘菊花　羌活　細辛　荆芥穗　秦皮　楮實
木賊去節童便浸一宿曬　藁本　甘草各二錢半
右爲細末每服一錢茶清調下
珍珠退瞖散
白澤　石膏研　鮫鯽魚骨　眞蚌粉各等分
珍珠少許
右爲細末每服一錢用第二次米泔調食後臨臥
常服
決明子散
治眼卒生瞖膜視物昏暗及瞖覆裹瞳人
決明子　黃連去鬚　川升麻　枳殼去瓤麩炒
元參各一兩　黃芩七錢半　車前子　梔子仁
地膚子　人參去蘆各五錢
右剉碎每服三錢水一盞煎至六分去滓食後溫
服
眞珠散
治眼忽生瞖膜赤澁疼痛
眞珠研五錢　青箱子　黃芩各二兩　甘菊花
人參　石決明搗研水飛　芎藭　甘草炙各一兩
右爲細末每服一錢食後溫漿水調下
開明丸
治年深日近瞖障昏盲寂無所見一切目疾
熟地一兩半酒浸　菟絲子　車前子　麥門冬
蒺藜去皮　決明子　地膚子　黃芩　羌蔚子
枸杞子　青箱子　五味子　防風去蘆　澤瀉
杏仁炒去皮尖　細辛去葉不見火　北葶藶炒各
一兩　官桂五錢
右爲細末以白羊肝煮爛研爲丸庶可久留少則
以蜜漬之丸如梧桐子大每服三十丸熟水下日
三仍忌生薑糟酒炙煿等熱物
祕傳去瞖聖金膏
爐甘石白色者五兩用童便煅淬三十次却研極細
用黃連龍膽草各一兩當歸三錢煎水兩椀飛過訖
重湯蒸乾再研約一日要如麪極細　黃連五兩水
洗淨曬乾却將一兩切碎煎水四兩碾爲細末重羅
過再碾極細用水飛過却於砂銚內煮此藥最難冬
月用雪水和藥曬乾再碾方細　密陀僧火煅酢淬
碾極細水飛過半兩　鮫鯽魚骨半兩碾細入煎
滴乳香用黃連等水碾飛過　沒藥碾用黃連等水
飛各三錢　白丁香水飛重湯內煮乾再碾入煎
南硼砂碾細　輕粉碾細　鷹條各一錢以水一椀
飛過同白丁香用水淘飛過合碾入煎須多淘淨秤
硇砂五分洗去泥以水入鐵銚內煮乾如鹽樣白
方好再碾細入藥煎　黃丹一兩用鐵銚火煅過碾
細末入水飛重湯煮乾再碾一時頃入煎　蜜四兩
用水一盞銅銚內煎以蔥白二莖攪蜜候煎了取銚
頓地上用淨紙一片揭去面上嘓　龍膽草一兩截
碎水煎　當歸半兩淨以一半焙乾碾細末再用些
水碾一半煎水用
右先以黃連當歸龍膽草三味截碎用銚子煎二
大椀水用此水研乳香沒藥飛過可用此水飛過
鷹條白丁香獨將黃連四兩洗淨令乾碾爲細末
重羅了又碾飛過或別作法度但要極細於砂銚
內用淨蜜四兩同煮却旋入諸藥煎成膏可丸即
止後入下二味

麝香用當門子碾細羅過　片腦各五分碾細羅過
候藥煎成膏却入此二味
此藥遠年目疾皆治須隨病輕重爲大小丸與之
每以淨湯一雞子殼大化開日洗五七次或如麥
粒大點眼尤妙

捲簾散

治久新病眼昏澀難開瞖膜遮睛或成努肉連瞼
赤爛常多冷淚或暴發赤眼腫痛
爐甘石四兩碎　矾硝五錢細碾　黃連七錢搥碎
以水一椀煑數沸濾去滓
右先將爐甘石末入乾鍋內開口煅令外有霞色
爲度次將黃連矾硝水中浸飛過候乾又入黃連
半錢水飛過再候乾次入
膩粉另碾　硇砂另碾　白礬半生半煅飛過
黃連碾爲末各五錢　銅青一兩半　乳香另研
白丁香另碾　鉛白霜另碾　青鹽另碾　膽礬另
碾各一字
右爲細末同前藥碾勻每用少許點眼

照水丸

治目生瞖障

龍腦　滑石　丹砂通明者　鰞鰂骨去甲
右各一錢碾細再同研勻先用黃蠟皂子大於新
白磁盞內慢火鎔以紗帛濾在淨盞內再鎔了將
前藥末同拌和捏作餅子如半破豌豆大用薄絹
或紗袋盛了以硇砂半兩放淨椀內上交橫安竹
片放藥在上面鋪著借硇砂氣熏用大盤子一箇
合椀上勿令透氣撅一地坑放藥椀在坑內用竹
箄一片蓋了然後以黃土蓋之七日出淨磁瓶中
收其硇砂不用如患浮瞖膜侵瞳人及一切目疾
但臨臥時將一餅劄在眼眥頭即睡至曉用水一
椀向東覷水椀其藥自落在水中淨浴却用絹帛
裹起安潔淨處臨臥依前再使每餅可用半月候
藥力慢時方易一餅如兩目有疾即用兩餅

眞珠膏

治眼虛熱目赤痛卒生瞖膜昏暗
眞珠一兩碾　麝香　硃砂　胡粉各二錢五分
貝齒五枚燒灰　鯉魚膽二枚　白蜜四兩煎濾過
右除魚膽蜜外都碾如粉以魚膽汁蜜於銅器中
調令勻慢火煎成膏每以銅筯取少許點之日三
四次

雞子殼散

治眼卒生瞖膜
雞子殼抱出子者去膜取殼研二錢五分　貝齒三
枚煅灰
右碾極細入磁盒中盛取少許日三五度點之

羌活退瞖膏

治足太陽寒水膜子遮左右睛白瞖在上視物不
明
羌活根七分　椒樹西北根二分東南根二分
當歸梢六分　黃連二錢　防風根　柴胡根
麻黃去節根　升麻根　生地黃各三分　甘草梢
四分　蕤仁六箇　漢防己　藁本各二分
右用淨新汲水一大椀先將漢防己黃連甘草梢
生地黃煎至一半下餘藥再煎至一盞去滓入銀
石器中再煎如膏點之有效爲度一名復明膏

蠍附散

嗃鼻退瞖膜
乾全蠍　附子尖　薑黃　青黛各二錢五分
薄荷一兩　鵝不食草五錢
右爲細末口含水嗃少許

玉餅子

治瞖膜
海螵蛸　蛤粉各五分　片腦半分　黃蠟五分
右爲末先鎔蠟持起攪微冷入末爲丸如青葙子
大帶匾些每用一餅臨臥納入眼中瞖膜上經宿
以水照之其餅自出

療五十年瞖方

貝齒一箇燒　豆豉三十粒　三年苦酒一升
右先漬貝齒三宿消盡後內豆豉微火煎如膠取
三合藥置筒中夜臥時著如小麥大於眥頭明日
以湯洗之

清心流氣飲 [illegible]

治眼丹

白茯苓　防風　甘草　紫蘇葉　羌活　獨活
青皮　薄荷　黃芩　柴胡　荊芥穗　赤芍藥
麥冬　連翹　石膏　蔓荊子　川芎
右水煎服

黃連敗毒散

治前證
薄荷五錢　黃連二兩　甘草　連翹　羌活
細辛　黃芩酒炒　甘菊花各一兩　防風一兩半

右爲末煉蜜九如桐子大每五十丸食後白湯下

搽藥

治前證

皂礬五錢　大粉草二兩

二味同煎膏加冰片少許用鴨毛潤眼眶上卽愈

如意金黃散（王宗下同）

眼丹初起宜此敷之

天花粉十斤　黃蘗　大黃　薑黃各五斤

白芷三斤　陳皮　甘草　蒼朮　厚朴　天南星

各二斤

以上共爲咀片曬極乾燥用大甕磨連磨三次方

用密絹羅廚篩出磁罐收貯勿令泄氣凡遇紅赤

腫痛發熱未成膿者及夏月火令時俱用茶湯同

蜜調敷

荊防敗毒散

治眼丹有表證者

荊芥穗　防風　羌活　獨活　前胡　柴胡

川芎　桔梗　白茯苓　枳殼各一錢　甘草

人參各五分

薑三片水二杯煎八分食遠服寒甚加葱三枝

清胃散

治眼丹有裏證者

黃連　黃芩　生地　丹皮　升麻　石膏各一錢

水二鍾煎八分食後服

涼膈清脾飲

治菌毒

防風　荊芥穗　黃芩　石膏　山梔仁　薄荷

赤芍　連翹　生地各一錢　甘草五分

水二鍾燈心二十根煎八分食後服

翠雲錠

治眼泡菌毒用針割後塗之

杭粉五兩　銅綠末一兩　輕粉一錢

共研極細用黃連一兩同川米百粒水一椀煎一半再熬折去二分和藥作錠陰乾臨用清水少許

淨硯上磨濃雞翎蘸搽患上又治爛弦風眼或暴

赤腫痛者簇搽更妙

單方一

眼目昏暗四月內取風落小胡桃每日午時食飽以無根水吞下偃臥覺鼻中有泥腥氣爲度（易簡方）

風眼赤爛膽礬三錢燒研泡湯日洗（經驗）

柏葉上露甘蒲上露並能明目旦旦洗之（時珍）

眼睛突出一二寸者以新汲井水灌漬睛中數易之自入（梅師方）

時行火眼患人每日於井上親井旋匝三遍能洩火氣（集元方）

火眼赤爛緊閉目以熱湯沃之湯冷卽止頻沃取安

妙在閉目或加薄荷防風荊芥煎湯沃之亦妙（濟急方）

風赤爛眼倒睫拳毛用白土一兩銅青一錢爲末每以五分泡湯洗之

凡目卒無見取黃土攪水中澄清洗之（肘後方下同）

目中瞤膜取東壁土細末日點之淚出佳

目生瞤膜用細料白瓷鍾一箇大火煅過研末紙篩加雄黃三分爲末早晚各點少許不可多用牛角簪撥出瞤膜爲妙若不退再以末點四角卽愈（集效方）

赤眼腫痛用新磚浸糞池中年久取放陰處生花刷下入腦子和點之

飛絲塵物入目磨濃墨點之卽出穀芒入目點摩瞳子上

一切目疾白臉揀出黑碎者厚紙七層包挂風處四十九日取研極細日日點之（普濟方）

拳毛倒睫用刀微劃動以藥泥眼胞上睫自起用石膽一錢石灰一錢酢調塗之（摘元方）

治爛弦風眼銅青水調塗盤底以艾熏乾刮下塗爛處（易簡方）

赤眼痛黃丹蜂蜜調貼太陽穴立止（明目經驗方）

眼生珠管鉛丹半兩鯉魚膽汁和如膏日點二五次（聖惠方）

一切目疾昏障蜂蜜半斤銅鍋熬起紫色塊入飛過眞黃丹二兩水一盌再煉至水氣盡以細生絹鋪薄紙一層濾淨瓶封埋地內三七每日點眼七次藥粘則洗之一方入訶子肉四箇（保壽堂方）

赤目及瞤鉛丹白礬等分爲末點之或鉛丹鴿鉤骨等分合研白蜜蒸點之（千金方）

痘疹生瞤黃丹輕粉等分爲末吹少許入耳內左患吹右右患吹左（痘疹方）

眼赤生瘡連年不愈古錢一文生薑石一箇洗淨以錢於石上磨蜜取濃汁三四滴在盡覆瓦上以艾炙瓦內七壯熏蜜取點之效（普濟方）

赤目浮瞤古錢一文鹽方寸匕治篩點之（千金方）

目卒不見用錢於石上磨汁注眥中（普濟方）

目生珠管及膚瞤用銅錢青一兩細墨半兩爲末酢

丸白豆大每以一丸乳汁新汲水各少許浸化點之聖惠方

大青錢磨汁入目主盲障膚赤余常患赤目腫痛數日不能開客有教以生薑一塊洗淨去皮以古青銅錢刮汁點之初甚苦熱淚篾面然終無損後有患者教之往往疑惑信士點之無不一點遂愈更不須再但作瘡者不可用也本草

風眼赤爛及風熱赤眼瞖膜燒銅匙柄熱烙之頻用妙時珍

眼生偷鍼布鍼一箇對井睨視已而折爲兩投投井中勿令人見醫說

小兒膚瞖未堅不可亂藥宜以珊瑚研如粉日少少點之三日愈德中方

水晶熨目除熱淚玻瓈熨熱腫摩瞖障琉璃點眼去飛絲

灰塵入目以寶石拂拭即去

瑪瑙熨目赤爛生障瞖以瑪瑙爲末日點之

目中障瞖蔓蔓藤以水浸過吹氣取汁滴入目中去熱瞖赤白障拾遺本草

眼暴赤腫磣澀疼痛甘蔗汁二合黃連半兩入銅器內慢火養濃去查點之普濟

眼赤澀痒以犬膽汁注目中效聖惠方下同

肝虛目暗白犬膽一枚螢火蟲二七枚陰乾爲末點之

目中膿水上伏日采犬膽酒服之聖濟總錄

老人肝虛目暗雄烏肝一具切以豉和米作羹或粥食之孫老書

卒生瞖膜蛇蛻皮一條洗曬細剪以白麪和作餅炙焦黑色爲末食後溫水服一錢日二次聖惠方

赤目障瞖青魚膽頻頻點之一方加黃連海螵蛸末等分龔氏易簡用黃連切片井水熬濃去查待成膏入大青魚膽汁和就入片腦少許瓶收密封每日點之甚效

目中赤脈痒痛時見黑花用初生杏子仁一升古五銖錢七文入瓶內密封埋門限下一百日化爲水每夕點之聖濟總錄

熱病目暗此因瘥後食五辛而致用鯽魚作臛食之集驗方

目生努肉鮮鯽魚取一片中央開竅貼於眶上日三五度聖濟總錄下同

風眼腫痛雞子白皮枸杞白皮等分爲末吹鼻中一日三次

腎虛目黑此能暖水臟用沉香一兩蜀椒去目炒出汗四兩爲末酒糊丸梧子大每服三十丸空心鹽湯下普濟方

傷寒熱毒攻眼生赤白瞖用鷓鴣魚骨一兩去皮爲末入龍腦少許點之日三

一切目瞖用鷓鴣魚骨五靈脂等分爲細末熟猪肝切片蘸食日二

補肝明目井治男子五勞七傷用冬瓜仁七升以淨絹袋盛投三沸湯中須臾取曬乾如此三度又與清苦酒浸之二宿曝乾爲末日服方寸匕令人悅澤明目延年不老

雀目夜眼鷓鴣骨半斤爲末化黃蠟三兩和捏作錢大餅子每服一餅以猪肝二兩竹刀批開摻藥紮定米泔水半椀煑熟食之以汁送下楊氏家藏下同

血風赤眼女人多此疾鷓鴣魚骨二錢銅綠一錢爲末每用一錢熱湯泡洗

疳眼流淚鷓鴣魚骨牡蠣等分爲末糊丸皂子大每用一丸用猪肝一具米泔煑熟食經驗方

風毒攻眼腫痒澀痛不可忍者或上下瞼赤爛或浮瞖瘀肉侵睛神效驅風散用五倍子一兩蔓青子一兩半爲末服二錢水二盞銅石器內煎汁去查乘熱洗留查再煎用大能明目去澀博濟方

風眼赤爛用五倍子煆存性爲末入飛過黃丹少許傅之日三上甚良集驗方

爛弦風眼及眼中努肉五倍子銅青白蠟土等分爲末熱湯泡開閉目淋洗冷即再熱洗之眼弦不可入湯濟急方

斑瘡入目不退者曾青一錢丹砂二錢爲末蠐螬五枚搗汁和點聖濟總錄

胎赤眼疾杏仁壓油半雞子殼食鹽一錢入石器中以柳枝一握緊束研至色黑以熟艾一團安椀內燒烘之令氣透火盡即成每點少許入兩眥甚效聖濟總錄下同

目中瞖遮但瞳子不破者用杏仁三升去皮麪裹作三包煻火煨熟去麪研爛壓去油每用一錢入銅綠一錢研勻點之

目生努肉或痒或痛漸覆瞳人用杏仁去皮二錢半膩粉五分研勻綿裹筯頭點之

拳毛倒睫石燕子一雌一雄磨水點搽眼先以鑷子

摘去拳毛乃點藥後以黃連水洗之（乾坤生意）

海鹽以百沸湯泡散清汁於銀石器內熬取雪白鹽花新瓦器盛每早揩牙漱水以大拇指甲點水洗目閉坐良久乃洗面能去腎大利老眼名洞視千里法極神妙（永類鈐方）

目中淚出鹽點目中冷水洗數次差（范汪方）

目中浮翳遮睛白鹽生研少許頻點屢效小兒亦宜（直指方）

塵物迷目以少鹽幷豉置水中視之立出（孫眞人方）

牢牙明目青鹽二兩白鹽四兩川椒四兩煎汁拌鹽炒乾日用揩牙洗目永無齒疾目疾（通要）

風眼爛弦戎鹽化水點之（普濟方）

風熱赤眼虛腫漉痛鹵鹹一升青梅二十七箇古錢二十一文新瓶盛密封湯中煮一伏時三日後取點日三五度（聖惠方）

目赤腫痛元精石半兩黃蘗炙一兩爲末點之良（普濟方）

目生赤脈元精石一兩甘草半兩爲末每服一錢小兒五分竹葉湯下

赤目失明內外障腎太陰元精石陰陽火煅石決明各一兩蒺藜仁黃連各二兩羊子肝七箇竹刀切曬爲末粟米飯丸梧子大每臥時茶服二十丸服至七日烙頂心以助藥力一月見效宋丞相言黃典史病此夢神傳此方愈（宋氏集驗方）

治赤眼痛鹽綠一分蜜半兩於蚌蛤內相和每夜臥時槩水洗目炙熱點之能斷根（聖濟錄）

目暗赤澁多淚鹽綠一錢蒺藜仁去皮一錢研入好酥一錢研勻每夜點一麻子大（聖惠方）

赤眼腫痛礬硝置豆腐上蒸化取汁收點（簡便方）

風眼赤爛用明淨皮硝一錢水二椀化之露一宿濾淨澄清朝夕洗目三日其紅卽消雖半世者亦愈也（經驗方）

退腎明目白龍散用馬牙硝光淨者厚紙裹實安在懷內著肉養之一百二十日研粉入少龍腦不計年歲深遠眼生腎膜遠視不明但瞳人不破散者並宜日點之（經驗方）

諸眼障腎牙硝十兩湯泡汁厚紙濾過瓦器熬乾置地上一夜入飛炒黃丹一兩麝香五分再羅過入腦子日點（齊general方）

男女內外障腎或三五箇月不見效者焰硝一兩銅器鎔化入飛過黃丹片腦各二分銅匙急抄入罐內收之每點少許其效如神兗州朱秀才忽不見物朝夕拜天因夢神傳此方點之而愈（張三丰仙方）

赤眼腫痛硝石末臥時以銅筯點黍米大入目皆至旦以鹽水洗去之

損目生瘀赤肉努出不退杏仁百箇蒸熟去皮尖研濾取淨汁入硇砂末一錢水煮化日點一二次自落（普濟方）

目腎努肉白礬石納黍米大入目令淚出日日用之惡汁去盡其疾日減

目生白膜礬石一升水四合銅器中煎半合入少蜜調之綿濾過每日點三四度（延齡至寶方）

赤目風腫甘草水磨明礬傳眼胞上效或用枯礬頻擦眉心（集簡方）

爛弦風眼白礬煅一兩銅青三錢研末湯泡澄清點洗（永類方）

眼暴赤爛紅棗五箇入綠礬在內火煨熟以河水井水各一椀桃柳心各七箇煎稠每點少許入眥上（摘元方）

爛弦風眼或倒睫拳毛俱用青礬火煅出毒細研泡湯澄清點洗（永類方）

棗皮同老桑樹皮並取北向者等分燒研每用一合井水煎澄取清洗目一日三洗昏者復明忌葷酒房事

赤眼努肉日夜痛者取好梨一箇搗絞汁以綿裹黃連片一錢浸汁仰臥點之（圖經）

赤眼腫痛鵝梨一枚搗汁黃連末半兩臙粉一字和勻綿裹浸梨汁中日日點之（聖惠方）

赤眼漬痛葳蕤赤芍藥當歸黃連等分煎湯熏洗（衛生家寶方）

眼見黑花赤痛昏暗用葳蕤焙四兩每服二錢水一盞入薄荷二葉生薑一片蜜少許同煎七分臥時溫服日一服（聖濟總錄）

補虛明目健骨和血蒼术泔浸四兩熟地黃焙二兩爲末酒糊丸梧子大每溫水下三五十丸日三服（普濟方）

青盲雀目用蒼术四兩泔浸一夜切焙研末每服三錢猪肝二兩批開摻藥在內紮定入粟米一合水一椀砂鍋煮熟熏眼臨臥食肝飲汁不拘大人小兒皆治

又方不計時月久近用蒼术二兩泔浸焙搗爲末每

服一錢以好羊子肝一片竹刀切破摻藥在內麻紮以粟米泔煑熟待冷食之以愈爲度

眼目昏澁蒼朮半斤泔浸七日去皮切焙爲末每服一錢茶酒任下聖惠方

目昏生醫仙靈脾生王瓜即小苦蔞紅色者等分爲末每服一錢茶下日二服聖濟總錄

病後青盲日近者可治仙靈脾一兩淡豆豉一百粒水一椀半煎一椀頓服即瘳百一選方

男婦赤眼十分重者以山漆根磨汁塗四圍甚妙集簡方

眼目諸病勝金黃連丸用宣連不限多少搥碎以新汲水一大椀浸六十日綿濾取汁入原椀內重湯熬之不住攪之候乾即穿地坑子可深一尺以瓦鋪底將熟艾四兩坐在瓦上以火燃之以藥椀覆上四畔泥封開孔出煙盡取刮下丸小豆大每甜竹葉湯下十丸

爛弦風眼黃連十文槐花輕粉少許爲末男兒乳汁和之飯上蒸過帛裹熨眼上三四次即效屢試有驗存仁方

暴赤眼痛宣黃連剉以雞子清浸置地下一夜次早濾過雞羽蘸滴目內選奇方下同

又方苦竹兩頭留節一頭開小孔入黃連片在內油紙封浸井中一夜次早服竹節內水加片腦少許外洗之

又海上方用黃連冬青葉煎湯洗之

又方用黃連乾薑杏仁等分爲末綿包浸湯閉目乘熱淋洗之

目卒痒痛乳汁浸黃連頻點眥中抱朴子云治目中百病外臺秘要

淚出不止黃連浸濃汁滴之肘後方

肝熱生醫不拘大人小兒黃芩一兩淡豉三兩爲末每服三錢以熟猪肝裹吃溫湯送下日二服忌酒麪衛生家寶方

眼目昏暗柴胡六銖決明子十八銖治篩人乳汁和傅目上久久夜見五色千金方

人睛忽垂至鼻如黑角塞痛不可忍或時時大便血出痛名曰肝脹用羌活煎汁服數盞自愈奇疾方

冷淚目昏貝母一枚胡椒七粒爲末點之備門事親

目生努肉用貝母眞丹等分爲末日點

又方用貝母丁香等分爲末乳汁調點肘後方

暑行目澀生龍膽搗汁一合黃連浸汁一匙和點之危氏得效方

眼中漏膿用草龍膽當歸等分爲末每二錢溫水下鴻飛集

內虛目暗補氣養血當歸生曬六兩附子火炮一兩爲末煉蜜丸梧子大每服三十丸溫酒下名六一丸聖濟總錄

一切眼疾白芷雄黃爲末煉蜜丸龍眼大硃砂爲衣每服一丸食後茶清下日二服名還睛丸普濟方

暴赤眼痛以管吹良薑末入鼻取嚏或彈出鼻血即散試驗方

一切眼疾血勞風氣頭運頭旋目眩荊芥穗爲末每酒服三錢龍木論

眼弦赤爛薄荷以生薑汁浸一宿曬乾爲末每用一錢沸湯泡洗經驗方

飛絲入目令人舌上生泡用紫蘇葉嚼爛白湯嚥之危氏得效方

暑月目昏多眵淚生龍腦薄荷葉搗爛生絹絞汁點之聖濟總錄

斑痘入目生醫障用白菊花穀精草菉豆各等分爲末每用一錢以乾柿餅一枚粟米泔一盞同煮候泔盡食柿日食三枚酒下淺者五七日遠者半月見效直指方

病後生醫白菊花蟬蛻等分爲散每用二三錢入蜜少許水煎服大人小兒皆宜屢驗救急方

眼目昏花雙美丸甘菊花一斤紅椒去目六兩爲末用新地黃汁和丸梧子大每服五十丸臨臥茶清下瑞竹堂方

火眼腫痛以艾燒烟起時椀覆之候烟盡椀上刮煤下以溫水調化洗眼即瘥更入黃連尤佳斗門方

眼熱赤腫山茵陳車前子等分煎湯調茶調散服數服直指方

積熱眼澀三月三日或五月五日采青蒿花或子陰乾爲末每井華水空心服二錢久服明目可夜看書名青金散十便良方

一切眼疾茴麻子一升爲末以獖猪肝批片蘸末炙熟再蘸再炙末盡乃爲末每服一字陳米飲下日三服聖濟總錄下同

目中醫膜久不愈者用麻實以柳木作磑磨去殼馬尾篩取黃肉去焦殼每十兩可得四兩非此法不能去殼也用猪肝薄切滾藥慢炙熟爲末酢和丸梧子

大每服三十丸白湯下
又方以麻實內袋中蒸熟暴爲末蜜丸溫水下
眼目昏暗蒼耳實一升爲末白米半升作粥日食之 普濟方
赤目生瘡作痛蒼耳末二兩乳香一錢每用一錢燒煙嗆鼻 聖濟總錄
一切眼疾籠茗燒灰淋汁洗之久之自效 經驗方
雜物入目白菱荷根取心搗絞取汁滴入目中立出 普濟方
內外障腎麻黃根一兩當歸身一錢同炒黑色入麝香少許爲末嗆鼻
目昏多淚木賊去節蒼木泔浸各一兩爲末每服二錢茶調下或蜜丸亦可
夜不合眼難睡燈草煎湯代茶飲即得睡 集簡方
物傷睛突輕者驗胞瞼痛重者目睛突出但目系未斷者即納之急搗生地黃綿裹傅之仍以避風膏藥護其四邊 聖濟總錄
睡起目赤腫起良久如常者血熱也臥則血歸於肝故熱則目赤起良久血散故如常也用生地黃汁浸梗米半升曬乾三浸三曬每夜以米煮粥食一盞數月即愈 醫方
眼暴赤痛水洗生地黃黑豆各二兩搗膏臥時以鹽湯洗目閉目以藥厚傅目上至曉水潤取下 聖濟總錄
蓦內赤目生地黃薄切溫水浸貼 小品方
內障青盲風赤生腎及墜眼日久撞損失明地黃花曬黑豆花曬槐花曬各一兩爲末猪肝一具同以水二斗煮至上有凝脂掠盡瓶收每點少許日三四次 聖惠方下同
眼生珠管牛膝井葉搗汁日點三四次
積年失明決明子二升爲末每食後粥飲服方寸匕 外臺秘要
青盲雀目決明一升地膚子五兩爲末米飲丸梧子大每米飲下二三十丸 普濟方
目赤腫痛決明子炒研茶調傅兩太陽穴乾則易之一夜即愈 醫方摘元
風熱赤目地膚子焙一升生地黃半斤取汁和作餅曬乾研末每服三錢空心酒服 聖惠方
目痛眯目中傷有熱屑者取地膚子白汁頻注目中 外臺秘要
物傷睛陷努肉突出地膚洗去土二兩搗絞汁每點少許冬月以乾者煮濃汁 聖惠方下同
目赤腫痛浸淫生瘡瞿麥炒黃爲末以鵝涎調塗臂頭即開或搗汁塗之亦可
眯目生腎其物不出者瞿麥乾薑炮爲末井華水調服二錢日二服
久患內障車前子乾地黃麥門冬等分爲末蜜丸如梧子大服之累試有效
風熱目睛澁痛車前子宣州黃連各一兩爲末食後溫酒服一錢日二服
目赤作痛用車前草搗取自然汁調砂硝末臥時塗眼胞上次早洗去小兒目痛車前草汁和竹瀝點之 聖濟總錄
目中微腎車前葉枸杞葉等分手中揉汁出以桑葉兩重裹之懸陰處一夜破桑葉取點不過三五度 十便良方
一切眼疾腎虛遮障凉腦治頭痛能生髮五月五日平旦合之蓮子草一握藍葉一握油一斤同浸密封四十九日每臥時以銅匙點藥摩頂上四十九遍久久甚佳 聖濟總錄下同
飛血赤目熱痛乾藍葉切二升車前草半兩淡竹葉切三握水四升煎二升去查溫洗冷即再煖以瘥爲度
爛弦風眼青黛黃連泡湯日洗 明目方
服丹石人毒發衝眼腫痛扁竹根一握洗搗汁服之 食療本草
三十年失明補肝散用蒺藜子七月七日收陰乾搗散食後水服方寸匕日二 外臺秘要
目中腎膜用穀精草防風等分爲末米飲服之甚驗 明目方
瘡後目腎隱澀淚出久而不退用穀精草爲末以柿或猪肝片燒食
又方穀精草眞蛤粉等分同入猪肝內煮熟日食之 濟急方
眼暴腫赤疼痛不得開淚出不止劏附子皮末如簪沙大著眥中以定爲度 備急方
肝傷目暗菟絲子三兩酒浸三日暴乾爲末雞子白和丸梧子大空心溫酒下三十丸 聖惠方下同
目中赤痛菟絲子苗搗汁塗之
爛弦風眼五味子蔓荊子煎湯頻洗之 談藪
目暗不見物冷淚浸淫不止及青盲天行目暗等疾取西國草一名畢楞伽一名覆盆子日暴乾搗極細

以薄綿裹之用飲男乳汁浸如人行八九里久用點目中卽仰臥不過三四日視物如少年禁酒麪油物按洪邁夷堅志云潭州趙太尉母病爛弦疳眼二十年有老嫗云此中有蟲吾當除之入山取草蔓葉咀嚼畱汁入筒中還以皂紗蒙眼滴汁漬下弦轉盼間蟲從紗上出數日下弦乾復如法滴上弦又得蟲數十而愈後以濟人多驗乃覆盆子葉也

倒睫拳毛因風入脾經致使風痒不住手擦日久赤爛拳毛入內將木鼈子仁搥爛以絲帛包作條左患塞右鼻右患塞左鼻其毛自分上下次服蟬蛻藥爲妙集效方

斑瘡入目馬錢子半箇輕粉水花銀硃各五分片腦麝香枯礬各少許爲末左目吹右耳右目吹左耳日二次飛鴻集

風熱赤眼白牽牛末以葱白煑研丸菉豆大每服五丸葱湯下服訖睡半時衛生家寶方下同

赤目痛濇不可忍王瓜蘺上大如彈丸紅色皮上有刺者九月十月采日乾槐花炒赤芍藥等分爲末每服二錢臨臥溫酒下

目睛暴痛防己酒浸三次爲末每一服一錢溫酒下

爛弦風眼九里光草卽千里及以笋殼葉包煨熟捻汁滴入目中經驗良方

諸般赤眼攀睛雲瞖菖蒲擂自然汁文武火熬作膏日點之效聖濟錄

眼瞼偷鍼獨生菖蒲根同鹽研傅壽域聖方

飛絲入目石菖蒲搥碎左目塞右鼻右目塞左鼻百發百中得效方下同

斑瘡入目浮萍陰乾爲末以生羊子肝半箇同水半盞煑熟搗爛絞汁調末服甚者不過一服已傷者十服見效

努肉攀睛青萍少許搗爛入片腦少許研勻貼眼上效

點眼去瞖蒼絲菜根一錢半搗爛卽葉如馬蹄開黃花者川楝子十五箇膽礬七分石決明五錢皂莢一兩海螵蛸二錢各爲末同菜根以水一鍾浸二宿去查一日點數次七日見效也集效方

睫毛倒入川石斛川芎藭等分爲末口內含水隨左右嚏鼻日三次

眼生花瞖澀痛難開景天搗汁日點三五次聖惠方

貼目取瞖用鵝不食草搗汁熬膏一兩爐甘石火煅童便淬三次三錢上等瓷器末一錢半熊膽二錢硇砂少許爲極細末作膏貼在瞖目上一夜取下用黃連黃蘗煎湯洗淨看如有再貼集效方

又方鵝不食草生按塞鼻玉璽集要詩云赤眼之餘瞖忽生草中鵝不食爲名塞於鼻內頻頻換三日之內復舊明

雀目夜昏七月七日九月九日取地衣草陰乾爲末酒服方寸匕日三服一月愈崔知悌方

斑瘡入眼馬屁勃蛇皮各五錢皂角子十四箇爲末入罐內鹽泥固濟燒存性研每溫酒服一錢集效方下同

天絲入目雞窠草燒灰淋汁洗之

飛絲入目腫痛葉下紅同鹽少許絹包滴汁入目仍以塞鼻左塞右右塞左

麥芒入目大麥煑汁洗之卽出孫眞人方

苦蕎麥皮黑豆皮菉豆皮決明子菊花同作枕至老目明雜興方

雜物眯目不出用生粟米七粒嚼爛取汁洗之卽出總錄

眼熱赤腫粟米泔澱極酸者生地黃等分研勻攤絹上方圓二寸貼目上熨之乾卽易

熱毒攻眼赤痛瞼浮用黑豆一升分作十袋沸湯中蒸過更互熨之三遍則愈普濟方

肝虛目暗迎風下淚用臘月牯牛膽盛黑豆懸風處取出每夜吞三七粒久久自明龍木論

赤眼腫痛有數種皆肝熱血凝也用消風熱藥服之夜用鹽收豆腐片貼之酸漿者勿用證治要訣

眼暗補中葱子半升爲末每取一匙煎湯一升半去查入米煑粥食之亦可爲末蜜丸梧子大食後米湯服一二十丸日三服食醫心鏡

目中風瞖作痛取薤白截斷安膜上令遍痛作復爲之范汪方

飛絲入目白菜揉爛帕包滴汁三二點入目中卽出普濟方

飛絲入目青芥汁點之如神揄元方

雀目不見眞紫芥菜子炒黑爲末用羊肝一具分作八服每用芥末三錢糝肝上笋籜裹定煑熟冷食以汁送下聖濟總錄下同

目中瞖膜芥子一粒輕手按入眼中少頃以井華水雞子清洗之

飛絲入目蔓菁菜揉爛帕包滴汁三兩點卽出也普濟方

明目益氣蕪菁子一升水九升煮汁盡日乾如此三度研細水服方寸匕日三亦可研水和米煮粥食外臺秘要

常服明目使人洞視腸胞用蕪菁子三升以苦酒三升煮熟日乾研篩末以井華水服方寸匕日三無所忌抱朴子云服之一年能夜視千金方

青盲眼障虛勞目暗但瞳子不壞者十得九愈用蔓菁子六升蒸之氣遍合甑取下以釜中熱湯淋之乃曝乾還淋如是三遍卽收杵爲末食上清酒服方寸匕日再服肘後方上

補肝明目蕪菁子淘過一升黃精二斤同和九蒸九曬爲末每空心米飲服二錢日再服

又方蔓菁子二升決明子一升和勻以酒五升煮乾曝爲末每服二錢溫水調下日二聖惠方

風邪攻目視物不明肝氣虛者用蔓菁子四兩入磁瓶中燒黑無聲取出入蛇蛻二兩又燒成灰爲末每服五分食後酒下日三服聖濟總錄

虛勞眼暗三月三日采蔓菁花陰乾爲末每服二錢空心井華水下久服長生可夜讀書

暴風客熱目赤腫痛塵者臘月取生薑搗絞汁陰乾取粉入銅青末等分每以少許沸湯泡澄清溫洗淚出妙聖濟總錄

冷淚目昏乾薑粉一字泡湯點洗之普濟方

赤眼澁痛白薑末水調貼足心甚妙普濟方

目忽不見令人嚼母薑以舌日舐六七次以明爲度聖濟總錄

目中卒痛乾薑削圓滑內皆中有汁出試之未盡更易千金方

目昏浮腎蘭香十七箇睡時水煎服久有效名方上

肝虛目淚煉成松脂一斤釀米二斗水七斗麴二斗造酒頻飲之

暴赤眼痛赤薺菜根杵汁滴之聖惠方

眼生腎膜薺菜和根莖葉洗淨焙乾爲細末每夜臥時先洗眼挑末米許安兩大眥頭澁痛忍之久久膜自落也聖濟總錄

眼目熱痛淚出不止蒴藋子搗篩爲末臥時銅筯點少許入目當有熱淚及惡物出甚佳又治眼中努肉夜夜點之

目中瘜肉淫膚赤白膜馬齒莧一大握洗淨和芒硝末少許綿裹安上瞼易之

雜物脉目不出用東牆上馬齒莧燒灰研細點少許於皆頭卽出也

目中出淚或出膿用馬齒莧子并莧菜子各半兩爲末綿裹銅器中蒸熱熨大眥頭膿水出處每熨以五十度爲率久久自絕聖惠方

活血明目濃搗豆爲末甘草湯調二錢日二服易簡方

眼目昏暗七月七日取苦瓠白瓤絞汁一合以酢二升古錢七文同以微火煎減半每日取沫納眥中神效千金方

努肉血腎秋間取小柄壺盧或小藥壺盧陰乾於緊小處鋸斷內空一小孔如眼孔大遇有此病將眼皮上下用手掙開將壺盧孔合定初雖甚痛苦然療肉血腎皆漸下不傷睛也經驗方

火眼赤痛五月取老黃瓜一條上開小孔去瓤入芒硝令滿懸陰處待硝透出刮下每點眼甚效本草綱目神方

眼流冷淚木耳一兩燒存性木賊一兩爲末每服二錢以清米泔煎服

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百七十卷目錄
醫部彙考一百五十
目門十三
單方二
鍼灸
導引
醫案

藝術典第一百七十卷
醫部彙考一百五十
目門十三
單方二

眼生黑花年久不可治者椒目炒蒼朮炒各一兩爲末酢糊丸梧子大每服二十丸酢湯下本事方

火盛病目西瓜切片曝乾日日服之遂愈瓜能降火也

眼赤作痛蓮實去皮研末一錢粳米半升以水煑粥常食普濟方

塵芒入目用大藕洗搗爛綿裹滴汁入目中即出也普濟方

目生膚醫龍腦末一兩日點三五度聖濟總錄

目赤目膜龍腦雄雀屎各八兩爲末以人乳汁一合調成膏日日點之無有不驗聖惠方

時行赤目黃蘗去麤皮爲末濕紙包裹黃泥固煨乾每用一彈子大紗帕包之浸水一盞飯上蒸熟乘熱熏洗極效

眼目昏暗每旦含黃蘗一片吐津洗之終身行之永無目疾普濟方

洗頭明目用鳳眼草即椿樹上叢生莢也燒灰淋水洗頭經一年眼如童子加椿皮灰尤佳正月七日二月八日三月四日四月五日五月二日六月四日七月七日八月三日九月二十日十月二十三日十一月二十九日十二月十四日洗之衛生易簡方

眼見諸物禽蟲飛走乃肝膽之疾青桐子花酸棗仁元明粉羌活各一兩爲末每服二錢水煎和查日三服經驗良方

目熱昏暗槐子黃連二兩爲末蜜丸梧子大每漿水下二十丸日二服

胎赤風眼槐木枝如馬鞭大長二尺作二段齊頭麻紮一處置銅鉢子內晨使童子一人以其木研之至瞑乃止令仰臥以塗目三四次瘥

赤眼生瞖秦皮一兩水一升半煑七合澄清日日溫洗一方加滑石黃連等分外臺秘要

眼暴腫痛秦皮黃連各一兩苦竹葉半升水二升半煑取八合食後溫服

赤眼睛痛秦皮一兩清水一升白椀中浸春夏一食頃以上有碧色出即以筯頭纏綿仰臥點令滿眼微痛勿畏良久瀝去熱汁日點十度以上不過兩日瘥也外臺秘要

眼弦偷針乃肝脾積熱剉秦皮夾沙糖水煎調大黃末一錢微利佳直指方

洗頭去風明目用槵子皮皂角胡餅菖蒲同搥碎漿水調作彈子大每用湯泡洗頭良多能鄙事

飛血赤眼櫸皮去麤皮切二兩古錢七文水一升半煎七合去查熱洗日二次聖濟總錄

雜物眯眼新桑根皮洗淨搥爛入眼撥之自出聖惠方

青盲洗法新摘青桑葉日乾按日就地上燒存性每以一合於瓷器中煎減二分傾出澄清溫熱洗目至百度屢試有驗正月初八二月初八三月初六四月初四五月初六六月初二七月初七八月二十九月十二十月十三十一月初二十二月三十普濟方

風眼下淚臘月不落桑葉煎湯日日溫洗或入芒硝集簡方

赤眼澀痛桑葉爲末紙卷燒烟熏鼻取效普濟方

目赤腫痛桑灰一兩黃連半兩爲末每以一錢泡湯澄清洗之聖濟總錄

洗青盲眼正月八二月八三月六四月四五月五六月二七月七八月二九月十二十月十七十一月二十六十二月三十日每遇上件神日用桑柴灰一合煎湯沃之於瓷器中澄取極清稍熱洗之如冷即重湯頓溫不住手洗久久視物如鷹鶻也一法以桑灰童子小便和作丸每用一丸泡湯澄洗龍木論

飛絲入目柘漿點之以絹蘸之拭去

洗目令明柘木煎湯按日溫洗自寅至亥乃止無不效者正月初二二月初二三月不洗四月初五五月十五六月十一七月初七八月初二九月初二十月十九十一月不洗十二月十四日徐神翁方也

肝熱生瞖用楮實子研細食後蜜湯服一錢日再服直指方

目昏難視楮桃荊芥穗各五百枚爲末煉蜜丸彈子

大食後嚼一丸薄荷湯下一日三服（衛生易簡方）

一切眼瞖三月收穀木軟葉曬乾爲末入麝香少許每以黍米大注眥內其瞖自落（聖惠方下同）

暴赤眼痛磣澀者嫩楮枝去葉放地火燒以椀覆之一日取灰泡湯澄清溫洗

目中瞖膜楮白皮暴乾作一繩子如釵股大燒灰細研每點少許五六次瘥乃止（崔氏方）

利氣明目枳殼麩炒二兩爲末點湯代茶

內障目瞖如偃月或如棗花用象膽半兩鯉魚膽七枚熊膽一分牛膽半兩麝香一分石決明末一兩爲末糊丸菉豆大每茶下十丸日二（總錄）

赤目障瞖熊膽丸每以膽少許化開入冰片一二片銅器點之絕奇或淚痒加生薑粉些須（齊東野語）

胎赤爛眼昏暗用蠍虎數枚以罐盛黃土按實入蠍虎在內勿令損傷以紙封口穿數孔出氣候有尿數粒去糞上一點黑者只取一頭白者唾津研成膏塗眼睫間周圍不得揩拭來早以溫漿水洗三次甚效（聖濟總錄）

目中赤瞖白羊髓傅之（千金方）

目赤熱痛看物如隔紗宜補肝益精用青羊肝一具切洗和五味食之（心鏡）

肝虛目赤青羊肝薄切水浸吞之極效（龍木論）

治風熱生膚赤白眼及去眼中風癢痛搗枸杞子汁點眼立驗亦治暴赤眼風熱赤膜一方用葉搗汁銜滿口待稍溫就嚥之

目病䀮䀮以銅器煑青羊肝用麪餅覆器上鑽兩孔如人眼大以目向上熏之不過三度（千金方）

目病失明青羖羊肝一斤去膜切片入新瓦內炕乾同決明子半升蓼子一合炒爲末以白蜜漿服方寸匕日三不過三劑目明至一年能夜見文字（食療）

不能遠視羊肝一具去膜細切以葱子一勺炒爲末以水煑熟去查入米煑粥食（多能鄙事）

青盲內障用白羊肝一具黃連一兩熟地黃二兩同搗丸梧子大食遠茶服七十丸日三服崔承元病內障喪明有人惠此方報德服之遂明（傳信方）

治風赤澀痛取訶梨勒核入白蜜研注目中神良一方以鷹嘴者一枚滴蜜於石磨點

睛上生暈不問久新鯉魚長一尺二寸者取膽滴銅鏡上陰乾竹刀刮下每點少許（總錄）

赤眼腫痛用鯉魚膽十枚膩粉一錢和勻瓶收日點（聖濟總錄）

治眼瞖及諸物入眼以左手中指甲洗淨候乾以刀刮其屑用燈草蘸點眼中瞖處一二次即去或用懷孕婦人指甲屑置目中去瞖

拳毛倒睫無名異末摻捲紙中作撚子點著至藥末處吹殺以烟熏之自起

蠶沙一兩虢丹五錢慢火熬成膏入輕粉五分熬黑色逐時湯泡洗

摘去拳毛以虱子血點入眼內數次即愈

冷淚久昏開元銅錢一百文背上有月者更妙甘草去皮三錢青鹽一兩半於白磁器內用無根水一大椀浸七日每著一盞洗無力換洗到十日約添甘草青鹽每日洗三次忌食五辛驢馬雞魚葷酒

迎風冷淚烏雞膽汁臨臥點眼中

不時熱淚鷓鴣魚骨研極細末點目中

飛絲入目用頭垢點入眼中

眼目昏暗用砂硝六錢重用水一盞煎至八分候冷定澄清下次分定每月一日洗至一年之間眼如童子光明正月初一二月初八三月初四四月初五五月初五六月初四七月初五八月初一九月十三十月十三十一月十六十二月初五

物落眼中用新筆蘸繳出

稻麥芒入眼取蠐螬以新布覆目上待蠐螬從布上摩之其芒出著布上

晚蠶沙香油浸月餘重緜濾過點之治爛弦

紫金膏用水飛過虢丹蜜多水少文武火熬以器盛之點眼

眼赤瞎以青泥蛆淘淨曬乾末之仰臥合目用藥一錢放眼上須臾藥行待少時去藥赤瞎自無

沙石草木入目中不出以雞肝汁注之

又方以書中白魚和乳汁注目中

目中眯法旦起對門戶跪拜云戶門狹小不足宿客乃便瘥

眼目昏暗用鷹眼睛一對炙乾搗末研令極細以人乳汁再研每以銅筯取少許點於瞳人上日夜三度可以夜見物或取臘月鴝鵒眼依上法用效三日見碧霄中物忌烟熏

治冷淚用胞棗一枚去核以花椒二十粒入內用濕紙裹煨熟細嚼白湯下

治暴赤眼削附子赤皮末加蠶屎著眥中

攀睛瞖膜昏澀風毒腫痛用瓜蔞一枚割下頂蓋取

瓤井子同猪脈子搗勻却裝在瓜蔞內用原蓋蓋之坐淨土上取桑條子十兩約長四五寸簇瓜蔞上用炭火燒扇之煙盡將成灰即住火扇冷和灰通研極細每用二錢沸湯浸澄清去脚洗之

鍼灸

素問曰足太陽有通項入於腦者正屬目本名曰眼系頭目苦痛取之在項中兩筋間入腦乃別陰蹻陽蹻陰陽相交陽入陰陰出陽交於目銳眥陽氣盛則瞋目陰氣盛則瞑目

肝病者兩脅下痛引少腹令人善怒虛則目䀮䀮無所見耳無所聞善恐如人將捕之取其經厥陰與少陽

目中赤痛從內眥始取之陰蹻

靈樞經曰黃帝曰人之哀而泣涕者何氣使然岐伯曰心者五臟六腑之主也目者宗脈之所聚也上液之道也口鼻者氣之門戶也故悲哀愁憂則心動心動則五臟六腑皆搖搖則宗脈感宗脈感則液道開液道開故泣涕出焉液者所以灌精濡空竅者也故上液之道開則泣泣不止則液竭液竭則精不灌精不灌則目無所見矣故命曰奪精補天柱經挾頸

甲乙經曰刺面中流脈不幸爲盲

頭腦中寒鼻衄目泣出神庭主之

頭痛目眩頸項強急本神主之

頰清不得視口沫泣出兩目眉頭痛臨泣主之

頸痛項不得顧目泣出多眵䁾鼻鼽衄目內眥赤痛氣厥耳目不明咽喉嘍引項筋攣不收風池主之

熱病頭痛引目外眥而急煩滿汗不出引頷齒面赤皮痛懸釐主之

頭風目欲如脫汗出寒熱面赤頰中痛項椎不可左右顧目系急瘈瘲攢竹主之

肩背痛目不開天牖主之

熱病煩心而汗不止肘攣腋腫善笑不休心中痛目赤黃太陵主之

面赤皮熱熱病汗不出中風熱目赤黃內關主之

鼻鼽衄熱病汗不出䁾目目痛瞑頭痛泣出陽谿主之

目痛引眥少腹偏痛視昏嗜臥照海主之瀉左陰蹻取足左右少陰前先刺陰蹻後刺少陰氣在橫骨上目外眥赤痛頭眩兩頷痛塞逆泣出耳鳴聾多汗目痒胷中痛不可反側痛無常處俠谿主之

目視不明振寒目瞖瞳子不見丘墟主之

鼽衄血不止淫濼頭痛目白瞖跟尻瘈頭頂腫痛泄注上搶心目赤眥爛無所見痛從內眥始京骨主之

其目泣出頭不痛者聽會主之

目中赤痛從內眥始取之陰蹻

目中痛不能視上星主之先取譩譆後取天牖風池

青盲遠視不明承光主之

目瞑遠視䀮䀮月光主之

目䀮䀮赤痛天柱主之

目眩無所見偏頭痛引外眥而急頷厥主之

目不明惡風日淚出憎寒目痛目眩內眥赤痛目䀮䀮無所見眥痒痛淫膚白瞖睛明主之

青盲無所見遠視䀮䀮目中淫膚白膜覆瞳子目窻主之

目不明淚出目眩瞀瞳子痒遠視䀮䀮昏夜無見目瞤動與項口參相引喎僻口不能言刺承泣

目痛口僻戾目不明四白主之

目赤黃顴帘主之

睊目水溝主之

目痛不明齗交主之

目瞑身汗出承漿主之

青盲䁾目惡風寒上關主之

青盲商陽主之

䁾目目䀮䀮徧歷主之

眼痛下廉主之

䁾目目䀮䀮少氣灸手五里左取右右取左

目中白瞖目痛泣出甚者如脫前谷主之

白膜覆珠瞳子無所見解谿主之

千金方云去瞖法以鵝翎切之近黑睛及當白睛之膜自聚上以鍼鉤挽之割去即明見物以綿著眼斷血三日瘥

儒門事親曰暴盲不見物鍼攢竹及項前五穴又刺鼻中大出血立明

易老云眼腫痛睛欲出須八關大刺手十指間出血即愈

衛生寶鑑曰眼戴上不能視灸脊第二椎骨第五椎

骨上各七壯一齊下火立愈

得效方云青盲灸巨髎又取肝俞命門商陽

古今醫統曰目病風熱者多次血虛腎水不足宜絲竹空上星百會宣洩之痛者灸風池合谷

風寒外搏連腦痛者灸二間合谷

醫學綱目曰努肉攀睛取睛明風池期門太陽出血

爛弦風取大骨空灸九壯以口吹火滅小骨空灸七壯亦吹火滅又以三稜針刺眶外出血即愈

迎風冷淚臨臥黑花取大骨空小骨空灸之吹火滅又取臨泣合谷

目昏暗灸三里鍼承泣又取肝俞瞳子髎

眼睛痛取風府風池通里合谷申脈照海大敦厥陰至陰

目赤腫醫鑑明隱濕取上星百會攢竹絲竹空睛明瞳子髎太陽合谷又以草莖刺鼻孔出血數升即愈

眼暴赤腫痛取神庭上星顱會前頂百會出血即愈又取光明五會

雀目取神庭上星前頂百會睛明出血即愈又取肝俞照海

諸障醫取睛明四白太陽百會商陽厲兌光明各出血合谷三里命門肝俞光明各灸之

內障取足厥陰足少陰陽蹻

針內障眼法歌內障由來十六般學醫人子審須看分明一一知形狀下針方可得安然若將針法同圓醫誤損神光取瘡難冷熱光明虛與實調和四體待令安不然氣悶違將息嘔逆勞神醫却翻咳嗽震頭皆未得多驚先服鎮心丸若求涼藥銀齊等用意臨時體候看老醫細針初復嫩針形不可一般般病虛新產懷娠月下手纔知將息難不雨不風兼皓月清齋三日在針前安心定意行醫道念佛親姻莫雜喧患者向明盤膝坐提撕腰帶得心安針者但行賢哲路惻隱之情實善緣有血莫驚須住手裹封如舊再開看忽然驚振醫重下服藥三旬見朗然七日解封難見日花生水動莫他言還睛丸散堅心服百日分明復舊根

針內障後法歌內障金針針了時醫師言語要深知緜包黑豆如毬子眼上安排日係之臥眠頭枕須安穩仰臥三朝莫厭遲封後忽然微有痛腦風牽動莫他疑或針或烙依經法痛極仍將火熨之擬吐白梅銜咽下吐來仰臥却從伊起則恐因遭努損雖然稀有也須知七朝豉粥溫溫食震著牙關事不宜大小便時須緩緩無令自起要扶持高聲叫喚言多後驚動睛輪見雪飛如此志心二十日漸行出入認親知狂心莫憶陰陽事夫婦分牀百日期一月不須臨洗面針痕還著痛微微五腥酒勢月年斷服藥平除病本基

右龍木論金針開內障大法謹按其法初患眼內障之時其眼不痛不澀不痒頭不旋不痛而瞖狀已結成者宜金針撥去其瞖如撥雲見日而光明也今具其略於後

圓瞖初患時見蠅飛花發垂簾薄烟輕霧先患一眼次第相牽俱圓瞖如油點浮水中陽看則小陰看則大金針一撥即去

滑瞖瞖如水銀珠宜金針撥之

澀瞖瞖如凝脂色宜針撥之

浮瞖藏形於睛之深處細看方見宜針深撥之

橫瞖橫如劍脊兩邊薄中央厚宜針於中央厚處撥之已上五瞖皆先患一目向後俱損初患之時其眼痛澀頭旋額痛雖有瞖狀亦難針撥獨偃月瞖棗花瞖黑水疑瞖微有頭旋額痛者宜針輕撥之

冰瞖初患時頭旋額痛者眼瞼骨鼻頰骨痛目內赤澀先患一眼次後瞖如冰凍堅白宜於所過經脈針其俞穴急出血宜針撥動不宜強撥

偃月瞖初患時微微頭旋額痛先患一目次第相牽俱損其瞖一處厚一處薄宜針先從厚處撥之

棗花瞖初患時微有頭旋眼澀眼中時時痒痛先患一眼而後俱瞖周圍如鋸齒輕針撥去莫留短脚兼於所過之經針灸其俞

散瞖瞖如酥點乍青乍白宜針撥之

黑水疑瞖初患時頭旋眼澀見花黃黑不定瞖疑結青色宜針撥之

驚振瞖頭腦被打築惡血流入眼內至二三年成瞖白色先患之眼不宜針牽損後患之眼宜針之

雖不痛不痒其瞖黃色紅色者不宜針撥瞖狀破散者不宜針撥中心濃重者不宜針撥撥之不動者曰死瞖急撥獨白瞖黃心宜先服藥後針之若無瞖者名曰風赤不宜針

白瞖黃心瞖四邊白中心黃者先服逐瞖散次針足陽明經所過諸穴後用金針輕撥若先患一眼向後失治兩目俱損

烏風無瞖但瞳人小三五年內結成瞖青白色不宜

針視物有花爲虛宜藥補不宜藥瀉
肝風無瞖眼前多見虛花或白或黑或赤或黃或見一物二形二眼同患急宜補治切忌房勞
五風變初患時頭旋額痛或一目先患或因久吐雙目俱暗瞳子白如霜
綠風初患時頭旋額角偏痛連眼瞼眉及鼻頰骨痛眼內痛澀先患一眼向後俱損無瞖目見花或紅或黑
黑風初患時頭旋額偏痛連眼瞼鼻頰骨痛眼內痛澀先患一眼向後俱損無瞖眼見黑花
青風初患時微有痛澀頭旋腦痛先患一眼向後俱損無瞖勞倦加昏重眼見青花
雷頭風變初患時頭旋惡心嘔吐先患一目次第相牽俱損瞳神或大或小疑脂結白
內經針灸白眼痛有四法其一取足太陽經云目痛赤脈從上下者太陽病故知取之也
其二取足陽明經云目痛赤脈從下上者陽明病故知取之也
其三取足少陽經云目痛赤脈從外走內者少陽病又手足少陽之脈所生病者皆目銳眥病故知取之也
其四取蹻脈經云邪客足陽蹻之脈令人目痛從內眥始刺外踝之下半寸所左刺右右刺左又云目中赤痛從內眥始取之陰蹻也
針灸黑珠痛有三法其一取足太陽經云足太陽有過項入於腦者正屬目本名曰眼系頭目若痛取之在項中兩筋間是也
其二取足厥陰經云肝足厥陰之脈上入頏顙連目系故取之也
其三取少陰經云手少陰之別名曰通里屬目系取之掌後一寸也又足少陽之正陽明之正皆繫目系經無取法也
針灸內障有四法靈樞口問篇哀而泣涕補天柱經俠頸是其一也
其二取肝經曰肝虛則目䀮䀮無所見善恐取其經厥陰與少陰取血者是也
其三取腎經曰腎足少陰之脈是動則病目䀮䀮無所見視寒熱虛實取之也
其四取陽蹻經曰邪之所在皆爲不足上氣不足目爲之瞑補足外踝下留之是也
久病昏花取肝腧一分沿皮向外一寸半補三呼三里一寸瀉十吸童子髎
景岳全書曰睛明風池太陽神庭上星顖會百會前頂攢竹絲竹空承泣目窗客主人承光以上諸穴皆可用鍼或以三稜鍼出血凡近目之穴皆禁灸
大骨空穴在手大指第二節尖灸九壯以口吹火滅
小骨空穴在手小指第二節尖灸七壯以口吹火滅
此二穴能治迎風冷淚風眼爛弦等證
合谷治陽明熱鬱赤腫瞖障或迎風流淚灸七壯大抵目疾多宜灸此末不再發也亦可鍼
翳風灸七壯治赤白瞖膜目不明
肝俞灸七壯治肝風客熱迎風流淚雀目
足三里灸之可令火氣下降明目
二間命門此二穴可灸水溝可鍼可灸治目睛直視
手三里灸右目取左左目取右
八關大刺治眼痛欲出不可忍者須刺十指縫中出血愈

導引

保生祕要曰導引對香靜坐灰心歇念目含光意覺香頭有灰以意吹之又靜覺灰又吹香盡爲期治一切雲瞖努肉攀睛腎水枯心火盛皆效
又先以手抱崐崙仰頭吐氣或噓或呵瀉而復納次以二目轉動左右上下轉時先開後閉閉而復開隨時行之不間或運或動二者兼之
運功法行艮背右旋上行逾崐崙經明堂漸旋至眼細圈入瞳神撒散數十度降胃膽曲行大腸出谷道退火復歸元位左目運左右目運右左右齊患從明堂分行雙運
又雙瞳藏於兩腎想腎水浸洗能退熱運徹四散能去風雙目觀二腎存兩道白水運至眼中著意圈洗磨剝單去瞖想二乳下肺肋推下脚股吹吸之法能退白上紅以雙手向肩厓兩脚心懸空噓吸乃退黑睛熱能泄肝經之火常注念臍縧取腎水升洗覆臍效
資生曰養目力者常瞑

讀書博奕過度患目名曰肝勞非三年閉目不可治古人治肝勞有養之之法彭眞人患目疾不計晝夜瞑目注視閉之少頃依法再行積功而視秋毫徐眞人亦患目疾暗室正坐運睛旋還八十一數閉目集神再運不數年而神光自現狀如金輪永除昏暗施眞人歌曰運睛除目暗皆養之之法也

熱摩手心熨兩眼每二七遍使人眼目自無障翳明目去風無出於此

常以手按兩眉後小空中三九過又以手心及指摩兩目下顴上以手提三四十過摩令微熱輒以手逆乘額三九過從眉中上行入髮際以口嚥唾無數如此常行日即清明一年可夜讀書

醫案

元史李杲傳魏邦彥之妻目瞤暴生從下而上其色綠靡痛不可忍杲云腎從下而上病從陽明來也綠非五色之正殆肺與腎合而爲病邪乃瀉肺腎之邪而以入陽明之藥爲之使既效矣而他日病復作者三其所從來之經與腎色各異乃曰諸脈皆屬於目脈病則目從之此必經絡不調經不調則目病未已也問之果然因如所論而治之疾遂不作

齊東野語曰熊膽善辟塵試之之法以淨水一器塵暴其上投膽粟許則凝塵鬆然而開以之治目障翳極驗每以少許淨水略調開盡筋膜塵土入冰腦一二片或淚痒則加生薑粉些小時以銀筯點之絕奇赤眼亦可用余家一老婢俱以此奏效

九靈山房集曰元末四明有呂復別號滄洲翁深於醫道臨川道士蕭雲泉眼中視物皆倒植請治於復復問其因蕭曰某嘗大醉盡吐所飲酒熟睡至天明遂得此病復切其脈左關浮促即告之曰嘗傷酒大吐時上焦反覆致倒其膽腑故視物皆倒植此不內外因而致內傷者也法當復吐以正其膽遂以藜蘆瓜蒂爲劑未用水煎之使平旦頓服以吐爲度吐畢視物如常

道山清話曰張子顏少卿晚年常目光閃閃然中有白衣人如佛相者子顏信之彌謹乃不食肉不飲酒然體瘠而多病矣一日從汪壽卿求診壽卿一見大驚不復言但投以大丸數十小丸千餘粒囑曰十日中服之當盡却以示報既如期視所見白衣人衣變黃而光無所見矣乃欲得肉食又思飲酒又明日俱無所見覺氣體異他日矣乃請壽卿以告壽卿曰吾固知矣公脾初受病爲肺所乘心脾之母也公既多疑心氣不固自然有所覩吾以大丸實其脾小丸補其心肺爲脾之子既不能勝其母其病自愈也

北夢瑣言曰有少年苦眩暈眼花常見一鏡子趙卿診之曰來晨以魚鰾奉候及期延於內從容久俟客退方得攀接俄而檯上施一甌芥醋更無他味少年儌甚聞芥酢香徑啜之逡巡再啜遂覺胷中豁然眼花不見卿曰郎君嗜魚鰾太多芥酢不快又有魚鱗在胷中所以眼花故權誑而愈其疾也

夢溪筆談曰有一人家妾視直物如曲弓弦界尺之類視之皆如鉤醫僧奉眞親見之

雲麓漫抄曰淮南陳吉老儒醫也有富翁子忽病視正物皆以爲斜八案書席之類排設整齊必更移令邪自以爲正以至書寫尺牘莫不皆然父母甚憂之更歷數醫皆不諳其疾或以吉老告遂以子往求治既診脈後令其父先歸留其子設樂開宴酬勸無算至醉乃罷扶病者坐轎中使人舁之高下其手常令傾倒展轉久之方令登榻而臥達旦酒醒遣之歸家前日斜視之物皆理正之父母躍然而喜且詢治之之方吉老云令嗣無他疾醉中嘗閃倒肝之一葉搭於肺上不能下故視正物爲斜今復飲之醉則肺脹展轉之間肝亦垂下矣藥安能治之哉富翁厚爲之酬

許學士曰荀牧仲嘗謂予曰有人視一物爲兩醫作肝氣盛故見一爲二服瀉肝藥皆不驗此何疾也予曰孫眞人曰靈樞有云目之系上屬於腦後出於項中則視岐故見兩物也令服驅風入腦藥得愈

儒門事親曰戴人女僮至西華目忽暴盲不見物戴人曰此相火也太陽陽明氣血俱盛乃刺其鼻中攢竹穴與項前五穴大出血目立明

青州王之一子年十餘歲目赤多淚衆工無效戴人見之曰此兒病目翳當得之母腹中被驚其父曰妊娠時在臨淸被圍戴人令服瓜蒂散加鬱金上涌而下泄各去涎沫數升人皆笑之其母亦曰兒腹中無病何吐瀉如此至明日其目耀然爽明李仲安見而

爲曰奇哉此法救人其日又與頭上出血及鼻中皆出血吐時次用通經散二錢舟車丸七十粒自吐却少半又以通經散一錢投之明日又以舟車丸二十粒投之下七八行病更不作矣

李民範目常赤至戊子年火運君火司天其年病目者往往暴盲運火炎烈故也民範是年目大發遂遇戴人以瓜蒂散涌之赤立消不數日又大發其病之來也先以左目內皆赤發牽睛狀如鋪麻左之右次銳背發亦左之右赤貫瞳子再涌之又退凡五次發亦五次皆涌又刺其手中出血及頭上鼻中皆出血上下中外皆奪方能戰退然不敢觀書及見日張云當候秋涼再攻則愈火方旺而在皮膚雖攻其裏無益也秋涼則熱漸入裏方可擒也惟宜暗處閉目以養其神水暗與靜屬水明與動屬火所以不宜見日也蓋民範因初愈後曾暑出門故痛連發不愈如此涌泄之後不可常攻使服鼠黏子散以退腎

安喜趙君玉目暴赤腫點洗不退偶思戴人語曰凡病在上者皆宜吐乃以茶調散涌之一涌赤腫消散君玉歎曰法之妙其迅如此乃知法不遠人人自遠法也

余嘗病目赤或腫或腎作止無時偶至新息帥府百餘日羞明隱澀腫痛不已忽眼科姜仲安云宜刺上星至百會速以鈹鍼刺四五十刺攢竹穴絲竹空穴上兼眉際二十刺及鼻兩孔內以草莖彈之出血如前約二升許來日愈大半三日平復如初

東垣十書曰戊申六月徐總管患眼疾上眼皮下出黑白腎二點隱澀難開兩目緊縮而不痛兩寸脈細緊按之洪大而無力乃足太陽膀胱爲命門相火煎熬逆行作寒水腎及寒膜遮睛阿欠善悲健忘噦噴賅淚時下面赤而白能食大便難小便數而欠氣上而喘以撥雲湯治之而愈

丹溪心法曰一老人病目暴不見物他無所苦起坐飲食如故此大虛證也急煎人參膏二斤服二日目方見一醫與青蒙石藥予曰今夜死矣不悟此病得之氣大虛不救其虛而反用蒙石不出此夜必死果至夜半死

一男子四十餘歲平生好飲熱酒忽目盲脈滿此因熱酒傷胃氣污濁之血死在其中而然也遂以蘇木作湯調人參膏飲之服二日鼻內兩手掌皆紫黑曰此病退矣滯血行矣以四物加蘇木紅花桃仁陳皮煎調入參末服數日而愈

一男子五十五歲九月間早起忽開眼無光視物不見急就睡片時却能見人物竟不能辨其何人何物飲食減平時之半神思極倦脈之緩大四至之上重按則散而無力予作受濕治訓之果因臥濕地半箇月得此證遂以白朮爲君黃芪茯苓陳皮爲臣附子爲佐十餘貼而安此上三方治目暴盲皆爲氣脫而用參朮追回者也經云上三方治目暴盲五穀味熏腐充身澤毛若霧露之溉是謂氣脫者目不明即其證也

海藏曰妻姪女形肥笋年時得目疾每月或二月一發發則紅腫難開如此者三年服除風散熱等劑左目反有頑腎從銳背遮睛人右目亦有腎從下而上經云從內走外者少陽病從下上者陽明病予謂此少陽陽明二經有積滯也脈短滑而實鼓長則似短澀潔古有云短爲有積滯遏抑臟腑宜下之遂用溫白丸減川芎附子下之後多加龍膽草黃連如東垣五積法從二丸加起每日加一丸至大利然後減丸又從一丸加起忽一日於利中下墨血塊若干如黑豆大而硬堅從此漸痊而腎盡去

衛生寶鑑云省郎中張子敬六十七歲病眼目昏暗脣微黑色皮膚不澤六脈弦細而無力一日出示治眼二方問予可服否予曰此藥皆以黃連大苦之藥爲君諸風藥爲使人年五十腸汁減而目始不明內經云土位之主其瀉以苦諸風藥亦皆瀉土人年七十脾胃虛而皮膚枯重瀉其土使脾胃之氣愈虛而不能營運營衛之氣滋養元氣胃氣不能上行膈氣吐食諸生焉又已年高衰弱起居皆不同此藥不可服只宜慎言語節飲食懲忿窒慾此不治之治也子敬以爲然明年春除關西路按察使三年致仕還精神清勝脈遂平和此不妄服寒藥之效也內經云誅罰無過是謂大惑解之可也

醫學入門曰一乳婦因大恐目張不得瞑公袭椰李仁酒飲之使醉則愈所以然者目系肝膽恐則氣結膽橫不下惟椰李仁去結隨酒入膽結去膽下則目能瞑矣

醫學綱目曰夏枯草治目珠疼至夜則疼甚者神效或用苦寒藥點之反疼者亦神效蓋目珠者連目本又各系屬厥陰之經也夜甚及用苦寒藥點之反甚者夜與寒亦陰故也丹溪云夏枯草有補養厥陰血脈之功其草三四月開花遇夏至陰生則枯蓋稟純陽之氣也至哉斯言故治厥陰目疼如神者以陽治

陰也予男至夜目珠及連肩稜骨作疼頭半邊腫痛用黃連膏點之反大疼百藥不效灸厥陰少陽疼隨止半日又作又灸又止月餘遂以夏枯草二兩香附末二兩甘草四錢同爲細末每服一錢半用清茶調服下咽則疼減大半至四五日良愈

一男子六十餘歲所患與前證皆同但黑睛有白翳二點諸藥不效亦以此藥與東垣選奇湯加四物湯及黃連煎間服并灸厥陰少陽而安

仁廟朝中衛才人忽患眼疼衆醫皆不能療或投寒藥或投補藥加之腑臟不安上乃問孫孫曰臣非眼科乞不全責於臣降旨有功無過孫乃診之肝脈弦滑非熱證也乃才人年壯血盛肝血併不通遂問及宮人月經已二月不通衆醫曰有孕孫曰此正爲病耳遂下通血藥其經既通不日眼疾亦愈上賜錢三十萬才人贈金一裹宮人謠曰神醫不來雙目難開薛己醫案云戊戌冬初李叔和至西京朋友待之以猪肉煎餅同蒜酢食之後復飲酒大醉臥於煖炕翌日病眼兩瞳子散大於黑睛視物無的以小爲大以短爲長卒然見非常之處行步踏空多求醫療而莫之愈至己亥春求治於先師曰內經有云五臟六腑之精氣皆注於目而爲之精精之窠爲眼骨之精爲瞳子又云筋骨氣血之精而爲脈并爲系上屬於腦又瞳子黑眼法於陰今瞳子散大者由食辛熱之物過多故也所謂辛主散熱則助火上乘於腦中其精故散精散則視物亦散大也夫精明者所以視萬物者也今視物不眞則精衰矣蓋火之與氣勢不兩立故經云壯火食氣壯火散氣手少陰足厥陰所主風熱連目系邪之中人各從其類故循此道而來攻頭目腫悶而瞳子散大皆血虛陰弱故也當除風熱凉血益血以收耗散之氣則愈矣滋陰地黃丸內經云熱淫所勝平以鹹寒佐以苦甘酸以收之以黃連黃芩大苦寒除邪氣之盛爲君當歸身辛溫生熟地黃苦甘寒養血凉血爲臣五味子酸寒體輕浮上收瞳子之散大人參甘草地骨皮天門冬枳殼苦甘寒瀉熱補氣爲佐柴胡引用爲使也忌食辛辣物而助火邪及食寒冷物損胃氣藥不能上行也

給事張禹功目赤不明服祛風散熱藥反畏明重聽脈大而虛此因勞心過度飲食失節以補中益氣加茯神棗仁山藥五味頓愈又勞役復甚用十全大補兼以前藥漸愈却用補中益氣加前藥而痊東垣云諸經脈絡皆走於面而行空竅其清氣散於目而爲精走於耳而爲聽若心煩事冗飲食失節脾胃虧損心火太甚百脈沸騰邪害空竅而失明矣況脾爲諸陰之首目爲血脈之宗脾虛則五臟之精氣皆爲失所若不理脾胃不養神血乃治標而不治本也

一儒者日晡兩目緊澁不能瞻視此元氣下陷用補中益氣倍加參芪數劑全愈

一男子亦患前證服黃藥知母之類更加便血此脾虛不能統血肝虛不能藏血也用補中益氣六味地黃而愈

一儒者兩目作痛服降火祛風之藥兩日如焚熱倦殊甚余用十全大補湯數劑諸證悉退服補中益氣湯兼六味丸而愈復因勞役午後目渴體倦服十全大補而痊

一男子年二十素嗜酒色兩目赤痛或作或止兩尺洪大按之微弱余謂少年得此目當失明翌早索途而行不辨天日衆皆驚異余與六味地黃丸料加麥門五味一劑頓明

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百七十一卷目錄
醫部彙考一百五十一
鼻門一
黃帝素問　金匱眞言論　陰陽應象大論　五藏別論　藏氣法時論　熱論　刺熱篇　繆刺篇　氣厥論　氣交變大論　眼科篇　至眞要大論　病能論　奇病論　大奇論　脈解篇　刺法論　刺瘧篇　氣穴論　骨空論　水熱穴論　調經論　繆刺論　四時刺逆從論　標本病傳論　經脈篇　本神篇　經脈別論　平人氣象論　玉機眞藏論　三部九候論　脈要精微論　五藏生成篇　五藏別論　五藏安和篇　五藏化象篇

歲木不及復則欬而鼽

註 肺開竅於鼻故欬而鼽鼽者鼻流清涕也復爲母鬱而子復也

歲金不及民病鼽嚏

註 鼽嚏肺病也

脈解篇

陽明所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫者陽明并於上上者則其孫絡太陰也故頭痛鼻鼽腹腫也

註 陰陽之氣上下升降內外出入行於脈外之氣分也氣分者皮膚肌腠之間上謂皮膚之上也夫諸脈之浮而常見者皆絡脈也足太陰之脈亦見於皮膚之上而無所隱是以陽明之氣并於上則迫於陽明之孫絡與太陰之經脈也迫於陽明之孫絡則頭痛鼻鼽迫於太陰之經脈則腹腫也

至眞要大論

太陽司天民病鼽衄

註 鼽衄乃陽熱中盛之病

少陰之復煩躁鼽嚏甚則入肺欬而鼻淵

少陰司天客勝則鼽嚏

註 鼽嚏厥陰之氣勝也

少陽司天甚則鼽衄

解精微論

泣涕者腦也腦者陰也髓者骨之充也故腦滲爲涕

五常政大論

審平之紀其藏肺其主鼻

註 肺開竅於鼻也

少陽司天火氣下臨肺氣上從欬嚏鼽衄鼻窒

註 上從者因司天之氣下臨畏其勝制而從之也

欬嚏鼽衄鼻窒皆肺病也

太陽司天寒氣下臨心氣上從鼽嚏善悲

註 寒氣下臨則藏氣上從也火性炎上水性潤下火氣妄行於上故霜寒以復之鼽嚏善悲火熱鑠金也

少陰司天熱氣下臨肺氣上從嚏鼽衄鼻窒

陽明司天初之氣民病鼽衄嚏欠嘔

註 鼽衄嚏欠嘔者風木之氣也

少陽司天三之氣民病鼽衄嚏欠

少陰司天民病鼽衄

陽明所至爲鼽嚏

熱至則鼽衄

刺法論

帝曰余聞五疫之至皆相染易天牝從來復得其往氣出於腦卽不干邪

註 天牝鼻也鼻受天之氣故曰天牝

靈樞經

邪氣藏腑病形篇

十二經脈三百六十五絡其血氣皆上於面而走空竅其宗氣上出於鼻而爲臭

註 宗氣者胃腑所生之大氣積於胷中上出於肺以司呼吸故出於鼻而爲臭

本神篇

肺藏氣氣舍魄肺氣虛則鼻塞不利少氣實則喘喝胷盈仰息

註 肺主氣以司呼吸故肺氣虛則鼻塞不利

經脈篇

足太陽之別名曰飛揚別走少陰實則鼽窒頭背痛虛則鼽衄

大腸手陽明之脈其支者上挾鼻孔所生病者目黃口乾鼽衄

胃足陽明之脈起於鼻之交頞中下循鼻外所生病者鼽衄

註 凡此皆經脈所循之分而爲病也

口問篇

口鼻者氣之門戶也

註 夫口鼻耳目皆爲空竅故曰口鼻者氣之門戶也

師傳篇

鼻隧以長以候大腸鼻孔在外膀胱漏泄

註 鼻乃肺之竅大腸肺之腑故鼻以候大腸膀胱者津液之腑氣化則出鼻孔在外謂鼻孔之氣出在外則膀胱漏泄蓋上竅通而下竅泄也

五閱五使篇

鼻者肺之官也肺病者喘息鼻張

註 官之爲言司也閱其官之象則可知其藏之有病矣

憂恚無言篇

人之鼻洞涕出不收者頑顙不開分氣失也

註 肝脈循喉嚨入頑顙頑顙者鼽之上竅口鼻之氣及涕唾從此相通故爲分氣之所洩謂氣之從此而分出於口鼻者也人之鼻洞涕出不收者因頑顙不開分氣失也

脈度篇

肺氣通於鼻肺和則鼻能知香臭矣

扁鵲難經

鼻屬肺其用屬心

四十難曰肺主聲鼻者肺之候而反知香臭其意何也然肺者西方金也金生於巳巳者南方火也火者心心主臭故令鼻知香臭

註肺金也聲出於金故肺主聲心火也火之化物五臭出焉故心主臭肺主聲鼻屬於肺不能聽聲而反知香臭果何如耶蓋由肺屬金金長生在巳南方巳午未巳正火臨官之地火在臟爲心心主臭鼻雖屬於肺肺金生於心火之位故令鼻知香臭

漢張機金匱要略

鼻塞清涕

肺雍胷滿脹一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭酸辛欬逆上氣喘鳴迫塞葶藶大棗瀉肺湯主之

鼻燥

酒黃疸者或無熱靜言了了腹滿欲吐鼻燥其脈浮者先吐之沉弦者先下之

華佗中藏經

不聞香臭常流清涕

肺風者胷中氣滿胒胵汗出鼻不聞香臭喘而不得臥者可治

肺實則鼻流清涕

死色

肺死則鼻孔開而黑黑色起於鼻上漸入於口者死黑白色入口鼻目中者五日死

宋楊士瀛直指方

鼻齆

鼻齆者肺爲風冷所傷津液冷滯鼻氣不宣香臭不知宜芎蘇散

嚴用和濟生方

論治

夫鼻者肺之候職欲常和和則吸引香臭矣若七情內鬱六淫外傷飲食勞役致鼻氣不得宣調清道壅塞其爲病也爲衄爲癰爲瘜肉爲瘡瘍爲清涕爲窒塞不通爲濁膿或不聞香臭此皆肺臟不調邪氣蘊積於鼻清道壅塞而然也治之之法寒則溫之熱則清之塞則通之壅則散之無越於斯但時氣鼻衄不可遽止如出三升已上恐多者方可斷之活人書所謂衄血者乃解蓋陽氣重故也不可不知

鼻者肺之所主職司清化調適得宜則肺臟宣暢清道自利攝養乖方則清道壅塞故鼻爲之病焉蓋肺藏於氣肝藏於血邪熱傷之則血熱血熱則氣亦熱血氣俱熱隨氣上逆故爲鼻衄甚則生瘡風寒乘之陽經不利則爲壅塞或爲清涕蘊積不散則不聞香臭或爲鼻齆或生瘜肉鼻痛之患矣又有熱流膿腑邪移於腦遂致鼻淵鼻淵者濁涕下不止也傳爲衄鐵騏目故得之氣厥也

寶漢卿瘡瘍全書

瘜肉（即鼾）

鼻居面中爲一身之血運而鼻孔爲肺之竅其氣上通於腦下行於肺若肺氣清氣血流通百病不生肺氣盛一有阻滯諸病生焉鼻孔中瘜肉名曰鼻痔皆由六氣七情所感而生若生上入眼名曰努肉若生下入鼻中名曰瘜肉窒塞不通當戒酒節慾除煩惱戒憂愁內服煎劑外用點藥庶平復矣

金劉完素六書

焦乾

鼻孔燥乾者金肺之本肺藏氣以血液內損氣虛或風則皴揭風能勝濕熱能耗液皆能成燥故經云風熱火兼爲陽寒濕燥同爲陰又燥濕亦異也然燥金雖屬秋陰而其性異於寒濕燥陰盛於風熱火也故風熱甚而寒濕同於燥也然中寒吐瀉亡液而成燥者亦以此矣故經云諸濕枯涸乾勁皴揭皆屬於燥也

夫傷寒之候頭項痛腰脊強身體拘急表熱惡寒不煩躁無自汗或頭痛肌熱鼻乾或仍滿而喘手足指未徹厥脈浮數而緊者邪熱在表皆麻黃湯發汗之證也或天水散之類甚佳

鼻淵

膵移熱於腦則辛頗鼻淵濁涕不止如涌泉不渗而已下久不已衄血爲患防風湯主之

鼻鼽

鼽者鼻出清涕也夫五行之理微則當其本化甚則兼乎鬼賊故經曰亢則害承乃制也易曰燥萬物者莫熯乎火以火煉金熱極而反化爲水及身熱極則反汗出也水體柔順而寒極則反冰如地也土主濕陰雲雨而安靜土濕過極則反爲驟注烈風雨淫潰也木主溫和而生榮風大則反凉而毀折也金主清

凉秋凉極而萬物反燥也皆所謂過極則反衆鬼賊之化制其甚也由是肝熱甚則出泣心熱甚則出汗脾熱甚則出涎肺熱甚則出涕腎熱甚則出唾也經曰鼻熱者出濁涕凡痰涎涕唾稠濁者火熱極甚銷鑠致之然也或言齆爲肺寒者誤也彼但見齆嚏鼻窒冒寒則甚遂以爲然豈知寒傷皮毛則腠理閉密熱極怫鬱而病愈甚也

小腹膀胱按之內痛若沃以湯濕於小便上爲清涕太陽直行從巔入絡於腦氣下灌於鼻時出清涕不止也

鼻窒

鼻窒窒塞也火主膜膚腫脹故熱客陽明而鼻中膜脹則窒塞也或謂寒主閉藏妄以鼻窒爲寒者誤也蓋陽氣盛於上而側臥則上竅通利而下竅閉塞者謂陽明之脈左右相交而左脈注於右竅右脈注於左竅故風熱鬱結病偏於左則右竅反塞之也俗不知陽明之脈左右相交注於鼻孔但見側臥則上竅通利下竅窒塞反疑爲寒爾所以否之道者象其肺金之盈縮也

病邑

脾風鼻黃脾熱鼻赤

嚏

嚏鼻中因癢而氣噴作於聲也鼻爲肺竅癢爲火化心火邪熱干於陽明發於鼻而癢則嚏也或故以物擾之癢而嚏者擾癢屬火故也或視日而嚏者由目爲五藏神華太陽眞火日光耀於目則心神躁亂而發熱於上則鼻中癢而嚏也傷寒病再經衰而或嚏者由火熱已退而虛熱爲癢癢發鼻則嚏也或風熱上攻頭鼻壅滯脈浮而無他證者內藥鼻中得嚏則壅滯開通而愈也或有痛處因嚏而痛其不可忍者因嚏之氣攻衝結痛而不得通利故也

元李杲十書

肺和則知香臭

金匱眞言論云西方白色入通於肺開竅於鼻藏精於肺夫十二經脈三百六十五絡其氣血皆上走於面而走空竅其精陽氣上走於目而爲睛其別氣走於耳而爲聽其宗氣出於鼻而爲臭難經云肺氣通於鼻肺和則能知香臭矣夫陽氣宗氣者皆胃中生發之氣也其名雖異其理則一若因饑飽勞役損脾胃生發之氣既弱其營運之氣不能上升邪塞孔竅故鼻不利而不聞香臭也宜養胃氣使陽氣宗氣上升鼻管則通矣又一說難經云心主五臭肺主氣鼻者肺竅反聞香臭者何也蓋以竅言之肺也以用言之心也因衛氣失守寒邪客於頭面鼻亦受之不能爲用是不聞香臭矣故經曰心肺有病鼻爲之不利潔古曰視聽明而清涼香臭辨而溫暖者是也治法宜先散寒邪後補衛氣使心肺之氣得交通則鼻利而聞香臭矣麗澤通氣湯主之

流清涕

冬三月陰氣在外陽氣內藏當外助陽氣不得發升內消陰火勿令泄瀉此閉藏周密之大要也盛冬乃水旺之時水旺則金旺子能令母實肺者腎之母皮毛之元陽本虛弱更以冬月助其令故病者善嚏鼻流清涕寒甚出濁涕嚏不止比常人大惡風寒小便數而欠或引行小便色清而多大便不調夜寒無寐甚則爲痰咳爲嘔爲穢爲吐爲唾白沫以至口開目瞪氣不交通欲絕者吳茱萸丸主之

窒塞

肺藏賊邪燥熱相合鼻窒齆鼾血溢血泄其脈濇而浮大甚者桃仁承氣湯微者犀角地黃湯極者抵當湯微極抵當丸

鼻爲肺之竅因心肺上病而不利也有寒有熱是皆傷於皮毛氣不利而壅塞壅塞清道氣不利宜通竅則表之麻黃桂枝之類熱則清之芩連梔子之類

體屬肺用屬心

經云五氣入鼻藏於心肺難經云肺主鼻鼻和則知香臭潔古云視聽明而清涼香臭辨而溫暖此內受天之氣而外利於九竅也夫三焦之竅開於喉出於鼻鼻乃肺之竅此體也其聞香臭者用也心主五臭舍於鼻蓋九竅之用皆稟長生爲近心長生在酉酉者肺故知鼻爲心之所用而聞香臭也故肺有病而鼻爲之不利也此明爲清氣所奉於天而心勞胃損則受邪也

朱震亨心法

酒齄

酒齄鼻是血熱入肺宜用四物湯加陳皮紅花酒炒黃芩煎入好酒數滴就調炒五靈脂末同服格致論中於上藥有苓茯生薑氣弱者加黃芪

酒齄者此皆壅熱所致夫肺氣通於鼻清氣出入之道路或因飲酒氣血壅滯上焦生熱邪熱之氣留伏不散則爲之鼻瘡矣又有肺風不能飲而自生者非

盡因酒耳宜一味浙二陳食後用冷飲外用硫黃入大菜頭內煅研塗之若鼻尖微赤及鼻中生瘡者辛夷研末入腦麝少許綿裹納之或以枇杷葉拭去毛剉煎湯候冷調消風散食後服

格致餘論

面鼻得冷則黑

諸陽聚於頭則面爲陽中之陽鼻居面中央而陽明起於頷中一身之血運到面鼻到面鼻陽部皆爲至清至精之血矣酒性善行而喜升大熱而有峻急之毒多酒之人酒氣熏蒸面鼻得酒血爲極熱熱血得冷爲陰氣所搏汗濁凝結滯而不行宜其先爲紫而後爲黑色也須用融化滯血使之得流滋生新血可以運化病乃可愈予爲酒製四物湯加炒片芩茯苓陳皮生甘草酒紅花生薑煎調五靈脂末飲之氣弱者加酒黃芪無有不應者

明徐春甫古今醫統

病屬於肺

經曰鼻者肺之外候又曰西方白色入通於肺開竅於鼻又曰鼻熱甚出濁涕又曰心肺有病而鼻爲之不利是也按巢氏病源曰肺開竅於鼻熱乘於血則氣亦熱也血氣俱熱血隨氣發出於鼻爲鼻衄甚則大衄而口耳皆出血也又云肺臟調和則鼻氣通利而知香臭若邪乘太陰其氣蘊積於鼻者則津液壅塞鼻氣不得宣調故不知香臭而爲齆也至於生瘡發成癰肉或窒塞或流涕皆是肺經之邪壅滯也

病屬於火

鼻中瘡而氣噴作於聲爲噦夫寒爲火化心火邪熱干陽明發於鼻則癢而噦也有以物擾之而噦有視日而噦者蓋太陽眞火耀於目而擾於心則火熱衝上鼻中癢而噦也有風熱上攻頭鼻壅塞有因噦而痛者雖證候之不同同爲熱也凡爲病不同邪熱所乘之經無有異也鼻竅與噦癢者熱客陽明胃之經也觥涕者熱客太陰肺之經也蓋鼻者足陽明胃經所主陽明脈左右相交注於鼻孔又鼻者肺之竅故肺氣通於鼻其邪熱干於二經發於鼻而爲窒塞觥涕之證故經曰心肺有病而鼻爲之不利也

鼻齆癰肉皆邪氣結成

肺氣通於鼻清氣出入之道肺臟熱邪壅滯上焦鬱結伏留不散而成齆癰之患矣

鼻赤酒皶血熱入肺

酒皶鼻多是飲酒之人酒氣邪熱熏蒸面鼻血熱壅滯而成鼻皶赤色者也或有肺經素有風熱雖不因酒亦自紅黑而生皶也

鼻竅不利治宜辛散苦瀉

心肺有熱而鼻爲之不利也或外傷風寒內熱愈窒壅塞不聞或流清涕或痒而噦者宜麻黃桂枝細辛辛夷之辛味以散不因外感而惟內熱者宜芩連梔子之苦味以瀉之二法爲治鼻之大綱也

鼻瘡

鼻熱生瘡色紅內無壅塞此爲血熱宜用生地黃四物湯加酒製片芩酒拌紅花生甘草麥門冬天門冬之類

鼻淵

經曰腦髮熱於腦則辛頞鼻淵劉河間用防風通聖散加薄荷黃連各二錢水煎服

鼻痿

鼻痿迺熱則生風故也故防風通聖散加白附子殭蠶之類

食入腦中

卒食物從鼻中縮入腦中介介痛不出牛脂膏甚良

虞搏醫學正傳

鼻證

內經曰西方白色入通於肺開竅於鼻又曰鼻者肺之外候丹溪曰肺之爲臟其位高其體脆性惡寒又惡熱是故好飲熱酒者始則傷於肺臟鬱熱久則見於外而爲鼻皶準赤之候得熱愈紅得寒則黑此謂熱極是水之象元則害承迺制也其或觸冒風寒始則傷於皮毛而成鼻塞不通之候或爲濁涕或流清汁久而不已名曰鼻淵此爲外寒束內熱之證也原病式曰肺熱則出涕是也又有膽移熱於腦則爲辛頞鼻淵鼻中濁涕如湧泉不滲而下久而不已則爲鼻齆衄血塞肉鼻齆等證各以類推而治之

脈法

右寸脈浮洪而數爲鼻衄鼻齆

左寸脈浮緩爲傷風鼻塞鼻流清涕

鼻爲元牝之門

老子曰谷神不死是爲元牝元牝之門爲天地根綿綿若存用之不勤何謂元牝之門答曰鼻通天氣曰元門口通地氣曰牝戶曰鼻乃元牝之門戶也

戴思恭證治要訣

流涕

鼻塞流涕不止有冷熱不同清涕者腦冷肺寒所致宜細辛烏附乾薑之屬濁涕者乃素問所謂膿移熱於腦則爲鼻淵是也宜防風甘菊之屬須以清濁別冷熱

有不因傷冷而涕多清或黃或白或時帶血如腦髓狀此由腎虛所生不可過用凉劑宜補腦散仍以黑錫丹紫霜丹靈砂丹

傷冷熱鼻暴塞流涕多者通關散

邵氏診

餘處無恙獨鼻尖色青黃者此其人必爲淋也鼻尖微白者亡血也赤者血熱也

李梴醫學入門

窒塞

鼻竅於肺而能知香臭者心也人身水升火降榮衛調和則鼻司呼吸往來不息而已苟或寒傷皮毛則鼻塞不利火鬱清道則香臭不知新者偶感風寒鼻塞聲重流涕噴嚏宜以風寒治之加味羌活湯參蘇飲消風百解散久則略感風寒鼻塞等證便發乃肺伏火邪鬱甚則喜熱惡寒故略感冒而內火便發宜清金降火兼通氣之劑凉膈散加荊芥白芷或川連石膏散又有不必外感四時鼻塞乾燥不聞香臭宜清金降火消痰之藥清氣化痰丸上清丸古方鼻塞甚者槩寒湯澄茄丸不知香臭者通氣湯內有硬物者單南星飲貼頷草茇餅外用石菖蒲皂角等分爲末綿包塞鼻仰臥片時虛寒者通草丸

鼽

鼻乃清氣出入之道清氣者胃中生發之氣也鼻塞久則氣壅不轉熱鬱於腦清濁混亂爲鼽爲衄爲淵鼽者鼻流清涕熱微二陳湯加芎歸細辛白芷防風羌活桔梗等分薑煎入薄荷少許久不止者芷夷散去薄荷加荊芥黃芩神麴半夏南星等分食後煎服外用細辛膏

鼻淵

淵者鼻流濁涕熱盛金沸草散倍黃芩入鳳凰殼一枚燒存性調服肺風消風散加髮灰肺火流涕咳吐膿血桔梗湯人參平肺散瞻視熱於腦流涕濁臭防風通聖散加薄荷黃連或芷夷散外用蒼耳莖苗子燒灰酢調塗鼻內鼻淵久則成衄防風散主之

腦砂

有流臭黃水者甚則腦亦作痛俗名腦砂有蟲食腦中用絲瓜藤近根五尺燒存性爲末酒調服虛者川烏散外用白牛尾毛橙葉等分爲末吹鼻中倘有血出加山梔亦不妨

鼻齆

鼻齆準頭紅也甚則紫黑因飲酒血熱入肺復被風寒鬱久則血凝濁而色赤或不飲者乃肺風血熱俱亢四物二陳湯去半夏加紅花黃芩水煎入酒少許調五靈脂末服氣虛加黃芪常宜服單山梔丸或黃連阿膠丸胃用升麻和氣飲吞瀉青丸以除病根外用黃連末天鈞藤燒灰桐油調敷或硫粉敬

鼻痛

鼻痛因風邪入鼻與正氣相搏鼻道不通故痛藿香正氣散祛風通氣散有痰火衝肺者鼻隔隱痛二陳湯加黃芩山梔桔梗麥門冬

鼻瘡

鼻瘡輕爲鼻瘡重爲鼻痔皆肺熱也鼻中生瘡者枇杷葉煎湯候冷調消風散食後服忌煎炒葷蒜熱物外用辛夷爲末入腦麝少許綿裹塞鼻

鼻痔

鼻痔肺氣熱極日久凝濁結成瘜肉如棗滯塞鼻齆甚者又名鼻齆宜防風通聖散加三稜海藻末調服外用辛夷爲君細辛杏仁少許爲末和羊髓豬脂熬膏候冷入雄黃白礬輕粉麝香少許爲丸綿裹塞鼻數日即脫甚者加硇砂少許或瓜蔞散亦妙又食積熱痰生痔單蒼耳丸內服外數最消食積或用白礬二錢細辛一錢白芷五分爲末塞鼻

治法

鼻證大抵疏風降火爲要法風寒外感者溫以散之風熱有自內鬱者或外感久則鬱而爲熱或內因飲食衣服過暖肝熱生風亦鼻塞流涕宜降火清金久則宜養血補腎爲要凡鼻涕鼽淵鼽久甚不愈者非心血虧則腎水少養血則血生而火自降補腎則水升而金自清雖鼻瘡痔難久亦宜又鼻塞久不愈者必內傷肺胃清氣不能上升非外感也宜補中益氣湯以和之此皆治本之論

李時珍本草綱目

病因

鼻淵流濁涕是腦受風熱

鼻鼽流清涕是腦受風寒包熱在內

腦崩臭穢是下虛

鼻窒是陽明濕熱生瘜肉

鼻齆是陽明風熱及血熱或臟中有蟲

鼻痛是陽明熱

樓英醫學綱目

鼻塞

鼻塞皆屬肺經云肺氣通於鼻肺和則鼻能知香臭矣又云五氣入鼻藏於心肺心肺有病而鼻爲之不利也又云西方白色入通於肺開竅於鼻藏精於肺又云肺主臭在臟爲肺在竅爲鼻是也

鼻淵

運氣鼻淵皆屬熱經云少陰之復甚則入肺咳而鼻淵治以苦寒是也

鼻齆

運氣鼻齆有二一曰火攻肺虛鼻齆經云少陰司天熱氣下臨肺氣上從齆衄鼻窒又云少陰司天熱淫所勝民病齆衄嚏嘔又云少陽司天火淫所勝甚則齆衄又云少陽之復煩躁齆嚏又云少陰司天客勝則齆嚏又云歲金不及炎火乃行民病齆嚏又云金不及曰從革從革之紀其病嚏欬齆衄治以諸寒是也二曰金助肺實鼻齆經曰陽明所至爲齆嚏治以溫劑是也

王綸明醫雜著

閉塞

鼻塞不聞香臭或但遇寒月多塞或略感風寒便塞不時舉發者世俗皆以爲肺寒而用表解通利辛溫之藥不效殊不知此是肺經有火邪火鬱甚則喜得熱而惡見寒故遇寒便塞遇感便發也治法清肺降火爲主而佐以通氣之劑若如常鼻塞不聞香臭者再審其平素只作肺熱治之清金瀉火清痰或丸藥噙化或末藥輕調緩服久服無不效矣此予所親見而治驗者其平素原無鼻塞舊證一時偶感風寒而致窒塞聲重或流清涕者自作風寒治

註前證若因飢飽勞役所傷脾胃發生之氣不能上升邪害空竅故不利而不聞香臭者宜養脾胃使陽氣上行則鼻通矣按東垣云膽移熱於腦則辛頻鼻淵治之以防風湯大抵胃氣不和之所致者多矣

方賢奇效良方

論證

鼻者肺之通竅主清氣出入之道路若氣血和平陰陽升降則呼吸通和榮衛行焉鼻和則知香臭矣或六淫七情內外傷感又因飲食勞倦因而鼻氣不得宣通清道壅塞其爲病也若積熱客於陽明遂以迫血妄行自鼻孔中出謂之衄熱則津液中乾冷則腦髓流注或風冷隨氣入於經上貫於腦下注於鼻則涕下不能自收謂之流涕或冷滯氣塞鼻則不聞香臭於是爲鼻齆血脈聚日久纏綿轉加壅結變生瘜肉或氣壅滯於上爲邪熱留伏不散則爲鼻瘡久則變爲疳蟲腐潰汁臭鼻之爲病不過風熱而已何謂云鼻窒塞也火主腑臃腫脹故熱客陽明而鼻中臃脹則鼻窒塞也或謂寒主閉藏妄以鼻窒爲寒者誤也蓋陽氣甚於上而側臥則上竅通利而下竅閉塞者謂陽明之脈左右相交而左脈注於右竅右脈注於左竅故風熱鬱結病偏於左則右竅反塞之類也所謂齆者鼻出清涕也夫五行之理微則當其本化甚則衆其鬼賊故經曰亢則害承乃制也易曰燥萬物者莫熯乎火以火煉金熱極而反爲水及其熱極則反汗出也由是肝熱甚則出泣心熱甚則出汗脾熱甚則出涎肺熱甚則出涕腎熱甚則出唾經曰鼻熱甚出濁涕又云膽移熱於腦則辛頻鼻淵者濁涕出不止也凡痰涎涕唾稠濁者火熱甚銷鑠致之然也或言齆爲肺寒者誤也但見齆涕鼻窒冒寒則甚遂以爲然豈知寒傷皮毛則腠理閉密熱氣怫鬱而痛愈甚也及夫嚏者鼻中因痒而氣噴作於聲也鼻爲肺竅痒爲火化心火邪熱干於陽明發於鼻而痒則嚏也或故以物擾之痒而嚏者擾痒屬血或故視日而嚏者由目爲五臟精華太陽真火見耀於目則心神躁亂而發熱於上則鼻中痒而嚏也或傷寒病衰而或嚏者由火熱已退而虛熱爲痒痒發鼻則嚏也或風熱上攻頭鼻壅滯脈浮而無他證者內藥鼻中得嚏則壅滯開通而愈也或有痛處因嚏而痛不可忍者因嚏之氣攻衝結痛而不得通利故也三者之證同爲熱也故爲病不同邪熱所乘之經有異故也鼻竅與嚏痒者熱客陽明胃之經也齆涕者熱客太陰肺之經也蓋鼻者足陽明胃經所主陽明之脈左右相交注於鼻孔又鼻者肺之竅故肺氣通於鼻其邪熱干於二經發於鼻而爲窒塞齆涕之證故經曰心肺有病而鼻爲之不利也治法觀邪所中之何經治之則不失矣或因外冒風寒而痛轉甚遂作寒治而用溫熱之劑表散者偶爾獲中豈知寒覆於熱

熱鬱濁氣清道不利故有是證或用辛甘發散腠理開通結滯得散陽熱外泄微者則已甚者鬱結不開其病轉加者雖用退熱疏風辛凉之劑解之即使結散熱退暫愈而已全在乎驗其內外結熱之微甚宜以辛溫凉平之藥可也凡此諸證全在醫之識病治之了然無不痊矣

張三錫醫學準繩六要

總論

肺開竅於鼻世所共知也然陽明之脈挾鼻絡目結於迎香左之右右之左去鼻孔各開五分是穴風邪從面而來則入陽明脈道怫鬱氣不通暢故清涕時出久變爲濁所謂外寒束內熱論極有理須辛散之方書多用升麻葛根白芷葱白乃陽明經藥也鬱熱既久頓發不開必加辛凉酒枯芩薄荷之類至如酒客膏粱辛熱炙煿太過火邪炎上孔竅壅塞則爲鼻淵鼻中濁涕如湧泉漸變鼻齆鼽血瘜肉鼻痔等證即素問所謂膽移熱於腦之義

窒塞不通

鼻塞時值寒月必加麻黃細辛於升麻葛根湯中佐以枯芩蘇葉多加甘桔爲舟楫庶易成功已經發散未得全開脈洪有力口乾鼻燥者君以辛凉清之酒芩梔子薄荷之屬仍佐荊防升芷不可驟用寒凉法也

氣虛之人氣弱不能上升則鼻塞滯所謂九竅不利腸胃之所生是也多服補中益氣湯自通此乃屢驗者

鼻壅氣不通不聞香臭通草散主之

痰火鬱結於上焦胃中肓膜之上上竅不通則元門閉密而鼻不聞香臭口不知味或耳聾目昏良由大氣弱不能上衝濁氣得以擅權是虛爲本而痰火爲標也當用補中益氣湯加升柴諸風藥引上行兼川清上化痰開竅丸藥戒性慎口久之自全

淵瘜酒齄

火鬱上焦氣不通抑遏成涕內經所謂肺熱則出涕是也方書謂腦滲爲涕恐非

濁涕如淵內經謂膽移熱於腦則辛頞鼻淵要皆陽明伏火所致宜防風通聖散一兩加薄荷黃連各二錢五分水煎服或本方稍黃滑石石膏減半倍加辛夷

瘜肉必由上焦積熱鬱塞已久而生然有諸中然後形諸外必內服清火利膈藥二陳凉膈加減須斷酒薄味

酒齄乃熱血入面爲寒所拂熱血得寒污濁凝滯而然服前藥外用梧桐子取油入黃連以天釣藤燒灰熱傅之

王肯堂證治準繩

所屬經絡

鼻頞中頞亦作鶚鼻山根也俗呼鼻梁屬足陽明胃經督脈之會

註　素問曰膽移熱於腦則辛頞鼻淵傳爲鉤鐵瞑目註曰足太陽膀胱脈起目內眥上額交巔絡腦陽明脈起於鼻交頞中旁約太陽之脈今腦熱則足太陽逆與陽明之脈俱盛薄於頞中故頞辛鼻淵頞辛者鼻酸痛也鼻淵者濁涕下而不止如水泉也熱盛則陽絡溢陽絡溢故鉤鐵者鼻出血汁也又謂之衄血出甚則陽明太陽脈衰不能榮於目故目瞑也

鼻屬手太陰肺經

註　素問曰西方白色入通於肺開竅於鼻然鼻熱靈樞曰肺病者喘息鼻張又曰肺虛則鼻塞不利和則能知香臭矣喬岳曰肺絕則無涕鼻孔黑燥肝逆乘之而色青東垣曰傷風鼻中氣出粗合口不開氣通於天也

又屬手少陰心經

註　李東垣曰鼻本主肺而復能聞香臭者鼻中有心庚金生於巳也素問曰五氣入鼻藏於心肺心肺有病而鼻爲之不利也

又屬手足陽明大腸胃經督脈之交會

註　劉河間曰傷風寒於腠理而爲鼻塞者寒能收斂陽氣不通暢也素問曰傷寒二日陽明受之陽明主肉其脈俠鼻故鼻乾不得臥王海藏曰石膏發汗辛寒入手太陰經仲景治傷寒陽明經證乃用之者何也蓋胃脈行身之前而胃爲胃肺之室邪熱在陽明則肺受火制故用辛寒以清肺所以號爲白虎湯也素問又曰運氣陽明所至爲欬嚏註欬鼻窒也嚏噴嚏也

其在小兒面部謂之明堂

註　靈樞曰脈見於氣口色見於明堂明堂者鼻也明堂廣大者壽小者始況加疾哉按此語即相家貴隆準之說也然須視其面部何如愚嘗見明堂雖小與面相稱者壽可八十要不可執一論也

屬足太陰脾經

註素問曰脾熱病者鼻先赤

俠鼻孔兩旁五分名迎香穴屬手足陽明大腸胃經之會

直兩目瞳子名巨髎穴屬足陽明胃經陰蹻脈之會

耳鳴口不知穀味氣不快四肢困倦行步不正髮脫落食不下膝冷陰汗帶下喉中介介不得臥口舌噤乾太息頭不可回顧項筋緊急脊強痛頭旋眼黑頭痛呵欠嘔噦溫衛補血湯人參湯辛夷散增損通聖散辛夷湯醍醐散通關散防風湯排風散華澄茄丸皆治鼻塞之劑宜審表裏寒熱而用之

鼻齆

鼻塞久而成齆蓋由肺氣注於鼻上榮頭面若上焦壅滯風寒客於頭腦則氣不通冷氣停滯搏於津液膿涕結聚則鼻不聞香臭遂成齆也內服芎藭散山茱萸丸外用赤龍散通頂散雄黃散黃白散通草散孫一奎曰大腸肺之腑也胃五藏之所受氣者也經曰九竅不利腸胃之所生也鼻主無形者經曰清氣通於天又曰鼻主天氣設腸胃無痰火積熱則平常上升之氣皆清氣也縱火熱主令之歲何害病耶若腸胃素有痰火積熱則其平常上升之氣皆雜而爲濁矣金職司降喜清而惡濁今受濁氣熏蒸凝聚既久壅遏鬱結而爲涎涕至於痔珠瘜肉之類皆由積久燥火內熾風寒外束隧道壅遏氣血升降被其妨礙澆培彌厚猶積土而成阜也卽非火熱主令之歲有不病者乎治者無拘於運氣之說可也

細辛散本事通草丸三因辛夷散千金細辛膏川椒散塞鼻杜壹皆溫熱之劑眞是腦冷者乃可用白芷丸有外感者乃可服

漏巇諸證治法

泣涕者腦也故腦滲爲涕故得之氣厥也王太僕註云腦液下滲則爲濁涕涕下不止如彼水泉故曰鼻淵也額謂鼻頗也足太陽脈起於目內眥上額交巔上入絡腦足陽明脈起於鼻交頗中旁約太陽之脈今腦熱則足太陽逆與陽明之脈俱盛薄於頗中故鼻頗酸痛也熱盛則陽絡溢陽絡溢則衄出血汁也血出甚陽明太陽脈衰不能榮養於目故目瞑厥者氣逆也皆由氣逆而得之宜服防風湯亦有痰氣者宜南星飲

頭風鼻涕下如白帶宜辛夷丸

久患鼻齆極臭者以冷水調百草霜末服

肺虛而壅鼻生瘜肉不聞香臭羊肺散

鼻痔蝕椿根湯烏香散藍靛傳令徧日十度夜四度立瘥

鼻乾無涕犀角散桑根白皮散吹鼻散

鼻痛氣道壅塞故也內服人參順氣散外傳巴苴散

風冷搏於肺臟上攻於鼻則令鼻痛沒藥散

肺受風而色枯白類時赤皮膚乾燥鼻塞乾痛此爲虛風白蘚皮湯

鼻塞聰昏疼痛腦悶壺盧酒

陳實功外科正宗

酒皶

鼾鼻屬脾由血熱鬱滯不散所謂有諸內必形諸外宜眞君妙貼散加白附子敷之內服枇杷葉丸黃芩清肺飲

鼻痔

鼻痔者由肺氣不清風濕鬱滯而成鼻內瘜肉結如櫃子漸大下垂閉塞孔竅使氣不得宣通內服辛夷清肺飲外以硇砂散逐日點之漸化爲水乃愈兼節飲食斷厚味戒急暴省嗜慾瘜後庶不再發

腦漏

一名鼻淵總因風寒凝入腦戶與太陽濕熱交蒸乃成其患鼻流濁涕或流黃水點點滴滴長溫無乾久則頭眩虛運不止治以藿香湯主之天麻餅子調之亦可漸愈如日久虛眩不已內服補中益氣湯六味地黃丸相間服之以滋化原始愈

吳崐醫方考

鼻病方論

鼻居五官之中疾非美觀也記曰盡飾之道斯其行者遠矣故考五方以治鼻

鼻流濁涕不止者名曰鼻淵乃風熱在腦傷其腦氣腦氣不固而液自滲泄也蒼耳散四味皆辛涼之品辛可以驅風涼可以散熱其氣輕清可使透於巔頂巔頂氣清則腦液自固鼻淵可得而愈矣

鼻生瘜肉氣息不通香臭莫辨者辛夷散主之夫鼻者氣之竅氣清則鼻清氣熱則鼻塞熱盛則塞甚此瘜肉之所以生也故治之宜清其氣是方也辛夷細辛川芎防風葉本升麻白芷皆輕清辛香之品也可以清氣可以去熱可以疏邪可以利竅乃木通之性可使通中甘草之緩可使瀉熱

鼻中瘜肉用鍼微刺令患人含水一口後以瓜蒂散

和麝香少許用水數滴吹鼻內出涎木則愈此苦能瀉泄也能瀉其實則瘜肉愈矣

陽虛腦寒鼻淵者補腦散主之人身之上天之陽也故六陽之氣皆會於面若陽氣自虛則陰氣湊之令人腦寒而流清涕是方也天雄辛熱而上浮辛熱者太陽之象故可以溫腦而補陽虛辛夷仁蒼耳葶藶皆輕清滋腦之劑可以佐天雄而透腦

鼻赤如橘者大矾散酒調敷之夫鼻者熱也所以赤者血也大黃寒能瀉熱矾硝鹹能敗血此證耽酒者有之若不絕酒而徒用藥抱薪救火何益於事

景岳全書 臣張介賓著

論證

鼻為肺竅又曰元牝乃宗氣之道而實心肺之門戶故經曰心肺有病而鼻為之不利也然其經絡所至專屬陽明自山根以上則連太陽督脈以通於腦故此數經之病皆能及之若其為病則窒塞者謂之鼽時流濁涕而或多臭氣者謂之鼻淵又曰腦漏或生瘜肉而阻塞氣道者謂之鼻齆及有噴嚏鼻衄酒齇赤鼻之類各當辨而治之然總之鼻病無他也非風寒外感則內火上炎耳外感者治宜辛散內熱者治宜清凉知斯二者則治鼻大綱盡乎是矣

論治

鼻塞證有二凡由風寒而鼻塞者以寒閉腠理則經絡壅塞而多鼽嚏此證多在太陽經宜用辛散解表自愈如川芎散神愈散及麻黃紫蘇荊芥葱白之類皆可擇用

若由火邪上炎而鼻塞者單宜清火火之微者多近上焦出自心肺宜清化飲黃芩知母湯之類主之火之甚者多出陽明或微兼頭痛宜竹葉石膏湯涼膈散之類主之

若風寒兼火者即防風通聖散之類亦可用大都常塞者多火暴塞者多風寒當以此辨之

鼻涕多者多由於火故曰肺熱甚則鼻涕出由此觀之則凡無故多涙及多口涎者亦多屬肝脾之火皆其類耳

鼻淵證總由太陽督脈之火甚者上連於腦而津津不已故又名為腦漏此證多因酒醴肥甘或久用熱物或火由寒鬱以致濕熱上熏津汁溶溢而下離經腐敗有作臭者有大臭不堪聞者河間用防風通聖散一兩加薄荷黃連各二錢以治之古法有用蒼耳散治之者

然以余之見謂此炎上之火而治兼辛散有所不宜故多不見效莫若但清陰火而兼以滋陰久之自寧此即高者抑之之法故常以清化飲加白蒺藜五錢或一兩芥耳子二三錢若火之甚者再以清凉等劑加減用之每獲全愈或用宣明防風湯之類亦可但此證一見即宜節戒早治久則甚難為力也

凡鼻淵腦漏雖為熱證然流滲既久者即火邪已去流亦不止以液道不能扃固也故新病者多由於熱久病者未必盡為熱證此當審察治之若執用寒涼未免別生他病其有漏泄既多傷其髓海則氣虛於上多見頭暈隱痛及眩運不寧等證此非補陽不可宜十全大補湯補中益氣湯之類主之

鼻齆瘜肉阻塞清道雖鼻為肺竅而其壅塞為患者乃經絡肌肉之病此實陽明熱滯留蓄而然故內治之法宜以清火清氣為主外治之法宜以黃白散及千金瘜肉方雄黃散或簡易瘜肉方之類主之

酒齇赤鼻多以好酒之人濕熱乘肺熏蒸面鼻血熱而然或以肺經素多風熱色為紅黑而生齇癬者亦有之內宜涼血清火外宜硫黃散白礬散輕搽

石室祕錄 臣陳士鐸著

腫痛由火

鼻腫者乃肺經火盛也宜用甘桔湯則效今用皂角末吹入打清嚏數十即愈蓋鼻因氣壅今打嚏則壅塞之氣盡開散故不必清肺而鼻腫自消也

鼻大

有人鼻大如拳疼痛欲死此乃肺經之火熱壅於鼻而不得泄法當清其肺中之邪去其鼻間之火可也方用黃芩麥冬花粉甘草各三錢桔梗天冬各五錢紫菀二錢百部蘇葉各一錢水煎服四劑自消此方全在羣入肺經以去其火邪又何壅腫之不消耶此奇病而以常法治之者也

孔生紅線

鼻中生紅線一條長尺許少動之則痛欲死人以為飲酒之病也而余以為不然亦祟也方用硼砂冰片各一分研為末以人乳調之輕輕點在紅線中間忽然如覺有人將病人打一拳一般頃刻即消奇絕之方也蓋硼砂亦是殺祟之物也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百七十二卷目錄

醫部彙考一百五十二

鼻門二

方　麗澤通氣湯　溫膽湯　溫衛湯　溫經補血湯　溫肺湯　人參湯　辛夷散　增損辛夷湯　蜜煎導　通聖散　辛夷湯　蜜煎導　通關散　通頂散　排風湯　瓜蒂散　菖蒲散　黃山梨　黃丸　通草散　赤龜散　川椒散　細辛散　通草丸　防風湯　苦丁香散　細辛散　白芷丸　辛夷散　苦耳散　抑金散　南星散　辛夷丸　川芎丸　治鼻痔方　細辛散　治鼻痔方　輕黃散　二丁散　治鼻痔方　地龍散　犀角散　烏犀丸　生地黃煎　赤根散　吹鼻散　烏香散　犀角散　桑根白皮散　壺盧酒　沒藥散　白薇散　升麻防風散　梔子仁丸　白蘞散　硫黃散　何首烏丸　治鼻赤方　冬瓜子散　上清丸　大椒油　治鼻赤方　酒蟹鼻方　又方　赤鼻風方　狀　荊芥散　通竅湯　麗澤通氣湯　瓜蒂散　貫衆湯　洗肺散　清血門　物湯　白龍丸　參蘇丸　肺風丸　升麻湯　清肺飲子　辛夷清肺飲　硇砂散　茵香草散　納氣化痰丸　金沸草散　羌活湯　二香散　養正丹　茵芋知母湯　理中湯　吳茱萸丸　消風散　補腦散　硫砂丹　防風通聖散　消風散　搽鼻去紅方　神效散　小柴胡湯　升麻葛根湯　參蘇飲　防風散　消風百解散　枇杷葉丸　黃芩清肺飲　真君妙貼散　青愛蓯香湯　消化飲

單方

鍼灸

導引

醫案

藝術典第一百七十二卷

醫部彙考一百五十二

鼻門二

方

麗澤通氣湯　準龍下同

治鼻塞

羌活　獨活　防風去叉　升麻　葛根各八分　川椒　麻黃存節各四分冬加之　蒼术一錢二分　白芷　黃芪各一錢六分　甘草八分

右作一服水二盞薑三片棗二枚蔥白三寸同煎至一盞去滓稍熱服食遠忌一切冷物及風寒凉處坐臥

溫肺湯

治前證

升麻　黃芪　丁香　葛根　羌活　甘草生　防風各一錢　麻黃四錢不去節

右粗末分二服每服水二大盞蔥白二莖煎至一盞去滓稍熱食遠服

猊寒湯

治寒氣風邪傷於皮毛令人鼻塞欬嗽上喘

黃芪一錢　人參　升麻　陳皮各五分　甘草　菸冬花　佛耳草　防風各三分　黃連　黃檗　羌活　白芷各三分　蒼术七分

水二大盞煎至一大盞去滓稍熱食遠服

溫衛湯

治前證

黃芪生　蒼术　升麻　知母　羌活　柴胡　當歸身各一錢　人參　黃檗　白芷　防風　甘草炙　澤瀉各五分　陳皮　青皮　木香　黃連各三分

水二盞煎至一盞去滓食遠溫服晴日服之

溫衛補血湯

治前證

黃芪一錢二分　升麻四分　柴胡　炙甘草　生甘草　地骨皮　桔梗　人參各三分　白术　生地黃　藁香　吳茱萸　黃檗各一分　蒼术　陳皮　王瓜根　牡丹皮各二分　桃仁三箇　當歸身二分半　菸花七朵　丁香一箇

水二盞煎至一盞半去滓食前稍熱服

人參湯

治肺氣上攻鼻塞不通

人參　白茯苓　黃芩　陳皮去白　羌活　麻黃去根節　蜀椒去目并合口者炒出汗各錢半

水二鍾煎至一鍾食後服

辛夷散

治肺虛爲四氣所干鼻內壅塞涕出不已或氣息不通不聞香臭

辛夷　川芎　木通去節　細辛洗去土　羌活　防風　葉本　升麻　白芷　炙甘草各等分　苍耳子減半

右爲細末每服二錢食後茶清調服

增損通聖散

治肺氣不和鼻塞不利

鼠黏子　桔梗　桑白皮　紫菀各一錢五分

荊芥穗二錢　生甘草七分
水二鍾薑三片煎一鍾食後服

辛夷湯

治肺氣不利頭目昏眩鼻塞聲重咯唾稠粘
辛夷去毛　川芎　白芷　甘菊花　生地黃
石膏　白朮　前胡　薄荷葉　赤茯苓去皮
陳皮去白各一兩　炙甘草二兩
右㕮咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食遠
溫服

醍醐散

治傷風鼻塞聲重
細莘半兩　川芎一兩　薄荷一兩五錢　撫芎
川烏炮去皮臍　白芷　甘草各二兩
右爲細末每服一錢葱茶或薄荷湯調下

通關散

治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流清涕多嚏肩
項拘急頭目昏痛風府怯寒
原蠶蛾瓦焙黃　白附子炮　益智去皮　薄荷
蒺藜炒去角　苦參各半兩
右爲細末每服三錢不拘時溫酒調下

防風湯 宜明

治鼻塞流清涕不止者
防風　官桂各半兩　梔子七枚　升麻一兩
石膏研三兩　麻黃七錢半　木通一兩二錢半
右㕮咀每服三錢水一盞煎七分去滓空心溫服
日再

排風散

治鼻塞或生瘜肉
防風　秦艽去苗土　吳茱萸湯浸焙　山芋
天雄炮去皮臍各一兩　羌活半兩
右爲細末每服二錢空心溫酒調下

蓽澄茄丸

治鼻塞不通
蓽澄茄半兩　薄荷葉三錢　荊芥穗二錢半
右爲細末煉蜜和丸如櫻桃大不拘時噙化一二
丸

菖蒲散

治鼻內窒塞不通不得喘息
菖蒲　皂角各等分
右爲末每用一錢綿裹塞鼻中仰臥少時

通頂散

治鼻塞
胡黃連　滑石研各二錢五分　瓜蔕研七枚
麝香研一錢　蟾酥研五分
右研勻每用少許吹入鼻內即瘥

芎藭散

治鼻塞
芎藭　辛夷各一兩　細莘去苗土七錢五分
木通半兩
右爲細末每用少許綿裹塞鼻中濕則易之五七
日瘥

瓜蔕散

治鼻塞
瓜蔕　藜蘆各等分
右爲末每用一錢綿裹塞鼻中日二易之

芎藭散

治鼻齆
芎藭　肉桂　細莘　檳榔　麻黃去節　防己
木通　石菖蒲　白芷各一分　木香　川椒
炙甘草各半分
右㕮咀每服三錢水二盞生薑三片紫蘇葉少許
煎至八分去滓食遠溫服

山茱萸丸

治鼻齆
山茱萸　大黃炒　菊花去梗葉各一兩二錢半
矾硝三兩七錢半　附子炮去皮臍　獨活各七錢
半　秦艽去苗土一兩半　蔓荊子去白皮　梔子
去皮炒　防風　炙甘草各一兩
右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服三十丸空心
用溫酒送下老人亦宜服姙娠去附子加細莘半
分

赤龍散

大抵肺氣注於鼻上榮頭面若上焦壅滯風寒客
於頭腦則氣不通冷氣停滯搏於津液膿涕結聚
則鼻不聞香臭遂成齆也
龍腦半錢研　瓜蔕研十四枚　赤小豆三十粒
黃連三大莖
右爲細末研勻每用菜豆許臨臥吹入鼻中水出
愈

通頂散

治鼻齆

瓜蒂　藜蘆各一分　皂角肉半分　麝香少許
右爲細末每用少許吹入鼻中
雄黃散
治鼻齆
雄黃半錢　瓜蒂二枚　綠礬一錢　麝香少許
右爲細末每用少許吹鼻中亦治瘜肉
黃白散
治鼻齆瘜肉鼻痔等證
雄黃半錢　白礬　瓜蒂　細辛各一錢
右爲細末以雄犬膽汁和丸綿裹塞鼻一方爲末
嗜鼻
通草散
治鼻齆氣息不通不聞香臭并鼻瘜肉
通草　細辛　附子各等分
右爲末蜜和綿裹少許納鼻中
川椒散
治鼻流涕
川椒開口者炒出汗　訶子去核　辣桂　川芎
川白薑生用　細辛　白朮各等分
右爲細末每用二錢食後溫酒調下
細辛散
治肺傷風冷鼻流清涕頭目疼痛胃腦不利
細辛一兩　附子炮去皮臍　白朮　蔓荊子
訶梨勒裹煨去核　芎藭　桂心各七錢五分
枳殼麩炒　炙甘草各半兩
右㕮咀每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去
滓食後服

通草九本事
治鼻塞清涕出腦冷所致
通草　辛夷各半兩　細辛　甘遂　桂心去皮
芎藭　附子各一兩
右爲細末蜜丸綿裹納鼻中密封勿令氣泄丸如
麻子稍加大微覺少痛效搗薑爲丸卽愈
辛夷散三因四
治鼻塞腦冷清涕不已
細辛　川椒　乾薑　川芎　吳茱萸　辛夷
附子各七錢五分　皂角屑半兩　桂心一兩
猪油六兩
右煎猪脂成膏以苦酒浸前八味取入油煎附子
黃色止以綿裹塞鼻中
細辛膏千金
治鼻塞腦冷清涕常流
細辛　川芎　川椒　黑附子炮去皮臍　乾薑
吳茱萸各二錢半　桂心三錢三分　皂角屑一錢
六分半
右用猪脂二兩煎油先一宿以米醋浸藥取入猪
油內同煎附子色黃爲度以綿醮藥塞鼻中
塞鼻柱膏
治鼻常有清涕
桂心　細辛　乾薑炮　川椒去目并合口者炒出
汗各半兩　皂莢二錢半
右爲細末以羊脂和成膏每用如棗核大綿裹塞
鼻中
白芷丸

治鼻流清涕不止
白芷研爲細末
右以葱白搗爛和爲丸如小豆大每服二十丸茶
湯下無時
防風湯
治膽移熱於腦則辛頞鼻淵濁涕不止如湧泉不
蔵久而不已必成衄血之疾
防風去蘆一兩五錢　黃芩　人參　炙甘草
川芎　麥門冬去心各一兩
右爲細末每服二錢沸湯點服食後日三
蒼耳散
治鼻流濁涕不止名曰鼻淵
辛夷半兩　蒼耳子炒二錢半　香白芷一兩
薄荷葉五分
右爲細末每服二錢用葱茶清食後調服
抑金散
治肺熱鼻塞涕濁
細辛　白芷　防風　羌活　當歸身　半夏
川芎　桔梗　陳皮　茯苓各等分
右十味剉作一貼加薄荷三錢薑煎服
南星飲
治風邪入腦宿冷不消鼻內結硬物窒塞腦氣不
宣遂流髓涕
上等大白南星不拘多少切成片
右用沸湯湓兩次焙乾每服二錢用棗七枚甘草
少許煎食後服三四服後其硬物自出腦氣流轉
髓涕自收仍以大蒜葉菱末杵作餅用紗襯炙熱

貼額前用熨斗火熨透或香附末及葷菱末吹入鼻中

辛夷丸

治頭風鼻涕下如白帶者

南星薑製　半夏薑製　蒼朮米泔浸　辛夷
黃芩酒炒　川芎　黃檗炒焦　滑石研　牡蠣煅
各等分

右爲細末糊丸薄荷湯下

川芎丸

治腦瀉臭穢

川芎生用二兩　蒼朮　草烏生去皮尖各半兩

右爲細末麪糊和丸如桐子大每服十九食後茶清送下服藥後忌熱物一時

羊肺散

治鼻漏腦漏

羊肺一具　白朮四兩　蔥蓉　木通　乾薑
川芎各一兩

右五味爲細末以水量打稀稠得所灌肺中煮熟焙乾細研爲末食後米飲服二錢

細辛散

治鼻齆有瘜肉不聞香臭

北細辛　瓜蒂各等分

右爲末綿裹如豆大塞鼻中一名瓜丁散

消鼻痔方

苦丁香　甘遂各二錢　青黛　草烏尖　枯白礬
各二分半

右爲細末麻油搜令硬不可爛旋丸如鼻孔大小納入鼻內令至痔肉上每日一次

又方

治鼻中窒塞氣息不通皆有肉柱若不得出終不能癒餘藥雖漸通利旋復生長宜用此藥

地膽二十枚　白雄犬膽一枚

右先搗地膽爲末納犬膽中以繩繫定三日乃於日出時令病人西首臥中庭以鼻孔向日旁人以故筆粘藥塗入鼻孔中一日一度至五六日當鼻孔裏近眼痛此是欲落更候三四日傳之漸漸噓之即落取將棄於四通道上柱落後急以綿塞之愼風

治瘜肉方

甘遂　硃砂　雄黃　雌黃　藜蘆　明礬煅
瓜蒂各等分

右爲末蜜調傳鼻

辛夷膏

治鼻生瘜肉窒塞不通有時疼痛

辛夷葉二兩　細辛　木通　廣木香　白芷
杏仁湯浸去皮尖研各半兩

右用羊髓猪脂二兩和藥於石器內慢火熬成膏取赤黃色放冷入龍腦麝香各一錢爲丸綿裹塞鼻中數日內脫落即愈

輕黃散

治鼻中瘜肉

雄黃半兩　輕粉　杏仁浸去皮尖雙仁各一錢
麝香少許

右四味用淨乳鉢內先研杏仁如泥後入雄黃麝香同研極細勻磁盒盛定每有患者不拘遠近夜臥用筯點粳米大在鼻中瘜肉上隔一日夜臥點一次半月見效

二丁散

治鼻不聞香臭腦漏流涕等證

苦丁香　丁香　赤小豆各七枚

右爲細末以竹筒吹入鼻中并治偏頭風一方有粟米七枚石膏少許

治鼻痔方

明礬一兩　苪麻七箇　鹽梅肉五箇　麝香少許

右搗爲丸綿裹塞鼻內令著瘜肉候化清水出四邊聆瓏其瘜肉自下

地龍散

治瘜肉

地龍去土炒二錢半　猪牙皂角一枚

右椵存性研爲末先洗鼻內令淨以蜜塗之傳藥少許在內出清水盡瘜肉自除

烏犀丸

治鼻瘡

烏犀鎊　羚羊角鎊　牛黃研　柴胡淨各一兩
丹砂研　天冬去心焙　貝母去心炒　胡黃連
人參各半兩　麥冬去心焙　知母各七錢半
黃芩　炙甘草各二錢半

右爲細末研勻煉蜜丸如梧子大每服二十丸空心溫酒送下

生地黃煎

治鼻生瘡痒痛不止

生地汁　生薑汁各一合　苦參一兩　酥三合
鹽花二錢後入
右以地黃汁生薑汁浸苦參一宿以酥和於銅石器中煎九上九下候汁入酥盡去滓傾入盒中每用少許滴於瘡上諸風熱瘡亦佳其鹽花至半乃下

椿根湯
治疳蝕口鼻
椿根去皮切一升　葱白細切半升　鹽半合
川椒去目并合口者炒出汗一合　豆豉半升
右合和以酢及清泔各三升煎數十沸去滓約一升分三服有惡物下即效小兒量大小加減

烏香散
治鼻疳侵蝕鼻柱
草烏燒灰　麝香研各等分
右研極細以少許貼瘡上

犀角散
治肺熱心神煩悶鼻乾無涕
犀角　木通　升麻　赤茯苓　黃芪　馬牙硝
杏仁去皮尖雙仁炒黃各半兩　麥冬去心一兩
硃砂研　龍腦研　炙甘草各二錢五分
右爲細末每服一錢食後竹葉湯調下

桑根白皮散
治肺臟積熱皮膚乾燥鼻痛無涕頭疼心悶
桑根白皮　木通　大黃剉炒各二兩　石膏
葛根各三兩　升麻一兩半　甘草炙赤一兩
右爲末每服三錢水一盞煎至六分食後溫服

吹鼻散
治鼻乾無涕
龍腦半錢　馬牙硝一錢　瓜蔕十四枚
右研極細每用一豆大吹入鼻中

白芷散
治風冷入肺鼻孔痛塞
白芷　杏仁湯泡去皮尖及雙仁　細莘各一錢
全蠍二箇焙
右爲細末麻油調傅

沒藥散
治前證
沒藥去油　乾蠍去土炒　南星炮　白附子炮
雄黃研　當歸焙　丹砂研　胡黃連　牛黃研
白芷　麝香研　官桂去皮　丁香　炙甘草各二錢半　烏蛇酒浸去皮骨炙半兩
右爲細末研勻每服半錢溫酒調下早晚各一服

白蘚皮湯
治肺受風面色枯白頰時赤皮膚乾燥鼻塞乾痛此爲虛風
白蘚皮　麥冬去心　白茯苓去皮　細莘去苗
杏仁去皮尖雙仁炒　白芷各一兩半　桑白皮
石膏研各二兩
每服三錢水三盞先煑大豆三合取汁一盞去豆下藥煎至七分去滓不拘時服

壺盧酒
治鼻塞眼昏疼痛腦悶
苦壺盧子不拘多少打碎
右以醇酒半升浸春三夏一秋五冬七日少少納鼻中一方用童便浸汁

神效宣腦散
治黃水鼻中下
川鬱金　川芎　青黛　薄荷　小黃米各二分
右爲細末每用少許口噙冷水嗃鼻中

升麻防風散
治鼻赤
升麻　防風　人參各一兩　乾蠍尾半兩炒
雄黃二錢　牛黃一錢　甘草　硃砂各二錢半
麝香一錢　殭蠶半兩炒
右剉碎煉蜜丸如櫻桃大硃砂爲衣每服一丸薄荷湯送下

梔子仁丸
治肺熱鼻發赤瘰
梔子仁不拘多少
爲細末蠟丸桐子大每服二十丸食後茶酒任下

白礬散
治肺風酒齇鼻等疾
白礬生　硫黃生　乳香各等分
右爲末每用手微抓動患處以藥擦之

硫黃散
治酒齇鼻鼻上生黑粉刺
硫黃生　輕粉各一錢　杏仁二七箇去皮
右爲細末唾津調臨臥時塗鼻上早晨洗去

凌霄花散
治酒齇鼻

凌霄花　山梔子各等分

右爲細末每服二錢食後茶湯調服

何首烏丸

治肺風鼻赤面赤

何首烏一兩半　防風　黑豆去皮　荆芥穗　地骨皮洗各一兩　桑白皮　天仙藤　苦參　赤土各半兩

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服三四十丸食後茶清下一方有藥本一兩

大楓油

治肺風面赤鼻赤

草烏尖七箇　大楓油五十文　眞麝香五十文

右以草烏尖爲末入麝研勻次用大楓油磁盒子盛於火上調勻先以生薑擦患處次用藥擦之日二三次兼服前何首烏丸卽除根本

治鼻赤方

川椒　雄黃　白礬枯　舶上硫黃　天仙子　三柰各一兩　輕粉　麝香各少許

右爲細末小磨麻油調搽患處

冬瓜子散

治鼻面酒齇如麻豆疼痛黃水出

梔子仁二兩　冬瓜子仁　柏子仁　白茯苓　葵子微炒　枳實麩炒各一兩

右爲細末每服二錢食後米飲調下

上清丸

治肺熱鼻窒不通

薄荷一斤　川芎　防風各二兩　桔梗五兩　砂仁五錢　甘草四兩

右爲細末煉蜜丸皂角子大每一丸不拘時噙化

肺風鼻赤方

草烏尖七箇　明礬半錢　麝香一字　猪牙皂角一錢

右爲細末以大楓油和勻用磁器火上鎔開先以薑擦次以指蘸藥擦之日三次

酒齇鼻方

生硫黃三錢　黃連　白礬　乳香各一錢半　輕粉半錢

右爲細末用唾津蘸藥擦之日二次

又方

治酒皶鼻并治鼻上贅肉及雀斑等疾亦可點痣

黃丹五文　硇砂三十文研極細　巴豆十粒去殼心膜紙椎去油　酒餅藥五十文罐子盛

右同入餅藥罐子中慢火煎兩三沸取下續入研細生礦灰三錢雞子清調勻赤鼻以鵝毛拭紅處一日一次上藥追出毒物病退卽止次服消風散

樺皮散之類五七貼雀斑用小竹棒挑藥點患處纔覺小腫卽洗去不洗恐藥力太猛

又方

治赤鼻及面風瘡

大楓油五十文　草烏一箇爲末　輕粉　麝香各一百文

右先將草烏入油內煮令勻取出少時下輕粉麝香末攪勻每用少許擦患處令熱旬日痊一方無輕粉用生薑擦患處傳藥

鼻赤肺風方歌

肺風鼻赤最難醫我有良方付與伊但用硫礬爲細末茄汁調塗始見奇

荆芥散

治肺風齇皰

荆芥穗四兩　防風　杏仁去皮尖　白殭蠶炒　蒺藜炒去刺　炙甘草各一兩

右爲細末每服二錢食後茶清調下

蓖麻子膏

治酒齇鼻及肺風面赤生瘡

蓖麻子去殼研　輕粉研　濕青研　硫黃研　黃蠟各二錢　麻油一兩

右熬成膏以磁器盛之每用少許塗患處

鉛紅散

治風熱上攻陽明經絡面鼻紫赤刺癢疹俗呼肺風以肺而淺在皮膚也

舶上硫黃　白礬灰各半兩

右爲末入黃丹少許染與病人面色同每上半錢津液塗之洗漱罷及臨臥再上兼服升麻湯下瀉青丸服之除其本也

荆芥連翹湯　同春

治鼻齇

荆芥　柴胡　川芎　當歸　生地黃　赤芍藥　白芷　防風　薄荷葉　梔子仁　黃芩　桔梗　連翹各五分　甘草三分

右剉作一貼水煎服

通竅湯　醫鑑

治感風寒鼻塞聲重流涕不聞香臭

白芷五分　防風　羌活　藁本　升麻　乾葛
川芎　蒼朮各一錢　麻黃　川椒　細辛　甘草
各三分

右剉作一貼薑三片葱白二莖水煎服

鼻不聞香臭方（同上卷）

薄荷二錢　細辛　白芷　防風　羌活　當歸
川芎　半夏　桔梗　陳皮　赤茯苓各一錢

右剉作一貼水煎服

瓜蒂散（入門）

去鼻痔

瓜蒂四錢　枯白礬　螺殼灰　草烏尖各五分
甘遂一錢

右爲末麻油調作丸如鼻孔大每日一次以藥納鼻內令達痔肉上其痔化爲水肉皆爛下卽愈

黃芩湯（同上卷下同）

治肺火盛鼻孔乾燥或生瘡腫痛

片芩酒炒　梔子連皮酒炒　桔梗　赤芍藥
桑白皮　麥冬　荆芥穗　薄荷　連翹各一錢
甘草二分

右剉作一貼水煎食後服

洗肺散

治鼻中生瘡

片芩酒炒二錢　甘草五分　五味子　天門冬
半夏　杏仁各一錢

右剉作一貼入薑五片水煎食後服

清血四物湯

治酒齇

川芎　當歸　赤芍　生地　片芩酒炒　陳皮
紅花酒焙　赤茯苓各一錢　生甘草五分

右剉作一貼入薑二片煎水調五靈脂末一錢食後服

白龍丸（丹溪）

治酒齇滿面紫黑

川芎　藁本　細辛　白芷　甘草各等分

右末四兩入煆石膏末一斤水丸彈子大逐日用此藥洗面如澡豆法或夕塗晨洗之

參歸丸（醫鑑）

治酒齇乃血熱入肺

苦參四兩　當歸二兩

右末酒糊和丸梧子大熱茶清下七八十九

肺風丸（東垣）

治面鼻風齇及齇皰

細辛　旋覆花　羌活各二兩　晚蠶蛾去翅足
苦參各一錢

右末軟飯和丸梧子大食後茶清下五七十九

升麻湯（丹溪）

治肺風瘡

陳皮　甘草生各一錢　蒼朮　乾薑　桔梗
升麻各七分　芍藥　大黃酒蒸各五分　半夏
茯苓　白芷　當歸各三分　枳殼　乾葛各二分

右剉作一貼入薑三片葱心一撮同煎服

清肺飲子（醫鑑）

治鼻紅肺風瘡

薄荷一兩　山茶花　胡麻仁　片黃芩酒炒
梔子仁　葛花　苦參　甘草各七錢　連翹
荆芥　芍藥　防風各三錢

右爲末每二錢茶清調服後用搽藥

辛夷清肺飲（正宗下同）

治肺熱鼻內生瘡肉初如石榴子日後漸大閉塞孔竅氣不宣通

辛夷六分　黃芩　山梔　麥冬　百合　石膏
知母各一錢　甘草五分　枇杷葉三片去毛淨
升麻三分

右水二鍾煎八分食後服

硇砂散

治鼻生瘡肉初如櫻子漸大下垂名爲鼻痔

硇砂一錢　輕粉三分　冰片五釐　雄黃三分

右共爲細末用草桔咬毛蘸藥勤點痔上日用五六次自然漸化爲水而愈

茴香散

茴香草　高良薑各等分

右爲末用吹鼻痔上二次片時許隨後方行取法其痔自然易脫取法載後針灸法中

清氣化痰丸

治肺風瘡

南星　半夏用皂角白礬生薑各三兩水十椀煮至五椀取湯浸星夏二日焙至無白點爲度曬乾各八兩　橘紅　枳殼各二兩　木香　沉香各一兩　蒼朮米泔浸炒四兩

右爲末薑汁糊丸淡鹽湯白湯任下

金沸草散
治前證
前胡　旋覆花各一兩　赤芍炒　甘草各一錢
半夏製五錢　荆芥穗一兩半　赤茯苓六錢半
右爲粗末每服一二錢薑三片水煎服日三
羌活湯
治前證
羌活　川芎　防風　山梔　膽草　當歸等分
甘草減半　淡竹葉　薄荷葉各十片
右水煎溫服無時
二香散
治鼻中肉蠼蛆
赤龍爪　苦丁香各二十箇　苦壺盧子一撮
麝香少許
右爲末用紙撚子蘸藥末點之
補腦散
治陽虛腦寒鼻淵
天雄炮　辛夷仁　蒼耳葉各等分
右共爲末飯後酒下二錢
靈砂丹
治前證
水銀一斤　硫黃四兩
右二味於新銚內炒成砂更入水火鼎內煅煉爲末糯米糊丸如麻子大每服三丸加至五七丸忌豬羊血菜豆粉冷滑之物
理中湯
治前證
人參　白朮炒　乾薑炒　炙甘草各三兩
右水煎服
吳茱萸丸
治前證
吳茱萸兩半洗炒　神麴炒五兩　白朮炒四兩
肉桂　乾薑炮各二兩五錢　川椒去目炒一兩
右爲末糊丸桐子大米飲下三五十丸食前服
養正丹
治前證
硫黃爲末　黑錫鎔淨　水銀　硃砂研各一兩
右將錫化入硫末漸入漸攪爲末再入水銀同擂如硬再於火上微煅又擂勻放冷研極細末糯米糊丸菜豆大每服三十丸空心鹽湯下
黃芩知母湯 宋 抄
治夏月火熾有痰面赤煩躁鼻流清涕
黃芩　知母　桑白皮　杏仁　山梔　天花粉
貝母　桔梗　甘草等分
水二鍾煎八分食遠服
防風通聖散 河間
治風熱上攻鼻塞等證
防風　川芎　當歸　赤芍藥　麻黃　連翹
薄荷葉　大黃　芒硝各五錢　石膏　黃芩
桔梗各一兩　滑石三兩　甘草二兩　荆芥
白朮　梔子各二錢五分
右爲末每服二錢水一大鍾生薑三片煎六七分溫服醫鑑加酒炒黃連薄荷葉名黃連通聖散治鼻淵證
消風散 局方
治風熱上攻頭目昏眩鼻塞聲重及癮疹搔癢
荆芥穗　炙甘草　人參　川芎　防風　羌活
薄荷　蟬蛻炒　殭蠶炒　茯苓各二錢　陳皮
厚朴各二錢
右爲末每服二三錢茶清調服
搽鼻去紅方 醫鑑
輕粉七分　白礬　水銀　京墨各一錢　杏仁
大楓子　五味子各四十九箇　核桃　白楊葉各七箇
右爲末雞子清調搽患處
神愈散
治肺熱鼻流濁涕窒塞不通
細辛　白芷　防風　羌活　當歸　半夏製
川芎　桔梗　陳皮　茯苓各等分
右爲末每服三錢薄荷薑煎服
防風散
治前證
防風去蘆　木通　麥冬去心　川升麻　虎杖
葛根各一兩　甘草炙七錢五分　石膏二兩
右咬咀每服五錢水一大盞煎至五分去查溫服不拘時候
小柴胡湯 仲景
治前證
柴胡半斤　半夏半升　人參　黃芩　生薑
甘草各三兩　大棗十二枚劈
右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三

升溫服一升日三服

升麻葛根湯

治前證

升麻　葛根　芍藥　甘草各等分

水煎寒多熱服熱多寒服

參蘇飲局方

治四時感冒風寒聲重鼻塞等證

人參　紫蘇葉　乾葛　前胡　陳皮　枳殼

半夏　茯苓各八分　木香　桔梗　甘草各五分

水二鍾薑五片棗一枚煎八分熱服

消風百解散局方

治四時傷寒頭疼發熱及風寒咳嗽鼻塞聲重

荊芥穗　麻黃　白芷　蒼朮　陳皮各一錢

甘草五分

右水鍾半薑葱煎八分熱服嗽甚更加烏梅一箇

枇杷葉丸正宗下同

治鼻齇初起紅色久則肉皰發腫

枇杷葉去毛刺八兩　黃芩酒炒　花粉各四兩

甘草一兩

共爲末用新安酒丸桐子大每服一錢五分食後

併臨睡白滾湯茶湯俱可送下忌火酒煎炒

黃芩清肺飲

治證同前

川芎　當歸　赤芍　防風　生地　天花粉

乾葛　連翹　紅花各一錢　黃芩二錢　薄荷五

分

水二鍾煎八分食後服用酒一杯過口

眞君妙貼散

治齇鼻紅赤紫腫

明淨硫黃末十斤　蕎麪　白麪各五斤

共用清水微拌乾濕得宜木廂內躧成麪片單紙

包裹風中陰乾收用臨時研極細新汲水調傅

奇受藿香湯

治鼻淵黃水濁涕長流致腦戶虛眩不已

藿香連枝帶葉者五錢

水一椀煎七分加公猪膽汁一枚和勻食後通口

服重者不過三服如苦甚不堪服用藿香末一兩

公猪膽汁熬稠膏爲丸每服二錢食後白滾湯下

清化飲景岳全書

治腦漏

芍藥　麥冬各二錢　石斛一錢　丹皮　茯苓

黃芩　生地各二三錢

水一鍾煎七分食遠溫服

單方

酒齇用白鹽和津唾常擦之爲妙得效

鼻中瘜肉取枯礬末和猪脂綿裹塞鼻中甚妙本草

鼻紅用硫黃化開入燒酒內淬三次爲末茄汁調敷

三次即效種杏

鼻中瘜肉取雄黃如棗核大塞鼻中瘜肉自落本草

酒齇輕粉硫黃爲末和津唾擦之又輕粉硫黃乳香

細莘爲末唾調敷之綱目

鼻多涕芎藭或煎或末服並佳本草下同

鼻塞乾薑爲末蜜和丸塞鼻中

鼻塞辛夷爲末葱茶清點服一錢又綿裹塞鼻中

鼻塞皂角炙爲末取少許吹入鼻中又食物入鼻不

出以末吹鼻取嚏即出

久患鼻瘡膿極臭百草霜細研爲末以冷水調下二

錢綱目

鼻中瘜肉瓜蔕爲末綿裹塞之或和羊脂或和細莘

皆佳本草

瘜肉胡荽搗爛塞鼻瘜肉自落丹溪

鼻齆及鼻中瘜肉取瓜蔕細莘末和狗膽汁塞鼻即

效本草

狗頭骨灰和硇砂少許嗜鼻中瘜肉自化丹溪

狗頭灰一錢丁香半錢細研吹鼻中瘜肉化爲水類聚

酒齇赤鼻蜀葵花研末臘猪脂和勻夜傅旦洗仁存方

鼻中生瘡生大黃杏仁搗勻猪脂和塗

口鼻急疳蝕爛腐草臭斗子鹽白麪等分爲末每以

吹之普濟方

鼻中生瘡生大黃黃連各一錢麝香少許爲末生油

調搽聖惠方

鼻窒不通蓖麻子仁三百粒大棗去皮一枚搗勻綿

裹塞之一日一易三十日聞香臭也聖濟錄

鼻流清涕蒺藜苗二握黃連二兩水二升煎一升少

少灌鼻中取嚏不過再服聖惠方

鼻中瘜肉硇砂點之即落白飛霞方

疳蟲蝕鼻雄黃葶藶等分研末臘猪膽和用槐枝點

之金匱方

鼻準赤色雄黃硫黃各五錢水粉二錢用頭生乳汁

傅不過三五次愈

鼻中瘜肉藜蘆三分雄黃一分爲末蜜和點之每日三上自消勿點兩畔聖濟方

肺實鼻塞不知香臭白薇貝母荻冬花一兩百部二兩爲末每服二錢米飲下普濟方

鼻中瘜肉用梁上塵吹之

鼻瘡膿血臭有蟲也苦參枯礬一兩生地黃汁三合水二盞煎三合少少滴之普濟方

鼻內生瘡密陀僧香白芷等分爲末蠟燭油調塗之簡便方

鼻齇赤皰密陀僧二兩細研人乳調夜塗旦洗聖惠方

鼻塞以狗膽汁和綿裹塞鼻中

齆鼻不聞香臭取鐵鎖磨石上取末和猪脂綿裹塞之經日肉出瘥普濟方

鼻上作痛上品硫黃末冷水調搽澹寮方

又方用舶上硫黃檳榔等分片腦少許爲末絹包日日擦之加蓖麻油更妙

鼻中生瘡黃蘗檳榔末猪脂和傅普濟方

酒齇用凌霄花半兩硫黃一兩胡桃四箇膩粉一錢研膏生絹包揩

赤鼻作痛紫色石葶脂紅色次之黃色勿用研末冷水調搽半月絕根

鼻流清涕華茇末吹之有效易簡方

鼻氣窒塞以水五升煑槐葉取三升下葱豉同和再煎服千金方

面鼻酒齇南方沒石子有孔者水磨成膏夜夜塗之妙得效方

鼻中毛出晝夜可長一二尺漸漸粗圓如繩痛不可忍摘去復生此因食猪羊血過多所致用生乳香硇砂各一兩爲末飯丸梧子大每空心臨臥各服十丸水下自退落夏子益奇疾方

腦崩流汁鼻中時時流臭黃水腦痛名控腦砂有蟲食腦中也用絲瓜藤近根三五尺燒存性每服一錢溫酒下以愈爲度醫學正傳

面鼻酒齇白薇白石脂杏仁各半兩爲末雞子清調塗旦洗御藥院方

鼻中生瘡杏仁研末乳汁和傅千金方下同

疳瘡蝕鼻杏仁燒黃取油傅之

鼻內生瘡桃葉嫩心杵爛塞之無葉用枝簡便方

肺熱鼻齇桐油入黃連末用天仙藤燒熱油傅之摘元方

鼻中瘜肉青蒿灰石灰等分淋汁熬膏點之聖濟總錄

又方人中白瓦焙每溫湯服一錢集驗方

鼻窒不通乾柿同粳米煑粥日食聖濟方

鼻塞不通小薊一把水三升煑取一升分服外臺秘要方

鼻淵流涕蒼耳子炒研爲末每白湯點服一二錢證治要訣

酒齇風鼻赤橘核炒研服一錢胡桃肉一箇擂酒服以止爲度

酒齇赤鼻面上風瘡枇杷葉梔子仁等分爲末每服二錢溫酒調下日三服

頭風鼻流清涕枇杷花辛夷等分研末酒服二錢日二服

鼻面酒齇銀杏酒酵糟同嚼爛夜塗旦洗醫林集要

酒齇鼻赤出膿血者以泔水煑爛槲葉取汁洗之拭乾納槲葉灰少許於中良聖惠方

鼻上酒齇以淅米泔食後冷飲外以硫黃入大菜頭內煨碾塗之

疳蝕口鼻唇頰穿者綿裹人屎貼之必有蟲出愈十便良方

鼻淵腦瀉用藕節芎藭焙研爲末每服二錢米飲下普濟方

鼻淵鼻鼽鼻窒臭瘡及痘後鼻瘡並用辛夷苞研末入麝香少許葱白蘸入數次甚良

鼻中瘜肉丁香綿裹納之聖惠方下同

鼻中瘜肉細莘末時時吹之

鼻中瘜肉垂下者用片腦點之自入集簡方

酒齇鼻赤腦子眞酥頻搽普濟方

鼻疳有蟲黃蘗二兩冷水浸一宿絞汁溫服聖惠方

鼻外齇瘤膿水血出蜂房炙研酒服方寸匕日三服肘後方

鼻齆不聞新馬屎汁灌入即通聖惠方

風刺赤鼻大楓子仁木鼈子仁輕粉硫黃爲末夜夜唾調塗之

鼻瘡疳蠱鰣鯽魚骨白芨各一錢輕粉二字爲末搽之錢乙小兒方

鼻中生瘡牛骨狗骨燒灰臘猪脂和傅千金方

鼻塞不通麻鞋燒灰吹之立通經驗方

面鼻酒齇白丁香十二粒蜜半兩早夜點久久自去聖惠方

鼻中瘜肉蜣螂十枚納青竹筒中油紙密封置厠坑

內四十九日取出曬乾入麝香少許爲末塗之當化爲水也聖惠方

鼻疳赤爛蘭香葉燒灰二錢銅青五分輕粉二字爲末日傅三次錢乙小兒方

鼻中瘜肉陳瓜蔕末吹之日三次瘥乃已聖惠方下同

又方瓜蔕末白礬末各五分綿裹塞之或以猪脂和梃子塞之一日換

又方青瓜蔕二枚雄黃麝香半分爲末先抓破然後貼之日三次

又方瓜蔕十四箇丁香一箇黍米四十九粒研末口中含水嗃鼻取下乃止湯液

鼻齆膿血正月取鼠頭燒灰以臘月猪脂調傅之外臺

鼻中瘜肉蝟皮炙爲末綿裹塞之日三千金方

鼻中瘜肉地膽生研汁灌之乾者酒煑取汁

又方細莘白芷等分爲末以生地膽汁和成膏每用少許點之以消爲度聖惠方

腦熱鼻淵肺壅多涕雞蘇葉麥門冬川芎藭桑白皮炒黃芪炙甘草生地黃焙等分爲末煉蜜丸梧子大每服四十丸人參湯下聖濟總錄

鍼灸

靈樞曰人之嚏者何氣使然岐伯曰陽氣和利滿於心出於鼻故爲嚏補足太陽榮眉本一曰眉上也

甲乙經曰邪客於足陽明之絡令人鼽衄上齒寒刺足中指爪甲上與肉交者各一痏左取右右取左

頭痛身熱鼻窒喘息不利煩滿汗不出曲差主之

頭項痛重暫起僵仆鼻窒鼽衄喘息不得通通天主之

腦風頭痛惡見風寒鼽衄鼻窒喘息不通承靈主之

頸痛項不得顧目泣出多眵矇鼻鼽衄目肉眥赤痛氣厥耳目不明咽喉僂引項筋攣不收風池主之

風眩頭痛鼻不利時嚏清涕自出風門主之

頭風痛鼻鼽衄善嚏攢竹主之

肩背痛鼻衄不得息不知香臭天牖主之

熱病鼻張列缺主之

多臥鼻齵痛鼻鼽二間主之

鼻鼽衄熱病汗不得出胷滿不得息陽谿主之

頭重鼻衄至陰主之

鼽衄腰脊脚腨痠重承山主之

熱病汗不出鼽衄惡風鼻不利厲兌主之

虛瘧鼽衄飛揚主之

癲疾多言實則鼻鼽衄徧歷主之

鼻不利前谷主之

鼽衄腕骨主之

鼻鼽衄不止取足太陽大衄衃血取手太陽不已刺腕骨下不已刺胭中出血

鼻不通左窒刺右右窒刺左兩脅下痛泄上下出胷滿短氣不得汗補手太陽以出之

鼻鼽衄上星主之先取譩譆後取天牖風池

鼻管疽發爲病腦空主之

鼻鼽不利窒洞氣塞喎僻多涕鼽衄有癰迎香主之

鼽衄涕出中有懸癰瘜肉窒洞不通不知香臭禾窌主之

鼻窒口僻清涕出不可止鼽衄有癰禾窌主之

鼻中瘜肉不利鼻頭額頞中痛鼻中有蝕瘡齗交主之

鼻鼽不得息不收涕不知香臭及衄不止水溝主之

衄血不止承漿及委中主之

資生方曰鼻涕多宜灸顖會前頂迎香

醫學綱目曰鼻流清涕濁涕灸上星二七壯清補濁瀉

又法取上星人中風府不愈再取百會風池風門大椎

鼻流濁穢灸上星曲差刺合谷不愈取人中迎香

鼻中瘜肉鼽衄取風池風門風府人中禾窌

鼻閉塞不聞香臭刺迎香一分沿皮向上瀉多補少忌灸上星三分

又法迎香上星合谷三處取之不愈灸人中風府百勞

針灸鼻鼽獨取足太陽經云足太陽之別名曰飛揚去踝七寸別走少陰實則鼽窒頭背痛取之所別是也

證治準繩曰灸法顖會在鼻心直上入髮際二寸可容豆是穴灸七壯又灸通天在顖會上一寸兩旁各

一寸灸七壯左臭灸左右臭灸右俱臭俱灸曾用此法灸數人皆於鼻中去臭積一塊如朽骨臭不可言去此全愈

外科正宗曰取鼻痔祕法先用茴香草散連吹二次次用細銅筯二根筯頭鑽一小孔用絲線穿孔內二筯相離五分許以二筯頭直入鼻痔根上將筯線絞緊向下一拔其痔自然拔落置水中觀其大小須用胎髮燒灰象牙末等分吹鼻內其血自止戒口不發

景岳全書曰顱會穴灸七壯治鼻齆鼻痔

治濁涕灸上星三壯七壯通天灸七壯灸後鼻出鼻積方愈

治鼻塞多涕迎香人中大椎合谷風府曲差百會風池並治鼻流臭穢灸三壯不愈灸七壯

導引

古今醫統曰東向坐不息三通手捻鼻兩孔治鼻中患交脚踑坐治鼻中患通脚坐治鼻中瘡去其涕唾令鼻道通得聞香臭久行徹聞十方

又法踞坐合兩膝張兩足不息五通治鼻瘡

又法端坐伸腰徐徐以鼻內氣以右手捻鼻徐徐閉目吐氣去鼻中瘜肉

養性書曰揩鼻潤肺常以手中指於鼻梁兩邊揩二三十遍令表裏俱熱所謂灌溉中岳以潤於肺也

又法常去鼻中毛謂其爲神氣出入之門戶也

保生祕要曰鼻淵并治不聞香臭導引法用中指尖掌心搓法極熱熨搓迎香二穴可時搓時運兼行後功可也

運功法歸元念滌過命門想腎水升上崐崘降臍次從左乳下經絡推至湧泉噓而吸之又行鼻間運患處搖動尾閭若患左則從右鼻肋推至左湧泉後又念臍滌過腎臉想水灌頂歸覆臍或頰紅及鼻但推紅處撤散升腎水洗肺久自退

鼻鼽想水圈圈洗肺經推開患處想火燒之又想水洗之其蟲用意拔出來

冒風鼻塞先清肺經以兩手指擦鼻兩旁令其內外俱熱如虛火升兩眼看脚底念

醫案

集異記曰狄梁公性嫺醫藥尤妙針術顯慶中應制入關路由華州闤闠之北稠人廣衆聚觀如堵狄梁公引轡遙望有巨牌大字云能療此兒酬絹千疋卽就觀之有富室兒年可十四五臥牌下鼻端生贅大如拳石根蔕綴鼻纔如食筯或觸之酸痛刻骨於是兩眼爲贅所繩目睛翻白痛楚危極頃刻將絕惻然久之乃曰吾能爲也其父母洎親屬叩顙祈請卽輦千絹寘於坐側公因令扶起卽於腦後下針寸許仍詢病者曰針氣已達病處乎病人領之公遽抽針而疣贅應手而落雙目登時亦如初曾無病痛其父母親眷且泣且拜則以縑物奉焉公笑曰吾哀爾命之危逼吾蓋急病行志耳吾非鬻伎者也不顧而去

儒門事親曰常仲明常於暑時風快處披露肌膚以求爽爲風所賊三日鼻窒雖坐於暖處少通終不大解戴人使服通聖散入生薑葱根豆豉同煎三兩服大發汗鼻立通矣

丹溪心法曰一人鼻流濁涕有穢氣脈弦小右寸滑左寸澀先灸上星三里合谷次以酒芩二兩蒼朮半夏各一兩辛夷細莘川芎白芷石膏人參葛根各五錢右剉分七貼服之全愈

醫學綱目曰治一男子右鼻管流濁涕有穢氣脈弦小右寸滑左寸澀先灸上星三里合谷次以酒芩二兩蒼朮半夏各一兩辛夷細莘川芎白芷石膏人參葛根各半兩分七貼服之全愈此乃濕熱痰積之證也

孫一奎云余嘗治一人用防風通聖散除硝黃其滑石石膏減半倍加辛夷花先服三五貼再用此爲丸每服七十丸早晚白湯吞服半斤則瘳矣

薛己醫按曰一儒者素勤苦惡風寒鼻流清涕寒禁噎噴余曰此脾肺氣虛不能實腠理彼不信服祛風之藥肢體痲倦痰涎自出殊類中風余曰此因風劑耗散元氣陰火乘其土位遂以補中益氣加麥冬五味治之而愈

鴻臚蘇龍溪欬嗽氣喘鼻塞流涕余用參蘇飲一劑以散寒邪更用補中益氣湯以實腠理而愈後因勞

怒仍作自用前飲益甚加黃連枳實腹脹不食小便短少服二陳四苓前證愈劇小便不通余曰腹脹不食脾胃虛也小便短少肺腎虛也悉因攻伐所致投以六君加黃芪炮薑五味二劑諸證頓退再用補中益氣加炮薑五味數劑全愈

職坊王用之喘嗽作渴面赤鼻乾余以爲脾肺有熱用二陳加芩連山梔桔梗麥冬而愈

倉憲阮君聘咳嗽面白鼻流清涕此脾肺虛而兼外邪用補中益氣加茯苓半夏五味治之而愈又用六君弓歸之類而安

一男子面白鼻流清涕不聞香臭三年矣用補中益氣加麥冬山梔而愈

一儒者每至秋嗽用參蘇飲之類乃愈後復發仍用前藥反喉痺左尺洪數而無力余以爲腎經陰火刑剋肺金以六味丸料加麥冬五味炒山梔及補中益氣湯而愈

吳江史元年子傷風用表散化痰之藥痰盛欬嗽肚腹膨大面色㿗白此脾土虛不能生肺金也余用六君子湯加桔梗一劑頓愈至三日前證仍作鼻流清涕此復傷風寒所致用前藥加桑皮杏仁桔梗而愈

長洲庠蘇子忠鼻梁患疔證屬表邪但氣血俱虛不膽發散遂用補中益氣爲主佐以防風白芷而愈

證治準繩曰孫氏姑鼻不聞香臭有年矣後因他疾友人繆仲淳爲處方每服用桑白皮至七八錢服久而鼻塞忽通

韓氏醫通曰一貴人鼻中肉贅臭不可近痛不可搖東手待斃予但以白礬末加硇砂少許吹其上頃之化水而清與勝濕湯加瀉白散二貼愈此乃厚味壅遏濕熱蒸於肺門如雨霽之地突生芝菌也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百七十三卷目錄
醫部彙考一百五十三
脣口門一
黃帝素問 金匱眞言論 陰陽應象大論 六節藏象論 風論 痺論 厥論 奇病論 氣交變大論 五常政大論 至眞要大論
靈樞經 邪氣臟腑病形篇 經脈篇 經水篇 經筋篇 衛氣篇 熱病篇 師傳篇 逆順肥瘦篇 本臟篇 衛氣失常篇 陰陽二十五人篇 受患無言論 病傳篇 五閱五使篇 陰陽繫日月篇 口問篇 厥論
扁鵲難經 脈病吉凶
張機金匱要略 口燥 口苦 口臭 咳逆 口乾燥 吐涎沫 口瘡 口爛 咽喉痛 唾膿血 口不仁 面口歪 口噤 口臭 酸苦臭辛臊之異
王叔和脈訣 診法
竇漢卿瘡瘍全書 脣腫 脣裂
錢乙指迷論 脣病
楊士瀛直指方 脣腫 脣瘡 口臭
陳無擇三因方 失欠脫頷
劉完素六書 口苦 口瘡
張從政儒門事親 口瘡 口臭 口瘡 口具酸苦臭辛臊之異 口瘡 口臭 口瘡
李杲十書 脾飲食勞役傷 口瘡
朱震亨心法 口瘡 口具酸苦臭辛臊之異
羅天益衛生寶鑑 口瘡論
危亦林得效方 五臟氣偏勝則應於口
方賢奇效良方 總論
薛己口齒類要 口瘡
李梴醫學入門 口病總論
戴思恭證治要訣 口瘡
吳崐醫方考 口病方論

王肯堂證治準繩 脣部所屬口都所主 口瘡 口瘡治法 口瘡 脣風 脣口破 落下 脣裂 脣腫 脣口瘡 口瘡治法
陳實功外科正宗 脣風 脣腫 脣口瘡 口瘡 口瘡治法
張介賓景岳全書 渴乾之病 苦酸之味 臭氣有熱蓄熱 口瘡 口瘡治法
陳士鐸石室秘錄 口瘡 脣裂

黃帝素問

金匱眞言論

中央黃色入通於脾開竅於口藏精於脾

註 中央土位脾土藏其氣相通黃者土色口者脾竅

陰陽應象大論

中央生濕濕生土土生甘甘生脾脾生肉肉生肺脾主口在竅爲口

註 脾氣通於口脾和則能知穀味故脾主口脾者主爲衛使之迎糧故脾竅在口

六節藏象論

脾胃大腸小腸三焦膀胱者倉廩之本榮之居也名曰器其華在脣四白

註 脾受水穀爲轉輸之官腸胃受傳水穀三焦決瀆水道膀胱爲水精之腑故皆爲倉廩之本脾藏榮故爲榮之居脾具升降出入之氣故名曰器四白者脣之四際白肉也口爲脾竅而主胍故華在脣四白

診要經終論

陽明終者口目動作善驚妄言色黃其上下經盛不仁則終矣

註 手足陽明之脈皆挾口承目故口目動作而章引歪邪也

熱論

五日少陰受之少陰脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴

十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而嚏

註 六氣相傳雖入於裏陰而皆爲熱證故口燥渴邪氣漸衰則正氣漸復故渴止其兩感於寒者病一日則巨陽與少陰俱病則頭痛口乾而煩滿

註 此復論陰陽兩感之爲病也太陽與少陰相爲表裏一日而陰陽俱受其邪是以見太陽之頭痛少陰之煩滿口乾

氣厥論

膀胱移熱於小腸鬲腸不便上爲口糜

註 小腸之脈絡心循咽下鬲屬小腸小腸之下名曰闌門泌別汁滲入膀胱膀胱反移熱於小腸是以鬲腸不能下滲濕熱之氣反隨經上逆而口爲之糜爛矣

風論

以夏丙丁傷於風者爲心風心風之狀多汗惡風焦

絕善怒嚇赤色病甚則言不可快診在口其色赤

註心爲火臟風淫則火盛故脣口焦而津液絕也

風化木木火交熾故善爲怒嚇心主舌病甚則舌本强而言不可快心和則舌能知五味故診驗在口

久風入中則爲腸風飧泄外在腠理則爲泄風泄風之狀多汗汗出泄衣上口中乾上漬其風不能勞事身體盡痛則寒

註脾胃之氣外主肌腠內主腹中風邪久在肌腠而入於中則脾胃之氣受傷而爲腸風飧泄蓋大腸小腸皆屬於胃也若久在外之腠理則陽氣外馳而爲泄風泄風者腠理開而傷氣故多汗汗泄衣上漸漬滲泄元府不閉也津液外泄故口中乾燥上漬其風者謂身半以上風濕相搏則陽氣受傷故不能煩勞其事若妄作勞則身體盡痛而發寒矣

瘚論

肝氣熱則膽泄口苦筋膜乾筋膜乾則筋急而攣發爲筋瘚

註膽者中精之腑其應在筋是周身之筋膜由膽藏之精汁以營養膽附於肝肝氣熱則膽汁泄而口苦膽汁泄則筋膜無以營養而乾燥筋膜乾則攣急而發爲筋瘚也

厥論

少陰之厥則口乾溺赤腹滿心痛

註足少陰之脈屬腎絡膀胱貫肝膈入肺中出絡心注胸中循喉嚨挾舌本經脈厥逆而陰液不能上養是以口乾心痛肺金不能遍調於下故溺赤水火陰陽之氣不交故腹滿也

奇病論

帝曰有病口甘者病名爲何何以得之岐伯曰此五氣之溢也名曰脾癉夫五味入口藏於胃脾爲之行其精氣津液在脾故令人口甘也此肥美之所發也此人必數食甘美而多肥也肥者令人內熱甘者令人中滿故其氣上溢轉爲消渴治之以蘭除陳氣也

註五氣者土氣也土位中央在數爲五在味爲甘在臭爲香在臟爲脾在竅爲口多食甘美則臭味留於脾中脾氣溢而證見於外竅也厚味令人內熱甘者主於留中夫脾主爲胃行其津液五味入口津液各走其道甘先入脾數食甘美而多肥則內熱凿中津液不能輸布於五臟而獨存於脾脾氣上溢發爲口甘治之以蘭除陳氣也

氣交變大論

歲金不及炎火乃行民病口瘡甚則心痛

註六乙之歲金運不及則所勝之火氣乃行金弱火亢水乃復之水寒之氣上乘迫其心火外炎故民病口瘡甚則心痛

五常政大論

備化之紀其主口

註備化土政也土屬脾脾開竅於口

厥陰司天風氣下臨脾氣上從而土且隆黃起水迺眚土用革體重肌肉萎食減口爽

註土平之紀其類土其臟脾其色黃土且隆者土體豐厚於下也黃起者土用上從於天也土從木化則受其勝制故土變革而爲體重食減之脾病也

至眞要大論

少陽之復大熱將至火氣內發上爲口糜

註夫所謂火者少陰之火也火氣內發於上焦則爲口糜也

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

膽病者善太息口苦嘔宿汁心下澹澹恐人將捕之嗌中吟吟然數唾

註膽病則膽氣不升故太息以伸出之口苦嘔宿汁者膽汁也心下澹澹恐人將捕之者膽氣虛也嗌中吟吟然數唾者少陽之脈病也

經脈篇

大腸手陽明之脈還出挾口交人中是主津液所生病者口黃口乾鮅鮭喉痹肩前臑痛也

註大腸傳導水穀變化精微故主所生津液病則津液竭而火熱盛故爲口黃口乾諸證也

胃足陽明之脈還出挾口環脣下交承漿是主血所生病者狂癲溫淫汗出鮅鮭口喎脣胗

註胃爲水穀之海主生此榮血故是主血所生病者爲狂爲溫癲汗出者胃氣熱而蒸發水液之汗也鮅鮭者經氣熱也口喎脣胗等者皆陽明經脈之爲病也

足太陰氣絕者則脈不榮肌肉脣舌者肌肉之本也脈不榮則肌肉輭肌肉輭則肉萎人中滿人中滿則脣反脣反者肉先死甲篤乙死木勝土也

註足太陰之氣生於脾脾藏榮而外主肌肉是以太陰氣絕則脈不榮於肌肉矣脾開竅於口主爲衛使之迎糧故脣舌爲肌肉之本脈不榮則舌萎脣反太陰之生氣絕於外也甲篤乙死脾臟之氣死於內矣

經水篇

足陽明之正上循咽出於口上額顱

經筋篇

足陽明之筋其直者上挾口其病口僻足之陽明手之太陽筋急則口目皆僻

註足陽明之筋上挾口爲目下網手太陽之筋結於頷屬目外皆故二經之左筋急則僻於左而當刺其左右筋急則僻於右而當刺其右

寒熱病篇

肌寒熱者肌痛毛髮焦而脣槁腊

註脈外之血氣充膚熱肉生毫毛故病在肌則肌肉痛而毛髮焦也脾主肌肉開竅於口故脣口槁腊

師傳篇

脾者主爲衛使之迎糧視脣舌好惡以知吉凶

註脾乃轉運之官故主爲衛吉凶者臟安則吉臟病則凶也

脣厚人中長以候小腸

註口乃脾之竅小腸受盛脾胃之濁而上屬於胃故脣與人中以候小腸

逆順肥瘦篇

年質壯大血氣充盈膚革堅固因加以邪刺此者深而留之此肥人也廣肩腋項肉薄皮厚而黑色脣臨臨然其血黑以濁其氣濇以遲其爲人也貪於取與

刺此者深而留之多益其數也

註此論形體之太過也廣肩腋者廣闊於四旁也項乃太陽之所主項肉薄而皮厚黑色者太陽之水氣盛也脣乃脾土之外候臨臨然者土氣厚大也黑者水之色血黑以濁者精水之重濁也氣濇以遲者肌肉厚而氣道滯也夫太過則能與不及則貪取貪於取與皆不得中和之道者也

瘦人者皮薄色少肉廉廉然薄脣輕言其血清氣滑易脫於氣易損於血刺此者淺而疾之

註此論形體之不及也皮薄色少秉天氣之不足廉廉瘦潔貌肉廉廉然薄脣輕言秉地氣之不足血清者水清淺氣滑者肌肉薄而氣道滑利也

本藏篇

揭脣者脾高脣下縱者脾下脣堅者脾堅脣大而不堅者脾脆脣上下好者脾端正脣偏舉者脾偏傾也

衛氣失常篇

脣色青黃赤白黑者病在肌肉

註肌肉者脾土之外合土灌四臟故觀脣色青黃赤白黑者知衛氣之病在肌肉也

陰陽二十五人篇

足陽明之上血氣皆少則兩吻多畫

註血氣少不能充皮膚肥腠理故兩吻多瘦文也

憂恚無言篇

口脣者音聲之扇也

熱病篇

熱病七日八日脈微小病者溲血口中乾一日半而死脈代者一日死

註此外熱不解內傳少陰而爲死證也六經傳遍七日來復八日不解又作再經矣微細少陰之脈也少陰之上君火主之病者溲血病足少陰之水臟也口中乾病手少陰之君火也一日半死者死於一二日之間陰陽水火之氣終也夫脈始於腎而主於心脈代者已絕於下故一日而死

熱病不知所痛耳聾不能自收口乾陽熱甚陰頗有寒者熱在髓死不可治

註熱病不知所痛者外因之熱入於內也耳聾不能自收口乾者腎臟之熱乘於上也陽熱甚而陰頗有寒者在內之熱交爭於外也熱在髓者外因之熱交爭於內也此皆病深入於內故死

五閱五使篇

口脣者脾之官也

註脾開竅於口故口爲脾之官

腸胃篇

口廣二寸半

口問篇

陽明氣至則懾脣

註陽明之脈挾口環脣生氣厥逆於上則懾脣

脹論

膹脹者齊下痛脹口中苦善太息

扁鵲難經

驗病吉凶

傷寒熱病口如魚口不能復閉而氣出多不反者死

病人口張者三日死

漢張機金匱要略

口燥乾

肺中風者口燥而喘身運而重冒而腫脹

腹滿口舌乾燥此腸間有水氣己椒歷黃圓主之

渴欲飲水口乾舌燥白虎加人參湯主之

病黃疸發熱煩喘胃滿口燥者以病發時火劫其汗兩熱所得然黃家所得從濕得之一身盡發熱面黃肚熱熱在裏當下之

病人胃滿脣痿舌青口燥但欲漱水不欲嚥無寒熱脈微大來遲腹不滿其人言我滿爲有瘀血

病者如熱狀煩滿口乾燥而渴其脈反無熱此爲陰伏是瘀血也當下之

晉王叔和脈訣

診法

左寸洪數心熱口苦右寸浮數肺熱口辛左關弦數膽虛口苦洪實則肝熱口酸右關沈實脾熱口甘洪數則口瘡

宋實漢卿瘡瘍全書

繭脣

繭脣者此證生於嘴脣也其形似蠶繭故名之內經云脾氣開於口又云脾之榮在脣但燥則乾熱則裂風則瞤寒則揭若腫起白皮皺裂如蠶繭故定名曰繭脣也始起一小瘡如豆大或再生之漸漸腫大合而爲一約有寸厚或翻花如楊梅如疙瘩如靈芝如菌形狀不一皆由六氣七情相感而成或心思太過憂慮過深則心火焦熾傳授脾經或食醞酒厚味積熱傷脾而腎水枯竭以致之須審其病證之因惟補腎水生脾血則燥自潤火自除風自息腫自消矣此亦異證所生者少人亦難曉若久不愈者急用金銀烙鐵在艾火內燒紅遍之內服歸脾養榮湯庶易愈矣若外用追蝕惡毒線結之法反爲所傷慎哉慎哉若婦人患此陰血衰少故也宜用四物逍遙散治之

錢乙指迷論

驗病

脾肺病久則虛而脣白脾者肺之母母子皆虛不能相營故曰怯肺主脣脣白而光澤者吉白如枯骨者死

血氣虛怯爲冷所乘則脣青又額黑脣青爲寒

楊士瀛直指方

脣腫脣瘡

脣腫宜瀉胃湯薏苡仁湯芍藥湯

脣舌焦燥口破生瘡蓋心脾受熱所致也水浸黃連重湯頓而飲之若大渴少飲竹葉石膏湯

口臭

口臭一證乃熱氣蘊積胃腸之間挾熱而衝發於口也

陳無擇三因方

失欠脫頷

凡欠伸頰車蹉跌但關不能合以酒飲令大醉睡中吹皂角末嚏其鼻令噦即自正

傘劍完素六書

口苦

謀慮不決膽虛氣上衝口中上溢則口苦口是清淨之府濁擾之氣上溢益膽湯主之

口糜

膀胱移熱於小腸膈腸不便上爲口糜心胃壅熱水穀不化轉下小腸柴胡地骨皮湯主之

元張從政儒門事親

口瘡

大人小兒口瘡脣緊用酸漿水洗去白痂臨困點綠袍散如或不愈貼赴筵散又不愈再貼鈴白霜散則愈

李杲十書

辨飲食勞役傷

若飲食勞役所傷其外證必顯在口必口失穀味必腹中不和必不欲言縱勉强對答聲必怯弱口沃沫多唾鼻中滴涕或有或無即陰證也蓋口者坤土也脾氣通於口飲食失節勞役所傷口不知穀味亦不知五味又云傷食惡食明矣

口糜

經云膀胱移熱於小腸膈腸不便上爲口糜此證好飲酒人多有之宜用五苓散導赤散相合服之效

朱震亨心法

口瘡

口瘡服凉藥不愈者因中焦土虛且不能食相火衝上無制用理中湯入參白朮甘草補土之虛乾薑散火之標甚則加附子或噙官桂亦妙或生礬爲末貼之極效或噙良久以水漱之再噙甚者用西瓜漿水徐徐飲之冬月無此用西瓜皮燒灰傳之或以黃蘆好酒煮之呷下立愈凡口舌生瘡皆上焦熱壅所致

宜如聖湯或甘桔湯加黃芩一錢仍用柳花散摻之

口具酸苦臭辛鹹之異

肝熱則口酸木乘脾口亦酸小柴胡加草龍膽青皮甚者宜當歸龍膏丸

心熱則口苦或生瘡宜涼膈散瀉心湯肝移熱於膽則口亦苦宜小柴胡湯加麥門冬酸棗仁地骨皮遠志

吐膿血如肺癰狀口臭他方不應宜消風散入男子髮灰清米飲調下兩服可除

肺熱則口辛宜甘桔湯瀉白散

腎熱則口鹹宜滋腎丸滋陰大補丸

羅天益衛生寶鑑

口瘡論

逆調論云膀胱移熱於小腸鬲腸不便上爲口瘡心胃壅熱水穀不轉下傳小腸以導赤散去小腸熱五苓散瀉膀胱熱故以導赤散調五苓散主之

危亦林得效方

五臟氣偏勝則應於口

口之味熱勝則苦寒勝則鹹宿食則酸煩躁則濕虛則淡疽則甘勞鬱則口臭凝滯則生瘡口之津液通乎五臟臟氣偏勝則味應乎口

明方賢奇效良方

總論

夫口者足太陰之經脾之所主五味之所入也五味入口藏於胃脾爲之運化津液以養五氣五氣者五臟之氣也節宣徹爽五臟之氣偏勝由是諸疾生焉且鹹則爲寒酸則停滯澁則因燥淡則由虛熱則從苦從甘也口臭者乃腑臟燥腐之不同蘊積於胃腸之間而生熱衝發於口也口瘡者脾氣凝滯風熱加之而然醫療之法各隨其所因以治之

薛己口齒類要

口瘡

口瘡上焦實熱中焦虛寒下焦陰火各經傳變所致當分別而治之如發熱作渴飲冷實熱也輕則用補中益氣重則用六君子湯飲食少思大便不實中氣虛也用人參理中湯手足逆冷肚腹作痛中氣虛寒也用附子理中湯晡熱內熱不時而熱血虛也用八物加丹皮五味麥門冬發熱作渴唾痰小便頻數腎水虧也用加減八味丸食少便滑面黃肢冷火衰土虛也用八味丸日晡發熱或從腹起陰虛也用四物參朮五味麥門冬不應用加減八味丸若熱來復去書見夜伏夜見晝伏不時而動或無定處或從脚起乃無根之火也亦用前丸及十全大補加麥門冬五味更以附子末唾津調搽湧泉穴若概用寒涼損傷生氣爲害匪輕

李梴醫學入門

口病總論

脾熱則口甘或臭宜瀉黃散二黃湯又胃熱則口甘胃虛則口淡肝熱則口酸木乘脾口亦酸小柴胡加草龍膽青皮甚者宜當歸龍膏丸肺熱則口辛宜甘桔湯瀉白散腎熱則口鹹宜滋腎丸滋陰大補丸口臭者胃熱也虛火鬱熱蘊於胷中乃作口臭宜芎芷膏傷胃陽虛則口中無味傷腎陰虛則口中有味

戴思恭薛治要訣

口瘡

口舌生瘡皆上焦熱壅所致宜如聖湯或甘桔湯加黃芩一錢仍用杏花散摻之未效則參以四香飲下虛上盛致口舌生瘡宜用鎮墜之藥以降陽光宜鹽水下養正丹或黑錫丹仍於臨臥熱湯洗足炒擦淨吳茱萸一小撮拭足了便以炒萸塗足心用絹片紮之男左女右

吳崐醫方考

口病方論

口瘡糜爛者口糜散主之蓋口糜本於濕熱濕熱不去必至瘡蝕寒可以勝熱苦可以堅膚故用黃連黃檗雄黃之悍殺蟲而利氣冰腦之竄殺蟲而入腐沒藥之苦散血而愈瘡

孫眞人千金方云薔薇根口瘡之神藥人不知之故其口齒一門用薔薇根者蓋多方焉今嘗其藥氣平而味苦內經曰氣薄爲陽中之陰又曰味厚則泄如此言之固清氣泄熱之藥也

氣厥論曰膀胱移熱於小腸鬲腸不便上爲口糜柴胡地骨皮湯主之蓋膀胱者水道之所出小腸者清濁泌別之區也膀胱移熱於小腸則清濁不能泌別濕熱不去勢必上蒸故令口中糜爛而瘡乃竈底燃薪籠中肉糜之象也是方也柴胡辛溫所以升其清陽地骨皮苦寒所以降其濁陰清濁既判則乾清坤寧鬲腸利而口糜愈矣實者加大黃朴硝謂大便祕滯邪氣自實二陰皆祕地道不通故用大黃苦寒以瀉實朴硝鹹寒以軟堅乃竈底抽薪之法也

謀慮不決肝膽氣虛口苦舌瘡者益膽湯主之蓋肝

主謀慮膽主決斷勞於謀慮決斷故令氣虛咽門爲膽之使膽汁上溢於咽故令口苦木能生火故令舌痛是方也人參甘草所以補其氣虛苦參黃芩所以清其氣熱經曰主明則十二官各得其職故用茯神遠志以養心又曰微者正治甚者從治故用官桂之辛熱

王肯堂證治準繩

脣部所屬

脣屬足太陰脾經

註素問曰脾者倉廩之本營之居也其華在脣靈樞曰脾者主爲衛使之迎糧視脣舌好惡以知吉凶故脣上下好者脾端正脣偏舉者脾偏傾揭脣者脾高脣下縱者脾下脣堅者脾堅脣大而不堅者脾脆脾病者脣黃脾絕者脣四面腫又曰腎舌者肌肉之本也足太陰氣絕則脈不榮肌肉脈不榮則肌肉軟肌肉軟則舌萎人中滿則脣反脣反者肉先死甲篤乙死木勝土也

又屬足陽明胃經

註靈樞曰足陽明所生病者口喎脣胗註所謂胗者血也胗古疹字脣瘍也又曰陽明氣至則齦脣中藏曰胃中熱則脣黑

又屬手少陰心經

註元珠曰上下脣皆赤者心熱也上脣赤下脣白者腎虛而心火不降也

又屬手少陰肺經

註錢仲陽曰肺主白脣白而澤者吉白如枯骨者死脣白當補脾肺蓋脾者肺之母也母子皆虛不能相營其名曰怯故當補若深紅色則當散肺虛熱

俠口統屬衝任二脈

註靈樞曰衝任二脈皆起於胞中上循背裏爲經絡之海其浮而外者循腹右上行會於咽喉別而絡脣口故氣血盛則充膚熱肉血獨盛則濟滲皮膚而生毫毛婦人數脫血是氣有餘血不足衝任之脈不榮脣口所以無鬚也

上脣俠口屬手陽明大腸經

下脣俠口屬足陽明胃經

口部所主

口者脾之所主胃大腸脈之所挾經云中央黃色入通於脾開竅於口藏精於脾又云脾主口在臟爲脾在竅爲口又云脾氣通於口脾和則口能知五味矣此脾之主於口也又經云胃足陽明之脈挾口下交承漿又云大腸手陽明之脈挾口交人中此胃大腸之脈挾於口也

諸證治法

燥則乾熱則裂風則瞤寒則揭若脣腫起白皮皺裂如蠶繭名曰繭脣有脣腫重出如繭者有本細末大如繭如瘤者或因七情動火傷血或因心火傳受脾經或因厚味積熱傷脾大要審本證察兼證補脾氣生脾血則燥自潤火自除風自息腫自消若患者忽略治者不察妄用清熱消毒之藥或用藥線結去反爲翻花敗證矣

腎虛脣繭時出血水內熱口乾吐痰體瘦宜濟陰地黃丸

肝經怒火風熱傳脾脣腫裂或患繭脣宜柴胡清肝散

胃火血燥脣裂爲繭或牙齦潰爛作痛宜清胃散或加芍芩柴胡可治脾胃肝膽經熱

風熱傳脾脣口瞤皺或頭目眩或四肢浮腫如風狀宜羌活散

風熱客於脾經脣燥裂無色宜瀉黃飲子

中氣傷損脣口生瘡惡寒發熱肢體倦怠宜補中益氣湯

思慮傷脾血耗脣皺宜歸脾湯

思慮過度蘊熱於脾瀉裂無色脣燥口乾生瘡年久不愈內服五福化毒丹外用橄欖燒灰末豬脂調塗或用核中仁細研傅之

口甘用生地黃芍藥黃連及三黃丸

口苦用柴胡黃芩黃連苦參龍膽草及小柴胡湯加麥門冬酸棗仁地骨皮遠志內經曰有病口苦名曰膽癉乃肝主謀慮膽主決斷盛汁七合是清淨之腑取決於膽膽或不決爲之恚怒則氣上逆膽汁上溢故口苦或熱甚使然也龍膽瀉肝湯主之

口瘡

口瘡一日熱經云少陽司天火氣下臨肺氣上從口瘡是也二曰寒經云歲金不及炎火乃行復則寒雨暴至陰厥且格陽反上行病口瘡是也

或問口瘡如何得之曰經云膀胱移熱於小腸膈腸不便上爲口糜蓋小腸者心之腑也此舉由邪熱之端耳心屬君火是五藏六腑之火主故諸經之熱皆慮於心心脈布舌上若心火炎上熏蒸於口則爲口

舌生瘡脾脈布舌下若脾熱生瘀熱涎相搏從相火上炎亦生瘡者尤多二者之病諸寒凉劑皆可治但有涎者兼取其涎然則有用理中湯加附子以治者又何如曰夫火有虛實因諸經原有熱而動者謂之實無熱而動者謂之虛實則正治寒凉之劑是也虛則從治如此用溫熱是也理中湯者因胃虛穀少則所勝腎水氣之逆而承之反爲寒中脾胃衰虛之火被迫炎上作爲口瘡故用參朮甘草補其土薑附散其寒則火得所助援引其退舍矣至聖濟總錄有謂元臟虛冷上攻口瘡者用巴戟白芷高良薑末猪腰煨服又有用丁香胡椒松脂細辛末蘇木湯調塗瘡上及不任食者用當歸附子白蜜含嚥者有用生附塗脚心者有用吳茱萸末酢熬膏入生地龍末塗兩足心者若此之類皆是治龍火之法也蓋寒水上迫心肺之陽不得下降故用溫熱之劑或散於上或散於下或從陰隨陽所攸利者也

胃中有熱脈洪大宜服凉膈散甘桔湯加黃芩三補丸金花丸漱以黃連升麻湯敷以綠袍散蜜蘗散丹溪用西瓜漿水徐徐飲之如無以皮燒灰噙之外用細辛黃蘗末摻之

胡氏方以好墨研螻蛄極細敷之立效按此治膀胱移熱於小腸者之正劑也蓋螻蛄專走小腸膀胱而通利膈腸者因力峻氣猛陰虛氣上致瘡者戒勿用唯體實有熱在上焦者宜之

陳實功外科正宗

脣風

陽明胃火上攻其患下脣發痒作腫破裂流水不疼難愈宜銅粉丸泡洗內服六味地黃丸自愈

繭脣

繭脣乃陽明胃經毒也因食煎炒過餐煿炙又兼思慮暴急痰隨火行留注於脣初結似豆漸大若蠶繭突腫堅硬甚則作痛飲食妨碍或破流血久則變爲消渴消中難治之證初起及已成無內證者用麻子大艾炷灸三壯貼蟾酥餅膏蓋日久漸消內證作渴者早服加減八味丸午服清凉甘露飲以滋化源日久流血不止形體瘦弱虛熱痰生面色黧黑腮頷紅現口乾渴甚者俱爲不治之證也

口破

口破者有虛火實火之分色淡色紅之別虛火者色淡而白斑細點甚者陷露龜紋脈虛不渴此因思煩太甚多醒少睡虛火動而發之四物湯加連翹知母丹皮肉桂以爲引導從治法也外以柳花散搽之實火者色紅而滿口爛斑甚者腮舌俱腫脈實口乾此因膏粱厚味醇酒炙煿心火妄動發之宜凉膈散外搽赴筵散吐涎則愈如口舌生瘡舌乾黃硬作渴者加減八味丸以滋化源俱禁水漱

落下頦拏法

落下頦者氣虛之故不能收束關竅也令患者平身正坐以兩手托住下頦左右大指入口內捺槽牙上端緊下頦用力往肩下捺開關竅向腦後送上即投關竅隨用絹條兜頦於頂上半時許去之即愈

景岳全書 臣張介賓著

渴乾之病

口渴口乾大有不同而人多不能辨蓋渴因火燥有餘乾因津液不足火有餘者當以實熱論津液不足者當以陰虛論二者不分反同冰炭矣然渴雖云火而亦有數種當辨者如實熱之渴火有餘也亡陰之渴水不足也故凡於大瀉之後大汗之後大勞之後大病之後新產失血之後癰疽大潰之後過食鹹味之後皆能作渴凡此數者悉由亡陰亡液水虧枯涸而然本非熱證不得誤認爲火總之渴而喜冷脈實便結者固火證也其有冷飲入腹則滯沃不行或口雖作渴而但喜熱飲及脈弱便溏者皆非火證切復有口雖乾苦而全然不欲茶湯者此乾也非渴也尤屬陰虛之候若作渴治能無誤乎故治此之法凡火盛於上者宜清肺清胃水虧於下者宜補脾補腎若陽虛而陰無以生氣虛而精無以化者使非水火並濟則何益之有哉

苦酸之味

口苦口酸等證在原病式則皆指爲熱謂肝熱則口酸心熱則口苦脾熱則口甘肺熱則口辛腎熱則口鹹或口淡者亦胃熱也若據此說則凡以口中之有五味者悉屬火證而絕無虛寒之病矣豈不謬哉如口苦者未必悉由心火口淡者未必盡因胃熱蓋以思慮勞倦色慾過度者多有口苦舌燥飲食無味之證此其咎不在心脾則在肝腎心脾虛則肝膽邪溢而爲苦肝腎虛則眞陰不足而爲燥即如口淡一證凡大勞大瀉大汗大病之後皆能令人口淡無味亦豈皆胃火使然耶故凡臨此者但察其別無火證火脈則不宜以勞傷作內熱而妄用寒凉也

臭氣

口臭雖由胃火而亦有非火之異蓋胃火之臭其氣濁穢亦必兼口熱口乾及別有陽明火證者是也若無火脈火證而臭如餿腐或如酸胖及胃口吞酸飲食噯滯等證亦猶陰濕留垢之臭自與熱臭者不同是必思慮不遂及脾弱不能化食者多有之此則一爲陽證宜清胃火一爲陰證宜調補心脾不得謂臭必皆熱以致生他病也

有熱無熱

口舌之病有瘡者有臭者有乾有渴者有爲苦酸諸味不同者在方書多以口病爲熱證然亦有似熱非熱及勞傷無火等證是不可盡歸於熱也

口瘡

口舌生瘡固多由上焦之熱治宜清火然有酒色勞倦過度脈虛而中氣不足者又非寒凉可治故雖久用清凉終不見效此當察其所由或補心脾或滋腎水或以理中湯或以蜜附子之類反而治之方可全愈此寒熱之當辨也

治法

口瘡口苦凡三焦內熱等證宜甘露飲徙薪飲主之

火之甚者宜凉膈散元參散主之

若胃火甚者宜竹葉石膏湯三黃丸之類主之

若心火肝火之屬宜瀉心湯龍膽瀉肝湯之類主之

酒濕熱口糜宜導赤散大分清飲五苓散之類主之

勞傷心脾兼火者宜二陰煎清心蓮子飲之類主之

若思慮謀爲不遂肝膽虛而口苦者宜七福飲理陰煎或五君子煎之類主之兼火者以黃芩龍膽草之類隨宜佐之

凡口瘡六脈虛弱或久用寒凉不效者必係無根虛火宜理陰煎理中湯之類反治之或用官桂噙嚥亦可

外治口瘡數藥陰陽散綠雲散細辛黃蘗散白蠶黃蘗散皆可選用或臨臥時以川黃蘗含口過宿亦妙

若口舌生瘡糜爛者宜冰玉散主之疳爛者冰白散

口臭由於胃火者宜清胃飲升麻黃連丸或竹葉石膏湯加香薷主之或千金口臭方皆可內清其火此外如丁香丸聖惠口齒方福建香茶餅之類亦可暫解其穢

石室祕錄 臣陳士鐸著

口瘡

口舌生瘡乃心火鬱熱而然用黃連三錢菖蒲一錢水煎服一劑而愈神方也此方不奇在黃連而奇在菖蒲菖蒲引心經之藥黃連雖亦入心經然未免肝脾亦入未若菖蒲之單入心也況不雜之以各經之品孤軍深入又何疑哉此所以奏功如響也倘不知用藥神機輕混之以肝脾之藥雖亦奏功終不能捷如桴鼓此治熱之又一法也

如人口舌生瘡法當用輕清之品少少散之無不立效如小柴胡湯之方是也然而小柴胡湯世人不知輕重之法予再酌定之可永爲式方用柴胡一錢黃芩一錢半夏一錢陳皮五分甘草一錢此小柴胡湯予更加人參五分茯苓二錢更爲奇妙蓋氣足則邪易出而汗易發世人見用人參便覺失色匪獨醫者不敢用即病者亦不敢服相沿而不可救者滔滔皆是安得布告天下醫人詳察其病源而善用之也

口舌生瘡者乃心經熱也宜用黃連黃芩之類凉散之自愈今不用用黃蘗一錢殭蠶一錢枳殼燒灰五分炙甘草末五分薄荷末五分冰片三釐山豆根五分各爲末絕細滲上一日滲三次第一日即少快明日全愈神方也以上皆上治之法也

脣裂

人有火盛之極舌如芒刺舒口開裂大渴呼飲雖非傷寒之證所得而人患此病即不身熱亦去死不久也白虎湯亦可救但過於太凉恐傷胃氣往往有熱退而生變仍歸於亡故白虎湯不可輕投也我有一方名曰清凉散元參二兩麥冬一兩甘菊花青蒿各五錢白芥子生地車前子各三錢水煎服此方妙在元參爲君以解上焦之焰麥冬爲臣以解肺中之熱甘菊青蒿爲佐以消胃中之火尤妙車前子白芥生地爲使或化痰或凉血盡從膀胱以下瀉其大熱之氣是上下之間無非清凉而火熱自散又不損胃故能扶危而不致生變也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百七十四卷目錄

醫部彙考一百五十四

脣口門二

方 赴筵散 赤白口瘡方 口瘡糜痛方 又方 兼金散 黃白散 綠袍散 碧雪 換金散 乳香散 沒藥散 青金散 茱萸散 如聖散 破血丹 龍鹽 瀉肝湯 益腸湯 三黃湯 芎芷膏 加減甘露飲 升麻黃連丸 柴胡地骨皮湯 涼膈散 玉芝飲 子 升麻煎 硼砂丸 黑參丸 理中湯 四物湯 瀉胃湯 薏苡仁湯 芍藥湯 五苓散 導赤散 胡黃連散 必效散 黃蘗散 涼膈散 甘桔湯 三補丸 金花丸 黃連升麻湯 綠袍散 蜜蘗散 黃連散 蟾酥綿 黃連解毒湯 養正丹 黑錫丹 升麻飲 冰蘗丸 加減瀉白散 生香膏 地骨皮丸 己椒藶黃丸 當歸龍薈丸 三黃丸 小柴胡湯 濟陰地黃丸 柴胡清肝散 清胃散 歸脾湯 補中益氣湯 羌活散 瀉黃飲子 五福化毒丹 半夏散 獨活散 升麻飲 生地黃煎 脣生腫核方 黃蘗散 銅粉丸 小柴胡湯 七福飲 二陰煎 連薪飲 大分清飲 理陰煎 五君子煎 冰玉散 冰白散 福建香茶餅 歸脾養榮湯 烙鐵法 除根搽藥 生肌散 口瘡不歇方 升麻煎 又方 又方 又方 又方 又方 蕎薇圓 又方 又方 口旁惡瘡方 五香圓 又膏方 甘草圓 盧勞口乾方 含香圓 口臭方 又方 口臭方 轉香方 口臭方 口香去臭方 又方 又方 又方 七孔臭氣皆合香方

單方

鍼灸

導引

醫案

藝術典第一百七十四卷

醫部彙考一百五十四

脣口門二

方

赴宴散 濟泰

治口瘡

五倍子一兩 黃蘗蜜炙紫色 滑石各五錢

右爲末每取半錢摻口內奇效

赤白口瘡方 丹溪

黃蘗 青黛 密陀僧等分

爲末摻之

口瘡糜痛方 同春

黃連 黃蘗 黃芩 梔子 細莘 乾薑各等分

爲末先以米泔漱口後摻之

又方 丹溪

治前證

細莘 黃蘗炒等分

右爲末摻口內吐涎卽差

兼金散 三四

治熱毒生口舌瘡

黃連 細莘等分

爲末先以布裹蘸水拭淨患處乃摻藥吐涎卽愈

黃白散 同春

治口瘡幷口中疳瘡如神

黃蘗 孩兒茶 枯白礬各等分

爲末先以冷米湯漱口乃摻之

綠袍散 醫鑒

治口瘡

黃蘗蜜炙一兩 青黛三錢 片腦二分

右爲末摻患處吐出涎卽愈

碧雪 得效下同

治口舌生瘡舌強腮腫喉閉

蒲黃 青黛 硼砂 焰硝 甘草各等分

爲末以手指摻於口中嚥津下

換金散

治毒熱口瘡

乾薑 黃連等分

爲末摻瘡上初若不堪應手卽愈

乳香散 綱目下同

治赤口瘡

乳香 沒藥各一錢 白礬半錢 銅綠少許

右爲末摻之

沒藥散

治白口瘡

沒藥 乳香 雄黃各一錢 輕粉半錢 巴豆霜少許

右爲末摻之

青金散 丹溪

治白口瘡急惡狀如木耳

五倍子 青黛各四錢

爲末油調貼瘡上喉中瘡爛以竹管吹入有涎吐之

茱萸散 得效

治口瘡及咽痛

吳茱萸　地龍等分
爲末米酢入生麴調塗足心神效或只用茱萸爲末水調敷足心亦愈
如聖散 簡易
治小兒口瘡不能吮乳
巴豆一粒或二粒去皮研爛不去油
右入朱砂黃丹各少許敷紙上剝開兒顖上髮貼在顖門上如四邊起粟米泡便用溫水洗去藥更用菖蒲水洗之便安如神
破血丹 醫林
天花粉三兩　赤芍藥二兩　薑黃　白芷各一兩
右爲末每用少許乾摻或蜜調塗之
龍膽瀉肝湯 綱目
治口苦
柴胡一錢　生甘草　人參　天門冬　麥門冬
黃連　黃芩　草龍膽　山梔仁　知母各五分
五味子七粒
右剉作一貼水煎空心服忌辛熱物
益膽湯 河間
治謀慮不決膽虛氣上溢口苦
黃芩　人參　甘草各一錢　遠志去骨　官桂各七分　苦參　茯神各三分
右剉作一貼水煎服
三黃湯 同春
治脾熱口甘
黃連　黃芩　梔子　石膏　白芍藥　桔梗
陳皮　茯苓各八分　白朮　甘草各三分

右剉作一貼烏梅一箇水煎服
芎芷膏 得效
治口氣熱臭
川芎　白芷
右等分爲末蜜丸芡實大每一丸臨臥噙化
加減甘露飲 本事
治胃熱口臭口瘡牙宣
熟地黃　生地黃　天門冬　黃芩　枇杷葉
茵陳　枳殼　石斛　甘草各一兩　犀角三錢
右爲末每二錢水煎服此方有犀角一味甚有道理有奇效
升麻黃連丸 正傳
治口臭穢惡人不得近
黃芩酒洗二兩　黃連一兩　生薑取汁　蓮花
青皮　升麻各五錢　生甘草二錢　白檀香一錢
右爲末蒸餅和丸彈子大每一丸細嚼白湯下
柴胡地骨皮湯 河間
治膀胱移熱小腸上爲口糜
柴胡　地骨皮各二錢半
右剉作一貼水煎服
涼膈散 同春
治三焦火盛口舌生瘡
連翹一錢二分　黃芩　梔子仁　桔梗　黃連
生地　薄荷　當歸　枳殼　甘草　赤芍各七分
右剉作一貼水煎服
玉芝飲子 東垣
治膈熱口舌生瘡咽喉腫痛

甘草製二兩　藿香葉　石膏煅　梔子仁各一兩
右爲末每一錢新水調下
升麻煎 直指
治心脾有熱口舌生瘡破裂
升麻　元參　川芎　生地黃　麥門冬各一錢
黃連　大黃　黃芩　甘草各五分
右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服
硼砂丸
治口舌生瘡口臭
寒水石二兩五錢　硼砂五錢　馬牙硝一錢
龍腦　麝香各五分
右爲末以甘草五錢浸汁熬膏搜和作丸芡實大含嚥津下或取末摻之
黑參丸 丹溪
治口舌生瘡連年不愈
元參　天門冬　麥門冬
右等分爲末蜜丸彈子大每噙化一丸
理中湯 仲景
治虛火口瘡服涼藥不愈者此中焦氣不足虛火泛上
白朮二錢　人參　乾薑　製甘草各一錢
右剉水煎服甚者加附子
四物湯 入門
治陰虛者
生地黃二錢　當歸　白芍藥　川芎各一錢
水煎加知母黃蘗
瀉胃湯

治胃實熱脣口乾裂煩渴便祕

大黃二錢半　葛根一錢　桔梗　枳殼　前胡　杏仁各五分

右劉作一貼入生薑三片水煎服

薏苡仁湯 得效

治風腫有濕脣口瞤動

薏苡仁　防己　赤小豆炒　炙甘草各一錢半

右劉水煎服

芍藥湯 同上

治脾火盛脣口生瘡或多食易饑

甘草五分　赤芍　梔子　黃連　石膏　連翹　薄荷各一錢

右劉作一貼水煎服

五苓散 仲景

治口糜

豬苓　茯苓　白朮炒各十八銖　桂心六兩　澤瀉一兩六銖半

右爲末每服三錢

導赤散 河間

治前證

生地　木通　甘草梢　淡竹葉各等分

水煎服

胡黃連散

治前證

胡黃連五分　藿香一錢　細辛　黃連各三錢

右爲末每半錢乾摻口內漱吐之

必效散

治前證

白礬　大黃各等分

右爲細末臨臥乾貼瀝涎盡溫水漱之

黃蘗散

治前證

白殭蠶直者置新瓦上下以火煨斷絲去火毒　黃蘗蜜塗炙乾去火毒

右研極細少許摻瘡上及舌上吐涎

涼膈散

治口瘡

連翹四兩　大黃酒浸　芒硝　甘草各二兩　梔子炒黑　黃芩酒炒　薄荷各一兩

右爲末每服三錢加竹葉生蜜煎

甘桔湯

治前證

桔梗一兩　甘草二兩

水煎服

三補丸

治前證

黃芩　黃連　黃蘗

等分爲末水丸每服三十丸白湯下

金花丸

治前證

黃連　黃蘗　黃芩　梔子　大黃便秘加之

等分爲末水丸每服三十丸白湯下

黃連升麻湯

治前證

升麻一錢半　黃連三錢

水煎服或爲細末綿裹含津嚥

綠袍散

治前證

黃蘗四兩　炙甘草二兩　青黛一兩

右先取二味爲末入青黛同研勻乾貼

蜜蘗散

黃蘗不計多少蜜炙灰色

爲細末乾摻上臨臥忌酒酢醬犯之則瘡難愈

黃連散

治前證

黃連　砂硝　白礬各五錢　薄荷一兩

右爲粗末用臘月黃牛膽將藥入膽內風頭挂兩月取下如有口瘡旋將藥研細入於口瘡上去其熱涎卽愈

蟾酥綿

治前證

蟾酥五皂角子大　硼砂　龍腦　麝香各一皂角子大

右研極細以溫湯半盞化令勻入緋綿拭半錢蘸藥汁曬乾候藥汁盡將綿寸截每用一片貼於患處有涎卽吐一日三五次易之取瘥

黃連解毒湯

治前證

黃連　黃芩　黃蘗　梔子

等分水煎服

養正丹

治前證
朱砂飛細　硫黃研細　水銀　黑鉛各一兩
右用鐵盞一箇燃炭熔鉛成汁入水銀以柳條攪勻下朱砂攪至不見星取起略停方可下硫黃末急攪成汁如焰起以酢灑之候冷取出研極細末羌糯米糊丸棗豆大每服七分鹽湯紅棗湯任送中氣虛人用人參湯送
黑錫丹
治前證
黑鉛　硫黃各二兩
右將鉛鎔化漸入硫黃候結成片傾地上出火毒研至無聲爲度
升麻飲
治口內生瘡齒齦肉爛
升麻　元參　黃連　黃芩　葛根　羚羊角鎊　大黃　羌活　防風　麥冬去心　菊花各半兩　人參　知母　炙甘草各二錢半
右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服一方無人參有牛蒡子
冰蕖丸
治前證
龍腦少許　黃蘗日乾　硼砂研　薄荷葉各等分
右爲細末研勻生蜜和丸如龍眼大每服一丸津液化下瘡甚者加腦子研
加減瀉白散
治口臭
桑白皮三錢　桔梗二錢　五味子二十一粒　地骨皮　炙甘草各一錢半　知母七分　黃芩　麥門冬各五分
右㕮咀水二盞煎至一盞去查溫服食遠一日二服忌酒濕麪及辛熱之物
生香膏
治口氣熱臭
乾甜瓜子去殼研細
用蜜少許調成膏食後含化或傅齒上尤妙一方
空心洗漱訖含化一丸如棗核大
地骨皮丸
治肺熱口臭口中如膠舌乾發渴小便多
地骨皮　桑白皮　山梔子　黃芪　馬兜鈴
各等分爲細末甘草膏和丸如芡實大每服一丸食後嚥化
己椒蘆黃圓（仲景）
治腸間水氣口舌乾燥
防己　椒目　葶藶　大黃各一兩
右四味爲末蜜丸如桐子大先食飲服一丸日三服稍增口中有津液渴者加芒硝半兩
當歸龍薈丸
治肝熱口酸
當歸酒洗　龍膽草酒洗　山梔炒黑　黃蘗炒　黃連炒　黃芩炒各一兩　大黃酒浸　青黛飛蘆薈各五錢　木香二錢　麝香五分
右爲末蜜丸薑湯下
三黃丸
治口甘
黃連　黃芩　大黃酒九蒸九曬
右等分蜜丸桐子大
小柴胡湯
治口苦
柴胡八兩　半夏半升　黃芩　人參　甘草蜜製各三兩
加生薑三兩大棗十二枚煎服
濟陰地黃丸
治陰虛火燥脣裂如繭
熟地黃九蒸杵膏　五味子　麥門冬　當歸肉蓯蓉　山藥　枸杞子　山茱萸肉　甘菊花
巴戟肉各等分
右爲末煉蜜丸如桐子大每服七八十九空心食前白湯送下
柴胡清肝散
治脣燥裂
柴胡　黃芩炒　當歸　丹皮　生地黃各一錢　黃連炒　山梔仁炒各七分　川芎六分　升麻八分　甘草三分
右水煎服若脾胃虛去黃連加白朮茯苓
清胃散
治前證
升麻二錢　當歸一錢五分　牡丹皮一錢五分　生地黃　川黃連各一錢
水煎微冷服
歸脾湯
治前證

人參　白朮土炒　黃芪炙　白茯神　酸棗仁
龍圓肉各二錢　遠志　當歸各一錢　廣木香
甘草炙各五分
加生薑棗水煎服

補中益氣湯

治前證
黃芪蜜炙錢半　人參　甘草炙各一錢　當歸
白朮土炒　陳皮各五分　升麻　柴胡各三分
加薑棗煎服

羌活散

治前證
羌活　茯苓　薏苡仁各等分
右每服三五錢水煎入竹瀝一匙服

瀉黃飲子 濟生

治風熱蘊於脾經脣燥裂無色
白芷　升麻　枳殼麩炒　金箔石斛一錢二分
黃芩　防風各一錢半　半夏薑湯泡七次一錢
甘草七分
水二鍾薑三片煎七分食後服

五福化毒丹

治脣舌腫破生瘡煩渴
元參洗炒　桔梗各二兩　白茯苓一兩五錢
馬牙硝風化　青黛各一兩　甘草炒七錢半
人參半兩　麝香一字
右爲細末煉蜜爲丸如皂角子大以金銀箔各四
十片爲衣每服一二丸薄荷湯化下如口臭以生
地黃汁化下食遠服

半夏散

治少陰口瘡聲絕不出者是寒氣遏絕陽氣不伸
半夏製一兩　肉桂　烏頭各一字
右以水同煎一盡分二服

獨活散

治脣上生惡核腫由脾胃多熱壅滯
獨活　升麻　沉香　連翹　桑寄生　犀角屑
漢防己　大黃炒各七錢半　炙甘草半兩
每服三錢水一盞煎至六分去查不拘時溫服

升麻飲

治脾胃有熱風冷相乘脣腫生核疼痛
升麻　前胡　犀角鎊　薏苡　炙甘草各半兩
葛根　龍膽草　青竹皮各二錢半
右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分去查食後
服

生地黃煎

治脾熱脣焦枯無潤澤
生地黃汁　生天門冬汁各半升　麥門冬去心
蔵棘各二兩　黃芪　升麻各一兩五錢　細辛
川芎　白朮　甘草生各一兩
右細剉綿裹酒浸一宿以豬脂二斤煎至藥色焦
綿濾去查內鍋中復下地黃天門冬汁熬令稠磁
器盛服每半匙不拘時含嚥下

脣生腫核方

松脂　大黃　白蘞　赤小豆　胡粉各等分
右爲末以雞子清調傅

黃蘗散

治齲脣
黃蘗一兩　五倍子二錢　密陀僧　甘草各一錢
右除黃蘗別餘藥爲末用水調傅於黃蘗上火炙
三五次將藥切成片子臨臥貼之天明即愈

銅粉丸

治齲脣
銅青五錢　宮粉三錢　明礬　輕粉各一錢半
麝香一分五釐　冰片一分二釐　黃連二兩切片
煎稠膏
右爲細末黃連膏丸如芡實大每用一丸白湯泡
開紙蓋之每洗燉熱蒸上面清水勤洗之其患自
愈

千金口臭方

橘皮二十銖　桂心十八銖　木蘭皮一兩　大棗
二十枚
右四味治下篩酒服方寸匕日三久服身香亦可
以棗肉丸之服二十丸如梧子大稍加至三十丸
一方有芎藭十八銖

七福飲 景岳全書下同

治思慮不遂肝膽虛而口苦者
人參　熟地各隨宜　當歸二三錢　棗仁二錢
白朮炒一錢半　炙甘草一錢　遠志製三五分
水二鍾煎七分食遠溫服

二陰煎

治勞傷心脾口糜兼火者
生地　麥冬各二三錢　棗仁二錢　白茯苓
元參　木通各錢半　生甘草一錢　黃連一二錢

水二鍾加燈心二十根或竹葉亦可煎七分食遠服

徙薪飲

治三焦內熱口苦口瘡

陳皮八分　黃芩二錢　麥冬　芍藥　黃蘗

茯苓　牡丹皮各一錢半

水一鍾半煎七分食遠溫服

大分清飲

治多酒濕熱口糜

茯苓　澤瀉　木通各二錢　猪苓　梔子或倍之

枳殼　車前子各一錢

水一鍾半煎八分食遠溫服如內熱甚者加黃芩

黃蘗草龍膽之屬

理陰煎

治肝膽虛而口苦

熟地三五七錢或一二兩　乾薑炒黃一二三錢

當歸二三錢或五七錢　炙甘草一二錢

水二鍾煎七八分熱服或加肉桂一二錢

五君子煎

治前證

人參二三錢　乾薑炒黃一二錢　炙甘草一錢

白朮　茯苓各二錢

水一鍾半煎服

冰玉散

治口瘡糜爛

生石膏一兩　月石七錢　冰片三分　殭蠶一錢

右爲極細末小磁罐盛貯或敷或吹

冰白散

治口瘡口疳糜爛者

人中白倍用　冰片少許　銅綠酢製　杏仁各等分

右爲細末敷患上有以蜜製黃蘗與人中白等分仍加冰片用者當隨宜用之

福建香茶餅

治胃火口臭又辟一切邪氣

沉香　白檀各一兩　兒茶二兩　粉草五錢

麝香五分　冰片三分

右爲極細末糯米調飲湯爲丸黍米大噙化

歸脾養榮湯瘡瘍全書

治繭唇

當歸　川芎　白芍　生地　茯苓　小柴胡

陳皮　甘草　升麻　山梔　桔梗　麥門冬

黃芪　白朮　防風　黃連　黃蘗　牡丹皮

知母

婦人加澤蘭元胡索香附

烙鐵法

不拘金銀打成烙鐵每用艾火燃燒通紅乘熱盪患上再燃再盪一日止可五六次恐傷元氣須要擇上吉日不犯尻神盪畢隨將藥搽之庶不再生矣

除根搽藥

治前證

莧菜陰乾燒灰三錢　銅青　枯礬　雞內金

孩兒茶各二錢　輕粉　雄黃各一錢　麝香二分

右爲細末麻油調搽明日再用甘草湯洗淨再烙如前以平爲度復用生肌散

生肌散

花蘂石酢煆　孩兒茶　雞內金　血竭各二錢

飛丹　乳香　紅絨灰　黃連各一錢

右爲細末加冰片一分乾摻

口瘡不歇方千金方下同

牛膝　生蘘荷根各三兩　黃蘗一兩

右三味㕮咀以綿裹酒三升漬一宿微火煎一兩沸細細含之

升麻煎

治膀胱熱不已口舌生瘡咽腫

升麻　元參　薔薇根白皮去土　麝干各四兩

大青　黃蘗各三兩　蜜七合

右七味㕮咀以水七升煮取一升五合去滓下蜜更煎兩沸細細含咽之

又方

治口數生瘡連年不瘥

薔薇根　黃芩　當歸　桔梗　黃芪　白蘞

大黃生　鼠李根皮　白芍藥　續斷　黃蘗

葛根各一兩

右十二味爲末以酒服方寸匕日二漿水服亦可

又方

治胃中客熱唇口乾燥生瘡

茯苓　黃芩　甘草　大黃　薔薇根各三十銖

枳實　杏仁去皮尖　黃連各一兩　桂心半兩

苦蔞根十八銖

右十味爲末食前漿水服方寸匕日二

又方
治口瘡
升麻三兩　乾生地黃五兩　薔薇根皮四兩
黃蘗二兩
右四味㕮咀以水七升煮取三升去滓含之瘥止
含極吐却更含
又方
治口中瘡爛痛不得食
甘草一寸　黃連六銖　杏仁二十枚
右三味爲末合和綿裹杏仁大含之勿咽日三夜
一
薔薇圓
治口中瘡身體有熱氣瘀爛
薔薇根　黃芩　芍藥　當歸　葛根　白蘞
黃蘗　石龍芮（翼作黃連）　鼠李根　續斷　黃芪各一
兩　苦蔄根二兩
右十二味爲末蜜丸如梧子大每服十丸日三
又方
治口吻瘡
梔子　甘草各十八銖　細辛三十銖　桂心十二
銖　芎藭一兩
右五味爲末蜜丸食後服七丸日再服瘥
又方
治前證
芎藭　白芷　橘皮　桂心　棗肉各一兩半
右五味爲末蜜丸食後服十五丸又含之以瘥爲
度此方甚驗

口旁惡瘡方
亂髮灰　故絮灰　黃連末　乾薑末
右四味等分合和爲散以粉瘡上不過三徧即愈
膏方
治口中瘡咽喉塞不利口燥
猪膏　白蜜　黃連各一兩
右三味合煎去滓攪令相得含之如半棗大日四
五夜二
又膏方
治熱病口爛咽喉生瘡水漿不得入
當歸　射干　升麻各一兩　附子半兩
右四味㕮咀以猪脂四兩先煎令成膏下著地勿
令大熱內諸藥微火煎令附子黃色藥成絞去滓
內白蜜四兩復上火一兩沸令相得置器中令凝
取如杏仁大含之日四五徧輒咽之
甘草圓
治口中熱乾
甘草　人參　半夏　生薑　烏梅肉各一兩半
棗膏二兩半
右六味爲末蜜丸如彈子大旋含咽日三
盛勞口乾方
酸棗仁　酸石榴子　烏梅肉各五合　苦蔄實
葛根　甘草各二兩　麥冬四兩　覆盆子三合
右八味爲末以蜜丸如棗大含之以潤爲度
五香圓
治口臭身臭令香止煩散氣
豆蔻　丁香　薰香　零陵香　青木香　白芷

桂心各一兩　香附二兩　檳榔二枚　甘松香
當歸各半兩
右十一味爲末蜜和丸常含一丸如豆大許咽汁
日三夜一
含香圓
治口氣臭穢宜常服之
丁香半兩　甘草生三兩　芎藭一兩　細辛
桂心各一兩半
右五味爲末蜜和丸如彈子大臨臥服二丸
口臭方
桂心　甘草　細辛　橘皮
右四味等分治下篩以酒服一錢匕瘥止
又方
治前證
棗肉八兩　芎藭　白芷　橘皮　桂心各四兩
右五味爲末次內棗肉乾則加蜜和丸如大豆許
旦服十九食前食後常含之或吞之七日口并身
大香
口臭轉香方
桂心（古今錄用細辛）　甘草各等分
右二味爲末臨臥以指撮許酒服二十日即香
口臭方
蜀椒　桂心各等分
右二味爲末酒服三指撮許
口香去臭方
甘草二十銖　白芷十八銖　芎藭二十四銖
右三味治下篩以酒服方寸匕日三服三十日香

又方
大棗　瓜子仁　松根白皮
右三味治下篩以酒服方寸匕日二服百日衣服俱香

又方
瓜子仁　芎藭　蒺本　當歸　杜衡各六銖
細辛半兩　防風二兩
右七味治下篩食後飲服方寸匕日三服一方加白芷十八銖

七孔臭氣皆令香方
沉香五兩　蒺本三兩　白瓜瓣半升　生甘草
當歸　芎藭　麝香各二兩　丁香五合
右八味爲末蜜丸小豆大食後服五九日三

單方
緊脣及重齶重齦蛇蛻燒爲末先拭後傅
凡脣上瘡取東壁土和胡粉傅之敷急
脣吻生瘡用新瓦爲末生油調塗集元
脣腫黑痛瘡不可忍用大錢四文於石上磨豬脂汁塗之不過數次愈活幼新書
脣腫生瘡連年不瘥以八月藍葉一斤搗汁洗之不過三度瘥丹溪
脣裂生瘡瓦花生薑入鹽少許搗塗摘元
冬月脣裂香油頻頻抹之相感志
又方白荷花瓣貼之神效如開裂出血者卽止丹溪
脣乾裂痛桃仁搗和豬脂傳寿上
脣燥生瘡青皮燒灰研豬脂調塗之
脣裂生瘡橄欖炒研豬脂和塗之
脣舌生瘡雞舌香末綿裹含之外臺
潘脣緊裂用鼈甲及頭燒研傅之類要
冬日脣裂痛過豬脂日日塗之十便良方
緊脣裂痛螻蛄燒灰傅之千金下同
口脣生核猪屎絞汁溫服
脣緊瘡裂屠几垢燒存性傅之
脣急作痛五倍子訶子肉等分爲末傅之得效
又方用青皮燒灰猪脂調塗仍將青皮灰末每一錢酒調服入門
又方亂髮露蜂房元畜毛燒灰猪脂調搽得效下同
又方蛇蛻皮或蟾蜍燒爲灰猪脂調傅
又方硫黃白礬枯朱砂水銀麝香黃蘗爲末和水銀磁器中臘月猪脂和如泥先淨拭脣却以膏塗之
又方黃連一分乾薑半分炮爲細末傅之
又方蛇蛻灰晚蠶蛾末油調傅之
又方以甑上滴下汗塗神效
緊脣皂角末少許水調塗之
風濕入脾脣口瞤動瘡揭頭目眩痛結核浮腫用薏苡仁炒防己赤小豆炒甘草炙等分入蓋煎服
又方用松脂半兩大黃白蘞赤小豆胡粉各二錢半爲細末雞子清調塗之
補脣舌方用鮮蟹燒灰每二錢同乳香沒藥各二錢半塗之卽生肉如多去脣舌用川烏草烏爲細末攤紙一條以涼水調合貼之卽不覺疼可用刀取如流血以陳石灰塗之卽止愈後舌硬用白雞冠血點之卽軟醫鑑
口臭朝取井華水口含吐置厠下數度卽差本草
口瘡硼砂焰硝含口中以天南星爲末用酢調貼足心神效正傳
口瘡熱水半椀入白礬一撮待溫漱口數次愈雜俎
又方生白礬爲末傅之亦效丹溪
口瘡取膽礬火煅爲末傅瘡上吐涎便差本草
又方膽礬一塊百沸湯泡開含漱卽差綱目
大人口瘡密陀僧煅研摻之聖濟
口內熱猪用青錢二十文炭火燒赤投酒中服之立瘥本草
老小口瘡水銀一分黃連六分水二升煮五合含之日十次普濟
口瘡咽痛上膈有熱寒水石煅三兩米砂三錢半嚼子半字爲末摻之
太陰口瘡用生甘草二寸白礬一粟大常噙之嚥津活法機要
口吻生瘡瘡砂殼煅研摻之卽愈此蔡醫博祕方簡易
口瘡不瘥及胃中並生者不拘大人小兒以角蒿塗之有汁吐去一宿效
口吻生瘡用經年葵根燒灰傅之外臺祕要
口中疳瘡款冬花黃連等分爲細末用唾津調成餅子先以蛇牀子煎湯漱口乃以餅子傅之其瘡立消也經驗

口瘡及口氣口疳濃煎升麻湯入鹽頻頻含漱本草
久患口瘡生附子爲末酢麪調貼足心男左女右日再換之經驗
口臭用細莘煑取濃汁熱含冷吐之卽差本草
口舌生瘡以好酒煑黃連取汁呷下立愈丹溪
虛火上壅口瘡滿口連舌者以草烏頭吳茱萸等分爲末蜜調塗足心本事
心氣不足口臭益智去殼加甘草爲末乾嚥下或沸湯點服得效
解頤脫臼不能收上用南星末薑汁調搽兩頰一夜卽上醫說
口中生瘡天行熱甚者蛇莓自然汁半升稍稍嚥之卽瘥傷寒類要
口臭用香薷甚捷丁香不及焉煑取汁或飲或漱之甚妙丹溪
口舌生瘡赤梗蜜桶藤高脚地銅盤馬蹄香等分以酒搗汁雞毛刷上取涎出卽愈普濟
經絡中有火邪致使夢漏恍惚口瘡咽燥龍腦三錢黃蘗三兩爲末蜜丸梧桐子大每服麥門冬湯下十丸摘元
口疳臭爛用黃蘗五錢銅綠二錢爲末摻之漱去涎愈三因
脣瘡痛癢黃蘗末以薔薇根汁調塗立效聖濟
口中痿瘡東行棟根細剉水煑濃汁日日含漱吐去勿嚥肘後
惡水入口及皂莢水入口熱痛不止以皂莢子燒存性一分以糖半兩和膏含之博濟

口鼻急疳沒石子末吹下部卽瘥千金
大小口瘡沒石子炮三分甘草一分研末摻之月內小兒生口瘡者以少許置乳上吮之入口卽啼不過三次聖惠
口吻爛瘡白楊嫩枝鐵上燒灰和脂傅之外臺秘要
口瘡塞咽用猪膏白蜜一斤黃連末一兩合煎取汁熬稠每服棗許日五服千金
久患口瘡大椒去閉口者水洗麪拌煑作粥空腹吞之以飯壓下重者可再服以瘥爲度食療本草
口內肉毬有根如線五寸餘如釵股吐出不能食物捻之則痛徹心者取麝香一錢研細水調服之日三自消夏子益奇疾方
口中氣臭取茴香苗莖煑作羹頻飲之及生食並得本草下同
老血在心脾間致咳唾言語氣臭取射干根煑湯飲之
老人患口瘡不能食飲人熱乳甚妙
食韭口臭沙糖解之摘要
柚子治飲酒人口臭可啖之又煎湯飲本草下同
赤白口瘡蠐螬研汁頻搽取效
白梅治口臭常含之可以香口
脣燥緊裂猪脂酒浸搽之葉氏摘元
鵝口瘡自內生出可治自外生入不可治用食草白鵝下清糞濾汁入沙糖少許搽之或用雄鵝糞眠倒者燒灰入麝香少許搽之並效永類鈐方
一切口瘡雞內金燒灰傅之立效活幼心書
鵝口白瘡雞肫黃皮爲末乳服半錢子母秘錄

鵝口桂末和薑汁塗之湯氏寶書
口瘡赤者心熱宜乳香散及天花粉末摻之白者肺熱宜沒藥散青金散及黃蘗蓽茇爲末摻之良久以水漱口入門
小兒口瘡爛取羊乳時常含嚥又治舌腫吮之差本草
口瘡五倍子爲末摻之便可飲食
口舌生瘡蠶繭五箇包硼砂瓦上焙焦爲末摻之
薔薇根治口舌生瘡爛久不差濃煎汁稍稍含漱溫含冷吐卽效冬取根夏取莖葉用
口瘡白楊樹枝取漿水煎和鹽含漱
香口去臭口噙雞舌香卽沉香花如無沉香可代
口中如膠而臭知母地骨皮桑白皮山梔麥門冬甘草鹽湯噙早起汲井中第一汲水卽井華水含之吐棄厠下卽瘥
口瘡糜痛五倍子一兩蜜炙黃蘗滑石各五錢銅綠二錢麝香二分半爲末摻之極效正傳
亂髮灰治口臭不可近用髮灰一錢井華水調下空心服醫說
口瘡甚者用西瓜漿水徐徐飲之冬月無此用西瓜皮燒灰傅之丹溪下同
又方遠志酢研鵝毛掃患處出涎
口瘡黃蘗酢漬含之亦愈本草下同
心脾熱口頰舌上生瘡蜜炙黃蘗與青黛爲末摻之差
口舌生瘡溺桶垽七分枯礬三分研勻摻之有涎拭去數次卽愈
口吻生瘡白爛用檳榔燒灰入輕粉少許同研細乾

摻之得效
口瘡以好墨研蠔蛄令細傅之立效蓋蠔蛄走小腸膀胱其效甚速綱目
口瘡久不愈以五倍末摻之或煎湯漱或煎湯泡白礬或膽礬漱蓋酸能收斂
香口去臭密佗僧一錢酢調漱口普濟
口中氣臭明礬入麝香爲末擦牙上生生編
齒敗口臭水煮苦蕒含之普濟
口中氣臭用香白芷七錢爲末食後井水服一錢
苦竹葉及瀝治口瘡煎葉湯漱口取瀝塗之本草
香口辟臭豆蔻細辛爲末含之肘後
香口去臭藿香洗淨煎湯時時嗽漱摘元
口吻瘡以松白皮及濕貼之三四度瘥千金下同
又方經年葵根欲腐者佳燒灰及熱傅之良
又方以新炊飯了甑及熱以脣口向飯脣上熨之二七下三兩上瘥止
口肥瘡熬竈上飯令焦末傅之
燕吻瘡水履尾內燼灰中令熱取拄兩吻各二七徧
失欠頰車蹉開張不合令一人以手指牽其頰以漸推之則復入矣推當疾出其指恐誤齧傷人指也
又方消蠍和水傅之善
卒口噤不開附子搗末內管中強開口吹口中
口乾羊脂或豬脂雞子大劈之內半升酢中漬一宿絞取汁含之
又方石膏五合碎蜜二升先以水三升煮石膏取二升內蜜煮取二升去滓含如棗核大咽汁盡更含之
虛勞口乾麥冬一兩爲末大棗肉三十枚以蜜一升和令熱用米五升蒸之任性服
又方羊脂如雞子大醇酒半升棗七枚劈合漬七日取棗食之立愈
口氣臭穢常以月旦日未出時從東壁取步七步四頭向垣立含水噀壁七徧口即香美
又方細辛豆蔻含之甚良

鍼灸

素問云帝曰有病口苦取陽陵泉口苦者病名爲何何以得之岐伯曰病名曰膽癉夫肝者中之將也取決於膽咽爲之使此人者數謀慮不決故膽虛氣上溢而口爲之苦治之以膽募俞
噬乾口中熱如膠取足少陰
靈樞經曰熱病先身濇倚而熱煩悗乾脣口噬取之脈以第一鍼五十九膚脹口乾寒汗出索脈於心不得索之水水者腎也
甲乙經曰舌下腫難以言舌縱涎出廉泉主之
口僻偏歷主之
口不能水漿喝僻水溝主之
瘈瘲口沫出上關主之
口僻噤外關主之
痱瘂臂腕不用脣吻不收合谷主之
風從頭至足面目赤口痛嚼舌解谿主之
厥口僻失欠下牙痛頰腫惡寒口不收舌不能言不得嚼大迎主之
口僻不正失欠口不開翳風主之
口僻刺太淵引而下之
口中腫臭勞宮主之
千金方曰承泣四白巨髎禾髎上關大迎顴骨強間風池迎香水溝主口喎僻不能言
頰車顴髎主口僻痛惡風寒不可以嚼
外關內庭三里大泉商丘主口僻噤
水溝斷交主口噤不能水漿喎僻
斷交上關大迎翳風主口噤不開引鼻中
合谷水溝主脣吻不收瘖不能言口噤不開
商丘曲鬢主口噤不開
地倉大迎主口緩不收不能言
下關大迎翳風主口失欠下牙齒痛
膽腧商陽小腸腧主口舌乾食飲不下
勞宮少澤三間大衝主口熱口乾口中爛
勞宮主大人小兒口中腥
曲澤章門主口乾
大谿少澤主咽中乾口中熱唾如膠
兌端目窻正營耳門主脣吻強上齒齲痛
陽陵泉主口苦噬中介介然
光明臨泣主喜齧頰
京骨陽谷主自齧脣
解谿主口痛齧舌
失欠頰車蹉灸背第五椎一日二七壯痛三日未瘥
灸氣衝二百壯脅前喉下巨骨中是亦名氣堂
又方灸足內踝下三寸宛宛中或三寸五分百壯三報此三陰交穴也

得效方曰脣緊不能開宜灸手虎口穴男左女右又灸承漿三壯

醫學綱目曰口噤喎斜取頰車治皮向下又取地倉喎左瀉右喎右瀉左鍼透亦無害輕者只鍼合谷頰車

落架風取頰車

口瘡取承漿合谷人中長强又取金津玉液各出血又取委中瀉後谿此二穴乃心火腎水二經之表

導引

東垣十書曰凡口瘡無問新久夜臥將自己兩丸以手左右交揉三五十遍睡覺行之三五度便差

保生祕要曰口乾導引法左右足心每搓三十六回按時吐納津遍即咽六度數週爲法兼後功行之

運功以舌抵上齶凝玆雍穴貫一窟凉水漸提至口滿咽

又法起凌泉水或腎水皆可

又法想喉下一窟凉水以意提起口中或舌頂上齶或舌壓下齶則津液自生或升腎水或升湧泉水上腸熱口乾燥心頭推開又想腎水升至背流出心頭洗之不嚥而吸之或念背舌托上齶而津液自生口不能言先推開肺經運腎水洗其心肺又推其舌肋肺如華蓋覆於心頭不能言者是火旺肺枯非腎水不能潤之

口生蝶毒清肺經舌托上齶想水遍舌洗之次呵出心火

醫案

儒門事親曰一男子病口瘡數年上至口中至咽嗌下至胃脘皆痛不敢食熱物一涌一泄一汗即去其九次服黃連解毒不十餘日皆釋

趙平尚家一男子年二十餘歲病口中氣出臭如發厠雖親戚莫肯與對語戴人曰肺金本主腥金爲火所燥火主焦臭故如是也久則成腐腐者腎也此極熱則反兼水化也病在上宜涌之先以茶調散涌而去其七分夜用舟車丸濬川散下五七行比旦而臭斷嗚呼人有病口臭而終其老者世訛以爲肺系偏而與胃相通故臭此妄論也

衛生寶鑑曰梁濟民膏粱多飲因勞心過度肺金有傷以致氣出腥臭湫唾稠粘咽嗌不利口苦乾燥以加減瀉白散主之雜經云心主五臭入肺爲腥臭此其一也因洪飲大熱之氣所傷使心火刑於肺金以桑白皮地骨皮苦微寒降肺中伏火而補氣爲君以黃芩知母苦寒治氣腥臭清利肺氣爲臣肺欲收急食酸以收之五味子酸溫以收肺氣麥門冬苦寒治湫唾稠粘口苦乾燥爲佐桔梗辛溫體輕浮治痰逆利咽膈爲使也

薛己醫案曰州守劉克新患蘭唇時出血水內熱口乾吐痰體瘦腎虛之證悉具用濟陰地黃丸年許而愈

一儒者因勞役感暑唇生瘡或用四物加黃蘗知母之類而愈後復作彼仍用前藥益甚腹中陰冷余用補中益氣湯加茯苓半夏治之而愈

儒者楊國華因怒唇口兩耳腫痛寒熱余謂怒生熱熱生風用柴胡山梔散數劑而愈

一男子素善怒唇腫脹服清胃等藥時出血水形體骨立余用補中益氣加半夏茯苓桔梗月餘唇腫漸消元氣漸復又以四物加柴胡炒山梔丹皮升麻甘草數劑乃去山梔加參朮而痊

一婦人懷抱久鬱患齲唇雜用消食降火虛證悉具盜汗如雨此氣血虛而有熱也用當歸六黃湯內黃芩連葉炒黑二劑而盜汗頓止乃用歸脾湯八珍散兼服元氣漸復更以逍遙散歸脾湯間服百餘劑而唇亦瘥

一婦人懷抱久鬱或時胃口嘈辣胃膈不利月水不調形衰食少日晡發熱食少體倦唇腫年餘矣余用歸脾湯加薑汁炒黃連山梔少佐吳茱萸嘈辣頓去飲食少進乃去黃連加貝母遠志胃膈通利飲食如常又用加味逍遙散歸脾湯間服百餘劑月水調而唇方瘥

一婦人唇裂內熱二年矣每作服寒涼之劑時出血水益增他證余用加味清胃散而瘥後因怒唇口腫脹寒熱而嘔用小柴胡加山梔茯苓桔梗諸證頓愈復用加味逍遙散而康

一婦人善怒下唇微腫內熱體倦用化痰藥食少作嘔大便不實唇出血水用理氣消導胃膈痞滿頭目不清唇腫經閉用清胃行血肢體愈倦發熱煩躁誕水湧出余曰此七情損傷肝脾誤行攻伐所致遂用濟生歸脾湯食進便實用加味逍遙散腫消熱退用補中益氣湯脾健涎止後因怒寒熱耳痛胃膈脹悶唇忽腫甚此怒動肝火而傷陰血用四物合小柴胡

加山梔頓愈又因怒脅乳作脹壯腹作痛嘔吐酸涎飲食不入小水不利此怒動肝木而尅脾土用補中益氣加川芎芍藥而愈又勞役怒氣飲食失節發熱而喘體倦不食下血如崩脣腫熾甚此肝經有火不能藏血脾經氣虛不能攝血用補中益氣湯加炒黑山梔芍藥丹皮而愈

一男子內熱作渴咳唾痰涎大便乾澀自喜壯實問治於余余曰此脾腎陰虧陽旺之證當壯水之主不信自服二陳芩連之類次年下脣漸腫小便赤澁執守前藥脣出血水大便黑塊小便淋瀝請余往治余曰大便結黑小便淋瀝肝腎敗也脣口腫白脾氣敗也辭不赴竟歿

一婦人月經不調兩足發熱年餘後而身亦熱勞則足腿酸痛又年餘脣腫裂痛又半年脣裂出血形體瘦倦飲食無味月水不通脣下腫如黑棗余曰此肝脾血虛火證彼不信用通經等藥而死

一婦人善怒脣腫或用消毒之藥脣脹出血年餘矣余曰須養脾胃滋化源方可愈彼用前藥狀如翻花癌而死

一男子口糜爛脈數無力此血虛而有火用四物加茯苓白朮少用黃蘗知母治之而愈

地官李孟卿子新婚口舌糜爛日晡益甚用八珍湯加五味麥門冬而口瘡愈更用加減八味丸而元氣實

一男子脣舌生瘡口苦作嘔小便淋漓此肝脾火動以小柴胡加山梔酸棗仁遠志麥門冬諸證漸愈但臍熱體倦用四物柴胡山梔而愈又加白朮茯苓炙甘草而安

一婦人每怒則口苦脅痛頭痛脅脹乳內刺痛此肝肺之火用小柴胡加山梔青皮芎歸桑皮而安後勞脅怒口復苦經水頓至用四物加炒山梔炒瞿草一劑更以加味逍遙散而康

秋官趙君言口舌生瘡勞則體倦發熱惡寒此內傷氣血之證用補中益氣加五味麥冬而愈

進士劉華甫口舌生瘡午前熱甚脈數而有力用清心蓮子飲稍愈更以四物二連湯全愈後因勞役日晡發熱脈數而無力用四物加參朮柴胡少瘥但體倦口乾再用補中益氣湯而愈

武庫劉君口舌生瘡口乾飲湯乃胃氣虛而不能化生津液也用七味白朮散而瘥

廷評曲汝為口內如無皮狀或咽喉作痛喜熱飲食此中氣眞寒而外虛熱也用加減八味丸而愈

儒者費懷德發熱口舌狀如無皮用寒涼降火藥面赤發熱作嘔少食痰涎自出此脾胃復傷虛寒而作也用附子理中湯以溫補脾胃用八味丸補命門火乃愈

一儒者口苦而辣此肺肝火證先以小柴胡加山梔膽草茯苓桑皮而漸愈更以六君加山梔芍藥而瘥若口苦脅脹小便淋瀝此亦肝經之病用六味丸以滋化源

一男子口臭牙齦赤爛腿膝痿軟或用黃蘗等藥益甚時或口瘡此腎經虛熱余用六味丸悉瘥

一婦人口苦脅脹用小柴胡山梔黃連少愈更以四君子加芍藥當歸柴胡而瘥

一婦人每怒口苦發熱脯甚以小柴胡合四物二劑更以四物加柴胡白朮茯苓丹皮而愈

醫學綱目曰宣文炳口流涎不止喜笑舌瘡脈洪大用連苓藥梔白朮半夏竹瀝薑汁服之五日涎止笑息

證治準繩曰常熟嚴文靖公年踰七十未斷房室日服溫補之藥無算兼以人參煮粥從容作羹致滋胃熱滿口糜爛牙齒動搖口氣臭穢殆不可近屢進寒凉清胃之藥不效有欲用薑桂反佐者請決於予予曰用之必大劇主用加減甘露飲八劑而平

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百七十五卷目錄
醫部彙考一百五十五
齒門一
黃帝素問上古天眞論 診要經終論 陰陽應象大論 藏氣法時論 至眞要大論
靈樞經根原篇 邪客篇
扁鵲難經 驗病死候
華佗中藏經 驗病死候
孫思邈千金方 論證
楊士瀛直指方 齒屬腎 毒瘀痛 蟲蝕痛
實漢卿瘡瘍全書 牙癰 牙腫 牙宣
劉完素六書 寒入腦痛
張從政儒門事親 病屬火 風症疼
李杲十書 論證 熱痛
朱震亨心法 齒屬熱
虞摶醫學正傳 論證
戴思恭證治要訣 痛證
李時珍本草綱目 食腐齒軟
王綸明醫雜著 牙疳腫痛
李梴醫學入門 齒血痛 宜露病勢 風熱痛 風冷病 蟲蝕痛 恐寒邑 熱痛
龔信古今醫鑑 脈法 痛證
薛己口齒類要 總論
張三錫醫學準繩六要 論酒色因 王肯堂證治準繩 齒部所屬 骨槽風 上齦腫 牙癰 陳實功外科正宗 齒病 走馬疳
趙獻可醫貫 齒論
吳崐醫方考 齒病方論
張介賓景岳全書 論證 治法
陳士鐸石室秘錄 主齒 固齒
方一 細辛湯 白芷湯 宣鬱通經飲 溫風 清胃湯 羌活散 升麻湯 蝕齒湯 清胃湯 胃丸 定痛散 殺蟲丸 哭來笑去散 牙疼方 牡丹皮 血竭散 麝香散 牙痛藥 白牙藥 取蟲牙落不犯手方 取蛀牙法 牙落重生方 又方 謝傳笑去散 固齒散 香取散 醋鬼散 搽牙方 揩齒散

藝術典第一百七十五卷
醫部彙考一百五十五
齒門一
黃帝素問
上古天眞論
女子七歲腎氣盛齒更髮長三七腎氣平均故眞牙生而長極
註 女子七歲腎氣方盛腎主骨齒乃骨之餘故齒更眞牙乃盡根之牙腎氣足故眞牙生
丈夫八歲腎氣實髮長齒更三八腎氣平均筋骨勁強故眞牙生而長極五八腎氣衰髮墮齒槁八八則齒髮去
註 眞牙生而筋骨所長以至於極矣腎爲生氣之原男子衰於氣五八則根氣先衰而髮墮齒槁至八八則數終衰極乃脫去也
診要經終論
少陰終者面黑齒長而垢腹脹閉上下不通而終矣
註 心之華在面黑者水氣上乘火氣滅而水氣脫矣齒長而垢骨氣洩也腹脹閉上下不通者心腎水火之氣並絕而不能上下交通也
陰陽應象大論
岐伯曰陽盛則身熱腠理閉喘爲之俯仰汗不出而熱齒乾以煩冤腹滿死能冬不能夏
註 陽勝乃火熱用事故身熱熱在表則腠理閉熱在裏則喘鼻陰勝在腹則爲之俯陽勝在背則爲之仰陽勝於周身則汗不出而熱也腎主精液齒乾精液竭矣心主血液煩冤血液枯矣腹滿中焦之生氣絕矣此陽熱偏勝之死證然能苟延於冬而不能幸免於夏
痿論
腎熱者色黑而齒槁
帝曰人有病頭痛以數歲不已此安得之名爲何病
岐伯曰當有所犯大寒內至骨髓髓者以腦爲主腦逆故令頭痛齒亦痛病名曰厥逆
註 腎生骨髓故所犯大寒之氣而內至骨髓也諸髓皆屬於腦故以腦爲主髓邪上逆則入於腦是以頭痛數歲不已齒乃骨之餘故齒亦痛也此下受之寒上逆於巔頂故名曰厥逆
至眞要大論
歲少陰在泉熱淫所勝民病腹中常鳴氣上衝胃喘不能久立寒熱皮膚痛目瞑齒痛頤腫
註 少陰在泉卯酉歲也腹中常鳴者火氣奔動也氣上衝胃者火氣炎上也喘不能久立寒熱皮膚痛者火淫肺金也目瞑者熱甚陰虛畏陽光也齒痛頤腫者熱乘陽明也

靈樞經

經脉篇

手陽明之脉其支者從缺盆上頸貫頰入下齒中

足陽明之脉下循鼻外入上齒中

邪客篇

天有列星人有牙齒

扁鵲難經

驗病死候

病人脣腫齒焦者死脾腎絕也

病人齒忽變黑者十三日死少陰絕也

漢華佗中藏經

驗病死候

胃絕齒落面黃者七日死一日十日死

面無光牙齒黑者死

齒忽黑色者十三日死

唐孫思邈千金方

論證

凡齒斷宣露多是蟲蝕及月蝕以角蒿灰夜數斷間使滿勿食油不過二三夜瘥食油及乾棗即發所以患齒者忌油乾棗及桂心每旦以一捻鹽內口中以溫水含揩齒及叩齒百徧爲之不絕不過五日口齒即牢密凡人齒斷不能食粟菜者皆由齒根露也爲此鹽湯揩齒叩齒法無不愈也神良凡人好患齒病多由月蝕夜食飲之所致也識者宜愼之所以日有蝕未平時特忌飲食小兒亦然

朱楊士瀛直指方

齒屬胃

齒者骨之所終髓之所養腎實主之故腎衰則齒豁精盛則齒堅虛熱則齒動

毒痰痛

熱則生痰毒氣上攻灌注經絡最能發痛外證痰盛欬嗽宜二陳湯加細辛枳殼生薑大棗烏梅煎服仍以薑黃華茇等分煎湯候溫以舌浸湯內涎自流出效

蟲蝕痛

凡人飲食不能潔齒腐臭之氣淹漬日久齒齦有孔蟲蝕其間蝕一齒盡又度其餘至如疳蟲皆其種類必殺蟲而後痛止

痛因

手陽明之支脉入齒牽則齒浮虛則宣露挾風則上攻頭面疳蟲則變成齲脫

寶漢卿瘡瘍全書

牙癰

牙邊生癰如豆大此脾胃二經火也宜用小刀點破搽以冰片散再服清胃湯甘桔湯無不愈矣

牙癤

齒屬腎經此證或風乘虛而入發癤或飲酒太過而癤或血虛而癤或剔傷而癤或房勞陰虛而癤治法宜以意詳證消息而治

牙宣

牙宣謂脾胃中熱湧而宣露也此證牙齒縫中出血上屬脾下屬胃吐血痰至升斗難療者急宜速治遲則難生先用蚌水灌淨然後吹藥

金劉完素六書

寒入腦痛

腎虛犯大寒頭疼齒亦痛痛之甚數歲不已者是也以天南星丸主之

元張從政儒門事親

痛屬火

有人因上下齒痛凡痛發輒取去不數年上下齒盡至五十歲生硬之物皆不能食夫上下齒痛皆由手足陽明二經風熱甚而痛矣可用大小承氣湯藏用丸祛風丸等藥瀉之則痛當自止內經曰諸痛癢瘡皆屬心火王冰云百端之起皆自心生心者火也火生土之故也出牙之故不可不知

風疰疼

夫風疰牙疼久不愈者用針揷巴豆一枚於燈焰上燎煙未及存性於牙窩根盤上熏之則愈

李杲十書

論證

夫齒者腎之標口者脾之竅諸經多有會於口者其牙齒是手足陽明之所過上齦隸於坤土乃足陽明胃之脉所貫絡也止而不動下齦腎物動而不休乃手陽明大腸之脉所貫絡也手陽明惡寒飲而喜熱足陽明喜寒飲而惡熱其病不一牙者腎之標亦喜寒寒者堅牢爲病不同熱甚則齒動齦脫作痛不已故所治療不同也有惡熱而作痛者有惡寒而作痛者有惡寒惡熱而作痛者有惡寒飲少熱飲多而作痛者有惡熱飲少寒飲多而作痛者有牙齒動搖而作痛者有齒疳而作痛者有齒齦爲疳所蝕缺少血出而作痛者有齒齦腫起爲痛者有脾胃中有風邪

但覺風而作痛者又有牙上多爲蟲所蝕其齒缺少而色變爲蟲牙痛者有胃中氣少不能禦寒袒露其齒作痛者有牙齒疼痛而穢臭之氣不可近者痛既不一豈可一藥而盡之故胃有實熱上齒痛尤甚宜凉膈散大黃酒蒸爲君加知母石膏升麻爲佐頻頻含嚥即愈

發惡寒飲大惡熱飲宜立效散

熱痛

熱痛者腸胃積熱齒齦腫爛口氣臭穢宜凉膈散加知母石膏升麻爲佐酒蒸大黃爲君噙嚥即愈

朱震亨心法

痛屬熱

牙齒之痛因胃中濕熱上出於牙齦之間適被風寒或飲冷所鬱則濕熱不得外達故作痛也寒是表故外用辛溫解漱之藥熱是本故內服辛凉散熱之劑牙痛用梧桐淚爲末少加麝香擦之牙大痛必用胡椒華茇能散其中浮熱間以升麻寒水石佐以辛凉荊芥薄荷細辛之類若用清凉藥便痛不開必須從治如華茇川芎薄荷荊芥細辛樟腦青鹽之類

明虞搏醫學正傳

論證

內經曰百病之起有生於本者有生於標者夫齒者腎之標骨之餘也足陽明胃之脈貫絡於齒上齦手陽明大腸之脈貫絡於齒下齦手陽明惡寒飲而喜熱飲足陽明惡熱飲而喜寒飲故其爲痛有惡寒惡熱之不同也有開口啘風則痛甚者腸胃中有風邪也有開口則穢臭不可近者腸胃中有積熱也或爲痛而齒動搖或爲痛而蟲侵蝕又有齒縫疎豁飲食不便者比比是也大抵齒齦露而動搖者腎元虛也治宜滋陰補腎爲要惟寒壯熱而口臭穢者胃氣熱也治宜安胃瀉火爲良其所謂風邪蟲蝕之證蓋因熱生風而風生蟲腸胃之火既平更加以擦牙訣蟲之藥以治其標無有不安之理也

戴思恭證治要訣

痛證

牙痛有風毒熱壅齲蛀腎虛未辨何證俱用消風散揩抹諸證俱宜香附炒黑三分炒鹽一分研勻揩用如常

有牙蟲已出其孔穴空虛而痛者此乃不可不知宜用乳香少許火炙令軟以實之

腎虛牙浮而痛甚則惟寒壯熱全具如欲脫之狀宜安腎丸間進黑錫丹

李時珍本草綱目

食酸齒軟

楚人多食酸則齒軟謂其木生木水氣弱木氣盛故齒如是

王綸明醫雜著

牙牀腫痛

牙牀腫痛齒痛搖動或黑爛脫落世人皆作腎虛治殊不知此屬陽明經濕熱蓋齒雖屬腎而生於牙牀上下牀屬陽明大腸與胃俗木生於土也腸胃傷於美酒厚味膏粱甘滑之物以致濕熱上攻則牙牀不清而爲腫爲痛或出血或生蟲由是齒不得安而動搖黑爛脫落也治宜瀉陽明之濕熱則牙牀清寧而齒自安固矣

註 按齒痛若因手足陽明經濕熱用東垣清胃散若因風寒入腦腦痛齒亦痛用羌活附子細辛湯若因思慮傷脾用歸脾湯若因鬱火所致用越鞠丸若因酒炙煿而發用清胃散若因飲食傷脾用六君子湯若因勞傷元氣用補中益氣湯若脾胃素弱用六君當歸升麻若因腎經陰虛用六味丸若因腎經陽虛用八味丸若陰陽俱虛用十補丸若脾腎虛寒用安腎丸徐用誠先生云凡齒病惡寒熱等證屬手足陽明經齒搖齦脫屬足少陰經齒蝕腫痛出血皆胃火所致也亦有諸經錯雜之邪與外因爲患者

李梴醫學入門

瘀血痛

風熱挾攻齦間令血出痰潛不消掣痛鑽刺宜犀角地黃湯或加減甘露飲加升麻

宣露動搖

齒齦宣露動搖者腎元虛也宜八味丸滋陰補腎

風熱痛

風熱者外風與內熱相搏齒齦腫痛濃汁臭穢宜犀角升麻湯兼以荊芥湯含漱

風冷痛

風冷者齒齦不腫不蛀日漸動搖宜溫風散兼以開笑散含漱

蟲蝕痛

齒病變成骨槽風出血骨露者宜玉池散

惡寒惡熱

足陽明胃絡脈入齒上縫其病喜寒飲而惡熱飲手陽明大腸絡脈入齒下縫其病喜熱飲而惡寒飲熱牙痛怕冷水冷牙痛怕熱水不怕冷熱乃風牙痛

熱痛

如溫熱被風冷鬱而作痛宜當歸龍膽散

久年齒痛黑爛脫落必吸涼稍止乃青粱濕熱之火調胃承氣湯加黃連下之

龔信古今醫鑑

脈法

右關脈洪數或弦而洪腸胃中有風熱而痛尺脈洪大而虛者腎虛主齒動搖疎豁相火上炎而痛

痛證

齒病有開口呷風則痛甚者胃中有風邪也有開口則臭穢不可近者腸胃中有積熱也有齒根腫而痛者胃熱也有痛而動搖者腎元虛也有孔而痛者蟲蝕也上牙痛亦屬足少陰腎經虛熱宜細辛湯下牙痛屬手陽明虛熱有風宜白芷湯

薛己口齒類要

總論

齒者腎之標口者脾之竅諸經多有會於口者齒牙是也徐用誠先生云齒惡寒熱等證本手足陽明經其動搖脫落本足少陰經其齦疳齦腫出血痛穢皆濕熱胃火或諸經錯雜之邪與外因爲患治法濕熱甚而痛者承氣湯下之輕者清胃散調之大腸熱而齦腫痛者清胃散治之重則調胃丸清之六鬱而痛者越鞠丸解之中氣虛而痛者補中益氣湯補之思慮傷脾而痛者歸脾湯調之腎經虛熱而痛者六味丸補之腎經虛寒而痛者還少丹補之重則八味丸主之其屬風熱者獨活散大寒犯腦者白芷散風寒入腦者羌活附子湯病證多端當臨證制宜

張三錫醫學準繩六要

論酒色因

牙牀屬胃牙齒屬腎中年酒色過度精弱不能榮於齒而厚味酒毒日腐於胃其榮於齒牀者皆濁濁則腐潰譬之土不堅則樹搖倒齒落之象矣牙根痛者牀熱而將腐也經曰丈夫五八腎氣衰髮墮齒槁生數四十而腎已衰何況斲喪遵生者勿全責於藥也

王肯堂證治準繩

齒部所屬

統屬足少陰腎經

註素問曰丈夫五八腎氣衰髮墮齒槁又曰腎熱者色黑而齒槁少陰終者面黑齒長而垢

齒分上下齦上齦屬足陽明胃經

註素問曰邪客於足陽明之經令人鼽衄上齒寒針經曰上牙痛喜寒而惡熱取足陽明之原衝陽穴在兩足跗上五寸骨間動脈中註牙判也左半爲牙右半爲片朱丹溪曰當灸三里穴三里足陽明經之合穴也在兩膝下外側輔骨下三指地離脛骨外一指許兩筋間宛宛中也

下齦屬手陽明大腸經

註張潔古曰泰艽去下牙痛及除本經風濕針經曰下牙痛喜熱而惡寒取手陽明之原合谷穴在兩手大指次指岐骨間陷中朱丹溪曰當灸三間穴三間手陽明經之合穴也在兩手大指次指本節後內側骨上縫中赤白肉際

男子八歲腎氣實而齒更生三八眞牙生五八則齒槁八八則齒去矣女子亦然以七爲數蓋腎主骨齒乃骨之餘髓之所養也故隨天癸之盛衰也足陽明之支者入於上齒手陽明之支者入於下齒若骨髓不足陽明脈虛則齒之諸病生矣何以言之陽明金也齒屬腎水也陽明之支入齒此乃母氣榮衛其子也故陽明實則齒堅牢陽明虛則齒浮動所以齒痛者乃陽明經有風冷濕熱之邪乘虛而入聚而爲液爲涎與齒間之氣血相搏擊而痛也若熱涎壅盛則腫而痛也然不盛則齒齦微腫而根浮也有齲牙痛者由濕熱生蟲蝕其根而作痛也有齒間血出者由陽明之支有風熱之邪入齒齦搏於血故血出也有齒齲者亦以陽明入風熱之邪搏齒齦氣血腐化爲膿出臭汁謂之齒齲亦曰風齲有齒匱者是蟲蝕齒至齦膿爛汁臭也有齒挺者由氣熱傳入於脈至齒齦間液沫爲膿氣血竭肉齦消故齒根露而挺出也有齒動搖者陽明脈虛氣血不榮故齒動搖也有齒歷蠹者由骨髓氣血不能榮養故令牙齒黯黑謂之歷齒其齒黃黑者亦然以此而言豈非諸齒病皆因陽明之所致哉

劉宗厚云外因風寒或口吸寒冷致牙疼者皆外因也實熱虛火骨蒸氣鬱血熱蟲蛀皆內因也硬物所支打擊等致皆不內外因也

冬時風寒濕頭疼項筋急牙齒動搖疼痛宜麻黃散大寒犯腦連頭痛齒亦痛宜細辛散白芷散蠍梢散牙痛用清凉藥更痛甚者從治之用草豆川椒薄荷

荊芥細辛樟腦青鹽爲末擦牙上得熱而痛得凉則止者以辛凉藥治之因服補胃熱藥致上下牙疼痛不可忍牽引頭腦滿面發熱大痛陽明之別絡入腦喜寒惡熱乃手陽明經中熱盛而作其齒喜冷惡熱清胃湯主之寒多熱少者微惡熱飲大惡寒飲宜草豆蔻散熱多寒少者微惡寒飲大惡熱飲宜麝香散立效散上牙疼升麻散下牙疼白芷散平昔多食肉人口臭牙齒動搖欲落或血出不止乃內傷濕熱膏粱之疾也宜神功丸牢牙散調胃承氣去硝加黃連湯若熱塞牙疼腫連腮頰乃陽明經熱也宜金沸草散去麻黃加薄荷如其數

骨槽風

或問牙齦腫痛寒熱大作腐爛不已作疳治之無益何如曰此骨槽風一名穿腮毒由憂愁思慮驚恐悲傷所致初起生於耳下及頸項間隱隱皮膚之內略有小核漸大如胡桃日增紅腫或上或下或左或右牙關緊急不能食先用鵝翎探吐風痰服黃連解毒湯活命飲加元參桔梗柴胡黃芩切不可用刀針

上齶癰

或問上齶生疽狀如紫葡萄何如曰是名懸癰屬手太陰手厥陰心包絡令人寒熱大作舌不能伸縮口不能開閉惟欲仰面而臥鼻中時出紅涕屬手足少陰經及三焦積熱所致宜黃連消毒飲加桔梗元參急刺出惡血犀角琥珀膏敷之壯實者一粒金丹下之過時不治飲食不入神昏脈亂者死

牙癰

或問牙根生癰何如曰此名附牙癰屬足陽明胃經熱毒所致宜清胃散黃連消毒飲或刺出惡血則愈

陳實功外科正宗

齒病

齒病者有風有火亦有陽明濕熱俱能致之風痛者遇風發作浮腫隨後生痛以消風散治之火痛者則齒根必牽扯腮顴陣陣作痛時發時止以冰硼散搽之出涎自愈陽明經濕熱作痛者其患腮顴浮腫甚者牽引太陽疼連頸項口中熱氣大便結燥當宜凉膈散加石膏治之又腫高軟者內必有膿用針刺破出膿自愈有齒齦病爛出血不止者內服犀角地黃湯外搽人中白散又小兒鑽齒疳牙根尖穿出齒根肉外芒刺嘴唇作痛用鈹針挑破牙面好肉以手取去本牙出血不止以濕紙換貼二三次其血自止必兼戒厚味其牙復生如舊

走馬疳

走馬疳言患迅速不可遲延故也其患多在痧痘餘毒所中又有雜病熱甚而成者其患牙根作爛隨變黑腐作臭甚者牙齦脫落根柯黑朽不數日間以致穿腮破脣誠爲不治初起宜用蘆薈消疳飲外用人中白散或冰硼散二藥搽之取去黑腐內是紅肉血流者爲吉如取時頑肉不脫腐爛漸開煩腫外散臭味不止更兼身熱不退者俱爲不治

趙獻可醫貫

齒論

素問曰男子八歲腎氣實而齒更生二八眞牙生五八則齒槁八八而齒去矣女子亦然以七爲數蓋腎主骨齒者骨之標髓之所養也凡齒屬腎上下齦屬陽明上齦痛喜寒而惡熱取足陽明胃下齦痛喜熱而惡寒取手陽明大腸凡動搖袒脫而痛或不痛或出血或不出血全具如欲落之狀者皆屬腎虛曰腎熱者色黑而齒槁又曰少陰終者面黑齒長而垢其齦疳齦腫不動潰爛痛癢者皆屬陽明或請經錯雜之邪與外因爲患俱分虛實而治腎經虛寒者安腎丸還少丹重則八味丸主之其冬月時大寒犯腦連頭痛齒牙動搖疼痛者此太陽並少陰傷寒也仲景用麻黃附子細辛湯凡腎虛者多有之如齒痛搖動肢體倦怠飲食少思者脾腎虧損之證用安腎丸補中益氣並服如喜寒惡熱者乃胃血傷也清胃湯若惡寒喜熱者胃氣傷也補中益氣湯

凡齒痛遇勞即發或午後甚或口渴面黧或遺精者皆脾腎虛熱補中益氣用六味丸或十全大補湯若齒齦腫痛煩連頤頰此胃經風熱用犀角升麻湯若善飲者齒痛頤頰煩腫此胃經濕熱清胃湯加葛根或解酲湯

吳崐醫方考

齒病方論

腎虛齒長而痛者滋陰大補丸加鹿茸方治之蓋腎主骨腎虛則髓弱髓弱則骨枯骨枯則不能固齒故令齒長而動譬之敗几焉几敗木枯則緊賓之寸木搖搖而出以木澤之則敗几潤而寸木固故治此者宜滋陰補腎腎不虛則齦骨潤齦骨潤則齒固矣是方也熟地牛膝杜仲山萸五味枸杞皆味厚之品也可以滋陰益腎巴戟菟蓉茴香遠志石菖蒲山藥茯苓皆甘溫之品也可以溫腎生精乃鹿茸者取其爲

血氣之屬得陰氣之最完故用之以爲補腎填精益髓之品耳紅棗肉者味甘益脾故用之以劑丸也

齊大夫病齲齒倉公爲之作苦參湯日漱三升五六日病已蓋取其苦能安齒蠹寒能去風熱也後人無風蠹有用苦參漱齒久而病愈重者降多故也此不知三軍之事而從三軍之政未有不敗者也

牙痛惡寒喜熱者羗牙散主之凡人臥去之時開口引其風寒因致牙痛故得寒飲則助其邪而痛甚得熱飲則散其寒而少寬是方也附子尖天雄尖辛熱之品也用之所以溫寒乃全蝎者微毒之品也假之就寒毒之區藉療風邪云爾或用乾薑華茇細辛作湯以漱之亦是治寒之意

風熱牙疼喜寒惡熱者定風湯漱之蓋內生風熱併於口頰邪火自實因致牙疼故得寒飲則陰陽微和而痛少可得熱飲則以火濟火而痛亦深是方也用牙皂荊芥葱白之辛溫以散其風用矾硝石膏之鹹寒以驅其熱

凡牙間有孔而痛者梧桐淚蠐螬酥莨菪子韭子石灰五件得一治之皆獲奇效蓋梧桐淚主火毒風疳蟲齒王海藏常奇之矣蠐螬酥主牙蝕到處痛定林元禮常奇之矣莨菪子炮氣蒸齒去蟲孫眞人常奇之矣韭子入艾燒煙熏蟲朱丹溪常奇之矣此皆古人之方也新得一方只是新燒石灰一物蜜丸著於齒蝕之處應手而愈此則古人之所未道也

本事方云取牙不犯手用草烏華茇各半兩川椒細華各二兩爲細末每用少許以鍼揩在患牙內外如此數次其牙日傷則易落矣蓋四物皆辛熱之品入齒齦而數傷之則齒肉日離此近理之方也

景岳全書 臣張介賓著

論證

齒牙之病有三證一曰火二曰風三曰腎虛凡此三者病治各有不同辨得其眞自無難治之齒病矣

凡火病者必病在牙牀肌肉間或爲腫痛或爲糜爛或爲臭穢脫落或牙縫出血不止是皆病在經絡而上牙所屬足陽明也止而不動下牙所屬手陽明也嚼物則動而不休此之病必爲美酒厚味膏粱甘脆過多以致濕熱畜於腸胃而上壅於經乃有此證治宜戒厚味清火邪爲主

蟲痛者其病不在經而在牙亦由肥甘濕熱化生牙蟲以致蝕損蛀空牙敗而痛治宜殺蟲爲主濕熱盛者亦宜兼清胃火

腎虛而牙病者其病不在經而在臟蓋齒爲骨之所終而骨則主於腎也故曰腎衰則齒豁精固則齒堅至其爲病則凡齒脆不堅或易搖動或疎豁或突而不實凡不由蟲不由火而齒爲病者必腎氣之不足此則或由先天之稟虧或由後天之斲喪皆能致之是當以專補腎氣爲主

傷於外因者或以擊損或以跌仆或勉強咬嚼堅硬等物久之無不損齒此豈藥之可療知者自愼也

治法

陽明熱壅牙痛宜清胃散清胃飲之類火甚者宜抽薪飲太清飲之類以清其源也若腎陰本虛胃火復盛上實下虛而爲熱渴腫痛者玉女煎爲最妙

牙痛外敷之藥惟辛溫可以散熱宜細辛煎丁香散薑黃散赴筵散之類然惟二辛煎二香散爲尤妙

蟲牙蛀空疼痛宜瑞竹堂方韭子湯巴豆丸藜蘆散皆可擇而用之

牙縫出血不止無非胃火所致宜以前清胃等藥主之亦有陰虛於下格陽於上則六脈微細全非實熱火證牙縫之血大出不能止而手足厥冷者速宜以鎮陰煎主之若誤用寒涼必致不救

腎虛牙齒不固或搖動或脆弱浮突者雖宜以補腎爲主然亦當辨其寒熱凡左歸丸六味丸可壯腎中之陰右歸丸入味丸可補腎中之陽須通加骨碎補丸服尤妙若齒牙浮動脫落或牙縫出血而口不臭亦無痛者總屬陰中之陽虛宜安腎丸之類主之

走馬牙疳牙牀腐爛齒牙脫落謂之走馬者言其急也此蓋熱毒蘊蓄而然凡病此者大爲凶候初見此證速宜內瀉陽明之火兼以菉豆飲常服之外用水白散冰玉散三仙散麝蟾散北粟丹之類敷之

石室秘錄 臣陳士鐸著

生齒

長齒法方用雄鼠脊骨全副餘骨尾頭俱不用麝香一分熟地身懷之令乾骨碎補炒各爲末三錢但熟地必須自製切不可經鐵器一犯則前藥俱不效矣生地亦須看一做過經鐵針穿孔者卽不效細辛三分榆樹皮三分總之羣藥俱不可經鐵器當歸一錢青鹽二錢杜仲一錢足矣各爲絕細末鼠骨去肉不用新瓦上焙乾爲末不可燒焦焦其生氣也用一磁瓶盛之每日五更時不可出房將此藥輕擦在無牙之處三十六擦藥任其自然嚥下不可用水漱口一

月如是日間午間擦之更佳亦如前數

固齒

固齒方用雄鼠脊骨一副熟地細辛檳榔皮骨碎補各三錢青鹽當歸各一錢杜仲二錢各爲末裹在綿紙成條咬在牙牀上以味盡爲度末不齒落矣然亦不可經鐵器經則不效此藥可數數百人大約一人須用三條

方一

細辛湯（普濟下門）

治牙疼

細辛一錢半　蔓荊子　鼠黏子各一錢　升麻　黃連　防己各七分　薄荷葉三分　羗活一分　黃蘗酒炒　知母酒炒各五分

右剉作一貼水煎服

白芷湯

治風火牙疼

防風　荊芥穗　連翹　白芷　薄荷　赤芍藥　石膏各一錢

右剉作一貼水煎服

當歸連翹飲（同上春）

治齒痛即風痛甚開口臭穢

細辛三分　當歸　生地　川芎　連翹　防風　荊芥穗　香白芷　羗活　黃芩　梔子　枳殼　甘草各七分

右剉作一貼水煎服不拘時

溫風散（入門）

治風冷齒痛

當歸　川芎　細辛　白芷　羗活　露蜂房　藁本各一錢

右剉水煎服仍含漱吐之

瀉胃湯（同上春下門）

治牙痛如神此胃熱也

當歸　川芎　赤芍藥　生地黃　黃連　丹皮　梔子　防風　荊芥　薄荷　甘草各一錢

右剉作一貼水煎服

滋陰清胃丸

治陽明血熱上下牙牀腫痛紅爛肉縮齒根露石膏火煅酢淬二兩　當歸酒洗　生地黃酒洗　梔子鹽水炒　丹皮各一兩　黃連酒炒　知母　葛根　防風各七錢　生甘草節四錢　升麻　白芷各五錢

右爲末蒸餅和丸菉豆大米飲下百丸

定痛散

治蟲牙痛甚

當歸　生地黃　細辛　乾薑　白芷　連翹　苦參　黃連　川椒　桔梗　烏梅　甘草各一錢

右剉作一貼水煎嗽漱後嚥下

清胃湯（同上春）

治牙牀腫痛動搖黑爛脫落皆屬手足陽明二經石膏末二匙　藿香五分　條芩　連翹　丹皮　梔子炒各一錢　生地黃酒洗　黃連炒各八分　升麻　白芍藥煨　桔梗各七分　甘草三分

右剉作一貼水煎食遠服

羗活散

治風寒濕犯腦痛牙齒龈動搖袒脫

草豆蔻一錢　柴胡五錢　麻黃　防風各二錢　羊脛骨灰二錢　羗活錢半　歸身六分　蒼朮　升麻各五分　藁本　香白芷　桂枝各三分

細辛少許

右爲末溫水漱口淨擦之其痛立止

雄黃定痛膏（衛生易簡）

治牙痛

大蒜二枚　細辛　焰硝各三錢　雄黃一錢　猪牙皂角四錢

右爲末蒜搗膏爲丸梧子大每一丸將綿裹左邊牙痛塞左耳中右邊塞右耳良久痛止神效

殺蟲丸（普濟下門）

治蟲牙痛

好砒霜不拘多少　黃丹少許

以黃蠟鎔成一塊旋用旋丸如黃豆大用白綿包裹留尾如右牙疼則塞右耳左牙疼則塞左耳兩邊疼則塞兩耳必深入耳孔一夜其蟲卽死永不復疼矣

哭來笑去散

治牙齒痛神效

雄黃　乳香　胡椒　麝香　藁茇　良薑　細辛

右等分爲末每用少許吹男左女右鼻中立止如頭痛臉腫用紙捲藥末在內作條燕香油點着燎牙痛處條燒盡痛卽止

牙疼方（續）

雄黃　沒藥各一錢　細辛五分

右爲末若左邊疼用少許噙入左鼻又吹入右耳若右邊疼噙右鼻又吹入左耳

韭子丸（千金）

治蟲牙痛

韭子　全蠍各一兩　乳香　雄黃各一錢五分

右爲末鍚黃蠟和丸彈子大磁瓶內燒一丸以紙蓋口以筆管引烟熏牙孔其蟲盡出將藥瓶安於水中其蟲摸在水中

血竭散

治牙疳惡瘡久不瘥

蒲黃二錢　血竭五分　龍骨　枯白礬各一錢

寒水石煅四錢

右爲末取少許摻瘡上以紙封貼

麝香散

治疳蟲牙齦臭爛出膿水

枯白礬　青黛　胡黃連　麝香各二錢五分

蝦蟆灰五分　麝香二分五釐

右爲末每五分摻患處加梧桐淚二錢五分尤妙

牙疳藥

信砒　青黛　輕粉各一錢　麝香五分

右爲末香油攤紙上用木槌槌實收起臨臥以漿水漱淨可瘡口大小以藥紙封之至曉去藥紙漱淨勿嗽三次必效

白牙藥

牙齒黃黑不瑩淨

石膏細末　砂鍋細末各一兩　零陵香　白芷　青鹽　升麻各二錢半　細辛一錢　麝香五分

右爲細末每早晨取少許擦齒上溫水漱口吐出取疼牙落不犯手方

川椒　細辛各一兩　草烏　草茨各五錢

右爲細末每少許揩痛齒自落取蛀牙法

硼砂　硃砂各一錢　硇砂二錢　川烏尖七箇　附子尖十四箇　蠟酥七箇　信砒二錢

右五月五日合爲末取少許揩牙上牙落後以防風荊芥甘草煎湯漱吐

牙落重生方

雄鼠一箇剝去皮用硇砂擦上三日肉爛化盡取骨瓦上焙乾　香附一兩　白芷　川芎　桑白皮　地骨皮　蒲公英　川椒　旱蓮草　明淨青鹽　川槿皮各三錢

右爲細末擦百日其牙復生良驗

又方

未開眼嫩老鼠三四箇　白芨　白芷　青鹽　細辛　當歸　熟地黃各五錢

先將五味爲末入地黃搗爛如泥和勻作一餅包老鼠在內外用濕紙包裹文武火燒盡煙絕取出研爲末擦上即生牙

謝傳笑去散

治牙齒痛

乳香　沒藥　雄黃　胡椒　兩頭尖　烏藥

右等分爲末擦患處吐涎即愈

固齒散

大鼠一箇去肉取骨　川椒炒　乳香各二兩　香附子炒　白蒺藜炒　青鹽各一兩

右爲末每日擦牙永無齒病

香椒散

治冷證齒痛

香附子　川椒　破故紙各二錢　草茨一錢

右爲末入炒鹽二錢擦牙上

誠鬼散（東垣）

治胃熱齒痛

麝香少許　黃連　梧桐淚　荊芥穗　薄荷　升麻　羊脛骨灰等分

右爲末擦之神效

擦牙方（入門）

荊芥　薄荷　細辛　梧桐淚等分　麝香少許

右爲末擦牙熱加馬牙硝冷加川椒

清胃散

治因服補胃熱藥致上下牙疼痛不可忍牽引頭腦滿面發熱大痛陽明之別絡入腦喜寒惡熱乃手陽明經中熱盛而作其齒喜冷惡熱

生地黃二分酒洗　升麻一錢　牡丹皮五分　當歸身二分　揀黃連二分如連不好更加二分夏倍之

右五味同爲細末水煎至一半去滓候冷細呷之

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百七十六卷目錄

醫部彙考一百五十六

齒門二

方二 麝香 雄散 熟絹末散 露蜂房散 川升麻散 牙齦腫爛出血方 黃連散 生肌換花散 鬱金散 牙宣出血方 玉池散 解毒雄黃散 野葛門蝕牙疼方 劑芥湯 蜘蛛散 十全大補湯 蜂窩散 蜂花解毒湯 天南星 藤黃附子細辛湯 蜂花散 九 犀角地黃湯 京墨散 消風散 巴豆 九 豬蘆散 韭子湯 北寒丹 三仙散 犀角升麻湯 琥珀犀角膏 加減甘露飲 黃連消毒散 麝香飲 二陳湯 安胃丸

大承氣湯 調胃承氣湯 越鞠丸 補中益氣湯 歸脾湯 六味丸 八味丸 茵陳散 羌活附子湯 獨活散 麻黃散 白芷散 獨活散 蠟矾散 牛黃地黃散 金沸草散 散 麝香雄黃散 草豆蔻散 麝香散 立效散 益智末揩散 白芷散 升麻散 功丸 牛黃散 通少丹 黑錫丹 牛黃散 白牙散 麝香朝 丸 長春牛黃散 沉香散 珠砂黎炒 散 地黃丸 甘露飲 五靈膏 珠砂牛黃揩 水煎方 宣牙膏 五倍子散 揩齦散 草 豆飲丸 右 左 玉女煎 水 白散 二辛煎 三香散 圓 大清飲 玉 散 盞 牙匙方 清胃湯 玉池散

藝術典第一百七十六卷

醫部彙考一百五十六

齒門二

方二

麝香 雄散 半錢 下附

治大人小兒牙齒動搖齦齲宣露骨槽風毒宣蝕潰爛不能下食

麝香 龍骨 雄黃 膽礬

右爲細末各用一字鵝毛蘸藥掃患處又用三錢以水七分煎至五分熱呷滿口候冷吐出或每日揩牙溫水漱之

熟銅末散

治牙齒非時脫落令牢定

當歸身 細辛 地骨皮 防風各二錢五分 熟銅末一兩

右爲細末研如粉每用塗藥在患處以蠟紙封之日夜二三度三五日牢定忌嚼硬物

露蜂房散

治牙齒不生及齒風痛

露蜂房炙 荊芥 川椒去目及合口者炒出汗 地骨皮 松節 青鹽 白礬枯各一兩

右爲細末每用五分綿裹於患處咬之有涎吐之

川升麻散

治牙齒不生齒風宣露

川升麻 白附子炮各一兩

右爲細末研勻於八月內取生地黃四斤洗去土絞取汁二大盞即下藥攪令勻放磁器中每用以柳枝綿裹一頭點藥炙令熱烙齒根下縫中更塗膏少許即驗

牙齦腫爛出血方

雄黃一錢半 麝香一字 銅綠 輕粉 黃連 黃丹炒各一錢 血竭 白礬枯各五分

右爲細末研勻每用些少敷患處

黃連散

治齒齦間出血喫食不得

黃連 白龍骨 馬牙硝各一兩 白礬一分 龍腦一錢

右爲細末每用少許敷牙根下

生肌桃花散

治牙齦內血出或有瘡時出血

寒水石煅三錢 硃砂飛一錢 甘草炒一字 片腦半字

右爲細末研勻每用少許貼患處

鬱金散

治齒出血

鬱金 白芷 細辛各等分

右爲細末擦牙仍以竹葉竹皮濃煎入鹽少許含數亦可

牙宣出血方

明白礬煅二錢 乳香五分 麝香少許

右研細末輕手擦良久鹽湯灌漱

神效散

治牙縫血出

草烏 青鹽 皂莢各等分

右入瓦器內燒灰存性每用一字揩齒立效

腎虛胃熱牙疼方 入門

羊脛骨灰四兩 石膏五兩 黃連一錢 升麻

生地黃各五錢 梧桐淚三錢 龍腦草五分

右爲末擦牙以水漱去

玉池散 方 見

治風蟲牙痛動搖潰爛或變成骨槽風出膿血

地骨皮 白芷 細辛 防風 升麻 川芎

當歸 槐花 藁本 甘草各一錢

右剉作一貼入生薑三片黑豆百粒煎熱漱冷吐之

荊芥湯（直指下門）

治風熱齒痛

荊芥　薄荷　升麻　細辛各二錢

右爲末沸湯點含漱冷吐之

開笑散

治風冷齒痛

白芷　細辛　良薑　蓽茇　川椒　香附子

露蜂房各等分

右爲末每三錢水煎含漱或擦之

椒鹽散

治蟲牙痛

川椒　白鹽　露蜂房各一錢

右剉入葱白三莖煎水熱漱冷吐

蜂窩散（同上）

治風牙蟲牙痛不可忍

露蜂房　白羌黎　川椒　艾葉　葱根　荊芥

細辛　白芷各一錢

右剉水酢同煎熱漱冷吐

十全大補湯

治虛牙痛

人參　白朮土炒　白芍藥炒　白茯苓去皮

黃芪製　當歸　製甘草　熟地　川芎各一錢

桂心二分

右加薑二片膠棗三枚煎服

麻黃附子細辛湯（傷寒）

治少陰牙疼

麻黃去節　細辛去土各二兩　附子一枚

水煎服

葛花解醒湯

治嗜酒牙疼

葛花　砂仁　白豆蔻　陳皮　人參　茯苓各五分　神麯炒　白朮土炒　乾薑　青皮去瓤炒　澤瀉各二分

水煎服

天南星丸

治痰火上逆牙疼

天南星炮　硫黃研　石膏研　硝石研各等分

右爲末熬糊爲丸如梧桐子大每服二十丸空心日午臨臥三時服

犀角地黃湯

治陰虛火盛牙疼

生犀角銼　牡丹皮各二錢五分　白芍藥二錢　生地黃一兩五錢

水煎服

凉膈散

治胃火牙腫痛牙宣

黃芩酒炒　梔子炒　薄荷各一兩　連翹四兩　大黃酒浸　芒硝　甘草各二兩

右共爲末每服五錢

消風散

治風火牙疼

荊芥穗　製甘草　陳皮　厚朴薑汁炒　藿香　蟬蛻　人參　白殭蠶炒　茯苓　防風　芎藭　羌活

右水煎服

巴豆丸

一名一笑散治蟲牙疼痛蝕孔空虛

巴豆一枚　花椒五十粒細研

右爲極細末飯丸黍米大綿包塞蛀孔

漿蘸散

治蟲牙疼痛

漿蘸不拘多少

爲末塞孔中勿令嚥汁有涎吐之大有神效

韭子湯

治蟲牙

韭菜子一撮

右椀盛用火燒煙外用小竹管將下截劈爲四開以紙糊如喇叭樣引煙熏其蛀齒如下牙蛀者以韭子煎濃湯漱之蟲自出

北聚丹

治走馬牙疳

北聚去核一箇　信砒一釐

右以信入棗內燒存性研細每以些小敷患處

三仙散

治走馬牙疳一時腐爛即死

銅綠三分　麝香一分　婦人溺桶白垢火煅一錢

右爲極細末敷上不可太多

犀角升麻湯

治風熱牙痛

犀角鎊七錢　防風　羌活各五錢五分　白芷　黃芩　白附子各二錢五分　甘草一錢五分　升麻五錢

右每服七錢水煎

琥珀犀角膏

治牙火疼幷牙宣

真琥珀研　犀角屑生用各一錢　人參去蘆　酸棗仁去皮研　茯神去皮木　辰砂研各二錢　片腦研一字

右爲細末研勻煉蜜和爲膏以磁器收貯候其疾作每服一彈子大以麥門冬去心濃煎湯化下一日連進五服

加減甘露飲 本事方

治胃熱牙宣

熟地黃　生地黃　天門冬去心　黃芩　枳殼　枇杷葉去毛　茵陳　金釵石斛各一兩　甘草　犀角鎊各五錢

右爲末每服二錢水一盞煎至七分去查食後臨臥溫服小兒一服分作兩服更斟酌與之

麝犀散

治走馬牙疳危惡證候

麝香少許　膽礬一錢　銅綠五錢　白礬生五分

右爲細末敷牙患處

二陳湯

治痰火牙痛

陳皮　半夏製各三錢　茯苓一錢　製甘草一錢　水二鍾薑三片棗一枚煎食遠服

安腎丸

治腎經積冷下元虛憊牙疼

肉桂去麤皮不見火　川烏炮去皮臍各一兩　白朮　山藥　茯苓　肉蓯蓉酒浸製　巴戟　白蒺藜炒去刺　草薢　桃仁麩炒　石斛製　破故紙炒各三斤

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服三五十丸溫酒或鹽湯下空心食前服

黃連消毒散

治實熱齒痛

黃連炒　羌活各一分　黃芩　黃蘗　桔梗　藁本　防己各五分　當歸尾　連翹　防風　獨活　知母炒　生地各四分　黃芪　蘇木　陳皮　澤瀉各二分　人參　甘草各三分

右水煎服

大承氣湯

治胃實牙疼

大黃四兩酒浸　芒硝三合　厚朴半升薑湯炒　枳實五枚麩炒

右水煎服

調胃承氣湯

治前證

大黃酒浸　芒硝各一兩　甘草炙五錢

少少溫服

越鞠丸

治肝火鬱怒牙疼

香附酢炒　蒼术米泔浸　撫芎　梔子炒黑　神麯炒各等分

右爲末水丸小豆大每服百丸

補中益氣湯

治氣虛牙疼

人參　甘草炙各一錢　升麻五分　當歸身　白术炒　陳皮　柴胡各五分　黃芪蜜炙一錢半　薑三片棗二枚水煎溫服

歸脾湯

治血不歸經齒宣出血

遠志一錢　人參　茯苓　黃芪　白术　棗仁　龍眼肉各二錢　木香　製甘草　當歸各五分　薑棗水煎

六味丸

治水虛火盛牙疼

熟地酒蒸八兩　山萸肉　茯苓乳拌各四兩　山藥　澤瀉　牡丹皮各三兩

右蜜爲丸如桐子大空心鹽湯送下

八味丸

治命門虛火上炎牙疼

熟地黃砂仁酒拌九蒸九曬八兩　山萸肉酒潤　山藥各四兩　茯苓乳拌　丹皮　澤瀉各三兩　附子　肉桂各一兩

右蜜爲丸空心鹽湯下

茵陳散

治牙齒疼痛外面赤腫疼痛及去胃膈風熱

茵陳　連翹　半夏　荊芥穗　麻黃　升麻　黃芩　牡丹皮　射干　羌活　獨活　大黃炮

薄荷　殭蠶各二錢半　細莘五錢　牽牛一兩
右爲細末每服三錢水一盞先煎湯熟下藥末攪一攪急瀉出食後連滓熱服

羌活附子湯 東垣

治冬月大寒犯腦令人腦齒連痛名曰腦風爲害甚速非此莫救
麻黃去節　黑附子炮各三分　羌活　蒼朮各五分　黃芪一分　防風　甘草　升麻　白殭蠶炒去絲　黃蘗　白芷各三分　佛耳草有寒嗽者用之如無不用
右水煎服

獨活散

治風毒牙痛或牙齦腫痛
獨治　羌活　川芎　防風各五分　荊芥穗
薄荷　生地黃　細莘
右每服三五錢水煎漱嚥

麻黃散 東垣

治寒火牙疼
麻黃根不去節　羊脛骨燒灰　龍膽草酒洗
生地黃各二錢　羌活一錢五分　防風　藁本
升麻　黃連　草豆蔻各一錢　細莘根三分
當歸身　熟地黃各六分
右研極細末依前搽之

白芷散

治大寒犯腦牙齒疼痛
麻黃去節　草豆蔻各一錢五分　黃芪　桂枝各二錢五分　吳茱萸　白芷各四分　藁本三分
羌活八分　當歸身　熟地黃各五分　升麻一錢
右爲細末先用水漱洗以藥擦之

蠍梢散 東垣

治大寒犯腦牙疼
麻黃去節一錢半　歸身　柴胡　白芷各二分
桂枝　升麻　防風　藁本　黃芪蜜炙各三分
羌活五分　羊脛骨灰二錢半　草豆蔻皮一錢
蠍梢少許
右爲末用法如前

牢牙地黃散 東垣

治牙疼及腦寒痛
麻黃　黃連　羊脛骨灰各一錢　升麻一錢半
草豆蔻皮一錢二分　吳茱萸八分　益智仁
當歸身各四分　藁本二分　防己　生地黃
人參　熟地　羌活各三分　黃芪　白芷各五分
右爲末先漱口淨擦患處

獨活散

治風毒攻蛀齒齦腫痛
羌活　防風　川芎　獨活　石膏　荊芥穗
升麻　乾葛　生地黃　細莘　白芷　赤芍藥
黃芩　甘草
右加薄荷煎服

金沸草散

治風熱牙疼
前胡　旋覆花各一兩　赤芍炒　甘草各一錢
赤茯苓六錢半　半夏製五錢　荊芥穗一兩半
右爲粗末水煎服

當歸龍膽散

治寒熱牙疼
升麻　麻黃　生地　當歸梢　白芷　草豆蔻
羊脛骨灰　草龍膽　黃連各等分
右爲末擦之

益智木律散

治寒熱牙痛
草豆蔻二錢二分　益智仁　當歸身　熟地黃
羊脛骨灰各五分　木律二分　升麻一錢五分
黃連四分
右爲細末擦之如寒牙疼去木律

草豆蔻散 丹溪

治寒多熱少牙齒疼痛
草豆蔻一錢二分　黃連　升麻各二錢五分
細莘葉　防風各二分　當歸身六分　熟地黃
羊脛骨灰各五分
右爲細末痛處擦之

麝香散

治熱多寒少牙露齦肉脫血出齒動欲落大作疼痛妨食
升麻一錢　黃連　草豆蔻各一錢半　熟地黃
麻黃各一分　益智仁二分五釐　麝香少許
羊脛骨灰二錢　人參　生地黃　當歸　漢防己
酒製各三分
右爲細末每用少許擦牙疼處噙良久有涎吐去

立效散 東垣

治牙齒痛不可忍及頭腦項背痛徹惡寒飲大惡熱飲其脈上中下三部陽虛陰盛是五臟內盛六

腑陽道微脈微小小便滑數

防風一錢　炙甘草三分　草龍膽酒洗四分

升麻七分　細莘二分

水一盞煎至五分去滓以匙抄在口中渫痛處少時立止如多惡熱飲更加草龍膽一錢如更惡風作痛加草豆蔻黃連各五分勿加龍膽隨寒熱多少臨時加減

升麻散

治上爿牙疼

細莘倍用　黃蘗　知母　防己　黃連　升麻

白芷　蔓荊子　牛蒡子　薄荷

右爲末薄荷湯調服及搽牙齦或煎服亦可

白芷散

治下爿牙疼

白芷　防風　連翹　石膏煅　荊芥　赤芍藥

薄荷　升麻倍用

右爲細末薄荷湯調服及搽牙齦或煎服亦可

神功丸 東垣

治牙齦腫痛

蘭香葉 如無蘆香代之　當歸身　木香不見火各一錢

升麻二錢　生地黃酒洗焙　生甘草各三錢

黃連去鬚淨酒洗秤　縮砂仁各五錢

右同爲細末湯浸蒸餅爲丸如菉豆大每服一百丸或加至二百丸止白湯下食遠服兼治血痢及血崩血下不止血下褐色或紫色黑色及腸澼下血空心服米湯下其脈洪大而緩者及治痲木厥氣上衝逆氣上行妄聞妄見者

牢牙散 東垣

治牙齦肉綻有根牙疳腫痛動搖欲落牙齒不長牙黃口臭

升麻　羌活　羊脛骨灰各一兩　龍膽草酒洗一兩五錢

右爲細末以紗羅子羅骨灰作微塵末和勻臥時貼在牙齦上升麻古本作四分亦一兩也

還少丹

治虛火牙疼

肉蓯蓉　遠志　茴香　巴戟　山藥　枸杞

熟地黃　石菖蒲　山茱萸肉　牛膝　杜仲炒

楮實　五味子　白茯苓各等分

右爲末煉蜜同棗肉爲丸梧桐子大每服三五十丸溫酒或鹽湯送下日三服

黑錫丹

治陽虛牙疼甚者

黑鉛　硫黃各二兩

右將錫鎔化漸入硫黃候結成片傾地上出火毒研至無聲爲度

牢牙散

治牙無力不能嚼物

升麻三錢　生地黃　石膏各一錢　白茯苓

元參各五錢　羊脛骨燒灰　梧桐淚各三分

黃連一錢三分　麝香少許另研

右爲細末研勻每用少許臨臥擦牙復以溫水漱去

透關散

治風冷蛀齲

蜈蚣頭　乾蠍梢去毒　草烏尖如麥粒大者

川烏底如錢薄者各七枚　雄黃麥大七粒另研

胡椒七粒

右爲細末用紙撚子蘸酢點藥少許於火上炙乾塞兩耳間閉口少時即效

刷牙牢牙散

去風冷蛀齲宣露用之甚效

鹽少許研細　槐枝　柳枝各長四寸四十九枝

皂角不蛀者七莖

右同入磁瓶內黃泥固濟糠火燒一夜候冷取出研細用如常法

白牙散

治牙黃黑色

石膏　升麻各一錢　白芷七分　麝香少許

羊脛骨灰二錢

右爲細末先用溫水漱口擦之妙

麝香刷牙散

固齒變白

麝香一分　升麻一錢　黃連二錢　羊脛骨灰

白豆蔻　草豆蔻各三錢半　歸身　防己酒浸

人參各三分　生地黃　熟地黃各二分　沒石子

三枚　五倍子一箇

右爲細末用如前法

長春牢牙散

烏髭髮去牙風

川芎　砂仁　香附子　百藥煎　丁香　升麻

五倍子　茯苓　細辛　青鹽　金絲礬　甘松
白蒺藜　檀香　破故紙各五錢　石膏二兩
沒石子　訶子肉各九箇　麝礬二錢　麝香五分
右爲細末研勻早晚刷牙次以温水漱口吐出
沉香散
堅固牙齒榮養髭髮
沉香　訶子皮　青鹽　青黛研各二錢　白檀
母丁香各一錢五分　當歸身　香附子炒去毛
細辛去苗各五錢　荷葉灰　乳香另研各一錢
苦楝子破四片炒五錢　龍腦另研　麝香另研各
五分　酸石榴皮二兩五錢
右爲細末每用五分如常刷牙温水刷漱了早晚
二次
硃砂散
揩牙令白淨
硃砂細研　茅香　藿香　丁皮　香附　甘松
白芷　升麻　黃丹各一兩　猪牙皂角二兩
寒水石八兩　石膏四兩　白檀　零陵香各五錢
右爲細末研勻每用揩齒甚佳
妙應散
牢牙疏風理氣烏髭髮
人參　細辛去苗　白茯苓　香附子炒去毛
川芎　白蒺藜炒去角　砂仁各五錢　百藥煎
白芷　石膏煅　龍骨研各六錢　麝香另研少許
右爲細末早辰臨臥温水刷漱之
地黃丸
治齒動搖
白茯苓　人參　山萸肉各四兩　枸杞根三兩
生地黃五斤取汁　白蜜一斤　酥少許
右將前四味爲末以好酒一斗煎至三升去滓入
地黃汁白蜜酥同煎至可丸卽丸如小豆大每服
二十丸用温酒送下一日三服漸加至五服
甘露飲　和劑
治丈夫婦人小兒胃中客熱牙宣口氣齒齦腫爛
時出膿血目瞼垂重常欲合閉或卽微煩不欲飲
食及赤目腫痛不任涼藥口舌生瘡咽喉腫痛瘡
疹已發未發皆可服之
枇杷葉刷去毛　乾熟地黃　天門冬去心焙
枳殼去瓤麩炒　山茵陳去梗　麥門冬去心焙
石斛去蘆　炙甘草　黃芩　生地黃
右等分爲末每服二錢水一盞煎至七分去滓温
服食後臨臥小兒一服分兩服量歲數大小加減
與之
五靈膏
治牙齒動搖
五靈脂五錢　松脂　黃蠟各一兩　蟾酥半字
黃丹二錢五分
右於磁器中以慢火熬成膏用白熟絹上攤候冷
剪作片子每夜貼於齦上有津卽吐謹嗽不妨此
藥臨臥時用一次於惡硬物底一箇牙根兒下裹
外貼之亦不甚悶若是兒牙堅固自然得力不惡
硬物也
牙動搖疼痛方
五倍子　白茯苓　細辛各五錢　青鹽三錢
右爲細末早晚刷牙久有大效
宣牙膏
治牙齒動搖不牢疼痛不止
定粉　龍骨各二錢五分　麝香一字　黃蠟一兩
右爲細末研勻將黃蠟鎔化和藥放冷取出熨斗
燒熱鋪紙用藥攤之勻薄每用剪作紙條兒臨臥
於齒患處齒縫間封貼一宿至次日早晨取出藥
每夜用之如此半月消牙齒腫悶坐生齦肉治瘡
蝕去風邪牢牙齒大有神效
五倍子散
治牙齒搖動及外物所傷諸藥不效欲落者
川五倍子　乾地龍去土微炒各五錢
右爲細末先用生薑揩牙根後以藥末敷之五日
內不得咬硬物如齒初折落時熱貼齒槽中貼藥
齒上卽牢如故
抽薪飲　景岳全書下同
治牙疼火甚者
黃芩　石斛　木通　黃檗　梔子炒各二錢
枳殼　澤瀉各一錢五分　甘草五分
水一鍾半煎七分服食遠熱甚者冷服更佳
萊豆飲
治火熱盛極牙疼不止
萊豆不拘多少
用寬湯煮糜爛入鹽少許或蜜亦可待冰冷或厚
或稀或湯任意飲食之日或二三次不拘此物性
非苦寒不傷脾氣且善於解毒除煩退熱止渴大
利小水乃淺易中之最佳最捷者也若火盛口甘

不宜厚味但略煑半熟清湯冷飲之尤善除煩清火

右歸丸

治元陽不足牙齒動搖脫落者

大懷熟地八兩　山藥炒四兩　山茱萸微炒

當歸各三兩（便蓄勿用）　枸杞微炒　鹿角膠炒珠

菟絲子製　杜仲薑湯炒各四兩　肉桂二兩漸可

加至四兩　製附子自二兩漸可加至五六兩

右先將熟地蒸爛杵膏加蜜爲丸彈子大每嚼服

二三丸以滾白湯送下其效尤速

左歸丸

治眞陰虧損而牙齒浮腫動搖如欲落者

大懷熟地八兩　山藥炒　枸杞子　山茱萸肉

菟絲子製　鹿角膠敲碎炒珠　龜膠切碎炒珠各

四兩（無火者不必用）　川牛膝酒洗蒸熟三兩（精滑者不必用）

右丸法如前或桐子大每食前用滾湯或淡鹽湯

送下百餘丸

玉女煎

治水虧火盛熱渴牙疼腫痛

生石膏三五錢　熟地黃三五錢或一兩　知母

牛膝各一錢五分　麥冬二錢

水一鍾半煎七分溫服或冷服

冰白散

治走馬牙疳

人中白倍用之　冰片少許　銅綠用酢製者

杏仁二味等分

右爲細末敷患處

太清飲

治牙疼火之甚者

知母　石斛　木通各錢半　石膏生五七錢

水一鍾半煎七分溫服或冷服或加麥門冬

二辛煎

治陽明胃火壅盛牙根口舌腫疼不可當先用此

湯漱之漱後敷以三香散或仍服清胃等藥以治

其本

北細莘三錢　生石膏一兩

右水二椀煎一椀乘熱頻漱之

冰玉散

治牙疳牙痛口瘡齒衄喉痹

生石膏一兩　月石七錢　冰片三分　殭蠶一錢

右爲極細末小磁瓶盛貯敷之吹之

三香散

治牙根腫痛

丁香　川椒紅等分　冰片少許

右爲末敷痛處如無川椒以蓽茇代之

固齒將軍散

錦紋大黃炒微焦　杜仲炒去絲半黑各十兩

青鹽四兩

右爲末每日清晨擦漱火盛者嚥之亦可

虛牙腫方（瘡瘍全書下同）

藁本　獨活　荊芥　川烏　香附子　當歸

皂角　細莘　川椒

右水酢各半煎乘熱噙漱另服清胃湯玉液散之

類

牙宣方

冰片　五倍子各三分　麝香二分　大紅絨灰

珍珠　硼砂　雞內金煅　人中白煅　元明粉

靛花　牛黃　黃蘗蜜炙褐色末各一錢　黃連末

一錢五分　雄黃五分　鹿角灰二錢

右藥品穿腮腫毒治之亦妙俱另研細末和勻吹

入患處

清胃湯

治前證

當歸梢　黃連酒炒　生地黃酒洗各一錢　升麻

二錢　牡丹皮二錢五分

水一鍾半煎服

玉池散

治前證

藁本　升麻　防風　細莘　白芷　甘草節

當歸　槐花　川芎　獨活　黑豆

水二鍾薑三片煎食遠服

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百七十七卷目錄
醫部彙考一百五十七
齒門三
單方
鍼灸
導引
醫案

藝術典第一百七十七卷
醫部彙考一百五十七
齒病門三
單方

雄黃殺齒蟲取爲末和棗肉作丸塞蛀孔本草下同
齒痛落盡膽礬末和人乳汁擦病齒上及孔中日三痛止齒復生百日如故
齒根宣露動搖以鹽水擦之熱湯含漱百遍不過五日齒卽牢固
薄荷鹽末擦牙固齒良
青鹽入腎入骨能固齒擦噙並佳得效
一切牙疼青鹽二兩白鹽四兩用川椒四兩煎汁拌炒二鹽爲末擦牙上仍用溫水含漱吐之洗眼尤妙入門
口齒風䘌腫痛牙根浮爛出膿血升麻煎湯服之仍頻含漱本草
風牙痛及疳蝕白蒺藜爲末二錢入鹽一匙水煎帶熱含漱大能止痛固齒入門

牙齒痛動搖血出取骨碎補一兩剉炒令黑色爲末盥漱後揩齒根良久吐之綱目
牙齦宣露蚯蚓屎水和爲泥火燒令赤研如粉臘月猪脂和敷上日三次末瘥一方同入磁瓶內黃泥固濟煻火煨燒一夜候冷取出細研用如常法揩牙
風冷齒痛蛀牙痛細莘白芷煎湯含漱綱目
齲齒痛苦參煎湯日漱三升五六日愈仍灸列缺穴漢史
啄木鳥啄木愈齲淮南
牙齒裂痛死蠕蟮爲末敷之卽止千金翼
蟲牙痛天仙子燒烟以竹筒抵牙引烟熏之其蟲卽死末瘥綱目
牙疼巴豆一粒煨熟去殼大蒜一瓣剜其中安巴豆合定綿裹隨患處塞左右耳中本草
蟲牙痛巴豆肉一枚香油燈上燒過塡入孔中綱目
風疳䘌齒牙疼痛骨槽風梧桐淚爲末擦之治口齒爲最要之物寒牙痛勿用本草下同
堅齒除齒痛川椒酢煎含漱吐之
牙齒動搖用生薑地黃汁製皂角散土蒺藜散黑鉛砂貼搽
牙齒痛川椒露蜂房等分爲末每二錢入鹽一匙水煎含漱吐之名如神散局方
牙䘌作痛蝸牛殼三十枚燒研日日揩之良聖惠方
齒齦腫痛槨李根白皮切水煑濃汁含漱冷卽易吐出蟲卽愈本草下同
牙痛白楊樹皮酢煎含漱吐之
牙齒痛露蜂房煎湯含漱

蟲痛有孔蜂房細莘煎湯含漱
蛀牙有孔痛啄木鳥舌尖綿裹當痛處咬之立瘥
牙齒疳䘌啄木鳥燒爲末納孔中不過三度瘥
蟲牙痛取蟾酥少許入孔中涎出吐之勿嚥
牙齒痛蟾酥用銀硃摻和爲丸如蘿蔔子大搽上患處便不疼至三丸吐濃涎數口便愈綱目
牙疳臭氣蜘蛛搗爛入臙脂麝香敷之直指
腎虛齒搖動羊脛骨灰常擦之妙牙齒疎豁須用之入門
卒牙齒痛苦竹燒一頭其一頭汁出熱揩之集驗方
牙齦痒痛杏仁百枚鹽一錢水一升煑令沫出含漱吐之三度瘥本草下同
䘌齒杏仁燒研如泥綿裹納䘌齒孔中能殺蟲
齲齒取雄雀屎綿裹塞孔中日一易
生齒固齒鹿茸末服丸服皆佳
固齒取牛齒三十枚火煆爲末取二錢水煎熱漱冷吐且以末擦之搖動者皆堅牢
牙疼塞耳藥壁錢包胡椒末如左邊痛塞右耳右邊痛塞左耳手掩按之側臥少頃額上微汗卽愈醫鑑
風蟲牙痛針刺杏仁清油燈上煙熏乘熱搽病齒上連用七箇末絕不痛得效下同
風蟲牙痛馬夜眼以刀刮起如米大插孔中或咬在痛處瀝出涎勿嚥卽瘥斷根
風蟲牙痛霜殺老絲瓜燒存性擦痛處立止
齒齲鶴虱枝插患處
又方吳茱萸雄黃各等分樟腦乳香各少許爲末擦痛處

齲齒疼痛削白馬蹄塞之不過三度千金方

牙疼壁上掃土用鹽炒過爲末隨左右嗃鼻普濟

蟲牙疼痛花鹹塡孔內立止儒門事親

風牙疼痛紋銀一兩燒紅淬燒酒一盞熱漱飲之立止集驗方

牙痛惡熱黃連末摻之立止李樓奇方

食梅牙齪韶粉揩之相感志

蟲牙作痛馬牙一枚煅熱酢中淬七次待冷含之即止經驗方

積年齒匱用舊鐵鏵頭一枚炭火燒赤捻硫黃一分猪脂一分於上熬沸以綿包柳杖搵藥熱烙齒縫數次愈普濟方

牙齒疼痛輕粉一錢大蒜一瓣杵餅安膈骨前陷中先以銅錢隔了用蜆殼蓋定紮住一宿愈左疼安右右疼安左摘元方

風蟲牙疳膿血有蟲輕粉一錢黃連一兩爲末摻之普濟方

風熱牙痛用雄黃乾薑等分爲末嗃鼻左痛嗃右右痛嗃左

牙齒風痛秦椒煎酢含漱孟詵食療

齒疎陷物爐甘石煅寒水石等分爲末每用少許擦牙或刷牙久久自密集驗方

風牙腫痛多年石灰細莘等分研擦即止普濟方下同

蟲牙作痛礦灰沙糖和塞孔中

風蟲牙痛用百年陳石灰爲末四兩蜂蜜三兩合勻鹽泥固濟火煅一日研末擦牙神效名神仙失笑散

牙宜有蠶土硃荊芥同研揩之日三

齒痛及落研細石膽以人乳和膏擦之日三四次止痛復生齒百日後復故乃止每日以新汲水漱淨外科福要

牢牙止痛石燕三對火燒酢淬七次青鹽乳香各一兩細莘五錢爲末揩之荊芥湯漱口一方去乳香細莘加麝香

齒疎不堅石燕子五對火煅米酢淬七次爲末入青鹽麝香各少許研勻日用揩牙後以溫酒漱嚥之元山遺方

牙齦腫痛紅燈籠枝根煎湯漱吐集效方

風熱牙痛槐枝煎濃湯二椀入鹽半斤煑乾炒研日用揩牙以水洗目經驗方

齒匱齒動鹽半兩皂莢兩條同燒赤研夜夜揩齒一月後並瘥食療本草

蛀牙有孔疼痛不斷根者用雄黃乳香各一錢樟腦少許末之黃蠟爲丸隨孔大小納一丸以鐵打條一尺五寸長如筯小頭作一勾頭如鉗尾狀火燒紅筆管筒住只留勾頭勿令熱傷脣舌須先以筯挑開口脣然後以頭勾住盪藥上須鎔開覺熱爲度以水漱之神效

牙齦宣露用苦蔞根二兩砂鍋內甘草水煑輭取出令乾雞舌香十枚白芷五錢麝香一分右爲細末每用少許揩牙誤嚥無妨

牙齒疼痛皂莢濃漿同矾硝煎化淋於石上待成霜擦之普濟方

牙齒腫痛白礬一兩大露蜂房一兩微炙每用二錢水煎含漱去涎濟衆方

患齒碎壞欲盡者常以綿裹白礬石含嚼吐去汁肘後方

牙齒疼痛縮砂常嚼之良直指方

牙齒腫痛青蒿一握煎湯漱之濟急方

急疳蝕齒黃礬青礬麝香爲末敷之一方加白礬

齒腐齦爛不拘大人小兒用上好鹹土熱湯淋取汁石器熬乾刮下入麝香少許研摻之宣明方

病齒非腫非痛虛不能嚼食用局方嘉禾散薑煎食後一服次以地骨皮煎湯漱之候空心以羊腰子一對切片勿令斷以葱絲椒末青鹽蒺藜去刺末固元散二錢拌勻摻於腰子內以豆蔻葉或荷葉包裹煨令熟食之服經兩日頓覺快利飲食如故

齒匱腫痛桔梗薏苡仁等分爲末末類方

牙根腫痛桔梗爲末棗膏和丸皂子大綿裹咬之仍以荊芥湯漱之經驗方

牙疳臭爛桔梗茴香等分燒研敷之易簡方

風牙腫痛蒼朮鹽水浸過燒存性擦牙去風熱普濟方

牙齒虛痛仙靈脾爲麤末煎湯頻漱大效奇效良方

風牙腫痛用獨活煑酒熱漱之肘後方

又方獨活地黃各三兩爲末每服三錢水一盞煎和滓溫服臥時再服文潞公方

風蟲牙痛鹽化地龍水和麪納齒上又以皂莢去皮研末塗上蟲即出又同元胡索蓽茇末塞耳普濟方

牙齒疼痛取五靈脂酢煎汁含嚥即效得效

牙齒疼痛大川芎一箇入舊糟內藏一月取焙入細莘同研末擦牙本事方

風蟲牙痛用蛇牀子燭燼同研塗之

又方用蛇牀子煎湯乘熱漱數次立止

風熱牙痛香白芷一錢硃砂五分爲末蜜丸芡子大頓用擦牙此乃濠州一村婦以此醫人絕勝他藥或以白芷吳茱萸等分浸水漱涎（醫林集要）

牙齒疼痛青木香末入麝香少許揩牙鹽湯漱之（聖濟總錄下同）

風疳蟲牙蝕肉至盡甘松賦粉末各二錢蘆薈五錢猪腎一對切炙爲末夜漱口後貼之有涎吐出

腎虛齒痛甘松硫黃各等分爲末泡湯漱之神效（經驗方）

一切牙痛三柰子一錢麪包煨熟入麝香二字爲末隨左右嗑一字入鼻內口含溫水漱去神效名海上（普濟方）

風蟲牙痛山柰爲末鋪紙上捲作筒燈燒吹滅乘熱和藥吹入鼻內痛即止

又方用肥皂角一箇去皮入山柰甘松各三分花椒食鹽不拘多少填滿麪包煅紅取研日用擦牙漱去

風牙腫痛高良薑二寸全蠍焙一枚爲末摻之吐涎以鹽湯漱口此乃驗方（百一選方）

風寒牙痛紅豆蔻爲末隨左右以少許嗑鼻中并摻

牙取涎或加麝香

風蟲牙痛華茇末揩之煎蒼耳湯漱去涎

又方用華茇末木鼈子肉研膏化開嗑鼻

又方用華茇胡椒等分爲末化蠟丸麻子大每以一丸塞孔中

牙疼蒟醬細莘各五錢大皂角五挺去子每孔入青鹽燒存性同研末額摻吐涎（御藥院方下同）

牙疼日久腎虛也補骨脂二兩青鹽五錢炒研擦之

風蟲牙痛上連頭腦補骨脂炒五錢乳香二錢五分爲末擦牙或爲丸塞孔內日用有效（通用方）

諸般牙痛香附艾葉煎湯漱之仍以香附末擦之去涎（普濟方）

牢牙去風益氣烏髭治牙疼牙宣乃鐵甕先生方也

香附子炒存性三兩青鹽生薑各五錢炒爲末日擦（濟生方）

牙齒疼痛零陵香梗葉煎水含漱之（普濟方下同）

風牙疳牙用零陵香洗炙華茇炒等分爲細末摻之即愈

風熱牙痛荊芥根烏桕根葱根等分煎湯頻含漱之

牙痛連耳用連錢草即積雪草和水溝汚泥同搗爛隨左右塞耳內（摘元方）

風蟲牙痛化螺少許攤紙上鋪艾以筋卷成筒燒煙隨左右熏鼻吸煙令滿口呵氣即痛止腫消（普濟方）

風齲牙痛鼠黏子炒煎水含漱吐之（延年方）

熱毒牙痛熱毒風攻頭面齒齦腫痛不可忍牛蒡根一斤搗汁入鹽花一錢銀器中熬成膏每用塗齒齦下重者不過三度瘥（聖惠方）

牙齒痛腫蒼耳子五升水一斗煮取五升熱含之冷即吐去吐後復含不過二劑瘥莖葉亦可或入鹽少許（千金翼方）

牙齒疼痛枳殼浸酒含漱（聖惠方）

風蟲牙痛芭蕉自然汁一椀煎熱含漱（普濟方）

牙疳宣露膿血口氣生地黃一斤鹽二合爲末同搗和團以麪包煨令烟斷去麪入麝一分研勻日夜貼之（聖濟總錄）

蟲牙疼痛用新殺猪肚尖上涎絹包咬之數次蟲盡即愈唐氏用枳殼末拌之

又方用巴豆一粒研綿裹咬之

蟲牙作痛香油抹筋頭蕪麝香末綿裹炙熱咬之換二三次其蟲即死斷根甚妙（醫方摘要）

牙齒疼痛牛膝研末含漱亦可燒灰（千金方）

牙齒不生用雄鼠屎三七枚麝香五分同研細揩齒疳蟲蝕齒羣靡雄黃等分爲末臘月猪脂和成以綿裹槐枝蘸點（金匱要略）

風牙疼痛取樹猻頭草入鹽少許於掌心擦之即止（集元方）

齒齦腫痛紫藍燒灰敷之日五度（聖惠方下同）

齒齦口臭苦瓠子爲末蜜丸半棗大每旦漱口了含一丸仍塗齒齦上涎出吐去妙

風蟲牙痛壺盧子半升水五升煎三升含漱之莖葉亦可不過三度

一切牙痛木耳荊芥等分煎湯頻漱（普濟方）

胃火牙痛口含冰水一口以紙燃熏大黃末隨左右嗑鼻立止（儒門事親）

風熱積壅一切牙痛去口氣大有奇效好大黃瓶內燒存性爲末早晚揩牙漱去即紫金散都下一家專貨此藥兩宮常以數千瞻之其門如市也（千金寶藏方）

風蟲牙痛齦常出血漸至崩落口臭極苦大黃米泔浸軟生地黃各旋切一片含定貼上一夜即愈未愈再貼忌說話恐引入風（本事方）

牙齒搖痛大戟咬於痛處良（生生編）

牙齒疼痛猫兒眼睛草一搦研爛湯泡取汁含漱吐涎 易簡方

風牙蟲牙用莨菪子入瓶內以熱湯灌下口合瓶口氣熏之冷更作盡三合乃止有涎津吐去有效

又方用莨菪子數納孔中以蠟封之亦效

牙齒宣落風痛用莨菪子爲末綿裹咬之有汁勿嚥 必效方

風蟲牙痛用附子一兩燒灰枯礬一分爲末揩之

又方川烏頭川附子生研麪糊丸小豆大每綿包一丸咬之

又方用炮附子末納孔中乃止

牙痛難忍附子尖天雄尖全蝎各七箇生研爲末點之 末類方

風蟲牙痛草烏炒黑一兩細莘一錢爲末揩之吐去涎

又方草烏食鹽同炒黑摻之 海上方

風蟲牙痛南星末塞孔以霜梅盦住去涎 摘元方

刮骨取牙玉簪花乾者一錢白砒三分白硇七分硼砂二分威靈仙三分草烏頭一分五釐爲末以少許點疼處即自落也 選奇方

牙痛欲取金鳳花子研末入砒少許點疼牙根取之 摘元方

風蟲牙痛藹藹一錢草烏頭二錢五分爲末化蠟丸菉豆大綿包一丸咬之追涎 海上仙方

牙痛難忍諸藥不效芫花末擦之令熱痛定以溫水漱之 末類方

風蟲牙痛用莽草煎湯熱漱冷吐一方加山椒皮一方加獨活一方加椰李仁一方加芫花一方加川椒細莘各等分煎湯熱漱冷吐

又方用莽草五錢皂角三挺去皮子漢椒七粒爲末棗肉丸芥子大每以一丸塞孔中吐涎取效

牙疼點眼用覆盆子嫩葉搗汁點目眥三四次有蟲隨眵淚出成塊也無新葉乾者煎濃汁亦可

蟲牙疼痛使君子煎湯頻漱

風牙腫痛木鼈子仁磨酢塗之 普濟方

牙齒疼痛苦蔞皮露蜂房燒灰擦牙以烏桕根荊柴根葱根煎湯漱之

牙齦腫痛山豆根一片含於痛所 備急方

牙疼頰腫桃白皮柳白皮槐白皮等分煎酒熱漱冷則吐之 聖惠方

風蟲牙痛針刺桃仁燒煙出吹滅安痛齒上咬之不過五六次愈

風蟲牙痛用骨碎補乳香等分爲末糊丸塞孔中 聖濟總錄

牙疼嗃鼻鵝不食草綿裹懷乾爲末含水一口隨左右嗃之亦可挼塞

牙齒蟲痛鏡面草不拘多少以水缸下泥同搗成膏入香油二三點研勻貼於疼處腮上

又方用鏡面草不拘多少入麻油二點鹽半捻挼碎左疼塞右耳右疼塞左耳以薄泥餅貼耳門閉其氣仍側臥泥耳一二時去泥取草放水中看有蟲浮出久者黑次者褐新者白須於午前用之

牙齒腫痛酸漿一把洗淨川椒四十九粒去目同擣爛絹片裹定如筯切成豆粒大每以一塊塞痛處即止 節齋醫論

牙齦腫痛天花白礬等分水煎漱之立效 摘元方

大人小兒牙疳雙頭蓮一名催生草搗爛敷之

牙齒痛腫胡麻五升水一斗煑汁五升含漱吐之不過二劑神良 肘後方

齒䘌併蟲積年不瘥從少至老者用雀麥一名杜姥草俗名牛星草用苦瓠葉三十箇洗淨取草剪長二寸以瓠葉作五包包之廣一寸厚五分以三年酢漬之至日中以兩包火中炮令熱納口中熨齒外邊冷更易之取包置水中解視即有蟲長三分老者黃色少者白色多至二三十少亦有一二十此方甚妙 外臺祕要

牙宣露痛絲瓜藤一握川椒一撮燈心一大把水煎濃汁漱吐其痛立住如神也 德生堂方

牙齒風痛薏苡根四兩水煑含漱冷即易之 延年祕錄

牙齒不生不拘大人小兒年多者用黑豆三十粒牛糞火內燒令烟盡研入麝香少許先以針挑破血出以少許揩之不得見風忌酸鹹物 經驗方

牙齒疼痛黑豆煑酒頻頻漱之良

牙齒疼痛紅豆末擦牙吐涎及吹鼻中一方入銅青少許一方入花鹻少許

牙齒疼痛米酢煑枸杞白皮一升取半升含漱即瘥 肘後方

風蟲牙痛燒酒浸花椒頻頻漱之

牙齒蟲䘌韭菜連根洗擣同人家地板上泥和敷痛處腮上以紙蓋之一時取下有細蟲在泥上可除根

又方韭根十箇川椒二十粒香油少許以水桶上泥

同擣敷病牙頰上良久有蟲出數次即愈也

煙熏蟲牙取瓦片煅紅安韭子數粒清油數點待煙起以筒吸引至痛處良久以溫水漱吐有小蟲出爲效未盡再熏（救急方）

蟲牙疼痛獨頭蒜煨熱切熨痛處轉易之（外臺）

風熱牙痛蕓薹子白芥子角茴香等分爲末嗃鼻左嗃右右嗃左

牙齦腫爛出臭水者芥菜乾燒存性研末頻敷之即愈

牙齒疼痛蘿蔔子十四粒生研以人乳和之左疼點右鼻右疼點左鼻

牙齒疼痛老生薑瓦焙入枯礬末同擦之有人日夜呻吟用之即愈（普濟方）

牙痛不止川薑炮川椒等分爲末摻之（御藥院方）

牙齒疼頭痛胡荽子五升水五升煮取一升含漱（外臺秘要）

牙痛用稻上蒔蘿蕓薹子白芥子等分研末口中含水隨左右嗃鼻神效

走馬牙疳小兒食肥甘胃受虛熱口作鼻息次第齒黑名曰崩砂漸至齦爛名曰潰槽又或出血名曰宣露重則齒落名曰腐根用蘭香子末輕粉各一錢密陀僧酢淬研末五錢和勻每以少許敷齒及齦上立效內服甘露飲（幼幼口議）

齒鬣腫痛柏枝燒熱注孔中須臾蟲緣枝出

揩齒固牙松脂出眞定者佳稀布盛入沸湯煮取浮水面者投冷水中不出者不用研末入白茯苓末和勻日用揩齒漱口亦可嚥之固牙駐顏

風蟲牙痛刮松上脂滾水泡化一漱即止已累試驗（集簡方）

齲齒百孔松脂紝塞須臾蟲從脂出也

風熱牙痛用油松節如棗大一塊碎切胡椒七顆入燒酒二三盞乘熱入飛過白礬少許噙漱三五口立瘥

又方松節二兩槐白皮地骨皮各一兩漿水煎湯熱漱冷吐瘥乃止

風牙腫痛松葉一握鹽一合酒二升煎漱（聖惠方）

風熱牙痛浮腫發渴元臟氣虛小兒疳飲雞腸草旱蓮草細莘等分爲末每日擦三次名祛痛散（普濟方）

風齒腫痛馬齒莧一把嚼汁漬之即日腫消（本事方）

還少丹昔日越王曾遇異人得此方極能固齒牙壯筋骨生腎水凡年未及八十者服之鬚髮返黑齒落更生年少服之至老不衰得遇此者宿有仙緣當珍重之不可輕泄用蒲公英一斤一名耦耨草又名蒲公罌生平澤中三四月甚有之秋後亦有放花者連根帶葉取一斤洗淨勿令見天日陰乾入斗子斛鹽一兩香附子五錢二味爲細末入蒲公英內淹一宿分爲二十團用皮紙三四層裹紮定用六一泥即蚯蚓糞如法固濟入竈內焙乾乃以武火煅通紅爲度冷定取出去泥爲末早晚擦牙漱之吐嚥任便久久方效（瑞竹堂方）

蟲牙作痛魚腥草花椒菜子油等分擣勻入泥少許和作小丸如豆大隨牙左右塞耳內兩邊輪換不可一齊用恐閉耳氣塞至一日夾取看之有細蟲爲效（簡便方）

牙齒腫痛隔年糟茄燒灰頻頻乾擦立效（海上名方）

蟲牙疼痛黃茄種燒灰擦之效（摘元方）

風蛀牙痛茄蔕燒灰摻之或加細莘末等分日用之

牙痛秋茄花乾之旋燒研塗痛處立止（海上名方）

牙齒蟹痕茄根擣汁頻塗之

又方陳茄樹燒灰敷之先以露蜂房煎湯漱過

牙痛取牙茄科以馬尿浸三日曬炒爲末每用點牙即落眞妙（龍氏方）

風蟲牙痛門下桃橛燒取汁少少納孔中以蠟固之（聖惠方）

食榴損齒石榴黑皮炙黃研末棗肉和丸梧桐子大每日空腹服三丸白湯下日二服（普濟方）

風蟲牙痛用楊梅根皮厚者焙一兩川芎藭五錢麝香少許研末每用五分鼻內嗃之口中含水涎出痛止

又方用楊梅根皮韭菜根廚案上油泥等分擣勻貼於兩腮上半時辰其蟲自眼角出也屢用有效

風蟲牙痛橡斗五箇入鹽在內皂莢一條入鹽在內同煅過研末日擦三五次荊芥湯漱之良（經驗良方）

風牙疼痛用荔枝連殼燒存性研末擦牙即止仙方也

又方用大荔枝一箇剔開塡鹽滿殼煅研擦之即止

牙齒風疳膿血有蟲用橄欖燒研入麝香少許貼之（聖惠方）

風蟲牙痛用川椒細末水和白麪丸皂子大燒熱咬之數度愈

又方花椒四錢牙皂七七箇酢一椀煎漱之

風蟲牙痛海桐枝煎水漱之（聖惠方）

遍治風蟲客塞三般牙痛呻吟不止胡椒九粒菜豆十一粒布裹搥碎以綠綿包作一粒患處咬定涎出吐去立愈

又方用胡椒一錢半羊脂拌打四十九擦之追涎

牙齒疼痛菜萸煎酒含漱之（孟詵本草）

風熱牙痛瓜蒂七枚炒研入麝香少許和之綿裹咬定流涎（聖濟總錄）

牙齒疼痛青荷葉剪取錢帶七箇以濃米醋一盞煎半盡去查熬成膏時時抹之妙（經驗方）

風牙宣露發渴口氣雞舌香射干一兩麝香一分爲末日揩（聖濟總錄）

齲齒黑臭雞舌香煎汁含之（外臺秘要）

風蟲牙痛乳香川椒末各一錢爲末化蠟和作丸塞孔中

又方用乳香巴豆等分研和蠟丸塞之

又方乳香枯礬等分蠟丸塞之

牙齒疼痛梅花腦硃砂末各少許揩之立止

牙齒蟲痛用韶腦硃砂等分擦之神效

一方用樟腦黃丹肥皂去皮核等分研勻蜜丸塞孔中

濕熱牙痛喜吸風梧桐淚入麝香摻之

牙疼出血梧桐淚五錢研末夜夜貼之或入麝香少許（聖惠方）

牙齒黳黑乃腎虛也梧桐淚一兩丹砂五錢麝香一分爲末摻之

牙疳宣露膿血臭氣者梧桐淚一兩枸杞根一升每用五錢煎水熱漱

又方梧桐淚草薢等分研摻（聖惠方下同）

齒縫出血不止用地龍末枯礬各一錢麝香少許研勻擦之

風熱牙痛皂角一條去子入鹽滿殼仍加白礬少許黃泥固濟研日摻之（經驗方）

風蟲牙痛用皂莢末塗齒上有涎吐之

蔓荊子生地黃地骨皮青蒿各一兩槲李根皮二兩每服五錢水煎熱含冷吐

風蟲牙痛皂角子末綿裹彈子大兩顆酢煮熱更互熨之日三五度（聖惠方）

風虛牙腫老人腎虛或因妄藥擦牙致痛用獨子肥皂以青鹽實之燒存性研末摻之或入生樟腦十五文（痘疹生家寶方）

牙齒腫痛無患子大黃香附各一兩青鹽五錢泥固煅研日用擦牙

牙齒疼痛綿裹無食子末一錢咬之涎出吐去（聖濟總錄）

齒齦腫痛垂柳枝槐白皮桑白皮白楊皮等分煎水熱含冷吐

又方柳枝槐枝桑枝煎水熬膏入薑汁細辛苦藭末每用擦牙（聖惠方）

風蟲牙痛楊柳白皮卷如指大含咀以汁漬齒根數過即愈

又方柳枝一握剉入少鹽花漿水煎含甚驗

又方柳枝剉一升大豆一升合炒豆熟磁器盛之清酒三升漬三日頻含漱涎三日愈（古今錄驗）

蟲牙作痛以蕪荑仁安蛀孔中及縫中甚效

啄木散治蟲牙啄木舌一枚巴豆一枚研勻每以猪鞭一莖點少許於牙根上立瘥（聖惠方）

蟲蝕牙根温米醋漱出蟲自愈

齒齦風腫用柳蠹末半合赤小豆炒黑豆炒各一合柳枝一握地骨皮一兩每用三錢煎水熱漱（物類相感志）

牙齒疼痛蛀竹屑陳皮各一兩爲末烏梅肉同研如泥數之（救急方）

風蟲牙痛熊膽三錢片腦四分每以猪膽汁調少許搽之（衛生方）

牙齒疼痛土狗一個舊糟裹定濕紙包煨焦去糟研末數之立止（本事方）

牙疳危急猪肝一具煮熟蘸赤芍藥末任意食之後服平胃散二三貼即效

風蟲牙痛濕生蟲一枚綿裹咬之勿令人知（聖惠方）

蟲蝕牙根肉腐用棘針燒取瀝頻數之或煮汁含之亦可

牙齒疳蟨黑敗羊脂莫菪子等分入盆中燒煙張口熏之（千金方）

齒墨宣露出膿血用蚺蛇膽三錢枯白礬一錢杏仁四十七枚研勻以布揩齦擩令血盡日三摻之愈乃止（聖惠方）

擦牙固齒用火煅羊脛骨爲末入飛鹽二錢同研勻日用

齲蛀齒用不蛀皂角一挺去皮子却於每皂子處安巴豆一粒鹽泥固濟燒灰研細末用鵝耳子抄少許填入蛀孔內

濕熱牙疼用羊脛骨灰二錢白芷當歸青鹽牙皂各

一錢爲末擦之（東垣方）

風熱牙腫連及頭面用露蜂房燒存性研末以酒少許調噙漱之（十便方）

風蟲牙痛露蜂房煎醋熱漱之

又方用草蜂房一枚鹽實孔中燒過研末擦之鹽湯漱去或取一塊咬之祕方也（袖珍）

又方用露蜂房一箇乳香三塊煎水漱之（普濟）

蛀齒蘆薈白膠香塞蛀孔內

風蟲牙痛露蜂房全蠍同研擦之

又方用蜂房帶綿包咬之效（聖惠方）

走馬牙疳五倍子青黛枯礬黃蘗等分爲末先以鹽湯漱淨摻之立效（便覽）

牙齦疳臭五倍子炒焦一兩枯礬銅青各一錢爲末先以米泔漱淨摻之絕效方也（集簡方）

一切齒痛疳蝕齲齒瘡腫用蚵蛾一枚鞭其頭背以竹筆刮眉間即有汁出取少許點之即止也（類編）

風蟲牙痛不可忍用蠟酥一片水浸軟入麝香少許研勻以粟米大綿裹咬定吐涎愈一方用胡椒代麝香（聖惠方）

又方用蠟酥染絲綿上剪一分長紐入齒縫根裏忌熱物半日效乾者以熱湯化開

蛀齒鶴虱細莘白芷乾茄等分爲末揩痛處如有蛀孔用飯丸藥末塞孔中

牙齒宣露黃竹葉當歸尾研末煎湯入鹽含漱（永類方）

牙齒疼痛老鼠一箇去皮以硇砂擦上三日肉爛化盡取骨瓦焙爲末入蠟酥二分樟腦一錢每用少許點牙根上立止（孫氏集效方）

刮骨取牙用鯽魚一箇去腸入砒在內露於陰地待有霜刮下瓶收以針搜開牙根點少許咳嗽自落

又方用硇砂入鯽魚內煅過瓶收待有霜刮取如上法用之效

牙齒疼痛白殭蠶直者生薑同炒赤黃色去薑爲末以皂角水調擦之即止（普濟方）

風蟲牙痛白直殭蠶炒蠶退紙燒等分爲末擦之良久以鹽湯漱口效（直指方）

牙齦腫痛五倍子一兩瓦焙研末每以五分敷痛處片時吐去涎內服去風熱藥（衛生寶鑑）

風牙腫痛五倍子一錢黃丹花椒各五分爲末摻之即止

又方五倍子末冷水調塗頰外甚效

蛀齒蘆薈四分炒研細先用鹽揩淨齒敷少許

年久牙痛楓香脂爲末以香爐內灰和勻每旦揩擦（危氏得效方）

止牙痛用燕子屎丸梧桐子大於痛處咬之丸化即痛止（袖珍方）

風熱牙痛百藥煎泡湯噙漱（聖濟總錄）

牙齦疳蝕百藥煎五倍子青鹽煆各一錢五分銅綠一錢爲末日摻二三次神效（普濟方）

風蟲牙痛不可忍者梅師方用蕪荑香嚼嚥汁立瘥

又方用乳香豆許安孔中燒銅筋烙化立止（集驗方）

風蛀牙痛夜明砂炒吳茱萸湯泡炒等分爲末蠟酥和丸麻子大綿裹二丸含之吐涎（普濟方）

齒落不生牛屎中大豆十四粒小開豆頭以注齒根數度即生（千金方下同）

蠶齒莫菪子三合盛瓶內將青銅錢七文燒令赤投瓶中候莫菪子作聲有烟出以筆管引烟氣熏於痛齒蟲出痛即止無莫菪則用葱子韭子亦可出蟲

牙落重生雄鷄糞雌鷄糞各十四顆右焙乾研末入麝香少許先於齒不生處以針刺令血出摻藥老人二十日少者十日當出不拘傷損及自落者皆生

牙落重生烏鷄雄雌糞各蓄收之舊麻鞋底三物燒存性爲末入麝香摻之一月生齒名雄雌散李察院亮卿常用有效

打傷搖動牙齒蒺藜根燒灰貼動牙即牢名蒺藜散

齒落重生長齒生牙賴雄鼠之骨末牙齒若折年多不生取雄鼠脊骨作末揩折處齒立生如故（肯堂公）

牙齒疼痛斷腫搖動及打動牙齒用土蒺藜去角生用不拘多少爲粗末每服五錢以淡漿水半椀煎七八沸去滓入鹽末一捻帶熱時漱之別無所忌或用根燒灰貼動牙即牢名土蒺藜散

落牙方馬肉剉十兩信砒巴豆肉各五錢爲末右拌勻用石器盛候出蟲焙乾研末於牙痛處出些血點上隨落妙

取牙方龍肝乃墓中陳石灰也研細一箇收龍肝納臍內陰乾爲末用時宜些少點牙根上即落切忌墜入口中

牙齒動搖髭髮赤黃一服髭黑牙牢生薑半斤取汁地黃一斤洗淨研細取自然汁仍留滓以不蛀皂角十莖刮去黑皮弦將前藥汁藤皂角慢火炙乾再薰再炙用藥盡爲度并前藥滓同入磁瓶內用火煆存性爲末牙齒動搖用藥擦牙斷上加髭黃以鐵器盛

藥末三錢湯調過三日後將藥汁蘸擦髭髮臨臥時用次早巳黑色三夜三次用其黑如漆甚妙

齒根動欲脫落用生地黃綿裹著齒上嚼之又咬咀以汁漬齒根日四五夜著之并嚥汁十日大佳如齒挺出嚼之亦可

牙齒動搖用黑鉛半斤大鍋內熔成汁旋入桑條灰柳木槌研令沙以熟絹羅爲末每日早晨如常揩牙後用溫水漱在盂內以水洗眼能明目烏髭髮及治諸般眼疾

齦間努肉漸長此乃齒壅取生地黃汁一鍾皂角數片火上炙熱淬地黃汁內再炙又淬以汁盡爲度麪爲末敷之卽縮一婦人平日好食動風物尤嗜蟹一日齒間壅出肉漸大不能開口有一道人傳此方卽愈或矽硝爲末敷之亦消

牙齒逐日漸長開口難爲飲食蓋髓液溢所致只用白朮末和水服及煮水灌漱自愈

擦牙止痛方黃蠟蜂巢一箇以川椒填滿其竅更以白鹽一錢封口燒存性入白芷羊脛骨灰各一錢右同鹽爲末先以清茶漱口乃擦之有孔則以藥塞其孔立愈正傳

鍼灸

素問曰邪客於足陽明之經令人躁衄上齒寒刺足中指次指爪甲上與肉交者各一痏左刺右右刺左

齒齲刺手陽明不已刺其脈入齒中立已

繆傳引上齒齒唇寒痛視其手背脈血者去之足陽明中指爪甲上一痏手大指次指爪甲上各一痏立已左取右右取左

靈樞曰齒痛不惡清飲取足陽明上齒痛亦如之齒痛惡清飲取手陽明下齒痛亦如之

手陽明有入頏偏齒者名曰大迎下齒齲取之譩惡寒補之不惡寒瀉之足太陽有入頏偏齒者名曰角孫上齒齲取之在鼻與頏前方病之時其脈盛盛則瀉之虛則補之

骨寒熱者病無所安汗注不休齒未槁取其少陰於陰股之絡齒已槁死不治骨厥亦然

甲乙經曰頰腫口急頰車痛不可以嚼頰車主之

上齒齲腫目窗主之

上齒齲痛惡風寒正營主之

齒牙齲痛浮白及完骨主之

齒痛類鼻及二間主之

上齒齲兌端及耳門主之

齒間出血者有傷酸齒牀落痛口不可開引鼻中膿交主之

上齒齲痛惡寒者上關主之

失欠下齒齲下牙痛頷厭下關主之

齒牙不可嚼額厭角孫主之

下齒痛惡寒頰厭商陽主之

齒齲痛惡清飲三間主之

口齒痛溫溜主之

下齒齲則上齒痛掖門主之

齒痛四瀆主之

齒齲痛合谷主之一作少澤

上牙齲痛陽谷主之一作陽谿

千金方曰厲兌三間衝陽偏歷小海合谷內庭復留主齲齒

浮白主牙齒痛不能言

犬迎頷髎聽會曲池主齒痛惡寒

陽谷正營主上牙齒痛

陽谷掖門商陽二間四瀆主下牙齒痛

角孫頰車主牙齒不能嚼

下關大迎翳風完骨主牙齒齲痛

曲鬢衝陽主齒齲

得效方曰齒痛灸列缺七壯永不疼又灸肩髃七壯

又灸耳垂下牙盡骨上三壯

齒痛以線量手中指至掌後橫紋折爲四分去三分將一分於橫紋後譩中灸三壯隨左右

古今醫統曰列缺二穴在手太陰肺經與陽明經相連叉手取穴中手盡處看其浮脈了叉之間灸七壯痛立止永不再發

合谷二穴治齒齲痛灸之

內庭治下齒痛針灸皆可

陽谷治上牙

大淵治風牙

肩髃二穴灸七壯隨左右灸之

耳垂下盡骨上穴灸三壯痛即止如神

醫學正傳曰齒蝕生瘡灸承漿

醫學綱目曰牙痛牙糟取太谿灸之治上牙齒痛二間灸之治下牙齒痛委中鍼之又足內踝兩尖灸之治上牙痛龍元在列缺上青脈中灸之治下牙痛承漿風府合谷內庭治上牙痛

按資生方牙疼屈手大指本節後陷中灸三壯初灸覺牙疼再灸覺牙有聲三灸疼止永不復作恐是陽谿穴也左疼灸右右疼灸左

本草拾遺曰取年深既古且闊三角土瓦一塊令三姓童子候星初出時指第一星下火於瓦上灸之

景岳全書曰足內踝二尖治上牙痛灸之足三里治上齒痛灸四十九壯手三間治下齒痛灸七壯列缺灸七壯末不發合谷齒齲灸之內庭下牙痛鍼灸皆可陽谷治上牙痛在手外踝骨尖左灸右右灸左十一壯屢驗神效太淵治風牙肩髃七壯隨左右灸之耳垂下盡骨上穴灸三壯痛即止如神

一切牙疼以草量手中指至掌後橫紋止將草折作四分去三畱一於橫紋後量臂中隨痛左右灸三壯即愈

又經驗法於耳前鬢髮尖內有動脈處隨痛左右用小艾炷灸五七壯神效亦不必貼膏藥如再發再灸即可斷根

導引

千金方曰每晨起以一捻鹽納口中以溫水含揩齒及叩齒百遍爲之不絕不過五日齒即牢密

直指方曰百物養生莫先口齒不漱不洗損蠹之媒凡暑毒酒毒常伏於口齒之間莫若時時洗漱之爲愈也晨興洗畢盥漱一口吐出掌中就掌滌眼自覺光明終身行之可爲妙法

養性書曰齒宜朝暮叩以會神一云以集身神若卒遇凶惡當叩左齒三十六名曰打天鐘若辟邪穢叩右齒名曰搥天磬若存念至眞叩中央齒名曰鳴天鼓

延壽書曰凡飲食訖輒以濃茶漱口煩膩既去而脾胃自和凡肉之在齒得茶漱滌不覺脫去而不煩挑剔也蓋齒性便苦緣此漸堅牢而齒蠹且自去矣

食畢漱口數過齒不蛀養生家晨興叩齒永無齒疾

古今醫統曰向本命日櫛髮之始叩齒九通陰呪曰大帝散靈五老反眞泥丸元華保精長存左迴拘月右引日根六合清練百疾愈因嚥唾三過常數行之使齒不痛腦不痛髮不白

又法向東坐不息四通上下琢齒三十六治齒痛

又法凡人覺脊背皆崛强不間時節縮嚥髆仰面努髆并向上頭左右兩向按之左右二七一住待血行氣動定後始更用初緩後急不得先急後緩若無病人常欲行須旦起午時日沒三辰用之三七遍除寒熱疾脊腰頭項痛風痹口內生瘡牙齒風頭眩諸病盡除也

保生祕要曰齒痛導引法用意推而散之又推而吸之或左齒痛則將右手三骨下一肋搦之或想火燒之

又法將腎水洗依患處環轉用日曬火燒折散或不愈吹之出口一尺用手揉牙關即愈

景岳全書種齒法曰古有晨昏叩齒之說雖亦可行然而谷谷震動終非盡善之道余每因勞因酒亦嘗覺齒有浮突之意則但輕輕咬實務令漸咬漸齊或日行一二次或二三次而根自固矣又凡欲小解時必先咬定牙根而後解則腎氣亦賴以攝非但固精亦能堅齒故余年逾古稀而齒無一損亦大得此二方之力

金丹全書云今人漱齒每以早晨是倒置也凡一日飲食之毒積於齒縫當於夜晚刷洗則垢汚盡去齒自不壞故云晨漱不如夜漱此善於養齒者今觀智者每於飯後必漱則齒至老堅白不壞斯存養之功可見矣

醫案

史記倉公傳曰齊中大夫病齲齒臣意灸其左太陽明脈即爲苦參湯日漱三升出入五六日病已得之風及臥開口食而不漱

儒門事親曰澤州李繼之忽病牙痛皺眉不語欒景先見之曰何不樂也曰牙痛欒曰曾記張戴人云陽明經熱有餘也宜大下之乃付舟車丸七十粒服畢遇數知交留飲强飲熱酒數杯藥爲熱酒所發盡吐之吐畢而痛止李大笑曰戴人神仙也不三五日又

痛再服前藥百餘粒大下數行乃愈

東垣十書曰劉經歷之內子年三十餘病齒痛不可忍須騎馬外行口吸涼風則痛止至家則痛復作家人以爲崇祈禱於巫師而不能愈遂求治於先師問其故曰此病乃濕熱而成也足陽明胃於上齒手陽明胃於下齒陽明多血多氣又加以膏粱之味助其濕熱故爲此痛因立一方不須騎馬當令風寒之氣常生於齒間以黃連梧桐淚之苦寒薪薄荷葉荊芥穗之辛凉四味相合而作風寒之氣治其濕熱更以升麻之苦平引入陽明經爲使牙齒骨之餘以羊脛骨灰補之爲佐麝香少許入內爲引用爲細末擦之神妙又以調胃承氣去芒硝加黃連以治其本服之下三五行其病良愈不復作

口齒類要曰宗伯毛三江胃經虛熱齒牙作痛用補中益氣加熟地丹皮茯苓芍藥尋愈

廷尉張中梁齒動或用清胃散肢體倦怠飲食少思牙齒作痛余曰此脾腎虧損用安腎丸補中益氣湯兼服外用羌活散而愈或牙根潰爛如喜寒惡熱者乃胃血傷也用清胃散若惡寒喜熱者胃氣傷也用補中益氣湯

楊考功齒動作渴屬胃虛弱陰火熾甚用補中益氣加酒炒黑黃蘗四劑又服加減八味丸諸證頓愈又用補中益氣湯而全愈

王侍御齒搖齦露喜冷飲食此胃經濕熱先用承氣湯以退火又用清胃散以調理而齒固繼用六味丸以補腎水羌活湯以祛外邪而尋愈

王吏部患齒痛或用祛風等劑更加寒熱體倦懶食欲嘔彼以爲火盛余曰病因元氣不足前藥復傷遂用補中益氣加茯苓半夏元氣復而諸證愈

郭職方善飲齒痛腮頰煩腫此胃經濕熱用清胃散加乾葛荊防而愈

鄭吏部仲冬牙痛連腦此腎經風寒所犯用羌活附子湯一服即愈此證不問冬夏腎虛者多患之急用此藥可療緩則不救

朱工部午後有熱遇勞遺精其齒即痛此脾腎虛熱先用補中益氣送六味丸更以十全大補湯而愈

竇吏部齒根腫痛連頸頰此胃經風熱用犀角升麻湯即愈

表兄顧僉憲牙痛右寸後半指脈洪而有力余曰此大腸積熱當用寒凉之劑自泥年高服補陰之藥呻吟徹夜余與同舟赴京煎凉膈散加荊防石膏與服一鍾即愈

大尹余時正素善飲齒常浮痛腹痛作瀉此酒積傷脾食後用清胃散食前用解酲湯而愈

滕部鍾復齋每勞心則齒縫脹而不能咀嚼此元氣虛弱先用補中益氣湯而痊更用十全大補湯雖勞不作

儒者柴濟美善飲牙蛀不生或時作痛用桃仁承氣湯二劑又以清胃散加山梔葛根外搽升麻散其牙復出

一男子脯熱內熱牙痛齦潰常取小蟲此足三陰虛火足陽明經濕熱先用桃仁承氣湯二劑又用六味地黃丸而愈

一男子患齒痛飲食難化大便不實此脾腎不足用還少丹而愈

一男子每足發熱牙即浮痛此足三陰虛火用加減八味丸而不復作

一男子齒浮作痛耳面黧色口乾作渴日脯則劇此脾虛弱也用補中益氣湯加減八味丸而愈

一婦人因怒齒痛寒熱作嘔用清胃等藥益甚此肝火傷胃寒藥復傷用六君子加芍藥柴胡山梔而愈

一婦人胃中嘈雜甚則熱痛後患齒痛此胃火生痰也用二陳加芩連下越鞠丸而瘳

一婦人發熱齒痛日脯益甚月水不調此脾經血虛所致用逍遙散加升麻尋愈後因怒復痛仍以前藥加川芎而痊

一婦人因怒牙痛寒熱用小柴胡加芎藭芩术山梔而疼痛止用加味逍遙散而寒熱退

史羊生內子每產後齒根皆動必踰日乃止後復懷孕臨月時予偶至言及此證留十全大補湯二劑令產後煎服齒不復動矣果如其言

郁芝巖先生齒根浮腫痛不可忍求治於予曰齒痛齦浮而不動屬於坤土乃足陽明脈所貫絡也因胃中有濕熱故爾用清胃湯加山梔元參進一服應手而痊

證治準繩曰一人患骨槽風因用藥點破入風虛火上升嘔吐血痰譫語臭穢不食而死

一人患上齒根連外腫痛後齒根潰膿醫者皆以牙癰治之久而不斂膿汁不絕詢其故乃曾生廣瘡者即以結毒治之而愈

景岳全書曰宋汪丞相之寵好食厚味一日熱大作

齒間蝕出有肉漸大脹滿口不能閉水漿不入一醫用生地黃汁一椀牙皂角數挺火上炙熱蘸汁令盡爲末敷蝕肉上隨即消縮不日而愈

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百七十八卷目錄

醫部彙考一百五十八

舌門一

黃帝素問 陰陽應象大論 診要經終論 風論 脈要精微論 刺熱篇 五常政大論 至眞要大論
靈樞經 經脈篇 經別篇 經筋篇 經水篇 五閱五使篇 脈度篇 榮衛生會篇 衛氣篇 憂恚無言篇 口問篇 腸胃篇
張機金匱要略 胎黃 邪入臟則難言 乾燥
傷寒論 乾燥 白胎
孫思邈千金方 舌論
竇漢卿瘡瘍全書 木舌 重舌 重齶 生瘡 蓮花舌
成無己明理論 胎色
張從政儒門事親 舌說
李杲十書 生刺
朱震亨心法 腫脈 生瘡
危亦林得效方 舌之病能 重舌 舌爛
戴思恭證治要訣 證治
李梴醫學入門 舌屬五臟 短強 腫長 破裂 胎色
樓英醫學綱目 舌屬心脾 重舌 木舌
薛己口齒類要 論證 驗證舌法

藝術典第一百七十八卷

醫部彙考一百五十八

舌門一

黃帝素問

陰陽應象大論

南方生熱熱生火火生苦苦生心心主舌在竅爲舌

註 心氣通於舌心和則能知五味故舌乃心之主又心之官也故心竅在舌

診要經終論

厥陰終者中熱嗌乾善溺心煩甚則舌卷卵上縮而終矣

註 肝合筋筋聚陰器絡舌本故舌卷卵縮而終也

風論

以夏丙丁傷於風者爲心風心風之狀多汗惡風焦絕善怒嚇赤色病甚則言不可快診在口其色赤

註 心爲火臟風淫則火盛故脣口焦津液絕風化木木火交熾故善爲怒嚇心主舌病甚則舌本強而言不快心和則舌能知五味故診驗在口

脈要精微論

心脈搏堅而長當病舌卷不能言

註 搏堅而長者搏擊應手有力而長此爲太過之脈心火太過故當病舌卷心主言故不能言也

刺熱篇

肺熱病者先淅然厥起毫毛惡風寒舌上黃身熱

註 皮毛者肺之合臟氣熱於內故淅然寒慄於外而惡風寒蓋熱甚則寒也肺上連於喉嗌故舌黃

五常政大論

升明之紀其主舌

註 升明火政也火屬心心開竅於舌

至眞要大論

厥陰司天風淫所勝民病舌本強司天之氣風淫所勝平以辛涼佐以苦甘以甘緩之以酸瀉之

註 厥陰司天巳亥歲也經脈篇舌本強等證皆脾經病風木淫勝病本於脾平者平其上而使下也

厥陰司天主勝則胷脅痛舌難以言

註 主勝則胷脅痛者肝經之脈布胷脅也厥陰少陽主筋二經之筋病則舌卷故難以言

靈樞經

經脈篇

脾足太陰之脈上鬲挾咽連舌本散舌下是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重

註 舌本舌根也舌本強食則嘔等證皆脾經之所爲病也善噫者脾氣上走心爲噫也得後與氣則快然如衰者厥逆從上下散也身體皆重太陰之氣逆也

腎足少陰之脈循喉嚨挾舌本是主腎所生病者口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心心痛

註 夫腎主藏精如主腎所生之病則精液不能上滋而爲口熱舌乾嗌痛煩心諸證蓋水不上濟則火盛於上矣

足厥陰氣絕則筋絕厥陰者肝脈也肝者筋之合也筋者聚於陰器而脈絡於舌本也故脈弗榮則筋急筋急則引舌與卵故脣青舌卷卵縮則筋先死庚篤

辛死金勝木也

註足厥陰之氣主筋故氣絕則筋絕矣厥陰者肝脈也肝者筋之合謂厥陰之氣合於肝脈肝藏之氣合於筋也聚於陰器者筋氣之會於宗筋也筋聚於陰器而絡於舌本故脈不榮於筋則筋急而舌卷卵縮矣厥陰氣絕則筋先死庚篤辛死金勝木而肝藏之木氣絕也

手少陰之別名曰通里去腕一寸半別而上行循經入於心中繫舌本屬目采其實則支鬲虛則不能言

註手少陰之別絡與經相干名曰通里之間去腕一寸半別經而上行循經入於心中繫舌本屬目采其氣實鬲間若有所支而不暢虛則不能言蓋心主言而經別絡舌本也

經別篇

足少陰之正直者繫舌本

足太陰之正貫舌中

經筋篇

足太陽之筋其支者別入結於舌本

手少陽之筋其支者當曲頰入繫舌本其病舌卷

經水篇

足太陰之正上至咽合於陽明與別俱行上結於咽貫舌中

五閱五使篇

舌者心之官也

註心開竅於舌故舌爲心之官

脈度篇

脾氣通於口脾和則口能知五穀矣心氣通於舌心和則舌能知五味矣當曲頰入繫舌本其病舌卷

註口能辨五穀舌能辨五味心脾和則口與舌俱和而五穀五味入口即辨矣

榮衛生會篇

上焦出於胃上口並咽以上貫鬲而布胸中走腋循太陰之分而行還至陽明上至舌下足陽明

註上焦出於胃上口者上焦所歸之部署也並咽以上貫鬲而布胸中出走腋下循太陰之雲門中府之分而行還至陽明之天鼎扶突而上至舌復下於足陽明之分也

衛氣篇

足少陰之標在背腧與舌下兩脈也

足太陰之標在背腧與舌本也

憂恚無言篇

舌者音聲之機也

足之少陰上繫於舌絡於橫骨終於會厭

口問篇

黃帝曰人之自齧舌者何氣使然岐伯曰此厥逆走上脈氣輩至也少陰氣至則齧舌少陽氣至則嚙頰陽明氣至則齧脣矣視主病者則補之

註齒者腎氣之所生也少陰之脈挾舌本少陽之脈循於頰如腎之藏生氣厥逆走上與中焦所生之脈氣相輩而至則齧舌

腸胃篇

舌重十兩長七寸廣二寸半

漢張機金匱要略

胎黃

病者腹滿按之不痛爲虛痛者爲實可下之舌黃未下者下之黃自去

腹滿舌萎黃躁不得睡屬黃家

邪入臟則難言

寸口脈浮而緊緊則爲寒浮則爲虛寒虛相搏邪在皮膚浮者血虛絡脈空虛賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣卻急正氣引邪喎僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經即重不勝邪入於腑即不識人邪入於臟舌即難言口吐涎

乾燥

肝中寒者兩臂不舉舌本燥喜太息胃中痛不得轉側食則吐而汗出也

腹滿口舌乾燥此腸間有水氣己椒藶黃圓主之

消渴病渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之

病人胃滿唇痿舌青口燥但欲漱水不欲嚥無寒熱脈微大來遲腹不滿其人言我滿爲有瘀血

傷寒論

乾燥

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡時小有潮熱從心上至少腹鞕滿而痛不可近者大陷胸湯主之

傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之

白胎

陽明病脅下鞕滿不大便而嘔舌上白胎者可與小承氣湯上焦得通津液得下胃氣因和身濈然而汗

出解也
病如結胸狀飲食如故時時下利寸脈浮關脈小細沉緊名曰臟結舌上白胎滑者難治
臟結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也
唐孫思邈千金方
舌論
凡舌者心主小腸之候也舌重十兩長七寸廣二寸半善用機衡能調五味也凡有所啖若多食鹹則舌脈凝而變色多食苦則舌皮槁而外毛焦枯多食辛則舌筋急而爪枯乾多食酸則舌肉肥而唇揭多食甘則舌根痛而外髮落又曰心欲苦肺欲辛肝欲酸脾欲甘腎欲鹹此五味內合五臟之氣也若臟熱則舌生瘡引唇揭赤若臟寒則舌本縮口噤唇青寒宜補之熱宜瀉之不寒不熱依臟腑調之舌縮口噤唇青升麻煎主之
宋寶漢卿痘瘍全書
木舌
其木舌硬如穿山甲外證憎寒壯熱語言蹇澀此心經受熱也心者舌之本因心而病治法以小刀點紫黑處煎藥內多加山梔湯火之要品也
重舌
其舌下生一小舌其色鮮紅其外證頷下浮腫有硬核此心經受熱毒氣出於舌下先用紫雪摻上流出熱涎急服甘桔湯加薑燈心煎服
重齦
舌上生一瘡其狀若楊梅外證無寒無熱但作事煩心先以甘桔湯多加山梔後服黃連解毒湯再吹冰片散不宜用刀
生瘡
舌生瘡如黃粟外證怯寒口張先用蚌水或田螺水或苦茶緻淨然後搽藥次服鼠黏子解毒湯加山梔黃連口臭冰片吹藥內加人中白枯礬銅青黃連末
蓮花舌
舌下生三小舌其類如蓮花狀但舌乃心之苗心火上炎或思慮太過或火氣所傷或酒後當風取涼以致風痰相搏而成此證急用清涼解毒湯加減服之再吹冰片散如腫不散次用小刀鍼出紫血爲妙
金成無己明理論
胎色
舌者心之官法應南方火本紅而澤傷寒三四日已後舌上有膜白滑如胎甚者或燥或澀或黃或黑是數者熱氣淺深之謂也邪氣在表者舌上則無胎及邪氣傳裏津液結搏則舌上生胎也寒邪初傳未全成熱或在半表或在半裏或邪氣客於胃中者皆舌上胎白而滑也經曰舌上如胎者以丹田有熱胃中有寒邪初傳入裏者也陽明病脅下鞕滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯是邪氣在半表半裏者也陽明病若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之是邪客於胃中者也臟結宜若可下舌上胎滑者則云不可攻也是邪未全成熱猶帶表寒故也及其邪傳爲熱則舌之胎不滑而澀也經曰傷寒七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之是熱耗津液而滑者已乾也若熱聚於胃則舌爲之黃是熱已深也金匱要略曰舌黃未下者下之黃自去若舌上色黑者又爲熱之極也黃帝鍼經曰熱病口乾舌黑者死以心爲君主之官開竅於舌黑爲腎色見於心部心者火腎者水邪熱已極鬼賊相刑故知必死觀其口舌亦可見其逆順矣
元張從政儒門事親
舌說
熱結於舌下復生一小舌子名曰子舌脹熱結於舌中舌爲之腫名曰木舌脹木者強而不柔和也微者可以鍼衄之而大者以辛散之昔嘗治一婦人木舌脹其舌滿口諸藥不愈余以鈹鍼小而銳者砭之五七度腫減三日方平計所出血幾至盈斗
李杲十書
生刺
舌燥澀如楊梅刺者生薑切厚片蘸蜜於舌上揩之其刺立消神效
朱震亨心法
腫脹
木舌者舌腫硬不和軟也百草霜芒硝滑石爲末酒調敷之
諸般舌腫脹取龍腦破毒散半錢以指蘸藥擦舌上下嚥津下
生瘡
舌上生瘡皆上焦熱壅所致宜如聖湯或甘桔湯加黃芩一錢仍用柳花散摻之或用白荷花瓣貼之
危亦林得效方

口舌主五味

心氣通於舌能知五味脾氣通於口能知五穀舌爲心之官主嘗五味以布五臟焉心之本脈繫於舌根脾之絡脈繫於舌旁肝脈循陰器絡於舌本腎之津液出於舌端分布五臟心實主之三經爲四氣所中則舌卷不能言七情氣鬱則舌腫不能語至如心熱則舌破生瘡肝壅則出血如湧脾閉則白胎如雪此舌之爲病也

失欠脫頷

輔車開不可合南星爲末薑汁調敷以帛縛合二宿而愈去風也

因欠輔車蹉不得張口一人以兩手牽其頤以漸推之則復入矣當疾出其指恐咬傷

舌爛

舌本爛熱不止者逆

明戴思恭證治要訣

證治

曾有舌上病瘡久餌成穴累服凉劑不效後來有教服黑錫丹遂得漸愈此亦下虛故上盛也

外有舌暴腫服名曰重舌一味鳥蒲黃末摻之

又有舌無故常自痹者不可作風治由心血不足理中湯加熱附子半錢當歸錢半

李梴醫學入門

舌屬五臟

心之本脈繫於舌根脾之絡脈繫於舌兩旁肝脈循陰器絡於舌本腎之津液出於舌端分布五臟心實主之故曰諸經皆會於口

短強

卒中風則舌短而強舌卷不言者死大概風用小續命湯寒用理中湯熱用甘桔湯加防風枳殼黃芩風寒濕舌強者用白礬肉桂末等分安舌下或正舌藥痰熱舌強壅腫或短甘露飲

腫長

內因七情氣鬱腫滿不得息者金沸草散久不愈者黑參丸外用古霜鹽散因怒者銹鐵粉塗之

舌腫滿口氣不得吐名木舌用陳茶陳白梅入巴豆七枚同搗膏薄荷水調刷口中得下咽片時即下一二行以粥補住如生瘡連頤頰腫者元參升麻湯

舌腫滿口不能聲飲食不通者名重舌用蒲黃頻刷舌上自退如不能嚥藥即以黃連濃煎時時呷之以瀉心火

舌腫如猪胞者以鍼刺舌下兩旁大脈血出即消切勿刺中脈令血不止誤刺以火燒銅筯烙之血再不止者死或酢調鍋煤敷舌上下脫去再敷須臾自消不食者亦死

舌腫舌下有蟲如蠐螬臥蠶頭小白有尾可燒鐵烙烙舌頭上即消

舌長過寸者單冰片末敷之

破裂

心熱生瘡破裂單黃連湯脾熱兼舌胎乾澀如雪薄荷蜜冰藥丸心脾熱升麻葛根湯加薄荷黃芩桔梗

胎色

舌爲心苗腎主津液無病則舌紅而潤偶見紅心點者將欲發黃如丹田邪熱則心苗枯槁生胎如白胎然是以邪在表則無胎邪初傳裏則胎白而滑胃寒熱懊憹者梔豉湯吐之陽明病脅硬不大便而嘔舌胎白者亦不可攻小柴胡和之如惡寒欲嘔痰者小柴胡加乾薑白胎滑而下利者爲臟結不治

熱漸入深則胎白而澀熱深入胃則胎黃或肥光或尖白根黃者麥多寒少也俱白虎加人參湯主之

手足腋下汗出譫語便閉胎紫帶黑或生芒刺蟲碎燥裂者承氣湯下之但舌黑亦有數種有四邊紅而中灰黑成路者失下也有黑圈者過經未解也有黑尖者虛煩也有舌見黃而中有黑至尖或亂黑點者熱毒深也有弦紅心黑或白胎中見黑點者表未解也有根黑尖黃脈滑者可下脈浮者可汗有尖黑而有亂紋脈滑實者急下之脈數無力者必發渴而死

凡舌黑不論多少俱係危證惟冷而滑如淡黑然者乃無根虛火可以化痰降火藥治之

陰證胎白腹痛自利者理中湯中濕濕痹舌上如胎非眞胎也丹田有熱胃中有寒五苓散

外感風寒傳經者則舌胎自白而黃而黑者死

樓英醫學綱目

舌屬心脾

舌屬心脾經云心主舌又云在臟爲心在竅爲舌又云心氣通於舌心和則舌能知五味是舌屬心也又云中央黃色入通於脾開竅於口藏精於脾故病在舌本屬脾也

重舌

舌根下生形如舌而小者曰重舌其著頰裏及上齶者曰重齦其著齒齦上者曰重齦皆刺之去血可也

木舌

木舌者舌腫粗大漸漸腫硬滿口不急治卽塞殺人也其法用紫雪二錢竹瀝和勻擲抹口中自消

薛己口齒類要

論證

經言舌乃心之苗此以竅言也以部分言之五臟有所屬以證言之五臟皆有所主如口舌腫痛或狀如無皮或發熱作渴爲中氣虛熱若眼如烟觸體倦少食或午後益甚爲陰血虛熱若咽痛舌瘡口乾足熱日晡益甚爲腎經虛火若四肢逆冷惡寒飲食或痰甚眼赤爲命門火衰若發熱作渴飲冷便閉爲脾胃實火若發熱惡寒口乾口渴食少體倦爲脾經虛熱若舌本作強頸項腫痛爲脾經濕熱若痰盛作渴口舌腫痛爲上焦有熱若思慮過度口舌生瘡咽喉不利爲脾經血傷火動若恚怒過度寒熱口苦而舌腫痛爲肝經血傷火動病因多端當因時制宜凡舌腫脹甚宜先刺舌尖或舌上或邊旁出血泄毒以救其急惟舌下廉泉穴此屬腎經雖宜出血亦當禁針

驗證舌法



舌見白胎滑者邪初入裏也丹田有熱胸中有寒乃少陽半表半裏之證也宜用小柴胡湯梔子豉湯治之



舌見紅色熱蓄于內也不問何經宜用透頂清神散治之

舌見純紅內有黑形如小舌者乃邪熱結於裏也君火熾盛反兼水化宜凉膈散大柴胡湯下之



舌見紅色而有小黑色者熱毒乘虛入胃蓄熱則發斑矣宜用元參升麻葛根湯化斑湯解之



舌見淡紅中有大紅星者乃少陰君火熱之盛也所不盛者假火勢以侮脾土將欲發黃之候也宜用茵陳五苓散治之

舌見紅色尖見青黑者水虛火實腎熱所致宜用竹葉石膏湯治之

舌見淡紅色而中有一紅暈沿皆純黑乃餘毒遺於心包絡之間與邪火鬱結二火亢極故有是證也以承氣湯下之

人字裂舌



舌見紅色更有裂紋如人字形者乃君火燔灼熱毒炎上故發裂也宜用凉膈散

蟲碎舌



舌見紅色更有紅點如蟲蝕之狀者乃熱毒熾甚火在上水在下不能相濟故也宜用小承氣湯下之

裏黑舌



舌見紅色內有乾硬黑色形如小長舌有刺者此熱毒熾甚堅結大腸金受火制不能平木故也急用調胃承氣湯下之

厥陰舌



舌見紅色內有黑紋者乃陰毒厥於肝經肝主筋故舌見如絲形也用理中合四逆湯温之

死現舌

舌見黑色水剋火明矣患此者百無一治治者審之

黃胎舌



舌見尖白根黃其表證未罷也須宜解表然後方可攻之如大便祕者用凉膈散加硝黃泡服小便溢者用五苓散加木通合益元散加薑汁少許以白滾湯調服

黑心舌



舌見弦白心黑而脈沉微者難治脈浮滑者可汗沉實者可下始病即發此色乃危殆之甚也速進調胃承氣湯下之

十五舌

舌尖白胎二分根黑一分必有身痛惡寒如飲水不至甚者五苓散自汗渴者白虎湯下利者解毒湯此亦危證也

十六舌



舌見白胎中有黑小點亂生者尚有表證其病之來雖惡宜凉膈散微表之表退即當下之下用調胃承氣湯

十七　偶灰色　舌

舌見如灰色中間更有黑暈兩條此熱來腎與命門也宜急下之服解毒湯下三五次遲則難治如初服量加大黃酒浸泡

十八　微黃色　舌

舌見微黃色者初病即得之發讝語者由失汗表邪入裏也必用汗下兼行以雙解散加解毒湯兩停主之

十九　白胎微黃　舌

舌中見白胎外有微黃者必作泄宜服解毒湯惡寒者五苓散

二十　微黃　舌

舌見微黃色者表證未罷宜用小柴胡湯合天水散主之可下者大柴胡湯下之表裏雙除臨證審用之

二十一　黃色本色　舌

舌見黃色者必初白胎而變黃色也皆表而傳裏熱已入胃宜急下之若下遲必變黑色爲惡證爲亢害鬼賊邪氣深也不治宜用調胃承氣湯下之

二十二　白胎本色　舌

舌左白胎而自汗者不可下宜白虎湯加人參三錢服之

二十三　本色白胎　舌

舌右白胎滑者病在肌肉爲邪在半表半裏必往來寒熱宜小柴胡湯和解之

二十四　白胎本色　舌

舌左見白胎滑此臟結之證邪併入臟難治

二十五　黃白色　舌

舌見四圍白而中黃者必作煩渴嘔吐之證兼有表者五苓散益元散兼服須待黃盡方可下也

二十六舌



舌見黃而有小黑點者邪偏六腑將入五臟也急服調胃承氣湯下之次進和解散十救四五也

二十七舌



舌見黃而尖白者表少裏多宜天水散一服涼膈散二服合進之脈弦者宜防風通聖散

二十八舌



舌見黃而溢有陽難者熱已入胃邪毒漸炙心火煩渴急宜大承氣湯下之若身發黃者用茵陳湯下血用抵當湯水在臍內十棗湯結胸甚者大陷胸湯痞用大黃瀉心湯

二十九舌



舌見四邊微紅中央灰黑色者此由失下而致用大承氣湯下之熱退可愈必三四下方退五次下之而不退者不治

三十舌



舌見黃而黑點亂生者其證必渴譫語脈實者生脈濇者死循衣摸牀者不治若下之見黑糞亦不治下宜大承氣湯

三十一舌



舌見黃中黑至尖者熱氣已深兩感見之十當九死惡寒甚者亦死不惡寒而下利者可治宜用調胃承氣湯主之

三十二舌



舌見外淡紅心淡黑者如惡風表未罷用雙解加解毒湯相半微汗之汗罷急下之如結胸煩躁目直視者不治非結胸者可治

三十三舌



舌見灰色尖黃不惡風寒脈浮者可下之若惡風惡寒者用雙解散加解毒湯主之三四下之見糞黑不治

三十四舌



舌見灰黑色而有黑紋者脈實急用大承氣湯下之脈浮渴飲水者用涼膈散解之十可救其二三



舌根微黑尖黃脈滑者可下之脈浮者當養陰退陽若惡風寒者微汗之用雙解散若下利用解毒湯十生八九也



舌根微黑尖黃隱見或有一紋者脈實急用大承氣湯下之脈浮渴飲水者用凉膈散解之十可救二三已上三十六舌乃傷寒驗證之捷法臨證用心處之百無一失

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百七十九卷目錄

醫部彙考一百五十九

舌門二

王肯堂證治準繩 舌部所屬

陳實功外科正宗 痰包　重舌　木舌

吳崑醫方考 舌病方論

張介賓景岳全書 論胎邑　重舌木舌

陳士鐸石室秘錄 生姜　黑色　生料　綠製　乾薑　吐出　編入　諸方　者可換　絕者可捉　傷寒相舌秘法

方 升麻煎　又方　黑參丸　柳花散　增損如聖散　甘桔湯　理中湯　薄荷煎　得效方　冰蘇丸　蘇金散　碧雪　香砂六君子湯　人參安胃散　七味白术散　四君子湯　六君子湯　二陳湯　葛花解醒湯　梔子清肝散　三黃丸　清心蓮子飲　十全大補湯　四物湯　當歸補血湯　清熱如聖散　玻珀牙硝散　升麻湯　青黛散　小續命湯　清熱補氣湯　清熱補血湯　六味丸　八味丸　加味歸脾湯　元參升麻湯　清熱化痰湯　八珍湯　金沸草散　薄荷散　黃藥湯　馬牙硝丸　牛黃散　犀角散　甘露飲　苦藥根散　青黛散　千金散　甘露飲　綠雪散　神效蘆薈丸　通天犀風湯　清心導痰丸　理除煩　大補元煎　補陰益氣煎

明王肯堂證治準繩

舌部所屬

屬手少陰心經

註 素問曰心在竅爲舌長寒內經曰心氣通於舌心和則舌能知五味矣病則舌卷短顫赤其脈搏堅而長喬岳曰心絕則舌不能收及不能語

又屬足太陰脾經

註 李東垣曰舌者心也復能知味是舌中有脾也靈樞曰足太陰之正貫舌中素問曰中央黃色入通於脾故病在舌本靈樞又曰足太陰是動則病舌本強所生病者舌本痛又曰刺舌下中脈太過血出不止爲瘖註舌下脈脾脈也瘖不能言也又孫景思曰舌者心氣之所主脾脈之所通二臟不和風邪中之則舌強不能言壅熱攻之則舌腫不能轉更有重舌木舌舌腫出血等證皆由心脾二經風熱所乘而然也

又兼屬足陽明胃經

註 張雞峯曰脾胃主四肢其脈連舌本而絡於唇口胃爲水穀之海脾氣磨而消之由是水穀之精化爲營衛以養四肢若起居失節飲食不時則致脾胃之氣不足而營衛之養不周風邪乘虛而干之則四肢與唇口俱痹語言蹇澀久久不治變爲瘂疾經云治瘂獨取陽明謂足陽明也治法宜多用脾胃藥少服去風藥則可安矣

又屬足少陰腎經

註 靈樞曰足少陰之正直者繫舌本舌縱涎下頃悅取足少陰元珠曰舌之下竅腎之津液所朝也註下竅廉泉穴也一名舌本在頷下結喉上素問曰刺足少陰脈重虛出血爲舌難以言

又屬足厥陰肝經

註 靈樞曰肝者筋之合也筋者聚於陰器而脈絡於舌本

陳實功外科正宗

痰包

痰包乃痰飲乘火流行凝注舌下結如匏腫綿軟不硬有妨言語作痛不安用利剪刀當包剪破流出黃痰若雞子清稠粘難斷捺盡以冰硼散搽之內服二陳湯加黃芩黃連薄荷數服忌煎炒火酒等件

重舌

大人小兒重舌乃心火妄動發之當以線針點刺患上令出惡血內服解毒瀉心湯外以冰硼散搽之

木舌

紫舌木舌亦由心火而發用飛鹽加冰片少許勤搽出涎自愈又有痰氣結於舌上成核作痛硬強者用線針點破出血用冰硼散搽之

吳崑醫方考

舌病方論

本事方云一士人夜歸其妻熟寢士人撼之妻問何事不答又撼之其妻驚覩之舌腫已滿口不能出聲急訪醫得一叟貧囊而至用藥摻之比曉復舊問之乃蒲黃一物嘅按內經曰熱勝則腫此證必心脾之

火併於舌故令腫而滿口蒲黃性寒能清氣凉血故愈

熱證多舌出有病愈而舌不能入者以冰片分許研末摻其舌上則入所以舌出者熱實於內而欲吐舌泄氣也所以不能入者邪氣久居舌强而不柔和也冰片味辛熱而氣清香可以利竅可以柔筋可以泄氣故得之而舌入矣

有人舌腫舒出口外無敢醫者一村人云偶有此藥歸而取至乃二紙撚以燈燒之取烟熏舌隨即消縮衆問其方村人曰吾家舊有一牛亦舌腫脹出口人教以蓖麻油蘸紙作撚燒烟熏之而愈因以治人亦驗崐謂舌腫舒出口外經所謂熱勝則腫也然舌者心之苗又脾之經絡連舌本散舌下其熱當責於心脾二經本草云蓖麻主浮腫惡氣取油塗之葉主風腫不仁搗蒸傅之則其能解風腫內熱也可知矣然用其烟猶有妙義烟乃輕清之物一入於口呼吸傳變可使徑達心脾匪惟治標亦可療本村人用之而不達其理斯其所以爲村人醫者聞之而不察其理則亦村人而已矣

景岳全書 臣張介賓著

論胎色

舌胎舌黑雖云火證然實火虛火俱能爲之凡治此者但當察脈證以虛實爲主而再以辨色之法參之庶可無誤蓋實熱之黑必兼紅紫乾渴或多芒刺若沉黑少紅而帶潤滑者本非實熱證也若其六脈細弱而形困氣倦則又最爲虛候是必寒水乘心火不歸原之病此不救本而但知治標則萬無一生矣此之治法凡裏熱未甚而表散有未解者宜柴胡諸飲之類以解其表裏邪熱甚者宜凉膈散犀角地黃湯之類以清其內此治實熱之法也若陰虛火盛而兼有表邪未解者宜補陰益氣煎之類兼表裏而治之若形氣病氣俱不足寒水乘心而虛陽不斂者必用理陰煎理中湯或大補元煎之類以單救其裏自可保其無虞此治虛火之法也若舌有白胎語言蹇澀者以薄荷白蜜同薑片蘸而揩擦之

舌爲心之官本紅而澤凡傷寒三四日已後舌上有胎必自潤而燥自滑而濇由白而黃由黃而黑甚至焦乾或生芒刺是皆邪熱內傳由淺入深之證也故凡邪氣在表舌則無胎及其傳裏則津液乾燥而舌胎生矣若邪猶未深其在半表半裏之間或邪氣客於胃中者其胎不黑不澀止宜小柴胡之屬以和之若陽邪傳裏胃中有熱則舌胎不滑而澀宜梔子豉湯之屬以清之若煩躁欲飲水數升者白虎加人參湯之類主之大都舌上黃胎而焦澀者胃腑有邪熱也或清之或微下之金匱妥略曰舌黃未下者下之黃自去然必大便燥實脈沉有力而大渴者方可下之若微渴而脈不實便不堅胎不乾燥芒刺者不可下也其有舌上黑胎而生芒刺者則熱更甚矣宜凉膈散承氣湯大柴胡之屬酌宜下之若胎色雖黑滑而不澀者便非實邪亦非火證非惟不可下且不可清也此辨舌之概雖云若此然猶有不可概論者仍宜詳察如左

按傷寒諸書皆云心爲君主之官開竅於舌心主火腎主水黑爲水色而見於心部是爲鬼賊相刑故知必死此雖據理之談然實有未必然者夫五行相制難免無尅此其所以爲病豈因尅爲病便爲必死但當察其根本何如也如黑色連地而灰黯無神此其本源已敗死無疑矣若舌心焦黑而質地紅活未必皆死證陽實者清其胃火火退自愈何慮之有其有元氣大損而陰邪獨見者其色亦黃黑眞水涸竭者其舌亦乾焦腎中水火俱虧原非實熱之證欲辨此者但察其形氣脈色自有虛實可辨而從補從清反如冰炭矣故凡以焦枯乾澀者尚有非實非火之證再若青黑少神而潤滑不燥者則無非水乘火位虛寒證也若認此爲火而苦寒一投則餘燼隨滅矣故凡見此者但當詳求脈證以虛實爲主不可因其焦黑而執言清火也傷寒固爾諸證亦然

重舌木舌

重舌木舌以舌下腫出如舌故曰重舌又謂之子舌忽腫木而硬者謂之木舌皆上焦熱壅故也惟宜砭鍼刺去其血爲上策及內服清胃降火之劑自愈若舌忽腫起如猪胞或硬如木石不能出聲脹滿塞口則閉悶殺人但看舌下有如螻蛄或如臥蠶者急於腫突處砭去其血仍用釜底煤不拘多少以鹽酢調厚傅之或用井華水調傅亦可脫去更傅如不甚者單以此傅之亦愈

石室祕錄 臣陳士鐸著

生瘡

人口中忽生瘡於舌上吐出在外寸餘上結成黃靨難以食物人以爲病在心也心熱故生此瘡此亦近理之談而不知非也亦有祟以憑之也方用冰片一

分入在蚌口內立化爲水乃以鵝翎數掃其上立刻收入其舌便可飲食矣蚌乃至陰之物攻至陰之邪則邪自退走況又加以冰片之辛溫逐邪不遺餘力自然手到功成也

口舌生瘡乃心火鬱熱而舌乃心苗故先見此證法用黃連三錢菖蒲一錢水煎服一劑而愈神方也此方不奇在黃連而奇在菖蒲菖蒲引心經之藥黃連雖亦入心經然未免肝脾亦入未若菖蒲之單入心也況不雜之以各經之品孤軍深入又何疑哉此所以奏功如響也倘不知用藥神機輕混之以肝脾之藥雖亦奏功終不能捷如桴鼓此治熱之法也

口舌生瘡者乃心經熱也宜用黃連黃芩之類凉散之自愈今不用而用黃藥屢驗各一錢枳殼燒灰炙甘草薄荷山豆根各五分爲細末冰片三釐研勻摻上一日摻三次第一日即少快明日全愈

黑色

陰寒而直中腎經舌黑眼閉下身盡黑上身盡青大便出小便遺此更危急之證雖有仙方恐難全活而予必欲生之因定一方雖不敢曰人盡可救亦庶幾於十人中而救一二人乎方名心救湯人參五兩附子一箇白朮半斤肉桂一兩菖蒲五分良薑三錢水煎服此方參朮多用者恐少則力量不能勝任以駕御夫桂附之熱藥也故必多加而後可望其通達上下以盡祛週身之寒毒倘待大便止而小便不遺便有生機再進一劑則眼開而舌黑可去身黑身青俱可盡解也苟服藥後仍前大小便之不禁不必再服藥藥其身死而已矣大約此方救此病十人中亦可救三四人

生刺

人有火盛之極舌如芒刺唇口開裂大渴呼飲雖非傷寒之證所得而人患此病即不身熱亦去死不久也白虎湯亦可救但過於太凉恐傷胃氣往往有熱退而生變仍歸於亡故白虎湯不可輕投也我有一方名曰清凉散元參二兩麥冬二兩甘菊花青蒿各五錢白芥子生地車前子各三錢水煎服此方妙在元參爲君以解上焦之焰麥冬爲臣以解肺中之熱甘菊青蒿爲佐以清胃中之火尤妙車前子白芥生地爲使或化痰或凉血盡從膀胱以下瀉其大熱之氣是上下之間無非清凉而火熱自散又不損胃故能扶危而不至生變也

燥裂

亡血之後口舌燥裂不能飲食者死蓋亡血自然無血以生精精涸則津亦涸必然之勢也欲使口舌之乾者重潤必須使精血之竭者重生補精之方六味丸最妙然而六味丸單補腎中之精而不能上補口舌之津也雖補腎於下亦能通津於上然終覺緩不濟急我今定一奇方上下兼補名曰上下相資湯熟地麥冬各一兩山茱萸沙參當歸牛膝蔴黃各五錢人參元參各三錢北五味二錢車前子一錢水煎服此方補腎爲君而兼以補肺之藥子母相資上下兼涸精生而液亦生血生而津亦生矣安在危亡之證不可處再生耶

乾腫

燥證舌乾腫大弱血大便又便血不止亦是死證蓋感暑熱之毒至秋而燥極肺金清肅之令不行大小便熱極而齊便血也論理見血宜治血矣然而治血血偏不止反至燥添而不可救吾不治血專治燥方用兼潤丸熟地當歸白芍各一兩元參麥冬沙參各二兩車前子生地各五錢地榆三錢水煎服一劑輕二劑血止便有生機也此方純是補血妙品惟用地榆以清火車前子以利水火清水利不必治血血自治也

吐出

如人舌吐出不肯收進乃陽火盛强之故以冰片少許點之即收後用黃連人參白芍各三錢菖蒲柴胡各一錢水煎服二劑可也

縮入

如人舌縮入喉嚨不能語言乃寒氣結於胃腹之故急用人參三錢白朮五錢肉桂附子乾薑各一錢治之則舌自舒矣

斷者可續

凡人有被人咬落舌尖或連根咬斷者或一日或二日或半月俱可接之速用狗舌一條觀其人舌之大小切正如人舌光景將病人舌根伸出病人坐在椅上仰面頭放在椅背上以自己手拿住喉嚨則舌自伸出急將狗舌蘸藥末接在人舌上一交接永不落矣末藥方開後龍齒人參俱透明者生地各三錢冰片三分藥皮一錢土狗三箇去頭翅勉强二十箇先將人參各項俱研末後用地亂土狗搗爛入前藥末內摻之佩身上三日乾爲末盛在瓶內遇有此等病爲之醫治可也此藥末接骨最奇服下神效骨斷者

服一錢即愈神方也

絕者可長

閩人說咬落舌頭者以醋漱之可以重長此說甚謬夫肉逢酸則縮豈有反伸出之理當用人參一兩煎湯含漱半日以一兩參湯漱完然後已再用龍齒末血竭末各三分人參末麥冬末各一錢冰片二分土狗一箇地虱十箇各火焙爲末放在土地上一刻出火氣將此末乘人參漱口完時即以此末自己用舌薰之使令遍不可將舌即縮入口中放在外者半刻至不能忍然後縮入可也三次則舌伸長矣

傷寒相舌祕法

凡見舌係白胎邪火未甚也用小柴胡湯解之舌係黃色者心熱也可用黃連梔子以凉之凡見黃而帶灰色者係胃熱也可用石膏知母以凉之凡見黃而帶紅者乃小腸膀胱熱也可用梔子以清之見舌紅而白者乃肺熱也用黃芩蘇葉以解之見舌黑而帶紅者乃腎虛而挾邪也用生地元參又入柴胡以和解之見舌紅而有黑星者乃胃熱極也宜用石膏以治之元參乾葛亦可終不若石膏之妙見舌紅而有白點者乃心中有邪也宜用柴胡黃連以解之心肝同治也見舌紅而有大紅點者乃胃熱而帶濕也須茵陳五苓散以利之蓋濕必歸膀胱以散邪非肉桂不能引入膀胱但止可用一二分不可多入見舌白胎而帶黑點亦胃熱也宜用石膏以凉之見舌黃而有黑者乃肝經實熱也用柴胡梔子以解之見舌白而黃者邪將入裏也急用柴胡梔子以解之不使入裏柴胡乃半表半裏不可不用之也見舌中白而外黃者乃邪入大腸也必須五苓散以分水水分則泄止矣見舌中黃而外白者乃邪在內而非外邪在上而非下止可加柴胡枳殼以和解不可驟用大黃以輕下也天水加五苓亦可終不若柴胡枳殼直中病原少加天水則更妥或不加用天水加五苓散亦可也見根黃而光白者亦胃熱而帶濕也亦須用石膏爲君而少加天水之品如豬苓澤瀉之味也見舌黃而隔一瓣一瓣者乃邪濕已入大腸急用大黃茵陳下之不必用抵當十棗湯也若下之遲則不得而用之然須辨水與血之分下水用十棗下血用抵當也見舌有紅中如蟲蝕者乃水未升而火來乘也亦須用黃連柴胡以和解之見舌紅而開裂如人字者乃邪初入心宜用石膏黃連以解之見舌有根黑而尖帶紅者乃腎中有邪未散宜用柴胡梔子以解之見舌根黑而舌尖白者乃胃火乘腎宜用石斛知母元參以解之不必論其渴與不渴不必問其下利也舌根黑而舌尖黃者亦邪將入腎須急用大黃下之然須辨其腹痛與不痛按之腹痛而手不可近者急下之否則只用柴胡梔子以和解之見舌純紅而獨尖黑者乃腎虛而邪火來乘也不可用石膏湯腎既虛而又用石膏是速之死也當用元參一兩或二兩以救之多有能生者見舌有中心紅暈而四圍邊旁純黑者乃君相二火炎騰急用大黃加生地兩許下而救之十人中亦可救五六人見舌有中央灰黑而四邊微紅者乃邪結於大腸也下之則愈不應則死以腎水枯槁不能潤之推送此時又不可竟用熟地補腎之藥蓋邪未散不可補補則愈加脹急適所以害之也必邪下而後以生地滋之則可然亦不可多用也見舌有純灰色中間獨兩暈黑者亦邪將入腎也急用元參兩許少加柴胡治之見舌有外紅而內黑者此火極似水也急用柴胡梔子大黃枳實以和利之若舌又見刺則火亢熱之極矣尤須多加前藥總之內黑而外白內黑而外黃皆前證也與上同治十中亦可得半生也惟舌中淡黑而外或淡紅外或淡白內或淡黃者較前稍輕俱可以前法治之十人中可得八人生也見舌有純紅而露黑紋數條者此木來乘火乃陰證也其舌胎必滑必惡寒惡水下咽必吐倘現純黑之舌乃死證也不須治之水極似火火極似水一帶純黑俱不可治傷寒知舌之驗法便有把握庶不至臨證差誤耳

方

升麻煎 千金方 下同

治心臟熱舌生瘡裂破引臀揭赤服之瀉熱

升麻　射干各三兩　柏葉切一升　大青二兩　生元參汁三合　苦竹葉切　地黃汁　生蘆根　薔薇根白皮各五兩

右十味㕮咀以水四升煮取一升去查下元參汁令兩沸次下地黃汁兩沸次下蜜煎取一升七合綿染取汁安舌上含細細咽之

又方
治舌上瘡不得食舌本强頸兩邊痛此是心虛熱所致
柴胡　升麻　芍藥　梔子仁　通草各二兩
黃芩　大青　杏仁各兩半　生薑　石膏各四兩
右十味㕮咀以水一斗九升煮取三升半分四服日三夜一滓可重煎服之
黑參九（升溪下同）
治口舌生瘡久不愈
黑參　天門冬　麥門冬去心各炒一兩
右爲末煉蜜丸如彈子大每用一丸綿裹嚥化嚥津
柳花散
治口舌生瘡
延胡索一兩　黃蘗　黃連各半兩　密陀僧　青黛各二錢
右爲末敷貼口內有津卽吐
增損如聖散
治上焦熱壅口舌生瘡
桔梗二兩　甘草炙一兩半　枳殼去瓤二錢半　防風半兩
右爲末每服三錢水煎食後服
甘桔湯
治前證
桔梗二兩　甘草一兩
右水煎食後溫服
理中湯（仲景）

治口舌生瘡服凉藥不愈此中焦土虛且不能食相火衝上無制也
白朮土炒二兩　人參　乾薑炮　甘草炙各一兩
右剉每服五錢水煎溫服
薄荷煎（三因）
治舌上生瘡或白胎乾澁如雪語話不眞
薄荷自然汁　白蜜各等分
右二味調勻先以生薑厚片蘸蜜木揩洗後敷此藥
得效方
治前證
硃砂　雄黃　硼砂　龍腦　麝香各少許
右爲末先以蜜水揩洗後以此敷之良
冰蘗丸（入門）
治口舌生瘡糜
黃蘗　薄荷　硼砂各等分　龍腦減半
右爲末蜜丸彈子大嚥化
象金散（三因）
治口舌瘡
黃連　細辛各等分
右爲末先以布巾蘸水拭淨患處乃摻藥吐涎卽愈
碧雪（得效）
治口舌生瘡舌强腮腫喉痹
蒲黃　青黛　硼砂　焰硝　甘草各等分
右爲末以手指摻於口中嚥津下
香砂六君子湯

治口舌生瘡服凉藥過多以致食少作嘔或中氣虛熱所致
人參　白朮土炒　茯苓　半夏　陳皮各一錢
薑香八分　甘草炒六分　縮砂仁炒八分
右薑水煎
人參安胃散
治胃經虛熱口舌生瘡喜熱飲食
人參　白茯苓各一錢　黃芩二錢　甘草炙
陳皮各五分　黃連三分　芍藥七分
右水煎服
七味白朮散
治虛熱口舌生瘡不喜飲冷吐瀉口乾
乾葛一錢　人參　白朮炒　木香　白茯苓
甘草炙　薑香各五分
右水煎服
四君子湯
治口舌生瘡脾胃虛弱飲食少思壯腹不利
人參　白朮　茯苓各一錢　甘草炙五分
右薑棗水煎服
六君子湯
治胃氣虛熱口舌生瘡或寒凉尅伐食少吐瀉
人參　白朮　茯苓各一錢半　陳皮　半夏
甘草各一錢
右薑棗水煎服
二陳湯
治脾胃虛弱口舌生瘡或中脘停痰嘔吐惡心飲食少思等證

陳皮　茯苓　半夏各一錢半　甘草炙五分
右薑棗水煎服
葛花解醒湯
治酒積口舌生瘡或嘔吐泄瀉
白豆蔻　縮砂仁　葛花各五分　陳皮　猪苓
白茯苓　人參　白朮土炒　神麯炒　澤瀉
乾薑各三分　木香　青皮各二分
右水煎服得微汗酒病去矣
梔子滴肝散
治三焦及足少陽經風熱口舌生瘡
茯苓　川芎　芍藥　牛蒡子炒　當歸各七分
柴胡　山梔　丹皮各一錢　甘草五分
右水煎服
三黃丸
治實熱口舌生瘡作渴喜冷
黃芩　黃連　黃蘗各等分
右爲末水糊丸桐子大每服七八十丸白湯下
清心蓮子飲
治口舌生瘡煩躁作渴小便赤澀夜靜晝發
黃芩　石蓮肉　白茯苓　黃芪蜜炙　柴胡
人參各一錢　麥門冬　地骨皮　車前子炒
甘草各一錢半
右水煎服
十全大補湯
治氣血俱虛牙齒腫痛口舌生瘡
人參　茯苓　當歸　白朮炒　黃芪炙　川芎
熟地　白芍藥炒　甘草炙各一錢　肉桂五分
右薑棗水煎服
四物湯
治血虛發熱口舌生瘡
當歸　熟地黃各二錢　芍藥　川芎各一錢
右水煎服
當歸補血湯
治血氣俱虛口舌生瘡
黃芪炙一兩　當歸酒製二錢
右水煎服
元戎四物二連湯
治血虛發熱口舌生瘡或晝寒夜熱
當歸身　生地黃　白芍藥　川芎　胡黃連
川黃連各一錢
右水煎服
逍遙散
治血虛有熱口舌生瘡
甘草炙　當歸　白芍藥炒　白茯苓　白朮炒
柴胡各一錢
右水煎服
黃連湯 同春下同
治心火舌上生瘡或舌上腫燥裂或舌尖出血或舌硬
黃連酒炒　梔子炒　生地黃酒洗　麥門冬
當歸酒洗　赤芍藥各一錢　犀角銼　薄荷
甘草各五分
右剉作一貼水煎食後服
清熱如聖散
治舌下腫如核桃破出黃痰後復發者
連翹一錢半　惡實　黃連各一錢　天花粉
梔子仁炒黑各七分　枳殼　柴胡　荊芥穗
薄荷葉各五分　甘草二分
右剉作一貼入燈心一團水煎稍冷服
琥珀犀角膏 入門
治咽喉口舌生瘡如菌其效如神
酸棗仁　茯神　人參各二錢　犀角　琥珀
硃砂各一錢　龍腦少許
右爲細末蜜丸彈子大每一丸以麥門冬煎湯化服一日用三五丸
霜鹽散
治舌忽腫大
百草霜　青鹽
等分爲末井水調塗舌上無青鹽則白鹽亦可
青黛散
治重舌
黃連　黃蘗各二錢　青黛　馬牙硝　硃砂水飛各六分　雄黃　牛黃　硼砂各三分　龍腦一分
右爲末先以薄荷汁拭口中以藥末摻之咽瘡腫亦佳
小續命湯
治中風舌短而强
防風一錢二分　桂枝　麻黃　人參　炙甘草
杏仁去皮尖炒研　芎藭酒洗　白芍藥酒炒
黃芩酒炒　防己各八分　附子四分
每服二錢加薑棗煎

升麻散（清生）

治熱毒口舌生瘡咽喉腫痛

升麻　人參　桔梗　乾葛　赤芍藥　甘草

右㕮咀薑煎溫服一方有黃連大黃黃芩元參麥門冬

碧雪（和劑）

治積熱口舌生瘡心煩喉閉

芒硝　青黛　寒水石飛　石膏煅飛　砂硝

硝石　馬牙硝各等分

甘草煎湯二升入諸藥再煎用柳枝不住攪令鎔方入青黛和勻傾入砂盆內冷卽成霜研藥每用少許以津含化如喉閉以竹管吹入喉中

本事方

治虛熱上攻口舌生瘡

草烏一箇　南星一箇　生薑一塊

爲末臨臥醋調作掩子貼手足心

龍石散（三因）

治上膈邋熱口舌生瘡咽喉腫痛

寒水石煅三兩　硃砂二錢半另研　龍腦一字

爲末每用少許摻患處小兒疹毒攻口用五福化毒丹後用此

清熱補氣湯

治中氣虛熱口舌如無皮狀或發熱作渴

升麻　元參　五味子　麥冬　炙甘草各五分

人參　白朮　茯苓　當歸酒洗　芍藥炒各一錢

右水煎服如不應加炮薑更不應加附子

清熱補血湯

治口舌生瘡體倦少食日晡益甚或目澀熱痛

當歸酒洗　川芎　芍藥　熟地黃酒洗各一錢

元參七分　知母　黃蘗　柴胡　麥門冬去心

五味子　牡丹皮各五錢

右水煎服如不應用補中益氣湯加五味治之

六味丸

治水衰火盛口舌生瘡

熟地黃砂仁酒拌九蒸九曬八兩　山萸肉酒潤

山藥各四兩　茯苓乳拌　丹皮　澤瀉各三兩

右爲細末蜜丸空心服

八味丸

治虛火上炎口舌生瘡

熟地黃砂仁酒拌九蒸九曬八兩　山萸肉酒潤

山藥各四兩　茯苓乳拌　丹皮　澤瀉各三兩

附子　肉桂各一兩

右爲細末蜜丸空心鹽湯下

加味歸脾湯

治思慮動火口舌生瘡

人參　白朮土炒　茯神　棗仁炒　龍眼肉各二錢　木香　甘草炙各五分　柴胡六分　遠志　丹皮　當歸酒洗各一錢　黃芪蜜炙一錢半

山梔八分

薑棗煎服

元參升麻湯

治心脾壅熱舌上生瘡木舌舌腫或連頰兩項腫痛

元參　升麻　犀角　桔梗　貫衆　赤芍藥　黃芩　甘草各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半煎七分去滓不拘時服

清熱化痰湯

治上焦有熱痰盛作渴口舌腫痛

貝母　天花粉　枳實炒　桔梗各一錢　黃芩

川黃連各一錢二分　元參　川升麻各七分

甘草五分

右水煎服

八珍湯

治氣血俱虛口舌生瘡

人參　白朮土炒　茯苓各二錢　炙甘草一錢

生地　當歸酒洗　芍藥炒各二錢　川芎一錢半

右水煎服

金沸草散

世醫用此發散傷寒傷風及加杏仁五味子治欬嗽皆效獨未知用之治舌腫牙疼辛未年有人患舌腫滿塞粥藥不入其勢危甚煎此一劑乘熱以紙籠氣熏之遂愈

前胡　旋覆花各一兩　赤芍炒　甘草各一錢

荊芥穗一兩半　赤茯苓六錢半　炙半夏五錢

右水煎服

黃蘗湯

治舌腫及重舌

黃蘗　炙甘草各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分食後溫服

馬牙硝丸

治木舌

馬牙硝研七錢五分　鉛白霜　太陰元精石　寒水石　麝香細研　大黃炒各半兩　枯白礬一錢二分　炙甘草二錢半

右爲細末研勻煉蜜和丸如彈子大含一丸嚥津

牛黃散

治舌腫强

牛黃研　漢防己各七錢半　犀角屑二錢五分　生地黃　羚羊角屑　人參　桂心　牛蒡子炒　炙甘草各半兩

右爲細末研勻每服三錢水一中盞煎至六分不拘時連渣溫服

飛礬散

治木舌

白礬飛　百草霜各等分

右研細末捻糟茄自然汁調若口噤挑開灌之妙

蜈蚣散

治腫證

蜈蚣五枚炙　鹽半兩

右研細末以水二盞煎十沸去渣熱含吐去以瘥爲度

百草霜散

治舌腫起如猪胞忽然硬腫逡巡塞悶殺人百草霜不拘多少

右一味以酢調厚傅舌上下脫去更傅須臾卽消若先決去血汁再傅之尤佳

烏犀膏

治重舌木舌

皂莢兩條搥碎水三升浸一時久搦汁去渣入瓦器內熬成膏　篠硝　百草霜研　人參末各一錢　好酒一合　白霜梅　硼砂各少許并研入膏中

右拌和令勻先以粗布蘸水揩舌冷水用生薑片擦之然後用鵝毛點藥少許於舌上下以出盡頑涎爲度却嚼甘草二寸嚥汁吞津

牛黃散

治重舌

牛黃研　人參　大黃炒　麝香研　甘草炙各半兩　白茯苓去皮七錢半　丹砂研　當歸切焙各二錢五分

右爲細末每服二錢食後沸湯調下甚者加一錢

礬石散

治風寒濕舌强不能言語

枯礬　桂心各等分

右爲末每用一錢安舌下

甘露飲

治口舌生瘡牙宣心熱

枇杷葉　石斛　黃芩　生地黃　麥門冬去心　炙甘草各等分

右㕮咀每服五錢水二鍾煎八分去渣不拘時溫服

苦蔞根散

治風熱口中乾燥舌裂生瘡

苦蔞根　胡黃連　黃芩各七錢半　白殭蠶炒　白鱔皮　大黃剉炒各半兩　牛黃研　滑石研各二錢半

右爲細末研勻每服二錢不拘時竹葉湯調服

甘露丸

治口舌乾燥解壅毒退風熱

寒水石二斤燒令赤攤於地上一宿以出火毒　鉛霜細研　龍齒細研　甘草炙赤各七錢半　馬牙硝三兩細研

右爲細末研勻以糯米飯和丸如彈子大每服半丸食後用新汲水磨化服

蘆薈散

治口舌生瘡

蘆薈　青黛　蜣蜋　羊蹄花各半兩　麝香研　白礬煅研　牛黃研各一錢二分　乾蝎半二枚　瓜帶二十枚　細茶　丁香　丹砂研各二錢半　馬牙硝研七錢半　熊膽研一錢

右爲細末研勻先以頭髮裹指於溫水內蘸搭之輭帛挹却膿水取少許藥末摻瘡上或輕可卽去蜣蜋蘆薈看病大小以意加減用之

元參散

治口舌生瘡連齒斷爛痛

元參　升麻　獨活　黃芩　黃蘗　大黃炒　前胡　犀角　麥冬　梔子仁　炙甘草各等分

右爲末每服五錢水一盞煎五分不拘時溫服

綠雲散

治舌上生瘡

銅綠　鉛白霜各等分

右同研極細每用少許摻舌上

神龜滋陰丸

治足痿舌縱

龜板炙四兩　知母酒炒　黃蘗炒赤各二兩

鎖陽酒洗　枸杞　五味子各一兩　乾薑炮半兩

右爲末滴水丸如桐子大每服七十丸空心鹽湯送下

通天愈風湯

治前證

桔梗三錢　人參　南星　貝母去心各一錢

連翹　甘草　防風　葳靈仙　荊芥穗各五分

苦蔞仁十五粒　白朮一錢半　生薑三片

水一盞半煎七分去查入荊瀝一呷薑汁些少半

饑時服吞下清心導痰丸五十粒日一服

清心導痰丸

治前證

南星薑製　半夏薑製各二兩　天花粉　白附子各一兩　黃連炒　鬱金各七錢半　川烏鹽製二錢　白殭蠶炒去絲嘴　天麻　羌活各半兩

右爲末薑汁糊爲丸如桐子大每服五十丸用通天愈風湯吞下

理陰煎 景岳全書下同

治形氣病氣俱不足寒水乘心虛陽不斂舌黑者

當歸二三錢或五七錢　乾薑炒黃色一二三錢

熟地三五七錢或一二兩　炙甘草一二錢

水二鍾煎七八分熱服或加肉桂一二錢

大補元煎

治前證

人參一二錢多則一二兩　山藥　杜仲各二錢

熟地二三錢多則二三兩　當歸二三錢泄瀉者去之

山萸一錢畏酸吞酸去之　枸杞二三錢　炙草一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

補陰益氣煎

治舌胎陰虛火盛表邪未解者

人參一二三錢　當歸身　山藥酒炒各二三錢

熟地三五錢或一二兩　升麻三五分火浮於上者不用

陳皮　炙甘草各一錢　柴胡一二錢無表邪者不用

水二鍾加生薑三五七片煎八分食遠溫服

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百八十卷目錄

醫部彙考一百六十

舌門三

單方

鍼灸

導引

醫案

咽喉門一

黃帝素問 太陰陽明篇 陰陽別論 診要經終論 欬論 風論 厥論 脈解篇 六元正紀大論 至眞要大論 陰陽類論
靈樞經 邪氣臟腑病形篇 經脈篇 本臟篇 憂恚無言篇 癰疽篇
張機金匱要略 乾燥 氣逆不利 水雞聲 痹痛
王叔和脈訣 乾燥
孫思邈千金方 喉嚨論
竇漢卿瘡瘍全書 總論 纏喉風說 雙乳蛾 單乳蛾 酒毒 風毒 風熱 陰毒 積熱生癰 啞癖風 弄舌風 腫閉 喉節 氣壅閉 嗆食風 七情生癰 脚眼風 喉閉 生痛 懸癰 鎖喉瘡 傷寒遺毒喉閉

藝術典第一百八十卷

醫部彙考一百六十

舌門三

單方

舌胎白而滑生薑蘸蜜擦之或以生薑蜜水洗之若舌胎黃赤燥澀者取新青布裹指蘸冷水頻頻擦之輕者易脫重者難脫必須大下之津液還而胎自退矣入門

舌上生瘡或白胎乾澀如雪語話不眞薄荷自然汁與白蜜等分調勻傅之良先以生薑厚片蘸蜜水揩洗後傅藥三因

又方生薑蜜水揩洗後用硃砂雄黃硼砂腦麝各少許爲末傅亦良得效

補舌斷方治大人小兒偶含刀在口割斷舌頭已垂落而未斷用雞子白軟皮袋了舌頭用破血丹蜜調塗舌根斷處却以蜜調蠟稀稠得所敷在雞子皮上蓋惟軟能透藥性故也常勤添敷三日舌接住方去雞子皮只用蜜蠟勤敷七日全安醫林

自行被跌仆穿斷舌心血出不止以鵝翎蘸米酢頻刷斷處其血即止仍用蒲黃杏仁硼砂少許爲末蜜調成膏噙化而安入門

舌頭被人咬去取諸瘡門治下疳瘡藥先以乳香沒藥煎水噙口中止痛後抹上藥即長全有效下疳瘡藥即黑鉛水銀寒水石輕粉硼砂五味方也同春

舌腫脹出口蓖麻子取油蘸紙撚燒烟熏之綱目

重舌取馬牙硝爲末傅舌下日三本草下同

重舌及舌生瘡蒲黃微炒摻之即差

舌腫大滿口眞蒲黃頻摻舌上且呷黃連湯瀉心火即差正傳

舌塞語吃川椒以生麪包丸每服十粒酢湯下救急

口舌生瘡用黃蘗含之良

舌腫滿口不得語鹽一升蜃蟲三十枚水三升煑三沸含之稍稍咽之日三千金

舌腫脹出口硼砂爲末生薑片蘸藥揩腫處即退綱目

舌頭生瘡黃蘗乾薑等分亦良

口舌瘡爛牛膝浸酒含漱亦可煎飲肘後

重舌腫脹取鐵銹鎖燒紅打下銹研末水調一錢噙嚥生生編

重舌木舌殭蠶爲末吹之吐痰甚妙

又方殭蠶一錢黃連蜜炒二錢爲末摻之涎出爲愈陸氏積德

木舌腫脹川烏尖巴豆細研酢調塗刷集簡

重舌木舌脹大塞口半夏酢煎含漱之

又方半夏二十枚水煑過再泡片時乘熱以酒一升浸之密封良久熱漱含吐之

重舌涎出水漿不入太陰元精石二兩牛黃硃砂龍腦各一分爲末以針刺舌上去血鹽湯漱口摻末嚥津神效聖惠下同

懸癰舌腫咽生瘜肉羊蹄草煑汁熱含冷吐之

木舌腫强糖酢時時含漱普濟

傷寒舌出過寸者梅花片腦半分爲細末摻之隨手即愈夷堅志

重舌鵝口赤小豆末酢和塗之普濟

口舌生瘡胷膈疼痛者用焦豉末含一宿即瘥聖惠

口舌生瘡矾硝含之良千金

口舌生瘡下虛上壅用白礬泡湯濯足

又方白礬末黃丹水飛硃砂等分研擦之

重舌木舌皂礬二錢鐵上燒紅研摻之積德堂方

舌腫塞口不治則能殺人用甘草煎濃湯熱漱頻吐聖濟總錄

重舌鵝口白芨末乳汁調塗足心聖惠

口舌生瘡用黃連浸酒時呷之肘後

口舌生瘡升麻一兩黃連三分爲末綿裹含嚥本事

飛絲入口致舌間生泡取蘇葉細嚼白湯送下立效（丹溪）

木舌腫滿塞口殺人紅芍藥甘草煎水熱漱（聖濟總錄）

舌卒腫大如猪脬狀滿口不治殺人取釜下墨和酒塗之（千金）

舌縮口噤以生艾搗傅之乾艾浸濕亦可（聖濟總錄）

舌硬出血不止取刺薊搗汁和酒服乾者爲末冷水服（普濟）

舌硬出血木賊煎湯漱之卽止（聖惠）

口舌生瘡膽礬半兩入銀鍋內火煅赤出毒一夜細研每以少許敷之吐去酸涎水二三次瘥（肘後方）（千金）

木舌塞脹不治殺人用蛇膽一枚焙乾爲末傅舌上有涎吐去

重舌腫痛蜂房炙研酒和傅之日三四次

舌上腫硬出血海螵蛸蒲黃各等分研細末井華水調傅

重舌用皂角刺煅矾硝少許研勻先以手蘸水擦口內井舌上下將藥摻之涎出自消

又方五靈脂一兩去砂石研末米醋一大椀煎逐旋嗽漱口

又方用皂角要不蛀者四五梃去皮弦炙令乾荊芥穗少許研細末以米醋調塗腫處

又方蛇蛻燒灰研極細少許傅之

重舌出涎特牛乳飲之

舌腫出血如泉鮫鯊骨蒲黃各等分炒爲細末每用塗之（簡易）

舌上生瘡羊脛骨中髓和胡粉塗之妙（聖惠）

重舌塞痛地鼈蟲和生薄荷研汁帛包捻舌下腫處一名地蜂蟲也（鮑氏）

木舌腫滿不治殺人蚯蚓一條以鹽化水塗之良久漸消（聖惠）

舌腫大塞口不通飲食經驗方用眞蒲黃一味頻刷

舌上其腫自退若能嚥藥卽以黃連一味煎濃汁細細呷之以瀉心經之火卽愈（正傳）

舌腫滿口諸藥不效以梅花冰片研爲細末傅之卽消（醫統）

舌腫脫出口外用硼砂爲末生薑片蘸藥揩腫處卽退（胎白）

口舌生瘡爛久不瘥用薔薇根濃煎汁稍稍含漱溫含冷吐卽效冬取根夏取莖葉用（本草）

鍼灸

素問曰昌陽之脈令人腰痛痛引膺目眩眩然甚則反折舌卷不能言刺內筋爲二痏在內踝上大筋前太陰後上踝二寸所

刺足少陰脈重虛出血爲舌難以言

靈樞曰熱病不可刺者舌本爛熱不已者死

甲乙經曰舌下腫難言舌縱喎戾不端通谷主之

舌緩涎下頰悶取足少陰

重舌刺舌柱以鈹鍼

厥口僻失欠下牙痛頰腫惡寒口不收舌不能言不得嚼大迎主之

舌縱涎下煩悶陰交主之

千金方曰廉泉然谷主舌下腫難言

陰谷主舌下腫難言舌縱涎出

風府主舌緩瘖不能言舌急語難

扶突大鍾竅陰主舌本出血

魚際主舌上黃身熱

尺澤主舌乾脅痛

關衝主舌捲口乾心煩悶

中衝主舌本痛

天突主俠舌纏脈青

復留主舌捲不能言

舌卒腫滿口溢出如吹猪脆氣息不得通須臾不治殺人急以指刮破舌兩邊去汁卽愈亦可以鈹刀決兩邊破之以瘡膏敷之

又方刺舌下兩邊大脈血出勿使刺著舌下中央脈血出不止殺人如上治不愈或血出數升則燒鐵筷令赤熨瘡數過以絕血也

濟生方曰舌急取痙門舌緩取風府

三因方曰凡舌腫舌下必有禁蟲狀如螻蛄臥竄有頭有尾頭少白可燒鐵烙烙頭上卽消

東垣十書曰廉泉一穴一名舌本在頷下結喉上治舌下腫難言縱涎出口噤舌根急縮下食難刺瘧論云舌下兩脈者廉泉也刺禁論云刺舌下脈太過血不止爲瘖刺節眞邪論云取廉泉穴血變而止以明宜出血禁用針或問取廉泉穴二說不同一說取頷

下結喉上一說取舌下兩脈何者爲當答曰舌本者乃舌根靜也若取舌下兩脈是取舌梢也舌梢也此法誤也當取頷下者爲當此舌根也況足陽明之脈根於厲兌結於廉泉頷下乃足陽明之所行也若取舌下兩脈非足陽明經也戊與癸合廉泉足少陰也治從下解云胃中熱上盛廉泉開故從下當出血瀉胃中熱又知非舌下兩脈也頷下結喉上者爲準矣

農論曰廉泉玉液者津液之道路也按針經云少陽結於廉泉今曰陽明者誤也

得效方曰舌腫如豬胞以鍼刺舌下兩旁大脈血出即消切勿刺中央脈血不止則死若誤刺以銅筋火燒烙之或酢調百草霜塗之須臾自消此患人多不識失治則死

醫學綱目曰治重舌木舌紫舌脹等疾腫脹疼痛硬强不語又兼舌根并兩頤合經盡處作腫瘀肉塞口噤難開俱用此法刺之用粗綿針紮在筋頭上在患處點刺出血紅紫毒輕紫黑毒重患甚者數十點皆可血盡温湯漱之甚者金鎖匙輕者冰硼散搽患上流去熱涎內服凉膈散清凉飲俱可選用

舌腫難言取廉泉金津玉液各以三稜出血又取天突少商然谷風府

舌卷取液門二間

舌縱涎下取陰谷

舌下腫難言口噤舌縱涎出及舌根急縮廉泉三分得氣即瀉灸三壯

舌腫廉泉三分灸之金津玉液各用三稜針出血又取天突少商

又法取廉泉然谷風府天突關元

針灸舌卷獨取手少陽絡與筋經云邪客手少陽之絡令人喉痹舌卷口乾心煩臂外廉痛手不及頭刺手中指次指爪甲上去端如韭葉各一痏又云手陽明之筋其病支痛轉筋舌卷治在燔針劫刺以知爲度以痛爲輸是也

萬病回春曰凡舌腫脹甚先刺舌尖或舌上或舌旁出血唯舌下廉泉穴禁鍼

導引

得效方曰重舌擦法重舌急證用指去爪先於舌下筋上擦至根漸深深擦入如此三次又用指蘸水取項後燕窠小坑中筋自上赶下至小屈深深擦入亦三次小兒若飲乳勝前則病去矣

保生秘要曰舌下重舌先於患處推散腎水升至舌下洗之推開肺經呵而吸之

醫案

儒門事親曰南鄰朱老翁年六十餘歲身熱數日不已舌根腫起和舌尖亦腫至滿口比元舌大二倍一外科以燔針刺其舌兩旁下廉泉穴病勢轉凶將至顛蹶戴人曰血實者宜決之以鉼鍼磨令鋒極尖輕砭之日砭八九次血出約一二盞如此者三次漸而血少痛減腫消夫舌者心之外候也心主血故血出則愈又曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火燔鍼艾火是何義也

一婦人木舌脹其舌滿口諸藥不愈余用鉼鍼小而銳者砭之五七度腫減三日方平計所出血幾至盈斗

本事方曰一士人夜歸其妻熟寢士人撼之妻問何事不答又撼之其妻驚視之舌腫已滿口不能出聲急訪醫得一叟負藥而至用藥摻之比曉復舊問之乃蒲黃一物

薛己醫案曰一婦人善怒舌本强手臂麻余曰舌本屬脾土肝木尅之故耳治以六君子加柴胡芎藥而愈

先兄口舌糜爛痰涎上壅飲食如常遇大風欲仆地用補中益氣湯及八味丸即愈間藥數日仍作每勞苦則痰盛目赤漱以冷水舌稍愈頃間舌益甚用附子片噙之即愈服前二藥諸證方痊

弘治辛酉金臺姜夢鯨患傷寒舌見全黑手足厥冷吃逆不止衆醫猶作火治幾致危殆判院吳仁齋用附子理中湯而愈夫醫之爲道有是病必用是藥附子療寒其效可數奈何世皆以爲必不可用之藥寧親人之死而不救不亦哀哉凡用藥得宜效應不異不可便謂爲百無一治而棄之也

余在留都聘地官主事鄭汝東妹壻患傷寒舌見全黑院內醫十會議曰當用附子理中湯人咸驚駭而止及其困甚治棺會與其鄰復往視之謂用前藥猶有生意其家既待以死拚而從之數劑而愈大抵舌黑之證有火極似水者即杜學士所謂新爲黑炭之意也宜凉膈散之類以瀉其陽有水來尅火者即曾醫士所療者是也宜理中湯以消陰翳又須以老生

薑切平擦其舌色稍退者可治堅不退者不可治

一男子不慎酒色多喜飲冷舌作痛小便頻數舌裂痰盛此腎水枯涸陰火無制名下消用加減八味丸而愈若寸脈洪數有力多飲少食大便如常口舌生瘡大渴引飲者名上消是心移熱於肺用白虎湯加人參治之若關脈洪數有力喜飲冷小便黃大便鞕而自汗者名中消調胃承氣湯下之

學士吳北川過飲舌本強言語不清痰氣湧盛肢體不遂余作脾經濕痰治之而愈

秋官鄭君過飲舌本強腫言語不清此脾虛濕熱用補中益氣加神麴麥芽乾葛澤瀉而愈

一膏粱之人患舌痛數服皆消毒之藥舌腫勢急余刺舌尖及兩旁出紫血杯許腫消一二更服犀角地黃湯一劑翌早復腫脹仍刺出紫血杯許亦消一二仍服前湯良久舌大腫又刺出黑血二杯許腫漸消忽寒熱作嘔頭痛作運脈浮洪而數此邪雖去而眞氣愈傷與補中益氣倍用參芪歸朮四劑而安又數劑而愈

一婦人善怒舌腫頗熱用降火化痰等藥前證益甚兩脅作脹服流氣飲肚腹亦脹經行不止此肝虛不能藏血脾虛不能統血用加味歸脾加麥門五味而愈若因暴怒而患前證用小柴胡加丹皮山梔血虛者用八珍加參朮柴胡山梔丹皮虛甚須加炮薑

一男子舌下牽強手大指次指不仁或大便祕結或皮膚赤疊此大腸血虛風熱用逍遙散加槐角秦艽而愈

一婦人冬患腦疽腫痛熱渴脈洪數實余用清凉消毒散潰之而愈次年三月其舌腫大遍身患紫疔如葡萄不計其數手足尤多各刺出黑血服達命丹七粒出臭汗瘡熱益甚便閉二日與大黃芩連各三錢升麻白芷山梔薄荷連翹各二錢生甘草一錢水煎三五沸服大小便出臭血甚多下體稍退乃磨入犀角汁再服舌本及齒縫出臭血諸毒乃消更與犀角地黃湯而愈

工部徐檢齋口舌生瘡喜冷飲食或咽喉作痛大便祕結此實熱也用清凉飲治之而愈

仲侍御多思慮舌作痛用苦寒降火藥發熱便血盜汗口乾肢體日瘦此脾氣虧損血虛之熱用加味歸脾湯而愈

醫學入門曰一婦人因產子舌出不能收周眞見之以硃砂傅其舌令作產子狀以兩女扶掖之乃於壁外置瓦盆墮地作聲聞而舌收矣

古今醫統曰王兄治一大賈因失驚伸舌出遂不能收經旬食不下咽延羸已甚國醫不能療其家榜於市曰有能治者酬千金兄醫名未著學且未精因檢鍼經有鍼法治此疾遂往治之用鍼舌之底抽鍼出舌遂伸縮如平時

醫方考曰有人舌腫舒出口外無敢醫者一村人云偶有此藥歸而取至乃二紙撚以燈燒之取烟熏舌隨即消縮衆問其方村人曰吾家舊有一牛亦舌腫脹出口人教以蓖麻油蘸紙作撚燒烟熏之而愈因以治人亦驗

景岳全書曰余在燕都嘗治一王生患陰虛傷寒年出三旬而舌黑之甚其芒刺乾裂焦黑如炭身熱便結大渴喜冷而脈則無力神則昏沉羣醫謂陽證脈必死無疑余察其形氣未脫遂以甘溫壯水等藥大劑進之以救其本仍間用凉水以滋其標蓋水爲天一之精凉能解熱甘可助陰非若苦寒傷氣者之比故於津液乾燥陰虛便結而熱渴火盛之證亦所不忌由是水藥並進前後凡用人參熟地輩各一二斤附子肉桂各數兩冷水亦一二斗然後諸證漸退飲食漸進神氣俱復矣但察其舌黑則分毫不減余甚疑之莫得其解再數日舌上脫一黑殼而內則新肉燦然始知其膚腠焦枯死而復活使非大爲滋補安望再生此一證特舉其甚者紀之此外凡舌黑用補而得以保全者不可枚舉所以凡診傷寒者當以舌色辨表裏寒熱若以之辨虛實則不能無誤蓋實固能黑以火盛而焦也虛亦能黑以水虧而枯也若以舌黃舌黑悉認爲實熱則陰虛證萬無一生矣

咽喉門一

黃帝素問

太陰陽明篇

喉主天氣咽主地氣

註　喉乃太陰呼吸之門主氣而屬天咽乃陽明水穀之道路屬胃而主地

陰陽別論

一陰一陽結謂之喉痺

註　一陰一陽者厥陰少陽也厥陰木主氣而得少

陽之火化風火氣結則金氣受傷故喉痛痹也

診要經終論

厥陰終者中熱嗌乾善溺心煩甚則舌卷卵上縮而終矣

註 手厥陰心包絡足厥陰肝木火之氣欲絕故中熱嗌乾善溺乃肝氣下泄心煩乃包絡之氣上炎肝者筋之合筋聚於陰器而脈絡於舌本故甚則舌卷囊縮而終矣

欬論

心欬之狀欬則心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痹

註 喉乃肺之竅心火淫金故喉中介然如梗手少陰心脈起於心中出屬心系上挾咽故咽嗌腫痛

風論

以春甲乙傷於風者爲肝風肝風之狀多汗惡風善悲色微蒼嗌乾善怒時憎女子診在目下其色青

註 足厥陰之脈循喉嚨之後上入頏顙風木合爲邪則火熱盛而嗌乾肝氣病故善怒怒勝思故時憎女子目者肝之官故診在目下

厥論

手陽明少陽厥逆發喉痹嗌腫痓治主病者

註 手陽明爲肺之腑手少陽三焦也陽明主嗌肺主喉兼三焦之火氣並逆故喉痹嗌腫也陽明乃燥熱之經三焦屬龍雷之火火熱並逆故發痓也

脈解篇

厥陰所謂甚則嗌乾熱中者陰陽相薄而熱故嗌乾也

註 甚者陽氣盛也厥陰之氣與盛陽相薄則陰亦爲熱熱甚故嗌乾而熱中

六元正紀大論

少陽司天之政三之氣民病熱中聾瞑血溢膿瘡欬嘔鼽衄渴嚏欠喉痹目赤善暴死

註 民病熱中諸證感風火之氣也二火相交風熱並至故善暴死

金鬱之發民病欬逆心脅滿引小腹善暴痛不可反側嗌乾面塵色惡

註 欬逆嗌乾肺之病也

少陽所至爲喉痹耳鳴嘔涌

註 此秋病之常也

至眞要大論

歲太陰在泉濕淫所勝民病飲積心痛耳聾渾渾焞焞嗌腫喉痹

註 太陰在泉辰戌歲也飲積心痛寒濕上乘也耳聾嗌腫喉痹乃三焦經病

歲陽明在泉燥淫所勝甚則嗌乾面塵身無膏澤足外反熱

註 陽明在泉子午歲也嗌乾面塵乃足厥陰病面塵身無膏澤足外反熱乃足少陽病

歲太陽在泉寒淫所勝民病嗌痛頷腫

註 太陽在泉丑未歲也嗌痛頷腫乃小腸經病

陽明司天燥淫所勝民病嗌乾面塵

註 陽明司天卯酉歲也嗌乾面塵肝經之病

太陽司天寒淫所勝民病面赤目黃善噫嗌乾

註 諸證乃寒凌心火逼其火熱上炎水火寒熱交爭也

太陰之勝火氣內鬱甚則熱格頭痛喉痹項强

註 此風火之氣與濕氣相雜從頸項而上干於巔頂也

陽明之勝清發於中爲嗌塞大凉肅殺胷中不便嗌塞而欬

註 金氣寒肅故清發於上則爲嗌塞胷中不便嗌塞而欬者陽明燥金上及於肺同氣相感也

少陽司天客勝則喉痹頭痛嗌腫耳聾

註 此皆感濕熱而爲病也

陽明司天清氣內復則欬衄嗌塞

註 清氣內餘者清肅之客氣入於內而有餘也欬衄嗌塞皆肺病肺屬金而主天是以陽明司天之氣餘於內而病在肺也

太陽司天主勝則喉嗌中鳴

註 此在下寒水之氣而上出於肺也

陰陽類論

一陰一陽代絕此陰氣至心上下無常出入不知喉咽乾燥病在土脾

註 一陰厥陰也一陽少陽也若一陰一陽之氣代絕則水不能隨之上升止陰氣自至於心下上下無常者或上或下也腹中和小便利爲知出入不知謂脾肺燥而不能出灌於四支不利於小便也水液不能上交於肺則喉咽乾燥矣不能滲灌於中土則土燥而脾病矣

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

心脈大甚爲喉吩

註喉吩者喉中吩然有聲也宗氣積於胷中上出喉嚨以貫心脈而行呼吸心氣盛故喉中有聲

經脈篇

腎足少陰之脈所生病者口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛

三焦手少陽之脈是動則病嗌腫喉痹

小腸手太陽之脈是動則病嗌痛

註凡此皆經脈所循之部分而爲病也

本藏篇

肺大則多飲善病胷痹喉痹逆氣

註肺居胷中開竅於喉以司呼吸故大則病如是

憂志無言篇

咽喉者水穀之道也喉嚨者氣之所以上下者也會厭者言聲之戶也口唇者音聲之扇也舌者音聲之機也懸雍垂者音聲之關也頏顙者分氣之所泄也橫骨者神氣所使主發舌者也故人之鼻洞涕出不收者頏顙不開分氣失也會厭之開閉主聲氣之出入故薄小則發聲疾厚大則開閉難氣出遲故重言也少陰之正氣上行而後音聲乃發如寒氣客於厭則厭不能發謂不能開也發不能下謂不能閉也故開閉不致而無音聲

癰疽篇

癰發於嗌中名曰猛疽猛疽不治化爲膿膿不瀉塞咽半日死其化爲膿者瀉則合家膏冷食三日而已

註嗌乃呼吸出入之門發於嗌中其勢甚猛故名猛疽若膿不瀉而塞嗌則呼吸不通不待十日而死矣嗌乃肺之上管肺腎上下交通豕乃水畜冷飲豕膏者使熱毒從下而出也

漢張機金匱要略

乾燥

狐惑之爲病狀如傷寒默默欲眠目不得閉臥起不安蝕於喉爲惑蝕於陰爲狐不欲飲食惡聞食臭其面目乍赤乍黑乍白蝕於上部則聲嗄甘草瀉心湯主之

蝕於下部則咽乾苦參湯洗之

虛勞裏急悸衄腹中痛夢失精四肢痠疼手足煩熱咽乾口燥小建中湯主之

病欬逆脈之何以知此爲肺癰當有膿血吐之則死其脈何類師曰寸口脈沉而緊沉爲水緊爲寒沉緊相搏結在關元始時當微年盛不覺陽衰之後榮衛相干陽損陰盛結寒微動腎氣上衝喉咽塞噎脅下急痛醫以爲留飲而大下之氣擊不去其病不除後重吐之胃家虛煩咽燥欲飲水小便不利水穀不化面目手足浮腫又與孝慈圓下水當時如小差食飲過度腫復如前胷脅苦痛象若奔豚其水揚溢則浮欬喘逆當先攻擊衝氣令止乃治欬欬止其喘自瘥先治新病病當在後

氣逆不利

大逆上氣咽喉不利止逆下氣者麥門冬湯主之

水雞聲

欬而上氣喉中水雞聲射干麻黃湯主之

痹痛

陽毒之爲病面赤斑斑如錦文咽喉痛唾膿血五日可治七日不可治升麻鼈甲湯主之

陰毒之爲病面目青身痛如被杖咽喉痛五日可治七日不可治升麻鼈甲湯去雄黃蜀椒主之

晉王叔和脈訣

乾燥

三部俱浮肺臟風鼻中多水唾稠膿壯熱惡寒皮肉痛噪乾雙目淚酸疼

肺脈浮兼實咽門燥又傷大便難且澀鼻內乏馨香實大相兼滑毛焦涕唾粘更和咽有燥秋盛夏宜砭

唐孫思邈千金方

喉嚨論

喉嚨者脾胃之候也重十二兩長一尺二寸其層圍十二重應十二時主通利水穀之道往來神氣若臟熱喉則腫塞氣不通烏鬚膏止之若腑寒喉則耿耿如物常欲窒癢痹涎唾熱則開之寒則通之不熱不寒依臟調之

黃漢卿瘡瘍全書

總論有序

實夢麟曰咽喉爲飲食精氣之要路肺與大腸表裏之別上通咽喉下由大腸出入之門戶也入穀則昌絕穀則亡生死須臾之間變證不一惟肺金主氣而生津液灌溉一身流潤百骸生生不已循環無端順則五臟華敷百關通暢若陽明燥金受火尅而疾生係乎太陽之標故推而治之可以解熱除毒祛風順氣則金自然平丹溪以米酢攪口中以出痰涎此收之之義也愚以爲太酸則燥先用黃蘗汁加元明粉少許灌喉中以弔其痰次用酢水仍前加元明粉灌之後用蜜湯潤之漸漸探吐其痰則咽喉間開利矣復以冰片散滋之無有不效若纏喉風用前三味不能探吐其痰宜用生桐油灌之鵝翎攪之再用蜜湯潤之急服牛黃清心丸或豁痰丸以墜其痰旋以二陳湯加減服之無不愈者若喉中聲出如雷嗆食眼脹天柱倒陷面黑臀焦鼻無氣息目睛突出汗出如珠者死若延及頸項頭面發腫紅如火光藥不能療急用磁鋒砭去惡血用雞子清調乳香末潤之立瘥再用芭蕉根汁潤之以解其毒若口舌腫大紫黑急用鍼點去血隨吹末藥甚效故序明之

呼者因陽出吸者隨陰入呼吸之間肺經主之喉嚨已下言六臟爲手足之陰咽門已下言六腑爲手足之陽蓋諸臟屬陰爲裏諸腑屬陽爲表以臟者藏也藏諸神流通也腑者府庫主出納水穀糟粕轉輸之謂也自喉嚨已下六臟喉應天氣乃肺之系也以肺屬金乾爲天乾金也故天氣之道其中空長可以通氣息但喉嚨與咽並行其實兩異而人多惑之蓋喉嚨爲息道咽中下水穀其喉下接肺之氣一云喉中三竅者非果喉中具三竅則水穀與氣各從一竅而俱下肺中肺下無竅何由傳送水穀入於下焦黃帝書云肺爲諸臟之華蓋藏眞高之氣於肺經也故清陽出上竅濁陰出下竅若世人不知保養風寒暑濕燥熱之六氣喜怒憂思悲恐驚之七情役冒非理百病生焉病瘍既成須尋所自若喉痹乳蛾纏喉風喉瘡喉閉風毒熱毒等證當刺則刺不可亂醫當吐則吐不可妄治此等證係性命之根本生死立見不識其標本而攻之失其法則禍不旋踵矣

丹溪云咽喉者一身總要與胃相接呼吸之所從出若胃膈蘊積熱毒致生風痰壅滯不散發而爲咽喉之病喉內生瘡或狀如肉赤肉爲腫窒塞不通吐嚥不下甚則生出重舌大法先去風痰以通咽膈然後解其熱毒遲則有不救之患又有熱毒衝於上齶而生瘡謂之懸癰及腑寒亦能令人咽閉吞吐不利宜用解施法或曰治法視火微甚微則正治甚則反治探痰出血隨所施治或於手大指少商穴出血行氣衝達於外者必外敷以藥予嘗以鵝翎蘸米酢繳喉中摘去痰涎蓋酸能收痰又能消積血乳蛾而不散者以小刀就蛾上出血皆用馬牙硝吹點咽喉以退火邪服射干青黛甘草桔梗黃芩山梔大黃白礬牛蒡子之類隨證佐利爲方以散上焦之熱外所敷藥如生地伏龍肝韭根皆可用若咽喉生瘡或白或赤者多血大率多是痰熱先以桐油吐之後用甘草湯解桐油之氣

纏喉風說

夫纏喉風屬痰熱咽喉裏外皆腫者是也外面無腫者必身發熱面赤此乃熱毒之氣極也外面有腫者身亦發熱邪火發外之原也或牙關不强外面不腫但喉中紅者曰暴感熱在心如左邊病退傳右邊此餘毒未盡故也咽喉有數證有積熱有風熱有客熱有病後餘毒未除變化雙乳蛾者且如病中喉間有腫紅色數日其光似鏡者此積熱也且如喉中有腫其色微白其形若臂者此風毒喉痹也此熱毒因而感風相搏而發故也或咽中有腫其色帶紫色者此乃客熱謂其人暴感熱毒之氣壅塞喉間須用木通元參生地黃芩黃連山梔仁瀉心經之火爲要或有傳變木舌者皆心熱蘊積於胃中故口中痰臭服劑

以凉膈爲要探藥以冰片散佐之或用小鈹刀點之以出紫血或風毒喉痹內外俱腫其故何也風毒之氣結於喉間則壅塞喉間乃風毒與痰相搏故也素問云無風則不動痰無痰則不受風風痰相搏結塞咽喉其外證咽喉形如雞子大其色微白外面腫上有腫其形似痛身發寒熱牙關緊強語聲不出者是也先用蘆汁加元明粉或蜜湯探取其痰急服荆防消毒散牙關腫處紫黑用小刀點破卽用冰片散吹之無不效驗

或蓮花重舌者其證熱乘風而發心火炎上之義治法同前

或病人瘡後口中臭腹中絞痛者何皆因熱毒積於髒家急用蘇子降氣湯服之

或病人瘡後喉中乾痛者何皆腎水枯涸心火衝上耗散津液先用麥門冬五味人參杏仁天門冬甘草天花粉生地當歸桔梗山梔仁之類噙以雙清丸

或病人瘡後氣短及聲不出者皆肺氣不行降氣湯多加前胡臨服加蘆汁以佐之若病後聲啞不言此乃肺經受刑百無一生

或風熱喉閉內外俱腫者謂其人久積熱毒因而感風風熱相搏發出外來則壅喉閒其人面赤腮腫身發寒熱喉中有塊如拳外血鮮紅先用玉字藥蜜調點之次用荆防消毒飲加減治之

或牙關緊強不得開者此皆風痰相搏壅塞咽喉先用木鍼排開或黃蘘菜汁或溫蜜湯或醋水俱下元明粉灌喉再用鵝翎攪之吐出痰涎幾椀外用五倍末醋調敷之急服荆防二陳湯再吹冰片散

或喉中有瘡其色帶黃探痰同前用小刀點瘡上出膿後卽吹冰片散宜服鳳黏子解毒湯

或風熱喉閉其因皆由病人久積熱毒因而感風風熱相搏故爾發外治法同前

或虛陽上攻由於久病元氣虛弱邪火上行咽喉腫痛上下不升降水火不既濟心火衝喉故腫痛而閉塞其形若何語聲不出牙關緊急痰涎滿口手足厥冷頭目昏眩者是也治法如前

或厥重不省人事目張直視可用茶黃研爛醋調塗脚心然後用降氣湯治之氣喘加前胡烏藥氣短加沉香人參待手足溫飲薄粥以斂元氣入穀則昌絕穀則亡此之謂也

或腮頷浮腫外面赤者此必感於風毒急用紫蘇楓葉柏枝煎湯洗之外用荆防羌活湯以祛其風或十宣散

或病人手足厥冷口脣搖動者宜用小續命湯薑棗煎熱服

或病傳右畔者餘毒未除急服牛蒡子湯降氣湯加減治之

或口中乾夜間潮熱不得睡臥時發譫語舉足妄動者用十味人參散主之地松汁亦妙穀精草碾末吹之小青草汁亦妙雄黃元明粉白礬爲末吹之吐痰

或病後夜間不得睡津液少者杏蘇膏或人參酸棗仁湯治之

或虛陽上攻上下不升降水火不既濟腰冷不知痛癢口中痰多唇黑者不治

或前證口中紅活吐得血又有痰涎喘息面青者不治

或前證手足冷者聲音不響喉中無腫乾痛者不治

或前證手足冷不能自收頸低不能自舉眼昏暈暗者不治

或舌卷大不得吞嚥皆由熱毒衝上急用紫雪加腦麝搽舌上再用冰片散吹之

或咽喉有膿後生重舌此兩經受病俱有邪也心邪發於舌下胃邪出於喉嚨蓋因喉間之邪鬱起於心經之邪則其病俱發外證頭疼項强身發潮熱者是也探痰法同前再用紫雪冰片散等治之

若傷寒十餘日已上病後煩滿咽喉痛舌卷而卵縮者不治

若十餘日已上病不解傳變咽喉痛外證脣青舌卷者此病屬厥陰經受病也難治咽喉乾痛無痰不治咽喉痛而脣卷不治咽喉痛而頭出汗不治口中黑者難治鼻中塞者不治

或咽喉有腫兼舌上生瘡此心經受熱也邪熱存心日久則爲喉閉餘毒干心則舌生瘡也須用冰片散元參升麻湯加減治之其形如楊梅故謂之重舌或酒毒喉閉酒毒蒸於心脾二經則壅咽喉其人面赤而目睛上視者是也取痰法如前再用冰片散吹之清凉散飲之

或口中卒然有腫轉服轉大此名飛痧也漸至殺人用小刀點出血鳳黏子解毒加紅花牡丹皮惡心腹脹滿者難治

大凡男婦治法一般惟女人喉中有腫而色紅者此月經不調也經不能行則壅塞於上故咽腫痛也蓋

由榮衛不和但男子以氣爲主女人以血爲主男婦各隨其氣血之分調治宜調榮湯可也如病勢重其色微白脚冷者此虛陽上攻宜服降氣湯探痰吹藥同前婦人有孕心頭痛者不治

或牙關緊強不得開心頭悶亂氣絕者可用皂角末吹喉中

或婦人產前咽喉痛而脈浮者不治面赤而目睛上視者不治面黑頭汗出者不治心胃緊滿吐痰不出者不治自利不治氣促四肢厥冷不治心中怔忡胃前紅甚舌卷面赤目上視者不治血氣攻心欲絕面紅不治自利喘不治手足厥冷不治潮熱往來時發譫語不治胃腹脹急不治喉中或雷聲或噫食不治

或婦人傷寒身發潮熱咽痛者此經行上也活人書云婦人傷寒經水適來晝則明了暮則譫語如見鬼神狀此乃熱入血室無犯胃氣及上二焦不可下也小柴胡湯主之今咽喉痛而潮熱往來面赤唇紅者此熱邪上壅也不用小柴胡湯宜用竹葉石膏湯清上膈除心煩所以爲妙次用四物湯

或傷寒病四五日發熱鼻乾口燥咽喉痛者陽明自病也陽明屬胃汗多則胃汁乾故津液不能潤咽而乾痛也宜用人參敗毒散主之

或傷寒三五日咽喉中有腫其色鮮紅痰涎自出頭痛項强須知屬太陽經邪氣入於經絡觸動心間但積熱之毒攻咽則咽喉腫痛甘桔湯內加牛蒡子元參生連之味吹藥同前

或傷寒八九日已上身無潮熱腹痛自利而咽喉痛者此太陰經受病也傷寒得汗已不解轉入太陰腹滿時痛自利而咽喉腫痛其色微白此證可治如手足厥冷自利不止者用真武湯主之所謂真武者能補下元助陽正氣以手足和煖爲妙經云但要口中紅活有痰可治宜隨證加減用藥若口中黑則血已枯乾聲啞目上視汗出者不能治矣切宜仔細看證

或傷寒八九日已上得汗已不散喉嚨痛舌乾脣燥者此少陰經自病也太陰經受病得汗後未解傳入少陰經屬腎汗多則腎汁乾其腎水不能潮潤咽喉故其病也如白利腹中痛手足厥冷咽中腫痛不可吞嚥如無涎唾及舌上乾者不治

或病人八九日已上身微溫無他證但喉中痛而無腫聲啞者不治

或傷寒十餘日已上得汗已病解無潮熱脈平靜而咽喉痛者此餘毒上攻也宜用黏子解毒湯

或陰毒傷寒身體重背强眼痛不堪任小腹急痛口青黑毒氣衝心四肢厥冷惡心吐逆咽喉不利脈沉細若能速灸臍輪下六日之內全愈否則難生

此證外面證如蛇纏頸身發潮熱頭目大痛其腫紫色依總論治之前吹藥內加雄黃腦麝服荊防黏子二陳湯急用鵝毛蘸燈窩濁油攪去痰涎三四椀方活如痰不能去難生矣須要避風內證紅絲白色壅塞不見咽喉皆因腎經有熱水枯不能上潤致令心火盛故發此證服敗毒散并探吐法仍用吹喉藥吹三五次又用白地松根酢搗汁漱出風痰如喉開雷響者不可治切宜仔細

雙乳蛾

咽門分兩路其受病不同左咽軟主吞嚥右喉主出聲經云喉能布氣咽能嚥物故喉中病總而言之故謂之咽喉醫者可別而治之其證種種各類其狀各各不同切宜仔細詳審

雙乳蛾亦名雙蛾風有兩枚在喉間兩邊如豆大急將黃蘗汁蜜少許加元明粉漱出風痰仍服當歸連翹散雄黃化毒丸七丸茶清送下次用冰片散吹入數次立效後服當歸連翹散

單乳蛾

左畔虛陽上攻其腫微紅者苦肺氣逆外證手足厥冷痰涎自出頭重目昏急用薺菜酸汁加元明粉灌之旋去痰涎即吹冰片散再服蘇子降氣湯二陳湯甘桔湯如厥重不省人事氣欲絕者急以茶黃研爛酸醋調塗脚心

右畔虛陽上攻其色微黃其形若蠶繭之狀故謂之乳蛾其證亦手足厥冷治法同前倘腰痛加乾薑赤芍藥

酒毒

其形若雞子其腫鮮紅其光如鏡外證發熱惡寒頭痛項强此上焦積熱心脾受之蓋心脾二經主上焦宜服黏子解毒湯治法同前

其腫黃其血黑其形若臂其腫若坎外證面赤目睛上視此乃熱毒傷於心脾二經之氣逼於口循環上下故咽喉痛治法先取其痰次用冰片散乾吹風黏子湯多加乾薑天花粉生黃連山梔仁連翹元參桔梗枳殼

風毒

外赤腫內腫微紅帶白色其形似蒸餅連腮腫痛外

證身惡寒而無熱腮頷浮腫牙關緊强此乃風痰相搏結塞喉間治法必以去痰爲要吹藥吹之若外面紅腫用圍藥敷之中留一大孔再潤之以助藥力

風熱

其腫紅而微紫其形如拳其人面赤而目上視外證壯熱惡寒儼若傷寒此病人久積熱毒因而感風所致如病人聲音不響宜用潤肺之藥治之

此證之起由於憂思勞碌太過或對風言語風入肺經作痰務多去痰爲要其色鮮紅久而紫赤急用小鉼刀點之或用蘆刀點之血微出火已瀉矣再服煎劑幷冰片散吹之甚效凡紫赤色變成淡紅色者愈之漸也

陰毒

腫如紫李見黑色其色光血紅可治陰毒血黑不治外證惡寒其身瞤動振腰痛脚冷此冬月感陰濕火邪相干也其血微紅及腫處軟喉中有痰可治血紅黑甚腫硬喉乾難治先服五福化毒丹次以蘇子降氣湯再吹冰片散一月之內戒酒

積熱生癰

其腫如黃糖李微黃上面紅絲外證項上痛齒疼此胃經受熱胃氣通於喉嚨故患喉癰探痰法同前吹藥冰片散加元明粉煎藥加當歸黃芪倍黃芩

啞瘴風

此啞瘴者風痰犯於咽膈之間以此口不能言牙關不開急用蟾酥磨水滴入鼻孔即開隨用桐油滴入喉中仍將鵝毛攪喉間風痰出盡再用甘草湯解桐油之氣即用冰片散吹之更服荊防敗毒散連進三服

如若面紫舌青脣黑鼻流冷涕爪甲俱青目中多淚者不可治

弄舌風

此證啞不能言舌出常將手撚弄急將兩手大指側爪甲縫用三稜針每指刺三針有血可治無血不治若針少商穴亦妙用銅匙排開口用膽硝丹吹入喉中燈窩內油脚再用鵝翎蘸攪出痰涎仍服雄黃化毒丸七丸茶清送下後服疏風甘桔湯再用冰片散頻吹之

腫閉

此毒起於脾經因食煎煿油膩等物及飲酒太過而行房事以致毒氣不能流行聚結於喉根若不速治潰毒閉急即死治法先用酢水虀汁攪去痰涎即用吹喉藥吹數次後服八正順氣散

喉節

此證生於鳩尾之中初起如梅核在喉膈之間吐不出咽不下至三日漸上喉節之間名爲喉節其疾須用刺破後用膽硝丹吹入喉中再用雄黃化毒丸吞下七丸仍用四七氣湯連進五服再用冰片散吹之

氣壅閉

此證爲因聚毒塞於喉間痰涎稠實發寒熱者仍分上中下三關毒在下關者難治上中二關用吹喉藥吹數次茶湯送下雄黃化毒丸七丸然後服參苓順氣散

嗆食風

此證因熱毒在於心經咽喉燥而無痰若嗆者不可治用川桔散如落心肺間刺痛者仍用當歸連翹散加大黃利下如久不治變爲飛絲勞毒能傷人命

七情生癰

此毒因喜怒憂思悲恐驚以傷七情鬱結成癰毒生喉間若不速治恐毒氣內攻喉骨若出必致口內出膿雖不傷命即成冷瘻終身之痼疾也宜十奇散治之

脚跟風

此證脚跟發起至於喉間或一年發一次半年發一次切忌熱物不得傷於怒氣其病一日行一穴至七日行七穴雖然不妨只是要發用吹喉藥仍服敗毒散如腥惡發泡者死

喉閉

此證因外感寒邪內傷熱物或大寒後便入熱湯洗故將寒氣逼入肺經冷氣阻於中脘邪氣熱客於心經故生此疾急用三稜鍼刺手腕中紫筋上或少商穴出血却將雄黃化毒丸冷茶磨化灌之仍將冰片散吹入喉中待漱出風涎稠痰爲愈更服八正順氣散後服玉樞丹

生瘤

喉瘤生於喉間兩旁或單或雙形如圓眼大血絲相裹如瘤故名之此證肺經受熱多語損氣或怒中高喊或誦讀太急或多飲燒釅酒或多噉炙煿物犯之即痛不犯不痛須要斂神晏息以藥攻之則此證脫落矣不可用刀點破宜服益氣疏風湯吹麝香散

懸癰

此毒生於上齶形如紫李墜下抵舌其人口不能言

舌不能伸頭不能低仰面而立鼻中時出紅涕若不速治毒入於腦即死治法用銅匙挑開口竹批針破癤頭用鹽湯搜淨血出盡用冰片散吹入患處閉口以待藥化自然嚥下連吹三五次仍服荊防敗毒散再服雄黃化毒丸三次冷茶清下此證形雖注外其實生口中上齶

鎖喉瘡

鎖喉瘡者心經毒氣小腸邪風發於懸會之端注於懸癰之側初生如瘰癧不能飲食閉塞難通漸次腫破化膿早治得生宜服當歸連翹散之類內用冰片散牛黃清心丸之類治之蜣蜋不拘以麝香冰片和搗搽之

傷寒遺毒喉閉

此證傷寒遺毒不散致八九日後喉閉皆因熱毒入於心經脾經急服四七氣湯二三貼次用冰片散後服竭毒流氣飲

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百八十一卷目錄

醫部彙考一百六十一

咽喉門二



朱肱活人書 伏氣之病
楊士瀛直指方 理一分殊 懸癰 梅核氣 尸咽 蛟賊 來痛 生瘡
嚴用和濟生方 論治
劉完素六書 癰腫
成無己明理論 痛癢閉塞
張從政儒門事親 咽喉風 懸癰
朱震亨心法 痰病 痰吸風
危亦林得效方 孔竅 喉風 懸癰
虞摶醫學正傳 總論
戴思恭證治要訣 肺病
楼英醫學綱目 病因生病諸證
李梴醫學入門 內吸病 指吸火 火吸虛證 吐法 大劑發之 關膈法
方賢奇效良方 總論
張三錫醫學準繩六要 腫痛
薛己醫案 病因諸證
龔信古今醫鑑 梅核氣 癰腫乳蛾
王肯堂證治準繩 喉痺 結喉癰
趙獻可醫貫 腫痛論治
吳昆醫方考 喉閉方論
陳實功外科正宗 論證 看法 治法 喉癰
張介賓景岳全書 論證 論治
石室秘錄 腫痛 乳蛾

朱朱肱活人書

伏氣之病

伏氣之病謂非時暴寒中人伏於少陰經始不覺旬月乃發先發咽痛大必下利脉微弱古謂之腎傷寒宜用半夏桂甘湯

楊士瀛直指方

理一分殊

咽者胃之系喉者肺氣之所通咽以嚥物喉以候氣理一而分殊也

懸癰

咽喉懸癰關要所係病不急療皆能殺人懸癰生於上齶又關於咽喉所以暴腫者抑亦熱氣使然也

梅核氣

七情氣鬱結成痰涎隨氣積聚堅大如塊在心腹間或塞咽喉如梅核粉絮模胳不出嚥不下每發欲絕逆害飲食宜四七湯

男女或有胷喉間有梅核之恙者觸事勿怒飲食勿冷

尸咽

尸咽者陰陽不和脾肺壅盛風熱毒氣不能宣通故令尸蟲發動上蝕於喉或痒或疼如匿之候也與傷寒孤惑同當互參之

殺賊

上焦而咽啗腫脹也
成無己明理論
痛癢閉塞
咽喉不利或痛或癢不可納食皆毒氣上衝所致經曰太陽病下之脉緊者必咽痛以太陽之邪搏於少陰也少陰之脉循喉嚨挾舌本少陰咽痛脉浮遲厥冷或吐利亦屬少陰並不可汗下用桔梗湯猪膚湯甚者半夏散通脉四逆湯去芍藥加桔梗汗不止蠟本溫粉撲之咽中生瘡不能言語聲不出者苦酒湯若傷寒六七日大下後寸脉沉遲尺脉不至咽喉不利唾血膿手足厥利不止者難治宜麻黃升麻湯腎傷寒一證乃非時暴寒伏於少陽之經頭痛腰痛脉微弱初咽痛以傷寒後必下利咽痛半夏桂枝湯卽半夏散四逆湯
咽中閉塞烏扇湯口瘡赤爛蜜浸黃蘗嚥咽痛甚者升麻六物湯
元張從政儒門事親
咽喉說
喉舌緩急砭藥不同咽與喉會厭與舌此四者同在一門而其用各異喉以候氣故喉氣通於天咽以嚥物故咽氣通於地會厭與喉上下以司開闔食下則吸而掩氣上則呼而出是以舌抵上齶則會厭能閉其咽矣四者相交爲用闢一則飲食廢而死矣此四者乃氣與食出入之門戶最急之處故難經言七衝門而會厭之下爲吸門及其爲病也一言可了一言者何曰火內經曰一陰一陽結謂之喉痹王太僕註云一陰者手少陰君火心主之脉氣也一陽者手少陽相火三焦之脉氣也二火皆主脉並絡於喉氣熱則內結結甚則腫腫甚則痹痹甚而不通則死矣夫足少陰循喉嚨挾舌本手少陰上俠咽此二者誠是也至於足陽明下人迎循喉嚨足太陰俠咽連舌本手太陽循咽下膈足厥陰循喉嚨之後此數經皆言咽喉獨少陽不言咽喉而內經言一陰一陽謂之喉痹何也蓋人讀十二經多不讀靈樞經中別十一篇具載十二經之正其文云足少陽之正繞髀入毛際合於厥陰別者入季脅間循胃裏屬膽散之上肝貫心以上俠咽出頤頷中散於面繫目系合少陽於目外眥也又手心主之正別下臑液三寸入胃中別屬三焦出循喉嚨出耳後合少陽完骨之下是手少陽三焦之氣與手心主少陰之氣相合而行於喉嚨也推十二經惟足太陽別項下其餘皆湊於喉嚨然內經何爲獨言一陰一陽結爲喉痹蓋君相二火獨勝則熱結正絡故痛且速也余謂一言可了者火是也故十二經中言窒乾嗌痛咽腫頷腫舌本強皆君火爲之也唯喉痹急速相火之所爲也夫君火者猶人火也相火者猶龍火也人火焚木其勢緩龍火焚木其勢速內經之言喉痹則咽與舌在其間耳以其病同是火故不分也後之醫者各詳其狀強立八名曰單乳蛾雙乳蛾單閉喉子舌脹木舌脹纏喉風走馬喉閉熱氣上行結薄於喉之兩旁近外腫作以其形似是謂乳蛾一爲單二爲雙也其比乳蛾差小者名閉喉熱結於舌下復生一小舌子名曰子舌脹熱結於舌中舌爲之腫名曰木舌脹木者強而不柔和也熱結於咽項腫邊於外且麻且癢腫而大者名曰纏喉風喉痹暴發暴死者名走馬喉痹此八種之名雖詳若不歸之火則相去遠矣其微者可以鍼熨之而大者以辛散之今之醫者皆有其藥也如薄荷烏頭殭蠶白礬砒硝銅綠之類也至於走馬喉痹何待此乎其生死人反掌之間耳其最不誤人者無如砭鍼出血血出則病已易曰血去惕出良以此夫昔余以治一婦人木舌脹其舌滿口諸藥不愈余以鉼鍼小而銳者砭之五七度腫減三日方平計所出血幾至盈斗又治一男子纏喉風腫表裏皆作藥不能下余以涼藥灌於鼻中下十餘行外以拔毒散敷之陽起石燒赤與伏龍肝各等分細末每日以新水掃百遍三日熱始退腫始消又嘗治一貴婦喉痹益龍火也雖用涼藥而不可使令服爲龍火宜以火逐之人火者烹餌之火是也乃使暴於烈日之中登於高堂之上令侍婢擽火爐坐藥銚於上使藥常極熱不至大沸通口時時呷之百餘次龍火自散此法以熱行寒不爲熱病扞格故也大抵治喉痹用鍼出血最爲上策但人畏鍼委曲旁求瞬息喪命凡用鍼而有鍼堪者宜揭生薑一塊調以熱白湯時時呷之則瘡口易合鍋人中亦有灸法然病微者可用病速者恐遲則殺人故治喉痹之火與救火同不容少待內經火鬱發之發謂發汗然咽喉中豈能發汗故出血者乃發汗之一端也後之君子毋執小方而曰吾藥不動臟腑又妙於出血若幸遇小疾而獲功不幸遇大病而死矣毋遺後悔可矣
朱震亨心法
痹痛

喉痹大概多是痰熱重者用桐油探吐
咽喉生瘡痛是虛熱血虛多屬虛火游行無制客於咽喉也用人參荆芥蜜炙黃蘗
虛火用人參竹瀝血虛四物加竹瀝
實熱者黃連荆芥薄荷硝蜜薑汁調噙化或用倒滴刺根淨洗入些少好酒同研滴入喉中痛立止
喉痛必用荆芥陰虛火炎上必用元參
咽喉痛硼砂或和膽礬白殭蠶白梅肉和含又必用荆芥元參

纏喉風

纏喉風屬痰熱戴思恭謂其咽喉裏外皆腫者是也
纏喉風喉閉之證皆由腦間素有痰涎或因酒色七情不節而作火動痰上壅塞咽喉所以內外腫痛水漿不入可謂危且急矣
纏喉風之證先兩日胃脘氣緊出氣短促忽然咽喉腫痛手足厥冷氣閉不通頃刻不治危亦林得效方

乳蛾

單蛾風者其形圓如小筯頭大生於咽喉關上或左或右關下難治雙蛾風者有兩枚在喉關兩邊亦圓如小筯頭大關下難治

纏喉風

纏喉風自耳邊過順下赤兎者是也大概內外皆腫者爲纏喉風
凡咽喉閉毒氣歸心胃前脘滿氣煩促下部洞泄不止者死

懸癰

懸癰謂之帝鍾懸癰腫而垂下有長數寸者謂之帝鍾風宜用鹽礬散不可鍼破鍼則殺人

明虞搏醫學正傳

總論

內經曰一陰一陽結謂之喉痹王注謂一陰卽厥陰肝與包絡是也一陽卽少陽膽與三焦是也四經皆有相火存焉叔和曰膽與三焦尋火治肝和包絡都無異東垣曰火與元氣不兩立一勝則一負蓋元氣一虛則相火隨起而喉痹等病暴作矣夫喉之爲會厭者經謂之吸門是也以其司呼吸升降爲人身緊關之橐籥門戶也若夫卒然腫痛水漿不入言語不通死在須臾誠可驚駭其會厭之兩旁腫者俗謂之雙乳蛾易治會厭之一邊腫者俗謂之單乳蛾難治古方通謂之喉痹皆相火之所衝逆耳經曰一水不能勝二火又二水不能勝五火甚言其眞水之易虧而相火之易動也如大怒則火起於肝房勞則火起於腎飲食失節則火起於脾胃之類是故知火者痰之本痰者火之標火性急速故病發則暴悍治之之法必先大滌其痰或以金鍼刺其腫處此急則治標之法也用藥必須以內經從治之法而以桔梗甘草元參升麻防風羌活荆芥人參白朮茯苓之類少加乾薑附子等藥爲嚮導徐徐頻與不可頓服此爲治之大法也切不可驟服寒涼之藥非徒無益而且促其死耳俗人未諳此理而峻用黃芩黃連梔子莧蘗之類而正治之又甚者雜進以大苦寒等劑類與頓服但覺腫勢稍退語言略通而醫者病者皆爲覆效而喜殊不知上熱未除中寒復生其毒氣乘虛而入腹中漸而至於發喘不休不可治矣良可歎哉外有天行一種名曰大頭病俗呼爲捏頭瘟其證甚爲凶惡染此證者十死八九宜推運氣治之治法亦不甚相遠也東垣普濟消毒飲子甚妙實爲百中之劑學者再宜詳究而擴充之務活人於斯世也幸甚

戴思恭證治要訣

腫痛

咽痛宜甘桔湯熱毒上攻或有瘡或無瘡服甘桔湯不效者宜甘桔湯中加荆芥一錢半名如聖湯或如聖湯中更加連翹一分防風半分或甘露飲仍用碧雲散旋旋煎點間用鹽水吞養正丹兼以薄荷羹雞蘇丸含化
有咽疼服冷劑反甚者宜用薑汁
有內熱熱形於上焦以致咽疼宜用黃蘗皮黃連大黃研末水調塗在足心與患處此出於葉氏方書
熱壅咽痛或嗽中帶血者宜金沸草散佐以辰砂化痰丸咽喉痛用諸冷藥不效者宜枳南湯
喉痹作痛腫滿不能言咽中生物名喉風宜甘桔湯若熱壅上焦咽喉疼痛而吞嚥乾物不若常時之潤腫覺口舌全無津液者如聖湯加人參半錢元參七分或佐以碧雲散雞蘇丸有上證兼心頭煩躁辰砂五苓散凡上壅並宜縮砂殼燒灰存性研末水調服之

樓英醫學綱目

痹痛生瘡諸證

凡經云喉痹者謂喉中呼吸不通言語不出而天氣閉塞也云咽痛云腫痛者謂咽喉不能納唾與食而

地氣閉塞也云喉痹咽嗌痛者謂咽喉俱病天地之氣並閉塞也蓋病喉痹者必兼咽嗌痛病咽嗌痛者不能兼喉痹也

喉痹惡寒及寸脈小弱於關尺者皆爲表證宜甘桔湯半夏桂枝甘草湯詳寒熱發散之若水漿不得入口者用解毒雄黃丸四五粒以極酸醋磨化灌入口內吐出痰涎却服之間以生薑自然汁一蜆殼嚥下之神效

按喉痹惡寒者皆是寒折熱寒閉於外熱鬱於內薑汁散其外寒則內熱得伸而愈矣切忌膏糜酸寒等劑點喉反使其陽鬱結不伸又忌硝黃等寒劑下之反使其陽下陷入裏則禍不旋踵矣韓祇和云寸脈弱小於關尺者宜消陰助陽東垣云兩寸脈不足乃陽氣不足故用表藥提其氣升以助陽也或三部俱小弱亦可用其法也

喉痹鄉村病皆相似者屬天行運氣之邪治必先表散之亦大忌酸藥點之寒藥下之鬱其邪於內不得出也其病有二

其一屬火經云少陽所至爲喉痹又云少陽司天之政三之氣炎暑至民病喉痹治宜仲景桔梗湯或面赤斑者屬陽毒宜陽毒諸方汗之

其二屬濕經云太陰之勝火氣內鬱喉痹又云太陰在泉濕淫所勝病嗌腫喉痹治宜活人半夏桂枝甘草湯或面青黑者屬陰毒宜陰毒諸方汗之

洪武戊辰春鄉村病喉痹者甚衆蓋前年終之氣及當年初之氣二火之邪也予累用甘桔湯加黃連半夏殭蠶鼠黏子根等劑發之挾虛者加參芪歸輩水漿不入者先用解毒雄黃丸酢磨化之灌喉痰出更用生薑汁灌之却用土項棄無不神驗若用膽礬等酸寒點過者皆不治蓋邪鬱不出故也

喉痹不惡寒者及寸脈大滑實於關尺者皆屬下證宜硝石青黛等寒藥降之或白礬等酸劑收之也韓祇和云寸脈大於關尺者宜消陽助陰東垣云兩寸脈實爲陰盛陽虛下之則愈故予每用此法治急喉痹如鼓應桴或三部俱實亦可用其法也

急喉痹其聲如鼾有如痰在喉響者此爲肺絕之候速宜參青救之用薑汁竹瀝放開服如未得參青或先煎獨參湯救之服早者十全七八次則十全四五遲則十不全一也

咽痛有陰氣大虛陽氣飛越痰結在上遂成咽痛脈必浮大重取必濇生死爲近宜補陰陽人參一味濃煎湯細細飲之

咽痛多虛火游行無制客於咽喉宜用人參蜜炙黃蘗荊芥治之

李梴醫學入門

咽喉病皆屬火

咽喉氣之呼吸食之出入乃人身之門戶也後世有一十八種之名其類雖繁同歸於火蓋少陰君火少陽相火二脈並絡於咽喉君火勢緩則熱結而爲疼爲腫相火勢速則腫甚不仁而爲痹痹甚不通而痰塞以死矣故曰一陰一陽結謂之喉痹一陰肝與心包一陽少陽三焦四經皆有相火火者痰之本痰者火之標故言火則痰在其中矣言咽喉則牙舌亦包在其中矣

火分虛實

實火因過食煎炒蘊熱積毒煩渴二便閉濕風痰上壅將發喉痹必先二日曾腸不利脈弦而數治宜先去風痰而後解熱毒涼膈散加黃連荊芥石膏或古荊黃湯防風通聖散三黃丸含化又風燥咽喉乾枯常如毛刺吞嚥有礙敗毒散加黃芩半夏倍桔梗薄荷生薑煎服痰盛加石膏凡服此藥子服午攻午服子攻如嘔吐咯傷因食熱物及穀芒刺濕風熱併與血氣相搏腫痛者消風散加薄荷元參全蠍或射干湯牛蒡子湯木舌重舌者如聖膠金錠舌根腫者麝香硃砂丸時行咽痛者普濟消毒飲子

虛火因飲酒則動膈火忿怒則動肝火色慾則動腎火火炎上攻咽膈乾燥必二便如常少陰脈微治宜補虛降火血虛者四物湯加桔梗荊芥如母黃檗氣虛者四君子湯加甘草桔梗元參升麻甚則乾薑附子以爲向導徐徐服之如痰盛者二陳湯料入青魚膽一箇其膽先以糯米入內陰乾爲末薑汁調服亦可探吐或千緡湯會服涼藥自利或聲音有壞者祕傳降氣湯救之

暴感風寒則咽喉緊縮妨礙者紫梗半夏湯指膚湯腎傷寒及陰證者半桂湯蜜附子

通用甘桔湯利膈湯冰梅丸犀角琥珀膏或單百草霜爲末蜜丸彈子大每三丸新汲水化服凡咽喉不可純用涼藥取效目前上熱未除中寒復起毒氣乘虛入腹胃前高腫上喘下澼手足指甲青紫七日以後全不入食口如魚口者死

徹吐法

繳法用青魚膽末繳三次紅腫即散

吐法用冬月青魚膽以枯礬入內臨用加百草霜炒鹽少許酢調以鵝毛蘸藥引吐痰盡如無魚膽用白礬半斤巴豆肉十枚同枯過去巴用引吐痰神效吐後用金鎖匙吹之常服甘桔湯最妙如牙關緊者用後開關藥或二仙散不省人事者一字散

火鬱發之

火鬱發之謂發汗也咽瘡忌汗最不誤人惟砭針出血即汗之之義也血出多則愈有針瘡者薑汁調熟水時時呷之畏針者委曲針之凡關上血泡最重關下不見者令病人含水一口用蘆管削尖入鼻孔刺出血妙惟腎傷寒及帝鍾腫者忌針用蛇牀子於瓶中燒烟令病人吸入喉中即愈

開關法

雄黃解毒丸龍腦破毒散玉鑰匙或用巴豆壓油紙上取油紙撚成條子點燈吹滅以烟熏入鼻中一時口鼻涎流牙關自開一方用巴豆肉以絲裹定隨左右塞於鼻中左右俱有左右俱塞立透蓋方中以巴豆治走馬喉痹者以熱攻熱熱則流通之意也

喉痹失音

喉痹失音者祕傳降氣湯去陳皮加黃芩風寒失音者甘桔湯加訶子木通入生地汁潤之或訶子散血虛受熱咳嗽聲嘶者用青黛蛤粉蜜調含化或潤肺丸蜜脂煎尋常聲音不清者加味固本丸內傷虛損咽瘡失音者無治法

方賢奇效良方

總論

戴人云咽與喉會厭與舌此四者同在一門而其因各異咽以納氣故咽氣通於天喉以納食故喉氣通於地會厭與喉上下以司開闔食下則吸而掩氣上則呼而出是以舌抵上齶則會厭能閉其咽矣四者相交爲用缺一則飲食廢而死矣此四者乃氣與食出入之門戶最急之處故爲病也爲咽痛喉痹之證是以難治輕者或治而愈甚者雖治必殆矣內經曰一陰一陽結謂之喉痹王注曰一陰者手少陰君火心主之脈也一陽者手少陽相火三焦之脈也二火皆主脈竝絡於喉氣熱則內結甚則腫脹腫脹則甚甚則痹痹甚而不遍則死矣非惟二脈繫此爲病以十二經推之惟足太陽別下項其餘皆湊於喉嚨惟君相二火獨勝則熱結正絡故痛且速也故十二經中言嗌痛咽腫頷腫舌本强皆君火爲之也惟喉閉急速相火之所爲也夫君火者猶人火也相火者猶龍火也人火焚木其勢緩龍火焚木其勢速經言喉痹則咽與舌在其中矣以其病同是火故不分也後之學者各詳其狀今列咽喉一十八證一曰單蛾風其形如圓小筯頭生於咽喉關上或左或右可治生於關下者難治二曰雙蛾風生兩箇在喉關兩邊亦圓如小筯頭大或生關下者難治三曰蟬舌風又名子舌自舌下再生重舌者是也四曰牙蜞風牙齦上腫盛聚毒成瘡者是五曰木舌風其舌漸漸長大相似煑熟猪舌不能轉動六曰舌黃風自舌上腫痛黃色七曰咬牙噤風牙盡頭作礬口噤不開八曰魚口風如魚吸水者不治九曰聚毒塞喉風喉關聚毒涎唾稠實發寒熱仍分上下關上者依法治療關下者難治十曰懸蜞蠱毒風上眶腫食而不能掩水外形腫如雞卵十一曰嗆食風又名飛絲毒口中或食腥膾之惡物發泡者十二曰獵頰風腮頰結腫者是牙盡處腫破十三曰纏喉風風自頤邊過頤下赤色者是亦有寒熱甚者危殆十四曰松子風口內滿喉赤如猪肝張口吞物則氣逆關閉飲食不能者用吹喉藥或絳雪點腫處輕者退甚者喉關響急不治十五曰崩砂甘口風自舌下牙齦上下腫赤口內作礬如湯熱牙齦漸甚爛者亦能脫齒十六曰連珠風自舌下起初起一箇又起一箇甚者三五七九箇連珠者是也十七曰蜂子毒或在腮臉洋爛或在喉關舌下作礬其色黃如蜂者是十八曰走疰瘰癧風頸項結核五七箇皮膚赤腫作寒熱者惟木舌者木强而不柔和也熱結於喉腫邊於外且痲且痒腫而大者名曰纏喉風喉痹暴發暴死者名走馬喉痹於十八證之名雖別而爲治若不歸之於火則相去遠矣其微者可以鹹耎之其大者可以辛散之治此疾者世之有方如薄荷烏頭殭蠶白礬砂硝銅綠之類至如走馬喉痹何待此乎其死生如人一反掌之間耳其最不誤人者無如砭針出血血出則病已但人畏針委曲旁求若執不從瞬息喪命凡用針時喉中嗆者宜搗生薑一塊入熱白湯時時呷之則嗆隨止治喉痹之疾如救火之法同豈可容易哉諸書治驗木舌脹者急以鉼針小而銳者砭之五七度出所藏血而愈纏喉風腫藥不能下者以凉藥灌鼻中吐之外以拔毒散之劑敷之熱退腫消而已喉痹龍火也雖用凉劑常令煎極熱時時呷之此藥以熱行寒不爲熱病

扞格故也又當以鍼針刺少商穴出血而愈後之葉
醫者須分人火龍火之病用藥無不取效矣

張三錫醫學準繩六要

腫痹

咽以嗌物喉以候氣其體清虛不容一毫濁物難經
曰三焦之氣通於喉嚨之聲則發矣然三焦屬相
火火爲病最速故卒然喉中腫塞古謂之喉痹是也
亦有胃中痰火泛上腫塞爲患者大抵暴起必是痰
火取吐爲急惟針刺去毒血爲妙昧者不知畏首畏
尾多致悞事是不明正理也

薛己醫案

痹痛諸證

丹溪先生云咽痛屬血虛用四物加竹瀝陰虛火上
炎者必用元參氣虛加人參竹瀝又云咽喉腫痛有
陰虛陽氣飛越痰結在上者脈必浮大重取必澀去
死爲近宜人參一味濃煎細細飲之如作實證治之
禍在反掌此發前人未發救無窮之天枉余更以上
焦風熱積熱及膀胱陰虛等證一二於後

疼痛或寒熱者邪在表也宜發散

腫痛痰涎壅盛者邪在上也

痛而脈數無力者屬陰虛宜滋陰降火

腫痛發熱便閉者表裏俱實病也宜解表攻裏如證
緊急更刺患處或刺少商穴

蕭山先生云喉痹不惡寒及寸脈洪大滑實於關尺
者皆屬下證宜硝石青黛等寒藥降之或膽礬等酸
劑收之韓懋和先生云寸脈大於關尺者宜消陽助
陰東垣先生云兩寸脈實爲陽盛陰虛下之則愈故
余算此法以治前證如鼓應桴也

陳藏器曰治臟寒咽閉吞吐不利用附子去皮臍剉
製以蜜塗炙令蜜入內嚥之勿嚥云甚效

龔信古今醫鑑

梅核氣

梅核氣者窒碍於咽喉之間咯不出嚥不下如梅核
之狀是也始因喜怒太過積熱蘊釀乃成痰涎鬱結
致斯疾耳宜加味四七湯加味二陳湯

痹腫乳蛾

熱結咽喉腫邊於外且痛且痺腫而大者名纏喉風
喉閉而暴發暴死者名走馬喉痹

乳蛾乃熱氣上行薄於喉之兩旁近外腫作以其形
似乳蛾一爲單二爲雙又其乳蛾之差小者名喉閉

王肯堂證治準繩

夾喉疽

或問喉之兩旁生疽何如曰此名夾疽屬手少陰心
經足太陰脾經足厥陰肝火熱毒上攻而然宜琥珀
犀角青犀角散黃連消毒飲活命飲加元參桔梗黃
連內潰者難治虛火上升痰壅飲食不進者死

結喉癰

或問當結喉生癰何如曰是名喉癰又名猛疽以其
勢毒猛烈可畏也屬任脈及手太陽手少陰經積熱
憂憤所致急宜清熱攻毒用琥珀犀角青及黃連消
毒飲紫金丹烏金散選用壯實者一粒金丹下之若
過時不治潰穿咽嗌者死

趙獻可醫貫

腫痛論治

喉與咽不同喉者肺脘呼吸之門戶主出而不納咽
者胃脘水穀之道路主納而不出蓋喉咽司呼吸主
升降此一身之緊關喪奮也經曰足少陰所生病者
口渴舌乾咽腫上氣嗌乾及痛素問云邪客於足少
陰之絡令人咽痛不可納食又曰足少陰之絡循喉
嚨遍舌本凡喉痛者皆少陰之病但有寒熱虛實之
分少陰之火直如奔馬逆衝於上到此咽喉緊鎖處
氣鬱結而不得舒故或腫或痛也其證必內熱口乾
面赤痰涎湧上其尺脈必數而無力蓋緣腎水虧損
相火無制而然須用六味地黃門冬五味大劑作湯
服之又有邪慾過度元陽虧損無根之火遊行無制
客於咽喉者須八味腎氣丸大劑煎成冰冷與飲使
引火歸原庶幾可救此論陰虛咽痛者如此治法正
緒氏所謂上病療下也人之喉咽如曲突曲突火炎
若以水自上灌下曲突立爆烈矣惟竜脉下以盆水
映之上炎即熄此上病療下之一驗也其間有乳蛾
纏喉二名不同腫於咽喉兩旁者爲雙蛾腫於一邊
者爲單蛾治法用鵝翎蘸米醋攪喉中去盡痰涎復
以鵝翎探吐之令著實一茨茨出蛾中紫血即潰或
紫金錠磨下即愈不散者以小刀刺出紫血即愈古
方有刺少商穴法甚好刀針刺血急則用之然亦有
不宜用者薛案云一人年五十咽喉腫痛或針去血
神思雖清尺脈洪數而無倫次按之微細如無曰有
形而無痛陽之類也當峻補其陰今反傷陰血必死
已而果殁引此一案爲粗工輕用刀針之戒纏喉風
者腫透達於外且痲且瘓且痛可用解毒雄黃丸
古方有用巴豆油染紙作撚子點火吹滅以烟熏鼻

中即時口鼻流涎牙關自開即用此喑患處即愈
陽虛咽痛者口舌生瘡遇勞益甚其脈必浮大此脾
肺氣虛膀胱虛熱須以理中湯加山藥山茱萸乃痊
上焦風熱者用荊防敗毒散
有咽喉腫痛作渴飲冷大便祕結六脈俱實下之則
愈可用防風通聖散世間虛熱者多實熱者少如此
證不多得此法不可輕用
有急喉痹聲如鼾呼痰如拽鋸此爲肺絕之候速宜
人參膏用薑汁竹瀝放開服如未得膏先煎獨參湯
救之服早者十全七八次則十全四五遲則不救丹
溪云咽喉腫痛有陰虛陽氣飛越痰結在上者脈必
浮大重取必澀去死爲近宜人參一味濃煎細細飲
之如作實證治之禍在反掌仲景云少陰客熱咽痛
甘草湯少陰寒熱相搏桔梗湯少陰客寒咽痛半夏
散及湯少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦
酒湯少陰陰虛客熱下利咽痛胷滿心煩者猪膚湯
世人但知熱咽痛不知有寒咽痛經曰太陽在泉寒
淫所勝民病咽痛頷腫陳藏器用附子去皮臍炮裂
切片以蜜塗炙令蜜入內噙嚥甘味盡更易之冬月
伏寒於腎經發則咽痛下利附子湯溫其經則愈
又有司天運氣其年鄉村相染若惡寒者多是暴寒
折熱寒閉於外熱鬱於內切忌膽礬酸寒之劑點喉
反使陽鬱結不伸又忌硝黃等寒劑下之反使寒下
陷入裏則禍不旋踵矣須用表散之劑若仲景甘桔
湯之類
又有陽毒咽痛用升麻湯陰毒咽痛用甘草湯
咽痛用諸藥不效者此非咽痛乃是鼻中生一條紅
線如髮懸一黑泡大如櫻珠垂挂到咽門而口中飲
食不入須用牛膝根直而獨條者洗淨入好酢三五
滴同研細就鼻孔滴二三點入去則線斷珠破其病
立安又有喉間作痛潰爛久而不愈此必楊梅瘡毒
須以萆薢湯爲主
吳崑醫方考

喉閉方論

夫喉者氣之關隘也通則利塞則害無問其標本而
當急治焉者也今考八方皆古人已試之程規觸類
而通之則活人之機亹亹矣
纏喉急閉者雄黃解毒丸主之蓋纏喉急閉軀命之
所關也急治則生緩治則死是方也雄黃能破結氣
巴豆能下稠涎鬱金能散惡血能此三者閉通矣丹
溪翁生平不用厲藥而此方其不得已而用之乎
喉閉數日不能食者稀涎散吐之涎盡病除夫皂角
之辛利能破結氣白礬之鹹苦能涌稠涎數數涌之
涎去而病已矣
咽痛者甘桔防風湯主之夫甘草之甘能緩喉中之
急桔梗之苦能下喉中之氣防風之辛能散喉中之
壅
纏喉風用巴豆油塗紙上撚成條子以火點著纔烟
起即吹滅之令患人張口帶火刺於喉間俄頃吐出
紫血半合即時氣寬能言及啖粥飲蓋火氣熱處巴
油皆到火以散之巴以瀉之烟以吐之乃一舉而三
善之方也
陳實功外科正宗

論證

問曰咽痛屬肺然所致有不同者自由虛火實火之
分緊喉慢喉之說又咽爲心肺肝腎呼吸之門飲食
聲音吐納之道此關係一身害人迅速故曰走馬看
咽喉不待少頃也假如虛火者色淡微腫脈亦細微
小便清白大便自利此思慮過多中氣不足脾氣不
能中護虛火易至上炎此恙先從咽嗌乾燥飲食妨
碍欬吐痰涎呼吸不利斑生苔蘚壘若蝦皮有如毛
草常刺喉中又如硬物嗌於咽下嘔吐酸水噦出甜
涎甚則舌上白胎脣生礬色聲音雌啞喘急多痰以
上等證皆出於虛火元氣不足中來治此不可悞投
凉藥上午痛者屬氣虛補中益氣湯加麥冬五味子
牛蒡元參午後痛者屬陰虛四物湯加黃蘗知母桔
梗元參如服不效者必加薑附以爲引導之用亦爲
佐治之法也實火者過飲醇酒縱食膏粱疊褥重衾
哺餐辛烈多致熱積於中久則火動痰生發爲咽腫
甚者風痰上壅咽門閉塞少頃湯水不入聲音不出
此爲喉閉緊喉風是也用藥不及事先用針刺喉間
發泄毒血隨用桐油餞鷄翎探吐稠痰務使痰毒出
盡咽門得鬆湯藥可入語聲得出乃止內服清咽利
膈湯疏利餘毒如牙關緊閉難入必當急刺少商出
血其閉自開如針刺探吐無痰聲如拽鋸鼻掀痰喘
湯水不入語聲不出者真死候也又有喉癰喉痹乳
蛾上齶癰等證其患雖腫而咽門半塞半開其病雖
凶而喉道又寬又緊此皆標病雖重無妨當用金鎖
匙吐出痰涎利膈湯推動積熱膿脹者開之損而痛
者益之其患自安凡喉閉不刺血喉風不倒痰喉癰
不放膿喉痹乳蛾不針烙此皆非法又有痰火勞嗽

欬傷咽痛者無法可治

看法

初起紅色腫痛語聲清朗亦無表裏之證相兼者輕已成腫痛咽喉半閉半開咯吐痰涎飲食稍進者順咽喉腫閉牙關緊急言語不清痰壅氣急聲小者險咽喉緊閉痰涎壅塞口噤不開探吐不出聲喘者死時瘡之後毒結咽間腫痛腐爛吐納不堪聲啞者重久嗽痰火虛陽上攻欬傷咽痛但見聲嘶而色紅者死

治法

初起腫痛寒熱交作頭眩拘急者邪在表也宜發散初起腫痛發熱脈有力而便秘者邪在內也宜下之腫痛寒熱口乾作渴脈洪大而有力者宜發表攻裏咽喉腫痛痰涎壅甚面紅口乾邪在上也宜探吐之喉閉痰涎壅塞氣急口噤難開先刺少商後行吐法已成膿痛咽喉壅塞湯水不入膿已成也宜急針之腫痛微紅脈虛無力午後痛者屬陰虛宜滋陰降火腫痛色白咯吐多涎上午痛者屬陽虛治宜補中健脾

喉癰

喉癰生於咽外正中腫痛妨礙飲食紅腫發熱必欲潰膿軟而脈痛者鍼之內服補托之藥玉紅膏搽貼長肌完口又有腐潰內通湯水隨孔出者會治數人俱亦無妨

景岳全書　臣　張介賓　著

論證

喉痹一證在古方書雖有十八證之辨而古人悉指爲相火然此證雖多由火而復有非火證者不可不詳察也蓋火有眞假凡實火可清者卽眞火證也虛火不宜清者卽水虧證也且復有陰盛格陽者卽眞寒證也故內經曰太陽在泉寒淫所勝民病喉痛頷腫其義卽此何後人之弗究也

喉痹所屬諸經凡少陽陽明厥陰少陰皆有此證但其中虛實各有不同蓋少陽厥陰木火之臟熱證固多陽明爲水穀之海而胃氣直透咽喉故又惟陽明之火爲最盛欲辨此者但察其以情志鬱怒而起者多屬少陽厥陰以口腹肥甘辛熱太過而起者多屬陽明凡患此者多宜以實火論治至若少陰之候則非此之比蓋少陰之脈絡於橫骨終於會厭繫於舌本凡陰火逆衝於上多爲喉痹但少陰之火有虛有實不得類從火斷若果因實火自有火證火脈亦易知也若因酒色過度以致眞陰虧損者此腎中之虛火證也非壯水不可又有火盛於下而格陽於上此無根之火卽腎中之眞寒證也非溫補命門不可凡此諸經不同而虛實大異皆後人所罕知者獨褚氏遺書有上病察下之說誠見道之言也

咽喉證總謂之火則名目雖多似有不必盡辨者然亦有不可不辨者如單乳蛾雙乳蛾及纏喉風之有不同也蓋腫於咽之兩旁者爲雙蛾腫於一邊者爲單蛾此其形必圓突如珠乃癰癤之類結於喉間故多致出毒或宜刺出其血而愈者若纏喉風則滿片紅腫多不成膿亦不必出血但使火降其腫自消此其所以有異而治之當有法也

龐氏曰伏氣之病古方謂之腎傷寒謂非時有暴寒中人毒氣伏於少陰經始初不病旬月乃發脈微肩法當以傷寒治之非喉痹之病也大必下利愚按此證亦所常有是必以少陰少陽之火令太陽之寒令太陰之濕令而復兼風寒之邪者皆有此證故治此者不必治喉痹但治外邪其喉自愈卽如新方諸柴胡飲及散陣諸方皆可隨宜酌用

論治

火證喉痹悉宜以抽薪飲主之火不甚者宜徙薪飲主之凡肝膽之火盛者宜以芍藥梔子草龍膽爲主陽明胃火盛者宜以生石膏爲主若大便祕結不通則宜加大黃芒硝之屬通其便而火自降如火浮於上而熱結於頭面咽喉者最宜清降切不可用散風升陽等劑蓋此火由中得升愈熾經曰高者抑之正此之謂非火鬱宜發及升陽散火之義學者於此最當體察勿得誤認其面目也至於外治火證腫痛之法宜以木鼈子磨酢用鵝翎蘸攪喉中引去其痰或少和清水免其太酸時時呷漱喉中不可嚥下引吐其痰爲更善漱後以代趁散吹之仍內服煎藥自無不愈若火壅於上而食物之治最宜雪梨漿菜豆飲之屬爲妙若南方少梨之處或以好醋葡杵汁和以清泉少加元明粉攪勻徐徐飲之既可消痰亦可清火其單雙乳蛾若毒未甚膿未成者治之自可消散若勢甚而危者必須砭出其血庶可速退此因其急亦不得已而用之也又古法用三稜鍼刺少商穴出血云治喉痹立愈

陰虛喉痹其證亦內熱口渴喉乾或脣紅頰赤痰涎壅盛然必尺脈無神或六脈雖數而浮軟無力但察

其過於酒色或素稟陰氣不足多倦少力者是皆腎陰虧損水不制火而然火甚者宜滋陰八味煎加減一陰煎之類主之如火微而不喜冷物及大便不堅小便不熱者宜六味地黃湯一陰煎之類主之若因思慮焦勞兼動心火者宜二陰煎主之

格陽喉痹由火不歸原則無根之火客於咽喉而然其證則上熱下寒全非火證凡察此者但診其六脈微弱全無滑大之意且下體絕無火證腹不喜冷即其候也蓋此證必得於色慾傷精或泄瀉傷腎或本無實火而過服寒凉以傷陽氣者皆有此證速宜用鎮陰煎爲上八味地黃湯次之或用蜜附子含嚥亦妙若再用寒凉必致不救

陽虛喉痹喉痹因於陽虛乃陽虛因而喉痹也蓋有因喉痹而過於攻擊致傷胃氣者有艱於食飲倉廩空虛亦傷胃氣者又有氣體素弱不耐勞倦而傷胃氣者凡中氣內虛疼痛外遍多致元陽飛越脈浮而散或弱而澀以致聲如鼾睡痰如拽鋸者此肺胃隨絕之候速宜挽回元氣以人參一味濃煎放心徐徐飲之如痰多者或加竹瀝薑汁亦可如遲多致不救如作實火治之則翻如反掌

喉癬證凡陰虛勞損之人多有此病其證則滿喉生瘡紅腫久不能愈此實水虧虛火證也宜用前陰虛喉痹之法治之若多咳嗽肺熱宜以四陰煎之類主之若滿喉生瘡破爛而痛者宜用牛黃益金散吹敷之仍內服滋補真陰之劑自可全愈

瘟毒喉痹乃天行瘟疫之氣其證則咽痛項腫甚有頸面頭項俱腫者北方尤多此病俗人呼爲蝦蟆瘟又名鼈鶯瘟亦名大頭瘟此濕熱壅盛最凶之候宜清諸經之火或瀉陽明之熱當察緩急而治之東垣有普濟消毒飲專治瘟毒喉痹百發百中

鎖喉風證時人以咽喉腫痛飲食難入或痰氣壅塞不通者皆稱爲鎖喉風而不知有眞正鎖喉風者甚奇甚急而人所未知也余在燕都嘗見一女子年已及笄忽一日於仲秋時無病而喉竅緊澀息難出入不半日而緊澀愈甚及延余治診其脈無火也問其喉則無腫無痛也觀其貌則面青瞪目不能語也聽其聲則喉竅之細如鍼探息之窘如線伸頸掙命求救不堪之狀甚可憐也余見而疑之不得解然意謂風邪閉塞喉竅非用辛溫不能解散遂以二陳湯加生薑煎而與之毫忽無效意復用獨參湯以救其肺然見其勢危若此恐滋怨謗終亦未敢下手他醫見之亦但束手而已如此者一日夜而歿後又一人亦如此而歿若此二人者余至今莫識其所以病此終身之疑實殊自媿也然意必肺氣竭絕而然倘再有值此者恐非獨參湯決不能救故筆諸此以俟後之君子盧心詳酌焉

楊梅結毒有喉閒潰爛作痛久而不愈者此非喉痹之屬乃楊梅瘡毒也宜仙遺糧湯甚者宜以土茯苓煎湯吞五寶丹

石室秘錄　臣陳士鐸著

腫痛

人有喉患大腫又非癰癌忽痛忽不痛外現五色之紋中按之半空半實此乃痰病結成似癌非癌似癰非癰也方用海藻牛夏白芥子貝母人參桔梗南星各三錢茯苓五錢昆布甘草各一錢附子一分水煎服此方乃消上焦之痰聖藥也又有海藻昆布以去其癭癌之外象消其五色之奇紋妙在消痰而仍不損氣則胃氣健而痰易化也一劑知二劑消大半三劑則全消四劑永不再發此方兼可治癭證神效

凡人有咽喉忽腫作痛生瘡蛾者飲食不能下五日不食即死急宜此證實火易治而虛火難醫實火方如用山豆根苓連半夏柴胡甘草桔梗天花粉治之立消惟虛火乃腎火不藏於命門浮游於咽喉之間其證亦如實火惟夜重於日清晨反覺少輕若實火清晨反重夜間反輕實火口燥熱乾而開裂虛火口不甚渴舌滑而不裂也以此辨證斷不差錯此等虛痛若亦以治實火之法治之是人已下井而又益之石也故不特不可用寒凉併不可用發散蓋虛火必須補也然徒補腎水雖水能制火可以少差而火熱太盛未易制伏又宜於水中補火則引火歸原而火勢頓消亡於頃刻矣方用引火湯熟地元參各一兩白芥子三錢山茱萸山藥各四錢北五味肉桂各二錢茯苓五錢水煎服一劑而瘡聲靜痛頓除腫亦盡消二劑全愈蓋熟地山茱萸五味之類純是補腎水聖藥茯苓山藥又益精而利水助肉桂之下行元參以消在上之浮火白芥子以消壅塞之痰上焦既寬而下焦又得肉桂之熱則龍雷之火有不歸根於命門者乎一劑便生眞有鬼神莫測之機又勝於八味地黃湯也倘喉腫閉塞勺水不能下此方將安施乎更有一法用附子一箇破故紙五錢各研末調如糊作膏布攤如膏藥大如茶鍾貼腳心中央以火烘之

一時辰喉卽覺而開一線路可以服藥矣

乳蛾

更有人病雙蛾者人以爲熱也喉門腫痛痰如鋸不絕茶水一滴不能下嚥覺非熱證然而痛甚至早少輕喉雖腫舌必不燥痰雖多必不黃而成塊此乃假熱之證也若以寒凉之藥急救之下喉非不暫快少頃而熱轉甚人以爲凉藥之少也再加寒凉之品服之更甚急須刺其少商之穴出血少許喉門必有一線之路開矣急以附子一錢熟地一兩山茱萸四錢麥冬北五味牛膝各三錢茯苓五錢煎服下喉一聲響喉其火勢熱證立時消散蓋少陰之火直如奔馬凡人腎水大耗者腎中元陽不能下藏蓋無水以養火而火必上越也日日衝上而咽喉口小不能任其出入乃結成腫痛狀似雙蛾實非雙蛾也方中妙在用附子辛熱之藥引龍雷之火下藏於宅夫龍雷之火乃相火也喜水而不喜火故藥中熟地山茱之類純是補陰之味使火有所歸而不再沸此因其逆勢而逆導之然喜水者喜眞陰之水也而非寒凉之水不喜火者不喜邪氣之火也而非辛熱之火至若日重夜輕治之最易用山豆根桔梗各三錢牛夏甘草各一錢治之一劑立愈而非逆證可比耳

陰虛雙蛾之證更有治法用附子一錢鹽水炒成片用一片含在口中立時有路可以用湯藥矣後以八味丸一兩白滾水送下亦立時而愈

又雙蛾陰證最難治而最易治也不知其竅而最難知其法而最易予常爲人治此病用附子一枚以鹽一合水煮透令其口含一片而火勢立止然後以六味湯大劑飲之不再發神方也

陰蛾之證乃腎水虧乏之火不能藏於下乃飛越於上而喉中關竅火不得直泄乃結成蛾似蛾而非蛾也早晨痛輕下午痛重至黃昏而痛更甚得熱則快得凉則加其證之重者滴水不能下喉若作外感陽證治之用山豆根苓連梔子之類則痛益甚而關不開有不盡命而死者矣惟補陰盧用引火歸原之法而痛頓失也方名化蛾丹熟地山茱萸麥冬各一兩附子一錢車前子三錢北五味二錢水煎服此方大補腎之水不治蛾之痛壯水則火息引火則痛消故一劑卽可收功奇絕之法也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百八十二卷目錄
醫部彙考一百六十二
咽喉門三
方荊防敗毒散 清咽利膈湯 金鑰匙 涼膈散 防風通聖散 補中益氣湯 四物湯 破棺散 清胃散 荊芥湯 荊芥連翹湯 牛夏桂枝甘草湯 荊芥連翹

荊芥湯
治咽喉腫痛語聲不出嚥之痛甚
荊芥半兩　桔梗二兩　甘草一兩
右剉散每服四錢水一盞薑三片煎六分去查溫服

君雪
治一切積熱口舌生瘡心煩喉閉及牙齒齦腫作痛
芒硝　青黛　寒水石煅　右膏煅研飛　砂硝
馬牙硝　甘草　滑石各二兩
將甘草煎湯二升入諸藥再煎用柳枝不住手攪令消傾入青黛和勻傾砂盆內候冷結凝成霜取霜研爲末每用少許含化嚥津如喉閉不能嚥下用竹管吹藥入喉中

破關丹
治乳蛾喉閉纏喉風等證
硼砂末五錢　霜梅肉一兩搗爛
右二味和勻丸芡實大每服一丸嗆化嚥下內服

荊防敗毒散
半夏桂枝甘草湯
治暴寒中人咽痛
半夏　桂枝　甘草各二錢半
水二盞生薑五片煎至八分去查漸漸呷之

解毒雄黃丸
治纏喉風及急喉痹卒然倒仆牙關緊急不省人事
雄黃研　鬱金各一兩　巴豆去皮出油十四枚
右爲細末酢黃蠟糊爲丸如菉豆大熱茶清下七丸吐出頑痰立甦未吐再服如至死者必心頭猶熱灌藥不下卽以刀尺鐵匙幹開口灌之下咽無有不活如小兒驚熱痰涎壅塞或二丸三丸量大小加減一法用雄黃丸三粒酢磨化灌之尤妙其痰立出卽蘇

小續命湯
治喉痹喉癰
麻黃去節　人參　條黃芩酒炒　白芍藥酒炒
川芎酒洗　防己　杏仁去皮尖雙仁炒　桂枝
甘草各一錢　防風　附子去皮臍炒各五分
右水煎服

玉鑰匙
治風熱喉痹及纏喉風
鍼硝一兩半　硼砂半兩　白殭蠶二錢五分
膽子一字
右爲末以竹管吹半錢入喉中立愈

玉屑無憂散
治纏喉風咽喉疼痛語聲不出嚥物有碍或風涎壅滯口舌生瘡大人酒漱小兒妳癖或誤吞骨屑哽塞不下
元參　貫衆　滑石研　砂仁　黃連　甘草炙
茯苓　山豆根　荊芥穗各半兩　硼砂一錢
寒水石煅一兩
右爲細末每服一錢乾摻舌上以清水嚥下此藥除三尸去八邪碎邊藏渴
甘露飲
治咽喉腫痛
枇杷葉刷去毛　熟地黃　天門冬　枳殼麩炒
山茵陳　生地黃　麥門冬　石斛　甘草
黃芩
右等分爲末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服食後臨臥小兒一服分兩服量歲數加減與之

君玉散
治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不下或喉痹重舌木舌腫脹皆可服
青黛　盆硝　蒲黃　甘草各等分
右爲細末研勻每用少許吹入咽喉內細細嚥下若作丸用砂糖爲丸每兩作五十丸每服一丸嚥化嚥下

防風散
治咽喉腫痛盧者少用實者多用
防風去蘆一兩　羌活　殭蠶炒　白藥子蜜炙
硼砂　荊芥　黃藥子　大黃濕紙包煨令香熟
細辛　川芎　紅內消　山豆根　鬱金　甘草各半兩　牙硝三錢　薄荷半斤
右爲細末研薄荷汁同蜜少許調每服一匙不拘時服

追風散
治咽喉腫痛
黃丹　砂硝　牙皂角煅　砂仁殼煅灰各半兩
右爲細末每用少許以鵝毛蘸藥入口中傳舌上下及腫處然後以溫水灌漱如咽喉間毒已破痛口痛者用豬腦髓蒸熟淡薑酢蘸喫效

開關散 實證

治纏喉風氣息不通

白殭蠶炒去絲嘴　枯白礬各等分

右爲細末每服三錢生蜜蜜水一盞調下細細服之

七寶散

治喉閉及纏喉風

殭蠶十箇　硼砂　雄黃　明礬　全蠍去毒

猪牙皂角一挺去皮弦各一錢　麝香半錢

右爲細末每用一字吹入喉中即愈

千緡湯

治前證

半夏七枚　皂角　甘草各一寸俱炙

薑棗煎

五香散

治咽喉腫痛諸惡氣結塞不通急宜服之

木香　沉香　雞舌香　薰陸香各一兩　麝香三分

右爲細末研勻每服二錢水一盞煎至五分不拘時温服

瓜蒂散

治纏喉風咽中如束氣不通

瓜蒂不拘多少

右細研爲末壯年一字十五歲已上及年老者服半字早晨用井華水調下一時須含砂糖一塊良久涎如水出年深者涎盡有一塊如石布水上如鑿涎盡食粥一二日如吐多困甚即嚥麝香湯一盞磨香須細研用温水調下此藥不大吐逆只吐涎水又瓜蒂須採自然落者用如未用以檳榔葉裹於東牆有風處挂令吹乾用

烏犀膏

治咽喉腫痛一切結喉爛喉遁尸纏喉痹喉急喉飛絲入喉重舌木舌等證

皂夾兩條椎碎用水二升浸一時久按汁去查入瓦器內熬成膏　好酒一合　筯硝　百草霜研各一錢同皂角膏攪勻令稠　人參一錢爲末　硼砂白霜梅各少許並研入膏中

右拌和前藥用鵝毛點少許於喉中以出盡頑涎爲度却嚼甘草二寸嚥汁吞津

備急如聖散

治時氣纏喉風漸入咽喉閉塞水穀不下牙關緊急不省人事

雄黃細研生用　藜蘆厚者去皮生用　白礬飛猪牙皂角去皮弦

右等分爲細末每用一豆大鼻內嚕之立效

一字散

治喉閉氣塞不通飲食不下

雄黃研　白礬生研　藜蘆各一錢　蠍梢七枚

猪牙皂角七挺

右爲末每用一字吹入鼻中即時吐出頑涎愈

玉粉丸

治前證

桂一字　草烏一字炒　半夏洗五錢

右爲末生薑自然汁浸蒸餅爲丸雞頭大每服一丸至夜含化多年不愈者亦效

三黃丸

治前證

黃連　黃芩　大黃酒九蒸九曬

右等分蜜丸桐子大量病人虛實以施多寡

龍腦聚聖丹

治心脾客熱毒氣攻衝咽喉赤腫疼痛或成喉痹或結硬不消愈而復發經久不瘥或舌本腫脹滿口生瘡飲食難嚥並宜服之

南硼砂研　川芎各一兩　生地黃　犀角屑　羚羊角屑　南琥珀研　元參　桔梗　升麻　鈴白霜研　連翹各五錢　赤茯苓　馬牙硝　麝子研　人參　麝香研各三錢　硃砂水飛　牛黃研各二錢

右爲細末煉蜜爲丸每兩作十丸用金箔五十片爲衣每服一丸薄荷湯或新汲水化下或細嚼或噙化津液嚥下皆可食後臨臥服

祛毒牛黃丸

治大人小兒咽喉腫痛舌本强硬滿口生瘡涎潮嗌急飲食難進胃膈不利

牛黃研三錢半　人參　南琥珀研　犀角細末　桔梗　生地黃　硼砂各五錢　雄黃一兩水飛　元參　升麻各三錢　鈴粉四兩水飛　鈴白霜片腦各一錢　寒水石煅二兩　硃砂飛研七錢

右爲細末煉蜜丸如小彈子大金箔爲衣磁器內收每服一丸濃煎薄荷湯化下或新汲水化服亦得食後日進二三服噙化亦得

咽喉備急丹

治前證

青黛　芒硝　白殭蠶各一兩　甘草

右爲細末用臘月牛膽有黃者盛藥其中陰四十九日多時爲妙此與佛手散有別

增損如聖湯

治風熱攻衝會厭語聲不出咽喉妨食腫痛

桔梗　炙甘草一兩半　枳殼湯浸去穰二錢半

防風半兩

右爲細末每服三錢水一大盞煎至七分去查入酥如棗許攪勻食後溫服

和解湯

一名利膈湯治虛煩上壅肺肺有熱咽喉生瘡

薤葉　荊芥　防風　桔梗　人參　甘草生

牛蒡子隔紙炒各一兩

右爲細末每服一錢沸湯點服如咽痛口瘡甚者加殭蠶一兩

桔梗湯

治咽腫徹覺痛聲破季冬合之

麻黃存節五分　甘草　桔梗各一錢　黃芩

殭蠶各三錢　馬勃一兩　桂枝少許　歸身三分

水二盞煎去查稍熱服食後徐徐呷之

金沸草散

治肺感寒邪咽喉痹痛

旋覆花　麻黃　前胡各七分　荊芥穗一錢

甘草炙　半夏製　赤芍藥各五分

水一盞半生薑三片棗一枚煎八分不拘時溫服

發聲散

治咽痛不妨飲物噎物則徹痛不宜用寒涼藥開熱也

苦蔞一個　白殭蠶半兩炒去絲　甘草二錢炒

桔梗七錢半炒

右爲末每用少許乾摻咽喉中若大腫痛左右有紅或只一壁紅紫長大水米不下用此藥一錢七研硝一錢和勻乾摻喉中嚥津如喉中生赤腫或有小白頭瘡用此藥一錢七白礬半錢細研如粉和勻乾摻之

佛手散

治纏喉風神效

芒硝一兩　白殭蠶炒五錢　甘草生二錢五分

青黛一錢

右爲末吹少許摻喉中如閉甚以竹管吹之

羅青散

治單雙乳蛾

蒲黃五錢　羅青　盆硝研各三錢　甘草二錢

右爲細末每服一錢冷蜜水調細細嚥之吞不下雞翎點藥喉內掃之立效

粉香散

吹乳蛾即開

巴豆三粒去皮油淨　輕粉研　麝香研各少許

白礬三錢

右於鐵器上熬礬令沸入巴豆在礬內候枯去巴豆不用將礬研末入粉麝吹喉中

乾薑散

治懸癰熱卒暴腫大

乾薑　半夏湯洗去滑等分

右爲細末以少許著舌上嚥津

元參散

治懸癰痛不下食

升麻　射干　大黃各半兩　甘草二錢五分

元參一兩

右爲細末用水煎至七分放溫時時含嚥良驗

射干丸

治懸癰腫痛咽喉不利

杏仁湯洗去皮尖及雙仁麩炒微黃　炙甘草

射干各半兩　升麻　大黃微炒　木鼈子各錢半

右爲細末煉蜜和丸如彈子大常含一丸嚥津

鹽礬散

治喉中懸癰垂長咽中妨悶

燒鹽　枯白礬

右研細各等分和勻以筯頭點之即消

射干丸

治懸癰腫痛咽喉不利胃中煩熱

射干　天竺黃研　馬牙硝研各一兩　犀角屑

元參　川升麻　炙甘草　白藥煎　黃藥煎

白礬各半兩

右爲細末研勻煉蜜和搗二三百杵丸如小彈子大不拘時以綿裹一丸含嚥津

硼砂散

治懸癰腫痛

硼砂研　馬牙硝　滑石豹　寒水石研各二錢

片腦研半錢　白礬一錢半
右爲細末每用半錢不拘時新汲水調服

啓關散
治風熱客搏上焦懸癰腫痛
惡實炒　甘草生用各一兩
右爲細末每服二錢水一盞煎六分旋含之良久嚥下

黃芪散
治咽喉生瘡疼痛
黃芪　檳榔　紫菀洗去土　牛蒡子　梔子仁
赤茯苓　甘草生各半兩　升麻　黃芩各三錢
元參　麥門冬各一兩
右剉碎每服一錢水一盞煎至六分去查服

桃紅散
治喉中生瘡腫赤紫色咽嗌痛嚥物有妨
金銀箔各十片　鉛白霜少許　寒水石四兩
太陰元精石二兩二味搗碎入盒子內火煅通赤取出埋土地內出火毒研細　馬牙硝研　丹砂研
甘草炙爲末各一兩
右爲細末研勻每服一字甘草水調下或以稀糯米粥丸如豌豆大噙化嚥津

琥珀犀角膏
治咽喉口舌生瘡菌
眞琥珀研　犀角屑生用各一錢　人參去蘆
酸棗仁去皮研　茯神去皮木　辰砂研各二錢
片腦研一字
右爲細末研勻煉蜜和爲膏以磁器收貯候其疾作每服一彈子大以麥門冬去心濃煎湯化下一日連進五服

救命散
治脾胃熱毒上攻咽喉有瘡並纏喉風
膩粉三錢　五倍子二錢半　大黃剉炒　黃連
白殭蠶直者炒　生甘草各半兩
右爲細末每服一字大人以竹筒吸之小兒以竹筒吹之如餘毒攻心肺咽有瘡用男孩兒乳汁調藥一字以雞翎探之嘔者生不嘔者死

牛蒡子丸
治咽喉內熱毒所攻生瘡腫痛
牛蒡子一兩微炒　升麻　黃藥子　乾浮萍草
元參　甘草生各半兩
右爲細末煉蜜和丸如彈子大常噙一丸嚥津

硼砂散
治心脾風熱所發咽喉生瘡腫痛或子舌脹或木舌重舌腫悶閉塞水漿不下
硼砂研三兩　薄荷葉　蒲黃各一兩　青黛研
貫衆　元參　茯苓　縮砂　滑石研　荊芥穗
山豆根　甘草生各半兩　寒水石煅研二兩半
右爲細末研勻每服半錢不拘時用新汲水調下

半夏厚朴湯
一名加味四七湯治前證
紫蘇葉　半夏　厚朴　赤茯苓　陳皮　枳實
南星　縮砂　神麯各一錢　青皮七分　檳榔
益智仁各三分　白豆蔻六分
薑五片水煎服

射干散
治咽喉中如有物妨悶噎塞疼痛嚥物不下
射干　桔梗　川升麻　犀角屑各三錢　木香
木通各半兩　紫蘇子炒　訶黎勒去核　檳榔
枳殼去穰麩炒　赤茯苓　甘草炙各一兩
右剉細末每服三錢水一盞煎至八分去查不拘時溫服

含化龍腦丸
治咽喉中有物如彈丸日數深遠津液難嚥作渴疼痛卽須深針腫結處散盡毒氣
龍腦研　麝香研各二錢半　鍾乳粉　馬牙硝
升麻　黃芪各一兩　大黃炒　炙甘草各半兩
生地黃五兩取汁和藥
右爲細末研勻以地黃汁更入煉蜜和丸如彈子大不拘時以綿裹一丸噙化嚥津以咽喉通利爲度

木香散
治咽喉中如有物噎塞吞不能入吐不能出
木香半兩　紫雪　射干　麝羊角屑　犀角屑
檳榔各一兩　元參　桑白皮　升麻各一兩半
右剉碎每服三錢水一盞煎至六分去查不拘時溫服

絡石湯
治咽喉中如有物噎塞
絡石　紫菀各半兩　升麻　射干各七錢半
木通　赤茯苓　桔梗炒各一兩
右剉碎每服五錢匕水一盞半煎至八分去查食

後溫服如要通利及湯成加芒硝末一錢匕攪勻服之絡石卽石薜荔

四味湯

治咽喉中如有物噎吐不利

半夏以生薑汁浸一宿湯浸切洗　厚朴刮去麤皮以生薑汁浸炙黃　橘皮以湯浸去白焙各一兩　赤茯苓刮去黑皮二兩

右剉碎每服三錢匕水一盞入薑一大棗劈破煎至六分去查食遠溫服

杏仁煎丸

治咽喉食卽噎塞如有物不下

杏仁湯浸去皮尖及雙仁炒半兩　官桂去麤皮　枇杷葉拭去毛炙　人參各一兩

右爲細末煉蜜爲丸如櫻桃大每服一丸含化嚥津以瘥爲度

甘草瀉心湯（仲景下同）

治前證

黃芩　人參　乾薑各三兩　大棗十二枚劈

半夏半升　甘草四兩　黃連一兩

右七味水一斗煮取六升去滓再煎溫服一升日三服

苦參湯

治狐惑病蟲蝕下部則咽中乾

苦參半斤　槐白皮　狼牙根各四兩

右剉以水五升煎三升半洗其下部

小建中湯（仲景下同）

治前證

桂枝　製甘草三兩　大棗十二枚　芍藥六兩　生薑三兩　膠飴一升

右六味以水七升先煮五味取三升去滓內膠飴更上微火消解溫服一升日三服

射干麻黃湯

治前證

射干十三枚　麻黃四兩　生薑四兩　細辛　紫菀　款冬花各三兩　五味子半升　半夏大者洗八枚　大棗七枚

右九味以水一斗二升先煮麻黃沸去上沫內諸藥煮取三升分溫三服一本射干三兩半夏半升

升麻鼈甲湯

一名蜀椒湯治前證

當歸　蜀椒炒去汗一兩　升麻　甘草各二兩　鼈甲手指大一片炙　雄黃半兩研

右六味以水四升煮取一升頓服之老小再服取汗

麥門冬湯

治前證

麥門冬七升　半夏一升　人參　甘草各二兩　粳米三合　大棗十二枚

右六味以水一斗二升煮取六升溫服一升日三夜一服

如聖勝金錠（局方）

治咽喉急閉幷單蛾雙蛾結喉重舌木舌等證

硫黃　川芎　臘茶　腦薄荷　川烏　生地黃　硝石

各等分爲末生葱汁和勻一兩分作十錠每取一錠先以凉水灌漱次嚼薄荷五七葉却用藥同嚼以井水嚥下甚者連進三服

二仙散（入門）

治急喉閉及纏喉風危急

膽礬一錢　白殭蠶二錢

右爲末吹少許入喉中

牛黃凉膈丸

治咽喉腫痛口舌生瘡頷頰赤腫熱痰壅塞

馬牙硝　寒水石煅　石膏煅各二兩　牛膽南星七錢半　紫石英煅飛五錢　龍腦　麝香牛黃各二錢半　甘草炙一兩

右爲末蜜和一兩作三十丸每一丸薄荷湯嚼下

奪命散（幷溪）

治急喉閉

枯白礬　白殭蠶炒　硼砂　皂角各等分

右爲末吹少許入喉中痰出卽差

膽礬散

治咽喉痹腫塞

膽礬半錢　全蠍二箇

右爲末以雞羽蘸藥入喉中須臾破開聲出大用生荷葉研細井水調下吐出毒涎卽愈未吐再服

雞內金散（幷溪）

治喉閉單雙蛾

臘月雞內金陰乾爲細末一錢　菉豆粉三錢

右生蜜和作三丸嚥化神效

龍腦膏（局方）

治喉痹腫痛

縮砂五粒　薄荷葉一斤　甘草三兩　防風

川芎　桔梗各二兩　焰硝一兩　片腦一錢

白豆蔻三十粒

右爲末蜜丸彈子大噙化嚥下

青龍膽（活人）

治咽喉閉塞腫痛并單雙蛾神效

膽礬盛於青魚膽內

右陰乾爲末吹入喉中立效無青魚則蠡魚膽代之臘月者甚佳

吹喉散（綱目）

治咽喉腫閉塞

膽礬五錢無膽礬則代以綠礬入青魚膽內風乾無青魚則代蠡魚膽　巴豆七箇去殼　銅青一錢

焰硝二錢半另研　輕粉五分　青黛一字

右將膽礬同巴豆於銅銚內飛過去巴豆合焰硝等四味再入麝香少許每用一字吹入喉中吐出痰血立愈

清涼散（同春下同）

治實火咽喉腫痛

桔梗錢半　梔子　連翹　黃芩　防風　枳殼

黃連　當歸　生地黃　甘草各七分　薄荷

白芷各三分

右剉作一貼燈心一團細茶一撮水煎服

加味四物湯

治虛火喉痹喉痛喉瘡最能降火

桔梗　甘草各錢半　熟地黃　白芍藥各七分

當歸　川芎　黃蘗蜜水炒　知母　花粉各五分

右剉作一貼水煎入竹瀝一鍾服

龍腦破毒散

治急慢喉閉腫塞不通

芒硝四兩　青黛研　白殭蠶　甘草生各八錢

蒲黃五錢　馬勃三錢　龍腦　麝香各一錢

右爲末每一錢井水調膏細嚥即破出血便愈如不是喉痹自然消散也無芒硝代以焰硝

金鎖匙（醫鑑）

治急喉閉纏喉風

朱砂三分二釐　枯白礬　膽礬各一分六釐

白硼砂一分二釐　熊膽　焰硝　梅花冰片

麝香各一分

右爲末吹半錢入喉中

白礬散（類聚）

治纏喉風及急喉閉

白礬三錢　巴豆三箇去殼分作六片

右銚器同炒候礬枯去豆取礬爲末水調灌下或吹入喉中或烏雞子清調灌入喉中

吹喉散（同春）

治懸癰下垂腫痛及一切咽喉疾

膽礬　白礬　焰硝　片腦　山豆根　辰砂

雞內金焙

右爲極細末以竹管吹少許入喉中即效

加味二陳湯（醫鑑）

治梅核氣

人參　白朮炒　陳皮　白茯苓　半夏各二錢

製甘草五分　枳殼　桔梗　黃芩　梔子仁

蘇子　白豆蔻各七分

右剉作一貼入薑三片水煎服

牛蒡子湯（入門）

治咽喉腫痛牙關緊急或生瘡癰或愈後復攻胷脇氣促身熱不能坐臥

牛蒡子二錢　元參　犀角屑　升麻　黃芩

木通　桔梗　甘草各一錢

右剉水煎食後服

上清丸

治咽喉腫痛口舌生瘡又能爽神

薄荷葉一斤　縮砂四兩　甘草二兩　防風

黃芩　桔梗各一兩

右爲末蜜和一兩作二十丸每一丸常噙化嚥之

加減薄荷丸

治風熱咽喉腫痛

薄荷葉八兩　防風　川芎　白豆蔻各一兩

縮砂　甘草各五錢　龍腦五分　桔梗二兩

右爲末蜜和勻一兩作三十丸每一丸常噙化嚥之

荊黃湯（入門）

治風熱結滯咽喉腫痛大便祕澀

荊芥四錢　大黃一錢

右剉水煎空心服

甘桔湯（必用方）

治風熱咽喉腫痛或喉痹神效

桔梗二錢　甘草生　荊芥穗　防風　黃芩

薄荷各一錢
右剉作一貼水煎徐徐服加元參一錢尤妙
金消丸（簡易方）
治咽喉腫痛
黃蘗　荊芥　射干　黃芩各等分
右爲末蜜丸櫻桃大每一丸噙化
清火補陰湯（醫鑑）
治虛火上升喉痛喉閉或生瘡
元參二錢　白芍藥　熟地黃各一錢　當歸身
川芎　黃蘗童便浸炒焦　知母生　天花粉
甘草各七分
右剉作一貼水煎入竹瀝三匙溫服
加味四物湯（正傳）
治喉乾燥痛
當歸　生地黃　川芎　白芍　桔梗　荊芥穗
黃蘗　知母
煎服立已
絳雪散（直指方）
治咽喉熱痛腫塞
寒水石煅五錢　硼砂　馬牙硝　硃砂各一錢
龍腦半錢
右爲細末每一字擦入口中嚥津
佛手散（丹溪）
治風熱咽喉腫痛生瘡
薄荷葉二兩　芒硝一兩　甘草七錢　桔梗
蒲黃各五錢　青黛二錢
右爲末取少許乾擦或以竹管吹入喉中

甘桔湯
治少陰客寒咽痛尤妙
桔梗三兩　甘草一兩
右剉五錢水煎徐徐服之加鼠黏子竹茹各一錢更妙
喉痹方（種杏）
治喉痹乳蛾腫痛生瘡潰爛水漿不入死在須臾
巴豆肉　細辛各等分
右爲末用紙捲藥在中兩頭撚緊從中剪斷塞入兩鼻中一時頭頂冰凉咽喉即開
通竅散
治喉痛生瘡聲啞
硼砂二錢　片腦二分　青黛　滑石　孩兒茶
寒水石各一錢　黃連　黃蘗各五分　蒲黃
馬牙硝　枯白礬各六分
爲細末煉化白砂糖和丸芡實大臥時舌壓一丸自化入喉神效或以葦筒吹少許入喉中亦神效
通關飲
治喉痹腫痛不能言語此從治之法無不愈者
桔梗二錢　甘草炙一錢半　人參　白朮炒
赤茯苓各一錢　防風七分　荊芥穗　薄荷
乾薑炮各五分
右剉作一貼水煎服
神效散
治喉痹語聲不出
荊芥穗　蓖麻肉各等分
爲末蜜丸皂子大綿裹含化

去涎方
治喉痹
猪牙皂角五錢　膽礬一錢半　青黛五分
右爲末酢糊和丸櫻桃大每一丸以熟絹裹在筋頭上用好酢潤透將藥點喉痛上咬著筋其涎如水即解後服防風通聖散
冰梅丸
治十八種喉痹俱效又治喉風腫痛如神
天南星三十五箇　半夏　白礬　白鹽　防風
砒硝各四兩　桔梗二兩　甘草一兩揀七分熟
大梅實一百箇
先將硝鹽水浸一伏時然後將各藥碾碎入水拌勻方將梅實置於水中其水淹過梅子三指爲度浸七日取出曬乾又入水中浸透曬乾俟藥水乾爲度方將梅子入磁罐封密如霜衣白愈佳用時綿裹噙在口中徐徐嚥汁下痰出即愈一方有皂角四兩無甘草
龍腦川芎丸
治咽喉諸病通利七竅爽氣清神除熱消痰消風化滯
薄荷葉五兩三錢　桔梗一兩半　川芎　防風
甘草各一兩　白豆蔻五錢　片腦三錢　縮砂仁二錢
右爲末蜜和每兩作二十丸每一丸細嚼茶清下噙化亦可此與加減薄荷煎元同而分兩異
烏犀膏（千金方）
喉嚨者脾胃之候若臟熱喉則閉塞神氣不通宜

服此

生烏爨十兩　升麻三兩　羚羊角屑　通草
芍藥各二兩　薤微根切一升　生地黃切五升
猪脂二斤　艾葉六銖生者佳

右九味㕮咀綿裹苦酒一升淹浸一宿內猪脂中微火煎取苦酒盡膏不鳴爲度去滓薄綿裹膏似大杏仁內喉中細細吞之

又方

治喉腫痛風毒衝心胷

豉一升半　犀角　射干　杏仁　甘草各二兩
芍藥三兩　梔子七枚　升麻四兩　羚羊角兩半

右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓內豉煮一沸分三服

風毒方

治風毒咽水不得下

升麻　芍藥各六兩　射干　杏仁研　楓香
葛根　麻黃各三兩　甘草二兩

右八味㕮咀以水八升煮取二升半分三服

母薑酒

咽門者肝膽之候若臟熱咽門則塞而氣閉若腑寒咽門則破而聲嘶宜服此

母薑汁二升　酥　牛髓　油各一升　桂心
秦椒各一兩　防風一兩半　芎藭　獨活各一兩
六銖

右九味爲末內薑汁中煎取相淹濡不髓酥油等令調微火三上三下煎平旦溫清酒一升下二合膏即細細吞之日三夜一

又方

治前證幷咽痛不利

丹參　升麻　雄黃研飛　杏仁　鬼臼　甘草
射干各一兩　麝香半兩

右八味爲末以蜜丸如桐子飲下一丸加至五丸日三酒服

又方

治咽傷語聲不徹

酒　酥各一升　乾薑末二兩半　通草　桂心
石菖蒲各二兩

右六味合和服一匕日三

又方

治前證

酒　酥各一升　乾薑末十兩

右三味以酒二合酥一匕薑末二匕相和服日三食後服

又方

治咽喉不利下氣

射干　杏仁　人參　附子　桂心各一兩

右五味末蜜丸如指大嚥一丸稍稍咽之令藥味相接

一陰煎（按岳全書下同）

治喉痹火微者

生地　芍藥　麥冬　丹參各二錢　甘草一錢
牛膝一錢半　熟地三五錢

水二鍾煎七分食遠溫服

加減一陰煎

治證如前而火之甚者宜用此方

生地黃　芍藥　麥冬各二錢　熟地三五錢
炙甘草五七分　知母　地骨皮各一錢

水二鍾煎服

二陰煎

治喉痹因思慮勞傷動心火者

生地　麥冬各二三錢　棗仁二錢　甘草一錢
黃連或一二錢　茯苓　元參　木通各一錢半

水二鍾加燈草二十根或竹葉亦可煎七分食遠服

四陰煎

治欬嗽肺熱喉痹

茯苓錢半　生地二三錢　麥冬　芍藥　百合
沙參各二錢　生甘草一錢

水二鍾煎七分食遠服

抽薪飲

治火證喉痹

黃芩　石斛　木通　梔子炒　黃檗各一二錢
枳殼　澤瀉各錢半　細甘草三分

水一鍾半煎七分食遠溫服甚者冷服更佳

徙薪飲

治喉痹火不甚者

陳皮八分　黃芩二錢　麥冬　芍藥　黃檗
茯苓　牡丹皮各一錢半

水一鍾半煎七分食遠溫服

蒺豆飲

治咽喉火塞諸證

菉豆不拘多寡煮湯煮糜爛入鹽少許或蜜亦可待冰冷或厚或稀或湯任意飲食之日或三四次不拘此物性非寒苦不傷脾氣且善於解毒除煩退熱止渴大利小水乃淺易中之最佳最捷者也若火盛口乾不宜厚味但略煮半熟清湯冷飲之尤善除煩清火

雪漿漿

治前證

清香甘美大棗劃去皮

別用大椀盛清冷甘泉將梨薄切浸於水中少頃水必甘美但頻飲其水勿食其梨退陰火極速也

滋陰八味丸

治陰虛喉痛

山藥　山茱萸肉各四兩　丹皮　茯苓　澤瀉　知母鹽水炒　黃檗鹽水炒各三兩　熟地黃八兩蒸搗

右水煎服

鎮陰煎

治格陽喉痹上熱者當以此湯冷服

熟地一二兩　牛膝二錢　炙甘草一錢　澤瀉一錢半　肉桂一二錢　製附子五七分或一二三錢水二鍾速煎服

代匙散

治喉痹

月石　石膏各一錢　冰片一分　粉草三分　殭蠶炒　膽礬　牙皂角炙烟盡各五分

右爲細末用細竹管頻吹喉中或加牛黃五分更

佳

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百八十三卷目錄
醫部彙考一百六十三
咽喉門四
單方
鍼灸
導引
醫案
藝術典第一百八十三卷
醫部彙考一百六十三
咽喉門四
單方
纏喉風白礬末半錢烏雞子清一箇調勻灌入喉中立效如神綱目
矾硝治喉痹神驗含口中細細嚥汁立瘥馬牙硝與焰硝同功本草
咽中瘡腫矾硝一錢蓖麻子去皮一粒同研新水和服即效綱目
硼砂治咽喉痹最爲要切含化嚥津本草下同
咽喉痹痛升麻剉煎取汁含之
喉閉垂死取馬蘭根擣絞取汁稍稍嚥之口噤者灌下葉及子同功子則取四十九枚爲末水調服葉則取二兩水煎服
喉痹取牛蒡子一合半生半炒爲末熱酒調下一錢
又方牛蒡子六分馬蘭子八分爲末煖水調一錢服立瘥

喉痹腫痛露蜂房灰白殭蠶等分爲末每乳香湯服半錢
又方用蜂房燒灰每以一錢吹入喉內不拘大人小兒心鏡
喉閉水漿不入採射干根擣取汁細呷之治喉痹最捷或醯酢同研取汁嚥引出涎更妙丹溪
喉痹咽腫生瘡蓖麻子取肉搥碎紙捲作筒燒烟吸之治喉痹名聖烟筒正傳
馬勃治喉閉咽痛以蜜搽拌以水調呷本草
又方馬勃白礬等分爲末以鵝翎管吹入喉中吐痰妙綱目
咽瘡喉痹用好米酢噙漱吐痰爲妙回春
纏喉風食不能下取大麥粥作稀粥令熱之既滑膩容易下咽以助胃氣本草下同
急喉閉皂莢搥碎去皮子挼水一盞灌下或吐或不吐即安
急喉閉取鹽魚膽汁少許點患處藥至即瘥病深則水調灌之臘月收者佳
喉痹雙乳蛾壁錢窩一箇取患者膕後髮拔一根纏定錢窩燈上以銀簪挑而燒之存性爲末吹入患處立消回春
又方壁錢燒存性白礬枯髮灰等分爲末吹入喉中治喉閉名吹喉散醫鑑
喉痹蟾蜍取汁點在喉中即喉開本草下同
喉閉蛇蛻燒爲末吹入喉中
纏喉風氣不通蛇蛻炙黃當歸等分爲末酒服一錢愈

喉閉蛇蛻取汁吞之咽喉即開
急喉閉白殭蠶爲細末薑汁調灌下立愈
又方殭蠶炒白礬生等分爲末白梅肉和丸皂子大綿裹含化嚥汁瘥直指
咽喉腫塞石蟹搗絞取汁灌之即開本草
咽喉閉塞口噤取雄雀糞細研濕水調灌半錢綱目
咽喉閉塞生雞卵一枚去黃留白著米醋嬉火沸起就熱飲醋盡一二次即瘥綱目
咽喉腫痛閉塞氈花上飛蛾燒爲末吹入喉中神效俗方
喉痹熱痛上好消梨杵取汁頻飲之多服爲良正傳
喉痹水穀不下取蘿蔔汁徐徐嚥之即愈綱目
咽喉乳蛾取土蜂窩一箇爲末先用楮葉擦破令出血以酢和末用鋼點之令痰涎出爲效後用扁竹根搥水服數口取利瑞竹堂方
咽中結塊不通水食危困欲死百草霜蜜和丸芡子大每新汲水化一丸灌下甚者不過二丸名百靈丸若溪方
喉痹乳蛾用烏龍尾枯礬豬牙皂莢以鹽炒黃等分爲末或吹或點皆妙烏龍尾即梁上塵也集效方
喉痹腫痛鉛白霜甘草各半兩青黛一兩爲末酢糊丸芡子大每含嚥一丸立效聖濟
喉痹腫痛舊蒲根嚼汁燒鐵秤鍾淬酒一杯飲之
咽生瘡肉及舌腫痛秤錘燒赤淬酢一盞嚥之
咽喉疼痛銀硃海螵蛸末等分吹之取涎數效
纏喉風痹雄黃磨新汲水一盞服取吐下愈續千金方
咽喉腫痛五心煩熱取不灰木以牛糞燒赤太陰元

精石煅赤各四兩眞珠一錢爲末糯米粥丸如芡子大每服一丸以生地黃汁粟米泔研化服日二次聖濟總錄

喉痹腫痛土硃煮汁飲之普濟方

喉痹李實根皮一片噙口內更用李實根研水敷項上一週遭用新採園中者

喉中生肉綿裹筯頭拄鹽揩之日五六度千金方

帝鍾喉風垂長半寸煅食鹽頻點之卽消聖惠方

喉痹風熱痰猪牙皂角爲末和霜梅噙咽

又方木鼈子用鹽水浸噙一丸

喉痹口噤硇砂馬牙硝等分研勻點之聖濟方

喉痹風熱茜草一兩一服降血中之火

又方焰硝半錢枯礬半錢硇砂一錢爲末杜仲牛膝搗汁調敷

喉風腫閉用皂礬一斤好米酢三升拌曬乾爲末吹之痰涎出盡用良薑末少許入茶內漱口嚥之卽愈集效方

喉痹作痛遠志肉爲末吹之涎出爲度直指方

喉痹陳年白梅入蜒蚰令化噙梅於口中

咽喉熱痛龍膽擂水服之集簡方

喉閉腫痛馬蹄草根搗井華水調下卽效救急方

咽喉腫痛百兩金一寸噙嚥津

咽喉痹腫硃砂磨水或酢嚥之甚良

冬月喉痹腰痛不可下藥者蛇牀子燒烟於瓶中口含瓶嘴吸咽其痰自出聖惠方

熱擁咽毒砂仁殼爲末水服一錢嚴原禮方

急喉風用瑞香白花者研水灌之醫學集成

咽喉腫痛用嫩艾搗汁細嚥之

又方青艾和莖葉一握同酢搗爛傅於喉上冬月取乾艾亦得

喉閉腫痛益母草搗爛新汲水一椀絞濃汁頓飲隨吐愈冬月用根易簡方下同

喉痹壅塞不通紅藍花搗絞取汁一小升服之以瘥爲度如冬月無生花以乾者浸濕絞汁煎服極驗

喉風喉痹大青葉搗汁灌之取效止

喉痹腫痛用蠡實一合升麻五分水一升煎三合入少蜜攪勻細呷大驗

又方馬藺子三升升麻一兩爲末蜜丸水服一錢

喉風腫痛鹽蟹汁滿含細嚥卽消時珍

喉痹口噤馬藺花二兩蔓荊子一兩爲末溫水服一錢

喉痹牙疳盆砂末吹並擦之集簡方

走馬喉痹用白礬末塗綿針上按於喉中立破綿針者用榆條上以綿裹作棗大也儒門事親

風熱喉痛白礬半斤研末化水新磚一片浸透取曬又浸又曬至水乾入糞厠中浸一月取洗安陰處待霜出掃收每服半錢水下普濟方

喉痹乳蛾等證用癩蝦蟆眉酥和草烏尖末猪牙皂角末等分丸小豆大每研一丸點患處神效活人心統

纏喉風病取蒼耳根一把老生薑一塊研汁入酒服聖濟總錄

咽喉腫塞痰涎壅滯水不可下者地松連根葉搗汁鵝翎掃入去痰最爲妙

又方用土牛膝鼓鎚草同搗汁灌之不得下者灌鼻得吐爲妙

又方土牛膝春夏用莖秋冬用根一把青礬半兩同研點患處令吐膿血痰沫卽愈

纏喉風腫蚵蚾草卽皺面草細研以生蜜和丸彈子大每噙化一二丸卽愈乾者爲末蜜丸亦可名救生丸

咽喉閉痛箬葉燈心草燒灰等分吹之甚妙集簡方

喉舌瘡爛酒漬蘘荷根半日含漱其汁至瘥乃止外臺秘要

咽喉不利風冷失聲蘘荷根二兩搗絞汁入酒一大盞和勻細細服取瘥肘後方

尸咽痛痹語聲不出麻黃以青布裹燒烟筒中熏之

急喉痹塞木賊以牛糞火燒存性每冷水服一錢血出卽安也聖惠方

喉風痹塞燈心一握陰陽瓦燒存性每吹一捻數次立愈

又方用燈心灰二錢硼砂末一錢吹之

又方燈心草紅花燒灰酒服一錢卽消

喉痹乳蛾新鮮牛膝根一握艾葉七片搗和人乳取汁灌入鼻內須臾痰涎從口鼻出卽愈無灰酒亦可

又方用牛膝搗汁和陳酢灌之

纏喉風痹不通欲死者用返魂草根一莖洗淨納入喉中待取惡涎出卽瘥神效更以馬牙硝津嚥之卽絕根返魂草卽紫菀也

咽喉生瘡脾肺虛熱上攻也麥門冬一兩黃連半兩爲末煉蜜丸如梧子大每服二十丸麥門冬湯下

喉瘡作痛燈籠草炒焦研末酒調呷之醫學正傳

喉痹乳蛾取蝦蟆衣鳳尾草擂爛入霜梅肉煑酒各少許即研絞汁以鵝翎刷患處隨手吐痰即消也 養痹良筆

咽喉痹風躁腫連頰吐血數者馬鞭草一握勿見風截去兩頭搗汁飲之良

喉痹腫痛箭頭草葉入醬少許研膏點入取吐 普濟方

喉卒攻痛商陸切根炙熱隔布熨之冷即易立愈

風毒咽腫嚥水不下及瘰癧咽腫水服莨菪子末兩錢匕神良

喉痹欲絕不可針藥者乾漆燒烟以筒吹之 聖濟總錄

急喉痹塞逡巡不救皂莢生研末每以少許點患之外以酢調厚封項下須臾便破出血即愈或挼水灌之亦良

又方用皂角肉半截水酢米泔煎七分服破出膿血即愈

喉卒癰腫吞薏苡仁二枚良 外臺秘要

喉痹不語大豆煑汁煎稠如飴含之并飲汁 肘後方

喉痹不語煑豉汁一升服覆取汗乃著桂末於舌下嚥之 千金方下同

咽生瘜肉鹽豉和搗塗之先刺破出血乃用神效

咽喉妨礙如有物吞吐不利杵頭糠人參各一錢石蓮肉炒二錢水煎服日三次 聖濟總錄

喉腫難食韭一把搗熬傅之冷即易 千金方

喉中腫痛塞氣不通者葱鬚陰乾爲末每用二錢入蒲州膽礬末一錢和勻每用一字吹之 杜壬方

咽喉腫痛薤根酢搗傅腫處冷即易之 聖惠方

喉咽氣塞喘息不通須臾欲絕用獨頭蒜二枚削去兩頭塞鼻中左患塞右右患塞左候口中膿血出立效

喉痹腫痛大蒜塞耳鼻中日二易之 肘後方

喉痹腫痛芥子末水和傅喉下乾即易之

又方薢芥子研末酢調取汁點入喉內待喉內鳴却用陳麻骨燒烟吸入立愈 聖惠方

喉痹腫痛蘿蔔和皂莢漿服取吐 普濟方

喉痹毒氣生薑二片搗汁蜜五合煎勻每服一合日五服

喉痹腫痛野苦蕒搗汁半盞燈心湯浸捻汁半盞和勻服

喉痹腫痛糟茄或醬茄細嚼嚥汁 德生堂方

咽喉腫痛老黃瓜一枚去子入硝塡滿陰乾爲末每以少許吹之 醫林集要

喉閉腫痛天羅瓜研汁灌之 普濟方

喉痹口噤不開欲死草烏頭皂莢等分爲末入麝香少許擦牙并嗃鼻內牙關自開

又方草烏尖石膽等分爲末每用一錢酢煑皂莢汁調稀掃入腫上流涎數次其毒即破也

喉痹腫痛白附子末枯礬等分研末塗舌上有涎吐出 聖惠方

喉風喉痹用天南星一箇剜心入白殭蠶七枚紙包煨熟研末薑汁調服一錢甚者灌之吐涎愈名如聖散

喉痹引痰法冬月青魚膽用白礬入內臨用加百草霜炒鹽少許酢調以鴨毛蘸藥引吐痰出如無魚膽用白礬半兩巴豆肉十枚同枯過去巴豆用礬如上法吐痰神效吐後用金鎖匙吹之常服必用方甘桔湯最妙

喉痹腫塞痛生半夏末嗃鼻內涎出效 集簡方

咽喉腫痛射干花山豆根陰乾爲末吹之如神 袖珍方

又方扁竹新根擂汁嚥之大腑動即解或酢研汁噙引涎出亦妙

又方用紫蝴蝶根一錢黃芩生甘草桔梗各五分爲末水調頓服立愈名奪命散

喉痹作痛番木鼈青木香山豆根等分爲末吹之

纏喉風腫番木鼈仁一箇木香三分同磨水調熊膽三分膽礬五分以鷄毛掃患處取效 經驗方

喉痹腫痛榼藤子燒研酒服一錢 聖惠方

喉中發癰山豆根磨酢噙之追涎即愈勢重不能言者頻以鷄翎掃入喉中引涎出就能言語 末類方

喉風急證牙關緊閉水穀不下山豆根白藥等分水煎噙之嚥下二三日即愈 楊清叟外科

咽喉腫痛水漿不下苦藥山豆根甘草硝石各一分射干柑皮升麻各半錢爲末蜜丸噙之 聖惠方

喉中熱塞腫痛散血消痰白藥矾硝等分爲末吹之日四五次 直指方

咽喉腫痛白藥末一兩龍腦一分蜜和丸芡子大每含嚥一丸 聖惠方

又方五爪龍草車前草馬蘭草各一握擣汁頻嗽咽喉痹腫塞喘息不通須臾欲絕用絡石草一兩水一升煎一大盞細細呷之

喉痹不語羊蹄獨根者勿見風日及婦人鷄犬以三年酢研如泥生布拭喉外令赤塗之 千金方

咽喉腫痛燕物不得馬勃一分蛇退皮一條燒末綿裹一錢含嚥立瘥

走馬喉痹馬屁勃即灰菰焰硝一兩爲末每吹一字吐涎血即愈

喉痹腫痛生油一合灌之立愈

飲酒咽爛口舌生瘡大麻仁一升黃芩二兩爲末蜜丸含之（千金方）

咽喉腫痛卒不可食白礬和醋塗喉外腫處（普濟方）

喉痹痧腮用糯米三升於端午前四十九日以冷水浸之一日兩換水輕淘轉勿令攪碎至端午日取出陰乾絹袋盛掛通風處每用旋取炒黑爲末冷水調如膏藥貼項下及腫處一夜便消乾即換之常令濕爲妙

喉痹腫痛稻草燒取黑烟醋調吹鼻中或灌入喉中涙出痰立愈（普濟方）

喉風腫痛絲瓜根以瓦瓶盛水浸飲之（海上名方）

咽喉痹痛五月五日收桑上木耳白如魚鱗者臨時搗碎綿包彈子大蜜湯浸含之立效（便民方）

喉痹乳蛾用青梅二十枚鹽十二兩醃五日取梅汁入明礬三兩桔梗白芷防風各二兩猪牙皂角三十條俱爲細末拌汁和梅入瓶收之每用一枚噙嚥津液凡中風痰厥牙關不開用此擦之尤佳

又方梅包生礬末作丸含嚥或納吞之

喉痹塞痛桃皮煮汁三升服（千金方）

咽喉作痛茱萸末傅調塗足心一夕愈

咽喉閉痛生烏藥即矮樟根以酸醋二盞煎一盞先噙後嚥吐出痰涎爲愈

風熱喉痹燈心一錢黃蘗五分並燒存性白礬七分煅過冰片三分爲末每以一二分吹患處（集簡方）

卒喉痹痛黃蘗片含之又以一斤酒一斗煮二沸恣飲便愈（肘後方）

咽喉卒腫食飲不通苦酒和黃蘗末傅之冷即易

喉風閉寒臘月初一日取猪膽不拘大小五六枚用黃連青黛薄荷殭蠶白礬矾硝各五錢裝入膽內青紙包了將地掘一孔方深各一尺以竹橫懸此膽在內以物蓋定候至立春日取出待風吹去膽皮青紙研末密收每吹少許神驗乃萬金不傳之方

大人喉風筆竹油頻飲之（集簡方）

咽喉卒腫不下食地龍十四條搗塗喉外又以一條著鹽化水入蜜少許服之

喉痹塞口用韭地紅小蚯蚓數條酢搗取食之即吐出痰血二三椀神效（普濟方）

又方用地龍一條研極爛以雞子白攪和灌入即通（聖惠方）

喉痹腫塞用蝸牛綿裹水浸含嚥須臾立通

又方蝸牛七枚白梅肉二枚研爛綿裹含嚥立效

喉痹腫痛用荔枝花及皮根水煮汁細細含嚥取瘥止（海上方）

走馬喉痹詩云急喉腫痹最堪憂急取盛燈盞內油甚者不過三五呷此方原是至人留

喉痹腫痛雞矢白含之嚥汁（聖惠方）

咽喉腫痛牙皂一挺去皮米酢浸炙七次勿令焦爲末每吹少許入咽吐涎即愈

喉痹喉風五月五日或六月六日七月七日采楮桃陰乾每用一箇爲末井華水服之重者以兩箇即愈（集簡方）

咽喉生瘡唇層如疊不痛日久有竅出臭氣糜飲食用臭橘葉煎湯連服

纏喉風危急用巴豆七粒三生四熟生者去殼生研熟者去殼燈上燒存性研乾桑黃茹二片雄黃一塊細研麝金一枚研右再研細每服半字茶清少許調下如口噤咽塞以竹管吹入喉中須臾吐利即安矣名雄黃散

喉痹語聲不出猪牙皂角和霜梅爲末噙之

鍼灸

素問曰邪客於手少陽之絡令人喉痹舌卷口乾心煩臂外廉痛手不及頭刺手中指次指爪甲上去端如韭葉各一痏壯者立已老者有頃已左取右右取左此新病數日矣

邪客於足少陰之絡令人嗌痛不可內食無故善怒氣上走貴上刺足下中央之脈各三痏凡六刺立已左刺右右刺左嗌中腫不能內唾時不能出唾者刺骨之前出血立已左刺右右刺左

肺虛則少氣不能報息耳聾嗌乾取其經太陰足太陽之外厥陰內血者

靈樞曰足陽明之別名曰豐隆其病氣逆則喉痹卒瘖宜取之

咽喉閉塞取照海

喉痹舌卷口中乾煩心心痛臂內廉痛不可及頭取手小指次指爪甲下去端如韭葉

嗌乾口中熱如膠取足少陰

喉痹不能言取足陽明能言取手陽明

甲乙經曰喉痛瘖不能言天突主之

喉痹胃中暴逆先取衝脈後取三里雲門皆瀉之

咽腫難言天柱主之

喉痹完骨及天容氣舍天鼎尺澤合谷商陽陽谿中渚前谷商丘然谷陽交悉主之

喉痹咽腫水漿不下璇璣主之

喉痹食不下鳩尾主之

喉痹咽如梗三間主之

喉痹不能言溫溜及曲池主之

喉痹氣逆口喝喉咽如扼狀行間主之

咽中痛不可內食湧泉主之

千金方曰風府天窻勞宮主喉嗌痛

扶突天突天谿主喉鳴暴忤氣喘

少商太衝經渠主喉中鳴

魚際主喉中焦乾

水突主喉咽腫

被門四瀆主呼吸短氣咽中如瘕肉狀

間使主嗌中如梗

少衝主酸咽

少府蠡溝主嗌中有氣如瘕肉狀

中渚支溝內庭主嗌痛

復溜照海太衝中封主嗌乾

前谷照海中封主咽偏腫不可以咽

涌泉大鍾主咽中痛不可內食

然谷太谿主嗌內腫氣走咽喉而不能言

風池主喉咽僂引項攣不收

完骨天牖前谷主喉痹頸項腫不可俛仰頰腫引耳後

中府陽交主喉痹胃滿塞寒熱

天容缺盆大杼膈俞雲門尺澤二間厲兌涌泉然谷主喉痹咽寒熱

天鼎氣舍膈俞主喉痹噎咽腫不得消食飲不下

天突主喉痹咽乾急

大陵偏歷主喉痹嗌乾

璇璣鳩尾主喉痹咽腫水漿不下

三間陽谿主喉痹咽如哽

神門合谷風池主喉痹

三里溫溜曲池中渚豐隆主喉痹不能言

關衝竅陰少澤主喉痹舌卷口乾

凡喉痹胃中暴逆先取衝脈後取三里雲門各瀉之又刺手小指端出血立已

東垣十書曰喉閉刺手足少陽井卽關衝竅陰

喉閉乳蛾取少商鍼入一分臥鍼向後三分照海太衝

丹溪心法曰喉閉少商合谷尺澤皆鍼之

累年喉痹男左女右手大指甲第一節灸三小壯得效方曰喉閉不開取陽靈穴出血卽愈

根腳咽喉常發者耳垂珠下半寸近腮骨灸七壯二七九妙

咽喉腫痹鍼風府主咽喉諸病及毒氣歸心等項惡證無不效又鍼少商咽喉腫痛皆治之又鍼合谷又鍼上星治頰腫纏喉風等證又鍼足三里

醫學綱目曰內經鍼灸喉痹法有二今以經脈所過咽喉取之驗者及他病相干而致喉痹取之者通六經也

其一取手足陽明經云喉痹不能言取足陽明能言取手陽明又云胃足陽明脈從大迎前下人迎循喉嚨所生病者頸腫喉痹親盛盛熱寒陷下取之又云足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其病氣逆則喉痹卒瘖取之所別也又曰大腸手陽明脈所生病者喉痹親盛盛熱寒陷下取之也

其二取手少陽經曰三焦手少陽之脈出缺盆上項繫耳後是動則病嗌腫喉痹親盛盛熱寒陷下取之又曰邪客手少陽之絡令人喉痹刺手中指次指爪甲上去端如韭葉各一痏壯者立已老者項已左取右右取左是也

其三以經絡所過喉咽者有二經曰肝足厥陰之脈循喉嚨之後故喉之後疼者取之累驗也又云腎足少陰之脈上貫肝鬲循喉嚨賁門所謂必准者照海治喉中之閉塞是也

其四他病相干致喉痹者有一經曰心主之脈喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痹取心之俞蓋大陵穴是

也

治喉痹豐隆湧泉關衝甚者以小三稜鍼藏筆鋒中許言點藥於喉痹上乃刺出紫血頓下立愈

喉閉不通少商隱白少衝湧泉

喉痹頷腫如升水粒不下少商出血手大指背頭節三稜鍼刺三鍼出血陽谷三分

喉痹刺少陰少陰在手腕當小指掌後動脈是也鍼入三分補之

內經炎刺咽喉腫痛有二其一取足少陰經云腎足少陰之脈所生病者咽腫上氣嗌乾痛又云嗌中腫不能內唾時不能出唾者刺然骨之前出血立已左刺右右刺左又云邪客足少陰之絡令人嗌痛不可納食無故善怒氣上走貫上刺足下中央之脈各三壯凡六刺立已左刺右右刺左是也

其二取手太陽經云小腸手太陽之脈是動則病嗌痛頷腫視盧實寒熱陷下取之也

內經炎刺咽嗌介介如梗狀有二其一取陽陵泉經云膀病者善太息口苦嘔宿汁嗌中介介然數唾取陽陵泉是也

其二取大陵經云心欬之狀喉中介介然如梗狀取心之俞是也

醫學入門曰火鬱則發之砭刺出血卽汗之之義也血出多則愈有鍼痞者薑汁調熟水時時呷之凡關上血泡最宜鍼關下不見者令病人含水一口用蓋管尖刺舁孔出血妙

醫方考曰急喉閉於患人手大指外邊指甲後一韭葉許鍼之男左女右血出卽效如大段危急兩手大指俱鍼之其效甚捷蓋喉嚨者肺之系所鍼之處乃少商也爲肺之井穴故出血則愈

喉中紅赤用鍼從旁鍼之出血卽愈所以必從旁穿者避痦門穴犯之令人失音故耳

導引

古今醫統曰治喉痹就令患人將手大拇指第二節屈踡急令張口勤勤堅咬其氣通暢血絲自散腫亦消矣

保生祕要曰喉風可於患處推清肺經呵而吸之

醫案

後漢書華佗傳曰佗嘗行道見有病咽塞者因語之曰向來道隅有賣餅人辦蘘甚酸可取三升飲之病自當去卽如佗言立吐一蛇乃懸於車而候佗時佗小兒戲於門中逆見自相謂曰客車邊有物必是逢我翁也及客進顧視壁北懸蛇以十數乃知其奇

儒門事親曰一婦人病咽喉腫塞漿粥不下數日腫不退藥既難下針亦無功戴人以當歸荊芥甘草煎使熱漱之以冷水拔其兩手不及五六日痛減腫消飲食如故咽喉之病甚急不可妄用針藥

衛生寶鑑曰梁氏膏粱之子因洪飲大熱之氣所傷滋溢心火刑於肺金故以桑白皮地骨皮苦微寒降肺中伏而補氣用以爲君黃芩知母苦寒治氣急腥臭清利肺氣用以爲臣肺欲收急食酸以收之五味子之酸溫以收肺氣麥門冬甘苦寒治渴唾稠黏口舌乾燥用以爲佐桔梗體輕辛溫治痰逆利咽膈爲使也戊辰春鄉村病喉痹者甚衆蓋前年終之氣及當年初之氣二火之邪也用甘桔湯加芩連半夏殭蠶鼠黏子葛根等劑發之虛加參芪當歸之類水漿不入先用解毒雄黃丸酢化灌之痰出更灌薑汁服前藥無不神驗若用膏糜酸寒點過者皆不治蓋邪鬱不出故也

奇效良方曰楊立之自廣府通判歸楚州喉間生癰既腫潰而膿血流注曉夕不止寢食俱廢醫者束手適楊吉老來赴郡守招立之兩手走往邀之至熱視良久曰不須看脈已得之矣然此疾甚異須先啖生薑片一斤乃可投藥否則無法也語畢卽出子有難色曰喉中潰膿痛楚豈宜食生薑立之曰吉老醫術通神其言不妄試取一片啗看如不能進則屏去無害遂食之殊有甘香稍加益至半斤許痛處已寬滿一斤始覺味辛辣膿血頓盡粥飲入口了無滯碍明日招吉老謝而問之對曰君居南方多食鷓鴣此禽好啖半夏久而毒發故以薑製之今病源已清無服他藥子記唐小說載崔魏公病此醫梁新診之曰中食毒僕曰常好食竹雞梁曰竹雞多食半夏苗蓋其毒也命攪生薑汁折齒灌之遂復活甚與此相類也

醫學綱目曰孫押班治都知潘元從喉閉孫以藥半錢吹入喉中少頃吐出膿血立愈潘詣孫謝曰大恩之患非明公不能救救人之急非藥不能療贈金百兩願求方以濟非常之急孫曰用猪牙皂角白礬黃連各等分置新瓦上焙乾爲末耳旣授以方不受所贈

薛己醫按曰通府李朝用咽喉腫痛口舌生瘡此上焦風熱先用荊防敗毒二劑喉痛漸愈又以元參升麻湯口舌遂愈

地官黃北盤喉痛作渴飲冷大便不通此上下表裏實熱用防風通聖散治之頓愈

一男子咽喉腫痛予欲針之以泄其毒彼畏針止服藥然藥及熱已不能下矣始急針患處出毒血更飲清咽消毒藥而愈

地官胡誠甫咽喉燥痛此腎經膀胱虛熱用四物加黃蘗知母元參四劑少愈更以人參固本丸一劑不復發

歲方虛抑齋咽喉腫痛兩目矇眛小便赤澁此膀胱濕熱用四苓散加黃蘗黃連知母茵陳防己治之而頓愈又用六味地黃丸而痊

儒者王文遠咽喉腫痛口舌生瘡勞則愈甚余謂脾肺氣虛膀胱有熱以補中益氣加元參酒炒黑黃蘗知母稍愈乃去黃蘗知母加山茱山藥乃痊

一儒者年踰五十咽喉痛服涼藥或過勞痛愈甚此中氣虛熱以補中益氣加炒黑芩連四劑而愈乃去芩連又數劑全愈

一儒者脚發熱則咽喉作痛內熱口乾痰涎上湧此腎經磨損火不歸經用補中益氣加麥門五味加減八味丸而全愈

一老人咽喉痛小便數而赤日晡尤甚此膀胱陰虛當滋化源以補中益氣加酒炒黑黃蘗知母二味四劑咽痛稍可乃去二味加以山茱山藥麥門五味頓愈

一男子咽喉腫藥不能下針患處出紫血少愈以破棺丹含化更用清咽利膈散而頓愈

一男子素善飲咽喉作痛內熱作渴小便不利飲食如常此膀胱積熱用四苓散加茵陳大黃四劑諸證漸退又用清心蓮子飲而安

一星士勞而入房喉痛漸閉痰涎上湧四肢乍熱此陰虛陽氣飛揚用補中益氣湯加附子煎灌而愈

憲副姜時川癸卯冬就診於予右寸浮數有力口中有瘡余曰此胃火傳於肺也當薄滋味慎起居甲辰秋復就診尺脈洪數而無力余曰此肺金不能生腎水宜靜養以滋化源彼云今喉間及耳內不時燥痛肢體不時發熱若無根之火殊無疑矣後謂劉古峽云立齋謂我之病可疑至乙巳孟春古峽謂余曰姜公之病已如算料遂同余往視喉果腫潰脈愈洪大或用湯火之藥反速其歿

雲間吳上舍年踰五十咽喉腫痛或針出血神思難清尺脈洪數而無倫次按之微細如無余曰有形而無痛陽之類也當峻補其陰今反傷陰血必死已而果歿蓋此證乃腎氣虧損無根之火炎上爲患惟加減八味丸料煎服使火歸源庶幾可救

府庠歸雲橋之內產後患喉痛服清熱等劑益甚余診之屬膀胱經血虛也蓋膀胱之脈上行至顃而還用八珍湯牡丹皮柴胡酒炒黑黃蘗二劑而愈

沈大方咽喉間偶有痰遂左顧吐之以未及合而頸骨如擢莫能轉視至夜增劇潛發盜汗手足痲冷臥起必藉人扶持稍動則痛連心腹苦楚萬狀不可勝數如是者三四日延予視之曰此怒動肝火膽得火而筋攣縮以六味地黃丸料加山梔柴胡以清肝火生膽血一劑未竟日而談笑舉動一一如常矣接見賓從俱以爲前日之病者罔也

一婦人喉間作痛兩月後而潰遍身筋骨作痛余以爲楊梅瘡毒先以蕁薟湯數劑而平更以四物加蕁薟黃芪二十餘劑諸證悉退

一孀月小兒口內患之後延遍身年餘不愈以蕁薟爲末乳汁調服母以白湯調服月餘而愈

一男子先患喉痛後發楊梅瘡用輕粉等劑愈而復發仍服前藥後又大發上齶潰爛與鼻相通臂腕數顆其狀如桃大潰年餘不飲虛證悉見余以蕁薟湯爲主兼以健脾之劑月餘而安

按齊東野語喉閉之疾極速而烈前輩傳帳帶散惟白礬一味然或時不盡驗辛丑歲余侍親自福建還汾途多此證至有闔家十餘口一夕併命者道路蕭然行旅惴惴及抵南浦有老醫教以用鵝嘴膽礬研細以醯酢調灌歸途恃以無恐然亦未知其果神也及先子守臨打日鈐下一老兵素愚謹忽垂泣請告曰老妻苦喉閉絕水粒者三日命垂殆矣偶藥笈有少許即授之俾如法用次日喜拜庭下云藥甫下咽即大吐去膠痰凡數升即瘥其後凡治數人莫不立

驗然膽礬難求眞者養生之家不可不預儲以備用也

廷評張汝翰患喉痛日晡益甚此氣血虛而有熱用八珍湯而愈後每入房發熱頭痛用補中益氣加麥門五味及六味丸常服後不復作

秋官葉任菴素陰虛因怒忽喉腫寒熱頭痛項强目直小便自出此皆肝火之證肝主筋膜火主腫脹火旺則血涸筋攣目系緊急頸項如拔陰挺痿弱則小便自遺遂刺患處出毒血用四物柴胡山梔元參甘草而甦再用六味丸料以生肝血滋腎水諸證悉愈

太守葉天培咽喉腫痛痰涎不利手足發熱喜冷飲食用清咽利膈湯二劑不應刺少商穴喉少寬痰從鼻出如膠患處出紫血稍寬至七日咳出穢膿而愈

一儒者三塲畢忽咽喉腫閉不省人事喘促痰湧汗出如雨肢體痿軟脈浮大而數此飲食勞役無根虛火上炎用補中益氣加肉桂一劑頓甦

義士顧克明咽喉作痛至夜發熱此肝盛陰虛之熱用四物加酒炒黑黃蘗知母麥門五味治之而愈後因勞咽喉腫閉刺患處出血用桔梗湯吐痰而消至仲夏乾咳聲嘶作渴發熱日晡足熱用滋腎丸加減八味丸間服三月餘喜其年富謹疾得愈

一婦人咽喉腫痛大小便祕以防風通聖散一劑諸證悉退又以荊防敗毒散三劑而安常治此證輕則荊防敗毒散吹喉散重則用金鑰匙及刺患處出血最效否則不救針少商二穴亦可不若刺患處之爲神速耳

一男子咽喉腫痛脈數而實以凉膈散一劑而痛止以荊防敗毒散加牛蒡子二劑而腫痛退以荊防敗毒散二劑又以甘草桔梗荊芥防風元參牛蒡子四劑而平

一男子咽喉腫閉痰涎壅甚以膽礬吹咽中吐痰椀許更以清咽利膈湯四劑而安

一男子咽喉腫痛藥不能下針患處出紫血少愈以破棺丹噙之更以清咽消毒散服之而愈

一男子咽喉乾燥而痛以四物湯加黃蘗知母元參四劑少愈更以人參固本丸一劑不再發

一男子咽痛午後益甚脈數無力以四物湯加黃蘗知母荊防四劑而愈仍以前藥去荊防加元參甘桔數劑後不再發

莆田史侍御患喉閉以防風通聖散治之腫不能嚥予謂此證須針乃可奈牙關已閉遂刺少商穴出血口即開更以膽礬吹患處吐痰二椀許仍投前藥而愈嘗見患此疾者畏針不刺多斃

一老人咽痛日晡尤甚以補中益氣湯加酒炒黃蘗知母數劑而愈

一男子乳蛾腫痛脈浮數尚未成膿針出惡血飲荊防敗毒散二劑而消

一男子乳蛾腫痛飲食不入瘡色白其膿已成針之膿出即安

一男子嗌癰腫痛脈浮數更沉實飲防風通聖散一劑瀉一次勢頓退又以荊防敗毒散二劑而消

一患者其氣已絕心頭尚溫急針患處出黑血即蘇如鮑符卿喬侍御素有此證每患皆以針去血即愈大抵咽喉之證皆因火爲患其害甚速須分緩急及膿成否若腫閉及壅塞者死在反掌之間宜用金鑰匙吹患處吐出痰涎氣得通即蘇若吐後仍閉乃是惡血或膿毒爲患須急針患處否則不治前人云治喉閉之火與救火同不容少待又云走馬看喉閉信夫治喉之方固多惟用針有回生之功即不用針只以萬年青取汁入喉吐出即愈

一男子咽喉作痛痰涎上壅予欲治以荊防敗毒散加連蕤山梔元參牛蒡子彼自服甘寒降火之藥反加發熱咽愈腫痛急刺少商二穴仍以前藥加麻黃汗之諸證竝退惟咽間一紫處仍痛此欲作膿以前藥去麻黃一劑膿潰而愈凡咽痛之疾治之早或勢輕者宜用荊防敗毒散以散之治之遲或勢重者須刺少商穴瘀血已結必刺患處亦有刺少商咽雖利而未全消者必成膿也然膿去即安若有大便祕結者雖經針刺去血必欲以防風通聖散攻之甘寒之劑非虛火不宜用

于縣尹喉閉腫痛寒熱脈洪數此少陰心火少陽相火二經爲病其證最惡惟刺患處出血爲上因彼畏鍼先以凉膈散之藥從鼻出急乃願刺則牙關已緊不可鍼遂刺少商二穴以手勒去黑血口即開仍刺喉間治以前藥及金鑰匙吹之頓退又以人參敗毒散加芩連元參牛蒡子四劑而平經曰火鬱發之謂發汗出血乃發汗之一端也河間云治喉閉之火與救火同不容少怠常見喉閉不去血喉風不去痰以至不救者多矣每治咽喉腫痛或生瘡毒以荊防敗毒散加芩連重者用防風通聖散竝效

杜皋人咽喉腫痛口舌生瘡先以清咽消毒散二服

更以元參升麻湯而愈

一男子年三十餘口舌常破如無皮狀或咽喉作病服清咽利膈散愈甚予以理中湯治之而愈

王文遠咽喉腫痛口舌生瘡勞而愈甚以補中益氣湯加元參酒炒知母黃蘗治之而愈

一男子咽痛而脈數以荊防敗毒散加芩連二劑少愈乃去芩連又二劑而愈

一男子咽喉腫閉牙關緊急針不能入先刺少商二穴出黑血口即開更針患處飲清咽利膈散一劑而愈

醫學綱目曰文潞公一日喉腫喻林咽喉科治之經三日愈甚上命孫名治之孫曰得相公書判筆一管去筆頭水霑筆管點藥入喉便愈孫隨手便刺相公昏仆不省人事左右皆驚愕流汗孫乃笑曰非我不能救相公須臾噴出膿血升餘旬日乃平復如故見上上喜曰孫名良醫甚有手段予嘗治一男子喉痹於太谿穴刺出黑血半盞而愈由是言之喉痹以惡血不散故也凡治此疾暴者必先發散發散不愈次取瘀取瘀不愈次去污血也

古今醫統曰一人攜二僕入京其一忽患喉風脹滿氣塞不通命在須臾詢諸郡人云有李家世醫喉痹即令僕往就醫李駭曰證候甚危猶幸來此不然即死何疑乃於筒中取一紙撚用火點著纔煙起吹滅之令僕張口刺於喉間俄吐出紫血半合即時氣寬能言及啖粥飲擕藥傳之立愈其人神其藥竊訪其祕蓋預以巴豆油塗紙故施火即著藉其毒氣往赴病處

一人患咽喉腫痛下食不得身熱頭疼大便不通衆醫之論紛然皆以爲熱當服涼藥一善醫云脈緊數是感寒所致衆醫不從善醫者曰我有法驗得寒熱室中生火用煎葱湯淋浴若是熱病則此煖處必有汗而咽喉痛不減若是感寒雖浴無汗患者信其言遂入浴洗而無汗就浴室中服麻黃湯一服須臾大汗出大便通即時無事衆醫服其神凡辨熱病感寒用此法最妙

醫方考曰名醫錄云李王公主患喉癰數日痛腫飲食不下召到醫官盡言須用鍼刀潰破公主開用刀鍼哭不肯治痛迫水穀不入一草澤醫曰某不用刀鍼只用筆頭蘸藥癰上霎時便潰公主喜令召之方兩次上藥遂潰出膿血一盞餘便寬兩日癒無事令供其方醫云乃以鍼繫筆心中輕輕劃破而潰之爾他無方也

外科正宗曰一男子咽喉腫痛發寒體倦脈弦有力此邪在表以荊防敗毒散加牛蒡元參一劑表證已退腫痛仍作又以元參解毒湯二劑腫痛減半又二劑而安

一男子咽喉腫痛痰涎壅盛用金鎖匙先吐稠痰清咽利膈湯推蕩積熱腫痛稍減惟色紅甚此火熱也又以黃連解毒湯加桔梗二劑紅腫亦退而安

一男子素飲火酒一時咽喉腫閉口噤舌強痰涎壅塞勢頗危急用鍼先刺少商二穴口噤方開以桐油餞雞翎探吐稠痰數椀語聲方出仍用鍼刺腫上出紫血鍾許溫湯漱淨冰硼散搽之以涼膈散加芒硝天花粉利去積熱又以連翹散二劑而安

一婦人咽痛微腫色白吐嗽不利診之脈亦細微此中氣不足虛火假證也用理中湯二服其疼頓止以補中益氣湯加炒黃蘗知母數服再不復作

一婦人肥甚暑熱咽間腫痛痰涎上壅語聲不出甚危先用針刺毒血次以金鎖匙吐去稠痰五六椀以清咽利膈湯一服腫痛少減去硝黃又服而安

一男子勞甚咽喉腫痛自服清咽利膈藥不應診之脈細而虛此勞傷虛火之證朝以補中益氣湯加麥冬五味子桔梗元參晚以四物湯加黃蘗知母炒黑乾薑服加童便不數日腫痛亦消痰回咽愈

一男子腫痛日甚服清咽利膈藥不應必欲作膿以防風通聖散去硝黃二服喉膿脹痛下針而愈

景岳全書曰余友王蓬崔年出三旬初未識面因患喉痹十餘日延余診視見其頭面浮大喉頸粗極氣急聲啞咽腫口痛痛楚之甚一婢倚背坐而不臥者累日矣及察其脈則細數微弱之甚問其言則聲微似不能振者詢其所服之藥則無非芩連梔蘗之屬此蓋以傷陰而起復爲寒涼所遏以致寒盛於下而格陽於上即水飲之類俱已難入而尤畏煩熱余曰危哉再遲半日必不救矣遂以鎮陰煎以冷水頓冷徐徐便嚥之用畢一煎過宿而頭項腫痛盡消如失余次早見之則癒然一瘦質耳何昨日之巍然也遂繼用五福飲之類數劑而起疑者始皆駭服自後感余再生遂成莫逆

來宅女人年近三旬因患虛損更兼喉痹疼痛多醫罔效余診其脈則數而無力察其證則大便溏泄問其治則皆退熱清火之劑然愈清火而喉愈痛察之

既確知其本非實火而且多用寒凉以致肚腹不實穗亦格陽之類也遂專用理陰煎及大補元煎之類出入間用不半月而喉痛減不半年而病全愈

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百八十四卷目錄

醫部彙考一百六十四

鬚髮門一　毛附

黃帝素問上古天眞論　六節藏象論　五藏生成篇　痿論　六節藏象論　金匱眞言論　調經論　長刺節論

靈樞經　終始篇　經脈篇　寒熱病篇　熱病篇　五變篇　本藏篇　天年篇　陰陽二十五人篇　五音五味篇　百病始生篇　邪客篇　五禁篇　鬚髮篇

扁鵲難經　毛折　髮槁

張機金匱要略　髮落　毛聳

華佗中藏經　髮黃

王叔和脈訣　毛髮乾澁　髮直

黃漢卿瘡瘍全書　眉風毒　發眉瘡　髮發毒　鬚髮毒

張子充醫說　各有所屬

張從政儒門事親　血熱髮落　眉棟

李杲十書　楊郭主治

朱震亨心法　眉龐痛

李梴醫學入門　髮乃血餘　榮枯楊郭

徐春甫古今醫統　補養氣血則美而不白　眉痛

龔信古今醫鑑　鬚髮各病

龔廷賢萬病回春　立名之義

王肯堂證治準繩　粗脈所榮　於髭毒　髮際發眉痛　髮際　眉心痣　髮際

陳實功外科正宗　龍泉痘虎鬚毒

陳士鐸石室秘錄　生眉烏髮

方一　張天師草還丹　元精丹　青絲散　擦牙烏鬚方　丁砂散　訶子散　鬚五倍子法　烏鬚烏髮方　又方　熟白方　改油去白方　黑雲散　潤榮散　三聖膏　八物湯　四物湯

醫部彙考一百六十四

鬚髮門一　毛附

黃帝素問

上古天眞論

女子七歲腎氣盛齒更髮長

註血乃腎之液髮乃血之餘故髮長也

四七筋骨堅髮長極

註精血盛極之時是以筋骨堅髮長極也

五七髮始墮六七髮始白

註陽明之脈循髮際故其衰也髮墮血脈華於色血脈衰故髮白也

丈夫八歲腎氣實髮長齒更五八腎氣衰髮墮齒槁

註腎爲生氣之原男子衰於氣故根氣先衰而髮墮齒槁也

六八陽氣衰竭於上髮鬢頒白八八則齒髮去

註數終衰極是以不惟頒白枯槁而更脫落矣

六節藏象論

肺者氣之本魄之處也其華在毛

註肺主皮毛故華在毛

腎者主蟄封藏之本精之處也其華在髮

註髮乃血之餘血乃精之化故其華在髮

五臟生成篇

肺之合皮也其榮毛也

註毛附於皮氣長則毛榮

腎之合骨也其榮髮也

註腎藏精而主髓故所合在骨髮乃精血之餘故其榮在髮

多食苦則皮槁而毛拔

註苦乃火味太過則傷肺而皮槁毛落

多食甘則骨痛而髮落

註甘乃土味太過則傷腎而骨痛髮落

痿論

肺主一身之皮毛故肺熱葉焦則皮毛虛弱急薄

註肺主皮毛肺熱葉焦則皮毛虛薄矣

肺熱者色白而毛敗

鍼解篇

人髮齒耳目五聲應五音六律

註髮齒耳目共六齒又爲六六之數而髮之數不可數矣律呂之數推而廣之可千可萬而萬之外不可數矣

調經論

邪客於形濕淅起於毫毛

註邪客於形尚在皮膚間故濕淅起於毫毛

長刺節論

病大風鬚眉墮名曰大風

註大風厲風也從肌肉而傷衛任之血氣故鬚眉墮也

靈樞經

終始篇

春氣在毛

註陰陽之氣始於皮毛而入筋骨自外而內也

太陰終者皮毛焦而終

註手太陰之氣絕而皮毛天焦矣

經脈篇

手太陰氣絕則皮毛焦太陰者行氣溫於皮毛者也故氣不榮則皮毛焦皮毛焦則津液去皮節津液去皮節者則爪枯毛折毛折者則毛先死丙篤丁死火勝金也

註 手太陰之氣主於皮毛是以太陰氣絕則皮毛焦手太陰主氣氣主熏膚澤毛故太陰者行氣溫於皮毛者也是以氣不榮則皮毛焦津液者隨三焦出氣以溫肌肉淖澤於骨節潤澤於皮膚氣不榮則津液去皮節津液去皮節則爪枯毛折矣毛先死者手太陰之氣先絕於外丙篤丁死肺臟之氣死於內也

手少陰氣絕則脈不通脈不通則血不流血不流則髦色不澤

註 血隨脈氣流行者也髦者血氣之所生也故血脈不流則髦色不澤

足少陰氣絕則骨枯髮無澤髮無澤者骨先死

註 夫腎主藏精而化血髮者血之餘也髮無澤者腎臟之精氣絕而骨先死矣

寒熱病篇

皮寒熱者不可附席毛髮焦鼻槁腊

註 病在皮故不可附席皮膚之血氣以滋毛髮皮氣傷故毛髮焦也肺主皮毛開竅在鼻故鼻爲之乾槁

肌寒熱者肌痛毛髮焦而脣槁腊

註 脈外之血氣充膚熱肉生毫毛故病在肌則肌肉痛而毛髮焦也

熱病篇

癲疾毛髮去索血於心

註 癲疾脈癲疾也髮者血之餘若癲疾而毛髮去當索血於心

五變篇

風雨寒暑循毫毛而入腠理

本臟篇

腎合三焦膀胱三焦膀胱者腠理毫毛其應皮急而無毫毛者三焦膀胱急毫毛美而粗者三焦膀胱直稀毫毛者三焦膀胱結也

註 太陽之氣主皮毛本經云熏膚充身澤毛是謂氣是以皮毛皆應於三焦膀胱又曰脾生肉肉生肺肺生皮毛

天年篇

四十歲榮華頹落髮頗頒白

註 髮頗頒白乃陽明少陰之氣衰也

陰陽二十五人篇

足太陽之上血氣盛則美眉眉有毫毛血多氣少則惡眉而多小理

註 足太陽之脈起於目內眥循兩眉而上額交巔是以皮膚之血氣盛則眉美而眉有毫毛也毫毛者眉中之長毛因血氣盛而生長惡眉者無華彩而枯瘁也面多小理者多細小之紋理蓋氣少而不能充潤皮膚也

足陽明之上血氣盛則髯美長血少氣多則髯短氣少血多則髯少血氣皆少則無髯兩吻多畫足陽明之下血氣盛則下毛美長至胷血多氣少則下毛美短至臍血氣皆少則無毛有則稀枯瘁

註 足陽明之脈其上行者挾口環脣下交承漿是以皮膚之血氣盛則髯美而長血少氣多則髯短氣少血多則髯少氣血皆少則無髯蓋血盛則淡滲皮膚而生毫毛氣者所以熏膚充身澤毛者也是以在上之鬚眉在下之毫毛皆藉皮膚之氣血以生長血氣少而不能充皮膚肥腠理故兩吻多畫蓋肌肉不得充滿而多瘦紋也足陽明之脈其下行者循膺胷下臍腹從膝臏而至足跗故在下皮膚之血氣盛則下毛美而長至胷血多氣少則下毛美短至臍血氣皆少則無毛雖有亦稀而枯瘁也

足少陽之上氣血盛則通髯美長血多氣少則通髯美短血少氣多則少鬚血氣皆少則無鬚足少陽之下血氣盛則脛毛美長外踝肥血多氣少則脛毛美短外踝皮堅而厚血少氣多則胻毛少外踝皮薄而軟血氣皆少則無毛外踝瘦無肉

註 足少陽之經脈其上行者循於耳之前後加頰車下頸項是以皮膚之血氣盛則通髯美長血多氣少則通髯美短蓋鬚髮乃血之餘是以血多氣少雖短而美也其經脈之下行者循膝外廉下輔骨之前抵絕骨之端下出外踝之前循足跗上是以在下皮膚分肉之血氣盛則脛毛美長外踝肥血多則皮堅而厚血少則皮薄而軟蓋血之所以淡滲於皮膚者也

手太陽之上血氣盛則有多鬚

註 手太陽之脈其上行者循於顴頰耳目鼻眥之

間是以皮膚之血氣盛則有多鬚
手陽明之上血氣盛則髭美血少氣多則髭惡血氣皆少則無髭
註手陽明之脈其上行者挾口交人中上挾鼻孔是以皮膚之血氣俱盛則髭美好惡者稀而枯瘁也
手少陽之上血氣盛則眉美以長
註手少陽之脈其上行者出走耳前交頰上至目銳眥是以皮膚之血氣盛則眉美以長長者卽生毫毛之意也

五音五味篇

黃帝曰婦人無鬚者無血氣乎岐伯曰衝脈任脈皆起於胞中上循背裏爲經絡之海其浮而外者循腹右上行會於咽喉別而絡脣口血氣盛則充膚熱肉血獨盛則淡滲皮膚生毫毛今婦人之生有餘於氣不足於血以其數脫血也衝任之脈不榮口脣故鬚不生焉
註此論絡脣口生髭鬚之血氣皆衝任脈之所滲也
黃帝曰士人有傷於陰陰氣絕而不起陰不用然其鬚不去其故何也宦者獨去何也岐伯曰宦者去其宗筋傷其衝脈血瀉不復皮膚內結脣口不榮故鬚不生黃帝曰其有天宦者未嘗被傷不脫於血然其鬚不生其故何也岐伯曰其天之所不足也其任衝不盛宗筋不成有氣無血脣口不榮故鬚不生
註髭鬚生於有生之後然又本於先天精氣陰陽血氣有互相資生之妙

美眉者太陽多血通脣極鬚者少陽多血美鬚者陽明多血
註此論人合天之四時無分手足也

百病始生篇

虛邪之中人也始於皮膚皮膚緩則腠理開開則邪從毛髮入入則抵深深則毛髮立毛髮立則淅然
註夫邪之中人必先始於皮毛人之形虛則皮膚緩而腠理開開則邪從毛髮入入則抵深深則毛髮立蓋氣者所以充膚澤毛如邪傷氣則折毛發理此邪入於皮膚而氣不傷故毛髮立淅然者灑淅動形也

邪客篇

地有草冀人有毫毛
註此論人之形身與天地相應也

扁鵲難經

毛折

十四難曰損脈之爲病一損損於皮毛皮聚而毛落從下上者皮聚而毛落者死

二十四難曰手太陰氣絕卽皮毛焦太陰者肺也行氣溫於皮毛者也氣弗榮則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去卽皮節傷皮節傷則皮枯毛折毛折者則毛先死丙日篤丁日死

髮槁

二十四難曰足少陰氣絕卽骨枯少陰者冬脈也伏行而溫於骨髓故骨髓不溫卽肉不著骨骨肉不相親卽肉濡而却肉濡而却故齒長而枯髮無潤澤無潤澤者骨先死戊日篤己日死

漢張機金匱要略

髮落

夫失精家髮落脈極虛芤遲

毛聳

太陽中暍發熱惡寒小便已瀝瀝然毛聳

華佗中藏經

死候

眉采傾者七日死
髮眉如衝起者死
髮直者十五日死
髮如麻喜怒不調者死
心與小腸絕者六日死絕則髮直如麻汗出不已不得屈伸者是也

晉王叔和脈訣

毛髮乾澁

遲脈歌曰三部俱遲腎臟寒皮膚燥澁髮毛乾
肺脈歌曰實大相兼滑毛焦漱唾黏更和咽有燥秋盛夏宜砭沉細仍兼滑因知是骨蒸皮毛皆總澁寒熱兩相承
細脈歌曰乏力無精腰裏酸形容憔悴髮毛乾如逢冬季經霜日不療其病必自痊
肺臟歌曰口鼻氣出不復迴脣反無文黑似煤皮毛焦乾爪枯折途程三日定知災
腎臟歌曰面黑齒痛目如盲自汗如水腰折頰皮肉濡却髮無澤四日應當命不存

髮直

肺脈歌曰十二動而又不來欬嗽唾膿兼難補髮直

如麻只片時扁鵲也應難救護
察色觀病歌髮直如麻半日死
宋竇漢卿瘡瘍全書
眉風毒
此毒受在肝經氣血上壅結聚成毒當用敗毒流氣飲內托流氣飲清肝飲治之
發眉瘡
發眉瘡從眉至頭生瘡色黑其腫漸漸腫氣浮滿面其瘡如石鍼刺無膿其水自出痛不可忍悶亂嘔逆者正是此瘡六日可刺出膿如吐逆心悶漸減可治如不能減男子二十四日而歿女子七日而終矣急用止痛拔毒散治之
髭發毒
此證乃脾胃虛熱心肺邪風上攻禾髎之端多在承漿之側形如羊刺四邊腫硬痛楚難禁時流黃水麻痺悄寒壯熱毒氣下流心胃主周身壯熱皆伏陽攻其心肺虛熱注於三焦內服當歸內托散外微擦破以神應散搽之
鬚發毒
此毒因腎經有熱水枯不能上潤於心火故發此毒急服人參敗毒散加五味子千金內托散蠟礬丸每服五六十丸連進十餘服待疽軟頭用替鍼丸咬破不可用鍼刺若鍼刺瘡口出黃水四圍生細黃泡徧面游走再用拔毒散圍四畔治法同髭發毒煎劑隨時施治
張子充醫說
各有所屬
髮屬心故上生稟火氣也眉屬肝故橫生稟木氣也
鬚屬腎故下生稟水氣也
元張從政儒門事親
血熱髮落
人年少髮早白落或白屑者此血熱而太過也世俗止知髮者血之餘也血衰故耳豈知血熱而髮反不茂肝者木也火多木少木反不榮火至於頂炎上之甚也大熱病汗後勞病之後皆髮多脫落豈有寒耶
眉煉
小兒瘡在面曰眉煉在耳曰輭耳在足曰靴痒此三者皆謬名也內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火乃心火熱盛之致然也可用鍼刺之出血一刺不愈當再刺之則必愈矣內經曰血實者宜決之決者破其血也眉煉不可用藥傳之其瘡多痒則必爬若使入眼則眼必損矣
李杲十書
槁落主治
脈弦氣弱皮毛枯槁黃芪建中湯四物湯主之
虛損之疾一損損於肺皮聚而毛落宜八物湯
朱震亨心法
眉眶痛
眉眶痛屬風熱與痰作風痰痛風類治
痛有二證眼屬肝有肝虛而痛幾見光明則眶骨痛甚宜生熟地黃丸又有眉稜骨痛眼不可開靜夜劇宜導痰湯或芎辛湯入芽茶或二陳湯吞青州白丸子良
明李梴醫學入門
髮乃血餘
血盛則髮潤血衰則髮衰血熱則髮黃血敗則髮白矣
榮枯槁落
鬚髮顏面皆皆脈所絡陽精盛注於外則鬚髮榮盛面體光潤
膽榮在鬚腎華在髮精氣上升則鬚潤而黑六八以後精華不能上升秋冬令行金削肺枯以致鬚髮焦槁如灰白包養生者宜預服補精藥以防之染掠亦非上策
髮燥者膽有怒火也膽合腑胱上榮毛髮風氣盛則焦燥汁竭則枯也
老來髮落鬚長常也少壯有髮落或鬚亦落者腎枯火炎肺痿內風妄動故也地黃酒腎氣丸天門冬膏主之內風甚者梧葉煎
髮落及枯燥而黃白有因吐衄失血多者瓊玉膏主之
因房勞損精易白者還元丹還元秋石丸女貞丸之類
有因火盛血枯者大造丸八仙添壽膏
因濕痰虛痢等疾衰白者蒼术膏加味蒼术膏
皮膚肌骨有風痛痒者何首烏丸
陽虛者却老烏鬚健陽丸延年益壽不老丹之類
烏鬚必因證用藥若不顧臟腑專務鬚髮而妄投丸散是剖腹而藏珠也
徐春甫古今醫統
補養氣血則美而不白

髭髮黑美須養氣血之十全氣血盛則髭髮美氣血衰則髭髮白此必然之理也人年三十之後常服補腎滋陰之藥保和氣血至老頭鬚不白信有驗矣若用藥於既衰之後豈能及之乎如凡事止於未動之先則易爲矣若於既去之後而欲挽回以復之者鮮有及焉

眉痛

眉骨痛者多是肝火上炎怒氣甚者多有此病其謂風證亦火之所致熱甚生風是也大抵抑肝火有風疫則兼而治之

龔信古今醫鑑

臟氣各殊

人之鬚髮眉雖皆毛類而所生五臟各異故有老而鬚白眉髮不白者臟氣有所偏故也男子腎氣外行上爲鬚下爲勢故女子宦人無勢則亦無鬚而眉髮無異於男子則知不屬腎也明矣

龔廷賢萬病回春

立名之義

在頭曰髮髮者拔也拔擢而出也

在目曰眉眉者媚也有媚嫵也

頤下曰鬚鬚者秀也物成乃秀人成而鬚生也

在頰曰髯隨口動搖冉冉然也

口上曰髭髭者委也爲委容之美也

王肯堂證治準繩

經厥所榮

巢氏病源云足少陽膽之經其榮在鬚足少陰腎之經其華在髮衝任之脈爲十二經之海謂之血海其別絡上唇口若血盛則榮於頭髮故鬚髮美若血氣衰弱經脈虛竭不能榮潤故鬚髮脫落

發髭毒

鬼遺云鼻下一處人中兩處爲發髭此多因摘髭外入風而結攻作不常寒熱相併此亦害人

或問地角上生癰何如曰是名髭毒屬足陽明經風熱所致用活命飲加芩連元參梔子桔梗以清熱壯實者一粒金丹下之若虛之有根肌肉不仁或麻或癢寒熱大作煩悶嘔逆者疔也

髮際瘡

鬼遺云左右髮際起如粟米頭白肉赤熱痛如錐刺此疾婦人患多丈夫患少始因風濕上攻髮際亦宜出膿無傷

或問髮際生瘡何如曰此名髮際瘡也狀如艾炷漫腫寒熱或痛或癢者髮際疽也此由風熱上壅所致宜服防風通聖散紫金丹奪命丹汗之

發眉疽

鬼遺云左右眉枝兩處發眉不拘在頭尾宜於未成已前攻擊在眉頭即攻入眼損睛在眉後即攻下太陽並宜戒愼

或問眉發疽毒何如曰眉疽從眉至頭生瘡黑色漸漸腫漫滿面瘡頭堅硬如石刺之無膿惟出黃水痛不可忍悶亂嘔逆是也由臟腑積熱風毒上攻而然急服紫金丹勝金丹汗之活命飲加黃連桔梗升麻或黃連消毒飲降火消毒之劑六七日刺得黃白膿者可治枯紫陷刺之無膿吐逆煩躁神昏不食者死也

眉心疽

或問眉心生疽何如曰是名眉心疽一名面風毒屬足太陽膀胱經風熱壅結陰陽相滯而生急服紫金丹蟾酥丸汗之或一粒金丹下之若黑色痛甚或痲或瘡寒熱併作者疔也

陳實功外科正宗

龍泉疽虎鬚毒

此二毒乃腎督二脈分合行布驟被外邪所搏而成龍泉疽發在人中之間虎鬚毒生於地閣之上初起疙瘩次生腫痛漸發寒熱甚者惡心乾嘔腮項俱腫此穴忌灸初起宜線針挑破患頂以蟾酥餅放上膏藥蓋之使毒有門而泄四邊瘀腫上如意金黃散敷之外有表證者荊防敗毒散加芩連牛蒡裏證內疎黃連湯已成欲其作膿芎歸內托散膿成腫痛者針之即愈膿潰後只宜膏藥換貼其口易完此證多生於元氣壯實者故多不必服藥自愈

石室秘錄臣陳士鐸著

生眉烏鬚

眉落可用桑葉七斤每日洗之一月重生如舊鬚落亦然鬚白乃腎水枯任脈血乾也二者得一皆能白鬚地黃湯最妙今不用用桑甚乎斤取汁一椀以骨碎補一兩爲末浸之曬乾無日則用火焙乾再浸以汁乾爲度再用生赤何首烏熟地焙乾各二兩青鹽當歸各一兩沒石子雌雄各四對長者雄圓者雌俱爲細末每日擦牙七七擦左右各如數一月之間即黑如漆蓋桑甚專能補陰黑鬚而又佐之熟地首烏

豈有不黑之理但苦不能引入鬚根耳今妙在用骨碎補浸石子直透齒肉之內既入齒肉有不引至鬚根者乎此方之所以巧而奇也倘更用補腎烏鬚以通任督則上下相資而髭髯有不重臻於年少之時乎今更有一方併傳之桑葚蒸熟曬乾不蒸則此物最不肯乾但不可經鐵器飯鍋蒸則無害生亦何首烏切片飯鍋蒸熟曬乾九次爲妙南燭葉亦飯鍋蒸熟曬乾若不蒸自乾則無用白术熟地黃各一斤麥冬半斤花椒去殼皮四兩取淨末二兩白果一兩此方不刊即名爲陳氏烏鬚丸久服長生不老春夏服地黃丸秋冬服此丸則升躋有路斑白無蹤無桑葚時可以桑葉代之須用一斤雖甚勝於葉而葉之功亦不亞甚也又烏鬚二方一丸方用熟地山藥各二斤山茱萸黑芝麻各半斤白术麥門冬桑葉各一斤巴戟白果肉各四兩爲末蜜丸每日蚤晚各服五錢萬年青六片加入尤妙一煎方熟地生亦何首烏山藥桑葉各一兩白果二錢黑芝麻五錢炒研碎萬年青半片人參三錢花椒一錢水煎加酒一茶鍾再加桔梗五分蚤服頭煎晚服二煎夜服三煎四劑即黑如漆二方同用未再白倘氣血虛者用服十劑必效又烏鬚方莫妙用乾桑葚飯鍋蒸熟曬乾生何首烏各一斤爲丸二味朝夕吞服自然烏黑矣蓋二味原是烏鬚之聖藥能日日服之延生返老豈特鬚髮之黑哉或少加白果尤妙不必加熟地藥愈多其功轉不大效用生何首烏者以滋味不泄也連皮用之正取其皮引入人之皮毛耳每日服五錢或一兩俱可無甚用桑葉二斤首烏一斤可也妙極

方一

張天師草還丹 壽波

此治上少陰下厥陰藥也

地骨皮　生地　菟絲子酒浸三日炒黃　牛膝

遠志去心　石菖蒲各等分

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服三十九空心溫酒下鹽湯亦可修合忌女人雞犬見

七寶美髯丹

補腎元烏鬚髮延年益壽

何首烏赤白雄雌各一斤　川牛膝八兩

右先用米泔水浸何首烏一日一夜以竹刀刮去蘆皮切作大片用黑豆鋪甑中一層却鋪何首烏一層再鋪豆一層却鋪川牛膝一層又黑豆一層重重相間面上鋪豆覆之以豆熟爲度取去豆曬乾次日如前用生豆再蒸如法蒸七次曬七次去豆用再加

破故紙水洗淨用黑芝麻同炒無聲爲度去芝麻

白茯苓用人乳汁拌勻浸透曬乾蒸過再曬乾

赤茯苓用黑牛乳汁拌勻浸透曬乾蒸過再曬乾

菟絲子用酒浸一宿洗去土曬乾蒸三次曬三次

當歸身用淨身去頭尾酒洗過　枸杞子各半斤

右末之煉蜜丸如龍眼大每日空心嚼二三丸溫酒下或米湯白湯鹽湯皆可製藥不犯鐵器

元精丹

北方黑色入通於腎開竅於二陰藏精於腎其味鹹其類水其病在骨此藥主之

自己頭髮或父母一本或少壯男女者揀去黃白色

右用灰湯洗二三次再以大皂角四兩搥碎煮水洗淨務要無油氣爲佳將髮扯碎曬乾每淨髮一斤用川椒四兩揀去梗核於大鍋內髮一層椒一層和勻以中鍋蓋之鹽泥固濟勿令泄氣柴柴慢火煅三炷香退火待冷取出約重四兩有餘於無風處研爲細末

何首烏用黑豆九蒸九曬揀去豆取淨末一斤

黑芝麻九蒸九曬取淨末　懷慶生地酒浸杵膏

熟地同上製各八兩　破故紙取淨末　女貞實

桑葚肥大者取淨汁熬膏　旱蓮草取淨汁熬膏

槐角子入牛膝內百日各四兩　胡桃肉研膏

膠棗肉研膏各二兩

右以藥末入諸膏和勻加煉蜜一斤成劑入石臼內舂千餘下如桐子大每服六十九空心用何首烏釀酒每溫二三杯送下日三服

青絲散東垣

補虛牢牙黑髭髮

白芷　白茯苓各五錢　母丁香　細辛　當歸

川芎　生甘草　甘松各三錢　升麻　旱蓮草

地骨皮　生地　熟地　破故紙　青鹽各二錢

寒水石七錢煅　麝香細研五分　生何首烏

香附米各一兩生薑汁浸一宿炒　高茶末

右爲細末庚日爲始背東面西擦牙蚤不見日夜不見燈刷畢嚥藥餘津潤髭一月頓黑忌食蘿蔔

擦牙烏鬚方

豬牙皂角七錢泡　白茯苓去皮　熟地酒浸焙

五倍子製　破故紙　青鹽　細辛去土各三錢

桑葚子曬乾五錢

右爲細末每清晨擦牙用水漱口洗鬚鬢不可將漱水入盆內恐傷眼目

丁砂散 瑞竹堂方

掠髭髮

大訶子兩箇　母丁香十五箇　百藥煎一錢

鉄砂少許醋炒七次　高茶末

右爲細末用水一大椀熬數沸不去查收於淨磁器內臨臥溫漿洗淨髭髮用藥水掠之次蜜用溫漿水淨洗百日髭髮白黑藥內浸一新釘尤妙

訶子散

白髮返黑

訶子一箇去核　沒食子　百藥煎　鉄砂用好醋一椀浸三日炒七次各三兩　金絲礬一兩半研

右用蕎麪入鉄砂打糊先一夜將鉄砂糊抹在頭上用荷葉包到天明溫漿水洗淨次夜却將前藥末四味調入鉄砂糊內用生薑一塊搥碎再加些少輕粉一處調勻抹在頭上仍用荷葉包到天明用溫漿水加清油數點在內洗淨其髮黑且光

製五倍子法

烏鬚髮

五倍子揀大者去蛀屑敲作碎粒

右分麤細爲二先將麤片放瓦器中用文火炒成糊次入細者同炒初時大黑煙起取出不住手炒將冷又上火炒昏黃煙起又取開炒再上火炒青黃煙冒出卽住火先以眞青布一大片浸濕將五倍子傾布上捏成一團用脚踏成餅上用濕泥一塔盦一夜色如烏鴉羽爲妙磁器盛勿泄氣

易簡烏鬚方

製五倍子一錢　鹽一分四釐　榆皮麪二分

膽礬　白礬各七釐

右俱研細末茶清調如稀粥隔湯頓稠黃昏乘熱刷上可黑一箇月

又方

金鉛一錢　青錠粉三分　海沙一分　樟腦半分

右和勻茶油調搽髭髮俟點線香一炷完洗去以油潤之

點白方

硃砂一分五釐　銀礦　當歸各三錢　白礬生

飛麪　眞粉各一分

右用清水調拔去白鬚卽以銀礦點在孔根內則再生者皆黑鬚矣

浸油去白方

銀礦一兩　當歸三兩　核桃油八兩

右二味爲末浸磁罐內七日後搽

黑雲散

五倍子炒　百藥煎　生胡桃皮　青石榴皮

訶子肉　青木瓜皮　青柿子皮　猪牙皂角炒

何首烏　青礬　細茶　水銀各等分

右以水銀入石榴皮內月餘再以榴皮曬乾同諸藥研末煉蜜丸如小錢大常於木炭灰內焙養勿得離火如要烏鬚髮時先用皂角水洗淨次用熱酒調化塗之好熱酢亦可

茲棗散 瑞竹堂方

長養髮髮落最宜

生薑焙乾　人參各一兩

右爲細末用生薑一塊切片蘸藥末於髮落處擦之二日一次

三聖膏必用方

治髮髮脫落能令再生

黑附子　藁本子　柏子仁各半兩

右爲末烏雞脂和勻搗研乾置瓦盆內封固百日取出塗脫處三五日卽生

八物湯

治氣血俱虛鬚髮頒白

人參　白芍　當歸各一錢　白茯苓一錢五分

甘草　川芎各六分　白朮土炒　熟地各二錢

右水煎服

四物湯

治血虛鬚髮白

熟地　當歸身各二錢　白芍一錢　川芎八分

右水煎服

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百八十五卷目錄
醫部彙考一百六十五
鬚髮門二毛附
方二四物坎離丸 秤金丹 還元秋石丸 卻老烏鬚健陽丹 七仙丹 加味蒼术膏 一醉不老丹 中山還童酒 經驗烏鬚酒 菊花散 平鑒散 二仙丸 生光烏鬚油 令珠綠雲油 秘傳烏鬚方 外染烏鬚膏 洗塵散 防風羌活湯 鹽梳 黃芩白芷湯 地黃丸 二陳湯 神仙六子丸 鍮石丸 導痰湯 神仙烏鬚丸 奇附白丸子 內服烏鬚丸 神應散 取效奇漱氣飲 內托清肝飲 止痛拔毒散 弓箭內托散 內疽黃連湯 如意金黃散 荊防敗毒散
單方
導引
醫案

方二

四物坎離丸 入門

善烏鬚髮

熟地黃酒浸搗膏三兩　乾生地黃酒浸搗膏
白芍藥各一兩半酒炒　當歸酒炒　黃蘗各二兩
鹽酒浸炒　知母鹽酒浸炒　側柏葉炒　槐子各一兩炒　連翹六錢
右爲末蜜丸梧子大盛磁盒內放地上七日曬乾收之每服五六十丸或溫酒或白湯下

秤金丹 入門

久服鬚髮黑返老還童

熟地黃　沒石子各一兩　地骨皮　蓮花蘂　槐角子俱酒浸夏一日春秋三日冬六日曬乾　薄荷各三兩　人參　木香各五錢
右爲末蜜丸芡實大每一丸嚥化溫酒送下日三服

還元秋石丸 入門

治因房室損精鬚髮蚤白

秋石　茯苓各一斤　天門冬　麥門冬　人參　生地黃　熟地黃　地骨皮　人乳粉各四兩
右爲末蜜丸梧子大白湯或溫酒下三五十丸久久即效

神仙烏雲丹 醫鑑

烏鬚黑髮返老還童神效無比

何首烏八兩入砂鍋內黑豆同蒸半日去豆用好酒浸七日曬乾如此七次　旱蓮汁　槐子各二兩
破故紙四兩酒洗砂鍋內炒黃　梧桐淚一兩爲末
右爲細末棗肉二斤胡桃仁半斤搗爲丸梧子大空心鹽湯下五七十丸服三月勿輟

卻老烏鬚健陽丹 入門

能變白鬚髮令黑

菟絲子　破故紙　牛膝各八兩以黑豆汁拌蒸二次　赤何首烏　白何首烏　赤茯苓用牛乳五升浸文武火煮乾　白茯苓入乳汁五升浸文武火煮乾各一斤
右爲末蜜丸彈子大每服一丸溫酒化下日二次或生地黃熟地黃各一斤加入尤妙

七仙丹 丹溪

補心腎駐容顏黑鬚髮之聖藥

何首烏九蒸九曬四兩　人參　生乾地黃酒洗　熟地黃　麥冬　天冬　白茯苓　茴香炒各二兩
右爲末蜜丸彈子大每一丸細嚼好酒送下鹽湯亦可或丸如梧子大每五七十丸空心酒下忌食三白及犯房事

加味蒼术膏 入門

久服精滿氣盛髮白變黑齒落更生

蒼术十斤搗如泥入大鍋內用水二桶以文武火煮至十餘椀絹濾取汁入磁罐內　人參　生地黃　熟地黃　黃蘗　遠志　杜仲　川芎　胡桃肉　川椒　破故紙　當歸蘆製各四兩　青鹽二兩　硃砂一兩　旱蓮草汁二椀　白蜜二斤
右各藥爲末入术膏內封固大鍋水煮官香二炷爲度取出埋土中七日每取二三匙空心酒湯任下日二次養精養氣養神

一醉不老丹 醫鑑

專養血烏鬚黑髮

蓮花蘂　生地黃　槐角子　五加皮各二兩　沒石子六箇
右以木石臼搗碎以生絹袋盛藥同好清酒十斤入淨罈內春冬浸一月秋二十日夏十日緊封罈

口浸滿日數任意飲之以醉爲度須連日服令盡酒盡而鬚髮白者自黑矣若不黑再製服之自黑神效

中山還童酒 同春下同

歌曰中山還童酒人間處處有善緣得遇者便是蓬萊叟

馬藺子一升埋土中三日　馬藺根洗切一升

右用黃米二斗水煑成糜陳麴二塊爲末酒酵子二椀幷前馬藺子共和一處做酒待熟另用馬藺子根一升用水煑十沸入酒內三日每日攪勻去查隨量飲醉其酒飲盡鬚髮盡黑其酒之色如漆之黑

經驗烏鬚酒

能變白爲黑身輕體健功不可述

大枸杞二升要每年冬十月壬癸日面東採摘紅肥者搗破

右用好無灰酒二斗同盛於磁器內浸二十一日足開封添生地黃汁三升攪勻各以紙三層封其口俱至立春前三十日開瓶空心煖飲一杯至立春後髭鬚都黑勿食三白

菊花散 丹溪下同

治鬚髮黃燥能令黑潤

菊花　蔓荊子　側柏葉　川芎　白芷　細莘

桑白皮　旱蓮根莖花葉各一兩

右剉每二兩漿水三椀煎至二椀去查洗鬚髮卽黑

巫雲散

治鬚髮黃白不澤

膽礬　五倍子　百藥煎　木瓜皮　訶子皮

酸石榴皮　青胡桃皮　猪牙皂角　何首烏

細莘各等分

右爲末蜜和如錢大常於炭灰內培養勿令離灰用時以熱酒化開塗之

二仙丸 醫鑑

治髮脫落神效

側柏葉焙乾八兩　當歸全身四兩

右不犯鐵器爲末水糊和丸梧子大酒或鹽湯下五七十丸日再

生禿烏雲油 類聚下同

能生鬚髮

川椒　白芷　川芎各一兩　蔓荊子　零陵香

附子各五錢

右爲麤末入絹袋浸香油一斤半過二十一日取油擦頭上卽生新髮

金珠綠雲油

能生髮

蔓荊子　沒石子　蒴藋花　訶子皮　白芷

沉香　附子　防風　覆盆子　生地　零陵香

芒硝　旱蓮草　丁香各一錢半　卷柏三錢

右剉袋盛浸清油八兩中封過七日取擦頭上日三

祕傳烏鬚方 醫鑑

五倍子不拘多少搥碎去灰入砂鍋內炒煙盡爲度以青布打濕扭乾裹之脚踏成餅爲末每用錢半烏黑霜卽炒黃好細麪四兩　當歸尾一兩爲末白芨末一兩三味攪勻每用一分半　紅銅末不拘多少火內燒極紅投入水椀中取出再燒再投取水內自然之末用水淘淨酢煎數沸至乾隨炒黑色每用一分半　明白礬末一分半　青鹽一分二釐

沒石子二釐半　訶子肉二釐半二味俱用麪包入砂鍋內將桑炭同拌炒至焦乾

右爲末以濃茶調勻以酒盞盛貯用鐵杓注水煑如糊先將皂角水洗淨鬚髮然後塗藥包裹一夜次蚤洗去以胡桃油塗之令潤

外染烏雲膏 種杏

沒石子二箇麪炒黃色　銅末製二錢　白礬

白鹽各一錢半　五倍子製五錢

右爲末濃茶調令勻重湯煑見黑色如上法用鬚髮卽黑

洗肝散

治眉稜眼眶骨痛不可忍

川當歸　羌活　薄荷　梔子　芎藭　生地黃

防風　大黃　龍膽草　甘草各等分

右爲末每服三錢白湯調服

選奇方

治眉骨痛甚

防風　羌活　黃芩　甘草各一錢

右水盞半煎八分食後溫服

防風羌活湯

治眉稜痛而因風寒痰濕宜此

防風　羌活　細莘　黃芩　南星製　半夏製

白朮　甘草
右各等分爲麤末每服四錢水一盞半煎八分溫服
黃芩白芷湯
治眉稜風熱痛
黃芩酒洗二錢　白芷一錢
右爲細末食後臨臥茶清調下
二陳湯
治眉稜痛而因痰者
陳皮留白　半夏製各三錢　白茯苓二錢　甘草炙一錢
右水二鍾薑五片棗二枚煎八分食遠服
神仙六子丸
男子三十後服此藥一歲二單製服不息永不白髮髮年四十之上或有微白及少年人焦黃不潤服此百日自然漆黑其效如神
菟絲子如法製　金鈴子　覆盆子　五味子
枸杞子　蛇牀子炒各一兩　何首烏酒浸焙
牛膝酒浸焙　地骨皮　熟地黃酒浸各三兩
鮑上茴香鹽炒　川木瓜各二兩
右十二味爲細末用製菟絲酒澄清作糊爲丸梧桐子大每服五十丸空心食前溫酒送下一方加人參白朮茯苓各一兩尤有神效大忌三白失禁不效
鉛梳方　普濟
烏鬚髮
鉛十兩　錫三兩　磁石　皂礬　訶黎勒皮　沒石子　石榴皮　硫黃　烏麻油各二錢半
熟地黃　鍼砂各半兩　婆羅得三箇　茜根
胡桃皮各一兩
右爲末先化鉛錫入末一半柳木攪勻傾入梳模子印成修齒餘末同水煮梳三日三夜水耗加之取出故帛重包五日每以熟皮襯手梳一百下先須以皂莢水洗淨拭乾
生熟地黃丸
治眉骨痛甚者
生地　熟地　元參　金鈆石斛各一兩
右爲末蜜丸
導痰湯
治眉骨痛晝靜夜劇
南星炮　橘紅　赤茯苓　枳殼麩炒各一兩
甘草炙半兩一作一兩　半夏四兩一作四錢
右每服五錢水煎生薑五片食前服
芎芷湯
治前證
附子生去皮臍　烏頭生　天南星　甘草炙乾薑　川芎　細辛各等分
右剉每服四錢薑五片芽茶少許煎服
青州白丸子
治前證
大半夏製　白附子洗淨略炒　天麻　全蠍
川烏略炮去皮尖　天南星洗淨略炮各等分
右爲細末用生薑自然汁煮麪糊和丸如梧桐子大每服十丸漸加至二十丸食後用茶清或熟水送下
內服烏鬚丸　入門
烏鬚黑髮因下血多而白者尤宜
胎髮　青鹽各四兩共入罐內封固火煅三炷香久冷定取出爲末　何首烏　冬青子九蒸九曬
旱蓮草　當歸　枸杞子　生地　茯苓各四兩
人參一兩
以水十椀煮汁五椀去渣熬膏將胎髮青鹽末入內攪勻分作數小罐盛之每空心滾水或酒調下三五茶匙
神應散　盡揚全書下同
治發髭毒
輕粉　五倍末各一錢　雞內金　韶粉　黃連
黃蘗末各二錢　麝香　冰片各三分
右爲末先用甘草苦參猪蹄薄荷白芷防風荊芥煎湯洗淨拭乾將陳菜油猪膽汁調搽之
敗毒流氣飲
治眉風毒
紫蘇葉　桔梗　生地黃　薄荷　青皮　枳殼
甘草　防風　川芎　小柴胡　白芍藥　羌活
前胡　連翹
右水煎溫服
內托清肝飲
治前證
人參　黃芪炙　天花粉　厚朴　甘草　防風
桔梗　白芍藥　金銀花　枳殼　葛本　升麻
烏藥　當歸　白芷　川芎

薑三片棗一枚水煎服

止痛拔毒散

治發眉瘡

升麻　甘草節　鼠黏子　乳香　黃連　川芎
黃芩　山梔仁　當歸鬚　桃仁　羌活　獨活
桔梗　白芍藥　生地黃　白芷　青皮　蟬蛻
連翹　金銀花

右水煎溫服

內托散（外科正宗下同）

治虎鬚毒

川芎　當歸　陳皮　白茯苓　天花粉　桔梗
銀花　黃芪各一錢　甘草五分

水二鍾煎八分食後服

內疏黃連湯

治前證

木香　黃連　山梔仁　當歸　黃芩　白芍藥
薄荷　檳榔　桔梗　連翹各一錢　甘草五分
大黃二錢

水二鍾煎八分食前服加蜜二匙亦可

如意金黃散

治前證

花粉十斤　黃蘗　大黃　薑黃各五斤　厚朴
陳皮　甘草　蒼木　南星各三斤　白芷三斤

共爲細末茶湯同蜜調敷

荊防敗毒散

治前證

荊芥穗　防風　羌活　獨活　前胡　柴胡
川芎　桔梗　茯苓　枳殼各一錢　生甘草
人參各五分
薑三片水二鍾煎八分食遠服寒甚加葱三枝

單方

染白髮令黑取鉞砂二錢醋浸七日取出曬乾炒黑
入沒石子一個爲末搽之即黑（本草下同）

地黃乾熟二種皆黑鬚髮良藥丸服或釀酒服之並
佳

髮白用牛膝煎服或釀酒服之佳

髮落不生以酢泔洗淨布揩令熱以臘猪脂入生鐵
煮三沸塗之便生（千金翼）

眉髮落不生先用生薑擦三次後用半夏生爲末麻
油調塗之即生（入門）

男女粘髮或因油膏而粘滯者取竹瀝塗之即解和
炒鹽尤妙（野語）

何首烏黑鬚髮末服丸服或釀酒服皆佳（本草）

婦人髮落芭蕉油塗之長髮令黑

槐實久服令鬚髮不白

黑桑葚變白髮釀酒服之佳又取一斤和蚺蛇一升
瓶盛封口懸屋東頭百日盡化爲黑泥染白髮髭黑
如漆

母丁香以生薑汁研拔去白髮鬚塗孔中即生黑者
矣又白蜜塗孔中亦生黑者

胡桃外青皮和蚺蛇爲泥染白鬚令黑又胡桃仁取
油塗鬚髮令黑潤有光

胡麻生取油塗頭生禿髮又烏麻九蒸九曬爲末棗
膏丸服令白髮還黑又取葉煎湯沐頭長髮

萵菁子壓取油塗頭能變蒜髮

頭痒生白禿瘡髮落取熊脂常常塗之令人生髮長
且黑

髮落熊腦髓作油塗之

頭髮黃赤生柏葉末一升猪脂一斤和丸彈子大每
以布裹一丸納泔汁中化開沐之一月色黑而潤矣
（聖惠方）

髮落羊糞燒灰淋汁沐頭令易生而黑又鬚髮落羊
糞和鴈糞傅三宿即生（本草下同）

髮落取臘月猪鬣膏火上烊化塗之即生髮薄不生
亦宜

染鬚方用蜈蚣四十條以京墨水養之三日埋馬矢
中一月取出以白絲頭試之如即黑到尾再入馬矢
中埋七日再取試之性緩乃以撚鬚庶不致黑皮膚
也（普濟方）

病後髮落猢猻薑野薔薇嫩枝煎汁刷之

揩齒變白髮方酸石榴皮一箇泥裹燒令通赤候冷
去泥用茄子根與槐枝同燒令烟絕急以器盖之候
冷用槐枝馬齒莧搗上生者好不令人見採薄荷石
膏五倍子燒熟川升麻各一兩爲末揩牙不但變白
爲黑亦且堅牙甚妙

拔白生黑良日正月四日二月八日三月十三四月十六五月二十六月二十七月二十八八月十九九月二十五十月一日十一月十一日十二月十日蚤起拔之永不白又正月五日十三日二月八日十八日三月三日四月十三二十五五月五日十五日六月十四二十四七月十八二十八八月九日十日九月八日十八日十月十三二十三十一月十日十二月十六日巳上月日並用午時前拔之凡拔時先以水於石上磨丁香汁候拔了急手傅於毛孔中即生黑者

變白方取老生薑刮皮一大升於鐺中以文武火煎之不得令過沸其鐺唯得多油膩者尤佳更不須洗刮便以薑皮置鐺中密封固濟勿令通氣令一精細人守之地色未分時便須煎之緩緩不得令火急如其人稍疲即換人看火一伏時即成置磁鉢中研極細雖曰一伏時若火候勻至日西即藥成也使時以小簪脚蘸取如麻子大先於白髮下點藥訖然後拔之再點以手指熱撚之令入肉第四日當有黑者生神效李鼎方

人無髮取甜瓜葉搗汁塗之即生

髮落不生令長用麻子一升熬令黑壓油以傅頭髮上

長髮方麻葉桑葉二味以泔煑沐髮七次可長六尺千金方

烏鬚明目用黑鉛半斤鍋內溶汁旋入桑條灰柳木攪成沙篩末每早揩齒以水漱口洗目能固齒明目黑鬚髮勝金方

揩牙烏髭用黑鉛消化以不蛀皂莢寸切投入炒成炭入鹽少許研勻日用揩牙摘去白髭黑者更不白也

又方黑錫一斤炒灰埋地中五日入升麻細莘訶子同炒黑日用揩牙百日效普濟方

令髮長黑用熊脂蔓荊子爲末等分和勻酢調塗之聖惠方

赤禿髮落香油水等分以銀釵攪和日日擦之髮生乃止普濟方下同

白禿無髮麻子炒焦研末猪脂和塗髮生爲度

髮落不生蕡麻子汁煑粥頻食之聖濟總錄

頭髮不生側柏葉陰乾作末和麻油塗之梅師方

染白鬚髮胡粉石灰等分水和染之以油紙包烘令溫煖候未燥開洗去以油潤之黑如漆也博物志

染白鬚髮用鍼砂酢炒七次一兩訶子白芨各四錢百藥煎六錢綠礬二錢爲末用酢熱調刷鬚髮菜葉包住次蚤酸漿洗去此不壞鬚亦不作紅

又方用鍼砂蕎麪各一兩百藥煎爲末茶調夜塗旦洗再以訶子五錢沒石子酢炒一箇百藥煎少許水和塗一夜溫漿洗去黑而且光

髮落不止乃肺有勞熱瘙痒用石灰三升水拌炒焦酒三升浸之每服三合常令酒氣相接則新髮更生神驗千金方

染髮烏鬚礦灰一兩水化開七日用鉛粉一兩研勻好酢調搽油紙包一夜先以皂角水洗淨乃用集元方

塗染白髮綠礬薄荷烏頭等分爲末以鐵漿水浸日染之相感志

髮鬚黃赤生地黃一斤生薑半斤各洗研自然汁留滓用不蛀皂角十條去皮弦蘸汁炙至汁盡爲度同滓入罐內泥固煆存性爲末用鐵器盛末三錢湯調停二日臨臥刷染鬚髮上即黑本事方

金陵煎益鬚髮變白爲黑金陵草一秤六月以後收采揀青嫩無泥土者不用洗摘去黃葉搗爛新布絞取汁以紗絹濾過入通油器鉢盛之日中煎五日又取生薑一斤絞汁白蜜一斤合和日中煎以柳木篦攪勿停手待如稀餳藥乃成矣每日蚤及午後各服一匙以溫酒一盞化下如欲作丸日中再煎令可丸大如梧桐子每服三十丸及時多合爲佳其效甚速千金月令方

烏鬚固齒七月取旱蓮草連根一斤用無灰酒洗淨青鹽四兩醃三宿同汁入油鍋中炒存性研末日用擦牙連津嚥之

又方旱蓮草取汁同鹽煉乾研末擦牙孫生妙用方

又方旱蓮草一兩半麻枯餅三兩升麻青鹽各三兩半訶子連核二十箇皂角三挺月蠶沙二兩爲末薄酢麪糊丸彈子大曬乾入泥瓶中火煨令煙出存性取出研末日用擦牙奉親養老書

髮黃不黑蓖麻子仁香油煎焦去滓三日後頻刷之摘元方

堅齒烏鬚大苦蔞一箇開頂入青鹽二兩杏仁去皮尖三七粒原頂合紮定蚯蚓泥和鹽固濟炭火煆存性研末每日揩牙三次令熱百日有驗如先有白鬚拔去以藥投之即生黑者其治口齒之功未易具陳也普濟方

染烏髭髮乾瓦松一斤半生麻油二斤同煎令焦爲末另以生麻油浸塗甚妙聖濟錄下同

少年髮白土馬騣石馬騣五倍子半夏各一兩生薑二兩胡桃十箇膽礬半兩爲末搗作一塊每以絹袋盛一彈子大用熱酒入少許浸汁洗髮一月神效妙極

染髮令烏酢煮黑大豆去豆煎稠染之千金方

揩牙烏鬚麻枯餅八兩鹽花三兩用生地黃十斤取汁同入鐺中熬乾以鐵蓋覆之鹽泥泥之煅赤取研末日用三次揩畢即飲薑茶先從眉起一月皆黑也養老書

染鬚方大烏龜一箇餓一二日將飯與肉骨果子烟火之食飼之三五月後夜間以漆盒盛之用竹片置盒口令通氣外放燈一盞盒內熱龜自撒尿急則以麻油烟熏鼻亦即尿先用五倍子末炒酢如膠若尿得一小鍾入五倍酢半鍾入磁器炆一滾即止牛角罐收貯以新筆略蘸搽鬚多用面黑

黑鬚倒捲簾方用大馬蜞二三十條竹筒裝之夜置露處受氣餓過七日以雞冠血磨京墨與食過四五次復陰乾將猪脛骨打斷放蜞入內仍合定鐵線纏住鹽泥塗之乾時放地上火煅五寸香二次退開三寸火又五寸香三次再退遠火又五寸香取出爲末將猪膽皮包指承末搽鬚梢即倒上也

繁縷爲蓋久久食之能烏髭髮聖惠方

癬瘡疤上不生髭髮先以竹刀刮損以萵苣子拗猢猻薑末頻擦之摘元方

鬚髮拔白換黑七月七日取百合熟搗用新瓷瓶盛之密封挂門上陰乾百日每拔去白者摻之即生黑者也便民圖纂

令髮易長取東行棗根三尺橫安甑上蒸之兩頭汁出收取傅髮即易長聖惠方下同

髮槁不澤木瓜浸油梳頭

撚鬚令黑酸石榴結成時就東南枝上揀大者一箇頂上開一孔內水銀半兩於中原皮封之麻紮緊牛屎封護待經霜摘下傾出殼內水以魚鰾籠指蘸水撚鬚久久自黑普濟方

揩齒烏鬚胡桃仁燒過貝母各等分爲散日日用之揩牙聖惠方

烏鬚髮方青胡桃三枚和皮搗細人乳汁三盞於銀石器內調勻搽三五次總錄

染鬚髮胡桃根皮一秤旱蓮草十斤切以瓮器盛之入水五斗浸一月去滓熬至五斤入蕓薹子油一斗慢火煎取五升收之凡用先以炭灰汁洗用油塗之外以牛柿葉包住絹裹一夜洗去用七日即黑也聖濟總錄

大風髮脫毘梨勒燒灰頻擦有效聖惠方下同

令髮不落榧子三箇胡桃二箇側柏葉一兩搗浸雪水梳頭髮末不落且潤也

髮落不生桐葉一把麻子仁三升米泔煮五六沸去滓日日洗之則長肘後方

髮落不生合歡木灰二合牆衣五合鐵精一合水萍末二合研勻生油調塗一夜一次普濟方

頭上軟癬令髮不生用抱出雞卵殼燒存性研末入輕粉少許清油調傅危氏方

髮白染黑經霜桐葉及子多收搗碎以甑蒸之生布絞汁沐頭普濟方

拔白生黑婆羅勒即婆羅得也十顆去皮取汁熊脂二兩白馬鬐膏煉過一兩生薑炒一兩母丁香半兩爲末和煎每拔白點之揩令入肉即生黑者近效方

染黑鬚髮樺皮一片包側柏一枝燒煙熏香油椀內成煙以手抹在鬚髮上即黑也多能鄙事

髮鬢墮落桑白皮剉二升以水淹浸煮五六沸去滓頻頻洗沐自不落也聖惠方下同

髮槁不澤桑根白皮柏葉各一斤煎汁沐之即潤神效

鼈脂主治除白髮除日拔白髮取鼈脂塗孔中即不生欲再生者白犬乳汁塗之藏器

黑髮於七月七日夜取螢火蟲二七枚撚髮自黑也便民圖纂方

烏鬚黑髮如神旱蓮草十六斤六月下半月七月上半月採取不許水洗扭乾取汁對日曬過五日不住手攪午時加入眞生薑汁同好蜜各一斤相和如前曬攪至數日似稀糖成膏磁罐收貯每日空心好酒一鍾藥一匙調服午後又一服至二十一日將白者摘去即生黑者名旱蓮膏醫鑑

烏鬚髮方取大水蛭二箇放磁椀中餓七日取烏骨雄雞血以松烟墨濃磨汁傾入猪尿胞內任水蛭吮飽將鍼刺蛭流出血汁塗鬚髮畱根二分其汁浸漬入肉鬚髮一年茂黑且柔軟極妙不過

又方用大水蛭七枚爲末汞一兩以銀三兩作小盒盛之用蚯蚓泥固濟半指厚深埋馬糞中四十九日

取出化爲黑油以魚脬籠指每蘸少許撚鬚上其油自然倒行至根變爲黑色也普濟方

染烏髮鬚用鍼砂八兩米酢浸五日炒略紅色研末五倍子百藥煎沒石子各二兩訶黎勒皮三兩研包先以皂莢水洗髭鬚用米酢打蕎麥麪糊和鍼砂末敷上荷葉包過一夜次日取去以蕎麥麪糊和四味敷之一日洗去即黑聖濟總錄

五倍子一斤研末銅鍋炒之勿令成塊如有烟起即提下攪之從容火上慢炒直待色黑爲度以濕青布包紮足踏成餅收貯聽用每用時以皂角水洗淨鬚髮用五倍子一兩紅銅末酒炒一錢六分生白礬六分訶子肉四分沒石子四分硇砂一分爲末烏梅酸榴皮煎湯調勻椀盛重湯煑四五十沸待如飴狀以眉掠刷於鬚髮上一時洗去再上包住次日洗去以核桃油潤之半月一染甚妙

沐髮除臃百藥煎末乾搽髮上一夜篦之

揩牙烏鬚百藥煎半兩延胡索雄黃各三錢爲末先以薑擦去涎用此揩牙以津洗目日日用甚佳普濟方

服食變白久服通血氣利五臟雞桑嫩枝陰乾爲末蜜和作丸每日酒服六十丸聖惠方

白髮鬚鑷去消蠟點孔中即生黑者

拔白換黑狗膽汁塗之千金方

紉染白鬚談埜翁方用水蛭研極細末以龜尿調撚鬚梢自行入根也

揩牙烏髭泥鰍魚槐葉狼把草各一兩雄燕子一箇酸石榴皮半兩搗成團入瓦罐內鹽泥固濟先文後武燒炭十斤取研日用一月以來白者皆黑普濟方

又方白烏骨雞一隻殺血入瓶中納活水蛭數十枚於內待化成水以猪膽皮包指蘸撚鬚梢自黑入根

眉毛不生烏麻花陰乾爲末烏麻油漬日塗之外臺秘要

眉毛不生芥菜子半夏等分爲末生薑自然汁調搽數次即生集效方

眉毛脫落蔓菁子四兩炒研酢和塗之聖惠方

眉毛脫落垂柳葉陰乾爲末每薑汁於鐵器中調夜夜摩之聖惠方

眉中練癬梔子燒研和油傅之保幼大全

眉毛脫落雄黃末一兩酢和塗之聖濟錄下同

眉毛脫落白礬十兩燒研蒸餅丸桐子大每空心溫水下七丸日加一丸至四十九日減一丸週而復始以愈爲度

癩風眉落生半夏羊屎燒焦等分爲末自然薑汁日調塗之

眉練癬瘡菟絲子炒研油調傅之山居四要

眉稜骨痛熱毒攻眼頭痛眉痛壯熱不止解毒子木香大黃各三分爲末漿水調膏攤貼乾即易之普濟方

導引

延壽書曰髮多梳則明目去風故道家晨梳常以百二十爲數

類聚曰髮是血之餘一日一次梳

醫案

仲景見侍中王仲宣時年二十餘謂曰君有病四十當眉落眉落半年而死令服五石湯可免仲宣嫌其言忤受湯勿服居三日見仲宣謂曰服湯否仲宣曰已服仲景曰色候固非服湯之胗君何輕命也仲宣猶不信後二十年果眉落後一百八十七日而死終如其言

丹溪心法曰胡氏年十七八歲髮脫不畱一莖飲食起居如常脈微弦而濇輕重皆同予曰此厚味成熱濕痰在膈間又日多吃梅酸味收濕熱之痰隨上升之氣至於頭蒸熏髮根之血漸成枯槁遂一時盡脫遂處以補血升散之藥用防風通聖散去芒硝惟大黃三度酒炒兼以四物湯酒製合和作小劑煎以灰湯入水頻與之兩月餘後診其脈濕熱漸解停藥淡味調養又二年髮長如初而愈

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百八十六卷目錄
醫部彙考一百六十六

頸項門一
黃帝素問 金匱眞言論 脈要精微論 玉機眞臟論 風論 厥論 熱論 腹中論 至眞要大論
靈樞經 邪氣臟腑病形篇 論疾診尺篇 寒熱病篇 本輸篇 寒熱篇 癰疽篇
張機金匱要略 項強急 頸脈動
孫思邈千金方 九漏
竇漢卿瘡瘍全書 項疽毒 風毒頸癰 瘰癧
劉完素六書 頸痛 瘰癧論
成無己明理論 項強
危亦林得效方 項軟
張潔古活法機要 瘰癧
張從政儒門事親 瘰癧
李杲十書 馬刀瘰癧
朱震亨心法 瘰癧結核瘻氣
齊德之外科精義 瘰癧治法
戴思恭證治要訣 瘰癧
樓英醫學綱目 瘰癧
李梴醫學入門 傷寒項強 頸疽對口 瘰癧 馬刀 痰核 癭
陶華六書 項強
薛己醫案 瘰癧
王肯堂證治準繩 頸項強痛 瘰癧治法 百脈疽 頸癰 項中疽 天柱疽 杵疽
陳實功外科正宗 腦疽論 看法 治法 瘰癧論 看法 治法
陳士鐸石室祕錄 瘰串

藝術典第一百八十六卷
醫部彙考一百六十六

頸項門一

黃帝素問

金匱眞言論

東風生於春病在肝俞在頸項故冬不按蹻春不鼽衄不病頸項

註 俞者經氣之所注也蓋臟氣實則病氣臟氣虛則病臟也按蹻者按摩導引引陽氣之通暢於四肢也冬時陽氣伏藏若導引其四出則無以奉春生夏長之氣是以有鼽衄頸項之經病矣春病在頸邪熱而迫於經者鼽衄別出下項則爲頸項之病矣

脈要精微論

推而下之下而不上頭項痛也

註 推而下之下而不上者其氣下盛上虛當主頭項痛也

玉機眞臟論

大骨枯槁大肉陷下胷中氣滿喘息不便內痛引肩項期一月死眞臟見乃予之期日

註 內痛者肺受其傷肺之俞在肩背故痛引肩項也肝病而已傳及於所勝之臟故當期以本月之內而死也眞臟脈見如循刀刃責責然如按琴瑟弦予之期日當死於庚辛日之薄暮也

大骨枯槁大肉陷下胷中氣滿喘息不便內痛引肩項身熱脫肉破䐃眞臟見十日之內死

註 肺病故痛引肩背傳及於心故身熱也夫心主血而生於腎臟之精血氣盛則充膚熱肉心腎傷而精血衰故曰脫肉破䐃眞臟脈見大而虛如羽毛中人膚病傳於心故期以十日之內死蓋心不受邪故死之速也

大骨枯槁大肉陷下胷中氣滿腹內痛心中不便肩項身熱破䐃脫肉目眶陷眞臟見目不見人立死其見人者至其所不勝之時則死

註 本經曰腎病者大小腹痛腎傳之心故心中不便心傳之肺肺傳之肝故肩項身熱肝傳之脾故目眶陷也眞臟脈見搏而絕如指彈石辟辟然如目不見人腎之精氣已絕故立死其見人者餘氣未盡至所不勝之時而死謂當死於日昃也夫腎爲生氣之原生絕於下故死之更速也

風論

胃風之狀頸多汗惡風食飲不下鬲塞不通腹善滿失衣則䐜脹食寒則泄胗形瘦而腹大

註 頸有風池風府乃經脈之要會故頸多汗胃腑受邪故飲食不下鬲塞不通腹善滿也胃氣不足則身以前皆寒腹脹滿是以形寒則䐜脹飲冷則泄者胃氣虛傷也胃者肉其應腹者胃之邪故主形瘦而腹大

厥論

少陽厥逆機關不利者腰不可以行項不可以顧

註 少陽主樞是以少陽氣厥而機關爲之不利也頸項者乃三陽陽維之會腰脊者身之大關節也故機關不利者腰不可以轉行項不可以回顧

手太陽厥逆耳聾泣出項不可以顧腰不可以俛仰

治主病者

註手太陽所生病者耳聾小腸主液故逆則泣出也夫心主血脈小腸主液而爲心之表小腸氣逆則津液不能榮養於經脈是以項不可以顧腰不可以俛仰蓋腰項之間乃脈絡經俞之大會也

熱論

岐伯曰傷寒一日巨陽受之故頭項痛腰脊強

註太陽之氣主皮毛故傷寒一日太陽受之陽氣在上故頭項痛背爲陽故腰脊強

腹中論

帝曰有病膚腫頸痛胃滿腹脹此爲何病何以得之岐伯曰名厥逆

至眞要大論

太陰司天濕淫所勝則沉陰且布雨變枯槁附腫骨痛陰痹陰痹者按之不得腰脊強頭項痛

註濕淫於上是以沉陰且布草木枯槁得化氣之雨而變生附腫陰痹皆感寒濕氣病在陰者名曰痹故按之不得也腎主骨而膀胱爲之腑故腰脊頭項骨痛

太陰之勝火氣內鬱瘡瘍於中流散於外病在胠脅甚則心痛熱格頭痛骨痹項強

註陰濕之氣淫於外則火氣內鬱而瘡瘍於中矣濕熱之氣流散於外則及於風木而病在胠脅甚則心痛者木甚而傳於火也熱格頭痛喉痹項強者風火之氣與濕氣相雜從頸項而上於巔頂也

太陽之勝熱反上行頭項囟頂腦戶中痛目如脫

註熱反上行者太陽之氣隨經上入腦還出別下項太陽經脈起於目內眥故目如脫也

太陰之復濕變乃舉頭項痛重而掉瘈尤甚

註頭項痛重而掉瘈尤甚者所謂因於濕首如裹濕氣不攘大筋緛短小筋弛長緛短爲拘弛長爲痿也

少陰司天客勝則鼽嚏頸項強肩背脊熱頭痛

註少陰司天初氣乃太陽寒水頭項強肩背脊熱頭痛太陽寒水之氣勝也

諸痙項強皆屬於濕

註此五藏之氣而發見於形氣也

靈樞經

邪氣藏腑病形篇

邪之中人中於項則下太陽

註以太陽之循頸項而上于於頭面也

論疾診尺篇

視人之目窠上微癰如新臥起狀其頸脈動時欬按其手足上首而不起者風水腹脹也

註足太陽之脈起於兩目而下出於頸項太陽之上寒水主之太陽之氣運行於膚表此水隨氣而溢於皮膚之間故目窠微腫頸脈動而膚脹欬者水留於皮毛而動其肺氣也風水者因外受於風風行而水渙也

寒熱病篇

五藏身有五部伏兔一腓二腓者腨也背三五藏之腧四項五此五部有癰疽者死

註伏兔腎之街腨者脾之部背乃肺之俞五藏俞謂五椎之心俞也項者肝之俞本經曰癰疽之發不從天下不從地出積微之所生也故五部之有癰疽者乃五藏漸積之鬱毒外應於血氣之不和而爲之也故五部有此者死

本輸篇

缺盆之中任脈也名曰天突

註當缺盆中央動脈是

一次任脈側之動脈足陽明也名曰人迎

註挾喉兩旁之動脈是

二次手陽明也名曰扶突

註挾喉動脈之後曲頰之前一寸後是

三次手太陽也名曰天窗

註手陽明之後當曲頰之下是

四次足少陽也名曰天容

註曲頰之後當耳之下是

五次手少陽也名曰天牖

註耳後當完骨上是

六次足太陽也名曰天柱

註挾項大筋中是

七次脈中央之脈督脈也名曰風府

註凡此論三陽之脈循序而上於頸項應陽氣之出於地外而任督二脈出於腎而通先天之陰陽也

足陽明挾喉之動脈也其脈在膺中手陽明次在其脈外不至曲頰一寸手太陽當曲頰足少陽在耳下曲頰之後手少陽出耳後上加完骨之上足太陽挾項大筋之中

註此論陽氣之上下以應天氣之升降也

寒熱篇

黃帝問於岐伯曰寒熱瘰癧在於頸腋者皆何氣使生岐伯曰此皆鼠瘰寒熱之毒氣也留於脈而不去者也

註寒熱之毒氣下藏於藏上遍於頸腋之間留於脈而不去則爲瘰癧者此腎藏先天之水毒也天開於子天一生水其毒在外故名曰鼠夫頸腋之脈少陽之脈也少陽乃初陽之氣生於先天之水中而少陽又與腎藏經氣相通故本經曰少陽屬腎

黃帝曰決其生死奈何岐伯曰反其目視之其中有赤脈上下貫瞳子見一脈一歲死見一脈半一歲半死見二脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲而死赤脈不下貫瞳子可治也

註脈陰少陽之形藏在於心下中焦之部分而二氣皆本於腎藏之所生瞳子者水藏之骨睛也赤脈從上而下貫瞳子者水藏之毒氣上交於包絡之火藏火藏之毒氣復下交於水藏之骨睛此爲陰陽交者死不治蓋毒氣在於陰陽之藏內往來不能出於末而從脈潰故爲不治之惡疾也一脈一歲死者水藏之毒甚也二脈二歲死者水藏之毒傳之於火藏也三脈三歲死者毒氣分於二藏之間也蓋毒之專者爲害重故死之速分者死之遲也一脈半者一二之間也二脈半者二三之間也

癰疽篇

癰發於頸名曰天疽其癰大以赤黑不急治則熱氣下入淵液前傷任脈內熏肝肺熏肝肺十餘日而死矣

註頸乃手足少陽陽明血氣循行之分部故不急治則熱氣下入淵液淵液乃足少陽膽經穴在腋下三寸蓋從外而將入於內也任脈居陽明少陽四脈之中故前傷任脈內熏肝肺此在外膽經之毒內熏於臟故至十餘日而死

漢張機金匱要略

項強急

病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目赤獨頭動搖卒口噤背反張者痓病也若發其汗者寒濕相得其表益處即惡寒甚發其汗已其脈如蛇

頸脈動

寸口脈沉滑者中有水氣面目腫大有熱名曰風水視人之目裏上微擁如蠶新臥起狀其頸脈動時時欬按其手足上陷而不起者風水

唐孫思邈千金方

九漏

凡項邊腋下先作瘰癧者欲作漏也宜禁五辛酒麪及諸熱食

凡漏有似石癰累累然作癧子有核在兩頸及腋下不痛不熱治者用練石散傅其外內服五香連翹湯下之已潰者治如癰法諸漏結核未破者火針針使著核結中無不瘥者何謂九漏一曰狼漏二曰鼠漏三曰螻蛄漏四曰蠹漏五曰蚘蜉漏六曰蜻蜻漏七曰浮沮漏八曰瘰癧漏九曰轉脈漏

宋漢卿瘡瘍全書

項疽毒

此毒因五臟受毒氣壅血枯伏在風府之間惡證也當用敗毒流氣飲治之後用內托流氣飲

風毒頸癰

有人肥壯素能飲酒酷暑遠行酒醉居於舟中臥於風內又爲日色暑氣相侵并有七情所干歸家不免於色慾頸項倏忽痛如失枕之狀其名曰何乃風熱鎖喉毒也久則紅色繞於肩背堅硬難消急服清暑疏風散

瘰癧

此證手少陽三焦經主之大抵二經多氣少血因驚憂思慮故生此疾初起生於耳下及項間并頤頷下至缺盆在鎖子骨陷中隱隱皮膚之內初生如豆漸長如李核之狀或一粒或三五粒按之則動而微痛不發熱惟午後微熱或夜間口乾飲食少思四肢倦怠則堅而不潰潰而不合皆因氣血不足往往變爲勞瘵自覺紅腫或上或下或左或右連串三五箇破潰遍項漸流膿血致成瘰癧獨形者爲結核續欲連結者爲瘰癧但此證原不係膏粱之變因處勞氣鬱所致宜以益氣養榮之藥治之其瘡自消若金石暴悍之劑血氣愈損不能生矣若不速治必致喪生也

馬刀瘡與瘰癧同係少陽膽經主之此二經亦多氣少血或在耳之前後或在耳下連及頤頷或在胷及胷側或在兩脅久堅不潰皆謂之馬刀瘡也故多堅少軟膿曰如稀糊似泔水狀治者求水清可也形表如蛤者爲馬刀瘡

金劉完素六書

頸痛

唐慶頸痛胃滿腹脹上實下虛氣厥而逆陽氣有餘鬱於胃也不可鍼灸宜服順氣湯小茯苓湯主之

腎熱者腰痛脈痺苦渴數飲食熱爭則項痛而強脈寒且疲足下熱不欲言經曰汗出脈躁盛一死脈不與汗相應其病二死狂言失志者三死皆是怫鬱結不能解散以致危殆

瘰癧論

夫瘰癧者經所謂結核是也或在耳前後連及頤頷下連缺盆皆爲瘰癧或在胃及胃之側下連兩脅皆爲馬刀手足少陽主之此經多氣少血故多堅而少軟農白而稀如泔水狀治者求水清可也如瘰癧生在別經臨時於銅人內隨其所屬經絡部分對證之穴灸之并依經內藥用之獨形而小者爲結核續數連結者爲瘰癧形表如蛤者爲馬刀

成無己明理論

項強

傷寒項強何以明之太陽脈起於目內眥上額交巔上入絡腦還出別下項循肩臂內挾脊抵腰中經曰太陽之病項背強痛而惡寒以太陽感受風寒則經脈不利而頸爲之急頸爲之強耳傷寒頸項強急者太陽表證也必發散而解之可也太陽病項背強八八反汗出惡風者桂枝加葛根湯主之太陽病項背強八八無汗惡風者葛根湯主之是皆發散之劑也二者均是項背強而發散又有輕重者蓋發熱汗出惡風者爲表虛表虛者可解肌無汗惡風者爲表實表實者可發汗是以爲治不同也桂枝加葛根湯方是桂枝加麻黃葛根又葛根湯方亦是桂枝湯中加麻黃葛根深詳究之無汗惡風爲表實正可發汗則於桂枝湯中加麻黃葛根爲當矣汗出惡風爲表虛表虛者可解肌恐是桂枝湯中但加葛根而不加麻黃也八音殊引頸之貌八短羽鳥也短羽之鳥不能飛騰動則先伸引其頭耳項背強者動亦如之非若几按之几而僂屈也太陽傷寒項背強其或太陽中風加之寒濕而成痙者亦項強也經曰病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脈赤獨頭面搖卒口噤背反張者痙病也金匱要略曰太陽病其證項背強八八然脈反沉遲者此爲痙桂枝加苦蓼湯主之雖項背強然太陽病表證悉當發散又有結胸病者項亦強如柔痓狀下之則和宜大陷胸丸主之臨病之際審其表裏可汗可下隨證投湯則萬全矣

項軟

小兒因風頸軟頭不得正或去前或去後宜用天柱五加皮散風熱項軟合用帥肝丸

張潔古活法機要

瘰癧

夫瘰癧者結核是也或在耳後或在耳前或在耳下連及頤頷或在頸下連缺盆皆謂之瘰癧或在胃及胃之側或在兩脅皆謂之馬刀手足少陽主之

結核耳前後有之或耳下頷下有之皆瘰癧也桑菩二斗極熟黑色者以布袋取自然汁不犯銅鐵以文武火慢熬作薄膏子每日百沸湯點一匙食後日三服

張從政儒門事親

瘰癧

夫人頭目有瘡腫瘰癧及胃臆胠脇之間或有瘡痂腫核不消及有膿水不止可用滄鹽一二兩炒過以長流水一大椀煎放溫作三五次頓服訖候不多時於咽喉中探引吐涎二三升後服和血通經之藥如玉燭散四物湯之類是也內經曰鹹味涌泄爲陰涌者吐也泄者瀉也銅人曰少陽起於目銳眥行耳後下脇肋過期門瘰癧結核馬刀挾癭是少陽膽經多氣少血之病也

李杲十書

馬刀瘰癧

耳下至缺盆或至肩上生瘡堅硬如石動之無根者名馬刀瘡從手足少陽經中來也或生兩脅或已流膿作瘡或未破連翹散堅湯並皆治之

瘰癧馬刀將先出一瘡用四楞鐵環定住不令出移破作口子以油紙撚紮之勿令合了以絕其瘡之源其效至速如瘡不破或病人不肯破更以藥塗之三日一易之以龍泉散主之

朱震亨心法

瘰癧結核瘰氣

夫瘰癧初起必起於少陽經不守禁戒必延及陽明經大抵食味之厚鬱氣之積曰毒曰風曰熱皆此三端招引變換須分虛實彼實者固易治自非痛斷厚味與發氣之物難易亦難殊爲可慮以其屬膽經主決斷有相火而且氣多血少婦人見此若月經行不作寒熱可生稍久轉爲潮熱其證危矣自非斷慾絕

慮食淡雖神聖不可治也

瘰癧屬血氣痰熱以牡蠣煅過爲末元參搗膏爲丸或桑葚黑熟者搗汁熬膏湯調服紅者曬乾爲末湯調服

夏枯草大能散結氣而有補養血脈之功能退寒熱虛者儘可倚仗若實者以行散之藥佐之外施艾灸亦漸取效

結核或在項在頸在臂在身如腫毒者多在皮裏膜外多是痰注作核不散問其平日好食何物吐下後用藥散核結核在下頦二陳湯加酒炒大黃連翹桔梗柴胡結核在臂二陳湯加連翹防風川芎酒芩蒼木皂角刺殭蠶麝香行太陰厥陰之積痰使結核自消甚捷

寒氣須先斷厚味

凡頸下卒結囊欲成癰以海藻一斤洗去鹹酒浸飲之

齊德之外科精義

瘰癧治法

夫瘰癧之病其名甚多巢氏病源載之三十六種千金聖惠所論瘰癧九漏總論說有風毒熱毒氣毒之異瘰癧結核寒熱之殊其本皆由恚怒氣逆憂思過甚風熱邪氣內搏於肝蓋怒傷肝肝主筋故令筋蓄結而腠其候多生於頸腋之間結聚成核初如豆粒後若梅李核累累相連大小無定初覺憎寒壯熱咽項强痛腫結不消者當便服五香連翹湯或牡蠣大黃湯疏下三兩行於上貼十香膏烏犀膏及用淋瀝腫湯潰毒膿時復淋瀝如此救療即得消散若未消散可服內消丸或皂角丸之類漸以求差若腫結深硬往往日月不能內消者久必成膿若腫高而稍爽其人面色痿黃皮膚壯熱上蒸膿已成也可以針決核中令其潰散則易愈也治法如瘡法於瘡口中用追毒蝕肉錠子紮之於上用烏犀十香膏等貼之及托裏之劑和之經久不差或愈而復發或別處自穴膿水透出流津不止肌體羸瘦者變成九瘵內經曰陷脈爲癭當連肉勝卽此病也可用蒜餅子灸之然後瘡口上用紫金散犀霞散等於上紮貼膏藥求差其將護忌愼治療用法無造次焉

明戴思恭證治要訣

瘰癧

瘰癧之病皆血氣壅結根在臟腑多結於頸項之間纍纍大小無定發作寒熱膿血潰漏或此愈而彼起宜於陽宿用米飲調下桂末滑石二錢重鍾動時進黑白散必有物如葡萄肉從小便出其數枚於腫核則愈仍常服四七湯加木香或蘇子降氣湯其匝頸者俗名蟠蛇瘰難治

先以石菖蒲爛研盦患處微破却以猫狸皮連毛燒灰香油調傅一味白蘞末酒調服多多爲上仍以酒一呷調白蘞盦患處掘取生者尤好或用豬膽內水調雄黃末傅患處亦好

樓英醫學綱目

瘰癧

初庶世云瘰癧多生肩項或赤或白或沉或浮初生如豆久似栲栳年月浸久其大如梅或如雞卵排行成列或生二三或生六七俗云蟠蛇瘰是也用性努力思慮過久則痰痛赤腫繼之早治爲上

流注瘰婦人多有之其性急躁其氣怫鬱其心執著初生在項破後膿注四肢遍體結毒如梅李狀不瘥自破孔竅相穿寒熱疼痛或流膿汁是名流注瘰也又名千歲瘡宜服托裏救苦神應丸如脈有力者先用追神散下之却服救苦神應丸

單窠瘰者生一箇也發於頸項最難治但宜如前藥服之日久自潰或發於顱骨亦難治用毒藥療之勿令浸漬日久

蓮子瘰一胞裏十數枚生於項之左右以手觸則能轉動尚可用藥治療如堅硬挨不動者乃不可生憎寒發熱躁渴凡遇此證至難治雖神聖亦無如之何也已

重臺瘰生於項頸或左或右初則單窠結在上或在下重疊見之是名重臺瘰此證藥不可療不可針灸若是毒行其腫痛發渴生痰萬死一生害人極速初覺有之急用小犀角丸粉金散治之

燕窠瘰形似燕窠不可治

李梴醫學入門

傷寒項强

項硬而不能左右回顧太陽初證表實無汗葛根湯表虛有汗桂枝湯加葛根若誤下邪氣乘虛入裏反結胃而項强又不解謂之結胃項强大陷胸湯丸兼理中丸或四逆湯服之所以陰毒初痛亦有項强俱以熱藥治之正陽散附子湯是也

項强連背下滿者小柴胡湯又有風濕項强痙病項强不可不辨也

頸疽對口

六腑陽毒聚於頂惟太陽膀胱主之有生於頸後者瘡頭向上瘡尾向下形如蜂窩乃反證也焮腫者急宜托裏散加升麻赤芍桔梗防毒攻心如痰發或流入兩肩者不治

有生腦後對口者名曰夭疽其狀大而色紫黑不急治熱入淵液前傷任脈內熏肝肺十餘日而死

焮腫作痛煩渴好飲冷水宜解毒湯加天花粉以除痰火濕熱或黃連消毒散當歸羌活湯清熱消毒飲活命飲選用

腫痛口乾作渴好飲熱湯爲腎陽虛火熾宜托裏消毒散托裏益氣湯腎氣丸八味丸漫腫微痛少食者補中益氣湯痰多者托裏清中湯若色黯不潰不斂爲陰精消涸名腦爍不治

瘰癧馬刀

生頸前項側結核如大豆如銀杏曰瘰癧生胷脅腋下堅硬如石形如馬刀蟲曰馬刀多氣少血之病總皆手足少陽相火所生蓋耳前後與缺盆肩上胛下屬足少陽部分延及頦項頰車與頤屬足陽明部分延及胷中中府雲門肺經部分者死風癧尖而小熱癧焮腫赤色又名血癧痰癧推動滑軟氣癧圓而動又有鼠殘癧大小不一

無痰不成核諸瘰初起實者皆以化痰爲主通用二陳湯加防風桔梗黃芩竹瀝胷緊者以此探吐尤妙通經脈必用蟹螯疏滲小便以瀉心火古方必效散立應散是也但此二藥甚峻服後宜量體調治體實風熱盛者繼以宣熱丹服之體虛者托裏益氣湯或八物湯合二陳湯多服瘡口自斂又有虛甚者宜先服健脾藥而後服二散輕者只用斑雞丸便堅胃盛者白蠶丸或追膿化毒散軟硬皂子丸少陽分者柴胡通經湯陽明分者升麻調經湯少陽陽明二經二湯合服調之誤下則犯經禁病禁

清肝者膽與肝合病則筋累累如貫珠寒熱譽痛乃肝氣動而爲病也當清肝火爲主佐以養血若寒熱止而瘡不愈者乃肝血燥而爲病也當養血爲主佐以清肝清肝益榮湯梔子清肝湯柴胡清肝湯選而用之

瘡如豆粒附筋肉色不變內熱口乾精神倦怠久不消潰及肝脈弦緊腎脈洪數乃腎水不能生木以致肝血火動筋攣忌用風藥燥乾經久爛破膿血大泄者脾腎愈虧火炎於肺皆宜腎氣丸補中勝毒餅爲主兼服逍遙散加桔梗麥門冬元參以清肺火多怒有肝火者清肝解鬱湯有寒熱者單夏枯草散肝火旺甚或近骨處生蟲作癢者蘆薈丸通用猪頭丸海藻散堅丸外治銀右散蠶繭散猫蝠散虛弱者單夏枯草膏內服外貼加麻油

經年成漏者初起宜溫散風冷及行腎經濕熱邪水久則大補氣血兼用熏洗平肌塞竅之藥古方白蛇散治瘰癧成漏以其有牽牛能利腎經惡水免致淋漓穿穴但利後當量體調治痛節酒色財氣

女人經調及經閉無潮熱者可治經閉有潮熱或欬者死古方用玉燭散治瘰癧和血通經服之自消日進一服七八日見效便不閉者柴胡通經湯升麻調經湯久虛者加味逍遙散清肝益榮湯或用二陳湯合四物湯加牡蠣柴胡黃芩元參神麴爲末以桑葚熬膏搗丸菉豆大每五十丸溫酒下或服腎氣丸尤妙

瘰癧瘍證之標也故痨瘵類有曰腹中有塊頸上有核最爲難治況成潰漏而又清金降火滋腎健脾病人若不清心淡口則潮汗渴瀉惡證蜂起其可生乎但視其目內赤脈貫瞳人有幾條則知其幾年死面色眺白金尅木脈洪大爲元氣虛敗俱爲不治故曰實者可治虛者可慮

痰核

頸項生核不紅不痛不作膿推之則動乃痰聚不散也不可悞用瘰癧藥治宜二陳湯加大黃連翹柴胡桔梗體薄者二陳湯加桔梗黃芩元參麥門冬及防風少許入竹瀝多服自消如耳後與項間各有一塊者含化丹

臂核或作微痛者以內無膿故外雖腫不紅或生背膊皆然宜陳皮半夏茯苓防風酒芩各一錢連翹二錢皂角刺一錢半川芎蒼朮各五分甘草三分水煎服

凡遍身有塊多是痰注但在上體多兼風熱在下體多兼濕熱宜加味小胃丹竹瀝達痰丸量體虛實服之通用海帶丸

癭

癭皆痰與氣相結而成筋脈呈露曰筋癭赤脈交絡曰血癭皮色不變曰肉癭隨憂愁消長曰氣癭堅硬不可移曰石癭其名有五者此也內應五臟治與瘤同

形似櫻桃一邊縱大似槌而垂皮寬不急原因憂患所生故又名癭氣今之所謂影癭者似也憂恚耗傷心肺故多著頸項及肩勞慾邪氣乘經之虛而作或軟或硬無痛無痒體實者海藻散堅丸海帶丸瘿火盛者舐掌散神效開結散此皆化痰行氣破堅之劑久虛者不可妄服

通用初起者十六味流氣飲單蜘蛛方稍久者蠟礬丸常服自然縮小消磨外敷南星膏切不可輕用刀鍼決破則膿血崩潰滲漏無已必至殺人

陶華六書

項強

項背強者太陽表邪也發散則解結胷項強有下之證寒濕項強成痓

太陽病項強無汗惡風爲表實葛根湯項背強發熱有汗惡風爲表虛桂枝加葛根湯誤下太陰結胷項強大陷胷丸一法寒實甚者兼與四逆湯

項強俯下滿身熱惡風手足汗而渴小柴胡湯

陰毒初得病項背強咽痛心腹痛短氣厥逆吐利身如被杖附子湯陰毒甘草湯正陽丹天行復作熱至晚則腰痛頭項強身重葛根生薑豉湯

薛己醫案

瘰癧

夫瘰癧之病屬三焦肝膽二經怒火風熱血燥或肝腎二經精血虧損虛火內動或恚怒氣逆憂思過甚風熱邪氣內搏於肝蓋怒傷肝肝主筋肝受病則筋累累然如貫珠也其候多生於耳前後項腋間結聚成核初覺憎寒惡熱咽項強痛若寒熱畢痛者此肝火風熱而氣病也用小柴胡湯以清肝火井服加味四物湯以養肝血若寒熱既止而核不消散者此肝經火燥而血病也用加味逍遙散以清肝火六味地黃丸以生腎水若腫高而稍軟面色痿黃皮膚壯熱膿已成也可用針以決之及服托裏之劑若經久不愈或愈而復發膿水淋漓肌體羸瘦者必純補之劑庶可收斂否則變成九瘻內經曰陷脈爲瘻留連肉腠卽此病也外用豆豉餅琥珀膏以驅散寒邪補接陽氣內服補中益氣湯六味丸以滋腎水培肝木健脾土亦有可愈者大抵肝膽部分結核不問大小其脈左關弦緊左尺洪數者乃腎水不能生肝木以致肝火燥而筋攣須用前藥以滋化源是治其本也外臺秘要云肝腎虛熱則生癘病機云癘癰不係膏粱丹毒火熱之變因虛勞氣鬱所致止宜補形氣調經脈其瘡自消散蓋不特汗之下之而已也其不詳脈證經絡受病之異者下之則犯經禁病禁虛虛之禍如指諸掌若脈洪大元氣虛敗爲不治若面晄白爲金剋木亦不治若眼內赤脈貫瞳人見幾條則幾年死使不從本而治妄用伐肝之劑則誤矣蓋伐肝則脾土先傷脾傷則損五藏之源矣可不慎哉

瘍腫脈沉數者邪氣實也宜泄之腫痛憎寒發熱或拘急者邪在表也宜發散因怒結核或腫痛或發熱者宜疏肝行氣腫痛脈浮數者祛風清熱脈滑者補血爲主脈弱者補氣爲主腫硬不潰者補氣血爲主抑鬱所致者解鬱結調氣血潰後不斂者屬氣血俱虛宜大補虛勞所致者補之因有核而不斂者腐而補之脈實而不斂或不消者下之

張氏云室女月水久不行切不可用青蒿等涼劑醫家多以爲室女血熱故以涼藥解之殊不知血得熱則行冷則凝養生必用方言之甚詳此說大有理不可不知若經候微少漸漸不通手足骨肉煩疼日漸羸瘦新生潮熱其脈微數此由陰虛血弱陽往乘之小水不能減盛火火逼水涸亡津液當養血益陰慎毋以毒藥通之宜柏子仁丸澤蘭丸

王肯堂證治準繩

頸項強痛

頸項強急之證多由邪客三陽經也寒搏則筋急風搏則筋弛左多屬血右多屬痰

頸項強急發熱惡寒脈浮而緊此風寒客三陽經也宜驅邪湯

頸項強急動則微痛脈弦而數實右爲甚作痰熱客三陽經治宜消風豁痰湯

頸項強急動則微痛脈弦而濇左爲甚作血虛邪客太陽陽明經治宜疏風滋血湯

頸項強急寒熱往來或嘔吐或脅痛宜小柴胡湯升麻防荊湯

頸項強急腰似折項似拔加味勝濕湯

精神短少不睡項筋腫急難伸禁甘溫宜苦寒養神湯主之

本事方椒附散治腎氣上攻項背不能轉側於虛寒者爲宜

頸痛非是風邪卽是氣挫亦有落枕而成痛者並宜和氣飲食後服按人多有挫閃及久坐井失枕而致項強不可轉移者皆由腎虛不能生肝肝虛無以養

筋故機關不利宜六味地黃丸常服

癧瘰

結核連續者爲癧瘰形長如蛤者爲馬刀一云癧瘰者結核是也或在耳後耳前或在耳下連及頤頷或在頸下連缺盆皆謂之癧瘰或在胷及胷之側或在兩脅皆謂之馬刀手足少陽主之

集驗云夫癧瘰瘡者有風毒熱毒氣毒之異癧瘰結核寒熱之殊其證皆由忿怒氣逆憂思過甚風熱邪氣內搏於肝蓋惡傷肝肝主筋故令筋縮結蓄而腫也其候多生頸項胷腋之間結聚成核初如豆粒後若梅李纍纍相連大小無定初覺憎寒壯熱咽項强痛腫結不消者便當服散腫潰堅湯或五香連翹湯薑湯之類散之或用牡蠣大黃湯疏利三兩行瘡上可用十香膏之類貼之及諸淋洗數貼等藥治之庶得消散若不散可用內消丸之類消之或隔蒜灸之仍斷慾息氣薄滋味調理之不然恐日久變生寒熱咳嗽而成勞瘵之疾不可治矣又有馬刀瘡亦生於項腋之間有類癧瘰但初起其狀如馬刀赤色如火燒烙極痛此瘡甚猛宜急治之不然成危殆也臨證辨之

治法

治瘰疬第初覺憎寒壯熱咽項强痛腫結不消者以羌活連翹湯又宜常服消瘰丸却以稜針刺破出血以拔毒湯熱淋洗一日洗五七次針五七次放蟾酥末少許於針處上以琥珀膏貼之更以內消膏貼之久久自然而消也如不散者用鐵筒拔毒膏點破次以下品錠子取去惡肉可作潰瘍治之用十宣散之類托裏若毒攻心嘔吐者用粉乳托裏散發出毒此要兼針灸法同施若已潰不愈者宜益氣養榮湯八物湯加柴胡地骨皮夏枯草附子貝母多服取效凡用錠子藥線必用托裏之劑服之瘀赤腫痛脈沉數者邪氣實也宜泄之以化毒消腫和裏散加減腫痛憎寒發熱或拘急脈浮數者邪在表也宜散表以荊防敗毒加減因怒結核或腫痛或發熱者宜疎肝行氣以小柴胡湯加青皮青木香紅花桃仁腫硬不潰者宜補氣血以益氣養榮湯抑鬱所致者解鬱結調氣血以益氣養榮湯潰後不斂者屬氣血俱虛宜大補以益氣養榮湯次用十全大補湯加香附子貝母遠志虛勞所致者宜補之先以補中益氣湯次以益氣養榮湯加減因有核潰而不斂者腐而兼補以針頭腐之以益氣養榮湯補之脈實而不斂或不消者下之以羌活連翹湯腫痛發寒熱大便祕以羌活連翹湯次以神仙活命飲耳下結核腫痛發寒熱宜荊防敗毒散表證悉退以散腫潰堅湯潰後核不腐以益氣養榮湯更數針頭散腐之腫硬久不消亦不作膿服散堅敗毒藥不應宜灸肘尖肩尖服益氣養榮湯而消氣血壯實之人脈沉實而大者亦不覺損方可進必效散遇仙無比丸下其毒若其毒一下卽止二藥更服益氣養榮湯調理瘡口不斂宜用豆豉餅灸之以琥珀膏十香膏貼之潰後發熱煩躁作渴脈大無力此血虛也宜以當歸補血湯次以聖愈湯再以八物湯加貝母遠志勞心過度頸腫發熱服敗毒藥愈甚以補中益氣數劑而消

百脈疽

鬼遺云百脈疽腫起環頸項疼痛身體大熱不敢動止悕悕不能食此有大畏恐駭上氣欬嗽其發引耳不可以腫十五日可刺導引不刺導引見血八十日必死

頸癰

或問頸上生癰疽何如曰是頸癰也屬手少陽三焦經鬱火積憤驚惶所致初覺卽隔蒜灸服活命飲加元參桔梗升麻及勝金丹奪命丹汗之壯實者一粒金丹下之老弱者十全大補湯人參養榮湯若潰而不斂煩躁脹滿小便如淋嘔吐者死

項中疽

或問頸後腦下發疽何如曰此卽對口瘡也屬督脈陽獨盛氣有餘火炎上而發疽也急服烏金散勝金丹汗之壯實者一粒金丹下之稍遲潰出膿水入風發搐者難治有毒邪壅盛鮮血暴湧者死毒攻心腹膨脹譫語者死此證燃赤腫痛可治若根大精神昏憒卽難治也量表裏虛實而爲汗下內托內消外用大圍藥箍住中點六灸膏之頸破泄其毒不可走失根脚若欲流兩肩脊者不可療也或云先服追疔奪命湯二貼後服活血化毒湯

天柱疽

或問天柱骨上極痒入骨惡心吐逆肩背拘急何如曰此名天柱疽急隔蒜灸痒止爲度無蒜明灸可治服活命飲加羌活桔梗烏金散勝金丹選用灸而有泡者吉無泡者凶服汗劑得汗可治無汗難治若潰爛神昏嘔噦惡心血不止者死

杼疽

或問頸上兩耳後生疽何如曰此名杼疽初不甚腫但痛痒不時而出清水漸漸長大如玳瑁斑點者是也亦名化骨瘡急服八陣散奪命丹活命飲加桔梗柴胡若過時潰爛日久出骨者大惡之證也此證多生於積鬱之人七惡多見犯禁者不治

陳實功外科正宗

腦疽論

夫腦疽者俗稱對口是也但所發不同其源有二得於濕熱交蒸從外感受者輕五臟蘊結從內發外者重其理何也濕熱之爲病天行氣候寒暑不調節序溫凉陰陽失度凡有體虛者易於侵襲項後雖屬督脈又主太陽寒水司行之道所有侵襲氣血必凝凝則後必爲腫此從外感受者其患初起有頭多生正穴三四日間多作焮痛始生寒熱口和而乾色紅根活瘡勢漸高形不散大時止時疼易膿易腐飲食知味起坐尋常外勢雖可畏而內無七惡之證相干此屬陽證其由從外來矣故多不治可愈所有五臟蘊結而成者重其源有五蓋心主血故心緒煩擾煽動不寧以致火旺而沸騰行於項間與寒水交滯而爲腫者一也肝統筋故惱怒傷肝項乃三陽統筋之所肝傷則血脈不潮筋無榮養凝結爲腫故項緊急强痛不能轉側其患未潰前肉色紫暗堅硬漫腫破流血水不痛無膿此等之證皆肝氣受傷者二也脾主肌肉故思慮傷脾脾氣日損又或膏粱損胃胃汁乾枯以致中脘否塞氣不運行逆於肉裏乃生臃腫其患外皮雖腐而內堅不潰口燥舌乾飲食不進根脚走散膿穢色敗此等之證皆脾氣受傷者三也肺主皮毛故憂鬱傷肺肺傷則毛竅閉塞腠理不通氣不舒暢縱橫經絡結而爲腫其形瘡多平陷色淡不華皮腐脂流形如湯潑氣粗短促面黴鼻掀碌碌生痰殷殷發嗽此等之證皆肺氣受傷者四也腎主骨髓故恣慾傷腎腎傷則眞陰之氣敗矣眞陰一敗相火自生此火最能自升自降或動或靜煎熬臟腑消鑠津液更變形容改換聲音瘡形紫黑脈數乖度煩躁口乾隨飲隨渴此等之證皆腎氣受傷者五也凡治此證必內分虛實外辨陰陽體順天時察其病理七日以前瘡勢未成者當通竅以汗發之七日已後病勢已成治當兼補以托之此則毒不內攻外無變證如藥攻利太過元氣受傷毒多難出又敷圍凉藥氣血冰凝則肌肉多死反難腐潰予嘗治此及諸發背初起未成者用鈹針當頂點入知痛處出其惡血通其瘡竅隨插蟾酥條直至瘡底外用膏蓋內服萬靈丹或蟾酥丸發其大汗解散內蘊之毒次日患止或腫或不腫或痛或不痛仍插仍貼直至患頂腫高根脚突起四圍裂縫有膿方住插藥輕淺者九日後吐出病根堅硬不化之物毒甚者不能頓然脫落亦可漸腐成膿爲轉重就輕之良法外用玉紅膏長肉內服補托收斂其患不久自愈如陽證輕淺者候自腐潰不用前法針刺如不腫不疼灸亦不痛陰證尤當速用不必遲延此爲移深居淺之大法也

看法

初起頂高根活色紅皮薄作疼焮熱腫不開散者順已成無論偏正瘡形獻起疼痛發熱易膿易腐者順已潰膿稠肉色紅活瘀腐易脫焮腫漸消痛減者順潰後腐脫新肉便生瘡口漸斂凝結痂膿作癢者順初生一點黃泡或似疙瘩不腫不疼自不知覺者逆已成不發高腫亦不焮痛瘡頂軟陷根脚平散者逆已潰膿清肉色紫黑外皮不腐內生臭穢不食者逆腐肉雖盡新肉不生瘡口散大軟陷無神色敗者逆

治法

初起有頭或無頭大痛或不痛俱隔蒜灸兼服解毒已成堅硬發熱焮痛口乾便祕者邪在內也宜泄之堅腫不痛發熱惡寒頭疼四肢拘急者兼發表攻裏腫硬日深形色紫黑外皮不腐內膿不潰宜行拔法腫强頭面焮熱口燥惡心嘔吐者邪在上也宜清之焮熱腫痛紅色光亮疼苦有時內膿脹痛者急開之將潰不潰微熱微紅不作腐潰者脾胃虛也宜補之潰後腐肉不脫膿水清稀腫痛仍作者當大養氣血大便多溏小便短濇自汗食少脈細身凉溫中健脾

瘰癧論

夫瘰癧者有風毒熱毒氣毒之異又有瘰癧筋癧痰癧之殊風毒者外受風寒縛於經絡其患先寒後熱結核浮腫熱毒者天時亢熱暑中三陽或內食膏粱厚味釀結成患色紅微熱結核堅腫氣毒者四時殺厲之氣感冒而成其患耳項胃腋驟成腫塊令人寒熱頭眩項强作痛瘰癧者累累如貫珠連接三五枚此不足寒熱其患得於悞食蟲蟻鼠殘不潔之物又或汗液宿茶陳水混入而餐其患先小後大初不覺疼久方知痛筋癧者憂愁思慮暴怒傷肝蓋肝主筋故令筋縮結蓄成核生於項側筋間形如棋子堅硬大小不一或陷或突久則虛羸多生寒熱勞怒則甚

痰癧者飲食冷熱不調飢飽喜怒不常多致脾氣不能傳運遂成痰結初起如梅如李生及遍身久則微紅後必潰破易於收斂凡觀此證別其風毒者散其風除其毒如防風解毒湯之類是也熱毒者清其脾瀉其熱連翹消毒飲之類是也氣毒者調其血和其氣藿香正氣散之類是也瘰癧者散其堅和其血散腫潰堅湯之類是也筋癧者清其肝解其鬱柴胡清肝湯之類是也痰癧者豁其痰行其氣芩連二陳湯之類是也又有寡婦尼僧鰥夫庶妾志不得發思不得遂積想在心過傷精力此勞中所得者往往有之最爲難治有此先養心血次開鬱結益腎安神疏肝快膈如歸脾湯益氣養榮湯俱加香附青皮山梔貝母木香之類是也又男人不宜太陽青筋潮熱咳嗽自汗盜汗女人又忌眼內紅絲經閉骨蒸五心煩熱男婦有此後必變爲癆瘵難治之證但此體實者初起可服散腫潰堅攻利之藥得效者十中三四有不察虛實盡劑追伐損傷元氣致成壞病者十有八九此非患者之命自出醫人之手予常治初起成核服前藥未效者用鍼刺核內深入三四分用冰蛳散撚成條子插入核內糊紙封上待至二七後核子自然落出隨用紅黑二膏搽貼內服補劑不久便愈又常見蟹蝥牽牛巴霜大黃追蝕等用往往致其危亡者多矣切宜戒之

看法

初起核高腫痛色紅軟活微作寒熱肩項不强者易已成根不堅硬內無小核相叢脾健氣血不衰者易已潰膿稠肉色紅活核腫漸消肩項自便漸斂者順潰後易消易斂氣體平和胷膈寬利飲食知味者順未成形體消瘦寒熱往來結核頑硬痰嗽相兼者險已成核堅連續如珠大小不等項強筋急脈虛者險已潰膿水清稀肌肉消鑠自汗盜汗寒熱不睡者逆潰後陰虛煩躁作渴泄祕男子骨蒸女人經閉俱逆

治法

初起腫痛憎寒壯熱四肢拘急項強頭眩者表散之腫硬發熱便祕口乾胷膈不利惡心脈實宜利之膏粱厚味醇酒積熱濕痰凝結而成化痰降火清中憂思過度鬱怒傷肝筋縮結核者宜養血開鬱疏肝房慾勞傷陰虛晡熱自汗欬嗽形消瘦者滋腎健脾失利忘名懷抱鬱結積想在心所如不得乖隔陰陽虛嗽歲月所得此者精血俱傷先養正氣次治標病堅而不潰腐而潰之潰而不斂補而斂之皆活法也

石室祕錄 臣陳士鐸著

瘰串

瘰串乃鼠食之物人不知食之多生此病然亦有鬱氣者乃易成而不愈也方用白芍白芥子紫貝天葵茯苓香附當歸各三兩人參柴胡各五錢蒲公英一兩白朮五兩砂仁二錢各爲末米飯爲丸如細米一半大每日白滾水送下三錢日三服一月即消二月全愈

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百八十七卷目錄
醫部彙考一百六十七
頸項門二
方一　曜烈湯　治風都痰醫　疏風滋血湯　升麻防荊湯　加味勝濕湯　養神湯
散附散　木瓜煎飲　羌活勝濕湯　大柱丸　五加皮散　葛根湯　桂枝加葛根湯
湯　大陷胸湯　四逆湯　小柴胡湯　附子湯　桂枝湯　五陽丹　保安肓靈丹　續命湯
丸　奪命丹　勝金丹　一粒金丹　仙方活命飲　敗毒散　瓜瓣飲　消暑飲
風散　續斷接骨丸　蒲黃連翹湯　連翹飲子　五香散　連翹飲　獨活散　消腫金漿
湯　益氣養榮湯　夏枯草湯　神效蟲散　羚羊散　針頭散　疏瘕丸　連翹散　堅潰湯　升陽
調經湯　散腫潰堅湯　枚苦勝靈丹　湯　柴胡消腫湯　太乙膏
蚊蚊散　玉燭散　羌活連翹湯　防風羌活湯　楊氏家藏方　聶氏三聖丸　保命連翹散
白花蛇散　小犀角丸　立效散　雄雞散　酒仙無比丸　射干連翹湯
羅鴻散　茵芋散　枳殼丸　內消丸　必效散　內消連翹
丸　玉屑妙靈散　二丁神散　薄荷丹　祛風聖散　海藻丸　槟榔散　四物
丸　絳宮丸　又方　水紅花散　又方　又方　破結散

方一

曜烈湯 會編

治風寒頸項強痛

麻黃去節　桂枝　杏仁　甘草　防風　羌活
獨活　川芎　藁本　柴胡　家葛　白芷　升麻

右生薑薄荷水煎服又方多加紫金藤

消風都痰湯

治前證

黃芩酒炒　羌活　紅花　半夏薑製　陳皮
白茯苓　甘草　獨活　防風　白芷　家葛
柴胡　升麻

右生薑煎服又方多加紫金藤

疏風滋血湯

治前證兼血不和者

當歸　川芎　白芍藥　熟地黃　羌活　獨活
紅花　牛膝　防風　香白芷　家葛　川升麻
甘草　柴胡　桃仁

右生薑煎服又方多加紫金藤

升麻防荊湯

治前證屬風熱者

柴胡　黃芩　半夏薑製　甘草　防風　羌活
荊芥穗　獨活　家葛　升麻　赤芍藥　川芎
白芷

右生薑薄荷煎服無汗加麻黃有汗加桂枝

加味勝濕湯

治前證屬風濕者

羌活　獨活　藁本　防風　蔓荊子　川芎
蒼木泔浸炒　黃蘗酒炒　荊芥　甘草炙

右生薑煎服又方多加紫金藤

發熱惡寒有外邪者加麻黃桂枝

腰痛沉沉者加熟附防己

虛極者去黃蘗加人參

養神湯 東垣

治前證氣虛而火盛者

黃芪炙　橘皮各一錢　黃芩酒浸二分　人參
川芎　白朮土炒各三分　柴胡　升麻各四錢
當歸身　蒼朮　麥芽　黃連各五分　半夏製
甘草各七分　木香　黃蘗各一分

咬咀每服五錢水二盞煎去查稍熱服無時

椒附散 本事方 同

治頸筋痛連背髀不可轉移

大附子一枚炮去皮臍末之

右末每二大錢好川椒二十粒用白麵填滿水一盞半生薑七片同煎至七分去椒入鹽空心服予一親患此服諸藥無效嘗憶千金髓有腎氣攻背強一證處此方與之一服瘥

木瓜煎

治前證

木瓜兩箇去瓤　沒藥研二兩　乳香研二錢半

二味內木瓜中盖合竹簽簽定飯上蒸三四次研成膏每服三五匙地黃酒化下生地黃汁半盞和無灰酒二盞用八分一盞煖化服

同首散

治頸項強急筋急或挫枕轉項不得者

烏藥　橘紅各二錢　麻黃去節　川芎　白芷
桔梗　枳殼炒各一錢　殭蠶炒去絲嘴　炮薑
甘草炙　羌活　獨活　木瓜 右加蒼朮水煎服

羌活勝濕湯 東垣

治太陽經中寒濕項強或似拔不得回顧

羌活　獨活各二錢　川芎　蔓荊子各五分

藥本　防風　甘草各一錢

右剉作一貼水煎服

天柱丸（得效方下同）

治項軟

蛇舍石一大塊火煅酢淬七次　鬱金末少許

右研細入麝香少許飯丸芡實大每一丸荊芥湯入薑汁二三點化下

五加皮散

治同上

五加皮不拘多少

右爲末酒調數項骨上乾則易濕者

葛根湯（仲景下同）

治項强無汗惡風爲表實者

葛根四兩　麻黃去節　桂心　生薑切各三兩　芍藥　甘草炙各二兩　大棗十二枚

右七味㕮咀以水一斗先煮葛根減二升去沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須餛粥餘如桂枝法

大陷胸湯

治誤下太陰結胸項强

大黃六兩　芒硝一兩　甘遂一錢

右以水六升先煮大黃取二升去滓內芒硝一兩煮沸內甘遂末溫服一升得快利止後服

四逆湯

治前證寒實甚者

甘草炙二兩　附子一枚生用去皮破成八片　乾薑一兩半

右三味㕮咀以水三升煮取一升二合去滓分溫再服强人可用大附子一枚乾薑三兩凉服

小柴胡湯

治項强脇下滿身熱惡風手足汗而渴者

柴胡半斤　黃芩　人參　甘草　生薑切各三兩　半夏半升洗　大棗十二枚劈

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

附子湯

治陰毒項背强

附子一枚炮去皮臍　茯苓　芍藥各一兩五錢　人參一兩　白朮二兩

右以水四升煮取一升半去滓溫服半升日三服

桂枝湯

治傷寒汗出惡風頭痛項强脈浮緩者

桂枝　芍藥　生薑各三兩　甘草炙二兩　大棗十二枚擘

水煎熱服須臾歠稀粥以助藥力溫覆取微汗不可令如水淋漓病差停後服病仍在者更作服

正陽丹（寶鑑）

治前證

葱葱四五枝　陳蜂房四五箇燒存性爲細末

右用葱葱搗和丸如彈子大手心內握定用手帕緊紮須臾汗出以綿被覆益如手心熱甚休教解開如服藥先服升麻湯五錢連鬚葱三枝生薑三片水二大盞煎至一盞去滓溫服被覆取汗則愈

保安萬靈丹（準繩下同）

發散一切癰疽瘰癧內蘊之毒

全蠍　石斛　明天麻　當歸　甘草炙　川芎　羌活　荊芥穗　防風　麻黃去節　北細辛　川烏湯泡去皮　草烏湯泡去皮尖　何首烏各一兩　明雄黃六錢　茅朮八兩

右爲細末煉蜜丸彈子大每藥一兩分作四丸一兩作六丸一兩作九丸三等做下以備年歲老壯病勢緩急取用預用硃砂六錢研細爲衣磁罐收貯用時以連鬚大葱白九枝煎湯一茶鍾將藥一丸乘熱化開通口服盡被益出汗爲效如服後汗遲再用葱白湯催之後必汗如淋洗漸漸退下覆益衣物其汗自收自斂患者自然爽快其病如失但病未成者隨卽消去已成者隨卽高腫潰膿如諸病無表證相兼不必發散者只用熱酒化服

蟾酥丸

治前證

蟾酥二錢酒化　輕粉五分　枯礬　寒水石煅　銅綠　滴乳香　明沒藥　膽礬　麝香各一錢　雄黃　硃砂各一錢　蝸牛二十一箇

以上各爲末秤準於端午日午時在淨室中先將

蝸牛研爛再同蟾酥和研稠粘方入各藥共搗極勻丸如菜豆大每服三丸用葱白五寸患者自嚼爛吐於男左女右手心包藥在內用無灰熱酒一茶杯送下彼益如人行五六里出汗爲效甚者再進一服修合時婦人雞犬等忌見

奪命丹

治前證

蟾酥　輕粉各五分　硃砂研飛三錢　白礬枯　寒水石　銅綠各一錢　蝸牛三十一粒另研　乳香　沒藥　麝香各一錢

右件爲細末將蝸牛另研一處用好酒糊爲丸菜豆大每服一丸生葱三五莖嚼極爛吐於手心包藥在內熱酒和葱送下如重車行五七里汗出爲效重者再服一二丸

勝金丹

治前證

麝香　白礬製各五分　眞蟾酥一錢　明雄黃　辰砂研飛　乳香　沒藥　血竭各一錢五分　全蝎泡炙　天龍去頭足炙　穿山甲各三錢　殭蠶炙去絲嘴五錢

右爲細末和勻每服三分赤砂糖調葱頭酒送下取汗爲度

一粒金丹

治前證

沉香　木香　乳香各五分　巴豆霜一錢五分　各爲細末照秤分數和勻用黑犯棗箇半去皮搗爛爲丸如芡實大每服一丸量人虛實先呷水一口行一次胃氣壯實者只可呷水三四口不可太過後用水一口送藥下行盡數次以米飲補之

仙方活命飲

又名眞人活命飲治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者卽潰又止痛消毒之聖藥也

滴乳香研　防風　白芷　川貝母　赤芍藥　歸尾　明沒藥研　皂角刺炒　花粉　甘草節　穿山甲炮各一錢　陳皮　金銀花各三錢

右爲粗末大者四兩小者二兩作一劑無灰酒十茶鍾瘡小五茶鍾入有嘴瓶內以厚紙封口勿令泄氣煎至三大鍾去滓作三次服接連不斷隨瘡上下服能飲酒者服藥後再飲三五杯此藥並無酒氣不動臟腑不傷氣血忌酸薄酒鐵器服後側睡覺痛定囘生神功浩大不可臆度

敗毒流氣飲（瘡瘍全書下同）

治項疽毒

小柴胡　紫蘇葉　桔梗　甘草　川芎　青皮　白芍藥　枳殼炒　防風　羌活　白芷　當歸　連翹　獨活

右㕮咀薑三片棗一枚水煎服

內托流氣飲

治前證

人參　黃芪　紫蘇葉　紫厚朴　甘草　桔梗　官桂　枳殼　檳榔　白芍藥　烏藥　當歸　防風　白芷　川芎　柴胡

右服法如前婦人加香附夏天去官桂加麥冬

清暑疏風散

治風毒頸癰

羌活　防風　荊芥穗　升麻　生甘草　乾葛　蒼朮　紫厚朴　川芎　當歸　白芍藥　獨活　白芷　桔梗　紫蘇葉　薄荷　大柴胡　薄桂　枳殼　蔓荊子　木香　藁本

水二鍾薑七片葱白三根濃煎熱服隨飲好酒以助藥力以衣覆患上出汗爲要次用圍藥并服千金托裏散加疏風清暑之劑

瘰癧痰核圍藥

昆布一兩　南星五錢　麝香五分　冰片二分

爲末用好酢薑汁蜜少許調勻搽四向空一孔乾再用餘汁潤之一方加田螺殼煅存性三錢白芨末五倍于末各二錢

海藻連翹湯

治前證

白茯苓　陳皮去白　連翹　半夏薑製　柴胡　黃芩酒炒　黃連酒炒　南星薑製　牛蒡子炒　三稜酒炒　莪茂酒炒　殭蠶炒去絲　夏枯草　昆布　海藻　羌活　防風　桔梗　川芎　升麻

右生薑薄荷煎食後服

連翹丸

治前證

連翹　防風　黃蘗　桂心　桑白皮　香豉　獨活　泰艽　牡丹皮各半兩　海藻二錢半

右爲末煉蜜丸如菜豆大每服十丸磨心湯下

五香散

治惡核腫硬不消瘰癧風毒腫氣

木香　雞舌香　沉香各一兩　麝香研二錢半　射干　藿陸香　乾葛剉　升麻　獨活　連翹　桑寄生　甘草生各二兩　大黃三兩剉碎微炒　右剉碎入麝香研勻每服三錢水一中盞煎至五分去滓入竹瀝半盞更煎一二沸溫服日三

連翹散

治項上惡核腫

連翹　射干　獨活　川升麻　木香　沉香　木通剉各一兩　桑寄生　丁香各半兩　川大黃二兩剉碎微炒　右爲細末每服二錢清粥飲調下日三服

獨活散

治惡核風結腫毒四肢煩熱拘急

獨活　木香　射干　桑寄生　連翹　升麻　沉香　大黃生　甘草生各一兩　右剉碎每四錢水一中盞煎至六分去滓入竹瀝半合更煎一二沸放溫服日三得快爲度

清肝益榮湯

治肝膽小腸經風熱血燥筋攣結核或耳項胷乳脅肋作痛或作瘡子并一切肝火之證

山梔　當歸　木瓜不犯鐵器　茯苓各一錢　柴胡　川芎　芍藥炒各七分　熟地黃一錢半　白朮二錢　龍膽草八分　炙甘草五分　右薑水煎服

益氣養榮湯

治抑鬱及勞傷氣血頸項或四肢腫硬或軟而不赤不痛日晡微熱或潰而不斂並治之

人參一錢　白朮炒二錢　茯苓　陳皮　貝母　香附子　當歸酒拌　川芎　黃芪鹽水拌炒熟地黃酒蒸　芍藥炒　桔梗　甘草炒各一錢　作一劑薑三片用水二鍾煎至八分食遠服

胃痞人參熟地各減三分

口乾加五味子麥門冬

往來寒熱加軟柴胡地骨皮

膿清加人參黃芪

膿多加川芎當歸

膿不止加黃芪當歸

肌肉遲生加白蘞官桂

夏枯草湯

治瘰癧馬刀不問已潰未潰或日久或漏皆用

夏枯草六兩　水二鍾煎至七分去柤食遠服此生血治瘰癧之聖藥蕞甚當濃煎膏服并塗患處多服益善兼十全大補湯加香附子貝母遠志尤善

神效蠲散

治瘰癧服散堅丸及養血氣藥不應者宜用此藥更兼服養血氣藥

蟾蜍二十一箇去頭足翅同糯米炒去米　荊芥　直殭蠶炒各二錢　黑牽牛炒一錢　右各爲末和勻每服一錢五更溫酒調下日午惡物從小便中下如小便澀或痛宜以葱茶湯或木通湯卽下更吃米粥補之不下次日五更再服必以下爲度若脈牢牆或洪大無力者不可服

時效針頭散

追蝕惡瘡瘜肉

赤石脂一兩　乳香　白丁香各二錢　砒生用　黃丹各一錢　輕粉　麝香　蜈蚣一條焙　爲細末摻於瘜肉上或瘡口小就摻瘡口上肉自去更以膏藥貼之肉亦去膏用砒末二錢以白礬末二錢和勻同飛過用礬一錢合藥亦效但不及生砒之功速耳

琥珀膏

治瘰癧腫硬或穿破膿水不絕經久不癒致成瘻疾及癰疽並貼之更服益氣養榮等湯

琥珀　丁香　木香各三錢　桂心半兩　白芷　硃砂細研　當歸　防風去蘆　木鼈子去殼　木通各半兩　黃丹七兩　柳枝三兩　松脂二兩　內除琥珀丁香桂心硃砂木香爲細末餘藥剉咀以麻油一斤二兩浸五日入鍋中以慢火熬候白芷焦色濾去查下松脂末及黃丹以柳枝不住手攪滴水中試軟硬如軟再煎得中方入琥珀等末攪勻用磁器盛貯用時旋攤

連翹散堅湯（原缺下同）

治耳下至缺盆或至肩上生瘡堅硬如石動之無根者名馬刀瘡從手足少陽經中來也或生兩脅或已流膿作瘡或未破並皆治之

當歸酒洗　生黃芩　連翹　廣藿茂酒洗微炒　三稜酒洗微炒各半兩　土瓜根酒炒　草龍膽酒洗各一兩　柴胡根一兩二錢　酒炒黃芩七錢　炙甘草六錢　酒黃連　蒼朮各三錢　芍藥二錢　右以一半爲細末煉蜜爲丸如菉豆大每服一百

丸或一百五十丸一半咬咀每服半兩水一盞八分先浸半日煎去查熱服臨臥頭低脚高去枕臥每口作十次嚥畱一口送丸服畢如常安臥

升陽調經湯

治瘰癧遶頸或至頰車此證足陽明胃經中來也若其瘡深遠隱曲肉低是足少陰腎中來也是戊土傳癸水夫傳妻俱作塊子堅硬大小不等並皆治之或作丸服亦得

升麻八錢　葛根　草龍膽酒製　黃芩酒製　廣茂酒洗炒　京三稜酒洗炒　炙甘草　連翹　黃連酒洗　桔梗各五錢　生黃芩四錢　歸梢芍藥各三錢　黃蘗酒洗二錢　知母酒洗炒一兩

右秤一半作丸煉蜜丸如菜豆大每服一百丸或一百五十丸一半咬咀每服半兩若能食大便硬可旋加至七八錢止水二盞先浸半日煎至一盞去滓熱服臥身脚在高處去枕頭嚥一口作十次嚥之畱一口在後送下丸子服藥畢臥如常此治法也

散腫潰堅湯

治馬刀瘡結硬如石在耳下至缺盆或至肩上或至脅下皆手足少陽經中及瘰癧遍下頰或至頰車堅而不潰在足陽明經中所出或已破及流膿水並皆治之服藥多少臨病斟酌量病人飲食多少大便硬軟以意消息之

柴胡梢四錢　草龍膽酒炒　黃蘗去粗皮酒炒　知母炒　花粉酒洗　昆布去土　桔梗各半兩　甘草梢炙　京三稜酒炒　廣茂酒洗炒　連翹　黃連各二錢　升麻六錢　黃芩梢八錢一半酒洗炒一半生用

右咬咀每服六錢或七錢水二盞先浸半日煎至一盞去查稍熱服於臥處伸脚在高處頭微低每嚥一口作十次嚥至服畢依常安臥取藥在胃中停畱故也另攢半料作細末煉蜜爲丸如菜豆大每服一百丸此湯留一口送下更加海藻半兩炒食後量虛實加減多少服皆倣此例一方有當歸白芍各二錢若蜜丸即名散腫潰堅丸

敕苦勝靈丹湯

治馬刀挾癭者從耳下或耳後下至頸至肩上或入缺盆中者乃手足少陽經之分野受心脾之邪而作也今將二證合治之

黃芪一錢護皮毛實腠理及活血又實表補元氣乃瘡家之聖藥也　人參三分補肺氣如氣短及不調而喘者加之　眞漏蘆半錢勿以白頭翁代之

升麻一錢　葛根半錢此二味俱足陽明本經藥

甘草半錢能調中和諸藥瀉火益胃　連翹一錢此味乃十二經瘡中之藥不可無者能散血結氣聚此瘡家之神藥也　丹皮二分去腸胃中畱滯宿血

熟地黃三分此三味諸經中和血生血凉血藥也當歸身三分　生地黃三分　白芍藥三分如夏月倍之其味酸其氣寒能補中益氣治腹痛如冬月寒證勿用　肉桂三分大辛熱能散結聚如陰證瘡瘍少用之此寒因熱用之意又爲陰寒覆蓋其瘡用大辛熱去之煩躁者勿用之　柴胡功同連翹如瘡不在少陽經勿用　鼠黏子三分無腫不用　京三稜炮二分　昆布二分味鹹若瘡堅硬甚者用之鹹能軟堅也　廣茂三分此二味瘡堅硬甚者用之不硬者勿用　羌活　獨活　防風各一錢三味必關手足太陽證脊痛項强不可回顧腰似折項似拔者防風辛溫如瘡在腦上難無手足太陽經證亦當用之爲能散結去上部風邪故也　神麴炒二分食不消化者用之　益智仁二分如唾多者胃不和也或吐沫吐食胃中寒者加之無則勿用　麥芽一錢消食健脾　黃蘗炒三分如有熱或腿脚無力加之如煩躁欲去衣者此胃中伏火也更宜加之　黃連炒三分治煩悶　厚朴薑製一錢二分如腹脹加之

右共爲細末湯浸蒸餅捏作餅子曬乾搗如米粒大每服二錢白湯下如氣不順加橘紅甚者加木香少許量病人虛實消息之毋令藥多妨其飲食此治之大法也

如止在陽明分者去柴胡鼠黏子二味餘皆用之

如在少陽分爲馬刀挾癭去獨活漏蘆升麻葛根加瞿麥三分

如本人氣素弱其病勢來時氣盛而不短促者宜作氣盛而從病變治之權也加黃芩黃連黃蘗知母防己視邪氣在上中下而用之假令在上焦加黃芩半酒洗半生用在中焦加黃連半酒洗半生在下焦加酒製黃蘗知母防己之類選而用之

如大便不通而邪盛者加酒製大黃以利之

如血燥而大便乾燥者加桃仁泥大黃

如風結燥不行者加麻仁大黃以潤之

如風盪而大便不行加煨皂角仁大黃秦艽以利

之

如脈濕覺身有氣濕而大便不通者加榔李仁大黃以除風燥

如陰寒證爲寒結祕而大便不通者以局方半硫丸或加炮附子乾薑煎候冰冷服之大抵用藥之法不惟瘡瘍凡諸疾病氣素怯弱者當去苦寒之劑多加人參黃芪甘草之類以瀉火而補元氣餘皆倣此

柴胡通經湯

治小兒項側有瘡堅而不潰名曰馬刀亦治瘰癧

柴胡　歸尾　生甘草　連翹　黃芩　牛蒡子

三稜　桔梗各一錢半　黃連一錢　紅花少許

右作一劑水二鍾煎至一鍾食後服此是攻裏內消之劑

柴胡連翹湯

治男子婦人馬刀瘡

柴胡　連翹　知母酒製　黃芩炒各半兩　黃蘗

酒製　生地　甘草炙各三錢　當歸尾一錢半

桂三分　牛蒡子二錢　瞿麥穗六錢

右剉如麻豆大每服三錢或五錢水二大盞煎至一盞去滓食後稍熱時時服之

消腫湯

治馬刀瘡

柴胡　黃蘗　黃芩生用各二錢　紅花少許

黃連　牛蒡子炒各半錢　黃芪　花粉各錢半

連翹　當歸尾　甘草各一錢

右㕮咀每服半兩水二大盞煎至一盞去滓食後稍熱服忌酒濕麪

太乙膏

治癧子瘡神效

沒藥四錢　清油一斤　黃丹五兩　麝香三錢

輕粉　乳香各二錢　腦子研一錢

右以清油黃丹熬成膏用柳枝攪又用憨葱七枝旋加下葱盡爲度下火不住手攪至滴水不散却入乳沒腦麝輕粉等味攪勻磁器內盛用

尅效散

治前證

蟹螯四十九箇不去翅足炒　粳米四十九粒

赤小豆四十九粒　官桂　硇砂各半錢

右五味研爲細末初服一字次服二字次服三字又次服四字煎樟柳根湯送下空心服以小便淋瀝併作濇爲效惡心嘔吐黃水無妨其瘰癧自日消矣

玉燭散

消瘰癧和血通經

當歸　芍藥　大黃　甘草　熟地黃　芒硝

黃芩　川芎各等分

右爲粗末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去查溫服日進一服七八日效

羌活連翹湯

治瘰癧初發寒熱腫痛

防風　羌活　連翹　夏枯草　柴胡　昆布洗

枳殼　黃芩酒炒　川芎　生牛蒡子　生甘草

金銀花

右薄荷水煎服次以追毒散行之以化堅湯消之大效

防風羌活湯

治瘰癧發熱者

防風　羌活　連翹　升麻　夏枯草　牛蒡子

川芎　黃芩酒浸　甘草　昆布洗　海藻洗

殭蠶

右薄荷水煎服虛者加人參當歸實者加黃連大黃

楊氏家藏方

治瘰癧

蟹螯二十八箇去頭翅足用大米炒一荊芥穗

白殭蠶　黑牽牛各二錢

右爲末臨臥時先將滑石末一錢用米飲調服夜半時又一服五更初却用溫酒調藥一錢或二三錢量強弱用服訖如小便無惡物行次日早再進一服又不行第三日五更初先進白糯米稀粥湯再進前藥一服更以燈心湯下調琥珀末一錢重服以小便內利去惡毒爲愈如小便痛用青黛一錢以甘草湯調送下即止

嚴氏三聖丸

治瘰癧

丁香五十粒　蟹螯十箇　麝香另研一錢

右爲末用鹽豉五十粒湯浸研爛如泥和前藥令勻丸如菉豆大每服五七丸食前溫酒送下日進三服五七日外覺小便淋漓是藥之效或便下如青筋膜之狀是病之根也忌濕麪毒食

保命連翹湯

連翹　瞿麥各一斤　大黃三兩　甘草二兩

右剉每服一兩水二椀煎至一盞半早食後巳時服服藥十餘日後可於臨泣穴灸二七壯服藥不可住至六十日方效一方加大黃木通貝母一作知母各五兩雄黃七分檳榔半兩減甘草不用同前藥爲細末熱水調下三五錢

必勝丸三四方

治瘰癧不拘年深月近及腦後兩邊有小結塊連復數箇兼勞腹內有塊

鯽魚一箇去腸并子　雄黃一塊雞子大　硇砂一錢巳上二味並入在鯽魚腹內仰安魚於炭火上燒煙盡　蜈蚣全者一條　蓬茂半兩　梔子五枚　皂角二挺四味並燒存性　蓖麻子五箇去皮燈火上燒　黃明膠三文

右爲末另用皂角二挺去皮搥碎以水三椀揉去滓煑精羊肉四兩爛軟入輕粉五釐男子乳汁半兩同研成膏和藥末丸如菉豆大硃砂爲衣溫酒清晨下十丸一服至晚看肉疙瘩子若項有五箇則以五服藥取之視其所生多少以爲服數既可更進數服

白花蛇散

治久漏瘰癧發於項腋間憎寒發熱或痛或不痛

白花蛇酒浸去皮骨焙乾二兩　犀角屑　青皮　黑牽牛半生半炒各半兩

右爲末每服二錢加臘粉半錢研勻五更糯米飲調下巳時利下惡物乃瘡之根也更候十餘日再進一服忌發風壅熱物如巳成瘡一月可效神驗

小犀角丸

常服除去根本截其源流效應如神諸癧並宜服之

犀角　青皮　黑牽牛半生半炒　陳皮各一兩　連翹半兩

右爲細末用皂角二挺去皮弦子泡搥以布絞取汁一椀許又用新薄荷二斤研取汁同熬成膏以前藥末爲丸如桐子大每服三十丸連翹煎湯食後服間以薄荷茶湯服

立應散

治瘰癧神效巳破未破皆可服

川烏尖七箇　連翹　赤芍藥　當歸　甘草炙　川芎　滑石研各半兩　黃芩　白牽牛生取末　土蜂房蜜水洗飯上蒸日乾各二錢半　地膽去頭翅足拌米炒米黃爲度去米秤三錢

右爲細末每服抄一大錢匕濃煎木通湯調下臨臥服毒根從小便中出澀痛不妨毒根如粉片塊血爛肉是也如未效再服繼以薄荷丹解其風熱且地膽性帶毒濟以烏尖或衝上痲悶不能强制嚼葱白一寸茶清下以解之如小便澀燈心湯調服五苓散瘡處用好膏藥貼若癰疽用此宣導惡毒本方去黃芩不用

雌雄散

治瘰癧

蟹螯一雌一雄足翅全者新瓦焙焦去頭翅足　貫衆二錢　鶴蝨　甘草

右爲細末作兩服飽飯後好茶濃點一盞調下

遇仙無比丸

專治瘰癧

白朮　檳榔　防風　黑牽牛半生半炒取頭末　蜜陀僧　蟹螯去翅足用糯米同炒去米不用　榔李仁湯泡去皮　甘草各五錢

右爲細末蒸糊爲丸如梧子大每服二十丸早晚煎甘草檳榔湯送下服至一月覺腹中微痛於小便中取下癧子毒物有如魚目狀巳破者自合未破者自消

射干連翹湯

治瘰癧寒熱

射干　連翹　元參　赤芍藥　木香　前胡　川升麻　山梔仁　當歸身　甘草炙各二兩　大黃炒一兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分去查入芒硝少許食後溫服日再服

苦蔞子散

治瘰癧初腫疼痛寒熱四肢不寧

蔞仁　連翹　何首烏　皂角仁　牛蒡子微炒　大黃微炒　白螺殼　梔子　漏蘆　牽牛微炒　甘草生各一兩

右爲細末每服二錢匕食後溫酒調下

枳殼丸

治瘡疽癰腫瘰癧

枳殼去瓤麩炒　牽牛微炒取頭末　廣木香　青皮各一兩　甘草　大黃

右爲細末用皂角長一尺者三挺約三兩炮煎椎碎以好酒煮軟挼取汁熬膏稠黏和前藥末爲丸如梧桐子大每服三五十丸食後葱茶下日進二服

內消丸

治癭腫初生及瘰癧結核熱毒鬱滯服之內消大效

青皮　陳皮各二兩　牽牛八兩取頭末二兩　薄荷八兩　皂角八兩不蛀者去粗皮椎碎以冷水一斗煮令極軟揉汁去滓熬成膏

右將青皮陳皮并牽牛末和勻用皂角膏子和丸如菉豆大每服三十丸食後荊芥茶清溫水皆可下

必效散

治瘰癧氣血雖無虧損內有癆核未去而不能愈

南硼砂二錢半　輕粉一錢　巴豆五粒去心膜白槟榔一箇　蜣螂十四枚去足翅同糯米炒麝香五分

右同研極細末取雞子二箇去黃用清調藥仍入殼內以濕紙數重糊口入飯甑候熟取出曬乾研末虛者每服半錢實者一錢用煨生薑酒五更初調服如覺小腹痛用益元散一服其毒俱從大便出胎婦勿餌毒去後多服益氣養榮湯瘡口自合精要云治瘰癧用必效散與瓜蔞散相間服神效致有不問虛實槩用必效散者殊不知蜣螂性猛有大毒利水破血大損元氣若實者用此劫之而後繼以補劑或可愈若虛而用此或用追蝕之劑瘀肉雖去而瘡口不合反致不救

雞鳴散

治氣瘰疼痛及熱毒結核或多煩悶惡熱而不寒者

牽牛一兩　大黃蒸二錢　砒硝煉成粉二錢　胡粉一錢

右爲細末每服三錢雞鳴時井華水調服以利爲度如未利再服

法製靈雞彈

治瘰癧馬刀腋下生者

蜣螂七箇去頭翅足

右將雞子一箇頂上敲開些小入藥在內紙封固了於飯上蒸熟取出去殼切開去藥五更空心和米飯嚼服候小便通如米泔水狀如脂即驗也如大便小便不通却服琥珀散二三貼催之然須常服二藥尤佳

妙靈散

服前藥後却將此散與連翹丸相間常服愈方止

木香三錢　沉香二錢　牛膝　何首烏　當歸　海螵蛸　桑寄生各一兩　海藻二兩　海帶　青葙子　昆布　甘草節各半兩

右爲末每服二三錢食後溫酒調下

內消連翹丸

治前證

連翹三兩　漏蘆　胡桃仁　夏枯草　土瓜根　射干　澤蘭　沙參　白芨各一兩半

右爲末入胡桃仁研勻酒糊爲丸如桐子大每服三五十丸空心食前鹽酒下

玉屑妙靈散

治前證

滑石細研爲粉

右每服一錢煎川木通湯調下

二丁神散

治前證

苦丁香六枚一作五分　白丁香　白殭蠶炒去絲嘴各一錢　苦參末五分　赤小豆　磨刀泥青石者佳一名寇泉砂　大蜣螂七箇去頭足炒

右六味共爲細末每服一錢空心無灰酒調下

薄荷丹

解瘰癧風熱之毒自小便去宣毒後須常服

杜薄荷葉　豬牙皂角不蛀者去弦皮子　連翹　何首烏米泔浸　蔓荊子　三稜煨　荊芥各一兩

右爲末好豉二兩半以米醋煎沸漉豉醃令軟研如糊和丸桐子大每服三十丸食後熟水下日一服病雖愈常服之

四聖散

治瘰癧服白花蛇散轉利後服此藥調之永去其根

海藻洗　石決明煨　羌活　瞿麥穗各等分

右件共爲細末每服二錢用米湯調下清水盡爲度

瞿麥飲子

治瘰癧馬刀

瞿麥穗半斤　連翹一斤

右爲粗末水煎臨臥服此藥經效多不能速驗宜待歲月之久除也

海菜丸

治瘰癧生於頸項交接名蛇盤瘰宜早治之

海藻菜蕎麥炒　白殭蠶微炒去絲嘴

右等分爲細末海藻菜旋炒研篩湯泡白梅取肉減半用所泡湯爲丸如梧子大每服六七十丸食後臨臥米飲送下其毒自大便內泄出若與淡菜連服爲妙蓋淡菜生於海藻上亦治此病忌豆腐雞羊酒麵日五六服

檳榔散

治氣毒瘰癧心膈壅悶不下飲食

檳榔　前胡去蘆　赤茯苓　牛蒡子炒各一兩　人參　枳殼去瓤炒　沉香　防風去蘆各半兩　甘草炙二錢半

右剉碎每服四錢以水一盞入生薑半分煎至六分去粗空心及晚食前溫服

祛風丸

一名何首烏丸治風毒瘰癧

何首烏蒸　薄荷葉　元參各四兩爲末　精羊肉半斤　皂角三十挺用十挺火燒欲過十挺酥炙去皮十挺水揾取汁去滓

右以皂角水煮肉使爛細研和藥爲丸如梧桐子大每服二十九空心溫酒或薄荷湯送下一方無羊肉蜜丸每服三四十丸名皂角煎丸

絳宮丸

治前證

山楂　連翹　川芎　當歸酒洗　麥芽　桃仁　蘆薈　甘草生　蒺藜子各一兩　川黃連酒浸　南星酒浸　海藻酒洗各一兩半　升麻　羌活　桔梗　防風　黃芩酒炒各半兩　大黃酒蒸　白朮各二兩

右爲末用神麴糊爲丸已破加人參一兩煎膏用甘草節殭蠶同煎下

又方

治瘰癧結核

黃芪七分　元參八分　苦參　牛蒡子各九分　枳實炒　大黃　羚羊角屑　麥冬去心各五分　連翹　人參　青木香　蒼耳子　升麻　茯苓　甘草炙　桂心　硝石各四分

右爲細末煉蜜和丸如梧子大以酒下十九日夜三四漸加至二三十九以知爲度忌生冷豬肉海藻菘菜生葱酢蒜陳臭等物

水紅花散

治瘰癧腫核結硬不消及膿汁旁穿不瘥

水紅花不拘多少一半炒一半生用

右粗搗篩每服二錢水一盞煎七分去滓溫服食後臥日三好酒調亦可

又方

治前證

牡蠣不以多少用灰深培上以炭三斤煅火盡取半斤爲細末　甘草末二兩

右研勻每服二錢食遠以建茗同點日二服忌魚酒酢醬油鹽海味等物

又方

治頸上塊動者

夏枯草六錢　甘草一錢

右爲末和勻每服一錢至二錢茶清調下食後

又方本事方

治風癧

土附子一枚　食鹽二斤

右二味用小便五升同浸半月取出將附子去黑皮陰乾爲末用黑豆爛煮研爲膏丸附子末如梧子大每服十九酒吞下早晚二服

破結散本事方

治石癭氣癭血癭肉癭馬刀瘰癧等證

海藻酒洗淨　龍膽草酒洗　海蛤粉　遠志　貝母　白礬枯　昆布酒洗淨　松蘿各三錢　麥麵炒四錢　半夏麴二錢

右爲細末每服二錢熱酒調食後忌甘草鯉魚雞肉五辛生果一方去松蘿加眞桑寄生一倍尤效

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百八十八卷目錄
醫部彙考一百六十八
頸項門三
方二 癭瘤方 補陰八珍湯 托裏救苦神應丸 化氣調經湯 追毒神異湯 金寶齊 綠雲膏 烏龍膏 蟾酥丸 金蟬脫殼 蜈蚣散 奇效散 蜈蚣散 又方 又方 三品旋子 三才錄雲錠子 天子 人才 附餅 荔枝膏 蜂房膏 蟾酥丸 洗方 治瘰癧丸 治瘰癧膏 虎青 十香膏 六君子湯 四物湯 當歸補膏丸 飲生地黃丸 逍遙散 補中益氣湯 仁丸 脫萼丸 托裏養榮湯
單方

藝術典第一百八十八卷
醫部彙考一百六十八
頸項門三
方二
癭瘤方
人參 白朮 當歸 陳皮 芍藥酒浸各一錢
川芎 香附 茯苓 半夏各五分 甘草少許
右作一服薑三片以金銀藤煎湯一鍾半煎前藥食後就吞綠宮丸十粒

補陰八珍湯
治瘰癧等瘡屬足三陰虛者
當歸 川芎 熟地黃 芍藥 人參 白朮
茯苓 甘草 黃蘗酒炒黑 知母酒炒各七分
右水煎服

托裏救苦神應丸
治流注癰
川烏去皮臍生 當歸酒浸一宿 沒藥 白芷
陳皮 甘草節各一兩 烏頭五兩 黃蠟兩半
蟬蛻水洗半兩 大皂角七挺去皮弦子
右用皂角敲碎水四大椀煎至二大椀濾去渣用
汁同爨川烏烏頭候川烏烏頭爛爲度擂如泥其
餘諸藥却另爲末和烏頭泥爲丸如桐子大每服
六十丸儻飽皆用薄荷湯下若瘡既破穿鑿孔穴
其處必生腫肉如指大或黑或白乃風與氣搏宜
驅風行滯散氣之劑以化氣調經湯主之

化氣調經湯
與神應丸間服治流注癰
香附子酒浸一宿日乾 羌活 白芷各一兩
牡蠣火煅 甘草 天花粉 皂角刺各半兩
橘皮二兩
右爲細末每服二錢用白湯不拘時調下日三次
如脈有力者先用追毒神異湯下之却服救苦神
應丸

追毒神異湯
治前證
辰砂 血竭各一錢 麝香一字其研細 大黃
大甘草節各半兩
右大黃甘草二味改咀河水一鍾煎至半鍾調前
末臨臥服之

蟾酥膏
治重臺癰
蟾酥如大豆許 白丁香十五粒 寒水石些少
巴豆五粒 寒食麪些少
右各另研和作一處再研煉蜜爲丸如菉豆大每
用一丸或二三丸納入針竅中如膿未盡再用數
丸以膿盡爲度

綠雲膏
治前證
黃連 大黃 黃芩 黃蘗 木鼈子去殼 元參
各一錢
右細切用香油一兩同煎焦色去藥入淨松香五
兩再煎成膏濾入水中拔令金色入銹再熬放溫
入後藥
猪膽汁三枚 銅綠二錢醋浸一宿綿濾去粗
右用竹篦帶溫攪勻然後如常攤貼瘡治瘡口不
乾加乳香沒藥輕粉尤妙

金寶齊
去腐肉朽肉不傷良肉新肉
桑柴灰五椀用沸湯十椀淋汁先以草紙一層皮紙
二層放籮底次置灰於上淋之 穿山甲二兩煅
信砒一錢 杏仁七粒去皮尖同信砒山甲研細
生地黃二兩搗取汁 辰砂飛一錢 粉霜研
麝香各半錢研

右將灰汁濾清下鍋煎濃下甲末及地黃汁候乾一半下麝香次下粉霜次下辰砂候將成膏下砂石灰末一兩以成塊密貯勿見風每取敷核上

龍珠膏

治前證

龍牙草五兩　棘翼根半兩　海藻二錢五分

蘇木半兩

右細切量水二十椀煎至十二三椀濾去柤又用桑柴灰　石灰　蒼耳草灰各二椀半

以草紙兩層皮紙兩層放籮底次置灰於上用煎湯熱淋取灰汁十椀許澄清入鍋內煎成膏用巴豆霜白丁香石膏麝香輕粉磁罐子收貯取傅核上再傅即去舊藥併靨再上新藥其核即潰而愈根小者但只塗藥於根上其核自潰

蝸牛散三因方

治瘰癧潰與未潰皆可治

蝸牛不拘多少以竹簽穿瓦上曬乾燒存性

右爲末入輕粉少許猪骨髓調用紙花量瘡大小貼之一法以帶殼蝸牛七箇生用取去肉每箇入丁香七粒於殼內燒存性與肉研成膏用紙花貼之

粉金散

治前證

黃蘗　草烏各等分

右爲末蜜調傅之

龍泉散

塗瘰癧

瓦粉　龍泉粉炒（即磨刀石上粉）　京三稜各酒浸炒乾

廣茂　昆布洗去土各半兩

右件同爲極細末煎熟塗之用此去疾尤速

奇效散（孫氏）

治瘰癧馬刀頑惡等瘡

野糞尖乾者一兩　密陀僧　無名異各半兩

皂角　乳香　沒藥各三錢

右糞同鹽泥封固炭火煅之去泥取出同藥五味研爲末入麝香少許用清油調勻浸敷上濕即乾摻其功神效

蝙蝠散

治癧多年不瘥

蝙蝠一箇　猫頭一箇

右同燒作灰撒上黑豆煅其灰骨化碎爲細末濕即乾摻乾則油調傅內服五香連翹湯

螺灰散

大田螺連殼燒存性

右爲細末破者香油調傅

又方

治瘰癧未破百藥不應者累效如神

杏樹葉陰乾爲末五分　人中白煅爲末　蝙蝠火焙乾爲末　白花蛇蛻燒灰存性爲末各二分半

蜜蜂七箇焙爲末

右將杏樹葉末用清水調却入前四件藥末調勻傅患處却將皮紙一片用針刺孔貼藥上如乾用清水就紙上刷之每一晝夜換藥一次如面上發熱服清涼飲子數貼其熱自退

又方

能敗散瘰癧神效

白膠香　海螵蛸　降眞香無土氣者取心用

右等分爲末摻患處外以水紙掩之一夕而退

又方

治已破者

蜜蜂二十一箇　蛇蛻七分半　蜈蚣二條端午前收者

右用香油四兩將三味藥入油內用文武火熬成膏入光粉二兩桑枝七條如筯大者急攪候冷出火氣七晝夜方可用紙攤作膏貼患處

神聖換肌散（孫氏）

去瘰癧頑瘡乃追蝕死肉峻藥非頑急勿用

白殭蠶二錢　白礬一錢五分　蟹蝥去翅足

生砒　草烏頭　青黛各一錢　麝香少許

右研極細末乾摻些少於瘡口內用膏藥護其惡肉化膿水

生肌乾膿散

治瘰癧馬刀膿汁不乾者

黃連　貝母　降眞香燒存性　白芨　海螵蛸

五倍子炒黑　芸香各五錢　輕粉五分

右爲末用藥水洗次摻此末外貼膏藥

三品錠子

上品

治一切痔漏

白礬二兩　白信石一兩零五分　乳香　沒藥各二錢半　雄黃三錢

中品

治五漏六癗氣核瘰癧

白礬二兩　白信石一兩二錢　乳香　沒藥各三錢　雄黃二錢

下品

治瘰癧氣核惡瘡六癗

白礬二兩　白信石一兩五錢　乳香　沒藥各二錢半　雄黃一錢

右三品俱同製度先將信石打碎如豆大置乾鍋內上以礬末益之瓦片益上以炭火煅令烟盡取出候冷爲末用秫米糊爲線挺陰乾隨瘡大小深淺長短臨時裁度先以鐵筒拔毒膏點破次以藥線紐入瘡內膏藥貼之藥線消盡又要換藥三四次年深者五六次其根自腐潰如瘡露在外更用蜜水調搽濕則乾上亦可

紫霞錠子

治瘰癧痔漏惡瘡

信石煅　白礬煅　硇砂各一錢　膽礬　雄黃　硃砂各五分　乳香　沒藥各二分半　麝香片腦各半分

右末糊糊爲錠子如蓖大帶扁些及作藥線隨瘡大小深淺長短臨時裁度先以拔毒膏點破次以藥錠放在瘡口膏藥貼上三日一換藥待肉腐之時藥線插入瘡口膏藥貼上直候腐肉去盡爲度

三才絳雲錠子

治瘰癧痔漏六癗惡瘡

天才

初開瘡口緊峻之藥

白礬煅五錢　雄黃三錢　信石生　硇砂生　硃砂各二錢　膽礬生　乳香　沒藥各一錢半　麝香　片腦各少許

地才

次去死肉緊緩之藥

白礬煅五錢　雄黃三錢　信石煅過　硃砂各二錢　硇砂生　膽礬生　乳香　沒藥各一錢半　兒茶　血竭　輕粉各五分　麝香　片腦各少許

人才

又次生新肌去瘀肉緩慢之藥

白礬煅五錢　雄黃三錢　赤石脂煅　兒茶　硃砂各二錢　硇砂水煮乾　膽礬煅　乳香　沒藥　輕粉　血竭各一錢半　麝香　片腦各少許

右末用秫米糊爲錠子如豆大帶扁些陰乾又作藥線如麻黃樣先用鐵罐膏點癧頭令黑次紐此錠膏藥貼上三日一換藥腐肉不盡出者可更用下品錠子及針頭散取盡腐肉止有膿汁不乾者用生肌乾膿散摻瘡口膏藥貼上如要生肌速用生肌散摻瘡口上膏藥貼之

碧玉錠子

治瘰癧惡瘡

銅青三錢　膽礬煅　白丁香　煅砒　硇砂生　雄黃　硃砂　滴乳香　明沒藥　輕粉各一錢　麝香　片腦各少許

右爲細末糊糊爲錠子如豆大帶扁些及藥線俱陰乾先用拔毒膏點破瘡口上貼膏藥直至腐肉去盡只貼膏藥以肉生滿爲度

又方

治項後側少陽經中疣瘡不辨肉色不問大小及日月深遠或有赤硬腫痛

生山藥一塊去皮　蓖麻子一粒

右研勻攤貼之如神丹溪云山藥補陽氣生者能消腫硬經曰虛之所在邪必湊之留而不去其病爲實非腫硬之謂乎固其氣則留滯自不容不行也

清凉散餅

治前證

山慈姑生　良薑等分

右俱搗爲餅去汁暴之能散去寒熱或止以慈姑磨調酒服大妙此藥大能散瘰如神

香附餅

治瘰癧腫核或風寒襲於經絡結腫或痛

香附子不拘多少

右末酒和爲餅覆患處以熱物熨之未成者內消已成者自潰若風寒濕毒用薑汁作餅

荔枝膏

治瘰癧

荔枝肉一兩　輕粉　麝香　白豆蔻　川芎　砂仁各半錢　全蠍五枚　硃砂　龍骨　血竭　乳香各一錢

右將荔枝肉搗爛軟米飯和爲膏看瘡大小攤貼如有三五箇者止去點爲頭者妙

蜂房膏

治熱毒氣毒結成瘰癧

露蜂房炙　蛇蛻炙　元參　蛇牀子　黃芪剉各三分　杏仁一兩半　亂髮雞子許　鉛丹　蠟各二兩

右先將前五味剉細綿裹用酒少許浸一宿勿令酒多用油半斤內杏仁亂髮煎十五沸待髮消盡即綿濾更下鐺中然後下丹蠟又煎五七沸即瀉出於磁盆中盛取貼瘡上一日一換

鐵筒拔毒膏

治癰疽癤毒瘰癧六疔瘤疔瘡頑癬痔漏痣贅惡瘡腫瘍一切惡核等毒已成者點破膿腐即去未成者自然消散其毒雖不能全消亦得以殺其毒也

蕎麥稭灰　桑柴灰　礦石灰各三椀　炭灰一盞

右將四灰和勻用酒漏一箇將棕帕塞住竅用水三十椀熬滾淋灰汁將汁復熬滾復淋過取淨藥力慢火入磁罐煎熬以紙數重固口熬至一椀爲度乘滾入礦石灰末攪勻如糊之樣入黃丹取如微紅之色密封固罐口候冷次日將厚實磁罐收貯密塞其口每用少許塗毒頂之上即時咬破不黑又點以黑爲度如藥乾以唾調塗如要急用只將燒大柴灰九椀石灰三椀淋灰汁熬濃如前製用更有枯瘤膏十陳膏治法並同

黑虎膏

治瘰癧諸瘡神效

大黃　黃連　黃芩　黃蘗　當歸各一兩　木鼈子五錢　穿山甲三錢　亂髮一丸　蛇蛻一條　清麻油一斤　黃丹水飛炒八兩　乳香一兩　沒藥五錢　阿魏一錢半

右將前九味剉碎入油浸五七日煎熬微黑濾去查入黃丹慢火熬成膏候冷入乳香沒藥阿魏末攪勻油紙攤貼

十香膏

治五發惡瘡結核瘰癧疳痿疽痔

沉香　麝香各一錢　安息香　零陵香　木香　丁香　乳香　甘松　白芷　藿香各五錢爲末　當歸　商陸根　木鼈子　川芎　黃芪　木通　白芍藥　細莘　川升麻　白蘞　獨活　川椒　藁本　石菖蒲　厚朴　官桂各二錢　柏子仁　松仁　桃仁　杏仁各五錢　松枝剉　亂髮灰　白礬灰　槐枝　桑枝　柳枝　沒藥　輕粉　雄黃　硃砂　雲母　犀角各二兩研粉　眞酥　羊腎脂　猪脂各二兩　黃丹一斤　芝麻油三斤

右先用木炭火煉油香熟下一十六味剉碎藥并四枝四仁熬至紫黑色出火濾去柤入酥脂煎十餘沸再以新綿濾過油澄清拭鐺令淨再入火上煎油沸下丹用濕柳枝作篦子不住攪熬一日滴在水中成珠不散則成也離火入十味藥末攪勻再上火入雲母等粉八味輕煎令沸出火不住攪一食頃於磁盒內密封收每用量瘡口大小緋絹帛上攤貼之腸胃癰疽可作丸如梧桐子大每服七丸空心溫酒送下

治瘰癧丸

右先於瘡上灸三壯然後用藥潰作瘡口用新活鱔魚截長一指大批開就掩在瘡口上少時覺瘡內痒急揭起魚覷魚上有細蟲如馬尾一節蟲出如捲三五次取盡蟲子後用斂瘡口藥

麝香　粉霜　雄黃　輕粉各半錢　龍腦　乳香各一字

右爲細末米糊爲丸如小麥大每用一丸兩丸紙在瘡口內覺腫痛是效

洗方拔毒湯

治瘰癧百雜瘡腫悉能內消

防風　荊芥穗　羌活　獨活　北細莘　藁本　白芷　大黃　苦參　當歸　赤芍藥　威靈仙　元參　何首烏　黃蘗　甘草　露蜂房　甘松　藿香　蒼朮　石菖蒲　零陵香　枸杞子　川芎

右葱白川椒煎水熱洗又用綿布二幅煮熱蒸熨

六君子湯

治陽虛陰弱之證

人參　白朮　茯苓各二錢　甘草一錢　陳皮半夏各八分

右㕮咀水煎服

四物湯

治血虛或發熱及一切血虛之證

當歸酒拌　川芎各錢半　芍藥炒　生地各一錢

作一劑水二鍾煎八分食遠服

當歸龍薈丸

治瘰癧腫痛或脅下作痛似有積塊及下疳便癰小便澀大便祕或瘀血凝滯小腹作痛

當歸酒拌　龍膽草酒拌炒　梔子仁炒　黃連
青皮　黃芩各一兩　大黃酒炒　薑蒼　青黛
柴胡各五錢　木香二錢五分　麝香五分另研
右爲末炒神麯糊爲丸菉豆大每服二三十丸薑
湯下

分心氣飲

治七情鬱結胷膈不利或脅肋虛脹噎塞不通或
噫氣吞酸嘔噦惡心或頭目昏眩四肢倦怠面色
痿黃口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦或大腸虛祕
或病後虛痞

木通　赤芍藥　赤茯苓　官桂　半夏薑製
桑白皮炒　大腹皮　陳皮去白　青皮去白
甘草炙　羌活各五分　紫蘇二錢
右作一劑水二鍾薑三片棗二枚燈心十莖煎八
分食遠服

生地黃丸

許白雲學士云有一師尼患惡風體倦午寒午熱
面赤心煩或時自汗是腠疫氣大行醫見寒熱誤
作傷寒治之而大小柴胡湯雜進數日病劇予診
視之曰三部無寒邪脈但厥陰肝脈弦長而上魚
際宜用抑陰之藥遂將此方而愈更治頸核瘰癧
大效

生地黃一兩酒拌搗膏　秦艽　黃芩　柴胡各五
錢　赤芍藥
右爲細末入地黃膏加煉蜜少許丸梧子大每服
三十丸烏梅煎湯下日服

逍遙散

治婦人血虛五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪
頰赤口燥咽乾發熱盜汗食少嗜臥及血熱相搏
月水不調臍腹脹痛寒熱頸核如纍及治室女血
弱柴衛不調痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

當歸酒拌　芍藥　茯苓　白朮　柴胡各一錢
甘草三分
右作一劑水二鍾煎八分食遠服

補中益氣湯

治中氣不足身熱心煩瘰核瘰癧等證

黃芪蜜炙一錢五分　甘草炙　人參各一錢
白朮土炒　陳皮　當歸各五分　升麻　柴胡各
三分
右薑三片棗二枚水煎服

椒仁丸

治病在血分

椒仁　甘遂　續隨子去皮研　附子　椰李仁
黑牽牛　五靈脂碎研　當歸　吳茱萸　延胡索
各五錢　芫花醋浸　麝香　石膏　白礬石各一
錢　蚯蚓十枚去頭翅足糯米炒黃去米不用
螫蜂十箇糯米炒黃去米不用
右爲末麪糊爲丸如豌豆大每服一丸橘皮湯下
此方雖峻利所用不多若畏而不服有養病害身
之患常治虛弱之人用之亦未見其有悞也

葶藶丸

治病在水分

葶藶炒另研　續隨子去殼各半兩　乾笋末一兩
右爲末蜜丸如梧子大每服七丸煎扁竹湯下如
大便利者減續子葶藶各一錢加白朮五錢

托裏養榮湯

治瘰癧流注及一切不足之證不作膿或不潰或
潰後發熱或惡寒肌肉消瘦飲食少思睡臥不寧
盜汗不止

人參　黃芪炙　當歸酒拌　川芎　芍藥炒
白朮炒各一錢　五味子炒研　麥門冬去心
甘草各五分　熟地黃生者酒拌蒸半日忌鐵器
右作一劑水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

單方

頭項強不得顧視大黑豆蒸熱納袋中枕之本草下同
頭項強不得回顧生桃葉蒸熱入袋著項上熨之
項強身中急者取活鼠破腹去五臟就熱熨之即瘥
風濕項強搗蒺藜麻葉傅之妙方
風項強不得顧視穿地作坑燒令通赤以水灑之令
冷納生桃葉鋪其席下臥之令項在葉上以衣著邊
令氣上蒸病人汗出良久即瘥千金方下同
頸項風強八月後取荊芥穗作枕及鋪牀下立春去
之

小兒疳疾及諸病後天柱骨倒乃體虛所致宜生筋
散貼之木鼈子六箇去殼蓖麻子六十粒去殼研勻
先包頭擦頭上令熱以津調藥貼之鄧氏小兒方
小兒項軟因風虛者蚯蚓石一塊蝦七次酢淬七次
研麝金等分爲末入麝香少許白米飯丸龍眼大每
服一丸薄荷湯化服一日一服活幼全書
項下熱腫俗名蝦蟆瘟五葉藤搗傅之外臺秘要
治對口瘡效方新鮮茄蒂七箇秤若干重又用鮮何

首烏秤同茄蒂重用水一鍾半煎服一服出癰一服收口如無鮮茄蒂首烏乾者亦可但不及鮮者有力此方輕劑不可以治重病觀者勿泥也

凡癰破多年膿水不絕用百年茅屋廚中壁土爲末入輕粉調傳半月即乾愈（永類方）

癰癤結核鉛二兩鐵器炒取黑灰醋和塗上故帛貼之頻換去惡汁如此半月不痛不破內消爲水而愈（傷寒信方）

痰核紅腫寒熱狀如癰癤石灰火煅爲末以白果肉同搗貼之蜜調亦可（活人心鏡）

瘰癧有蟲八月中多取螫蚕以苦酒浸半日曬乾每用五箇銅器炒熟爲末巴豆一粒黃犬背上毛二七根炒研硃砂五分同和苦酒頓服其蟲當盡出也

癰癤結核苦參四兩牛膝汁丸菉豆大每暖水下二十九（普濟方）

癰癤潰爛延至胃前兩腋塊如茄子大或牽至兩肩上四五年不能瘳者皆治之其驗如神武進縣朱守仁傳云其項不能回頭用此數日減可如瘡爛破者用荊芥根下一段剪碎煎湯湯溫洗良久看爛破處紫黑以針一刺去血再洗三四次用樟腦雄黃等分爲末麻油調上出水次日再洗再搽以愈爲度（活法機要）

癰癤結核或破未破以新薄荷二斤取汁皂莢一挺水浸去皮搗取汁同於銀石器內熬膏入連翹末半兩連白陳皮一兩連白青皮黑牽牛半生半炒皂莢子各一兩半同搗和丸梧子大每服三十丸煎連翹湯下（清生方）

癰癤未破野菊花根搗爛煎酒服以查傳之自消不消亦自破也（瑞竹堂方）

癰癤風病苗陳蒿兩握水一斗五升煮取七升先以皂莢湯洗次以此湯洗之冷更作隔日一洗不然恐痛也

風毒癰癤赤腫地菘搗傅乾卽易之（聖惠方）

癰癤已破蒺藜二合豉一升搗作餅子如錢大厚二分安瘡孔上作艾炷灸之令溫熱不可破肉數易之而灸但不可灸初起之瘡恐蒺藜氣入腦傷人也（永類鈐方）

癰癤結核連翹芝麻等分爲末時時食之（簡便方）

項邊馬刀用連翹二斤瞿麥一斤大黃三兩甘草半兩每用一兩以水一椀半煎七分食後熱服十餘日後灸臨泣穴二七壯六十日決效（活法機要）

癰癤未穿靛花馬齒莧同搗日日塗傅取效（簡便方）

癰癤疔瘡發背諸腫紫花地丁根去粗皮同白蔗漿爲末油和塗神效

癰癤喉痹攻痛生商陸根搗作餅置癤上以艾炷子上灸三四壯良（竹堂觀要）

男婦癰癤猫兒眼睛草一二細井水二桶五月五日午時鍋內熬至一桶去滓澄清再熬至一盆許收每以葱椒槐枝煎湯洗瘡淨乃搽此膏數次愈（便民圖纂方）

癰癤結核蓖麻子炒去皮每睡時服二三枚取效一生不可吃炒豆（經驗方）

癰癤惡瘡及軟癩用白膠香一兩瓦器鎔化去查以蓖麻子六十四箇去殼研膏鎔膠投之攪勻入油半匙點水中試軟硬添減膠油得所以緋帛量瘡大小攤貼一膏可治三五癩也（儒門事親）

癰癤初作未破作寒熱草烏頭半兩木鼈子二箇以米醋磨之入搗爛葱頭蚯蚓糞少許調勻傅上以紙條貼令通氣孔妙（醫林正宗）

蠍瘭五孔相通者半夏末水調塗之日二（聖惠方下同）

癰癤初起氣壯人用芫花根搥水一盞服大吐利卽平

癰癤結核薺苨一兩爲末雞子白調塗帛上貼之日二易取效止

結核氣瘿菜日乾爲末油煎成膏摩之日三五度便瘥（食療本草）

癰癤未破用月季花頭二錢沉香五錢芫花炒三錢剉碎入鯽魚腹中就以魚腸封固酒水各一盞煮熟食之卽愈魚須安糞水內遊死者方效此方活人多矣（試驗方）

癰癤結核或破或不破下至胃前者皆治之何首烏根洗淨日日生嚼幷取葉搗塗之數服卽止

癰癤潰爛冷飯團切片或爲末水煎服或入粥內食之多食妙忌鐵器及發物（攝生堂方）

癰癤結核用紅娘子十四枚乳香硃霜各一錢半黃丹五分共爲細末糯米粥和作餅貼之不過一月其核自然脫下矣（簡易方）

鼠瘻不消遍草取汁釀酒日飲之

項下癰癤如梅李狀宜速服海藻消之方用海藻一斤絹袋盛之以清酒二升浸之春夏二日秋冬三日每服兩合日三酒盡再作其查曝乾爲末每服方寸匕日三服不過兩劑卽愈（范汪方）

鼠瘻有核膿血用熱牛屎封之日三（肘後方）

蜣螂瘻疾熱牛屎封之日數易當有蜣螂出千金方

瘰癧初起七月七日麻花五月五日艾葉等分作炷灸之百壯外臺秘要

內消瘰癧不拘大人小兒經驗方用蟾蜍一兩去翅足以粟米一升同炒米焦去米不用入薄荷四兩爲末烏雞子清丸如菉豆大空心臘茶下三丸加至五丸却每日減一丸減至一丸後每日又服五丸又日減一丸以消爲度

惡核腫結小蒜臭菜黃等分搗傅卽散肘後方

瘰癧小芥子米酢和貼之看消卽止遲恐損肉肘後方

五膲瘻疾芥子末以木蜜和傅乾卽易之廣濟方

瘰癧不斂乾薑爲末薑汁打糊和作劑以黃丹爲衣每日隨瘡大小入藥在內追膿盡生肉口合爲度如不合以慈白汁調大黃末摎之卽愈集驗方

鼠瘻核痛未成膿以柏葉搗塗熬鹽熨之氣下卽消一切癰瘡錄成松脂末填令滿日三四度聖惠方

項上瘰癧馬齒莧陰乾燒研臘猪脂和以暖泔洗拭傅之

大癭有孔苦瓠四枝大如盡者各穿一孔如指大湯煮十數沸取一竹筒長一尺一頭插瓠一頭注瘡孔上冷則易之用遍乃止千金方

瘰癧潰爛桑上木耳五錢水紅豆一兩百草霜三錢青礬二錢片腦一分爲末雞子白調傅以車前艾葉桑皮煎湯洗之集驗方

膿瘻不止桃花爲末猪脂和傅之日三千金方

卒患瘰癧不痛者取桃樹白皮貼瘡上灸二七壯良

千金方

瘰癧傷風青胡桃皮搗泥入醬清硇砂各少許令勻先以泔洗後傅之

一切瘻疾用槲樹背陰白皮三十斤剉以水一石煮一斗去滓煎如飴又取通都厠上雄鼠屎雌鼠屎各十四枚燒汁盡研和之納溫酒一升和勻瘦人服五合當有蟲出也

又方用槲白皮切五升水八斗煮令泣盡去滓再煎成膏日服棗許并塗瘡上宜食苜蓿鹽飯以助之以瘥爲度

項上瘰癧白殭蠶爲末水服五分日三服十日瘥外臺秘要

瘻瘡楸枝作煎類洗取效肘後方

瘰癧瘻瘡秋分前後早晚令人持袋擒楸葉納袋中秤取十五斤以水一石淨釜中煎取三斗又換鍋煎取七八升又換鍋煎取二升乃納不津器中用時取麻注半合蠟一分酥一栗子許同消化又取杏仁七粒生薑少許同研米粉二錢同入膏中攪勻先塗瘡上經二日來乃拭却卽以筆子勻塗楸煎滿瘡上仍以軟帛裹之且日一拭更上新藥不過五六上已破者卽便生肌未破者卽內消瘥後須將愼半年采藥及煎時忌孝子婦人僧道雞犬見之普濟方

年久瘰癧用不蛀皂角子一百粒米酢一升硇砂二錢同煮乾炒令酥看癧子多少如一箇服一粒十箇服十粒細嚼米湯下酒浸煮服亦可虛人不可用硇砂

瘰癧結核用桑葚子二斗黑熟者以布取汁石器熬成膏每白湯調服一匙日三服保命集

男女瘰癧經驗用牡蠣煅研末四兩元參末三兩麪糊丸梧子大每服三十丸酒下日三服服盡除根初虞世云瘰癧不拘已破未破用牡蠣四兩甘草一兩爲末每食後用臘茶湯調服一錢其效如神

瘰癧經久不瘥用蟾蜍一枚去翅足微炙以漿水一盞空腹吞之用蜜水亦可重者不過七枚瘥也廣利方

鼠瘻瘰癧用猪膏淹生地黃煎六七沸塗之

鼠瘻劉涓子用山龜殼炙狸骨炙甘草炙雄黃桂心乾薑等分爲末飲服方寸匕仍以艾灸瘡上用蜜和少許入猪中良

瘰癧初起者用壁虎一條一名守宮焙研每日酒服半分肯堂方

瘰癧初起未破者好茶泡濃汁與蜂蜜調敷日數易數日消

瘰癧日久成硬核者用陳米醋調蜜數之亦消

瘰癧鼠瘻以石菖蒲生研敷之微破以猫狸皮連毛燒灰用香油調傅內服白蘞末酒下多多爲上仍以白蘞搗爛入酒少許傅之效證治要訣

猫腦紙上陰乾主治瘰癧鼠瘻潰爛同莽草等分爲末納孔中千金方

猫眼睛主治瘰癧鼠瘻燒灰井華水服方寸匕日三外臺秘要

猫舌主治瘰癧鼠瘻生嚥微研傅千金方

猫涎主治瘰癧刺破塗之時珍

瘰癧腿痛久不瘥用狸頭蹄骨並塗酥炙黃爲散每日空心米飲下一錢匕聖惠方

瘰癧已潰狸頭燒灰頻傅之千金下同

一切惡瘻中有冷息肉者用正月狐屎乾末食前新汲水下一錢匕日二

瘰癧已潰牛皮油韡底燒灰調傅之集元方

一切冷瘻人吐蚘蟲燒灰先以甘草湯洗淨塗之無不瘥者慎口味千金下同

蛇瘻不愈蛇腹鼈燒灰封之

瘻瘡膿水不止不合用啄木一隻或火老鴉亦可鹽泥固濟煅存性研末酒下二錢匕姚大夫方

頸項瘰癧用帶殼螻蛄七枚生取肉入丁香七粒於殼內燒過與肉同研用紙花貼之救急方

蟻瘻不愈鯪鯉甲二七枚燒灰猪脂調傅千金方

諸瘻不愈用蜥蜴炙三枚地膽炒三十枚螫蝥炒四十枚爲末蜜丸小豆大每服二丸白湯下治諸法不效者劉涓子鬼遺方

鼠瘻潰爛用鼠一箇亂髮一雞子大以三歲臘猪脂煎令消盡以半塗之以半酒服姚云不傳之妙法也葛氏

白花蛇散治九漏瘰癧發項腋之間痒痛憎寒發熱白花蛇酒浸取肉二兩焙生犀角一兩二錢五分鎊研黑牽牛五錢半生半炒青皮五錢爲末每服二錢入膩粉五分五更時糯米飲調下利下惡毒爲度十日一服可絕病根忌發物三因方

蝦蟆瘻瘡雄雞屎燒灰臘猪脂和傅之千金方下同

鼠瘻已潰雞卵一枚米下蒸半日取黃熬令黑先拭瘡令乾以藥納孔中三度即愈

風瘻不合露蜂房一枚炙黃研末每以一錢臘猪脂和塗肘後方

頸下結核大蜘蛛不計多少好酒浸過同研爛澄去查臥時服之最效醫林集要

瘰癧結核無問有頭無頭用大蜘蛛五枚日乾去足細研酥調塗之日再上聖惠方

鼠瘻腫核已破出膿水者用蜘蛛二七枚燒研傅之千金方

瘰癧結核黑牛皮膠鎔化攤膏貼之已潰者將膏搓作線長寸許紝入孔中頻換拭之取效經驗方

治瘰癧用韋藤蛇蒡草并根蒂葉紅子四兩夏枯草五錢頭生酒諒意用入砂罐煑一炷香取起埋土穴中退火一宿其煑藥時罐內空懸紋銀以煑不變黑色則其草無毒可服如黑去之另用草煑則無礙矣初服藥酒一杯隨服常酒數杯取汗後不時常服一杯一日以五次爲度不可多服未形者由瀉而內消已形者毒水出於小便一月全效保生秘要

頸項瘰癧已破汁出不止者用鴨脂調半夏末日日敷之永類方

項下瘻氣水涯露出柳根三十斤水一斛煑取五升以糯米三升如常釀酒日飲范汪方

項下瘻氣秫米三斗炊熟取圓葉白楊皮十兩勿令見風切水五升煑取二升漬麴朮五兩如常釀酒每旦一盞日再服崔氏方

鹿靨主治氣瘻以酒浸炙乾再浸酒中含嚥汁味盡更易十具乃愈深師方

用猪靨七枚酒麴三錢入水瓶中露一夜取出炙食二服效杏林摘要

開結散猪靨焙四十九枚沉香二錢眞珠砂罐煅四十九粒橘紅四錢爲末臨臥冷酒徐徐服二錢五服見效重者一料愈以除日合之忌酸鹹油膩澁氣之物醫林集要

身項粉瘤舊皮鞋底洗淨煮爛成凍子常食之瘤自破如豆腐極臭直指

項下氣瘻用羊靨一具去脂酒浸炙熟含之嚥汁日一具七日瘥外臺

又方用羊靨七枚陰乾海藻乾薑各二兩桂心昆布逆流水邊柳鬚各一兩爲末蜜丸芡子大每含一丸嚥津千金方

瘰癧潰爛用黑色蝦蟆一枚去腸焙研油調傅之忌鐵器

瘰癧潰爛臘猫屎以陰陽瓦合鹽泥固濟煅過研末、油調搽之儒門事親

瘰癧潰瘡茶蜈蚣二味炙至香熟搗篩爲末先以甘草湯洗淨傅之枚中方

雀瘻有蟲母猪屎燒灰以臘月猪膏和傅當有蟲出千金方

瘰癧潰爛流串者用荊芥根下段煎湯洗良久著瘡破紫黑處以鍼刺去血再洗三四次用韭菜地上蚯蚓一把五更時收取炭火上燒紅爲末每一匙入乳香沒藥輕粉各五分穿山甲九片炙爲末油調傅之如神此武進朱守仁所傳有驗方保命集

瘰癧結核不問新久已潰未潰並治之神效用嫩明松香一兩葱湯煑化冷水拔淨火麻仁一兩上好松蘿茶葉五錢共搗如泥油紙攤爲膏貼之未潰即消

已潰即斂此祕方也

又方穿山甲土炒盤蝥熟艾等分爲末傅之外以烏柏葉貼上灸四壯效 壽域方

項下瘰癧用羊膍胵燒灰香油調敷

鼠瘻潰壞新鼠屎一百粒收密器中五六十日杵碎即傅之效 千金方

瘰癧已破羊屎燒五錢杏仁燒五錢研末猪骨髓調搽 海上方

瘰癧潰壞用黃魚破開入蓖麻子二十粒紮定安厠坑中冬三日春一日夏半日取出洗淨黃泥固濟煅存性研香油調傅 普濟方

項上瘰癧左盤龍炒研末飯和丸梧桐子大每服三五十丸米飲下 張子和方

鼠瘻瘰癧五白散白牛屎白馬屎白羊屎白雞屎白猪屎各一升燒灰漏蘆末二兩以猪膏一升煎亂髮一兩同熬五六沸塗之神驗 千金方

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百八十九卷目錄

醫部彙考一百六十九

頸項門四

鍼灸

導引

醫案

藝術典第一百八十九卷

醫部彙考一百六十九

頸項門四

鍼灸



素問曰腎熱病者先腰痛胻痠苦渴數飲身熱熱爭則項痛而强胻寒且痠足下熱不欲言其逆則項痛員員澹澹然戊己甚壬癸大汗氣逆則戊己死刺足少陰太陽

先項背痛者先刺之

大風頸項痛刺風府風府在上椎

靈樞曰大腸手陽明之脈其支者從缺盆上頸貫頰入下齒中還出挾口交人中左之右右之左上挾鼻孔是動則病齒痛頸腫視盛虛熱寒取之也

胃足陽明之脈是主血所生病者狂瘧溫淫汗出鼽衄口喎脣胗頸腫喉痹視盛虛熱寒取之也

小腸手太陽之脈其支者從缺盆循頸上頰至目銳眥却入耳中其支者別頰上頗抵鼻至目內眥斜絡於顴是動則病咽痛頷腫不可以顧肩似拔臑似折是主液所生病者耳聾目黃頰腫頸頷肩臑肘臂外後廉痛視盛衰熱寒取之也

膀胱足太陽之脈是動則病衝頭痛目似脫項如拔脊痛腰似折髀不可以曲膕如結腨如裂是爲踝厥視盛虛熱寒取之也

手陽明之筋其支者繞肩胛挾脊直者從肩上髃上頸其病當所過者支痛及轉筋肩不舉頸不可左右視治在燔鍼刼刺以知爲數以痛爲輸名爲孟夏痹也

手太陽之筋起於小指之上入結於腋下其支者從走腋後廉上繞肩胛循頸出足太陽之前結於耳後完骨其病腋後廉痛繞肩胛引頸而痛應耳中鳴痛引頷目瞑良久乃得視頸筋急則爲筋痿頸腫寒熱在頸者治在燔針刼刺以知爲數以痛爲輸其爲腫者復而銳之

手少陽之筋起於小指次指之端結於腕上循臂結於肘上繞臑外廉上肩走頸合手太陽其病當所過者卽支轉筋舌卷治在燔針刼刺以知爲數以痛爲輸名爲季夏痹也

邪在腎則病骨痛陽痹陽痹者按之而不得腹脹腰痛大便難肩背頸項痛時眩取之湧泉崑崙視有血者盡取之

厥頭痛項先痛腰卽爲應先取天柱後取足太陽

項痛不可俛仰刺足太陽不可以顧刺手太陽也

黃帝曰鼠瘻寒熱之毒氣去之奈何岐伯曰鼠瘻之本皆在於臟其末上出於頸腋之間其浮於脈中而未內著於肌肉而外爲膿血者易去也黃帝曰去之奈何岐伯曰請從其本引其末可使衰去而絕其寒熱審按其道以予之徐往徐來以去之其小如麥者一刺知三刺而已

甲乙經曰頭項痛重暫起僵仆鼻窒鼽衄喘息不得通通天主之

項上痛風頭重目如脫不可左右顧百會主之

頸痛項不得顧目泣出眵瞑鼻鼽衄目內眥赤痛氣厥耳目不明咽喉僂引項筋攣不收風池主之

項腫不可俯仰頰腫引耳完骨主之

頸項痛不可以俯仰頭痛振寒瘈瘲氣實則脇滿俠脊有井氣熱汗不出腰背痛大杼主之

頸項通强取通天百會風池完骨瘂門大杼

胷中滿腋下腫馬刀瘻善自嚙舌頰天牖中腫淫濼脛痠頭眩枕骨頷腮痛目澀身痹灑淅振寒季脅支滿寒熱脅腰腹膝外廉痛臨泣主之

馬刀腫瘻淵液章門支溝主之

出於頦下或至頰車者當於手足陽明經取之或鍼或灸如後穴三里足陽明合谷手陽明

瘻天窻及臑會主之氣舍亦主之

千金方曰少澤前谷後谿陽谷完骨崑崙小海攢竹主項强急痛不可以顧

消濼本神通天强間風府瘖關天柱風池齦交天沖陶道外丘通谷玉枕主項如拔不可左右顧

天容前谷角孫腕骨支正主頸腫項痛不可以顧

天容主頸項癰不能言

角孫主頸頷柱滿

飛揚涌泉頷厭後頂主頸項疼歷節汗出

天府膻會氣舍主瘰癧氣咽腫
腦戶通天消濼天突主頸有大氣
通天主瘰灸五十壯曾堂羊屎灸一百壯
絕骨主瘦馬刀掖腫
大迎五里臂臑主寒熱頸瘰癧
天突天窗主漏頸痛
俠谿陽輔大衝主掖下腫馬刀瘿
瘡瘍全書曰男子婦人小兒患瘰癧者依法四六燒
灸無不效肩骨尾盡處是肩井二穴左肩灸左右肩
灸右左右俱有俱灸鼠尾一穴用草一莖男比左手
女比右手中節橫紋攢量過四指紋盡處比交折斷
將至絲螺骨尖中比至脚後總筋中是鼠尾穴左灸
左右灸右俱有俱灸一年五壯年深多灸專治一切
瘰癧須要禁忌房事神效不虛可以活人灸畢瘡爛
車前草葉搗爛貼之看遍身神人所在禁忌井擇天
醫黃道吉日
灸忌旣灸忌諸魚熱麪生酒生冷物鮮肉及房勞
又灸兩手掌後四寸兩筋間各七壯以病人中指橫
紋量至本指尖爲四寸再灸肘尖左病灸右右病灸
左各三壯不過三丈除根
治瘰癧已成未成已潰未潰以手置肩上微舉起則
肘骨尖自現是灸處如患左灸左肘患右灸右肘左
右俱患兩肘皆灸以三四十壯爲期更服補劑一年
者日灸一丈三灸其瘡自除如患三四年不愈者辰
時灸起至酉時方止三灸卽愈更服益氣養榮湯
又法未成膿者用大蒜切片如二錢厚者安患上用
艾炷於蒜上灸之至三五壯搗蒜每日灸十數蒜片
以拔膏毒如破久不合內有核或瘀肉此因氣血不
足不能腐爛更用江西豆豉爲末唾津和爲餅如前
灸之以助陽氣內服補藥外貼金絲膏瘡口自合
東垣十書曰腋下腫馬刀挾瘿善自嚼舌頰天膈中
壓寒熱取臨泣丘墟各一分灸五壯太衝一分灸三
壯
腋下頸項腫取天池順皮三分灸七壯如領腫加後
谿二分灸五壯
腋下腫馬刀挾瘿喉痹取陽輔五分灸一七壯申脈
一分灸三壯立愈
諸瘿惡氣灸肩髃男左十八壯右十七壯女右十八
壯左十七壯在肩端凸骨間陷宛宛中舉臂取之
又法灸天府七七壯衝陽隨年壯
丹溪心法曰灸瘰癧法搗商陸根作餅子置於瘰癧
上艾炷灸餅子上乾卽易之灸三四餅
得效方曰治瘰癧以手仰置肩上微舉手取之肘骨
尖上是穴隨患處灸七壯或二七壯神效
醫學綱目曰刺灸頸項瘡痛有二其一取手足太陽
治項後痛經云足太陽之脈是動則病項如拔視虛
盛寒熱取之又云項痛不可俯仰刺足太陽不可以
顧刺手太陽又云大風頸項痛刺風府風府在上椎
又云邪客於足太陽之絡令人頭項肩痛刺足小指
爪甲上與肉交者各一痏立已不已則刺外踝下三
痏左取右右取左如食頃是也
其二取足手陽明治頸前痛經云足陽明之脈所生
病者頸腫又云手陽明之脈是動則病頸腫皆視盛
虛寒熱陷下取之也

導引

石室祕錄曰頸項强直乃風也以一人抱住下身以
一人手拳而搖之至數千下放手深按其風門之穴
久之則其中酸痛乃止病人乃自坐起口中微微咽
津送下丹田者七次而後已一日卽痊
保生祕要曰瘰癧導引法用手於肩井穴掐六十四
度擦之亦如數而行運法極效
運法起於歸元漸引至患處著意多旋小而大徹而
散散而運運而至於胷間遶十數迴又旋至瘡處如
前法遍而復始約數十迴以散其結每日送毒一次
從胃口曲入大腸如法送出救道外去濁提清歸元
愼走元陽切戒惱怒發物其前運法一晝夜每行七
度自然消散無蹤
又法於患處想一筋右邊用左手左邊用右手扯下
肚裏去覺瘡疼又扯下從脚底去

醫案

本事方曰有人患頸筋急項不得轉側自午後發至
黃昏時定予曰此患必從足起蓋足太陽之筋自足
至項大抵筋者肝之合也日中至黃昏天之陽陽中
之陰也又曰陰中之陽肺也自離至兌陰旺陽弱之
時故靈寶畢法云離至乾腎氣絕而肝氣弱肝腎二
臟受陰氣故發於是時授以木瓜煎方三服而愈
一人患項筋痛連背膊不可轉移服諸風藥皆不效
予憶千金髓有腎氣攻背强一證與椒附散一服差

蓋腎氣自腰挾脊上項至曹溪穴然後入泥丸宮曹溪穴非精於搬運者不能透今逆行至此不得通用椒以引歸經則安矣氣上逆故服之即愈

儒門事親曰戴人在西華寄於夏官人宅忽項上病一瘡狀如白頭瘡腫根紅硬以其微小不慮也忽遇一故人見邀飲以羊膏酒雞魚鹽蒜皆在焉戴人以其故舊不能辭又忘其禁忌是夜瘡疼痛不可忍項腫及頭口發狂言目見鬼神夏君甚懼欲報其家戴人笑曰請無慮來日當平乃以酒調通經散六七錢下舟車丸百餘粒次以熱粥藥投之上涌下泄一時齊作合去半盆明日日中瘡腫已平一二日腫消而愈夏君見大奇之

一婦人病瘰癧延及胷臆皆成大瘡相連無好皮肉求戴人療之戴人曰火淫所勝治以鹹寒命以淦鹽吐之一吐而著痂次用凉膈散解毒湯等劑皮肉乃復如初

丹溪心法曰一男子項强不能回顧動則微痛其脈弦而數實右手爲甚作痰客太陽經治之用二陳湯加酒洗黃芩羌活紅花服後一日愈

薛己醫案曰儒者楊澤之性躁嗜色缺盆結一核此肝火血燥筋攣法當滋腎水生肝血不信乃內服降火化痰之藥外敷南星商陸等大如椀余用補中益氣及六味地黃間以蘆薈丸年餘元氣復而腫消

一男子素善怒左項微腫漸大如升用清痰理氣大熱作渴小便頻濁余謂腎水虧損用六味地黃補中益氣而愈亦有胃脘等處大如升斗或破而如菌如櫃不問大小俱治以前法

舉人江節夫頸臂脅肋各結一核恪服祛痰降火軟堅之劑益甚余曰此肝膽經血少而火燥也彼執前藥至明年六月各核皆潰脈浮大而濇余斷以秋金將旺肝木被尅必不起後果然

閣老楊石齋子年十七患瘰癧發熱作渴日晡頰赤左關尺脈大而浮此肝腎陰虛用補陰八珍湯二十餘劑又加參芪二十餘劑而潰但膿水清稀肌肉不生乃以參芪歸朮爲主佐以芍藥熟地麥冬五味膿水稠而肌肉生更服必效散一劑瘡毒去而瘡口斂

一儒者患愈後體瘦發熱晝夜無定此足三陰氣血俱虛用八珍加麥冬五味二十餘劑又用補中益氣加麥冬五味及六味丸而愈

儒者張子容素善怒患瘰癧久而不愈瘡出鮮血左關弦洪重按如無此肝火動而血妄行證屬氣血俱虛用補中益氣以補脾肺六味丸以滋腎肝而愈

一人耳下患結核五枚經年許尚硬面色痿黃飲食不甘勞而發熱脈數軟而濇以益氣養榮湯六十餘劑元氣已復患處已消一核尚存以必效散二服而平

一人先於耳前耳下患之將愈延及項側缺盆三年遂延胷腋診之肝脈弦數以龍膽散堅二丸治之將愈肝脈尚數四年後小腹陰囊內股皆患毒年餘不斂脈診如前以清肝養血及前丸而愈

一人因怒耳下及缺盆患瘰潰延腋下形氣顏實瘡口不合治以散腫潰堅而愈

一人因勞而患怠惰發熱脈洪大按之無力宜用補中益氣湯彼不信輒服攻伐之劑吐瀉不止而死大抵此證原屬虛損若不審虛實而犯病禁經禁鮮有不悞常治先以調經解鬱更隔蒜灸之多自消如不消即以琥珀膏貼之候有膿則針之否則變生他證

設若兼痰兼陰虛等證只宜加兼證之劑不可干擾餘經或氣血已復而核不消却服散堅之劑至月餘不應氣血亦不覺損方進必效散或遇神仙無比九其毒一下即止二藥更服益氣養榮湯數劑以調理瘡口不斂豆豉餅琥珀膏若氣血俱虛或不慎飲食起居七情者俱不治然此證以氣爲主氣血壯實不用追蝕之劑彼亦能自腐但取去便易於收斂若氣血虛不先用補而數用追蝕之藥適足以取敗若發寒熱眼內有赤脈貫瞳人者不治一脈者一年死二脈者二年死

一人患結核瘀盛胷膈痞悶脾胃脈弦此脾土虛肝木乘之也當實脾土伐肝木爲主彼以治痰爲先乃服苦寒化痰藥不應又加破氣藥病愈甚始用六君子湯加芍藥數劑飲食少思以補中益氣湯倍加白朮月餘中氣少健又以益氣養榮湯四月腫消而血氣亦復矣夫右關脈弦弦屬木乃木盛剋脾土爲賊邪也虛而用苦寒之劑是爲虛虛兄痰之爲病其因不一主治之法不同凡治痰利藥過多則脾氣愈虛虛則痰愈易生如中氣不足必用參朮之類爲主佐以痰藥

一人久患不斂神思困倦脈虛孚欲投以托裏彼以爲迂乃服散腫潰堅湯半月餘果發熱飲食愈少復求治孚以益氣養榮湯三月喜其謹守禁忌故得以收效齊氏曰結核瘰癧初覺宜內消之如經久而除

氣血漸衰肌寒肉冷或膿汁清稀毒氣不出瘡口不合聚膿不赤結核無膿外證不明者並宜托裏膿未成者使膿早成膿已潰者使新肉早生血氣虛者托裏補之陰陽不和托裏調之大抵托裏之法使瘡無變壞之證此所以宜用也

一婦患癭癰延至胃腑膿水淋漓日久五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪頰赤口乾咽燥發熱盜汗食少嗜臥月水不調臍腹作痛予謂血虛而然非癰故也服逍遙散月餘少可更服八珍湯加牡丹皮香附子又月餘而經通再加黃芪白薇兩月餘而愈

一婦潰後核不腐以益氣養榮湯三十餘劑更數針頭散腐之再與前湯二十餘劑而斂

一婦久潰發熱月經過期且少用逍遙散兼益氣養榮湯兩月餘氣血復而瘡亦愈但一口不收數針頭散更灸肩井穴而痊

一婦癭癰與養血順氣藥不應服神效瓜蔞散二劑頓退又六劑而消却與托裏藥氣血平復而愈

一婦人癭癰久不愈或以木旺之證用散腫潰堅湯伐之腫硬益甚予以爲肝經氣血虧損當滋化源用六味地黃丸補中益氣湯至春而愈此證若肝經風火暴病元氣無虧宜用前湯若風木旺而自病宜用瀉青丸慮者用地黃丸若水不能生木亦用此丸若金來尅木宜補脾土生腎水大凡風木之病壯脾土則木自不能尅矣若行伐肝則脾胃先傷而木反尅土矣

一婦患癭癰少寐年餘癰破膿水淋漓經水或五十日或兩月餘一至誤服通經丸展轉無寐午前惡寒午後發熱予以爲思慮虧損脾血用歸脾湯作丸午前以六君送下午後以逍遙送下兩月餘得寐半載後經行如期年餘瘡愈

一婦癭癰後遍身作痒脈大按之則虛以十全大補湯加香附治之而愈大凡潰後午前痒作氣虛午後痒作血虛若作風證治之必死

一男子患此腫痛發寒熱大便祕以射干連翹散六劑熱退大半以仙方活命飲四劑而消

一婦人耳下腫痛發寒熱與荊防敗毒散四劑表證悉退以散腫潰堅湯數劑腫消大半再以神效瓜蔞散四劑而平

一男子肝經風熱耳下腫痛發熱脈浮數以薄荷丹治之而消

一男子每怒耳下腫脅或作痛以小柴胡湯加青皮木香紅花桃仁四劑而愈

一男子頸腫不作膿脈弦而數以小柴胡湯兼神效瓜蔞散各數劑及隔蒜灸數次月餘而消

一婦人頸腫不消與神效瓜蔞散六劑少退更以小柴胡湯加青皮枳殼貝母數劑消大半再以四物對小柴胡湯數劑而平

一男子因暴怒項下腫痛生結核痞悶兼發熱用方脈流氣二劑胃腑利以荊防敗毒散二劑而熱退肝脈尚弦滑以小柴胡加芎歸與藥四劑脈證頓退以散腫潰堅丸一料將平唯一核不消乃服遇仙無比丸二兩而癒

一婦人久鬱患此潰而不斂發熱口乾月水短少飲食無味日晡尤甚以益氣養榮湯二十餘劑少健余謂須服百劑庶保無虞彼欲求速效反服盤蜇之劑及數用追蝕毒藥去而復結以致不能收斂出水不止遂致不救蓋此證屬虛勞氣鬱所致宜補形氣調經脈未成者消已成者潰若投標悍之劑則氣血愈虛多變爲瘵證彼堅而不潰潰而不合氣血不足明矣凡二經之血原自不足不可不察

一男子患久不斂膿出更清而黃羸瘦每侵晨作瀉與二神丸數服瀉止更以六君子湯加芎歸月餘肌體漸復灸以豆豉餅及用補劑作膏藥貼之三月餘而痊

一男子患此未潰倦怠發熱以補中益氣湯治之少愈以益氣養榮湯月餘而潰又月餘而痊

一婦人肝經積熱患此作痛脈沉數以麝香連翹湯四劑少愈用散腫潰堅丸月餘而消丹溪云癭癰必起於足少陽一經不守禁忌延及足陽明經食味之厚鬱氣之久曰毒曰風曰熱皆此數端招引變換須分虛實實者易治虛者可慮此經主決斷有相火且氣多血少婦人見此若月水不調寒熱變生稍久轉爲潮熱自非斷慾食滯神醫不能療也

一男子患此腫硬久不消亦不作膿服散堅敗毒藥不應令灸肘尖肩尖二穴更服益氣養榮湯月餘而消

一男子患此同前亦灸兩穴飲前湯膿成針之而斂

一婦人因怒結核腫痛察其氣血俱實先以神效散下之更以益氣養榮湯三十餘劑而消常治此證虛者先用益氣養榮湯待其氣血稍充乃用神效散取去其毒仍進前藥無不效者

一室女年十七項下時或作痛乍寒乍熱如瘧狀肝脈弦長此血盛之證也先以小柴胡湯二劑少愈更以生地黃丸治之而痊婦人良方云寡婦之病自古未有言者唯倉公傳與褚澄論及言寡婦獨陰無陽欲男子而不可得是以鬱悒而成病也易曰天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生孤陽獨陰可乎夫既處閨門慾心萌而不遂致陰陽交爭乍寒乍熱有類瘧疾久而爲痨又有經閉白淫痰逆頭風腸氣痞悶面黯瘦瘠等證皆寡婦之病診其脈獨肝脈弦出寸口而上魚際究其脈原其疾皆血盛而得經云男子精盛則思室女人血盛則懷胎觀其精血思過半矣

一婦人患久不作膿脈浮而濇予以氣血俱虛欲補之便自潰彼欲內消專服蟾蜍及散堅之藥氣血愈虛而死

一男子素弱潰後核不腐此氣血皆虛用托裏養榮湯氣血將復核尚在以舒挺撥去又服煎藥月餘而痊

一男子氣血已復核尚不腐用針頭散及必效散各三次不旬日而愈

一婦人因怒項腫後月經不通四肢浮腫小便如淋此血分證也先以椒仁丸數服經行腫消更以六君子湯加柴胡枳殼數劑頸腫亦消矣亦有先因小便不利後身發腫致經水不通名曰水分宜葶藶丸治之婦人良方云婦人腫滿若先因經水斷絕後至四肢浮腫小便不通名曰血分水化爲血血不通則復化爲水矣宜服椒仁丸若先因小便不利後身浮腫致經水不通名曰水分宜葶藶丸

一室女年十九頸腫而面色不變肌肉日削筋攣急痛此七情所傷血氣皆損之證也當先滋養血氣彼不信乃服風藥後果不起盧祖鏡曰經云神傷於思慮則肉脫意傷於憂愁則肢廢魂傷於悲哀則筋攣魄傷於喜樂則皮槁志傷於盛怒則腰脊難以俛仰也

一癆婦四肢倦怠殊類瘵證以養血氣健脾胃藥而愈

一室女性急好怒耳下常腫痛發寒熱肝脈弦急投以小柴胡湯加青皮牛蒡子荊芥防風治之而寒熱退更以小柴胡湯對四物數劑而腫消其父欲除去病根勿令再發予謂肝內主藏血外主榮筋若恚怒氣逆則傷肝肝主筋故蓄結而爲腫須病者自能調攝庶可免患否則肝迭受傷則不能藏血血虛則爲難瘳之證矣後不戒果結三枝屢用追蝕藥不斂而歿

一少婦耳下患腫素勤苦發熱口乾月水每過期而至且少老媼以爲經閉用水蛭之類通之以致愈虛而斃夫月水之爲物乃手太陽手少陰二經主之此二經相爲表裏主上爲乳汁下爲月水爲經絡之餘氣苟外無六淫所侵內無七情所傷脾胃之氣壯則衝任之氣盛故爲月水適時而至然而面色痿黃四肢消瘦發熱口乾月水過期且少乃陰血不足也非有餘瘀閉之證宜以滋養血氣之劑徐徐培之則經氣盛而經水自依時而下

一放出宮女年踰三十兩膀作痛不腫色不變大小便作痛如淋登厠尤痛此瘀血潰入隧道爲患乃男女失合之證也難治後潰不斂又患瘰癧而歿此婦爲吾鄉湯氏妾湯爲商常在外可見此婦在內久懷幽鬱及在外又不能如願是以致此疾愈見流注瘰癧乃七情氣血皆已損傷不可用攻伐之劑皎然矣故精血篇云精未通而御女以通其精則五體有不滿之處異日有難狀之疾陰已痿而思色以降其精精不出而內敗小便道澀而爲淋精已耗而復竭之則大小便道牽疼愈疼則愈欲大小便愈便則愈疼若女人天癸既至踰十年無男子合則不調未踰十年思男子合亦令不調不調則舊血不出新血誤行或潰而入骨或變而爲腫或難合而亦難子合男子多則精枯虛人產乳衆則血枯殺人觀其精血思過半矣

一室女年十七患瘰癧久不愈月水尚未通發熱咳嗽飲食不思有老媼欲用巴豆肉桂之類先通其經予謂此證潮熱經候不調者不治但喜脈不濇且不潮熱尚可治須養氣血益津液其經自行彼悞於速效之說仍用之予曰非其治也此類乃標悍之劑大助陽火陰血得之則妄行脾胃得之則愈虛經果通而不止飲食愈少更加潮熱遂致不救經云女子七歲腎氣盛齒更髮長二七天癸至任脈通太衝脈盛月事以時下然過期而不至是爲失常必有所因夫人之生以血氣爲本人之病未有不先傷氣血者婦女得之多傷於七情世有室女童男積想在心思慮過當多致勞損男子則神色先散女子則月水先閉何以致然蓋憂愁思慮則傷心心傷則血逆竭血逆

竭則神色先散而月水先閉也火既受病不能榮養其子故不嗜食脾既虛則金氣鬱故發欬嗽水氣絕故四肢乾木氣不充故多怒爪髮焦筋骨痿俟五臟傳遍然後死矣此一種於勞中最難治蓋病起於五臟之中無有已期藥力不可及也若或自能改易心志用藥扶接如此則可得九死一生果此爲例其餘諸方可按脈與證而治之張氏云室女月水久不行切不可用青蒿等涼劑醫家多以爲室女血熱故以涼藥解之殊不知血得熱則行冷則凝變生必用方言之甚詳此說大有理不可不知若經候微少漸漸不通手足骨肉煩疼羸瘦漸生潮熱其脈微數此由陰虛血弱陽生乘之小水不能減盛火火遍水涸亡津液當養水益陰慎毋以毒藥通之宜柏子仁丸澤蘭丸

沈氏宝患瘰癧久而不消自汗惡寒此氣血俱虛也遂以十全大補湯月餘而潰然其核雖取而瘡口不斂更灸以豆豉餅仍與前藥加烏藥香附南月而愈大抵堅而不潰潰而不合皆由氣不足也嘗見患此瘡者瘡口雖合而不加補往往變爲瘵證以及赤脈貫睛皆爲死證

一婦人因怒耳下腫痛以荊防敗毒散加連翹黃芩四貼而愈嘗治此旬日不消者以益氣血藥及飲遠志酒其腫自消若無膿者亦自潰不戒忿怒者則難治

一婦人亦因怒耳下瘃腫頭痛寒熱與荊防敗毒散加黃芩治之表證悉退但飲食少思日晡發熱束垣云雖有虛熱不可大攻熱去則寒生也遂以小柴胡湯加地骨皮川芎當歸茯苓白朮陳皮十餘貼而愈次年春復堅硬不潰來索方予定八珍湯加香附柴胡地骨皮桔梗自製服之至六七劑以效延緩仍服人參敗毒散勢愈甚又服流氣飲則盜汗發熱口乾少食至秋復求治診視氣血虛極予辭不治果殺今人有瘡瘍不審元氣虛實病在表裏便服敗毒流氣藥殊不知敗毒散乃發表之藥果有表證亦止宜一二服多則元氣反損其毒愈甚雖有人參莫補其耗流氣飲乃耗血之劑果氣結腸滿亦止宜二三服多則血氣愈傷反爲敗證雖有芎歸難以倚仗丹溪云此不係膏粱丹毒之變因虛勞氣鬱所致也

一婦人患瘰癧不消膿清不斂予以八珍湯治之少愈忽肩背痛不能回顧此膀胱經氣鬱所致當以防風通氣湯治之蓋膀胱之脈始於目內眥上額交顛下耳角復上頂至腦後過風府下項走肩膊一支下膕臀是經氣動則脊痛項強腰似折此非膀胱經證而何彼乃云瘰癧瘡經病也其脈主行項側即是經火動而然遂自服清肝降火之藥反致不食痛甚復請予診其脈胃氣愈弱先以四君子湯加陳皮炒芍藥半夏羌活葛根荊子四劑食進痛止繼以防風通氣湯二劑而愈

田氏婦年踰三十患瘰癧已潰不愈與八珍湯加柴胡地骨皮夏枯草香附貝母五十餘貼形氣漸轉更與必效散二服瘡口遂合惟氣血未平再用前藥三十餘劑而平後田生執此散方不問虛實槩以治人殊不知方中蟾酥性毒雖能專治瘰癧多服則損元氣若氣血實者先用此下之而投補劑或可愈若虛而用下藥或追蝕藥瘀肉雖去而瘡口不合反致難治

廣東陳方伯子遠遂勞倦發熱厥大無力耳下患腫此勞損證也飲補中益氣湯自然熱退腫消若專攻毒則有虛虛之禍彼不聽服降火藥及必效散果吐瀉不食而死夫人勞倦則損氣氣衰則火旺火旺則乘其脾土故倦怠而熱此元氣傷也丹溪云宜補形氣調經脈其瘡自消不可汗下若不詳脈證經絡受病之異而輒下之鮮不危矣

汪中翰姪年及二十耳下患瘰癧痛左關脈數此肝經風熱所致以荊防敗毒散二貼表證悉退再與散腫潰堅丸月愈而平復

一婦年二十耳下結核經水每過期午後頭痛服頭風藥愈盛予以八珍湯加柴胡地骨皮二十餘劑而愈

楊文魁年踰三十每勞心過度頸腫發熱服敗毒散愈盛予以補中益氣湯數劑而消

一癰婦潰後發熱煩躁作渴脈大無力此血虛而然也以當歸補血湯六劑頓退又以聖愈湯數劑少健更以八珍湯加貝母遠志三十餘劑而斂東垣云發熱惡熱大渴不止煩躁肌熱不欲近衣其脈洪大按之無力或目痛鼻乾者非白虎湯證也此血虛發躁當以當歸補血湯主之又有火鬱而熱者如不能食而熱自汗氣短者虛也以甘寒之劑瀉熱補氣如能食而熱口舌乾燥大便難者以辛苦大寒之劑下之以瀉火補水

一男子頸間結核大潰予用靛子清肝火養肝血益

元氣之藥而愈此證亦有大如升斗者亦治以前藥可愈

一兒七歲項結二核時發寒熱日久不愈治以連翹丸而消若患在面臂等處尤宜此丸若潰而不斂兼以托裏之藥治之

一兒項結一核堅硬如癤面色痿黃飲食不甘服托裏藥不應此無辜府毒也以蟾酥丸治之而愈若數服不消按之轉動軟而不痛者內有蟲如粉急針出之若不速去則蟲隨氣走內蝕臟腑不治蟾蜍夏月溝渠中取腹大不跳不鳴者先取糞蛆一杓置桶中以尿浸之桶近上令乾使蛆不得出將蟾蜍撲死投蛆中任蛆食次以新布袋包繫置水急處浸一宿取出瓦上焙爲末入麝香一字軟飯丸如麻子大每服二三十丸空心米飲服之

一婦因怒不思食發熱倦怠骨痠疼體瘦面黃漸不通頸間結核以逍遙散八珍湯治之少可彼自誤服水蛭等藥血氣愈虛遂致不救

外科正宗曰一男人項疽十餘日視其瘡勢頗甚根連左右耳項並腫紅赤發熱脈浮而數先用黃連消毒散二服退其大勢根腳稍定後用托裏消毒散數服不覺腐潰但診脈浮無力詢知患者年過五旬久艱嗣息房中又有妾人多嫌思慮勞慾太過損傷元氣故也又瘡形勢大止能起發不能培養爲膿更用十全大補湯加桔梗白芷倍人參白朮各二錢外用桑木灸法早晚二次灸之又塗紫霞膏數日患者頭面俱腫雙目合縫形狀可畏然後腐潰並作膿出日至數升如此半月同前藥不勝其事內加煩躁不寧五心煩熱飲食漸少等證此膿水出多氣血走泄爲虛火假證之故隨用聖愈湯一服不應又進一服加熟附子二錢方應前證悉退次以人參養榮湯加麥冬五味參朮倍至三錢調理月餘後至腦骨腐肉連髮片片脫下其狀狠狽不可觀瞻凡相視者無不點頭驚訝又恐腐潰深大補不及事每日粥食中用人參三錢凡餐分入同羹食之以補脾元後方元氣漸醒調理四月方愈彼後一年反生一子以承後嗣也

一婦人正對口四五日自灸甘餘壯竟不知痛灸疤焦黑平塌如故診之脈微數而無力此內虛證也若假藥力則悞其事用鈹鍼當頂刺入寸許不知痛亦無血出此毒滯而未發揚者用蟾酥條插入鍼孔每日一次膏益其上至七日後周圍裂縫出膿血內服純補之藥至十四日落出瘡根一塊指大長寸餘後以玉紅膏平長肌肉又半月其口已平以珍珠散摻上即刻生皮而愈此證設若不用鍼工專假藥力攻托雖不至死豈能得其速愈者哉

一監生項瘡初起請視瘡頭偏於右半不可輕待必用艾灸爲上隔蒜灸至十五壯知痛乃住後彼視爲小恙失用內藥又四日其瘡復作頸腫項強紅紫木痛便祕脈實有力以內疏黃連湯加元明粉二錢通其大便次用消毒救苦湯二服腫勢仍甚此內毒外發也不可再消之換服托裏消毒散至近二十日因患者肥甚外肉多緊不作腐潰予欲行鍼開放彼家堅執強阻豈後變證一出煩悶昏憒人事不省彼方驚悔臨用鈹鍼左右耳邊併項之中各開一竅內有膿腐處剪割寸許頑肉放出內積瘀毒膿血不止椀許內服健脾胃養氣血托裏補虛之藥其膿似泉流不歇每朝夕藥與食中共參六七錢服至腐肉脫盡新肉已生又至四十日外患者方得漸甦始知人事問其前由不知也此患設若禁用鍼刀不加帬補豈有生乎因其子見識道理從信予言未百日而痊

一婦人四旬肥甚項瘡五六日視之肉腫瘡不腫又兼口燥心煩堅硬色紫根腳散平六脈洪大此太過證也後必無膿相辭不治彼又請醫視之有言外托者又言內消者有稱年壯不妨又說脈大易治衆人紛紛不定仍各用藥又去七八日前後胃俱腫木悶堅硬仍復請視決之予曰此不治者何也初起肉腫瘡不腫頂陷者一也根腳平散眞氣內敗不能收束毒氣二也口燥心煩邪火內淫三也形色紫暗血死毒滯不作腐潰者四也六脈洪大瘡毒大盛正氣受尅無以抵當故瘡終變軟陷邪毒內攻而死者五也當備後事爲要此終於二十七朝前後足矣後果至期而歿於此言正理順之病可歎時人何爲紛紛妄治也

一男子項瘡五六日就肆看視頭便黃色根亦平散予曰此當急治方可彼面色不悅而去又請里中醫視之乃曰小恙也因喜其說用藥又至五日外其瘡勢堅硬根腳開大毒氣已過兩肩流注前項胃乳皆腫嘔吐惡心寒熱不食瘡勢形色俱覺可畏始信前言復請予治其瘡形狀不可觀也此非藥力可及先用葱艾湯洗盡舊藥連煮藥筒拔提二處拔出瘀血椀餘隨用銀鍼斜斜插入根腳透通患底數處以蟾酥條插入孔內此後解毒爲膿總以膏益走散處以

眞君妙貼散敷之日漸日消其毒收歸後項原處又發服內托降火化痰之藥三四日候其大勢已退內膿已通換服十全大補湯凡堅而不化者胎之腐而不痛者取之新而生遲者培之如此調理將近三月方得完口平復此爲患者諱疾忌醫之過幾乎至於喪命者多矣

一女人年過六旬係宦族素稟怯弱項間患疽初起頭便如粟謂裏可容穀之病也喜其形體不肥雖發之後必易於腐潰此則不妨前說先用隔蒜灸之次用蟾酥餅貼灸上四邊以吸毒散敷之收其根脚不散內服托裏消毒散數服瘡勢堅硬疼苦不止予曰到某日方止況今瘡不腐潰診其脈細數而無力此內虛之故不能解毒爲膿以疼爲要豈可得止次換益氣養榮湯加角鍼白芷三服腫亦漸起外用桑木灸法其堅漸軟膿出稠而不多前方去角鍼白芷加香附倍用參芪又數服方得膿潰後痛亦不止予曰再三日午後痛可止也至期腐肉將脫小半臨午用乳香定痛散一服午後疼痛頓退安睡不醒患家欣悅予曰不然此在用藥適其時也雖半月之言應於今刻惟信則不失耳後當某日腐盡某日肌平某日完口此三者患家以墨繩記候期日果實並無過與不及也此法要在服力精巧量病難易新腐遲速補助有無用藥合式然後相量日數可決於前發之必中也

一婦壯年項瘡三日其形徑對前口彼家相畏人胖不當瘡發此穴也予視頂高脚活雖發不妨彼欲內消之方妥予曰藥消則不能鍼消則可取彼從之用鈹鍼當頂鍼入六七分點至軟肉方住隨去瘀血又以蟾酥餘插入孔內服蟾酥丸得大汗而解次日瘡上微膿出之漸消尤恐內毒未盡又用消毒清熱之藥數服不出十日而安大抵凡欲消瘡先斷根本次泄毒氣使毒自衰無得內攻爲妙

一男子耳後生疽十餘日自謂小恙不治將近半月根脚漸大瘡頭惟流血水稀惡汚穢四邊紫黑軟陷無膿面慘鼻掀手冷氣促脈診散大無根此內敗證也何必治之辭不用藥又延客醫治之固詢無事患者恨予不治凡遇親友勉力支持厭聲自囑決不甘死予曰心不服死也再五日必死果然予常觀瘡但犯此證雖山岳之軀一敗無不傾倒

一男子項核腫痛拘急惡寒用荊防敗毒散二劑表證悉退餘核不消用散腫潰堅湯加川芎香附貝母十餘服其核漸消外以琥珀膏貼之月餘而安

一男人仲冬渡江暴發寒氣又值驚恐次日寒熱交作頭面耳項俱腫先以藿香正氣散二服寒熱亦止面腫漸消惟項間堅腫不退紅暈作痛此毒聚必欲作膿仍用正氣散加芎歸皂刺數服候膿熟針之膿痛頓退又以十全大補湯脾健肌生完口

一婦人孀居六載子幼未立憂鬱成核半年又兼罹水不調寒熱交作形體消瘦脈亦弦數此勞傷氣血肝火妄動而成斯疾也所謂損者益之不可用追蝕之藥損而復損先用逍遙散加香附牡丹皮貝母和其血脈和其肝氣使寒熱盡退次用益氣養榮湯服至月餘氣血漸復經事漸調元氣漸醒外用火針核上點破四孔用黃線藥插入五六次候至孔大換用冰蟬散搽於核上封之至十三日外其核自落外搽紅玉膏生肌收斂內換人參養榮湯加香附木香三十餘服其口自完此婦慎起居絕七情戒口味盡調理故可得愈否則必不能矣

一室女年十七因父擇壻不遂航至二旬懷抱日久項生數核堅硬如石此肝經凝結筋縮之病也又兼經水斷絕寒熱如瘧咳嗽脈數惟不顴紅此陰虛火動已成勞瘵證也非藥能愈視其形狀喜無敗色予曰欲治此病先治其心猶可痊父問曰何藥治心予曰非藥也易云天地氤氳萬物化醇男女媾精萬物化生此天地男女生成化育之道也斯病獨起於孤陰寡陽不生不化所謂逆理之病此女大失配謂當至而不至漸成失度之疾其病不生而自生非己作也由時變也故藥不能挽回必得陰陽和而雨澤降夫婦和而家道成斯時之後用藥方可彼父始悟隨即擇嫁三月後復請視之前證稍定先用逍遙散加香附青皮山梔丹皮貝母十餘劑開鬱疏肝寒熱漸止次以人參養榮湯加丹皮紅花通其血脈使心血易生容顏稍澤又用益氣養榮湯倍參朮培助脾胃增進飲食間用歸脾湯加麥冬五味遠志沙參收斂神氣寬慰性情又製參朮地黃膏服至半年精神頓復經事亦通惟核不能全退用火針點破一核琥珀膏貼之漸腐爲膿又兩月而斂餘腫三核漸針漸潰漸斂首尾純用補脾開鬱藥調理一年始得全愈

一男子年近三十項生數核面白神勞皮粗脈數此元氣受傷之證也先當補養氣血待根本壯實後治其瘡隨用養榮健脾藥十餘劑未效彼以爲綫又信

方士所惑以圖內消自服蜚蝨巴麝之藥連瀉十數行後致小便淋瀝不已虛熱更增飲食減少又復請視形色內敗不堪調理辭而不治彼後方悔雖請內醫強投扶助降火之藥終不應而死

一婦壯年性急夫蕩不爲家左項生核牛載漸至雞卵大堅硬如石皮外紅絲纏繞左右脈俱弦數弦屬肝火妄動數乃脾熱之甚先用梔子清肝湯平伐肝木五服後而脈始平又以清肝解鬱湯數服散其鬱結次用益氣養榮湯調其氣血間服散腫潰堅湯軟其堅腫外以琥珀膏貼之調理百日而元氣乃復堅硬已消八九止存小核未盡彼以爲愈止不服藥後又一載值夫賭訟未勝暴急驚恐前腫復作兩手脈弦細而多數此陰血虧損陽火乘之非前有餘證也又兼胃腸不利飲食無味經水先期過多形容憔悴不澤此神傷於思慮則肉脫意傷於憂愁則肢廢魂傷於悲哀則筋攣魄傷於喜樂則皮槁志傷於暴怒則腰脊不能俯仰以上俱七情內損證也法當滋養氣血調和脾胃益腎清心開鬱散滯庶保無虞彼不肯信仍前欲服散腫潰堅之藥欲灸腫上以圖內消余曰此非前比今則不敢治也請客醫自製前藥亦灸患上併灸肘尖此爲導氣虛而益虛邪氣實而益實後果反加發熱自汗痰嗽項強四肢不收灸瘡無膿血水不絕腫亦熾盛此藏腑已損之候必不久居也又月後傳爲氣急聲啞痰血交出而歿余嘗見庸醫不辨虛實患家不信正理偏聽服藥往往多致不救者十有八九凡醫者患者俱當省而愼戒之

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百九十卷目錄

醫部彙考一百七十

肩門

黃帝素問 金匱眞言論 平人氣象論 臟氣法時論 欬論 氣穴論 氣府論 氣交變大論

靈樞經 邪氣臟腑病形篇 經脈篇 經別篇 經筋篇 骨度篇 五邪篇 師傳篇 本臟篇 玉版篇 陰陽二十五人篇 邪客篇 論疾診尺篇 九宮八風篇

華佗中藏經 肩痛

寶漢卿瘡瘍全書 肩疽 上肩疽 下鼠疽 左右搭 左右串 癰疽發

李杲十書 肩痛

戴思恭證治要訣 作痛

樓英醫學綱目 痛屬火刑肺 肩疽

李梴醫學入門 左右搭手

王肯堂證治準繩 疼痛 肩疽 蓮子發 左右串 鉄盆疽 肩後疽

方 消毒散 內托定痛散 加味托裏散 參藥 加味麻黃桂枝湯 牛膠飲 白芷升麻湯 黃礬丸 十六味流氣飲 內疏黃連湯 烏金散 奪命丹 勝金丹 一粒金丹 仙方活命飲 人參養榮湯 十全大補湯

單方

鍼灸

醫案

藝術典第一百九十卷

醫部彙考一百七十

肩門

黃帝素問

金匱眞言論

西風生於秋病在肺俞在肩背

註 俞者經氣之所注也

秋氣者病在肩背

註 秋氣降收不能主持於皮膚肌腠之間故風氣入於俞

平人氣象論

寸口脈中手促上擊者曰肩背痛

註 中手促上擊者浮而搏擊應手也此陽邪不上不下故主在肩背之中也

臟氣法時論

心病者胷中痛脅支滿脅下痛膺背肩胛間痛兩臂內痛

註 手少陰心脈起心中上挾咽出脅下循臑內下肘中循臂內後廉手少陽小腸脈上手臂循臑內出肩解繞肩胛二經氣實故有是痛脅支滿者少陰之支絡滿痛於脅下也

肺病者喘欬逆氣肩背痛汗出尻陰股膝髀腨胻足皆痛

註 肺主氣而發原於腎腎爲本肺爲末母子之經氣相通是以足少陰之脈其直者從腎上貫膈入肺中循喉嚨挾舌本病則氣逆故喘欬也肺俞在肩背氣逆於上則肩背痛而汗出逆於下則尻陰胻膝皆痛也

欬論

腎欬之狀欬則肩背相引而痛甚則欬涎

註 腎脈貫膈入肺中故欬則肺俞相引而痛

氣穴論

肩解二穴

註 即肩井穴在肩上陷中屬足少陽膽經

肩貞二穴

註 肩貞穴在曲胛下兩骨解間肩髃後陷者中屬手太陽小腸經

氣府論

手太陽脈氣所發肩解各一

註 謂秉風二穴在肩上小髃後舉臂有空

肩解下三寸各一

註 謂天宗二穴在秉風後大骨下陷中

手陽明脈氣所發髃骨之會各一

註 謂肩髃二穴也在膊骨頭肩端上兩旁罅間陷者宛宛中舉臂取之

手少陽脈氣所發肩貞各一肩貞下三寸分間各一

註 肩貞二穴係手太陽小腸經在曲胛兩骨解間肩髃後陷中下三寸謂肩髎臑會消濼三穴肩髎當缺盆上突起肉臑會挾肩髎後大骨下胛上廉陷中消濼在肩下臂外間腋對肘分下

氣交變大論

歲火太過炎暑流行金肺受邪民病中熱肩背熱甚則脅支滿脅痛膺背肩胛間痛

註 諸戊之歲火運太過火勝則尅金故金肺受邪

肩背者肺之俞也若亢極則心火自傷膺胃之內心主之宮城也背爲陽心爲陽中之太陽故胃中膺背肩胛間痛手少陰心脈出脅下循臑內下肘中循臂內後廉是以脅支滿痛

歲金不及炎火迺行民病肩背臂重

註六乙之歲金運不及則所勝之火氣乃行肺俞在肩背故民病肩背臂重

金不及其告西其藏肺病內舍膺脅肩背外在皮毛

註膺胃之內肺之分也脅內乃雲門天府之分肺脈之所出肩背肺俞之分皮毛肺所出也

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

小腸病者小腹痛腰脊控睾而痛肩上熱

註小腸名赤腸爲受盛之腑其氣與膀胱相通是以腰脊控睾而痛手太陽之脈起於小指之端循臂出肩解此太陽之經脈病也

膀胱病者肩上熱

註肩上乃足太陽經脈之所循

經脈篇

肺手太陰之脈是主肺所生病者氣盛有餘則肩背痛風寒汗出中風小便數而欠氣虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色變

註氣之盛虛謂太陰之氣也肺俞在肩背因氣而痛於俞所謂氣傷痛也溺色變者氣虛不化也

大腸手陽明之脈起於大指次指之端循臑外前廉上肩出髃骨之前廉動則病肩前臑痛

註肩端兩骨間爲髃骨

小腸手太陽之脈起於小指之端出肩解繞肩胛交肩上動則病肘痛肩似拔臑似折

註脊兩旁爲膂膂上兩角爲肩解肩解下成片骨爲肩胛

膀胱足太陽之脈其直者循肩髆內挾脊抵腰中其支者從髆內左右別下貫胛

三焦手少陽之脈起於小指次指之端上貫肘循臑外上肩而交出足少陽之後

膽足少陽之脈循頸行手少陽之前至肩上却交出手少陽之後

手太陽之別上走肘絡肩髃

手陽明之別上循臂乘肩髃

經別篇

手太陽之正指地列於肩解

註指地者謂手之太陽下合於足太陽也

手陽明之正從手循膺乳別於肩髃

經筋篇

足太陽之筋上挾脊上項其支者結於肩髃其病脊反折肩不舉

手太陽之筋上繞肩胛其病繞肩胛引頸而痛

手陽明之筋其支者繞肩胛挾脊直者從肩髃上頸其病肩不舉

手太陰之筋下出缺盆結肩前髃

骨度篇

肩至肘長一尺七寸

五邪篇

邪在腎則病肩背頸項痛

師傳篇

五藏六腑者肺爲之蓋巨肩陷咽候見其外

本藏篇

白色小理者肺小粗理者肺大巨肩反膺陷喉者肺高合腋張脅者肺下好肩背厚者肺堅肩背薄者肺脆背膺厚者肺端正脅偏疎者肺偏傾也

註肺居肩膺之內脅腋之上故視其肩背膺腋即知肺之高下堅脆端傾

玉版篇

肩項中不便逆也

註太陽爲諸陽主氣肩項中不便陽氣傷也

陰陽二十五人篇

木形之人大肩背火形之人好肩背肩背肉滿土形之人美肩背金形之人小肩背水形之人小肩

邪客篇

地有高山人有肩膝

論疾診尺篇

肘後獨熱者肩背熱

註肘後乃手少陽之天井處蓋以兩手下垂上以候上下以候下前以候前後以候後也

九宮八風篇

風從北方來名曰大剛風其傷人也內舍於腎外在於骨與肩背之筋

漢華佗中藏經

肩痛

心病則胃中痛四肢滿腹肩背臂脾皆痛

肺脈虛則不能息耳重鼽乾喘欬上氣肩背痛

宋竇漢卿瘍全書

肩疽

病肩疽者因負重傷動肩井穴故生此疽用內托散加烏藥青皮木香外貼金絲膏

肩疽受在脅膀胱氣血疑滯不行結成疽毒也先用流氣飲內托散四圍以圍藥敷之多服消毒散內托定痛散

此毒因怒氣上攻於心酒後房事下傷於腎宜服加味托裏散如膿出盡時服內補散三四貼膿未盡時服排膿內托散小便赤澀用五苓散加黃連燈心服之其毒從小便出更服乳香護心散日進五服又服黃蘗丸日進三服

上肩疽下鼠疽

此毒因怒氣上攻於心酒後房事下傷於腎宜服加味托裏散胃腑滿悶加陳皮砂仁熱盛加小柴胡黃芩元參咳嗽加麥冬兜鈴五味杏仁桑皮口乾煩躁加麥冬前胡乾葛烏梅寒多加厚朴防風藿香再服黃蘗丸通氣散仍貼元武膏金絲膏如膿出盡時服內補散三四貼膿未盡時服排膿內托散小便赤澀用五苓散加黃連燈心服之其毒從小便出更服乳香護心散日進五服又服黃蘗丸日進三服

左右搭

此證少陽經少血有相火尤甚於厥陰發於左搭肩骨上生移動之處可治難安串於右搭肩者必難治也此證由於風變之來以脈斷之邪在表其證大小便如故飲食如常口能知味知其不在裏也不惡風只燥熱脈不浮知不在表若表裏既和則邪在經絡中疑於經絡其癰斯出身半已上風從受之故云八風之變法當却寒邪調和經絡中氣血則氣血通暢自愈

左右串

此證發於左搭肩骨上生在移動之處可治難安串於右搭肩必難治矣可用雞黃皮及綿絮焙乾爲末濕則乾摻乾則清油調搽

如證發於右搭肩骨上生在移動之處可治難安串於左搭肩者亦難治用藥搽摻依前左搭肩藥治之

癰疽發

凡兩肩下兩脅邊成癰疽因血虛而氣亦虛切不可服補陽之藥熱劑即補陽也倘受熱劑則虛熱愈盛易致傷骨膜切愼切愼宜服十六味流氣飲內疏黃連湯治法與發背癰疽同湯劑附子薄桂烏頭之類禁用

元李杲十書

肩痛

脈經風寒汗出肩背痛中風小便數而欠者風熱乘其肺使肺氣鬱甚也當瀉風熱以通氣防風湯主之如肩背痛不可回顧此手太陽氣鬱而不行以風藥散之

明戴思恭證治要訣

作痛

肩背痛未辨何證俱宜和氣飲每服加烏藥半錢

當肩背一片冷痛背脊疼痛古方用神保丸愈者此有積氣故也

其人素有痰飲流注肩背作痛宜星香散或導痰湯下五套丸更於嘔吐門停飲證選藥

有腎氣不循故道氣逆挾背而上致肩背作痛宜和氣飲每服加炒茴香半錢炒木椒十粒

有本體虛及病後心膈間痛或牽引乳脅或走注肩背此乃元氣上逆當引使歸元不可復下疏刷之劑愈刷愈痛發汗太多人患此者衆惟宜溫補拘於氣無補法之說誤矣經云汗者心之液又曰陽受氣於胃中汗過多則心液耗陽氣不足故致疼也

樓英醫學綱目

痛屬火刑肺

肩背痛屬肺分野病經云西風生於秋病在肺俞在肩背故秋氣者病在肩背又云秋脈太過爲病在外則令人逆氣背痛愠愠然是也

運氣肩背痛皆屬火攻肺病經云歲火太過民病肩背熱又云少陰司天熱淫所勝病肩背膺缺盆中痛又云歲金不及其病內舍膺脅肩背外在皮毛治以寒劑是也

肩疽

丁疽發兩肩惡血留結內外榮衛不通發成丁疽五日腫大令人口噤寒戰十二日可刺不治二十日死

陳乾疽腫發起兩肩及兩大臂胛骨二十日痛不息亦不可動五十日身熱不赤六十日可刺刺之無血者死

使榮疽腫起發肋及兩肩肘頭二十日不穴死九日可刺發赤白相間膿多可治全無赤白者不治

李梴醫學入門

左右搭手

生在肩下脊上乃因飲食感毒廣一尺深一寸雖潰在危內不穿膜不死急治脾胜中之毒內服護心散外用數藥始不奔心大要服藥裁之若過脊皆腫者不可救

右搭肩發骨上生者移動之處可治若串左肩難治左搭肩發骨上生者移動之處可治若串右肩難治二證內服托裏散加升麻桔梗外用去惡散或棉絮燒灰爲末摻之乾者麻油調搽

王肯堂證治準繩

肩背痛

按風寒汗出而肩背痛小便數者脈經既以瀉風熱之藥通肺氣之塞則寒熱氣不足以息而肩背痛小便遺失者當以人參黃芪之屬補肺氣之虛不言可知也

濕熱相搏肩背沉重而疼者當歸拈痛湯

肩疽

或問肩上生疽何如曰此處手足三陽交會之所名曰肩疽由風熱鬱結所致或因負重損傷而作服烏金散勝金丹活命飲加柴胡桔梗壯實者一粒金丹下之老弱者十全大補湯托之

蓮子發

或問肩胛內痛漸至潰爛成瘡何如曰此名太陰疽即蓮子發屬手太陰肺經積熱所致宜活命飲加桔梗黃芪奪命丹勝金丹黃芪木香散選用壯實者八陣散一粒金丹下之赤色者可治青黑者不治喘嗽大渴胃滿脈微者死

左右串

或問左右搭串何如曰左肩骨上生疽串於右者可治右肩骨上生疽串於左者難治古有此說愚請不然攻注左右者氣血不調陰陽交錯也宜勝金丹活命飲加羌活桔梗壯實者八陣散一粒金丹下之七惡證少何慮難瘥元氣虛憊治之何補哉

缺盆疽

或問一人年六十肩前陷中生疽寒熱大作飲食少進肩背拘急小水不利胃腹膨脹何如曰是名缺盆疽又名鎖骨疽屬足陽明胃經手少陽三焦經宜隔蒜灸先服紫金丹奪命丹而惡證退惟苦小水不利投以六一散而利後服十全大補湯而安若治之稍緩必致潰爛是經少血多氣痛口不合危篤者多矣

肩後疽

或問肩膊後骨上生疽何如曰此名上鳳疽即上搭也怒氣積鬱所致屬太陽兼少陽經初覺宜隔蒜灸活命飲加羌活桔梗柴胡勝金丹紫金丹奪命丹選用既潰十全大補湯黃芪木香散人參養榮湯

方

消毒散

人參　紫蘇葉　前胡　川芎　黃芩　桔梗　羌活　獨活　枳殼　白茯苓　甘草　防風　赤芍藥

右煎服

內托定痛散

治證同上

人參　黃芪　生地黃　白芷　川芎　赤芍藥　防風　赤茯苓　生甘草　烏藥　桂心　枳殼　桔梗　木香

右薑三片棗一枚不拘時服

加味托裏散

治肩疽

桔梗　厚朴　人參　白芷　黃芪　當歸身　官桂　川芎　荊芥穗　黃芩　烏藥　防風　連翹　香附　枳殼　花粉

右水煎服

胃腸滿悶加陳皮砂仁

熱甚加小柴胡黃芩元參

欬嗽加麥冬兜鈴五味杏仁桑皮

口乾煩躁加麥冬前胡乾葛烏梅

寒多加厚朴防風藿香再服黃蠟丸通氣散仍貼元武膏金絲膏

摻藥

治左右搭肩

雞黃皮焙　血竭　花蕊石　冰片

右爲細末濕用乾摻乾用清油調搽

加味麻黃桂枝湯

治形實色黑背生紅腫胛骨下痛脈浮數而洪緊食則嘔

苦夔仁一錢半　生附子　羌活　人參　青皮　白朮　山藥各一錢　半夏　生甘草節各六分　黃芪二錢

右水二鍾薑三片煎服冬加黃藥

牛膠飲

治搭肩截癰疽惡瘡險處服之使毒氣不攻於內不傳惡證

牛皮膠透明好者四兩

右用好酒一椀入磨內重湯煮令膠鎔透服或用酒煎米湯調和服之

白芷升麻湯

治證同上

官桂三分　白芷　紅花　當歸各一錢　升麻

桔梗各五分　甘草　生地各一兩　黃芩酒炒

黃芪　連翹　歸梢各二錢　生黃連一錢五分

右十三味水酒各一椀煎至半椀服之須睡井怡養心神不可妄想以動心火

黃礬丸

一名蠟礬丸治肩疽發背一切惡證服此能衛護內膜驅解諸毒

通明礬一兩爲末　黃蠟七錢

貴人加木香富人加沉香平人加紫蘇葉俱爲末鎔蠟下蜜一匙少溫入礬衆手拌勻丸如梧子大每服五十丸溫湯下日三服未破內消已破易合蠟性實大腸礬性解諸毒故用之也

十六味流氣飲

未成速消已成速退疼痛漸減前十二味名托裏內補散

人參　當歸身　官桂各五分　川芎　大腹皮

白芍藥　桔梗　黃芪　炙甘草　厚朴　木香

白芷　防風　烏藥　枳殼　蘇葉各一錢

右爲末每六錢酒調下不飲酒者木香湯代之米飲亦可輕重量人氣稟用之服藥後飲酒以助藥力

不退熱加茯苓白朮地黃

不進飲食加砂仁香附

疼痛加乳香沒藥

朮不乾加知母貝母

瘡不穿加皂角刺

大便閉加大黃枳實

欬嗽加陳皮枳殼半夏杏仁薑

小便閉加麥門冬車前子木通滑石瞿麥

內疏黃連湯

治一切癰疽嘔吐心逆發熱而煩脈沉而實腫硬瘡木而皮肉不變色根系深大病源在內臟腑祕結當急疏利

黃連　白芍藥　當歸　山梔仁　檳榔　木香

薄荷　連翹　茯苓　黃芩　桔梗　甘草各一錢

右除木香檳榔爲末外餘剉每一兩水煎八分入檳香二末和服之吃三服後加大黃一錢再加二錢以利爲度

烏金散

治疔毒腫痛肩疽因負重損傷而作

砒製　蟾酥　麝香各五分　血餘煅　蛇蛻煅

蜂房煅各一錢　蟬蛻酒洗　血竭　乳香炙

白殭蠶炒去絲各二錢　辰砂研水飛　雄黃研

穿山甲炙黃各二錢半　全蠍三錢湯泡七次

天龍四錢酒炙去頭足　牙皂四分　沒藥炙

川烏尖

右各爲細末稱準分兩和勻每服三分赤砂糖調葱頭酒送下取汗爲度

奪命丹

治諸般腫毒疔疽惡瘡

硃砂三錢　白礬枯　寒水石　銅綠　滴乳香

明沒藥　麝香各一錢　蝎牛三十一粒另研

蟾酥　輕粉各五分

右爲細末丸如菉豆大如不就加好酒糊每服一丸生葱三五莖嚼極爛吐於手心包藥在內熱酒和葱送下如重車行五七里汗出爲效重者再服

一二九

勝金丹

治證同前

麝香　白砒製各五分　雄黃　辰砂　乳香

沒藥　血竭各一錢半　全蠍泡炙　穿山甲炙

天龍去頭足炙各三錢　白殭蠶炙去絲五錢

蟾酥一錢

右爲細末勻每服三分赤砂糖調葱頭酒送下取汗爲度

一粒金丹

治證同前

沉香　木香　乳香各五分　巴豆霜一錢五分

各爲細末和勻用黑肥棗箇半去皮搗爛爲丸如芡實大每服一丸量人虛實先呷水一口行一丈胃氣壯實者只可呷水三四口不可太過後用水一口送藥下行盡數次以米飲補之

仙方活命飲

又名眞人活命飲治一切癰疽未成膿者內消已成膿者即潰又止痛消毒之聖藥也

滴乳香研　防風　香白芷　赤芍藥　當歸尾
貝母　沒藥研　皂角刺炒　天花粉　甘草節
穿山甲炮各一錢　陳皮　金銀花各三錢

右爲粗末大者四兩小者二兩作一劑無灰酒十茶鍾煎小五茶鍾入有嘴瓶內以厚紙封口勿令泄氣煎至三大鍾去渣作三次服接連不斷隨痛上下服能飲酒者服藥後再飲三五杯此藥並無酒氣不動臟腑不傷血氣忌酸薄酒鐵器服後側睡覺腫定囘生神功浩大不可臆度

人參養榮湯

治一切潰瘍并老弱人之病

白芍一錢半　人參　陳皮　黃芪蜜炙　桂心
當歸酒拌　白朮　甘草炙各一錢　熟地酒拌
五味子炒杵　茯苓各七分半　遠志去心炒五分

作一劑水二鍾薑棗煎服

十全大補湯

治證同前

人參　肉桂　生地酒洗蒸焙　川芎　白芍炒
茯苓　白朮　黃芪鹽水炒　當歸酒拌各一錢
甘草炙五分

作一劑水二鍾薑棗煎服

單方

肩疽巢菜莧用鹽醃過炒研酢和塗之（活幼口議）

頸肩臂背有大腫赤發即封之令不成膿用矾硝五兩香豉生地黃汁各半升三味合搗爛令地黃爛熟敷腫處厚二分日三四易至癒止兼治一切腫（千金方）

鍼灸

素問曰邪客於足太陽之絡令人頭項肩痛刺足小指甲上與肉交者各一痏立已不已刺外踝下三痏左取右右取左如食頃已

靈樞曰足太陽之筋其病小指支踵跟痛骨擧脊反折項筋急肩不擧腋支缺盆中紐痛不可左右搖治在矯鍼刃刺以知爲數以痛爲輸名曰仲春痹也

手陽明之筋起於大指次指之端結於腕上循臂上結於肘外上臑結於髃其支者繞肩胛挾脊直者從肩髃上頸其支者上頰結於頄直者上出手太陽之前上左角絡頭下右頷其病當所過者支痛及轉筋肩不擧頸不可左右視治在矯鍼刃刺以知爲數以痛爲輸名曰孟夏痹也

肥人厭肩腋項肉薄皮厚而黑色脣臨臨然其血黑以濁其氣懣以遲其爲人也貪於取與刺此者深而留之多益其數也

癰發於肩及臑名曰疵疽其狀赤黑急治之此令汗出至足不害五臟癰發四五日逞焫之

甲乙經曰肩痛不可擧天容及乘風主之

肩背髀痛臂不擧寒熱淒索肩井主之

肩腫不得顧氣舍主之

肩背髀不擧血瘀肩中不能動搖巨骨主之

肩中熱指臂痛肩髃主之

肩重不擧臂痛肩俞主之

肩重肘臂痛不可擧天宗主之

肩胛痛而寒至肘肩外俞主之

肩胛周痹曲垣主之

肩痛不可擧引缺盆痛雲門主之

肩肘中痛難屈伸手不可擧腕重急曲池主之

肩肘節酸重臂痛不可屈伸肘髎主之

肩痛不能自擧汗不出頸痛陽池主之

肩不可擧不能帶衣清冷淵主之

肩胛小指痛前谷主之

肩痛不可自帶衣臂腕外側痛不擧陽谷主之

肩痛欲折臑如拔手不能自上養老主之

肩背頭痠時眩撓泉主之

千金方曰氣舍主肩腫不得顧

曲池天髎主肩重痛不擧

天井主肩痛瘁痹不仁不可屈伸肉痿木

肩臭關衝肩髃主肩中熱頭不可以顧

巨骨主肩中痛不能動搖

支溝關衝主肩臂酸重

清冷泉陽谷主肩不擧不得帶衣

天宗主肩重臂痛

曲垣主肩胛周痹

後谿主肩臑痛
腕骨主肩臂痛
養老天盲主肩痛欲折
涌泉主肩背頸項痛
前腋主肩腋前痛與胷相引
天牖缺盆神道大杼天突水道主肩痛
巨骨主肩背痛
膈腧譩譆京門尺澤主肩背寒痓肩甲內廉痛
醫學綱目曰鍼灸肩背痛有二法其一取肺經云肺病者喘欬逆氣肩背痛汗出取其經太陰足太陽之外厥陰內血者又云肺手太陰之脈氣盛有餘則肩背痛寒少氣不足以息視盛虛熱寒陷下取之是也其二取腎經云邪在腎則病肩背頸項痛時眩取之湧泉崐崘視有血者盡取之是也
肩背痛連胛胛縫在背踹骨下直腋縫尖及臂取二寸半瀉六吸五樞二寸半瀉八吸
肩背胛痛崐崘懸鍾肩井
肩背頸項腋前痛與胷相引取湧泉一分見血妙前腋刺面上一寸
又法氣舍五分天窌灸曲池一寸半天井五分
肩背痛手三里主之
鍼灸肩痛有三法其一取手陽明經云大腸手陽明之脈所生病者肩前臑痛視盛虛熱寒陷下取之也其二取手太陽經云小腸手太陽之脈是動則病肩似拔臑似折視盛虛熱寒陷下取之也
其三取筋經云手太陰之筋病繞肩胛引頸而痛應耳中鳴痛手陽明足太陽之筋皆病肩不舉皆治在燔鍼刼刺以知爲數以痛爲輸也
肩不可動臂不可舉肩顒二寸半巨骨五分
清冷淵一寸關衝五分
肩端腫取肩顒二寸半瀉九吸腕骨七分先瀉後補兩胛痛取肩井二寸半不宜久停鍼支溝

醫案

儒門事親曰安撫初病時右肩臂膊痛無主持不能舉動多汗出肌肉瘦不能正臥臥則痛甚經云汗出偏沮使人偏枯予思內經云虛與實鄰決而通之又云畱瘦不移節而刺之使經絡通和血氣乃復又言陷下者灸之爲陽氣下陷入陰中肩膊時痛不能運動以火導之火引而上補之溫之已上證皆宜灸刺謂此先刺十二經之井穴於四月十二日右肩臂上肩井穴內先鍼後灸二七壯及至瘡發枯瘦處漸添肌肉汗出少肩臂微有力至五月初八日再灸肩井穴次於尺澤穴各灸二十八壯引氣下行與正氣相接次日臂膊又添氣力自能搖動矣時值仲夏暑熱漸盛以清肺飲子補肺氣養脾胃定心氣
薛氏醫案曰一男子肩患毒腫硬作痛惡證迭見用白礬末三錢糊丸以葱頭七莖煎湯調下腫痛悉退再服諸證亦退更以仙方活命飲二劑出水而消此祕方名千金化毒湯本礬末葱湯調服因末難服故易爲丸一方士治瘡疽不問腫潰先用此藥二三服後用消毒藥甚效常治芻蕘之人用此即退不用托裏藥亦愈蓋止熱毒爲患血氣不虧故也若金石毒藥發疽者尤效蓋礬又能解金石之毒也一方用礬末五錢硃砂五分熱酒下亦效此藥托裏固內止瀉解毒排膿不動臟腑不傷氣血有益無損其藥易得其功甚大偏僻之處不可不知此方或蟲犬所傷鎔化熱塗患處更以熱酒調末服皆效
上舍陳履學之內先從左肩下一點寒三日後右肩下發一白腫如甌中紅如酒盞自用消解凉藥一劑不散次投十宣散四劑加痛略紅次連投參芪丁桂防芷之劑膿潰後惡心嘔吐頭運不止厥逆寒戰鼓牙虛汗頂平膿清此投解散凉劑之誤急洗去圍藥投以參芪歸朮地黃薑附大劑一服原從左肩下舊寒一點先熱起又進一服遍腫浮熱腫高膿稠兼紝烏金膏數日出腐筋如脂膜大小數片日進前藥二服參芪投至八錢踰兩月始安愈後時以勞厥即投參芪歸朮薑附大劑乃甦
一男子肩患毒礬痛飲冷煩躁便祕脈數而實以清凉飲二劑少愈以金銀花散四劑悉退又以十宣散去桂加天花粉數劑瘡潰而痊此脈與證皆屬有餘也
一人肩患疽脈數以槐花酒一服頓退再以金銀花黃芪甘草十餘貼而平槐花酒治濕熱之功最妙速若胃寒之人不可過劑
一婦人患瘰癧不消膿清不斂予以八珍湯治之少愈忽肩背痛不能回顧此膀胱經氣鬱所致當以防風通氣湯治之蓋膀胱之脈始於目內眥上頂巔下

耳角復上項至腦後過風府下項走肩髆一支下腰脊是經氣動則脊痛項強腰似折按此非膀胱經證而何彼乃云瘰癧應經病也其脈主行項側即是經火動而然遂自服清肝降火之藥反致不食痛甚復請予診其脈胃氣愈弱先以四君子湯加陳皮炒芍藥半夏羌活蔓荊子四劑食進痛止繼以防風通氣湯二劑而愈

王喬年齡三十肩患毒以人參敗毒散一劑更以十宣散去參桂加金銀花天花粉四劑而潰因怒動肝火風熱上壅頭面赤腫煩痛飲冷以荊防敗毒散加芩連薄荷二劑不應急砭患處出黑血盡許仍以一劑勢退大半再進人參敗毒散四劑而愈夫病有表裏上下之殊治有緩急攻補之異若不砭刺毒氣結於肉理藥不能及煩腫日甚使投峻利之藥則上熱未除中寒已作必傷命矣

一男子患肩疽作渴脈數有力以黃連解毒湯三劑而止更以仙方活命飲四劑潰而愈

一婦人肩下患毒脈弦緊以白芷升麻湯二劑表證已退更以托裏藥潰之而愈

一男子肩下患疽已數日漫腫微痛頭甚多皆如粟許色不變不起發此氣血虛也診其脈果然先以仙方活命飲二劑殺其大勢更以托裏藥而起發瘡頭雖潰但流血水氣血尚虛不能爲膿也彼欲服太乙錠子予謂此藥止能攻毒不能托裏彼不深信仍服之至四次飲食不進瘡色黑陷吃逆不絕胃氣虛極也不治強投溫中健脾之劑不應而死

一婦人癸卯冬失物發怒缺盆內微腫甲辰春大如覆椀左肩胛亦腫肉色如故或鍼出鮮血三椀許腹痛如雖泄瀉不止四肢逆冷嘔吐惡寒或時發熱絕食已七日矣其脈洪大時或微細此陽氣脫陷也用六君加炮薑三錢附子二錢早服至午不應再劑加附子五錢熟睡覺來諸證頓退六七少進稀粥再四劑諸證悉退飲食如故缺盆始痛鍼出清膿二椀許諸證復至此虛極也以十全大補加薑桂附各一錢三劑而安後減乾薑桂附各五分與歸脾湯兼服五十餘劑而愈

外科正宗曰一男子六旬有二發生右搭先用艾灸漸次形勢高腫堅硬不痛十五日後尚未潰膿日生煩悶恐其毒陷先用針通隨行拔法拔出惡血鍾許已後稍得輕便搽上化腐之藥膏益用至三日其瘡漸作腐潰至二十日亦出正膿壞肉漸脫新肉漸生此外治之法盡矣因病家與內科一醫平交甚切托彼用藥內服而不遵外科補托之法自執己見不聽予言失於峻補每日人參不過二錢以爲足用予曰不及法當五錢兼熟附二錢方爲稱病不然必生變矣彼俱不信後果肉色淡白瘡口散大膿水清稀飲食減少此敗證具矣後雖強投溫中健脾大補之藥終則不應至於形體消削膿水臭穢延至六十日歷盡氣血而亡然後方自懊悔殊不知凡大瘡每日膿出一椀用參必至三錢以此爲則況本病出膿日有三椀用參二錢謂之大損小補豈不歸死又外科乃破漏之病最能走泄眞氣如損補兩不相敵無以抵當往往至於不救者多矣此爲不信於補而執俗見自取敗亡者也可惜

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百九十一卷目錄

醫部彙考一百七十一

腋門

黃帝素問 氣府論 至眞要大論

靈樞經 本輸篇 經脈篇 經別篇 經筋篇 骨度篇 營氣篇 營衛生會篇 寒熱病篇 本臟篇 衛氣篇 陰陽二十五人篇 邪客篇

實漢卿瘡瘍全書 左右痕

孫思邈千金方 狐臭漏腋

薛己醫案 瘰癧癰

徐春甫古今醫統 狐臭 腋漏

王肯堂證治準繩 所屬部分 瘰癧癰 腋發 夾肢癰

陳實功外科正宗 腋癰

方 散腫潰堅湯 石灰散 狐臭方 又方 又方 六物散 烏龍丸 收功後藥 祕傳奇方 擦體氣方 十香丸 五香丸 又方 龍膽瀉肝湯 三神散 蜘蛛散 淨腋湯 回陽玉龍膏 金箍散 內托黃芪柴胡湯 何首烏散 內補十宣散 人參養榮湯 十全大補湯 千金內托散 黃礬丸 鐵箍散 勝金丹 一粒金丹

單方

鍼灸

醫案

藝術典第一百九十一卷

醫部彙考一百七十一

腋門

黃帝素問

氣府論

足少陽脈氣所發腋下三寸脅下至胠八間各一

註 腋下謂淵腋輒筋天池脅下至胠謂日月章門帶脈五樞維道居髎共九穴曰八間者自腋下三寸至季肋間凡八肋骨也

手太陽脈氣所發曲腋上骨穴各一

註 謂臑俞二穴挾肩髎後大骨下胛上廉陷中舉臂取之

至眞要大論

太陽司天寒淫所勝則寒氣反至運火炎烈民病胷腹滿手熱肘攣腋腫病本於心神門絕死不治

註 太陽爲諸陽之首卽君火之陽也然本於在下之寒水今寒氣反從上而至是上下皆寒而太陽運居於中故曰運火炎烈夫寒臨於上如陽能勝之卽所謂凡傷於寒則爲病熱如胷腹滿手熱肘攣腋腫乃寒凌心火逼其火熱上炎水火寒熱交爭而神門脈絕心氣滅矣神門心之俞穴在手掌後銳骨端動脈應手所謂候脈之動氣則知其五臟之存亡矣

靈樞經

本輸篇

腋內動脈手太陰也名曰天府腋下三寸手心主也名曰天池

經脈篇

肺手太陰之脈起於中焦從肺系橫出腋下

註 胷旁肋下謂之腋

心手少陰之脈起於心中其直者從心系却上肺下出腋下

心主手厥陰心包絡之脈起於胷中其支者循胷中出脅下腋三寸上抵腋下是動則病心中熱臂肘攣急腋腫甚則胷脅支滿心中憺憺大動

註 厥陰是動則病心中熱臂肘攣急腋腫經氣之病於外也甚則胷脅支滿心中憺憺大動蓋甚則從外而內其有餘於內也

膽足少陽之脈其直者從缺盆下腋

經別篇

手太陽之正入腋走心繫小腸也

經筋篇

足太陽之筋起於足小指其支者從腋後外廉結於肩髃其支者入腋下上出缺盆其病肩不舉腋支缺盆中紐痛不可左右搖

註 肩不舉腋支缺盆中紐痛不可左右搖支筋之爲病也

足少陽之筋起於小指次指其直者上出腋貫缺盆出太陽之前

手太陽之筋起於小指之上循臂陰入腋下腋下痛腋後廉痛繞肩胛引頸而痛其病當所過者支轉筋

註 手太陽之筋起於手小指之少澤循臂肘肩項而上結於耳頷目眥之間其在筋之所過而結者爲痛爲腫爲筋痿

手太陰之筋起於大指之上上循內廉入腋下出缺盆結肩前髃

手心主之筋起於中指上臂陰結腋下其支者入腋散胷中

手少陰之筋起於小指之內側上入腋交太陰

骨度篇

角以下至柱骨長一尺行腋中不見者長四寸腋以下至季脇長一尺二寸

註肩胛上之頸骨爲柱骨肋下脇內爲腋自柱骨至腋中計長四寸脇骨之下爲季脇自腋以下至季脇計長一尺二寸

營氣篇

營氣從太陰出注手陽明上行注足陽明下行至跗上注大指間與太陰合上行抵髀從髀注心中循手少陰出腋下臂注小指合手太陽上行乘腋出頤內又循心主脈出腋下臂

營衛生會篇

上焦出於胃上口並咽以上貫膈而布胷中走腋

寒熱病篇

腋下動脈臂太陰也名曰天府

註腋下動脈手太陰也太陰統主陰陽之氣者也

本臟篇

合腋張脇者肺下

註肺居脇腋之上

衛氣篇

手太陰之本在寸口之中標在腋內動也手心主之本在掌後兩筋之間二寸中標在腋下下三寸也

陰陽二十五人篇

手陽明之下血氣盛則腋下毛美手魚肉以溫

邪客篇

地有深谷人有腋胭此人與天地相應者也

手太陰之脈上行臑陰入腋下內屈走肺

肝有邪其氣流於兩腋

宋寶漢卿瘡瘍全書

左右疽

左腋疽生於左腋下乳側間因喜怒不常或飲食之間忽然疼驚或忍氣而得之若不速治必成流注急服千金內托散竭毒流氣飲黃礬丸外用圓藥鐵箍散或金箍散敷治之

右腋疽生於血堂之間初起一小核日漸長大成疽急服內托散三五貼外用圓藥井服黃礬丸再服十奇散三五服方可用鍼刺破治法同前

唐孫思邈千金方

狐臭漏腋

有天生狐臭有爲人所染臭者天生臭者難治爲人所染者易治然須三年酢敷礬石散勿止并服五香丸乃可得瘥勿言一度敷藥即瘥即一敷藥時暫得一瘥耳凡狐臭人通忌食葷盡五辛食之終身不瘥

明薛己醫按

癭癰癰

有癰腫在項腋兩乳旁兩胯軟肉處者名爲癭癰癰此冷證無熱宜以內補十宣散與回陽玉龍膏參用小兒不可輕用附子恐生驚癇切不可更犯針刀薄血無膿芽肉難合宜以濕熱藥貼散內消倘犯針刀生芽肉宜以此藥收功倘用藥微疼略有驚癇宜用全蠍觀音散加減用之驚定藥如故又有小兒亦患宿疾失道者癰腫見於頸項臂脾胃背等處是爲冷極全在熱藥敷貼之功

徐春甫古今醫統

狐臭

腋屬足厥陰肝經之分肝氣鬱於內而出於腋其臭如狐又曰狐臭腋之下有竅肝氣盛則竅漘開而其氣泄於外蓋不可近實由肝經邪氣雖外搓以枯礬麝香僅療一時之急不終日而氣復如舊者何也此皆不知治本也治本者何內以疏其肝臟之邪則氣自息如瀉肝湯龍膽丸之類是也

腋漏

兩腋下并手足心陰股及囊常如汗濕污衣名曰腋漏六物湯主之

王肯堂證治準繩

所屬部分

腋謂臂下脅上際也屬手厥陰心包絡經丹溪云手足陰陽合生見證曰腋腫謂手厥陰足少陽也又屬足厥陰肝經靈樞曰肝有邪其氣留於兩腋腋前屬手太陰肺經腋後屬少陰心經腋下屬足厥陰肝經下六寸屬足太陰脾之大絡

癭癰癰

或問項腋兩乳旁結核或兩胯軟肉處生腫塊何如曰是名癭癰癰屬手少陽三焦經其發緩慢是冷證非熱證也宜用回陽玉龍膏熟藥敷貼服內補十宣散何首烏散勝金丹選用

腋發

鬼遺云內疚疽發兩腋下及臂并兩手掌中振寒熱血噬乾飲多卽嘔煩心悁悁脈盛六七八日診如此可汗不汗死

夾肢癰

或問肩髆下陳內生疽何如曰是名夾肢癰屬手少陰心經手厥陰心包絡風熱所致宜服內托黃芪柴胡湯壯實者八陣散一粒金丹下之及紫金丹勝金丹選用老弱者黃芪木香散人參養榮湯十全大補湯托之

陳實功外科正宗

腋癰

腋癰俗稱夾癰此肝脾二經爲患肝經血滯脾經氣凝其結爲腫初起皮色不變漫腫無頭日久方疼乃生寒熱此患難消終必作膿未破者柴胡清肝湯已破者十全大補湯去肉桂加香附陳皮軟腫脹痛者針之膏貼但此證首尾俱宜溫補忌用寒凉也

方

散腫潰堅湯

治手足少陽經腋窩分生癰疽腫毒馬刀瘰癧初起結硬如石堅而不潰或在足陽明經中所出或已破及流膿水諸證並皆治之其服藥多少須要臨病斟酌量病人飲食多少大便軟硬以意消息之

柴胡梢四錢　草龍膽酒炒　黃藥去粗皮酒炒　知母酒浸炒　苦蔞根酒洗　昆布洗去土　桔梗各半兩　甘草根炙黃　京三稜酒炒　廣莪术酒洗炒　連翹　當歸各三錢　葛根　白芍藥酒炒　川黃連各二錢　升麻六錢　黃芩梢八錢一半酒洗炒一半生用

右㕮咀每服六錢或七錢水二盞浸半日煎一盞去滓稍熱服脚高頭低臥每嚥一口作十次嚥服完依常臥取藥在胃中停留也另攢半料作細末蜜丸菉豆大每服百丸此湯留一口送下結核加海藻半兩炒食後量人虛實加減多少服皆倣此例

石灰散千金方下同

治狐臭

楓香一作沉香　丁香　薰陸香　青木香各二兩　礬石四兩　橘皮　陽起石各三兩　石灰一升

右八味治下篩以綿作椽子粗如指長四寸展取藥使著椽上以絹袋盛著腋下先以布揩令痛然後挾之

狐臭方

辛夷　芎藭　細辛　杜蘅　藁本各二兩

右五味㕮咀以醇苦酒漬一宿煎取汁數之欲敷取臨臥時以瘥爲度

又方

治狐臭

青木香　附子　白灰各二兩　礬石半兩

右四味爲散著粉中常粉之

又方醫學入門

礵砂五分　辰砂七分　白枯礬二錢　密陀僧　銅青　白附子各一錢

共爲細末用皂刺煎濃汁調搽兩腋下夜靜時先用皂刺煎水洗淨然後擦藥至一七又將大甘草一兩煎濃汁服之外用甘遂末四錢豬油調搽腋下一日夜拔出身內臭物再將枯礬一兩蛤粉五錢樟腦一錢爲末少許搽之永去病根

六物散

治漏腋腋下手掌足心陰下股裏常如汗濕汚衣

乾枸杞根　乾薔薇根　生甘草各二兩　胡粉　商陸根　滑石各一兩

右爲末以苦酒少許和塗當微汗出易衣更塗之不過三次便愈或次年又發依法再治愈

烏龍丸古今醫鑑下同

治腋氣神方

冰片分半　當歸酒洗　生地搗爛　枸杞子炒　石蓮肉焙各一兩　白茯苓去皮二兩　蓮蕊焙丁香　木香　青木香　乳香　京墨各五錢

右爲末用陳米飯荷葉包燒過搗爛入地黃爲丸如黃豆大麝香一分黃酒化爲衣每服三四十丸臨臥半饑半飽用砂仁二分炒入黃酒內送下婦人加烏藥三錢酢炒香附米三錢童便炒

收功後藥

人參　當歸　生地黃　滴乳香　沒藥　官桂　木香各一錢半　麝香八味俱用酒浸過　青皮　陳皮　白芷　良薑　麻黃　米殼　甘草各一錢

右剉水煎服出汗外用川椒枯礬各一兩爲末擦腋下終身忌鱖魚羊肉始不再發若去大小便不

可與女同厠

融傳奇方

治體氣

大田螺一箇　巴豆一枚去殼　膩粉一豆許

麝香少許

右將螺用木簽二日去泥土揭起螺蓋入粉豆麝在內以線拴住放磁器內次日化成水須五更時將藥以手自抹在腋下不住手抹藥直候腹內欲行臟腑却住手先要揀空地面去大便黑糞極臭是其驗也以厚土蓋之不可令人知之如不盡再以藥水抹之又去大便以日用後藥擦之永去病根

擦體氣方

枯礬一兩　蛤粉五錢　樟腦一錢

右爲末每以少許擦之

十香丸青囊良方下同

治腋氣舍化令人徧體俱香

沉香　木香　白檀香　零陵香　甘松去土　藿香　雞舌香　肉豆蔻去殼　白芷　細辛　莒蒿　檳榔　丁香各半兩　龍腦　麝香各一錢

右爲細末再研煉蜜和丸如芡實大每服一丸不拘時含化嚥津每日三五度

五香丸

治口臭及腋臭止腫痛散血氣

丁香　藿香　青木香　豆蔻子　白芷　當歸　桂心　零陵香各一兩　甘松　香附子各一兩　檳榔二枚

右爲細末煉蜜和丸如大豆日三夜一時含之嚥津五日口內香十日身香二七日衣被香三七日下風人聞香四七日淨洗手水落地香五七日把他人手亦香禁五辛臭氣之物

又方

治腋氣臭於狐狸者

枯白礬　黃丹各一兩　青礬　鐵粉　雄黃　臙粉各一錢

右爲細末每夜先以皂莢水洗後用唾津調藥塗之

龍膽瀉肝湯

治氣鬱熱腋氣及腋下多汗

龍膽草　生地黃　當歸酒洗　木通　車前子　澤瀉　甘草減半　梔子　黃芩各一錢

右水二鍾煎一鍾食後溫服

三神散直指方

擦腋氣

明礬　黃丹各一錢　麝香少許

右爲細末頻擦之

蜘蛛散三因方

治狐臭不可近

大蜘蛛一枚　輕粉一字

右以黃泥少加赤石脂并鹽杵爲窩子包裹蜘蛛於小火中煨乾漸加武火煅通紅候冷取蜘蛛細研入輕粉和米醋調膏臨臥浴洗淨方擦腋下來早洗下黑汁惡物爲效宜遠僻處埋之不可染人不可穿舊時衣服其舊衣俱重漿洗過

淨腋湯

治皮膚痒腋下瘡背上瘡耳聾耳鳴

麻黃去節　草豆蔻　防風　柴胡　黃芩酒洗　蒼术各一錢　桂枝　羌活各二錢　生甘草　桔梗　生地黃各五分　當歸梢七分　紅花少許　升麻半分　連翹一錢半

右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去查稍熱服

回陽玉龍膏

治腋生瘜癰

草烏頭三兩炒　軍薑二兩煨　香白芷不見火　赤芍藥　南星煨各一兩　肉桂半兩不見火

右爲細末用熱酒調塗

金箍散

治前證

川黃蘗刮去粗皮　芙蓉葉　紫花地丁各一斤　川白芨四斤　天花粉　白蘞各半斤

右爲極細末每用葱一把搗碎加蜂蜜少許再搗取汁調勻搽患處四向空中出毒乾再用餘汁潤之以助藥力蓋葱性能開腠理善走諸經發散風邪蜜乃百花之精潤肌竅解百毒與葱相反助諸藥力如葱汁不便夏月用蜜水冬月用蜜湯

內托黃芪柴胡湯

治腋癰

黃芪二錢　柴胡　土瓜根酒製　生地各一錢　羌活五分　連翹一錢二分　當歸尾七分半　肉桂　黃蘗酒洗各三分

右作一服酒一盞水三盞煎至一盞空心燕服一服愈

何首烏散

治瘰癧癰

何首烏 夏荊子 石菖蒲 荊芥穗 甘菊花 枸杞子 苦參去蘆 威靈仙各半兩

右爲細末每服三五錢食後溫酒調下或茶清或蜜水亦得日進二服

內補十宣散

治證同上

人參 當歸身 黃芪各二兩 川芎 防風 厚朴 桔梗 官桂 甘草 白芷各一兩

右爲細末每服二錢加至六錢止熱酒調下日數服以多爲妙不飲酒者用木香濃煎湯下然不若酒力之勝也許學士云此方得於都下異人濟苦者不可勝數陳無擇謂此藥在第四節服者非也早服中病者必消散

人參養榮湯

治夾脰癰并諸瘡潰後不能收斂或氣血原不足不能收斂若大瘡愈後多服之不變他病

白芍藥一錢半 人參 陳皮留白 黃芪蜜炙 桂心 當歸酒拌 白朮土炒 甘草炙各一錢 熟地黃酒拌蒸 五味子炒杵 茯苓各七錢半 遠志去心炒五分

右作一劑水二鍾薑三片棗一枚煎八分食前服

十全大補湯

治證同上若血氣不足之人結腫未成膿者宜加枳殼香附連翹服之自消

人參 肉桂 地黃酒洗蒸焙 川芎 白朮炒 白芍藥炒 茯苓 黃芪鹽水拌炒 當歸酒拌各一錢 甘草炙五分

右作一劑用水二鍾薑棗煎服

千金內托散

治腋疽

人參 當歸身 香白芷 厚朴 防風 黃芪 川芎 生甘草 官桂 黃芩 白朮

右水煎服

黃礬丸

大能衛護內膜驅解諸毒

遍明白礬一兩 黃蠟七錢

右將蠟銼化下蜜一匙少溫入礬衆手拌勻丸如桐子大每服五十九溫服下日三服未破內消已破易合蠟性實大腸礬性解諸毒故用之也貴人加木香富人加沉香平人加紫蘇葉俱爲末

鐵箍散

敷圍腫毒

貝母去心 白芷 蒼耳草灰酢拌曬乾各二兩

右爲細末水調或香油調貼瘡上或加龍骨二錢尤妙

勝金丹

治瘰癧癰井一切毒

麝香 白礬製各五分 雄黃 辰砂 乳香 沒藥 血竭各一錢半 穿山甲炙 全蠍泡炙 天龍去頭足炙各三錢 白殭蠶炙去絲五錢

蟾酥一錢

右爲細末和勻每服三分赤砂糖調葱頭酒送下取汗爲度

一粒金丹

治一切惡瘡癰腫無名腫毒

沉香 木香 乳香各五分 巴豆霜一錢五分

各爲細末糜杵分數和勻用黑肥棗箇半去皮搗爛爲丸如芡實大每服一丸量人虛實先呷水一口行一次胃氣壯實者只可呷水三四口不可太過後用水一口送藥下行盡數犬以米飲補之

單方

腋下狐臭用清水洗淨又用清酢漿洗淨微揩破取赤銅屑和酢熱揩之甚驗（外臺秘要）

又方胡粉常粉之或以胡粉三合和牛脂煎稠塗之（千金方）

又方漿水洗淨油調密陀僧塗之或用熱蒸餅一箇切開密陀僧摻末夾之（集簡方）

又方古文錢十文鐵線穿燒酢淬十次入麝香研末調塗（唐瑤良方）

又方以田蠃水搽之效（時珍）

又方用石綠三錢輕粉一錢研細濃酢調敷五次斷根（集元方）

又方瞻礬半生半熟入膩粉少許爲末每用半錢以自然薑汁調塗十分熱痛乃止數日一用以愈爲度（簡易方）

又方礬石絹袋盛之常粉腋下甚妙（許堯臣方）

腋下瘤癭用長柄苦壺盧燒存性研末搽之以消爲度

腋臭陰濕或作瘡青木香以好酢浸夾於腋下或爲末敷之（外臺秘要下同）

狐臭三年釅酢和石灰敷之

又方薑汁頻塗絕根

又方馬齒莧杵以蜜和作團紙裹泥固半寸厚日乾燒過研末每以少許和蜜作餅先以生布揩之以藥夾腋下令極痛久忍然後以手巾勒兩臂日用一次以瘥爲度（千金方）

又方槲箬三升切水煑濃汁洗畢即以白苦瓠殼烟熏之後用辛夷細莘杜蘅末酢浸一夜傅之

又方用桔枸樹鑿孔取汁一二椀用青木香東桃西柳七姓婦人乳一處煎一二沸就熱於五月五日雞叫時洗了將水放在十字路口速回弗顧即愈只是他人先遇者必帶去也桔枸樹即梨棗樹也（易簡方）

又方大田螺一箇入麝香三分在內埋露地七七日取出將患處洗拭以墨塗上再洗看有墨處是患竅以螺汁點之三五次即瘥

又方雞子兩枚煑熟去殼熱夾待冷棄之三叉路口勿回顧如此三次效（肘後方）

一方用蝙蝠一箇以赤石子末半兩塗遍黃泥包固驪乾煅存性以田螺水調塗腋下待毒氣上衝急服下藥行一二次妙（乾坤秘韞）

又方夜明砂末豉汁調

又方自己小便乘熱洗兩腋下日洗數次久則自愈（集簡方）

又方用自己唾擦腋下數過以指甲去其垢用熱水洗手數遍如此十餘日則愈

又方伏龍肝末頻傅之（千金方）

又方用銅礦石磨汁塗之（唐本草）

又方黃丹入輕粉唾調頻摻之（普濟方）

又方用鏡上綠同五倍子末等分爲末米泔洗後傅之（時珍）

鐵落裹以熨腋下療狐臭有驗（蘇恭）

又方水銀胡粉等分以面脂和頻摻之（千金方）

又方用龍眼核六枚同胡椒二七枚研遇汗出即擦之（時珍）

治腋漏方用絡石一名木饅頭煎湯洗腋及手足陰處再以密陀僧末敷之三日愈（綱目）

狐臭青礬枯白礬各一兩古文錢十四文白梅七箇搥碎於磁器內盛水一大盞浸半日先洗淨腋下將藥水時時塗之（奇效良方）

又方飛黃丹密陀僧枯礬以蒸餅蘸藥擦之（丹溪心法）

又方枯礬蛤粉輕粉密陀僧麝香各等分爲細末研勻每用少許擦之（奇效良方）

治陰汗鵶臭兩腋下臭不可與人同行白礬密陀僧黃丹各二錢半麝香五分於乳鉢內研如飛塵以酢於手心內調藥末搽腋下經兩時辰許却以香白芷煎湯洗之一日用一次

治腋下臭神效密陀僧四兩白礬枯過二兩輕粉三錢共爲細末擦兩腋下擦至半月見效一月全愈

又方密陀僧一兩白礬七錢硇砂麝香各少許右爲細末先用皂角煎湯洗後傅上

又方用白礬飛過不拘多少臨臥時以紙襯卓上伸手托壁柱上以藥乾揩令腋下十分熱痛兩腋揩徧先於日中將所著上截衣服用灰汁淨洗又泡去衣袖中臭氣皆無氣息如新衣方可著若洗氣息不斷枉用其藥大槩藥無不驗多是衣服再作氣故不能斷根

又方辛夷細莘芎藭青木香各四分四味治下篩熏竟粉之

又方五更時取精猪肉二大片以甘遂末一兩拌之挾腋下至天明以甘草一兩煎湯飲之良久瀉出穢物須在荒野之外恐穢氣傳人也依法三五次即愈其他密陀僧胡粉之類皆塞竅以治其末耳（回春）

患腋臭者耳內皆有油濕也用大田螺一箇水中養之候靨開以巴豆肉一粒鍼挑放在螺內仰頓盞內夏月一宿冬則五六宿自然成水取搽腋下絕根（丹溪心法）

又方先用胭脂塗腋下其出狐臭之處黃色就將前巴豆田螺去靨掩於狐臭之上絹帛勒緊其狐臭從大便出則絕根矣

腋氣除根方先用刀削去腋毛淨用白定粉水調搽

傳患處六七日後看腋下有一黑點如鍼孔大或如
簪尖大其氣由此而出也用筆點定卽用艾炷如米
大灸七枚灸過攻心中痛當用此方下之青木香丁
香各三分檳榔八分檀香一錢麝香少許大黃三錢
水煎服以下爲度不下再加大黃二錢又服
又方石灰三升銀屑一升一作銅屑二味合和絹囊
盛汗出粉之妙
又方正旦以尿洗腋下神妙
又方黃礬石燒令汁盡治爲末絹袋盛粉之卽瘥

鍼灸

素問曰腋癰大熱刺足少陽五刺而熱不止刺手心
主三刺手太陰經絡者大骨之會各三
靈樞曰癰發於腋下赤堅者名曰米疽治之以砭石
欲細而長疏砭之塗以豕膏六日已勿裹之其癰堅
而不潰者爲馬刀挾癭急治之
醫學綱目曰內經刺腋腫有二法其一取膽經云膽
足少陽之脈所生病者缺盆中腫痛腋下腫是也
其二取心經云心主手厥陰脈是動則病手心熱腋
腫皆視虛實寒熱陷下施補瀉疾留灸也

醫案

本草綱目曰一府校老嫗右腋生一瘤漸長至尺許
其狀如長瓠子久而潰爛一方士教以用長柄藥壺
盧燒存性研末搽之遂出水消盡而愈
薛氏醫案曰朱文鼎母因忿鬱腋下結一栲二十餘
年因怒加腫痛完穀不化飲食少思東垣云瀉利不
止飲食不入此腸胃虛也遂以六君子湯加砂仁肉
桂乾薑肉豆蔻瀉雖止而膿清瘡口不合氣血俱虛
也以十全大補湯月餘而愈
河南張承祖年踰二十腋下患毒十餘日腫硬不潰
脈弱時嘔予謂腫硬不潰脈弱乃陽氣虛嘔吐少食
乃胃氣弱先以六君子湯加藿香砂仁治之彼曰腫
瘍時嘔當作毒氣攻心治之潰瘍時嘔當作陰虛補
之予曰此丹溪大槩言也卽諸痛痒瘡瘍皆屬心火
如腫赤痛甚煩躁脈實而嘔爲有餘當下之腫硬不
潰脈弱而嘔爲不足當補之亦有痛傷胃氣或感寒
邪穢氣而嘔者雖腫瘍尤當助胃壯氣彼執不信飲
攻伐藥愈病復請診其脈弱微而發熱予謂熱而脈
靜脫血脈實汗後脈躁皆不治後果殺夫腫瘍毒氣
內侵作嘔十有一二潰瘍濕氣內侵作嘔十有八九
豈可混爲一途
一男子腋下患毒欬逆不食腸鳴切痛四支厥冷脈
細以托裏溫中湯二劑頓愈更以香砂六君子湯二
神丸而飲食頓進以十全大補湯十餘劑而斂
一童子腋下患癰不斂膿清脈大倦怠嬾食少寐自
汗口乾以內補黃芪湯及豆豉餅灸之兩月而愈凡
瘡膿潰而清或瘡口不合或聚腫不赤肌寒肉冷汗
出色脫者皆氣血俱虛也非補不可
證治準繩曰一人年逾五十腋下患毒瘡口不合右
關脈數而渴此胃火也用竹葉黃芪湯而止再用補
氣藥而愈嘗治午後發渴或發熱用地骨皮散
張通北人年踰四十夏月腋下患毒潰後不斂膿出
清稀皮寒脈弱腸鳴切痛大便溏泄食下卽嘔此寒
變而內陷也宜大辛溫之劑遂以托裏溫中湯二貼
諸證悉退更以六君加炮乾薑肉桂數劑再以十全
大補湯而愈

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百九十二卷目錄

醫部彙考一百七十二

脅門一

黃帝素問 臟氣法時論 脈要精微論 平人氣象論 五臟生成篇 熱論 刺熱篇 欬論 舉痛論 腹中論 厥論 奇病論 脈解論 氣穴論 繆刺論 四時刺逆從論 標本病傳論 氣交變大論 五常政大論 六元正紀大論 至眞要大論

靈樞經 邪氣臟腑病形篇 本神篇 經脈篇 經別篇 經筋篇 骨度篇 脈論 本臟篇 論勇篇 九宮八風篇 九鍼論 癰疽篇

扁鵲難經 積聚滿痛

張機金匱要略 痛滿

華佗中藏經 痛滿 死候

孫思邈千金方 痛屬肝實熱 滿屬肝虛寒

朱肱活人書 痛滿

寶漢卿瘡瘍全書 內丹 上下肋癰

成無己明理論 脈滿

張從政儒門事親 痛滿

李杲十書 痛滿 脅熱

朱震亨心法 脅鳴 痛滿

藝術典第一百九十二卷

醫部彙考一百七十二

脅門一

黃帝素問

臟氣法時論

肝病者兩脅下痛引少腹令人善怒

註 病者邪氣實也肝脈布脅肋抵少腹故兩脅下痛引少腹靈樞經曰肝氣實則怒蓋肝爲將軍之官而志怒肝氣鬱而不舒故也

脈要精微論

尺內兩旁則季脅也

註 尺內尺中也兩旁兩尺部之外旁也季脅兩脅之下秒也

平人氣象論

寸口脈沉而橫曰脅下有積腹中有橫積痛

註 脅下主身半之中腹中爲形身之裏寸口脈沉而橫是外邪入於裏陰之中故主脅下腹中有橫積也

五臟生成篇

腹滿䐜脹支鬲胠脅下厥上冒過在足太陰陽明

註 腹者脾胃之郛郭也腹滿䐜脹邪薄於太陰陽明之氣分太陰陽明之支絡貫鬲氣分之邪轉入於經是以連及支鬲胠脅皆脹滿也

熱論

三日少陽受之少陽主膽其脈循脅絡於耳故胷脅痛而耳聾

註 少陽之氣主樞主膽膽氣升則諸陽之氣皆升所謂因於寒欲如運樞也諸陽之氣從樞脅而出於膚表太陽主表陽明主肌少陽主胷脅胷脅痛而耳聾者病在氣而見有形之經證也

刺熱篇

顴後爲脅痛

註 言色逆於顴後是熱邪乘膽當爲脅痛

欬論

肝欬之狀欬則兩脅下痛甚則不可以轉

註 肝脈布脅肋上注肺故欬則兩脅下痛不可轉者不可以俛仰也

脾欬之狀欬則右脅下痛陰陰引肩背甚則不可以動動則欬劇

註 脾臟居右故欬則右脅下痛脾氣上通於肺肺之俞在肩背故陰陰引於肩背也

舉痛論

寒氣客於厥陰之脈厥陰之脈者絡陰器繫於肝寒氣客於脈中則血澀脈急故脅肋與少腹相引痛矣

註 肝主血故寒氣客於厥陰之脈則血澀脈急肝脈布脅肋循陰器故脅肋與少腹相引而痛

腹中論

帝曰有病胷脅支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭出淸液先唾血四支淸目眩時時前後血病名爲何何以得之岐伯曰病名曰血枯此得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來也

註 血虛脫則肝氣大傷胷脅支滿者肝虛而脹滿也食氣入胃散精於肝肝氣傷故妨於食肝臭臊肺臭腥肝肺兩虛是以病至則先聞腥臊臭也肺

氣虛出清液肝臟虛先唾血也不能充膚熱肉則四肢冷肝開竅於目故目眩也肝主疎泄時時前後血者肝無所藏而虛泄矣大脫血則傷肝肝傷在女子則月事衰少不來矣醉以入房在男子則傷精精傷則無從而化亦矣氣生於精血精血虛脫則氣竭矣

厥論

少陽之厥則暴聾脅痛

註少陽之脈循胷過季脅故逆則脅痛

奇病論

帝曰病脅下滿氣逆二三歲不已是爲何病岐伯曰病名曰息積此不妨於食不可灸刺積爲導引服藥藥不能獨治也

註肺主氣而司呼吸定息故肺之積曰息奔在本經曰息積積者漸積而成是以二三歲不已夫肝肺之積皆主脅下滿積在肝則妨於食此積在肺故不妨於食也此病腹中有形不可灸刺凡積當日用導引之功調和之藥二者並行斯病可愈若止用藥而不導引則藥不能以獨治也

脈解論

少陽所謂心脅痛者言少陽盛也盛者心之所表也九月陽氣盡而陰氣盛故心脅痛也

註九月少陰心臟主氣少陽爲君火之相故至九月而爲心之表其氣更盛然此時陽氣盡歸於下而陰氣正盛君相之火爲時所遏故心脅痛也

氣穴論

脹滿起斜出尻脈絡胃脅支心貫膈上肩加天突斜下肩交十椎下

註督之大絡名曰長强挾脊上項散頭上下當肩胛左右別走太陽入貫脅經脈滿則轉溢於大絡故督脈滿則斜出於尻脈蓋督脈之別斜出於尻絡胃脅也其絡支心貫膈上肩胛而與任脈交會於天突復斜下肩而與督脈交合於十椎下間故胃背相控而痛

繆刺論

邪客於足少陰之絡令人胃脅支滿邪客於足太陽之絡令人肩痛邪客於足少陽之絡令人脅痛不得息邪客於足太陽之絡令人拘攣背急引脅而痛

四時刺逆從論

少陽有餘病筋痹脅滿

標本病傳論

心病先心痛一日而欬三日脅支痛五日閉塞不通身痛體重三日不已死冬夜半夏日中

註心先痛者病先發於心欬者一日而之肺脅支痛者三日而之肝閉塞不通身痛體重者五日而之脾此皆逆傳其所勝是以三日不已而死心爲火臟冬之夜半者水勝而火滅也肺病喘欬三日而脅支滿痛一日身重體痛五日而脹十日不已死冬日入夏日出

註肺病喘欬者病先發於肺三日而之肝則脅支滿痛一日而之脾則身重體痛五日而之胃則脹再十日不已死夫冬氣收藏夏氣浮長日出氣始生之時日入氣收引之時肺主氣故終於氣之出入也

肝病頭目眩脅支滿三日體重身痛五日而脹三日腰脊少腹痛脛痠三日不已死冬日入夏早食

註病先發於肝則頭目眩脅支滿三日而之脾則體重身痛五日而之胃則脹三日而之腎則腰脊少腹痛三日不已死夏早食寅卯之時木氣絕而不生也冬日入者申酉之時金氣旺而木氣絕也

氣交變大論

歲木太過化氣不政生氣獨治民病反脅痛而吐甚衝陽絕者死不治

註化氣土氣也風木太過是以化氣不能章其政令生氣木氣也反脅痛而吐甚者淫極而反招損也食氣入胃散精於肝肝氣虛故吐甚也衝陽胃脈也木淫而土氣已絕故爲不治之死證

歲金太過燥氣流行肝木受邪民病兩脅下痛胃痛引背兩脅滿且痛引少腹甚則喘欬逆氣肩背痛收氣峻生氣下草木斂蒼乾凋隕病反暴痛胠脅不可反側欬逆甚而血溢

註諸庚之歲金運太過燥氣流行則肝木受病令人胃痛引背下則兩脅支滿肅殺太甚則金氣自虛而火氣來復也肺俞在肩背故肩背痛

歲木不及燥乃大行生氣失應民病中清胠脅痛

註中清者清凉之氣乘於中而中氣冷也脅痛肝木病也

木不及春有鳴條律暢之化則秋有霧露清凉之政春有慘凄殘賊之勝則夏有炎暑燔爍之復其眚東其臟胠其病內舍胠脅外在關節

註木不及則金當勝之如春有鳴條律暢之化則

秋有暮露清凉之政此各守四時之本位無勝無復乃氣之和者也如春有慘淒殘賊之勝則夏有炎暑爍鑠之復其災眚當主於東方其藏在肝其病內舍胠脅胠脅爲肝之分外在關節以肝主筋也

歲火不及寒迺大行民病胃中痛脅支滿兩脅痛膺背肩胛間及兩臂內痛脅下與腰背相引而痛甚則屈不能伸髖髀如別

註六癸之歲火運不及水反勝之故寒乃大行所謂寒勝爲痛痹也太陽主筋屈不能伸者其病在筋陽氣虛不能養筋故也太陽氣之爲病腰似折髀不可以曲膕如結踹如別是爲踝厥

火不及夏有炳明光顯之化則冬有嚴肅霜寒之政夏有慘淒凝冽之勝則不時有埃昏大雨之復其眚南其藏心其病內舍膺脅外在經絡

註水不勝火則火有明顯之德化矣無勝則無復冬得以章其寒肅之政令矣不時四時也埃昏大雨之復土復水也其災眚當主在南方其藏爲心其病內舍膺脅

金不及夏有光顯鬱蒸之令則冬有嚴凝整霜之應夏有炎燥焜燿之變則秋有冰雹霜雪之復其眚西其藏肺病內舍膺脅肩臂外在皮毛

註光顯鬱蒸火之化也膺胷之內肺之分也脅內乃雲門天府之分肺脈之所出肩背肺俞之分皮毛肺所主也

五常政大論

陽明司天脅痛目赤掉振鼓慄筋痿不能久立

少陰司天脅痛善太息

註少陰司天則陽明燥金在泉故地乃燥淒滄數至凡此皆肝膽之病也

六元正紀大論

少陽司天之政寅申之紀也壬寅壬申其病掉肢支脅驚駭

註壬主木運太過寅申少陽司天厥陰在泉運氣與太陽太角相同但其病少異蓋木與水土相合其病即在血分木與風火相合其病乃在氣分本經曰諸風眩掉皆屬於肝又曰東方肝木其病發驚駭

少陽司天之政氣化運行先天初之氣其病氣怫於上血溢目赤欬逆頭痛血崩脅滿膚腠中瘡

註初之間氣乃少陰君火血溢目赤欬逆膚瘡等證皆風火之爲也

少陰司天之政氣化運行先天終之氣燥令行病生皮腠內舍於脅下連少腹而作寒中地將易也

木鬱之發民病胃脘當心而痛上支兩脅膈咽不通飲食不下

火鬱之發民病脅腹胷背膺膺臆脹

土鬱之發甚則心痛脅膺嘔吐霍亂

註諸證皆感土氣而發

陽明所至爲脅痛皴揭

註此秋病之常也

至眞要大論

歲厥陰在泉風淫所勝民病瀧瀧振寒善伸數欠心痛支滿兩脅裏急飲食不下膈咽不通食則嘔腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重

註厥陰在泉寅申歲也脾是動則病瀧瀧振寒善伸數欠諸證脾氣病則飲食不下食則嘔腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體俱重蓋木淫而土病也

歲陽明在泉燥淫所勝民病喜嘔嘔有苦善太息心脅痛不能反側

註陽明在泉子午歲也嘔苦善太息心脅痛不能反側乃足少陽病

少陰司天熱淫所勝火行其政民病胷中煩熱嗌乾右胠滿皮膚痛尺澤絕死不治

註少陰司天子午歲也少陰之火發於陰中故爲怫熱民病胷中煩熱嗌乾右胠滿皮膚痛肺受火熱而津液不生也尺澤肺之合穴脈也肺氣已絕故死不治

厥陰司天風淫所勝民病胃脘當心而痛上支兩脅膈咽不通飲食不下病本於脾衝陽絕死不治

註厥陰司天巳亥歲也胃脘痛上支兩脅飲食不下皆脾經之病蓋風木淫勝故病本於脾衝陽足陽明胃脈在足跗上動脈應手胃氣已絕故死不治

陽明司天燥淫所勝民病左胠脅痛病本於肝太衝絕死不治

註陽明司天卯酉歲也左胠脅痛肝經之病心脅暴痛不可反側嗌乾面塵皆肝經之病蓋金淫於上故病本於肝

太陽司天寒淫所勝則寒氣反至民病腹脹心滯濕

大動胃脅胃脘不安病本於心神門絕死不治所謂動氣知其臟也

註寒氣反至者謂太陽爲諸陽之首卽君火之陽然本於在下之寒水今寒氣反從上而至是上下皆寒而太陽運居於中故曰運火炎烈夫寒臨於上如陽能勝之卽所謂凡傷於寒則爲病熱乃病反其本得標之病矣故治反其本得標之方此太陽從本從標寒熱更勝之氣也木火寒熱交爭而神門脈絕心氣滅矣神門心之俞穴在手掌後銳骨端動脈應手故所謂候脈之動氣則知其五臟之存亡矣

厥陰之勝肢脅氣并化而爲熱小便黃赤胃脘當心而痛上支兩脅

註肢脅氣并肝氣聚也化而爲熱小便黃赤木淫而生火也風木氣勝則脾胃受傷故風氣淫於上則胃脘當心而痛上支兩脅

太陰之勝火氣內鬱瘡瘍於中流散於外病在肢脅

註陰濕之氣淫於外則火氣內鬱而瘡瘍於中濕熱之氣流散於外則及於風木而病在肢脅

陽明之勝清發於中左肢脅痛

註金勝則木氣受虧故爲脅痛

陽明之復清氣大舉病生肢脅氣歸於左

註病生肢脅氣歸於左者金乘木也

厥陰司天主勝則胃脅痛

註胃脅痛者肝經之脈布胃脅也

少陰司天主勝則心熱煩躁甚則脅痛支滿

註主勝則心熱煩躁者君相二火之氣勝也甚則脅痛支滿者厥陰之初氣勝也蓋君火司歲故先火勝而甚則及於厥陰

少陰在泉主勝則厥氣上行心痛發熱脅中衆痹皆作發於肢脅魄汗不藏四逆而起

註主勝則厥氣上行心痛發熱者乃寒水之主氣上乘於在泉之君火也五之主氣乃陽明燥金客氣乃厥陰風木衆痹者各在其處更發更止更居更起以右應左以左應右脅中衆痹皆作發於肢脅乃陽明之氣乘於厥陰之經也四之主氣乃太陰濕土客氣乃太陽寒水汗乃陰液膀胱者津液之所藏四逆而起者土氣上逆也以土勝水是以津液不藏而汗出於表也

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

有所大怒氣上而不下積於脅下則傷肝肝脈微急爲肥氣在脅下若覆杯

本神篇

肝悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄不精不精則不正當人陰縮而攣筋兩脅骨不舉毛悴色夭死於秋

註悲哀肺之情也如肝因悲哀動中則傷肝臟所藏之魂魂傷則狂妄不精蓋肝者將軍之官謀慮出焉肝志傷則不能處事精詳矣膽爲中正之官決斷出焉臟氣傷則腑志亦不正而無決斷矣肝主筋而脈絡陰器陰縮筋攣脅骨不舉情志傷而及於形也

經脈篇

心主手厥陰心包絡之脈起於胸中循胸中出脅下支滿腋下三寸下腋內爲臂太陰陽明之間入肘中循臂下行至中指末端其支者復從掌中出次指第三節還出其端

註動則病胸脅支滿腋足少陽之脈是動則病口苦善太息心脅痛不能轉側是主骨所生病者缺盆中腫痛脅下腫馬刀俠癭汗出振寒瘧胸脅肋髀膝外至脛絕骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用

註是動則病口苦善太息心脅痛不能轉側少陽之氣不升卽少陽屬膽故主骨所生病者爲缺盆腋下胸脅髀膝脛踝皆痛乃足少陽經脈所循之部分而爲病也血脈留滯則爲馬刀俠癭陽加於陰則爲汗出陽逆於下則爲振寒少陽主骨故諸節皆痛也

肝足厥陰之脈挾胃屬肝絡膽布脅肋

脾之大絡名曰大包出淵液下三寸布胸脅

經別篇

足少陽之別入季脅之間

經筋篇

足少陽之筋起於小指次指其直者上乘肋季脅上走脅前廉其病卽上乘肋季脅痛

足陽明之筋上循脅屬脊

手心主之筋起於中指上臂陰結腋下下散前後挾脅

骨度篇

腋以下至季脅長一尺二寸季脅以下至髀樞長六寸

註肋下臑內爲腋脅骨之下爲季脅自腋以下至季脅計長一尺二寸捷骨之下爲髀樞一名髀厭在臀之兩旁卽足少陽之環跳穴處自季脅以下

至髀樞計長六寸

脹論

肝脹者脅下滿而痛引小腹膽脹者脅下痛脹口中苦善太息

本臟篇

肺高則上氣肩息欬肺下則居賁迫肺善脅下痛

註 肺主氣故高則上氣息肩而欬也賁乃胃脘之賁門在胃之上口下則肺居賁間而胃脘迫肺血脈不通故脅下痛脅下乃肺脈所出之雲門中府處也

肝小則臟安無脅下之痛肝大則逼胃迫咽迫咽則苦鬲中且脅下痛肝高則上支賁切脅悗爲息賁肝下則逼胃脅下空脅下空則易受邪肝堅則臟安難傷肝脆則善病消癉易傷肝端正則和利難傷肝偏傾則脅下痛也

註 肝居脅下故小則臟安而無脅下之痛肝居胃之左故大則逼胃而胃脘上迫於咽也肝在鬲之下故大則苦於鬲中且脅下痛肝脈貫膈上注肺故高則上支賁切脅悗爲息賁肝居胃旁故下則逼胃而脅下空空則易受於邪蓋脅乃邪正出入之樞部也肝堅則臟安難傷脆則善病消癉而易傷也肝藏血血舍魂端正則神志和利偏傾則脅痛也

脾大則苦湊胁而痛不能疾行脾高則胁引季脅而痛

註 脾居於腹在脅骨之秒故大則苦湊胁而痛脾主四支故不能疾行也脅在胁之上故高則胁引季脅而痛

脅偏疎者肺偏傾也

青色小理者肝小粗理者肝大廣胷反骹者肝高合脅兔骹者肝下胷脅好者肝堅脅骨弱者肝脆膺腹好相得者肝端正脅骨偏舉者肝偏傾也

註 骹者胷脅交分之偏骨內膈前連於胷之鳩尾旁連於脅後連於脊之十一椎肝在膈之下故廣胷反骹者肝高合脅兔骹者肝下兔者骨之藏伏也肝脈下循於腹之章門上循於膺之期門在內者從肝別貫膈故膺腹好相得者肝端正

論勇篇

怯士者脅下空

註 脅下空肝膽之體質弱也

九宮八風篇

風從東北方來名曰凶風其傷人也內舍於大腸外在於兩脅腋骨下及肢節

九鍼論

左脅應春分其日乙卯右脅應秋分其日辛酉

註 脅主外內出入之樞故主春秋二分

癰疽篇

癰發於脅名曰敗疵敗疵者女子之病也灸之其病大癰膿治之其中乃有生肉大如赤小豆剉薐葱草根各一升以水一斗六升煑之竭爲取三升則强飲厚衣坐於釜上令汗出至足已

註 脅在腋之下肺肝之部分也此亦發於皮膚故名曰敗疵夫肺主氣肝主血女子之生有餘於氣不足於血此因氣血不調而生故爲女子之病其病大癰膿治之者謂如治大癰之法以灸之也其中乃有生肉大如赤小豆是雖名敗疽而不至於腐肉爛筋傷骨矣薐乃水草葱連葱也剉二草根各一升煑之强飲厚衣坐釜上令汗出至足乃已蓋水草能清熱發汗葱能解毒也

扁鵲難經

積聚滿痛

十八難曰人病診在右脅有積氣得肺脈結脈結甚則積甚結微則積微

註 結爲積聚之脈肺脈見結知右脅有積氣右脅肺部也積氣有微甚脈從而應之

診不得肺脈而右脅有積氣者何也然肺脈雖不見右手脈當沉伏

註 肺脈雖不見結右手脈當見沉伏沉伏亦積聚脈右手所以候裏也

五十六難曰肺之積名曰息賁在右脅下覆大如杯久不已令人灑淅寒熱喘欬發肺壅以春甲乙日得之何以言之心病傳肺肺當傳肝肝以春適王王者不受邪肺復欲還心心不肯受故留結爲積故知息賁以春甲乙日得之

註 息賁或息或賁也右脅肺之部分肺主皮毛故灑淅寒熱或謂臟病止而不移今肺積或息或賁何也然或息或賁非居處無常如腑病也特以肺主氣故其病有時而動息爾腎亦主氣故賁豚亦然

漢張機金匱要略

痛滿

胃痹心中痞氣結在胸胃滿脅下逆搶心枳實薤白桂枝湯主之人參湯亦主之

跌陽脈微弦法當腹滿不滿者必便難兩脇疼痛此虛寒從下上也當以溫藥服之

寸口脈弦者即脅下拘急而痛其人喜嘔惡寒也腹中寒氣雷鳴切痛胸脅逆滿嘔吐附子粳米湯主之

脅下偏痛發熱其脈弦緊此寒也宜溫藥下之宜大黃附子湯

寒疝腹中痛及脅痛裏急者當歸生薑羊肉湯主之

肝中風者頭目瞤兩脅痛行常偃令人嗜甘

問曰病有積有聚有檠氣何謂也師曰積者臟病也終不移聚者腑病也發作有時展轉痛移爲可治檠氣者脅下痛按之則愈復發爲檠氣

水在肝脅下支滿嚏而痛

留飲者脅下痛引缺盆欬嗽則輒已

心下有痰飲胸脅支滿目眩苓桂朮甘湯主之

華佗中藏經

痛滿

肝脈實而微則爲不足病在內不及則令人胸脅脹滿大凡肝實引兩脅下痛喜怒虛則如人將捕之其氣逆則頭痛耳聾頰赤其脈沉而急浮而急亦然主脅支滿小便難頭痛眼眩其脈微急氣在脅下肝虛冷則脅下堅痛目眥痛發寒如瘧狀不欲食

膀正熱則面黃目赤脅痛滿

胃寒則腹中痛痛甚則腹脅脹滿吐嘔不入食當心上下不通惡聞食臭嫌人語振寒喜伸欠

肺有積則脅痛虛則力乏喘促右脅脹語言氣短上焦實熱則腹脹脅肋痛

死候

面色黑脅滿者不能反側者死

唐孫思邈千金方

痛屬肝實熱

兩脅痛息忿忿如怒狀名曰肝實熱也

滿屬肝虛寒

左手關上脈陰實者足厥陰經也病苦心下堅滿常

左手關上脈陰虛者足厥陰經也病苦脅下堅寒熱腹滿不欲飲食腹脹悒悒不樂婦人月經不利腰腹痛名曰肝虛寒也

宋朱肱活人書

痛滿

傷寒三四日胸脅痛而耳聾或口苦舌乾或往來寒熱而嘔其尺寸脈俱弦此足少陽膽經受病也太陽病不解轉入少陽脅下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱尚未可吐下其脈弦緊者小柴胡湯主之

病身涼汗出兩脅疼痛或乾嘔此十棗湯證也

大抵脅下痛者此爲有飲須分表裏乾嘔微利發熱而欬爲表有水小青龍湯加芫花主之身體涼表證罷乾嘔而脅下痛爲裏有水十棗湯主之十棗湯非小青龍湯之比須量人虛實不可妄投

宋漢卿瘡瘍全書

內丹

內丹者從脅下至腰下腫發赤色名曰內丹如早覺可治至暮便不可治其病多大小便不通似有不過三日而飛偏身青黑色而死用救急丹酢磨敷內丹處更服連翹敗毒散

上下肋癰

此證乃肝經寒熱不調風濕伏於腸胃結成癰毒發出皮膚惡證用敗毒流氣散後服內托流氣飲金成無己明理論

脹滿

傷寒胸脅滿何以明之胸脅滿者謂胸膈氣塞滿悶也非心下滿者也脅滿者謂肋下氣脹膨滿也非腹滿者也邪氣自表傳裏必先自胸膈以次經心脅而入胃邪氣入胃爲入腑也是以胸滿多帶表證脅滿者當半表半裏證也經曰下後脈促胸滿者桂枝去芍藥湯主之又曰太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黃湯是胸滿屬表而須發汗者也蓋胸中至表猶近也及脅者則更不言發汗但和解而已經曰設胸滿脅痛者與小柴胡湯又曰胸脅滿不去者小柴胡湯主之本太陽病不解傳入少陽者脅下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱脈沉緊者小柴胡湯主之是知脅滿屬半表半裏明矣大抵胸脅滿以邪氣初入裏未停留爲實氣鬱積而不行致生滿也和解斯可矣若邪氣留於胸中聚而爲實者非涌吐則不可已故華佗曰四日在胸吐之則愈是邪氣已收斂而不散漫者則可吐之內經曰其高者因而越之病在胸膈之上爲高越之爲吐也經曰病在胸中當吐之發汗若下之而煩熱胸中窒者則以梔子豉湯吐之若胸中痞鞕氣上衝咽喉不得息者此爲胸中有寒也則以瓜蒂散吐之二者均是吐劑梔子豉湯吐

胃中虛煩客熱也瓜蒂散吐胃中痰實宿寒也若能審明藥劑之輕重辨別邪氣之淺深對證投湯不爲放者未之有也

元張從政儒門事親

痛滿

夫一切沉積水氣兩脅刺痛中滿不能食頭目眩者可用茶調散涌吐冷涎一二升次服七宣丸則愈矣木香檳榔丸導飲丸亦妙不可用巴豆銀粉等藥癖積兩脅刺痛三稜廣茂之類甚者甘遂蠍梢

李杲十書

痛滿

肝木妄行胃脅痛口苦舌乾往來寒熱而嘔多怒四肢滿閉淋漓便難轉筋腹中急痛此所不勝乘上也足少陽膽經行身之側在太陽陽明之間病則往來寒熱口苦胃脅痛嘔宜和解且膽者無出無入又主發生之氣反陷入陰中也

如脅下痛或縮急乃脾胃虛弱也黃芪人參湯加柴胡二分或三分

如飲食勞倦傷脾胃致脅下痛或急縮者俱宜補中益氣湯加柴胡

如脾胃爲暑所傷致脅下急或痛甚俱宜清暑益氣湯加柴胡甘草

婦人先病惡寒手足冷全不發熱脈八至兩脅微痛治者便作少陽治之或曰是則然矣論猶未也無寒熱無脅痛當作何經治或者不敢對惡寒爲太陽脈八至且作陽治當不從標本從乎中也治此者少陽也若曰脈八至作相火亦少陽也兼又從內而之外也是又當先少陽也此不必論兩脅痛與不痛脈弦與不弦便當作少陽治之

或問曰傷寒雜證一體若誤下之甚者變大答曰非一體也傷寒誤下變無定體雜病誤下變有定體何以然傷寒自外而入陽也陽主動雜病自內而出陰也陰主靜動者犯之其變無窮靜者犯之其變止痞與腹脅痛而已故變無窮爲重痞與腹脅痛者爲輕也

脅熱

內傷手足不和兩脅俱熱知先少陽也從內之外者先有形也

兩脅肌熱脈浮弦者柴胡飲子

寅申發熱兩脅不盛亦爲柴胡證

朱震亨心法

脅鳴

胃脅間轆轤有聲此痰之爲患善治痰者不治痰而治氣氣順則一身之津液亦隨氣而順矣

痛滿

脅痛有肝火盛有木氣實有死血有痰流注有肝急之分

肝木氣實因怒大逆肝氣鬱甚謀慮不決風中於肝皆使木氣大實故火盛肝氣急也

木氣實用蒼朮川芎青皮當歸之類

痛甚者肝火盛以當歸龍膽丸薑汁下是瀉火之要藥

脅痛有死血因死血停留於肝攻於脅下而痛病則自兩脅甚按之益甚也

死血用桃仁紅花川芎

脅痛有瘀血行氣藥中加桃仁不去尖幷香附之類

痰流注以二陳湯加南星蒼朮川芎

肝苦急急食辛以散之用撫芎川芎蒼朮血病入血藥中行血

治痰嗽脅痛以二陳湯加南星香附青皮青黛入薑汁

有火盛者當伐肝木

左金丸治肝火脅痛

有氣鬱而胃脅痛者看其脈沉澁當作鬱治宜香附童便浸蒼朮米泔浸撫芎

痛而不得伸舒者蜜丸龍膽丸最快

控涎丹治一身氣痛脅痛痰挾死血加桃仁泥丸服

右脅痛用推氣散出嚴氏方

左脅痛用前藥爲君加柴胡或小柴胡亦可治

脅下痛發寒熱小柴胡

肥白人因氣虛而發寒熱脅下痛者補虛用參芪退熱用柴胡黃芩調氣止痛用青木香青皮

瘦人脅下痛發寒熱多怒者必有瘀血宜桃仁當歸紅花柴胡青皮大黃梔子草龍膽

嗽而脅下痛宜疏肝氣以青皮抉痰藥實者白芥子之類在後以二陳湯加南星香附青黛青皮薑汁

凡脅痛者多是肝木有餘也宜用小柴胡加青皮川芎芍藥草龍膽甚者煎成正藥入青黛麝香

痰流注者本方倍半夏加橘紅南星蒼白朮茯苓川芎之類氣實脈滑有力十棗湯最佳

瘀血作痛者小柴胡合四物湯加桃仁紅花或乳香沒藥煎服痛甚而元氣壯實者桃仁承氣湯下之而愈

性氣多怒之人時常腹脅作痛者小柴胡加川芎芍藥青皮之類煎服甚者以煎藥送下當歸龍薈丸其效甚速

青皮乃肝膽二經之藥人多怒脅下有鬱積固宜用此以解之若二經之氣不足則當先補血少用青皮可也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百九十三卷目錄
醫部彙考一百七十三
脅門二
戴思恭證治要訣 脅痛治法
樓英醫學綱目 運氣爲痛
王綸明醫雜著 脹痛
李梴醫學入門 痛分左右 左痛屬怒火死血 右痛屬食痰七情 兩脅痛 久痛不已 腹滿 脅生瘡癤
龔信古今醫鑑 痛證
方賢奇效良方 痛隨論
張三錫醫學準繩六要 痛屬肝膽
陶華六書 痛寒痛
王肯堂證治準繩 痛有左血右痰之分 脅痛
陳實功外科正宗 脅癰
吳崐醫方考 疼痛方論
喻昌醫門法律 痛痛
張介賓景岳全書 論痛證 治法
陳士鐸石室祕錄 痛滿治法
方一 加味小柴胡湯 枳殼煮散 芍藥湯 香橘湯 分氣紫蘇飲 推氣散 枳芎散 柴胡疏肝散 復元活血湯 破血散疼 挂枝散 大黃附子湯 當歸龍薈丸 柴胡疏肝散 復元活血湯 破血散疼 挂枝散 大黃附子湯 枳實散 瓜蔞薤白半夏湯 神朮散 檳榔湯 枳實導滯丸 木香檳榔丸 香連丸 神朮散 檳榔湯 枳實導滯丸 木香檳榔丸 香連丸 香附餅 枳殼散 調中順氣丸 枳實薤白桂枝湯 當歸生薑羊肉湯 附子粳米湯 答糍木甘湯 十棗湯 小柴胡湯 柴胡桂枝乾薑湯 小青龍湯 竹瀝半夏湯 補肝湯 橘皮通氣湯 恒山丸 又方 黃芪人參湯 補中益氣湯

明戴思恭證治要訣

脅痛治法

諸脅痛各有所感若止是冷氣作楚與顚仆閃挫宜和氣飲及烏藥順氣散或濃煎葱白湯下枳殼散左右脅有氣塊而痛者此是積聚停飲脅痛本事方薤丸最佳

曾有人脅痛連腦進諸氣藥并自大便導者其痛殊甚後用辛熱補劑下黑錫丹方愈此乃虛冷作痛愈疏而愈虛耳脅痛病在肝膽傷寒脅痛屬少陽經合用小柴胡湯痛甚而不大便者於內加枳殼若尋常脅痛不係正傷寒時身體帶微熱者本事方中枳殼煮散用枳殼桔梗細辛川芎防風各四分乾葛錢半甘草一錢若只是脅痛別無雜證其痛在左爲肝經受邪宜用川芎枳殼甘草其痛在右爲肝經移病於肺宜用片薑黃枳殼桂心甘草此二方出嚴氏濟生續集加減在人又有肝膽經停痰伏飲或一邊脅痛宜用嚴氏導痰湯痰結成癖間進半硫丸蓋枳殼乃治脅痛的劑所以諸方中皆不可少曾見潘子先說有人脅痛下青龍湯痛止衆嗽得可此其痛必在右脅故也灼然知是寒氣作痛枳實理中湯爲宜戴復庵云腹內諸般冷痛一箇枳實理中湯加減作無限用

樓英醫學綱目

運氣爲痛

運氣爲痛者鄉境皆病脅痛也其證有二其一風木助肝氣實而痛經云厥陰所至爲脅痛又云厥陰在泉風淫所勝民病兩脅裏急支滿又云少陽司天之政初之氣風勝乃搖候乃大溫其病脅痛治以凉劑得痊也

其二燥金攻肝虛而痛經云少陽所至爲脅痛又云陽明司天燥氣下臨肝氣上從脅痛又云少陰司天地乃燥凄滄數至脅痛善太息又云歲木不及燥乃大行民病中清胠脅痛治以温劑得痊也

王綸明醫雜著

脹痛

痰走於肝則眩運不仁脅肋脹痛吐利轉筋脅下痛厥弦者木尅土也用平胃散加木瓜或建中加柴胡木瓜

李梴醫學入門

痛分左右

左右者陰陽之道路也左肝陽血陰右肺陰氣陽實者肝氣實也痛則手足煩躁不安臥小柴胡湯加芎歸白芍蒼朮青皮龍膽草或單黃連丸虛者肝血虛也痛則悠悠不止目眩眩耳無聞善恐如人將捕之四物湯加柴胡梢或五積散去麻黃加青木香青皮虛甚成損脅下常一點痛不止者各乾脅痛甚危八物湯加木香青皮桂心有火去桂加山梔或吳萸水炒黃連

左痛屬怒火死血

大怒氣逆及謀慮不決或外感風邪皆令肝火動甚脅痛難忍古黃連丸當歸龍薈丸輕者小柴胡加黃

連牡蠣枳殼

瘀血必歸肝經夜痛或午發者是小柴胡湯合四物湯加桃仁紅花乳沒痛甚者古枳芎散便堅黑者桃仁承氣湯或瀉青丸皮痛吐血者熱傷肝也小柴胡湯加芎歸生地外用韭菜熨脅及琥珀膏貼

右痛屬食痰七情

食積脅下如杠梗起一條作痛神保丸枳實煎湯下輕者保和丸

痰飲流注肝經喘咳引痛者二陳加南星蒼术川芎柴胡白芥子或入青黛少許薑汁二匙痰甚者控涎丹如胃背脅痛噎急妨悶者瓜蔞實丸

飲水停滯脅下如撞痛者濃煎葱白湯調枳殼養散甚者用傷寒水證治法

七情凝滯如有物刺痛氣促嘔吐者分氣紫蘇飲流氣飲子調中順氣丸鬱氣挾食連乳痛者推氣散鹽煎散悲哀傷者枳殼養散四味枳實散一塊氣丸素有鬱者越鞠丸

兩脅痛

濕熱甚則兩脅痛當歸龍薈丸諸脅痛皆效如痛不可舒伸者用此丸二錢半加薑黃桃仁各五錢蜜丸或煎服

外感脅痛寒熱者小柴胡加枳梗

久痛不已

脅痛二三年不已者乃膠痰瘀結成積塊肝積肥氣肺積息賁發作有時雖皆肝木有餘亦不可峻攻宜枳术丸加官桂陳皮桔梗甘草蜜丸服或復元通聖散

脹滿

脅滿非腹中滿也乃脅肋下脹滿半表半裏之間多耳聾乾嘔寒熱往來默默不欲食少陽所主小柴胡湯和之如太陽未罷項强者小柴胡加乾葛陽明便閉舌胎者柴梗湯挾痰熱者柴梗半夏湯

脅生癰瘍

脅癰一樣忌補虛初起神效瓜蔞湯或柴胡清肝湯蓋胃脅肝心火盛虛中有熱決不敢投陽藥潰後方敢清熱托裏兼滋腎水誤投熱藥易傷骨髓慎之

脅癰用雞屎粘搗爛入鹽少許酢和敷之消膿止痛膿成者數之即安

龔信古今醫鑑

痛證

夫脅痛者厥陰肝經爲病也有內因外因之分治之當以散結順氣化痰和血爲主平其肝而導其氣則無有不愈矣

死血作痛用桃仁去皮留尖紅花酒拌焙乾川芎香附童便浸青皮水煎服

凡脅痛用青皮必須用酢炒過煎服末服並佳

方賢奇效良方

痛滿總論

素問臟氣法時論曰肝病兩脅痛引少腹善怒何謂也夫厥陰脈自足而上環陰器抵少腹又上貫肝膈布脅肋故兩脅下痛引少腹刺熱篇云肝熱亦令脅痛手足躁不得安臥熱論云肝熱之狀熱則兩脅下痛甚則不可以轉轉則兩胠下滿脾熱亦能右胠下痛陰陰引肩背胠亦脅也舉痛論寒氣客於厥陰之脈故脅引少腹而痛以歲運論之歲木太過金反勝之則脅痛歲火太過水反勝之胃中痛脅支滿痛歲金太過病兩脅下少腹痛木勝金復則胃脘暴痛下引少腹六元正紀曰木鬱之發民病胃脘當心而痛上支兩脅膈咽不通飲食不下至真要大論曰陽明在泉心脅痛不能反側繆刺篇云邪客於足少陽之絡令人脅痛不得息熱而汗出邪客足太陽之絡令人拘攣背急引脅而痛標本論曰心病先心痛一日熱傳肺三日肺傳肝脅支痛而滿肝病頭目眩脅支滿痛也且夫左右脅者陰陽之道路也故肝生於左肺藏於右以左屬肝而藏血肝陽也血陰也乃爲外陽而內陰也右屬肺而主氣肺陰也氣陽也乃爲外陰而內陽也或謂肝血蓄於左脅作塊而痛者爲肝積名肥氣也肺氣鬱於右脅痞硬而痛咳喘爲肺積名息賁也而脾所系於右其經濕勝故痰飲濕能令脅痛病則入於右左脅痛者多因蓄血而作右脅痛者悉是痰飲氣鬱病者豈可一槩而言哉論病之由當分外之六淫內傷外感與夫怒傷肝悲哀結飲食過度冷熱失調煩仆傷形者或因痰積流注於右與血相搏皆能爲痛張仲景論傷寒少陽耳聾脅痛甚者此是肝膽之氣鬱而作痛且脅痛之病諸經論之詳矣其脈弦濇者順洪大者逆治法當推其歲氣分其左右辨其氣血痰積量其形證虛實用藥施治無不取效而收十全之功矣

張三錫醫學準繩六要

痛屬肝膽

方書悉指脅痛屬肝因是然少陽膽經脈循脅絡耳

故傷寒邪在少陽則耳聾脅痛是也柴胡亦膽經藥常見口吐苦水脅痛寒熱用猪膽汁炒黃連入小柴胡屢驗是膽家有火也若夫謀慮不決不眠辛苦膽氣傷而作痛用歸芍人參麥冬茯神熟酸棗仁有火加元參乃膽虛而脅痛也

陶華六書

傷寒滿痛

傷寒胃腸滿者乃腹間氣塞滿悶也非心下滿脅滿者乃脅肋下脹滿也非腹中滿蓋證邪傳裏必先胃以至心腹入胃是以胃滿多帶表證宜微汗之惟脅滿多帶半表半裏小柴胡加枳桔和之胃中痰實者湧之如胃中結實燥渴大便祕者下之大陷胃湯可也

少陽證耳聾脅痛寒熱嘔而口苦是足少陽膽經受證假如先起惡寒身熱耳聾脅痛者本病已後嘔而舌乾口苦者標病緣膽無出入病在半表半裏之間止宜小柴胡一湯加減和解表裏治之再無別湯本方自有加減法此經有三禁不可汗下吐也若治之得法有何壞證常須識此宜當審焉

胃脅俱滿或脅下硬痛或嘔吐舌上白胎或不大便並屬小柴胡湯

傷寒五七日往來寒熱胃脅苦滿默默不飲食心煩喜嘔或脅下痞硬柴胡加牡蠣湯

王肯堂證治準繩

痛有左血右痰之分

或問脅痛從肝治復有可言者乎曰肝病內舍肢脅而脅痛也則何異於心肺內舍膺脅而痛者哉若謂肝實病而肢脅痛也則何異於肝木不及陽明所勝之肢脅痛者哉若謂由是厥陰肝經所過而痛也則何異於足少陽手心主所過而脅痛者哉若謂獨經脈挾邪而痛也則何異於經筋所過而痛者哉豈執一說而可已乎非察色按脈徧識各經氣變雖在一病之中而辨其異狀者卒不能也且夫左右者陰陽之道路也是故肝生於左肺藏於右所以左屬肝肝藏血肝陽也血陰也乃外陽而內陰也右屬肺肺主氣肺陰也氣陽也外陰而內陽也由陰陽互藏其左脅多因蓄血作痛右脅悉是痰積作痛其兩脅之病又可一槩而言乎若論其致病之邪凡外之六淫內之七情勞役飲食皆足以致痰氣積血之病雖然痰氣固亦有流注於左者然必與血相搏而痛不似右脅之痛無關於血也

脅疽

鬼遺云兩肋起疽名爲發肋初腫盛至十數日不穴攻即腫大如杯椀高如鏊背痛徹內腸絞刺左邊患應右邊痛右邊患應左邊痛唯有此處多是內毒却入攻而死者多人有斯患急以針刺出膿血則免內攻傷內矣

或問脅上生疽何如曰是名脅疽屬手厥陰心包絡足厥陰肝火熱毒怒氣相併而作活命飲加柴胡紫金丹烏金散選用壯實者八陣散一粒金丹下之此證宜速治不然潰爛不斂多致危困

內發丹毒

或問脅下至腰胯間腫痛赤色如霞何如曰此名內發丹毒治之稍緩毒攻於內嘔噦昏迷胃腹膨脹者死二便不通徧身青紫者死急砭出惡血服防風通聖散去白朮甘草紫金丹勝金丹汗之服汗劑得汗則生無汗則死嘔吐不食讝語者死

陳實功外科正宗

脅癰

脅癰多從鬱怒肝火發之者肥胖內實者鮮此證初起宜梔子清肝湯柴胡清肝湯解鬱瀉火已成者托裏消毒散加青皮香附膿已成者卽針之勿傷內膜已破八珍湯加丹皮山萸澤瀉兼滋腎水又虛勞所得者破流臭敗稀膿補托不應者必死

吳崑醫方考

疼痛方論

脅者肝膽之區也肝爲盡陰膽無別竅怒之則氣無所泄鬱之則火無所越故病證恆多今考名方三首示大槩爾

左脅作痛者抑青丸主之夫肝東方木也南面而立則左爲東矣故左脅爲肝之部位所以痛者木氣實也木欲實金當平之以黃連瀉去心火使金無所畏自足以平肝故曰抑青此古人實則瀉其子治之以其所不勝也

兩脅作痛者小柴胡湯主之蓋少陽膽經行於兩脅故兩脅作痛責之少陽是方也柴胡味辛而氣溫辛者金之味故足以平木溫者春之氣故足以入少陽佐以黃芩瀉其實也佐以半夏破其滯也而必用夫人參甘草者恐木病傳脾而先實其土也用夫生薑大棗者調其營衛不令經氣壅滯也

肝氣脅痛嚴氏推氣散主之蓋肝藏血而主怒故病

則氣血俱病越人云東方常實實則可以瀉矣故用枳殼破其氣黃芩利其鬱桂心能引二物至於痛處又曰木得桂而柔以故用之乃甘草者取其和緩之氣以調肝木之急耳

醫門法律 臣喻昌著

痛滿

金匱云趺陽脈微弦法當腹滿不滿者必便難兩脇疼痛此虛寒從下上也當以溫藥服之夫趺陽脾胃之脈而見微弦爲厥陰肝木所侵侮其陰氣橫聚於腹法當脹滿有加設其不滿陰邪必轉攻而上決無輕散之理蓋陰邪既聚不溫必不散陰邪不散其陰寂必不通故知其便必難勢必逆攻兩脇而致疼痛較腹滿更進一步也虛寒之氣從下而上由腹而脇纔見一班亟以溫藥服之俾陰氣仍從陰竅走散而不至上攻則善矣仲景所謂此虛寒自下上也當以溫藥服之苞裹陰病證治了無剩義蓋虛寒從下上正地氣加天之始用溫則上者下聚者散直捷痛快一言而終故卒病論雖亡其可意會者未嘗不宛在也

合論十棗湯甘遂半夏湯二方如傷寒病兩脅疼滿而痛用十棗湯下其痰雜病雖非傷寒之比而留飲內痛在脅則同況脈見沉弦非亟奪其邪邪必不去脈必不返所以用十棗湯不嫌其過峻也凡病之在脅而當用下者必倣此爲例也至甘遂甘草湯之治留飲徹妙元通非深入聖域莫能製之內經但曰留者攻之耳仲景於是析義以盡其變無形之氣熱結於胃則用調胃承氣攻之痞結於脅則用十棗湯攻之留結於腸胃之間則用甘遂半夏湯攻之法曰病在脈伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此爲留飲欲去故也甘遂半夏湯主之脈道爲留飲所隔伏而不行其證欲下利利反快似乎留飲欲去然雖欲去不能去也心下續堅滿可見留飲之未已及於腸留飲之根仍著於胃不剗其根飲必不去故立是方甘遂甘草大相反者合而用之俾其向留著之根盡力一剗得留者去而藥性已不存矣正內經有故無殞之義也又加白蜜同煎留戀其藥不致逆入無過之地其用半夏芍藥者由木入土中成其堅滿半夏益土芍藥伐木抑何神耶後世方書并甘草刪去神奇化爲朽腐製方立論皆中人以下之事矣竟何益哉

凡虛勞之證大抵心下引脅俱疼蓋滯血不消新血無以養之尤宜用地黃膏子加韭汁桃仁泥

發明金匱腹中寒氣雷鳴切痛胷脅逆滿嘔吐用附子粳米湯夫腹中陰寒奔迫上攻胷脅以及於胃而增嘔逆項之胃氣空虛邪無所隔徹入陽位則殆矣是其除患之機所重全在胃氣乘其邪氣初犯胃時尚自能食而用附子粳米之法溫飽其胃胃氣溫飽則土厚而邪難上越胷脅逆滿之濁陰得溫無敢留戀必還從下竅而出曠然無餘此持危扶顛之手眼也

景岳全書 臣張介賓著

論痛證

脅痛之病本屬肝膽二經以二經之脈皆循脅肋故也然而心肺脾胃腎與膀胱亦皆有脅痛之病此非諸經皆有此證但以邪在諸經氣逆不解必以次相傳延及少陽厥陰乃致脅肋疼痛故凡以焦勞憂慮而致脅痛者此心肺之所傳也以飲食勞倦而致脅痛者此脾胃之所傳也以色慾內傷水道壅閉而致脅痛者此腎與膀胱之所傳也傳至本經則無非肝膽之病也至於忿怒疲勞傷血傷氣傷筋或寒邪在半表半裏之間此自本經之病病在本經者直取本經傳自他經者必拔其所病之本辨得其眞自無不愈矣

脅痛有內傷外感之辨凡寒邪在少陽經乃病爲脅痛耳聾而嘔然必有寒熱表證者方是外感如無表證悉屬內傷但內傷脅痛者十居八九外感脅痛則間有之耳

脅痛有左右血氣之辨其在諸家之說有謂肝位居左而藏血肺位居右而藏氣故病在左者爲血積病在右者爲氣鬱脾氣亦係於右故濕痰流注者亦在右若執此說則左豈無氣右豈無血食積痰飲豈必無涉於左乎古無是說此實後世之謬談不足憑也然則在氣在血何以辨之但察其有形無形可知之矣蓋血積有形而不移或堅硬而拒按氣通流行而無迹或倏聚而倏散若食積痰飲皆屬有形之證自可辨識且凡屬有形之證皆由氣滯但得氣行則何聚不散是以凡治此者無論是血是痰必兼順氣爲主而後隨宜佐使以治之庶得肯綮之法無不善矣

治法

外感證邪在少陽身發寒熱而脅痛不止者宜小柴胡湯三柴胡飲或河間葛根湯之類酌宜用之

若外邪未解而兼氣逆脅痛者宜柴胡疏肝散主之
若元氣本虛陰寒外閉邪不能解而脅痛畏寒者非大溫中飲不可
內傷肝膽氣逆不順而脅痛者宜排氣飲推氣散沉香降氣散木香調氣散之類主之
若鬱結傷肝中脘不快痛連兩脅或多痰者宜香橘湯
若暴怒傷肝氣逆脹滿胃脘疼痛者宜解肝煎
若怒氣傷肝因而動火脅痛脹滿煩熱或動血者宜化肝煎
若氣滯胃脘痛而兼喘者宜分氣紫蘇飲
若男子憂鬱傷肝兩脅疼痛者宜枳實散
若男婦肝腎二經氣滯自下而上痛連兩脅者宜木通散
若悲哀煩腦肝氣受傷脈緊脅痛者枳殼養散
若因驚氣逆脅痛不已者桂枝散
若食積作痛但痛有一條扛起者是也大和中飲或用保和丸
若痰飲停伏胃脘疼痛者導痰湯加白芥子
若肝火內鬱二便不利兩脅痛甚者當歸龍薈丸或左金丸
若從高跌墜血流脅下停痛者復元活血湯
若婦人血滯脅腹連痛者芍藥散決津煎
若肝脾二經血虛或鬱怒傷肝致寒熱血痛者宜逍遙散
若肝腎虧損脅肋作痛頭眩心跳身痛或婦人經水不調經後作痛者補肝散

至於內傷虛損脅肋疼痛者凡房勞過度腎虛羸弱人多有胃脘間隱隱作痛此肝腎精虛不能化氣氣虛不能生血而然凡人之氣血猶源泉也盛則流暢少則壅滯故氣血不虛則不滯虛則無有不滯者倘於此證不知培氣血而但知行滯通經則愈行愈虛鮮不殆矣惟宜左歸飲小營煎及大補元煎之類主之或有微滯者用補肝散亦可
若憂思過度耗傷心脾氣血病有如前者宜逍遙飲三陰煎七福飲之類主之或歸脾湯亦可
若以勞倦過傷肝脾氣血而病如前者宜大營煎大補元煎之類主之

石室秘錄 臣陳士鐸著

痛滿治法

肝經之病兩脅脹滿吞酸吐酸等證乃肝木之鬱也宜用正治之法方用白芍五錢柴胡二錢炒梔子半夏蒼术甘草茯苓各一錢神麴炒五分丹皮三錢水煎服此方之妙妙在用白芍丹皮柴胡也蓋三味乃肝木專經之藥而白芍尤善平肝不去遠凌脾土土得養而木益舒木舒而氣爽痛自除吐漸止也病在左者如兩脅脹滿不可左臥者此病在肝也法宜專治肝矣今偏不治肝而兼治肺蓋肝木之旺由於肺金之虛金不能制木則木愈盛木盛則脾土更無所養肺金益虛則肝木益旺而病無已時也方用黃芩麥冬白芍當歸各三錢柴胡人參茯苓甘草各一錢陳皮五分水煎服一劑知二劑愈四劑全瘥蓋參芪乃補氣之味與肝木不相干也雖用柴胡舒肝然而柴胡亦是肺金主藥二味而兩用之白芍當歸雖專入肝經然亦能入肺所以同羣入肺以助氣而非逐隊以平肝此左病而治右之一法也
脅痛之證乃肝病也肝宜順而不宜逆逆則痛痛而不止則死矣故治脅痛必須平肝平肝必須補腎腎水足而後肝氣有養不必治脅痛脅痛自平也方用肝腎兼資湯熟地當歸各一兩白芍二兩甘草白芥子各三錢炒梔子一錢山茱萸五錢水煎服此方補肝爲君補腎爲佐少加清火消痰之味自然易於奏功一劑而痛定矣

方一

加味小柴胡湯 奇效良方

治傷寒脅痛

柴胡　黃芩各二錢　人參去蘆　半夏各錢半
牡蠣粉　枳殼麩炒　甘草各一錢

右作一服水二鍾薑三片紅棗二枚煎一鍾食遠服

枳殼煮散 本事方 下同

治悲哀煩惱傷肝氣至兩脅骨疼筋脈緊腰脚重滯兩股筋急兩脅牽痛四肢不能舉漸至脊膂急此藥大治脅痛

枳殼麩炒四兩先煎數沸　細辛　川芎　桔梗　防風各二兩　葛根一兩半　甘草一兩

右爲粗末每服四錢水一盞半薑棗同煎至七分去查空心食前溫服

芎葛湯

治脅下痛不可忍者

川芎　乾葛　桂枝　枳殼麩炒　細辛　芍藥

麻黃　人參　防風各半兩　甘草炙二錢
右作粗末每服五錢水二鍾生薑三片煎至七分去查溫服日三有汗避風

香橘湯（奇效良方下同）

治七情所傷中脘不快腹脅脹滿
香附子醋浸炒去毛　橘紅　半夏薑製各三錢
甘草炙一錢
右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾食遠服

分氣紫蘇飲

治肺壅脅痛
紫蘇葉　桑白皮　五味子　桔梗　草果仁
大腹皮　白茯苓　陳皮　甘草炙各一錢半
右水二鍾生薑三片鹽少許煎至一鍾空心服

推氣散（普生方下同）

治右脅疼痛脹滿不食
片薑黃　枳殼去瓤麩炒　桂心不見火各五錢
甘草炙二錢
右爲細末每服二錢薑棗湯調下食遠服

枳芎散

治左脅刺痛不可忍者
枳實　川芎各半兩　粉草炙二錢
右引同上酒調亦可

柴胡疏肝散（發明旨）

治肝氣脅痛
柴胡　陳皮酢炒各二錢　川芎　枳殼麩炒
芍藥　香附各一錢五分　甘草炙五分
右作一服水二鍾煎八分食前服

復元活血湯（發明）

治從高墜下惡血流於脅下及疼痛不可忍者
柴胡半兩　瓜蔞根　當歸尾各三錢　紅花
甘草　穿山甲炮各二錢　大黃酒浸炒一兩
桃仁酒浸去皮尖研如泥五十枚
右件除桃仁外剉如麻豆大每服一兩水一盞半酒半盞同煎至七分去滓大溫服之食前以利爲度得利痛或不止服乳香神應散鍼經云有所墜墮惡血留內若有所大怒氣上而不行下干脅則傷肝肝膽之經俱行於脅下宜以柴胡爲引用爲君以當歸和血脈又急者痛也甘草緩其急亦能生新血陽生陰長故也爲臣穿山甲瓜蔞根桃仁紅花破血潤血爲之佐大黃酒製以盪滌敗血爲之使氣味和合氣血各有所歸痛自去矣

破血散疼湯（東垣書）

治乘馬跌傷損其脊骨惡血流於脅下其痛苦楚不能轉側妨於飲食
羌活　防風　桂心各一錢　蘇木一錢五分
連翹　當歸尾　柴胡各二錢　麝香少許別研
水蛭三錢炒烟盡別研
右分作二服每服水一大盞酒二大盞除水蛭麝香別研如泥煎餘藥作一大盞去查上火令稍熱二味調入空心服

當歸龍脅丸（錢氏）

治肝火脅痛
當歸酒洗焙　草龍膽　山梔仁　黃連　黃蘗
條黃芩各一兩　生大黃　蘆薈　青黛各半兩
木香二錢半　麝香半錢另研
右爲細末煉蜜丸如小豆大小兒如麻子大生薑湯下二三十丸忌發熱諸物兼服防風通聖散

桂枝散（本事方）

治因驚傷肝脇骨裏疼痛不已
枳殼一兩小者　桂枝半兩
右爲細末每服二錢薑棗湯調下

大黃附子湯（仲景）

治感寒脇痛
大黃三兩　附子三枚炮　細辛二兩
右三味用水五升煮取二升分溫三服若強人煮取二升半分溫三服服後如人行四五里更進一服

枳實散（本事方）

治男子兩脅疼痛
枳實一兩　白芍藥炒　雀腦芎　人參各半兩
右爲細末薑棗湯調二錢酒亦可食前日三服

補肝散（錢氏下同）

治飲食不消脅肋痛脹
橘皮三分　山萸　桂心　薯蕷　天雄　茯苓
人參各五分　川芎　白朮　獨活　五加皮
大黃各七分　防風　乾薑炒　丹參　厚朴
細辛　桔梗各一兩半　甘草　菊花各一兩
貫衆半兩　陳麥麴　大麥蘗各一升
右爲末酒服方寸匕日二若食不消食後服若止痛食前服

補肝散

治肝腎二經氣血虧損脅脹作痛或脅脹頭眩寒熱發熱或身痛經不調

山茱萸肉　當歸　五味子炒杵　山藥　川芎　黃芪炒　木瓜各半兩　熟地　白朮炒各一錢　獨活　酸棗仁炒各四錢

右爲末每服五錢七水煎服

檳榔湯

治寒氣兩脅痛脹

檳榔二十四箇　附子七枚　母薑七兩　茯苓　橘皮　桂心各三兩　桔梗　白朮各四兩

右㕮咀以水九升煮三升去查溫服每服一升若氣喘者加芎藭三兩半夏四兩甘草二兩

脅痛方

治脅下風氣作塊寒疝發則連小腹痛攢心其積屬肝在右脅下故病發則右脅手足頭面昏痛不思飲食

乾葛一兩　麻黃去節五錢　附子一箇　川芎　防風　當歸　枳實炒　白芍藥　桂枝　羌活　甘草各四錢

右爲粗末每服四錢水一盞半生薑三片同煎至七分去查服日三有汗避風

薏苡仁丸

治脅痛如前兼去手足枯悴

薏苡仁一兩　石斛用細者二錢　製附子半兩　牛膝　生地黃各三錢　細辛　人參　柏子仁　枳殼　川芎　當歸各半兩　甘草　桃仁各一兩

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服三四十丸酒吞下食前日三服或以丸子食前煮散食後相兼服爲佳

沉香導氣散

治一切氣不升降脅肋痛塞

沉香二錢半　人參五錢　檳榔二錢半　白朮　烏藥　麥蘗炒　神麯炒　紫蘇葉　大腹皮炒　厚朴製各一兩　訶子皮炮半兩　香附炮兩半　薑黃　紅花　橘紅　廣茂炮　甘草生各四兩

京三稜　益智各二兩

右爲細末每服二錢食前沸湯點服

氣鍼丸（奇效良方下同）

治久積風塞心胃築痛兩脅心胃似有鍼刺六脈沉伏按之手不可近此藥屢試神驗常服疏滯氣止刺痛

木香　檳榔　青皮炒　陳皮　生大黃各四兩　牽牛取頭末半斤半生半炒

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸薑湯送下食前服量虛實加減

又方

治脅痛如打

芫花　菊花　薤葱花各等分

右用布囊蒸熱以熨痛上冷復易之

木通散

治男子婦人脅肋苦痛

木通去節　青皮去白　蘿蔔子炒　茴香炒

川楝子取肉用巴豆半兩同炒黃去巴豆各一兩　滑石另研　莪朮　木香各半兩

右爲細末每服三錢不拘時用葱白湯調服甚者不過三服

芍藥散

治婦人脅痛

香附子二兩醋一升鹽半兩同煮乾　白芍藥　延胡索炒　肉桂各一兩

右爲細末每服二錢不拘時白湯調下

白朮丸

治息積病脅下滿逆妨悶喘息不便呼吸引痛不可鍼灸宜導引服藥

白朮　枳實　官桂各一兩五錢　人參二兩　陳皮　桔梗酢炒　甘草炙各一兩

右爲細末煉蜜和丸如桐子大每服五十丸不拘時溫酒送下日三服

芎歸芍藥湯

治肝積氣滯左脅下遇發作手足頭面昏痛

川芎　當歸　白芍藥　桂枝　防風　枳實　羌活　甘草各一錢六分　乾葛四分　麻黃側子二分

右㕮咀分作二貼每貼用水二鍾生薑五片煎至七分去滓不拘時服有汗避風

乳香神應散

治從高墜下脅痛不可忍及腹中疼痛

乳香　沒藥　雄黑豆　桑白皮　獨科棗子各一兩　破故紙二兩炒香

右爲細末每服半兩酢一盞於砂石器內煎至六

分入麝香少許去滓溫服

琥珀膏

治脅下有塊

大黃　矾硝各一兩

右爲末大棗搗膏和貼

小龍膏丸　并治心法下同

治肝火盛脅痛

當歸身　草龍膽　梔子仁　川黃連　川芎

大黃各五錢　蘆薈三錢　木香一錢

右爲末入麝香少許粥丸菉豆大薑湯下五七十丸仍以琥珀膏貼痛處

沉香降氣散

治氣滯脅肋刺痛胃脘痞塞

薑黃　陳皮　甘草各一錢　三稜　蓬术並煨　益智　厚朴各七分　白术　紫蘇葉　香附子　神麴炒　麥芽　烏藥各五分　人參　訶子皮

大腹皮各二分半

右剉作一貼煎服

枳殼散　得效方

治脅痛如有物刺之乃氣實也

枳殼一兩二錢半　甘草炙二錢七分半

右爲末每服二錢以濃煎葱白湯調下

調中順氣丸　并治心法

治氣滯飲積脅下虛滿刺痛

半夏薑製　大腹子各一兩　木香　白豆蔻

陳皮　青皮　三稜各五錢　縮砂　檳榔　沉香各二錢半

右爲末粥丸梧子大陳皮湯下五七十丸

枳實薤白桂枝湯　仲景下同

治胃痹脅下逆搶心

枳實四枚　厚朴四兩　薤白半斤　桂枝一兩

苦蔞實一枚搗

右五味以水五升先煮枳實厚朴取二升去滓內諸藥煮數沸分溫三服

當歸生薑羊肉湯

治寒疝脅痛

當歸三兩　生薑五兩　羊肉一斤

右三味以水八升煮取三升溫服七合日三服若寒多者加生薑一斤痛多而嘔者加橘皮二兩白术一兩加生薑者亦加水五升煮取二升二合服之

附子粳米湯

治寒脅逆滿

附子炮一枚　半夏　粳米各半升　甘草一兩

大棗十枚

右五味以水八升煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

芩桂术甘湯

治痰飲胷脅支滿目眩

茯苓四兩　桂枝　白术各三兩　甘草二兩

右四味以水六升煮取三升分溫三服小便則利自差

十棗湯

治太陽病心下痞鞕滿引脅下痛乾嘔短氣此屬水氣

芫花熬　甘遂　大戟　大棗十枚擘

右三味等分各別搗爲散以水一升半先煮大棗肥者十枚取八合去滓內藥末強人服一錢匕羸人服半錢平旦溫服之若下少病不除者明日更服加半錢得快下利後糜粥自養

小柴胡湯

治陽明少陽病胷脅滿者

柴胡半斤　半夏半升洗　黃芩　人參　甘草生薑切各三兩　大棗十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

柴胡桂枝乾薑湯

治少陽汗下後胷脅滿小便不利渴而不嘔頭汗出寒熱心煩者

柴胡半斤　桂枝　乾薑　黃芩　牡蠣各三兩　苦蔞根四兩　甘草炙二兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服初服微煩再服汗出便愈

小青龍湯

治傷寒表不解心下有水氣胷脅痛滿者

麻黃去節　芍藥　桂枝　乾薑炮　甘草炙　細辛各三兩　五味子　半夏湯洗各半升

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升

若微利者去麻黃加蕤花如雞子大熬令赤色

若渴者去半夏加苦蔞根三兩

若噎者去麻黃加附子一枚炮
若小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩
若喘者去麻黃加杏仁半升去皮尖

竹瀝瀉熱湯 千金方下同

治肝實熱兩脅痛

竹瀝十升　麻黃　大青　梔子　升麻　元參
白茯苓　知母各三分　生葛　石膏各八分
生薑　芍藥各四分

右十二味㕮咀以水九升煮取二升半去滓下竹瀝煑兩三沸分三服須利下芒硝三分去芍藥加生地黃五分刪繁方無石膏生薑芍藥生葛用人參三分

補肝湯

治肝虛寒兩脅滿

山茱萸　甘草　桂心各三兩　桃仁　柏子仁
細辛　茯苓　防風各二兩　大棗二十四枚

右九味㕮咀以水九升煮取五升去滓分三服千金翼無山茱萸桃仁有烏頭蕤仁

橘皮通氣湯

治筋實極則欬欬則兩脅下縮痛痛甚則不可轉側

橘皮四兩　白朮　石膏各五兩　細辛　當歸
桂心　茯苓各三兩　香豉一升

右八味㕮咀以水九升煑取三升去滓分三服

恆山丸

治脅下邪氣積聚往來寒熱如溫瘧

蜚蠹六銖　蜀漆　恆山　白薇　桂心　鼈甲
鮀甲　白朮　附子　䗪蟲　貝齒各一兩半

右十一味爲末蜜丸如梧子大以米泔淸服五丸日三

又方

治冷氣脅下往來衝胷膈痛引脅背悶者

當歸　桂心　人參　甘草　吳茱萸　白芍藥
大黃各二兩　茯苓　枳實各一兩　乾薑三兩

右十味㕮咀以水八升煑取三升半分三服日三

治尸疰亦佳外臺仲景無茯苓枳實

黃芪人參湯 東垣十書下同

治脾胃虛脅下痛或縮急

黃芪一錢如自汗過多更加一錢　升麻六分
人參　橘皮畱白　麥冬　蒼朮無汗更加五分
白朮各五分　黃蘗酒洗　炒麴各三分　炙草
當歸身酒洗各二分　五味子九粒

右件同㕮咀都作一服水二盞煎至一盞去查稍熱服食遠或空心服之忌酒濕麪大料物之類及過食冷物

補中益氣湯

治飲食勞倦傷脾胃致脅下痛或縮急者

黃芪病甚勞役熱甚者一錢　甘草炙各五分
人參三分 有嗽去之　當歸身二分酒焙乾或日乾
橘皮畱白　柴胡　升麻各二三分　白朮三分

右件藥㕮咀都作一服水二盞煎至一盞量氣弱氣盛臨病斟酌水盞大小去查食遠稍熱服如傷之重者不過二服而愈若病日久者以權立加減法治之

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百九十四卷目錄

醫部彙考一百七十四

脅門三

方二　古黃連丸　腫痞散　瀉青丸　柳青丸　控涎丹　柴胡清脅湯　勻氣丸　痧保丸　三柴胡飲　大溫中飲　搏氣飲　解肝煎　化肝煎　左歸飲　小營煎　大補元煎　逍遙飲　三陰煎　七福飲　大營煎　敗毒散　大和中飲　決津煎　連翹敗毒散　氣飲　內托復氣散　紫金丹　活命飲　八珍湯　梔子清肝湯　一粒金丹　防風通聖散　勝金丹　托裏消毒散

單方

鍼灸

導引

醫案

藝術典第一百九十四卷

醫部彙考一百七十四

脅門三

方二

古黃連丸（入門下同）

一名左金丸治肝火氣從左脅起

黃連六兩　吳萸一兩

右二味爲末水丸或蒸餅丸菉豆大白湯下

瀉煎散

治男婦形寒飲冷右脅心腹疼痛

當歸身　川芎　白芍藥　三稜　莪朮　青皮　枳殼　白茯苓　厚朴　神麯　麥芽　小茴香　木香各等分

右每服四錢葱白一根食鹽少許水煎服冷痛加官桂

瀉青丸

治肝經鬱熱兩脅因怒作痛

龍膽草三錢　當歸身　川芎　山梔仁　大黃　羌活　防風各五分

右爲末蜜丸芡實大每一二丸竹葉薄荷煎湯化下

抑青丸（丹溪心法）

治肝火脅痛

黃連半斤

右爲末蒸餅糊爲丸

控涎丹

治一身及兩脅走痛痰挾死血者

甘遂麵裹煨　大戟製　眞白芥菜子炒各等分

右爲末加桃仁泥糊丸如梧子大每服五七丸漸加至十九臨臥薑湯下

柴胡清肝湯

治肝火壅盛并脅生癰疽

川芎　當歸　防風　生地黃　柴胡　黃芩　山梔仁　天花粉　牛蒡子　連翹　白芍藥　甘草各一錢

水二鍾煎八分食遠服

勻氣丸（醫學綱目下同）

專治脅痛

山梔　熟地　茯苓　細辛　桂心　川芎各等分

右研爲末加羊脂煎服

神保丸

治心膈痛腹痛血痛腎氣脅下痛大便不通氣噎宿食不消

木香　胡椒各二錢半　巴豆十枚去皮心膜研乾蠍七枚

右四味共爲末湯浸蒸餅爲丸如麻子大亦用硃砂爲衣每服五九心膈痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑湯下血痛炒薑酢湯下腎氣脅下痛茴香酒下大便不通蜜湯調檳榔末一錢下氣噎木香湯下宿食不消茶酒任下

三柴胡飲（景岳全書下同）

三爲木數從肝經血分也治外感寒熱脅痛者

柴胡二三錢　當歸二錢（酒潤者易熟地）　芍藥一錢半　炙甘草　陳皮各一錢　生薑三五片

右水一鍾半煎七八分溫服

如微寒欬嘔者加半夏一二錢

大溫中飲

治元氣本虛陰邪未解而脅痛畏寒者

熟地三五七錢　白朮（冬用）　當歸各三五錢（腹滿者代以山藥）　炙甘草一錢　人參二三錢甚者加至一兩　肉桂　乾薑炒熟各一二錢（或相機生薑三五七片代之亦可）　柴胡二三四錢　麻黃一二三錢

右水二鍾煎七分去浮沫溫服或略蓋取微汗

如氣虛加黃芪二三錢
如寒甚陽虛者加製附子一二錢
頭痛加川芎或白芷細辛
陽虛氣陷加升麻
如肚腹泄瀉宜少波柴胡加防風細辛亦可
排氣飲
治內傷肝膽氣逆不順而脅痛者
陳皮 薑香 枳殼各一錢五分 厚朴一錢
木香七分或一錢 香附 烏藥 澤瀉各二錢
右水一鍾半煎七分熱服
如氣逆之甚者加白芥子沉香青皮檳榔之屬
如嘔而兼痛者加半夏丁香之屬
解肝煎
治暴怒傷肝胃脘脹痛者
陳皮 半夏 厚朴 茯苓各一錢半 蘇葉
芍藥各一錢 砂仁七分
右水一鍾半加生薑三五片白芥子一錢煎服
化肝煎
治怒氣傷肝因而氣逆動火致爲煩熱脅痛脹滿
動血等證
青皮 陳皮 白芍藥各二錢 丹皮 梔子炒
澤瀉各錢半 下部見血易甘草 土貝母二三錢
右水一鍾半煎七八分食遠溫服
如大便下血者加地榆小便下血者加木通各一
錢五分
如兼寒熱加柴胡一錢
如火盛加黃芩一二錢
如脇腹脹痛加白芥子一錢
脹滯多者勿用芍藥
左歸飲
此壯水之主劑也治房勞過度腎陰虛損胃脇隱
隱作痛者
熟地二三錢或至一二兩 山藥 枸杞各二錢
炙甘草一錢 茯苓一錢半 山萸一二錢 長服少用
右水二鍾煎七分食遠服
如腎熱骨蒸多汗者加地骨皮二錢
陰虛不寧者加女貞子二錢上實下虛者加牛膝
二錢以導之
小營煎
治證同上
當歸 白芍藥酒炒 山藥炒 枸杞子各二錢
熟地二三錢 炙甘草一錢
右水二鍾煎七分食遠溫服
如氣滯有痛者加香附一二錢引而行之
大補元煎
治證同上
人參少則用一二錢多則用一二兩 山藥炒
杜仲各二錢 熟地少則用二三錢多則二三兩
枸杞 當歸各二三錢 澁瀉者去之 炙甘草一二錢
山茱萸一錢 長服吞酸者去之
右水二鍾煎七分食遠溫服
如元陽不足多寒者加附子肉桂炮薑之類隨宜
用之
如氣分偏虛者加黃芪白朮如胃口多滯者不必
用
如滑泄者加五味故紙之屬
逍遙飲
治憂思傷脾而脇痛者
當歸二三錢 芍藥 茯神各錢半 陳皮八分
熟地三五錢 棗仁炒二錢 遠志製三五分
炙甘草一錢
右水二鍾煎七分食遠溫服
如婦人經水過期兼痛滯者加酒炒香附一二錢
三陰煎
治證同上
當歸二三錢 熟地黃三五錢 炙甘草一錢
芍藥酒炒 棗仁炒各二錢 人參隨宜
右水二鍾煎七分食遠服
如嘔惡者加生薑三五片
汗多煩躁者加五味子十四粒
汗多氣虛者加黃芪一二錢
如有脹悶加陳皮一錢
七福飲
治證同上
人參 熟地各隨宜 當歸二三錢 白朮炒一錢
半 炙甘草一錢 棗仁炒二錢 遠志製三五分
右水二鍾煎七分食遠溫服或加生薑三五片
大營煎
治勞倦傷肝脾氣血而脅痛者
當歸二三錢或五錢 熟地三五七錢 枸杞子
杜仲炒去絲各二錢 炙甘草 肉桂各一二錢

牛膝一錢半
右水二鍾煎七分食遠溫服
如氣虛者加人參白朮
中氣虛寒嘔惡者加炒焦乾薑一二錢
大和中飲
治食積脅痛
陳皮一二錢　枳實一錢　砂仁五分　山楂肉
麥芽各二錢　厚朴　澤瀉各一錢半
右水一鍾半煎七八分食遠溫服
脹甚者加白芥子
胃寒無火或惡心者加炮乾薑一二錢
疼痛者加木香烏藥之類
多痰者加半夏
決津煎
治婦人血滯脅腹連痛者
當歸二三錢　芍藥　茯神各錢半　陳皮八分
熟地三五錢　棗仁炒二錢　遠志製三五分
炙甘草一錢
右水二鍾煎七分食遠溫服
如經水過期兼痛滯者加酒炒香附一二錢
連翹敗毒散
治內丹并一切腫毒
當歸　連翹　黃芩　生甘草　麥門冬　木通
柴胡　前胡　黃連　生地
右薑二片棗一枚水二鍾煎服
敗毒流氣飲（卷端全書下同）
治上下肋癰

紫蘇葉　桔梗　枳殼　防風　柴胡　生甘草
川芎　白芷　白芍藥　當歸　羌活　白茯苓
烏藥　陳皮
右薑三片棗一枚煎服
內托流氣飲
治前證
人參　黃芪　厚朴　生甘草　紫蘇葉　桔梗
枳殼　白芍藥　當歸身　防風　烏藥　白芷
川芎
右薑三片棗一枚食前服
紫金丹
一名神仙解毒萬病丸又名追毒丸又名玉樞丹
治一切癰疽腫毒
文蛤淡紅黃色者搥碎洗淨三兩　麝香三錢
山慈姑去毛皮洗淨二兩　紅芽大戟洗淨兩半
續隨子去殼研細以紙包壓去油再研一兩
右各另爲細末和勻以糯米粥和合於木臼中杵
千餘下每料分作四十錠於端午重陽七夕合如
欲急用辰日亦得勿令婦人孝婦不具足人及雞
犬之類見之合宜珍重否則無效
活命飲
治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者即潰又止
痛消毒之聖藥也
滴乳香研　防風　白芷　貝母　赤芍　花粉
當歸尾　明沒藥研　皂角刺炒　穿山甲酥炙
甘草節各一錢　陳皮　金銀花各三錢
右爲粗末大者四兩小者二兩作一劑無灰酒十

茶鍾瘡小五茶鍾入有嘴瓶內以厚紙封口勿令
泄氣煎至三大鍾去查作三次服接連不斷隨瘡
上下服能飲酒者服藥後再飲三五杯此藥並無
酒氣不動臟腑不傷氣血忌酸薄酒鐵器服後倒
睡覺痛定回生神功浩大不可臆度
八珍湯
治發癰已潰諸證調和榮衛順理陰陽滋養氣血
進美飲食和表裏退虛熱爲氣血俱虛之大劑也
川芎　白芍藥　當歸　熟地黃　人參　白朮
茯苓各一錢　甘草炙五分
右水二鍾薑三片棗二枚煎八分食前服
梔子清肝湯
治少陽經盧肝火風熱上攻遂成脅癰或寒熱甚
胃滿口苦舌乾
牛蒡子　柴胡　白芍藥　石膏　當歸　川芎
山梔　丹皮各一錢　黃芩　黃連　甘草各五分
右水二鍾煎八分食後服
一粒金丹
治一切惡瘡癰腫無名腫毒
沉香　木香　乳香各五分　巴豆霜一錢五分
右爲細末照秤分數和勻用黑肥棗箇半去皮搗
爛爲丸如芡實大每服一丸量人虛實先嚼水一
口行一次胃氣壯實者只可嚼水三四口不可太
過後用水一口送藥下行盡數次以米飲補之
防風通聖散
治腰脅丹毒瘡瘍解暑月熱毒或偏身頭面惡瘡
芍藥焙　芒硝　滑石煅　川芎　大黃酒炒

桔梗　石膏煅　荊芥　麻黃各四分半　山梔
白朮　連翹　當歸　薄荷葉　生甘草　防風
黃芩焙各八分

右作一劑水二鍾煎八分服按此方非表裏俱實大小便祕者恐不可用宜審之

勝金丹

治癰疽腫痛

麝香　白砒製各五分　蟾酥一錢　通明雄黃
辰砂飛　乳香研　沒藥研　血竭研各一錢半
全蠍泡炙　天龍去頭足炙　穿山甲炙各三錢

右爲細末和勻每服三分赤砂糖調葱頭酒送下取汗爲度

托裏消毒散

治發癰已成不得內消者宜服此藥以托之未成者可消已成者卽潰腐肉易去新肉易生此時不可用內消洩氣寒涼等藥致傷脾胃爲要

人參　川芎　白芍藥　黃芪　當歸　白茯苓
白朮　金銀花各一錢　白芷　甘草　皂角刺
桔梗各五分

水二鍾煎八分食遠服脾弱者去白芷倍人參

單方

發下疳瘡羹黃丸用雄黃一兩巴豆五錢同研入白粥二兩滴水丸梧子大每服二十四丸漿水煮三十沸入冷漿水沉冷吞下以利爲度如神（保命）

病後發腦脹天行病後兩發腦脹滿熬鹽熨之（外臺）

發破腸出急以油抹入煎人參枸杞汁淋之內喫羊腎粥十日愈（得效方）

酒癖發腦脹時復嘔吐腹有水聲川芎藭三錢炮各一兩爲末每服二錢葱白湯下（聖濟總錄）

心煩發痛連胃欲死者香薷搗汁一二升服（肘後方）

腹發積塊風化石灰末半斤瓦器焙極熱稍冷入大黃末一兩炒熱入桂心末半兩略炒下米醋攪成膏攤布貼之

又方大黃二兩矾硝一兩爲末以大蒜同搗膏和貼之或加阿魏一兩尤妙（丹溪心法）

胃發痛用薏苡根剉煮濃汁服三升乃定（肘後方下同）

腰發卒痛大豆炒二升酒三升煮二升頓服

心胃發下有邪氣結實硬痛脹滿者用生薑一斤搗查留汁慢炒待潤以絹包于患處款款熨之冷再以汁炒再熨良久豁然寬快也（傷寒撮法）

發下刺痛小茴香一兩炒枳殼五錢麩炒爲末每服二錢鹽酒調下神效（補珍方）

胃發氣逆脹滿茯苓一兩人參半兩每服三錢水煎服日三（聖濟總錄）

鬼擊之病發腹絞痛或卽吐血鰒血下血一名鬼排白犬頭取熱血一升飲之（百一方）

發風痛用枳實煎服末服並佳（本草下同）

兩發痛用枳殼煎服末服並佳

痰飲結聚兩發脹痛旋覆花水煎服之

風發痛防風水煎服之

瘀血在發下堅痛蠐螬焙爲末和酒服

腎氣衝發如刀刺痛喘息不得生薑香搗汁一合投熱酒一合和服（孟詵）

發骨疼痛因驚傷肝者枳殼一兩麩炒桂枝生半兩爲細末每服二錢薑棗湯下（本事方）

胃發痛滿羚羊角燒末水服方寸匕（子母秘錄）

鍼灸

素問曰肝熱病者熱爭則狂言及驚發滿痛手足躁不得安臥庚辛甚甲乙大汗氣逆則庚辛死刺足厥陰少陽

熱病先胃發痛手足躁刺足少陽補足太陰病甚者爲五十九刺

熱病先眩冒而熱胃發滿刺足少陰少陽

刺腋下發間內陷令人欬

胠絡季發引少腹而痛脹刺謹諦

風寒入舍于肺弗治肺卽傳而行之肝病名曰肝痹一名曰厥發痛出食當是之時可按若刺耳

邪客於足少陽之絡令人發痛不得息欬而汗刺足小指次指爪甲上與肉交者各一痏不得息立已汗出立止欬者溫衣飲食一日已左刺右右刺左病立已不已復刺如法

邪客於足太陽之絡令人拘攣背急引發而痛刺之從項始數發椎俠發痰按之應手如痛刺之旁三痏立已

靈樞曰胃病者腹脹胃脘當心而痛上支兩脅膈咽不通食飲不下取之三里也
足少陽之筋其病上乘胛季脅痛上引缺盆膺乳頸維筋急從左之右右目不開上過右角並蹻脈而行左絡於右故傷左角右足不用命曰維筋相交治在婚鍼刃刺以知爲數以痛爲輸名曰孟春痹也
足少陰之筋其病下引膺兩脅痛引膺口脊內痛治在婚鍼刃刺以知爲數以痛爲輸命曰孟秋痹也
手太陰之筋起於大指之上結肘中上臑內廉入腋下出缺盆結肩前髃上結缺盆下結胃裏散貫賁合賁下抵季脅其病當所過者支轉筋痛甚成息賁脅急吐血治在婚鍼刃刺以知爲數以痛爲輸名曰仲冬痹也
手心主之筋起於中指與太陰之筋並行結於肘內廉上臂陰結腋下下散前後挾脅其支者入腋散胃中結於臂其病當所過者支轉筋前及胃痛息賁治在婚鍼刃刺以知爲數以痛爲輸名曰孟冬痹也
邪在肝則兩脅中痛寒中惡血在內行善掣節時脚腫取之行間以引脅下補三里以溫胃中取血脈以散惡血取耳間青脈以去其掣
熱病胃脅滿取之湧泉
黃帝曰衛氣之留於腹中積積不行菀蘊不得常所使人肢脅胃中滿喘呼逆息者何以去之伯高曰其氣積於胃中者上取之積於腹中者下取之上下皆滿者旁取之黃帝曰取之奈何伯高對曰積於上瀉大逆天突喉中積於下者瀉三里與氣街上下皆滿者上下取之與季脅之下一寸重者難足取之診視其脈大而弦急及絕不至者及腹皮急甚者不可刺也黃帝曰善
左脅應春分其日乙卯右脅應秋分其日辛酉凡此者善候八正所在之處所主左右上下身體有癰腫者欲治之無以其所直之日潰治之是謂天忌日也甲乙經曰氣逆上刺膺中陷者與脅下動脈膲俞主之
胃脅積滿痛引胃中華蓋主之
胃脅積滿痹痛骨疼飲食不下嘔逆氣上煩心紫宮主之
胃中滿不得息脅痛骨疼喘逆上氣嘔吐煩心玉堂主之
胃脅積滿鬲塞飲食不下嘔吐食復出中庭主之
胃脅積滿不得息欬逆乳癰漉淅惡寒神封主之
胃脅積滿鬲逆不通呼吸少氣喘息不得舉臂步郎主之
胃脅積滿喘滿上氣呼吸肩息不知食味氣戶主之
胃脅積滿却引背痛臥不得轉側胃鄉主之
大氣不得息息即胃脅中痛實則其身盡寒虛則百節盡縱大包主之
胃脅積滿爽瘀引膂腹痛短氣煩滿巨闕主之
傷食脅下滿不能展轉反側目青而嘔期門主之
胃脅積滿勞宮主之
胃脅脹腸鳴切痛太白主之
暴脹胃脅積滿足寒大便難面唇白時嘔血太衝主之
胃脅積滿惡聞人聲與木音巨虛上廉主之
胃脅積滿寒如風吹狀俠谿主之
胃脅積滿頭痛項內寒外丘主之
脅下積滿嘔吐逆陽陵泉主之
金匱要略曰婦人中風發熱惡寒經水適來得七八日熱除脈遲身涼和胃脅滿如結胃狀譫語曰此爲熱入血室也當刺期門隨其實而取之
千金方曰過谷章門曲泉商陵期門食實陷谷石門主胃脅支滿
本神顧息主胃脅相引不得傾側
肝輸脾輸志室主兩脅急痛
腎輸主兩脅引痛
期門缺盆主胃中熱息賁脅下氣上支溝主脅腋急痛
腕骨陽谷主脅痛不得息
竅陰主脅痛欬逆
臨泣主季脅支痛胃痹不得息
陽輔主胃脅痛
環跳至陰主胃脅痛無常處腰脅相引急痛太白主胃脅脹切痛
膽輸章門主脅痛不得臥滿嘔無所出
大包主胃脅中痛
華蓋紫宮中庭神藏靈墟胃脘俠谿步郎商陽上廉三里氣戶周榮上脘勞宮滿泉陽陵泉主胃脅拄滿膚憲主胃脅癰腫
中脘承滿主脅下堅痛
關元期門少商主脅下脹
尺澤少澤主短氣脅痛心煩

醫學綱目曰傷寒脅痛取支溝陽陵泉
脅痛取懸鍾竅陰此二穴左取右右取左竅陰出血
妙外關三里此一穴正取
閃挫脅痛取支溝章門中封陽陵泉
怒氣脅痛行間
傷寒後脅痛期門
治脅幷胃痛不可忍取期門四分章門六分灸七壯
至七七壯行間丘墟涌泉
胃脘痛取期門沿皮三寸支溝膽俞沿皮半寸
胃脘脹滿痛取公孫三里太衝三陰交
腰脅痛取環跳至陰太白陽輔
脅肋痛取支溝透間使瀉之外關透內關如取支溝
不必再取外關
脅痛取陽陵泉
古今醫統曰脅痛刺關元仍服小柴胡湯
景岳全書曰治卒脅痛不可忍用蠟繩橫度兩乳中
牛屈繩從乳斜趨痛脅下繩盡處灸三十壯更灸章
門七壯丘墟三壯可鍼入五分

導引

養性書曰以手交項上相握自極治脅下痛坐地交
兩手著不過偏握當挽久行實身如金剛令息調長
如風雲如雷
保生祕要曰脅痛先念痛處想火燒之
氣虛血弱濕干肝則肝氣不順搪脅而痛春月木旺
宜常噓吸爲補瀉之法和其肝氣勿食諸肝以免死
氣入肝傷其魂也宜燒蒼朮香淸晨飲屠蘇酒馬齒
莧以祛一年不正之氣大抵陽氣初升景物融和當

眺覽園林尋春郊外以暢春生之氣

醫案

儒門事親曰洛陽孫伯英因誣獄妻子被繫逃于故
人家是夜便覺脅痛託故人求藥故人曰有名醫張
戴人適在焉當與公同往時戴人宿酒未醒强呼之
故人曰吾有一親人病欲求診戴人隔窻望見伯英
曰此公伏大驚恐故人曰何以知之戴人曰面靑脫
色膽受怖也後會赦乃出方告戴人
上渠卞家一男子年二十八歲病身弱四肢無力面
色蒼黃左脅下身側如癖狀每發則痛無時食不減
大便如常小便微黃已二三載矣諸醫技窮求戴人
治之視其部分乃足厥陰肝經兼足少陽膽經張曰
甲膽乙肝故靑其黃者脾也診膽脈小此因驚也驚
則膽受邪腹中當有驚涎絲水病人曰昔曾屯軍被
火自是而疾戴人夜以舟車百五十丸瀋川散四五
錢加生薑自然汁平旦果下綠水四五行或問大加
生薑何也荅曰辛能伐木也下後覺微痛令再下之
比前藥減三之一又下綠水三四行痛止思食反有
力戴人謂卞曰汝妻亦當病卞曰太醫未見吾妻何

以知之曰爾威此驚幾年矣卞省曰當被火時我正
在草堂中熟寐人驚喚我醒中驚不能言火已塞門
我父搜出我火中今五年矣張曰汝膽被火驚甲乙
乘脾土是少陽相火乘脾脾中有熱故能食而殺殺
熱雖能化穀其精氣不完汝必無于蓋敗經反損婦
人汝妻必手足熱四肢無力經血不時卞曰吾妻實
如此亦已五年矣他日門人因觀內經言先瀉所不
勝次瀉所勝之論其法何如以問張張曰且如膽木
乘胃土此土不勝木也不勝之氣尋救於子己土能
生庚金庚爲大腸咏辛者爲金故大加生薑使伐木
然先不開脾土無由行也遂用舟車丸先通其閉塞
之路是先瀉其所不勝後用薑汁調瀋川散大下之
是次瀉其所勝也大抵陽干宜對腑腑對藏
戴人出游道經陽夏問一舊友其人病已危矣戴人
往視之其人曰我別無病三年前當隆暑時出村野
有以養酒餽予者適村落無湯器冷飲數升便覺左
脅下悶漸痛結硬至今不散鍼灸磨藥殊不得效戴
人診其兩手脈俱沉實而有力先以獨聖散吐之一
涌二三升色如養酒香氣不變後服和解散漏藥五
七日百脈沖和始知鍼灸無功徒增苦楚矣
一緇侶好茶成癖積在左脅戴人曰此與肥氣頗同
然痰癊不作便非肥氣雖病十年不勞一日況兩手
脈沈細有積故然吾治無鍼灸之苦但小惱一晌可
享壽盡期先以茶調散吐出宿茶水數升再以水如
意湔之又涌數升皆作茶色次以三花神佑丸九十
餘粒是夜瀉二十餘行膿水相雜燥糞瘀血雜然而
下明日以除濕之劑服十餘日諸苦悉蠲神淸色瑩

東垣十書曰李兄年四十餘面面稍白神甚勞忽脅下生一紅腫如桃一人教用補劑衆笑且誹於是以流氣飲十宣散雜而進之旬餘召予視之予曰非惟不與補藥抑且多得解利血氣俱憊矣已而果然丹溪心法曰金氏子因騎馬跌撲次年左脅脹痛醫與小柴胡湯加草龍膽青皮等藥不效來求治診其脈左手寸尺皆弦數而滑關脈尤甚右三部數而虛予曰明是瘀血證用抵當丸一劑下黑血二升許後以四物湯加減調理而安

壽四郎右脅痛小便赤少脈少弦不數此內有陳久積痰飲因外感風寒所遏不能宣散所以作痛與龍膽丸三十五粒保和丸三十粒細嚼薑片以熱湯下服後脅痛已安小便尚赤少再與白朮三錢陳皮芍藥各二錢木通錢半條芩一錢甘草五分薑二片煎熱飲之癒

一婦人脾疼帶脅痛口微乾問已多年時尚秋用二陳湯加川芎乾葛青皮木通下龍膽丸二十粒而安

章宅張郎氣痛自右脅時作時止脈沉而弦小便時有赤色吞酸喜嘔出食此濕痰在脾肺間所以肝上乘之小柴胡湯去黃芩加川芎白朮木通滑石芍藥生薑煎湯下保和丸三十五粒

薛氏醫案曰濮湖一男子患傷寒仰臥一月且耳聾予意其病必在少陽故脅痛不能轉側及耳聾也與小柴胡湯加山梔一劑即能轉側尾閭處內潰皆蛆耳亦罕聞蓋少陽屬風木而風木能生蟲也其在少陽宜矣

一婦人欬嗽脅痛發熱日晡益甚用加味逍遙散加熟地治之而愈後因勞役多怒前證仍作又少陽寒熱往來或欬嗽遺尿皆屬肝虛火旺陰挺痿痹用前散及地黃丸而痊

一男子脾胃不和服香燥行氣之藥飲食少思兩脅脹悶服行氣破血之藥致飲食不入右脅脹痛喜手按之予曰乃肝木尅脾土而脾土不能生肺金也用滋化源之藥四劑諸證頓退予又曰火令在邇當再補脾土以養肺金不信後復作吐膿而歿

一男子房勞兼怒風府脹悶兩脅脹痛予作色慾損腎怒氣傷肝用六味地黃丸料加柴胡當歸一劑而安

儒者楊文魁素咳諸藥不應服牛黃清心丸吐痰甚多或頭運或熱從脅起左脈洪大有力右脈浮大而無力予曰此足三陰虧損虛火不能歸源用補中益氣加麥冬五味及加減八味丸補其化源而愈

一男子因勞發熱脅下腫痛脈雖大而按之無力此氣血虛勝理不密邪氣襲於肉裏而然也河間云若人飲食疎精神衰氣血弱肌肉消薄榮衛之氣短促而澀滯故寒薄腠理閉鬱而癰腫也當補之以接虛怯之氣遂以補中益氣湯加羌活四劑少可去羌活又十餘劑而愈

一男子脅腫一塊日久不潰按之微痛脈微而濇此形證俱虛也經曰形氣不足病氣不足當補不當瀉予以人參養榮湯治之彼不信乃服流氣飲虛證悉至方服前湯月餘少愈但腫尚硬以艾葉炒熱熨患處至十餘日膿成以火鍼刺之更灸以豆豉餅又服十全大補湯百劑而愈蓋流氣飲通行十二經則諸經皆爲所損況膽經之血原少又從而損之矣何不至於禍邪凡一經受病則當主於其經苟不察其由泛投對伐之劑則諸經被戕能無危乎河間云凡瘡止於一經或兼二經者止當求責其經不可干擾餘經也

一男子因怒左脅腫一塊不作痛脈濇而浮余曰此肝經邪火熾甚而眞氣不足爲患皆宜培養氣血爲主若使草率敷貼俱致不救

一男子年三十餘歲素饑寒患右肋腫如覆瓢轉側作水聲脈數經曰陰虛陽氣湊襲寒化爲熱熱甚則肉腐爲膿即此證也及按其腫處即起是膿已成矣遂以潰煮黃芪六一湯令先飲二鍾然後鍼之膿出數碗許虛證屢現遂以大補藥治之三月餘而愈大抵膿血大泄氣血必虛當峻補之雖有他病皆宜緩治蓋元氣一復諸病自退若老弱之人不問腫潰尤當補也

一男子因怒脅下作痛以小柴胡湯對四物加青皮桔梗枳殼治之而愈

一婦人因怒脅下腫痛胃腸不利脈沈遲以方脈流氣飲數劑少愈以小柴胡湯對二陳加青皮桔梗貝母數劑頓退更以小柴胡湯對四物二十餘劑而痊

一婦人脅患癰未成膿惡寒脈緊以十宣散加柴胡二劑表證悉退更以托裏散數劑膿潰而愈

一男子近脅患毒腫而不潰投大補之劑潰而已愈後患弱證而歿

一上舍年逾四十因怒脅內作痛不止數日後外結一塊三寸許漫腫色不赤按之微痛予謂怒氣傷肝

致血傷氣鬱爲患以小柴胡湯對四物倍用芎歸黃芪貝母肉桂治之彼謂丹溪云腫瘍內外皆壅宜托裏表散爲主又云凡瘡未破毒攻臟腑一毫熱藥斷不可用況此證爲氣血凝滯乃服流氣飲愈虛始信而復求治視之虛證併臻診之胃氣更虛彼欲服予前藥予謂急者先治遂以四君子湯加酒炒芍藥炮乾薑四劑少得更加當歸又四劑胃氣漸醒乃去乾薑又加黃芪芎歸肉桂數劑瘡色少赤并微作痛又二十餘劑而膿成鍼之却與十全大補湯喜其謹疾又兩月餘而瘳夫氣血凝滯多因營衛之氣弱不能運散豈可復用流氣飲以益其虛況各經血氣多寡不同心包絡膀胱小腸肝經多血少氣三焦膽腎心脾肺少血多氣然前證正屬膽經少血之臟人年四十以上陰血日衰且脈證俱屬不足瘍腫內外皆壅宜托裏散爲主乃補氣血藥而加之以行散之劑非專攻之謂也若腫焮煩躁脈大辛熱之劑不但腫瘍不可用雖潰瘍亦不可用也凡患者須分經絡氣血地部遠近年歲老幼稟氣虛實及七情所感時令所宜而治之常見以流氣十宣二藥柴治結腫之證以致取敗者多矣

一婦人脅下作痛色赤寒熱用小柴胡湯加山梔川芎以清肝火而愈但經行之後患處作痛用八珍湯以補氣血而安若肝膽二經血燥氣逆所致當以小柴胡湯加山梔膽草芎歸主之若久而脾胃虛弱用補中益氣爲主若兼氣鬱傷脾而患間以歸脾湯若朝涼暮熱飲食少思須以逍遙散爲主

崐庠馬進伯母左脾連脅作痛遣人索治予意此鬱怒傷肝脾用六君加桔梗枳殼柴胡升麻彼別用瘡藥益甚始請治其脈右關弦長按之軟弱左關弦洪按之濇滯乃脾土不及肝木太過因飲食之毒七情之火而爲病也遂用前藥四劑脈證悉退再加芎歸全愈此等證誤用敗毒行氣破血導痰必致不起

證治準繩曰一人患脅疽如胡桃微痛微腫月餘漸大如杯醫作痰治或作肝積或云痞塊竟莫能效數月遂大如盎堅硬如石不甚疼痛微紅漫腫復得暴怒胷復脹滿小水不利脈遲而微投以化氣丸六一散小便利胷次寬繼投烏金散奪命丹間服八陣散月餘漸消

一人性急味厚常服燥熱之藥左脅一點痛輕診弦重按芤知其痛處有膿與四物湯加桔梗香附生薑煎十餘貼痛處微痛如指大鍼之少時屈身膿出與四物調理而安

一夫人左脅內作痛牽引胷前此肝氣不和尚未成瘡用小柴胡加青皮枳殼四劑少可加芎歸治之而愈

一人連年病瘧後生子三月病熱右脅下陽明少陽之分生一癤甫平左脅下相對又一癤膿血淋漓幾死醫以四物湯敗毒散數倍人參以香附爲佐犀角爲使大料飲乳母兩月而愈踰三月忽腹脹生赤瘮如霞片取翦刀草汁調原蠶沙敷隨消又半月移脹入囊爲腫黃瑩裂開兩丸顯露水出以紫蘇葉盛麪炭末托之旬餘而合此胎毒證也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百九十五卷目錄
醫部彙考一百七十五
背脊門一



黃帝素問 金匱真言論 陰陽離合論 脈要精微論 玉機真臟論 脈氣法時論 藏氣法時論 平人氣象論 風論 腹中論 標本病傳論 厥論 痿論 奇病論 大惑論 熱論 刺熱論 評熱病論 逆調論 生氣通天論 陰陽別論 痹論 血氣形志篇 病能論 逆調論 舉痛

量其乳間中折之更以他草度此草去半已使與中折之草拄爲三隅以一隅上齊脊之大椎兩隅分而拄下當其下俞之盡處是肺俞也

癉論

邪氣客於風府循脊而下衝氣一日一夜大會於風府其明日日下一節故其作也晏此先客於脊背也

註此言邪從風府而客於脊背之間者發作有早晏也

中於背者氣至背而病

註中於背邪卽舍於背間衝氣行至背與所舍之邪相遇故病作

舉痛論

寒氣客於背俞之脈則脈泣脈泣則血虛血虛則痛其俞注於心故相引而痛按之則熱氣至熱氣至則痛止矣

註背俞之脈者足太陽之脈也太陽之脈循於背而五臟六腑之俞皆在太陽之經故曰背俞之脈臟腑之血氣皆注於俞故寒客之則脈泣而血虛血虛則痛矣

風論

腎風之狀脊痛不能正立

註腎主骨故脊痛不能正立

脈解篇

太陽所謂強上引背者陽氣大上而爭故強上也

註強上引背者頭項強而引於肩背也太陽之脈上額交巔從巔別下項挾脊抵腰中陽氣大而爭援於上故使其強上也

氣府論

督脈所發大椎以下至尻尾及旁十五穴至骶下凡二十一節脊椎法也

註大椎以下至尻尾之長強計十三穴及下兩旁之會陽穴共十五穴也大椎在項後大骨上陷中陶道在大椎下節間身柱在三椎下節間神道在五椎節間靈臺在六椎節間至陽在七椎節間筋縮在八椎節間脊中在十一椎節間懸樞在十三椎節間命門在十四椎間陽關在十六椎間腰俞在二十一椎間長強在脊骶端會陽在陰尻骨兩旁屬太陽膀胱經自大椎至骶骨凡二十一節連項上三椎共二十四節或曰應二十四氣

標本病傳論

脾病身痛體重一日而脹二日少腹腰脊痛脛痠三日背胳筋痛小便閉十日不已死冬人定夏晏食

註病先發於脾則身痛體重二日而之胃則脹二日而之腎則少腹腰脊痛脛痠三日而之膀胱則背胳筋痛小便閉十日不已死馬蒔曰冬之人定在亥謂土敗而水勝也夏之晏食在寅木旺而土絕也

腎病少腹腰脊痛脛痠三日背胳筋痛小便閉三日腹脹三日兩脅支痛三日不已死冬大晨夏晏晡

註病先發於腎則少腹腰脊痛三日而之膀胱則背胳筋痛小便閉三日而之胃則腹脹三日而之肝則兩脅支痛冬之大明在辰土旺而水滅也夏之晏晡在亥水絕而不能生也

胃病脹滿五日少腹腰脊痛脛痠三日背胳筋痛小便閉五日身體重六日不已死冬夜半後夏日昳

註病先發於胃故脹滿五日而之腎則少腹腰脊痛脛痠三日而之胳膀胱則背胳筋痛小便閉五日而之脾則身體重再六日不已而死冬夜半後者土敗而水勝也夏日昳者乃陽明所主之時土絕而不能生也

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

邪中人也方乘虛時其中於膺背兩脅亦中其經

註此手足三陽之絡皆循頸項而上於頭面膺背兩脅者復循頭項而下於胷脅肩背也

心脈微急爲心痛引背微大爲心痹引背善淚出

註諸急皆寒心爲火臟寒微則只薄心之界分故心痛引背大則爲盛微盛則逆於心下而爲心痹引背行於上則心精隨氣上湊於目而淚出也

肺脈微急爲肺寒熱怠惰欬唾血引腰背胷若鼻息肉不通微大爲肺痹引胷背起惡日光

註肺寒熱者皮寒熱也寒在皮毛故微急也肺主氣怠惰欬唾血引腰背胷鼻若有瘜肉而氣不通皆肺氣虛寒之所致氣微盛於上則爲肺痹引胷背蓋氣從下而上也陰血少故惡日光金畏火也

腎脈緩甚爲折脊

註督脈屬腎貫脊緩則督脈懈弛故脊折也

經脈篇

膀胱足太陽之脈是動則病衝頭痛目似脫項如拔脊痛腰似折髀不可以曲腘如結踹如裂是爲踝厥是主筋所生病者痔瘧狂癲疾頭顱項痛目黃淚出

鼽衄項背腰尻髀踹脚皆痛小指不用

註太陽是動則病衝頭痛目似脫項如拔腰似折盖太陽之氣生於膀胱水中而爲諸陽主氣陽氣者柔則養筋故是主筋所生之病則爲痔經絡沉以內薄則爲瘧厥逆於下則爲癲爲狂顛項鼽目腰背髀踹諸證皆經絡所循之部分而爲病也

腎足少陰之脈貫脊屬腎絡膀胱

督脈之別名曰長强挾脊上項當肩胛左右實則脊强挾脊之有過者

經筋篇

足太陰之筋其內者著於脊其病下引兩脅痛脊內痛

足少陰之筋循脊內挾膂上至項結於枕骨與足太陽之筋合

骨度篇

項髮以下至背骨長二寸半膂骨以下至尾骶二十一節長三尺上節長一寸四分分之一奇分在下故上七節至於膂骨九寸八分分之七

註此脊背之骨度也項髮以下至背骨者自項後之髮際至背骨之大椎計長二寸五分膂骨脊骨也自背骨之大椎循膂骨以下至尾骶計二十一節共長三尺上節每節長一寸四分一釐其奇分之九釐在下節計算故膂骨以上計有七節每節長一寸四分一釐則七得七寸四七二寸八分共九寸八分又每節一釐共計九寸八分七釐故曰九寸八分分之七也

營氣篇

營氣循脊下尻又從二焦注膺出脅又循脊入骶

癲狂篇

癲疾始作先反僵因而脊痛

註脊痛者寒氣乘於地中也脊背也易曰艮其背艮爲山止而不動乃坤土之高阜者

厥病篇

厥心痛與背相控

註背爲陽心爲陽中之太陽故與背相控而痛心與背相應也

五癃津液別篇

陰陽不和則使液溢而下流於陰髓液皆減而下下過度則虛虛故腰背痛而脛痠

註陰陽不和者少陰與陽明之不和也陰陽之氣不和則液與精不合使液溢於骨外而下流於陰矣液溢於外則髓液皆減而下是不能爲高矣下流過度則骨虛而腰痛脛痠矣

好肩背厚者肺堅肩背薄者肺脆背膚厚者肺端正脅偏疎者肺偏傾也

註肺居肩膺之內脅脹之上故視其肩背膺腋卽知肺之高下堅脆端傾倪沖之曰肺屬天而華蓋於上背爲陽而形身之上也故肺俞出於肩背

背腧篇

黃帝問於岐伯曰願聞五臟之腧出於背者岐伯曰背中大腧在杼骨之端肺腧在三焦之間心腧在五焦之間膈腧在七焦之間肝腧在九焦之間脾腧在十一焦之間腎腧在十四焦之間皆挾脊相去三寸所則欲得而驗之按其處應在中而痛解乃其腧也

註焦椎也在脊背骨節之交督脈之所循也大杼在第一椎端之兩旁問五臟之腧而先言大杼者乃項後大骨之端督脈循於脊骨之第一椎也

衛氣篇

足少陰之本在內踝下上三寸中標在背腧與舌下兩脈也足厥陰之本在行間上五寸所標在背腧也足太陰之本在中封前上四寸之中標在背腧與舌本也手少陰之本在銳骨之端標在背腧也氣在胸者止之膺與背腧氣在腹者止之背腧

玉板篇

嘔血胃滿引背脈小而疾逆也

註嘔血胃滿引背脈小而疾逆於心絡也

五音五味篇

衝脈任脈皆起於胞中上循背裏

寒熱病篇

五臟身有五部伏兎一髀二髀者腨也背三五臟之腧四項五此五部有癰疽者死

註夫在外者皮膚爲陽筋骨爲陰癰疽所發在於皮肉筋骨之間此言五臟各有五部而一部之陰陽不和卽留滯而爲癰矣伏兎腎之街也腨者髀之部也背者肺之俞也五臟俞者謂五椎之心俞也項者肝之俞也本經曰癰疽之發不從天下不從地出積微之所生也故五部之有癰疽者乃五臟漸積之鬱毒外應於血氣之不和而爲癰疽故五部有此者死

漢張機金匱要略

背痛

胃癰之病喘息欬唾胃背痛短氣寸口脈沉而遲關上小緊數苦蔞蘆白白酒湯主之

胃癰不得臥心痛徹背者苦蔞蘆白半夏湯主之

心痛徹背背痛徹心烏頭赤石脂圓主之

心中寒者其人苦病心如噉蒜狀劇者心痛徹背背痛徹心譬如蟲注其脈浮者自吐乃愈

腸上病瘀滿喘欬吐發則寒熱背痛腰疼目泣自出其人振振身瞤劇必有伏飲

華佗中藏經

痛屬臟腑虛實寒心脈微急心中痛引腰背痛不下食微大則痛引背多淚

肺太過則令人氣逆胃滿背痛虛則肩背痛上焦寒則不入食吐酸水胃背引痛噎乾津不納也

唐孫思邈千金方

強屬膀胱實熱

右手尺中神門以後脈陽實者足太陽經也病苦胞轉不得小便頭眩痛煩滿脊背強名曰膀胱實熱也

發背

凡服金石人皆須勞役四體無令自安如其不爾者多有發動亦不得遂便恣意取暖稱己適情必須違欲以取寒凍雖當時不覺於後在身多有所益終無發動之慮耳

宋寶漢卿瘡瘍全書

發背

發背之生積毒臟腑正氣盛淹留停緩元氣虛朝輕夕重如發弓矢外小內大內托則生敗毒則斃治法以參芪爲主一定之論百世不易凡癰發於背廣一尺深可一寸難潰至骨不穿膿不死此證六氣七情或因飲食而感其毒積於脾胃之間用藥先消脾胃中之毒內外夾攻斯無患矣

魚脊瘡

魚脊瘡者臟中積冷腎氣虛寒故虛熱得傳經絡脊骨之間發動不拘何處初生如疽癤破時黃水流出白泡似魚脊若不速治肉爛膿流命亦難保先服神功活命湯次用歸芪調榮湯或參芪內托散外用解毒潤肌散搽之或用金絲膏貼之洗用猪蹄煎湯或用地骨皮煎湯尤妙

兩頭發

此證兩頭小者四邊散攻乃因飲酒體虛之所致也而氣食相鬬合陰虛而成之氣虛而散所以開口而鬬急服內消藥亦宜補陽也治法與發背肩癰同前方加減服之

腎俞發

腎俞之發屬陰人難知識因受暑濕幷怒氣飲熱酒而得之傷於內腎之間流毒在腎急用解內腎之毒內外攻之若醫緩傷膜者難生矣切戒怒氣行房稍或一犯決不可治治法同發背癰疽而補腎加黃蘗知母沒藥廣膠

對心發

對心發此證難治蓋心者君主之官神明出焉恬惔虛無病安從來心有怫鬱諸病生焉發於手足者皆由於心火故發於心乎此證發於背脊與心相對乃對心發因心火盛而熱氣會生於此處其毒愈盛急用疏導心火之藥解之用意調處若合兵法方有生機必須戒性若一怒不能生矣發於心之側者亦可治並宜黃連解毒湯護心散蠟礬丸日夜服之

散走流注發

此證發於背胛之間若氣血不調經絡不通復感六氣七情故毒氣乘風熱而走是也乃因風盛而生熱之證熱極氣盛氣因熱之極而走於四散急宜疏風定熱則氣自然而息若元氣盛初發者速以艾灸七壯四圍敷藥內服二十四味流氣飲無不愈者若流注於手足腿者死無疑矣

連珠發

此疾若陰囊赤腫小便不通小腹脹痛此疽因色慾過度及醉飽房事以傷腎水得此疾者必致成串令人口乾身發寒熱百節皆疼治以十奇散酒煎散或患處好肉四邊紅腫其色如火用磁鋒砭去惡血卽用雞子清調乳香末敷之時時用芭蕉根汁潤之以助藥功

蜂窩發

此疾若肉黑色青色中大陷四圍硬肉赤紫色風毒氣傷於腠裏可發出卽生不發出卽死此毒因膏粱之味溫牀厚被醉飽房事以致五臟積毒不流積而爲癰則心神恍惚夜夢不安小便頻數大便溏泄此疾串於左脅卽死治宜內托十宣散連服蠟礬丸日進五服膿將透便服排膿內補十宣散卽內托散加木香穿山甲仍貼金絲膏

竟體發

此毒發於背脊之間因暑熱之時空心受其穢氣以

致胃氣仍敗則致嘔逆如若不治毒氣入內則難生矣急服乳香托裏散再服五香連蕤散蠟礬丸外貼金絲膏內服忍冬酒一日三服

蓮子發

此疽發於右胛中恐其毒氣奔入心大要用藥散之敷圍藥點截住不令攻心如在中道通背皆腫不可救也消者可療諸瘡痛痒皆屬於心以心生血而行氣主痛諸瘡皆有敷藥就上下打大針三四針爲妙用前化毒消腫散千金內托散多加黃芪護心散蠟礬丸時刻不可缺

上中下三搭手

此毒受在五臟六腑毒熱憂怒氣壅傷於肺經結聚成毒此是惡證也當用腦疽發背癰疽等藥治之圍藥亦然時進忍冬酒蠟礬丸

上中下三發背

上發背受在陶道經主傷於肺肝心經驚鬱結聚怒氣傷肝壅出背毒此乃惡毒證也先用敗毒流氣飲次用護心托裏散後用內托流氣飲治之

中發背受在神堂靈道經正心毒心血湧出不能歸肝氣血壅在背中損於肝經此乃惡證當用煎藥治宜敗毒流氣飲

下發背乃受脾肝經絡凝滯於五臟傷於三經此是三毒之證也先用敗毒流氣飲後用人參內托散外用圍藥敷之

纏袋痰注

所謂痰注者何來六氣七情所感痰不能流行結於背胛伏於經絡之間而背爲明堂月深日久結成囊窠內連於臟腑外隔於皮毛宜早治之其形或圓或歪或如米袋堅硬如石外用圍藥次服人參內托散四五十劑元氣充足方可用下行劑下大便痰積數升而愈

三串毒

此證生於背之上下其形雖一而中間皮好但內肉潰爛初起紅色亦不大痛日漸潰爛此證之來六氣七情所感嚴寒酷暑所遇積毒於臟腑或年老男婦性度怡默而亦患此者想平居坐臥濕地而然也若無外證得生若飲食日減泄瀉發熱勢難生矣治法與發背諸癰同

腎俞怒發脾癰

此證下腎俞雙發因飲熱酒行房怒氣傷肝受濕而得也陽發於外可治痰發陰發傷於腎膜膿稀者爲虛難治若老少婦人性氣溫和飲食謹節又無六情惱懷而亦患此者乃受地之濕氣或暑月以冷水沐浴而然脾癰發於左膊之間初發可用艾火灸之急服追疔湯汗之即散治法服藥同前蠟礬丸甚宜服之

血潰流注疽

此證多生膏粱形重之人有此疾者好食煎炒炙煿糖蜜之類其疽大者如雞子形猶如紫李只腫不紅內串經絡之間流注背節之內徧身瘦疼百節疼痛用內托散加木瓜白芍連蕤再服乳香護心散黃礬丸外用圍藥敷之不可遲也凡用藥以意消息切勿執方對證

對臍毒一名衝疽

衝疽生於腰腎之間發於背骨作瘡腫又名對臍又名歷腎主心流入腎囊三十日可刺其膿赤白色者不死青黃紫色又兼譫語見鬼者發則內腎疼變爲渴者萬無一全多服參芪內托散加知母黃蘗麥冬以滋腎水

楊登父直指方

發背

凡發熱則謂之背發大瘡若不發熱皆癤也其有陰證於五臟內發者却又沉晦無熱

癰疽發背陰證頭平向內沉黯不痛渾身及患處不熱宜服當歸酒以排膿內補散加味不換金正氣散爲佐兼以米餔猪蹄腎肉爲養蕎麥麵能發起可煮食之如更不起發可用穿山甲頭切片蘸酢炒焦生人牙煅各二錢半右爲末分兩貼用辣桂當歸麻黃煎酒調服外取薑汁和麵厚塗患處

發背陰疽內宜服仙方活命飲祕方奪命散仙傳化毒湯難血散狗寶丸賽飛龍奪命丹外用四虎散敷之

發腦發鬢發眉發頤發背是爲五發至險其證皆令人頭痛惡心寒熱氣急拘攣宜五香散五香湯

究其病源有風有氣有食有藥毒有勞損風則多痒氣則多痛食則發寒熱藥毒則堅硬勞損則瘦弱風氣食三積易療宜二香散藥毒勞損二者難醫

金劉完素六書

强痛惡寒

風爲病者或爲腰脊强痛

風熱氣壅筋滯脈拘脊强痛

夫傷寒之候邪熱在表必脊强身體拘急太陽證脊强脈浮無汗

一陰一陽病發驚駭背痛噫欠名爲風厥蓋胃土肝木爲木尅土風勝濕不制腎水故令上逆腎風脊痛不能正立寒氣入經稽留疑泣氣不流通心背相引而痛

氣循風府而上則爲腦風背怯冷

元張從政儒門事親

背瘡

背瘡初發便可用藏用丸玉燭散大作劑料下臟腑一二十行以鍼針於腫羣處亂刺血出如此者三甚者百會委中皆出血後以陽起石散傅之不可便服內托散內犯官柱更用酒煎男子以背爲陽更以熱投熱無乃太熱乎如瘡少愈或瘡口未合瘡痂未斂風痒時作可服內托散以辟風邪耳

李杲十書

氣鬱作痛

脈經云風寒汗出肩背痛中風小便數而欠者風熱乘肺使肺氣鬱甚也當瀉風熱通氣防風湯主之肩背痛不可回顧此手太陽氣鬱而不行以風藥散之

發背

夫背疽初生如黍米大痒痛有異悞觸破之卽燉展四畔赤腫沉悶牽引脅肋疼痛數日之後漸覺肌膚壯熱惡寒煩渴腫暈侵展燻漿汁出積日不潰抑之則流血者謂之發背疽也又有初生其狀無頭腫闊三四寸始覺注悶疼痛因循數日皮光微軟者甚則亦令人發熱惡寒頭疼煩渴者謂之發背癰也此證惟疽最重其初生皆由滋味與厚衣衣服厚煖則表易招寒滋味過多則五臟生熱臟腑積熱則血脈不流而毒氣凝滯邪氣伏留熱搏於血血聚則肉潰成瘡淺則爲癰實則爲疽深則爲疽矣亦有因服金石發動而患此疾者亦有平生不服金石藥而亦患此疾者蓋由上祖曾服餌者其毒氣流傳子孫此病初生認是疽則宜速療之若氣實之人則服五香連翹湯漏蘆湯若年紀未五十少壯實者可服五利大黃湯化毒丸取通利臟腑一二行瘡頭上用追毒散之類貼溫熱背劑更瀉腫湯潰毒湯淋瀝之如此調治以待膿成已前不可以諸藥救療以安患人之心愼勿惱怒觸著至膿成敗潰宜服五香湯及內托裹散茯苓湯當歸托裹散之類渴不止者服竹葉黃芪湯乳香散勿爲大熱服大黃矾硝苦寒之藥若因服利藥而利不止死矣若瘡中惡肉未退膿水不快者卽用追蝕之藥或鉗子紐之上用鹿角散以酢熬爲糊貼之惡肉退去好肉漸生卽用搜膿散翠霞散之類紐之若瘡毒未盡愼勿早上生肌之藥縱得平復必再發其間調理次第臨時制宜在將護忌愼耳

朱震亨心法

冷痛

背心一片常爲冰冷此痰之所爲善治痰者不治痰而治氣氣順則一身之津液亦隨氣而順矣

凡人每日背上一條如線而寒起痰也宜吐下之

脊骨胛眼痛宜蒼朮復煎湯

發背

背瘡先發爲癰氣血鬱積蒸肉爲膿故其痛多在瘡之始作時也膿潰之後腫退肌寬痛必漸減而反痛者此爲虛宜補亦有穢氣所觸宜和解風寒遇者宜溫散

虛勞瘦弱榮衛否澁患處重著如負石不可用香燥疏泄之藥宜腎氣丸托裹散

明戴思恭證治要訣

發背

有服金石以助欲至精氣既衰藥毒偏盛金石與肺同類肺通於腎所以多成發背之疾又有用龍爲癰亦治發背蓋龍之陽氣皆聚於上胛所以上胛可入藥也若毒發於陰而又未可用附桂諸藥劑外疼內寒宜五香湯

患背瘡人及諸毒已潰後血去過多津液少者宜摸肌散毒初發頭疼體痛乍寒乍熱恐挾外邪宜香蘇飲加川芎白芷防風當歸陳皮之類

樓英醫學綱目

惡寒屬飲

背惡寒是痰飲仲景云心下有留飲其人背惡寒冷如冰茯苓丸主之

疼痛屬肺

肩背痛屬肺分野經云西風生於秋病在肺臉在肩背故秋氣者病在肩背又云秋肺太過爲病在外則令人逆氣背痛愠愠然是也

運氣屬火

經云歲火太過民病肩背熱又云少陰司天熱淫所勝病肩背臉缺盆中痛又云歲金不及其病內舍膺

脅肩背外在皮毛治以寒劑是也

發背

海藏治發背用奪命丹蒼耳方一則用大黃牡蠣一則用蒼耳知有內外之別也

前用奪命丹二藥表裏不同何以然乃膏粱之變脈沉而滑地之濕氣感則害人皮肉筋脈脈浮而滑所以有泄之發之之異也

夫人生最可憂者發背也其種有五

一曰陽毒因風熱而有或患熱毒消渴或先患傷寒餘有陽毒觸處蓄積起於背脊膂之間不問椎數但從兩夾脊起止腰上滿背畀熱如炊之狀赤紫或紅如焰膿毒難成成後不止止後痛不除壽忽數日之間復平如舊將謂腫消此是內攻肉陷不可療

二曰陰毒發背是氣冷而作初如黍米粒起情緒不快愔愔而痛直應前心心忪怔忡頭目昏重寒熱如瘧五七日後始發引攻腫開闊難收內積有膿深沉遲緩未透宜急以補氣湯藥內托外以抽膿藥貼之宜急見膿無膿即平愈未期

三曰有人多服金石燒煉之藥毒惡流滯成發背者初起如丹疹之狀漸漸開如湯火瘡面色如朱心膈煩躁多渴嗜冷其瘡難起起即驚人猶勝於陰陽二毒者緣此有解金石藥毒湯散治其內也賴有根底分明亦須急療方安

四曰人有患酒食毒發背者此疾非近得之乃臟腑久積乘飢乘困食之便睡或多食酒肉冷熱粘滑肥鮮熾膩未下胃膈房室不禁恣意當風取快脾臟氣虛不能受乘發毒攻背兩夾脊不問椎數初起癰頭如小彈子後大如拳堅如石痛遍四肢拘急口苦舌乾腹急大小便澀十數日後頭面手足虛腫及臟腑通泄如利內急痛者是其證也喜方腫引急用收腫發穴潰膿湯藥內實外泄膿水不可放縱遲緩則皮肉腐壞傷骨爛筋漸成膿多因而感邪內敗死矣

五曰人有冒山嵐瘴氣發背毒先在臟腑年月淺遠氣血虛損衰弱初起腫色青黑如靴皮頑痹痛深附筋骨微髓按之木石引手加深方覺似有痛處至五七日毒氣浮淺腫高色變青白有如拳打之狀寒戰似瘧及有風候頭動口偏手足厥逆眼黑睛小白多而慢此內有邪氣相搏急破出清血三五升方有黃膿白汁相和發泄其皮不寬不慢亦急脹痛亦不住直至色退熱疼方愈宜急追膿與毒氣外出無害

有發背癰有發背疽如毒氣勇猛而發如火焚茅易於敗壞初發即可如黍米粒大三兩日漸赤引腫如手掌面大五七日如椀面大即易爲攻煞熱赤引如火燒之狀浮面漸潰爛開內發腫如炊之狀外爛皮肉如削去紫瘀膿汁多而腫不退疼亦不止發逆飲食不下嘔吐氣急浮淺開闊者尤宜發膿托毒湯藥用之必愈此陽證實也

其間有只如盡面大者此非不大緣爲毒氣深沉內虛毒氣近膿也此必內攻近入臟腑却外入四肢先攻頭面虛浮後攻手面次攻兩足面腫名曰毒氣散入四肢其人聲嘶氣脫眼睛黑小十指腫黑乾焦不治此陰證虛也

凡癰疽初發腫硬高者而毒氣却淺此乃六腑不和爲癰其證屬陽勢雖急而易治若初發如粟粒甚則如豆許與肉俱平或作赤色時覺痒痛痒時慎勿抓破此乃五臟不調爲疽其證屬陰蓋毒氣內蓄已深勢雖緩而難治

始發一粒如麻豆大身體便發熱生疽處腫大熱痛此爲發於外雖大如盆治之百可百活此陽證實也或身體不熱自覺倦怠生疽處亦不熱數日後漸大不腫不痛低陷而壞爛此爲發於內雖神仙無如之何此陰證虛也

初患腫三日內灸者生八日內膿成針烙導引者生未瘥慎勞力者生慎忌食者生慎喜怒者生懼腫猛療者生急療者生不諱發背者生

待膿自出不導引者死未內攻而針烙用藥導引者生內攻後導引針烙者死膿煞熱痛方盛已前療者生如過此後已內攻者死膿成後不出不導引但傳藥者死如赤白痢氣急者是已內攻醫療無益必死癰不救十得五生疽不療十全死輕腫怕痛者必死不遇良方者死節候不依法者必死愚執恣意用性逸情者死

凡發背及癰疽皆在背上不問大小有疼無疼或熱或不熱或冷或不冷但從小至大腫起至一尺已上者其赤腫煞熱者即用緊急收赤腫藥圍定不令開中心即用抽膿聚毒散貼之急令散毒外透內服排膿縮毒內托湯藥候膿成相次破穴看瘡大小深淺內發其膿汁膿大水泄急須托裏內補雖破穴膿汁不多再須排膿救毒透後慎不令再腫須疼止腫消患人自覺輕便即是順疾也最宜節慎飲食其熱毒方盛或發大渴多飲冷水及冷漿之類此是毒氣攻

心令口乾煩渴但以心氣藥內補腑臟卽止矣內補謂參芪之屬排膿謂皂角刺之屬

蜂疽發靜背起心俞及心包絡俞若有髑二十日不穴死十日可刺其色赤黑膿淸者不治

特疽發肺俞及肝俞不穴二十日死八日可刺其色紅赤內陷起如椒子者死

陰陽二氣疽廣闊滿背或大或小不常腫熱脹大十日可刺導引出膿不拘深淺多少發渴體倦十日外不見膿不治

筋疽發夾脊兩邊大筋上其色蒼八日可刺有癰在肥腸中九十日死

李梴醫學入門

寒熱倒懊

背心常一片冰冷者痰飲也導痰湯合蘇子降氣湯服之

背寒有陰有陽傷寒少陰證背惡寒者口中和陽明證背惡寒者口中乾燥此寒熱之辨也

背熱屬肺肺居上焦故熱應於背

中濕背倒懊足攣成廢甘遂一錢入猪腰子內煨食之上吐下瀉卽愈

發背總論

發膿發熱疼痛色赤作瘍脈滑數有力先服活命飲後用托裏消毒散漫腫不熱微疼色黯作渴脈數無力腎虛也托裏散少食者六君子湯加蓽茇補熱陰虛者四物湯加參朮或腎氣丸惡寒四邊漸大者陽氣虛也單人參湯十全大補湯小便頻數八味丸初起食少者邪盛脾虛也急用補中益氣湯救之今俗專用賽命丹一捻金箍於因怒因飲食毒及肥人則可若瘦人及因慾火者反傷陰作渴致泄或血盛毒氣不行惟初起或一服之則可凡舉腫氣血勝毒易治漫腫服托藥不應者乃毒勝氣血死在旬日或已發出而不腐潰者須急用托裏藥兼補脾胃不應死在二旬若已潰而色不紅活者用托裏散加參芪肉桂及補脾之藥却不能生肌瘡口黯暈大而不斂乃脾崩也死在月餘表證內托發汗裏證內疏通經和解體虛者未潰托裏消毒已潰托裏溫補

背疽難膀胱督脈所主然五臟皆係於背或多食厚味或鬱怒房勞以致水枯火炎痰多血熱或被外邪與毒搆引隨處發生生在肩下脊上乃因飲食感毒癘一尺深一寸雖潰在內不穿膜不死急治脾胜中之毒內服護心散外用敷藥始不奔心大要服藥截之若通脊背腫者不可救

蓮子發

蓮子發生於右胛中外如蓮房內有子孔恐其毒奔入心大要用托裏散加芩連黃檗荷蓋散之不令攻心漸消可治通背腫者危

脾發

脾發生於左膊間初起可用燈火點破內服追疔湯汗之卽散

蜂窩發

蜂窩發正當脊心形如蜂窩有孔在上者不宜最爲反證宜托裏散加菊花生肌定痛防毒攻心難治因心火未發故也

對心發

對心發極重因心火盛而熱氣會注於此其毒壯盛走暴急用疏導心火之藥解之

流注發

散走流注發毒氣乘風熱而走急宜疏風定熱治之則氣自息若流注於手脚腿者必死無疑

龜形發

此發頭尾俱尖四邊散大如龜之形因飲食所至而氣食相關合陰虛而成之氣虛而散者所以開口面關急服托裏補氣藥

薛己醫案

灸法用藥

精要曰經云諸痛痒瘡瘍皆屬心火前聖又謂癰疽多生於丹石房勞之人凡人生四十以上生發背等瘡宜安心早治此證如虎入室禦而不善必至傷人宜先用內托散次用連翹五香湯更以鍼竹馬法或隔蒜灸并明灸足三里以發泄其毒蓋邪之所湊其氣必虛留而不去其病乃實故癰疽未潰臟腑蓄毒一毫熱藥斷不可用癰疽已潰臟腑既虛一毫冷藥亦不可用猶宜忌用敷貼之藥閉其毫孔若熱渴便祕脈沉實洪數宜用大黃等藥以瀉其毒後用國老膏萬金散黃礬丸遠志酒之類還而用之

按前證若熱毒蘊於內大便祕結元氣無虧者宜用大黃等藥泄其熱毒若陰虧陽湊精虛氣節脾胃虛弱者宜用甘溫之劑培其本源若瘡不舉腫不作膿者雖未潰仍須溫補若瘡已潰而腫不退痛不止者仍宜淸凉之劑治之若病急而元氣實者先治其標病緩而元氣虛者先治其本或病急而元氣更虛者

必先治本而兼以治標大抵腫高譽痛膿水稠粘者元氣未損也治之則易漫腫微痛膿水清稀者元氣虛弱也治之則難不腫不痛或漫腫色黯不潰者發於陰也元氣虛甚理所不治若腫高譽痛者先用仙方活命飲後用托裏消毒散漫腫微痛者宜托裏散如不應加黃柱若膿出而反痛氣血虛也八珍散不作膿不腐潰陽氣虛也四君加歸芪肉桂不生肌不收斂脾氣虛也十全大補加黃柱補熱內熱陰血虛也四物加參朮欲嘔作嘔胃氣虛也六君加炮薑自汗盜汗五臟虛也六味丸加五味子食少體倦脾氣虛也補中益氣加茯苓半夏喘促咳嗽脾肺虛也前湯加麥門五味欲嘔少食脾胃虛也人參理中湯腹痛泄瀉脾胃虛寒也附子理中湯小腹痞足脛腫脾腎虛弱也十全大補湯加山萸山藥肉桂泄瀉足冷脾腎虛弱也前藥加桂附熱渴淋閉腎虛陰火也加減八味丸喘嗽淋閉肺腎虛火也補中益氣湯加減八味丸凡此變證皆因元氣虧損失於預補所致故丹溪先生云但見腫痛參之脈證虛弱便與滋補氣血無虧可保終吉旨哉斯言蓋古今虛實不同因時施治不無少異

論調護法

李氏云背疽之方雖多得效者殊少今擇用驗者錄之庶不致誤人如護心散凡有疽疾早進數服使毒氣外出而無嘔吐之患否則咽喉口舌生瘡或黑爛如菌若瘡發四五日之後宜間用別藥治之

按護心散乃解金石發疽之藥若發熱譽腫作渴飲冷而嘔者宜用若發熱譽腫作渴飲湯而嘔者不宜用若脾虛停痰或寒邪內侵或痛傷脾胃宜用六君子湯若喉舌生瘡口乾作渴或小便頻數宜用六味丸大凡諸瘡作嘔若飲冷便愈是熱毒也黃連消毒散解之飲冷便和是胃火也竹葉石膏湯清之懶食飲湯是胃虛也補中益氣湯以補之大便不實喜飲熱湯是脾胃虛寒也六君加炮薑以溫之常見脾胃虛弱者用前散反心間陰冷無不致嘔其喉舌生瘡乃腎水枯涸虛火炎上其證甚惡急用加減八味丸亦有得生者

背疽多先渴而後發或先疽而後渴不救多矣若服加減八味丸非特杜絕渴疾抑且大滋氣血生長肌肉

疽源有五

一天行二瘦弱氣滯三怒氣四腎氣虛五飲冷酒食炙煿服丹藥

按前證所因雖殊其治法亦當審別經絡陰陽虛實表裏腫潰而以助胃壯氣爲主使根本堅固庶保無虞

生死形證

問曰病有甚而至生有微而至死病證難辨死生何從決乎答曰發背潰透內膜者死此言肝俞已上也未潰內陷面青唇黑便泻者死此言臟壞便瘀血也

按前證有因元氣虛弱而毒氣內陷者有因初作失於內疏托裏和榮衛者有因毒盛失於消解者有因虛弱失於補托者有因膿成失於針刻者有因腐潰失於補養者若發背屬濕熱上壅者黃連消毒散補中益氣湯以除濕毒補脾肺滋腎水

麥飯石膏治效

李氏云麥飯石膏治發背癰疽神妙惜世罕知有患者因膿不潰以毒藥攻之其勢益甚毒延咽喉腳膝皆爲不治余用此膏一夕頓潰凡疽得膿其毒始解或有不潰者須用此膏故錄之俾精擇修合以收十全之功也

按前證屬腑陽而氣血未損者用前膏敷之固無不愈然亦有屬臟屬陰而氣血有虧者當審其因而調治其內可也大凡瘡瘍之作由胃氣不從瘡瘍之潰由胃氣腐化瘡瘍之飲由胃氣營養余嘗治初結成腫者托而散之已成欲作膿者托而腐之膿成未潰者托而開之膿已潰者托而斂之東垣先生云胃氣乃生發之源爲人身之本丹溪先生亦謂治瘡當助胃壯氣使根本堅固厥有旨哉

寒熱多汗用藥

李氏云近有數人病背疽或先寒後熱或先熱後寒或連日或間日必嘔痰大汗而後止皆用柴胡桔山不應余謂此因脾氣不正復感寒邪痰盛而作遂先用不換金正氣散次用排膿內托散木香湯三日即愈

按前證若外邪既去而仍作宜用六君子湯以補脾胃大凡胃氣虛而作嘔者必喜溫熱毒內攻而作嘔者必喜寒治當辨之

發熱屬腎虛

李氏曰一發背之熱未有不自腎虛而得之者必須五更服加減八味丸

按前論誠爲啓發後人垂惠永久蓋發背由腎經溫

熱盛火上炎中傳惡證若非加減八味丸滋腎水以制心火補中益氣以生化源欲望其生難矣啓元子云大寒而甚熱之不熱是無火也當助其心大熱而甚寒之不寒是無水也當益其腎夫寒之不寒責其無水熱之不熱責其無火熱之不久責心之虛寒之不久責水之少竊謂無火者當用八味丸以益其心無水者當用六味丸以滋其腎

又按肘後用冬瓜切去一頭合瘡上瓜爛復切合之若疽腫痛甚其邪在表者最宜用此法宣熱拔毒以通其滯若腫痛發渴大便祕結其邪在裏者須佐以內疏黃連湯通利臟腑以瀉其毒在經絡者當助以托裏榮衛湯以調氣血斯善

分別三因

陳無擇云發背者該三因而有之論曰癰疽瘰癧不問虛實寒熱皆由氣鬱而成經亦云氣宿於經絡與血俱溫而不行壅結爲癰疽不言熱之所作而後成癰者此乃內因喜怒憂思有所鬱而成也身有熱被風冷搏之血脈凝泣不行熱氣壅結而成亦有陰虛陽氣淒襲寒化爲熱熱成則肉腐爲膿者此亦外因寒熱風濕所傷而成也又服丹石及炙煿酒麵溫牀厚被所致又盡力房室精虛氣節所致者此乃因不內外所傷而成也故知三因備也

按所分三因雖備但未具瘡瘍之邪在經在表在裏之異故其治法亦不得詳備也

背瘡總論

發背屬督脈膀胱經凡陰虛火盛或醇酒厚味或鬱怒房勞或丹石熱毒皆能致之若腫赤痛甚脈洪數而有力者熱毒之證也爲易治若漫腫微痛色黯作渴脈雖洪數而無力者陰虛之證也爲難治若不腫不痛或漫腫色黯脈微細者陽氣虛甚也尤爲難治

背疽之人難於隱几用菜豆十餘斗作一大袋隱伏則自然心涼身安

若腫脊作痛寒熱作渴飲食如常此形氣病氣俱有餘也先用仙方活命飲後用托裏消毒散解之

頭痛拘急乃表證先服人參敗毒散一二劑如厥痛用金銀花散或槐花酒神效托裏散

脊痛腫硬脈實以清涼飲仙方活命飲苦參丸

腫硬木悶疼痛發熱煩躁飲冷便祕脈沉實者內疏黃連湯或清涼飲大便已利欲得作膿用仙方活命飲托裏散蜘蝥丸外用神異膏

漫腫微痛或色不赤飲食少思此形氣病氣俱不足也用托裏散補之

不作膿或膿成不潰陽氣虛也托裏散倍加肉桂參芪

膿出而反痛或膿清稀氣血俱虛也八珍湯

惡寒形寒或不收斂陽氣虛也十全大補湯

脹熱內熱或不收斂陰氣虛也四物加參朮

作嘔欲嘔或不收斂胃氣虛也六君加炮薑

食少體倦或不收斂脾氣虛也補中益氣湯加茯苓半夏

肉赤而不斂血熱也四物加山梔連翹

肉白而不斂脾虛也四君加酒炒芍藥木香

小便頻數者腎陰虧損也加減八味丸

腫高脊痛脈浮者邪在表也托之

脊痛煩躁或咽乾火在上也宜瀉之

腫痛或不作膿者邪氣凝結也宜解之

腫痛飲冷發熱譫語者火也宜清之

不作膿或不潰及不斂者陽氣虛也宜補之

瘀肉不腐或積毒不解者陽氣虛也宜助陽氣

膿多或清者氣血俱虛也宜岐補之

右關脈弱而肌肉遲生者宜健脾胃

若初患未發出而寒熱疼痛作渴飲冷此邪氣內蘊也仙方活命飲口乾飲熱漫腫微痛此元氣內虛也托裏消毒散飲食少思肢體倦怠脾胃虛弱也六君子湯如未應加薑桂其有死者乃邪氣盛眞氣虛而不能發出也在於旬餘之間見之

若已發出用托裏消毒散不腐潰用托裏散如不應急溫補脾胃其有死者乃眞氣虛而不能腐潰也在於二旬之間見之

若已腐潰用托裏散以生肌如不應急溫補脾胃其有死者乃脾氣虛而不能收斂也在於月餘間見之

此三證雖不見於經籍予嘗治而歷驗者

嘗治發背初起未成膿先用烏金膏或援生膏點患處數點以殺其大勢更服仙方活命飲如飲食少思或不甘美用六君子湯加藿香連進三五劑如外皮腐動用雄黃解毒散洗之每日用烏金膏塗腐處候有瘡口即用紙作撚蘸烏金膏紐入瘡內若有膿爲筋膜間隔不出致作脹痛用針引之腐肉堵塞者去之若瘀肉腐動用豬蹄湯洗如膿稠脹痛飲食如常瘀肉自腐用消毒藥與托裏相兼服之仍用烏金膏塗搽若瘀肉已離好肉即去之如膿不稠不稀微作

痛飲食不甘瘀肉腐遲用桑柴灸患處更用托裏藥主治之瘀肉不腐或膿清稀不覺痛者服大補之劑仍用桑木灸之以補接陽氣解散鬱毒其肉自腐

張三錫醫學準繩六要

痛因

看書久坐對奕而腰背痛者屬虛補中益氣湯爲主

八物湯

肥人多痰年高必用人蔘而痛快者屬痰屬虛除濕化痰兼補脾腎

醉飽後多痛欲蔘是脾不運而濕熱作楚也須節飲瘦人多是血少陰虛亦不禁酒及厚味而然養血清火四物酒芩連牡丹皮

背痛須加羌活防風引經肥人少佐附子

有素虛人及病後產後經行後心痛或牽引乳脅或走注肩背此元氣上逆當引使歸元不可復下疏刷愈刷愈痛發汗人患此者衆惟宜温補拘於痛無補法之言誤矣汗者心之液陽受氣於胷中汗過多則心液耗陽氣不足故致痛也

陶華六書

惡寒

背爲陽腹爲陰背惡寒陽不足也陽不足則陰氣盛陰氣盛口中和陽氣內陷者口乾燥附子白虎宜加詳審

口中和背惡寒者屬少陰附子湯及灸氣海陽氣內陷口乾燥背惡寒白虎湯

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百九十六卷目錄

醫部彙考一百七十六

背脊門二

王肯堂證治準繩 强痛 天柱發對心發對臍發 陰陽疽 禽疽 滿天星 老鼠攢 竟體發 酒毒發疽 黃瓜癰 龍疽 丹毒發疽 蜂窩發

陳實功外科正宗 發背陽證歌 陰證歌 半陰半陽證歌 繃縛背瘡法

喻昌醫門法律 惡寒 作痛

陳士鐸石室祕籙 疼痛 開裂

方一 苦蔞薤白白酒湯 苦蔞薤白半夏湯 烏頭赤石脂丸 通氣散 通氣防風湯 丁香五套丸 加減當歸飲子 又方 熨背散 下氣湯 檳榔湯 又方 禦寒膏 三合湯 蒼朮復煎湯 白散子 清涼膏 豬蹄湯 透膿散 又方 神功活命湯 黃連解毒湯 妙貼散 二十四味流氣飲 參芪內托十宣散 十奇散 酒煎散 內托十宣散 圍藥 攻毒流氣飲 千金內托散 人參內托散 萬應黑虎膏 神仙救命丹 又方 開胃散 護心散 忍冬酒 犀角散 洪寶丹 金絲萬應膏 附煉松香法 黃芪竹葉湯 八味黃芪散 內補散 生肉膏 又方 蝟皮散 又方 內補散 又方 李根皮散 大內塞排膿散 漏蘆湯 五利大黃湯 托裏散 內托裏散 溺腫湯 當歸托裏湯 翠霞散

藝術典第一百九十六卷

醫部彙考一百七十六

背脊門二

明王肯堂證治準繩

强痛

脊痛項强腰似折項似拔衝頭痛乃足太陽經不行也羌活勝濕湯主之若打撲傷損從高墜下惡血在太陽經中腰脊痛不可忍地龍湯主之

按脈經云風寒汗出肩背痛中風小便數而欠者風熱乘其肺使肺氣鬱甚也當瀉風熱以通氣防風湯主之然則寒熱氣不足以息而肩背痛小便遺失者當以人參黃芪之屬補肺氣之虛不言可知也

天柱發對心發對臍發

或問背發疽有幾日上中下三發俱在脊中屬督脈上發者傷於肺發於天柱骨下爲天柱發中發者傷於肝爲對心發下發者傷於腎爲對臍發皆由積熱怒氣所致初如粟米或痲或痒或拘急或不痛或大痛初覺便宜隔蒜灸之或汗或下或托量其虛實施治腦發背發在上者不可用木通恐導虛下元故也老弱者尤宜戒然三發背總要之地與他處不同尤所當謹微有痛痒宜速治之活命飲加羌活紫金丹勝金丹奪命丹選用壯實者一粒金丹八陣散等下之老弱者黃芪木香散十全大補湯托之

陰陽疽

或問背上痲木不常時腫時塌忽軟忽硬乍寒乍熱何如曰此名陰陽疽由七情內乖陰陽不和也此證必大渴神清脈定者可治活命飲加羌活或勝金丹奪命丹選用昏迷躁亂飲食不進者死十日得黃白膿者可治數日無膿者死

禽疽

或問背忽痲木拘急不痛十數處肉紫色如拳觸狀何如曰此名禽疽七日內寒熱口噤者死急服活命飲加羌活獨活勝金丹奪命丹得汗可治無汗不治神清脈和可治神昏脈躁或微或代者死漫腫不潰宜服臺閣紫微丸

禽疽始發者如疹數十處如拳打之狀發寒齒噤如此者十四日死十日可刺導引膿出即愈

滿天星

或問背疽兩頭小四邊散何如曰此名兩頭發又名滿天星一名廣綿背發因怒蓄熱所致活命飲加羌活紫金丹勝金丹壯實者八陣散一粒金丹下之腫高紅潤者生低陷黑暗者死

老鼠攢

或問背脊之間三兩處發疽何如曰此名老鼠攢一名遊走血脾癰由怒氣積熱所致多發於足少陽足厥陰二經宜順氣清熱之劑服黃連解毒湯活命飲加黃連梔子及服紫金丹壯實者一粒金丹下之老弱者黃芪木香散內補十宣散選用七日不見膿黑陷及躁亂者死

竟體發

或問背上生疽肉色不變痲木微痒頑如牛領之皮二三尺許何如曰此名竟體發亦名椒眼發由盛暑時空腹感觸穢氣及憤怒積鬱所致宜活命飲加羌活或黃連解毒湯勝金丹烏金散選用壯實者八陣散一粒金丹下之七日內未成膿宜隔蒜灸灸而起發神清脈和者可治灸而不起腹脹神昏脈微或促或代者死服汗劑得汗者生無汗者死服補劑紅潤起發知痛者生膨脹不食乾枯黑陷者死

酒毒發疽

或問背當心而痛痲木不常累累如彈如拳堅硬如石痛徹五內遍身拘急何如曰此名酒毒發疽由饑飽勞傷炙煿厚味所致宜服黃連解毒湯加羌活乾葛或神效消毒散內疏黃連湯紫金錠勝金丹選用

神昏脈亂大渴狂言有妨飲食者死二便閉結者死有因寒變而內陷者用托裏溫中湯

黃瓜癰

或問背側生疽高二寸長尺許狀如黃瓜肉色不變何如曰此名黃瓜癰一名肉龜疼痛引心四肢麻木是也此證多不可治急服紫金丹勝金丹活命飲加羌活柴胡及奪命丹神仙追毒丸選用脈微自汗譫語者死平塌黑色者獨薑散主之服臺閣紫微丸

龍疽

或問第九椎兩旁忽腫痛而無頭寒熱大作何如曰此名龍疽即中搭也屬太陽經由憤怒積熱所致壯實者急服一粒金丹或八陣散下之活命飲加柴胡羌活黃芩水酒各半煎服老弱者黃芪木香散內補十宣散十全大補湯選用色赤起發潤澤者可治色黑低陷惡心眩運大便滑泄小便如淋譫語者死

丹毒發疽

或問背上細瘟無數浸淫一二尺如湯火傷煩躁多渴何如曰此丹毒發疽也因服丹石剛劑所致紅潤者生紫黯者死惡證少者宜服黃連消毒散勝金丹國老膏惡證多神昏脈躁膨脹嘔噦者死

蜂窩發

或問背患疽狀如蜂房十日而平塌寒熱痛楚殊甚飲食少進膨脹淋瀝何如曰此蜂窠發也其脈微而遲四肢厥冷爲不足乃過服耗氣之劑又暴怒而然用活命飲加參芪歸朮兼以烏藥青皮木香間與紫金丹服之起發膿潰服十全大補湯

陳實功外科正宗

發背陽證歌

癰疽不論上中下惟在陰陽二證推發背雖有正與偏要取高低兩樣看純陽初起必畀腫更兼身熱有微寒頂如尖字高突起腫似灣弓根有盤七日之間多畀痛二七之期膿漸漫動息自寧食知味二便調勻無瀉乾腫消膿潰精神爽脫腐生新氣血完五善自然臻並至七惡全無半點干痛便隨膿減腫退自肌寬新肉已生紅艷艷腐皮自斂白漫漫一身多爽快五臟盡和歡此屬純陽俱易活百人百可保平安

陰證歌

純陰初起不知瘡粟米之形疙瘩僵不紅不腫不知痛少熱少畀少隄防七朝之後身體倦瘡根平大喜澆湯頂不高兮根不活色不光兮腐不穰軟陷無膿空結聚脈浮散大細飛颺飲食不餐身戰戰嘗湯止許意忙忙瘡上生衣如脫甲孔中結子似含芳膿多臭穢身難便舉動倉皇韻不長瘡形成紫黑面色變青黃精神昏憒多鼾睡言語無人自發揚口乾多舌强痰喘定身亡此屬純陰俱不治百人百可到泉鄉

半陰半陽證歌

陰陽之證兩相交生死同兼事可招微熱微寒微赤腫半昏半爽半平高脈來雖數多無力飲食雖餐不易消腫而不潰因脾弱潰而不斂爲膿饒大便多溏小便數上身有汗下身焦五善雖兼有七惡未全逃口渴喜湯腸腹痛面浮饜飲足心高心煩不穩睡神亂怕音焦投方應病方爲妙陰轉爲陽漸可調心眞造化命爾堅牢逢之任是神仙手半死餘生定莫逃

繃縛背瘡法

發背已潰流膿時冬夏宜絹帛四五層放貼膏藥外再用棉布方八寸四角用蛇皮細帶貯之安盍絹上以帶紮在前胷繃實瘡上庶使瘡中暖氣不洩易於腐潰洗瘡時預備二繃更換務要患內暖氣烘烘

醫門法律 臣喻昌著

惡寒

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者用灸及附子湯外內協攻之法夫口中和而不燥不渴其無裏證可知況背爲督脈總督諸陽上行之地他處不寒獨覺背間寒其爲陽虛陰邪上湊可知故外灸內溫兩法並施必求陰消陽復而後已不知者謂傷寒纔一二日外證且輕何反張皇若此詎識仲景正以一二日即顯陽虛陰盛之證蚤從暴病施治此見微知著也若待至三四日勢必極盛難返不可救藥矣

作痛

心痛徹背背痛徹心乃陰寒之氣厥逆而上干者橫格於胷背經脈之間牽連痛楚亂其氣血紊其疆界此而用氣分諸藥則轉益其痛勢必危殆仲景用烏頭赤石脂丸以蜀椒烏頭一派辛辣以溫散其陰邪然恐胷背既亂之氣難安而即於溫藥隊中即用乾薑之泥赤石脂之澀以塡塞厥氣所橫衝之新隧俾胷之氣自行於胷背之氣自行於背各不相犯其患迺除此煉石補天之精義也今人知有溫氣補氣行氣散氣諸法矣亦知有堵塞邪氣攻衝之實令胷背陰陽二氣並行不悖者哉

石室祕錄 臣陳士鐸著

疼痛

背脊骨痛者乃腎水衰耗不能上潤於腦則河車之路乾澀而難行故爾作痛此等證非一二劑可以見功非久服補氣之藥以生陰非大服補陰之藥以生水未易奏功也方用黃芪熟地各一兩山茱萸麥門冬各四錢北五味一錢白朮五錢防風五分茯苓三錢附子一分水煎服此方補氣則有黃芪白朮補水則有熟地山萸去濕則有茯苓去風則有防風引經則有附子而又有麥冬以生腎水之母自然金旺生水水足則河車之路不乾不乾則潤金滋骨可知又何痛之作楚既不痛矣又何背之不直哉然此方不能奏功於旦夕必須多服久服乃效

如人患背疼者人以爲心病而非心也乃膀胱之氣化不行故上阻滯而作痛法當清其膀胱之火背痛自止蓋膀胱乃腎之腑腎虛膀胱亦虛夾脊乃河車之路膀胱借腎道而行所以背脊作楚耳方用熟地一兩肉桂三分車前子澤瀉各三錢薏仁茯苓芡實各五錢水煎服二劑膀胱之水道大通而背脊之疼亦愈矣蓋熟地乃補腎之聖劑腎足而膀胱之氣亦足矣又有茯苓車前薏仁類以瀉其水肉桂又引入諸藥直達膀胱以通其氣自然化行而水泄水泄而火散上行之鬱結有何不除此病之所以立效也

開裂出蛇蝨

如人有背上忽然疼痛裂開一縫擠出蛇一條長二尺者頗善跳躍予親手治之而驗其證必先背脊痛甚而又無腫塊久則腫矣長有一尺許一條直似立在脊上予乃用刀輕輕破其皮而蛇忽跳出其人驚絕予乃用人參一兩半夏南星各三錢附子一錢治之忽蛻生肌散數其患處而愈

人有背脊裂開一縫出蝨千餘此乃腎中有風得陽氣吹之不覺破裂而蝨現方用熟地山茱萸各三兩杜仲一兩白朮五錢防己一錢稀莶草三錢二劑裂縫生蝨盡死

又有一方用蓖麻三粒研成如膏用紅棗三枚搗成爲丸如彈子大火燒之熏衣上則蝨死而縫合亦絕奇方也眞不可思議矣蓖麻子能殺蝨蝨去風出則縫自合矣

方一

苦蓼薤白白酒湯 金匱要略下同

治胃背痛

苦蓼實一枚搗　薤白半斤　白酒七升

右三味同煮取二升分溫再服

苦蓼薤白半夏湯

治胃病不得臥心痛徹背者

苦蓼實一枚搗　薤白三兩切　半夏洗半升

白酒一斗

右四味同煮取四升溫服一升日三服

烏頭赤石脂丸

治心痛徹背背痛徹心者

蜀椒　赤石脂各一兩一法各二分　烏頭一分炮

附子半兩炮一法　乾薑一兩一法

右五味末之蜜丸如梧子大先食服一丸日三服不知稍加服

通氣散

治風熱肩背痛

防風　蓽本　羌活　獨活各八分　黃芩酒炒

黃連薑汁炒各一錢

右㕮咀水煎服盧加人參

通氣防風湯 東垣十書

治肩背痛

柴胡　川升麻　黃芪各一錢　防風　羌活

陳皮　人參　甘草各五分　白豆蔻仁二分

黃蘗一分　蓽本　青皮各三分

右水煎溫服食後氣盛者宜服面白脫色氣短者勿服

丁香五套丸 和劑局方

治肩背痛

南星每箇切作十數塊同半夏先用水浸三日每日易水次用白礬二兩研碎調入水內再浸三日洗淨焙乾　半夏切各二兩　乾薑炮　白朮　良薑　白茯苓各一兩　木香　丁香俱不見火　青皮　陳皮去白各半兩

右爲末用神麴一兩大棗葉二兩同研取末打糊丸如梧桐子大每服五十丸加至七十丸不拘時溫熱水送下

加減當歸飲子 元珠

治肩背忽痛

當歸　防風　柴胡　生地黃　大黃各一兩半　白芍藥　黃芩　人參各一兩　甘草一兩三錢　滑石六兩　黃連五錢

右每服六七錢水煎

又方

治背痛

薑黃四兩　甘草炙　羌活　白朮各一兩

右每服一兩水煎

熨背散 千金方下同

治胷背疼痛而悶

芎藭一兩六銖　烏頭　細莘　附子　羌活

蜀椒　桂心各五兩

右七味治下篩布裹微火炙令煖以熨背上取瘥乃止慎生冷如常法

下氣湯

治胷腹背閉滿上氣喘息

杏仁四七枚　大腹　檳榔各二七枚

右二味㕮咀以童子小便三升煎取一升半分再服曾患氣發輒合服之便瘥

檳榔湯

主破胷背惡氣音聲塞閉

極大檳榔四枚　極小檳榔八枚

右一味二品㕮咀以小兒尿二升半煑減一升去滓分三服頻與五劑未定

又方

治膀胱實熱背强痛

梔子仁 一作瓜子仁　茯苓　知母各三兩　淡竹葉

生地黃切各一升　蜜五合　石膏八兩

右七味㕮咀以水七升煑取二升去滓下蜜煑二沸分三服須利加芒硝三兩

禦寒膏 古今醫鑑下同

治體虛人背上惡寒或夏月怕脫衣及婦人產後被風冷手足冷痛至骨又治腰痛

生薑半斤取自然汁　明膠三兩　乳香　沒藥各一錢半共入薑汁內

右於銅杓內煎化移在滾湯內頓以柳條攪至成膏又入川椒末少許再攪勻用皮紙攤貼患處以鞋底烘熱熨之候五七日脫下或起小瘡不妨

三合湯

治背心一點痛

烏藥順氣散　合二陳湯　香蘇散　加羌活

蒼朮

右水煎服

蒼朮復煎湯 丹溪心法

治寒濕相合腦痛脊骨胛眼痛膝臏痛

蒼朮四兩　羌活　升麻　澤瀉　柴胡　藁本

白朮各五分　黃蘗三分　紅花少許

右剉先以蒼朮用水二椀煎至一椀去滓入羣藥於蒼朮湯內再煎至半去滓服

白散子

治發背候取下毒無次用清涼膏貼之

白附子　大香附子各半兩　半夏一分薑製

黑牽牛二兩半生半炒令熟　大甘遂一分以大麥炒候黃若赤色不用須極慢火炒之

右爲末量患人虛實加減每服二錢以蜜酒調下續飲溫酒一兩盞候所苦處刺痛爲度微利三五行瀉出惡物卽瘥次用膏藥貼之氣盛者一服二錢餘更裁度

清涼膏

治發背等先用白散子取之次用此藥貼之

當歸二兩　香白芷　木鼈子肉　白芨　芍藥

黃蘗　白蘞各一兩　乳香別研　白膠香別研

膩粉各少許　黃丹五兩

右用清麻油十兩煎前六味候紫色去之入槐柳枝各七寸再煎少頃又去之入黃丹五兩熬成入乳香等藥綿濾入罐子內貯之用如常貼使

猪蹄湯

一切發背等證用此洗之能消毒氣去惡肉凡瘡有口急用之

香白芷　黃芩　赤芍藥　露蜂房小孔多者佳

當歸　羌活　生草　地骨皮

先將雄猪前蹄一隻以水四椀煑熟去蹄取汁澄去面上油膩取清汁加前藥煎三四滾取汁將敗筆或軟絹蘸藥湯徐徐洗之須要避風并人口中氣

透膿散

癰疽發背不用開刀服之一日夜自透出一頭蛾口繭出了蛾者

右將一枚燒作灰用酒調服切不可用兩枚三枚若服一枚只一頭多服多頭

又方

治發背癰疽惡瘡

人參　黃芪　當歸　白朮各五錢　橘紅一錢半

右剉水煎入竹瀝薑汁和勻服之如欲煎膏加參芪等藥各四兩

腫瘍加當歸連翹羌活

潰瘍加芍藥川芎甘草白芷
酒毒加酒炒黃連
氣加炒香附
痰加瓜蔞仁
發熱加酒炒黃芩
渴加麥冬天花粉
惡心加半夏生薑藿香
解毒加金銀花甘草節
瀉加蒼朮白朮俱土拌炒
在太陽經上加羌活
在少陽經上加柴胡
在陽明經上加鼠黏子白芷升麻

神功活命湯

治癰疽發背

當歸　川芎　生地黃　白芍藥　連翹　黃蘗
知母　白茯苓　生甘草　升麻　白朮　桔梗
黃芩　獨活　青皮　白芷　苦參　花粉

右水煎服體盛加參朮減苦參連翹

黃連解毒湯

治背脊對心發

黃連薑汁拌炒　甘草　升麻　桔梗　白茯苓
黃芩酒炒　山梔　當歸　川芎　白芍　生地
枳殼　元參　花粉　連翹　小柴胡　金銀花

右燈心爲引臨用加犀角汁四劑後宜加人參
妙貼散

治流注發背

白芷　南星　肉桂　蛤粉各五錢　文蛤一兩
芍藥七錢　多年小粉八兩炒焦　白芨四兩

右磨末每用生薑自然汁好醋葱蜜搗汁和勻火上熬熱調藥如糊數四向空中出毒乾再用前汁潤之以助藥力

二十四味流氣飲

治證同上

陳皮　半夏製　升麻　乾葛　甘草　澤瀉
白茯苓　蒼朮　厚朴　木香　羌活　獨活
防風　荆芥穗　薄荷　黃芩　川芎　當歸
生地　白芍藥　黃芪　青皮　木通　白芷

右水二鍾薑五片葱白三根煎熱服以衣覆患上出汗爲妙止可一服冬天加紫蘇大柴胡

參芪內托十宣散

治證同上

人參一錢五分　陳皮八分　甘草三分　升麻
白茯苓各一錢　黃芪蜜炙　白朮土炒　澤瀉
當歸各二錢　生地黃　川芎　白芍藥　黃芩
花粉　烏藥　前胡　黃蘗　知母

右煎服冬天加桂倘有別內證因證加減

十奇散

治發背傷於腎者

桔梗　人參　當歸身　花粉　五味子　芍藥
烏藥　香附　枳殼　木香

囊腫加川楝子檳榔

百節疼痛加木瓜牛膝赤芍

寒熱加柴胡黃芩

酒煎散

治發背因毒內攻其毒與好肉一般平者用手按之如牛頸之皮上有黃泡出歷水乃毒入於肺若不速治即死

當歸　穿山甲炮　白芷　升麻　肉桂　木香
川芎　赤芍　甘草

右酒煎服

內托十宣散

治蜂窩發背

人參　黃芪炙　白朮炒　當歸　白芍　厚朴
連翹　桔梗　防風　甘草　荆芥穗　金銀花
白芷　川芎　官桂

右水二鍾煎八分食前連進十貼

虛甚者加附子

心神恍惚夜夢不安加遠志辰砂酸棗仁

大便溏泄加黃連木香白朮土炒蒼朮

內陷不發加穿山甲乳羊角燒灰

小便頻數加薏苡仁益智

膿不透加歸鬚地蜈蚣炙赤芍藥

圍藥

治一切腫毒不令內犯臟腑

南星　木鼈　草烏　貝母　大蒜另搗　白芨
五倍子

右爲末生薑汁米醋調敷留口二三日夜即消盡矣常以醋潤之

敗毒流氣飲

治發背

紫蘇葉　桔梗　枳殼　防風　柴胡　生甘草

川芎　白芷　白芍藥　當歸　羌活　白茯苓　烏藥　陳皮

右薑三片棗一枚煎服

于金內托散

治發背

桔梗　厚朴　白芷　防風　人參　黃芪蜜炙　川芎　甘草　當歸　官桂　黃芩　白朮土炒

右煎服

人參內托散

治發背

人參　白朮各二錢　陳皮　白芥子　黃芪　茯苓　川芎　白芍　蒼朮　桔梗　黃芩酒炒　烏藥　厚朴薑汁拌炒　升麻各一錢　半夏　當歸　枳實　花粉各一錢五分　香附　麥冬　黃連各五分　青皮八分　防風七分　甘草四分

右作一劑薑五片砂仁末五分煎臨服加淡竹瀝薑汁半酒杯和服之加減存乎人

萬應黑虎膏

治背上瘍注如纏袋形

多年小粉八兩炒黑　五倍炒黃　蛤粉　乾薑　南星各四兩　花粉　白芷　龜板醋炙　昆布　白芥子　烏藥各二兩　白芨五兩　肉桂三兩

右各爲細末和勻用生薑自然汁一椀好醋一椀　葱半斤搗爛加蜜三兩再搗取汁半椀三味和勻火上熬熟調藥俟遍手敷患上置一小洞出氣時用熱餘汁潤之一日夜方可易之敷至一月方得軟矣亦可下行劑

神仙救命丹

治前證待硬處活動如綿煎劑服大半方可下之否則無益有損

珍珠製研　麝香研　甘草末　枳實　全蠍末　蛤粉各一錢　冰片研三分　陳膽星末五錢　蟾酥六分　巴豆霜五分

右各爲細末和勻米粉糊和丸如桐子大每服三錢空心或酒或蜜湯送下其痰從大便中出盡爲度如不行再服卽行以薄粥補之若不待其軟遂下行藥命亦難生病者須要拱聽醫師之戒清心寡慾戒惱除憂并忌油膩生冷蒜茄等物如瀉不止可服後方

又方

治前證瀉不止者

甘草七分　黃連　車前子　酒炒白芍　炒苓　茯苓各一錢五分　蒼朮炒　白朮土炒各二錢　豬苓　澤瀉各一錢　人參　蓮肉

右水二鍾薑三片棗二枚煎服卽愈

開胃散

治發背寒氣入胃不欲飲食

縮砂仁　枳殼　陳皮　白茯苓　肉桂　甘草　藿香　厚朴

右水煎服仍用神異膏貼之

護心散

一名乳粉托裏散治癰疽初發便服毒氣不攻若惡心煩悶吃喔噦厥以至泄瀉急服之

異乾葉豆粉二兩　乳香五錢研

右和勻甘草湯調下此藥不時呷之使藥味長流胃膈間則毒氣不能攻心

忍冬酒

凡癰疽初起時便當服此不問發於何處

忍冬藤五兩　甘草一兩

水五椀煎至一椀再加無灰酒煎服

犀角散

發背不曾服粉乳托裏散以致熱毒衝於心經故咽喉口舌生瘡甚至黑爛先服犀角散以解其毒免有此證

犀角　元參　黃芪　升麻　木通　麥門冬　赤芍藥　生甘草　當歸　大黃酒煨

右每五錢水煎服

洪寶丹

治發背黑色四圍爛開用此把住好肉

天花粉三兩　薑黃　白芷各一兩　赤芍藥二兩

右共末之若病勢大熱可用熱茶清調敷如病少溫則用酒調欲箍其膿加薑汁四分茶清六分

金絲萬應膏

治癰疽發背諸腫毒定痛追膿生肌收口

川貝母半斤　草烏二兩　地骨皮四兩　黃芩　黃蘗　黃連　天花粉各一兩　小薊　大薊　赤蘞　白蘞　馬鞭草　靈仙　白芨　赤芍藥　肉桂各五錢　元參　細辛各三錢　大黃一斤　當歸　川芎　白芍藥　劉寄奴　丹皮　蘇木　紅花　露蜂房　馬屁勃　血餘　貝薑　續斷　桑寄生　木鼈　無名異　桃仁　連翹　象皮

金銀花　烏梢尾　金毛狗脊　羌活　獨活
仙靈皮　青皮　五加皮　白芷　防風　黃芪
黃蓍　穿山甲　血見愁　殭蠶　半夏　龜板
烏藥　皂角刺　天麻子　地榆　蘄艾　苦參
南星　牙皂　甘松　三柰　骨碎補　五倍子
葉本　麻黃　蟬蛻　青風藤　百合　何首烏
白鮮皮　木通各一兩　地龍三十條　蝦蟆
全蠍　蜈蚣各二十條　蛇蛻十條
已上用眞麻油二十斤春浸十日夏浸五日秋浸
十五日冬浸一月文武火煎熬旋加桑柳槐枝各
二斤鳳仙梗稀薟草益母草芋活見腫消等草
各少許新鮮者有水氣緩緩下之若驟下則油泛
上發浮慎之慎之待藥焦黑濾淨查入油磁瓶中
此藥必用絲綿覆麻布濾方精製再入鍋內慢火
煎油滴水不散爲度春夏明淨松香一斤下油二
兩柳枝攪勻候藥溫旋下乳香血竭沒藥各一兩
麝香一錢春初天氣尚寒每斤再加油半兩秋初
亦如之冬月嚴寒松香一斤下油四兩細藥同前
攪至不黏手爲度傾入水中多令人蘸水煉如黃
金色再入水中浸三日出火毒任用每藥油一斤
加天鵝油一兩能使諸藥透入骨髓
附煉松香法
松香不拘多少入淨鍋中煎熬柳棍攪之俟其煙化
將稻柴濾淨查俟冷結成塊取出任用其砂石木屑
俱在柴中矣
黃芪竹葉湯
治癰疽發背

黃芪　甘草　黃芩　芍藥　麥門冬各三兩
當歸　人參　石膏　茵蔯　半夏製各二兩
生地黃八兩　大棗三十枚擘　淡竹葉一握
生薑五兩
右十四味㕮咀以水一斗二升先煮竹葉取一斗
去滓內藥煮取三升分四服相去如人行二十里
久日三夜一
八味黃芪散（千金方下同）
治證同上
黃芪　芎藭　大黃　黃連　白芍藥　莽草
黃芩　梔子仁各等分
右八味治下篩雞子白和如泥塗故帛上隨腫大
小傅之乾則易若已開口封瘡上須開頭令洩氣
內補散
一名木占斯散治癰疽發背未潰者令消不消者
令速潰疾愈
木占斯　人參　乾薑（一作乾地黃）　桂心　細辛
厚朴　敗醬　防風　花粉　桔梗　炙甘草各一
兩
右十一味治下篩酒服方寸匕藥下咽覺流入瘡
中若癰疽灸之不能發已壞者可服之未壞者去
敗醬已發膿者內敗醬服藥日七八服夜二三服
以多爲善若病在下當膿血出此爲腸癰也諸病
在裏惟服此藥即覺其力痛者即不痛常服去敗
醬治諸瘡疽痔瘡婦人乳癰已潰便早愈醫人不
知用此藥發背無有治者若始覺背上有不好處
而渴者即勤服之若藥力行覺渴止便消散若經
已壞但日夜服之勿住藥腫自消散一方無桂心
生肉膏
治癰疽發背壞後生肉
薤白五兩　生地黃一斤　辛夷二兩　獨活
當歸　大黃　黃芪　芎藭　白芷　白芍藥
黃芩　續斷各一兩
右十二味㕮咀以臘月猪脂四升煎取白芷黃下
之去滓傅之立瘥
又方
治證同上
甘草　當歸　白芷　肉桂㕮洗去鱗甲　蜀椒
細辛各二兩　烏啄生用六分　薤白二十莖
乾地黃三兩　蛇銜一兩
右十味㕮咀以酢半斤漬一宿次內猪膏三斤煎
令沸三上三下膏成塗之立瘥
蝟皮散
治癰疽膿血諸漏壞敗男發背女乳房及五痔
刺蝟皮　露蜂房各一具　地榆　附子　桂心
當歸　續斷各五分　厚朴六分　乾薑　蜀椒
藁本各四分
右十一味治下篩空腹以酒服方寸匕日三取瘥
加螫蚤七枚益良
又方
治發背背上初欲結腫
大黃　升麻　黃芩　甘草各三兩　梔子三七枚
右五味㕮咀以水九升煮取三升分三服取快利
便止不利更進

內補散
治癰疽發背已潰排膿生肉
當歸身　桂心各二兩　人參　芎藭　厚朴
防風　甘草　白芷　桔梗各一兩
右九味治下篩酒服方寸匕日三夜二未瘥更服
勿絕外臺無防風甘草白芷
又方
治癰疽發背
蜀椒　乾薑　黃芩　人參各二分　桂心一分
小豆一合半　芎藭二兩　白蘞　甘草　附子
防風各一兩
右十一味治下篩酒服方寸匕日三夜二
李根皮散
治癰疽發背及少小瘡癰
李根皮一升　苦蔄根　半夏各五兩　通草
白蘞　桔梗　厚朴　黃芩　白附子各一兩
甘草　當歸各二兩　葛根三兩　芎藭六兩
桂心　芍藥各四兩
右十五味治下篩酒服方寸匕日三猪大困者夜
再服之曾有人患骨從瘡中出衆有三十餘癰癤
服此散瘥
大內塞排膿散
治發背癰疽經年瘥後復發此因大風或結氣在
內經脈閉塞至夏月已來出攻於背久不治積聚
作膿血爲瘡內漏
山茱萸　五味子　茯苓　乾薑各六兩　甘草
石斛　人參　桂心　芍藥各五分　巴戟天
麥門冬　乾地黃　菟絲　遠志各八分　當歸
石韋　芎藭各四分　附子　地膽　菟絲各三分
右二十味治下篩酒服方寸匕日三服夜一服稍
加之長服終身不患癰癤
漏蘆湯
治癰疽發背初覺一二日便如傷寒頭痛煩渴拘
急惡寒肢體疼痛四肢沉重恍惚悶亂坐臥不寧
皮膚壯熱大便祕澀小便赤黃並宜服之姙娠莫
服
漏蘆　白蘞　黃芩　麻黃　枳實炙去瓤
芍藥　甘草炙　矾石各一兩　大黃二兩
升麻
右除矾外餘㕮咀與矾同和勻每服三錢氣實人
五錢水一盞半支武火煎七沸去查空心熱服
五利大黃湯
治人年四十已前氣血盛多若患癰疽大小便澁
大黃根　黃芩去黑腐　升麻各一兩　芒矾
梔子各一兩二錢
右㕮咀每服五錢水一盞煎五七沸去查空心稍
熱服
托裏散
治癰疽發背膿成敗潰者
川烏頭炮　茯苓各三兩　乾薑炮　麻黃去節
甘草炙各一兩五錢　杏仁炒去皮尖　五味子
桂心各一兩
右爲粗末每服五六錢水一盞半煎至一盞去查
食前溫服
內托裏散
治癰疽發背潰後內虛者或氣弱人初覺生瘡瘍
亦可服內消宜詳細用之
當歸　芎藭　黃芪　厚朴去皮　桔梗　防風
甘草炒　官桂　人參　白芷　芍藥各一兩
右爲細末每服三錢溫酒調下或木香湯亦可
溯膿湯
治一切氣實膿毒
芍藥　丹參　黃芩去黑心　白蘞各等分
右㕮咀用藥五錢水一升煎十沸帛濾頻溫灌之
當歸托裏湯
治癰疽發背膿成潰敗者
當歸　黃芪　人參　熟地黃　川芎　芍藥
甘草炙　柴胡各等分
右爲粗末每服五錢水一盞煎至六分去滓食前
溫服
翠霞散
治癰疽發背去毒生肌
滑石一兩　銅綠五錢　輕粉二錢　片腦另研
麝香另研各三分　粉霜一字
右研細末每蕪菜紐於瘡口上以膏貼之或滑石
二兩名二聖散量其淺深輕重用之

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百九十七卷目錄
醫部彙考一百七十七
背脊門三
方二　乳香散　追毒散　化毒丸　保生挺子
神聖膏　金銀花散　奪命丹　黃藥
當歸湯　五香散　五香湯　二香散　四虎
散　乳香膏　神異膏　通毒散　青歡子
卻氣散　追風通氣散　搜膿散　撥棺膏
芙蓉膏　三神膏　神妙生肌散　撥棺膏
玉容膏　水雪膏　神僊解毒丸　將軍散
綠袍散　豆豉餅　人參敗毒散　神僊藏法
變令丹　紫金錠　犀龍奪命丹　勝金丹
十全大補湯　一粒金丹　翠青錠子　同
勝玉龍膏　螵蛸丸　桃花散　乳香拔毒散
乳香黃芪散　當歸　連翹散　趙養葵方
神授痛生湯　內消沃雪湯　琥珀蠟礬丸　雙解復生湯　同勝
肉桂散　消心散　三建湯　神靈聖法　如意金黃散　同勝
黍米丸　金丹　汴和膏　救苦救危　當歸酒
消心飲　琥珀丹　十宣散　鎮藥　烏金膏
裹散　神功散　備方活命飲　神功托
背方　海蛤拔毒散　苦參丸　雄黃解毒散　吞

藝術典第一百九十七卷
醫部彙考一百七十七
背脊門三
方二
乳香散
治發背
白乾薑　苦丁香　草烏頭各五錢　釣苓根
狼毒　乳香各一兩
右爲細末每用乾摻之或唾調作錠子紮入瘡口內

追毒散
一名追毒錠子治癰疽發背膿水不快者
五靈脂　川烏炮　白乾薑炮各一兩　全蠍五錢
右爲細末用少許摻瘡口中深者紙撚蘸藥紮於瘡口內以膏貼之或浸蒸餅令透稔去水和藥合勻撚作錠子每用紮入瘡口中

化毒丸
治一切靨毒初覺一二日欵逆煩悶或咽喉閉塞發熱惡寒
乳香另研　沒藥另研各五錢　草烏酢浸炮裂
浮石燒赤酢淬七次研各七錢　巴豆四十九粒去皮生用另研
右五味爲細末用浮石烏頭餘酢打麪糊爲丸如豌豆大每服五七丸食後冷酒調下忌熱飲取快利二三行或吐出惡物爲效

保生挺子
治疔瘡背疽癰癤一切惡瘡
金脚信　雄黃　輕粉　硇砂各二錢　麝一錢
巴豆四十九粒文武火炒研
右爲極細末用黃蠟五錢鎔開將藥和成挺子冷水浸少時取出旋丸捏作餅子如錢眼大將瘡頭撥開安一餅子次用神聖膏貼後服托裏散若瘡氣入腹危者服破棺丹

神聖膏
治發背癰疽一切惡瘡
當歸　蓽本各半兩　沒藥研　乳香研各二錢
琥珀二錢五分　黃丹　黃蠟　白膠香各二兩
膽礬　粉霜各一錢　槐枝　柳枝各一百廿條
木鼈子去皮五十箇　巴豆仁十五箇　清油二斤
右作一處先將槐枝柳枝下油內熬焦取出不用後下餘藥熬至焦黑亦濾出不用將油澄清下黃丹再熬成膏用絳帛攤之甚效

金銀花散（衛生寶鑑）
治發背惡瘡托裏止痛排膿
金銀花四兩　甘草炒一兩
右爲粗末每服四錢水酒各一盞煎至一盞去查熱服之

奪命丹（醫學補目下同）
治惡瘡癰疽發背
生大黃爲末置砂器中以木攪八十一遍飛過
牡蠣　生黃各一兩　沒藥　乳香各一錢
右爲粗末轉作丸子一錢用好酒一升木炭火熬一沸分二椀盛之夜露一宿早晨去滓空心服

黃藥當歸湯
治背疽
黃蘗炒七錢　連翹五分　黃芩炒　當歸身炒
甘草炙各一兩　黃連炒　防風各五錢　澤瀉
山梔　知母　地骨皮各三錢
右㕮咀分作四服水一小椀浸一時許入酒一匙煎至八分去查調下槐柳散大溫服

五香散
治陰陽之氣鬱結不消結核腫痛發背寒熱頭痛
木香　丁香　沉香　乳香　麝香各等分

右爲粗末每取三錢水煎服一方無麝香有藿香五香湯

凡癰疽發背因血凝氣滯而生氣血閙香則行故宜用此透達經絡

人參　黃芪　犀角屑各一錢　木香　沉香　丁香　乳香　麝香　甘草各五分

右剉作一貼水煎服或爲末點服

二香散

治癰疽發背因風氣食三者而生通用此調暢胃氣

益智仁　縮砂仁各三錢　木香　藿香　厚朴　白豆蔻　白茯苓　半夏麴　陳皮　蒼术泔浸　甘草各一錢半　丁香七分半

右爲粗末每服三錢薑五片棗二枚同水煎服

四虎散

治發背初生筋脈緊急不舒

附子生去皮一兩　天南星泡　半夏湯洗七次　狼毒各半兩

右四味爲末熱酒調成膏攤上腫處以熟絹縛定覺患處如火燒不妨

乳香膏

凡癰疽外熱內疼者是有客邪內有積毒欲作膿透之候背痛初發時小後五七日赤色腫高即暴藥令內毒徹減疼免牽引並治之

乳香一兩　青薄荷葉四兩洗乾

右研勻厚暴患處以青絹蓋之如乾以新汲水潤之常令濕其熱毒自然消散如熱毒攻結可用氣毒攻結不可用

神異膏

治一切癰疽發背

杏仁去皮尖切片　露蜂房剪淨各一兩（蜂多者妙）　蛇蛻鹽水洗淨焙乾　元參各半兩　黃芪三分　黃丹五兩研細　男子亂髮洗淨焙乾如雞子大　眞麻油一斤

右件藥先將麻油入銀銚內同亂髮於風爐上慢慢文武火熬候髮焦鎔盡以杏仁投入候杏仁色變以好綿濾去查再將所熬清油入銀銚內然後入黃芪元參二味慢火熬一二時取出銚子安一冷風爐上候半時久火力稍息旋入露蜂房蛇蛻二味將柳枝急攪移銚於火上不住手攪慢火熬至黃紫色用綿濾過後復入清油在銚內乘冷投黃丹急攪片時又移銚於火上文武火慢慢熬不住手用柳枝攪千餘轉候藥油變黑色滴於水中凝結成珠子則是膏成就矣若珠子稀再熬少時必候得所然後用磁器內封收待用或恐偶然熬火太過稍硬難用却入少蠟熬溶麻油在內磁器盛封蓋於甑上蒸乘熱攪勻收而用之膏藥熬成了須用所盛磁器置淨水盆中出火毒一晝夜數三日方可用熬此膏藥極難於火候須耐煩看火緊慢火猛即藥中火發千萬謹戒膏藥方甚多效者無出於此

遍毒散

貼發背癰疽膿盡四面皮粘恐有膿毒攻起宜用此藥

通明雄黃研飛一錢　黃藥子　白藥子各一兩　赤小豆二兩

右爲末水調敷

青散子

治發背癰疽膿盡生肉平滿宜用緊瘡口生肌

權花葉盛時收陰乾四兩　青小豆　赤小豆　白芨各二兩

右爲末臨時用權花末三錢匕白芨小豆末各一錢匕相和新汲水調攤紙上貼四畔中心瘡口不用貼

和氣散

治發背一切癰疽膿潰後氣虛脾臟滑泄并四肢逆冷

蒼术四兩米泔浸一日洗淨曬乾再以米醋炒令香黃色　甘草炙　青皮去穰各一兩　良薑炒　肉桂　乾薑炮各半兩　陳粟半升

右七味爲末每服一錢用炒茴香末半錢相和溫酒調下不拘時

追風通氣散

治癰疽發背流注腫毒腦疽打破傷折疝氣血瘕腳氣諸氣瘡塞塊痛腰痛一切痰飲爲患此藥大能順氣勻血扶植胃本不傷元氣蕩滌邪穢自然通順不生變證眞仙劑也

赤芍　木通　白芷　何首烏　枳殼　茴香　烏藥　當歸　甘草

右㕮咀酒水同煎

二仙散

治發背癰疽已成未成已潰未潰痛不可忍者
白芷未潰者用一兩已潰者用五錢　貝母未潰者用五錢已潰者用一兩
右劑好酒煎服

搜膿散

治癰疽發背一切惡瘡年深不效者
白芷一兩　芎藭二錢　白芍藥三兩　輕粉三錢
右爲細末每用乾撒瘡口上瘡口深者紙之

芙蓉膏

治發背癰疽痛如錐刺不可忍者用此登時痛止如神
芙蓉葉　黃荊子各等分
右二味入石臼內搗極爛雞子清調搽患處留頂如烟篝起立瘥此方用在未潰之先或將潰之際爲宜

三神膏

治癰疽發背
蓖麻子去殼四十九枚　陳酢一椀半　鹽一撮
右三味置鍋中用文武火熬之梳枝攪膏先將米泔水洗淨瘡搽上藥留頂未成膿者卽散已成膿者卽潰忌一切發物并酒

神妙生肌散

治癰疽發背諸般瘡毒潰爛疼痛
滴乳香燈草同研　孩兒茶　海螵蛸　赤石脂
血竭　龜板炒　鼈甲炒　水銀　黑鉛各一錢
沒藥燈草同研　硼砂各二錢
右將銀鉛同煎化將前藥各爲末入銀鉛於內研極細摻瘡上神效作痒加白芷一錢

鐵桶膏

治癰疽發背疔瘡瘭癰痔瘡粉瘤
蕎麥稈灰淋汁二椀熬至一椀　血竭　沒藥
乳香各三分爲末入汁內再熬去半椀取下待冷
黃丹　雄黃　硃砂各八分　好石灰八錢爲極細末共一處放藥汁內
右攪勻成膏磁器收貯用三稜針刺破將藥入內直送深入到底不三四次全愈

玉容膏

治發背癰疽潰爛用此生肌止痛外護
香油二兩　黃蠟　寒水石火煅爲末各一兩
黃丹末一錢
右將油蠟化開入後二味爲膏紙攤貼患處

水雲膏

治發背
乾薑炒　皂角炙去皮弦　五倍子炒　川芎各一兩　孩兒茶　乳香　沒藥各三錢　白礬火煅
槐花各一錢
右爲末猪膽汁調塗神效

神仙解毒丸

治疔瘡發背魚口諸般惡瘡腫毒初發一服立消
白礬不拘多少鎔化
作丸如菉豆大珠砂爲衣每服十九連鬚葱七八根水煎一椀送下立愈已成者不傷生未成者卽消

將軍散

治發背癰疽疔瘡惡毒一切無名腫痛煩熱初起未潰者
大黃半生半煨　甘草節等分
右爲細末和勻每用一匙空心溫酒調服一二服
疏利爲度

鐵箍散

治男婦發背無名腫毒未潰者
舊石灰四兩　五倍子四兩二味同炒黑色爲度
黃丹一兩　雄黃七錢　膽礬五錢
共爲末醋調搽留口出膿

豆豉餅

治發背癰疽腫硬不潰及潰而不斂
江西豆豉
右一味爲末唾津和作餅子如錢大厚如三文置患處以艾灼於餅上灸之餅乾再用唾津和作如前灸腫大用漱口水調作餅覆患處以艾鋪於餅上燒之如未成者用之卽消已成者縱不能全消其毒頓減前人俱稱有奇功不可忽之

人參敗毒散

治發背癰疽等證憎寒壯熱甚至頭痛拘急狀似傷寒者宜服一二劑以衰其毒輕則內自消若至六七日不消可服托裏消毒散
人參　前胡　柴胡　枳殼麩炒　羌活　獨活
川芎　桔梗　茯苓　甘草各一錢
右作一劑用水二椀煎至八分食遠服
如熱甚或痛者加黃芩黃連
大便不通加煅大黃硝

神仙截法

治癰疽發背一切惡瘡預服則毒氣不入內

眞麻油一斤銀石器內煎熬十數沸候冷

右用酒二椀入油五盞通口熱服一日用盡緩則數日服之吳安世曰吾家三世用之無有不驗又聞獵者云凡中藥箭急服麻油藥毒卽消鄭學論德甫屢用之甚驗

按麻油下三焦熱毒通大小腸滯氣若瘡瘍初起毒蓄於內大便祕結者用之以疏通其毒誠爲良法若大便不實三焦虛熱恐非所宜用者審之

賽命丹

一名賽飛龍奪命丹治癰疽發背一切無名腫毒

蠐螬　硃砂　雄黃　膽礬　血竭　明乳香　沒藥各三錢　蜈蚣　麝香各五分　北細辛　全蠍　蟬退　穿山甲　白殭蠶　猪牙皂角各六錢　片腦　白礬以信石少許同枯去信石各五分

右爲末端午日以酒糊和丸菉豆大每三九以葱酒一小鍾吞下被蓋出汗或吐若不汗再服白粥催之

紫金錠

治一切癰疽腫毒

文蛤三兩淡紅黃色者搥碎洗　山慈姑各二兩紅芽大戟洗淨一兩五錢　麝香三錢另研細

續隨子去殼研細以紙包壓去油再研一兩

右各另爲細末和勻以糯米粥和合於木臼中杵千餘下每料分作四十錠於端午重陽七夕合如欲急用辰日亦得勿令婦人孝服不具足人及雞犬之類見之合宜珍重否則無效癰疽發背未破用冷水磨塗痛處并服良久覺痒立消

飛龍奪命丹

治諸般腫毒疔疽惡瘡

蠐螬　輕粉各五分　硃砂飛研三錢　白礬枯　寒水石　銅綠各一錢　蝸牛三十一粒另研　乳香　沒藥　麝香各一錢

右件爲細末將蝸牛另碾一處丸如丸不就用好酒糊爲丸如菉豆大每服一丸生葱三五莖嚼極爛吐於手心包藥在內熱酒和葱送下如重車行五七里汗出爲效重者再服一二丸

勝金丹

治一切癰疽發背疔毒腫痛

麝香　白礬製各五分　雄黃　辰砂　乳香　沒藥　血竭各一錢半　全蠍泡炙　穿山甲炙　天龍去頭足炙各三錢　白殭蠶炙去絲五錢

蠐螬一錢

右爲細末和勻每服三分赤沙糖調葱頭酒送下取汗爲度

十全大補湯

治潰瘍發熱或惡寒或作痛或膿多或清或自汗盜汗及流注瘰癧便毒久不作膿或膿成不潰潰而不斂若血氣不足之人結腫未成膿者宜加枳殼香附連翹服之自消

人參　肉桂　地黃酒蒸焙　川芎　白芍藥炒　白茯苓　白朮黃土水拌炒　黃芪鹽水拌炒　當歸酒拌各一錢　甘草炙五分

右作一劑用水二鍾薑棗煎服

一粒金丹

治一切惡瘡癰腫無名腫毒發背

沉香　木香　乳香各五分　巴豆霜一錢五分

各爲細末照秤分兩數和勻用黑肥棗箇半去皮核搗爛爲丸如芡實大每服一丸量人虛實先嚼水一口待一次胃氣壯實者只可嚼水三四口不可太過後用水一口送藥下行盡數次以米飲補之

翠青錠子

一名善效錠子治發背潰爛追膿水長肌肉

銅青四錢　枯礬　韶粉　乳香　青黛各錢半　白斂　輕粉各一錢　杏仁二十七粒　麝香半錢

右爲細末調糊爲餅子或糯米飯和亦得看深淺紐之直至瘡平復猶可用之大有神效如青金翠霞信效紅玉諸錠針頭散追毒併等方不宜多用

謂犯生砒也如有死肉加白丁香一錢

回陽玉龍膏

治陰發背之第一藥也

草烏頭炒三兩　軍薑煨二兩　南星煨　白芷　赤芍藥炒各一兩　肉桂不見火半兩

右爲末用熱酒調塗若發背發於陰又爲冷藥所誤又或發於陽而誤於冷藥陽變爲陰滿背黑爛四圍好肉上用洪寶丹把住中間以此藥敷之一夜陽氣回黑者皆紅活卽住此藥却以沖和仙膏收功如不效欲作膿又以南星草烏加於沖和用之如陽已回黑已紅惟中間一點黑爛不能紅者

蓋血已死可以矾硝明礬白丁香硇砂乳香用唾調勻於黑紅交處作一圈上用沖和膏盒之至明早起藥自然去黑肉如割却以藥洗之掩以生肉合口藥收功

蟾酥丸

治癰疽發背疔黃

川烏　蓮花蕊　硃砂各一錢半　乳香　沒藥各二錢　輕粉　蟾酥各一錢　麝香五分

右爲細末糊丸豌豆大每服一丸病重者二丸依前法服取汗

桃花散

治癰疽發背生肌活血

烏魚骨　虎骨　龍骨各一兩　寒水石半斤煅　白石脂　赤石脂　白蘞各半兩　黃丹少許

右入白芨半兩同爲細末量瘡大小敷貼

乳香拔毒散

治癰疽發背疼痛不可忍者

乳香少許另研　泥蜂窩壁間採研

右爲末用醯酢調塗乾則以酢潤之痛立止

乳香黃芪散

治癰疽發背疼痛不可忍者或未成者速散已成者速潰敗膿不假刀砭其惡肉自下及治打撲傷損筋骨疼痛

黃芪去蘆　當歸酒洗　川芎　麻黃去根節　甘草生　芍藥　人參去蘆　粟殼蜜炒各一兩　乳香另研　沒藥另研各五錢　陳皮一兩

右爲細末每服三錢水一盞煎至七分去柤溫服如瘡在上食後在下食前服之

當歸連翹散

治發背癰疽

當歸　連翹　梔子仁　芍藥　金銀藤各一兩　黃芩五錢

右㕮咀每服五錢用水二盞煎至七分空心溫服要行加大黃二錢待藥熟入大黃煎一二沸去柤服

趙養葵方

治發背初起

穿山甲四片　牛皮膠四兩

二味俱在新瓦上燒灰研細用酒二椀調勻從容服完末無大患此方妙甚得之活人多矣且簡易可辦近以此方治諸惡疽癤皆愈始知牛皮膠之功極大也近來膏粱之人多患此不知此方之妙不肯一服而世之庸醫亦不知此方之妙自持成藥欺人多矣外用牛皮膠略用自然薑汁同水熬膏如稀泥樣爲度以布貼患處極效

神授衛生湯

治發背癰疽凡未成者即消已成者即潰能宣熱散風行瘀活血解毒消腫疏通臟腑且藥性平和功效甚速誠外科首用方也

羌活八分　防風　白芷　穿山甲炒研　沉香　紅花　連翹　石決明煅各六分　皂刺　歸尾　金銀花　甘草節　天花粉各一錢　乳香五分

大黃酒拌炒二錢脈虛便利者不用

水二椀煎八分病在上部先服藥隨後飲酒一杯病在下部先飲酒一杯隨後服藥以行藥勢

內消沃雪湯

治發背初起但未出膿堅硬疼痛不可忍者

青皮　陳皮　穿山甲　乳香　沒藥　甘草節　黃芪　當歸　連翹　金銀花　白芷　射干　花粉　貝母　白芍　皂刺各八分　木香四分　大黃二錢

右水酒各一椀煎至八分量病之上下爲食前後服之

雙解復生湯

治發背初起憎寒發熱四肢拘急內熱口乾大小便祕宜此藥發表攻裏並效

荊芥穗　防風　川芎　白芍藥　黃芪　麻黃　甘草各五分　薄荷葉　山梔仁　當歸　連翹　滑石末　金銀花　羌活　人參　白朮各八分　大黃　芒硝各二錢

水二椀表證甚者薑三片葱頭二莖裏證甚者臨服加生蜜三匙和服爲發表攻裏雙解藥也

內消散

治發背癰疽諸瘡此藥能令內消化毒爲黑水從小便而出勢大者雖未全愈亦可轉重就輕移深居淺

金銀花　知母　貝母　天花粉　白芨　半夏　穿山甲　皂角刺　乳香各一錢

右水酒各一椀煎八分隨病上下食前後服之留藥查搗爛加秋芙蓉葉細末二兩白蜜五匙同查調敷瘡上一宿自消重者再用一服忌口效

內固清心散

治發背熱甚譫痛煩躁飲冷有此證者可預防毒氣內攻當服此藥庶不變證

茯苓　辰砂　人參　元明粉　白豆蔻　甘草　乳香　明雄黃各二錢　冰片一錢　菉豆粉少許

右爲細末每服一錢五分蜜湯調下不拘時候

琥珀蠟礬丸

治發背已成未膿之際恐毒氣不能外出必致內攻預服此丸護膜護心亦且散血解毒

白礬一兩二錢　硃砂　雄黃各一錢二分　琥珀一錢另研極細　黃蠟一兩　蜂蜜二錢臨服加

右上四味先礬研極細另將蜜蠟銅杓內鎔化離火片時候蠟四邊稍凝將方入上藥攪勻其成一塊以一人將藥火上微烘衆手急丸小寒豆大用硃砂爲衣磁罐收貯每服二三十丸白湯食後送下病甚者早晚日進二次其功最效

回陽三建湯

治陰疽發背初起不疼不腫不熱不紅硬若牛皮堅如頑石十日外脈細身凉肢體倦怠形如龜甲色似土硃粟頂多生孔孔流血根陷平散軟陷無膿又皮不作腐手熱足凉者俱急服之

附子　人參　黃芪　當歸　白茯苓　枸杞子　川芎　陳皮　山萸肉各一錢　木香　生甘草　紫草　厚朴　紅花　獨活各五分

煨薑三片皂角樹根上白皮二錢水二椀煎八分入酒一杯隨病上下食前後服之用綿帛蓋煖痛上不得大開窻孔走泄元氣爲要愚按凡背疽屬陰者皆由臟腑先壞而內毒不得發越於外也舊有用雞冠剪血滴於疽上者有酢煮雄艾敷圍者猪腦熱藥敷圍者神燈火氣灼照者此數法皆陰疽之用寧雖嘗用未見其實但陰疽不起者如樹木之根壞强力培植枝葉而終無發生之理予嘗據理用藥固有得其生者十中三四譬之稼穡先疏其土通其地脈助其根本回其陽氣此四者缺一不可用蒼朮厚朴茯苓陳皮疏其土川芎當歸紫草紅花通其脈人參黃芪枸杞山萸助其本附子木香甘草獨活回其陽如此用之但根本內有一脈未絕之氣服之俱可得生又驗其手足溫暖猪便發熱漸作畢腫復生疼痛色暗得活堅硬得腐胃氣得回此是藥之效驗必在三服中應之爲吉外象照法接助回陽此通治陰疽之大法也

神燈照法

治發背初起七日前後未成者自消已成者自潰不起發者即發不腐潰者即腐誠爲良法也

雄黃　硃砂　血蝎　沒藥各二錢　麝香四分

右五味研爲細末每用三分綿紙裹藥爲撚長約尺許以眞麻油潤透燃如燈火離瘡半寸許自外而內周圍徐徐照之火頭向上藥氣入內瘡毒隨火解散自不內侵臟腑初用三條漸加至四五條候瘡勢漸消漸減熏後隨用敷藥如已潰大膿發洩時不必用此照敷只宜用膏藥盖貼

敷藥

凡發背用神燈照後即用此藥敷之

車前草連根　稀薟草　五龍草　金銀花各等分

右四味鮮草藥一處搗爛加三年陳小粉初起仍加飛鹽末二三分共打爲稠糊徧敷瘡上中留一頂以膏盖貼避風自然拔出膿毒若冬月草無鮮者預採蓄下陰乾爲末用陳米酢調敷亦如前法並效今恐前敷藥內用五龍草隨地或有缺少不便合用予嘗用神燈照後頂以膏盖周圍腫上以如意金黃散代敷亦效

如意金黃散

治發背神燈照後用此代前敷藥

天花粉上白十斤　黃蘗　大黃　薑黃各五斤　香白芷三斤　紫厚朴　陳皮　生甘草　蒼朮　天南星各二斤

以上共爲咀片曬極乾燥爲極細末磁罐收貯勿令洩氣備用

黍米寸金丹

二名返魂丹三名再生丸四名追命丹五名延壽丹六名來蘇圓七名知命丸八名得道丸此方異人所傳治癰疽發背初起惰寒壯熱四肢倦怠沉重者不分表裏老幼輕重並宜服之

麝香五分　乳香　沒藥　雄黃　狗寶　輕粉　烏金石各一錢　蟾酥　硇砂各二錢　黃蠟　粉霜各三錢　鯉魚膽陰乾三箇　豹膽一箇　白丁香四十九箇　金頭蜈蚣全者酥炙黃七條　頭胎男乳一合

右爲細末除黃蠟乳汁二味熬成膏子後入二味和丸菉豆大大人三丸小兒用一丸病重者五丸冷病用葱湯熱病用新汲水送下衣被密盖勿令

透風汗出爲度諸病如失後食白粥調理

沖和膏

治癰疽發背陰陽不和冷熱不明者宜用之

紫荊皮炒五兩　獨活炒三兩　赤芍炒二兩

石菖蒲一兩半　白芷一兩

右爲細末葱湯熱酒俱可調敷

黃拔筒

治發背已成將潰時膿毒不得外發必致內攻乃生煩躁重如負石非此法拔提毒氣難出也

羌活　獨活　紫蘇　蘄艾　鮮菖蒲　甘草

白芷各五錢　連翹葱三兩

預用新鮮嫩竹一段徑口一寸二三分長七寸一頭留節用刀剔去外青留內白一半約厚一分許靠節鑽一小孔以柳木條塞緊將前藥放入筒內筒口用葱塞之將筒橫放鍋內以物壓之勿使浮起用清水十大椀淹筒煮數滾約內藥濃熟爲度取出候用再用鈹針於瘡頂上一寸內品字放開三孔深入淺寸約筒圈內將藥筒連湯用大磁鉢盛貯患者揭前將藥筒倒出急用筒口乘熱對瘡合上以手捺緊其筒自然吸住約待片時藥筒已溫拔去塞孔木條其筒自脫將器倒出筒中物色看其何樣如有膿血相粘鮮明紅黃之色約有一二杯許其病乃是活瘡治必終愈如拔出物色純是敗血氣穢紫黑稀水而無膿意相粘者其病氣血內敗肌肉不活必是死瘡强治亦無功矣此法宋傳屬經有驗如陽瘡易潰易膿之證不必用此以傷氣血只可用之於陰瘡要在十五日前後堅硬不潰不膿者行之最當此法的有回天之效醫家不可缺也

當歸酒

治發背陰疽

肉桂五錢　當歸四錢　木香　白芷各二錢

右剉分二貼每貼酒煎去滓入乳香末半錢調服清心飲

治瘡瘍腫痛發熱飲冷脈沉實睡語不寧

防風　川芎　薄荷葉　當歸　芍藥　大黃

麻黃　連翹　芒硝各半兩　石膏末　黃芩

桔梗各一兩　滑石三兩　甘草二兩　荊芥

白朮　梔子各一分　黃連五錢

每劑一兩水二鍾煎至八分服

破棺丹

治瘡瘍熱極汗多大渴便祕譫語或發狂結陽之證

大黃二兩五錢半生半熟　芒硝　甘草各二兩

右爲末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸食後童便酒化下白湯化服亦可

十宣散

治瘡瘍脈緩體倦息惡寒或脈弦或緊細者皆宜用之散風寒助陽氣也

人參　當歸酒拌　黃芪鹽水拌炒　甘草炙

白芷　川芎　桔梗炒各一錢　厚朴薑製五分

防風　肉桂各三分

右作一劑水二鍾煎八分服

鍾乳

治發背毒甚斂走不住此藥圍之即解

芙蓉葉　白芷　大黃　山慈姑　寒水石煅

白芨　蒼耳草　黃蘗炒各等分

右各另爲末用水調搽四圍中如乾以水潤之

烏金膏

解一切瘡毒及腐化瘀肉最能推陳致新

巴豆一味去殼炒焦研如膏

右點腫處則解毒塗瘀肉上則自化加乳香少許亦可如紅瘡內能搜膿化毒加香油少許調稀可用若餘毒深伏不能收斂者宜此紲之不致成漏

援生膏

治一切惡瘡初起點破難未全消亦得以殺其毒

雄黃五錢　輕粉　蟾酥各三錢　乳香　沒藥

血竭各一錢　麝香五分

右用蕎麥稭灰或眞炭灰一斗二升淋灰湯八九椀將栗柴或桑柴文武火煎作三椀以備日久藥乾添用取二椀盛於磁器內將前藥碾爲極細末入灰湯內用鐵桿或柳枝順攪再入好細石灰一升再攪勻過一宿却分於小磁罐收貯凡遇諸惡瘡點當頭二三點一日換二次次日又二次須出血水爲妙如藥乾却加所存灰湯少許調之

神功散

治發背一切瘡瘍不問陰陽腫潰並效

黃蘗炒　川烏炮

右另爲末各等分用唾津調敷患處并塗瘡口一道人不問陰陽腫潰盛實痛否此藥用漱口水調搽不畱瘡頭日易之內服仙方活命飲甚效

仙方活命飲

治一切瘡瘍未作膿者內消已成膿者卽潰又排膿止痛消毒之聖藥也

穿山甲用蛤粉炒黃色　甘草節　防風　沒藥　赤芍　白芷　皂刺炒黃　歸尾　乳香各一錢　天花粉　貝母各八分　金銀花　陳皮各三分

右作一劑用酒一椀同入瓶內紙糊瓶口勿泄氣慢火煎數沸去渣分病之上下食前後服之能飲酒者再飲二三杯尤好

神功托裏散

治癰疽發背一切腫毒羣痛憎寒壯熱

黃芪鹽水拌炒　金銀花　當歸　粉草各一錢

右作一劑用酒水各一鍾煎至一鍾分病上下食前後服少頃再進一劑查數患處不問陰陽腫潰老少虛實皆可服爲末酒調服尤效

清涼飲

治發背瘡瘍煩躁飲冷羣痛脈實大便閉結小便赤澁

大黃炒　赤芍藥　當歸　甘草各二錢

右作一劑用水二鍾煎八分食前服

苦參丸

治一切癰疽瘡毒羣痛作渴或煩躁

苦參不拘多少

右爲末用水糊爲丸如梧桐子大每服二三錢溫酒下

雄黃解毒散

治一切癰腫潰爛毒勢甚者先用此藥二三次以後用猪蹄湯

雄黃一兩　白礬四兩　寒水石煅一兩半

右用滾水二三椀乘熱入前藥末一兩洗患處以太乙膏或神異膏貼之

發背方（中藏經）

燒車螯　蘆殼（如無以竹根代）　黃蘗　甘草

右等分爲末先以青鹽薄荷芫荽樓葱煮漿水湯洗瘡男子以婦人婦人以男子唾調前藥塗之以赤水出爲度

海馬枚毒散

治疔瘡發背惡瘡大有奇效

雄黃三錢　海馬一對炙黃　穿山甲黃土炒　硃砂　水銀各一錢　冰片　麝香各少許

右爲末入水銀研不見星每以少許點之一日一點毒自出也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百九十八卷目錄

醫部彙考一百七十八

背脊門四

單方

鍼灸

導引

醫案一

藝術典第一百九十八卷

醫部彙考一百七十八

背脊門四

單方

發背癰癤取多年煙熏壁土黃蘗等分爲末薑汁拌調攤貼之更以茅香湯調服一錢壁土取東迎太陽者經驗方

又方取糞坑底泥陰乾爲末新水調傅其痛立止時珍

發背欲死取伏龍肝末酒調厚傅之乾卽易平乃止千金方

癰腫發背酢磨濃墨塗四圍中以猪膽汁塗之乾又上一夜卽消趙氏方

又方廚內倒弔塵爲末以生葱極嫩心同搗膏傅之留頂一日一換乾則以水潤之集簡方

又方用甘草三兩微炙瓶盛酒一斗浸甘草乃以黑鉛一斤鎔化投酒中如此九度去查飲酒醉臥卽愈經驗方

發背惡瘡及諸癰疽好光粉二兩眞麻油三兩慢火熬以柳枝急攪至滴水成珠入白膠末少許入器水浸兩日油紙攤貼名神應膏直指方

發背初起鐵漿飲二升取利外臺祕要

疽瘡發背銀硃白礬等分煎湯溫洗却用桑柴火遠遠灸之日三次甚效救急方

麥飯石膏治發背瘡甚良乃中岳山人呂子華祕方取麥飯石石大小不等或如拳或如鵝卵或如餅大略狀如握聚一團麥飯有粒點如豆如米其色黃白但於溪間麻石中尋有此狀者卽是取此石碎如棊子炭火燒赤投米酢中浸之如此十次研末篩細入乳鉢內用數人更碾五七日要細膩如麪四兩鹿角一具要生取連腦骨者其自脫者不堪用每二三寸截之炭火燒令烟盡卽止爲末研細二兩白蘞生研末二兩用三年米酢入銀石器內煎令魚目沸旋入藥在內竹枝子不住攪熬一二時久稀稠得所傾在盆內待冷以紙盍收勿令塵入用時以鵝翎拂膏於腫上四圍赤處盡塗之中留錢大洩氣如未有膿卽內消已作頭卽撮小已潰卽排膿如湍水若病久肌肉爛落見出筋骨者卽塗細布上貼之乾卽易逐日瘡口收斂但失陷下穴者卽無不瘥已潰者用時先以猪蹄湯洗去膿血故帛拭乾乃用藥其瘡切忌手觸動嫩肉仍不可以口氣吹風及腋氣月經有孕人見之合藥亦忌此等初時一日一洗一換十日後二日一換此藥要極細方有效若不細塗之卽極痛也此方孫眞人千金月令已有之但不及此詳悉且又北齊馬嗣明治楊遵彥背瘡取粗黃石如鵝卵大者猛火燒赤納濃酢中當有屑落酢中再燒再淬石至盡取屑日乾搗篩極細末和酢塗之立愈劉禹錫傳信方謂之鍊石法用傅瘡腫無不驗

發背初起惡寒齎齎或已生瘡腫癮疹消石三兩煅水一升泡化青布摺三重溫溻赤處熱卽換頻易取瘥外臺祕要

發背初起疑似者便以秦艽牛乳煎服得快利三五行卽愈集驗方

癰疽發背用胡燕窩土鼠坌土榆白皮苦蔞根等分爲末以女人月經衣水洗取汁和傅腫上乾卽易之潰者封其四圍五日瘥千金方

發背初起地菘杵汁一升日再服瘥乃止傷寒類要

發背潰爛陳蘆葉爲末以葱椒湯洗淨傅之神效乾坤福韻

發背欲死及一切腫毒赤遊風疹或風熱頭痛芭蕉根搗爛塗之肘後方

發背初起草決明生用一升搗生甘草一兩水三升煑一升分二服大抵血滯則生瘡肝主藏血決明和肝氣不損元氣也本事方

又方用牡蠣粉灰以雞子白和塗瘡四圍頻上取效千金方下同

又方鹿角燒灰酢和塗之日五六易

發背腫毒未成者用活蟾一箇繫放瘡上半日蟾必昏憒置水中救其命再易一箇如前法其蟾必踉蹡再易一箇其蟾如舊則毒散矣累驗極效若勢重者以活蟾一箇或二三箇破開連肚乘熱合瘡上不久必臭不可聞再易二三次卽愈愼勿以物微見輕也醫林集要

癰毒初起大蝦蟆一箇剁碎同炒石灰研如泥傅之頻易（余居士方）

癰疽發背及發乳諸毒用吳茱萸一升搗爲末用苦酒調塗帛上貼之（外臺秘要）

癰疽發背用母猪蹄一雙通草六分綿裹煮羹食之（梅師方）

發腦發背及癰疽熱癤惡瘡用臘月兎頭搗爛入瓶內密封惟久愈佳每用塗帛上厚封之熱痛卽如水也頻換取瘥乃止（勝金方）

發背癰膿用白犬屎半升水絞取汁服以查數之日再（外臺秘要）

五毒發背金星草和根洗淨慢火焙乾每四兩入生甘草一錢搗末分作四服每服用酒一升煎一二沸更以溫酒二三升相和入瓶器內封固時時飲之忌生冷油膩毒物（經驗方）

發背初起生薑一塊炭火炙一層刮一層爲末以猪膽汁調塗（海上方）

發背欲死雞腸草搗傅之

又方冬瓜截去頭合瘡上瓜爛截去更合之瓜未盡瘡已小斂矣乃用膏貼之（肘後方）

發背不潰皂角刺麥麩炒黃一兩綿黃芪焙一兩甘草半兩爲末每服一大錢酒一盞乳香一塊煎七分去查溫服（本事方）

發背初起活蝸牛二百箇以新汲水一盞湯瓶中封一夜取逕水入眞蛤粉旋調掃傅瘡上日十餘度熱痛止則瘡便愈（集驗方）

又方用雞腫黃皮不落水者陰乾臨時溫水潤開貼之隨乾隨潤不過三五箇卽消（經驗方）

發背已潰用雞腫黃皮同綿絮焙末搽之卽愈

背瘡潰爛黃黑牛屎多年者曬乾爲末入百草霜研勻細摻之（談埜翁方）

背疽初發用黃明牛皮膠四兩酒一盌重湯頓化隨意飲盡不能飲者滾白湯飲之服此毒不內攻不傳惡證（阮氏經驗方）

又方牛皮膠新瓦上燒存性研末酒二盌服之（談埜翁試驗方）

搭手發背用蜆子殼一箇密陀僧一錢共爲細末桐油調搽內服托裏散一方無蜆子殼

發背腫毒蛇頭燒灰酢和傅之日三易（千金方）

癰疽發背初作及經十日以上腫赤熾熱日夜疼痛百藥不效者用煅雞子一枚新狗屎如雞子大攪勻微火熬令稀稠得所捻作餅子於腫頭上貼之以帛包抹時時看視覺餅熱卽易勿令轉動及歇氣經一宿定如日多者三日貼之一日一易至差乃止此方穢惡不可施之貴人一切諸方皆不能及但可備撓而已（千金方）

發背欲死燒人屎灰酢和傅之乾卽易（肘後方）

又方凡人中熱毒眼花頭運口乾舌苦心驚背熱四肢痲木覺有紅暈在背後卽取槐干一大把揀淨鐵鍋內炒褐色好酒一大椀煎滾去槐子熱服待汗出卽愈未退再服

發背不起穿山甲蛤粉拌勻炒碾末五錢酒下

刻效散治發背用黃瓜蔞一枚白礬一錢連皮子煅過爲末酢調敷乳汁尤妙

水龍收毒法單治發背初起紅色者瘡上用糊泥成圈中間放水下馬蝗數條待蝗吸毒血一日三易其瘡卽愈謂之蜞針

驪龍散治發背破與不破二者之間功能捷奏用珍珠八分牛黃一兩十二月生甲餘月煅灰存性鐵銹一兩共研細末以猪腦加酢調敷瘡口三五次乾再易之

一艾二黃散此奪旗斬將之劑治發背黑色不痛卽爲陰也用艾葉一斤碗黃雄黃末各五錢以水同煮艾半日搗極爛候溫敷上再煮再易十餘徧能知痛者可生全無痛者出紫血而死

治發背一切癰疽金石藥毒發以紫背車螯大者鹽泥固濟火煅通紅放冷取出研爲極細末地上出火毒一宿以甘草膏子丸如梧桐子大每服三五十九甘草湯下日進三服第三日取下惡物用後藥貼之（中藏經）

背瘡白膏藥寒水石不以多少火煅通紅入磁器中封口令密沉井中一宿取出研極細以臘月猪脂和如膏稀稠得所自瘡赤壺處塗之關一指許上以薄紙爲花子中心留一孔貼定漸次赤退卽遠遠移近裹至愈紙花孔子外所留紙令與所塗藥關狹等

發背初起爛開不住合圍攻勝之劑用白鹽梅皂角二味燒存性研末不發熱者米酢調塗四圍連摸卽不走開（瘡瘍全書）

平肌追膿散瘡頭冷者用炒乾薑礬末雞子清調搽四向如潰爛用猪蹄湯洗淨瘡口拭乾摻之覺熱如烘肌平易愈

發背癰疽李北海言此方乃神授極奇祕用甘草三大兩生搗篩末大麥麪九兩和勻取好酥少許入內下沸水搜如餅狀方圓大於瘡一分熱傅腫上以紬片及故紙隔令通風冷則換之已成者膿水自出未成者腫便內消仍當吃黃芪粥爲妙

又方甘草一大兩火炙搗碎水一大升浸之器上橫一小刀子露一宿平明以物攪令沫出去沫服之但是瘡腫發背皆甚效 蘇頌圖經

癰疽發背初起未成者苧根熟搗敷上日夜數易腫消則瘥 圖經本草

發背癰疽成瘡者龍葵一兩爲末麝香一分研勻塗之甚善 蘇頌圖經

虛火背瘡虛火上行背內熱如火炙者附子末津調塗湧泉穴 摘元方

疔瘡發背草烏頭去皮爲末用葱白連鬚和搗丸豌豆大以雄黃爲衣每服一丸先將葱一根細嚼以熱酒送下或有惡心嘔三四口用冷水一口止之卽臥以被厚盆汗出爲度 乾坤祕韞

癰疽發背及乳瘡半夏末雞子白調塗之 肘後方

背腿間一點痛不可忍者芫花根末米酢調敷之如不住以帛束之婦人產後尤宜 袖珍方

發背初起水調白蘞末塗之 肘後方

木蓮葉治背癰乾末服之下利卽愈 蘇頌

癰疽發背生菖蒲末搗貼之瘡乾者爲末水調塗之 祕寶方

發背初起腫礜赤熱用紫背浮萍搗和雞子清貼之 聖惠方

發背石韋炒末冷酒調服 蘇頌

癰疽發背一切腫毒蕎麥麪硫黃各二兩爲末井華水和作餅曬收每用一餅磨水傅之痛則令不痛不痛則令痛卽愈 直指方

又方粢米粉熬黑以雞子白和塗練上剪孔貼之乾則易神效 葛氏方

背瘡熱腫蕺菜搗汁塗之留孔以洩熱毒冷則易之 經驗方

發背惡瘡重陽日收老茄子百枚去蔕四破切之硝石十二兩搗碎以不津器先鋪茄子一重乃下硝石一重如此間鋪令盡以紙數層密封安置淨處上下以新磚承覆勿犯地氣至正月後取出去紙兩重日中曝之逐日如此至二三月度茄已爛開瓶傾出濾去滓別入新器中以薄綿盍頭又曝至成膏乃可用每以酒調半匙空腹飲之日再更以膏塗瘡口四圍覺冷如氷瘡乾便瘥其有根本在膚腠者亦可內消若膏久乾硬卽以飯飲化動用之 圖經本草

癰疽發背大如盤臭腐不可近桐葉酢蒸貼上退熱止痛漸漸生肉收口極驗祕方也 醫林正宗

發背散血槐花菉豆粉各一升同炒象牙色研末用細茶一兩煎一盌露一夜調末三錢傅之留頭勿犯婦女手 攝生妙用方

癰疽發背榆根白皮切清水洗搗極爛和香油傅之留頭出氣燥則以苦茶頻潤不黏更換新者將愈以桑葉嚼爛隨大小貼之口合乃止神效 救急方

癰疽發背巴豆樹根掘取洗搗傅患處留頭妙不可言收根陰乾臨時水搗亦可 經驗方

發背初生一切癰疽皆治單用紫荊皮爲末酒調箍住自然撮小不開內服柞木飲子乃救貧良劑也 仙傳外科

癰疽發背用豶猪腰子一雙同飛麪搗如泥塗之卽愈

槐花酒治發背一切瘡毒不問已成未成但礜痛者並治之槐花四五兩微炒黃乘熱入酒二鍾煎十餘沸去滓熱服未成者二三服已成者一二服又治濕熱瘡疥腸風痔漏諸瘡作痛尤效

又方用亂髮燒灰酒服方寸匕

又方猪脂傅上日四五度亦治發乳救急方云取猪羊脂切作片冷水浸貼上煖卽易之五六十片瘥若初貼少許卽寒寒定好眠甚效

又方三年酢滓微火煎令稠和牛脂傅上

又方猪狗牙燒灰酢和傅上日三四易

又方古蚌燒灰雞子白和傅之日三易

遠志酒治一切癰疽發背癤毒惡候若有死血陰毒在中則不痛傅之卽痛有憂怒等氣積而內攻則痛不可忍傅之卽不痛或蘊熱在內熱逼人手不可近傅之必清涼或氣虛血冷潰而不斂若七情內鬱治之必愈用遠志不以多少泔浸搥去心爲末酒一盞調末三錢澄清飲之以滓傅於患處 醫學綱目

治癰疽發背初腫時方用風化石灰二兩細莘一兩共爲粗末用熱酢調勻傅患處乾再傅三上其腫卽消

有人患背疽已潰如椀面大視五臟僅膈膜耳自謂必死用大鯽魚一枚去腸臟以羯羊糞入其中烘焙

焦黑極燥爲細末乾摻之瘡口遂收後竟無恙此方累用有效須候膿少欲生肌肉時用之

又方治背疽久不收口用川椒去目炒黑一錢定粉風化硝各二錢白礬二錢半乳香沒藥各一錢共爲末摻之

治背瘡肉長疾皮不及裹見風卽成僵以寒水石燒研爲細末傅瘡上再用銅綠細末上之肉卽不作僵矣

治一切發背疔瘡無名腫毒三月清明將蝦豚收一罐用雄黃硃砂各一兩研細末入罐內曬之至端午日取出聽用如搽瘡用藥磨水點上立消（古今醫鑑）

治發背方蒼耳炒黃擦去刺再炒深黃不見風研細末每服五錢匕好熱酒調食前臨臥服（海藏）

發背用金銀藤取五六兩搗爛入熱酒一鍾攪勻取汁酒溫服柤罨患處四五服立效（趙氏醫貫）

雞血散治發背陰證用赤雄雞翦去冠尖少許倒提滴血瘡上血盡再換不過五六雞痛止毒消其瘡自愈內以人參六兩分六貼盡日煎服（醫學入門）

癰疽發背用伏龍肝以雞子黃和塗之或酢調或大蒜同研貼之並佳（本草）

發背取白鳳仙花連根葉搗爛先以米酢洗患處後敷藥一日一換如神（萬病回春）

背疽取薜荔葉爛研取汁和蜜飲數升以查敷瘡上

又方薜荔葉細末和酒絞取汁煎數沸服之（本草）

發背用芙蓉花及葉幷曬乾爲末酢調敷白蓮尤佳（升後法心）

鍼灸

素問曰足太陽之瘧令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱熇熇暍暍然熱止汗出難已刺郄中出血

瘧脈滿大急刺背俞五胠俞背俞各一適行至於血也

先項背痛者先刺之

風瘧瘧發則汗出惡風刺三陽經背俞之血者

肺熱病者熱爭則喘欬痛走胷膺背不得太息頭痛不堪汗出而寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死刺手太陰陽明出血如大豆立已

刺脊間中髓爲偃

深專者刺大臟迫臟刺背背俞也

病在少腹有積刺俠脊兩旁四椎間刺兩髂髎季脅肋間導腹中氣熱下已

背與心相控而痛所治天突與十椎及上紀上紀者胃脘也下紀者關元也

靈樞曰足太陽之別名曰飛揚去踝七寸別走少陰實則鼽窒頭背痛虛則鼽衄取之所別也

督脈之別名曰長強挾脊上項散頭上下當肩胛左右別走太陽入貫膂實則脊強虛則頭重高搖之挾脊之有過者取之所別也

厥挾脊而痛至項頭沉沉然目䀮䀮然腰脊強取足太陽膕中血絡

心痛引背不得息刺足少陰

黃帝問於岐伯曰願聞五臟之腧出於背者岐伯曰背中大腧在杼骨之端肺腧在三焦之間心腧在五焦之間膈腧在七焦之間肝腧在九焦之間脾腧在十一焦之間腎腧在十四焦之間皆挾脊相去三寸所則欲得而驗之按其處應在手而痛解乃其腧也灸之則可刺之則不可氣盛則瀉之虛則補之以火補者毋吹其火須自滅也以火瀉者疾吹其火傳其艾須其火滅也

金匱要略曰飲酒大忌灸腹背令人腸結

甲乙經曰肩背痹痛不舉血瘀肩中不能動搖巨骨主之

肩背不可自帶衣臂腕外側痛不舉陽谷主之

肩背欲折臑如拔手不能自上下養老主之

項背痛引頸魄戶主之

肩痛胷滿悽厥脊背急強神堂主之

肩背髀痛臂不舉寒熱悽索肩井主之

腰脊痛不得俛仰刺脊中睪脊內廉痛便難陰痿不用少腹急引陰及脚內廉內陰谷主之

男子脊急目赤支溝主之

腰脊強四肢懈惰善怒咳少氣鬱然不得息厥逆肩不可舉陽乃痿身瞤章門主之

腎脈緩甚爲折脊

千金方曰列缺主背寒慄少氣不足以息寒厥交兩手而瞀凡實則爲背熱背汗出四肢暴腫虛則肩寒慄氣不足以息

附分主背痛引頭

膈關秩邊京骨主背惡寒痛脊強難以俛仰

魚際主痹走胷背不得息

經渠丘墟主胷背急胷中彭彭

凡發背皆因服食五石寒食更生散所致亦有卑服

鍾乳而發者此是上代有服之者其候率多於背兩胛間起初如粟米大或痛或癢仍作赤色人皆初不以爲事日漸長大不過十日遂至於死其臨困之時已闊三寸高一寸瘡有數十孔以手按之諸孔中皆膿出尋時失音所以養生者少覺背上癢痛有異即火急取淨土水和如泥捻作餅子厚二分闊一寸半以粗艾大作炷灸泥餅上貼著瘡上灸之一炷一易餅子若粟米大時可灸七餅子即癒如榆莢大灸七七餅炷即瘥如錢大可日夜灸之不限炷數仍服五香連翹湯及鐵漿諸藥攻之乃愈又法諸發背未作大膿可以冷水射之浸石令冷熨之日夜莫住癒乃止此病忌豬酒五辛等亦有當兩肩上發者

凡腫起背胛間頭白如黍粟四邊相連腫赤黑令人悶亂即名發背也禁房室酒肉蒜麪若不灸治即入內殺人若灸當瘡上七八百壯有人不識多作雜證治者皆死

醫學綱目曰鍼灸背痛有二法其一取肺經云肺病者喘欬逆氣肩背痛汗出取其經太陰足太陽之外厥陰內血者又云肺手太陰之脈氣盛有餘則肩背痛風寒汗出氣虛則肩背痛寒少氣不足以息視盛虛熱寒陷下取之是也

其二取腎經云邪在腎則病肩背頸項痛時眩取之湧泉崑崙視有血者盡取之是也

肩背痛連胛取胛縫在背端骨下直腋縫尖及臂取二寸半瀉六吸五壓二寸半瀉八吸

肩背胛痛取崑崙懸鍾肩井

肩背頸項腋前痛與胷相引者取湧泉一分見血乃妙前腋刺面上一寸

又法取氣舍五分灸天窻又取曲池一寸半天井五分

肩背痛手三里主之

鍼灸脊痛脊強有三法其一取督脈經云督脈之別名曰長強別走太陽實則脊強取之所別也

其二取足太陽經云厥挾脊而痛者至頂頭沉沉然目眩眩然腰脊強取足太陽胭中血絡是也

其三取小腸經云少腹控睾引腰脊上衝心邪在小腸取之肓原以散之刺太陰厥陰以下之取巨虛下廉以去之是也

脊膂并腰疼取人中口含水突處鍼入三分略向上些但瀉無補留三吸委中二寸半忌灸又於四畔紫脈上去血如藤塊者不可出血出血不止令人夭又瀉三里五壓

薛氏醫案曰神效桑枝灸治發背不起或瘡肉不潰此陽氣虛弱用桑枝燃火著吹熄焰用火灸患處片時日三五次以助腫潰若腐肉已去新肉生遲宜灸四畔其陰瘡瘰癧流注臁瘡惡瘡久不愈者亦宜用之大抵此法未潰則解熱毒止疼痛消瘀腫已潰則補陽氣散餘毒生肌肉其陽證腫痛甚或重如負石初起用此法出毒水即內消日久者用之雖潰亦淺且無苦楚惜患者不知有此治者亦不肯用此也

隔蒜灸法治一切瘡毒發背大痛或不痛或麻木如痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒隨火而散蓋火以暢達拔引鬱毒此從治之法也有回生之功用大蒜去皮切三文錢厚安瘡頭上用艾壯於蒜上灸之三壯摸蒜復灸未成者即消已成者亦殺其大勢不能爲害如瘡大用蒜搗爛攤患處將艾鋪上燒之蒜敗再換如不痛或不作膿及不發起或陰瘡尤宜多灸灸而仍不痛不作膿不起發者不治此氣血虛極也

李氏云凡患背疽漫腫無頭者用濕紙貼腫處但一點先乾處乃是瘡頭可用大蒜十顆淡豉半合乳香鉞許研爛置瘡頭上鋪艾灸之痛否皆以隔蒜灸法爲度愚按前證或附骨疽及臀腿諸毒初起未明者尋頭用灸多自內消其毒熾盛更服活命飲其功尤捷若氣血虛弱必以補托爲主若背疽大潰欲驗穿透內膜者不可用皂角取嚏法但以紙封患處令病者用意呼吸如紙不動者未穿透也倘用取嚏鼓動內膜反致穿透慎之慎之

伍氏方論曰夫癰疽發背皆有所因論中言之詳矣凡初覺赤腫先從背脊骨第二陷中兩旁相去同身寸各一寸五分名熱腑穴二處各灸七壯此能疏泄諸陽熱氣永無癰疽之苦或隔蒜灸不論壯數則邪無所容而眞氣不損但頭項見瘡宜用騎竹馬及足三里灸之

伍氏曰凡治癰疽發背疔瘡不痛者必灸使痛痛者必灸使不痛若初灸即痛者由毒氣輕淺灸而不痛者乃毒氣深重悉宜內服追毒排膿外傅消毒之藥大抵癰疽不可不痛又不可大痛悶亂不知痛者難治

素問云陽氣凑襲寒化爲熱熱甚則肉腐爲膿凡發背多因服金石而發者有因上代曾服而發者其候

多發於皮起如粟或痛或痒多致不救外面如拳古人云外面如麻裏面如瓜有數十孔以手按之諸孔出膿尋時失瘡凡有此證可用淨土水調量大小作餅厚分許以艾炷灸之內服五香連翹湯及鐵漿酢調蛙殼灰塗之更以騎竹馬法灸之甚良愚按前證仍參首論主治恐其表裏熱毒之不同元氣虛實之不一也

伍氏曰夫癰發背者皮薄腫高多有椒眼數十粒疽發背者皮膚頑硬狀如牛領之皮二證皆宜灼艾癰成膿則宜鍼其鍼當以馬銜鐵爲之形如韭葉樣兩面皆利可以橫直裂開五六寸許取去毒血其病頓輕須先灸而後裂可服神仙追毒丸利去毒根次服排膿托裏等藥調治疽成膿則宜烙用銀篦大寸許長六寸燒赤熨烙患處以膿出爲效大抵癰疽難於諸科非心傳奧妙其可以易治耶愚按前證若氣血充實其膿既成宜速鍼之勿藥可愈若氣血虧損膿不能出或膿出反痛須托裏養胃庶保終吉

伍氏曰但覺背兩胛間赤痒腫痛或有白粒且以津唾時潤令濕切勿抓破大抵在背徹有赤腫點或因抓破入浴犯水或因飲食膾炙而作初未辨證且以津潤時用墨圍之若腫赤急就圍中灼艾最善人皆疑以火熱太過多致延漫誤者衆矣愚按疽發背胛若有瘀肉腐爛膿水淋漓腫痛仍作者此處有筋一層間隔內膿不出故也宜用鍼引之老弱者若待其自潰多致不救治者審之

譽痛或不痛及癌木者邪氣盛也隔蒜灸之不痛者久至痛痛者灸至不痛毒隨火而散再不痛者須明灸之腫硬痛深脈實者邪在內也下之

醫學入門曰久患傷寒肩背痛但鍼中渚即愈脊脊痛者鍼人中尤妙

東醫寶鑑曰背痛乃作勞所致技藝之人輿士女刻苦者多有此包勞者亦患之惟灸膏肓穴爲妙

導引

保生祕要曰背作疼腰導引法以掌心搓之九九乘熱交搭於左右二肩躬身用力往來搖動九九之數加以運功

運功即行良背大小圈法行後手指至指甲散出滯氣於疼病亦如之左疼行左右疼行右二邊俱疼分而行之

背疽運功依患處念推而行之或推開肺經升腎水洗之

附良背訣故初學之士靜坐片時將萬慮掃除凝神定志於本穴之中背之腔子裏平心元虛處初從口念太乙救苦而漸歸於心歸於背存無守有念茲在茲從有復冥於無神自虛而靈矣

醫案一

齊東野語曰族伯臨川推官平生以體羸氣弱多服烏附丹砂晚年疽發於背其大如扇醫者悉歸罪於丹石之毒凡菉豆粉羊血解毒之品莫不遍試殊不少損或以後市街祝老爲薦者祝本瘍醫然指下極精診脈已即云非敢求異於諸公然此乃極陰證在我法中正當爲服伏火硃砂及三建湯否則非吾所知也諸子皆有難色然其勢已殆姑嘗試一二小料而祝復俾作大劑頓服三日後始用膏藥敷貼而丹砂烏附略不輟口半月餘而瘡遂平凡服三建湯二百五十服此亦可謂奇工矣洪景盧所載時康祖病心痔用聖惠方治腰痛鹿茸附子藥服之而差又福州郭醫用茸附醫漏痔疾皆此類也蓋癰疽皆有陰陽證要當一決於指下而今世外科往往不善於脈每以私意揣摩故多失之此不可不精察也

本事方曰一人發背醫療逾月勢益甚有張生者教以艾火灸其上至一百五十壯知痛乃止明日鑷去黑痂膿盡潰肉理皆紅不復痛乃以膏藥貼之日一易易時翦去黑爛月餘乃平復

瘡瘍全書曰一人年六十歲冬至後發背疽五七日腫勢約七寸開遲故變證果生覺瘡重如負石熱如火痛倍常六脈沉數按之有力此膏粱積熱之變邪氣酷熱寒藥治之時冬月嚴寒復有用寒遠寒之戒乃思內經有假者反之違其時從其證可也

一人曾背皆駝頸漸短問其故因食旱鼈所致患上用紫蘇煎湯洗淨次用龜尿搽之取龜尿法以龜置器中用鏡照之則尿出矣

一人背發一塊心神兀兀四肢倦怠飲食不進一醫曰此發癰也剖開果發合許甘草湯洗淨拭乾將多年油木梳燬灰爲末麻油調搽立愈

儒門事親曰一富家女年十餘歲好食紫櫻每食卽二三斤歲歲如此至十餘年一日潮熱如勞戴人診其兩手脈皆洪大而有力謂之曰他日必作惡瘡腫毒熱上攻目陽盛陰脫之證其家大怒不肯服解毒之藥不一二年患一背疽如盤痛不可忍其女忽思戴人曾有是言再三悔過請戴人戴人以鈹鍼繞疽暈刺數百鍼去血一斗如此三次漸漸痛減腫消微出膿而斂將作痂時使服十補內托散乃痊終身忌口然目亦昏終身無子

丹溪心法曰一男子忽患肩背胛縫一線疼上跨肩至胃前側脅而止其痛晝夜不息不可忍其脈弦數重取豁大左大於右夫背胛小腸經也胃脘膽經也此必思慮傷心藏未病而腑先病故痛從背胛起謀慮不決又歸之膽故痛至胃脘而止乃小腸火來乘膽木子來乘母是爲實邪詢之果因謀慮不遂而病以人參四錢木通二錢煎湯下龍荼丸數服愈

一人背偃僂足攣脈沉弦而細以煖腎散與之上吐下瀉凡三服乃愈

一男子年五十形實色黑背生紅腫及胛骨下痛其脈浮數而洪緊食亦嘔正冬月與麻黃桂枝湯加酒黃蘗生附瓜蔞子甘草節羌活青皮人參黃芩半夏生薑六貼而消此正內托之法非藉要內托散乳香萊豆等藥想此方專爲服丹石而發疽者設不因丹石而發恐非必用之劑

五八癰年六十歲背上生癰脈洪大數午後惡寒發熱食少用連翹黃芪砂仁各三錢人參當歸各一錢陳皮茯苓各五分炙甘草白朮各一錢以黃芪爲君甘草歸參爲佐乃實內補虛之中兼托裏也

一人年七十患背疽徑尺餘雜與五香十宣數十貼膿血腥穢嘔逆不食者旬餘病人自去吃內托散膈中不安且素有淋病三十年今所苦者淋之痛與嘔吐不得睡而已急以參芪歸朮羹膏以牛膝湯入竹瀝飲之三日後盡藥一斤半淋止思食七日後盡藥四斤膿自潰出而得睡又兼旬而安

一男子年六十餘性好酒肉背疽見膿嘔逆發熱蓋其得內托十宣多矣醫以嘔逆於嘉禾散中加丁香以溫胃行氣時七月大熱脈洪數有力予因謂此脈證在潰瘍尤爲忌然形氣實只宜人參膏和竹瀝飲之盡藥十五斤竹百餘竿而安予曰此病幸安也不薄味必再作仍厚味自若夏月醉後坐水池中又年餘左脅旁生一軟塊如餅二年後軟塊爲疽本人見膿血淋漓而脈洪數有力又嘔逆食少遂自以人參膏入竹瀝飲之又百餘竿而安今八十歲強健如舊此病以老年血氣弱兩服人參竹瀝而皆愈若與內托十宣散恐未能若是之安全也

予治章兄背疽經尺家貧待死而已視瘡穴黑深似有近內之意急作參芪歸朮膏飲三日略以艾葶湯洗氣息奄奄不可支持幸其身不發熱而可進飲食每日作餛飩大椀與之盡藥膏五斤餛飩多肉者三十椀瘡口漸合以其因肉與餛飩助氣之有益也

衞生寶鑑曰戊午冬予從軍住扎於成武縣有賈倉使父年踰六旬冬至後數日疽發於背五七日膿勢約七寸許不任其痛瘍醫曰視之膿已成可開發矣公懼不從踰三日醫曰不開恐變生矣遂以燔鍼開之膿泄痛減以開遲之故迫二日變證果生覺重如負石熱如燔火痛楚倍常六脈沉數按之有力此膏粱積熱之變也邪氣酷熱固宜以寒熱治之時月嚴凝復有用寒遠寒之戒乃思內經云有假者反之雖違其時以從其證可也與瘍醫議急作清凉飲子加黃連秤一兩五錢作一服服之利下兩行痛減七分翌日復進前藥其證悉除後月餘平復

醫學綱目曰史源母背髆間微痒視之有赤半寸許方有白粒如粟黍乃急著艾灸其赤隨消二七壯而止信宿復覺微痛視之有赤下流長二寸闊如韭葉舉家皆以前灸爲悔或云等慈寺尼智全者前病瘡甚大得灸而愈奔問之全云劇時昏不知但小師輩言范八奉議守定灸八百餘壯方甦約艾一篩爾亟歸白之見從始以艾作炷如銀杏大灸其上十數殊不覺痛乃截四旁赤引其炷減四之三皆覺痛七壯後覺痒每一壯燼則赤隨縮入灸至二十餘壯赤暈收退病者不憚遂以艾作圍大灸其上漸加至雞黃大約四十壯方覺痛視火焦處已寸餘蓋灸之遲而初發處肉已壞壞肉成頑直至好肉方痛四旁知痛肉未壞也病者六夜不寐至是食粥安寢至晚視之瘡如覆甑突高三四寸上有百數小竅色正黑突然高者毒氣出外而聚也百數小竅者毒未聚而浮攻肌膚也色正黑者皮與肉俱壞也非艾火出其毒於壞肉之裏則五臟逼矣

薛氏醫按曰憲副陳魯山居官勤苦勞傷元氣背患疽漫腫中央色黯四畔微赤微痛脈浮大按之微細左寸短而右寸若無十餘日腫未全起此病元氣虛寒朝用參芪薑桂歸朮陳皮半夏炙草溫補其陽夕用加減八味丸滋其肝腎各四劑而腐潰但膿水清稀盜汗自汗內熱晡熱脈浮而數改用八珍湯復發熱而陽夜舉此腎虛火動仍用加減八味丸料煎服而安又因怒動肝火瘡出鮮血二盞許左關弦數右關弦弱此肝木侮脾以致肝不能藏血脾不能統血用十全大補參前藥各二劑而血止再用前藥調理而痊

節推王器之背患疽瘡頭如黍腫背重脈沉而實此毒在內服黃連內疏湯二劑少退更與仙方活命飲而愈

舉人劉華甫舁腫作痛脈浮而數此毒蓄於經絡用內托復煎散二劑而舁腫減用仙方活命飲四劑而腫痛止更用托裏藥而痊

一儒者患背疽腫舁痛甚此熱毒蘊結而熾盛用隔蒜灸而痛止服仙方活命飲而腫消更與托裏藥而潰愈

一男子背患疽腐肉雖潰而新肉不生此毒氣解而脾胃之氣虛也用六君子加芎歸五味黃芪漸愈用十全大補湯全愈

一男子背患疽肉腐膿清肌肉不生此邪去而氣血俱虛也用十全大補湯月餘而斂

一男子背患疽腫痛赤暈尺餘背如負石其勢當峻攻其脈又不宜遂砭赤處出紫血椀許腫痛頓退更用神功散及仙方活命飲二劑潰口及砭處出血水而消大抵瘡毒勢甚若用攻劑恐弱之人必損元氣因而變證者衆矣

儒者周在魯懷抱久鬱背脊患疽肝脈弦洪脾脈浮大按之微細以補中益氣加桔梗貝母少用銀花白芷二劑肝脈頓退脾脈頓復乃以活命飲二劑膿潰腫消肝脈仍弦此毒雖去而胃氣復傷仍用前湯加半夏茯苓而愈用銀花白芷非爲治瘡乃解患者之疑耳

秋官高竹眞患背疽色黯堅硬重如負石神思昏憒可畏其親廷評鄭沙村請同往治鄭云竹眞先任湖廣某縣時以某河涉險不便竹眞爲整治有功其民爲立生祠凡渡河者無不禱祭竹眞患此悉疑立祠致祟余曰不然病因元氣虛寒積毒熾盛所致遂以杵蒜攤患處用錢大艾炷灸二十餘壯尚不知乃攤蒜鋪艾灸亦不知乃著肉灸良久方知再灸方痛內服參附大補之劑而起

水部曹文兆背脾患之半月餘瘡頭如粟且多內痛如刺其脈歇止此元氣虛而疽蓄於內非灸不可遂灼艾二三十壯飲以六君加藿香當歸數劑瘡勢漸起內痛頓去胃脈漸至但瘡色紫瘀肉不潰此陽氣虛也燃桑枝灸患處以解散其毒補接陽氣仍以前藥加參芪歸桂色赤膿稠瘀肉漸腐兩月而愈夫邪氣沉伏眞氣怯弱不能起發須灸而衆大補若投以常藥待其自潰鮮有不誤者

儒者顧大有年餘六旬仲冬背疽初起入房患處黑死五寸許黯暈尺餘漫腫堅硬背如負石發熱作渴小便頻數兩耳重聽揚手露髓神思昏憒脈沉而細右手爲甚便祕二十七日計進飲食百餘椀腹內如常衆欲通之余曰所喜者此耳急用大劑六君加薑附肉桂三劑瘡始舁痛自後空心用前藥午後以六味丸料加參芪歸朮五劑復用活命飲二劑鍼出黑血甚多瘀膿少許背即輕軟仍用前藥便亦通利余適他往四日神思復昏瘡仍黑陷膿水淋漓飲食不進急以參芪歸朮各一兩炮附子五錢薑桂各三錢服之即索飲食并鴨子二枚自後日進前藥二劑肉腐膿潰而愈

僉憲申天益兄背患疽脈沉而實腫硬木悶大便祕結此毒蓄於內用大黃白芷名萬全散一服去瘀血瘡頓消

通府張廷儀背患疽作嘔舁痛大便祕結口乾作渴此內蘊熱毒用竹葉石膏湯二劑諸證頓退用托裏消毒散四帖腫消用仙方活命飲瘡亦尋愈

一男子背瘡潰而瘀血不散此陽氣虛弱也用參芪歸朮峻補更以桑枝灸之又用托裏散加肉桂瘡口自斂此補接陽氣之法也

一男子背瘡漫腫微痛食少體倦余曰證屬形病俱虛法當補元氣爲主彼不信仍用攻毒之劑中央肉黯五寸許惡證悉具復求治余曰此胃氣虛寒而變證作矣當急溫補脾胃則惡證自退黯肉自生仍不信乃割死肉祛惡證遂致不起

御醫王介之室背疽不起發不舁赤泄瀉欲嘔飲食少思手足厥冷脈息如無此陽氣虛寒用大補之劑加附子一錢薑桂各一錢不應附子加至三錢二劑

泄瀉愈甚又以附子一枚薑桂各二錢參芪歸朮各五錢作一劑腹內始熱嘔吐始止手足始溫脈息始復仍用大補加薑附四劑乃潰三十劑得愈六年後仍發虛寒之證

大尹陳國信素陰虛背患疽用參芪大補而不斂內熱發熱舌燥唇裂小便頻數口乾飲湯嘔吐瀉利耳閉目盲仰首則眩運脈浮大而數余曰瘡口不斂脾土敗也舌燥唇裂腎水枯也小便頻數肺氣衰也內熱發熱虛火上炎也口乾飲湯眞寒之象也嘔吐瀉利眞火衰敗也耳閉目盲肝木枯敗也仰首眩運腎氣絕也證不治後果殁

姑蘇黃汝耘年踰五十患發背用生肌藥太早竟背腐潰更加泄瀉脈微綴予謂脾胃虛先用二神丸以止其瀉次以大補藥以治其本更用豬蹄湯洗淨以黃芪末填滿患處乃用膏藥喜其初起時曾用蒜多灸故毒不內攻兩月而愈

許序班患發背十餘日瘡頭如粟許腫硬木閟肉色不變寒熱拘急脈沉實此毒在內也先以黃連內疏湯次用消毒托裏藥其毒始發奈欲速急又用生肌藥患處忽若負重身如火爨後竟不起東垣云毒氣未盡不可用生肌藥縱得平復必再發若毒氣入腹十死八九大抵毒氣盡脾氣壯則肌肉自生生肌藥可弗用矣

鄭大理伯興脾骨患疽背左右各一竟背重如負石兩臂如墜瘡頭皆如大豆許其隱於皮膚如粟者不計其數瘡色黯而不起已七日口乾作渴予診之脾胃脈甚虛彼云昨日所進粥食今尚不消作酸予意此難治之證田氏素善者籌其治法以隔蒜灸二十餘壯其背與臂動覺少便隨用六君子湯加薑汁炒山梔及吳茱萸連服數劑吞酸遂止飲食少進但口乾瘡仍不起色亦不赤亦無膿復如前法灸二十餘壯背臂頓便瘡遂發其時適秋又投以大補之劑以生脈散以代茶飲

一男子背疽不起發脈浮按之則濇此血氣俱虛故不能發非補劑不愈

太守朱陽山之內年五十二四月四日背當心生疽如粟三日漸大根盤五寸許不腫痛不寒熱脈微而沉余曰實則痛虛則痒不發不治潰而不斂亦不治乃與大補陽氣之劑色白而黯瘡勢如故神疲食減小便淋濇乃與大補氣血加薑桂二劑瘡亦不起十五日涉怒嘔瀉並作復與大補藥一劑瘡仍不起留前藥二劑昏不服或勸之始悟依方連進七劑十六日瘡起而潰色紅而淡十九日與大補二十餘劑後因勞自汗口乾舌強太陽髮際腦頂俱脹此血氣俱虛肝膽火上炎用補中益氣加山梔芍藥頓愈但內熱少睡手足不時發熱晡熱用逍遙散加山梔熱退復用歸脾湯瘡亦愈計瘡發及斂凡四十二日未嘗一用攻瘡之藥

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第一百九十九卷目錄
醫部彙考一百七十九
背脊門五
醫案二



藝術典第一百九十九卷
醫部彙考一百七十九
背脊門五
醫案二

薛己醫按曰江陰舉人陳鳴岐寓京患背疽用大補之劑而愈壅日設席作謝對談如常是晚得家信大拂其意惱怒發熱作渴食梨子少許至夜連瀉數次早促予視脈已脫矣竟至不起夫梨者利也疏利下行之物凡脾胃虛寒產婦金瘡者皆當忌之

留都鄭中翰仲夏患發背已半月瘡頭十餘枚皆如粟許漫腫堅硬根大如盤背重如負石即隔蒜灸五十餘壯其背頓輕彼因輕愈不守禁忌三日後大作瘡不起發熱得作痛用活命飲四劑勢少退用香砂六君子湯四劑飲食少進彼恃知醫自用敗毒藥二劑飲食益少口流涎沫若不自知此脾虛之甚也每用托裏藥內參芪各三錢彼嗇自揀去大半後雖用大補藥加薑桂亦不應遂以參芪各一斤歸朮各半斤乾薑桂附各一兩煎膏一罐三日飲盡涎頓止腐

頓潰食頓進再用托裏健脾藥腐肉自脫而愈

南都聘士葉公玉表兄聶姓者患發背時六月腐肉已去瘡口尺許色赤而燃發熱不食欲嘔不嘔服十宣散等藥自爲不起葉請余決之其脈輕診則浮而數重診則弱而濇此潰後之正脈然瘡口開張血氣虛也欲嘔而不嘔脾胃虛也色赤燃腫虛火之象也尚可治遂與十全大補湯加酒炒黃蘗知母五味麥門及飲童便飲食頓進肌肉頓生服至八劑瘡口收如粟許又惑於人言又服消毒藥二劑以爲消餘毒反發熱昏憒急進前藥又二十餘劑乃愈後兩月因作善事一晝夜不睡致勞發熱似睡不睡與前藥二劑愈加發熱飲食不進惟飲熱湯後以前藥加附子一錢二劑復愈

高秋官貞甫孟秋發背色黯而硬不痛不起脈沉而細四肢逆冷急用大艾隔蒜灸三十餘壯不痛遂用艾如粟大者七壯著肉灸始知痛與六君子湯二劑每劑入附子二錢不應後劑又加肉桂二錢始應

石武選廉伯患發背內服防風通聖散外敷涼藥汗出不止飲食不進且不寐瘡盈尺色黯而堅硬按之不痛氣息奄奄此陽氣已脫脈息如無急隔蒜灸一時許背頓輕四圍高不知痛中央肉六寸許一塊已死服香砂六君子湯一劑翌日復灸一次痛處死血得解令砭去予歸後爲他醫所惑未砭其血復凝又數辛溫活血藥翌日依予言砭之出黑血二盞許彼云背強頓去以前藥加薑桂服一鍾即鼾睡覺來肢體少健但飲食仍不思吞酸仍有瘡仍不痛彼以爲陰毒乃如此予曰此氣血虛極寒邪逕於內無陽營於患處故肌肉死也非陰毒若陽氣一回胃氣即甦死肉即潰可保無慮矣以前藥二劑各加薑桂附子二錢服之略進米飲精神復舊患處竟熱脈略有力此陽氣略回矣是日他醫謂瘡瘍屬火證況今暑令乃敷芙蓉根等涼藥即進粥二椀服消毒藥死肉即潰予意芙蓉乃寒涼之藥與脾胃何益飲食即時而進消毒乃妄散之劑與陽氣何補死肉即時而潰此蓋前桂附之功至而脾胃之氣復故飲食進陽氣旺故死肉腐也苟虛寒人若內無辛熱回陽之藥輒用寒涼攻毒之劑豈可得生耶若以爲火令屬陽之證內有熱而施辛溫補益之劑豈不致死而反生耶殊不知此乃捨時從證之治法也

一男子發背膿始潰靡未消已十七日脈微而靜予曰膿毒未盡脈先弱此元氣虛宜補之否則後必生變彼惑於人言乃服敗毒藥腐肉雖潰瘡口不完忽腹中似痛後去白垢肛門裏急復求治予曰此裏虛然也非痢非毒當溫補脾胃爲善因諸瘍醫皆以爲毒未盡仍服敗毒藥而死

賀少參朝儀背胛患疽大如豆粒根畔木悶不腫肉色如常予曰此氣虛毒甚之證雖用補劑亦不能收斂先用活命飲二劑背強少和又二劑疽少赤用大補劑瘡出黑血杯許繼有鮮血數碗予曰可見氣血虛極矣他醫以爲屬氣血有餘之證審用攻毒藥一鍾即嘔逆腹內陰冷而死

少司寇周玉巖背患疽在胛已四日瘡頭如粟重如負石堅硬不起自以爲小恙外敷涼藥內服連翹消毒散去後四次形證俱急自汗盜汗口乾不寐請予

治子曰瘡不宜硬色不宜黯公曰初起時赤而軟自用前二藥以致如此子曰凡瘡外如麻內如瓜毒結於內非小患耳脈輕診似數按之則微未潰脈先弱主後難斂因與鄉雅不能辭遂腦蒜灸二十餘壯乃知痛又十餘壯背覺少和服六君子湯加黃芪藿香當歸麻黃根浮麥二劑渴止汗少斂瘡色仍黯堅硬又服辛溫活血之藥瘡始起渴止汗斂所結死血得散良久汗復出口復乾又服數劑外皮雖潰清膿尚未潰通而內膿欲走別處彼用藥圍之子曰裏虛而膿不能潰於外圍藥逼毒入內至十二日脈浮按之如無再用前藥二劑加薑桂服之即安寐又二日脈忽脫再與前藥加附子七分服二劑公曰背今日始屬吾也形體亦儘顏有生意因子先日有言難以收斂更醫治乃雜用清熱解毒及數涼藥遂致裏虛元氣下陷去後如瘌用治瘌消毒藥而死

姜舉人發背十日正腐潰作渴喜熱湯飲此中氣虛不能生津液而口乾宜預補之否則不能收斂後瘡口果不收猶以毒為未盡用敗毒藥兩劑瘡口不完清利腹痛又服清涼之劑而死

王庠班發背元氣虛弱用托裏藥而始起用大補藥而始潰彼惑他議數帖藥致腹內不和裏急後重去後如瘌大孔作痛子曰此裏虛非瘌仍用敗毒治瘌藥而死凡瘡大潰之後大便後有白膿或止便白膿或瀉瘌此腸胃氣虛也裏急後重血虛也若果瘌亦不可用清涼敗毒之藥況仲景先生云治瘌不止者當溫之下瘌腹痛急當救裏可與理中四逆附子輩大孔痛當溫之東垣先生治瘌元氣陷下者未嘗不用溫補之藥然瘡膿潰既久血氣既弱不用溫補吾不得而知也

一男子年四十餘歲發背未潰即作渴脈數腫高色紫面赤小便如膏予以加減八味丸料加酒炒知母黃蘗為丸每日空心幷食前以童便送下百丸用八珍湯加五味子麥門冬黃芪酒炒知母赤小豆食遠煎服逐日又以童便代茶飲之渴止瘡潰而愈吾治得生者此人耳

酉都機房紀姓者背瘡胃氣虛用溫補藥而飲食進大補藥而瘡腐愈後患腿瘡予用養血化痰之劑少止彼嫌功緩他醫以為濕熱服麻黃左經湯一劑汗出不止予曰必發痙而死已而果然

一男子患背瘡痛甚服消毒藥愈熾予為隔蒜灸之而止與仙方活命飲二劑頓退更與托裏藥潰之而愈

一男子背瘡已四日瘡頭如黍燃痛背重脈沉實與黃連內疏湯二劑少退更與仙方活命飲二劑而消

一男子背瘡燃腫作痛脈浮數與內托復煎散二劑少退與仙方活命飲四劑痛止而潰再與托裏藥而愈

一婦人背瘡發熱煩躁飲冷與黃連解毒湯少愈更與托裏消毒散始潰與托裏藥而斂

一男人背瘡毒勢熾甚痛不可忍諸藥不應以仙方活命飲二劑諸證悉退又二劑而潰以金銀花散六劑而愈

一婦人背瘡腫痛發熱讝語脈大用清心湯一劑而安以金銀花甘草天花粉當歸瓜蔞黃芪數劑漸潰更以托裏藥而愈

一男子背瘡腐肉漸脫而膿微清飲食無味以十宣散去白芷防風加茯苓白朮陳皮月餘而斂

一男子背瘡已愈惟一口不斂診之脈浮而濇以十全大補湯治之而愈

一男子背瘡將愈但肌肉生遲診之脾胃俱虛以六君子湯加芎歸五味子黃芪治之而愈

一男子背瘡已愈惟一眼番出努肉如菌三月不愈乃傷風寒也以生豬脂調蒙廬末塗之即愈亦有努出三寸許者尤宜用此藥也烏梅塗之亦效若勢緩硫黃亦可

一男子背患毒疼痛飲冷發熱多汗便祕譫語以破棺丹二九而寧以金銀花散四劑膿成開之更用托裏藥而愈

一婦背瘡膿成脹痛不安鍼之投托裏消毒藥即愈大抵發背之證雖發熱疼痛形勢高大煩渴不寧脈若有力飲食頗進可保無虞其膿一潰諸證悉退多有因膿不得外泄以致疼痛若用敗毒瀉藥攻之反致誤事若有膿急鍼之膿一出若楚即止膿未成而熱毒作痛者用解毒之藥亦有腐潰尺餘者若無惡證投以大補之劑肉最易生亦無所妨惟忌腫不高色不赤不疼痛脈無力不飲食膿不潰腐不爛膿水清或多而不止肌肉不生屬元氣虛也皆難治宜峻補之其或膿血既泄腫痛尤甚膿水敗臭煩躁時嗽腹痛渴甚瀉利無度小便如淋乃惡證也皆不治

一弱婦背瘡外皮雖腐內膿不潰脹痛煩熱不安予謂宜急開之膿一出毒即解痛即止諸證自退待其

自潰不惟疼痛潰爛愈深彼不從待將旬日膿尚未出人已痛疲矣雖鍼之終不能收斂竟至不起

一男子背瘡潰而瘀肉不腐予欲取之更以峻補之一婦素弱背瘡未成膿大痛發熱予謂須隔蒜灸以拔其毒令自消皆不從俱致不救常治不問日期陰陽腫痛或不痛或痛甚但不潰者即與灸之隨手取效勢未定者先用箍藥圍之若用烏金膏或援生膏點患處數點尤好若頭痛拘急乃表證先服人參敗毒散一二劑如舁痛發熱脈數者用金銀花散或槐花酒神效托裏散如疼痛腫硬脈實者以清凉飲仙方活命飲苦參丸腫硬木悶疼痛發熱煩躁飲冷便祕脈沉實者內疏黃連湯或清凉飲大便已利欲其作膿用仙方活命飲托裏散蜈蚣丸外用神異膏如飲食少思或不甘美用六君子湯加藿香連進三五劑更用雄黃解毒散洗患處每日用烏金膏塗瘡口處俟有瘡口即用紙作撚蘸烏金膏紝入瘡內若有膿爲脂膜間隔不出或作脹痛者宜用鍼引之腐肉堵塞者去之若瘀肉腐動用猪蹄湯洗如膿稠或痛飲食如常瘀肉自腐用消毒與托裏藥相兼服之仍用前二膏塗貼若腐肉已離好肉宜速去之如膿不稠不稀微有疼痛飲食不甘瘀肉腐遲更用桑柴灸之亦用托裏藥若瘀肉不腐或膿清稀不畀痛者急服大補之劑亦用桑木灸之以補接陽氣解散鬱毒常觀患疽稍重未成膿者不用蒜灸之法及膿熟不開或待腐肉自去多致不救大抵氣血壯實或毒少輕者可假藥力或自腐潰怯弱之人熱毒中隔內外不通不行鍼灸藥無全功矣然此證若膿已成宜急開之否則重者潰通臟腑腐筋骨輕者延潰良肉難於收功因而不斂多矣

一婦人背瘡半月餘尚不發起不作膿痛甚脈弱隔蒜灸二十餘壯而止更服托裏藥漸潰膿清而瘀肉不腐以大補藥及桑柴灸之漸腐取之而尋愈常治一日至四五日未成膿而痛者灸至不痛不痛者灸至痛若灸而不痛或麻木者明灸之毒氣自然隨火而散腫硬不作膿畀痛或不痛或微痛或瘡頭如黍者灸之尤效亦有數日色尚微赤腫尚不起痛不甚膿不作者尤宜多灸勿拘日期更服甘溫托裏藥切忌寒凉之劑或瘀血不腐亦用桑木灸之若脈數發熱而痛者發於陽也可治脈不數不發痛者發於陰也難治不痛最惡不可視爲常疾此證不可不痛不可大痛煩悶者不治大抵發背腦疽大疔癰癤脫疽脚發之類皆由膏粱厚味盡力房勞七情六慾或丹石補藥精虛氣弱所致非獨因榮衛凝滯而生也必灸之以拔其毒更辨其因及察邪在臟腑之異虛實之殊而治之庶無悞也

一男子背瘡初生如粟悶痛煩渴便祕脈數實此毒在臟也予謂宜急疏去之以絕其源使毒不致外侵彼以爲小恙乃服尋常之藥後大潰而歿

一老婦患背瘡初生三頭皆如粟腫硬木悶煩躁至六日其頭甚多脈大按之沉細爲隔蒜灸及托裏漸起發尚不潰又數劑內外雖腐爲筋所隔膿不得出致脹痛不安予謂須開之彼不從後雖自穿毒已攻深矣亦歿大抵發背之患其名雖多惟陰陽二證爲要若發一頭或二頭其形畀赤腫高頭起疼痛發熱爲癰屬陽易治若初起一頭如黍不腫不赤悶痛煩躁大渴便祕譫語咬牙四五日間其頭不計數其瘡口各含如一粟形似蓮蓬故名蓮蓬發積日不潰按之流血至八九日或數日其頭成片所含之物俱出通結一衣揭去又結其口共爛爲一瘡其膿內攻色紫黯爲疽屬陰難治脈洪滑者尚可沉細尤難如此惡證惟隔蒜灸及塗烏金膏有效凡人背近脊骨皮裏有筋一層患此處者外皮雖破其筋難潰以致內膿不出令人脹痛苦楚氣血轉虛變證百出若待自潰多致不救必須開之兼以托裏常治此證以利刀剪之尚不能去似此堅物待其自潰不亦反傷非血氣壯實者未見其能自潰也

一男子年踰五十患背瘡色紫腫痛外皮將潰寢食不安神思甚疲用桑柴灸患處出黑血即鼾睡覺而諸證如失服仙方活命飲二劑又灸一次膿血皆出更進二劑腫痛大退又服托裏消毒散數劑而欲夫瘡勢熾甚宜用峻劑攻之但年老血氣衰弱兄又發在肌表若專於攻毒則胃氣先損反致悞事

一婦人背瘡發熱作痛專服降火敗毒藥潰後尤甚煩躁時嗽小便如淋皆惡證候辭不治果死大抵瘡瘍之證五善之中見一二善證者可治七惡之內見一二惡證者難治若虛中見惡證者不救實中無惡者自愈此證雖云屬火未有不由陰虛而致者故經云督脈經虛從腦而出膀胱經虛從背而出豈可專泥於火

趙太守患背瘡腫堅不潰瘡頭如粟脈洪大按之則濇經云骨髓不枯臟腑不敗者可治然腫硬色天堅

如牛領之皮脈更濇此精氣已絕矣不治亦死

張宜人年逾六十患發背三日肉色不變頭如粟許肩背加重寒熱飲冷脈洪數陳良甫云外如麻裏如瓜齊氏云惟寒壯熱所患必深又云肉色不變發於內也予以人參敗毒散二劑及隔蒜灸五十餘壯毒始發背始輕再用托裏藥漸潰顧氣血虛甚而作渴用參芪當歸熟地等藥渴亦止彼欲速效自用草藥畧患處毒氣復入遂不救嘗見老弱者患此瘡頭不起或堅如牛領之皮多不待潰而死有潰後氣血不能培養者亦死凡瘡初潰毒正發越宜用膏藥吸之參芪等藥托之若反以藥遏之使毒氣內攻者必不救

虞奕侍郎背中發小瘡不悟只以藥調補數日不疼不痒又不滋蔓疑之呼外醫灸二百壯已無及此公平生不服藥一年來唯覺時時手脚心熱疾作不早治又誤服補藥何可久也蓋發背無補法諺云背無好瘡但發於正中者爲眞發背按謂發背無補法此非通論然一種瘡補而無過變者又爲不可

程明佑治槐充胡媼年六十疽發背大如盂頭如蜂窠嘔逆咽不下瘍醫藥之毒雖殺而胃寒泄程曰凡病必分陰陽虛實今胃傷於寒故嘔逆溫補則榮衛充而氣血周貫毒隨膿出而肌肉漸生依方投藥四五劑咽遂下嘔止癰潰體漸平

陳斗嵓治王主政福建人背患癰痛甚發咳逆十餘日木穀不下脈伏如絕醫皆不治陳視之曰此寒涼過甚中氣下陷以四君加薑桂三進而病如失癰亦漸愈

周訏事觀患背癰瘡口久不合名瘍醫徐廷禮療治恆以托裏十宣二散與服不效徐謂周曰更請盛用美來共事料理吾技窮矣既而盛至按用藥率與徐類但多加人參五錢附子稍行功耳服後兩足俱暖自下而上謂其子曰今之藥何神哉頓覺神爽快服之旬日而瘡口平復

汪石山治一老人患癰診視之其脈洪緩而濡癰腫如椀皮肉不變按之不甚痛微發寒熱乃語之曰若在髆胛脈絡交錯皮薄骨高之處則難矣今腫去胛骨下掌許乃太陽經分尚可治遂用黃芪五錢當歸羌活甘草節各一錢先令以被蓋煖藥熱服令微汗寢熟腫消一暈五服遂安

進士張德弘背疽微腫微赤飲食少思予用六君等藥膿成而潰再用大補陽氣之類肉生而斂忽寒熱作嘔患處復腫其脈浮大按之若無形氣殊倦予謂之曰此胃氣虛憊非瘡毒也彼云侵晨登厠觸穢始作信夫先生胃虛之說也用補托而斂

崑庠王子大背患疽年餘瘡口少許不斂色黯陷下面色痿黃形氣怯弱脈浮緩而濇此脾肺氣虛也用十全大補湯加附子少許數劑而元氣漸復却去附子又三十餘劑全愈而領鄉薦

一婦年五十餘四月初背當心生疽如粟大三日漸大根盤五寸許不腫痛不寒熱予診其脈微而沉曰脈病而形不病者忌也實則痛虛則痒陰證陽證之所由分也不發不治潰而不斂亦不治乃與大補陽氣之劑色白而黯瘡勢如故至十二日復診其脈沉瘡勢不起神疲食減小便淋漓乃與大補氣血加薑桂二劑瘡亦不起十五日因怒嘔瀉並作服大補藥一劑瘡仍不起予畧藥二劑而去病者昏憒不服或勸之省悟依方連進七劑十六日瘡起而潰色紅而淡膿亦如之十九日予至喜曰瘡已踰險處但元氣銷鑠尚可憂連與大補二十餘劑五月十一日病者因勞自汗口乾舌强太陽髮際腦頂俱脹復延予至診之曰此氣血俱虛肝膽火上炎用補中益氣湯加山梔芍藥頓愈但內熱少睡手足發熱不時寒熱用逍遙散加山梔熱退復用歸脾湯瘡乃愈計瘡發及斂四十二日

操江都憲伍松月背瘡愈後大熱誤爲實火用苦寒藥一鍾寒熱益甚欲冷水浴身脈浮大按之全無予曰此陽氣虛浮在肌表無根之火也急用六君子加附子一劑即愈

一男子背瘡不斂小便赤澀畧腫發熱口乾體倦脈洪數而無力用參芪歸朮熟地芍藥陳皮麥冬五味炙草肉桂補元氣引虛火歸經脈證益甚此藥力未能及也再劑頓退却去肉桂又數劑而愈此證因前失補元氣故耳

中翰鄭朝用背疽發熱吐痰飲食無味肌肉不生瘡出鮮血予曰此脾氣虧損不能攝血歸源也法當補脾胃彼不信消毒凉血加惡寒嘔吐始悟其言用六君加炮薑半夏茯苓數劑諸證悉退又令用十全大補瘡口漸斂後因飲食稍多泄瀉成痢此脾胃虛寒下陷用補中益氣下四神丸而痢止繼以六君子湯而瘡愈

封君袁懷雪背疽發熱作渴脈數無力用四物加黃

葉知母元參山梔連翹五味麥冬銀花厥證漸退又加白芷參芪腐肉悉潰因停藥且勞熱渴仍作乃與參芪歸芷炙草山藥山萸茯苓澤瀉肉桂而安又以六味地黃丸及十全大補而斂

都憲周弘岡背疽腫而不潰脈大而浮此陽氣虛弱而邪氣壅滯也用托裏散倍用參芪反內熱作渴脈洪大鼓指此虛火也用前散急加肉桂脈證頓退仍用托裏而愈若以爲熱毒而用寒藥則誤矣

太僕王的塘背瘡初起因大勞又用十宣散之類加喘渴內熱脈大無力此陽氣自傷不能升舉下陷於陰分而爲內熱也予以補中益氣加酒炒芍藥麥門冬五味子治之而愈

上舍張克恭患背瘡內服外敷皆寒涼敗毒遍身作痛榮衛虛而不能營於肉裏也欲嘔少食脾胃虛寒而不能消化飲食也內熱晡熱陰血內虛而陽氣陷於陰分也惡寒畏寒陽氣虛弱而不能衛於肌膚也此皆由脾胃之氣不足所致遂用補中益氣湯諸證漸退又以十全大補湯腐肉漸潰又用六君子湯加芍藥肌肉頓生而愈

儒者周兩峰懷抱久鬱背脊患疽肝脈弦洪脾脈浮大按之微細以補中益氣湯加桔梗貝母少用金銀花白芷二劑肝脈頓退脾脈頓强乃以活命飲二劑膿潰腫消肝脈仍弦此毒雖去而胃氣復傷仍用補中益氣湯加茯苓半夏

腸外因當用內托復煎散其間黃芩蒼朮亦不敢用脈沉實邪在內腸內固當用內疏黃連湯其中大黃檳榔亦不敢用況浮數濇三脈皆主血氣俱虛邪既在表而反用峻利之劑重瀉其裏誅伐無過不死何俟

張錦衣年踰四十患發背心脈洪數勢危劇心脈洪數乃心火熾甚經云諸痛痒瘡瘍皆屬心火心主血心氣滯則血不行故生癰也騎竹爲灸穴是心脈所由之地急灸之以瀉心火隔蒜灸以拔其毒再以托裏消毒果愈

平氏室患發背以托裏消毒藥二十餘劑而潰因怒頓吐血五六椀許氣弱脈細此氣血虛極也遂令服獨參膏斤許稍緩更以參芪歸朮陳皮炙甘草三十餘劑瘡口漸合設投以犀角地黃湯沉寒之藥鮮有不誤

顧浩宇年踰四十患發背治以托裏藥而潰忽嘔而痛胃脈弦緊彼以爲餘毒內攻東垣云嘔吐無時手足厥冷膿腐之虛也丹溪云潰後發嘔不食者濕氣侵於內也又云膿出而反痛此爲虛也今胃脈弦緊木乘土位其虛明矣宜以六君子湯用酒炒芍藥砂仁檀香治之彼自服護心散嘔愈甚復邀治仍用前藥更以補氣血藥兩月而愈大抵濕氣內侵或感穢氣而作嘔者必喜溫而脈弱熱毒內攻而作嘔者必喜涼而脈數必須辨認明白亦有大便不實或腹作痛或膨脹或嘔吐或吞酸噯腐此腸胃虛寒也以理中湯治之如不應加熟附子二三片有侵晨作瀉者名曰腎瀉以二神丸治之有食少漸瘦者爲脾腎虛也尤宜服二神丸是又治蒙遺生肌肉之要藥也嘗治飲食少思吞酸噯腐諸藥不應唯服理中湯及附子理中丸有效蓋此證皆因中氣虛寒不能運化鬱滯所致故用溫補則中氣溫和自無此證矣

一男子渴後背發疽未潰脈數無力此陰虛火動用加減八味丸咬咀二劑稍緩次用丸劑而愈

劉太宰紫岩太夫人發背元氣不足用托裏藥而起

王安人發背正潰時欲速效俱敷草藥即日而死

劉大尹年將五十陸路赴京兼喪子患發背盈尺中六寸許不痛發熱口乾惡寒自汗少食大便不禁且氣促脈浮大按之空虛余用補中益氣湯加半夏茯苓四劑又以隔蒜灸之彼云背重已去形氣少健但吞酸前日所進飲食覺仍在腹又以前藥加薑桂服二劑飲食少進吞酸已止始得睡瘡且不痛不潰疑爲陰證余曰此陽氣虛不能營於患處故所患肉死而不痛不潰也若胃氣回飲食進死肉即潰矣仍服前藥六劑飲食漸進患處漸潰脈有力余曰此陽氣回矣後惑於他醫云必服飛龍奪命丹出汗爲善遂進一服汗大出三日不止復請治余曰汗多亡陽無能爲也強曰諸書云汗之則瘡已豈能爲患後果死

東垣先生云瘡瘍因風熱鬱於下其人多怒其瘡色赤腫高結硬而痛左關脈洪緩而弦是邪客於血脈之上皮膚之間故發汗而通其榮衛則邪氣去矣宜與徐符卿年踰四十患發背五日不起肉色不變脈弱少食大便不實予以凡疽未潰脈先弱難於收斂用托裏消毒散二劑方起發彼惑一媼言貼膏藥服攻毒劑反盛背如負石復請予治遂以隔蒜灸三十餘壯彼云背不覺重但痒痛未知更以托裏藥知痛痒膿清仍以前藥倍加參芪佐以薑桂膿稍稠又爲人惑外用猪腰子貼抽膿血內服硝黃劑逐流血五六椀許連瀉十餘行腹內如冰飲食不進不得已速予診之脈壺脫已不可醫矣蓋其證屬大虛不足之甚雖一於溫補猶恐不救況用攻伐之劑不死何俟

鄭進士患癰將痊大便祕結服大黃等藥反腐飲食余用補氣血之劑加桃仁麻仁未效更以猪膽汁深納穀道續以養血氣而愈

王太守宜人患發背膿熟不開昏悶不食此毒入內也斷不治強之鍼膿椀許稍蘇須臾竟亡大抵血氣壯實膿自潰出老弱之人氣血枯槁必須迎而奪之順而取之若毒結四肢砭刺少緩腐潰深大亦難收斂痛結於頰項胃膕緊要之地不問壯弱急宜鍼刺否則難治

汪夫人發背用敷藥冷徹胃內欲嘔急令洗去用托裏藥而愈

張侍御發背專用敷藥痛豁不起胃膈痞悶氣不能呼吸自分不治余用托裏辛溫藥而愈

王通府患發背十餘日勢危脈大先以槐花酒二服殺其勢退更以敗毒二劑再以托裏藥數劑漸潰又用桑燃艾灸患處每日灸良久仍以膏貼之灸至數大膿潰腐脫以托裏藥加白朮陳皮月餘而愈

鄧大尹發背六七日滿背腫痛勢甚危與隔蒜灸百壯飲槐花酒二椀即睡隨服托裏消毒藥十去五六令將桑燃艾灸患處而潰不數日愈

太監劉關患發背予奉旨往治腫痛紫色診其脈息沉數陳良甫云脈數發熱而痛者發於陽也且瘡瘍赤甚則紫即火極似水也詢之嘗服透骨丹半載乃積溫成熱所致遂以內疏黃連湯再服稍平更用排膿消毒散及猪蹄湯太乙膏而愈經曰色與脈當相參應治之者在明亢害承制之理陰陽變化之機焉耳

一儒者背腫一塊按之則軟肉色如故飲食如常勞則吐痰體倦此脾氣虛而痰滯用補中益氣加茯苓半夏少加羌活外用陰陽散以薑汁調搽而消後因勞頭運作嘔仍以前藥去羌活加生薑蔓荊而愈

陳遲婦臥牀十三年矣嘉靖癸卯遭回祿益加憂鬱甲辰三月右肩下發一塊脊腫如甌中赤外白先用凉藥一劑不解次用十宣散四劑加痛略紅迎徐南樓視之連投參芪丁桂防芷之劑膿潰徐云無恙矣辭後眩運嘔逆惡寒戰慄頂陷膿清偶檢予外科發揮至發背門云若初起一頭如粟不腫不赤煩躁便祕四五日間生頭不計其數瘡口各如含一粟名曰蓮房發云云始駭爲惡證治法雖詳不諳於行迎予至診云辛凉解散氣血兩虛者忌之連投參芪歸朮地黃薑附大劑腫高膿稠紺烏金膏數日果腐落如脂膜者數片人參每服加至八錢日進二服逾兩月平復

鄭揮使年踰五十患發背形證俱虛用托裏藥而潰但有腐肉當去彼懼不肯延至旬日則好肉皆敗矣雖投大劑毒甚竟不救古人謂壞肉惡於狠虎毒於蜂螫緩去之則戕賊性命信哉

舍親居賓鷗仲夏患發背黯腫尺餘皆有小頭如鋪黍狀四日矣此眞氣虛而邪氣實遂隔蒜灸服活命飲二劑其邪頓退乃純補其眞氣又將生脈散以代茶飲瘡邪大退予因他往三日復視之飲食不入中央肉死大便祕結小便赤濁予曰中央肉死毒氣盛而脾氣虛也大便不通腸虛而不能傳送小便赤濁脾虛而火下陷治亦難矣彼始云莫非間斷補藥之過予曰然乃急服六君子加當歸柴胡升麻飲食漸進大便自通外用烏金膏塗中央三寸許四圍紅腫漸消中央黑腐漸去乃傅當歸膏用地黃丸與前藥間服將百劑而愈

職方王的塘背疽潰後小便淋漓或時自遺作渴引飲煩熱不寐瘡口焮赤時或如灼時或便遺余曰此腎虛之惡證用加減八味丸加麥冬數劑而痊

太守朱陽山患背疽漫腫色黯微腫作渴瘡頭數十左尺脈洪大按之無力此腎虛之證先用活命飲二劑以殺其毒午前以參芪歸朮之類壯氣血午後以加減八味丸料固腎氣喜其未用敗毒之藥元氣未損故數日膿出肉腐而愈

駕部林汝玉冬不衣綿作渴飲冷每自喜壯實哂予衣綿診其脈數大無力予曰至火令當求予也三月間果背熱便祕脈濇用四物加芩連山梔數劑大便稍和却去芩連加參朮茯苓二十餘劑及前丸半斤許渴減六七背熱亦退至夏背發一疽純用托裏之劑而斂

一男子背瘡出血煩躁作渴脈洪大按之如無此血脫發躁用當歸補血湯二劑少愈又以八珍加黃芪山梔數劑全愈

南儀部賀朝卿陞山西少參別時予見其脣鼻青黑且時搔背問其故曰有一小瘡耳予與視之果疽也此脾胃敗壞爲不治之證予素與善悲其途次不便殯殮遂托其僚友張東華輩强留之勉與大補但出紫血虛極也或謂毒熾不能爲膿乃服攻毒藥一鍾以致嘔逆脈脈果卒於南部

一縣尹背瘡竟背腐潰色黯重若負石甚危喜飲食頗進用桃紅散色漸赤負漸輕再用而肌生更服托裏藥而愈蓋此亦大毒證非此峻藥莫能治此亦用砒故用攻毒有效然有氣血虛不能腐潰宜補養血氣

趙氏醫貫曰一園丁患發背甚危令取金銀藤五六兩搗爛入熱酒一鍾攪勻取汁酒溫服柤罨患處四五服而平彼得此方凡有患瘡者即以治之百發百中即得養身成家遂棄園業

外科正宗曰一男子年五十餘背心生疽十三日矣湯水全然不入堅硬背如負石煩悶不語請予視之瘡勢雖重皮色亦紫喜其根脚交會明白毒尚結局於此未經入內故可治之須行拔法使毒氣外發不致內攻爲要隨煑藥筒提拔二次共去惡血椀許又以其脈實便祕以內疏黃連湯及猪膽汁導法大便通利二次使內外毒氣皆得通泄隨夜睡臥得寧背重失其大半次用托裏排膿之藥與服外以桑木灸法腫硬漸腐膿毒漸出換服十全大補湯加麥門冬五味數服腐肉自脫飲食漸進瘡口漸合調理兩月餘而愈

一老婦年近七旬背瘡已過半月形勢全然可畏彼家俱置不治惶惶整備後事名予看童稚瘡恙見問其故舉家大小咸言待死朝夕予强借觀可否視之瘡形半背皆膿瘡雖不高亦不內陷以手按之外實而內腐老年內虛膿毒中隔不得外發故也雖飲食不餐且喜脚根兩無浮腫雜臟腑又無敗色乃有生之證也病家固執不信又言錢龜命卜俱斷必死治豈生乎予嗟可惜也再三四日不治內膜穿潰必死此命陷於無辜矣次日予心不服自往討治喟然嘆曰予非相强實見其有生不忍捨其待死因欲强之醫藥金分毫不取直待患者果愈隨其酬補何如彼衆方肯先用葱艾湯淋洗瘡上外面俱是不腐頑肉隨用鈹鍼利剪正中取去二寸頑肉放通膿管以手輕重之間捺淨內蓄膿血支流不住約有三椀旁視者無不點頭失色待膿血稍盡仍用前湯洗淨用膏封貼內用回元大成湯三服以接補眞氣後用人參養榮湯倍人參白朮加香附早以八味丸八仙糕相兼調理欲其脾健食進腐脫肌生況此婦謹愼調理並未更變不過百日瘡愈身健而安自後方信予言無謬也

一監生年過五旬素有渴證身軀又肥胖之極背生一發約有尺許至十二朝後請予往治視其瘡勢微腫色淡微紅根脚半收半散此陰陽相等之證也況肥人內虛瘡勢又大非大爲補托瘡必難起毒必內陷恐後不及事也初服便以托裏散調其內候至十五日外用鈹鍼小小從頂放通三孔庶使內毒有路而出勢大不可過放走泄元氣恐膿難成內用參芪內托散倍加人參黃芪各三錢服至二十日大膿將發日至升許早以參朮膏午用十全湯加參芪各四錢麥冬五味子各一錢服至月餘肉腐逼潰膿似湧泉間用聖愈湯八仙糕兼服調理保助脾胃增進飲食後恐前藥不勝其事於藥中加熟附子一錢喜其脾健膿稠色黃而正至四十日外瘡勢方得微退時值仲夏天氣酷熱患者生煩快飲冷水二椀至晚瘡隨下陷忽變爲陰不痛無膿身凉脈細腹痛足冷彼覺請視瘡形軟陷脈亦細微此瘡因寒變之故也非辛熱不可回陽急用十二味異功散倍人參熟附各三錢不應此藥力不勝其寒也換用生附人參各五錢早晚二服方得身温脈起瘡高復痛又二服膿似前流大膿出至一月之久約有百餘椀竟不減少外皮紅退亦不腐爛此肥人外實而內虛故皮不腐而內潰也又用玉紅膏搽於綿花片上推入患內膏益之其內腐漸脫漸出又十日後出大腐一塊約有六兩自後腫消身便膿少漸長生肌百日外方得平復人參服過五斤外附子亦用十餘兩方得全安此證設用解毒傷脾宣利等藥不用辛熱峻補豈有得生之理

一鄉宦年踰七旬餘發瘡右背已經八日外視之瘡雖微腫色淡不紅勢若龜形根漫不聳此老年氣血衰弱之故也診其脈帶微數而有力此根本尚有帶也雖老可治隨用排膿內托散加皂刺以潰膿托裏爲要服至十三日後瘡漸腫高色亦漸赤但不能腐潰爲膿此食少脾弱不能培養之故也又用十全大補湯數服膿亦漸出不能快利凡膿澀滯者內膜中隔不通故也不可惜其老而悞其大事隨用鈹鍼當頭取開二寸許捺遍膿管果膿隨出以猪蹄湯洗淨膏益後用照藥每日一次外肉漸腐爲膿患者形色枯槁不澤更用人參養榮湯倍加參芪托裏腐肉將脫者取之新肉欲生者培之但老年氣血不能速效又加服參朮膏早晚二次以後新肉方生飲食頓倍調理七十五日而安

一庠生年六十餘患背疽十日外視其瘡形堅硬色亦黯紫頭發甚多含若螺子堅長尺許根橫半背且喜其高腫光亮發熱燃痛脈得洪數而有力此瘡得於膏粱醇酒湯熱交蒸之故也雖重不妨隨用照藥三條相應照畢其頭內含螺子盡欲吐出亦用抵脚括去又流惡血鍾許葱湯洗淨搽上數藥用紙盖貼周圍根脚用吸毒散數之收其毒氣庶不開大次日仍照仍數三日後外肉漸腐內加托藥培助脾胃解毒爲膿早服八味丸以滋腎水換洗腳湯仍將膏貼候其腐盡深入寸許隨用玉紅膏日漸日長但此公素性好飲雖在恙中不能相忌兩月後新肉雖平嬌嫩不能結皮完口因而戒飲復將浮嫩之肉盡行剪去用膏貼數日待肉老平換用珍珠散摻上數次方結老蓋八十日而安

一老年人患疽半月其瘡貫脊偏背皆腫上至肩膊下至膕窩腫若瓜形頭計數百彼家以爲勢重不治予診其脈微洪而不鼓又兼腫畧外發詢問飲食知味其年雖老而根本尚有餘也雖老何慮先用托裏消毒散二服其勢稍定外用桑木灸法助力腐潰根以鐵筒膏箍之更服排膿內托散候正膿漸出但年

老氣血衰弱肉不易腐視其肉色相變不能腐化者隨用鍼鉤利剪徐徐剪去其形腐凹寸餘長低尺許凡見紅肉便用膏塗其新肉已生將半時值隆冬患家自行開瘡洗看未燃柴炭之火又兼蓋護未煖外被寒侵次後瘡色淡白膿反清稀飲食減少氣體不舒請視之此不遵調養愛護而被寒氣侵入也雖變不妨因瘡原稟於陽故能不失陽矣房中不燃柴火烘熏則無暖氣以逼除其寒即開瘡相看而致之也隨用濃葱湯乘暖淋洗將玉紅膏烘化搽上外用膏貼以熟綿軟絹覆疊數層繃蓋甚密內用神功托裏散早晚連進二服次早復看其瘡自回陽矣已後遵法調理百日而安

一老人年過六旬患背疽十二日矣視其瘡形半腫半紅微疼微熱其患發於背心之下腎俞之上高低平等廣開八寸根脚泛腫色若水噴頂軟無神似腐非腐脈浮而大重按而虛此瘡利於腫潰不利於收斂辭不可治彼家哂然而笑復請里中老醫視之見患者起居平和言語清利舉動如常飲食有味言此爲五善具是安若泰山之證也何必相慮彼家得此欣躍萬態隨用其藥日漸有功膿潰腫退腐盡肌生彼此以爲萬安之象也予嘗對患家親族言此病不可待必死於收口至錢大時也衆若以予爲妄言後問收口只有錢許未合予曰不久居也急備後事恐不及矣不數日變證一出不四朝而死後里人羣謂予之前言是矣

一男人六旬有二發生右搭先用艾灸次漸形勢高腫堅硬木痛十五日後尚未潰膿日生煩悶恐其毒陷先用鍼通隨行拔法拔出惡血鍾許已後稍得輕便搽上化腐之藥膏蓋用至三日其瘡漸作腐潰至二十日亦出正膿壞肉漸脫新肉漸生此外治之法盡矣因病家與內科一醫平交甚切托彼用藥內服而不遵外科補托之法自執己見不聽予言失於峻補每日人參不過二錢以爲足用予曰不及法當五錢兼熟附二錢方爲稱病不然必生變矣彼亦不信後果肉色淡白瘡口散大膿水清稀飲食減少此敗證具矣後雖强投溫中健脾大補之藥終不能應至於形體消削膿水臭穢延至六十日瀝盡氣血而亡然後方自懊悔殊不知大瘡每日膿出一椀用參必至三錢以此爲則況此病出膿日有三椀用參二錢謂之大損小補豈不歸死又外科乃破漏之病最能走泄眞氣如損補兩不相敵往往至於不救此爲不信於補而執俗見自取敗亡者也

一男子年近六旬時值仲夏背生熱癤二十餘處彼家邀請視孫瘡恙見彼坐於堂滿背皆癤予略視之內有一瘡比癤甚小其毒甚大予曰此瘡非癤比也一發勢不可及彼笑而答以爲無恙也乃郎送至門庭予又囑曰可急請他醫治之不可緩待俱不聽信又至十日形勢稍發命里中一醫治之又曰是癤也又十日形勢內陷敗證齊出稍信前言方央親友邀予相視其人睡臥於堂帛覆瘡上登堂未進二三步即退人曰何也予曰敗氣滿前死期速矣何必視瘡急備後事再七日死後果如言不差時刻此爲諱疾忌醫自取敗者也

景岳全書曰向予長男生在癸丑及乙卯五月甫及二週而患背疽初起時背中忽見微腫數日後按之則根深漸闊其大如椀而皮色不變亦不甚痛至十餘日身有微熱其勢滋甚因謀之瘍醫或云背疽或云痰氣咸曰葷腥溫補一毫不可入口乃投以解毒之藥一劑而身反大熱神氣愈困飲食不進矣予危懼之甚因思丹溪有云癰疽因積毒在臟腑當先助胃氣爲主使根本堅固而以行經活血佐之又曰但見腫痛參之脈證虛弱便與滋補氣血無虧可保終吉是誠確論也因却前藥而專固元氣以內托其毒遂用人參三錢製附子一錢佐以當歸熟地炙甘草肉桂之屬一劑而飲食頓進再進而神彩如舊抑何神也由是弛其口腹藥食並進十劑而膿成以其根深皮厚復用鍼出膿甚多調理月餘而愈向使傾信庸流絕忌溫補滋味專意解毒則胃氣日竭毒氣日陷飲食不進倘致透隔內潰則萬萬不保矣且此兒素無虛病何敢乃爾蓋以其既屬陰證又無實邪見有確眞故敢峻補脾腎方保萬全嗚呼醫之關係皆是類也因錄此按用告將來以見腫瘍潰瘍凡虛證未見而但無實熱壅滯可據者便宜托補如此則其受益於不識不知有非可以言語形容者

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百卷目錄

醫部彙考一百八十

胷腹門一

黃帝素問 金匱眞言論 陰陽別論 刺熱篇 腹中論 舉痛論 厥論 奇病論 標本病傳論 厥解篇 氣交變大論 五常政大論 六元正紀大論 至眞要大論 氣厥論 病能論

靈樞經 邪氣臟腑病形篇 壽夭剛柔篇 師傳篇 脈論 寒熱病篇 玉版篇 經脈篇 經筋篇 營氣篇 衛氣篇 骨度篇 熱病篇 四時氣篇 癲狂篇 厥論 百病始生篇 癰疽篇

扁鵲難經 腹痛

張機金匱要略 胷中諸病 腹中諸病 少腹諸病 臍悸 腸癰

華佗中藏經 滿痛諸證 腸鳴 臍突 臍下重

王叔和脈訣 腸腹諸病

孫思邈千金方 胷腹諸病 試胷內生癰法 腸癰

楊士瀛直指方 腹痛 肚皮痛

竇漢卿瘡瘍全書 井疽發 穿心冷癢 蜂窩發胷 發肚毒 肚癰 肋肚癰 臍癰 九發 小腸癰 盤腸癰 目 腚癰 心肝癰

嚴用和濟生方 心痛

藝術典第二百卷

醫部彙考一百八十

胷腹門一

黃帝素問

金匱眞言論

南風生於夏病在心兪在胷脅故仲夏善病胷脅

註 兪者經氣之所注也此言臟氣實則病氣臟氣虛則病臟也

陰陽別論

三陰三陽俱搏心滿腹發盡不得隱曲五日死

註 三陰三陽者五行之氣也陰陽二氣俱搏擊而不和故盡五行之數終而死也心滿陽搏於上也不得隱曲陰搏於下也腹居身半之中陰陽相交者也腹發盡者陽盡發於上陰盡發於下而無陰陽中見之和也

一陽發病少氣善欬善泄其傳爲心掣其傳爲隔

註 一陽者少陽之氣病也飲食於胃濁氣歸心脾胃受傷而爲泄故心虛而掣痛矣靈樞經曰脾脈微急爲膈中又曰飲食不下膈塞不通邪在胃脘此皆少陽之木邪干土

刺熱篇

心熱病者先不樂數日乃熱熱爭則卒心痛

註 此內因之熱外感之風寒外內交爭熱干神臟故卒然煩痛也

肝熱病者小便先黃腹痛脅滿

註 肝脈環陰器抵小腹而上脅肋故腹痛脅滿

脾熱病者腹滿泄

註 腹乃脾土之邪郭也

腹中論

帝曰人有身體髀股胻皆腫環臍而痛是爲何病岐伯曰病名伏梁此風根也其氣溢於大腸而著於肓肓之原在臍下故環臍而痛也不可動之動之爲水溺澀之病

註 此論邪留氣分而爲伏梁也氣行於肌腠之間是以身體股胻皆腫風爲陽邪傷人陽氣此風邪傷氣而留於臍腹之間故曰此風根也大腸謂大腸之外空郭之間風邪之氣充溢於大腸之外而留著於膏肓肓之原出於脖胦正在臍下故遶臍而痛也不可動者不可妄攻以動之也蓋風邪之根留於臍下動之則風氣淫佚而鼓動其水水溢於上則小便爲之不利矣

舉痛論

帝曰願聞人之五臟卒痛何氣使然岐伯對曰經脈流行不止環周不休寒氣入經而稽遲泣而不行客於脈外則血少客於脈中則氣不通故卒然而痛帝曰其痛或卒然而止者或痛甚不休者或痛甚不可按者或按之而痛止者或按之無益者或喘動應手者或心與背相引而痛者或脅肋與少腹相引而痛者或腹痛引陰股者或痛宿昔而成積者或卒然痛死不知人有少間復生者或痛而嘔者或腹痛而後泄者或痛而閉不通者凡此諸痛各不同形別之奈何岐伯曰寒氣客於脈外則脈寒脈寒則縮踡縮踡則脈絀急則外引小絡故卒然而痛得熱則痛立止因重中於寒則痛久矣

註莫于晉曰太陽日中之火也太陽主諸陽之氣陽熱之甚者也此受天之寒邪得吾身之陽氣以化熱故痛立止

寒氣客於經脈之中與炅氣相薄則脈滿滿則痛而不可按也寒氣稽留炅氣從上則脈充大而氣血亂故痛甚不可按也

註榮血行於脈中陽氣行於脈外寒邪在脈與陽氣相搏則血氣凝澁而脈滿矣脈滿故痛而不可按也寒氣稽留於脈中陽氣惟升而從上血氣不能相將而循行則亂矣

寒氣客於腸胃之間膜原之下血不得散小絡急引故痛按之則血氣散故按之痛止

註寒氣客於腸胃膜原之間則內引小絡而痛氣爲陽經絡爲陰如邪客於脈外之氣分而迫於經絡爲痛者或得炅或按之而痛止蓋寒邪得氣而易散也如邪入於經絡而爲痛者甚則不可按或雖按之無益蓋陰分之邪難散也此邪在膜原之氣分牽引小絡而痛故按之卽止

寒氣客於俠脊之脈則深按之不能及故按之無益也

註俠脊之脈伏衝之脈也伏衝之脈上循背裏邪客之則深按之不能及故按之無益也

寒氣客於衝脈衝脈起於關元隨腹直上寒氣客則脈不通脈不通則氣因之故喘動應手矣

註夫衝脈之循於背者注於經其浮而外循於腹者至胷中而散於脈外之氣分故脈不通則氣因之而喘動應手謂脈逆於胃之下而氣因病於胃之上喘動應手者人迎氣口喘急應手也

寒氣客於背腧之脈則脈澁脈澁則血虛血虛則痛其俞注於心故相引而痛按之則熱氣至熱氣至則痛止矣

註背腧之脈者足太陽之脈也太陽之脈循於背而五藏六腑之俞皆在太陽之經故藏腑血氣皆注於俞故寒客之則脈澁而血虛血虛則痛矣夫心主血脈五藏六腑之俞皆注於心故相引心而痛心爲陽中之太陽與太陽之氣標本相合是以按之則熱氣至而痛止矣

寒氣客於厥陰之脈厥陰之脈者絡陰氣繫於肝寒氣客於脈中則血澁脈急故脅肋與少腹相引痛矣

註肝主血故寒氣客於厥陰之脈則血澁脈急肝脈布脅肋循陰器故脅肋與少腹相引而痛

厥氣客於陰股寒氣上及少腹血澁在下相引故腹痛引陰股

註厥陰之脈上抵少腹下循陰股故腹痛引陰股蓋言經氣上下相通故邪正相引而爲痛

寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血澁不得注於大經血氣稽留不得行故宿昔而成積矣

註蓋邪在於外內之絡脈者必轉入於大經而後乃代謝如血氣稽留於絡脈則宿昔而成積矣宿昔稽留久也大經藏腑之大絡也

寒氣客於五藏厥逆上泄陰氣竭陽氣未入故卒然痛死不知人氣復反則生矣

註寒氣客於五藏藏陰之氣厥逆於上而從上泄則陰氣內竭陽熱之氣未入於內則裏氣虛傷故卒然痛死不知人陰陽之氣復反於內則生也

寒氣客於背腧之脈則脈澁脈澁則血虛血虛則痛其俞注於心故相引而痛按之則熱氣至熱氣至則痛止矣

註背腧之脈者足太陽之脈也太陽之脈循於背而五藏六腑之俞皆在太陽之經故藏腑血氣皆注於俞故寒客之則脈澁而血虛血虛則痛矣夫心主血脈五藏六腑之俞皆注於心故相引心而痛心爲陽中之太陽與太陽之氣標本相合是以按之則熱氣至而痛止矣

寒氣客於厥陰之脈厥陰之脈者絡陰氣繫於肝寒氣客於脈中則血澁脈急故脅肋與少腹相引痛矣

註肝主血故寒氣客於厥陰之脈則血澁脈急肝脈布脅肋循陰器故脅肋與少腹相引而痛

厥氣客於陰股寒氣上及少腹血澁在下相引故腹痛引陰股

註厥陰之脈上抵少腹下循陰股故腹痛引陰股蓋言經氣上下相通故邪正相引而爲痛

寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血澁不得注於大經血氣稽留不得行故宿昔而成積矣

註蓋邪在於外內之絡脈者必轉入於大經而後乃代謝如血氣稽留於絡脈則宿昔而成積矣宿昔稽留久也大經藏腑之大絡也

寒氣客於五藏厥逆上泄陰氣竭陽氣未入故卒然痛死不知人氣復反則生矣

註寒氣客於五藏藏陰之氣厥逆於上而從上泄則陰氣內竭陽熱之氣未入於內則裏氣虛傷故卒然痛死不知人陰陽之氣復反於內則生也

寒氣客於背腧之脈則脈澁脈澁則血虛血虛則痛其俞注於心故相引而痛按之則熱氣至熱氣至則痛止矣

註背腧之脈者足太陽之脈也太陽之脈循於背而五藏六腑之俞皆在太陽之經故藏腑血氣皆注於俞故寒客之則脈澁而血虛血虛則痛矣夫心主血脈五藏六腑之俞皆注於心故相引心而痛心爲陽中之太陽與太陽之氣標本相合是以按之則熱氣至而痛止矣

寒氣客於厥陰之脈厥陰之脈者絡陰氣繫於肝寒氣客於脈中則血澁脈急故脅肋與少腹相引痛矣

註肝主血故寒氣客於厥陰之脈則血澁脈急肝脈布脅肋循陰器故脅肋與少腹相引而痛

厥氣客於陰股寒氣上及少腹血澁在下相引故腹痛引陰股

註厥陰之脈上抵少腹下循陰股故腹痛引陰股蓋言經氣上下相通故邪正相引而爲痛

寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血澁不得注於大經血氣稽留不得行故宿昔而成積矣

註蓋邪在於外內之絡脈者必轉入於大經而後乃代謝如血氣稽留於絡脈則宿昔而成積矣宿昔稽留久也大經藏腑之大絡也

寒氣客於五藏厥逆上泄陰氣竭陽氣未入故卒然痛死不知人陰陽之氣復反於內則生也

寒氣客於背腧之脈則脈澁脈澁則血虛血虛則痛其俞注於心故相引而痛按之則熱氣至熱氣至則痛止矣

註背腧之脈者足太陽之脈也太陽之脈循於背而五藏六腑之俞皆在太陽之經故藏腑血氣皆注於俞故寒客之則脈澁而血虛血虛則痛矣夫心主血脈五藏六腑之俞皆注於心故相引心而痛心爲陽中之太陽與太陽之氣標本相合是以按之則熱氣至而痛止矣

寒氣客於厥陰之脈厥陰之脈者絡陰氣繫於肝寒氣客於脈中則血澁脈急故脅肋與少腹相引痛矣

註肝主血故寒氣客於厥陰之脈則血澁脈急肝脈布脅肋循陰器故脅肋與少腹相引而痛

厥氣客於陰股寒氣上及少腹血澁在下相引故腹痛引陰股

註厥陰之脈上抵少腹下循陰股故腹痛引陰股蓋言經氣上下相通故邪正相引而爲痛

寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血澁不得注於大經血氣稽留不得行故宿昔而成積矣

註蓋邪在於外內之絡脈者必轉入於大經而後乃代謝如血氣稽留於絡脈則宿昔而成積矣宿昔稽留久也大經藏腑之大絡也

寒氣客於五藏厥逆上泄陰氣竭陽氣未入故卒然痛死不知人陰陽之氣復反於內則生也

註寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也

寒氣客於腸胃之間從胃上出故痛而嘔

註寒氣客於小腸小腸不得成聚故後泄腹痛矣

寒氣客於小腸之間轉入於腸內故不成積聚而爲後泄腹痛也

註此言寒氣客於小腸之間轉入於腸內故不成積聚而爲後泄腹痛也

熱氣留於小腸腸中痛癉熱焦渴則堅乾不得出故痛而閉不通矣

註熱氣者寒氣稽留而化熱也小腸爲赤腸乃心藏之腑故感火氣而化熱小腸主液腸中熱則液消而爲癉熱矣液消熱燥則受盛之物堅乾而不得出故痛閉不通矣

厥論

手心主少陰厥逆心痛引喉身熱死不可治

註手心主者手厥陰包絡之氣手少陰者心藏之氣君相二火並逆將自焚矣故死

奇病論

帝曰人有尺脈數甚筋急而見此爲何病岐伯曰此所謂疹筋是人腹必急白色黑色見則病甚

註皮膚爲陽筋骨爲陰是以筋病則尺脈數諸筋之會聚於宗筋衝脈者主滲灌谿谷與陽明合於宗筋是以筋病而腹必急夫十二經之筋病惟手太陰甚則成息賁脅急吐血足少陰筋病甚者死不治是以白色黑色見者則病甚也

標本病傳論

心病先心痛一日而死三日脅支痛五日閉塞不通身痛體重三日不已死冬夜半夏日中

註心先痛者病先發於心欬者一日而之肺脅支痛者三日而之肝閉塞不通身痛體重者五日而之脾此皆逆傳其所勝是以三日不已而死心爲火臟冬之夜半者水勝而火滅也夏之日中者亢極而自焚矣

腎病少腹腰脊痛脇痠三日背胳筋痛小便閉三日腹脹三日兩脅支痛三日不已死冬大晨夏晏晡

註病先發於腎則少腹腰脊痛三日而之膀胱則背胳筋痛小便閉三日而之胃則腹脹三日而之肝則兩脅支痛冬之大明在辰土旺而水滅也夏之晏晡在亥水絕而不能生也

肝病頭目眩脅支滿三日體重身痛五日而脹三日腰脊少腹痛歷疲三日不已死冬日入夏早食

註病先發於肝則頭目眩脅支滿三日而之脾則體重身痛五日而之胃則脹三日而之腎則腰脊少腹痛三日不已死夏早食者寅卯之時木氣絕而不生也冬日入者申酉之時金氣旺而尅木也

厥解篇

少陽所謂心脅痛者言少陽盛也盛者心之所表也九月陽氣盡而陰氣盛故心脅痛也所謂不可反側者陰氣藏物也物藏則不動故不可反側也

註九月少陰心主氣少陽爲君火之相故九月爲心之表其氣更甚然君相之火爲時所遏故心脅痛九月收藏之時少陽不能樞轉故不可反側

陽明所謂胃痛少氣者水氣在腦腑也水者陰氣也陰氣在中故胃痛少氣也

註此無形之水氣上乘而爲之也

氣交變大論

歲土大過雨濕流行腎水受邪民病腹痛瀉泄腸鳴

註諸甲之歲土運太過雨濕流行腹痛乃腎臟之病土勝而水傷也

歲木太過風氣流行民病腸鳴腹支滿

註諸壬之歲木運太過則勝土腸鳴腹滿脾病也

歲水太過寒氣流行邪害心火民病身熱煩心躁悸陰厥上下中寒諺妄心痛甚則腹大滿腹腸鳴

註諸丙之歲水運太過寒氣流行故邪害心火寒氣上乘迫其火氣外炎故身熱心煩心悸者水氣上凌於心也躁者火氣不交於陰也陰氣寒甚故厥逆於上上下中寒者三焦之火衰也心神不寧故諺妄也

歲火不及寒迺大行民病胃中痛脅支滿鬱冒曚昧心痛暴瘖

註火運不及寒乃勝之則陽氣不能施化故爲此諸痛所謂寒勝則痛痹也鬱冒曚昧寒濕之氣冒明也水寒乘心故心痛心主言故暴瘖

歲水不及濕迺大行復則大風暴發痛於心腹

註水弱土勝木後復之故大風暴發風氣入於腸中在上則痛於心在下則痛於腹也

歲木不及燥乃大行民病中清胠脅痛少腹痛腸鳴

註中清中氣冷也胠脅少腹痛肝木之病肝氣虛逆更乘中清故腸鳴

歲金不及炎火迺行復則民病口瘡甚則心痛

註六乙之歲金運不及則所勝之火氣乃行金弱火亢水乃復之故水寒之氣上乘迫其心火外炎故民病口瘡甚則心痛

歲土不及風乃大行化氣不令草木茂榮飄揚而甚秀而不實上應歲星民病飧泄霍亂體重腹痛寒中胃脅暴痛下引少腹善太息

註六己之歲土運不及木反勝之由是風木傷土民則有飧泄霍亂體重腹痛肌肉之病

五常政大論

少陽司天火氣下臨肺氣上從心痛胃脘痛厥逆鬲不通

註靈樞曰厥陰心包絡所生病者心痛煩心胃脘痛者木尅土也土位中央鬲不通則上下厥逆

太陽司天寒氣下臨心氣上從熱氣妄行寒迺復善忘甚則心痛

註寒氣下臨藏氣上從而熱氣妄行寒以復之是以神氣傷而善忘甚則心痛也

太陰司天濕氣下臨腎氣上從胃中不利厥逆心下否痛少腹痛時害於食

註太陰司天則太陽寒水在泉心下否者上下水火之氣不交也少腹痛者腎病於下也時害於食者水上乘土也

六元正紀大論

金鬱之發民病欬逆心脅滿引小腹善暴痛不可反側

註此受司天在泉之勝制鬱極乃發以報復其歲氣靈樞曰足少陽是動病心脅痛不能轉側

土鬱之發民病心腹脹腸鳴而爲數後甚則心痛脅嘔吐霍亂飲發注下腑腫身重

註腹脹腸鳴諸證皆感土氣而發

水鬱之發民病寒客心痛腰脽痛大關節不利屈伸不便善厥逆痞堅腹滿

註腰脽腎之腑關節屈伸筋骨之病腎主骨而筋屬於節也厥逆痞堅腹滿者陽氣下藏中氣塞也

木鬱之發民病胃脘當心而痛上支兩脅鬲咽不通食飲不下

註此受司天在泉之制勝鬱極乃發以報復其歲氣如丁卯丁酉歲少角木運而上臨陽明壬子壬午歲太角木運而陽明在泉則木氣皆鬱矣胃脘痛等病木勝而土傷也

太陰所至爲積飲痞隔

註此春病之常也土位中央而分旺於四季故四時爲病稽中滿之病

太陰所至爲稽滿

註此夏病之常也

太陰所至爲中滿

註此秋病之常也

至眞要大論

少陰司天熱淫所勝民病胃中煩熱心痛肺膜腹大滿膨膨而喘欬

註少陰司天子午歲也胃中煩熱諸證乃火淫而金傷也

厥陰司天風淫所勝民病胃脘當心而痛上支兩脅鬲咽不通飲食不下腹脹

註厥陰司天巳亥歲也胃脘痛等病乃木淫而土傷也

太陽司天寒淫所勝民病厥心痛胃腹滿手熱肘攣腋腫心澁澁大動胃脘胃脘不安

註太陽司天辰戌歲也心痛諸證乃寒凌心火逼其火熱上炎而水火寒熱交爭也

陽明司天燥淫所勝民病腹中鳴心脅暴痛不可反側

註陽明司天卯酉歲也腹中鳴寒清於中也心脅暴痛肝經病也

歲少陰在泉民病腹中常鳴氣上衝胃喘不能久立

少腹中痛腹大

註少陰在泉卯酉歲也腹中鳴氣上衝胃火氣上奔也熱在下焦則少腹痛熱在中焦則腹大也

歲厥陰在泉風淫所勝民病心痛支滿兩脅裏急飲食不下鬲咽不通食則嘔腹脹善噫

註厥陰在泉寅申歲也厥陰肝脈上貫鬲布脅肋故爲心痛支滿等病腹脹善噫木淫而土病也

太陰之勝火氣內鬱心痛胃滿少腹滿復則體重中滿飲食不化陰氣上厥胃中不便

註心痛者木盛而傳於火也胃中脘中也宗氣之所居陰氣上逆故胃中不便

厥陰之勝胃腸如寒胃脘當心而痛上支兩脅腸鳴飧泄少腹痛甚則嘔吐鬲咽不通復則少腹堅滿裏急暴痛厥心痛

註胃鬲如寒胃土病也風氣淫於上則胃脘當心而痛上支兩脅甚則嘔吐鬲咽不通淫於下則腸鳴飧泄少腹痛也少腹堅滿裏急暴痛厥陰之氣鬱而欲發也

少陽之勝熱客於胃煩心心痛少腹痛下沃赤白

註少陽之氣合於三焦故熱客於胃蓋三焦之原皆出於胃也而與心主包絡相合故煩心心痛

陽明之勝清發於中胃中不便復則心痛否滿腹脹煩心病在鬲中

註胃中不便者陽明清氣在上也心痛否滿腹脹者乘火土也煩心者病在鬲中陽明之氣上逆也

太陽之勝凝滯且至寒厥入胃則內生心痛復則厥氣上行心胃生寒胃腸不利心痛痞滿

註太陽寒水氣勝故凝滯且至厥逆而入於胃者木侮土也胃絡上通於心故心痛也

少陰之復燠熱內作煩躁鬱冒悶瞀少腹絞痛心痛鬱冒不知人

註煩躁火煩而陰躁也少腹絞痛少陰之氣發於下也心痛乃火氣自傷鬱冒不知人者寒熱之氣亂於上也

少陰在泉主勝則厥氣上行心痛發熱鬲中衆痹皆作

註心痛發熱乃寒水之主氣上乘在泉君火也

少陽在泉客勝則腰腹痛而反惡寒甚則下白溺白

主勝則熱反上行而客於心心痛發熱格中而嘔

註腰腹痛惡寒者客勝而太陽之主氣病也太陽之氣傷故惡寒甚則下白溺白者病及於陽明太陰之主氣也蓋金主氣氣化則溺出窮白者氣不化而溺不清也下白者土氣傷而大便色白也因客勝而主氣反病故曰反主勝則熱反上行而客於心心痛發熱者君相二火之客氣反上行而自

病也格中而嘔者太陰之客氣自病也

陽明在泉客勝則清氣動下少腹堅滿而數便瀉主勝則腰重腹痛少腹生寒下爲鶩溏則寒厥於腸上衝胃中甚則喘不能久立

註 清氣動下者清肅之天氣而動於下也少腹堅滿而數便瀉者太陽寒水之病也主勝則腰重腹痛少腹生寒者太陽寒水之氣發於下也下爲鶩溏者水下泄也寒厥於腸上衝胃中甚則喘者寒氣逆乘陽明之大腸而上及於胃中之肺臟也

歲少陽在泉火淫所勝民病注泄赤白少腹痛溺赤

註 熱傷血分則注赤熱傷氣分則注白熱在下焦故少腹痛而溺赤也

陽明在泉燥淫所勝民病喜嘔嘔有苦善太息心脅痛不能反側

註 陽明在泉子午歲也嘔苦善太息心脅痛不能轉側者足少陽病也

厥陰之復少腹堅滿裏急暴痛厥心痛汗發嘔吐飲食不入

註 少腹堅滿裏急暴痛厥陰之氣鬱而欲發也嘔吐飲食不入木淫而土敗也

少陽司天主勝則胃痛欬仰息

註 少陽司天初氣三氣乃君相二火二之氣乃太陰濕土火土之氣上逆也

氣厥論

肺移寒於腎爲涌水涌水者按腹不堅水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裹漿水之病也

註 腎爲水臟肺主生原肺之寒邪下移於腎而腎之水氣反上涌於肺矣大腸乃肺之腑肺居膈上故水氣客於大腸疾行則鳴濯濯有聲如以囊裹漿者水不沾流走於腸間也

病能論

黃帝問曰人病胃脘癰者診當何如岐伯對曰診此者當候胃脈其脈當沉細沉細者氣逆逆者人迎甚盛甚盛則熱人迎者胃脈也逆而盛則熱聚於胃口而不行故胃脘爲癰也

註 胃脈右關脈也人迎結喉兩旁之動脈蓋胃氣逆則不能至於手太陰而胃脈沉細矣氣逆於胃則人迎甚盛乃熱聚於胃而不行則留滯爲癰也

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

心脈微急爲心痛引背微滑爲心疝引臍

註 微急乃邪薄於宮城之外而臟之神未受傷滑則陽盛在下則少腹當有形也

肺脈微急爲肺寒熱怠惰欬唾血引腰背胃微大爲肺痹引胃背

註 肺寒熱者皮寒熱也寒在皮毛故微急肺主氣怠惰欬唾血引腰背胃痛皆肺虛寒之所致微盛於上則爲肺痹引胃背蓋從下而上也

肝脈微大爲肝痹陰縮欬引小腹

註 肝脈抵少腹上肺欬引小腹經氣逆於上下也

壽夭剛柔篇

怫慊賁響風寒客於腸胃之中

註 此因風寒之病氣所謂氣勝形者是也

師傳篇

寒中之屬則便熱腸中寒則腸鳴飧泄

註 腸中寒則腸鳴飧泄者寒熱外內之相應也

臍已上皮熱腸中熱則出黃如糜臍已下皮寒胃中寒則腹脹

註 寒熱外內之相應也

脹論

大腸脹者腸鳴而痛濯濯冬日重感於寒則飧泄不化

註 此衛氣逆於城郭之中而爲腸脹也

寒熱病篇

小腹臍下三結交三結交者陽明太陰也臍下三寸關元也

註 三結交者足太陰陽明與任脈交結於小腸臍下也

玉版篇

腹鳴而滿四肢清泄其脈大逆也

註 此榮衛血氣之不調逆傷於腎也

經脈篇

肺手太陰之脈所生病者欬上氣喘渴胃滿

脾足太陰之脈是動則病舌本强食則嘔胃脘痛心下急痛

心主手厥陰心包絡之脈循胃中出脅是動則病胃脅支滿心痛掌中熱

膽足少陽之脈是動則病善太息心脅痛不能轉側胃脅肋髀膝外至脛絕骨外踝前及諸節皆痛

肝足厥陰之脈所生病者胃滿

註 凡此皆經脈所循之部分爲病也

手少陰之別名曰通里其實則支膈

註 手少陰之別絡與經相干名曰通里其氣實膈間若有所支而不暢

手心主之別名曰內關心系實則心痛

註 手心主別絡與經相干於內關之間心系實則心痛心系與包絡之相通也

足太陰之別名曰公孫其別者入絡腸胃實則腸中切痛

註 足太陰之別絡與經相干於公孫之間其別行者入絡腸胃氣有餘而實則爲腸中切痛

任脈之別名曰尾翳實則腹皮痛虛則癢搔

註 蓋言任脈之別絡出於下極以散於腹絡氣實則腹皮急虛則癢搔

經筋篇

手心主之筋其病前及胷痛息賁

註 手心主之筋散胷中而結於胃脘之賁間故前及胷痛息賁也

足太陰之筋聚於陰器上腹結於臍其病下引臍痛

手少陰之筋起於小指之內側循臂下繫於臍

營氣篇

營氣入臍中

衛氣篇

衛氣在腹者止於臍左右之動脈

註 陽明之血氣從衝脈而出於腹氣之街故與衝脈會於臍之左右動脈也

百病始生篇

積留著於陽明之經則挾臍而居飽食則益大饑則益小

註 陽明之經乃胃之大絡故挾臍而居飽則水穀之津注於外故大饑則津血少故小也

骨度篇

胷圍四尺五寸

註 此胷骨圍轉一周之總數也

熱病篇

熱病挾臍急痛

註 挾臍急痛者外淫之風邪客於心下而爲伏梁也

四時氣篇

腹中常鳴氣上衝胷喘不能久立邪在大腸

註 此邪在大腸而爲病也大腸爲傳導之官病則其氣反逆是以腹中常鳴氣上衝胷喘不能久立也

飲食不下膈塞不通邪在胃脘

註 此邪在胃脘而爲病也食飲不下膈塞不通如邪在上脘則不能受納水穀如邪在下脘則不能傳化糟粕也

小腹痛腫不得小便邪在三焦

註 此邪在膀胱而爲病也膀胱主約下焦邪客之則小腹腫痛不得小便也

癲狂篇

厥逆爲病也足暴清胷將若裂腸若將以刀切之煩而不能食

註 此足少陰之本氣厥逆而爲病也少陰之氣逆於內故足暴清也胷將若裂腸若將以刀切之煩而不能食者厥氣從腹而上及於心胷也

厥論

眞心痛手足青至節心痛甚旦發夕死夕發旦死

註 夫四臟厥逆而爲心痛者從經脈而薄於心之分也心爲君主之官神明出焉故心不受邪若傷其眞臟而爲眞心痛者不竟日而死矣

百病始生篇

虛邪傳舍在腸胃之時賁響腹脹多寒則腸鳴飧泄食不化其著孫絡之脈而成積者其積往來上下臂手孫絡之居也浮而緩不能拘積而止之故往來移行腸胃之間水湊滲注灌濯濯有音有寒則䐜滿雷引故時切痛

註 虛邪者虛鄉不正之邪風孫絡者腸胃募原間之小絡蓋胃腑所出之血氣滲出於胃外之小絡而轉注於大絡從大絡而出於孫絡皮膚其著於內之孫絡而成積者其積往來上下其臂手孫絡之居於外也浮而緩不能拘束其精而止之故往來游行於腸胃之間胃腑之水津滲注於外則濯濯有聲也

癰疽篇

癰發於胷名曰井疽其狀如大豆三四日起不早治下入腹不出七日死矣

註 胷者膻中之分宗氣之所居也宗氣出於陽明不早治則下入於腹而傷陽明胃氣胃氣傷則七日死矣

發於膺名曰甘疽色青其狀如穀實蓏蓏常苦寒熱急治之去其寒熱十歲死死後出膿

註 膂乃足厥陰陽明之部分故疽發於此其名曰甘色青狀如穀實菰蘇者如米穀如苦蔞之子實也陰陽互交故往來寒熱至十年而後發乃死此即乳巖石癰之證也蓋臟腑之氣將衰則毒氣發而潰爛死矣

扁鵲難經

腹痛

假令得肝脈其外證善潔面青善怒其內證臍左有動氣按之牢若痛得心脈其內證臍上有動氣按之牢若痛其病煩心心痛

得脾脈其內證當臍有動氣按之牢若痛

得肺脈其內證臍右有動氣按之牢若痛

得腎脈其內證臍下有動氣按之牢若痛其病逆氣小腹急痛

脈有三部中部法人主鬲以下至臍之有疾也

漢張機金匱要略

胷中諸病

師曰夫脈當取太過不及陽微陰弦即胷痹而痛所以然者貴其極虛也今陽虛知在上焦所以胷痹心痛者以陰弦故也

胷痹之病喘息欬唾胷背痛短氣寸口脈沉而遲關上小緊數苦蔞薤白白酒湯主之

胷痹不得臥心痛徹背者苦蔞薤白半夏湯主之

胷痹心中痞氣氣結在胷胷滿脅下逆搶心枳實薤白桂枝湯主之人參湯亦主之

胷痹胷中氣塞短氣茯苓杏仁甘草湯主之橘皮枳實生薑湯亦主之

胷痹緩急者薏苡仁附子散主之

心中痞諸逆心懸痛桂枝生薑枳實湯主之

心痛徹背背痛徹心烏頭赤石脂丸主之

按之心下滿痛者此爲實也當下之宜大柴胡湯

心胷中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起出見有頭足上下痛而不可觸近大建中湯主之

肝中寒者兩臂不舉舌本燥喜太息胷中痛不得轉側食則吐而汗出也

心中寒者其人苦病心如噉蒜狀劇者心痛徹背背痛徹心譬如蠱注其脈浮者自吐乃愈

心傷者其人勞倦即頭面赤而下重心中痛而自煩發熱當臍跳其脈弦此爲心臟傷所致也

有支飲家欬煩胷中痛者不卒死至一百日或一歲宜十棗湯

厥陰之爲病消渴氣上衝心心中疼熱饑而不欲食食即吐蚘下之不肯止

病者苦水面目身體四肢皆腫小便不利脈之不言水反言胷中痛氣上衝咽狀如炙肉當微欬喘審如師言其脈何類師曰寸口脈沉而緊沉爲水緊爲寒沉緊相搏結在關元始時當微年盛不覺陽衰之後榮衛相干陽損陰盛結寒微動腎氣上衝喉咽塞噎脅下急痛醫以爲留飲而大下之氣擊不去其病不除後重吐之胃家虛煩咽燥欲飲水小便不利水穀不化面目手足浮腫又與葶藶圓下水當時如小差食飲過度腫復如前胷脅苦痛象若奔豚其水揚溢則浮欬喘逆當先攻擊衛氣令止乃治欬欬止其喘自差先治新病病當在後

痓爲病胷滿口噤臥不著席脚攣急必齘齒可與大承氣湯

寸口脈遲而緩遲則爲寒緩則爲虛榮緩則爲亡血衛緩則爲中風邪氣中經則身痒而癮疹心氣不足邪氣入中則胷滿而短氣

病人胷滿唇痿舌青口燥但欲漱水不欲嚥無寒熱脈微大來遲腹不滿其人言我滿爲有瘀血

趺陽脈當伏今反緊本自有寒疝瘕腹中痛醫反下之即胷滿短氣

嘔而胷滿者茱萸湯主之

瘦人繞臍痛必有風冷穀氣不行而反下之其氣必衝不衝者心下則痞

水在心心下堅築短氣惡水不欲飲

心下有痰飲胷脅支滿目眩苓桂朮甘湯主之

病者脈伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此爲留飲欲去故也甘遂半夏湯主之

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脈沉緊得之數十日醫吐下之不愈朮防己湯主之虛者即愈實者三日復發復與不愈者宜朮防己湯去石膏加茯苓芒硝湯主之

支飲胷滿者厚朴大黃湯主之

卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者半夏加茯苓湯主之

腹中諸病

趺陽脈微弦法當腹滿不滿者必便難兩胠疼痛此虛寒從下上也當以溫藥服之

病者腹滿按之不痛爲虛痛者爲實可下之舌黃未

下者下之黃自去
腹滿時減復如故此爲寒當與溫藥
病者痿黃躁而不渴胃中寒實而利不止者死
病腹滿發熱十日脈浮而數飲食如故厚朴七物湯主之
腹中寒氣雷鳴切痛胃脘逆滿嘔吐附子粳米湯主之
痛而閉者厚朴三物湯主之
腹滿不減減不足言當須下之宜大承氣湯
脈沉小遲名脫氣其人疾行則喘喝手足逆寒腹滿甚則溏泄食不消化也
五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷房室傷饑傷勞傷經絡榮衛氣傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑緩中補虛大黃䗪蟲圓主之
石水其脈自沉外證腹滿不喘黃汗其脈沉遲身發熱胃滿四肢頭面腫久不愈必致癰膿
問曰病下利後渴飲水小便不利腹滿因腫者何也答曰此法當病水若小便自利及汗出者自當愈
師曰寸口脈遲而滑遲則爲寒滑爲血不足趺陽脈微而遲微則爲氣遲則爲寒寒氣不足則手足逆冷手足逆冷則榮衛俱勞陽氣不通即身冷陰氣不通即骨疼陽前通則惡寒陰前通則痹不仁陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃散實則失氣虛則遺溺名曰氣分
陽明病脈遲者食難用飽飽則發煩頭眩小便必難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脈遲故也
酒黃疸者或無熱靜言了了腹滿欲吐鼻燥其脈浮者先吐之沉弦者先下之
腹滿舌萎黃躁不得眠屬黃家
黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此爲表和裏實當下之宜大黃硝石湯
黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱熱除必噦噦者小半夏湯主之
下利清穀不可攻其表汗出必脹滿
下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯
嘔而腸鳴心下痞者半夏瀉心湯主之
下利三部脈皆平按之心下堅者急下之宜大承氣湯
虛勞裏急悸衄腹中痛夢失精四肢痠疼手足煩熱咽乾口燥小建中湯主之
奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱奔豚湯主之
腹滿口舌乾燥此腸間有水氣己椒藶黃圓主之
諸勞腹痛而嘔者宜柴胡湯
病腹痛有蟲其脈何以別之師曰腹中痛其脈當沉若弦反洪大故有蚘蟲

少腹諸病

男子脈虛沉弦無寒熱短氣裏急小便不利面色白時目瞑兼衄少腹滿此爲勞使之然
黃家日晡所發熱而反惡寒此爲女勞得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時溏此女勞之病非水也腹滿者難治硝石礬石散主之
夫失精家少腹弦急陰頭寒目眩髮落脈極虛芤遲爲清穀亡血失精脈得諸芤動微緊男子失精女子夢交桂枝龍骨牡蠣湯主之
虛勞腰痛少腹拘急小便不利者八味腎氣圓主之
淋之爲病小便如粟狀小腹弦急痛引臍中

臍悸

發汗後臍下悸者欲作賁豚茯苓桂枝甘草大棗湯主之
心傷者其人勞倦即頭面赤而下重心中痛而自煩發熱當臍跳其脈弦此爲心臟傷所致也
假令瘦人臍下有悸吐涎沫而癲眩此水也五苓散主之

腸癰

腸癰之爲病其身甲錯腹皮急按之濡如腫狀腹無積聚身無熱脈數此爲腸內有癰膿薏苡附子敗醬散主之
腸癰者少腹腫痞按之即痛如淋小便自調時時發熱自汗出復惡寒其脈遲緊者膿未成可下之當有血脈洪數者膿已成不可下也大黃牡丹湯

華佗中藏經

滿痛諸證

心病則胃中痛虛則胃腹及膂背引痛及心中疼心脈大甚則胃中滿而煩又心病則先心痛而欬心積則胃滿悸脈虛則不樂胃腹中若痛
脾脈急則腸中不利滑則蟲毒腸鳴中熱滿則腸癰
脾病腹中鳴痛脾寒則使人腹中痛
胃寒則腹中痛虛則胃中短氣穀不化

肺實則胷滿脈太過則令人氣逆胷滿
大腸積冷則脾痛不能久立痛已則泄虛則喜滿
腎有水則腹大臍腫小腹結痛氣上衝心寒則結在
臍下也有厥氣則臍下重悶或有痛絕
下焦病則令人腹脹氣滿小腹堅溺而不得便而窘
迫也寒則飲食不消虛則腸鳴膨脹
病心腹脹滿痛不止脈堅大洪者死
病腹中痛其脈浮大而長者死
病腹痛而喘其脈滑而利數而緊者死

腸鳴

脾脈微滑則蠱毒腸鳴中熱
胃者腑也虛則腸鳴脹滿引出滑泄
中焦虛則腸鳴膨脹

臍突

腎有水則腹大臍腫腰重痛不得溺陰下濕如牛鼻
頭汗出是爲逆
脾脉至大而虛有積脾氣絕則十日死又臍出者亦
死
掌腫無紋臍腫出囊莖俱腫者死

臍下重

腎中寒結在臍下腎脈來而細軟附於骨者是也實
則煩悶臍下重
膀胱滿脹則小便不下臍下重悶或有痛絕則三日
死死難鳴也
晉王叔和脈訣

腸腹諸痛

下指定位圖歌陽數卽吐兼頭痛陰微卽瀉臍中吼
肺脈歌曰溢出胷中滿氣泄大腸鳴
脾臟歌曰濕多虛五泄腸走若雷奔
滑脈歌曰尺部見滑臍似冰飲水下焦聲瀝瀝
濇脈歌曰尺部如濇逢逆冷體寒臍下作雷鳴
緊脈歌曰隱指寥寥入尺來激結繞臍常手捧
微脈歌曰尺部見之臍下積身寒飲水卽呻吟
唐孫思邈千金方

胷腹諸病

胷痹之病令人心中堅滿痞急痛肌中苦痹絞急如
刺不得俛仰其胷前皮皆痛手不得犯胷中愊愊然
而滿短氣咳唾引痛咽塞不利習習如癢喉中乾燥
時欲嘔吐煩悶自汗出或徹引背痛不治之數日殺
人
寒氣卒客於五臟六腑則發卒心痛胷痹感於寒微
者爲欬甚者爲痛爲泄厥心痛與背相引善瘈如物
從後觸其心身傴僂者腎心痛也厥心痛腹脹滿心
痛甚者胃心痛也厥心痛如以針錐刺其心心痛甚
脾心痛也厥心痛色蒼蒼如死灰狀終日不得太息
者肝心痛也厥心痛臥若從心間痛動作痛益甚色
不變者肺心痛也眞心痛手足靑至節心痛甚旦發
夕死夕發旦死蚘心痛心腹中痛發作腫聚往來上
下行痛有休止腹中熱善涎出是蚘咬也以手按而
堅持之勿令得移以大針刺之復久持之蟲不動乃
出針心下不可刺中有成聚不可取於腧腸中有蟲
蚘咬皆不可取以小鍼
診得脾積脈浮大而長饑則減飽則見膹氣與穀爭
減心下累累如桃李起見於外腹滿嘔泄腸鳴四肢
重足脛腫厥不能臥是主肌肉損色黃也
脾病爲痞者令人寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出
恆山丸主之
大腸中風者臥而腸鳴不止灸大腸腧百壯可服續
命湯

試胷內生癰法

胷中痛而短氣者當令入闇室中以手指捺左眼視
若見光者胷中有結癰若不見光者是瘰疽內發出
也

腸癰

卒得腸癰而不曉其病候愚醫治之錯則殺人夫腸
癰之爲病小腹重而強抑之則痛小便數似淋時時
汗出復惡寒其身皮皆甲錯腹皮急如腫狀其脈數
者小有膿也其脈遲緊者未有膿也甚者腹脹大轉
側聞水聲或繞臍生瘡或膿從臍中出或大便出膿
血
問曰官羽林婦病醫脈之何以知婦人腸中有膿爲
下之卽愈師曰寸口脈滑而數滑則爲實數則爲熱
滑則爲榮數則爲衛衛數下降榮滑上升榮衛相干
血爲濁敗小腹痞堅小便或澀或復汗出或復惡寒
膿爲已成設脈遲緊卽爲瘀血血下則愈大黃牡丹
湯主之
宋楊士瀛直指方

腹痛

有寒有熱有死血有食積有痰飲有蟲
氣血痰水食積風冷諸證之痛每每停聚而不散惟
蟲痛則乍作乍止來去無定又有嘔吐淸沫之爲可

驗

肚皮痛

肚皮痛者由腎虛不能行水加之酒麴無度酒與水交聚於腹中而麴毒復壅滯其氣是以水滲於肚皮而作痛矣以錢氏宣風散用蜜水煎嚥下神保丸俟其大便流行後以青木香丸一分安腎丸倍之用二陳湯煎水空心嚥下脾腎氣復自然向安

寶漢卿猪瘍全書

井疽發

此證發於胃者名曰井疽狀如豆大三四日起若不早治必入於腹入腹不療十日當死急服內固清心散可治若內發傷膜主死無疑治法與發胃發背同

穿心冷瘡

此毒生於心窩初起則心頭如火熱其毒則先內潰心包方出皮膚令人心神恍惚盜汗多出二日皆紅舌如雞金背裏外俱熱易治若毒發於外冷氣攻心常嘔吐惡心口吐冷痰惡聞食味然氣臭者死

蜂窩發胃

此證蜂窠發於胃乳間乃心火熱盛須用依前疎導心火之藥稍治之遲則熱必攻心必然死矣內服發胃煎藥外貼膏藥後用摻藥洗用猪蹄湯

發肚毒

發肚之毒有發腹肚或手肚足肚者俱爲發肚若不速治必致喪命便服竭毒流氣飲三四服并服六皮四子湯內托散加木瓜檳榔蒼朮空心煎服未潰用金箍散已潰後外貼金絲膏內服蠟礬丸

肚癰

此毒生於脾經因食煎煿油膩酒醉太過及行房事以致毒不流通聚成此癰或生在外或生在內若不速治潰透脾膜即死先服六君子湯加厚朴砂仁青皮芍藥木香枳殼甜瓜子黃芪次服內補十宣散蠟礬丸

潰後久不愈用六合回生丹猪腰子法治之未潰爛之前按內有膿狀急用腸癰之行藥追膿大便中出庶易愈矣

助肚癰

此癰受在大小腸二經氣壅而發出在表乃結癰聚毒也當用內托流氣飲外用圍藥內服腸癰從大便會膿之藥治之調理禁忌之法相同

臍癰

此證生於臍內因食生冷油膩之物積聚於氣海之間聚結成癰若不速治即內潰臍內出膿四圍堅硬或出血水者即難治也無此則生

如未潰破按之有膿將治腸肚癰行藥從大便中出甚妙痛加乳香

婦人此癰受在心流於小腸經發在臍中堅硬如石與男子不同此是惡毒證也當用內托流氣飲定痛三香飲治之治法須用圍藥并同男子臍癰之藥加減治之

九發

九發者肺疽心疽肝疽腎疽脾疽胃疽大腸疽三焦疽小腸癰須驗其人所現爲依據此候審定癰疽淺深其病從何臟腑發先會食何乳石又驗其氣血虛實穿潰出入者可治發於內者則傷膜流膿大便出者必難治若以藥令膿大便出者則藥味入於經絡引出無害當參詳而療之愈後一年之外不許遠行及行房事若不知戒終至於斃

小腸癰

此證因膀胱有熱蓄毒不流結成以致臍中堅硬結核小便疼痛日夜下利無度用敗毒散加猪苓澤瀉木通燈草甘草梢瞿麥又用連根葱十根搗爛盦臍上多服金花丸大要用前腸癰肚癰之法治之

盤腸癰

此毒因悶脈而得之用獨活散此即治腕疽藥

胃脘癰

素問云人病胃脘癰當候胃脈沉細者氣逆氣逆者人迎甚盛則熱人迎者胃脈逆而盛熱聚胃口不行故留爲癰其發寒熱如瘧身皮甲錯或嗽或嘔或吐膿血宜升麻連翹湯熱聚胃脘留結爲癰須要知戒

心肝癰

心者君主之官神明出焉肝者將軍之官謀慮出焉二官有君臣之分一身之主宰其可傷也此癰受在心心主行血氣血熱傷於經絡此是惡毒之證不可不審也當用定痛敗毒散如不散用內托流氣飲服用和濟生方

心痛

夫心痛之病醫經所載凡有九種一曰蟲心痛二曰疰心痛三曰風心痛四曰悸心痛五曰食心痛六曰飲心痛七曰寒心痛八曰熱心痛九曰去來心痛其名雖不同而其所致皆因外感六淫內犯七情或飲啖生冷果食之類使邪氣搏於正氣邪正交擊氣閉

塞鬱於中焦遂成心痛夫心迺諸臟之主正經不可傷傷之則痛若痛甚手足青過節者則名曰眞心痛眞心痛者旦發夕死夕發旦死若乍間乍盛成疹而不死者名曰厥心痛不過邪氣乘於心支別絡也寸口脈緊心脈甚急皆主心痛又有痛甚而心脈沉伏者有之矣王叔和云心腹痛脈沉細遲浮大弦長命必殂治法當推其所自而調之痛無不止矣

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百一卷目錄
醫部彙考一百八十一
胃腹門二
劉完素六書 滿痛諸證
成無己明理論 諸滿
張從政儒門事親 滿悶
李杲十書 痞滿 腹痛
朱震亨心法 痞 心腹痛 腹鳴
虞摶醫學正傳 心腹痛
戴思恭證治要訣 腸痛 心痛 心腹痛
龔信古今醫鑑 諸痛
方賢奇效良方 心痛
王綸明醫雜著 心腹痛
薛己醫按 胃院痛 腸痛 腹痛
樓英醫學綱目 運氣胃心腹痛 運氣腸鳴

藝術典第二百一卷
醫部彙考一百八十一
胃腹門二
金劉完素六書
滿痛諸病
中滿濕爲積飲痞隔而土主形體位在中央故中滿也
濁氣在上則生膜脹此陰陽返則氣結不散脹滿常如飽吳茱萸湯主之
膺腫頸痛胃滿腹脹上實下虛氣厥而逆此爲陽氣有餘鬱於胃也不可鍼灸宜服順氣湯小茯苓湯主之
因於失衣風感之頭汗多惡風膈塞不通寒則胃拽腹滿氣不通大豆豉丸胃風湯主之
陽氣大怒則形氣絕而血脈菀於上令人薄厥於胃中赤茯苓湯主之
諸心痛者皆少陰厥氣上衝也有熱厥心痛者身熱足寒痛甚則煩躁而吐額自汗出知爲熱也其脈洪大當灸太谿及崑崙謂表裏俱寫之是謂熱病汗不出引熱下行表汗通身而出者愈也灸畢服金鈴子散痛止服枳术丸去其餘邪也有大實心中痛者因食受時氣卒然發痛大便或祕久而注悶心胃高起按之愈痛不能飲食急以爰黃丸利之利後以薑本湯去其餘邪有寒厥心痛者手足逆而通身冷汗出便利溺清或大便利而不渴者氣微力弱急以术附湯溫之寒厥暴痛非久病也朝發暮死當急救之是知久痛無寒而暴痛非熱
堅痞腹滿急痛寒主拘縮故急痛也寒極則血脈凝滯而反兼土化制之故堅痞而腹滿也或熱鬱於內而腹滿堅結痛者不可言爲寒也
土主形體腹滿中央乃曰中滿以傳化失度故甚則霍亂吐瀉也
蠱腹痛腎傳心筋脈相引而急精液少筋脈不榮灌而引急建中加減湯主之
脾風傳腎一名疝氣小腹痛出白液名曰蠱左傳云以喪志名爲蠱病此乃眞精不守故也大建中湯主之
小腹膀胱按之內痛若沃以湯溫於小便上爲清涕太陽直行從巔入循於腦氣下灌於鼻時出清涕不止腎著湯主之
小腹痛不得大小便邪氣入客約而不行故穀氣不得通也枳穀丸主之
足厥陰之脈環陰器抵小腹腫或痛腎虛寒水涸竭瀉邪補脈爲治葵葱湯主之
伏梁者若梁之伏隱也居臍上逆臍下順不可移動爲水溺濇故有二等
腹痛欲嘔吐者上熱下寒也以陽不得降而胃熱欲嘔陰不得升而下寒腹痛是升降失常也黃連湯主之
淋閉不通臍下狀如覆椀痛悶不可忍
成無己明理論
諸滿
傷寒胃脘滿何以明之胃脘滿者謂脘膈間氣塞滿悶也非心下滿者也脘滿者謂脘肋下氣脹膨滿也非腹滿者也邪氣自表傳裏必先自胃膈以次經心脘而入胃邪氣入胃謂入腑也是以胃滿多帶表證脘滿者當半表半裏證也經曰下後脈促胃滿者桂枝去芍藥湯主之又曰太陽與陽明合病喘而胃滿者不可下宜麻黃湯是胃滿屬表而須發汗者也蓋胃中至表猶近也及脘者則更不言發汗但和解而已經曰設胃滿脘痛者與小柴胡湯又曰胃脘滿不去者小柴胡湯主之本太陽病不解轉入少陽者脘下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱脈沉緊者小柴胡湯

主之是知脅滿屬半表半裏明矣大抵胃脅滿以邪氣初入裏未停留爲實氣鬱積而不行致生滿也和解斯可矣若邪氣留於胃中聚而爲實者非湧吐則不可已故華佗曰四日在胃吐之則愈是邪氣已收斂而不散漫者則可吐之內經曰其高者因而越之病在胃脘之上爲高越之爲吐也經曰病在胃中當吐之發汗若下之而煩熱胃中窒者則以梔子豉湯吐之若胃中痞鞕氣上衝咽喉不得息者此爲胃中有寒也則以瓜蒂散吐之二者均是吐劑梔子豉湯吐胃中虛煩客熱也瓜蒂散吐胃中痰實宿寒也若能審明藥劑之輕重辨別邪氣之淺深對證投湯不爲妨者未之有也

傷寒心下滿何以明之心下滿者謂正當心下高起滿鞕者是矣不經下後而滿者則有吐下之殊若下後心下滿者又有結胃痞氣之別經曰病人手足厥冷脈乍緊邪結在胃中心中滿而煩饑不能食者病在胃中當須吐之又曰脈浮而大心下反鞕有熱屬藏者攻之不令發汗屬腑者不令攻之茲二者爲不經汗下而心下滿者或吐之或下之看其邪氣之高下高者則因而越之下者則因而竭之要在泄其邪也至於陽明病雖心下鞕滿又未可攻經曰陽明病心下鞕滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈是邪氣自表傳裏至於心下蓄結爲實者則不可下乃吐之可也若未全爲實者則不可下故有此戒也又邪氣在表未應下而强下之邪氣乘虛結於心下實者鞕滿而痛爲結胃虛者滿而不痛爲虛痞經曰嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆必蒸蒸而振却復發熱汗出而解若心下滿而鞕痛者此爲結胃也但滿而不痛者此爲虛痞蓋實邪留結則爲鞕爲痛虛邪留滯則但滿而不鞕痛也結胃熱實脈沉而緊心下痛按之石鞕者大陷胃湯主之明其邪實可知矣脈浮而緊而反下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳明其邪虛可知矣病發於陽而反下之熱入因作結胃病發於陰而反下之因作痞表邪未罷醫反下之胃中空虛客氣動膈陽氣內陷心中因鞕則爲結胃須陷胃湯圓攻之可也傷寒中風醫反下之心下痞鞕而滿醫見心下痞謂病不盡而復下之其痞益甚此非結熱但以胃中空虛客氣上逆故使鞕也須瀉心湯散之可也二者俱是心下滿鞕一爲虛證一爲實證凡投湯者大須詳審結胃雖爲實邪衆皆共知當用陷胃湯圓下之或脈浮大者則不可下下之則死此是猶帶表邪未全結實下之重虛其裏邪深結則死設或結胃形證悉具而加之煩躁者又爲不治之疾藥之所以能勝邪者必待胃氣施布藥力始能溫汗吐下之以逐其邪氣邪氣勝胃氣絕者湯藥縱下胃氣不能施布雖神丹豈能爲效也

傷寒腹滿何以明之腹滿者俗謂之肚脹是也華佗曰傷寒一日在皮二日在膚三日在肌四日在胃五日在腹六日入胃入胃謂入腑也是在腹也猶未全入裏者雖腹滿爲裏證故亦有淺深之別經曰表已解而內不消非大滿猶生寒熱則病不除是其未全入腑若大滿大實堅有燥屎自可除下之雖四五日不能爲禍謂之邪氣已入腑也傷寒邪入腹是裏證已深故腹滿乃可下之者多矣如經曰其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯發汗不解腹滿痛者急下之本太陽病醫反下之因而腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂枝加大黃湯主之少陰病腹脹不大便者急下之諸如此者皆爲裏證是也雖曰腹中滿痛者此爲實也當下去之然腹滿不減者則爲實也若腹滿時減者又爲虛也則不可下經曰腹滿不減減不足言當下之金匱要略曰腹滿時減復如故此虛寒從上下也當以溫藥和之蓋虛氣留滯亦爲之脹但比之實者不至堅痛也大抵腹滿屬太陰證也陽熱爲邪者則腹滿而咽乾陰寒爲邪者則腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛太陰者脾土也治中央故專主腹滿之候又發汗吐下之後因而成腹滿者皆邪氣乘虛內客爲之而所主又各不同經曰發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘草半夏人參湯主之傷寒吐後腹脹滿者調胃承氣湯主之傷寒下後心煩腹脹滿臥起不安者梔子厚朴湯主之三者有當溫者有當下者有當吐者何邪氣不一也且發汗後腹滿當溫之邪氣在表因發散則邪去胃爲津液之主發汗亡陽則胃氣虛而不能敷布諸氣壅滯而爲脹滿是當溫散可也吐後腹滿可下之邪氣在胃者則可吐之吐之邪去則安若吐後邪氣不去加之腹脹滿者是胃中之邪下傳入胃壅而爲實故生脹滿當須下之可也下後腹滿可吐者邪氣在表未傳入腑而妄下之邪自表乘虛而入鬱於胃中而爲虛煩氣上下不得通

利者腹爲之滿故當吐之可也凡爲醫者要識邪氣所起所在審其所起知邪氣之由來觀其所在知邪氣之虛實發汗吐下之不差温補針艾之適當則十全之功自可得也

傷寒少腹滿者何以明之少腹滿者臍下滿是也少腹者下焦所治難經曰下焦者當膀胱上口主分別清濁其治在臍下邪氣自上而下至於下焦結而不利故少腹滿也胃中滿心下滿皆氣爾俱無物也及腹滿者又有燥屎爲之者至於少腹滿者非止氣也必有物聚於此而爲之滿爾所以然者身半以上同天之陽清陽歸之身半以下同地之陰濁陰歸之清者在上而濁者在下內經謂清陽出上竅濁陰出下竅當出不出積而爲滿是在上而滿者氣也在下而滿者物也所謂物者溺與血爾邪氣聚於下焦則津液不得通血氣不得行或溺或血留滯於下是生脹滿而鞕痛也若從心下至少腹皆鞕滿而通者是邪實也須大陷胃湯下之若但少腹鞕滿而痛小便利者則是蓄血之證小便不利者則是溺瀝之證經曰少腹滿應小便不利今反利者爲有血也又曰少腹鞕滿小便不利者爲無血也小便自利其人如狂者血證諦也其小便利而少腹滿者爲太陽隨經瘀血在裏太陽自入腑者也經曰太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外未解者尚未可攻當先解外外解已但少腹急結者乃可攻之桃仁承氣湯主之是少腹鞕滿爲物聚於下可知矣滲之利之參酌隨宜可爲上工

元張從政儒門事親

滿悶

夫上喘中滿酢心腹脹時時作聲否氣上下不能宣暢叔和云氣壅三焦不得昌是也可用獨聖散吐之吐訖次以導水禹功輕瀉三五行不愈更以利膈丸瀉之使上下宣通不能壅滯後服平胃散五苓散益元散桂苓甘露散三和散分陰陽利水道之藥則愈凡膏粱之人起居閒逸奉養太過酒食所傷以致中脘畜飲惡悶痞脇酢心可服木香導飲丸治之若田野藜羹之人食疏衣薄作勞役苦酒食所傷心腹滿悶酢心時時吐酸水可用進食丸以其勝毒也病甚者每日瀉三五次

李杲十書

痞滿

痞者心下滿而不痛是也太陰濕土主壅塞乃土來心下而爲痞也傷寒下之早亦爲痞乃寒傷榮血心主血邪入於本故爲心下痞仲景瀉心湯數方皆用黃連瀉心下其土邪其效如響應桴

酒積雜病下之太過亦能作痞蓋胃中之氣因虛而下陷於心之分野故致心下痞宜行胃氣以血藥兼之若全用氣藥導之則氣愈下降必變爲中滿鼓脹矣

痞有虛實之殊實痞大便閉厚朴枳實湯主之虛痞大便利芍藥陳皮湯主之

腹痛

腹痛有部分中脘痛太陰也理中湯加味小建中湯草豆蔻丸之類主之臍腹痛少陰也四逆湯薑附湯或五積散加吳茱萸主之小腹痛厥陰也當歸四逆湯加吳茱萸主之

雜證腹痛四物苦練湯酒煮當歸丸增損當歸丸之類或芍藥甘草湯主之脈弦傷氣加黃芩脈洪傷金加芍藥脈緩傷水加桂枝生薑脈濇傷血加當歸脈遲傷火加乾薑腹不滿者加棗若滿者不加脾虛滿者黃芪湯芍藥去濕

朱震亨心法

痞

痞者有食積兼濕心下痞須用枳實炒黃連

如稟受充實面蒼骨露氣實之人而心下痞者宜枳實黃連青皮陳皮枳殼

如稟受素弱轉運不調飲食不化而心下痞者宜白朮山楂神麴麥芽陳皮

如肥人心下痞者乃是實痰宜蒼朮半夏砂仁茯苓滑石

如瘦人心下痞者乃是鬱熱在中焦宜枳實黃連葛根升麻

如食後感寒飲食不化心下痞宜藿香草豆蔻吳茱萸砂仁

痞挾血成窠囊用桃仁紅花香附大黃之類

痞者與否同不通泰也由陰伏陽蓄氣與血不運而成處心下位中央膜滿痞塞者皆土之病而與脹滿有輕重之分痞則內覺痞悶而外無脹急之形者是痞也

有中氣虛弱不能運化精微爲痞者

有飲食痰積不能施化爲痞者

有濕熱太甚爲痞者

古方治痞用黃連黃芩枳實之苦以泄之厚朴生薑半夏之辛以散之人參白朮之甘苦以補之茯苓澤瀉之淡以滲之既痞同濕治惟宜上下分消其氣如果有內實之證庶可略與疏導世人苦於痞塞喜行利藥以求其速效暫時過快痞若再作益以滋甚

心腹痛

心痛卽胃脘痛雖日數多不喫食不死若痛方止便喫物還痛必須三五服藥後方喫物

痛甚者脈必伏用溫藥附子之類不可用參朮

諸痛不可補氣

大凡心腹之痛須分新久若明知身受寒氣口喫寒物而得病者於初得之時當與溫散或溫利之藥若病之稍久則成鬱久鬱則蒸熱熱久必生火原病式中備言之矣若欲行溫散溫利寧無助火添病耶古方中多以山梔子爲熱藥之向導則邪易伏病易退正易復而病易安然病安之後若縱恣口味不改前非病復作時反咎醫之失良可嘆哉一方用山梔子炒去皮每服十五枚濃煎湯一呷入生薑汁令辛再煎小沸又入川芎一錢尤妙山梔子大者或七枚或九枚須炒黑

大藥胃口有熱而作痛者非山梔子不可須佐以薑汁多用台芎開之

病發者或用二陳湯加川芎蒼朮倍加炒梔子痛甚者加炒乾薑從治之法也

輕者川芎一兩蒼朮一兩山梔子炒去皮二兩薑汁蒸餅糊丸梧子大服七八十丸熱辛薑湯下

重者桂枝麻黃石膏各等分薑汁和蒸餅丸桐子大服五十丸熱辛薑湯下

一法輕者散之麻黃桂枝之類重者加石膏川芎蒼朮炒山梔子去皮作丸服

凡治此證必要先問平日起居何如假如心痛有因平日喜食熱物以致死血留於胃口作痛用桃仁承氣湯下之切記輕者用韭汁桔梗能開提其氣血藥中衆用之

以物拄按痛處則止者挾虛以二陳湯加炒乾薑和之

有蟲痛者面上白斑唇紅能食屬蟲治以苦楝根錫灰之類

痛定便能食時作時止者是蟲上半月蟲頭向上易治下半月蟲頭向下難治先以肉汁及糖蜜食下則引蟲頭向上然後用藥打出楝樹根皮檳榔鶴蝨夏取汁飲冬濃煎湯下萬應丸最好

脈堅實不大便者下之

心痛用山梔并劫藥止之若又復發前藥必不效可用元明粉一服立止

左手脈數熱多脈濇有死血

右手脈緊實痰積弦大必是久病

胃脘有濕而痛者宜小胃丹下之

夫心痛其種有九一曰蟲痛二曰疰痛三曰風痛四曰悸痛五曰食痛六曰飲痛七曰寒痛八曰熱痛九曰來去痛

其痛甚手足青過節者是名真心痛旦發夕死夕發旦死非藥物所能療

若蛔蟲攻嚙心痛令人惡心而吐用川椒十粒煎湯下烏梅丸良

有腎氣上攻以致心痛用生韭研汁和五苓散爲丸空心茴香湯下

時作時止或飲湯水下咽而作噦者是有死血在其中以桃仁承氣湯下之

治氣餒弱人心痛草豆蔻丸妙

腹痛有寒積熱死血食積濕痰

脈弦食脈滑痰濕痰多作腹痛台芎蒼朮香附白芷爲末以薑汁入湯調服大法之方若此

腹痛者氣用氣藥如木香檳榔香附枳殼之類

血用血藥如當歸川芎桃仁紅花之類

初得時元氣未虛必推蕩之此通因通用之法久必難施壯實與初病宜下虛弱衰與久病宜升之消之

凡心腹痛者必用溫散此是鬱結不行阻氣不運故痛

在上者多屬食食能作痛宜溫散之如乾薑炒蒼朮川芎白芷香附薑汁之類不可用峻利藥攻下之蓋食得寒則凝得熱則化更兼行氣快氣藥助之無不可者

老人腹痛年高不禁下者用川芎蒼朮香附白芷乾薑茯苓滑石之類

或曰痰豈能痛曰痰因氣滯而聚既聚則礙其道路不得運故作痛也

諸痛不可用參芪白朮蓋補其氣氣旺不通而痛愈甚

白芍藥只治血虛腹痛諸痛勿用以酸收斂故也

臍下忽大痛人中黑色者多死

絞腸沙作痛以樟木煎湯大吐或白礬調湯吐之鹽湯亦可探吐宜刺委中出血

腹痛須用芍藥惡寒而痛者加桂惡熱而痛者宜加黃蘗

凡腹痛以手重按者屬虛宜參朮薑桂之屬

凡腹痛不可以手按者屬實宜大黃芒硝下之

凡肥人腹痛者屬氣虛兼濕痰宜人參二朮半夏

如感寒而腹痛者宜薑桂嘔者丁香

如傷暑而腹痛宜玉龍丸

如飲食過傷而痛者宜木香檳榔丸下之

如禀受弱飲食過傷而腹痛者當補脾胃而消導宜參朮山楂麵蘗枳實木香

如顛撲損傷而腹痛者乃是瘀血宜桃仁承氣湯加當歸紫蘇紅花入酒童便煎服下之

有全不思食其人本體素弱而腹冷痛者以養胃湯仍加桂茱黃各半錢木香三分又或理中湯建中湯皆可用內加吳茱萸良

腸鳴

腹中水鳴乃火擊動其水也二陳湯加芩連梔子亦有臟寒而鳴者

腹中鳴者病本於胃也

明虞搏醫學正傳

心腹痛

內經曰木鬱之發民病胃脘當心而痛上支兩脅鬲咽不通食飲不下蓋木氣被鬱發則太過故民病有土敗木賊之候也夫胃爲脾之腑陽先於陰故臟未病而腑先病也甚而至於脅下如刀劃之痛者已連及於臟矣古方名爲脾疼者是也胃之上口名曰賁門賁門與心相連故經所謂胃脘當心而痛今俗呼爲心痛者未達此義耳雖曰運氣之勝復未有不由痰涎食積鬱於中七情九氣觸於內之所致爲是以清陽不升濁陰不降而肝木之邪得以乘脾侵侮而爲病矣更原厥初致病之由多因縱恣口腹喜好辛酸恣飲熱酒煎熇復餐寒涼生冷朝傷暮損日積月深自鬱成積成痰痰火煎熬血亦妄行痰血相雜妨礙升降故胃脘疼痛吞酸噯氣嘈雜惡心皆腸噎反胃之漸者也俗醫不究其源例以辛香燥熱之劑治之以火濟火遂成危劇良可痛哉古方九種心痛曰飲曰食曰風曰冷曰熱曰悸曰蟲曰疰曰寒去痛夫所謂冷者惟一耳豈可例以熱藥治之乎詳其所由皆在胃脘而實不在於心也有異心痛者大寒觸犯心君又曰汚血衝心手足青過節者且發夕死夕發旦死宜區別諸證而治之無有不安之理

內經曰寒氣入經而稽遲泣而不行客於脈外則血少客於脈中則氣不通故卒然而痛又舉痛論言寒邪外客而痛者甚詳悉未能盡述學者自宜檢閱外有因實因虛因傷寒因痰火因食積因死血者種種不同亦當表而出之庶使學者易爲參考焉東垣曰腹中諸痛皆由勞役過甚飲食失節中氣不足寒邪乘虛而客入之故卒然而作大痛經曰得炅則止此事難知集論曰傷寒中脘痛太陰也理中湯黃芪建中湯之類臍腹痛者少陰也四逆湯真武湯附子湯之類小腹痛厥陰也重則正陽散回陽丹輕則當歸四逆湯之類太陰連少陰痛甚者當變爲下利不止若夫雜病腹痛四物苦楝湯酒煮當歸丸之類夏月腹痛肌熱惡熱脈洪數屬手太陰足陽明黃芩芍藥湯主之秋月腹痛肌寒惡寒脈沉疾屬足太陰足少陰桂枝芍藥湯主之四時腹痛芍藥甘草湯主之原病式曰熱鬱於內則腹滿堅結而痛不可例言爲寒也成無己曰陰寒爲邪者則腹滿而吐食不下自利益甚腹疼痛無陰證也發汗不解醫反下之因而腹滿時痛者屬太陽也桂枝加芍藥湯主之大實而痛者桂枝加大黃湯主之又曰邪氣聚於下焦則津液不得宣通血氣不得流行或蓄澼或血凝滯於下而生脹痛鞕痛也若從心下至小腹皆鞕滿而痛者是邪實也須以大陷胸湯下之若但小腹鞕滿而痛小便利者則是蓄血之證小便不利者則爲蓄溢之證也其有血虛腹弱之人津液枯涸傳送失常鬱火燥熱煎成結糞滯於大小腸之間阻氣不運而作痛者宜以枳實導滯丸備急大黃丸之類先通其滯止其痛然後用四物等生血潤燥之劑以治其本外有卒然心腹大痛欲吐不得吐欲瀉不得瀉腎脈逆死在須臾此內因食積外感寒邪是名乾霍亂之候也急宜以鹽湯灌之而以鵝翎探吐取涎而愈若夫清痰留滯於胃腹之間食積鬱結於腸胃之內皆能令人腹痛清痰作痛者控涎丹小胃丹之類食積爲患者保和丸枳實丸之類消之枳實導滯丸木香檳榔丸之類下之濁氣在上者湧之清氣在下者提之寒者溫之熱者清之虛者培之實者瀉之結者散之留者行之此治法之大要也

胃中若有涎飲清痰作痛腹中臚臚有聲及手足寒

痛或腰膝脊骨抽掣作痛者用小胃丹或三花神佑丸或控涎丹漸漸服之能徹去病根即止

戴思恭證治要訣

膈痛

膈痛多因積冷與痰氣而成宜五膈寬中散或四七湯加木香桂各半錢或撫脾湯加木香膈痛而氣上急者宜蘇子降氣湯去前胡加木香如數痰涎壅盛而痛者宜小半夏茯苓湯加枳實一錢間進半硫丸

膈痛與心痛不同心痛則在岐骨陷處本非心痛乃心支別絡痛耳膈痛則痛橫滿胷間比之心痛爲輕諸方稱爲噎雜煩躁忪悸痰飲證也五苓散利心小腸之熱恐非其對不若用四物湯十全大補湯去桂生生血而益陰此以水制火之義亦有呷薑湯數口或進乾薑劑而愈者此膈上停寒中有伏飲見熱則消也

心痞

心痞有痰飲所致俗名飲痞有胃口熱食易消故痞素問謂之食痞亦類消中之狀俗名肚痞痰氣宜小半夏茯苓湯加枳實一錢胃中熱宜二陳湯加黃連一錢或五苓散加桂與辰砂

心腹痛

心痛病有得之日近者有得之日久時發動者不問諸證並宜異攻散香靈湯仍佐以撫脾湯

若積冷而痛者宜手拈散酒調下於內加官桂等分仍以撫脾湯鐵刷湯佐之或用蘇合香丸薑汁和酒調開熱服前後心痛亦可用

若服溫藥而痛愈甚者宜微利其大便量虛實先進神保丸以利爲度繼進加味七氣湯若因飲食冷物而痛者宜調氣散和撫脾湯

若因蚘作痛蚘攻嘔心痛有休止其人吐蚘或與之湯飲藥餌轉入轉吐蓋緣物入則蚘動蚘動則令人惡心而吐用川椒十數粒煎湯下烏梅丸有腎氣逆上攻心以致心痛用生韭研汁和五苓散爲丸空肚茴香湯下

腹痛之證所感不一或因寒熱或因暑濕或因飲食饑飽不問何證皆可用薑香正氣散加木香半錢或正氣散調下蘇合香丸

若腹痛欲得熱手按及喜熱食者此是積冷作痛當用理中湯或治中湯小建中湯等藥若冷痛用溫藥不效痛愈甚大便不甚通當微利之用藿香正氣散每服加官桂木香枳殼各半錢吞下來復丹或用蘇感丸不利則量虛實用神保丸

有全不喜食其人本體素怯弱而又加以腹冷疼者養胃湯以白术蒼术仍加桂吳萸各半錢木香三分臍腹冷痛或心脾疼者生薑均治之

龔信古今醫鑑

諸痛

按痛則不通通則不痛夫胃脘心脾痛者或因身受寒邪口食冷物內有鬱熱素有頑痰死血或因惱怒氣滯蟲動作痛種種不同若不分而治之何能愈乎余曰是寒則溫之是熱則清之是痰則化之是血則散之是氣則順之是蟲則殺之臨證不可惑也

一心痛卒急無藥以鹽置刀頭燒紅淬入水中乘熱飲之吐痰而愈此法治攪腸沙大痛已死者立效

凡腹痛有寒有熱有死血有食積有濕痰有虛有實若綿綿痛而無增減者是寒也時痛時止者熱也每痛有處不行移者死血也痛甚欲大便利後痛減者食積也痛而小便不利者濕痰也

凡腹中痛甚飲涼水一盞其痛稍可者屬熱痛當用涼藥清之清之不已而或遶臍硬痛大便閉實煩渴用涼藥下之利氣丸之類若飲水愈加作痛屬寒痛用溫藥和之和之不已而或四肢厥冷腹痛嘔吐瀉利惡服熱藥救之附子理中湯之類須詳脈力有無腹痛氣用氣藥如木香檳榔香附枳殼之類血用血藥如當歸川芎桃仁紅花之類

如腹中常覺有熱而暴痛暴止者此爲積熱宜調胃承氣湯下之

如腹痛全不思飲食其人本體素弱而腹冷痛者以人參養胃湯加肉桂木香吳茱萸或理中湯加良薑吳茱萸

如飲食過傷而腹痛者宜利氣丸下之并治痰氣作痛

方賢奇效良方

心痛

內經曰五臟卒痛何氣使然曰寒氣客於背俞之脈則血脈泣脈泣則血虛血虛則痛其俞注於心故相引而痛按之則熱氣至則痛止矣感於寒則痛久矣病機要曰諸心痛者皆本於厥陰氣上衝也有熱厥心痛者身熱足寒痛甚煩躁而吐額自汗出知爲熱也其脈浮大而洪當灸太谿及峴嶺謂表裏俱瀉之

是謂熱病汗不出引熱下利表汗通身而出者愈也炙畢服金鈴子散則愈痛止服枳朮丸去其餘邪也有大實心中痛者因氣而食卒然發痛大便或祕久則注悶心胃高起按之愈痛不能飲食急可刺之利後以藥本湯去其邪也有寒厥心痛者手足逆而通身冷汗出便溺清利或大便利而不渴氣微力弱急以朮附湯温之寒厥暴痛非久病也朝發暮死急當救之是知久病無寒暴病非熱也以是論寒厥熱厥與夫大實心痛治法已詳又有病久氣血虛損及素作勞羸弱之人患心痛者皆虛痛也故錢氏心虛者炒鹽補之圖經衍義載牡蠣治心痛則蠣粉與鹽實得之矣大意治病必求其本究其虛實正謂紫之奪紅相去一間耳而毫釐疑似實霄壤焉夫心爲五官之主百骸之所以聽命者也心之正經果爲風冷邪氣所干果爲氣血痰水所犯則其痛掣背脅脹胃煩咽乾兩目赤黃手足俱青至節朝發而暮殂矣然心之包絡與胃口相應往往脾痛連心或陽虛陰厥亦令心下急痛或他臟之邪亦有客乘於心者是則心之別脈受焉如所謂九種心痛一曰蟲二曰疰三曰風四曰悸五曰食六曰飲七曰冷八曰熱九曰來去者皆是也真心果痛不知能愈否乎若手足俱青至節不治陳無擇論心痛又分三因云十二經絡外感六淫則其氣閉塞鬱於中焦氣與邪氣發爲疼痛足厥陰心痛兩脅急引小腹連陰股相引痛手心主痛徹背心煩掌中熱咽乾目黃赤脅滿足太陰心痛腹脹滿濇濇然大便不利膈閉咽塞手太陰心痛短氣不得倚息季脅空痛遺矢無度胃滿煩心足少陰心痛煩劇面黑心懸若饑胃滿腰脊痛背俞諸經心痛心與背相引心痛徹背背痛徹心諸腑心痛難以俛仰小腹上衝卒不知人嘔吐泄瀉此皆諸經諸俞諸腑涉邪所致病屬外所因若五藏內動汩以七情則其氣痞結聚於中脘氣與血搏發爲疼痛肝心痛者如鍼錐刺其心腹蘊蘊然氣滿肺心痛者若從心間起動作痛益甚不變色腎心痛者與背相引善噦如物從後觸其心身偃僵胃心痛者腹脹滿不下食食則不消皆藏氣不平喜怒憂鬱所致屬內因飲食勞役觸忤之類使藏氣不平痞隔於中食飲留疰變亂腸胃發爲疼痛或飲啖生冷果實中寒不能消散結而爲積遇食則痛名積心痛及其藏寒生蚘致心痛者故有九種之名除風熱冷屬外所因餘皆不內外因更婦人惡血入心脾經發作疼痛尤甚於諸痛更有卒中客忤鬼擊尸疰使人心痛亦屬不內外因丹溪先生曰凡心腸之痛須分久新若知身受寒氣口食寒物而病初得之時當用温散或温利之藥病得稍久則成鬱矣鬱則蒸熱熱久必生火原病式曰若欲行温利温散寧無助火添病耶凡治此病必要先問平日起居何如假如心痛有因平日喜食熱物以致死血留於胃口作痛者用桃仁承氣湯下之脈經曰厥心痛者乃寒氣客於心包絡也諸蟲痛如心腹痛懊憹發作腫聚往來上下行痛有休作心腹中熱善渴涎出而色乍青乍白乍赤嘔吐清水者蚘咬也以手緊按而堅持之無令得移以鍼刺之久持之蟲不動乃出鍼也心痛之脈陰弦爲痛微急爲痛微大爲心痹引背痛短數爲痛濇則爲痛浮大弦長者死沉細者生且古人論諸心痛皆因六淫七情所致有寒厥熱厥有大實者有內因有外因有不內外因以成前證是以古人立論置方後之學者當以誠心切脈熱者冷之寒者温之感受風邪者散之順氣調血逐水豁痰此其要略耳

王綸明醫雜著

心腹痛

凡治心腹疼痛但是新病須問曾何飲食因何傷感有無積滯便與和中消導之藥若日數已多曾多服過辛温燥熱之藥嘔吐不納胃膈飽悶口舌乾燥大小便澁雖則有鬱熱或原有舊病因感而發綿延日久見證如前者俱用開鬱行氣降火潤燥之藥如川芎香附炒山梔黃連薑汁之類甚者再加芒硝但治其心腹久痛須於温散藥內加苦寒鹹寒之藥温治其標寒治其本也

按腹痛若脾胃虛弱飲食不化或兼腹中作痛用六君子湯若飲食過多停滯未化或兼腹痛用人參養胃湯若飲食既化脾胃受傷或兼腹中作痛用六君子加當歸若胃中有熱心腹中脘作痛嘔吐用二陳湯加黃連山梔若脾胃虛弱少食心腹作痛用六君子湯脾胃虛寒加炮薑大凡腹滿痛按之不痛爲虛痛爲實餘當臨證制宜

薛己醫按

胃脘痺

聖濟總錄云胃脘痺由寒氣陽陽熱聚胃口寒熱不調故血肉腐壞以氣逆於胃故胃脈沉細以陽氣不得上升故人迎數甚令人寒熱如瘧身皮甲錯或咳

歟或嘔膿壅血若脈洪數膿成也急排之脈遲緊瘀血也急下之否則其毒內攻腐爛腸胃矣丹溪先生云內疽者因飲食之毒七情之火相鬱而發用射干湯主之愚常以薏苡仁湯牡丹皮散太乙膏選用之亦效若吐膿血欲食少思助胃壯氣爲主而佐以前法不可專治其瘡

腸癰

小腹硬痛脈數緊者瘀血也宜下之

小腹痛脈洪數者膿成也宜托之

孫眞人云腸癰爲病小腹重强按之則痛小便如淋時時汗出復惡寒身皮甲錯腹皮急如腫甚者腹脹大轉側有水聲或繞臍生瘡或膿從臍出或從大便下蓋因七情飲食所致治法脈遲緊者未有膿也用大黃湯下之脈洪數者已有膿也用薏苡仁湯排之小腹疼痛小便不利膿壅滯也牡丹皮散主之若大便或臍間出膿者不治經云腸癰爲病不可驚驚則腸斷而死故患是者其坐臥轉側理宜徐緩時少飲薄粥及服八珍湯固其元氣靜養調理庶可保其生腸癰治法要略以薏苡仁附子敗醬散千金以大黃牡丹湯三因以薏苡湯治之千金又有灸法曲兩肘正肘頭銳骨灸百壯下膿血而安

腹癰

腹癰謂瘡生於肚腹或生於皮裏膜外屬膏粱厚味七情鬱火若漫腫堅硬肉色不變或脈遲緊未成膿也四君加芎歸白芷枳殼或托裏散腫瘍色赤或脈洪數已成膿也托裏消毒散膿成而不外潰者氣血虛也臥針而刺之腫瘍作痛者邪氣實也先用仙方活命飲隔蒜灸以殺其毒後用托裏以補其氣若初起欲其內消當助胃壯氣使根本堅固而以行經活血之藥佐之若用尅伐之劑欲其消散則腫者不能潰潰者不能斂若用疎利之藥下其膿則少壯者多爲難治老弱者立見危亡亦有貪積痼氣類此者

樓英醫學綱目

運氣胃心腹痛

運氣胃痛有二一曰邪火助心經云歲火太過甚則胃中痛脅支滿脅痛膺背肩胛兩臂內痛是也

二曰金邪傷肝經云歲金太過民病胃痛引背兩脅滿痛引少腹歲土不及風乃大行民病體重腹痛金復則胃脘暴痛引少腹者是也

運氣心痛有六凡熱風濕寒燥五氣之初皆能干心而痛蓋心爲五藏之主是也一曰熱邪干心經云少陰司天熱淫所勝病心痛少陰之復暴瘖心痛少陽之勝熱客於胃煩心心痛陽明司天燥氣下臨暴熱至甚則心痛此在泉之熱爲痛治皆以寒劑是也

二曰寒邪干心經云太陽司天寒氣下臨甚則心痛陽明司天之政四之氣寒雨降病心痛歲水太過民病上下中寒煩心躁悸心痛歲金不及炎火乃行復則寒雨暴至心痛水鬱之發民病寒客心痛太陽司天寒淫所勝病厥心痛太陽之復心胃生寒心痛痞滿少陽在泉主勝則熱反上行病鬱冒蒙昧心痛太陽之勝寒厥入胃則內生心痛皆治以熱劑是也

三曰風邪干心傷胃經云少陽司天之政終之氣風乃至心痛少陽司天風行於地心痛胃脘痛鬲不通歲水不及濕乃大行復則暴風大發鬲中痛於心腹木鬱之發民病胃脘當心而痛鬲咽不通厥陰在泉風淫所勝心痛支滿厥陰司天風淫所勝胃脘當心而痛厥陰之復厥心痛厥陰之勝胃脘當心而痛治皆以凉劑是也

四曰濕邪干心經云土鬱之發心痛脅膜太陰在泉濕淫所勝病飲積心痛太陰之勝火氣內鬱心痛熱格治皆以凉劑是也

五曰燥邪干心經云陽明之復善太息心痛痞滿治以濕劑是也

六曰寒熱干心經云少陰司天之政寒熱淩犯而爭於中寒厥入胃心痛三之氣大火行寒氣時至民病氣厥心痛治分寒熱多少調之是也

運氣腹痛有二一曰土盛攻腎而痛經云歲土太過雨濕流行腎水受邪民病腹痛清厥意不樂是也

二曰火鬱之發而痛經云火鬱之發民病腹中暴痛是也

運氣腸鳴

運氣腸鳴有二一曰土發經云土鬱之發腸鳴而爲數後是也

二曰熱勝經云少陰在泉熱淫所勝病腹中腸鳴氣上衝胃治以鹹寒是也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百二卷目錄

醫部彙考一百八十二

胷腹門三
李梴醫學入門 痞滿 心痛 腹痛 論臍
王肯堂證治準繩 痞滿 胷痹 胷痛 腹痛 腸鳴 臍中疽 脾發疽 臍毒 小腹疽
吳崐醫方考 痞 腹痛
喻昌醫門法律 比類金匱胷腹寒痛十七則
張介賓景岳全書 胷痞 結胷 胷腹滿 腹滿痛 心腹痛 論痛厥 論痛治

藝術典第二百二卷

醫部彙考一百八十二

胷腹門三

明李梴醫學入門

痞滿

痞與否卦義同精神氣血出入流行之紋理閉密而爲心下痞塞按之不痛非若脹滿外有脹急之形大要大便易而利者爲虛大便難而閉者爲實外感邪氣自肌表傳至胷膈爲半表半裏證宜和解或已經下胷滿而痛者爲結胷不痛者爲痞滿同傷寒治法

雜病食積下之太過或誤下則脾胃之陰頓亡以致胷中至高之氣乘虛下陷心肺分野其所蓄之邪又且不散宜理脾胃兼以血藥調之若用氣藥導利則氣愈降而痞愈甚久則變爲中滿鼓脹蓋痞皆自血中來但傷寒從外之內宜以苦泄雜病從內之外宜以辛散人徒知氣之不運而槩用枳梗檳榔而不知養陰調血惜哉古方食壅胷中窒塞者二陳湯探吐傷飲食胷痞者枳朮丸食後感寒以致飲食不化者二陳湯加山楂麥芽神麴虛寒不散或寬或急常喜熱物者理中湯加枳實稍久鬱成濕熱者平補枳朮丸

膈間痰火因厚味鬱成痰滯者小陷胷湯或枳梗二陳湯導痰湯火盛者二陳湯加芩連瓜蔞或黃芩利膈丸用白朮陳皮煎湯下或古萸連丸以瀉肝補脾清濕熱開痞結久病者黃連消痞丸如痰火濕熱太甚者方敢用三黃瀉心湯加減量下之虛者只宜分消上下與濕同治七情氣鬱成痞不思飲食食之不散者木香化滯湯或順氣導痰湯

有禀受中虛痞滯不運如饑如微刺者六君子湯加香附砂仁有內傷勞役濁氣犯上清氣下陷虛痞者補中益氣湯加黃連枳實芍藥便閉加大黃嘔加黃連生薑陳皮冬月加黃連丁香食已心下痞者平補枳朮丸停飲中寒者枳實理中丸瘀血結成窠囊而心下痞者用桃仁紅花香附大黃等分爲末酒調服利之或犀角地黃湯血虛挾火遇勞則發心下不快者四物二陳湯加桔梗苦蔞降之氣血俱虛者枳實消痞丸

王道消補不輕吐下故古方以芩連枳實苦泄厚朴生薑半夏辛散參朮甘苦溫補茯苓澤瀉淡滲隨病所在調之通用二陳湯爲主肥人多濕痰加蒼朮砂仁滑石倍茯苓半夏瘦人多熱鬱中焦加枳實黃連乾葛升麻稟受素實面蒼骨露者加枳殼黃連青皮厚朴素虛者加白朮山楂麥芽陳皮誤下陰虛者去茯苓半夏加參朮升麻柴胡枳實以升胃氣更合四物湯以濟陰血飲食積痞加枳殼砂仁薑汁炒黃連食後感寒加藿香草豆蔻吳萸砂仁氣痞痰痞加木香枳殼南星中虛加參朮香附砂仁瘀血合四物湯加桃仁紅花

心痛

眞心痛因內外邪犯心君一日卽死厥心痛因內外邪犯心之胞絡或他臟邪犯心之支脉謂之厥者諸痛皆少陰厥陰氣逆上衝又痛極則發厥也新者身旣受寒口又傷冷鬱遏元陽宜草豆蔻丸鷄舌香散溫散之或神保丸溫利之稍久寒鬱爲熱或因七情者始終是火此古方多以苦寒瀉火爲主辛熱行氣爲向導也

痛甚發厥有二因寒厥外因風寒客背之血脉背俞與心引痛暴發手足厥逆冷汗甲青似傷寒陰厥古薑附湯三味延胡散熱痛內因酒食積熱痰鬱發厥手足雖冷而身熱甚則煩躁吐逆額汗古元金散三味川楝散莎芎散甚者大承氣湯下之後服枳朮丸九種者悸痛蟲痛來去痛疰痛飲痛食痛風痛冷痛

熱痛夫悸痛內因七情輕則怔忡驚悸似痛非痛妙香散四七湯小草丸熱者連附六一湯重則兩目赤黃若手足青至節卽眞痛不治蟲痛濕熱生蛀攻心痛發難當痛定能食饑則嘔沫靈檳散烏梅丸化蟲丸選用

來去痛肺鬱痰火勞心則發熱者梔薑飲蠟礬丸痰積白螺殼丸痰火墜痰丸疰痛卒感惡忤尸疰素虛者腎經陰氣上攻神昏卒倒蘇合香丸痛引背傴僂者沈香降氣湯或五苓散倍桂韭汁爲丸小茴煎湯下素實者腎火上攻小承氣湯勞瘵尸疰者紫河車丹

胃脘脾痛乃內傷飲食腹脹便閉嘔吐頻頻胃脘當心而痛脾臟連心而痛局方云卽心痛蓋厥痛亦少脾胃痛多但七情四氣歸脾蟲痛攻脾入胃痰瘀脾胃所主但心痛因傷思慮脾胃痛因傷飲食胃痛善噎兩脅咽膈不利脾痛舌強喜嘔腹脹二便不通古方實痛以黃連治心山梔治胃虛痛以參歸小草治心丁砂豆蔻治胃亦未嘗混大槩傷水飲聚涎心痛如刺者溫膽湯加白朮傷食生冷遇熱食暫散者香蘇散加生薑菖蒲半夏枳殼或人參養胃湯加肉桂吳萸或木香化滯湯感應丸凡心痛數日不食無妨痛止恣食卽發胃火梔薑飲胃寒烏藥沉香湯上熱下寒者古梔附湯脾痛海石散古二胡散風冷抽刀散蟠葱散燒脾散二炒香良散濕者小胃湯或五膈寬中散腹脹厚朴溫中湯連脅痛復元通氣散痰滯便閉順氣導痰湯氣聚便閉三和散四磨湯小便閉通靈散又有心脾俱痛者手拈散

外感風冷熱皆能作痛痛則連脅腰背風因肝邪乘心痛則兩脅引小腹陰股桂枝湯加附子便閉入蜜一匙同煎或分心氣飲加厚朴枳殼蘿蔔子木香或阿魏撞氣丸冷因形寒飲冷臥涼腎氣乘心痛則心懸若饑腰痛下重泄痢五積散便閉加大黃或肺寒乘心痛則短氣季肋空痛者流氣飲子鹽煎散或脾寒乘心痛則腹脹便難者藿香正氣散挾濕者除濕湯熱因心包絡暑毒乘心痛徹背俞掌熱黃連香薷散加蓼草或單黃連丸凡諸經心痛引背多屬風冷諸臍心痛難以俯仰嘔瀉多屬熱

虛痛按之暫止素虛多勞或誤服攻耗心氣藥多者酸棗仁湯歸脾湯心無血輔者四物湯去地黃加乾薑心氣不足者六君子湯加肉桂氣血俱虛者古歸朮散挾痰火食積者二六丸

實痛素有瘀熱頑痰或因惱怒而發者梔萸丸木香檳榔煎湯下或香稜丸大實痛因怒後飲食卒痛注悶心胷高起手不可按便閉者大陷胷湯或煮黃丸下之後服古藥蒼湯以去餘邪瘀血痛飲湯水嚥下作餽乃素食熱物血死胃脘桃仁承氣湯輕者四物湯加桃仁紅花或延胡索丸失笑散婦人瘀血入心脾痛甚者五積散加三稜莪朮經行未盡血衝心痛加桃仁紅花經行已住作痛者七氣湯加當歸產後痛者桂心湯木檳湯

凡痛皆痰粘胃通用二陳湯風寒初起無汗加麻黃有汗加桂枝裏寒加草豆蔻濕加蒼朮川芎熱加山梔鍋煤童便或少加炒乾薑反佐之冷加丁香良薑氣虛加參朮血虛加當歸虛寒厥逆加薑附肝火加青黛青皮黃連痰飲加白螺殼滑石南星食積加砂仁香附瘀血加韭汁桔梗蟲痛加苦楝根頭木香檳榔蛔痛加胡椒略用蟹螯炒過痛不可忍加細茶乳香或石鹼凡痛攻走腰背發厥嘔吐諸藥不效者加蒼朮川芎山梔探吐積痰椀許乃愈寒者九痛丸卻痛散熱者散痛丸通靈散有積神保丸素虛單乾漆丸通用手拈散如意丹神聖代針散

腹痛

大腹痛多食積外邪臍腹痛多積熱痰火小腹痛多瘀血及痰與溺澀臍下卒大痛人中黑者中惡客忤不治陰證滿腹牽痛自利或嘔喜按少食綿綿不減宜溫之陽證腹中覺熱甚則大便閉澀脹滿怕按時痛時止宜下之

舊以虛痛喜按實痛怕按但寒熱邪有淺深不可太泥寒謂寒氣入經客於衛分則血澀急痛按之熱則止寒氣客於榮分則氣鬱滿痛甚怕按寒氣客腸胃募原血絡急引皮痛按之則氣血散而痛止寒氣客俠脊背俞之脈則深按之不能及也寒氣客關元則氣逆喘寒氣客厥陰脈絡則脅肋與小腹或陰股引痛寒氣客小腸募原之間則血氣凝聚成積寒氣客小腸不聚則腹痛而泄寒氣客胃則腹痛而嘔寒氣客五臟則痛死復生尋常外感冒寒證卒痛吐酸下利喜熱物熨者五積散加吳茱萸木瓜煨葱或藿香正氣散加木香少許風證桂枝湯加芍藥或胃風湯加木香暑證香薷散加生薑陳壁土紅蓼木瓜或五苓散濕證除濕湯或香蘇散加蒼朮枳殼積熱時痛時止痛處亦熱手不可近便閉喜冷宜四順清涼飲

大承氣湯三黃丸老人麻子仁丸
食積鬱結腸胃作痛得大便後則減者宜平胃散加消導藥或保和丸枳朮丸紅丸子調之或木香檳榔丸大黃備急丸神保丸如意丸下之又有食塡胃滿心胃作痛者宜大吐之
濕痰阻滯氣道必小便不利或二便俱不利宜芎朮散如清痰留滯胃腹作聲者控涎丹小胃丹
痰火病痛乃火欲升水欲降相擊腸鳴者二陳湯加芩連山梔如怒火攻衝痛無定處定時者更加香附芍藥青皮又有糞結腸鳴作痛不大便者大黃備急丸之類通之如臟寒冷結腸鳴者宜分三陰以溫藥治之
蟲痛肚大青筋往來絞痛痛定能食發作有時不比諸痛停聚不散烏梅丸化蟲丸
七情痛心胃痞悶或攻注脅背虛者七氣湯木香勻氣散木香化滯湯實者三和散分心氣飲
中虛脾弱隱隱冷痛全不思食者人參養胃湯加肉桂吳萸木香素氣虛挾痰者六君子湯加蒼朮
瘀血痛有常處或憂思逆鬱跌撲傷瘀或婦人經來產後惡瘀不盡而凝四物湯去地黃加桃仁大黃紅花又血虛鬱火燥結阻氣不運而痛者四物湯倍芍藥加炒乾薑凡痛多屬血澀通用芍藥甘草湯爲主惡寒而痛屬脾腎加肉桂惡熱而痛屬脾胃加黃芩脈緩傷水加桂枝脈澀傷血加當歸脈遲傷寒加乾薑臍下痛加熟地惟氣分諸痛不宜芍藥酸收宜木香檳榔青皮陳皮香附辛散之刼痛宜手拈散
凡痛虛宜辛溫消散燒脾散蟠葱散丁香脾積丸果係沈寒痼冷小腹下痛者酒煑當歸丸經曰結者散之是也實宜辛寒推蕩經曰通因通用痛隨利減是也方與積熱痛同
腹屬坤久病宜和脾胃如脈弦急木尅土也小建中湯加當歸取芍藥味酸於土中瀉木爲君如脈沈細水侮土也理中湯取乾薑辛熱於土中瀉水爲君如脈緩腹痛自利米穀不化者平胃散加肉桂吳萸取蒼朮苦辛瀉濕土爲君胃氣下陷者加升麻柴胡蒼朮以升之有積者加山楂麥芽枳實黃連木香以消之上熱下寒升降失常腹痛嘔吐者黃連湯主之
疝痛引睪丸痢痛拘急積聚痛有形可按腸癰痛臍生瘡小便如淋脈芤沙證痛甚嘔吐脈沈
腹中自覺窄狹神昏性躁乃濕痰濁氣攻於心脾以致升降失常肥人多濕痰宜二陳湯加蒼朮燥濕香附行氣瘦人多火宜二陳湯加黃連清熱蒼朮流濕心神不斂者俱加遠志麥門冬酸棗仁血氣虛者六君子湯加芎歸養血流濕自然平復

論臍

夫人之臍也受生之初父精母血相受凝結胞胎混沌從太極未分之時一氣分得二穴穴中始產四穴外通二腎內長赤白二脈四穴之中分爲表裏在母腹中母呼兒呼母吸兒吸是一身臍帶如花果在枝而通帶也一月一週眞氣漸足既產胎衣未脫臍帶且緩斷倘臍門未閉感風傷寒卽損嬰兒眞氣遂以艾火熏蒸數次則眞氣無患矣三七臍門自閉惟覺口深於是陽盛年長汨於五味溺於五音探於五氣外耗精神內傷生冷而眞氣不得條暢故用長生延壽丹蒸臍固帶如水灌土培草木根本自壯茂也人常依法熏蒸則榮衛調和安魂定魄寒暑不侵身體可健其中有神妙也夫肺爲五臟之華蓋聲音所從生者皮毛賴之而滋潤腎水由之而生養腠理不密外感內傷乘之令人咳嗽外感發散內傷滋潤又有鬱結則當解之或傷辛燥之藥或未發散而遂使鬱遏之劑則氣不散而滯於肺中多生粘痰而作喘急咳嗽或傷房勞飲食致使吐血乍寒乍熱耳目昏昏身體倦怠拘急胃滿煩悶飲食少思精神怯弱等疾作矣醫者可急用保眞丸化痰丸等劑療之倘用之無效必須長生延壽丹依法熏臍

王肯堂證治準繩

痞論

或問痞屬何臟邪屬何氣曰嘗考之內經有陽明之復心痛痞滿者註以清甚於內熱鬱於外太陽之復心胃生寒心痛痞悶者註以心氣內燔備化之紀痞病卑監之紀留滿痞塞太陰所至爲積飲否隔註皆以陰勝陽也由是觀之則是受病之臟者心與脾也因而怫鬱壅塞不通爲痞者火與濕也其論致病所由之邪則不可一言而盡天氣之六淫外感人氣之五邪相乘陰陽之偏負飲食七情之過節皆足以亂其火土之氣蓋心陽火也主血脾陰土也主濕凡傷其陽則火怫鬱而血凝傷其陰則土壅塞而濕聚二臟之病相去不離方寸間至於陰陽之分施治之法便不同也何則金匱要略水病篇謂心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作者二條同是語也但一條之上有氣分二字用桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯治

爲水寒之邪閉結氣海之陽不布衆衛不行一條用枳朮湯爲中焦水停土壅故也又胃痺篇云胃痺心下痞留氣結在胸胸滿脅下逆搶心枳實薤白桂枝湯主之人參湯亦主之一證列二方原其意蓋是留氣結在胃爲重者便須補中又心中痞諸逆心懸痛桂枝生薑枳實湯主之傷寒論中有謂病人手足厥冷脈乍緊邪結在胸中者當吐之脈浮大心下反鞕有熱屬藏者下之茲二者爲不汗下而痞滿從其邪有高下故吐下之不同若經汗下而心下痞則以諸瀉心湯大抵痞與結胸同是滿鞕但結胸則涌治豈非仲景治痞亦在心脾二臟從火土之陰陽者歟各逸其宜而治高者越之下者竭之上氣不足推而揚之下氣不足溫而行之高者抑之下者舉之鬱者開之結者解之寒者熱者寒之虛則補實則瀉隨機應變以爲治

東垣云夫痞者心下滿而不痛是也太陰者濕也主塞塞乃土來心下爲痞滿也傷寒下太早亦爲痞乃爲寒傷其榮榮者血也心主血邪入於本故爲心下痞悶仲景立瀉心湯數方皆用黃連以瀉心下之土邪其效如響應桴故活人書云審知是痞先用桔梗枳殼湯非以此專治痞也蓋因先錯下必成痞證是邪氣將陷而欲過胃中故先用載散其邪氣使不至於痞先之一字早用之義也若已成痞而用之則失之晚矣不惟不能消痞而反損胃中之正氣則當以仲景痞藥治之經云察其邪氣所在而調治之正謂此也非止傷寒如此至於酒積雜病下之太過亦作痞傷蓋下多亡陰亡陰者謂脾胃水穀之陰亡也故胃中之氣因虛下陷於心之分野則致心下痞宜升胃氣以血藥兼之若全用氣藥導之則其痞益甚甚而復下之氣愈下降必變爲中滿膨脹皆非其治也又有虛實之殊如實痞大便閉者厚朴枳實湯主之虛痞大便利者白芍陳皮湯主之如飲食所傷痞悶者當消導之去其胃中窒塞上逆兀兀欲吐者則吐之所謂在上者因而越之也

海藏云治痞獨益中州脾土以血藥治之其法無以加矣

傷寒痞者從血中來雜病痞者亦從血中來雖俱爲血證然傷寒之證從外至內從有形至無形故無形氣證以苦泄之有形血證以辛甘散之中滿者勿食甘不滿者復當食也中滿者腹脹也如自覺滿而外無腹脹之形即非中滿乃不滿也不滿者病也當以甘治之可也

總宜用黃芪補中湯爲主加柴胡升麻緣天地不交爲痞今以猪苓澤瀉從九天之上而降柴胡升麻從九地之下而升則可以轉否而爲泰矣

無形氣證以苦泄之枳實黃連之類大消痞丸黃連消痞丸失笑丸

有形血證以辛甘散之枳實理中丸人參湯半夏瀉心湯之類傷寒五六日不論已下未下心下痞滿瀉心湯小柴胡湯加枳桔主之

少陽面赤不利心下痞瀉心湯加減易老單用瀉心湯用錢氏法而隨證加減煩者加山梔蹙加香豉嘔加半夏滿加枳實厚朴腹痛加芍藥脈遲加附子下焦寒加乾薑大便硬加大黃如用薤附先煎令熟使熱不僭後加黃連同用痞而頭目不清者以上清散主之胃中不利者宜利其表

飲食傷脾痞悶輕者大消痞丸枳朮丸回金丸之類甚者微下之吐之下之者檳榔丸爽黃丸吐之者二陳湯及瓜蒂散探吐之若酒積雜病下之太過亦作痞滿宜升提胃氣以血藥兼之

傷於濕者四肢必困重小便短少宜平胃和五苓以滲之

鬱者越鞠丸

熱則煩渴溺赤以苦寒泄之大消痞丸煎湯用黃連及葛根升麻發之便結卽利之

寒則中滿以辛甘散之枳實理中丸揭脾湯加丁香或丁沈透膈湯

因七氣所傷結滯成疾痞塞滿悶宜四七湯或導痰湯加木香半錢或下來復丹

脾胃弱而轉運不調爲痞宜四君子湯若傷於勞倦者宜補中益氣湯其大病後元氣未復而痞者亦宜之

脈之右關多弦弦而遲者必心下堅此肝木尅脾土鬱結涎閉於臟腑氣不舒則痞木香順氣湯

胃痹

心下滿而不痛爲痞心下滿而痛爲胃痹

胃痛（心痛條有腸痛痞條有胃痹宜與此條參看）

經云南風生於夏病在心俞在胃脘又云仲夏善病胃脘此則胃連脘痛屬心若肝虛則胃痛引背脊肝實則胃痛不得轉側喜太息肝著則常欲蹈壓其胃經云春脈如弦其氣不實而微此謂不及令人胃痛

引背下則兩脅脹滿此肝虛而其脈證見於春如此也宜補肝湯金匱云肝中寒者兩臂不舉舌本燥喜太息胷中痛不得轉側食則吐而出汗也肝著其人常欲踏其胷上先未苦時但欲飲熱旋覆花湯主之素問曰陽明所謂胷痛短氣者水氣在藏腑也水者陰氣也陰氣在中故胷痛少氣也輕者五苓散重者用張子和法取之脈經云寸口脈沈胷中引脅痛胷中有水氣宜澤漆湯及刺巨闕瀉之

腹痛

或問腹痛何由而生曰邪正相搏是以作痛夫經脈者乃天真流行出入藏腑之道路也所以水穀之精悍爲榮衛行於脈之內外而統大其用是故行六氣運五行調和五藏灑陳六腑法四時升降浮沈之氣以生長化收藏其正經之別脈絡在內者分守藏腑部位各司其屬輿之出納氣血凡是榮衛之妙用者皆天真也故經曰血氣人之神不可不謹養養之則邪弗能傷矣失之則榮氣散解而諸邪皆得從其藏腑所虛之舍而入客焉入客則氣停液聚爲積爲痰血凝不行或瘀或蓄脈絡皆滿邪正相搏眞氣迫促故作痛也脾胃內舍心肺心肺內舍胷膺兩脅肝內舍肢脅小腹腎內舍小腹腰脊大小腸衝任皆在小腹此藏腑所通之部位也曰舉痛論敘腹痛一十四條屬熱者止一條餘皆屬寒後方論因盡作風冷客之攻擊而作痛今子乃云諸邪何故曰方論不會通諸篇之旨因不解篇末復謂百病皆生於氣列九氣之狀其間難不言痛必亦爲或有作痛者故也不然何乃出於諸痛篇之末耶試以靈樞百病始生篇觀之其旨則顯然矣所論邪有三部風雨傷於上清濕傷於下傷於上者病從外入內從上下也次第傳入舍於輸之時六經不通或著絡脈或著經脈或著輸脈或著伏衝之脈或著腸胃之膜原皆成積而痛傷於下者病起於足故積之始生得寒乃生厥乃成積厥氣生足悗悗生脛寒脛寒則血脈凝濇血脈凝濇則寒氣上入於腸胃入於腸胃則膜脹腸外之汁沫迫聚不得散日以成積傷於藏者病起於陰故卒然多飲食則腸滿起居不節用力過度則絡脈傷陽絡傷則血外溢血外溢則衄血陰絡傷則血內溢血內溢則後血腸胃之絡傷則血溢腸外腸外有寒汁沫與血相搏則幷合凝聚不得散而積成矣卒然外中於寒若內傷於憂愁則氣上逆氣上逆則六輸不通溫氣不行凝結蘊裹而不散津液滲著而不去而積皆成矣自今觀之此篇所謂成積作痛未至於瘕瘕結塊之積乃汁沫聚而不散之積也與舉痛論所謂血氣稽留不得行而成積同也豈七情敘於篇末者之異於作痛者乎然推原二篇之意百病始生篇在乎三部之邪會而爲痛故相連而爲言舉痛論在乎其邪各自爲病所以獨引寒淫一氣者亦爲寒邪之能閉塞陽氣最甚故也用是爲例其他則可自此而推之矣至於七情之氣逆卽傷其榮衛而不行榮衛不行則液聚血凝及飲食用力過度者亦然皆不待與寒相會始成積作痛也且如諸篇有言胃氣實而血虛其脈奕散者當病食痹謂食則痛也有言歲土太過濕淫所勝大腹小腹痛者有言衝脈之病其氣盛於大腸而著於胷胃之原在臍下故環臍而痛有言脾傳之腎少腹窘熱而痛有言肝熱病者腹痛身熱有言腎虛者亦大腹小腹痛有言厥陰之厥小腹腫脹太陰厥逆心痛引背有言六氣司上下之勝之復等邪各隨其所入之部分而痛豈非諸邪各有自經入而作痛初無與寒相關者耶難經云臍上牢若痛心內證也臍下牢若痛腎內證也臍右牢若痛肺內證也脾左牢若痛肝內證也方論之未備者不獨此而已至若厥心痛五邪相乘者亦不能推及四藏與之無異豈五五二十五陽之相移獨心而已哉更於五藏之痛不干涉於睪丸止在腹中痛者猶未明也止知諸脈急者爲痛未知脈滑微有熱者亦病痛也且河間嘗解急脈之意急脈固是寒之象然寒脈當短小而遲非急數而洪也由緊脈主痛急而爲痛甚所以痛而脈有緊急者脈爲心之所養也凡六氣爲病則心神不寧而緊急不得舒緩故脈亦從之而見也欲知何氣之爲病者適其緊急相乘之脈而可知也如緊急洪數則爲熱痛之類也此論可謂善推脈理病情者也曰諸邪之作痛則聞命矣然其邪之博也奈何以治將亦有所守要約之方乎曰自博而求約何患約之無其道不自博而從事於約約必失其道失其道寧無實實虛虛誅伐無過之患乎然其道要在於審經脈氣血之虛實辨六淫五邪之有無兼氣於是擇至眞要諸治法中併五藏者之所當施而後還其經分祛邪補正適所宜之藥配君臣佐使以爲方夫如是而約之則猶約囊也無不切中其病矣

腸鳴

內經腸鳴有五一曰脾虛經云脾虛則腹滿腸鳴飧泄食不化取其經太陰陽明少陰血者是也
二曰中氣不足經云中氣不足腸爲之苦鳴補足外踝下留之五分申脈穴也
三曰邪在大腸經云腸中雷鳴氣上衝胷邪在大腸刺肓之原巨虛上廉三里是也
四曰土鬱經云土鬱之發腸鳴而爲數後是也
五曰熱勝經云少陰在泉熱淫所勝病腹中腸鳴氣上衝胷治以鹹寒是也

膻中疽

或問心窩上兩乳間生疽何如曰此膻中發疽也蓋膻中爲氣之海氣所居焉能分布陰陽若臟腑陰陽不和七情不平則發此證宜活命飲加紫蘇薄荷葉汗之奪命丹勝金丹紫金丹選用稍遲則潰爛惡證多者難治

脾發疽

或問心窩下旁生疽何如曰此名脾發疽毒由多食煎煿醉飽入房以致毒聚脾經而作活命飲加桔梗升麻紫金丹勝金丹汗之壯實者八陣散下之老弱者十全大補湯稍遲則潰傷脾膜膿如蟹沫者死服藥而嘔飲食不進者死

或問人病胃前肋上堅硬如石寒熱大作飲食不進徧身疼痛煩躁不寧胃脘膜脹何如曰凡在胃及胃之側或是肩前下延及脅形長如蛤皆爲馬刀瘡屬手少陽三焦經足陽明胃經手厥陰心包絡鬱火怒氣積痰所致宜灸宜汗攻補兼施則消宜服勝金丹烏金散壯實者一粒金丹下之活命飲加柴胡過時則潰爛徹骨久而不斂者死未潰而譫語神昏泄利嘔吐者不治

臍癰

或問當臍生癰何如曰此即臍癰也由心經積熱流於大小腸二經所致宜何首烏散活命飲加升麻及紫金丹三生散選用壯實者一粒金丹下之
按臍爲神闕穴禁針之所早消散之免使見膿爲上

小腹疽

鬼遺云衝疽發小腹疼痛而振寒熱四日悄悄五日變色可刺不刺及導引出膿毒不治五十餘日死
或問臍下發疽何如曰此即小腹癰臍下一寸五分爲氣海二寸爲丹田三寸爲關元皆屬任脈由七情不和所致急服活命飲紫金丹奪命丹壯實者一粒金丹八陣散下之老弱者黃芪木香散內補十宣散十全大補湯選用若潰而低陷膿水清稀或潰爛久不斂者死
或問有人患疽於小腹之左數月堅塊如石寒熱間作飲食減少漸至尫羸何如曰是名緩疽屬足太陰經積熱所致由醫不得法邪正相持耳宜服紫金丹活命飲間服十全大補湯

吳崐醫方考

痞

叙曰痞虛中之實也許學士云邪之所湊其氣必虛留而不去其病則實故治痞者一補一消考方二首表昔人之法爾
心下虛痞惡食懶倦右關脈弦者枳殼消痞丸主之
夫痞與否同不通泰也易曰天地不交而成否故肺氣不降脾氣不運升降不通而名痞也脾爲邪氣乘之不足以勝穀故令惡食脾者卑臟役氣於四肢而後肢體强健脾病則不能致氣於肢體故令懶倦弦肝脈也木來乘土故令右關脈弦是方也枳實黃連厚朴之苦可以下氣半夏麴乾生薑之辛可以行滯人參甘草白朮茯苓之甘可以健脾麥蘗善消則可以推陳而致新矣是疾也功在慎口經曰陰之五宮傷在五味奈何不慎乎
憂氣鬱結腹皮裏微痛心下痞滿不思飲食木香化滯湯主之此即六朝之醫所謂衰腸今人謂之氣痞也經曰脾主行氣於三陰三陰之脈皆行腹裏今憂氣鬱結營衛之行澀故令腹皮裏微痛心下痞滿者升降之道乖也不思飲食者憂氣傷脾也辛香可以化氣故用木香豆蔻生薑陳皮半夏之辈以主之升降者交泰之道也故用柴胡之辛以升之枳實之苦以降之營衛澀而後腹皮痛故用歸尾紅花以和營炙甘草以和衛

腹痛

叙曰腹中者中氣之所居也一有疾痛則壞中氣百骸十二官胡然受氣而榮養乎故考名方以治腹痛
腹痛脈遲者二薑丸主之夫腹痛之由有數種今曰脈遲則知寒矣故用乾薑良薑之辛熱者以主之辛可以破滯熱可以散寒不滯不寒痛斯失矣
丁香止痛散亦治寒氣腹痛之方也蓋寒氣入經澀而稽遲故令腹痛經曰得炅則痛立止炅熱也故用丁香茴香良薑之辛熱者以主之而復佐以甘草者和中氣於痛損之餘也

諸腹痛連於脅膈手足冷脈來伏匿者宜鹽湯探吐法蓋腹痛連於脅膈多是飲食痰飲填塞至陰抑遏肝膽之氣肝者將軍之官贍者少陽上升之令抑之不得敷暢兩實相搏令人自痛所以痛連脅膈者少陽之經行於兩脅厥陰肝脈貫於膈也手足冷者少陽之氣不敷也脈來伏者爲痛甚陽氣閉藏之象也經曰木鬱則達之故用吐法鹹能軟堅故用燒鹽客寒犯胃胃脘當心而痛脈來沉遲者扶陽助胃湯主之蓋客寒犯胃多是飲食寒冷或因食後呼吸冷氣所致脈來沉者爲裏遲者爲寒是方也附子乾薑官桂吳茱萸草豆蔻益智仁辛熱之品也用之所以扶陽邪之所湊其氣必虛故用人參白朮甘草甘溫之品以助胃用芍藥者取其味酸能瀉土中之木用陳皮者取其辛香能利膹中之氣

七氣相干陰陽不得升降攻衝作痛者三因七氣湯主之夫三因者內因外因不內外因也七氣者寒熱怒恚喜憂愁也以三因而動七氣升降有妨則攻衝而痛是方也紫蘇之辛芳可使散七氣厚朴之苦溫可使下七氣半夏之辛溫茯苓之淡滲可使平水穀相干之七氣

腹中寒熱不調而大痛者桂枝加大黃湯主之夫寒熱不調而大痛者先食熱物後食寒物二者不調而令大痛是方也桂枝能散眞寒大黃能瀉實熱芍藥能健脾而和肝甘草能調中而益氣生薑可使益胃大棗可使和脾

婦人氣血攻刺疼痛連於脅膈者延胡酒主之蓋延胡索味苦辛苦能降氣辛能散血淬之以酒則能達乎經脈矣

脅膈常時疼痛得熱則減得寒則增者韭汁酒主之蓋此證死血也故用韭汁消瘀清酒行滯

痰涎蓄積胃脘胷膹腹作痛者小胃丹主之夫小消也小胃者消去胃中之痰物也甘遂芫花大戟能下十二經之溫痰大黃佐之下行黃藥制其辛烈是方也大毒之劑攻殺擊刺之兵也善用則治弗善用之則亂故醫者人之司命實實虛虛弗可弗察也

腹中乾痛有時者蟲痛也雄橫丸主之夫乾痛者不吐不瀉而但痛也有時者淡食而饑則痛厚味而飽則否也浮粟經曰腹疾乾痛有時當爲蟲此之謂也是方也雄黃白礬檳榔皆殺蟲之良劑故主之蟲盛者以吐下驅蟲之劑加之視人虛實可耳

醫門法律　臣　鑒　昌　著

比類金匱胷腹寒痛十七則

寒痛多見於身之前以身之背爲陽身之前爲陰也而身之前又多見於腹以胷爲陰之陽腹爲陰之陰也仲景論心胷之痛屬寒證者十之二三論腰腹之痛屬寒證者十之七八亦可煥然明矣因茲舉內經金匱之奧相與繹之

經曰眞心痛者寒邪傷其君也手足青至節甚則旦發夕死夕發旦死夫心爲神明之臟重重包裹百骸衛護千邪萬惡莫之敢干必自撤其藩神明不守寒邪乃得傷犯其用勝寒峻猛之劑僭逼在所不免昌嘗思之必大劑甘草人參中少加薑附豆蔻以溫之俾邪去而藥亦不存乃足貴耳若無大力者監之其敢以暴易暴乎

鍼經云足太陰之脈其支者復從胃別上注心中是動則病舌根脹食則嘔胃脘痛腹脹善噫心中急痛此以脾痛四迄之邪連及於心其勢分而差緩不若眞心痛之卒死矣即太陰推之足少陰厥陰客邪皆可犯心惟陽虛陰厥斯舟中皆敵國矣

厥心痛乃中寒發厥而心痛寒逆心包去眞心痛一間耳手足逆而遍身冷汗出便溺清利不渴氣微力弱亦主旦發夕死急以朮附湯溫之

諸經心痛心與背相引心痛徹背背痛徹心宜灸溫其經諸腑心痛難以俛仰小腹上衝卒不知人嘔吐泄瀉其勢甚銳宜急溫其腑至臟邪乘心而痛不可救藥者多宜急溫其心包并主邪別脈經絡臟腑淺深歷然乃可圖功

心痛者脈必伏以心主脈不勝其痛脈自伏也不可因其脈伏神亂駭爲心虛而用地黃白朮補之蓋邪得溫藥則散加泥藥即不散不可不慎之也溫散之後可陰陽平補之

金匱論胷痹心痛之脈當取太過不及陽微陰弦以太過之陰乘不及之陽即胷痹心痛然總因陽虛故陰得乘之陽本親上陽虛知邪中上焦設陰脈不弦則陽雖虛而陰不上干惟陰脈弦故邪氣厥逆而上此與濁氣在上則生膜脹同一病源也胷痹有微甚不同微者但通其上焦不足之陽甚者少驅其下焦厥逆之陰通胷中之陽以薤白白酒或苦蘆半夏桂枝枳實厚朴乾薑白朮人參甘草茯苓杏仁橘皮擇用對病三四味即成一方不但苦寒不入即清涼盡屛蓋以陽通陽陰分之藥所以不得預也甚者則用

附子烏頭蜀椒大辛熱以驅下焦之陰而復上焦之陽也

金匱又錯出一證云病人胷中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦憒憒然無奈者生薑半夏湯主之此即胷痺一門之證故用方亦與胷痺無別恐編者之差誤今併論於此蓋陽受氣於胷陰乘陽位阻其陽氣布息呼吸往來之道若喘若嘔若噦實又不然但覺憒亂無可奈何故用半夏生薑之辛溫以燥飲散寒患斯愈也緣陰氣上逆必與胷中之飲結爲一家兩解其邪則陽得以布氣得以調而胷際始曠也其用橘皮生薑及加竹茹人參皆此例也

發明金匱心痛徹背背痛徹心用烏頭赤石脂丸夫心痛徹背背痛徹心乃陰寒之氣厥逆而上干者橫格於胷背經脈之間牽連痛楚亂其氣血紊其疆界此而用氣分諸藥則益其痛勢必危殆仲景用蜀椒烏頭一派辛粹以溫散其陰邪然恐胷背既亂之氣難安而即於溫藥除中取用乾薑之泥赤石脂之澀以填塞厥氣所橫衝之新隧俾胷之氣自行於胷背之氣自行於背各不相犯其患乃除此煉石補天之精義也人知有溫氣補氣行氣散氣諸法亦知有堵塞邪氣攻衝之實令胷背陰陽二氣並行不悖者哉

發明金匱胷痺緩急用薤白附子散夫胷中與太空相似天日照臨之所而膿中之宗氣又賴以苞舉一身之氣者也今胷中之陽痺而不舒其經脈所過非緩即急失其常度總因陽氣不運故致然也用薤白仁以舒其經脈用附子以復其胷中之陽則宗氣大轉陰濁不留胷際曠若太空所謂化日舒長曾何緩急之有哉

發明金匱九痛丸夫仲景於胷痺證後附九痛丸治九種心痛以其久著之邪不同暴病故藥則加峻而湯改爲丸取緩攻不取急蕩也九種心痛乃久客之劇證即腎水乘心脚氣攻心之別名也痛久血瘀陰邪團結溫散藥中加生狼牙巴豆吳茱萸驅之使從陰竅而出以其邪據胷中結成堅壘非搗其巢邪終不去耳合三方以觀仲景用意之微而腎中之眞陽有之則生無之則死其所重不可識耶

金匱云趺陽脈微弦法當腹滿不滿者必便難兩胠疼痛此虛寒從下上也當以溫藥服之夫趺陽脾胃之脈而見微弦爲厥陰肝木所侵侮其陰氣橫聚於腹法當脹滿有加設其不滿陰邪必轉攻而上決無輕散之理蓋陰邪既聚不溫必不散陰邪不散其陰竅必不通故其便必難勢必逆攻兩胠而致疼痛較腹滿更進一步也虛寒之氣從下而上由腹而胠繞見一斑亟以溫藥服之俾陰氣仍從陰竅走散而不至上攻則善矣仲景所謂此虛寒自下上也當以溫藥服之苞舉陰病證治了無剩義蓋虛寒從下上正地氣加天之始用溫則上者下聚者散直捷痛快一言而終故卒病論難亡其可意會者未嘗不宛在也

金匱云病者腹滿按之不痛爲虛

腹滿時減復如故此爲寒當與溫藥

中寒其人下利以裏虛也此裏虛下利即當溫補臟氣防其竭絕

病者痿黃躁而不渴胷中寒實而利不止者死蓋痿黃乃中州土敗之象躁而不渴乃陰盛陽微之象胷中寒實乃堅冰凝沍之象加以下利不止此時即極力溫之無能濟矣蓋堅在胷而瘕在腹堅處拒藥不納勢必轉趨其瘕而奔迫無度徒促其臟氣之絕耳執謂虛寒下利可不乘其胷中陽氣未澌陰寒未實早爲溫之也乎

發明金匱腹中寒氣雷鳴切痛胷脅逆滿嘔吐用附子粳米湯夫腹中陰寒奔迫上攻胷痺以及於胃而增嘔逆項之胃氣空虛邪無所隔徹入陽位則殆矣是其除患之機所重全在胃氣乘其邪初犯胃尚自能食而用附子粳米之法溫飽其胃胃氣溫飽則土厚而邪難上越胷脅逆滿之濁陰得溫無敢菌戀必還從下竅而出曠然無餘此持危扶顛之手眼也

發明金匱腹痛脈弦而緊則衝氣不行即惡寒緊則不欲食邪正相搏即爲寒疝寒疝繞腹痛若發則自汗出手足厥冷其脈沉弦者用大烏頭煎由內經心疝之名推之凡腹中結痛之處皆可言疝不獨辜丸間爲疝矣然寒疝繞腹痛其脈陽弦陰緊陽弦故衝氣不行而惡寒陰緊故胃中寒盛不殺穀邪即胃中之陰邪正即胃中之陽氣也論胃中水穀之精氣與水穀之悍氣皆正氣也今寒入榮中與衛相搏則榮即爲邪衛即爲正矣繞臍腹痛自汗出手足厥冷陽微陰盛其候危矣故用烏頭之溫合蜜之甘入胃以建其中而緩其勢俾衛中陽旺榮中之邪自不能留亦不使虛寒自下而上之微旨也

景岳全書　臣張介賓著

胷痞

痞者痞塞不開之謂滿者脹滿不行之謂蓋滿則近

脹而痞則不必脹也所以痞滿一證大有疑辨則在虛實二字凡有物有滯而痞者實痞也無物無滯而痞者虛痞也有脹有痛而滿者實滿也無脹無痛而滿者虛滿也實痞實滿者可散可消虛痞虛滿者非大加溫補不可此而錯用多致誤人

虛寒之痞凡過於憂思或過於勞倦或饑飽失時或病後脾氣未醒或脾胃素弱之人而妄用寒凉尅伐之劑以致重傷脾氣者皆能有之其證則無脹無悶但不知饑亦不欲食問其胃腹脹否則曰亦覺有些而又曰不甚脹蓋本非脹也止因不欲食而自疑爲脹耳察其脈則緩若無神或弦多胃少察其形則色平氣怯是皆脾虛不運而痞塞不開也此證極多不得因其不食妄用消耗將至胃氣日損則變證百出矣治宜溫補但使脾腎氣強則痞滿開而飲食自進元氣自復矣又凡脾胃虛者多兼寒證何也蓋脾胃屬土土虛者多因無火土寒則氣化無權故多痞滿此卽寒生於中也亦有爲生冷外寒所侵而致中寒者然胃強則寒不能侮而寒能勝者總由脾氣之弱凡脾胃微虛而若滿非滿食少不化者宜四君子湯或異功散若心脾氣虛或氣有不順者歸脾湯或治中湯若三陰氣血俱虛治節不行而不便於溫者宜五福飲若中焦不煖或噯腐吞酸而痞滿者非溫補不可宜溫胃飲五君子煎或理中湯聖术煎參薑飲若脾腎兼寒命門不煖則中焦不化或便溏或胃腹喜煖畏寒或上下腹俱膨膨而小水黃澀者宜理陰煎甚者宜六味回陽飲此二藥最妙人罕知也

一飲食偶傷致爲痞滿者當察其食之有無而治之凡食滯未消而作痞滿或兼疼痛者宜大和中飲或和胃飲加減治之或枳朮丸亦可甚者神香散若食滯既消脾氣受傷不能運行而虛痞者當專扶脾氣微者異功散養中煎甚者五福飲聖朮煎若命門母氣不足者治宜如前若偶食寒凉傷胃痞滿而不可補者宜和胃飲加山楂麥芽之類或厚朴溫中湯

一實滯之痞當察其所因而治之若溫勝氣滯而痞者宜平胃散或良方厚朴湯或五苓散若寒滯脾胃爲痛痞而中氣不虛者宜厚朴溫中湯若脾寒氣滯而痞者和胃飲若怒氣暴傷肝氣未平而痞者解肝煎若大便氣祕上下不通而痞者河間厚朴湯若胃口停痰而痞者二陳湯或橘皮半夏湯胃寒氣滯停痰痞而兼嘔者加減二陳湯膠痰不開壅滯胃口者藥不易化須先用吐法而後隨證治之若大便祕結不通而痞滿不開者宜微利之

一外邪之痞凡寒邪感人者必自表入裏若邪淺在經未入於腑則飲食如稍深則傳入胃次漸犯胃口而不能飲食是亦痞之類也治此者但解外邪而或散或消或溫或補邪去則胃口自和痞滿自去此於傷寒門求法治之又傷寒家曰陽證下之早者乃爲結胸陰證下之早者因成痞氣此以邪在表而攻其裏邪在陽而攻其陰不當下而妄下之以致邪氣乘虛陷結心下是誤治之害最危者實者硬滿而痛是爲結胸虛者滿而不痛是爲痞氣宜審別治之

結胸

愚按結胸一證觀傷寒論所載凡太陽表邪未解而誤下者成結胸少陽證亦然太陽少陽併病者亦然此不當下而誤下之以致臟氣空虛外邪乘虛內陷結於胸膈之間是皆因下而結者也又曰傷寒六七日結胸熱實脈沉而緊心下痛按之石鞕者此不因下而邪實漸深結聚於胸中者也然則結胸一證有因誤下而成者有不因下而由於本病者觀近代傷寒諸書云未經下者非結胸也豈不謬哉

一結胸證獨仲景所言惟太陽少陽二經誤下者有之而陽明一經獨無言及者何也蓋凡病入陽明胃腑已實故可下之而無害也然又曰陽明病心下鞕滿者不可攻之攻之利不止者死此豈非陽明在經表證邪未入腑者亦爲不可下乎不惟三陽爲然卽三陰之證其有發熱惡寒表邪未解者切不可下最當慎也

一結胸證治之辨凡心腹脹滿鞕痛而手不可近者方是結胸若但滿不痛者此爲痞滿非結胸也凡痞滿之證乃表邪傳至胃中未入於腑此其將入未入猶兼乎表是卽半表半裏之證只宜以小柴胡之屬加枳殼之類治之或以本方對小陷胸湯亦妙今余新方製有柴陳煎及一柴胡飲之類皆可擇而用之也至於結胸之治則仲景俱用大陷胸湯主之然以予之見則惟傷寒本病其有不因誤下而實邪傳裏心下鞕滿痛連小腹手不可近或燥渴譫妄大便鞕脈來沉實有力者此皆大陷胸湯所正宜也其於太陽少陽表邪未解因下早而致結胸者此其表邪猶在若再用大陷胸湯是既因誤下而復下之此則余所未敢不若以痞滿門諸法酌其輕重而從乎雙解以緩治之或外用蓄法以解散胸中實邪此余之屢

用獲效而最穩最捷者也

胃腹滿

凡邪氣自表傳裏必先入胃膈以次漸從脅肋而後入胃邪氣入胃乃爲入腑是以胃滿者猶屬表證脅滿則半表半裏也大抵胃脘滿者以邪氣初入於裏氣營不行所以生滿尚未停聚爲實故但從和解以小柴胡之屬則可愈矣若果實邪在上留滯不能散者乃可吐之華元化曰四日在胃吐之則愈是因邪已收聚而未散漫者乃可吐也在仲景用梔子豉湯或瓜蒂散之屬梔子豉湯可吐客熱瓜蒂散可吐實痰其或一時藥有不便當用吐法以代之或卽以和解之藥探而吐之無不可也

腹滿痛

一腹滿證按華元化曰傷寒一日在皮二日在膚三日在肌四日在胃五日在腹六日在胃入胃卽爲入腑入腑卽在腹也若腹雖滿而未甚者猶是未全入腑不可攻也然腹滿之證有虛實也有寒熱也不可一概皆以實論觀金匱要略曰腹滿不減減不足言當下之是不減者爲實滿也又曰腹滿時減復如故此虛寒從下上也當以溫藥和之是或進或退時或減而時復如故者本非結聚實邪此虛滿也大抵腹滿之證本屬太陰若是陽邪則必咽乾煩熱脈實有力若是陰邪則必腹滿吐食畏寒自利脈息無神可以辨之實熱者可清可攻虛寒者宜溫宜補也

傷寒腹痛有四若繞臍鞕痛大便結實煩渴者皆屬燥屎痛急用寒藥下之因食積而痛者治亦同若小腹鞕滿小水自利大便黑身目黃者屬蓄血痛亦用寒劑加行血藥下壺黑物自愈

凡傷寒腹中痛甚但將凉水一盞與病者飲而試之若飲水後痛稍可者屬熱痛當用凉藥清之以上三條皆實熱痛也必脈來沉實有力方是此證若微弱者仍當詳審從緩治之

若飲水愈加作痛此爲寒痛當用温藥和之和之不已而或四肢厥冷嘔吐瀉利者急用熱藥救之但須詳脈之有力無力方爲良法

心腹痛

凡病心腹痛者有上中下三焦之別上焦者痛在膈上此卽胃脘痛也內經曰胃脘當心而痛者卽此時人以此爲心痛不知心不可痛也若病眞心痛者必手足冷至節爪甲青旦發夕死夕發旦死不可治也中焦痛者在中脘脾胃間病也下焦痛者在臍下肝腎大小腸膀胱病也凡此三者皆有虛實寒熱之不同宜詳察而治之

痛有虛實凡三焦痛證惟食滯寒滯氣滯者最多其有因蟲因火因痰因血者皆能作痛大都暴痛者多由前三證漸痛者多由後四證但蟲痛痰痛多在中焦火痛則三焦俱有之血痛則多在下焦然惟婦人則常有血證而男子則少也諸如此類但察其多滯多逆者方是實證如無滯逆則不得以實論也辨之之法但當察其可按者爲虛拒按者爲實久痛者多虛暴痛者多實得食稍可者爲虛脹滿畏食者爲實痛徐而緩莫得其處者多虛痛劇而堅一定不移者爲實痛在腸臟中有物有滯者多實痛在腔脅經絡不干中臟而牽連腰背無脹無滯者多虛脹與證參虛實自辨微實者宜調不宜攻大實者或上或下非攻不可純虛者或氣或血非大補不可

痛證有寒熱誤認之則爲害不小蓋三焦痛證因寒者常居八九因熱者十惟一二觀內經舉痛等論義可知矣蓋寒則凝滯凝滯則氣逆氣逆則痛脹由生而熱則流通多不然也雖熱證亦常有痛然熱者必有明辨如內經所言腸中痛而辨熱焦渴則堅乾不得出閉而不通者此因燥結熱閉故能作痛然必有煩熱等證乃因於火最易見也今之醫家但見心腹痛證無問有無寒熱便云諸痛皆屬於火多用寒凉不知此說出於何典而彼此訛傳無曇無根妄亦甚矣又見丹溪治法云凡心腹痛者必用温散此是鬱結不行阻氣不運故痛也此說誠是也然又引原病式云若欲行温散草無助火落病也由是古方多以山梔爲主加熱藥爲向導或用二陳湯加川芎蒼朮倍加梔子煎服痛甚者加炒乾薑反佐之若此議論治法予則大有不服夫致病之由熱者自熱寒者自寒病因火邪清利自愈因不必反佐也病因寒滯温散自愈何爲反助火邪蓋寒者熱之熱者寒之此自正治之正理豈可不論經權不分從逆既宜梔子又宜乾薑概用反佐而治寒犯寒治熱犯熱乎因致後代醫流凡有見不眞者每每借此爲成法而藉口反佐誤人於疑似之中者不少矣

一痛證當辨有形無形無形者痛在氣分凡氣病而爲脹爲痛者必或脹或止而痛無常處氣聚則痛而見形氣散則平而無迹此無形之痛也但宜順氣氣順則痛自愈矣有形者痛在血分或爲食積凡血瘕

食積而爲脹痛者必痛有常所而脹無休息不往不來不離其處者是有形之痛也然或食或血察得所因乃可攻而去之此二者之當辨也

論痛脉

凡諸病之虛實辨之於脈者皆易惟心腹痛證則有大有小其脈多有難辨雖滑實有力者固多實邪虛弱無神者固多虛邪此其常也然暴痛之極者每多沉伏細澀最似極虛之候不知氣爲邪逆氣逆則脈道不行而沉伏異常此正邪實之脈然於沉伏之中細察之必有梗梗然弦緊之意此必寒邪阻遏陽氣多有是脈若火邪作痛則不然凡見此者不得因其細極微極便認爲虛脫妄用補劑必大誤矣辨之法但當察其形氣以見平素之強弱問其病因以知新病久病及何所因而起大都暴病痛極而脈忽沉伏者多實邪久病痛緩而脈本微弱者爲虛邪再以前論虛實之法酌之以理參而診之則萬無一失矣

論痛治

凡心腹痛證必須先辨寒熱如無熱證熱脈則定非火邪不得妄用凉藥

凡治心腹痛證古云痛隨利減又曰通則不痛此以閉結堅實者爲言若腹無堅滿痛無結聚則此說不可用也其有因虛而作痛者此一說更如冰炭

凡痛在上焦者如因停滯既痛兼脹不易行散而痛極難忍者欲其滯去速效無如吐之之妙若無停積脹急而或寒或氣微有凝滯而作痛者但覆其氣無有不愈

胃脘痛證多有因食因寒因氣不順者然因食因寒亦無不皆關於氣蓋食停則氣滯寒留則氣凝所以治痛之要但察其果屬實邪皆當以理氣爲主宜排氣飲加減主之食滯者兼乎消導寒滯者兼乎温中若止因氣逆則但理其氣病自愈矣其有諸藥不效氣結難解者惟神香散爲妙若氣有滯逆隨觸隨發者以胡椒二十一粒擂碎熱酒服之或用官桂三兩水煎頓服此二方最妙

下焦小腹痛者或寒或熱或食或蟲或血或氣逆皆有之凡閉結者利之下之當各求其類而治之

寒滯之痛有因內寒者如食寒飲冷之類是也必兼寒象食隨其宜而治之如上法可也有因外寒者或觸冒不時之寒邪或犯客令之寒氣或受暴雨沙氣之陰毒以致心腹攪痛或吐或瀉或上不能吐下不能瀉而爲乾霍亂危劇等證總由寒氣犯臟或在上焦或在中下二焦凡痛急在上者用吐最妙在中在下者俱宜解寒行滯以排氣飲爲主加減治之或不換金正氣散或和胃飲平胃散十香丸之類皆可擇用其有寒逆之甚者宜四逆湯理中湯之類主之又神香散可解三焦之滯當隨證作引以送之

血積之有腹痛者是即蓄血證也而血證之屬有四一傷寒有蓄血證成無己曰邪氣聚於下焦則津液不得通血氣不得行或溺或血留滯於下是生脹滿而鞕痛也若從心下至少腹鞕滿而痛小便利者則是蓄血之證此當分而治之其他證治并婦人血痛證治並詳本門若跌打損傷有瘀血腹痛證但去其瘀而痛自愈凡氣血和平者宜通瘀煎加減治之其有血滯便結邪實不通者宜桃仁承氣湯百順丸主之或血虛燥結便祕不通者宜玉燭散主之若食鬱既久而胃脘有瘀血作痛者生韭飲

氣血虛寒不能管養心脾者最多心腹痛證然必以積勞積損及憂思不遂者乃有此病或心脾肝腎氣血本虛而偶犯勞傷或偶犯寒氣及飲食不調者亦有此證凡虛痛之候每多連綿不止而亦無急暴之勢或按之揉之温之熨之痛必稍緩其在心脾胃脘之間者則或爲咸或爲懊憹或似饑非饑或饑勞更甚或得食稍可或懊憹無迹莫可名狀或形色青黃或脈微氣弱是皆虛寒之證此非甘温養血補脾和中不可也宜大小營煎理陰煎之類加減主之若氣虛者必大加人參陽衰者必佐以桂附乾薑丹溪曰諸痛不可補氣此惟邪實氣滯者當避之而已諸痛皆然則謬矣其下虛腹痛必因虛挾寒或陽虛中寒者乃有之寒無形迹而喜按喜緩者是也治宜補陰逐寒必宜理陰煎主之然男子則間或有之惟女人則陰虛而痛者更多蓋女人有月經帶濁之病所以爲異亦宜理陰煎大劑主之寸用此以活人多矣

若虛中挾滯而血有不行者惟決津煎爲最妙凡治心腹痛證已經攻擊滌蕩愈而復作或再三用之而愈作愈甚或脈反浮弦虛大者皆爲中虛之候此皆酌其虛實而或兼治邪氣或專補正氣若用補無得則當漸進切不可雜亂妄投以自擊其肘但當純用補藥使脾胃氣強得以運行則邪氣自不能犯又何疼痛之有

凡火邪熱鬱者皆有心腹痛證如火在上焦痛而兼脹者宜於行氣導滯藥中倍加山梔黃芩之屬以治

之若有痛無脹者加芍藥生地麥冬以佐之若火在下焦者宜大分清飲或茵陳飲之類主之然火在上者必有煩熱焦渴喜冷等證火在下者必有脹滿祕結淋瀝等證務兼脈證察其眞有火邪方可治以寒凉如無火證火脈則不得妄稱爲火以誤治也

凡痰飲停滯胃膈亦能作痛如胃脘膨悶漉漉有聲或作酢酸心嘔惡或痛連脅背者皆其證也宜清膈煎二陳湯橘皮半夏湯局方四七湯及括痰丸潤下丸之類並皆治之又東垣草豆蔻丸丹溪白螺丸亦皆治痰之劑若鬱痰凝結消之不去者宜用吐法

凡陰寒腹痛因房室之後中寒而痛極者此陰寒也宜先用葱薑搗爛炒熱或熱磚之屬熨其臍腹以解其寒極凝滯之氣然後用理陰煎或理中湯四逆湯之類加減治之其有痛極至危者須速灸神闕氣海等穴

凡胃腹之痛有不關於內而在筋骨皮肉之間者此邪之在經不可混作裏證必須詳問的確但當分其或火或寒或氣或勞傷或血滯或血虛或有淫瘡邪毒留蓄在經辨其所因庶不致謬而治之亦易也

凡大人小兒或素因口腹不節致傷脾胃以後或寒或食一有所觸即爲腹痛屢發不已或爲脹滿食減等證者惟芍藥枳朮丸爲最妙宜加減用之

凡胃脘大痛連及脅背藥不能納到口即吐者此則無論諸藥皆可發吐因就其勢探而吐之則最易最捷吐出邪滯積痰痛可立止若邪猶未盡痛猶未止則再以前藥與之務盡其邪無不愈者

凡蟲痛證必時作時止來去無定或嘔吐青黃綠水或吐出蟲或痛而坐臥不安或大痛不可忍面色或青或黃或白而脣則紅然痛定則能飲食者便是蟲積之證速宜逐之

凡蟲勢驟急上攻心腹作痛者宜槺蟲煎若蟲積堅固者宜獨蟲丸遇仙丹木香檳榔丸百顆丸之類若稍緩而質弱者宜蕪荑散化蟲散之類或用檳榔根檳榔鶴蝨夏取汁冬濃煎飲之又萬應丸最妙

治蟲之法如丹溪云上半月蟲頭向上易治下半月蟲頭向下難治先以肉汁或糖蜜引蟲頭向上然後用藥此法甚善然屬緩法夫蟲證甚急安能待其時乎且望前望後辨蟲頭亦若渺茫無據惟先用香餌而蟲頭可引也

凡下蟲必先一日不食而使蟲飢次早五更用油煎肉嚼之良久腹內蟲聞肉香頭皆向上而欲食乃以雞卵煎餅和藥嚼而食之須臾服葱湯或白水些少以助藥力下行不踰時而蟲俱下然後以白粥補之隨服補劑調理脾胃而疾可全愈

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百三卷目錄
醫部彙考一百八十三
胃腹門四
方一 溫胃湯 大半夏湯 附子粳米湯 厚朴七物湯 厚朴三物湯 吳茱萸湯 厚朴大柱湯 又方 半夏湯 半夏湯 又方 人參湯 奔氣湯 枳實湯 又方 又方 生薑湯 腸癰湯 張仲景三物備急丸 滴心湯 半夏湯 補心湯 大黃湯熱湯 又方 五辛湯 桂心三物湯 當歸湯 烏頭湯 又方 又方 厚朴湯 高良薑湯 當歸湯 又方 又方 又方 溫中當歸湯 羊肉當歸湯 溫脾湯 又方 溫中當歸湯 苦蔞湯 治中湯 茯苓湯 生薑湯 通氣湯 細辛散 蜀椒散 前胡湯 枳實湯 又方 發胃散 下氣湯 檳榔湯 枳實薤白桂 枝湯 九痛丸 通靈散 檳榔散 蜜煎散 烏沉湯 烏藥沉香湯 草豆蔻丸 小草丸 抽刀散 烏藥湯 二六丸 養脾丸 二妙香良散 四味 古藥蒼湯 古歸木散 二六丸 養脾飲 栀萸丸 連梔子丸 海石散 白螺飲 九 天笑散 單乾漆丸 延胡索丸 芎朮 散 酒黃當歸丸 木香分氣丸 木香順氣 丸 沉香降氣湯 退熱清氣湯 枳橘湯 金 橘皮一物湯 清膈 茶芍丸 大建中湯 鈴子散 烏頭赤石脂丸 苦藥蘇白半夏湯 果附湯 枝附助胃湯 柱枝生薑枳實湯 木香丸 硝砂丸 麻黃桂枝湯 二蠶丸 化蟲丸 補金散 木香三稜散 檳桂湯 甘草粉蜜湯 海蛤丸 又方 走馬湯 用芍散 和氣散 苦蔞葛白酒 湯 薏苡仁附子散 益智散 又方 痢湯 芍藥甘草湯 當歸丸 四物苦楝湯 五蠶 又方 七氣湯 紫氏三和三倍加 白朮湯 調胃白朮湯 木香 化蟲湯 木香順氣湯 益智和中丸 栝萎半夏 湯 益智散 黑荼丸 厚朴 養胃丸 溫中丸 又方 升膈除溫湯 孝蔞丸

方一

溫胃湯 千金方 下同

治胃氣不平時脹欬不能食

乾薑五分　附子　當歸　厚朴　人參　枳實　芍藥　甘草各一兩　蜀椒三合

右九味㕮咀以水九升煮取三升分三服

大半夏湯

治胃中虛冷腹滿塞

半夏一升　大棗二十枚　甘草　附子　當歸　人參　厚朴　茯苓　枳實各二兩　桂心五兩　生薑八兩　蜀椒二百粒

右十二味㕮咀以水一斗煮取三升分二服

附子粳米湯

治腹中寒氣脹滿腸鳴切痛胃脘逆滿嘔吐

附子一枚　半夏　粳米各半升　甘草一兩　大棗十枚

右五味㕮咀以水八升煮米熟去滓每服一升日三服集驗加乾薑二兩

厚朴七物湯

治腹滿氣脹

厚朴半斤　甘草　大黃各三兩　大棗十枚　枳實五枚　桂心二兩　生薑五兩

右㕮咀以水一斗煮取五升去滓內大黃煮取四升服八合日三

嘔逆者加半夏五合

利者去大黃

寒多者加生薑至半斤

厚朴三物湯

治腹滿發熱數十日脈浮而數飲食如故

厚朴半斤　大黃四兩　陳枳實大者五枚

右㕮咀以水一斗二升煮取五升內大黃煮取三升去滓服一升腹中轉動者勿服不動者更服一方加芒硝二兩

吳茱萸湯

治久寒胃脘逆滿不能食

吳茱萸　半夏　小麥各一升　甘草　人參　桂心各一兩　大棗二十枚　生薑八兩

右八味㕮咀以酒五升水三升煮取三升分三服

大柱湯

治虛羸胃腸滿

桂心　生薑各一斤　半夏一升　黃芪四兩

右四味㕮咀以水一斗半煮取五升分五服日三夜二

又方

治男子卒勞內傷汗出中風腹脹大飢食不下心痛小便赤黃時白大便不利

生大黃　苦葶藶　寒水石　苦參　川黃連

苦蔞根各等分

右六味爲末蜜丸以豉汁和飲服如梧子大二丸日三加至十九

半夏湯

治胃滿有氣心腹中冷
半夏一升　桂心四兩　生薑八兩
右三味㕮咀以水七升煮取二升服七合日三服
半夏湯
治逆氣心腹滿氣上胃脘痛寒冷心腹痛嘔逆
半夏一升　生薑　桂心各五兩　橘皮四兩
右四味㕮咀以水七升煮取三升分四服日三夜一人强者作三服亦治霍亂後吐逆腹痛
奔氣湯
治大氣上奔胃膈中諸病發時迫滿短氣不得臥劇者便悶欲死腹中冷濕氣腸鳴相逐成結氣
生薑一斤　半夏　吳茱萸各一升　桂心五兩
人參　甘草各三兩
右六味㕮咀以水一斗煮取三升分四服
枳實湯
下氣治胃中滿悶
枳實三枚　附子三枚　大棗十四枚　人參
甘草　白朮　乾薑　厚朴各二兩　半夏五兩
右九味㕮咀以水七升煮取二升半每服八合日三
又方
下氣治胃滿腹脹
半夏一升　生薑一斤　人參一兩半　橘皮三兩
右四味㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服日三一方無人參止三味
又方
治氣滿閉塞不能食喘息
訶黎勒十枚
右爲末蜜丸梧子大食後服三丸不忌得利卽止
人參湯
安食下氣理胃脘并治客熱
人參　麥門冬　乾薑　當歸　白茯苓　甘草
五味　黃芪　芍藥　枳實各二兩　桂心三兩
半夏一升　大棗十五枚
右十三味㕮咀以水九升煮取三升去滓每服九合從旦至晡令盡皆熱服愼勿冷
生薑泄暘湯
治大腸實熱腹脹不通口爲生瘡
桂心一兩　地黃十兩　生薑　橘皮　青竹茹
黃芩　梔子仁　白朮各三兩　大棗十四枚
茯苓　芒硝各二兩
右十一味以水七升煮取三升去滓下芒硝分二服
張仲景三物備急丸
司空裴秀爲敎用治心腹諸卒暴痛
大黃　乾薑　巴豆各等分
右皆須精新多少隨意先搗大黃乾薑下篩爲散別研巴豆如脂內散中合搗千杵卽爾用之爲散亦好下蜜爲丸貯密器中莫令洩氣若中惡客忤心腹脹滿刺痛口噤氣急停屍卒死者以暖水或酒服大豆許三枚老小量與扶頭起令得下喉須臾未醒更與三枚腹中鳴轉得吐利便愈若口已噤可先和成汁傾口中令從齒間得入極良
瀉心湯
治老小下利水穀不消腸中雷鳴心下痞滿乾嘔不安
人參　黃芩　甘草各一兩　乾薑兩半　黃連半夏　大棗十二枚
右七味㕮咀以水八升煮取二升半分三服并治霍亂
若寒加附子一枚
渴加苦蘘根二兩
嘔加橘皮一兩
痛加當歸一兩
客熱以生薑代乾薑
半夏補心湯
治心虛寒心中脹滿悲憂或夢山丘平澤
半夏六兩　宿薑五兩　茯苓　桂心　枳實
橘皮各三兩　白朮四兩　防風　遠志各二兩
右九味㕮咀以水一斗煮取三升分三服
大黃洩熱湯
治心勞熱口爲生瘡大便苦難閉澀不通心滿痛小腸熱
大黃　澤瀉　黃芩　芒硝　梔子仁各三兩
桂心　通草各二兩　石膏八兩　甘草一兩
大棗二十枚
右十味㕮咀用水九升先以水一升別漬大黃一宿餘八升水煮諸藥取二升五合去滓下大黃煮兩沸去滓下芒硝令烊分三服
又方
治寒熱氣卒客於五臟六腑中則發心痛

生大黃　芍藥　柴胡各四兩　升麻　黃芩
桔梗　硃砂各三兩　鬼箭羽　鬼臼　桂心
砒霜各二兩
右十一味㕮咀以水九升煮取二升七合分三服
先分硃砂作二分每服內一分攪合勻服之得快
利痛不止宜服後方
後方
赤芍藥六兩　桔梗　杏仁各五兩
右三味㕮咀以水六升煮取三升分三服
五辛湯
治心腹疼痛
細辛　蜀椒　桂心　乾薑　吳茱萸　芍藥
防風　苦參　甘草　乾地黃　當歸各一兩
梔子　烏梅　大棗各十二枚
右十四味㕮咀以水九升煮取三升分四服
桂心三物湯
治心中痞諸逆懸痛
桂心　生薑各二兩　膠飴半斤
右三味取一味㕮咀以水六升煮取三升去滓內
飴分三服
烏頭圓
治心痛徹背背痛徹心
附子　蜀椒各半兩　乾薑　赤石脂各一兩
烏頭六銖
右五味爲末蜜丸如麻子大先食服三丸日三不
知稍增之范汪不用附子服如梧子二丸崔氏用
桂心半兩爲六味

又方
治虛冷腹痛不下飲食食復不消膨脹
當歸　茯苓各五分　黃芪蜜製　紫菀各四分
高良薑　乾薑各六分　鹿茸　桂心　昆布
肉蓯蓉　橘皮各三分　甘草二兩　烏頭一兩
大棗四十枚　桃仁一百枚　地骨皮　法麴
大麥蘗各一升
右十八味㕮咀以水一斗半煮取四升二合分五
服下利加赤石脂龍骨各三分渴加麥門冬一升
犀角圓
治心腹久痛積年不定不過一時間還發甚則數
日不能食又便出乾血窮天下方不能瘥甄立言
處此方數日卽愈
烏犀角屑　麝香　雄黃　桔梗　莽草　鬼臼
桂心　芫花各半兩　甘遂一兩半　光明砂
附子各六銖　貝齒五枚　巴豆去皮二十枚
赤足蜈蚣二枚
右十四味爲末蜜丸如梧子大飲服一丸日二漸
加至三丸以微利爲度古今集驗無雄黃
高良薑湯
治心腹絞痛如刺兩脅支滿煩悶不可忍
高良薑五兩　厚朴二兩　當歸　桂心各三兩
右四味㕮咀以水八升煮取一升八合分二服日
二若一服痛止便停不須更服強者爲二服劣者
分三服
當歸湯
治心腹絞痛諸虛冷氣滿痛
蜀椒一兩　當歸　芍藥　厚朴　半夏各二兩
桂心　甘草　黃芪　人參各三兩　乾薑四兩
右十味㕮咀以水一斗煮取二升二合分四服羸
劣人分六服小品方云大冷加附子一枚良
又方
一名吳茱萸湯治寒冷腹痛
桂心　甘草　人參各一兩　生薑五兩　半夏
小麥各一升　吳茱萸二升　當歸二兩
右八味㕮咀以水一斗半煮取三升分三服日三
又方
治冷氣脅下往來衝胃膈痛引脅背悶
當歸　桂心　人參　甘草　吳茱萸　白芍藥
大黃各二兩　茯苓　枳實各一兩　乾薑三兩
右十味㕮咀以水八升煮取三升半分三服日三
治尸疰亦佳外臺仲景方無茯苓枳實
又方
治久寒疾胃膈中痛時下利
當歸三兩　甘草　柑皮各二兩　附子一兩
乾薑四兩
右五味㕮咀以水八升煮取二升分三服日三
又方
治久寒宿疾胃腹中痛短氣時滯下利
當歸　桂心各三兩　乾薑四兩　附子一兩
右四味㕮咀以水八升煮取二升分三服日三范
汪無附子用甘草二兩云虛冷激痛甚者加黃芪
芍藥各二兩
溫中當歸湯

治心腹中痛發作腫聚往來上下痛有休止多熱喜涎出是蚘蟲咬也服二三劑後若不效有異宜改方增損之

當歸　人參　乾薑　白茯苓　厚朴　桂心　芍藥　木香　甘草各二兩

桔梗　右十味咬咀以水八升煮取三升分溫五服日三不耐木香者以犀角一兩代之

羊肉當歸湯

治腹冷絞痛

羊肉半斤　當歸四分　乾薑　橘皮　黃芪炙　白芍藥　芎藭　桂心　獨活　防風各三分

吳茱萸　人參　甘草　乾地黃　茯苓各一分　生薑六分　大棗三十枚

右十七味咬咀以水一斗半先煮肉取一斗二升出肉次內諸藥煮取三升分三服日三覆取溫暖

溫脾湯

治腹痛臍下絞結繞臍不止

大黃五兩　甘草　附子　人參　芒硝各一兩

當歸　乾薑各二兩

右七味咬咀以水七升煮取三升分溫服日三

生薑湯

治胃腹中卒痛

生薑一斤取汁　食蜜八兩　醍醐四兩

右三味微火上耗令相得適寒溫服三合日三

苦蘘湯

治胃痹病喘息欬唾胃背痛短氣寸脈沉而遲關上小緊數

半夏半升　薤白一斤　枳實二兩　生薑四兩　苦蘘實一枚

右五味咬咀以白蘘漿一斗煮取四升服一升日二仲景肘後不用生薑枳實半夏

治中湯

治胃痹候胃中愊愊如滿噎塞習習如痰喉中溫燥唾沫出

橘皮一斤　生薑半斤　枳實五枚

右三味咬咀以水五升煮取二升去滓分再服

茯苓湯

治胃中氣塞短氣

茯苓三兩　甘草一兩　杏仁五十枚

右三味咬咀以水一斗三升煮取六升去滓為六服日三未瘥再合服

通氣湯

治胃滿短氣噎

半夏八兩　生薑六兩　橘皮三兩　吳黃四十枚

右四味咬咀以水八升煮取三升分三服一方用桂二兩無橘皮

細辛散

治胃痹達背痛短氣

細辛　甘草各二兩　枳實　生薑　苦蘘實

乾地黃　白朮各三兩　桂心　茯苓各五兩

右九味治下篩酒服方寸匕日三

蜀椒散

治胃痹達背

蜀椒　食茱萸各一兩　桂心　桔梗各三兩

烏頭半兩　豉六兩

右六味治下篩食後酒服方寸匕日三

前胡湯

治胃中逆氣心痛微背少氣不食

前胡　甘草　半夏　白芍藥各二兩　黃芩

當歸　人參　桂心各一兩　生薑三兩　大棗三十枚　竹葉一升

右十一味咬咀以水九升煮取三升分為四服

又方

前胡　人參　生薑　半夏　麥門冬　甘草　白芍藥　白茯苓　膠飴各三兩　桂心　黃芩

當歸各一兩　大棗三十枚

右十三味咬咀以水一斗四升煮取三升去滓分三服

熨背散

治胃背疼痛而悶

芎藭一兩六銖　烏頭　細辛　附子　羌活

蜀椒　桂心各五兩

右七味治下篩帛裹微火炙令暖以熨背上取瘥乃止慎生冷如常法

下氣湯

治胃腹背閉滿上氣喘息

杏仁四七枚　大腹檳榔二七枚

右二味咬咀以童便三升煮取一升半分再服胃患氣發輒合服之

檳榔湯

主破胃背惡氣音聲塞閉

檳榔極大者四枚小者八枚
右一味二品㕮咀以小兒尿二升半煮減一升去滓分三服頻與五劑永定
枳實薤白桂枝湯
治胃痹心中痞氣結在胸胃滿脅下逆搶心
枳實四枚　薤白一斤　桂枝一兩　厚朴三兩
苦酒實一枚
右五味㕮咀以水七升煮取二升半分再服仲景方厚朴四兩薤白半升水五升煮取三升半服之
九痛丸（人門下同）
治九種心痛及中惡眼痛口不能言連年積冷流在心胃腫痛上氣落馬墜車等疾
附子三兩　巴豆　人參　乾薑　吳萸各一兩
狼毒二錢半
右爲末蜜丸梧子大每三丸空心溫酒下
通靈散
治九種心痛
蒲黃　五靈脂各一兩　木通　芍藥各五錢
每四錢水煎臨熟入鹽少許通口服
散痛丸
治心氣痛不可忍
陳茶一兩　乳香五錢
右爲末臘月兔血丸芡實大每一丸淡酢湯下
靈檳散
治心脾蟲痛此方用肉味引蟲頭向上用藥殺蟲
五靈脂　檳榔等分
右爲末每三錢舊蒲煎湯下隔夜先將猪肉鹽醬煮熟令患人細嚼吐出勿吞却將前藥空心服之
燒脾散
治飲食生冷停留中焦心脾冷痛
乾薑　草果　厚朴　砂仁　神麴　大麥芽
陳皮　良薑　甘草各等分
右爲末每三錢淡鹽湯點服
古二胡散
治心腹疼痛
延胡索　胡椒各等分
右爲末每二錢酒調服
二妙香良散
香附　良薑各等分
右各炒爲末每二錢入鹽少許米飲調服若同炒則不效
四味烏沉湯
治心脾刺痛
烏藥　香附　砂仁　沉香各等分
右薑煎服
烏藥沉香湯
治一切氣除一切冷調中補五臟益精壯陽暖腰膝治嘔瀉療癪痞痛風水毒腫冷風痲痹及中惡心腹痛蠱毒鬼氣宿食不消天行瘴疫膀胱冷氣攻衝背脅俛仰不利婦人血氣攻心胃腹攪痛
烏藥一兩　沉香五錢　人參三分　甘草四分
右爲末每五分入鹽少許薑煎服或加香附砂仁陳皮半夏或加枳殼神麴麥芽莪朮青皮木香隨宜加入
草豆蔻丸
治客寒犯胃作痛得熱卽止熱痛亦可暫服
草豆蔻一錢四分　澤瀉（小便數者減之）　麥芽各錢半
半夏一錢　吳茱萸　益智仁　陳皮　白礬
人參　黃芪各八分　生甘草　炙甘草各三分
當歸　青皮酢炒　神麴　薑黃　柴胡各四分
桃仁七枚
右爲末蒸餅丸梧子大每服三十丸白湯下食遠對酌多少用之
小草丸
治胃痹心痛逆氣隔中飲食不下
小甘草　桂心　川椒　乾薑　細辛各三兩
附子二分
右爲末蜜丸梧子大每三丸米飲下忌葷臭生冷抽刀散
治心脾痛
白薑五兩用巴豆一錢同炒赤去巴豆　舊蒲五兩
半生半炒　良薑五兩用螫螫二十五枚同炒黑去螫螫　糯米六兩一分炒黃
右爲末每二錢空心溫酒下昔一人醉臥星夜天明脾疼攻刺百藥罔效後服之頓愈乃知風寒入脾故用二薑舊蒲散邪巴豆螫螫借氣伐根繼以養脾之劑調之更不復作
連附六一湯
治胃脘痛甚諸藥不效者熱因熱用也
黃連六錢　附子一錢
薑棗煎熱服

莎芎散
治曾服香燥熱藥以致病根深固者
香附子　川芎各一兩　黃連　山梔仁各五錢
木香　乾生薑各三錢　檳榔　黃芩酒浸炒
芒硝各二錢
右爲末每二錢用薑汁同滾白湯調痛時呷下

羨黃丸
治大實心痛
雄黃一兩　巴豆五錢　白礬二兩
右研勻水丸梧子大取十二丸用漿水煮熟濾入
冷漿水內流冷每一時冷漿水下一丸一日盡十
二丸如得利不可再服宜古羨蒼湯以去餘邪

古羨蒼湯
治大實心痛及心頭透痛者亦好
蒼本五錢　蒼术一兩
水煎服服羨黃丸後宜此斷根

古歸术散
治心脾疼痛
當歸八兩　白术一兩
右爲末每二錢沸湯點服

二六丸
治氣血俱虛挾食積痰火心痛
白术五錢　白芍　砂仁　半夏　當歸各三錢
桃仁　黃連　神麴　陳皮各二錢　吳萸錢半
人參　甘草各一錢
右爲末蒸餅爲丸服

梔薑飲
治胃熱作痛如用此及劫痛藥不止者須用元明
粉一錢服之立效

山梔仁十五枚炒焦
水一盞煎至六分入生薑自然汁三匙令幹再煎
少沸熱飲或入川芎一錢尤妙

梔萸丸
治氣實心痛
山梔仁炒焦三兩　吳萸　香附各五錢
右爲末蒸餅丸如花椒大每二十丸生地黃酒洗
同生薑煎湯服

萸連梔子丸
治濕熱心痛引小腹欲作疝者
吳茱萸　黃連　山梔仁炒　滑石細末各五錢
荔枝核燒存性三錢
右爲末薑汁糊丸服

海石散
治脾痛疝痛
海石二錢　香附一錢
右爲末川芎山梔煎湯入薑汁令幹調服實者可
煅牡蠣粉二錢酒調服

白螺殼丸
治痰積胃脘作痛
白螺螄殼火煅　南星　滑石　蒼术　山梔仁
香附子各一兩　枳殼　青皮　木香　半夏製
砂仁各五錢
春加川芎夏加黃連秋冬加吳萸爲末薑汁浸蒸
餅爲丸菉豆大每五十丸薑湯下

失笑散
治心氣痛及小腸氣痛不可忍
蒲黃　五靈脂各等分
右爲末每二錢先以醋調成膏入水一盞煎空心
熱服

單乾漆丸
治九種心痛惡心吐水腹脅積聚滯氣婦人瘀血
作痛尤效
乾漆炒烟盡
右爲末醋糊丸梧子大每五七丸熱酒或醋湯下

延胡索丸
治死血作痛神效
桃仁三十枚　延胡索一兩半　桂心　紅花
滑石　紅麴各五錢
右爲末蒸餅爲丸服

芎术散
治痰積作痛脈滑小便不利
川芎　蒼术　香附子　白芷各等分
右爲末磨木香薑汁點熱湯調服

酒羨當歸丸
治小腹寒痛
當歸一兩　黑附子　良薑各七錢　茴香五錢四
味酒一椀羨焙乾　甘草　苦楝　丁香各五錢
延胡索四錢　全蝎炒黃各三錢　柴胡二錢
木香　升麻各一錢
右爲末酒糊丸梧子大每五七十丸空心淡醋湯
下忌油膩酒臘生冷

木香分氣丸

治一切氣逆心胃痞悶腹脅虛脹或加丁皮藿香薑黃砂仁檀香常服寬中進食

木香　甘松各一兩　甘草六兩　香附一斤　莪朮半斤

右爲末糊丸梧子大每三十丸薑湯橘皮煎湯任下

木香順氣丸

治一切氣逆心腹脹痛

木香　蘿蔔子　大腹皮各五錢　枳殼　陳皮　故紙　香附各一兩　黑丑六兩

右爲末水丸梧子大每五十丸溫水下

沉香降氣湯

治陰陽壅滯氣不宣通胃膈痞悶

沉香銼二錢　縮砂仁五錢　生甘草一兩二錢　香附四兩

右爲末每二錢入鹽少許白湯調服

退熱清氣湯

治氣逆身熱中脘痞滿

柴胡　橘皮　茯苓各一錢　香附七分　半夏　枳殼各八分　川芎五分　縮砂仁七粒　木香　甘草各二分

薑煎溫服

枳橘湯

治胃痹胃中氣塞短氣須審氣滯何部分以引經藥導之

橘皮八錢　枳殼一錢半　生薑四錢

鬱甚加薑黃少許水煎食遠溫服

橘皮一物湯

治血氣攻刺及感風寒暑濕初證通用凡酒食所傷中脘痞塞妨悶嘔吐吞酸

橘皮洗淨一兩

新汲水煎溫服

清膈蒼沙丸

治因濕熱痰火氣滯

蒼朮二兩　香附一兩半　黃芩　黃連各五錢

右爲末用紅熟苦蓼去皮搗糊和丸菜豆大每三十丸溫湯下

大建中湯

治虛勞寒澼飲在脅下決決有聲飲已如從一邊下決決然也有頭並衝皮起引兩乳內痛裏急善夢失精氣短目眩眩惚惚多忘

蜀椒二合　半夏一升　生薑一斤　甘草二兩　人參三兩　飴糖八兩

右六味㕮咀以水一斗煮三升去滓內糖溫服七合

裏急拘引加芍藥桂心各三兩

手足厥腰背冷加附子一枚

勞者加黃芪一兩

金鈴子散

治熱厥心痛或作或止久不愈者

金鈴子　延胡索各一兩

右爲末每服三錢酒調下痛止與枳朮丸

烏頭赤石脂丸

治心痛徹背背痛徹心

烏頭炮一分　附子炮半兩　乾薑炮　赤石脂　蜀椒各一兩

右五味爲末蜜丸如桐子大先食服一丸日三服不效稍加服

苦蘆薷白半夏湯

治胃痹不得臥心痛徹背者

苦蘆薷實一枚　薷白三兩　白酒一斗　半夏半升

右四味同煮取四升溫服一升日三服

扶陽助胃湯

治寒客腸胃卒然心腹大痛

附子炮去皮臍二錢　乾薑炮一錢半　草豆蔻　益智仁　人參　炙甘草　官桂　白芍各一錢　吳茱萸　陳皮　白朮各五分

右剉如麻豆大都作一服水二盞薑三片棗二枚同煎至一盞去查溫服食前

桂枝生薑枳實湯

治心中痞厥逆心懸痛

桂枝　生薑各一兩　枳實五箇

右三味以水六升煮取三升分溫三服

果附湯

治寒氣心痛

附子　草果　良薑等分

以酒煎服立效

二薑丸

養脾溫胃去冷消痰大治心脾疼寬胃下氣進飲食及一切冷物所傷並皆治之

乾薑炮　良薑

右等分爲細末麵糊丸如桐子大每服十五丸至二十丸食後陳皮湯妊娠婦人不宜服

木香丸

治食積心痛

白蔻一錢　木香　丁香　三稜　蓬朮　青皮　陳皮各二錢半　檳榔二錢　巴豆肉十五粒用醋煮令無白心

右爲末醋糊丸麻子大

礞砂丸

治一切積聚痰飲心痛

礞砂　三稜　乾薑　白芷　巴豆去油各半兩　大黃末　乾漆各半兩　木香　青皮　胡椒各一分　檳榔　肉豆蔻各一箇

右爲細末醋二升煎五七沸後下三稜大黃末同煎五七沸入礞砂同煎成膏稀稠得所入諸藥和勻杵丸如菜豆大年深成塊生薑湯下四五丸食積熟水下白痢乾薑湯下赤痢當歸湯葱酒亦得

麻黃桂枝湯

治外因心痛惡寒發熱內攻五臟胃腹拘急不得轉側

麻黃去節湯浸焙　桂心　芍藥　細辛去苗　乾薑　甘草炙各七錢半　半夏　香附各五錢

右剉每五錢水盞半生薑五片煎七分去查食前服大便祕入大黃量虛實加減

檳桂湯

治心疼甚效

檳榔　桂心　葛根　甘草　細辛　半夏製　桔梗　枳殼　川芎　防風

右等分惟甘草半之水煎服有人心疼諸藥不效服此愈

化蟲丸

治蟲積心胃痛

鶴蝨　檳榔　胡粉炒　苦楝根去皮各五十兩　白礬飛十二兩

右爲末麪糊爲丸桐子大小兒疾病多有諸蟲或因臟腑虛弱而動或咽食甘肥而動動卽腹中疼痛往來上下攻心痛則笑不休合眼仰身撲手心神悶亂嘔噦涎沫或吐清水四肢羸困面青色黃飲食雖進不生肌肉或寒或熱沉沉默默不的知病處一歲兒服五丸溫漿下入香油一兩點打勻下之米飲亦得其蟲自下

補金散

治諸般蟲痛

鶴蝨生　雷丸　定粉　錫灰各等分

右爲末每服三錢空心少油調下又用猪肉一兩燒熟摻藥在上細嚼亦得用翎毛掃甘遂末一錢與前藥一處服之其蟲自下

木香三稜散

治腹中有蟲疼痛面色痿黃一切積滯

黑牽牛半生半炒　大腹子洗　檳榔　三稜煨　錫灰酢炒　雷丸　蓬朮煨　木香　大黃各一兩

右爲細末每服三錢空心用蜜水調下或沙糖水亦可須先將燒肉一片口中半嚼之嚥下吐出口中肉汁後服藥

甘草粉蜜湯

治蚘蟲爲病令人吐涎心痛發作有時毒藥不止

甘草二兩　定粉一兩　蜜四兩

右三味以水三升先煮甘草取二升去查內粉蜜攪令勻煎如薄粥溫服一升癒卽止

海蛤丸

治痰心痛

海蛤燒爲灰研極細去火毒　苦葍仁帶皮同研

右以海蛤入苦葍內乾濕得所爲丸每服五十丸又方

治脾疼

海蛤粉　香附末

用川芎山梔生薑汁煎薑湯調服爲佳

走馬湯

治中惡心腹脹大痛不便

巴豆二枚去皮心炒　杏仁二枚

右二味以綿纏槌令碎熱湯二合搦取白汁飲之當下老少量服通治飛尸鬼擊等病

川芎散

治妊娠卒心痛氣欲絕

川芎　當歸　茯苓　厚朴各等分

右水六升煎二升分二服

白朮散

治妊娠卒心痛氣欲絕不可忍者

白朮　赤芍藥各二兩　黃芩一兩半

右水六升煑取二升半分三服半日令盡微下水令易產忌桃李雀肉

和氣散

治男婦一切氣疾他藥不瘳者

白芷　白芨各一兩　地骨皮　山蜈蚣　藿香　甘草炙　木香　紅內消　山慈姑各半兩

右焙乾爲末每服二大錢空心鹽湯點服余鄉村有一老醫數世習醫凡婦人氣疾惟憑此藥百發百中

苦蔞薤白白酒湯

治心痛脈小緊數者

苦蔞實一箇搗　薤白半升　白酒七升

右三味同煑取二升分溫再服

薏苡仁附子散

治胷痹緩急者

薏苡仁四兩　附子炮一枚

右二味杵爲散服方寸匕日三服

益智散

治傷寒陰盛心腹痞滿嘔逆瀉利手足厥逆及一切冷氣攻心脅臍腹脹絞痛

川烏炮去皮臍四兩　益智仁去皮　乾薑炮　青皮去白各一兩

右爲細末每服三錢水二盞生薑三片棗二枚劈破同煎至八分去查溫服食前

又方

治胷滿氣噫下部冷臍腹疞痛

吳茱萸五十粒湯洗泡　生薑六兩　陳皮四兩　桂枝一兩　半夏二兩製

右㕮咀用水十升煑取四升分五服冷再溫空心食前服

五靈脂湯

治中暑腹疼不已

五靈脂　香附各等分

右爲末白湯調服

芍藥甘草湯

治腹痛稼穡作甘甘者己也曲直作酸酸者甲也甲己化土此仲景妙方也

芍藥二兩　甘草一兩

右㕮咀每服五錢水煎服

當歸丸

治三陰受邪心臍少腹疼痛

生地黃　當歸　川芎　白芍各半兩　防風　獨活　全蠍各五分　續斷一兩　苦楝　延胡各七錢　木香　丁香各二錢半　茴香一兩炒

右爲細末酒糊丸桐子大空心溫酒下三五丸大效

四物苦楝湯

治心脾疼痛

四物湯四兩　延胡索　苦楝各一兩

右爲細末每服三錢溫酒酢湯任下

又方

治腹中攪痛不可忍

延胡索　當歸　白芍　川芎　乾薑各等分

右爲末每服三錢溫酒調下

又方

治前證

延胡索　桂心各半兩　當歸

右爲細末熱酒調下

七氣湯

治虛冷上氣及寒氣怒氣思氣喜氣憂氣愁氣內結積聚堅牢如杯心腹絞痛不能飲食時發時止發即欲死此藥主之

半夏湯洗五兩　人參　甘草炙　肉桂各一兩

右爲粗末入半夏令勻每服二錢水一大盞生薑三片煎七分去查稍熱服食前

索氏三和三倍加白朮湯

治心胃疼痛

白朮　厚朴　陳皮各三兩　木通一兩　檳榔　紫蘇各二兩　甘草　海金沙　大腹皮　茯苓　枳殼各一兩

水煎服

調胃白朮澤瀉散

治痰病化爲水氣傳變水穀不能食

白朮半斤　澤瀉　芍藥　陳皮　茯苓　生薑　木香　檳榔各一兩

右爲末治腹腫如神

若心下痞加枳實

若心下盛滿加牽牛

枳朮湯

治脾胃虛食不化胷膈支滿腹痛

枳實七箇　白朮二兩

右二味以水五升煮取三升分溫三服腹中軟即當散也

木香化滯湯

治脾胃鬱滯脹滿疼痛

白豆蔻仁　陳皮　大腹子　白茯苓　砂仁　人參　白朮各一錢　青皮醋炒　檳榔　木香　薑黃各二錢　甘草炙四分　白檀　藿香葉各二分　桔梗五分

右爲細末水二大盞煎至一盞稍熱服食前沸湯點服亦得

木香順氣湯

治濁氣在上則生膜脹

木香　蒼朮　草豆蔻麪裹煨各三分　厚朴製四分　青皮一錢　益智　陳皮　澤瀉　白茯苓半夏　乾薑　吳茱萸湯泡各二分　當歸　人參各五分　升麻　柴胡各一分

右㕮咀都作一服水二盞煎至一盞去查溫服

益智和中丸 東垣 下同

季秋合治心腹中大痛煩躁冷汗自出

草豆蔻仁四錢　益智仁一錢三分　砂仁七分　甘草炙二錢半　黃芪蜜炙當歸身　人參　乾薑　麥冬　麴末　陳皮各五分　木香一分　桂枝　桂花各一錢半　薑黃三分　大麥蘗炒三錢半　黃連　生地各一錢

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服二三十丸溫水送下細嚼亦得

厚朴湯

治脾胃虛寒心腹滿及秋冬客寒犯胃時作疼痛

厚朴薑製　陳皮二兩　茯苓一兩　甘草炙

乾薑各五錢

戊火已衰不能運化又加客氣聚爲滿痛散以辛熱佐以苦甘溫以淡泄之扶持胃氣以平爲期也

益智散

治傷寒陰盛心腹痞滿嘔逆瀉利手足厥逆及一切冷氣攻心脅臍腹脹滿絞痛

川烏炮去皮臍四兩　益智去皮　乾薑炮　青皮去白各一兩

右爲細末每服三錢水二盞生薑三片棗一枚劈破同煎至八分去查溫服食前

溫中丸

治食積肚痛

白朮　香附童便浸　針砂各四兩醋浸炒紅　山楂肉　神麴炒各八兩　川芎半兩 各則用夏去之　吳茱萸半兩湯浸 冬則用春減之　蒼朮米泔浸二兩半　苦參一兩

右爲末醋調麪糊爲丸如桐子大一方去山楂神麴川芎加半夏青皮黃連

黑芥丸 普濟方

治冷痰胃脘痞滿

黑芥子　白芥子　大戟　甘遂　胡椒　桂心

右各等分爲末糊丸梧子大每服十九薑湯下

桔梗半夏湯 活人書

凡傷寒腹脹陰陽不和以此主之

桔梗　半夏　陳皮各三錢

右㕮咀薑五片水二鍾煎一鍾服

覓中丸 指迷方

治脾氣不和冷氣客於中壅遏不通而爲脹滿

白朮二兩　橘皮四兩

右爲末酒糊丸梧子大每食前木香湯送三十丸

又方

治心痛

管仲　白芍藥　梔子炒各三錢　乳香末二錢　甘草五分

右水煎服一劑即止痛此方專治火痛也又治呼號口渴者神效

升陽除濕湯

治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄瀉無度小便黃四肢困倦並宜服此

蒼朮一錢　半夏　益智　澤瀉　羌活　防風　神麴　柴胡　升麻各半錢　豬苓　陳皮　麥蘗各三分

右㕮咀作一服水三盞生薑三片棗二枚煎至一鍾去滓空心服如胃寒腸鳴者加甘草三分

萃萸丸 河間六書

治涌水疾行則腹鳴如囊裹水漿之聲

萃萸隔紙炒　澤瀉　椒目　杏仁　桑白皮　豬苓各五錢

右爲末煉蜜丸如桐子大每服二十丸葱白湯下以利爲度

養胃丹 中藏經

治脾胃不和全不思食中脘停塞嘔逆惡心臟寒

泄痢腹痛腸鳴常服溫中養胃散飲思食

丁香兩半　甘草炙　白豆蔻　半夏麴各半兩
人參三分　乾薑三兩炮用乾生薑尤佳

右同爲細末煉蜜爲丸每兩作十丸每服一丸溫湯化下空心食前服之或細嚼湯下亦可

又方

治胃中痰飲腸中水鳴食不消嘔吐水

檳榔十二枚　生薑　杏仁研　白朮各四兩
半夏八兩　茯苓五兩　橘皮三兩

右七味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百四卷目錄

醫部彙考一百八十四

胃腹門五

方二 內補散 健脾丸 泰綾錦家二十四味 三台丸 升麻除濕湯 沉香升麻除濕湯 五福飲 大營煎 小營煎 加減四物湯 神應丸 歸脾丸 大和中飲 小和中飲 補肝散 蠲痛丸 十香丸 均藥枳朮丸 排風湯 大分清飲 消脂湯 五味異功散 百順丸 理陰煎 參苓白朮散 內固清心散 六合同生丹 又方 內托散 又方 肚癰方 又方 六皮四子湯 發胃煎藥 加減四物湯 又方 神效蠲痛散 又方 一粒金丹 大黃牡丹湯 奪命丹 勝金丹 十全大補湯 封臍艾灸法 何首烏散

藝術典第二百四卷

醫部彙考一百八十四

胃腹門五

方二

內補散 千金方

治男子五勞六極六氣之爲病皆起於大勞脈虛外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹中雷鳴時時泄痢或閉或利面目黧心下憒憒不欲聞憎聞人聲乾地黃 菟絲 山茱萸 地骨各五兩 遠志 巴戟天各半兩 麥冬 五味子 甘草 人參 蓯蓉 石斛 桂心 茯苓 附子各一兩

右十五味治下篩酒服方寸匕日三加至三七無所禁

健脾丸

治虛勞羸瘦身體重脾胃冷飲食不消雷鳴腹脹泄痢不止

鍾乳粉三兩 赤石脂 好麴 大麥芽 當歸 黃連 人參 釵石斛 龍骨 乾薑 白茯苓 細辛 桂心各三兩 附子一兩 蜀椒六兩

右十五味爲末白蜜丸如梧子大酒服十九日三加至三十九弱者飲服此方通治男女集驗無細辛龍骨

泰綾錦家二十四味養脾丸

治風冷寒濕邪致腹脹病滿刺痛腸鳴泄瀉吐逆吞酸羸弱困倦無力不思飲食一切脾胃之疾

神麴炒各半兩 附子炮去皮臍六錢 麥芽炒 丁香 沉香 木香各一錢半 陳皮 大腹皮 肉桂 白朮各一兩半 厚朴去皮薑製三兩 訶子煨去核一兩三錢 人參 茯苓各四錢 縮砂八兩 草澄茄 白附子炮 良薑油炒 紅豆去紅皮 胡椒炒 草芨 川薑炮 甘草炙各二錢

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼用白湯送下食前服

三台丸

治五臟寒熱積聚膿脹腸鳴而噫食不生胸膈甚則嘔逆者

大黃煨 前胡各二兩 萆薢 杏仁去皮尖 硝石各一升 茯苓半兩 厚朴 附子 細辛 半夏各一兩

右十味爲末蜜和搗五千杵如梧子大服雪丸稍加至十九以止爲度

升麻除濕湯

治自下而上者引而去之

蒼朮一錢 柴胡 羌活 防風 升麻 神麴 澤瀉 猪苓各五分 炙甘草 陳皮不去白 麥蘗麪各三分

右都作一服水二盞煎至一盞去粗空心服之如胃寒腸鳴加益智仁半夏各五分生薑三片棗一枚同煎若非腸鳴不得用

沉香溫胃丸

治中焦氣弱脾胃受寒飲食不美氣不調和臟腑積冷心腹疼痛大便滑泄腹中雷鳴霍亂吐瀉手足厥逆便利無度

附子炮去皮臍 巴戟天酒浸去心 乾薑炮 茴香炒各一兩 官桂七錢 沉香 甘草炙 當歸 吳茱萸洗炒去苦 人參 白朮 白芍 白茯苓 良薑 木香各五錢 丁香二錢

右爲細末用好酢打麪糊爲丸如梧子大每服五七十丸熱米飲送下空心食前日進三服忌一切生冷物

神應丸

治因一切冷物冷水及潼乳酪水腹痛腸鳴米穀不化

黃蠟二兩　巴豆　杏仁去皮尖雙仁　百草霜　乾薑各五錢　丁香　木香各二錢

右先將黃蠟用好醋煮去粗穢將巴豆杏仁同炒黑烟盡研如泥將黃蠟再上火入蘇油半兩鎔開入在杏仁巴豆泥內同攪旋下丁香木香等藥末研勻搓作挺子油紙裹了旋丸用每服三五十丸溫米飲送下食前日進三服

五福飲（景岳全書下同）

治三陰氣血俱虛治節不行而胃痞腹痛者

人參　熟地各隨宜　當歸二三錢　炙草一錢

白朮炒一錢半

右水二鍾煎七分食遠溫服或加生薑三五片

大營煎

治心脾虛寒心腹疼痛等證

當歸二三錢或五錢　熟地三五七錢　枸杞子　杜仲各二錢　炙草　肉桂各一二錢　牛膝錢半

右水二鍾煎七分食遠溫服

小營煎

治前證

熟地二三錢　當歸　白芍藥酒炒　山藥炒　枸杞各二錢　炙甘草一錢

右水二鍾煎七分食遠溫服

和胃飲

治寒濕傷脾脘滿腹痛

陳皮　厚朴各錢半　乾薑炮一二錢　炙草一錢

右水鍾半煎七分溫服

排氣飲

治氣逆食滯胃腹脹痛

陳皮　藿香　枳殼各錢半　木香七分或一錢　香附　澤瀉　烏藥各二錢　厚朴一錢

右水鍾半煎七分熱服

大和中飲

治飲食蓄滯胃腹脹痛

陳皮一二錢　枳實一錢　山楂　麥芽各二錢　砂仁五分　厚朴　澤瀉各錢半

右水鍾半煎七八分食遠溫服

小和中飲

治胃腸脹悶

陳皮　茯苓　厚朴各錢半　甘草五分　山楂　扁豆炒各二錢

右水鍾半加生薑三五片煎服

解肝煎

治暴怒傷肝氣逆胃腹脹滿

陳皮　半夏　厚朴　茯苓各錢半　砂仁七分　蘇葉　芍藥各一錢

右水鍾半加生薑三五片煎服

廓清飲

治三焦壅滯胃腸脹滿或肚腹單脹氣實等證

白芥子五七分或一錢　枳殼二錢　茯苓連皮　澤瀉各二三錢　陳皮　蘿蔔子生一錢（不服能食者減之）　厚朴錢半　大腹皮一二錢

右水鍾半煎七分食遠溫服

搖蠱煎

治諸蠱上攻胃腹作痛

青皮　小茴香炒　吳茱萸各一錢　甘草八分　檳榔　烏藥各錢半　細榧子敲碎三錢　硃砂雄黃各五分並研極細　烏梅二箇

右除硃砂雄黃二味餘八味水鍾半煎八分去查隨入二味再煎三四沸攪勻徐徐服如惡心加炒乾薑一二錢或先啖牛膽少許候茶頃頓服之妙

十香丸

治氣滯寒滯諸痛

木香　沉香　小茴香　香附酒炒　荔核煨焦　澤瀉　烏藥　陳皮　丁香各等分　皂角燒煙盡

右爲末酒糊丸彈子大者磨化服小者湯引下

芍藥枳朮丸

治食積痞滿小兒腹大脹滿疼痛脾胃不和

白朮麩炒　赤芍藥酒炒各二兩　枳實麩炒　陳皮各一兩

荷葉湯襄老黃米粥爲丸桐子大米飲白湯任下百餘丸

括痰丸

治一切停痰胃脘脹悶疼痛等證

陳皮四兩切用鹽二錢入水中拌浸一宿曬乾半夏製　白芥子　猪苓各二兩　炙甘草五錢

乾薑炒黃一兩

右爲末湯浸蒸餅爲丸菜豆大每服錢許白湯下

如胃脘疼痛者加台烏藥二兩

神香散

治前證諸藥不效者
丁香　白豆蔻（去殼炒仁亦可）
右等分爲末白湯調下五七分甚者一錢日數服
不拘若寒氣作痛者薑湯下
覆盞丸
治蟲積胃腹脹痛
乾漆炒烟盡　雄黃微炒　蒸熟　雷丸　桃仁
皂角燒烟盡　錫灰　檳榔　史君子各等分
輕粉減半　細槌肉加倍
右爲末湯浸蒸餅爲丸菉豆大每服五七分白湯
陸續下如蟲積堅固者加巴豆霜與輕粉同
百順丸
治一切積滯胃腹脹痛
錦紋大黃一斤　牙皂角炒微黃一兩六錢
右爲末湯浸蒸餅丸菉豆大每用五分或一二三
錢酌宜用引蜜丸亦可
大分清飲
治熱閉腹痛
茯苓　澤瀉　木通各二錢　豬苓　車前子
梔子或倍之　枳殼各一錢
右水鍾半煎八分食遠溫服
如內熱甚者加黃芩黃菜草龍膽之屬
如大便堅鞕滿者加大黃二三錢
如邪熱蓄血腹痛者加紅花青皮各錢半
清膈煎
治痰因火動氣壅胃滿煩渴
陳皮錢半　貝母（敲碎）二三錢　白芥子五七分
臍星一二錢　海石　木通各二錢
右水鍾半煎七分溫服
六味回陽飲
治陰陽將脫胃腹畏寒膨脹
人參一二兩或數錢　炙甘草一錢　製附子
炮乾薑各一二三錢　當歸身三錢（加澤瀉玄胡血者以冬术代）
熟地五錢或一兩
右水二鍾武火煎七八分溫服
理陰煎
治前證
熟地黃三五七錢或一二兩　炙甘草一二錢
當歸二三錢或五七錢　乾薑炒黃色一二三錢
右水二鍾煎七八分熱服或加肉桂一二錢
養中煎
治中氣虛寒胃滿嘔瀉
人參一二三錢　白扁豆炒二三錢　山藥炒
茯苓各二錢　乾薑炒黃一二錢　炙甘草一錢
右水二鍾煎七分食遠溫服
溫胃飲
治前證
人參　白朮各一二三錢或一兩　扁豆炒二錢
乾薑炒焦一二三錢　當歸一二錢（澤者勿用）　炙草
陳皮各一錢（氣味衰不用）
右水二鍾煎七分食遠溫服
五君子煎
治前證
人參二三錢　白朮　茯苓各二錢　炙草一錢
乾薑炒黃一二錢
右水鍾半煎八分溫服
參薑飲
治前證
乾薑炮五分或一二錢或用鮮生薑三五片亦可
人參三五錢或倍之　炙甘草三五分
右水鍾半煎七八分徐徐服之此方陳皮薑茨茯
苓皆可酌而佐之
胃關煎
治脾腎虛寒腹痛不止
熟地三五錢或一兩　山藥炒　扁豆炒各二錢
焦乾薑　白朮炒各一二三錢　炙甘草一二錢
吳茱萸製五七分
右水二鍾煎七分食遠溫服
聖朮煎
治脾胃虛衰痞脹甚者即以此煎送神香散最妙
白朮五六錢至一兩　乾薑炒　肉桂各一二錢
陳皮酌用或不用
右水鍾半煎七分溫服
內固清心散（藥物全書下同）
治井疽
粉甘草　升麻　當歸　川芎　黃芪　白芍藥
山梔仁　乳香　黃芩　羌活　桔梗　天花粉
青皮　白芷
右水煎服
穿心冷麥方
辰砂　茯神　遠志　白茯苓　人參　乳香

沉香　丁香　木香　藿香　麝香　棗仁各等分
右辰砂末二錢金箔五片同研燈心薄荷煎湯下
內塞散
治穿心冷痛
人參　白朮　白茯苓　熟地黃　甘草　芍藥
黃芪　肉桂　當歸　黃芩酒炒　桔梗　防風
右水煎服連服十貼常服黃礬丸護心散
六合同生丹
治前證有同生之妙
鉛粉一兩　輕粉　銀硃　雄黃　沒藥炙黃
乳香炙黃各二分五釐
右六味各擇眞正好者研爲極細末凡治其病先
用好苦茶洗淨瘡口軟絹拭乾後剖猪腰子片用
藥一二分摻腰子上却敷患上待腰子發熱如蒸
良久取去自此拔去毒氣定減痛苦瘡口出膿不
可手擠第二日依前法再敷之第三日亦敷之惡
甚可敷七八九次瘡小只敷一次可愈猪腰子不
發熱勿治矣
又方
治心胃前有漏孔久不愈幷治胃癰井疽心肝癰
鹿茸去毛酥炙微黃　附子炮去皮臍　鐘
右三味各等分爲末用瘦肉去皮核爲丸每服三
十丸空心酒下
發胃煎藥
人參　黃芪　白朮　茯苓　甘草　金銀花
連翹　生地　白芍　山梔　黃芩　天花粉
桔梗　防風　青皮　乾葛　麥冬　鼠黏子
右水煎服冬加官桂夏加黃蘗雨加澤瀉
六皮四子湯
治發肚毒
陳皮　青皮　腹皮　五加皮　薑皮　茯苓皮
花粉　蘇子　萄子　甘草　葶藶子　車前子
右水煎服
肚癰方
厚朴　砂仁　半夏　陳皮　人參　白茯苓
青皮　芍藥　木香　枳殼　甘草　甜瓜子
黃芪　白朮
右水煎服
內托流氣飲
治肋肚癰
人參　木香　黃芪　厚朴　甘草　紫蘇葉
桔梗　枳殼　官桂　檳榔　烏藥　天花粉
芍藥　白芷　川芎　防風　當歸
右薑三片棗一枚水煎服
薏苡附子敗醬散仲景
治腸癰有膿者
薏苡仁十分　附子二分　敗醬五分
右三味杵爲末取方寸匕以水二升煎減半頓服
小便當下
又方千金方下同
治前證
生地黃五兩　牡丹皮　甘草　敗醬　生薑
茯苓各二兩　桔梗　薏苡仁　麥門冬各三兩
丹參　芍藥各四兩
右十一味㕮咀以水一斗煮取二升分三服日三
又方
治前證
薏苡仁一升　丹皮　桃仁各三兩　瓜瓣仁二升
右四味㕮咀以水六升煮取二升分再服
大黃牡丹湯
治腸癰
大黃四兩　牡丹三兩　芒硝二兩　瓜子一升
桃仁五十枚
右五味㕮咀以水五升煮取一升頓服當下膿血
奪命丹
治諸般腫毒疔疽惡瘡
硃砂三錢　白礬枯　寒水石　銅綠　滴乳香
明沒藥　麝香各一錢　蝎牛三十一粒另研
蠟酥　輕粉各五分
右爲細末丸如菜豆大如不就加好酒糊每服一
丸生葱三五莖嚼極爛吐於手心包藥在內熱酒
和葱送下如重車行五七里許汗出爲效重者再
服一二丸
勝金丹
治前證
麝香　白硇砂各五分　雄黃　辰砂　滴乳香
明沒藥　血竭各錢半　全蠍泡炙　穿山甲炙
天龍去頭足炙各三錢　白殭蠶炙去絲五錢
蠟酥一錢
右爲細末和勻每服三分赤砂糖調葱頭酒送下
取汗爲度

一粒金丹

治前證

沉香　木香　滴乳香各五分　巴豆霜錢半

右爲細末和勻用黑肥棗箇半去皮搗爛爲丸如芡實大每服一丸量人虛實先呷水一口行一次胃氣壯實者只可呷水三四口不可太過後用水一口送藥下行盡數次以米飲補之

仙方活命飲

一名眞人活命飲治一切癰疽未成膿者內消已成膿者即潰止痛消毒之聖藥也

滴乳香研　防風　香白芷　赤芍藥　當歸尾

貝母　明沒藥研　皂角刺炒　花粉　甘草節

穿山甲炮各一錢　陳皮　金銀花各三錢

右爲粗末大者四兩小者二兩作一劑無灰酒十茶鍾瘡小五茶鍾入有嘴瓶內以厚紙封口勿令泄氣煎至三大鍾去滓作三次服接連不斷隨瘡上下服能飲酒者服藥後再飲三五杯忌酸薄酒鐵器服後側睡覺痛定回生

十全大補湯

治一切潰瘍幷老弱人之病

人參　肉桂　生地酒洗蒸焙　川芎　白芍炒

白茯苓　白朮土炒　黃芪鹽水拌炒　當歸酒拌

各一錢　甘草炙五分

右作一劑水二鍾薑棗煎服

十宣散

治一切癰疽

人參　當歸　黃芪製　生甘草　川芎　防風

厚朴　桔梗　官桂　白芷各一兩

右爲細末每服二錢加至六錢止熱酒調下日數服以多爲妙不飲酒者用木香濃煎湯下

封臍艾（醫林下同）

治臍腹冷痛或泄瀉

陳艾葉　蛇牀子各一兩　木鼈子二箇帶殼生用

右爲末和勻用綿包裹安在臍上以紙圈圍定以熨斗火熨之爲妙

代灸塗臍膏

治下元虛寒臍腹冷痛

大附子　馬藺子　蛇牀子　木香　吳茱萸

肉桂各等分

右爲末入白麪薑汁調稠作片貼臍上以帛包繫

定痛三香飲

治臍癰

乳香　香附　木香　延胡索　人參　黃芪

當歸　川芎　芍藥　防風　官桂　香白芷

桔梗　枳殼　烏藥　厚朴　甘草

右薑三片棗一枚煎服夏天去桂加乾葛黃芩生地麥冬

何首烏散

治臍癰

何首烏　蔓荊子　石菖蒲　荊芥穗　甘菊花

枸杞子　苦參　威靈仙各半兩

右爲細末每服三五錢食後溫酒調下或茶清或蜜水亦得日進二服

單方

心腹冷痛男子病令女人取水一盃飲之女人病令男子取水一盃飲之（肘後方）

攪腸沙痛陰陽腹痛手足冷但身上有紅點以燈草蘸油點火焠於點上（濟急方）

卒患心痛畫地作王字撮取中央土水和一升服良（陳藏器本草）

急心痛五十年陳壁土枯礬二錢爲末蜜丸艾湯服（集元方）

腸癰死人塚上土作泥塗之良（千金方）

冷熱心痛伏龍肝末方寸匕熱以水服冷以酒服（外臺秘要）

卒心氣痛鐺墨二錢熱小便調下（千金方）

中惡心痛鐺墨五錢鹽一錢同研勻熱水一盞調下（千金方）

心氣刺痛自然銅火煅酢淬九次研末酢調一字服即止（衛生易簡方）

小兒腹脹肚皮青色並用胡粉鹽熬色變以摩腹上（子母秘錄）

血氣攻心痛不可忍蓼根剉酒浸服之瘥（斗門方）

婦人心痛急者好官粉爲末葱汁和丸小豆大每服七丸黃酒送下即止粉能殺蟲葱能透氣故也（郤巢人方）

痰結胷中不散密陀僧一兩酢水各一盞煎乾爲末每服二錢以酒水各一小盞煎一盞溫服少頃當吐出痰涎爲妙（聖惠方）

心腹煩滿及胷脅痛欲死者比輪錢二十枚水五升煮三升分三服（肘後方）

急心氣痛古文錢一箇打碎大核桃三箇同炒熱入醋一椀衝服（袖驗方）

走注氣痛車缸燒赤濕布裹熨病上（千金方）

寒氣心疝三十年者射罔食茱萸等分爲末蜜丸麻子大每酒下二丸日三服劉國英所祕之方（范汪東陽方）

心痛有蟲芜花一兩醋炒雄黃一錢爲末每服一字溫醋湯下（乾坤生意）

一切心痛不拘大小男女大馬兜鈴一箇蜡上燒存性爲末溫酒服立效（摘元方）

胃痛徹背心腹痞滿氣不得通及治痰嗽大苦壞去瓤取子炒熟和殼研末麵糊丸梧子大每米飲下二三十丸日二服（袖珍方）

心痛用豨薟草搗汁醋和服之效有人服此吐蟲二條終身不發

又方當歸爲末酒調服方寸匕（外臺）

心痹心煩內熱舊根爽汁頻服（傷寒類要）

風毒攻心煩躁恍惚大豆半升淘淨以水二升煮取七合食後服之（心鏡）

腸痛如打用大豆半升熬焦入酒一升煮沸飲取醉

又方當歸爲末酒調服方寸匕（外臺）

心痹心煩內熱舊根爽汁頻服（傷寒類要）

風毒攻心煩躁恍惚大豆半升淘淨以水二升煮取七合食後服之（心鏡）

腸痛如打用大豆半升熬焦入酒一升煮沸飲取醉

附後方

夏秋之交露坐夜久腹中痞如羣石在內用大豆半升生薑八片水三升煎一升已來頓服瘥（經驗方）

心氣疼痛萊豆二十一粒胡椒十四粒同研白湯調服即止

食積心痛陳神麴一塊燒紅淬酒二大椀服之（摘元方）

冷氣心痛燒酒入飛鹽飲即止

陰毒腹痛燒酒溫飲汗出即止

中惡心痛或連腰臍鹽如雞子大青布裹燒赤納酒中頓服當吐惡物愈（袖珍方）

心腹脹堅痛悶欲死鹽五合水一升煎服吐下即定不吐更服（梅師方）

男婦心痛用硃砂明礬枯等分爲末沸湯調服（摘元方）

霍亂腹痛炒鹽一包熨其心腹令氣透又以一包熨其背（救急方）

諸心腹痛焰硝雄黃各一錢研細末每點少許入舌內名火龍丹（集元方）

心腹宿癥及卒得癥硃砂研細搜飯以雄雞一隻餓二日以飯飼之收糞曝燥爲末溫酒服方寸匕日三服服盡更作愈乃止（外臺秘要）

血痢腹痛臘粉五錢定粉三錢同研水浸蒸餅心少許和丸菉豆大每服七丸或十丸艾一團水一盞煎湯下（祕寶方）

結胃鶴頂丹不問陰陽虛實炒過陷胃瀉心等藥用銀硃半兩明礬一兩同碾以熨斗盛火炙盞盛藥鎔化急刮搓丸每服一錢眞茶入薑汁少許服之心上隱隱有聲結胃自散不動臟腑不傷眞氣明礬化痰銀硃破積故也（活幼全書）

脾疼反胃靈砂一兩蚌粉一兩同炒赤丁香胡椒各四十九粒爲末自然薑汁爽半夏粉糊丸梧子大每薑湯下二十丸（普濟方）

天行病小腹滿不得小便雄黃末蜜丸納尿孔中入半寸（肘後方）

陰毒腹痛回陽丹不灰木煅牡蠣煅高良薑炒烏頭炮白芍藥各一錢爲末入麝香少許每用一錢男用女唾調塗外腎女用男唾調塗乳上得汗即愈（王璆袖珍方）

冷氣心痛靈砂三分五靈脂一分爲末稀糊丸麻子大每服二十丸食前石菖蒲生薑湯下（直指方）

胃痹氣滿心腸不利枳實二錢麩炒微黃爲末非時以清粥飲調下二錢（聖惠方）

卒熱心痛生麻油一合服之良（肘後方）

絞腸沙痛蕎麥麵一撮炒水煮服（簡便方）

卒心氣痛粳米二升水六升煮六七沸服（肘後方）

心氣疼痛高粱根煎湯溫服甚效（袖珍方）

心痛不甚數十年者黍米淘汁溫服隨意（袖珍方）

冷氣心痛桃仁二兩去皮水研絞汁入青粱米四合煮粥常服（養老書）

蜘蛛心痛薏苡根一斤切水七升煮三升服之蟲死盡出也（梅師方）

腫滿腹大四肢枯瘦尿澀用甜葶藶炒薺菜根等分爲末煉蜜丸彈子大每服一丸陳皮湯下只二三丸小便清十餘丸腹如故（三因方）

心腹虛脹手不厥逆或飲苦寒之劑多未食先嘔不思飲食山藥半生半炒爲末米飲服二錢一日二服大有功效忌鐵器生冷（普濟方）

腹脹黃腫用亞腰壺盧連子燒存性每服一箇食前溫酒下不飲酒者白湯下十餘日見效（簡便方）

心下急痛桑耳燒存性熱酒服二錢（集簡方）

胃痹痛如錐刺不得俛仰自汗出或徹背上不治或至死可取生韭或根五斤洗搗汁服之（食療本草）

卒心急痛牙關緊閉欲絕以老葱白五莖去皮細搗膏以匙送入咽中灌以麻油四兩但得下咽即甦少

項蟲積皆化黃水而下永不再發累得救人瑞竹堂方

腹皮麻痹不仁者多煑葱白食之卽自愈危氏方

心痛吐水不下飲食發止不定雌黃二兩酢二斤慢火煎成膏用乾蒸餅和丸梧子大每服七丸薑湯下聖惠方

陰毒腹痛厥逆脣青卵縮六脈欲絕者用葱一束去根及青留白二寸烘熱安臍上以熨斗火熨之葱壞則易之良久熱氣透入手足溫有汗卽瘥乃服四逆湯若熨而手足不溫不可治活人書

胷痛瘥而復發薤根五升搗汁飲之立瘥肘後方下同

奔豚氣痛薤白搗汁飲之

積年心痛不可忍不拘十年五年者隨手見效濃煑小蒜食飽勿著鹽曾用之有效再不發也

血逆心痛生蒜搗汁服二升卽愈

鬼疰腹痛不可忍者獨頭蒜一枚香墨如棗大搗和醬汁一合頓服永類鈐方

心腹冷痛小蒜酢浸至二三年蒜食至數顆其效如神集簡方

小兒夜啼腹痛面青冷證也用大蒜一枚煨研日曝乾乳香五分同搗丸芥子大每服七丸乳汁送下得效方

臍下絞痛芥子末蜜丸梧子大井華水寅時下七丸申時再服千金方

心腹積痛三月三日采桃花曬乾杵末以水服二錢匕良食療本草

腹冷氣起白芥子一升微炒研末湯浸蒸餅丸小豆大每薑湯吞十丸甚妙續傳信方

卒患腹痛山豆根水研汁半盞服之經驗方

心腹惡痛艾葉搗汁飲之藥性論

心痞嘔噦心下痞堅用生薑八兩水三升煑一升半夏五合洗水五升煑一升取汁同煑一升半分再服千金方

腹中脹滿綿裹煨薑內下部冷卽易之梅師方

凡心胷脅下有邪氣結實硬痛脹滿者生薑一斤搗查留汁慢炒待潤以絹包於患處款款熨之冷再以汁炒再熨良久豁然寬快也陶華傷寒秘法

蚘蟲心痛吐清水七月七日採蒺藜子陰乾方寸匕日三服外臺秘要

心腹結氣杏仁桂枝橘皮訶藜勒皮等分爲丸每服三十丸白湯下無忌孟詵食療

心腹脹痛短氣欲絕者烏梅二七枚水五升煑沸納大錢二七枚煑二升半頓服之肘後方下同

卒然心痛桃仁七枚去皮尖研爛水一合服之

人有氣從臍左右起上衝胷滿氣促鬱冒厥者用梨木灰伏出雞卵殼中白皮紫菀麻黃去節等分爲末糊丸梧子大每服十丸酒下亦可爲末服方寸匕或煑湯服總錄

臍下絞痛木瓜三片桑葉七片大棗三枚水三升煑半升頓服卽愈食療

途中心痛橘皮去白煎湯飲之甚良談埜方

冷膈氣及酒食後飽滿快膈湯青橘皮一斤分作四分四兩用鹽湯浸四兩用百沸湯浸四兩用酢浸四兩用酒浸各三日取出去白切絲以鹽一兩炒微焦研末每用二錢以茶末五分水煎溫服亦可點服

卒腹痛舌上寫風字紙上寫蜈蚣二字相交吞之道藏

急心氣痛核桃一箇去殼棗子一枚去核同用紙裹煨熟以生薑湯一鍾細嚼送下永久不發名盡落湯經驗方

脾胃冷痛白艾末沸湯調服二錢易簡方

蚘蟲心痛如刺口吐清水白熟艾一升水三升煑一升服吐蟲出或取生艾搗汁五更食香脯一片乃飲一升當下蟲出肘後方

血氣脹滿劉寄奴穗實爲末每服三錢酒煎服不可過多令人吐利此破血之仙藥也易簡方

男女氣脹心悶飲食不下冷熱相攻久患不愈用厚朴薑汁炙焦黑爲末以陳米飲調服二錢匕日三服斗門方

血氣刺痛紅藍子一升搗碎以無灰酒一大升拌子曝乾重搗篩蜜丸梧子大空心酒下四十丸仲景方

小兒卒然肚皮青黑乃血氣失養風寒乘之危惡之候也大青爲末納口中以酒送下保幼大全方

又方用厚朴薑汁炙研末新汲水服二錢如神

九腫心痛及腹脅積聚滯氣筒內乾漆一兩搗炒烟盡研末酢煑麪糊丸梧子大每服五丸至九丸熱酒下簡要濟衆

心氣疼痛白芨石榴皮各二錢爲末煉蜜丸黃豆大每服三丸艾酢湯下生生編

腹中蚘蟲漏蘆爲末以餅臛和方寸匕服之外臺秘要

九種心痛當太歲上取新生槐枝一握去兩頭用水三大升煑取一升頓服千金方

胷中痰結皂莢三十挺去皮切水五升浸一夜挼取

汁慢熬至可丸丸如梧子大每食後鹽漿水下十丸
又方用半夏酢煑過以皂角膏和勻入明礬少許以
柿餅搗膏丸如彈子大噙之名釣痰膏聖惠方
腹滿癖堅如石積年不損者必效方用白楊木東枝
去粗皮辟風細剉五升熬黃以酒五升淋訖用絹袋
盛滓還納酒中密封再宿每服一合日三服外臺祕要
脾痛不止荔枝核爲末酢服二錢數服卽愈易簡方
傷寒痞滿陰病下早成痞按之虛軟而不痛檳榔枳
實等分爲末每服二錢黃連煎湯下宣明方
蛔厥腹痛已經汗下後者檳榔二兩酒二盞煎一盞
分二服龐安時傷寒論
心脾作痛雞心檳榔高良薑各一錢半陳米百粒同
以水煎服之直指
天行病四五日結胷滿痛壯熱苦參一兩以酢三升
煑取一升二合飲之取吐卽愈外臺祕要
腹內虛冷生椒擇去不折者用四十粒以漿水浸一
宿令合口空心新汲水吞下久服暖臟腑駐顏黑髮
明目令人思飲食斗門方
心腹冷痛以布裹椒安痛處用熨斗熨令椒出汗卽
止孫眞人方
冷蟲心痛川椒四兩炒出汗以酒一椀淋之只服酒
壽域神方
卒熱心痛黃連八錢㕮咀水煎熱服外臺祕要
肝火爲痛黃連薑汁炒爲末粥糊丸梧子大每服三
十丸白湯下
留飲腹痛椒目二兩巴豆一兩去皮心熬搗以棗膏
和丸麻子大每服二丸吞下其痛卽止

又方椒目十四枚巴豆一枚豉十六枚合搗爲二丸
服之取吐利肘後方
心腹冷痛胡椒三七枚清酒吞之或云一歲一粒玉詵
食療
心下大痛用川椒四十九粒乳香一錢研勻男用生
薑女用當歸酒下壽域方
又方用椒五分沒藥三錢研細分二服溫酒下
心腹冷痛吳茱萸五合酒三升煑沸分三服楊氏產乳
冷氣腹痛吳茱萸二錢擂爛以酒一鍾調之用香油
一杯入鍋煎熱傾茱萸酒入鍋煎一滾取服立止唐瑞
經驗方
腸癰已成小腹腫痛小便似淋或大便難澀下膿用
甜瓜子一合當歸炒一兩蛇蛻一條㕮咀每服四錢
水一盞半煎一盞食前服利下惡物爲妙聖惠方
腹中緊脹白糖以酒三升煑服之不過再服子母祕錄
急心疼痛用黃蠟燈上燒化丸芡子大百草霜爲衣
井水下三丸
陰毒腹痛露蜂房三錢燒存性葱白五寸同研爲丸
男左女右著手中握陰臥之汗出卽愈
心疼腹痛用五倍子生研末每服一錢鐵杓內炒起
烟黑色爲度以好酒一鍾傾入杓內服之立止經驗方下
同
腹內龜病詩云人間龜病不堪言肚裏生成硬似磚
自死殭蠶白馬溺不過時刻軟如綿神效普濟方
男婦心痛不可忍者晚蠶沙一兩滾湯泡過濾淨取
清水服卽止瑞竹堂方
陰證腹痛桑葚絹包風乾過伏天爲末每服三錢熱

酒下取汗集簡方
卒胷痹痛枳實搗末湯服方寸匕日三夜一肘後方
蚘咬心痛面青口中沫出臨死者取扁竹十斤剉以
水一石煎至一斗去滓煎如餳隔宿勿食空心服一
升蟲卽下也仍常煑汁作飯食
心脾痛芭蕉花燒存性研鹽湯點服二錢日華
傷寒後卒胷膈痹痛枳實麩炒爲末米飲服二錢日
二服濟生方
產後腹痛枳實麩炒芍藥酒炒各二錢水一盞煎服
亦可爲末服聖惠方
老幼腹脹血氣凝滯用此寬腸順氣名四炒丸商州
枳殼厚而綠背者去瓤四兩分作四分一兩用蒼朮
一兩同炒一兩用蘿蔔子一兩同炒一兩用乾漆一
兩同炒一兩用茴香一兩同炒黃去四味只取枳殼
爲末以四味煎汁煑麪糊爲丸梧子大每食後米飲
下五十丸王氏易簡方
冷熱腹痛疞刺不思飲食山梔子川烏頭等分生研
爲末酒糊丸如梧子大每服十五丸生薑湯下小腹
痛茴香湯下博濟方
腹脅刺痛因腎臟虛冷不可忍者棘鍼鉤子一合焙
檳榔二錢半水一盞煎五分入好酒半盞更煎三五
沸分二服聖惠方
卒心刺痛榔李仁三七枚嚼爛以新汲水或溫湯下
須臾痛止却呷薄荷鹽湯至寶方
胷脅氣逆脹滿茯苓一兩人參半兩每服三錢水煎
服日三聖濟總錄
卒忽心痛三年頭帶沸湯淋汁飲之以盌覆帶於閑

地周時即愈聖惠方

惡氣心痛破網巾燒灰一錢貓屍燒灰五分溫酒服馬氏方

諸蟲心痛吐清水靨靨淡羹飽食三五度即差外臺秘要

心脾氣痛氣實有痰者牡蠣煅粉酒服二錢丹溪心法

心氣疼痛眞蛤粉炒香附末等分白湯淬服聖惠方

心脾痛不止者水甲散主之用田螺殼溪間者亦可以松柴片層層疊上燒過火吹去松灰取殼研末以烏沉湯寬中散之類調服二錢不傳之妙集要

腸氣疼痛白玉散用壁上陳白螺螄燒研每服一錢酒下甚效孫氏

卒然心痛白雞一頭治如食法水三升羹二升去雞煎取六合入苦酒六合眞珠一錢煎取六合納麝香二豆許頓服之肘後方

陰毒卒痛用雄雞冠血入熱酒中飲之暖臥取汗傷寒類要

陰毒腹痛雞糞烏豆地膚子各一把亂髮一團同炒烟起傾入好酒一椀浸之去滓熱服即止生生編

小兒心痛白烏骨雞屎五錢靨研松脂五錢爲末葱頭汁和丸梧子大黃丹爲衣每酢湯服五丸忌生冷硬物三四日立效嬰童百問

心氣作痛雞子一枚打破酢二合調服肘後方

虻蟲攻心口吐清水以雞子一枚去黃納好漆入雞子殼中和合仰頭吞之蟲即出也古今錄驗

陰證腹痛面青甚者鴿子糞一大抄研末極熱酒一鍾和勻澄清頓服即愈劉氏

蛔蟲腹痛白鴿屎燒研飲和服之外臺秘要

冷氣心痛鴿屎燒存性酒服一錢即止

血氣刺痛用五靈脂生研三錢酒一盞煎數沸熱服聖惠方

卒暴心痛五靈脂炒一錢半乾薑炮三分爲末熱酒服立愈事林廣記

心脾蟲痛不拘男女用五靈脂檳榔等分爲末水煎石菖蒲調服三錢作餅用猪肉一二片海上仙方

蛔蟲攻心刺痛吐清水草龍膽一兩去頭剉水二盞煮一盞隔宿勿食平旦頓服之聖惠方

急心疼痛猪心一枚每歲入胡椒一粒同鹽酒煮食中蟲腹痛支太醫祕方以猪肝一具蜜一升共煎分二十服或爲丸服肘後方下同

胃腹冷痛猪腎一對桂心二兩水八升煮三升分三服

攪腸沙痛用母猪生兒時拋下糞日乾爲末以白湯調服

脾胃虛冷腹滿刺痛肥狗肉半斤以水同鹽豉煮粥頓食一兩頓心鏡

血氣撮痛不可忍者用黑狗膽一箇半乾半濕剖開以筯子排丸菉豆大蛤粉滾過每服四十丸以鐵淬酒送下痛立止經驗方

心氣疼痛不問遠近以山羊糞七枚油頭髮一團燒灰酒服永斷根集效方

卒心氣痛驢屎絞汁五合熱服即止肘後方

蛔蟲心痛用六畜心生切作四臠縱橫割路夾硃砂或雄黃於中吞之蟲死即愈集驗方

蛔蟲心痛熊膽一大豆和水服之大效外臺秘要

胃脘痛滿羚羊角燒末水服方寸匕子母秘錄

心痛不止敗筆頭三箇燒灰無根水服立效經驗方

急肚疼病用本人頭髮三十根燒過酒服即以水調芥子末封在臍內大汗如雨即安談苑翁方

絞腸沙痛童子小便服之即止聖惠方

卒然腹痛令人騎其腹溺臍中肘後方

小兒腹痛蠐螬炙芍藥等分各二錢爲末每用一字乳汁調下聖惠方

腹中冷癖水穀壅結心下停痰兩脅痞滿鳴轉逆害飲食大蟾蜍一枚去皮腸支解之芒硝强人一升中人七合弱人五合水七升煮四升頓服得下爲度腹大如箕用蜈蚣三五條酒炙研末每服一錢以雞子二箇打開入末在內攪勻紙糊沸湯煮熟食之日一服連進三服瘳活人心鏡

陽毒結胃按之極痛或通而復結喘促大躁狂亂取生地龍四條洗淨研如泥入生薑汁少許蜜一匙薄荷汁少許新汲水調服若熱熾者加片腦少許即與揉心下片時自然汗出而解不應再服一次神效傷寒類要

凡心下硬按之則無常覺膨滿多食則吐氣引前後噫呃不除由思慮過多氣不以時而行則結滯謂之結氣人參一兩橘皮去白四兩爲末煉蜜丸梧子大每米飲下五六十丸聖惠方

胃滿不痛用桔梗枳殼各等分水二鍾煎一鍾溫服活書人

脾寒氣發歇痛不可忍者茱萸桃仁各一兩和炒令茱萸焦黑後去茱萸取桃仁去皮尖研細葱白三莖煨以酒浸溫分三服（君藏方）

心痛累效方冰梅一箇去核生硫黃爲末相和搗勻以可丸爲度作一丸白湯下立愈病不再作

治內癰未作頭者用伏雞屎服之即瘥（千金方下同）

脾冷腹痛嘔吐乾薑炒三錢甘草炙半錢棗一枚同煎服或爲末和飲服（直指方）

又方鶴蝨苦酒空腹服方寸匕佳

又方七月七日採蒺藜子陰乾燒灰先食服方寸匕日三即瘥

疰心痛用桃白皮煮汁空腹以意服（崔氏）

暴心痛苦參十斤㕮咀以水一石煮取二斗去滓下苦酒一斗更煮取五升加大黃末熬和汁中煎令可丸併手丸之如梧子大每服以酒一升進三四十丸日一當倒腹吐不吐下利更酒漬苦參二斤浸久彌佳非止暴痛凡是腹中之疾悉主之又治宿冷血結陰癖類用有效大良

又方桂心一兩㕮咀以水四升煮取一升半分三服

蟲心痛用鶴蝨爲末蜜丸如梧子大服四十丸蜜湯下日一服可加至五十丸慎酒肉

腸癰雄雞頂上毛并屎燒存性爲末空心酒服之

又方截取櫓頭尖少許燒灰水和服當作孔出膿血取愈

凡腸癰其狀兩耳輪文理甲錯初患腹中苦痛或繞臍有瘡如聚皮熱便膿血出似赤白下不治必死方

用馬蹄灰以雞子白和塗即拔氣不過再

內癰馬牙灰以雞子白和塗之乾則易

腸癰瓜子仁三升搗末以水三升煮取一升五合分作三服

寸白蟲心胃痛很牙五兩搗末蜜丸麻子大隔宿不夜食明旦以漿水下一合服盡愈

一切心痛無問新久生地黃一味隨人所食多少搗汁攪麪作餺飥或冷淘食良久當利出蟲（海上方）

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百五卷目錄
醫部彙考一百八十五
胃腹門六
鍼灸
導引
醫案

藝術典第二百五卷
醫部彙考一百八十五
胃腹門六
鍼灸

素問曰中滿者瀉之於內
心病者胃中痛脅支滿脅下痛膺背肩胛間痛虛則胃腹大脅下與腰相引而痛取其經少陰太陽舌下血者其變病刺郄中血者
病痛者陰也痛而以手按之不得者陰也深刺之
胠絡季脅引少腹而痛脹刺譖譖
肝病者兩脅下痛引少腹令人善怒取其經厥陰與少陽
脾虛則腹滿腸鳴飧泄食不化取其經太陰陽明少陰血者
腎病者腹大脛腫喘欬身重寢汗出憎風虛則胃中痛大腹小腹痛清厥意不樂取其經少陰太陽血者
陽明之厥則癲疾欲走呼腹滿不得臥面赤而熱妄見而妄言太陰之厥則腹滿嗌脹後不利不欲食食則嘔不得臥少陰之厥則口乾溺赤腹滿心痛厥陰之厥則少腹腫痛腹脹涇溲不利好臥屈膝陰縮腫脈內熱盛則瀉之虛則補之不盛不虛以經取之
太陰厥逆脈急攣心痛引腹治主病者
厥陰厥逆攣腰痛虛滿前閉譫言治主病者
手太陰厥逆虛滿而欬善嘔沫治主病者
少陰厥逆虛滿嘔變下泄清治主病者
靈樞經曰心痛引腰脊欲嘔取足少陰
心痛腹脹膚膚然大便不利取足太陰
心痛引背不得息刺足少陰不足取手少陽
心痛引小腹滿上下無常處便溲難刺足厥陰
心痛但短氣不足以息刺手太陰
心痛當九節刺之按已刺按之立已不已上下求之得之立已
厥心痛與背相控善控如從後觸其心偃僂者腎心痛也先取京骨崑崙發鍼取然谷
厥心痛腹脹胃滿心尤痛甚胃心痛也取之大都太白
厥心痛痛如以錐刺其心心痛甚者脾心痛也取之然谷太谿
厥心痛色蒼蒼如死狀終日不得太息肝心痛也取之行間太衝
厥心痛臥若徙居心痛間動作痛益甚色不變肺心痛也取之魚際太淵
心痛不可刺者中有盛聚不可取於腧
腸中有蟲瘕及蛟蛕皆不可取以小鍼心腸痛懷作痛腫聚往來上下行痛有休止腹熱喜渴涎出者是蛟蛕也以手按聚而堅持之無令得移以大鍼刺之久持之蟲不動乃出鍼也巷腹懷痛形中上者
小腸控睾引腰脊上衝心邪氣盛則厥逆上衝腸胃熏肝散於肓結於臍故取之肓原以散之刺太陰以予之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以調之
大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感於寒即泄當臍而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉
胃病者腹膜脹胃脘當心而痛上支兩脅鬲咽不通食飲不下取之三里也
小腸病者小腹痛腰脊控睾而痛取之巨虛下廉
膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之即欲小便而不得取委中央
三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢則水留即爲脹取委陽
邪在胃則病肌肉痛陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹痛皆調於三里
邪在腎則病骨痛陰痹腹脹腰痛大便難取之湧泉
崑崙視有血者盡取之
邪在心則病心痛喜悲時眩仆視有餘不足而調之其輸也
腹中常鳴氣上衝胸喘不能久立邪在大腸刺肓之原巨虛上廉三里
厥逆腹脹滿腸鳴胃滿不得息取之下胃二脅欬而動手者與背腧以手按之立快者是也
厥而腹鬻鬻然多寒氣腹中穀穀便溲難取足太陰腹滿食不化腹鬻鬻然不能大便取足太陰

邪之所在皆爲不足中氣不足漫便爲之變腸爲之苦鳴補足外踝下留之

甲乙經曰胃滿痛噦噫主之

暴脹胃脘檔滿足寒大便難面脣白時時嘔血太衝主之

胃脘檔滿痛引胃中華蓋主之

胃脘檔滿痹痛骨疼飲食不下嘔逆上氣煩心紫宮主之

胃中滿不得息脅痛骨疼喘逆上氣嘔吐煩心玉堂主之

胃脘背相引痛心下胃中嘔吐多睡飲食不下幽門主之

胃脘檔滿痛引膺不得息悶亂煩滿不得飲食靈墟主之

胃中暴滿不得眠輸筋主之

胃脘檔滿寒如風吹狀俠谿主之

胃脘檔滿劫引背痛臥不得轉側胃鄉主之

大氣不得息息卽胃脘中痛實則其身盡寒虛則百節盡縱大包主之

胃滿善太息胃中膨膨然丘虛主之

胃中痛天容主之

胃脘檔滿勞宮主之

胃痹引背時寒間使主之

胃滿不得息頸頷腫陽谷主之

胃脘檔滿腸塞飲食不下嘔吐食後還出中庭主之

胃脘滿頭痛項內寒熱外丘主之

胃脘檔滿痺

主胃脘支滿
大杼及心腧主胃中鬱鬱
本神及顱息主胃脘相引不得傾側
天樞主腹脹腸鳴氣上衝胃
氣衝主胃腹中大熱不安腹有大氣暴脹滿鬱閉淫
濼
神堂主胃腹滿
三間主胃滿腸鳴
陽谿及天容主胃滿不得息
期門及缺盆主胃中熱息賁脘下氣上
曲池及人迎與神道章門中府臨泣天池璇璣府輸
主胃中滿
支溝主胃腋急痛
豐隆及丘墟主胃痛如刺
臨泣主季脘支痛胃痹不得息
陽輔主胃脘痛
陽交主胃滿腫
環跳及至陰主胃脘痛無常處腰脘相引急痛
太白主胃脘脹切痛
然谷主胃中寒欬唾有血
大鍾主胃喘息脹
膽腧及章門主脘痛不得臥胃滿嘔無所出
大包主胃脘中痛
膻中及天井主胃心痛
華蓋及紫宮中庭神藏靈墟胃脘俠谿步郎商陽上
廉三里氣戶周榮上脘勞宮涌泉陽陵泉主胃脘拄
滿
膺窗主胃脘癰腫
乳根主胃下滿痛
雲門及中府隱白期門肺腧魂門大陵主胃中痛又
云雲門主胃中暴逆
鳩尾主胃滿欬逆
巨闕及間使主胃中澹澹又云主胃痹背相引
大衝主藏瘦恐懼氣不足腹中悒悒
梁門主胃下積氣
大泉主胃滿呼胃膺痛
魚際主痹走胃背不得息
經渠及丘墟主胃背急胃中膨膨
少衝主胃痛口熱凡胃滿短氣不得汗皆鍼補手太
陰以出汗
心病支溝及太谿然谷主心痛如錐刺甚者手足寒
至節不息者死又云然谷主心如懸少氣不足以息
大都及太白主暴泄心痛腹脹心痛尤甚
臨泣主胃痹心痛不得反側
行間主心痛色蒼蒼然如死灰狀終日不得太息
通谷及巨闕及太倉與心腧膻中神府主心痛
通里主卒痛煩心心中懊憹數欠類伸心下悸悲恐
期門及長強及天突俠白中衝主心痛短氣
尺澤主心痛膨膨然心煩悶亂少氣不足以息
腎腧及復溜及大陵及雲門主心痛如懸
章門主心痛而嘔
通里主心痛上搶心不欲食
少衝主心痛而寒
大泉主心痛肺脹胃氣上逆
鳩尾主心寒脹滿不得食息賁吐血厥心痛善噦心
疝太息
上脘主心痛三蟲多涎不得反側
中脘主心痛難以俛仰
不容及期門主心切痛喜吐酸
胃門主心下大堅
靈道主心痛悲恐相引癲癎
間使主心懸如饑
郄門及曲澤大陵主心痛
商丘主心下有寒痛又主脾虛令人病不樂好太息
凡卒心痛汗出刺大敦出血立已
內關主凡心實則心中暴痛虛則心煩惕然不能動
失智
腹病復留及中封腎腧承筋陰包承山大敦主小腹
痛又云復留主腹厥
石門及商丘主小腹堅痛下引陰中
氣海主小腹疝氣遊行五藏腹中切痛
關元及委中照海太谿主小腹熱而偏痛
腸腧及陰谷主腹脹胃脘暴痛及腹積聚肌肉痛
高曲（一名商曲）主腹中積聚時切痛
四滿主腹僻切痛
天樞外陵主腹中盡痛
巨嚴主腹痛喘暴滿
氣衝主身熱腹痛
腹結主繞臍痛搶心
衝門主寒氣滿腹中積痛淫濼
隱白主腹中寒冷氣脹喘

鳩尾主腹皮痛搔癢
中極主腹中熱痛
水分及石門主小腹中拘急痛
巨闕及上脘石門陰交主腹中滿暴痛汗出
行間主腹痛而熱上注心心下滿
太谿主腹中相引痛
湧泉主風入腹中小腹痛
豐隆主胃痛如刺腹若刀切痛
中極主小腹積聚堅如石小腹滿又云中極主寒中腹脹
通谷主結積留飲癖囊胃滿飲食不消
上脘主心下堅積聚冷脹
胃脘及三焦腧主小腹積聚堅大如盤胃脹食飲不消
三里及章門京門厲兌內庭陰谷絡郄崑崙商丘陰谷曲泉陰陵泉主腹脹滿不得息又云陰陵泉主腹中脹不嗜食脅下滿腹中盛水脹逆不得臥又云商丘主腹中滿轟轟然不便心下有寒痛
期門主腹大堅不得息脹癖滿小腹尤大太陰郄主腹滿積聚
解谿主腹大下重又云解谿主厥氣上往腹大
中脘主腹脹不通痓大便堅憂思損傷氣積聚腹中甚痛作膿腫往來上下
水道主小腹脹滿痛引陰中
日月及大橫主小腹熱欲走太息
巨闕及上管主腹脹五臟脹心腹滿
五里主心下脹滿而痛上氣

太白及公孫主腹脹食不化鼓膜腹中氣大滿
蠡溝主數嘔恐悸氣不足腹中悒悒
凡腹滿痛不得息正仰臥屈一膝伸一脚並氣衝鍼入三寸氣至瀉之
灸臍中治腸中常鳴氣上衝心禁鍼
陰交主腸鳴濯濯如有水聲
陰都主心滿氣逆腸鳴
治腸中雷鳴相逐痢下灸承滿五十壯穴在俠巨闕相去五寸巨闕在心下一寸灸之者俠巨闕兩邊各開二寸半
漏谷主腸鳴强欠心悲氣逆腹脹滿急
陷谷溫留漏谷復留陽綱主腸鳴而痛
膺窓主腸鳴泄注
太白公孫主腸鳴
灸腸癰法屈兩肘正灸肘頭銳骨各百壯則下膿血卽瘥
李杲十書曰胃脘痛取期門沿皮二寸支溝膽俞沿皮一寸五分
胃脘暴痛膺中堅痛取石門商丘陰谷大腸俞隔俞朱震亨心法曰卒心痛不可忍吐冷酸水及原臟氣少灸足大指大指內約文中各一壯如小麥大下火立瘥
醫學綱目曰內經灸刺胃痛有四其一取心經云心痛者胃中痛脅支滿脅下痛膺臂肩胛間痛兩肘臂內痛實則胃腹大脅下與腰相引而痛取其經少陰太陽舌下血者其變病刺郄中血者是也
其二取腎經云腎虛則胃中痛大腹小腹痛取其經少陰太陽血者按刺法不分補瀉但言取血王註謂先取血脈後調虛實也
其三取膽經云膽足少陽脈所生病者胃脅肋髀膝外皆痛詳盛虛熱寒陷下取之也
其四取筋經云手心主之筋其病當所過者支轉筋前及胃痛息賁治在燔鍼刼刺以知爲數以痛爲輸又足太陽之筋足少陽之筋痛皆引胃痛治在燔鍼刼刺以知爲數以痛爲輸也
內經灸刺胃滿有三法其一取氣海經云膻中者氣之海其輸上在手柱骨之上下前在於人迎氣海有餘者氣滿胃中悅息面赤審守其輸而調其虛實無犯其害是也
其二取肝經云肝足厥陰脈所生病者胃滿嘔逆飧瀉狐疝遺溺閉癃詳盛虛熱寒陷下取之也
其三取胃經云厥逆腹滿面腫脣漯漯然暴言難甚則不能言取足陽明是也
傷寒結胃先使人刺心蔽骨下正使名曰雙關大刺左行間左一壁結胃立效右畔依上法刺之慢慢呼吸停鍼卽時愈
心胃痞取涌泉太谿中衝大陵隱白太白少衝神門
結胃身黃取涌泉
胃脘痛不堪取期門四分章門六分灸七壯至七七壯又取行間丘墟涌泉
胃滿血膨取期門一分沿皮向外一寸五分瀉之
心痛引背灸刺法有四其一取足太陽經刺節云取京骨昆崙者是其穴也蓋足太陽之正循膂當心入散絡故心痛引背取之也

其二取足少陰刺節云取京骨崑崙不已取然谷者是其穴也又經云腎足少陰之脈所生病者煩心心痛視盛虛熱寒陷下取之也又經云心痛引腰脊欲嘔取足少陰者是也蓋足少陰脈貫脊絡心故亦治心痛引背也

其三取足少陽經云心痛引背不得息刺足少陰不已取少陽者是也蓋手少陽之脈散絡心脈又三焦下俞曰委陽是足太陽絡足太陰循胷當心入散絡故亦治心痛引背也

其四取督任脈經云背與心相控而痛所治天突與十椎及上紀上紀者胃脘也下紀者關元也又云心痛當九節刺之按已次按之立已不已上下求之得之立已者是也蓋十椎與九節者督脈也胃脘與天突者任脈也

心痛兼脹灸刺法有二其一取足太陰經云取大都太白者是其穴也又經云脾足太陰之脈是動則病胃脘痛腹脹所生病者煩心心下急痛者視盛虛熱寒陷下取之又云心痛腹脹善噫然大便不利取足太陰者是也蓋足太陰脈從貫上膈注心中故心痛腹脹者取之也

其二取足陽明經云厥病者腹脹胃脘當心而痛飲食不下取之三里者是也蓋胃脘當心痛者似心痛實非心痛也

九種心痛取間使靈道公孫太衝足三里陰陵泉

卒心痛不可忍取上脘八分先補後瀉覺針下氣行如涼雞子入腹爲度次取氣海湧泉無積者刺之如食頃有積者先飲利藥刺之立已不已再刺間使支溝三里

胃脘痛取足三里

病在膺必灸刺魂門

手心主之病實則心痛取內關

心脾痛取巨闕上脘中脘

蟲心痛灸上脘中脘陰都

蟲心痛取期門

內經刺灸腹痛有四法其一取脾胃經曰邪在脾胃陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹痛皆調於三里

又云足太陰之別名曰公孫去本節之後一寸實則腹中切痛取之所別也又云腹痛刺臍左右動脈已刺按之立已不已刺氣衝已刺按之立已是也

其二取大腸經云大腸病者腸中切痛而鳴濯濯感於寒即泄當臍而痛取巨虛上廉是也

其三取督脈經云腎虛則胷中痛大腹小腹痛清厥意不樂取其經少陰太陽血者是也

其四取任脈經云任脈之別名曰尾翳下鳩尾散於腹實則腹皮痛取之所別也

絞腸沙手足厥冷腹痛不可忍者以手蘸溫水於病者臍灣內拍打有紫黑處以鍼刺去惡血即愈

腹痛幷氣塊痛取內關支溝照海

氣痛幷積痛食不化取氣海一寸半灸五十壯中脘二寸半灸十壯隱白二分瀉之灸七壯

又法取巨闕足三間怪穴

腹痛腸鳴取氣衝入二寸半灸五十壯

臍腹痛取陰陵泉太衝三里支溝不已取中脘關元天樞繞臍痛公孫三陰交陰谷

內經鍼灸腸鳴有三法其一補脾經云脾虛則腹滿腸鳴飧泄食不化取其經太陰陽明少陰血者是也其二補足太陽經云中氣不足腸爲之苦鳴補足外踝下留之申脈穴也入五分

其三取太陽經云腸中雷鳴氣上衝胷邪在大腸肓之原巨虛上廉二里是也

導引

保生祕要曰心邪用一指認眞尻尾穴而行泄法後二指用胷至胷分之

運功守黃庭或歸元注念太乙救苦默呪以正其心邪自不見

心痛其機在目兩眼看湧泉念或從痛處推下大腸九曲去

心頭冷積想兩手用力推開心頭至臍轉行周天法即愈

胃管疼痛於足三里掐之九九療之九九

運功行歸元逐痛處流行胃火自然發散

胷腹脹悶雙手交叉低頭觀臍以兩手貼胷口將身往下不論數推拂能寬胷脹止腹疼兼後運功自效

運功先定歸元後行斡旋至胷前推散左右分開如未通暢以艮背佐之無不效矣

腹痛先念痛處想火燒之

腹熱或疼念臍圈自小而大又自大而小圈於臍上腹皮痛患處先推散兩旁然後想水洗之復行周天

法

中脘氣脹須簡煩省思去怒便不滯於胃腑而火自然流行如不進飲食須降氣安心而食自進或病後而發過熱渴飲之太多二者不能以前法議只可通其二便或開其腠理微漐汗亦消水脹之疾通便之法須摩臍輪井摩腎腧二處仍吹噓其氣十二徧

醫案

瘡瘍全書曰一人腹中如鐵石臍中出水旋變作蟲行之狀繞身匝臍癢痛難忍扒搔不盡濃煎蒼朮湯浴之以蒼朮加麝香水調服之瘥

儒門事親曰沈丘王宰妻胃腑不利口流白沫自言咽下胃中常雷聲心間作微痛又復發昏胃乳之間炙瘕如碁化痰利膈等藥服之三載病亦依然其家知戴人吐藥無損來求之一涌而出雪白蟲一條長五六寸有口鼻牙齒走於涎中病者忽而斷之中有白髮一莖此正與徐文伯所吐宮人髮瘕一同蟲出立安

一將軍病心痛不可忍戴人曰此非心痛也乃胃脘當心痛也內經曰歲木太過風氣流行民病胃脘當心而痛乃與神祐丸一百餘粒病不減或問曰此胃脘有寒宜溫補將軍素知戴人明了復求藥於戴人戴人復與神祐丸二百餘粒作一服大下六七行立愈

一人病心胃疼悶不欲食飲身體壯熱口燥舌乾大小便不利有一工治之謂下元虛冷便投煖藥十數服其病不愈又一醫所論與前亦同又投煖藥五七日其證轉加困弱余審問日數飲食大小便何似小便赤色大便黑色此乃傷寒瘀血之證宜用大黃芍藥湯二劑次日用犀角地黃湯二劑後日用通經丸一服換過大便黃色以爲效驗此藥服十餘貼方可獲瘥可誤用煖劑哉

酒官楊仲仁病心氣痛此人常好飲酒初飲二三杯必奔走三五十次其酒稍散方能復席飲至前量醉後至明旦嘔清黃水數口夜變魚腥臭六七日始安戴人曰宜吐乃吐蟲一條青黃色長六七寸口目鼻俱全二目膜瞞狀如蚍類楊醜乾示人

李杲十書曰一婦人重娠六箇月因慟哭口吸風寒忽病心痛不可忍渾身冷氣欲絕曰此乃客寒犯胃故胃脘當心而痛急與草豆蔻半夏乾生薑炙甘草益智仁之類或曰半夏有小毒重娠服之可乎曰乃有故而用也岐伯曰有故無殞故也服之愈

朱震亨心法曰監縣之閻年五十餘春末心脾疼腹脹滿手足寒過肘膝須綿裹火烘胃稔長熱却喜狀露得風涼則快脈皆沈細而澀稍重則絕輕取似弦而短口渴乾而喜熱飲穀肉全不食遂以草豆蔻丸三倍加黃連滑石炒神麴爲丸白朮爲君茯苓爲佐陳皮爲使作湯送下一百丸服至二斤諸證皆愈

許文懿公因飲食作痰成心脾痛後觸風雪腿骨痛醫以黃芽歲丹烏附治十餘年艾灸萬計又冒寒而痛加胯難開合脾疼時胯稍輕胯痛則脾疼止此初因中脘有食積痰飲續冒寒濕鬱遏經絡氣血不行津液不通痰飲注入骨節往來如潮湧上則爲脾疼降下則爲胯痛須湧泄之以甘遂末一錢入猪腰子內煨食之連泄七行足便能步後嘔血大作不食煩躁氣弱不語記金匱云無寒熱而短氣不足以息者實也其病多年鬱結一旦泄之徒引動其猖獗之勢無他少制御之藥故也仍以吐劑達其上焦次第及其中下二集連日用瓜蒂藜蘆苦參等藥俱吐不透而噦躁愈甚乃用附子尖三枚和聚水以蜜飲之方大吐膠痰一大桶以矸硝滑石黃芩石膏連翹等一斤濃煎置井中極冷飲之四日服四斤後腹微痛二便秘脈厥至於卯酉時予謂卯酉爲手足陽明之應此乃胃與大腸有積滯未盡當速瀉之諸醫咸阻乃作紫雪二日服至兩服稍安後又小便閉痛飲以薤蔔子汁得吐立通又小腹滿痛以大黃牽牛等分水丸服至三百丸下如爛魚腸者二升許脈不歇又大便迸痛小腹滿悶又與前丸藥百粒腹大絞痛腰胯重眼火出不言語瀉下穢物如柏油條一尺許肛門如火以水沃之自病半月不食不語至此方啜稀粥始有生意數日平安自嘔吐至安日脈皆平常弦大次年行倒倉法全愈

一人以酒飲牛乳患心痛年久無汗醫多以丁附贏弱食減每痛以物拄之脈遲弦而濇又苦吞酸以二陳加芩連白朮桃仁柳李仁澤瀉每旦服之湧出酸苦黑水井如爛木耳者服至二百餘貼脈濇退至添純弦而漸充滿時令暖意其欲汗而血氣未充以參朮歸芍陳皮半夏甘草痛緩與麻黃蒼朮芎歸幾下咽忽遲厥須臾而甦大汗痛止

一童子久瘧方愈心脾痛六脈伏痛減時氣口緊盛餘部弦而實意其宿食詢之果傷冷油麪食以小胃丹津嗓下十餘粒禁食三日與藥十二次痛止後又與穀太早忽大痛連宵乃禁食亦不與藥蓋宿食已消今因新穀與餘積相迸而痛若再藥攻必傷胃氣至夜心嘈索食先以白朮黃連陳皮丸服之以止其嘈此非饑也乃餘飲未了因氣而動耳若與食復痛詢其饑作膈間滿悶又與前丸子一晝夜不饑而昏睡後少與粥漸安

一婦因久積憂患後心痛食減羸瘦渴不能飲心與頭更換而痛不寐大便燥結以四物加陳皮甘草百餘貼未效予曰此肺久爲火所鬱氣不得行血亦蓄寒遂成汚濁氣壅則頭痛血不流則心痛通一病也治法當自愈遂放東垣清空膏例以黃芩細切酒浸透炒赤色爲細末湯下頭稍汗十餘貼汗漸通身愈因其膝下無汗瘦弱脈濇小便數大便澀當補血以防後患以四物湯加陳皮甘草桃仁酒芩服之愈

一婦春末心脾疼自言腹脹滿手足寒時膝須綿裹火烘胃畏熱喜掀露風凉脈沉細濇稍重則絕輕似弦而短渴喜熱飲不食以草豆蔻仁三倍加黃連滑石神麯爲丸以白朮爲君茯苓爲佐陳皮爲使作丸湯下百丸至二斤而安

一男子年十八歲自小面微黃五月間腹大痛醫者與小建中湯加丁香兩貼不效加嘔吐清汁又與十八味丁沉透膈湯兩貼食全不進痛無休止臥不能起如此五六日又與阿魏丸百餘粒至夜發躁不得睡口却不渴予脈之左三部沉弦而數關部尤甚右三部沉滑而數實痛處不可按遂與大柴胡湯四貼加甘草下之痛嘔雖減食猶未進遂與小柴胡湯去黃芩人參加芍藥陳皮黃連生甘草二十貼而愈

井竈渠吳孺人年近四十得腹隱痛常以火燒磚瓦熨之面與胃禁間惡火之熱氣發時少煩食亦減六脈和皆微弦最苦夜間不得睡但世上凶惡之事并憂苦境像皆上念時作惡泣說離別囑付後事如此者一年衆作心痛治之自覺氣自下衝雖久病人却不瘦予曰此肝受病遂與防風通聖散吐之時尚春寒於通聖散中加桂入薑汁調之日三四次至初夏稍熱與當歸龍膽丸枳朮丸一月而愈

一婦形瘦色嫩味厚幼時曾以火烘濕鞋濕氣上襲致吐清水吞酸服丁香熱藥時作時止至是心疼是痞塊略吐食脈皆微弦重似濇輕稍和與左金丸三四十粒薑湯下三十餘次食不進予曰結已開矣且止藥或思飲與水間與青綠丸脈弦漸添與人參酒芍藥引金瀉木漸思食若大便祕以生芍藥陳皮桃仁入參爲丸與之又以蜜導便通食進

一老人心腹大痛昏厥脈洪大食不勝一味攻擊之藥用四君子加川歸沉香麻黃服愈

衛生寶鑑曰漕運使崔君長男雲卿年二十五體本豐肥奉養膏粱時有熱證友人勸食寒凉物因服寒藥至元庚辰秋瘧發醫以砒霜等藥治之新汲水下禁食熱物瘧病未除反添吐瀉脾胃復傷中氣愈虛腹痛腸鳴時復胃脘當心而痛不任其苦屢醫未效至冬不瘥延至四月間勞役煩勞過度前證大作請予治之診視脈得弦細而微手足稍冷面色青黃不澤情思不樂惡人煩冗飲食減少微飽則心下痞悶嘔吐酸水每發作冷汗時出氣促悶亂不安須人顧相抵而坐少時易之予思內經云中氣不足溲便爲之變腸爲之苦鳴下氣不足則爲痿厥心冤又曰寒氣客於腸胃之間則卒然而痛得熱則已非甘辛大熱之劑則不能愈遂製扶陽助胃湯三服大勢去痛減半至秋先灸中脘三七壯以助胃氣次灸氣海百餘壯生發元氣滋榮百脈以還少丹服之喜飲食添肌肉皮膚潤澤明年春灸三里二七壯少助胃氣引氣下行又以芳香助脾服育氣湯加白檀平治之戒以懲慾窒慾慎言語節飲食一年而平復

眞定趙客乙丑歲六月間客於他方因乘困傷濕麪心下痞滿躁熱時作臥不安遂宿於寺中僧以大毒之藥數丸下十餘行心痞稍減越日困睡爲盜劫其財貨心有所動遂躁熱而渴飲冷酒一大甌是夜臍腹脹痛僧再以前藥復下十餘行病加困篤四肢無力躁熱惡衣喜飲冷水米穀不化痢下如爛魚腸腦赤水相雜全不思食强食則嘔痞甚於前噫氣不絕足胕冷少腹不任其痛請予治之診其脈浮數八九至按之空虛予泝流而尋源蓋暑天之熱已傷正氣以有毒大熱之劑下之一下之後其所傷之物已去而無餘矣遺巴豆之毒氣於腸胃之間使嘔逆而不能食胃氣轉傷而然及下膿血無度大肉陷下皮毛枯槁脾氣弱而衰舌上赤澀口燥咽乾津液不足下多亡陰之所致也陰既已亡心火獨旺故心胃躁熱煩亂不安經曰獨陽不生獨陰不長天之由也遂辭而退後易他醫醫至不審其脈不究其源惟見痞滿

以枳殼丸下之病添喘滿利下不禁而死

眞定一秀士年三十一肌體本弱左脅下有積氣不敢食冷物覺寒則腹痛或嘔吐清水脘運欲倒目不敢開惡人煩冗靜臥一二日及服辛熱之藥則病退延至至元甲戌秋初因勞役及食冷物其病大作腹痛不止冷汗自出四肢厥冷口鼻氣亦冷面色青黃不澤全不得臥扶几而坐咳嗽咽膈不利予與藥服之見藥則吐藥不得入無如之何遂以熟艾約半斤用白紙一張鋪於腹上紙上攤艾令勻又以慈葱數枝批作兩半片鋪於熟艾上再用白紙一張覆之以慢火貯熨斗內熨之冷則易之覺腹中熱腹皮暖不禁以帛三搭繞帶繫之待冷方解初熨時得暖則痛減大暖則痛止至夜得睡翌日再與對證藥服之良愈

癸丑歲予隨王府承應至瓜忽都地面住冬有搏兔赤馬剌約年三旬有餘因獵得兔以火炙食之各人皆食一枚惟馬剌獨食一枚半抵暮至營極困倦渴飲潼乳斗餘是夜腹脹如鼓疼痛悶亂臥而欲起起而復臥欲吐不吐欲瀉不瀉手足無所措舉家驚慌請予治之具說飲食之由診其脈氣口大一倍於人迎乃應食傷太陰經之候也右手關脈又且有力蓋燒肉乾燥因而多食則致渴飲乾肉得潼乳之濕是以盜滿於腸胃非峻急之劑則不能去遂以備急丸五粒覺腹中轉失氣欲利不利復投備急丸五粒又與無憂散五錢須臾大吐又利十餘行皆物與清水相合而下約二斗餘腹中空快漸漸氣調至平旦以薄粥飲少少與之三日後再以參朮之藥調其中氣七日而愈或曰用峻急之藥汝家平日所戒今反用之何也予對曰理有當然不得不然內經曰水穀入口則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛更虛更實此腸胃傳化之理也今飲食過節腸胃俱實胃氣不能腐熟脾氣不能運化三焦之氣不能升降故成傷也大抵內傷之微者但滅食一二日自消若傷之重者以藥內消之傷之大重者以藥下之若藥不瞑眩厥疾不瘳峻急之劑何不可用之有或者然之

至元戊寅五月間積雨不止魯齋許平仲先生時年五十有八面目肢體浮腫大便多溏腹脹腸鳴時痛飲食減少命予治之脈得弦細而緩先生曰年壯時多曾服牽牛大黃藥面目四肢時有浮腫今因陰雨故大發予曰營運之氣出自中焦中焦者胃也胃氣弱不能布散水穀之氣榮養藏腑經絡皮毛氣行而濕故爲浮腫大便多溏而腹脹腸鳴皆濕氣勝也四時五藏皆以胃氣爲本五藏有胃氣則和平而身安若胃氣虛弱不能運動滋養五藏則五藏脈不和平本藏之氣盛者其脈獨見輕則病甚過則必死故經曰眞藏之脈弦無胃氣則死先生之疾幸而未至於甚尚可調補人知服牽牛大黃爲一時之快不知其爲終身之害也遂用平胃散加白朮茯苓草豆蔻仁數服而腹脹溏瀉腸鳴時痛皆愈飲食進止有肢體浮腫以導滯通經湯主之良愈

醫學綱目曰予少年時曾患膨腹疾痛初不疑其虛徧服諸家藥無效遂自診之覺是虛證合本事方半夏生薑陳皮桂心吳萸一劑服未至半劑頓愈

一男子腸鳴食少臍下有塊耕動若得下氣多乃已已而復鳴醫用疏氣藥與服半年不效予用參朮爲君甘草連芩枳殼乾薑爲臣一貼腸鳴止食進又每服吞厚朴紅豆丸其氣耕亦平經云脾胃虛則腸鳴腹滿又云中氣不足腸爲之苦鳴此之謂也

醫學正傳云山頭沈三十一丈年三十餘身材肥盛夏秋間因官差丈量田地辛苦至冬間得疳滿證兩脅氣攻胃中鬱悶不能臥欲成脹滿證歷數醫皆用疏氣耗散之藥不效三月初旬名予診治兩手關前皆浮洪而弦濟兩關後脈皆沉伏予曰此膈上有痰痰脾土之氣敦阜肝木鬱結而不伸當用吐法木鬱達之也奈冬月降沉之令未可行此法且與豁痰疏肝氣瀉脾胃敦阜之氣用平胃散加半夏茯苓青皮川芎龍膽香附砂仁柴胡黃連苦蔞子等藥病退十之三四待次年二月初爲行倒倉法平安

薛己醫案曰唐儀部胃內作痛月餘腹亦痛左關弦長右關弦緊面色黃中見青此脾虛肝邪所乘以補中益氣加木香半夏二劑而愈又用六君子湯二劑而安

一人年踰四十胃患瘡成漏日出膿椀許喜飲食如常用十全大補湯加遠志貝母白蘞續斷灸以附子餅膿漸少調護歲餘而愈

一少婦胃脘間潰一竅膿血與口中所飲相應而出以參芪當歸加退熱排膿等藥而愈或曰此因肺癆所致

一人胃腫一塊半載不消令灸百壯方潰服大補藥不效灸附子餅而愈

一百戶胃患毒腫高聳赤發熱脈數大小便澀飲食

如常齊氏曰腫起色赤寒熱疼痛皮膚壯熱頭目昏重氣血實也又曰大小便澀飲食如故腹滿膨脹胃脇痞悶肢節疼痛身熱脈大精神昏冒臟腑實也進黃連內疏湯一劑諸證悉退更以荊防敗毒散加黃芩山梔四劑稍愈再以四物加芩連白芷桔梗甘草金銀花數劑而消按此項治法雖因脈證皆實而用泄法然有先後次序先攻裏後發表最後又和解前賢治病不肯孟浪如此學者可不以此爲法哉

一男子每遇勞役食少胃痞發熱頭痛吐痰作渴脈浮大余曰此脾胃血虛病也脾爲至陰而生血也不信服二陳加黃連枳實厚朴之類諸證益甚又服四物黃藥知母麥門更腹痛作嘔脈洪數而無倫次余先用六君加炮薑痛嘔漸愈又用補中益氣全愈

府庠徐道夫母胃脘當心痛劇右寸關俱無左雖有微而似絕手足厥冷病勢危篤察其色眼胞上下青黯此脾虛肝木所勝用參术茯苓陳皮甘草補其中氣用木香和胃氣以行肝氣用吳茱萸散脾胃之寒止心腹之痛急與一劑俟涼先服煎熟再進諸病悉愈向使泥痛無補法而反用攻伐之藥禍不旋踵

一婦人懷抱鬱結不時心腹作痛年餘不愈諸藥不應余用歸脾加炒山梔而愈

廷評張汝翰胃脇作痞飲食難化服枳术丸久而形體消瘦發熱口乾脈浮大而微用補中益氣加薑桂諸證悉退惟見脾胃虛寒遂用八味丸補命門火不月而飲食進三月而形體充此證若不用前丸多變腹脹喘促腿足浮腫小便淋瀝等證急用濟生加減腎氣丸亦有得生者

一儒者面色痿黃胃脇不利吞酸噯腐恪服理氣化痰之藥大便不實食少體倦此脾胃虛寒用六君加炮薑木香漸愈更兼用四神丸而元氣復此證若中氣虛弱者用人參理中湯或補中益氣加木香乾薑不應送左金丸或越鞠丸若中氣虛寒必加附子或附子理中湯無有不愈

一上舍飲食失宜胃腹脹悶噯氣吞酸以自知醫用二陳枳實黃連蒼术黃藥之類前證益甚更加足指腫痛指縫出水余用補中益氣加茯苓半夏治之而愈若腿足浮腫或煩腫寒熱嘔吐亦用前藥

儒者胡濟之塲屋不利胃脇膨悶飲食無味服枳术丸不時作嘔用二陳黃連枳實痰湧氣促加紫蘇枳殼喘嗽腹脹加厚朴腹皮小便不利加檳榔蓬术泄瀉腹痛悉屬虛寒用六君加薑桂二劑不應更加附子一錢二劑稍退數劑十愈六七乃以八味丸全愈

一上舍嘔吐痰涎發熱作渴胃脇痞滿或用清氣化痰降火前證益甚更加足指腫痛指縫出水余用補中益氣加茯苓半夏治之而愈若腿足浮腫或煩腫寒熱嘔吐亦用前藥

一人嘔吐痰涎發熱作渴胃脇痞滿或用清氣化痰降火藥益甚涎自出余曰嘔吐痰涎胃氣虛寒發熱作渴胃不生津胃脇痞滿脾胃虛也當生發陽氣諸病自退不信仍服前藥虛證悉至復請治余曰飲食不入吃逆不絕泄瀉腹痛手足逆冷是謂五虛煩熱作渴虛陽越於外也脈洪大脈欲絕也死期迫矣或曰殞於日乎夜乎余曰脈洪大當殞於晝果然

一婦人性沉靜多慮胃脇不利飲食少思腹脹吞酸面色青黃用疏利之劑余曰此脾虛痞滿當益胃氣不信用之胃脇果滿飲食愈少余以調中益氣加香砂炮薑漸愈後以六君芎歸貝母桔梗炮薑而愈

陸仙母久患心腹疼痛每作必胃滿嘔吐厥逆面赤唇痲咽乾舌燥寒熱不時而脈洪大衆以痰火治之屢止屢作迨乙未春發熱頻甚用藥反劇有朱存默氏謂服寒凉藥所致欲用參术等劑彼疑痛無補法乃請予診曰此寒凉損眞之故內眞寒而外假熱也且脈息弦洪而有怪狀乃脾氣虧損肝脈乘之而然惟當温補其胃遂與補中益氣加半夏茯苓吳茱木香一服而效

上舍毛體仁素陰虛春初咳嗽胃中隱痛腎脈數而無力肺脈數而時見此腎氣損陰火盛用六味丸料一劑病勢雖減內癰已成蓋因元氣虛而未能發出火令可畏不信服痰火之劑兩月後乳間微腫脈洪數而無力余曰膿內潰矣當刺出其膿以免內攻之禍不信又月餘請視但鍼得一孔膿兜不利仍復內攻腎古青赤余曰臟腑已壞吾何能治之後果歿

一夫人性剛多怒胃前作痛肉色不變脈數惡寒經曰洪數脈應發熱反惡寒瘡疽也今脈洪數則膿已成但體豐厚故色不變似乎無膿以痛極始肯鍼鍼入數寸出膿數椀以清肝消毒藥治之而愈設泥其色而不用鍼無可救之理

一男子患胃脘癰用射干湯之類將愈但氣喘體倦發熱作渴小便頻數此肺氣不足用補中益氣山藥山萸麥冬五味時仲夏更以生脈散代茶飲而愈

一婦人素食厚味吐膿已愈但小便淋瀝此肺腎氣

虛用補中益氣加麥冬五味及加減八味丸而愈若膏粱之人初起宜用清胃散

陽山之內素善怒胷膈不利吐痰甚多吞酸噯腐飲食少思手足發熱十餘年矣所服非芩連枳實必檳蘇厚朴左關弦洪右關弦數此屬肝火血燥木乘土位朝用六味地黃丸以滋養肝木夕用六君加當歸芍藥以調脾土不月而愈癸卯夏患背疽證屬虛寒用大溫補之藥而愈乙巳夏因大怒吞酸噯腐胷腹脹滿余以他往旬日或用二陳石膏治之吐涎如湧外熱如灼將用滾痰丸下之余到診之脈洪大按之如無曰此乃脾胃虧損而發熱脾弱而涎泛出也用六君加薑桂一鍾即睡覺而諸證如失數劑而康

一男子寒熱作渴不時咳吐口內血腥又五日吐膿身皮甲錯用射干湯四劑膿血已止但氣壅痰多以甘桔湯而愈蓋余知其爲胃脘癰也

羅工部仲夏腹惡寒而外惡熱鼻吸氣而腹覺冷體畏風而惡寒脈大而虛微每次進熱粥甌許必兼食生薑甌許若粥離火食之腹內即冷余曰熱之不熱是無火也當用八味丸壯火之源以消陰翳彼反服四物元參之類而歿

儀部李北川常患腹痛每治以補中益氣加山梔即愈一日因怒肚腹作痛胷脅作脹嘔吐不食肝脈弦緊面色黃中見青兼赤此脾氣虛弱肝火所乘仍用前湯吞左金丸一服而愈

太守朱陽山因怒腹痛作瀉兩脅作脹或胷乳作痛或寒熱往來或小便不利飲食不入嘔吐痰涎神思不清此肝木乘脾土用小柴胡加山梔炮薑茯苓陳皮酢製黃連一劑即愈

儒者沈尼文內停飲食外感風寒頭痛發熱惡心腹痛就治敝寓余用人參養胃加芎芷麴蘗香附桔梗一劑而愈次日抵家前病仍作腹痛請治以手按痛即止此客寒乘虛而入也乃以香砂六君加木香炮薑服之睡覺痛減六七去二香再服飲食少進又加黃芪當歸少佐升麻而愈

楊錦衣子十歲腹脹痛服消導藥不應彼以爲中毒請診其脈右關沉伏此食積也今腹脹善噫舌本強得後與氣則快然如衰皆脾病也審之果因食粽得此以白酒麴熱酒服而愈

黃恭人腹內一塊不時作痛痛則人事不知良久方蘇諸藥不應其脈沉細則非瘡毒河間云失笑散治疝氣及婦人血氣痛欲死並效與一服痛去六七再服而平此藥治產後心腹絞痛及兒枕痛尤妙

光祿高署丞脾胃素虛因飲食勞倦腹痛胷痞用大黃等藥下之譫語煩躁頭痛喘汗吐瀉頻頻時或昏憒脈大無倫用六君加炮薑四劑而安但倦怠少食口乾發熱六脈浮數欲用瀉火之藥余曰不時發熱是無火也脈浮大是血虛也脈虛浮是氣虛也此因胃虛五臟虧損虛證發見服補胃之劑諸證悉退

進士劉華甫停食腹痛瀉黃吐痰服二陳山梔黃連枳實之類其證益甚左關弦緊右關弦長乃肝木尅脾土用六君加木香治之而愈若食已消而泄未已宜用異功散以補脾胃如不應用補中益氣升發陽氣凡泄利色黃脾土虧損眞氣下陷必用前湯加木香肉蔻溫補如不應當補其母宜八味丸

癸卯春人日余在下堡顧氏會間有儒者許梅村云舍親馬生者發熱煩渴時或頭痛昨服發散藥反加喘急腹痛其汗如水晝夜譫語余意此勞傷元氣誤汗所致其腹必喜手按許往詢之果然遂與十全大補加附子一錢服之熟睡喚而不醒舉家驚惶及覺諸證頓退再劑而痊凡人飲食勞役起居失宜見一切火證悉屬內眞寒而外假熱故肚腹喜煖口畏冷物此乃形氣病氣俱屬不足法當純補元氣爲善

上舍周一元腹患癰三月不愈膿水清稀朝寒暮熱服四物黃蘗知母之類食少作瀉痰涎上湧服二陳枳實之類痰涎愈甚胷膈痞悶謂余曰何也余曰朝寒暮熱血氣虛也食少作瀉脾腎虛也痰湧胷痞脾肺虛悉因眞氣虛而邪氣實也當先壯其胃氣使諸臟有所稟而邪自退矣遂用六君加黃芪當歸數劑諸證漸退又用十全大補湯肌肉漸斂更用補中益氣湯調理而痊

從姪孫年十四而畢姻乙巳春年二十四腹中作痛用大黃等藥二劑下血甚多胷腹脹滿痰喘發熱又服破氣降火藥一劑汗出如水手足如冰余他往適歸診之右關洪數右尺尤甚乃腹癰也雖能收斂至夏必變而成瘵證用參芪各一兩歸朮各五錢陳皮茯苓各三錢炙甘草炮薑各一錢二劑諸證少退腹始微赤按之覺痛又二劑作痛又二劑腫痛脈滑數鍼出膿瘀更用大補湯精神飲食如故因遺精患處色黯用前藥加五味子山萸山藥骨脂吳萸等劑瘡口漸斂瘵證悉具其脈非洪大而數即微細如無惟專服獨參湯人乳汁少復良久仍脫余曰當備後事

以俟火旺乃禱鬼神巫者歷言往事如見更示以方藥皆峻利之劑且言保其必生敬信服之後果歿經曰拘於鬼神者不可與言至德而凡又輕信方藥於邪妄之人耶書此以警後患

鴻臚蘇龍溪小腹內腫脹作痛大小便祕結作渴飲冷脈洪數而實用黃連解毒二劑腫痛頓止二便調和用活命飲而愈

進士邊雲莊腹痛惡寒脈浮數余曰浮數之脈而反惡寒瘡疽之證也不信數日後復請視之左尺洪數余曰內有膿矣仍不信至小腹痛脹連及兩臀始悟余曰膿潰臀矣氣血俱虛何以收斂急服活命飲一鍾臀潰一孔出膿斗許氣息奄奄用大補藥一劑神思方醒每去後膿從瘡出痛不可當小肚間如有物上挺即發痙不省人事煩躁脈大舉按皆實省而診之脈洪大按之如無以十全大補倍用參芪至四斤更加附子二枚煎膏服而痙止又用十全大補湯五十餘劑而瘡斂

一男子患腹癰腫硬不潰乃陽氣虛弱嘔吐少食乃胃氣虛寒法當溫補脾胃假如腫赤痛甚煩躁脈實而嘔爲有餘當下之腫硬不潰脈弱而嘔爲不足當補之若痛傷胃氣或感寒邪積氣而嘔者雖腫瘍猶當助胃彼不信仍服攻伐藥而果歿

裕事錢南郭腹患癰已成余用托裏之藥漸起發彼惑於衆論用行氣破血以圖內消形體甚倦飲食益少患處頓陷色黯堅硬按之不痛余用大補之劑色赤腫起膿熟鍼之再用托裏之藥腫硬漸消而愈

一男子腹內作痛腹外微腫或用藥汗之外無形色脈數無力此元氣虧損毒不能外起遂與參芪歸朮之類數劑漸發於外又數劑膿成而欲鍼之惑於人言用大黃白芷穿山甲之類引膿從便出以致水瀉不止患處平陷自汗盜汗發熱作渴不食仍用前藥加半夏陳皮薑桂四劑形氣漸復又數劑鍼去其膿仍用補劑喜年幼未婚得痊

司馬李梧山患此腹痛而勢已成用活命飲一劑痛頓止用托裏消毒散腫頓起此膿將成也用托裏散補之自潰而愈

錦衣掌堂劉廷器正德辛未仲夏腹患癰潰而膿清熱渴腹脹作嘔不食或以爲熱毒內攻皆用芩連大黃之劑病愈甚余曰當捨時從證投以參芪薑附等藥一劑嘔止食進再用托裏等劑而痊愈

通府張廷用患腸癰兩月餘矣時出白膿體倦惡寒此邪氣去而中氣虛也余用托裏散兼益氣湯徐徐呷之又令以猪肚肺黃爛取其湯調米粉煮時呷半盡後漸調理而痊

一男子裏急後重下膿腹痛此脾氣下陷用排膿散蠟礬丸而愈後因勞役寒熱體倦用補中益氣湯而安

一婦人患此小腹腫痛小便如淋時時汗出此瘀血凝結於內先以神效苦蘘散二劑少愈更以薏苡仁湯而愈

一婦人小腹脹痛而有塊脈芤而澀此瘀血爲患也以四物加延胡索紅花桃仁牛膝木香二劑血下而痊

一婦人小腹脹痛大便祕澀轉側有水聲脈洪數此膿瘀內潰也以梅仁湯一劑下瘀血諸證悉退再以薏苡湯二劑而痊

一婦人膿成脹痛小便不利脈洪數此膿毒內潰也服太乙膏二錢膿下甚多更以苦蘘散蠟礬丸及托裏藥而安如用雲母膏尤妙

一婦人產後患此惡血不止小腹作痛服瓜子仁湯下瘀血而痊大凡瘀血停滯宜急治之緩則腐化爲膿最爲難治若流注關節則爲敗證

一婦腸中痛甚大便自小便出李生診之曰扎脈見於陽部此腸癰也以雲母膏一日十圓煎黃芪湯吞之利膿數升而安

一女子腹痛百方不治脈滑數時作熱腹微急孫曰痛病脈當沉細今滑數此腸癰也以雲母膏一兩爲丸如梧桐子大以牛皮膠鎔入酒中井水吞之餉時服盡下膿血愈

一男子小腹痛而堅硬小便數汗時出脈遲緊以大黃湯一劑下瘀血合許以薏苡仁湯四劑而安

一產婦小腹疼痛小便不利以薏苡仁湯二劑痛止更以四物湯加桃仁紅花下瘀血升許而愈大抵此證皆因榮衛不調或瘀血停滯所致若脈洪數已有膿脈但數微有膿脈遲緊乃瘀血下之即愈若患甚者腹脹大轉側作水聲或膿從臍出或從大便出宜太乙膏及托裏藥

一男子膿已成用雲母膏一服下膿升許更以排膿托裏藥而愈後因不守禁忌以致不救

一婦人因經水多服澀藥止之致腹作痛以失笑散二服而瘥

醫方考曰宋徽宗常食冰因致腹痛國醫進藥俱不效乃名泗州楊吉老診之吉老曰宜主理中丸上曰服之屢矣不驗吉老曰所進湯使不同陛下之疾得之食冰今臣以冰煎藥此欲已其受病之原也果一服而瘳崐謂是義也大易所謂同氣相求內經所謂衰之以屬也自非吉老之良烏能主此

證治準繩曰予讀中秘書時館師韓敬堂先生常患腸痛診其脈洪大而濇予用山梔仁赤芍通草大麥芽香附當歸川芎煎湯加薑汁韭汁童便竹瀝之類飲之而止一日勞倦忍饑痛大發亟邀予至日晨起痛甚不能待公服家兒藥下咽如刀割痛益甚不可忍何也予曰得非二陳平胃烏藥紫蘇之屬乎曰然曰是則何怪乎其增病也夫勞餓而發飽逸則止知其虛也飲以十全大補湯一劑而痛止

呂滄洲治郡守李母龐病小腹痛衆醫皆以爲瘕聚久藥不效呂診循其少陰脈如刀刃之切手胞門扎而數知其陰中痛癰結小腸也告之曰太夫人病在幽隱不敢以開幸出侍人語之乃出老嫗呂曰苦小腸癰以故臍下如瘕聚今膿已成痛迫於玉泉當不得前後溲則痛甚嫗曰誠如公言遂用國老將軍爲向導麒麟竭琥珀之類攻之膿自小便出應手愈

又一小兒患內癰腹脹臍凸而顏銳醫欲刺臍出膿其母不許請呂視之見一僧擁爐熾炭然銅筋一枝於烈火中燈目視翁曰此兒病癰發小腸苟舍刺臍無他法呂論之曰臍神闕也針刺所當禁矧癰舍於內惟當以湯丸攻之苟如爾言必殺是子矣僧怒趨而出呂投透膿散一匕明日膿自臍潰繼以十奇湯下萬應膏丸而瘥

外科正宗曰一幼婦產後月餘腹中漸痛腫脹如盞內醫紛紛認爲蠱病又月餘沉重昏憒彼家已棄不治請予視童稚瘍恙偶言此予討診之彼時人雖憤不醒診之其脈細數有力此內癰膿病也猶似不妨彼家曰無生之理予曰腹腫上見而按之一決其生何如隨視腫皮緊急光亮臍下大熱此內癰不妨乃萬無一失之病彼家懽悅分付先備淨桶用滾湯半桶蓋之聽用先以薏苡仁湯加酒炒大黃二錢徐徐灌服待腹中覺痛搭起患者坐桶上熱氣熏蒸其膿如湧泉連湯與膿約共滿桶其患即甦更服八珍湯加牡丹皮五味子調理月餘而安

一婦人腹脹如鼓臍突寸許小水澀滯轉側腹有水聲此內膿已成因刺臍上突頂出膿盆許以牡丹皮散五六劑其膿漸少朝以八味丸暮以八珍湯加澤瀉牡丹皮黃芪破故紙服之月餘而愈矣

一婦人小產瘀血未盡勞動之早小腹腫痛月餘大便祕燥小便澀滯口燥咽乾煩悶不睡內醫調理其病日重偶見予問之予曰恐內癰也及診脈數實而有力此腸癰已成用薏苡仁湯加大黃一服下膿數椀腹痛遂止外腫堅硬不散仍煖作痛此欲潰膿從外泄也以十全大補湯三服膿脹痛而鍼之更服八珍湯加牡丹皮五味子月餘而斂

一男子小腹脹痛裏急後重時時下膿醫作痢治之愈重診之脈扎而數此小腸癰也以薏苡仁湯一服下膿升許隨不堅重更以牡丹皮散六服而安

景岳全書曰向予荊人年及四旬於八月終初寒之時偶因暴雨後中陰寒沙毒之氣忽於二鼓時上爲嘔惡下爲胃腹攪痛勢不可當時值暮夜藥餌不及因以薑湯探吐之痛不爲減遂連吐數次其氣愈升則其痛愈劇因而上塞喉咽甚至聲不能出水藥亳不可入危在頃刻間矣余忽憶先年曾得祕傳刮沙法乃擇一光滑細口磁椀別用熱湯一鍾入香油一二匙却將椀口蘸油湯內令其煖而且滑乃兩手覆熱其椀於病者背心輕輕向下刮之以漸加重椀乾而寒則再浸再刮良久覺胃中脹滯漸有下行之意稍見寬舒始能出聲頃之忽腹中大響遂大瀉如傾其痛遂減幸而得活瀉後得睡一飯頃復通身搔癢之極隨發出疙瘩風餅如錢大者不計其數至四鼓而退愈後細窮其義蓋以五臟之系咸附於背故向下刮之則邪氣亦隨而降凡毒氣上行則逆下行則順所以得愈雖近有兩臂刮沙之法亦能治痛然毒深病急者非治背不可也至若風餅疙瘩之由正以寒毒之氣充塞表裏經臟俱閉故致危劇今其臟毒既解然後經氣得行而表裏俱散也可見寒邪外感之毒凡臟氣未調則表亦不解表邪未散則臟必不和此其表裏相關義自如此故治分緩急權衡在人矣繼後數日一魏姓者亦於二鼓忽患此證治不得法竟至五鼓痛極而斃遇與不遇此其所以爲命也

凡腹痛因食者或因滯物或因冷物皆能停積中脘須用前治食法加減治之此正法也然又有食停小腹者余嘗治一上舍年及三旬因午刻食水煮麵角將至初更食及小腹下至右角間遂停積不行而堅突如拳大如鵝卵其痛之劇莫可名狀余爲治之察

其明係痰積壅而無疑然計其已入大腸此正通則不痛之證也乃與木香檳榔丸連下二三次其痛如故因疑藥力之緩猶未及病乃更投神祐丸以瀉之又不效余謂此必藥性皆寒故滯有不行也因再投備急丸雖連得大瀉而堅痛毫不爲減斯時也余計窮矣因潛測其由不過因痰豈無所以制之今既逐之不及使非借氣以行之不可也且計痰毒非大蒜不殺滯非木香不行又其滯深道遠非精銳之嚮導不能達乃用火酒磨木香令其嚼生蒜一瓣而以香酒送之一服後覺痛稍減三四服後痛漸止而食漸進方得全愈然雖痛止食進而小腹之塊仍在後至半年許始得消盡由是知欲消食滯即大黃巴豆猶有所不能及而惟宜行氣爲先也且知飲食下行之道乃必由小腹下右角間而後出於廣腸此自古無人言及者故并筆之用以廣人之聞見

一人患心腹大痛或止或作痛不可忍凡用去疾行氣等藥百方不效但於病極時須用拳搥之痛得少止而旋止旋作久不能愈日加困弊莫測其故忽一胡僧見之曰余能治也遂令病者先食香餌纔進一丸打下一硬嘴異蟲遂愈此因蟲嚙腸臟所以痛極搥之則五內震動蟲亦震而斂伏不搥則蟲得自由所以復作此亦驗蟲奇法故凡見心腹痛證但用揉按重捻而痛得暫止者多有因蟲而然也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百六卷目錄

醫部彙考一百八十六

腰門一

黃帝素問　金匱眞言論　五臟生成篇　脈要精微論　臟氣法時論　熱論　瘧論　痿論　厥論　病能論　脈解篇　刺要論　長刺節論　氣交變大論　五常政大論　六元正紀大論　至眞要大論
靈樞經　邪氣臟腑病形篇　本神篇　終始篇　經脈篇　經筋篇　脈論　五癃津液別篇　陰陽繫日月篇　本臟篇　百病始生篇　論疾診尺篇　刺節眞邪篇
張機金匱要略　腰重　腰痛　治腫須分腰之上下　食禁
華佗中藏經　腰痛　腰重　腰熱　死候
王叔和脈訣　腰重脈　腰曲脈　腰痛脈
孫思邈千金方　痛因有五
楊登父直指方　腰痛
嚴用和濟生方　總論
竇漢卿瘡瘍全書　火腰帶毒　內丹　腰疽
劉完素六書　痛證
張從政儒門事親　痛證
李杲十書　總論痛病
朱震亨心法　總論痛病　氣鬱　腎虛　閃挫　久病
危亦林得效方　論痛病
虞摶醫學正傳　總論治法
戴思恭證治要訣　痛因　瀝血痛　風痛　血虛　腎虛　閃撲
樓英醫學綱目　運氣爲痛
李中梓醫宗必讀　總論　感寒　傷濕　風痛　熱痛　閃挫　瘀血　氣滯　淡積　腎虛
李梴醫學入門　外感分經　腎虛　濕熱　風邪　內傷七情　濕痰流注　飲食滯鬱　閃挫凝瘀　作勞傷腎　色慾傷腎
龔信古今醫鑑　瘀血　腎虛而痛　陰火而軟

藝術典第二百六卷

醫部彙考一百八十六

腰門一

黃帝素問

金匱眞言論

北風生於冬病在腎俞在腰股

註　俞者經氣之所注也

五臟生成篇

肝痹得之寒濕與疝同法腰痛足清頭痛

註　清濕地氣之中人也必從足始足厥陰之脈從足上膕入毛中過陰器抵小腹布脅肋故病證與疝病相同而腰痛足冷也厥陰與督脈會於巔故頭痛也

脈要精微論

腰者腎之腑轉搖不能腎將憊矣

註　兩腎在於腰內故腰爲腎之外腑

腎脈搏堅而長其色黃而赤者當病折腰

註　腰者腎之腑腰傷故腎脈盛也

推而上之上而不下腰足清也

註　上而不下者其氣上盛下虛當主腰足清冷也

按之至骨脈氣少者腰脊痛而身有痹也

臟氣法時論

心病者虛則脅下與腰相引而痛

註　心氣不能下交於腎陰故脅下與腰相引而痛也

熱論

傷寒一日巨陽受之故頭項腰脊強

註　太陽之氣主皮毛故傷寒一日太陽受之陽氣在上故頭項痛背爲陽故腰脊強此言始病太陽之氣也

瘧論

瘧之始發也先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊俱痛

註　衛氣同邪氣將入於陰表氣虛故先起於毫毛伸欠

巨陽虛則腰背頭項痛

註　太陽之氣主表而上升於頭其經脈上會於腦出於項下循背膂故腰背頭項俱痛

邪中於腰脊者氣至腰脊而病

註　中於腰背邪卽舍於腰背之間衛氣行至腰背與腰背所舍之邪相遇而病作焉

痿論

腎氣熱則腰脊不舉骨枯而髓減發爲骨痿

註　腎主藏精腎氣熱則精液燥竭矣腰者腎之腑是以腰脊不能伸舉腎生骨髓在體爲骨腎氣熱

而精液竭則髓減骨枯而發爲骨痿也

厥論

厥陰厥逆攣腰痛

註 攣者肝主筋也腰者肝之表也

少陽厥逆機關不利者腰不可以行

註 少陽主樞是以少陽氣厥而機關爲之不利也

腰脊者身之大關節也故機關不利而腰不可以轉行

手太陽厥逆腰不可以俛仰

註 腰不可俛仰蓋腰乃脈絡經俞之大會

病能論

帝曰有病厥者診右脈沉而緊左脈浮而遲不然病主安在岐伯曰冬診之右脈固當沉緊此應四時左脈浮而遲此逆四時在左當主病在腎頗關在肺當腰痛也帝曰何以言之岐伯曰少陰脈貫腎絡肺今得肺脈腎爲之病故腎爲腰痛之病也

註 脈合四時故冬診之左右脈皆當沉緊今左脈浮而遲是逆四時之氣矣腎主冬氣而又反浮在左故當主病在腎頗關涉於肺當爲腰痛之病行奇恒之法以太陰始五臟相通移皆有次是木氣所生之精氣先至於手太陰太陰肺金相生而順傳於腎腎當復傳於肝今反見浮遲之肺脈是腎臟有病而氣反還逆之於母臟故當主腎病之腰痛而頗關涉於肺也

脈解篇

太陽所謂腫腰脽痛者正月太陽寅寅太陽也正月陽氣出在上而陰氣盛陽未得自次也故腫腰脽痛也

註 此解奇病之脈也太陽爲諸陽主氣生於膀胱水中故以太陽之氣爲歲首正月陽氣雖出於上而陰寒之氣尚盛陽氣未得次序而出故太陽所謂腫腰脽痛者因太陽之氣尚爲陰氣所鬱故腫腰脽痛也此論陽氣之微也

少陰所謂腰痛者少陰者腎也十月萬物陽氣皆傷故腰痛也

註 十月寒水用事故主於足少陰腎

刺要論

刺筋無傷骨骨傷則內動腎腎動則冬病脹腰痛

註 動腎氣則所藏者少故當病虛脹而腰痛腰乃腎之腑也

長刺節論

病在少腹腹痛不得大小便病名曰疝得之寒刺少腹兩股間刺腰踝骨間刺而多之盡見病已

註 少腹兩股及腰踝骨間爲厥陰肝脈之所循刺而多留之俟其盡熱而病是已

氣交變大論

歲水不及濕乃大行民病腰股痛發

註 六辛之歲水運不及土乃勝之故濕氣大行傷及腎陰故爲腰股痛發諸病

歲火不及寒乃大行民病脅下與腰背相引而痛甚則屈不能伸髖髀如別

註 六癸之歲火運不及水反勝之故寒乃大行太陽乃氣之爲病故爲腰背等病

五常政大論

太陰司天濕氣下臨腎氣上從當其時反腰脽痛動轉不便也

註 當冬令之時腎藏主氣而反腰脽痛動轉不便蓋腎氣上從而大衰於下也

六元正紀大論

太陰司天之政氣化運行後天終之氣寒大舉濕大化感於寒則病人關節禁固腰脽痛寒濕推於氣交而爲疾也

註 終之主客乃在泉寒水之氣故寒大舉寒濕之氣上下相交故濕大化關節禁固骨節不利也腰脽者腎之腑寒濕推於氣交而人在氣交之中也

少陰司天之政氣化運行先天寒厥入胃心痛腹痛腹大初之氣民反周密關節禁固腰脽痛

註 寒厥清病生於下也入胃心痛腹痛腹大寒熱交爭於中而爲病也初之客氣乃太陽寒水初之主氣乃厥陰風木故風乃至陽春之氣鬱而民反周密太陽主腎而爲腎之腑故關節禁固而腰脽痛也

水鬱之發民病寒客心痛腰脽痛大關節不利屈伸不便

註 腰脽腎之腑也關節屈伸乃筋骨之病腎主骨而筋屬於節也

太陽所至爲腰痛

註 此夏病之常也

至眞要大論

歲太陰在泉民病衝頭痛目似脫項似拔腰似折髀不可以曲膕如結腨如別

註太陰在泉辰戌歲也自衝頭痛至腦如別乃土氣淫勝而水臟水腑皆爲病也

歲太陽在泉寒淫所勝民病少腹控睾引腰脊上衝心痛

註太陽在泉丑未歲也太陽之脈挾脊抵腰中故引腰脊腎脈絡心故上衝心痛

太陰司天濕淫所勝腑腫骨痛陰痹者按之不得腰脊頭項痛病本於腎太谿絕死不治

註太陰司天丑未歲也腑腫陰痹皆感寒濕之氣病在陰者名曰痹腎主骨而膀胱爲之腑故腰脊頭項骨痛太谿腎之動脈在足內踝外踝骨上太谿厥不至則腎氣已絕故死不治

陽明司天燥淫所勝民病嗌乾面塵腰痛病本於肝太衝絕死不治

註陽明司天卯酉歲也嗌乾面塵腰痛皆肝經之病蓋金淫於上故病本於肝太衝在足大指本節後二寸動脈應手肝經之俞穴也肝氣已絕故死不治

太陰之勝火氣內鬱燥化乃見少腹滿腰脽重強

註腰脽重者濕氣下淫而不及於腎也

太陽之復厥氣上行腰脽反痛屈伸不便少腹控睾引腰脊上衝心

註腰脽反痛屈伸不利水淫而反自傷也少腹控睾引腰脊上衝心者厥陰病也蓋亦報復歲半以前之木火土也

厥陰在泉主勝則腰腹時痛

註腰腹時痛者乃在泉之主氣太陰陽明太陽三氣之爲病也

少陰在泉客勝則腰痛

註四之客氣乃太陽寒水腰痛乃太陽經證同氣相感也

少陽在泉客勝則腰腹痛而反惡寒

註腰腹痛而反惡寒者客勝而太陽之主氣乃病也

陽明在泉主勝則腰重腹痛

註腰重腹痛太陽寒水之氣發於下也

太陽在泉寒復內餘則腰尻痛屈伸不利股脛足膝中痛

註寒復內餘者太陽寒水之客氣入於內而有餘也腰尻股脛足痛者太陽之經證也屈伸不利者太陽之主筋也

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

肺脈微急爲肺寒熱怠惰欬唾血引腰背胷

註肺主氣怠惰欬唾血引腰背胷皆肺氣虛寒之所致

小腸病者腰脊控睾而痛

註小腸病者謂病小腸之腑氣也其氣與膀胱相通是以腰脊控睾而痛

本神篇

腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘其前言腰脊不可以俛仰屈伸

註腰者腎之腑腎藏志今志傷故腰脊不可以俛仰屈伸

終始篇

從腰以上者手太陰陽明皆主之從腰以下者足太陰陽明皆主之

註手太陰陽明主天足太陰陽明主地身半以上爲天身半以下爲地

病在腰者取之腘

註腎藏膀胱之水氣應天泉之上下也

經脈篇

膀胱足太陽之脈其直者從巔入絡腦挾脊抵腰中其支者從腰中下挾脊貫臀是動則病脊痛腰似折

註此病在太陽之氣也

肝足厥陰之脈是動則爲腰痛不可以俛仰

註是在厥陰之動氣則病腰痛不可以俛仰蓋厥陰從少陽中氣之化厥陰之化氣病也

經筋篇

足少陰之筋病在外者不能俛在內者不能仰故陽病者腰反折不能俛陰病者不能仰

註病在外在陽者病太陽之氣故腰反折不能俛在內在陰者病少陰之氣故不能仰

腹論

腎腹者腹滿引背央央然腰髀痛小腸腹者少腹膜腹引腰而痛

註此衛氣逆於城郭之中而爲臟腑之腹也

五癃津液別篇

陰陽不和則使液溢而下洩於陰髓液皆減而下下過度則虛虛故腰背痛而腰疼

註陰陽不和者少陰與陽明之不和也陰陽之氣

不和則液與精不合故使液溢於骨外而下流於陰矣液溢於外則髓液皆減而下是不能爲高矣下流過度則骨虛而腰痛脛痠矣此髓道之閉癃也

陰陽繫日月篇

腰以上爲天腰以下爲地故天爲陽地爲陰

註 積陽爲天積陰爲地天地合氣命之曰人故身半以上天氣主之身半以下地氣主之人秉天地水火而生故與天地參也

腰以上者爲陽腰以下者爲陰

註 此陰陽之定位手經有陰足經有陽乃上下之氣交

本臟篇

腎小則臟安難傷腎大則善病腰痛不可以俛仰易傷以邪腎下則腰尻痛不可以俛仰爲狐疝腎堅則不病腰背痛腎偏傾則苦腰尻痛也

註 腰脊者身之大關節也故腰痛背膂痛腰尻痛皆不可以俛仰腎附於腰脊間故病諸痛也

百病始生篇

虛邪之中人傳舍四肢則肢節痛腰脊乃强

註 腰脊乃强者臟腑之大絡而皆通於督脈之長強也

論疾診尺篇

肘所獨熱者腰以上熱手所獨熱者腰以下熱

註 肘所自寸而下尺也手所自尺而上寸也

臂中獨熱者腰腹熱

註 臂中掌中魚上乃手臂之正面背面爲陽故候形身之外正面主陰故候腰腹之內

刺節眞邪篇

腰脊者身之大關節也

註 腰脊者從大椎至尾骶乃身之大關節

漢張機金匱要略

腰重

腎著之病其人身體重腰中冷如坐水中形如水狀反不渴小便自利飲食如故病屬下焦身勞汗出衣裏冷濕久久得之腰以下冷痛腰重如帶五千錢甘薑苓朮湯主之

腰痛

腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足逆冷面反瘦

膈上病痰滿喘欬吐發則寒熱背痛腰疼目泣自出其人振振身瞤劇必有伏飲

虛勞腰痛少腹拘急小便不利者八味腎氣圓主之

治腫須分腰之上下

師曰諸有水者腰以下腫當利小便腰以上腫當發汗乃愈

食禁

十月勿食被霜生菜令人面無光目澀心痛腰疼

華佗中藏經

腰痛

心虛則多悸惕然無眠胷腹及腰背引痛喜悲時眩仆

左寸脈微急心中痛引腰背痛不下食

腎脈虛則陰邪入腎則骨痛腰痛上引脊背疼

腎脹則腰痛滿引背怏怏然痹痛

腎乏精徹脊與腰相引而疼饑見飽減腎脈來而細軟附於骨者是也

腎寒則陰中與腰脊俱疼面黑耳乾或嘔血是也

痞候小便不利臍下滿硬語言蹇滯腰痛脚重不能立是也

腰重

大小便難飲食如故腰脚沉重診其左右手脈尺中脈伏而澀者下實也大小便難飲食進退腰脚沉重如坐水中行步艱難氣上奔衝夢寐危險診其左右尺中脈滑而濇者下虛也病人脈微澀短小俱屬下虛也

腎風者腰脚痛重視脅下未生黃點者可治不然則死矣腎風宜灸腎俞也

腰熱

心積沉而空空然上下往來無常處病胷滿悸腰腹中熱頰赤咽喉乾燥掌熱甚則嘔春瘥冬甚宜急療之止於旬日也

死候

病瘧腰脊強急瘈瘲者死

骨絕腰脊痛腎中重不可反側足膝後平者五日死

晉王叔和脈訣

腰重脈

腎脈歌曰腎散腰間氣尿多澀滑并滑弦腰脚重沉腎痛還同

沉脈歌曰若在尺中腰脚重小便稠數色如泔

遲脈歌曰流入尺中腰脚重厚衣重覆也嫌單

察色觀病生死候歌曰脊疼腰重反覆難此是骨絕五日看

腰曲脈

腎臟歌曰面黑齒痛目如盲自汗如水腰折頻皮肉濡結髮無澤四日應當命不存

腰痛脈

診得陰維脈如貫珠者男子兩脅下實腰中痛

唐孫思邈千金方

痛因有五

凡腰痛有五一曰少陰少陰腎也十月萬物陽氣皆衰是以腰痛二曰風痹風寒著腰是以腰痛三曰腎虛役用傷腎是以腰痛四曰墜墮傷腰是以腰痛五曰取寒眠地爲地氣所傷是以腰痛痛不止引牽腰脊皆痛

夫腰背痛者皆由腎氣虛弱臥冷濕地當風得之若不速治濕流入腳膝爲偏枯冷痹緩弱疼重或腰痛攣脚重痹宜服獨活寄生湯

宋楊登父直指方

腰痛

血瀝則腰痛如錐之所刺

憂思傷脾則腰痛怒怒傷肝亦作腰痛俱宜沉香降氣湯合調氣散入薑三片棗二枚煎服

嚴用和濟生方

總論

素問云腰者腎之腑轉搖不能腎將憊矣審如是說則知腰近於腎多因嗜慾過度勞傷腎經腎臟既虛喜怒憂思風寒濕毒得以傷之遂致腰痛又有墜墮閃肭氣凝血滯亦致腰痛大抵腰痛之病脈皆沉弦沉弦而緊者寒腰痛沉弦而浮者風腰痛沉弦而濡細者濕腰痛墜墮閃肭以致氣凝血滯而痛者脈多沉弦而實也當推其所因合其脈證以治無不效者矣

寶漢卿瘡瘍全書

火腰帶毒

此毒受在心肝二經熱毒傷心流滯於膀胱不行壅在皮膚此是風毒也當用清肝流氣飲敗毒流氣散治之不可便數藥患上用紫金錠水磨汁頻用鵝毛蘸汁潤之

內丹

內丹者從脊下至腰下腫發赤色名曰內丹如早覺可治至腰便不可治其病多大小便不通亦有不過三日而飛遍身青黑色而死用救急丹酢磨敷內丹處更服連翹敗毒散

腰疽

此證受在陰包氣穴傷於濕氣血不行流注經絡此是毒證也當用發背藥治之三五日內宜灸七壯即消

金劉完素六書

痛證

寒中腸泄斯病鶩溏腰股痛發風爲病者或爲腰脊強痛風熱病氣壅滯筋脈拘攣體倦腰痛脾熱者熱爭則腰痛不可俛仰腎熱者腰痛骨疲苦渴婦人產後血滯腰重痛夫傷寒之候邪熱在表必腰痛婦人產後惡血不下月候不行必血刺腰痛太陽證腰強脈浮無汗

元張從政儒門事親

痛證

夫婦人腰胯疼痛兩脚痲木惡寒喜煖者乃是風寒濕痹先可服除濕丹七八十丸量虛實以意加減次以禹功散服之瀉十餘行清冷積水青黃涎沫爲驗後以長流水同生薑棗煎五苓散服之風濕散而血氣和也

夫一切男子婦人或因咳嗽一聲或因悲哭啼泣抬舁重物以致腰痛氣刺不能轉側及不能出氣者可用不臥散噓之汗出痛即止如不能飲食可用通經散導水丸瀉十餘行瀉訖服烏金丸和血丹痛減則止矣

老人腎虛腰脊痛腎惡燥腰者腎之腑也峻攻之則腎愈虛矣

李杲十書

總論痛病

六元正紀大論云太陽所至爲腰痛又云巨陽卽太陽也虛則頭項腰背痛足太陽膀胱之脈所過還出別下項循肩髆內挾脊抵腰中故爲病項如拔挾脊痛腰似折髀不可以曲是經氣虛則邪客之痛病生矣夫邪者是風熱濕燥寒皆能爲病大抵寒濕多而風熱少然有房室勞傷腎虛腰痛是陽氣虛弱不能運動故也經云腰者腎之腑轉搖不能腎將敗矣宜腎氣丸茴香丸之類以補陽之不足也膏粱之人久服湯藥醉以入房損其眞氣則腎氣熱腎氣熱則腰脊痛而不能舉久則髓減骨枯發爲骨痿宜六味地

黃丸滋腎丸封髓丹之類以補陰之不足也靈樞云腰痛上寒取足太陰陽明上熱取足厥陰不可俛仰取足少陽蓋足之三陽從頭走足足之三陰從足走腹其經所過之處皆能爲痛治之者當審其何經所過分野循其空穴而刺之審何寒熱而藥之假令足太陽令人腰痛引項脊尻背如重狀刺其郄中太陽二經出血餘皆倣此彼執一方治諸腰痛者固不通矣

如身重腰沉沉然乃經中有濕熱也於羌活勝濕湯中加黃蘗一錢附子五分蒼朮二錢

朱震亨心法

總論痛病

腰痛主濕熱腎虛瘀血挫閃有積痰

脈大者腎虛杜仲龜板黃蘗知母枸杞五味之類爲末猪脊髓丸服

脈澀者瘀血用補陰丸加桃仁紅花

脈緩者濕熱蒼朮杜仲黃蘗川芎之類

痰積作痛者二陳加南星半夏若腰曲不能伸者鍼人中

凡諸痛皆屬火而寒凉峻補藥不可用必用溫散之藥

諸痛不可用人參蓋人參補氣氣旺不通則痛愈甚人之痛面上忽見紅點者多死

濕熱腰疼者遇天陰或久坐而發者是也腎虛者疼之不已者是也瘀血者日輕夜重者是也

腰者腎之外候一身所恃以轉移闔闢者也蓋諸經皆貫於腎而絡於腰脊腎氣一虛凡衝寒受濕傷冷蓄熱血濇氣滯水積墮傷與失志作勞種種腰疼疊見而層出矣

脈若弦而沉者爲虛沉者爲滯濇者瘀血緩者爲濕滑與伏者是痰

氣鬱

氣痛一身腔子盡痛宜用少許木香於藥內行氣若寒濕腰痛見熱則減見寒則增宜五積散加吳茱萸半錢杜仲一錢

腎虛

腎虛腰痛轉側不能以大建中湯加川椒十粒仍以大茴香鹽炒爲末破開猪腰子作薄片勿令斷層層撒藥末水紙裹煨熟細嚼酒喫下

閃挫

閃挫腰痛宜復元通氣散酒調服或五積散加牽牛頭末一錢或桃仁七枚

久病

久腰痛必用官桂開之方止腹脅痛亦然橘香丸治腰痛經久不瘥亦用官桂開之之意也

危亦林得效方

論痛病

風熱腰痛敗毒散加續斷天麻木瓜薄荷久虛卑濕雨露侵霪腰重痛如石冷如氷五積散加桃仁吳茱萸最效

明虞摶醫學正傳

總論治法

虛者補之杜仲黃蘗肉桂當歸五味菟絲子天門冬熟地黃之類風者散之麻黃防風羌活獨活之類寒者溫之肉桂乾薑附子之類挫閃者行之當歸蘇木乳香沒藥桃仁紅花之類瘀血者逐之大黃牽牛桃仁水蛭蝱蟲之類濕痰流注者消導之蒼朮蕪芎香附白芷枳實橘紅半夏茯苓之類宜各類推而治之不可執一而論也

平日膏粱厚味之人腰痛皆是濕熱陰虛

戴思恭證治要訣

痛因

腰者腎之所附皆屬腎有寒有濕有風有虛皆能作痛

瀝血痛

腰痛如錐刀所刺大便黑小便赤黃或黑由血滯腰間名瀝血腰痛桃仁酒調黑神散

風痛

若風傷而腰疼者或左或右痛無常處牽引兩足宜五積散每服加防風半錢或加全蠍三箇尤好小續命湯獨活寄生湯皆可選用仍吞三仙丹杜仲薑汁炒研末每一錢溫酒調空心服名杜仲酒治腎虛腰疼兼治風冷爲患

血虛

婦人去血過多及素患血虛致腰痛者當益其血

腎虛

腎虛腰痛轉側不能嗜臥疲弱者大建中湯加川椒十粒吞下腰腎丸及生料鹿茸丸之類仍服丹溪茴香摻猪腰子方

閃撲

若因閃肭或顛撲傷損而痛宜黑神散和復元通氣

散酒調下不效則恐有惡血停滯宜先用酒調下蔾合香丸仍以五積散每服加大黃半錢蘇木半錢當歸倍原數若因勞役負重而痛宜用和氣飲或普賢正氣散

閃挫兼勞役而痛宜生料五積散加炒桃仁五枚

樓英醫學綱目

遲氣爲痛

遲氣腰痛有五一曰寒經云水鬱之發民病腰脽痛大關節不利屈伸不便又云太陽所至爲腰痛又云太陽之復脽反痛屈伸不便治以熱劑是也

二曰濕經云太陰司天濕氣下臨腎氣上從當其時反腰脽痛動轉不便又曰太陽在泉濕淫所勝病腰似折亦治以熱劑是也

三曰寒濕雜合經云太陰司天之政終之氣寒大舉濕大化病關節禁固腰脽痛治以燥熱是也

四曰燥經云陽明司天燥淫所勝病腰痛治以苦溫是也

五曰燥熱風寒雜至經云少陰司天之政水火寒熱持於氣交民病腰痛初之氣寒乃始陽氣鬱民反周密關節禁固腰脽痛治以濕熱多寒清少也

李中梓醫宗必讀

總論

按內經言太陽腰痛者外感六氣也言腎經腰痛者內傷房慾也假令作強伎巧之官謹其閉蟄封藏之本則州都之地具氣布濩雖六氣苛毒弗之能害惟以欲竭其精以耗散其眞則腎藏虛傷勝疣之腑安能獨足於是六氣乘虛侵犯太陽故分別施治有寒有濕有風熱有挫閃有瘀血有滯氣有痰積皆標也腎虛其本也標急則從標本重則從本標本不失病無遁狀矣

感寒

感寒而痛其脈必緊腰間如冰得熱則減得寒則增五積散去桔梗加吳茱萸或薑附湯加肉桂杜仲外用摩腰膏兼寒濕者五積散加蒼术麻黃

傷濕

傷濕如坐水中腎屬水久坐水濕或傷雨露雨水相得以致腰痛身重脈緩天陰必發渗濕湯腎著湯兼風濕者羗活奇生湯

風痛

有風脈浮痛無常處牽引兩足五積散加防風全蠍或小續命湯杜仲薑汁炒爲末每服一錢酒送治腎氣腰痛兼治風冷或牛膝酒

熱痛

脈洪數發渴便閉甘豆湯加續斷天麻

閃挫

或跌撲損傷乳香趁痛散及黑神散和復元通氣散酒調下不效必有惡血四物湯加桃仁穿山甲大黃

勞役負重而痛十補湯下青娥丸

瘀血

脈濇轉動若錐刀之刺大便黑小便或黃或黑日輕夜重調榮活絡飲或桃仁酒調黑神散

氣滯

脈沉人參順氣散或烏藥順氣散加五加皮木香或用降香檀香沉香各三錢三分煎湯空心服

痰積

脈滑二陳湯加南星香附烏藥枳殼脈有力者二陳湯加大黃

腎虛

腰肢痿弱脚膝酸軟脈或大或細按之無力痛亦悠悠隱隱而不甚分寒熱二候脈細而軟力怯短氣小便清利腎氣丸茴香丸鹿茸羊腎之類脈大而軟小便黃虛火炎六味丸封髓丹丹溪云腎虛痛必用官桂開之方止

李梴醫學入門

外感分經

太陽證分有汗無汗傷寒人參順氣散傷風敗毒散或遏氣防風湯外用三稜針刺委中出血甚妙太陽合陽明葛根湯少陽柴胡桂枝湯與頭痛參看

少陰腰痛腰下如橫木甚則遺溺

厥陰風熱故腰強急如弓三陰通用五積散加杜仲附子或加於黃芪建中湯當歸四逆湯中當與雜病腰痛參看

傷寒腰痛必依六經證用藥尋常感冒寒痛不能轉側如寒傷腎者遇天寒發連背拘攣脈沉弦急五積散加吳萸杜仲桃仁痛甚加黑牽牛少許肢厥者古薑附湯連肩背者通氣防風湯摩腰丹屈伸導法

腎虛

腰新痛宜外疏邪清濕熱久則補腎兼理氣血

腰者腎之候一身所恃以轉移開闔然諸經貫於腎而絡於腰脊雖外感內傷種種不同必腎虛而後邪能溪之故不可純用凉藥亦不可純用參芪補氣痛

甚面上忽見紅點人中黑者死

濕熱

久處卑濕雨露侵淫爲濕所著腰重如石冷如冰喜熱物熨不渴便利飲食如故腎著湯加附子停水沉重小便不利五苓散滲濕湯腰重痛單角茴散久不已單牛膝浸酒服青娥丸加蒼朮爲妙

濕氣熱者長夏暑濕相搏或因膏粱成濕熱者亦同實者二妙蒼朮散加柴胡防風煎服虛者七味蒼朮散溺赤者五苓散清燥湯健步丸有諸藥不效者用甘遂牽牛大瀉其濕而止乃濕熱甚也古方有以甘遂末三錢和豬腰子煨熟空心酒下

風邪

風傷腎腰痛左右無常牽連脚膝強急不可俛仰以顧風熱敗毒散加杜仲二便閉者甘豆湯加續斷天麻風虛小續命湯加桃仁或烏藥順氣散加五加皮風挾寒濕五積交加散用全蠍炒過去蠍獨活寄生湯羌活勝濕湯加味龍虎散或單威靈仙爲末酒調服

內傷七情

失志則心血不旺不能攝養筋脈腰間鬱鬱膨脹不伸令人虛羸面黑不能久立遠行七氣湯倍茯苓加沉香乳香少許虛者當心腎俱補人參養榮湯加杜仲牛膝

五臟皆取氣於穀脾者胃之倉廩也憂思傷脾則胃氣不行腰痛連腹脅脹滿肉痹不仁沉香降氣湯木香匀氣散飲食難化者異香散

宗筋聚於陰器肝者腎之同系也怒傷肝則諸筋縱弛腰痛連脅聚香飲子調肝散

七情挾外感有表者人參順氣散烏藥順氣散枳甘散加葱白通用七香丸青木香丸立安丸

濕痰流注

濕痰流注經絡背腰疼痛脈滑者二陳湯加南星蒼朮黃蘗風加麻黃防風羌活寒加薑桂附子控涎丹大便泄者龜桷丸

飲食滯鬱

食積因醉飽入房濕熱乘虛入腎以致腰痛難以俛仰四物二陳湯加麥芽神麴葛花砂仁杜仲黃蘗官桂枳殼痛甚者速效散積聚者加味龍虎散濕熱者七味蒼蘗散清燥湯

閃挫凝瘀

閃挫跌撲墜墮以致血瘀腰痛日輕夜重宜行血順氣實者桃仁承氣湯或大黃生薑等分水浸一宿五鼓服之久者補陰丸加桃仁紅花或五積散去麻黃加茴香木香檳榔連翹痛者復元通聖散加木香

作勞傷腎

勞力傷腎者黃芪建中湯加當歸杜仲或四物湯加知母黃蘗五味子杜仲吞大補陰丸熱者獨活湯

勞心者夢授天王補心丹杜仲煎湯下

色慾傷腎

房慾傷腎精血不足養筋陰虛悠悠痛不能舉者杜仲丸補陰丸

陽虛腰軟不能運用者九味安腎丸加杜仲鹿茸百倍丸八味丸加鹿茸木瓜當歸續斷或煨腎丸猪腎酒

龔信古今醫鑑

瘀血

瘀血痛用三稜針於委中穴出血以其血滯於下也瘀血在足太陽太陰少陽三經腰痛宜川芎肉桂湯

腎虛而痛

腎虛者痛之不已用安腎丸主之

陰火而軟

腰軟者腎肝伏熱治用黃蘗防己

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百七卷目錄
醫部彙考一百八十七
腰門二
張三錫醫學準繩六要 濕痰 閃肭 瘀血 腎虛 陰虛 外感 氣滯
方賢奇效良方 總論
王肯堂證治準繩 腰痛 石痛 鐵腰火丹
吳崑醫方考 腰痛方論
張介賓景岳全書 論證 論治
方人參補氣散 茯苓桂枝甘草大棗湯 五苓散 麻黃湯 調榮活絡飲 蠲痛方 菊花酒 杜仲酒 又方 又方 腎著散 又方 又方 萬靈丸 一粒金丹 麻黃復煎散 加味蠲痛散 龜鹿丸 七香丸 黃芪丸 調腎湯 活血應痛丸 滋腎丸 芎歸餅子 三才封髓丹 六味地黃丸 防風湯 加味四物湯 益腎丸 羌活蠲痛湯 蒼术復煎散 五積散 厚朴溫散 復元通氣散 烏藥順氣散 杜仲木香散 薏苡仁湯 虎骨木瓜丸 牛膝丸 附子散 一柴胡飲 二柴胡飲 正柴胡飲 當歸地黃飲 右歸丸 左歸丸 大分清飲 獨活寄生湯 三仙丹 牛膝酒 生附湯 補骨脂丸 補陰丸 補腎湯 補腎丸 補中湯 地黃丸 百倍丸 滋腎丸 調肝散 橘香丸 川芎肉桂湯 麻黃湯 薏苡仁湯 甘豆湯 敗毒散 羌活湯 調氣飲 清肝瀉火飲 痛泄飲 七味蒼朮湯 敗毒散 正氣散 大黃湯 安腎丸 破血散 痛泄飲 敗毒散 杜仲丸 補腎湯 調氣飲 痛泄飲 敗毒散 通經散 七味蒼朮湯 清肝瀉火飲 敗毒散 流氣飲 芎芷內托湯 勝金丹 內疏黃連湯 一粒金丹 仙方活命飲 人參養榮湯 十全大補湯

藝術典第二百七卷

醫部彙考一百八十七

腰門二

明張三錫醫學準繩六要

濕熱

六脈數急而弦或沉濡而數小便黃腰痛不得俛仰遇天陰及久坐便痛屬濕熱宜滲濕清熱當歸拈痛湯出入有寒熱者當先發散

濕痰

脈滑或沉伏動作便有痰或一塊作痛是濕痰多見於肥盛之人宜快氣豁痰使痰隨氣運加味豁痰湯主之不應控涎丹徐徐取之

腰痛足太陽經也胯痛足少陽膽之所過也若因傷於寒濕流注經絡結滯骨節氣血不和而致腰胯痛宜除濕丹或滲濕湯加芍藥青皮蒼术橫梛有痰滯經絡導痰湯加橫梛青皮芍藥丹溪以爲腎肝伏熱治用黃檗防己

閃肭

肝脈搏堅而長或兩尺脈實忽然不可俛仰屬閃肭此雖起於偶然亦必有所覺方可作閃肭治宜先以乳沒研細衝酒飲之次用活血行氣藥復元通氣主之不效必有瘀血五積散加桃仁大黃蘇木各一錢當歸倍原數

瘀血

脈濇滯或扎日輕夜重大便黑小便黃轉側如錐刺屬瘀血宜順氣活血元戎加味四物湯或加桃仁紅花桂下之果因閃挫打撲瘀血爲患乃可

腎虛

脈大或兩尺洪盛疼而不已是腎虛宜滋腎四物加黃檗杜仲五味之類吞補腎丸或青蛾丸或大補陰丸莫辭丸

大抵諸腰痛皆起於腎虛既挾邪氣則當先去其邪若子和以甘遂陳皮當歸等分爲末服三錢酒下者準繩用黑白丑炒末五靈脂各三錢狗脊微炒半兩莫辭炒三錢沒藥二錢胡桃肉五箇酢糊丸甚者加濕紙煨熟巴豆五粒下五七次後用煨腎散及無比山藥丸是先瀉後補也

陰虛

因辛苦勞碌而得者宜補養兼利肢節四物加獨活羌活杜仲牛膝少入肉桂爲鄉導有火加知母甚者十補湯吞青娥丸

外感

風傷腎而痛脈必帶浮三因方用杜仲三錢炒煎酒服又牛膝酒治風毒攻腎刺痛

偶被風寒濕所鬱而作痛宜五積散加減須羌活爲主

諸腰痛甚者不可用補氣藥及寒凉藥初必加溫散和血快氣後必加補腎藥四物牛杜之類房勞辛苦之人悉宜補養氣血孰虛治各加製附子少許爲引下鄉導最妙

氣滯

氣滯而痛脈必沉弦或伏結實人初起木香流氣飲日久宜理氣養血

方賢奇效良方

總論

六元正紀論曰太陽所至爲腰痛又曰巨陽卽太陽也盧則腰背頭項痛夫腎肝爲病則腰滯而痛故經云腰乃腎之腑轉搖不能腎將憊矣蓋諸經皆貫於腎而絡於腰脊腎氣一虛邪氣易入或風寒暑濕客之或血凝氣滯鬱鬱悶悶而不伸積水沉重則小腸不得宣通其證遂作素問刺腰痛論云分六經之病且如太陽腰痛引項脊尻背如重狀陽明腰痛不可以顧顧卽如有所見者善悲少陽腰痛如針刺皮循循然不可俛仰不可以顧散脈令人腰痛而熱煩甚生瘡腰下如有横木居其中甚則遺溲少陰腰痛痛引脊內廉厥陰腰痛如張弓弩弦善言嘿嘿然不慧解脈是足太陽之別脈令人腰痛引肩眴眴然時遺溲又云痛如引帶常若折腰狀善恐同陰之脈是足少陽之別絡也令人腰痛痛若小錘居其中怫然腫陽維之脈是太陽之所生奇脈也令人腰痛痛上怫然壅衛絡之脈是太陽之外絡令人腰痛不可俛仰仰則恐仆得之舉重傷腰衛絡絕惡血歸之會陰之脈是足太陽之中經也令人腰痛痛上漯漯然汗出汗乾令人欲飲飲已欲走飛揚之脈是陰維之脈也令人腰痛痛上怫怫然甚則悲恐昌陽之脈是陰蹻脈也令人腰痛痛引膺目眴眴然甚則反折舌卷不能言肉里之脈是少陽所生則陽維之脈所發也令人腰痛不可以欬欬則筋縮急挾脊而痛至頭八八發目眴眴欲僵仆刺足太陽腰痛上寒刺足太陽陽明上熱刺足厥陰不可俛仰刺足少陽中熱而喘刺足少陰少腹滿刺足厥陰腰痛引少腹控胁不可仰刺腰尻交者兩踝胂上刺熱篇云脾熱病者熱爭則腰痛不可俛仰腹滿泄腎熱病者先腰疼胂疼口渴且人之腰者乃一身之大關節六經所系支絡其經多虛少實或房勞之過度或四氣之所襲因虛則邪相搏以爲痛也巢氏與千金方二家之論腰痛有五所感不同一曰陽氣不足少陰腎衰是以腰痛二曰風痹風寒濕著腰而痛三曰腎虛勞役傷腎而痛四曰腎腰及墜傷腰而痛五曰寢臥濕地而痛此論受病之因陳無擇則又有三因而分之蓋太陽少陰多中寒少陽厥陰多中風陽明太陰多中燥濕若此六經腰痛者爲外之所因也若失志傷腎鬱怒傷肝憂思傷脾若此腰痛爲內之所因也大抵此病未嘗不由腎虛而致以內經推足三陰三陽十二經八脈有貫絡於腰腎而痛者則經中各有刺法治之或風寒濕蓄熱與失志房勞及墜傷閃肭氣滯血滯而痛者當於五種三因而推之不過從其所由用汗下補瀉之法以療之若脈浮弦爲風弦緊爲寒沉細爲濕沉實爲熱沉濇爲氣與血也治法識六經五種三因之病則心胷了然用藥收十全之功也

王肯堂證治準繩

腰疽

或問十四椎旁腰腎之間發疽何如曰此名連腎發卽下搭也由房勞太過致傷腎水令人口乾寒熱大作百節俱痛急服勝金丹黃芪內托散活命飲加羌活黃芪治之稍緩潰爛透膜者死若見咳嗽嘔噦腰間似折不能俛仰飲食不納者死潰而膿水清稀腐爛腥穢迷悶不醒厥逆者不治

石疽

或問一人患疽於腰胯之間肉色不變堅硬如石經月不潰者何如曰此名石疽屬少陽陽明二經積熱所致邪毒固結元氣不足故不能起發活命飲加獨活羌活柴胡黃芪及紫金丹汗之壯實者八陣散一粒金丹下之老弱者十全大補湯人參養榮湯托之若黑陷不起麻木不痛嘔噦不食精神昏亂脈散或代者死神清脈和服蠹關紫微丸

纏腰火丹

或問繞腰生瘡累累如珠何如曰是名火帶瘡亦名纏腰火丹由心腎不交肝火內熾流入膀胱纏於帶脈故如束帶急服內疏黃連湯壯實者一粒金丹下之活命飲加芩連黃檗外用清熱解毒藥敷之此證若不早治纏腰已徧則毒由腎入膨脹不食而死吳崑醫方考

腰痛方論

叙曰腰者腎之腑水火之司有生之根也善調之則本固而葉榮不善調之則根枯而葉萎考方四首而治腰之大者見矣

腎虛腰痛者青娥加黃檗知母丸主之蓋腎坎象也水火病焉水衰則陽光獨治而令腎熱火衰則陰霾襲之而令腎寒水火俱衰則土氣乘之而邪入於腎均之令人腰痛也是方也破故紙杜仲胡桃味厚而温黃檗知母牛膝味厚而寒温者可使養陽寒者可使養陰均之能走下部矣若草藥者苦燥之品足以利水土之邪而平其氣也曰青娥者涵

陽之坎也假之以名方明其全夫水火之眞爾腎氣虛弱肝脾之氣襲之令人腰膝作痛屈伸不便痹者陰邪實也無力者氣血虛也是方也獨活寄生細辛秦艽防風桂心辛溫之品也可以升舉肝脾之氣肝脾之氣升則腰膝弗痛矣當歸熟地白芍川芎杜仲牛膝者養陰之品也可以滋補肝腎之陰肝腎之陰補則足得血而能步矣人參茯苓甘草者益氣之品也可以長養諸臟之陽諸臟之陽生則冷痹而有力矣

腎著於濕腰冷如冰若有物者腎著湯主之蓋腎主水脾主濕濕勝則流必歸於坎者勢也故曰腎著腰爲腎之腑濕爲陰之氣故令腰冷如冰若有物者實邪著之也乾薑辛熱之物辛得金之燥熱得火之令燥能勝濕暘能曝濕故乘而用之白朮甘草甘溫之品也甘得土之味溫得土之氣土勝可以制濕故用以佐之白茯苓甘淡之品也甘則益土以防水淡則開其竅而利之此圍師必缺之義也

小可腰痛猪腰青鹽杜仲方主之易曰方以類聚物以羣分故猪腰可以補腰經曰五味入口鹹先入腎故青鹽可以就下杜仲辛甘益腎之物也君以猪腰佐以青鹽則直走腎而補之矣

景岳全書　臣張介賓著

論證

腰痛證舊有五辨一曰陽虛不足少陰腎衰二曰風痹風寒濕著腰痛三曰勞役傷腎四曰墜墮損傷五曰寢臥濕地雖其大約如此然而猶未悉也蓋此證有表裏虛實寒熱之異知斯六者庶乎盡矣而治之亦無難也

凡腰痛證悠悠戚戚屢發不已者腎之虛也遇陰雨或久坐痛而重者濕也遇諸寒而痛或喜煖而惡寒者寒也遇諸熱而痛及喜寒而惡熱者熱也鬱怒而痛者氣之滯也憂愁思慮而痛者氣之虛也勞動即痛者氣之衰也當辨其所因而治之

腰爲腎之府腎與膀胱爲表裏故在經則屬太陽在藏則屬腎氣而又爲衝任督帶之要會所以凡病腰痛者多由眞陰之不足最宜以培補腎氣爲主其有實邪而爲腰痛者亦不過十中之二三耳

腰痛之虛證十居八九但察其既無表邪又無濕熱而或以年衰或以勞苦或以酒色斲喪或七情憂鬱所致者則悉屬眞陰虛證凡虛證之候形色必清白而或見黧黑脈息必和緩而或見細微或以行立不支而臥息少可或以疲倦無力而勞動益甚凡積而漸至者皆不足暴而痛甚者多有餘內傷稟賦者皆不足外感邪實者多有餘故治者當辨其所因

論治

凡腎水眞陰虧損精血衰少而痛宜當歸地黃飲及左歸丸右歸丸爲最若病稍輕或痛不甚虛不甚者如青娥丸煨腎散補髓丹二至丸通氣散之類擇用若腰痛之表證凡風寒濕滯之邪傷於太陽少陰之經者皆是也若風寒在經其證必有寒熱其脈必見緊數其來必聚其痛必拘急兼疲而上連背脊此當辨其陰陽治從解散凡陽證多熱者宜一柴胡飲或正柴胡飲主之若陰證多寒者宜二柴胡飲五積散之類主之尙有未盡當於傷寒門辨治

若濕滯在經而腰痛者或以雨水或以濕衣或以坐臥濕地凡濕氣自外而入者總皆表證之屬宜不換金正氣散平胃散之類主之若濕而兼虛者宜獨活寄生湯主之若濕滯腰痛而小水不利者宜胃苓湯或五苓散加蒼朮主之若風濕相兼一身盡痛者宜羌活勝濕湯主之若濕而兼熱者宜當歸拈痛湯蒼朮湯之類主之若濕而兼寒者宜濟生朮附湯五積散之類主之

凡腰痛有寒熱證寒證有二熱證亦有二如外感之寒治宜溫散如前或用熱物熨之亦可若內傷陽虛之寒治宜溫補如前熱有二證若肝腎陰虛水虧火盛者治當滋陰降火宜滋陰八味煎或用四物湯加黃檗知母黃芩梔子之屬主之若邪火蓄結腰腎而本無虛損者必痛極必煩熱或大渴引飲或二便熱澀不通當直攻其火宜大分清飲加減主之

凡跌仆傷而腰痛者此傷在筋骨而血脈凝滯也宜四物湯加桃仁紅花牛膝肉桂延胡乳香沒藥之類主之若血逆之甚而大便閉結不通者宜元戎四物湯主之或外以酒糟葱薑搗爛罨之其效尤速

丹溪云諸腰痛不可用參補氣補氣則疼愈甚亦不可峻用寒涼得涼則閉遏而痛甚此言皆未當也蓋凡勞傷虛損而陽不足者多有氣虛之證何爲參不可用又如火聚下焦痛極而不可忍者速宜清火何

爲寒凉不可用但虛中夾實不宜用參者有之雖有火而熱不甚不宜過用寒凉者亦有之若桀不可用豈其然乎

若婦人以胎氣經水損陰爲甚故尤多腰痛脚痠之病宜當歸地黃飲主之

方

人參補氣散奇效良方

治氣滯腰痛

人參　川芎　桔梗　白朮　白芷　麻黃去節　陳皮　枳殼　烏藥　白薑炮　甘草炙一錢

水二鍾煎至一鍾或爲細末食前用甘草湯調服一方加五加皮一錢

茯苓桂枝甘草大棗湯仲景下同

茯苓半斤　甘草二兩炙　大棗十五枚擘　桂枝四兩

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服甘爛水法取水二斗置大盆內以杓揚之水上有珠子五六千顆相逐取用之

五苓散

治膀下悸吐涎沫而顛眩

澤瀉一兩一分　桂二分去皮　猪苓去皮　茯苓　白朮各三分

右五味爲末白飲服方寸匕日三服多飲暖水汗出愈

麻黃湯

治太陽病頭痛發熱身疼腰痛惡風無汗而喘者

麻黃去節三兩　桂枝去皮二兩　甘草炙一兩　杏仁湯泡去皮尖七十箇

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微汗不須啜粥

乾薑苓术湯

一名腎著湯治腎著病腰中冷重

甘草　白朮各二兩　乾薑　茯苓各四兩

右四味以水五升煮取三升分溫三服腰中卽溫

桂枝加黃芪湯

治黃汗腰痛腰以上有汗腰以下無汗

桂枝　芍藥　生薑各三兩　黃芪炙　甘草各二兩　大棗十二枚

右六味以水八升煮取三升溫服一升須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力溫覆取微汗若不汗更服

調榮活絡飲方三因

治失力腰閃或跌撲瘀血及大便不通而腰痛

桂枝三分　大黃　當歸條　川牛膝去蘆酒洗　杏仁去皮研泥各二錢　赤芍藥　紅花　羌活　懷生地黃酒洗各一錢　川芎一錢半

水一鍾半煎至八分食前溫服

腰痛方中藏經

治小便不利臍下滿硬語言蹇滯腰痛脚重不能立

瞿麥頭　車前子炒各一兩　官桂去粗皮一分　甘遂三分

右爲末猪腰子一箇去筋膜薄批開入藥末二錢勻裝濕紙包煨熟空心嚼服酒送下以大便爲度小便亦利臍腹未軟更服後方

葱白一寸去心

右用硇砂一錢安入葱心中兩頭以線子繫之濕紙包煨熟冷醉酒送下空心服以效爲度

菊花酒千金方下同

治男女風虛寒冷腰背痛食少羸瘦無顏色噓吸少氣去風冷補不足

茯苓三兩　菊花　杜仲各一斤　防風　附子　黃芪　乾薑　桂心　當歸　釵石斛各四兩　紫石英　肉蓯蓉去鱗甲各五兩　菟絲　獨活　鍾乳各八兩

右十五味㕮咀以酒七斗漬五日一服二合稍稍加至五合日三千金翼無乾薑

杜仲酒

治腎脈逆小於寸口勝胕虛寒腰痛胃中動通四時用之

乾薑一作地黃　杜仲各四兩　菟絲　羌活　天雄　蜀椒　桂心　芎藭　防風　秦艽　烏頭　細辛各三兩　五加皮　石斛各五兩　花粉　桔梗　地骨皮　續斷　甘草各一兩

右十九味㕮咀以酒四斗漬四宿初服五合加至七八合日再通治五種腰痛

又方
治前證
桑寄生　牡丹皮　鹿茸　桂心
四味各等分治下篩酒服方寸匕日三
又方
治腎虛腰痛
萆薢　白朮　桂心各三分　牡丹皮二分
右四味治下篩酒服方寸匕日三亦可作湯服之
又方
治前證
附子二分　桂心　牡丹皮各一兩
右三味治下篩酒服一刀圭日再甚驗
腎著散
治腎虛腰痛
杜仲　桂心各二兩　白朮炒　茯苓各四兩
甘草　澤瀉　牛膝　乾薑各三兩
右八味治下篩爲粗散一服三方寸匕酒一升煮五六沸去滓頓服日再
又方
治腰疼不得立
甘遂　桂心（一作附子）　杜仲　人參各二兩
右四味治下篩以方寸匕內羊腎中炙令熟食之
又方
治腰痛
萆薢　杜仲　枸杞根各一斤
右三味㕮咀好酒三斗漬之內磐中密封頭於銅器中煮一日服之無節度取醉

丹參丸
治腰痛並冷痹
杜仲　丹參　牛膝　續斷各二兩　桂心　乾薑各二兩
右六味爲末蜜丸如梧子大每服二十丸日再夜一
萬靈丸（方出前門下同）
治腎臟一切耳鳴腰疼筋骨痛
赤芍藥　五靈脂　防風　草烏頭炮各二兩
黃芪　細辛　海桐皮　茵陳　地龍　骨碎補
巨勝子　何首烏　蔓荊子　白附子　川烏頭
牛膝各八錢　黑狗腎二兩　仙朮一兩　青皮
御米子炒各二錢　芫花炒三錢　黑牽牛半兩
右爲末酒麪糊爲丸如桐子大每服十丸至二十丸溫酒下空心食前服
一粒金丹
治腰膝走注疼痛如虎嚙
草烏頭　五靈脂各一斤　白膠香半斤　細墨
乳香各一兩　木鼈子　地龍去土炒各四兩
當歸焙　沒藥各二兩　麝香一錢
右爲末再研一千下糯米麪糊和丸如桐子大每服一丸至二丸溫酒下喫藥罷徧身微汗神效
麻黃復煎散
治寒濕腰痛
白朮　人參　生地黃　柴胡　防風各五分
羌活　黃蘗各一錢　甘草三錢　麻黃去節
黃芪各二錢　杏仁去皮三箇
右㕮咀都作一服先以水五大盞煎麻黃令沸去沫煎至二盞內諸藥再煎至一盞臨臥服之勿令食飽取漸次有汗則效
加味龍虎散（醫學入門下同）
能養腎氣治積聚癥瘕內傷生冷外中風寒腰脚膝脛曲折攣拳筋骨疼痛經年不能步履者如神
蒼朮一兩　草烏　熟附子各二錢　全蠍五錢
天麻三錢
右爲末每一錢淋黑豆酒調服
龜楔丸
治濕痰腰痛大便泄或加蒼朮威靈仙尤妙凡腔子裏氣須用些木香行氣
敗龜板一兩　楔白皮　蒼朮　滑石各五錢
白芍　香附各四錢
右爲末粥丸服
七香丸
治鬱悶憂思或閃挫跌撲一切氣滯腰痛
丁香　香附　甘草各一兩二錢　甘松八錢
益智仁六錢　莪朮　砂仁各二錢
右爲末蒸餅糊丸菉豆大每服三十丸米飲下
異香丸
治心腎不和腰痛倦怠腹脅脹悶飲食難化噫氣吞酸一切冷氣結聚腹中刺痛
石蓮肉　甘草　莪朮　三稜　益智仁各五錢
青皮　陳皮各一錢半　厚朴一錢　鹽一撮
右薑棗煎服
瀉腎湯

治腎實熱小便脹滿腰背急強難解便黃舌燥四肢青黑耳聾夢泄等證急宜服此救之

大黃一合用石器水浸一宿　磁石八錢　元參　細辛各四錢　芒硝　白茯苓　黃芩各一錢　生地汁　石菖蒲各五錢　甘草二錢

每服一兩以水三盞煎去查下大黃內藥汁中更煑減一分去大黃下地黃汁微煎一二沸下芒硝食前溫服

活血應痛丸 衞生寶鑑下同

治風濕爲病血脈凝滯腰腿重疼身體麻木頭面虛腫下注脚膝重痛行步艱難

狗脊六兩半　草烏頭二兩半　香附十二兩　陳皮九兩　沒藥另研一兩二錢　威靈仙三兩　蒼朮十兩

右七味爲末酒糊丸桐子大每服二三十丸溫酒或熱水任下不以時

尅效餅子

治腰痛及腿膝痛累效

甘遂麩炒黃　蕎麪各一兩　黑牽牛淨四兩半生半炒取頭末二兩半

右爲末每服三錢夜臥滴水和成餅慢火燒黃色令出氣實者作一服爛嚼後煎半生半熟葱白酒送下微取一行如婦人有胎不可服之

三才封髓丹

降心火益腎水腎陰虛敗腰痛者宜之

麥門冬　熟地　人參各半兩　黃蘗炒三兩　甘草炙七錢半　縮砂仁一兩半

右爲細末米糊和丸梧子大每服五十丸用蓯蓉半兩作片酒浸一宿次日煎至三五沸去查送下前丸子空心服

六味地黃丸

治腎陽虛乏腰痛

熟地黃八兩　牡丹皮　白茯苓　澤瀉各三兩　山茱萸　山藥各四兩

右爲細末煉蜜丸梧子大空心溫酒服五十丸加五味子肉桂熟附子各一兩名腎氣丸

滋腎丸

治腎陰不足腰痛

黃蘗酒洗焙　知母酒洗焙各二兩　肉桂二錢

右爲末熟水丸如雞豆大每服百丸加至二百丸百沸湯下空心服

腰痛方

腰痛脈大者腎虛也宜此

杜仲　龜板　黃蘗　知母　枸杞　五味各等分

右爲末猪脊髓爲丸

又方

治五般腰痛

胡桃肉五箇去皮研爲膏　五靈脂　萆薢炒　黑牽牛炒　白牽牛炒各三錢　狗脊半兩微炒　沒藥三十文　巴豆五粒用濕紙裹煨取肉去油

右件爲末將前胡桃膏和入酢糊丸如桐子大每服十五丸風腰疼豆淋無灰酒下氣腰疼煨葱白酒下血腰痛當歸酒下打撲腰疼蘇木酒下

防風湯

治傷寒腰痛或皮肉痛痹腿膝疼痛行步艱難不可俛仰

防風　芎藭　附子炮去皮臍　當歸　芍藥　羌活　續斷各一兩　麻黃去節　桂枝去皮　杜仲炙各七錢半　牛膝　五加皮　丹參各半兩

右㕮咀每服五錢水一盞半薑二錢同煎食前服

加味四物湯 元戎

治瘀血腰痛

生地　當歸　川芎　芍藥　桃仁泥　紅花酒拌

六味同煎空心熱服

益腎丸 醫門事親

一名煨腎散治閃挫腰痛水濕停蓄作痛

甘遂爲末三錢

以猪腰子批開用鹽椒醃去水摻藥三錢於內荷葉包文武火燒熟細嚼酒送下

羌活桃仁湯

治墜墮閃挫氣血凝滯攻刺腰痛神效

羌活　桃仁泥　紅花　牛膝酒洗　延胡索　大黃酒拌各等分

右㕮咀每服五錢水二盞葱一根煎七分食前服

拈痛湯 醫學正傳下同

治濕熱爲病肩背沉重肢節腰脅痛胷膈不利

白朮四分　人參　升麻　苦參酒炒　葛根　蒼朮各五分　防風去蘆　知母去毛酒洗　澤瀉　黃芩　猪苓去皮　當歸各六分　生黃芩酒洗　炙甘草　茵陳酒炒　羌活各八分

右細切作一服水二盞煎至一盞去查溫服

蒼朮復煎散
治寒濕相合腦後痛惡寒項筋脊骨強肩背膝眼痛腰痛膝腫痛無力行步沉重
紅花一分　黃蘗三分　柴胡　蓁本　澤瀉
白朮　升麻各五分　羌活一錢　蒼朮四兩
右細切先以蒼朮一味用水三大盞煎至二盞去查入前藥復煎至一盞去查空心稍熱服取微汗爲效忌酒及慾
五積散
治寒濕及濕痰流注經絡腰膝背脊疼痛
香白芷　川芎　桔梗　芍藥　陳皮　厚朴
白茯苓　甘草　麻黃　乾薑　官桂　當歸
製半夏　蒼朮　枳殼各五分
右細切作一服加生薑三片水二盞煎至一盞溫服
黑神散（醫宗必讀下同）
治打墜腰痛
黑豆炒去皮半升　熟地黃酒浸　當歸酒洗
肉桂　乾薑炒　甘草炙　芍藥　蒲黃各四兩
右爲細末每服二錢童便半鍾酒少許煎服
復元通氣散
治一切氣濕及閃挫腰痛
大茴香炒　穿山甲炒各二兩　延胡索　橘紅
白牽牛炒　甘草炙各一兩　木香忌火一兩半
右爲細末每服二錢熱酒調下
烏藥順氣散
治前證
白朮　白茯苓　青皮　白芷　陳皮　烏藥
人參各一兩　甘草五錢
右爲末每服三錢水一鍾煎七分服
杜仲木香散（青囊良方）
治腰痛行氣血立愈
杜仲製三錢　木香　官桂各一錢
右爲細末每服二錢空心溫酒調下
屠尚書方（古今醫鑑下同）
治腰痛
破故紙　巴戟天淨　胡盧巴　當歸各五錢
杜仲酒炒一兩　桃仁四十九箇
右剉一劑酒煎入乳香沒藥各三錢調熱服
捉虎丹
治瘀血腰痛
白膠香兩半　草烏頭　五靈脂　木鼈子去殼
地龍去泥土淨各一兩　麝香　京墨各二錢半
乳香　沒藥　當歸各七錢半
右爲細末糯米飯丸桐子大每服一丸或二丸多至三五丸空心溫酒下
按白膠香乃楓香樹脂藥肆無此皆松香之白者殊非立法之初意如用必於夏月山中於楓樹上流出者採用方妙
蕁薢丸
治腎損骨痿不能起於牀腰背腿皆痛
蕁薢　杜仲炒去絲　菟蓉　菟絲子酒浸
右等分細末豬腰子搗爛丸桐子大每服五十丸至七十丸空心溫酒下
術附湯（青囊良方下同）
治濕傷腎經腰重冷痛小便自利
附子炮去皮臍切片　杜仲去皮炒去絲各三錢
白朮四錢
右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾空心服
附子散
治腰痛強直不能俛仰及筋脈拘急
附子炮　當歸剉炒各兩半　杜仲去皮炒去絲
延胡索　羌活各一兩　防風二兩　桂心半兩
牛膝三分
右㕮咀每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓食前溫服
牛膝丸
治腰胯疼痛四肢煩疼不能飲食
牛膝　訶黎勒煨用皮　附子炮　當歸各一兩
乾薑炮　芎藭各半兩　桂心　白芍藥　白朮
羌活各三分　厚朴去粗皮塗生薑汁炙黃香熟一兩半
右爲細末酒煮糊和搗二三百杵丸如梧桐子大每服三十丸食前用溫酒送下
蕁薢酒
治五種腰痛連腳膝筋脈拘急疫疼
蕁薢　牛膝各三兩　羌活　附子炮去皮臍
狗脊　杜仲炒去絲　桂心　桑寄生各二兩
右細剉用生絹袋盛以酒二斗浸窖封七日後開
每於食前溫服一盞
沉香丸

治腎臟風虛冷滯腰間久痛連腿膝麻痹或時疼痛乏力羸瘦

沉香　桂心　萆薢　懷乾地黃　牛膝　羌活　白茯苓　海桐皮　杜仲去粗皮炙黃　石斛去根　檳榔　漏蘆各三分　芎藭　木香　當歸微炒　白朮　防風各半兩　附子炮去皮臍　補骨脂微炒各一兩

右爲細末煉蜜和搗三四千杵丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫酒送下晚間照前再服

一柴胡飲景岳全書下同

治腰痛陽證多熱者

柴胡二三錢　黃芩　生地　陳皮各一錢半　芍藥二錢　甘草八分

水一鍾煎七八分溫服

二柴胡飲

治腰痛陰證多寒者

陳皮　厚朴各一錢半　半夏二錢　甘草八分　細莘一二錢　柴胡一錢或二三錢

右水一鍾半生薑三五七片煎七八分溫服

正柴胡飲

治外感風寒腰痛凡血氣平和宜從平散者此方主之

防風　甘草各一錢　陳皮一錢半　芍藥二錢　柴胡一二三錢

水一鍾半生薑三五片煎七八分熱服

當歸地黃飲

治腎虛腰膝疼痛等證

山茱萸肉一錢　當歸二三錢　熟地三五錢　山藥　杜仲各二錢　牛膝一錢半　炙甘草八分

水二鍾煎八分食遠服

左歸丸

治腎虛腰痛眞陰不足壯水之主以培左腎之元陰而精血自充矣

大懷熟地八兩　山藥炒　枸杞子　山茱萸肉　菟絲製　鹿膠炒珠　龜膠炒珠各四兩無火者不用　川牛膝酒洗蒸熟三兩精滑者不用

右先將熟地蒸爛杵膏加煉蜜丸桐子大每食前用滾湯或淡鹽湯送下百餘丸

右歸丸

治腎虛腰痛眞陰不足益火之原以培右腎之元陽而神氣自強矣

大懷熟地八兩　山藥微炒　山茱萸肉微炒　枸杞子微炒　鹿角膠炒珠　菟絲子製　杜仲薑汁炒各四兩　當歸三兩便溏勿用　肉桂二兩漸可加至四兩　製附子二兩漸可加至五六兩

右丸法如前或丸如彈子大每嚼服二三丸以滾白湯送下其效尤速

滋陰八味丸

治陰虛火盛下焦濕熱腰疼變湯名滋陰八味煎

山藥　山萸肉各四兩　丹皮　白茯苓　澤瀉　黃蘗鹽水炒　知母鹽水炒各三兩　熟地八兩蒸

右加煉蜜搗丸梧桐子大或空心或午前用滾白湯或淡鹽湯送下百餘丸

大分清飲

治邪火蓄結腰腎疼痛

茯苓　澤瀉　木通各二錢　猪苓　梔子或倍之　枳殼　車前子各一錢

水一鍾半煎八分食遠溫服

獨活寄生湯衛生寶鑑

治腎氣虛弱冷臥濕地腰腿拘急筋骨攣痛當風取涼過度風邪流入脚膝爲偏枯冷痹緩弱疼痛或腰痛牽引脚重行步艱難

獨活　桑寄生如無以川續斷代　杜仲去皮切炒去絲　牛膝　細莘　秦艽　白茯苓　桂心　防風　芎藭　人參各一錢半　甘草　當歸　芍藥　乾地黃各一錢

水二大盞生薑五片同煎至七分食前服

三仙丹和劑局方

治前證

川烏一兩生去皮剉塊用鹽半兩同炒黃色去鹽　茴香淨稱三兩炒令香透　蒼朮二兩米泔浸一宿刮去皮切碎以葱白一握同炒黃色去葱

右爲末酒煮麪糊丸如梧桐子大每服二十丸空心溫酒鹽湯任下

牛膝酒

治前證

生地黃十兩　牛膝　羌活　地骨皮　五加皮　川芎　薏苡仁　甘草各一兩　海桐皮二兩

右剉以絹袋裹入好酒二斗浸二七日夏三五宿每服一杯日三四次令酒氣不絕爲佳一方入杜仲一兩炒斷絲

生附湯
治受濕腰痛
附子生　白朮　茯苓　牛膝　厚朴　乾生薑
甘草炙各一錢　蒼朮炒　杜仲薑製炒各二錢
右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾
食前服

橘核酒（三因方）
治打撲腰痛惡血瘀蓄痛不可忍
橘核炒去皮研細
右每服二錢酒調服或用猪腰子一箇去筋膜破開入藥同葱白茴香鹽濕紙裹煨熟細嚼溫酒下

川芎肉桂湯
治寒濕腰痛兩脅搐急
羌活　柴胡　歸梢　甘草炙　川芎　肉桂
蒼朮各一錢　防風　漢防己各三分　炒黜
獨活各五分　桃仁五枚去皮另研如泥
右㕮咀水酒煎去查食遠熱服

麻黃蒼朮湯（青囊良方）
治寒濕所客身體沉重腰痛面色萎黃不澤
麻黃　澤瀉　炒黜　白茯苓　橘皮各一錢
半夏　桂枝　草豆蔻　猪苓各半錢　蒼朮
甘草炙各二錢　黃芪三錢　杏仁十箇
右作一服水二鍾煎一鍾食前服

摩腰膏（丹溪心法）
治老人腰痛
附子尖　烏頭尖　南星各二錢半　乾薑一錢
麝香大者五粒小則加之　硃砂　雄黃　樟腦
丁香各一錢半
右爲末蜜丸如龍眼大每服一丸用生薑汁化開
如厚粥火上烘熱放掌上摩腰中候藥盡貼腰上
卽烘綿衣縛定腰熱如火間二日用一丸

蒼朮湯（東垣十書下同）
治濕熱腰腿疼痛
蒼朮五錢　柴胡三錢　防風　黃蘗各一錢半
水二鍾煎至一鍾空心食前服

獨活湯
治因勞役得腰痛如折沉重如山
獨活　防風　澤瀉　大黃煨　肉桂各三錢
羌活　甘草炙二錢　連翹　當歸尾各五錢
桃仁五十粒　漢防己　黃蘗酒浸各一兩
右㕮咀每服五錢如麻豆大酒半盞水一盞去查
熱服

羌活湯
治腰膝無力沉重
羌活三錢　防風一錢半　生甘草　炙甘草
草豆蔻　黃蘗　葛根各五分　知母二錢半
陳皮六分　黃芪二錢　蒼朮　升麻　獨活
砂仁　柴胡各一錢
右爲粗末作二服水二盞煎至一盞去查空心服

羌活勝濕湯
治脊痛項强腰似折項似拔衝頭痛乃足太陽經
不行也
羌活　獨活　藁本　防風各一錢　蔓荆三分
川芎二分　甘草炙五分
右㕮咀作一服水二盞煎一盞去查食後溫服

甘豆湯
治內蓄風熱入腎腰痛大小便不通
黑豆二合　甘草二錢
右加續斷天麻生薑七片水煎服間服敗毒散

敗毒散（直指方下同）
治風熱腰痛傷寒熱證通用
人參　赤茯苓　川芎　桔梗　羌活　獨活
前胡　柴胡　枳殼製　甘草炒各等分
右剉散每服三錢生薑五片煎服

乳香趁痛散
治打墜腰痛
虎脛骨酒炙黃　敗龜板酒炙各二兩　赤芍藥
白附子炮　麒麟竭　當歸　沒藥　桂去粗皮
防風　自然銅煅醋淬研　蒼耳子微炒　白芷
骨碎補炒去毛各三兩　牛膝　天麻　五加皮
檳榔　羌活各一兩
右爲末每服一錢溫酒調下加全蠍更妙

普賢正氣散（和劑局方）
治痰水腰痛
陳皮　半夏製　蒼朮　厚朴　藿香　甘草
生薑各等分
每服五錢水二盞葱二莖黑豆百粒煎八分不拘
時熱服

青娥丸（直指方）
治腎虛腰痛益精助陽烏鬚壯脚
杜仲去粗皮剉豆大用生薑二兩半擦醃炒乾

破故紙各四兩炒香
右爲末用胡桃肉三十箇研膏入少熟蜜丸如桐子大每服五十丸調氣散食前下

地龍湯 東垣十書

治閃挫墜撲腰痛
桃仁六箇　羌活二錢　獨活　甘草　當歸梢
黃蘗各一錢　麻黃去節　中桂　地龍各四分
蘇木六分
右爲粗末每服五錢水二盞煎一盞食遠熱服

補骨脂丸 奇效良方下同

治腰脚疼痛不止
補骨脂微炒　牛膝去苗各三錢　骨碎補一兩
桂心一兩半　檳榔　安息香二兩入胡桃仁搗熟
右爲細末煉蜜入安息香和搗千餘杵丸如梧子大每服十丸至二十丸空心溫酒下

百倍丸

治男婦腰膝疼痛筋脈拘急
敗龜板　虎骨二味各酢浸一宿蘸酢炙令黃
蓯蓉　牛膝酒浸一宿　乳香另研　沒藥另研
木鼈子去殼　骨碎補去毛　自然銅酢淬七次
破故紙炒各等分
右爲細末以浸蓯蓉牛膝酒煑麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸食前溫酒下

養腎散

治腰脚筋骨疼痛不能步履
蒼朮去皮一兩　全蠍半兩　黑附子炮去皮臍
草烏去尖各二錢　天麻三錢
右爲細末每服一錢淋黑豆酒調下藥氣所至痲痹少時瘳

大建中湯 和劑局方

治陽虛腰痛
當歸　白芍藥　白朮　麥門冬　熟地　黃芪
甘草　蓯蓉酒浸　人參　川芎　半夏　肉桂
附子炮去皮　茯苓各等分
每服五錢水二盞薑三片棗二枚煎八分空心溫服

麋茸丸 本事方

治腎虛腰痛不能轉側
麋茸 鹿茸亦可　菟絲子末各一兩　舶上茴香半兩
右爲末以羊腎二對用酒浸煑爛去膜研如泥和丸如桐子大陰乾如羊腎少入酒糊佐之每服三五十丸溫酒或鹽湯下

補陰丸 丹溪心法

治陰虛腰痛
龜板酒炙　黃蘗酒炒　知母　側柏葉　枸杞
五味子　杜仲薑汁炒去絲　縮砂仁各等分
甘草減半
右爲末猪脊髓加地黃膏爲丸

調肝散

治鬱怒傷肝發爲腰痛
半夏製三分　蓽桂　宣木瓜　當歸　川芎
牛膝　細莘各二分　石菖蒲　酸棗仁去皮炒
甘草炙各一錢
每三錢薑五片棗二枚煎服

橘香丸 奇效良方下同

治腰痛
橘核炒　破故紙炒　胡盧巴炒　菴蕳子炒
茴香炒　附子炮各等分
右爲細末酒煑麪糊和丸如梧子大每服三四十丸食前用鹽湯送下

又方

治腰痛
杜仲　肉蓯蓉　破故紙　人參　當歸　秋石
川巴戟　鹿角霜各等分
右爲末用猪腰子一箇洗淨血水淡鹽泥過劈開兩半勿令斷中間細花開用前藥摻入另用稀絹一塊包裹線縛定外用小糖罐入酒少許罐上用紙封固毋令走泄藥氣煑腰子候熟取食之飲醇酒三五杯立愈

立安丸

治五種腰痛常服補煖腎經壯健腰脚
破故紙　乾木瓜　杜仲去皮薑炒去絲　續斷
牛膝酒浸各一兩　萆薢二兩
右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸空心用溫酒或鹽湯送下

二至丸

治腎氣虛損腰痛不可屈伸
附子炮去皮臍　桂心　杜仲去皮剉炒去絲
補骨脂炒各一兩　鹿角鎊　麋角鎊各二兩
鹿茸酒炙　青鹽另研各半兩
右爲細末酒煑糊和丸如梧桐子大每服七十丸

空心用胡桃肉細嚼用鹽湯或鹽酒送下如惡熱藥者去附子加肉蓯蓉一兩

速效散

治男女腰痛不可忍者

川楝子取肉以巴豆五粒去殼同炒赤去巴豆茴香鹽炒香去鹽　破故紙炒各一兩

右爲細末每服三錢空心熱酒調服

散滯丸

治腰痛不可忍者

黑牽牛不以多少取頭末

右用大蒜每一瓣入巴豆肉一粒在內以濕紙裹定煨香熟去巴豆將蒜研和牽牛末爲丸梧子大每服五丸空心食前醋茶湯下量虛實服一方無巴豆以硃砂爲衣每服二十丸酒下一服便安

又方

治腰痛

胡桃肉　補骨脂　杜仲各四兩

右咬咀作二貼每貼用水二盞煎空心服

張走馬家飛步丸

此第一方筋骨藥能去筋脈骨節手足腰背諸般疼痛攣縮不伸之患

乳香一兩另研　白芍藥　川烏生刮去皮臍　草烏生刮去皮臍　木鼈子取肉另研去油淨　白膠香各二兩

右爲細末用赤小豆末煮糊爲丸如梧子大每服十五丸木瓜湯下病在上食後服病在下空心服忌熱物片時

神應丸

治腎經不足風冷乘之腰痛如折牽引背膂俛仰或勞役傷於腎或寢濕地或墜墮傷損風寒客搏皆令腰痛

威靈仙　桂心　當歸各二兩

右爲細末酒煮麪糊丸梧子大每服二三十丸食前用溫酒或茴香湯下婦人桂心湯下

如神湯

一名舒筋湯一名立效散治男婦腰痛閃肭血滯腹中疙痛產後服之更妙

延胡索微炒　當歸　桂心各等分

右爲細末每服二錢不拘時溫酒調服一方加杜仲或加桃仁牛膝續斷亦可

牽牛丸

治冷氣流注腰疼不可俛仰

黑牽牛　延胡索炒　補骨脂另炒擣末各二兩

右煨蒜研膏丸如梧子大每服五十丸食前葱酒鹽湯任下一方不用延胡索骨脂用麩炒爲末酒糊丸

立安散

專治腰痛

杜仲炒　橘核炒取仁

右等分爲細末每服二錢不拘時用鹽酒調服

補骨脂丸

治腰痛不可忍

補骨脂二兩酒浸一宿用麩炒爲末　杏仁湯泡去皮尖研　桃仁炮去皮尖研各一兩

右和勻以浸藥酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服五十丸空心鹽湯或鹽酒下

萬蘭丸

治墜墮閃肭血氣凝滯腰痛

萬蘭子　當歸酒浸焙　威靈仙　破故紙炒　杜仲薑汁炒去絲　桂心各五錢　乳香別研　沒藥別研各二錢半

右爲細末酒煮麪糊丸如梧子大每服七十丸空心用鹽湯或鹽酒任下

神麴酒

治閃挫腰痛

神麴一塊約如拳大

右燒令通赤好酒二大盞淬酒中便飲之令盡仰臥少頃卽安或以此酒吞青娥丸尤妙

除濕丹（袪旨）

治腎著腰痛

陳皮四兩　檳榔　甘遂　芍藥煨　威靈仙　澤瀉　蒼朮各二兩　黑牽牛頭末　乳香研

沒藥研各一兩　大戟炒三兩

右爲末麪糊丸如梧子大每服三十丸空心用燈草湯送下

禹功散（備門事親）

治傷濕腰痛

黑牽牛四兩　茴香炒一兩

右爲末薑汁調二錢服

清濕散（袪旨）

治前證

黃蘗鹽水拌炒　蒼朮米泔浸炒各一錢五分
杜仲　澤瀉　白芍藥煨　牛膝酒浸　木瓜
威靈仙　陳皮各一錢　甘草三分
水二鍾薑三片煎八分食前服痛甚者加乳香沒
藥末五分臨服調入

虎骨散 奇效良方

治腰胯連脚膝曉夜疼痛
虎脛骨酥炙　敗龜板酥炙　當歸　川芎藭
萆薢　牛膝　桂心　羌活各一兩
右爲細末每服二錢空心溫酒調下

加味青娥丸 古今醫鑑下同

治風寒血氣相搏腎腰爲痛
破故紙芝麻同炒變色去芝麻　杜仲各六兩薑汁
浸炒　胡桃肉　沉香　乳香　沒藥各三兩
右爲末以肉蓯蓉六兩酒浸成膏和藥搗千杵丸
如梧子大溫酒或鹽湯下五七十丸

壯本丹

治腎虛腰痛甚妙
杜仲酒炒　破故紙鹽水炒　茴香炒各一兩
肉蓯蓉酒洗　巴戟酒浸　青鹽各五錢
右爲末將猪腰子分開入藥在內縫住紙包煨熟
每一箇作一服以黃酒送下

局方安腎丸 醫學入門

治腎虛腰痛下元虛冷小便滑數
桃仁　白蒺藜　巴戟　肉蓯蓉　山藥　石斛
破故紙　白茯苓　萆薢　白朮各二兩四錢
川烏炮　肉桂各一兩三錢
右爲末蜜丸梧子大空心酒下五七十丸

補髓丹 東垣十書

治腎虛腰痛
鹿茸一兩　破故紙以芝麻二兩半同炒去芝麻
杜仲薑汁炒五兩　沒藥五錢
右爲末胡桃肉十五箇搗膏入麪少許酒煮爲糊
作丸梧子大空心鹽湯下百丸

九味安腎丸 三因方下同

治腎虛腰痛目眩耳聾面黑羸瘦
胡盧巴　破故紙炒　川楝肉　茴香　續斷各一
兩半　桃仁　杏仁　山藥　白茯苓各一兩
右爲末蜜丸梧子大空心鹽湯下五七十丸

熟大黃湯

治墜墮閃挫腰痛不能屈伸
大黃切如指大　生薑切各半兩
右同炒令焦黃色以水一盞浸一宿五更去查服
天明取下如雞肝者即惡物也

杜仲丸 醫學入門

治腎虛腰痛動止軟弱脈大虛疼不已
杜仲薑汁炒　五倍子　枸杞子　敗龜板酥炙
黃蘗　知母并鹽水炒　當歸　白芍藥　黃芪
破故紙炒各一兩
右爲末煉蜜入猪髓和丸梧子大空心鹽湯吞下
八十丸或百丸

補腎湯 古今醫鑑

治腎虛腰痛
破故紙炒　茴香鹽酒炒　延胡索　牛膝酒洗
當歸酒洗　杜仲酒炒　黃蘗　知母並鹽酒炒各
一錢
右作一貼薑三片水煎空心服

調氣散 丹溪心法

治諸氣腰痛
藿香葉　甘草各八錢　縮砂仁四錢　白豆蔻
丁香　白檀香　木香各二錢
右爲末每一錢鹽湯點服不拘時

破血散痛湯 東垣十書

治墮落損傷跌其腰脊惡血留於脅下痛楚不能
轉側
水蛭三錢炒令烟盡另研細　連翹　當歸
柴胡各二錢　蘇木一錢半　羌活　防風
桂心各一錢　麝香五分另研
右剉分二貼每服酒二盞水一盞煎至一盞去滓
調水蛭麝香末空心服兩服即愈

通經散 舊門事親

治腰痛下水濕
陳皮　當歸　甘遂各等分
右爲末每三錢臨臥溫酒調下

七味蒼蘗散 醫學入門

治腰痛
蒼朮　黃蘗　杜仲　破故紙　川芎　當歸
白朮各一錢
右剉作一貼空心水煎服

清肝流氣飲 猪瘍全書下同

治火腰帶毒

桔梗　生甘草　防風　前胡　羌活　獨活
赤芍　連翹　薄荷　荊芥穗　石膏　枳殼
黃連　白茯　歸鬚　青皮　黃芩
右煎服之
敗毒流氣飲
治前證
紫蘇葉　桔梗　枳殼　防風　柴胡　生甘草
川芎　白芷　赤芍藥　當歸　羌活　白茯苓
烏藥　陳皮
右薑三片棗一枚煎服
黃芪內托湯
治一切癰疽已破後虛弱無力體倦懶言精神短少飲食無味自汗口乾脈濇不睡並效
黃芪　人參　茯苓　川芎　歸身　白芍藥
熟地　肉桂　麥冬　遠志各一錢　甘草五分
右咬咀水二鍾薑三片棗二枚煎一鍾食遠服
勝金丹
治腰疽并一切腫痛
麝香　製砒各五分　蟾酥一錢　雄黃　辰砂
乳香　沒藥　血竭各一錢半　天龍去頭足炙
全蝎泡炙　穿山甲炙各三錢　殭蠶炙去絲五錢
右爲細末和勻每服三分赤砂糖調葱頭酒送下取汗爲度
內疏黃連湯
治癰腫火丹并一切癰疽發熱而煩脈沉而實病遠在內臟腑祕濇當急疏利之
連翹二兩　黃連　芍藥　當歸　檳榔　木香
黃芩　梔子　薄荷　桔梗　甘草各一兩
右除檳榔木香爲末外並剉每服一兩水一盞半煎一盞先喫一二服次每服加大黃一錢再加二錢以利爲度
一粒金丹
治一切惡瘡癰腫無名腫毒
沉香　木香　乳香各五分　巴豆霜一錢五分
右爲細末照稱分數和勻用黑肥棗子擩半去皮搗爛爲丸如芡實大每服一丸量人虛實先呷水一口行一次胃氣壯實者只可呷水三四口不可太過後用水一口送藥下行盡數次以米飲補之
仙方活命飲
一名眞人活命飲治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者即潰又止痛消毒之聖藥也
滴乳香研　當歸尾　明沒藥研　赤芍　防風
甘草節　白芷　貝母　皂角刺炒　天花粉
穿山甲炮各一錢　陳皮　金銀花各三錢
右爲粗末大者四兩小者二兩作一劑無灰酒十茶鍾瘡小五茶鍾入有嘴瓶內以厚紙封口勿令泄氣煎至三大鍾去查作三次服接連不斷隨瘡上下服能飲酒者服藥後再飲三五杯此藥並無酒氣不動臟腑不傷氣血忌酸薄酒鐵器服後側睡覺痛定同生神功活大不可聽度
人參養榮湯
治癰疽氣血不足不能收斂若大瘡愈後多服之不變他病
白芍一錢半　人參　陳皮　黃芪蜜炙　桂心
當歸酒拌　白朮　甘草炙各一錢　熟地酒拌五味炒杵　茯苓各七分半　遠志去心炒五分
右作一劑水二鍾薑三片棗一枚煎八分食前服
十全大補湯
治血氣未足之人結腫未成膿者宜加枳殼香附連翹服之自消
人參　肉桂　地黃酒洗蒸焙　白芍炒　川芎
白茯苓　白朮薑土炒拌炒　黃芪鹽水拌炒
當歸酒拌各一錢　甘草炙五分
右作一劑用水二鍾薑棗煎服