中國歷代醫學典



廣陵書社

中國歷代醫學典

四



廣陵書社

圖書在版編目(CIP)數據

中國歷代醫學典 / 廣陵書社編. —揚州:廣陵書社,2008.8
ISBN 978-7-80694-286-4

Ⅰ.中… Ⅱ.廣… Ⅲ.中國醫藥學—古籍—選集 Ⅳ.R2-52

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2008)第 115790 號



書　　名　中國歷代醫學典
編　　者　廣陵書社
責任編輯　王志娟
出版發行　廣陵書社
揚州市文昌西路雙博館附二樓　郵編 225012
http://www.yzglpub.com　E-mail:yzglss@163.com
印　　刷　揚州市文津閣古籍印務有限公司
版　　次　2008 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
規　　格　開本 /787 × 1092 毫米　1/16
印　　張　344.375
標準書號　ISBN 978-7-80694-286-4/K·154
定　　價　1500.00 圓(全八册)

出版説明

本書是對清代以前醫學的一個總結，係根據《古今圖書集成》的《博物彙編·藝術典·醫部》内容編輯而成。

《古今圖書集成》原名《彙編》，由清代陳夢雷編纂，後經雍正帝審閲，改名爲《欽定古今圖書集成》，并由户部尚書蔣廷錫等增删重編，至雍正四年告成。《古今圖書集成》收羅宏富，内容廣博，體例周詳，分類細密；全書分六彙編，三十二典，六千一百零九部，共一萬卷，集我國古代文獻之大成，號稱『清朝第一大書』（康有爲語），實際上也是我國現存最大的古代類書。

『藝術』一詞，古代含義與今不同。古代『藝』指才能，『術』指方法；『藝術』合稱則泛指各種技術技能。《博物彙編·藝術典》原分四十三部，『所紀多民用所資』，『醫部』當時是收在『藝術典』中。我社于二〇〇七年四月出版《中國歷代藝術典》是按現代藝術含義收編，祇將屬于現代藝術範疇的繪畫、游藝、戲劇等内容輯入，而農、醫、商賈、術數等部皆未入選。

本書稿共五百二十卷，爲我國歷代以來最大的一部醫學類書。先作『彙考』，然後再分列總論、醫術名流列傳、藝文、紀事、雜録、外編等，系統而全面地收録了上古至清初醫學方面的相關資料。第一卷到五百卷爲醫經注釋、臨床各科疾病的證治，第五百一卷至五百二十卷，設總論、列傳、藝術、紀事、雜録、外編等内容。『總論』從《易

經》、《周禮》及《靈樞》、《素問》等經典著作中摘録了某些有關醫學的概論性資料；『醫術名流列傳』收輯了清初以前歷代著名醫學家的傳記一千多例；『藝文』是歷代醫藥書籍中有研究價值的序和一些醫學家的詩文；『紀事』是史書、筆記中有關中國傳統醫藥的記載；『雜論』是有關書籍中記述的醫學事迹和寓言故事；『外編』是非醫學書籍中所記載的有關醫學傳説等内容。輯録了從春秋戰國到清朝初期的醫學著作百餘種，分門别類歸納集成。其結構嚴謹，層次分明，載述有據，論理精詳。其取材廣泛，既有中國醫藥學的基礎理論，又包括了中醫臨床各科疾病的證治，上采秦漢醫經及注釋，下集清初名著及文獻，堪爲醫學百科全書。在中醫學術的發展史上起到了積極的作用，有深遠的影響。

一九五九年十二月人民衛生出版社曾出版《古今圖書集成醫部全録》鉛印本，但有部分删節。此次我社新編《中國歷代醫學典》爲全本。

廣陵書社于上世紀九十年代起陸續編輯印行《中國歷代食貨典》、《中國歷代經籍典》、《中國歷代文學典》、《中國歷代禮儀典》、《中國歷代考工典》、《中國歷代藝術典》諸書，由于按類彙編，資料翔實，收録全面，具有較高的資料價值，給研究者帶來很大便利。今仍依其例，以饗讀者。

編　者

二〇〇八年七月

中國歷代醫學典目錄

第一册

第一卷至第四十五卷
黃帝素問 一
第四十六卷
黃帝素問補遺 五二〇
第四十七卷至六十卷
黃帝靈樞經 五三一

第二册

第六十一卷至第六十八卷
黃帝靈樞經 六九五
第六十九卷至第七十卷
扁鵲難經 八〇七
第七十一卷至第八十八卷
脉法 八三五
第八十九卷至第九十二卷
外診法 一〇三五
第九十三卷至第一百五卷
臟腑門 一〇八五
第一百六卷至第一百十卷
經絡門 一二二七
第一百十卷
身形門 一二七七
第一百十一卷至第一百十七卷
運氣門 一二八四

第三册

第一百十八卷至第一百二十一卷
運氣門 一三六一
第一百二十二卷至第一百二十九卷
頭門 一四〇七
第一百三十卷至第一百三十三卷
面門 一四九三
第一百三十四卷至第一百三十七
耳門 一五三〇

第一百三十八卷至第一百五十卷
目門　一五六八
第一百五十一卷至第一百五十二卷
鼻門一六八八
第一百五十三卷至第一百五十四卷
唇口門　一七一一
第一百五十五卷至第一百五十七卷
齒門　一七三一
第一百五十八卷至第一百六十卷
舌門　一七五七
第一百六十卷至第一百六十三卷
咽喉門　一七七八
第一百六十四卷至第一百六十五卷
鬚髮門　一八一六
第一百六十六卷至第一百六十九卷
頸項門　一八三〇
第一百七十卷
肩門　一八六九
第一百七十一卷
腋門　一八七七
第一百七十二卷至第一百七十四卷
脊門　一八八五
第一百七十五卷至第一百七十九卷
背脊門　一九一〇
第一百八十卷至第一百八十五卷
胸腹門　一九五五
第一百八十六卷第一百八十七卷
腰門　二〇二〇

第四册

第一百八十八卷
腰門　二〇四一
第一百八十九卷至第一百九十九卷
四肢門　二〇五〇
第二百卷至第二百六卷
前陰門　二一五二

第二百七卷至第二百十卷
後陰門 二二二五
第二百十一卷
皮門 二二六九
第二百十二卷至第二百十三卷
肉門 二二八一
第二百十四卷至第二百十五卷
筋門 二二九五
第二百十六卷
骨髓門 二三一二
第二百十七卷至第二百二十五卷
風門 二三二二
第二百二十六卷至第二百二十九卷
痹門 二四〇四
第二百二十九卷至第二百三十卷
寒門 二四四一
第二百三十一卷至第二百三十二卷
暑門 二四五六
第二百三十三卷至第二百三十四卷
濕門 二四七八
第二百三十五卷
燥門 二四九九
第二百三十六卷至第二百三十七卷
火門 二五〇八
第二百三十八卷至第二百四十二卷
痰門 二五三一
第二百四十二卷至第二百四十七卷
咳嗽門 二五七五
第二百四十八卷至第二百五十一卷
嘔吐門 二六三二
第二百五十二卷至第二百五十六卷
泄瀉門 二六六九
第二百五十七卷第二百五十八卷
霍亂門 二七一八

第五册
第二百五十九卷至第二百六十三卷
滯下門　二七三九
第二百六十四卷至第二百六十七卷
大小便門　二七八七
第二百六十八卷至第二百七十卷
淋濁遺精門　二八二三
第二百七十一卷至第二百七十七卷
血門　二八五七
第二百七十八卷至第二百七十九卷
汗門　二九二六
第二百八十卷至第二百八十二卷
渴門　二九四四
第二百八十三卷至第二百八十五卷
哮喘門　二九七四
第二百八十五卷至第二百八十七卷
疽門　二九九七
第二百八十八卷至第二百九十一卷
瘧門　三〇二一
第二百九十二卷至第二百九十四卷
厥門　三〇六五
第二百九十五卷至第二百九十七卷
癲狂門　三〇九〇
第二百九十八卷
痛門　三一一五
第二百九十九卷至第三百卷
瘟疫門　三一二七
第三百一卷至第三百二卷
癱瘓門　三一四三
第三百三卷至第三百七卷
虚勞門　三一五九
第三百八卷至第三百十一卷
腫脹門　三二一五
第三百十二卷至第三百十三卷
噎膈反胃門　三二五九

第三百十四卷至第三百十五卷
飲食門 三二八六
第三百十六卷至第三百十八卷
積聚門 三三〇九
第三百十九卷至第三百二十卷
驚悸怔忡健忘門 三三三七
第三百二十一卷
情志門 三三六一
第三百二十二卷
煩躁門 三三七四
第三百二十三卷
嗜卧門 三三八四
第三百二十三卷
不得卧門 三三八七
第三百二十四卷
聲音門 三三九六
第三百二十五卷
呃門 三四〇七
第三百二十五卷
噫氣門 三四一八

第六册

第三百二十六卷
懊憹門 三四二一
第三百二十六卷
懈惰門 三四二二
第三百二十六卷
太息門 三四二六
第三百二十七卷
中蠱門 三四二八
第三百二十七卷
中毒門 三四三三
第三百二十八卷
中惡門 三四四二
第三百二十八卷
卒中暴死門 三四四九

第三百二十九卷
諸哽門　三四五五
第三百二十九卷
五絶門　三四五七
第三百二十九卷
怪病門　三四五八
第三百二十九卷
諸蟲門　三四六二
第三百三十卷至第三百三十二卷
頤養補益門　三四七一
第三百三十三卷至第三百三十四卷
種子門　三五〇四
第三百三十五卷至第三百五十八卷
傷寒門　三五二三
第三百五十九卷至第三百六十七卷
外科癰疽疔毒門　三七六九
第三百六十八卷
外科附骨流注門　三八八一
第三百六十九卷
外科遊風丹毒斑疹門　三八九四
第三百七十卷至第三百七十一卷
外科癘瘍瘰風門　三九〇四
第三百七十二卷至第三百七十三卷
外科浸淫疥癬門　三九二七
第三百七十四卷
外科反花天泡楊梅門　三九四〇
第三百七十五卷
外科瘻瘤疣痣門　三九五〇
第三百七十六卷
外科熱瘡痤痱門　三九六五
第三百七十六卷
外科湯火灸凍漆瘡門　三九六八
第三百七十七卷至第三百八十卷
外科跌打金刃竹木破傷門　三九七五
第三百八十卷
外科蟲獸傷門　四〇一三

第三百八十一卷至第三百八十三卷
婦人經脉門 四〇二二
第三百八十四卷
婦人子嗣門 四〇五八
第三百八十五卷至第三百八十六卷
婦人胎前門 四〇七二
第七册
第三百八十七卷
婦人胎前門 四一〇一
第三百八十八卷至第三百八十九卷
婦人臨産門 四一一八
第三百九十卷至第三百九十四卷
婦人産後門 四一三九
第三百九十五卷至第三百九十六卷
婦人崩漏門 四二〇五
第三百九十七卷至第三百九十八卷
婦人帶下門 四二二九
第三百九十九卷
婦人諸乳疾門 四二五二
第四百卷
婦人前陰諸疾門 四二六五
第四百卷
婦人夢與鬼交門 四二七六
第四百卷
婦人交腸門 四二七八
第四百一卷
小兒未生胎養門 四二八〇
第四百二卷
小兒初生護養門 四二八八
第四百三卷至第四百五卷
小兒診視門 四三〇二
第四百六卷
小兒臟腑形證門 四三三七
第四百七卷至第四百十卷
小兒初生諸疾門 四三四九

第四百十一卷至第四百十四卷
小兒頭面耳目鼻病門 四三九四
第四百十五卷至第四百十六卷
小兒唇口齒舌喉病門 四四三四
第四百十六卷
小兒胸背手足病門 四四五二
第四百十七卷至第四百十八卷
小兒風寒門 四四五八
第四百十九卷至第四百二十一卷
小兒諸熱門 四四七七
第四百二十二卷至第四百二十三卷
小兒嗽喘門 四五〇九
第四百二十四卷
小兒諸卒中門 四五三五
第四百二十五卷至第四百三十三卷
小兒驚癇門 四五四六
第四百三十四卷至第四百三十七卷
小兒吐瀉門 四六三六
第四百三十八卷
小兒二便門 四六六九
第四百三十九卷
小兒心腹痛門 四六八二
第四百四十卷
小兒腫脹門 四六九一
第四百四十一卷至第四百四十二卷
小兒食癖門 四七〇二
第四百四十三卷至第四百四十七卷
小兒諸疳門 四七二五
第四百四十八卷
小兒痢門 四七七六

第八册

第四百四十九卷
小兒痢門 四七八九
第四百五十卷
小兒嘔門 四七九九

第四百五十一卷
小兒諸汗門 四八〇八
第四百五十一卷
小兒陰病門 四八一二
第四百五十二卷
小兒雜病門 四八一八
第四百五十三卷至第四百五十八卷
小兒瘡瘍門 四八二八
第四百五十九卷至第五百卷
痘疹門 四八八六
第五百一卷至第五百三卷
總論 五三〇〇
第五百四卷至第五百十七卷
醫術名流列傳 五三二九
第五百十八卷至第五百十九卷
藝文 五四七六
第五百十九卷
紀事 五四八四
第五百二十卷
雜録 五四九〇
第五百二十卷
外編 五四九四

目録

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百八卷目錄

醫部彙考一百八十八

腰門三

單方

鍼灸

導引

醫案

藝術典第二百八卷

醫部彙考一百八十八

腰門三

單方

脾疼腰痛砒霜成塊者爲末黃丹各半兩化蠟入砒以柳條攪焦則換至七條取起收之每旋丸梧子大冷水送下小兒黍米大和劑局方

金牙石治一切冷風氣筋骨攣急腰脚不遂燒酒浸服聖惠

腰腹諸痛焰硝雄黃各一錢研細末每點少許入眥內名火龍丹集元方

腰脚疼痛天麻半夏細莘各二兩絹袋二箇各盛藥合勻蒸熱交互熨痛處汗出則愈數日再熨衛生易簡方

氣滯腰痛青木香乳香各二錢酒浸飯上蒸勻酒調服聖惠方

腎虛腰痛用破故紙一兩炒爲末溫酒服三錢神妙或加木香一錢經驗方

腰痛揩牙香附子五兩生薑二兩取自然汁浸一宿炒黃爲末入青鹽二錢擦牙數次其痛即止乾坤生意

婦人腰痛向東蘘荷根一把搗汁三升服之肘後方

腰脚風氣作痛大黃一兩切如碁子和少酥炒乾勿令焦搗篩每用二錢空心以水三大合入薑三片煎十餘沸取湯調服當下冷膿惡物痛即止崔元亮海上方

腰脚冷痹疼痛有風川烏頭三箇生去皮臍爲散酢調塗帛上貼之須臾痛止聖惠方

虛寒腰痛鹿茸去毛酥炙微黃附子炮去皮臍各二兩鹽花三分爲末棗肉和丸梧子大每服三十丸空心溫酒下

腰膝疼痛或頑痲無力菟絲子洗一兩牛膝一兩同入銀器內酒浸一寸五分暴爲末將原酒煮糊丸梧子大每空心酒服二三十丸經驗方

氣滯腰痛牽牛不拘多少以新瓦燒赤安於上自然一半生一半熟不得撥動取末一兩入硫黃末二錢半同研勻分作三分每分用白麪三匙水和捍開切作碁子五更初以水一盞煑熟連湯溫下痛即已未住隔日再作予常有此疾每發一服痛即止本事方

挫氣腰痛香茶內滴入菜油數點頓服綱目

腰重作痛檳榔爲末酒服一錢斗門方

桃榔子麪作餅炙食腴美令人不饑補益虛羸損之腰脚無力久服輕身辟穀李珣

腰痛難轉煎茶五合投酢二合頓服孟詵食療

腰腿疼痛甜瓜子三兩酒浸十日爲末每服三錢空心酒下日三壽域神方

閃挫腰痛用西瓜青皮陰乾爲末鹽酒調服三錢攝生衆妙方

葡萄根及藤葉治腰脚肢腿痛煎湯淋洗之良時珍

腰脚諸痛用威靈仙末空心溫酒服一錢逐日以微利爲度千金方

又方用威靈仙一片洗乾好酒浸七日爲末麪糊丸梧子大以浸藥酒每服二十丸

腎虛腰痛杜仲爲末每旦以溫酒服二錢三因方

腰脚風痛不能履地皂角子一千二百箇洗淨以少酥熬香爲末蜜丸梧子大每空心以蒺藜子酸棗仁湯下三十丸千金方

牛領藤主腹內冷腰膝痛弱小便白數陽道乏煑汁或浸酒服

白龍鬚治男子婦人腰腿痛不可忍並宜之惟虛勞癱瘓不可服研末每服一錢氣弱者七分無灰酒下密室隨左右貼牀臥待汗出自乾勿多蓋被三日勿下牀見風一方得疾淺者用末三錢瓷瓶煑酒一壺每日先服桔梗湯少頃飲酒二盞早一服晚一服保壽堂方

腰脚風冷石花浸酒飲之聖惠方

腰脚疼痛新胡麻一升熬香杵末日服一小升服至一斗永瘥溫酒蜜湯薑汁皆可下千金方

風冷傷腎腰背痛杜仲一斤切炒酒二斤漬十日日服三合陶隱居得效方

腰痛炙熱黃狗皮裹之頻用取瘥時珍

腰痛虛寒糯米二升炒熱袋盛拴靠痛處內以八角茴香研酒服談埜翁試驗方

腰脅卒痛大豆炒二升酒三升煑二升頓服肘後方

卒然腰痛大豆六升水拌濕炒熱布裹熨之冷即易

乃張文仲所處方也延年秘錄

粟子粥補腎氣益腰脚

女貞皮酒治風虛補腰膝女貞皮切片浸酒煑飲之

薏苡仁酒去風濕强筋骨壯腰膝健脾胃用絕好薏苡仁粉同麴米釀酒或袋盛煑酒飲

茯苓酒治頭風虛眩暖腰膝主五勞七傷用茯苓粉同麴米釀酒飲之

仙茆酒治精氣虛寒陽痿膝弱腰痛痹緩諸虛之病用仙茆九蒸九曬浸酒飲

牛蒡酒治諸風毒利腰脚用牛蒡根切斤浸酒飲之

羊羔酒大補元氣健脾胃益腰腎宣和化成殿眞方用米一石如常浸漿嫩肥羊肉七斤麴十四兩杏仁一斤同煑爛連汁拌末入木香一兩同釀勿犯水十日熟極甘滑一法羊肉五斤蒸爛酒浸一宿入消梨七箇同搗取汁和麴米釀酒飲之

腰脚無力韭子一升揀淨蒸兩次暴乾簸去黑皮炒黃搗粉用安息香二大兩水煑一二百沸慢火炒赤色和搗爲丸梧子大如乾入少蜜每日空服酒下二十丸以飯三五匙壓大佳崔元亮海上方

腰脊脹痛芥子末酒調貼之立效摘元方

腎虛腰痛用猪腰子一枚切片以椒鹽醃去腥水入杜仲末三錢在內荷葉包煨食之酒下本草權度

思仙散用八角茴香杜仲各炒研三錢木香一錢水一鍾酒半鍾煎服活人心鏡

閃剉腰痛蒔蘿作末酒服二錢匕永類鈐方

腰脚拘攣腰脚風血積冷筋急拘攣疼痛者取茄子五十斤洗以水五斗煑取濃汁濾去滓更入小鐺中煎至一升以來卽入生粟粉同煎令稀稠得所取出搜和更入麝香硃砂末同丸如梧子大每日用秫米酒送下三十丸近暮再服三月乃瘥男子女人通用皆驗圖經本草

腰痛不止天羅布瓜子仁炒焦擂酒服以查傅之熊氏補遺

腰痛不止絲瓜根燒存性爲末每溫酒服二錢神效甚便鄧筆峯雜興

腰脊作痛三月三日取桃花一斗一升井華水三斗麴六升米六斗炊熟如常釀酒每服一升日三服神效千金方

老人腰痛及腿痛用棠毬子鹿茸炙等分爲末蜜丸梧子大每服百丸日二服

腎疰腰痛用青皮炒研每服溫酒一錢或酒煎服大明

放杖木治一切風血理腰脚輕身變白不老浸酒服之藏器

蟾酥同牛酥或吳茱萸苗汁調摩腰眼陰囊治腰腎冷并助陽氣日華

閃腰血痛桂末和苦酒塗之乾再上肘後方

白檀香治腰腎痛水磨塗腰腎痛處大明

腎虛腰痛用杜仲去皮炙黃一大斤分作十劑每夜取一劑以水一大升浸至五更煎三分減一取汁以羊腎三四枚切下再煑三五沸如作羹法和以椒鹽空腹頓服聖惠方入薤白七莖篋中方加五味子半斤海上方

腰痛脚氣木瓜湯治腰膝痛脚氣羊肉一脚草果五枚粳米二升回回豆卽胡豆半升木瓜二斤取汁入砂糖四兩鹽少許煑肉食之正要下同

虛寒腰痛用羊頭蹄一具草果四枚桂一兩薑半斤哈昔泥一豆許胡椒煑食

腎虛腰痛用羊腎去膜陰乾爲末酒服二方寸匕日一千金方

治卒腰痛羊腎一對咱夫蘭一錢水一盞浸汁入鹽少許塗抹腎上徐徐灸熟空腹食之正要

腎虛腰痛用羊脊骨一具槌碎煑和蒜薤食飲少酒妙心鏡

又方用羊脊骨一具槌碎肉蓯蓉一兩草果五枚水煑汁下葱醬作羹食正要

腰脚不隨攣急冷痛取虎脛骨五六寸刮去肉膜塗酥炙黃搗細絹袋盛之以瓶盛酒一斗浸之煻火微溫七日後任情飲之當微利便效也

又方虎腰脊骨一具前兩脚全骨一具並於石上以斧槌碎安鐵牀上文炭火炙待脂出則投無灰濃酒中密封春夏七日秋冬三日任性日飲三度患十年以上者不過三劑七年以下者一劑必瘥崔元亮海上方

腰脊痛及腎勞腰脊攣用杜仲四兩炒去絲浸酒二升每服酒三合日三服一方用杜仲薑汁炒去絲爲末空心酒下一錢綱目

腰膝疼痛傷敗者鹿茸塗酥炙紫爲末每溫酒服一錢續千金方

腎虛腰痛如錐刺不能動搖鹿角屑三兩炒黃研末空心溫酒服方寸匕日三肘後方

腰脚屈而難伸山櫨末三錢茶酒鹽湯隨下

皂角膏治諸腰脚疼痛用好酒二大椀皂角一斤去

皮弦搗碎熬至一半濾去滓再用前汁入銀石器內熬爲膏子隨痛處貼之（綱目）

腰脚雖痛牽引支腿者猫兒屎燒灰唾津調塗之（永類鈐方）

閃損腰痛趁痛丸用白葛苴子炒三兩白粟米炒一撮乳香沒藥烏梅肉各半兩爲末煉蜜丸彈子大每嚼一丸熱酒下（玉機微義）

腰曲不伸重如帶石用赤茯苓白朮各四兩炙草三兩乾薑炮二兩每五錢水煎服

天火帶用白鱔泥沙研細香油傳之（丹溪心法）

又方雉雞毛及鵝毛燒灰香油調敷

閃挫腰痛以茴香同紅麴搗爛好熱酒調服

又方用茴香根搗爛好酒下立愈

凡腰痛用生薑四兩取自然汁略熱乾水氣成膏將貼患處外將裹脚縛住未貼膏之先須要稍醉然後以膏貼患處蓋膏到身上片時熱不可當醉則濃睡不覺其熱耳（趙氏醫貫）

腰痛磁石火煅酢淬九次爲末水飛作丸服或入補腎藥皆佳腎虛腰不利宜用（本草下同）

腰痛膝冷菟絲子酒煮作末溫酒下二錢

腰痛地黃花爲末酒服方寸匕

又方菟絲末二兩杜仲蜜炙末一兩山藥末酒煮爲糊作丸酒下五七十丸名固陽丹

蛇纏瘡用雄黃研爲末以酢調塗仍用酒調服凡爲蛇傷及蜂蠆蜈蚣毒蟲頭犬所傷皆可用之（證治準繩）

腰痛脚弱石斛煮服末服浸酒服皆佳（本草下同）

腰脊痛蒺藜子爲末蜜丸服或作末和酒服並佳

腰痛肉蓯蓉作丸服之

又方續斷煮服末服並佳

腰痛草薢酒浸服之

又方草薢三兩杜仲一兩搗爲末空心酒服二錢禁食牛肉

又方威靈仙細末二錢猪腰子一隻批藥在內濕紙裹煨熟早晨細嚼熱酒下（綱目）

又方威靈仙酒浸爲末麪糊和丸梧子大酒下八十丸至百丸大便下青膿（本草下同）

腰痛五加皮細剉酒浸服之

腎虛腰痛童便二盞好酒一盞猪腰子一對盛磁缸黃泥封口日晚以慢火養熟至中夜待五更初以火溫之發瓶飲酒食腰子此以血養血絕勝金石草木之藥（入門）

虛損腰痛取胡桃肉和杜仲茴香浸酒空心服

腰脊痛薏苡仁爲末煮粥空心服

鍼灸

素問曰腎熱病者熱爭則腰痛不可用俛仰腹滿泄兩顴痛甲乙甚戊己大汗氣逆則甲乙死刺足太陰陽明

腎熱病者先腰痛脈痠苦渴數飲身熱戊己甚壬癸大汗氣逆則戊己死刺足少陰太陽

足太陽之瘧令人腰痛頭重寒從背起刺郄中出血

足厥陰之瘧令人腰痛少腹滿小便不利刺足厥陰

腎瘧者令人洒洒寒腰脊痛宛轉刺足太陽少陰

先腰脊痛者先刺郄中出血

足太陽脈令人腰痛引項脊尻背如重狀刺其郄中

太陽正經出血脊無見血

少陽令人腰痛如以鍼刺其皮中循循不可以俛仰不可以顧刺少陽成骨之端出血成骨在膝外廉之骨獨起者夏無見血

陽明令人腰痛不可以顧顧如有見者善悲刺陽明於脏前三痏上下和之出血秋無見血

足太陰令人腰痛痛引脊內廉刺少陰於內踝上二痏春無見血出血太多不可復也

厥陰之脈令人腰痛腰中如張弓弩弦刺厥陰之脈在腘踵魚腹之外循循累累然乃刺之其病令人善言默默然不慧刺之三痏

解脈令人腰痛痛引肩目瞤瞤然時遺溲刺解脈在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血血變而止

解脈令人腰痛如引帶長如折腰狀善恐刺解脈在郄中結絡如黍米刺之血射以黑見赤血而已

同陰之脈令人腰痛痛如小錘居其中怫然腫刺同陰之脈在外踝上絕骨之端爲三痏

陽維之脈令人腰痛痛上怫然腫刺陽維之脈脈與太陽合踹下間去地一尺所

衝絡之脈令人腰痛不可以俛仰仰則恐仆得之臯重傷腰衝絡絕惡血歸之刺之在郄陽筋之間上郄數寸橫居爲二痏

會陰之脈令人腰痛痛上漯漯然汗出汗乾令人欲飲飲已欲走刺直陽之脈上三痏在蹻上郄下五寸橫居視其盛者出血

飛陽之脈令人腰痛痛止怫怫然甚則悲以恐刺飛陽之脈在內踝上五寸少陰之前與陰維之會

昌陽之脈令人腰痛痛引膺目眩眩然甚則反折舌卷不能言刺內筋爲二痏在內踝上大筋前太陰後上踝二寸所

散脈令人腰痛而熱熱甚生煩腰下如有橫木居其中甚則遺溲刺散脈在膝骨肉分間絡外廉束脈爲三痏

內里之脈令人腰痛不可以俯仰則筋縮急刺內里之脈爲二痏在太陽之外少陽絕骨之後

腰痛挾脊而痛至頭几几然目眩眩欲僵仆刺足太陽郄中出血

腰痛上寒刺足太陽陽明上熱刺足厥陰不可以俛仰刺足少陽中熱而喘刺足少陰刺郄中出血

腰痛上寒不可顧刺足陽明上熱刺足太陰中熱而喘刺足少陰大便難刺足少陰少腹滿刺足厥陰如折不可以俛仰不可舉刺足太陽引脊內廉刺足少陰

腰痛引少腹控胁不可以仰刺腰尻交者兩踝胂上以月生死爲痏數發鍼立已左取右右取左

腰痛不可以轉搖急引陰卵刺八髎與痛上八髎在腰尻分間

靈樞經曰小腸病者小腹痛腰脊控睾而痛時窘之後當耳前熱若寒甚若獨肩上熱甚及手小指次指之間熱若厥陷者此其候也手太陽病也取之巨虛下廉

病在上者下取之病在下者高取之病在頭者取之足病在腰者取之腘

足少陰之別名曰大鍾別走太陽其別者并經上走於心包下外貫腰脊其病氣逆則煩悶實則閉癃虛則腰痛取之所別也

邪在腎則病骨痛陰痹陰痹者按之而不得腹脹腰痛大便難肩背頸項痛時眩取之湧泉崑崙視有血者盡取之

厥頭痛項先痛腰脊爲應先取天柱後取足太陽

厥挾脊而痛至頂頭沉沉然目眩眩然腰脊強取足太陽腘中血絡

心痛引腰脊欲嘔取足少陰

腎氣盛則夢腰脊兩解不屬凡此盛者至而瀉之立已

腰尻以下應冬至其日壬子凡此者善候八正所在之處所主左右上下身體有癰腫者欲治之無以其所直之日潰治之是謂天忌日也

甲乙經曰腰痛上寒實則脊急強長強主之

少腹痛控睾引腰脊疝痛上衝心腰脊強溺黃赤口乾小腸俞主之

腰脊痛強引背少腹俛仰難不得仰息脚痿重尻不舉溺赤腰以下至足清不仁不可以坐起膀胱俞主之

腰痛不可以俛仰中膂內俞主之

腰足痛而清善偃睪跳舉上窌主之

腰痛怏怏不可以俛仰腰以下至足不仁入脊腰背寒次窌主之先取缺盆後取尾骶與八窌

腰痛大便難瀉泄腰尻中寒中窌主之

腰痛脊急脅中滿小腹堅急志室主之

腰脊痛惡風少腹滿堅癃閉下重不得小便胞肓主之

腰痛骶寒俛仰急難陰痛下重不得小便秩邊主之

腰痛控睾小腹及股卒俛不得仰刺氣街

腰痛不得轉側章門主之

腰痛不可以久立俛仰京門及行間主之

腰腹少腹痛下窌主之

腎腰痛不可俛仰陰陵泉主之

腰痛少腹滿小便不利如癃狀羸瘦意恐懼氣不足腹中怏怏太衝主之

腰痛少腹痛陰包主之

腰痛大便難湧泉主之

腰脊相引如解實則閉癃淒淒腰脊痛宛轉目循循嗜臥口中熱虛則腰痛寒厥煩心悶大鍾主之

腰痛引脊內廉復溜主之脊無見血若太多虛不可復是前足少陰痛也

腰痛不能舉足少坐若下車蹲地脛中矯矯然申脈主之

腰痛如小錘居其中怫然腫痛不可以俯仰則筋縮急諸節痛上下無常寒熱陽輔主之

腰痛不可舉足跟中踝後痛脚痿僕參主之

腰痛挾脊至頭几几然目眩眩委中主之是前刺足太陽郄中出血者

腰痛得俛不得仰仰則恐仆得之舉重惡血歸之殷門主之是前衝絡之厥腰痛者

腰脊痛尻脊股臀陰寒大痛盛則血動實則并熱痛

痔痛尻臀中腫大便直出承扶主之
千金方曰腰背痛宜鍼決膝匀畫中青赤絡脈出血便瘥
腰痛不得俛仰者令患人正立以竹拄地度至膕斷竹乃以度之背脊灸竹上頭處隨年壯灸訖藏竹勿令人得知
腰痛灸脚跟上橫文中白肉際十壯良
又灸足巨陽七壯巨陽在外踝下
又灸腰目穴七壯在尻上約左右是
又灸八窌及外踝上骨約中
腰卒痛灸窮骨上一寸七壯左右一寸各灸七壯
五藏六腑心腹滿腰背疼飲食吐逆寒熱往來小便不利羸瘦少氣灸三焦臚隨年壯
腹疾腰痛膀胱寒澼飲注下灸下極臚隨年壯
勞冷氣逆腰腕冷痹脚屈伸難灸陽蹻一百壯在外踝下容爪
腰背不便轉筋急痹筋攣灸第二十一椎隨年壯
神道谷中腰臚長強大杼膈關水分脾臚小腸臚膀胱臚主腰脊急強
腰臚膀胱臚長強氣衝上窌下窌居髎主腰痛
志門京門主腰痛脊急
小腸臚中胞臚白環臚主腰脊疝痛
次窌胞肓承筋主腰脊痛惡寒
三里陰市陽輔蠡溝主腰痛不可以顧
束骨飛揚承筋主腰痛如折
申脈太衝陽蹻主腰痛不能舉
崑崙主脊強背尻骨重
合陽主腰脊痛引腹
委中主腰痛挾脊至頭八八然凡腰脚重痛於此刺出血久痼宿疹亦皆立已
大鍾主腰脊痛
太白陰陵泉行間主腰痛不可俛仰
承扶主腰脊尻臀股陰寒痛
湧泉主腰脊相引如解
陰骨主脊內廉痛
膈關秩邊京骨主背惡寒痛脊強難以俛仰
儒門事親曰腎臚二穴在十四椎下兩旁各寸半陷中灸五壯主腰痛不可俛仰轉側難身寒熱食倍多身羸瘦面黃黑目眴眴又主丈夫婦人冷疾氣勞病
中脊俞二穴在十一椎下兩旁各寸半灸五壯主腰痛不可俛仰挾脊胃痛上下按之應手者從項後始至此穴痛皆灸之立愈也
腰俞一穴在二十一椎節下間陷中灸五壯主腰疼不能久立腰以下至足冷不仁起坐難腰脊痛不能立急強不得俛腰重如石難舉動也
張仲文傳神仙灸法腰膝重痛不可轉側起坐難及冷痹脚筋攣急不可轉側屈伸灸曲膝兩文頭左右脚四處各三壯每灸一脚二火齊下艾炷到肉初覺疼痛用二人兩邊齊吹至火滅午時著灸人定已來藏腑自動一兩行或轉動如雷聲其疾立愈此法神效卒不可量也
朱震亨心法曰腰曲不能伸者鍼入中
醫學綱目曰素問刺腰痛篇刺足太陽腰痛引項脊尻背三法刺郄中出血二法取足太陽出血也經云
邪在腎腹腰腰痛大便難肩背頸項痛時眩取之湧泉崑崙視有血者悉取之此則足太陽少陰俱取血也又云足太陽之脈是動則病衝頭痛云云此則視太陽盛虛熱寒陷下刺施補瀉疾留灸以調之也
刺足少陰腰痛引脊內廉此法出足少陰經血也經曰足少陰之別名曰大鍾當踝後繞踵別走太陽其病虛則腰痛取之所別也此補足少陰絡也
刺腰痛不可俛仰四法少陽陽明衝絡三法皆出血也經云肝足厥陰之脈是動則病腰痛不可以俛仰此則視虛實寒熱陷下施補瀉疾留灸以調之也
刺腰痛引少腹控眇不可以仰取腰尻分間經文三出此其一也繆刺論云腰痛引少腹控眇不可以仰息刺腰尻之解兩胂之上是腰臚以月死生爲痛數發鍼立已左刺右右刺左又骨空論云腰痛不可以轉搖急引陰卵刺八髎與痛上八髎在腰尻分間此三節經文大同小異通一法也又足厥陰之脈是動則病腰痛不可以俛仰視盛虛熱寒陷下調之此則證同法異
刺腰痛目眴眴有三目陽之脈其一也若痛引肩遺漫者刺解脈在郄外廉筋肉分間委陽穴也若痛引項脊欲僵仆者刺足太陽委中出血也
刺腰痛篇取足太陽郄中間六法郄胭者膝後屈處兩筋之間橫文胭內也太陰正經二法刺郄中央出血解脈二法刺郄中橫文出血衝絡一法刺郄上數寸出血會陰一法刺郄中下五寸出血也
腎虛腰痛刺腎臚取法以杖量與膕平去脊各一寸半灸二七壯又取人中委中

腰強痛灸命門二七壯十四椎節下間伏取之刺崑崙瀉之灸亦瀉

忽然氣滯腰痛不可俛仰取志室五分得氣即瀉又取行間

腰脊內引痛不可屈伸若近上痛取合谷近下痛取崑崙復溜

腰脊俱痛不可忍取風池合谷崑崙

又法風池承山合谷呂細三間

腰脊如痙取湧泉一分陰谷一寸半京骨一分行間五分

腰內挂氣痛取尺澤忌灸又取委中人中陽陵泉束骨崑崙下節

腎虛痛久不已取肩井腎腧五分留七呼灸隨年壯

大虛腰痛刺而復發腰重不能舉體可刺委中動脈出血

腰痛在身之前取足陽明原穴身之後取足太陽原穴身之側取足少陽原穴

閃挫腰痛取氣海肥人一寸瘦人五分三補三瀉令人覺臍上下痛停鍼候二十五息左手重按其穴右手進鍼三息又停二十五息依前進鍼令人覺從外腎熱氣上入小腹出鍼神效

古今醫統曰腰痛宜用雷火鍼法於五月五日東引桃枝削去皮尖兩頭如雞子樣長寸許用尖鍼時以鍼向燈上點著隨後念呪三徧用紙三層或五層貼在患處以鍼按紙上患深者再燃立念呪曰天火地火三昧眞火鍼天天開鍼地地裂鍼鬼鬼滅鍼人人得長生百病消除萬病消滅吾奉太上老君急急如律令

醫學入門曰腰痛輕者委中出血便愈甚者補環跳瀉委中久者俱補

腰連背痛者鍼崑崙委中

腰連腿痛補腕骨瀉足三里

腰連脚痛補環跳瀉風市行間足三里

命門主老人腎虛腰痛

導引

千金方曰腰痛導引法正東坐收手抱心一人於前據攝其兩膝一人後捧其頭徐牽令偃臥頭到地三起三臥久久效

保生祕要曰氣血虛弱濡於腎諸寒收引皆屬腎水氣弱或作腰痛冬月水旺宜吐納按節吹氣調和奪意掌心所忌須避寒冷最宜早臥大抵冬月斂藏氣閉至陰已極宜節慾養一陽之初生蓋陰陽交精子南合墜萬物氣微在下不可動搖守此則保壽無疆

腰痛導引法相火燒兩腎或以手心摩熱以擦痛處腰風軟導引法腎處相火提起燒背從背轉下於腎

醫案

史記倉公傳曰齊王黃姬兄黃長卿家有酒名客召臣意諸客坐未上食臣意望見王后弟宋建告曰君有病往四五日君腰脽痛不可俛仰又不得小溲不亟治病即入濡腎及其未舍五藏急治之病方今客腎濡此所謂腎痺也宋建曰然建故有腰脊痛往四五日天雨黃氣諸侍見建家京下方石即弄之建亦欲效之效之不能起即復置之暮腰脊痛不得溺至今不愈建病得之好持重所以知建病者臣意見其色太陽色乾腎部上及界腰以下者枯四分所故以往四五日知其發也臣意即爲柔湯使服之十八日所而病愈

濟北王侍者韓女病腰背痛寒熱衆醫皆以爲寒熱也臣意診脈曰內寒月事不下也即竊以藥旋下病已病得之欲男子而不可得也所以知韓女之病者診其脈時切之腎脈也濇而不屬其來難堅故曰月事不下肝脈弦出左寸口故曰欲男子不可得也

儒門事親曰戴人女僮冬間自遂來面赤如火至灑陽病腰胯大痛裏急後重痛則見鬼神戴人曰此少陽經也在身側爲相火使服舟車丸通經散瀉至數盆病猶未瘥人皆怪之以爲有祟戴人大怒曰驢鬼也復合調胃承氣湯二兩加牽牛頭末一兩同煎服之太過數十行約一二缶方捨其杖兼但發渴戴人恣其飲水西瓜梨柿等曰凡治火莫如冰水天地之至陰也約飲水一二桶猶覺微痛戴人乃刺其陽陵穴以伸其濡足少陽膽經之穴也自是方寧女僮自言每一歲須瀉五六次今年不曾瀉故如是也常仲

明悟其言以身有濕病故一歲必瀉十餘行病始已此可與智者言難與愚者論也

息帥病腰股沉痛行步坐馬皆不便或作脚氣寒濕治之或作虛損治之烏附乳沒活血壯筋骨之藥無不用之至六十餘日目赤上熱大小便澀腰股之病如故戴人診其兩手脈皆沉遲沉者爲在裏也在裏者瀉之以舟車丸濬川散各一服去積水二十餘行至早辰服薏白粥一二頓與之馬已能矍鑠矣

一男子六十餘歲病腰尻脊胯皆痛數載不愈晝靜夜躁大痛往來屢求自盡天年且夕則痛作必令人以手槌擊至五更雞鳴則漸減向曙則痛止左右及病者皆作鬼神陰譴白虎嚙朝禱暮祝覡巫僧道禁師至則其痛以減又夢鬼神戰鬬相擊山川神廟無不祭者淹延歲月肉瘦皮枯飲食減少暴怒日增惟候一死有書生曰既云鬼神虎嚙陰譴之禍如此禱祈何無一應聞陳郡有張戴人精於醫可以問其鬼神白虎與病乎彼若術窮可以委命其家從之戴人診其兩手脈皆沉滯堅勁力如張絙謂之曰病雖瘦難於食然腰尻脊胯皆痛者必大便堅燥其左右曰有五七日或八九日見燥糞一兩塊如彈丸結硬不可言曾令人剜取之强下一兩塊渾身燥癢皮膚皴揭枯澀如麩片戴人既得病之虛實隨用大承氣湯以薑棗煎之加牽牛頭末二錢不敢言是瀉劑蓋病者聞煖則悅聞寒則懼說補則從說瀉則逆此弊非一日也而況一齊人傅之衆楚人咻之乎及煎成使稍熱嚥之從少至多累至三日天且晚臟腑下泄四五行約半盆以燈視之皆燥糞痞塊及瘀血穢濁不可近須臾痛減九分昏睡鼻息調如常人睡至明日將夕始覺饑而索粥溫凉與之又困睡一二日其痛全愈次令飲食調養日服導水丸甘露散滑利便溺之藥四十餘日乃復病既痊乃壽至八十歲故凡燥證皆三陽病也

北人衛德新因之析津冬月飲寒則冷病腰常直不能屈伸兩足沉重難於行步途中以牀畀遞程問醫皆云腎虛以蓯蓉巴戟附子鹿茸皆用之大便反閉潮熱上周將經歲矣乃乞拯於戴人戴人曰此疾十日之效耳衛曰一月亦非遲戴人曰足太陽經血多病則腰似折膕如結腨如裂太陽所至爲屈伸不利況腰者腎之府也身中之大關節今既强直而不利宜鹹以軟之頓服則和柔矣難經曰强力入房則腎傷而髓枯枯則高骨乃壞而不用與此正同今君之證太陽爲寒所遏血墜下滯腰間必有積血非腎虛也節次以藥下數百行約去血一二㪷次以九曲玲瓏竈蒸之汗出三五次而愈初蒸時至五日問曰腹中鳴否德新曰未也至六日覺鳴七日而起已能揖人戴人曰病有熱者勿蒸蒸則損人目也

息城酒監趙進道病腰痛歲餘不愈其兩手脈沉實有力以通經散下五七行次以杜仲去粗皮細切炒斷絲爲細末每服三錢猪腰子一枚薄批五七片先以椒鹽醃去腥水摻藥在內裹以荷葉外以濕紙數重以文武火燒熟臨臥細嚼以溫酒送下每旦以無比山藥丸一服數日而愈

東垣十書曰丁未年冬曹通甫自河南來有役人小翟露宿寒濕之地腰痛不能轉側兩脅搐急作痛已經月餘不愈矣腰痛論中說皆爲足太陽足少陰血絡中有凝血作痛間有一二證屬少陽膽經外絡脈病皆去血絡之凝乃愈其內經有云冬三月禁不得用鍼只宜服藥通其經絡破其血絡中敗血

丹溪心法曰徐質夫年六十因墜馬腰痛不可轉側六脈散大重取則弦小而長稍堅予以爲惡血雖有未可驅逐且以補接爲先遂令煎蘇木人參黃芪川芎當歸陳皮甘草服至半月後散大漸斂飲食亦進遂與前藥調下自然銅等藥服一月而安

義一姪婦瘧疾初安因冲風又發腰痛白濁已與參朮檳榔半夏等補方又教以煅牡蠣一錢木通五分炒蘗三分粗末入前方同煎而愈

醫學綱目曰戊戌年八月淮南大水城下浸灌者連月予忽臟腑不調腹中如水吼數日調治得愈自此腰痛不可屈折雖洗面亦相妨徧服藥不效如是凡三月予後思之此必水氣陰盛腎經感此而得乃灸腎俞三七壯服麋茸丸瘥

醫學準繩六要曰一人因太勞又過飲酒致濕熱乘虛入客於經作腰痛夜更甚不得俛仰脈濡而弱先與拈痛湯去參朮二貼稍愈遂改用四物加杜仲牛膝獨活肉桂頓愈

一人肥盛而肢節痛腰更甚脈沉濡而滑知濕痰也予二陳加南星二朮二活泰艽防風十劑愈

一人體厚腰間常冷予腎著湯加南星蒼朮三服愈

一人因墜馬腰痛不止日輕夜重瘀血諦矣與四物去地黃加肉桂桃仁紅花蘇木四服大便下血而痊

一人素有脚氣每發則引腰痛不可俛仰其人雄飲

明是濕熱脈濡而數投枯痛湯八劑漸減遂以捉虎丹酒下二丸空心凡三服腿腕出黑汗永不再舉

奇效良方曰忠州太守陳逢原因暑取涼食瓜至秋忽然右腰腿間疼痛連及膝脛曲折不能經月右脚難於舉動凡治腰脚藥服之無效得養腎散纔一服移刻舉身麻痺再服脚能屈伸再一服即康寧

一人忽兩足拳攣連腰疼楚脈弦而澀此證風寒兩感寒多於風或投百一選方養腎散隨效李奉議亦嘗謂余曰其家曾有婦人腰脚不能轉動用此藥即效皆風寒兩感之證也

薛己醫案曰一男子年四十餘患腰痛服流氣飲寄生湯不應以熱手熨之少可蓋脈沉弦腎虛所致以補腎丸愈之

傅允承母年臨七十腰生一癰作瘡異常疑是惡證所毒診脈浮數齊氏云浮數之脈而反惡寒瘡疽之謂也又云外如麻裏如瓜疽毒在內翌日復診脈乃弱予謂未潰而脈先弱何以收斂況大便不通則眞氣已竭治之無功其子固請不得已用六君子湯加葛香神麴飲食漸進大便始通更用峻補之劑潰而膿清作渴再用參芪當歸熟地黃麥門冬五味子而渴止允承喜曰吾母可無慮矣予謂不然不能收斂先入之言也彼疑遂速他醫果不起

陸氏女初嫁患腰痛不腫脈沉滑神倦此爲內發七情之火飲食之毒所致以托裏藥一劑下膿升許陳良甫云癰疽未潰而內陷面青脣黑者不治果卒

崑山舉人張元忠孟秋患腰疽瘡頭如大豆粒根大三寸許微腫略赤處證悉具用桑枝灸痛處服活命飲一劑腫退召赤飲食仍少用香砂六君子湯四劑食漸進後用大補藥膿雖成而不潰於補藥內每劑加附子一片二劑後膿自溃出旬日而愈

一婦人暴怒腰腫一塊胃膈不利時或氣走作痛與方脈流氣飲數劑而止更以小柴胡湯對四物加香附貝母月餘而愈

一婦人腰間患一小塊肉色如常不潰發熱予謂當以益氣養榮解鬱之藥治之彼家不信別服流氣飲後鍼破出水年餘而歿

一男子年十九腰間腫一塊無頭不痛色不變三月不潰飲食少思肌肉日瘦此寒搏胜理榮氣不行鬱而爲腫也名曰濕毒流注元戎云若人飲食疎精衰氣血弱肌肉消薄榮衛之氣短促而澁滯故寒搏腠理閉鬱而爲癰腫者當補之以接虛柱之氣遂以十全大補湯加香附陳皮三十餘劑始鍼之遂出白膿二椀許仍用前藥倍加參芪及以豆豉餅灸之漸愈彼惑於速效者乃內服敗毒外貼寒涼藥反致食少膿稀患色紫復請予治喜得精神未喪仍以前藥加遠志貝母白蔹百劑而愈此瘡若久而不愈或膿水清稀者當以內塞散服之及附子餅灸之然後可愈若不慎飲食起居七情者不治

劉文通室年踰二十腰間突腫寸許肉色不變微痛不潰發熱脈大此七情所傷氣血凝滯濕於隧道而然也當益氣血開鬱結更以香附餅熨之使氣血充暢內自消散不消雖潰亦無虞不聽乃服十宣流氣之藥氣血愈虛破出清膿不斂而斃

一男子腰患毒膿熟不潰鍼之膿大洩反加煩躁以聖愈湯四劑而寧更以人參養榮湯加麥門冬五味子兩月而愈此人後患濕氣遂爲痼疾凡瘡膿血去多瘡口難合尤當補益務使氣血平復否則更患他證必難治療慎之

一男子腰中患毒發而不潰其氣血止能發起不能培養爲膿也投大補藥數劑而潰又數劑膿尚清乃服參芪歸朮數斤餘膿少稠數斤膿漸稠肌肉頓生

凡大癰疽藉氣爲主若患而不起或潰而不腐或不收斂及膿少或清皆氣血之虛也宜大補之最忌攻伐之劑亦有膿反多者乃氣血虛而不能禁止也若潰後發熱作渴脈大而膿愈多屬眞氣虛而邪氣實也俱不治常見氣血充實之人患瘡皆腫高色赤易腐潰而膿且稠又易於收斂怯弱之人多不起發不腐潰及難於收斂若不審察而妄投攻劑虛脫之禍不免矣及患後當調養若瘡瘥流注之證尤當補益也否則更患他證必難措治慎之

僉憲張碧崖腰患疽醉而入房脈洪數兩尺更大予辭不治將登舟其子强留項間吐臭血五六椀予意此腎經虛火而血妄行血必從齒縫出合肉桂等補腎制火之藥各用罐煎熟聽用血止拭齒視之果然遂與一鍾冷服之熱渴頓止少頃溫服一鍾脈細如脫氣息奄奄得藥則脈少復良久仍脫其子疑內有膿欲刺之予曰必無乃以鵝翎管紲內果如予意次日脈脫脚寒至膝腹內如冰急用六君加薑附腹始溫膿始潰瘡口將完彼因侍者皆愛妾又患小便不通此陰已痿而思色以降其精精內敗不出而然耳用加減八味丸料加參芪白朮一劑小便雖愈瘡口

不斂而歿

府庠彭君溪患腰疽服寒凉敗毒之藥色黯不痛癢頭如鋪黍背重不能安寢耳聾目白面色無神小便頻澀作渴迷悶氣粗短促脈浮數重按如無予先用滋腎水之藥一劑少頃便利渴止背即輕爽乃砭去瘀血以艾半斤許明灸患處外數鳥金膏內服參芪歸朮肉桂等藥至數劑元氣稍復自疑肉桂辛熱一日不用手足並冷大便不禁仍加肉桂及補骨脂二錢肉豆蔻一錢大便如常其肉漸潰更用當歸膏以生肌肉八珍湯以補氣血而愈

舉人顧東溪久作渴六月初患腰疽不慎起居瘡潰尺許色黯敗臭小便如淋臀裂舌刺七月終左尺洪數左關浮濇予謂先渴而患疽者乃腎水乾涸虛火上炎多致不起然膿水敗臭色黯不痛瘡口張大乃脾氣敗而腎水絕也左尺洪數腎無所生也左關浮濇肺尅肝也況當金旺之際危殆速矣二日後果歿蓋此證既發於外兩月方歿者乃元氣虛不能收斂也若豫爲調補使氣血無虧亦有得生者

醫門法律曰張令施乃弟傷寒壞證兩腰僕廢臥牀徹夜痛叫百治不效求診於余其脈亦平順無患其痛則比前大減余曰病非死證但恐成廢人矣此證之可以轉移處全在痛婦刀刺尚有邪正互爭之象若全然不痛則邪正混爲一家相安於無事矣今痛覺大減實有可慮宜速治之病者曰此身既廢不如速死余蹙額欲爲救全而無治法諦思良久謂邪深入兩腰血脈久閉不能復出只有攻散一法而邪入既久正氣全虛攻之必不應乃以桃仁承氣湯多加肉桂附子二大劑與服服後即能强起再做前意爲丸服至旬餘全安此非前人之已試乃一時之權宜也然有自來矣仲景於結胸證有附子瀉心湯一法原是附子與大黃同用但在上之證氣多故以此法瀉心然在下之證血多獨不可做其意而合桃仁肉桂以散腰間之血結乎後江古生乃弟傷寒兩腰僕廢痛楚不勞思索徑用此法二劑而愈

景岳全書曰余嘗治一董翁者年逾六旬資稟素壯因好飲火酒以致濕熱聚於太陽忽病腰痛不可忍至求自盡其甚可知余爲診之則六脈洪滑之甚且小水不通而膀胱脹急遂以大分清飲倍加黃蘗龍膽草一劑而小水頓通小水通而腰痛如失若用丹溪不可用寒凉之言鮮不誤矣是以不可執也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百九卷目錄

醫部彙考一百八十九

四肢門一

黃帝素問 陰陽應象大論 陰陽別論 五臟生成篇 脈要精微論 平人氣象論 玉機真臟論 腹中論 逆調論 通評虛實論 太陰陽明論 陽明脈解篇 經脈論 氣交變大論 五常政大論 示從容論 六元正紀大論 至眞要大論 示從容論 陰陽類論 解精微論
靈樞經 邪氣臟腑病形篇 本神篇 經脈篇 經脈論 逆順肥瘦篇 陰陽繫日月篇 本臟篇 五色篇 衛氣失常篇 動輸篇 陰陽二十五人篇 百病始生篇 邪客篇 論疾診尺篇 壽夭剛柔篇
扁鵲難經 四肢滿閉 四肢不收 足腫
張機金匱要略 四肢腫重 寒熱 痰疹 下 食禁 受淫瘀 轉筋
華佗中藏經 論脚弱狀候不同 死候
王叔和脈訣 四肢痰疾 死候

藝術典第二百九卷

醫部彙考一百八十九

四肢門一

黃帝素問

陰陽應象大論

清陽實四肢濁陰歸六腑

註 四肢爲諸陽之本六腑者傳化物而不藏此言飲食所生之清陽充實於四肢而渾濁者歸於六腑也夫脾主四肢又曰手太陰獨受其濁蓋濁中之清者由脾之轉輸而充實於四肢濁中之濁者歸於六腑也

陰陽別論

三陽在頭三陰在手所謂一也

註 三陽之脈手走頭而頭走足故曰三陽在頭三陰之脈足走腹而腹走手故曰三陰在手也十二經脈雖有手足陰陽之分然皆一以貫通

三陽三陰發病爲偏枯痿易四肢不舉

註 三陽三陰者太陽太陰之爲病也偏枯者半身不遂痿易者委棄而不能如常之動作也太陽爲諸陽主氣而主筋陽氣虛則爲偏枯陽虛而不能養筋則爲痿脾屬四肢故不舉也此水腑爲病而逆乘脾土也

結陽者腫四肢

註 此言陰陽之氣不和自結而爲病也四肢爲諸陽之本氣歸形氣結故形腫也

五臟生成篇

肝之合筋也其榮爪也其主肺也

註 髓生肝肝生筋故所合在筋爪乃筋之餘故其榮在爪

人臥血歸於肝肝受血而能視足受血而能步掌受血而能握指受血而能攝

註 血者所以濡筋骨利關節者也此言衝任之血歸於肝榮於目循行於四肢溪於指掌而無處不到也

脈要精微論

脾脈搏堅而長其色黃當病少氣其軟而散色不澤者當病足腫若水狀也

註 五臟元眞之氣脾所主也濕熱太過則色黃脈盛而少氣矣脾氣虛故足腫也若水狀而非水病故其色不澤

平人氣象論

推而上之上而不下腰足清也

註 推而上之者以三指平按而審之上而不下者其氣上盛乎虛當主腰足清冷也

平人氣象論

寸口脈中手長者曰足脛痛

註 寸口脈中手長者寸脈直下於尺中此陽邪直行於下部故主足脛痛也

玉機真臟論

脾太過則令人四肢不舉

註 脾爲濕土主氣濕行太過故令人四肢不舉

臟氣法時論

脾病者身重善肌肉痿足不收行善瘈脚下痛

註 脾主肌肉脾氣傷故身重而肌肉善痿足太陰經脈循脛膝邪在經絡故足不收氣傷故善瘈而痛

肺病者喘咳逆氣肩背痛汗出尻陰股膝髀腨脛足皆痛虛則少氣不能報息耳聾咽乾

通評虛實論

黃帝問曰何謂虛實岐伯對曰邪氣盛則實精氣奪則虛帝曰虛實何如岐伯曰氣虛者肺虛也氣逆者足寒也非其時則生當其時則死餘臟皆如此

註 夫邪氣有微盛故邪盛則實正氣有强弱故精奪則虛蓋邪從表入裏在外之氣血骨肉先爲邪

病所虛是以骨肉滑利則邪不內侵而裏亦實表氣虛則內傷五臟而裏亦虛此表裏之虛實也如氣逆於上則下虛而足寒此上下之虛實也如值其生旺之時則生當其勝尅之時則死此四時之虛實也

帝曰何謂重虛岐伯曰脈氣上虛尺虛是謂重虛帝曰何以治之岐伯曰所謂氣虛者言無常也尺虛者行步恇然脈虛者不象陰也如此者滑則生濇則死也

註榮氣宗氣行於脈中衛氣行於脈外故曰脈氣蓋以氣口之脈可以候血亦可以候氣也上虛者寸口之脈氣虛也尺虛者脈氣虛於下也上下皆虛故曰重虛氣者謂陽明所生之榮衛宗氣也虛則令人恇然而虛怯也謂陽明之氣虛於上則言語無常陽明之氣虛於下則令人行步恇然蓋氣從太陰出注手陽明上行注足陽明下行至跗上故曰身半以上手太陰陽明皆主之身半以下足太陰陽明皆主之氣爲陽血脈爲陰陽明之生氣爲陽少陰之精氣爲陰蓋言以寸尺之脈以候陽明之生氣而不效象其陰之虛也夫氣生於陽明而發原在腎少陰之氣上與陽明相合陰陽相搏其脈則滑搏則化水穀之精微而氣生矣故主生濇主少陰生原已絕故死

帝曰脈實滿手足寒頭熱何如岐伯曰春秋則生冬夏則死脈浮而濇濇而身有熱者死帝曰其形盡滿何如岐伯曰其形盡滿者脈急大堅尺濇而不應也如是者故從則生逆則死帝曰何謂從則生逆則死岐伯曰所謂從者手足溫也所謂逆者手足寒也

註腎主生氣之原膀胱爲太陽之府脈實滿者少陰之寒氣充於外也手足寒者少陰之生氣虛於內也頭熱者太陽之氣發越於上也腎與膀胱陰陽並交咸主生氣若盛於外則反虛於內矣春時陽氣微上陰氣微下秋時陰氣微上陽氣微下陰陽二氣交相賚生故主生冬時陰氣盡出於外夏時陽氣盡虛於內故主死言陰陽之根氣不可虛脫者也若脈浮而濇陰越於外而虛於內也濇而身熱乃陽脫於內而弛於外也言陰陽之根氣脫者皆爲死證非但冬夏死而春秋可生也又水體泛溢其皮膚肌膚腫脹盡滿脈急大堅尺濇而不應者手足溫則謂之從而生手足寒則謂之逆而死蓋溫則少陰之生氣復而火土之氣漸旺水寒之邪漸消寒則少陰之生氣已絕故死

瞤跖寒風濕之病也

註瞤跖行不正而偏廢也此風寒濕邪皆爲此疾

太陰陽明篇

陰氣從足上行至頭而下行循臂至指端陽氣從手上行至頭而下行至足故曰陽病者上行極而下陰病者下行極而上故傷於風者上先受之傷於濕者下先受之

註言土者生萬物而法天地天氣下降地氣上升是以上下四旁無處不到蓋臟腑陰陽十二經脈之精神氣血皆中土之所生陰者注陰陽者注陽此言邪隨氣轉也人之陰陽出入隨氣升降是以陽病在上者久而隨氣下行陰病在下者久而隨氣上逆上先受之者言邪氣之中人也高故邪氣在上也下先受之者言清濕地氣之中人也必從足始故清氣在下也

帝曰脾病而四肢不用何也岐伯曰四肢皆稟氣於胃而不得至經必因於脾乃得稟也今脾病不能爲胃行其津液四肢不得稟水穀氣氣日以衰脈道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉

註胃爲陽土脾屬陰土暢于四肢坤德也四肢者五臟六腑之經俞也四肢受水穀之氣由脾臟之轉輸脾之轉輸各因其臟腑之經隧而受氣於陽明是以脈道不利則筋骨肌肉無氣以生養矣陽明者表也五臟六腑之海也亦爲之行氣於三陽臟腑各因其經而受氣於陽明故爲胃行其津液四肢不得稟水穀氣以益衰陰道不利筋骨肌肉無氣以生故不用焉

註陽明者表陽也爲五臟六腑之海亦爲之行氣於三陽如海之行雲氣於天下也夫三陰三陽所以受氣於太陰陽明者氣也如臟腑四肢受水穀之津液者各因其經脈而通於太陰陽明也

陽明脈解篇

岐伯曰四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實實則能登高也

註陰者主臟陽者主腑陽受氣於四肢陰受氣於五臟故四肢爲諸陽之本陽盛則四肢實實則能登高矣蓋陽盛則升四旁俱盛故能升高

逆調論

帝曰人有四肢熱逢風寒如炙如火者何也岐伯曰

是人者陰氣虛陽氣盛四肢者陽也兩陽相得而陰氣虛少少水不能滅盛火而陽獨治獨治者不能生長也獨勝而止耳逢風而如炙如火者是人當肉鑠也

註此論表裏陰陽之不和也四肢爲諸陽主氣四肢熱者陽熱之氣在表也逢風寒而如炙如火者邪正相搏因表陽之熱而熱更盛極也陰氣虛者裏陰之氣虛也陽氣盛者表陽之氣盛也陽受氣於四末陰受氣於五臟四肢者陽明之所主也兩陽陽明也兩陽合明故曰陽明相得者自相得而爲熱也陰氣少者少陰之氣少也少水者津液少也津液少而不能還入胃中則火盛而不能滅矣夫腎主藏精陽明之所生也腎之精氣復上與陽明相合戊癸合而化大火土之氣陰氣虛少則陽獨治矣然獨陽不生謂不能再生長其陽熱惟此獨勝而止矣二陽之氣在於皮膚肌腠之間而又逢風熱之陽邪正相搏則火熱熾而銷鑠其肌肉矣

瘧論

邪中於頭項者氣至頭項而病中於背者氣至背而病中於腰脊者氣至腰脊而病中於手足者氣至手足而病

註如邪中於頭項衛氣行至頭項而病作中於腰背手足邪即舍於腰背手足之間衛氣行至腰背與腰背所舍之邪相遇而病作衛氣行至手足與手足所舍之邪相遇而病作

其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰癉瘧

註其但熱不寒者邪氣藏於骨髓之中而腎陰之氣先與骨氣相絕是外邪不及於裏陰而獨發於陽也熱傷氣故少氣心惡熱故煩冤手足爲諸陽之本故手足熱經云諸嘔吐酸皆屬於熱此溫瘧之不復寒者名曰癉瘧癉單也謂單發於陽而病熱也

氣厥論

黃帝問曰五藏六腑寒熱相移者何岐伯曰胃移熱於膽亦曰食亦

註五藏六腑之生氣皆取決於膽膽氣燥熱則生陽不升故四肢懈惰胃氣熱則消穀善饑故亦曰食亦

大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食亦

註胃主受納水穀大腸爲傳導之官大腸熱邪反逆乘於胃是以胃熱則消穀善食陽明燥熱則榮衛津液不生故雖能食而瘦亦解体也謂雖能食而四肢懈惰故又謂之食亦

風論

以季夏戊己傷於邪者爲脾風脾風之狀多汗惡風身體怠惰四肢不欲動色薄微黃不嗜食診在鼻上其色黃

註脾主肌肉四肢身體怠惰四肢不欲動脾氣病也足太陰之脈屬脾絡胃上膈挾咽連舌本經絡篇云是主脾所生病者食不下土位中央故所診在鼻

厥論

巨陽之厥則腫首頭重足不能行發爲眴仆

註巨陽太陽也足太陽脈起於目內眥上額交顛從顛入絡腦還出別下項循背俠脊抵腰中下貫臀入腘中循髀內出外踝之後是以厥逆於上則爲首腫頭痛厥逆於下則爲足不能行神氣昏亂則爲眩仆太陽爲諸陽主氣此病在經而轉及於氣分故曰發

少陽之厥則暴聾頰腫而熱脅痛胕不可以運

註足少陽之脈起於目銳眥從耳後入耳中下頰車循胷過季脇出膝外廉循足跗故逆則暴聾頰腫脅痛足胕不可以運行

厥陰之厥則少腹腫痛腹脹涇溲不利好臥屈膝陰縮腫胕內熱

註足厥陰之脈內抵少腹挾胃屬肝絡膽肝主筋膝者筋之會經脈厥逆不能濡養筋骨故好臥而屈膝

三陰俱逆不得前後使人手足寒三日死

註三陰俱逆是陰與陽別矣不得前後者陰關於下也諸陽之氣皆生於陰三陰俱逆則生氣絕滅是以手足寒而三日死此厥在氣分故主三日死謂三陰之氣厥絕也若厥在經脈則爲厥狀病不能至於死矣

大奇論

腎雍脚下至少腹滿脛有大小髀胕大跛易偏枯

註雍者謂臟氣滿而外壅於經絡也腎脈起於足下循內踝上踹內屬腎絡膀胱故自脚下至少腹滿腎主骨而寒水主氣故足脛有大小髀胕大而

痿變易爲偏枯此論臟氣癈於經脈而爲此病與邪在三焦之不得小便虛邪偏客於形身而發爲偏枯之因證不同也

脈解篇

病偏虛爲跛者正月陽氣凍解地氣而出也所謂偏虛者冬寒頗有不足者故偏虛爲跛也

註此言太陽之氣生於冬令水中寒水之氣有所不足以致太陽之氣亦虛而爲偏枯跛足也

少陽所謂色色不能久立久坐起則目眩眩無所見者萬物陰陽不定未有主也秋氣始至微霜始下而方殺萬物陰陽內奪故目眩眩無所見也

註色色不能猶言種種不能自如也此言少陽主七八月爲首七月之交陰氣上升陽氣下降萬物陰陽不定而未有所主是以色色不能而亦未有定也秋氣始至則陽氣始下而未盛於內陰氣正出而陰氣內虛則陰陽之氣奪於內矣陰陽內奪故目眩眩無所見也

調經論

形有餘則腹脹逕溲不利不足則四肢不用

註脾主四肢故虛則不用

氣交變大論

歲土太過雨濕流行腎水受邪民病腹痛清厥意不樂體重煩冤甚則肌肉痿足痿不收行善瘈脚下痛飲發中滿食減四肢不舉

註諸甲之歲土運太過土勝則制水故腎臟病而脚下痛

歲金太過燥氣流行肝木受邪甚則喘欬逆氣肩背痛尻陰股膝髀腨胻足病

註此夏病之常也

至眞要大論

少陰在泉客勝則腰尻股膝髀腨胻足病瞀熱以酸附腫不能久立溲便變

註四之客氣乃太陽寒水故爲腰尻股胻足病皆太陽之經證同氣相感也次之氣乃厥陰風木瞀熱以酸附腫不能久立乃脾土之證蓋木淫而土病也終之客氣乃少陰君火主氣乃太陽寒水溲便變者水火相交火淫於下也

太陽在泉寒復內餘則腰尻痛屈伸不利股胻足膝中痛

註寒復內餘者太陽寒水之客氣入於內而復內有餘也腰尻股胻足痛者太陽之經證也屈伸不利者太陽之主筋也

歲陽明在泉燥淫所勝民病足外反熱

註陽明在泉子午歲也足外反熱乃足少陽病

少陰司天客勝則鼽嚏頸項强肩背瞀熱頭痛少氣發熱耳聾目瞑甚則腫

註少陰司天初氣乃太陽寒水甚則附腫乃太陽寒水之氣勝也

少陽司天主勝則胃滿欬仰息甚而有血手熱

註少陽司天初氣三氣乃君相二火有血手熱者火發於外也君相之脈皆循於手故爲手熱

示從容論

雷公曰於此有人四肢懈惰喘欬血泄而愚診之以爲傷肺切脈浮大而緊愚不敢治粗工下砭石病愈多出血血止身輕此何物也帝曰子所能治知亦衆

多與此病失矣譬以鴻飛亦冲於天夫聖人之治病循法守度援物比類化之冥冥循上及下何必守經今夫脈浮大虛者是脾氣之外絕去胃外歸陽明也夫二火不勝三水是以脈亂而無常也四肢懈惰此脾精之不行也喘欬者是水氣幷陽明也血泄者脈急血無所行也若夫以爲傷肺者由失以狂也不引比類是知不明也

註此明腎之精水貫乎地中上通於天也於此有人者言即於此腎臟而有人病四肢懈惰諸證也此何物者言如此之病當以何物比類也聖人治病循陰陽之法度引物比類譬以鴻飛亦冲於天猶人之腎精中貫於脾胃而上合於肺也故聖人察造化之冥冥循水天之上下又何必僅守其經乎脾氣外絕者不行於肌腠也去胃外歸陽明者去中胃而外歸陽明之經也二火者君火相火也三水者太陰所至爲濕生終爲注雨是地之水濕也太陽之上寒水主之通天之寒水也腎爲水臟天一之癸水也夫三水太盛則火不能勝之是以脈亂無常蓋心主血心主包絡主脈木幷於脈中而君相之陽不能勝故脈亂而血妄行也四肢懈惰者脾土之精氣不行於肌腠也喘欬者下焦之水氣幷於陽明之經也血泄者水氣幷於脈中則脈急而無所循行故血妄行而下泄也若夫以爲傷肺者由失其比類之義而以狂論也不援物比類是以知之不明也言腎精之上交於肺者必由中土而上今反乘於脈中故君相之火傷

陰陽類論

二陰一陽病出於腎陰氣客遊於心脘下空竅堤閉塞不通四肢別離

註此言水從中土而上交於肺復隨天氣而運行於上下四旁二陰謂少陰所主之兩腎一陽乃腎臟所生之少陽空竅謂汗空乃肺主之毛竅如水不隨氣運行於膚表則空竅閉塞不通矣堤所以防水者也水不滲入於土中之理路則堤閉塞不通而四肢不能受氣於中土矣此緣腎臟病而津液少不能滲灌於脾肺其虛氣反從少陽而客遊於心下也

二陰二陽病在肺少陰脈沉勝肺傷脾外傷四肢

註此二陰二陽相類而爲病也夫腎精之上通於肺者從脾土而上升若鴻漸之冲天也二陰二陽相類而病在肺者腎水從陽明而直乘於肺是以肺反病也少陰脈沉是心腎不交矣水不濟火則火熱炎上而痺肺水不灌於土中則土燥而脾氣損傷外傷四肢蓋土受水津之濕而後能灌溉於四旁

解精微論

夫人厥則陽氣幷於上陰氣幷於下陽幷於上則火獨光也陰幷於下則足寒足寒則脹也夫一水不勝五火故目背盲

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

腎脈急甚爲骨癲疾微急爲沉厥奔豚足不收不得前後

註腎爲陰臟而主骨陰寒太甚故爲骨癲疾腎爲生氣之原正氣虛寒則爲沉厥虛氣反逆故爲奔豚陰寒在下故足不收腎開竅於二陰氣虛不化故不得前後也

本神篇

脾憂愁而不解則傷意意傷則悗亂四肢不舉毛瘁色天死於春

註憂愁脾之情也如脾因憂愁不解則傷脾臟之意意傷則悗亂而四肢不舉蓋意乃心之所生而脾主四肢也

脾藏榮榮舍意脾氣虛則四肢不用五藏不安

註脾主四肢虛則四肢不用土灌四藏是以五藏不安

經脈篇

胃足陽明之脈是主血所生病者狂瘧溫淫汗出鼽衄口喎脣胗頸腫喉痹大腹水腫膝臏腫痛循膺乳氣街股伏兔骭外廉足跗上皆痛中指不用

註平脈篇曰水入於經而血乃成胃爲水穀之海主生此榮血故是主血所生病者爲狂爲溫瘧汗出者胃氣熱而蒸發水液之汗也鼽衄者經氣熱也口喎脣胗頸腫喉痹腹腫膝痛膺股骭跗皆痛者陽明經脈之爲病也

脾足太陰之脈是主脾所生病者不能臥強立股膝內腫厥足大指不用

註不能臥強立股膝內腫足大指不用經病之在外也

脛骵足太陽之脈是動則病髀不可以屈腘如結踹如裂是爲踹厥是主筋所生病者項背腰尻腘踹脚

皆痛小指不用

註 太陽之氣生於膀胱水中而爲諸陽主氣陽氣者柔則養筋故主筋所生之病腰背膕踹諸證皆經脈所循之部分而爲病也

心主手厥陰心包絡之脈是主脈所生病者煩心心痛掌中熱

註 心主血而包絡代君行令故主脈是主脈之包絡所生病者煩心心痛掌中熱皆經脈所循之部分而爲病也

三焦手少陽之脈是主氣所生病者汗出目銳眥痛頰腫耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不用

註 少陽乃一陽初生之氣故主氣所生病者汗出陽加於陰則汗出也目銳眥痛頰腫耳後肩臑肘臂小指次指皆經脈所循之部分而爲病也

膽足少陽之脈是主骨所生病者胷脅肋髀膝外至脛絕骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用

註 少陽屬腎故主骨所生病者爲髀膝脛踝皆痛乃足少陽經脈所循之部分而爲病也少陽主骨故諸節皆痛也

經筋篇

足太陽之筋其病小指支跟腫痛

註 此經筋之爲病也

足少陽之筋病小指次指支轉筋引膝外轉筋膝不可屈伸膕筋急前引髀後引尻傷左角則右足不用命曰維筋相交

註 維筋者陽維之筋也陽氣從左而右維筋左右之交維也左絡於右故傷左角者病從左而右也右足不用者從上而下也

足陽明之筋其病足中指支脛轉筋脚跳堅伏兔轉筋髀前腫

註 足陽明之筋起於中三指乃厲兌之外間循髀股而上經於頸結於口鼻耳目之間其病支脛伏兔轉筋脚跳而堅經筋之爲病也

足太陰之筋其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引髀而痛

註 足太陰之筋起於大指內側之隱白間循膝股而上於胷腹其內者著於脊其病在經筋之部分而爲痛

足少陰之筋其病足下轉筋及所過而結者皆痛及轉筋

註 其病足下轉筋及所過而結者皆痛病在此所過所結者主癇瘛痙強亦經筋之爲病也

足厥陰之筋其病足大指支內踝之前痛內輔痛陰股痛轉筋陰器不用

註 足厥陰之筋起於足大指之大敦循脛股而結於陰器絡諸筋陰器乃宗筋之會厥陰主筋故連絡於三陰三陽之筋也其病乃筋之所過而結者爲痛爲轉筋爲陰器不用

手太陽之筋其病小指支肘內銳骨後廉痛

註 此筋之所過而結者爲腫爲筋痿也

手少陽之筋起於小指次指之端結於腕上循臂結於肘上繞臑外廉上肩走頸合手太陽其病當所過者即支轉筋

註 手少陽之筋起於小指次指之關衝穴循腕臂肘臑而上肩頸其病當所過之處即支分而爲轉筋

手太陰之筋起於大指之上循指上行結於魚後行寸口外側上循臂結肘中上臑內廉入腋其病當所過者支轉筋痛

手少陰之筋起於小指之內側結於銳骨上結肘內廉上入腋其病當所過者支轉筋筋痛

註 手少陰之筋起於手小指側之少衝間循肘腋其病當筋之所過者爲轉筋筋痛

海論

髓海有餘則輕勁多力自過其度髓海不足則腦轉耳鳴脛痠眩冒目無所見懈怠安臥

註 精液補益腦髓而下流陰股故髓海有餘則足勁輕健而多力度骨度也髓從骨空循骨度而上通於腦故有餘則自過其度矣髓海不足則津液竭津液者所以濡空竅者也是以耳爲之鳴目無所見液脫者骨屬屈伸不利故脛痠而懈怠安臥也

逆順肥瘦篇

黃帝曰脈行之逆順奈何岐伯曰手之三陰從臟走手手之三陽從手走頭足之三陽從頭走足足之三陰從足走腹

註 此言手足陰陽之脈上下外內逆順而行應地之經水也

陰陽繫日月篇

黃帝曰余聞天爲陽地爲陰日爲陽月爲陰其合之於人奈何岐伯曰腰以上爲天腰以下爲地故天爲

陽地爲陰故足之十二經脈以應十二月生於水故在下者爲陰手之十指以應十日日主火故在上者爲陽

註積陽爲天積陰爲地天地合氣命之曰人故身半以上天氣主之身半以下地氣主之日以應火月以應水人秉先天之水火而成此形故在上者爲陽以應日在下者爲陰以應月十日應天之十干十二月應地之十二支是以足之十二經脈以應十二月手之十指以應十日人秉天地水火而生故與天地相參

黃帝曰合之於脈奈何岐伯曰寅者正月之生陽也主左足之少陽未者六月主右足之少陽卯者二月主左足之太陽午者五月主右足之太陽辰者三月主左足之陽明巳者四月主右足之陽明此兩陽合於前故曰陽明申者七月之生陰也主右足之少陰丑者十二月主左足之少陰酉者八月主右足之太陰子者十一月主左足之太陰戌者九月主右足之厥陰亥者十月主左足之厥陰此兩陰交盡故曰厥陰

註歲半以上爲陽而主少陽太陽歲半以下爲陰而主少陰太陰猶兩儀之分四象也兩陽合明故曰陽明兩陰交盡故曰厥陰此四象而生太少中之三陰三陽也男生於寅故始於正月之少陽女生於申故始於七月之少陰陽從左故左而右陰從右故右而左

甲主左手之少陽己主右手之少陽乙主左手之太陽戊主右手之太陽丙主左手之陽明丁主右手之陽明此兩火并合故爲陽明庚主右手之少陰癸主左手之少陰太陽主日少陽主火故兩火并合是爲陽明陽明者離明之象也明兩作離故兩火并合兩陽合明是爲陽明手少陰君火主日手太陰肺金主天故應手之十指此陽中有陰也

故足之陽者陰中之少陽也足之陰者陰中之太陰也手之陽者陽中之太陽也手之陰者陽中之少陰也腰以上者爲陽腰以下者爲陰

註腰以上者爲陽腰以下者爲陰此陰陽之定位手經有陰足經有陽乃上下之氣交

本臟篇

肝應爪爪厚色黃者膽厚爪薄色紅者膽薄爪堅色青者膽急爪濡色赤者膽緩爪直色白無約者膽直爪惡色黑多紋者膽結也

註朱氏曰爪者筋之餘故肝應爪視爪之好惡以知膽之厚薄緩急也

五色篇

顴者肩也顴後者臂也臂下者手也目內眥上者膺乳也挾繩而上者背也循牙車以下者股也中央者膝也膝以下者脛也當脛以下者足也巨分者股裏也巨屈者膝膕也此五藏六腑肢節之部也各有部分有部分用陰和陽用陽和陰當明部分萬聚萬當能別左右是謂大道男女異位故曰陰陽

衛氣失常篇

皮有部皮之部輸於四末

註衛氣行於皮輸於四末爲所主之部蓋衛氣出於陽從頭目而下注於手足之五指故以四末爲部也

動輸篇

黃帝曰榮衛之行也上下相貫如環之無端今有其卒然遇邪氣及逢大寒手足懈惰其脈陰陽之道相輸之會行相失也氣何由還岐伯曰夫四末陰陽之會者此氣之大絡也四街者氣之徑路也故絡絕則徑通四末解則氣從合相輸如環黃帝曰善此所謂如環無端莫知其紀此之謂也

陰陽二十五人篇

足少陽之下血氣盛則外踝肥血多氣少則外踝皮堅而厚血少氣多則外踝皮薄而軟血氣皆少則外踝瘦無肉

註足少陽經脈之下行者循膝外廉下輔骨之前抵絕骨之端下出外踝之前循足跗上是以在下皮膚分肉之血氣盛則外踝肥血多則皮堅而厚血少則皮薄而軟

足太陽之下血氣盛則跟肉滿踵堅氣少血多則瘦跟空血氣皆少則善轉筋踵下痛

註轉筋踵下痛者血氣少而不能榮養筋骨也

手陽明之下血氣盛則手魚肉以溫氣血皆少則手瘦以寒

註手陽明經脈之下行者循臑臂上入兩筋之間出合谷故血氣盛則手魚肉以溫血氣皆少則手瘦以寒也

手少陽之下血氣盛則手捲多肉以溫血氣皆少則寒以瘦氣少血多則瘦以多脈

註手少陽經脈之下行者從肩臑肘臂而上出於手腕故血氣盛則手捲多肉以溫蓋手少陽之血氣循手表腕盛則皮緩肉淖故善於捲握也多脈者皮肉瘦而脈絡多外見也

手太陽之下血氣盛則掌肉充滿血氣皆少則掌瘦以寒

註手太陽之脈下行者循肩臑肘臂而下出於手腕是以血氣盛則掌肉充滿血氣皆少則掌瘦以寒也

百病始生篇

虛邪之中人也始於皮膚留而不去則傳舍於絡脈留而不去傳舍於經留而不去傳舍於輸在輸之時六經不遍四肢則肢節痛腰脊乃強

註輸者轉輸血氣之經脈即臟腑之經隧也臟腑之大絡左右上下並經而出布於四末故邪留於輸則六經不遍四肢之肢節痛也腰脊乃強者臟腑之大絡通於督脈之長強也

邪客篇

天圓地方人頭圓足方以應之天有四時人有四肢天有十日人有手十指辰有十二人有足十指整垂以應之女子不足二節以抱人形

論疾診尺篇

肘所獨熱者腰以上熱手所獨熱者腰以下熱肘前獨熱者膺前熱肘後獨熱者肩背熱臂中獨熱者腰腹熱肘後粗以下三四寸熱者腸中有蟲掌中熱者腹中熱掌中寒者腹中寒魚上白肉有青血脈者胃中有寒

註手太陰之脈從指井之少商過於輸行於經而入於肘之尺澤脈外之氣血從手陽明之五里走尺以上魚相逆順而行也肘所自寸而下尺也手所自尺而上寸也肘所獨熱者腰以上熱手所獨熱者腰以下熱此診尺膚以候形身之上下故與脈候之上下反其診也肘前乃手厥陰之曲澤處肘後乃手少陽之天井處蓋以兩手下垂上以候上下以候下前以候前後以候後也夫所謂肘所手所者論手臂之背面臂中掌中魚上乃手臂之正面背面爲陽故候形身之外正面主陰故候腰腹腸胃之內即尺外以候季脅尺裏以候腹中之大義相同也

大便赤辦飧泄脈小者手足寒難已飧泄脈小手足溫泄易已

註大便赤辦者謂黃赤之間別也蓋中焦泌糟粕蒸津液乃化而爲血循行於經隧命曰榮氣水穀常并居於胃成糟粕而俱下於大腸渫泌別汁而滲入於膀胱如大便赤辦乃中焦之血與糟粕并下矣飧泄大腸虛而不能渫泌矣此賜胃虛泄於下中焦之汁不能榮於脈中故脈小也若手足溫者得下焦之生氣故泄易已

癰疽篇

發於股脛名曰股脛疽其狀不甚變而癰膿搏骨不急治三十日死矣

註發於股脛足少陰之毒也其狀不甚變者毒附於骨而不外發故皮膚不甚變爲癰毒之狀也

發於股陰名曰赤施不急治六十日死在兩股之內

註股陰足三陰之部分也以火毒而施於陰部故名赤施六者水之成數十日者陰數之終也

發於膝名曰疵癰其狀大癰色不變寒熱如堅石勿石之者死須其柔乃石之者生

註膝者筋之會足少陽之分也色不變者色與皮膚相同而不赤也其狀如大癰而色不變者毒在外內之間也蓋少陽主樞故其色狀如此而爲寒熱也如堅石者勿石之石之則死毒氣入於內也須其柔熨而石之者生毒氣出於外也蓋少陽主樞可內而可外也

發於膕名曰兔齧其狀赤至骨急治之不治害人也

註兔乃陰類發於膕名曰兔齧者發於陰經也其狀赤至骨者從外而內也故曰急治之不治害人猶言外賊之來害人也

發於內踝名曰走緩其狀癰也色不變數石其輸而止其寒熱不死

註夫癰疽之變有病因於內而毒走於外者有腫見於外而毒氣走於內者此邪畜於脈而不行故名曰走緩其狀若癰而色不赤也足少陰之脈起於小指之下邪趨足心出然谷之下循內踝之後以上踹內故當數石其輸去其邪而止其寒熱蓋足少陰秉先天之水火故能爲寒爲熱也

發於足上下名曰四淫其狀大癰不急治之百日死

註四淫者邪氣淫於左右之太少也少陽主初陽之生氣而發於腎臟太陽乃腎之府而爲諸陽主氣故當急治之不則陽氣傷而百日死矣

發於足旁名曰厲癰其狀不大初如小指發急治之去其黑者不消輒益不治百日死

註足陽明之脈起於足大指次指之厲兌故發於足旁名曰厲癰黑者水之色不急治之以去其黑則寒淫而土敗矣

發於足指名曰脫癰其狀赤黑死不治不赤黑不死不衰急斬之不則死矣

註此足少陰之毒從內而發於外故曰脫癰謂從陰而脫出於陽也發於足指者發於足大指也夫足少陰秉先天之水火其狀赤黑者水火之淫毒太盛故爲不治之死證不赤黑者其毒氣少衰故爲不死如癰腫不衰急斬去其指不則毒氣注於諸經之絡而死矣

扁鵲難經

四肢滿閉

假令得肝脈其外證善潔面青善怒其內證臍左有動氣按之牢若痛其病四肢滿閉淋溲便難轉筋有是者肝也無是者非也

四肢不收

假令得脾脈其外證面黃善噫善思善味其內證當臍有動氣按之牢若痛其病腹脹滿食不消體重節痛怠惰嗜臥四肢不收有是者脾也無是者非也

飲食勞倦其病身熱而體重嗜臥四肢不收其脈浮大而緩

足寒

假令得腎脈其外證面黑善恐欠其內證臍下有動氣按之牢若痛其病逆氣小腹急痛泄如下重足脛寒而逆有是者腎也無是者非也

中濕其病身熱而小腹痛足脛寒而逆其脈沉濡而大

濕張機金匱要略

四肢腫重

皮水爲病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶聶動者防己茯苓湯主之

脾水者其腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難

諸肢節疼痛身體尪羸脚腫如脫頭眩短氣溫溫欲吐桂枝芍藥知母湯主之

味酸則傷筋筋傷則緩名曰泄咸則傷骨骨傷則痿名曰枯枯泄相搏名曰斷泄榮氣不通衛不獨行榮衛俱微三焦無所御四屬斷絕身體羸瘦獨足腫大黃汗出脛冷假令發熱便爲歷節也

病人常以手指臂腫動此人身體瞤瞤者藜蘆甘草湯主之

累熱

腹痛脈弦而緊弦則衛氣不行即惡寒緊則不欲食邪正相搏即爲寒疝寒疝繞臍痛若發則白津出手足厥冷其脈沉緊者大烏頭煎主之

痠疼

虛勞裏急悸衄腹中痛夢失精四肢痠疼手足煩熱咽乾口燥小建中湯主之

不仁

寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛灸刺諸藥不能治抵當烏頭桂枝湯主之

食禁

時病差未健食生菜手足必腫

春秋二時龍常精入芹菜中人偶食之爲病發時手背腹滿痛不可忍各蛟龍病方治之

浸淫瘡

浸淫瘡從口流向四肢者可治從四肢流來入口者不可治

浸淫瘡黃連粉主之

轉筋

轉筋之爲病其人臂脚直脈上下行微弦

華佗中藏經

論脚弱狀候不同

人病脚氣與氣脚無異者爲邪毒從內而注入脚名曰脚氣也風寒暑濕邪毒之氣從外而入於脚膝漸傳於內者名曰氣脚也皆以邪奪其正使人病形頗栝類例其於治療亦有上下先後也故分別於耳目一揆而不察其由無理致其療也又喜怒憂思寒熱毒邪之氣流入肢節或注於脚膝其狀類諸風歷節偏枯腫腫之證但入其脚膝謂之氣脚也若從外入足入藏者謂之脚氣也脚氣者先治內而次治外實者利之虛者益之又病脚氣多者何也謂人之心肺二經起於手脾腎肝三經起於足手則清邪中之足則濁邪中之人身之苦者手足耳而足則最重者艱苦故風寒暑濕之氣多中於足以此脚氣病多也然而得此病者從漸而生病但始萌而不悟悟者不曉醫家不爲脚氣將爲別疾治療不明因循至大身居厄矣本從微起漸成巨候流入藏腑傷於四肢頭項

腹背未甚終不能知覺也時因他而作或如傷寒或如中暑或腹背疼痛或肢節不仁或語言錯亂或精神昏昧或時喘乏或暴盲聾或飲食不入或臟腑不通或攣急不遂或舒緩不收或口眼㖞搖或手足顫掉種種多狀莫有達者故使愚俗束手受病死無告療仁者見之豈不傷哉今始述本末略示後學淺深消息至於醉入房中飽眠露下當風取涼對月貪歡沐浴未乾而熟睡房室縱罷而衝軒久立於低濕久行於水涇冒雨而行侵寒而寢勞傷汗出食飲悲生犯諸所禁因成疾矣其於不正之氣中於上則害於頭目害於中則蠱於心腹形於下則失於腰脚及於旁則妨於肢節千狀萬證皆屬氣脚起於脚疼乃謂脚氣也形候脈理亦在詳明其脈浮而弦者起於風濡而弱者起於濕洪而數者起於熱遲而澁者起於寒滑而微者起於虛牢而堅者起於實在於上則發於上在於下則發於下在於中則發於中結則因氣散則因憂緊則因怒細則因悲風者汗而愈濕者溫而愈熱則解而愈寒則熨而愈虛者補之實者瀉之氣則流之憂則寬之怒則悅之悲則和之能通斯方謂之良醫脚氣之病傳於心肝十死不治入心則恍惚妄謬嘔吐食不入眠不安定左手寸口脈乍大乍小乍有乍無者是也入腎則腰脚俱腫小便不通呻吟不絕目額皆黑色時上衝胃腹而喘其左尺中脈絕者是也切宜明審矣

死候

手足爪甲肉黑色者死

骨絕腰脊痛腎中重不可反側足膝後平者五日死

腎絕足腫者九日死

筋絕魂驚慮恐手足爪甲青呼罵不休者八九日死

晉王叔和脈訣

四肢痠疼

滑脈關前熱在胃到關翻胃發千重更向尺中還若是小便赤澁脚痠疼

死候

足趺趾踵膝如斗十日須知難保守

手足甲青叫罵多筋絕九日定難過

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百十卷目錄
醫部彙考一百九十
四肢門二
孫思邈千金方　論風毒狀　論何以得之於脚　論得已便令人覺否　論風寺相似　論得之所由　論冷熱不同　論因脚氣續生諸病　論須療救急　論虛實可服藥不可服藥　論看病問疾人　論服候法　論醫不醫　論須愼不愼　論善能治者發日可差　論服湯藥色目
朱肱活人書　脚氣
嚴用和濟生方　脚氣
竇漢卿瘡瘍全書　瘤瘡　腳背發　臂毒　天蛇毒　臂面毒　手心毒　手腕毒　發腫　冷疔　臁瘡　腰毒　臀瘡　委中毒　腿游風　鶴膝風　膝眼毒　脾瘡　腕瘡　竹槎瘡　脚手發疔　背瘡瘡　脚拐毒　跟疽　血風瘡　腎氣游風　鼠乳瘡　裏外臁瘡　蟠蛇三串　中發瘡　風毒發瘡
成無己明理論　手足自汗
張從政儒門事親　手指寢木　北方下注脚氣論　四肢對內外傷　四肢不舉　脚氣　胃足痛　足跟痛　手足寢木　腋痛
李杲十書　四肢病
朱震亨心法　腳氣　手氣　臂痛　脚氣　脚心痛　鶴膝風　不舉不用　邪留　肢節　脚氣　臂痛
戴思恭證治要訣　四肢所主　分乾濕證　辨內外因　脚氣總論　脚默痛　脚轉筋　手足自汗　鶴膝風　四肢舉捐　甲疽　代指　天蛇頭　脚指丫疽　痛足骨　脫甲　腳指丫疽　腳跟痛　腳肚痛　脚背發腫

藝術典第二百十卷
醫部彙考一百九十
四肢門二
唐孫思邈千金方
論風毒狀
考諸經方往往有脚弱之論而古人少有此疾自末嘉南渡衣纓士人多有遭者嶺表江東有支法存仰道人等並留意經方偏善斯術晉朝仕望多獲全濟莫不由此二公又朱齊之間有釋門深師師道人述法存等諸家舊方爲二十卷其脚弱一方近百餘首周魏之代蓋無此病所以姚公集驗殊不殷勤徐王撰錄未以爲意特以三方鼎峙風教未一霜露不均不等是以關西河北不識此疾自聖唐開闢六合無外南極之地襟帶是重爪牙之寄作鎮於彼不習水土往者皆遭近者中國士大夫雖不涉江表亦有居然而患之者良由今代天下風氣混同物類齊等所致之耳然此病發初得先從脚起因卽脛腫時人號爲脚氣深師云脚弱者卽其義也深師述支法存所用末平山數施蓮范祖耀黃素等諸脚弱方凡八十餘條皆極精要然學者尋覽頗覺繁重正是方集耳卒欲救急莫測指南今取其所經用灼然有效者以備倉卒餘者不復具述
論何以得之於脚
問曰風毒中人隨處皆得作病何偏著於脚也答曰夫人有五藏心肺二藏經絡所起在手十指肝腎與脾三藏經絡所起在足十趾夫風毒之氣皆起於地地之寒暑風濕皆作蒸氣足常履之所以風毒之中人也必先中脚久而不瘥偏及四肢腹背頭項也微時不覺痼滯乃知經云次傳間傳是也
論得已便令人覺否
凡脚氣病皆由感風毒所致得此病多不令人卽覺會因他病一度方始發動或奄然大悶經兩三日不起方乃覺之諸小庸醫皆不識此疾謾作餘病治之莫不盡斃故脚病多不令人識也始起甚微食飲嬉戲氣力如故惟卒起脚屈弱不能動有此爲異耳黃帝云緩風濕痺是也
論風毒相貌
夫有脚氣未覺異而頭項臂髆已有所苦有諸處皆悉未知而心腹五內已有所困又風毒之中人也或見食嘔吐憎聞食臭或有腹痛下利或大小便祕澀不通或胃中衝悸不欲見光明或精神昏潰或喜迷忘語言錯亂或壯熱頭痛或身體酪冷疼煩或覺轉筋或脚脛腫或不腫或脞腿頑痺或時緩縱不隨或復百節攣急或小腹不仁此皆脚氣狀貌也亦云風毒脚氣之候也其候難知當須細意察之不爾必失其機要一朝病成難可以理婦人亦爾又有婦人產後春夏取涼多中此毒深宜慎之其熱悶擊瘈驚悸心煩嘔吐氣上皆其候也又但覺臍下冷痞惋惋然不快兼小便淋瀝不同生平卽是脚氣之候頑弱名緩風疼痛爲濕痺
論得之所由
凡四時之中皆不得久坐久立濕冷之地亦不得因酒醉汗出脫衣就穢當風取涼皆成脚氣若暑月久坐久立濕地者則熱濕之氣蒸人經絡病發必四肢

酸疼煩悶若寒月久坐久立濕冷地者則冷濕之氣上入經絡病發則四體酷冷轉筋若當風取凉得之者病發則皮肉頑痹諸處瞤動漸漸向頭凡常之日忽然暴熱人皆不能忍得者當於此時必不得頓取於寒以快意也卒有暴寒復不得受之皆生病也世有勤功力學之士一心注意於事久坐行立於濕地不能動轉冷風來擊入於經絡不覺成病故風毒中人或先中手足十指因汗毛孔開腠理疏通風如急箭或先中足心或先中足趺或先中膝已下踹脛表裏者若欲使人不成病者初覺即灸所覺處二三十壯因此即愈不復發也黃帝云當風取凉醉已入房能成此疾

論冷熱不同

問曰何故得者有冷有熱答曰足有三陰三陽寒中三陽所患必冷暑中三陰所患必熱故有表裏冷熱冷熱不同熱者治以冷藥冷者療以熱藥以意消息之脾受陽毒即熱頑腎受陰濕即寒痹

論因脚氣續生諸病

雖患脚氣不妨乳石動發皆須服壓石藥療之夫因患脚氣續生諸病者則以諸藥對之或小便不利則以猪苓茯苓及諸利小便藥治之大便極堅者則以五柔麻仁丸等治之遍體腫滿成水病者則取治水方中諸治水之藥治之餘皆倣此更無拘忌

論須療緩急

凡小覺病候有異即須大怖畏決意急治之勿緩氣上入腹或腫或不腫胷脅逆滿氣上肩息急者死不旋踵寬者數日必死不可不急也但看心下急氣喘不停或自汗數出或乍寒乍熱其脈促短而數嘔吐不止者皆死

論虛實可服藥不可服藥

凡脚氣之疾皆由氣實而死終無一人以服藥致虛而殂故脚氣之人皆不得大補亦不可大瀉終不得異處故須止湯不服也如此者皆死不治也

論看病問疾人

世間大有病人親朋故舊交遊來問疾其人曾不經一事未讀一方自騁了了詐作明能談說異端或言是虛或言是實或云是風或云是蠱或道是水或云是痰紛紜謬說種種不同破壞病人心意不知因是遷延未定時不待人欻然致禍各自散走是故大須好人及好名醫識病深淺採蹟方書博覽古今是事明解者看病不爾大誤人事竊悲其如此者衆故一一顯析具述病之由狀令後來病者讀之以自防備也但有一狀相應則須依方急治勿取外人言議自貽憂悔但詳方意愈人不難莫信他言以自誤也余嘗爲人撰門冬煎此方治脚氣大有驗病者須急用之

論脈候法

凡脚氣雖復診候多塗而三部之脈要須不違四時者爲吉其逆四時者勿治餘如脈經所說此中不復具載其人本黑瘦者易治肥大肉厚赤白者難愈黑人耐風濕赤白不耐風瘦人肉硬肥人肉軟肉軟則受疾至深難愈也

論腫不腫

凡人久患脚氣不自知別於後因有他疾發動治之得瘥後直患嘔吐而復脚弱余爲診之乃告爲脚氣病者曰某平生不患脚腫何因名爲脚氣不肯服湯餘醫以爲石發狐疑之間不過一旬而死故脚氣不得一向以腫爲候亦有腫者有不腫者其以小腹頑痹不仁者脚多不腫小腹頑痹不過三五日即令人嘔吐者名脚氣入心如此者死在旦夕凡患脚氣到心難治以其腎水尅心火故也

論須慎不慎

凡脚氣之病極須慎房室羊肉牛肉魚蒜蕨菜菘菜蔓青蒜子酒麪酥油乳糜猪雞鵝鴨有方用鯉魚頭此等並切禁不得犯之并忌大怒惟得食粳粱粟米醬豉葱韭薤椒薑橘皮又不得食諸生果子酸醋之食犯者皆不可瘥又大宜生牛乳生栗子

論善能治者幾日可瘥

凡脚氣病枉死者衆略而言之有三種一覺傷之晚二驕狠忿傲三狐疑不決此三種正當枉死之也故世間誠無良醫雖有良醫而病人有性靈堪受入者更復拗少故雖有騏驥而不遇伯樂雖有尼父而人莫之師其爲枉橫亦猶此也今有病者有受入性依法使余治之不過十日可得永瘥矣若無受入性者亦不須爲治縱能治之恐無瘥日也非但脚氣諸病皆然良藥善言觸目可致不可使人必服法爲信者施不爲疑者說

論服湯藥色目

風毒之氣入人體中脈有三品內外證候相似但脈有異耳若脈浮大而緩宜服續命湯兩劑應瘥若風盛宜作越婢湯加白朮四兩若脈浮大緊轉驟宜作

竹瀝湯若病人脈微而弱宜服風引湯此人脈多是因虛而得之若大虛短氣力乏可其間作補湯隨病冷熱而用之若未愈更服竹瀝湯若病人脈浮大而緊駛此是三品之中最惡脈也或沉細而駛者此脈正與浮大而緊者同是惡脈浮大者病在外沉細者病在內治亦不異當消息以意耳其形尚可而手足未容至弱數日之中氣上即便命終如此之脈往往有人得之無一存者急服竹瀝湯日服一劑切要湯勢常令相及勿令半日之中空無湯也此湯竹瀝多服之若不極熱輒停在胷心更爲人患每服當使極熱若服竹瀝湯得下者必佳也若已服三劑竹瀝湯病及脈勢未折而苦脹滿可以大鼈甲湯下之湯勢盡而不得下可以丸藥助湯令下後更服竹瀝湯趣令脈勢折氣息料理便停服三十二物八風散佳凡初得病便摩野葛膏日再頑痹脚弱都愈乃止若服竹瀝湯脈勢折如未病時氣力轉勝脚故未能行體力充足然後漸微行步病重者瘥後半年始能人扶行耳既覺脈及體內瘥但當勤服八風散勿以脚未能行輕加餘治餘治未必全得益更生諸惡失此諸治也震人邊亦勿行野葛膏有人聞竹瀝湯云恐傷腰脚者即與勿治宜知此法此皆人無受入性不可與醫故也不爲疑者說此之謂也竹瀝湯有三首輕者服前方重者以次第服後方此風毒乃相注易病人宜將空缺服小金牙散以少許塗鼻孔耳門病困人及新亡人喜易人强健人宜將服之亦以塗耳鼻乃可臨近亾人及視疾者絳囊帶一方寸匕男左女右臂此散毒服宜從少爲始病人惟宜飲赤小豆飲

冬服側子金牙酒續命湯治風毒病初得似時行毒病而脈浮緩終不變駛者不治或數日而死或十日而死或得便不識人或發黃或發斑或目赤或下部穿爛者此最急得之即先服續命湯一劑幷服葛根湯麻黃湯下之若此不折更與續命湯兩三劑必瘥此病大急常令湯勢相接不可使半日缺湯不然即便殺人

夫脚氣之病先起嶺南稍來江東亦有得之者其證或微覺疼痹或兩脛腫滿或行起澀弱或上入腹不仁或時冷熱小便祕澀喘息氣上衝咽喉氣急欲死食嘔不下氣上逆者皆其候也若覺此證先與犀角旋覆花湯

宋朱肱活人書

脚氣

傷寒只傳足經不傳手經地之寒暑風濕皆作蒸氣足常履之遂成脚氣所以病證與傷寒相近其脈浮而弦者起於風濡而弱者起於濕洪而數者起於熱遲而澀者起於寒風者汗而愈濕者溫而愈熱者下而愈寒者熨而愈凡得脚氣候也黃帝所謂緩風濕痹是也頑弱名緩風疼痛爲濕痹痹者閉也閉而不仁故曰痹也寒中三陽所患必冷越婢湯小續命湯主之小續命煎湯成旋入生薑自然汁最快暑中三陰所患必熱小續命湯去附子減桂一半大煩躁者紫雪最良大便祕者脾約丸神功丸五柔丸大三脘散木瓜散主之脚氣之疾皆由氣實而始終無一人以服藥致虛而殂者頭痛身熱肢節痛而脚屈弱者是其人素有脚氣此時發動也脚腫者檳榔散主之脚氣方論千金外臺最詳此不復敘大抵越婢湯小續命湯薏苡仁酒法脾約圓神功圓皆要藥也仍鍼灸爲佳服補藥與用湯淋洗者皆醫之大禁也

嚴用和濟生方

脚氣

千金言脚氣皆由感風毒所致又經云地之寒暑風濕皆作蒸氣足常履之遂成脚氣然古來無脚氣之說黃帝時名爲厥兩漢之間名曰緩風朱齊之後謂之脚氣其名雖不同其實一也以此觀之寒暑風濕皆能致此非特風毒而已脚氣之病初得不覺因他病乃始發動或奄然大悶經三兩日方乃覺之先從脚起或緩弱疼痹或行起忽倒或兩脛腫滿或足膝枯細或心中忪悸或小腹不仁或舉體轉筋或見食嘔逆惡聞食氣或胷滿氣急或遍體酸痛此其候之不同也大抵寒中三陽所患必冷暑中三陰所患必熱誠哉斯言若論其脈浮而弦者起於風濡而弱者起於濕洪而數者起於熱遲而澀者起於寒風者汗而愈濕者溫而愈熱者下而愈寒者熨而愈凡得脚

氣速宜針灸之惟用湯淋洗者醫之大禁也觀夫脚氣皆由腎虛而生然婦人亦有病脚氣者必因血海虛乘宿塊與恚哀感悲傷遂成斯疾衆今婦人病此者衆則知婦人以血海虛而得之與男子腎虛類矣治婦人之法與男子用藥固無異但兼以治憂恚藥無不效也且補瀉之法當順四時春秋二時當急補瀉夏月疾盛專須汗利入冬已後須量人之盛衰微加滋補不然則氣血日衰必使年年遇蒸熱而作理之必然也治法大槩無越於斯又當於四時之中謹加調攝不得久坐久立冷濕之地暑月亦不當露坐濕處能慎於斯依法隨證治之無不瘳矣

寶漢卿瘡瘍全書

訓疽

訓疽者肺經受熱發於兩手五指頭上七八日不瀉必死四日可刺如發黑癰不甚過節猶可治也黑甚過節者死雖過節猶可治者藥入及之也其狀因小黯肉中生點子點小者如粟豆大惟大者如梅李或赤或黑乍青乍白有實核卽根也不浮腫悗痛應心至骨或身體發熱若不急治毒遂冲上面悉腫泡點紫黑爛壞入臟殺人南人得此名曰搨著毒卽截去其指恐毒上攻罕有一生十指端忽然策策痛入於心不可忍之向明望者見黃赤或黯青黑是癘疽齒間出臭水血者七日亡矣但厚肉處卽割去用鐵烙其上令焦如炭又於疽上灸百壯爲佳須頓飲葵根汁青蒙花竹瀝犀角汁枳殼湯消毒飲若吐膿血不治宜以灰掩膿血上不爾毒氣著人亦相染矣癘疽害人不旋踵惡風入肌脈初未知覺毒氣既發若火之烈其上陷小而深實點黑而不明其病應心稍緩則入臟矣

脚背發

脚背發此證由於消渴之證發於足指者名曰脫疽其色紫黑者死不紫黑者可治宜服苦參丸

發臂毒

發臂毒受在心腎經通於五指絡毒氣流走通爲串漏此是惡毒也當用內托流氣飲定痛消毒飲治之此肘後毒氣血流注積結成毒此乃癰毒也定痛流氣飲

筋疽

筋疽生動脈之間筋脈之上臂髆不能屈伸若不速治潰爛筋脈必成痼疾若生於臂撐上者名鷰癰紅腫作痛初宜灸之若潰之必損命不可輕忽內服內托散加木香五加皮更服黃礬丸十奇散多服護心散外用鐵箍散加薑汁調敷

天蛇毒

天蛇毒受心風傷於指肘臂此是惡毒證也當用定痛流氣飲治之此證未熟不宜便用刀開針撥其努肉卽發起深難治者潰後經年不能長肉用二黃散摻之

臂面毒

臂面毒生於臂膚之面受在肝肺經氣血凝滯不通結聚成毒此是惡證也當用清毒流氣飲後用定痛內托飲圍藥用金箍散敷之

手心毒

手心毒右手受在陰火太陰陽明氣血流於左足厥陰經左手毒在心火太陽流於右足太陰陽明土復生流於五行子母更相生養或因喜怒憂思寒凝氣血阻滯不通結聚成毒當用定痛解毒之劑後用內托流氣飲外用金箍散敷之

手腕毒

手腕毒生在掌後因心經風寒喜怒驚風瘀盛血不流通結成此毒當用定痛敗毒散內托清氣飲或透手心或透腕外再用三香內托散治之

發髀

發髀乃少陽經多氣少血因少陽有相火尤甚於厥陰皆由多慮勞神六氣七情相感預宜防肌肉難長暴戾之藥勿輕用之但此證之發紅腫或如栗勿以小而忽之

冷疔

冷疔者膏粱之變風溫餘毒天陰久冷攻於膝下傳於足太陰經初生如米漸成潰爛其色如煤敗血來侵骨肉損壞遂成大患經年骨節疼痛累歲不能生肌先用艾葉蛇牀子紫蘇稀薟草煎湯洗之內服黃芪白朮蒼朮當歸白芍連翹生地之藥外用隔紙膏貼之節勞內省亦可瘳矣

臁瘡

大抵下部之證以蒼朮爲主佐以黃蘗之辛行以青皮加以甘草隨證用引經之劑則得效矣此毒受在肝腎經痛不可忍用內托流氣飲治之搽藥用颳游風及婦人臁瘡藥通用

委中毒

此毒受在腎經寒氣阻滯而成加減紫蘇流氣飲治

之先用敗毒流氣飲後服紫蘇流氣飲排膿加人參黃芪

腿游風

此癰受在小腸腎經傷於寒熱邪氣與毒流於兩腿此是游毒也當用紫蘇流氣飲治之後服敗毒流氣飲外治先以金絲膏貼四五日以拔其毒水後用搽藥治之

鶴膝風

鶴膝風痫風鼓槌風之類也氣血相並而行周於一身得寒則行遲而不及得熱則行速而太過內傷七情外傷六淫則血氣之運或遲或速而病作矣多因日久得熱已自騰沸後復感冒濕熱血受邪鬱爲瘀滯不得運所以作痛夜則痛甚行於陰也治以辛溫監以辛凉流散寒濕而積熱得發其血自行與氣相和其病乃止或因灑藥取效性急作勞常享厚味感冒風雨腿腫則痛甚皆瘀血流於經隧日久不治恐成偏枯以致膝腫筋縮大痛兩足無力脚弱漸細髀枯槁拘攣不能屈伸治宜祛風順氣補血壯筋養陰除濕則氣血通暢自然愈矣

膝眼毒

此毒受在腎經膀胱氣血凝滯而濕熱攻於膝眼結成毒也圍藥用鶴膝風藥敷之煎劑用木香流氣飲

腕疽

俗言此疽堅硬無膿殊不知腫硬因成膿在內一時不能出皮膚須用內托發出方可用鍼刺破

骨槽疽

骨槽疽生於膝蓋上并脚趺上腕其痛時如刀割其癢似蟲鑽急用艾灸疽上三五壯便貼乳香萬應膏更服黃蠟丸

脚手發背

此證因心經有熱行履高低傷於足趺血聚成疽治法同冷漏濕毒流注

骨瘦疽

此證生於手陽明之間初如粟漸長如赤豆其痛不可忍漸長大如楊梅之狀血不出亦不生膿毒從經絡流於遍身有此疾者宜當謹防不可視爲輕疾宜用治疔之法加減行之

脚拐毒

此毒受在腎通於陽明筋聚之處疼痛傷心成毒也當用膝眼毒跟疽毒及鶴膝風藥治之

跟疽 一名牛觸瘡 一名土栗

此毒生於脚跟之上因行動高下肭傷故生此疽形如琉璃色無膿惟有紫色便不可刺破先用金箍散或鐵箍散敷之避風戒色不宜行動先服蠲毒流氣飲後服除濕木瓜湯待其將潰用針挑破出膿水貼金絲紫金二膏藥

鞋帶瘡

鞋帶瘡生於足踝之旁因受寒濕足陽明爲毒氣血相聚而成也當用定痛流氣飲治之

脚心毒

脚心毒受在腎心經生在脚心是爲濕毒也乃名脚心癰當服定痛流氣飲并檳榔丸治之

血風瘡

此瘡因婦人經脈不調或一月兩次或過月不來以此血氣潰入足陽明經故生此瘡宜用木香流氣飲五積散外用隔紙膏貼之

腎氣游風

此毒生在脚肚受在膀胱經冷氣傷腎伏在膀胱此乃風毒也當用紫蘇流氣飲外用鐵箍散敷之

裏外臁瘡

裏外臁瘡三里之旁陰交之側生之者因腎經寒氣攻於下焦內因風邪之所攻外有冷氣之所搏或因攛損而致生此瘡漸至潰爛膿水不乾蓋因濕熱風毒相搏而致然也

蠼蛄三串

此證生於兩手有上中下三種皆因濕毒傷於膚氣血傷於腎慾氣傷心而瘀血滯氣相搏故成此串毒也治用流氣飲三香內托散定痛降氣飲

中發疽

此證生於臂臑乃肝經氣血不行壅聚而成毒也當用托裏流氣飲消毒流氣飲治之

風毒發疽

此證生於足踹之間因氣血不通凝滯脾胃有傷經絡或過食炙煿或被毒氣結聚成瘡或乘虛爲賊風所吹當用溫中順氣飲孕婦宜加減服

金成無己明理論

手足自汗

傷寒手足汗出何以明之四肢者諸陽之本而胃主四肢手足汗出者陽明之證也陽經邪熱傳併陽明則手足爲之汗出陽明爲津液之主病則自汗出其有身汗出者有但頭汗出者有手足汗出者悉屬陽

明也何以使之然也若一身自汗出者謂之熱越是熱外達者也但頭汗出者是熱不得越而熱氣上達者也及手足汗出者爲熱聚於胃是津液之旁達也經曰手足濈然汗出者此大便必鞕也手足漐漐汗出大便難而譫語者下之則愈由此觀之手足汗出爲熱聚於胃可知矣或謂熱聚於胃而手足爲之汗出其寒聚於胃而有手足汗出者乎經曰陽明中寒者不能食小便不利手足濈然汗出此欲作痼瘕卽是中寒者也且熱聚於胃爲可下之證其寒聚於胃爲不可下又何以明之要明於此二者曰大便初鞕後溏以胃中冷水穀不別是以不可下也若大便難譫語者爲陽明證具則是可下之證臨病宜審之

元張從政儒門事親

手指麻木

凡人初覺大指次指麻木不仁或不用者三年內有中風之疾也宜先服愈風湯天麻丸各一料此治未病之先也是以聖人冶未病不治已病

北方下注脚氣論

內經云太陽之勝火氣內鬱流散於外足胻胕腫飲發於中胕腫於外又云脾脈搏堅而長其色黃當病少氣其耎而散色不澤者當病足胕腫若水狀也脾病者身重肉痿足不收行善瘈脚下痛此穀入多而氣少濕居下也故濕從下受之如上所說皆謂脾胃濕氣下流乘其肝腎之位於是足脛疼痛而胕腫也夫五穀入胃糟粕津液宗氣分爲二隧故宗氣積於胷中出於喉嚨以貫心肺而行呼吸焉營氣者泌其津液注之於脈化而爲血以營四末內注五臟六腑以應刻數焉衛氣者出悍氣之慓疾而先行於四末分肉之間行而不休者也又宗氣之道內穀爲寶穀入於胃乃傳之於脈流溢於中布散於外精專者行於經隧常營無已終而復始是謂天地之紀或飲食失當胃氣不能鼓舞脾氣不能運化行於百脈其氣下流乘其肝腎土木水相合下注於足胻胕腫而作疼痛晉蘇敬號爲脚氣是也凡治此疾每旦早飯任意飽食午飯少食日晚不食彌佳恐傷脾胃營運之氣失其天度況夜食則血氣壅滯而行陰道愈增腫痛古之人少有此疾自永嘉南渡衣纓士人多有之大唐開闢爪牙之士作鎭於南極其地卑濕霧露所聚不襲水土往往皆遭之關西河北人皆不識此疾外臺祕要總錄亦說江東嶺南大率有此此蓋清濕襲虛傷於下故經云感則害人皮肉筋骨者也故制方立論皆詳其當時土地所宜而治之今觀北方爽塏而無卑濕之地況腠理緻密外邪難侵而有此疾者何也蓋多飲乳酪醇酒水濕之屬也加以奉養過度以滋其濕水之潤下氣不能响之故下注於足胻積久而作腫滿疼痛此飲之下流之所致豈可與南方之地同法而治哉當察其地勢高下詳其飲食居處立爲二法一則治地之濕氣一則治飲食之下流隨其氣宜用藥施治庶幾合軒岐之旨也

李杲十書

四肢辨內外傷

內傷等病是心肺之氣已絕於外必怠惰嗜臥四肢沉困不收此乃熱傷元氣脾主四肢既爲熱所乘無氣以動經云熱傷氣又云熱則骨消筋緩此之謂也若外傷風寒是腎肝之氣已絕於內腎主骨爲寒肝主筋爲風自古腎肝之病同一治以其遞相維持也故經言膽主筋膀胱主骨是也或中風或傷寒得病之日便著牀枕非扶不起筋骨爲之疼痛不能動搖乃形質之傷經云寒傷形寒則筋攣骨痛此之謂也內傷及勞役飲食不節病手心熱手背不熱外傷風寒則手背熱手心不熱此辨至甚皎然

四肢不收

脾胃虛則怠惰嗜臥四肢不收時值秋燥令行濕熱少退體重節痛口乾舌乾飲食無味大便不調小便頻數不欲食食不消兼見肺病灑淅惡寒慘慘不樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也當升陽益氣宜升陽益胃湯主之

脚氣

脚氣之疾實水濕之所爲也蓋濕之害人皮肉筋脈而屬於下然亦有二焉一則自外而感一則自內而致其治法自應不同故詳而論之其爲病也有證無名脚氣之稱自晉蘇敬始關中河朔無有也惟南方地下水寒其清濕之氣中於人必自足始故經曰清濕襲虛則病起於下或者難曰今茲北方其地則風土高寒其人則腠理緻密而復多此疾者豈是地濕之氣感之而爲邪答曰南方之疾自外而感者也北方之疾自內而致者也何以言之北方之人常食潼乳又飲酒無節過傷而不厭且潼乳之爲物其氣味則潼乳其形質則水也酒醴亦然人之水穀入胃胃氣蒸騰其氣與味宣之於經絡化之爲血氣外榮四末內注五臟六腑周而復始以應刻數焉是謂天地

之紀此皆元氣充足脾胃之氣無所傷而然也苟元氣不充則胃氣之本自弱飲食既倍則脾胃之氣有傷既不能蒸化所食之物其氣與味亦不能宣暢旁通其水濕之性流下而致之其自外而入者止於下脛腫而痛自內而致者乃或至於手節也經云足脛腫曰水太陰所至爲重胕腫此但言其自外者也所治之法前人方論備矣自內而致者治法則未有也楊大受云脚氣是爲壅疾治以宣通之劑使氣不能成壅也壅既成而盛者砭惡血而去其勢經曰蓄則腫熱砭射之後以藥治之

內經論南方者其地下水土弱霧露之所蒸也江東嶺南大率如此春夏之交山林蒸鬱風濕毒氣爲甚足或感之遂成瘴毒脚氣其候則脚先屈弱漸至痹疼脛微腫小腹不仁頭痛煩心痰壅吐逆時作寒熱便溲不通甚者攻心而勢遍治之誠不可緩支法存所以留意經方偏善此術者豈非江右嶺表此疾行之多歟

異法方宜論云北方者其地高陵居風寒冷冽其俗飲湩酪而肉食凡飲湩酪以飲多飲速者爲能經云因而大飲則氣逆又云食入於陰長養於陽今乃反行陽道是爲逆也夫乳酪醇酒者濕熱之物飲之屬也加以奉養太過亦滋其濕水性潤下氣不能呴故下注於足脛積久而作腫痛此飲食下流之所致也通評虛實論云穀入多而氣少濕居下也況湩酪醇酒之濕熱甚於穀者也至眞要大論云太陰之盛火氣內鬱流散於外足脛胕腫飲發於中胕腫於下此之謂也故飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五藏陰陽揆度以爲常也若飲食自倍腸胃乃傷則胃氣不能施化脾氣不能四布故下流乘其肝腎之位注於足脛加之房事不節陰盛陽虛遂成痼疾

楊大受云脚氣之疾自古皆尚疏下爲疾壅故也然不可太過太過則損傷脾胃使營運之氣不能上行反下注爲脚氣又不可不及不及則使壅氣不能消散今立羌活導滯湯開結導引丸等方詳虛實而用之

外臺云第一忌嗔嗔則生煩煩則脚氣發第二禁大語大語則傷肺肺傷亦發動又不得露足當風入水以冷水洗脚兩脚脛尤不宜冷雖暑月常須著綿褲至冬寒倍令兩脛溫煖得微汗大佳依此將息脚氣漸薄損每至寅丑日割手足甲割少侵肉去風濕氣夏時勝理開不宜當風臥睡睡覺令人按摩勿使邪氣稽留數勞動關節常令通暢此並養生之要拒風邪之法也尋常有力每食後行三五百步疲倦便止脚中惡氣隨即下散難浮腫氣不能上也

第一凡飲食酒及湩酪勿使過度過則傷損脾胃下注於足脛胕腫遂成脚疾第二慾不可縱嗜慾多則脚氣發凡飲食之後宜緩行二三百步不至汗出覺困則止如此則不能成壅也經云逸者行之又云病濕痹忌溫食飽食濕地濡水

臂足痛

臂痛有六道經絡究其痛在何經絡之間以行本經藥行其氣血血氣通則愈矣若表證疼痛不可便下當詳細辨之

足痛新病以痛風法治之久病非脚氣以鶴膝風治之各自有門痛風多屬血虛然後寒濕得以侵之

朱震亨心法

脚氣

脚氣須用升提之藥提起其濕隨氣血用藥

有脚氣衝心者宜四物湯加炒黃蘗再宜湧泉穴用附子末津唾調傅上以艾灸泄引熱下

有筋動於足大指上至大腿近腰結了乃因奉養厚遇風寒宜四物湯加酒芩紅花蒼朮南星生薑煎服

脚氣有濕熱有食積流注有風濕有寒濕

勝濕以仙朮白朮防己川芎爲主或六物附子湯或當歸拈痛湯

氣鬱甚者舟車丸除濕丹有飲者東垣開結導引丸

解表用麻黃左經湯等藥隨經選用有兼痰氣寒濕者五積散加木瓜

若雙解以大黃左經湯東垣羌活導滯湯若理血以八味丸或四物加羌活天麻又或四物加黃蘗南星或健步丸

若疏風養血用獨活寄生湯最效

足跟痛

有痰有血熱血熱宜四物加黃蘗知母

手足癱木

手足癱者屬氣虛木者有濕痰死血

十指癱木是胃中有濕痰死血

肢節痛

肢節痛須用羌活去風濕亦宜用之

如肥人肢節痛多是風濕與痰飲流注經絡而痛宜南星半夏

如瘦人肢節痛是血虛宜四物加防風羌活

如瘦人性急躁而肢節痛發熱是血熱宜四物湯加黃芩酒炒黃檗

如肢節腫痛脈滑者當用燥濕宜蒼朮南星兼行氣藥木香枳殼檳榔在下者加漢防己

若肢節腫痛脈澀數者此是瘀血宜桃仁紅花當歸川芎及大黃微利之

如倦怠無力而肢節痛此是氣虛兼有痰飲流注宜參朮星半

明戴思恭證治要訣

手氣

手氣手腫痛或在掌指連臂膊並五痹湯獨痹湯

臂痛

臂爲風寒濕所搏或飲液流入或因提挈重物皆致臂痛有腫者有不腫者除飲證外其餘諸痛並宜五積散及烏藥順氣散或獨痹湯

外有血虛一證血不榮於筋或致臂痛宜獨痹湯四物湯各半貼和勻煎服

乳婦以臂枕兒傷於風寒多有臂痛亦宜於此選用若坐臥爲風濕所搏或睡後手在被外爲寒邪所襲遂令臂痛宜五積散及獨痹湯烏藥順氣散審知是濕獨痹湯每服加蒼朮二錢防己四分或用五痹湯倉因挈重傷筋以致臂痛宜琥珀散劫柒散或和氣飲每服加白薑黃半錢以薑黃能入臂故也

脚氣

風寒暑濕足當履之遂成脚氣諸邪氣不問久近乾濕及屬何經並可用除濕湯加木瓜檳榔白芷各半錢或芎芷香蘇散加赤芍藥草解各半錢仍吞木瓜丸此藥宜常服脚氣發動而兩足痛不可忍者五積散加全蠍三五箇入酒煎

脚氣發動必身痛發熱不可妄用傷寒等藥緣脚氣類傷寒若卒起脚弱或小腹不仁或舉體轉筋或見食嘔逆或兩脛赤腫便當作脚氣治乾者於前二藥中或更加蘿蔔子炒研碎半錢濕者於前二藥中加青橘皮十數片

切記脚氣不可令下寒亦不可妄用寒藥得溫則消散

脚氣跟注一孔深半寸許每下半日疼痛異常此乃脚氣注成漏以人中白於火上煅令水出滴入瘡口

脚氣發熱不退者敗毒散加木瓜一錢或用敗毒散五積散各半貼和勻名交加散更加木瓜一錢

若久履濕而得兩脚或腫或瘡五苓散或和氣飲加木瓜蘿蔔子各半錢大黃一錢

脚氣小便不通者生料五苓散一貼除濕湯一貼加木瓜二錢重分二服若大小便俱不通五苓散復元通氣散

脚氣喘急者此係入腹宜蘇子降氣湯或沉香降氣湯仍佐以養正丹或四磨飲

脚氣迫肺令人喘嗽宜小青龍湯每服加入檳榔一錢重煎服

脚氣畏食者宜生料平胃散加木瓜一錢嘔逆惡心八味平胃散加木瓜一錢

脚氣日久脚脛枯細或寒或熱或痛或瘧或一脚偏患或軟弱痺曳狀如偏風者宜小續命湯加木瓜或獨活寄生湯附子八味湯吞活絡丹虎骨四斤丸之

類

脚氣血虛芎芷香蘇內加木瓜羌活赤芍芎芷之類

脚轉筋用龍膽散

脚心痛

脚心痛者宜大聖散二錢入木瓜末半錢或一錢豆淋酒調仍用川椒香白芷草烏煎湯洗

鶴膝風

脛細而腫者俗呼爲鶴膝風宜地仙丹

鶴膝風則於五積散中加松木杉木二節

樓英醫學綱目

四肢所主

陽主四肢經云四肢者諸陽之本也又云陽受氣於四肢是也陽實則肢腫經云結陽腫四肢是也

陽虛則肢滿經云冬氣病在四肢是也

脾主四肢經云四肢皆稟氣於胃而不得至經必因於脾乃得稟者是也

不舉不用

脾實則四肢不舉經云脾脈太過爲病在外則令人四肢不舉者是也

脾虛則四肢不用經云脾臟肉形不足則四肢不用又云四肢懈惰此脾精之不行是也

運氣四肢不舉皆屬濕經云土太過日敦阜敦阜之紀其病腹滿四肢不舉是也

邪留肢節

五藏有邪留在肢節經云肺心有邪其氣留於兩肘肝有邪其氣留於兩股脾有邪其氣留於兩髀腎有邪其氣留於兩膝是也

脚氣

脚氣壅腫便溺阻隔心下痞滿飲食不消宜微利之脚氣多屬肺氣實經云肺病者汗出尻陰股膝髀腨脛足皆病故戴人治脚氣用涌法者良由此也又千金方多汗之者亦瀉肺之法也

風有一百二十四種氣有八十種唯脚氣頭風上氣當須藥不絕餘則隨其發動臨時消息但有風氣之人春末夏初及秋暮得通泄則不困劇所謂通泄者如麻黃桂牛榔李仁之類不必苦寒利藥也

按東垣論南方脚氣外感濕熱作寒治北方脚氣內傷酒醴作濕熱治此實發前人之未發者以余論之不必以南北分寒熱凡外感寒濕者皆爲寒濕不必南方爲然凡內傷酒醴者皆屬濕熱不必北方爲然但隨服證及詢其病之由來而施治可也

外臺總錄所錄皆謂南方卑濕霧露所聚之地其民腠理疎陽氣不能外固因而履之則清濕襲虛病起於下此因血虛氣弱受清濕之邪氣與血併行於膚腠邪氣盛正氣少故血氣澁澁則痹虛則弱故令痹弱也後人名曰脚氣緘經云有道以來有道以去治之多以炙熨爲佳以導引濕氣外出及飲醪醴以通經散邪所謂之方寒藥少熱藥多多用麻黃川烏薑附之屬內經云濕淫於外以苦發之麻黃苦溫發之者也川烏辛熱走而不能守通行經絡薑附辛甘大熱助陽退陰亦能散清濕之邪又察足之三陰三陽是何經絡所起以引用藥爲主治復察六氣中何氣當之治以佐使之藥孫眞人云醫者意也隨時增損初無定方眞知言哉

臂痛

按東垣云臂痛有六道經絡以行本經藥行其氣血者蓋以兩手伸直其臂貼身垂下大指居前小指居後而定之則其臂臑之前廉痛者屬陽明經以升麻白芷乾葛行之後廉痛者屬太陽經以藁本羌活行之外廉痛者屬少陽以柴胡行之內廉痛者屬厥陰以柴胡青皮行之內前廉痛者屬太陰以升麻白芷葱白行之內後廉痛者屬少陰以細辛獨活行之并用鍼灸法視其何經而取之也

李梴醫學入門

脚氣總論

脚曰氣者風寒暑濕四氣蒸於足循經入臟之深而發則以漸非若四氣中人雖淺而驟也外證全類傷寒且有六經傳變一如太陽頭疼身熱云云直至厥陰煩滿囊縮又有合併二病但初起脚膝軟弱頑痹轉筋赤腫爲異耳如太陽證見外踝循京骨至小指外側皆痛者隨四氣偏勝發散麻黃湯加防風羌活細辛葛根白朮茯苓防己或敗毒散合槟榔散陽明證見髀膝外廉下入中指內痛者隨四氣偏勝微利大柴胡湯加羌活細辛杏仁或升麻葛根湯合槟蘇散少陽證見諸足指節痛者宜和解小柴胡湯去參加防風葛根細辛白朮茯苓麥門冬乾薑小草三陽合病拘攣便閉者合前三方加減而服名左經湯或專入足太陰經證見脚膝內廉足大指端內側痛或浮腫者古桂附湯加防己白朮茯苓少陰經證見足小指下連足心腳外廉股內痛沖胃不食面黑溺澀小腹不仁者難治八味丸救之厥陰經證見足大指連內廉臍腹脹痛脚攣乾嘔者養眞丹如足三陰攣痹緩弱上攻胃脘肩背下注脚膝足心熱者換脚丸要之風多入肝病筋走注脈浮無汗小續命湯加獨活風毒腫痛攣風湯槟榔散筋急壅痛乳香定痛散濕多入脾病肉重著行起忽倒或臃除濕湯痰多者用此湯吞青州白丸子暑多入心病氣喘悶煩躁所患必熱敗毒散加大黃寒多入腎病骨攣急壅痛所患必冷五積散越婢加木瓜通用千金續命湯流氣飲子烏藥順氣散煩躁者單竹瀝飲大便閉者三和散脾約丸毒氣沖心作痛者蘇子降氣湯下養正丹或吳茱萸煎湯入薑汁速救之不然死在旦夕尋常春夏槟蘇散加川楝子熱腫赤者敗毒散加木瓜蒼术秋冬五積散加木瓜槟榔牛膝吳萸最忌補湯淋洗草藥攤敷其證有因於氣因於飲食及丹石者不可不知

分乾濕證

脚氣內經名厥兩漢名痿風初病不覺因他病始發或奄然大悶其證寒熱全類傷寒但初起則卒然脚痛發則旬月又作爲異濕者筋脈弛長而軟或浮腫或生廯瘡之類謂之濕脚氣宜利濕疏風乾即熱也乾者筋脈跧縮攣痛枯細不腫謂之乾脚氣宜滌血清燥

辨內外因

內因好食乳酪醇酒濕熱下流肝腎加之房勞故富

貴之人亦有脚疾外因久坐久立濕地或貧苦跋涉山溪瘴毒夏月則感濕熱之氣發則四肢多熱冬月則感濕冷之氣發則四肢多冷加以當風取凉汗出洗足醉後入房故成此疾外感止於下脛腫痛內傷或至手節周身初起察其起處隔蒜灸之最妙

湯藥則應除濕湯加檳榔防己脛腫者紅花蒼朮丸肥人加痰藥赤裂腫痛甚者用甘遂爲末水調敷腫處另用甘草煎湯服之立消或敗毒散加蒼朮大黃搜風順氣丸

濕衆寒則痛五積散不換金正氣散附子六物湯勝濕丸

濕衆風則走注不常烏藥順氣散地仙丹甚者用赤芍草烏等分酒糊丸服以刼之挾瘀血者復元通聖散合消風散

濕衆熱則腫痛異常加味蒼藥散二炒蒼朮散清燥湯

食積濕痰下注者檳榔蒼藥丸

軟痹者乃膏粱火乘肝腎以致血氣澀則痹厥不仁盧則軟綫無力或痲木不舉三妙丸搜風順氣丸然腎主骨盧則骨軟陽盧附虎四斤丸陰虛虎潛丸腎氣丸脚軟筋痛者大補陰丸去地黃加白芍知母甘草倍牛膝肝主筋盧則脚膝頑痲養眞丹肝腎脾俱盧者五獸三匱丹

凡濕氣在下隨氣血痰藥中加防風蒼朮升提其濕

冲心則恍惚嘔吐不食脈乍大乍小者死宜木香流氣飲或蘇子降氣湯吞養正丹有火者四物湯加黃藥以降之再用附子末津調塗涌泉穴引勢下行入腹不仁喘急欲死者木黃散腹脹煩躁者松節湯入肺喘敎小青龍湯加檳榔入肝頭目昏眩喘滿逼促烏藥平氣散入腎腫脚腫脹小便不利目額皆黑左尺絕者死牛膝散加大黃救之如少陰腎氣入心乃木剋火也急宜八味丸救之有脚氣寒熱足腫心煩體痛垂死者杉節湯不食加砂仁青皮木瓜外用桃柳棗槐楮五枝煎湯洗之消腫住痛先喫酒三五杯最忌熱藥蒸泡忌逼邪入經絡故治脚以疏逼氣道爲佳

濕熱流注三陰經絡火鬱成毒腫上干三陽寒熱嘔惡身痛且重者左經湯主之或香蘇散加木瓜檳榔七情再加五加皮木香痛加赤芍忍冬藤婦人加當歸

三陰裏證胃滿怔忡遍體轉筋二便祕澀或自利者羌活導滯湯除濕丹導水丸搜風順氣丸挾痰者三花神佑丸挾食積者開結導飲丸裏虛者獨活寄生湯換腿丸表裏俱見者左經湯加大黃

脚跟痛

脚跟痛有血熱者四物湯加知母黃藥牛膝有痰者五積散加木瓜或開結導飲丸

脚轉筋

脚轉筋有血熱者四物湯加酒芩紅花感濕者除濕湯常用松節二兩乳香一錢慢火焙存性爲末每一錢木瓜煎酒調服

手足自汗

傷寒津液自胃腑旁達於外則手足自汗有熱襲胃腑逼而出之者必有譫語燥糞陽明證也大便已鞕者大柴胡湯或大承氣湯大便不鞕而軟者小柴胡湯凡傷寒欲下而小便少手足心并臍下不滋潤者不可攻也有寒聚胃腑大便初鞕後溏或水穀不分手足濈然汗出者不可下少與理中湯或猪苓湯如寒甚不食小便不利者此欲作痓痙也宜理中兼散氣之藥治之

四肢攣搐

四肢諸陽之本腰背太陽之絡因發汗勝理空疎蓋覆不周將息未久以致風邪復入筋骨之間攣搐有妨行持牛蒡根湯主之如脚攣齒噤者風熱也承氣湯下之

拘急者手足不能自如屈伸不便跬臥惡風之狀發汗亡陽而有此證汗多小便難者桂枝湯加附子吐下後厥逆拘急者四逆湯心煩足攣屬血虛者芍藥甘草湯陰陽易病手足搐搦如風狀者古瓜竹湯

甲疽

甲疽乃毒氣攻於手足指努肉裹上指甲痒痛出血痛中有蟲或因剔甲傷肌或因甲長侵肌遂成腫痛俱用綠礬五兩置鐵板上以炭火封之吹令火熾其礬即鎔流出赤汁直俟汁盡去火待冷取爲末色似黃丹收之先以鹽湯洗拭後用綠礬爲君入乳香少許敷之重者用綠礬五錢蓖香一錢半麝香一字爲末以綿袋盛藥納所患指於袋中線紮定以瘥爲度

代指

代指指頭先腫燉熱製痛然後於爪甲邊結膿甚者爪甲俱脫先用芒硝煎湯淋洗然後用烏梅核中仁爲末米醋調成膏入指漬之自愈或用猪脂和蚯蚓

搗爛敷之

天蛇頭

天蛇頭瘡生手指上或足瘡旁一塊開口腫痛用雞母楊根好酢浸一宿卽消或以雄黃入雞子內以患指浸其中一宿次早更以蜈蚣燒煙熏病指一二次卽消如痛甚流血不止者用雄黃蜈蚣全蠍爲末搽在瘡上却以少油抹帛上紮之

鶴膝風

鶴膝風乃足三陰虧損風邪乘之以致內熱減食肌瘦肢體攣痛久則膝愈大而腿愈細有如鶴之膝然初起宜用葱熨法以內消之寒熱者五積交加散加烏藥殭蠶已潰者獨活寄生湯大防風湯

陽虛熱來復去者無根虛火也十全大補湯大防風湯臍腹疼痛溺頻頭運吐痰者八味丸發熱大渴面赤脈大血虛甚也古歸芪湯

陰虛形瘦發熱者腎氣丸挾濕熱者蒼龜丸二炒蒼藥散食少面黃者六君子湯津乾中氣不足者補中益氣湯加五味子膿清肌肉不生者八物湯

婦人月經不調發熱口渴兩膝腫痛者腎氣丸蒼龜丸逍遙散加牛膝杜仲黃蘗

膝瘡

此瘡生兩膝上初起脣腫作痛寒熱者屬外邪濕熱檳榔散敗毒散主之毒盛發寒熱者活命飲

漫腫作痛或不腫不痛屬三陰虛也或發寒熱俱宜八物湯十全大補湯脾虛挾表邪者補中益氣湯加桔梗白芷脾虛濕熱流膿口乾少食者補中益氣湯加茯苓芍藥脯熱加炒黑黃蘗熟地挾怒氣加山梔川芎有鬱者歸脾湯加山梔柴胡若患處黑黯肢體惡寒飲食少思屬肝腎虛敗宜八味丸內熱口乾者腎氣丸久不愈者大苦參丸腎臟虛風四生散黃芪丸

外治法因風熱者洗以葱湯次用龍骨膏貼之風熱者馬齒膏濕熱者窰土膏因血氣凝滯者小駐車丸加乳香少許摻之

內臁瘡初起洗以鹽湯次以蠟礬紙貼之重者桐油膏癢甚者蘄艾膏久不愈者內外通用爐灰膏點去瘀肉後貼黃蠟膏然內必量體服藥若誤用攻伐傷胃者亦能傷人

脚跟瘡

脚跟乃督脈發源腎經過脈內因飲食起居虧損足三陰所致或外被犬兔所咬而成

漫腫食少者補中益氣湯脯熱頭昏者逍遙散腎氣丸咳嗽吐痰者十全大補湯八味丸若不斂口瀝盡氣血而死

脚肚瘡

脚肚上生瘡初如粟漸大抓搔不已成片包脚相交黃水流出癢不可忍久成痼疾難愈先用貫衆煎湯淋洗後用百藥煎爲末津唾調逐旋塗敷自外而入

袴口瘡

袴口瘡生於脚脛或因物打撲而成其瘡口狹皮內極闊皮薄如竹膜極癢痛終日黃水流延蔓而生甚者數十年不愈又易於染人患者須忌房室則易愈用韭菜地乾地龍屎爲末入輕粉清油或白犬血調敷內外臁瘡亦治

足發

濕熱下注者先用隔蒜灸及活命飲以解蘊毒次服補中益氣湯腎氣丸以補精氣三陰虛者初起托裏消毒散或托裏散加牛膝檳榔杜仲或托裏消毒散潰後大防風湯十全大補湯八味丸陰虛足心熱者四物湯加知母黃蘗脾虧者補中益氣湯若專治瘡者死

嵌甲

嵌甲因靴窄研損爪甲陷入四邊腫脣黃水流出浸淫相染五指濕爛漸漸引上脚趺泡漿四起如湯潑火燒日夜倍增不能行動以陳皮濃煎湯浸良久甲肉自相離開輕手剪去肉中爪甲外用蛇退一條燒灰雄黃四錢爲末乾摻乾者香油調敷與甲疽條參治

脚指丫瘡

脚指丫瘡乃足指角急爲甲所入肉便刺作瘡濕爛用枯礬三錢黃丹五分爲末摻之或鵝掌黃皮燒灰摻之

脚背發

脚背發又名爲脫疽疔以其能潰脫也亦有患於手背及手指者原因膏粱房室損傷脾腎或先渴而後發或先發而後渴輕則色赤作痛自潰可治先用隔蒜灸內服活命飲或敗毒散加金銀花白芷大黃痛止乃與托裏散或內托十宣散去桂加天花粉金銀花挾氣者十六味流氣飲下虛者十全大補湯八味丸大苦參丸

重者色黯不痛先用隔蒜灸桑枝灸更服補藥固內

則惡肉不致上侵庶可保生又有因修手足口咬等傷或外塗生肌涼藥內服寇伐兼犯房室患處不潰不痛色黯上延亦多致隕重者須用利刀解去其筋則筋骨出而毒得泄又甚在指則斬去其指在肉則割去其肉外治用桐油及無名異煎一沸入花椒一勺看瘡大小剪麥葉在內同煎浸一七後單以此葉貼瘡上卽安

瘺漏

有瘺上生一孔約深半寸至下半日異疼者此漏毒注成漏也用人中白炙出水滴入瘡口

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百十一卷目錄

醫部彙考一百九十一

四肢門三

彙信古今醫鑑　腳氣　脈法　臁瘡

李中梓醫宗必讀　腳氣類傷寒

陶華六書　手足寒熱辨　自汗　拘急

王綸明醫雜著　腿中熱痛　足軟

薛己醫案　脫疽　鶴膝風　臁瘡　足跟痛　腳發

王肯堂證治準繩　腳氣　四肢拘急　寸疔　代指　股陰疽　股陽疽　腿筋風　委中毒　鶴膝風　臁瘡　三里發　接骨發　手心毒　虎口疽　蛇頭疔　蝎又　天蛇頭　教蛔　手指節發　太指疽　足踝疽　魚鱗瘡　足跟疽　瘰癧疽　足心癰　肉刺　無名腫毒

陳實功外科正宗　脫疽　癰疽　治法　痈發　石榴疽　潛法　甲疽　穿腋疽　天蛇毒　合谷疔　臁瘡　鱼鳞瘡　婦人　腳丫作痛　手足破裂　蟾蜍疔　瘡　牛皮臁　瘡物蛀田螺泡　鵝掌風　拾遺　證

腳氣

治之之法用蒼术白术以治其濕黃芩黃蘗知母以治其熱當歸芍藥生地黃以調其血木瓜檳榔以調其氣羌活獨活以利關節而散風濕象用木通防己牛膝引諸藥下行及消腫去濕以爲此證之大法矣

彙用鍼熨導引其濕熱之氣外出也東垣立當歸拈痛湯治之其效捷於影響學者更宜詳究焉

脈法

腳氣之脈其狀有四浮弦爲風宜汗濇弱濕氣宜滲遲濇因寒宜溫洪數爲熱宜下

微滑者虛牢堅者實結則因氣散則因憂緊則因怒細則因悲

臁瘡

夫臁瘡者皆因腎臟虛寒風邪毒氣外攻三里之旁灌於陰交之側風熱毒氣流注兩脚生瘡腫爛疼痛臭穢步履艱難此瘡生於臁骨爲重以其骨上肉少皮薄故難愈至有多年無已瘡口開闊皮爛肉見臭穢可畏

治法當先取蟲然後敷貼仍宜內服蟾蜍之類須翹足端坐勿多行履庶可全愈矣

李中梓醫宗必讀

腳氣類傷寒

腳氣乃足受寒濕頭痛身熱肢節痛便閉喘逆但腳痛或腫滿或枯細與傷寒異耳

許則仁曰此病有數種有飲氣下流以成腳氣飲氣即水氣之漸亦有腎氣先虛暑月承熱以冷水洗腳濕氣不散亦成腳氣亦有腎氣既虛諸事不節有因居卑濕濕氣上衝亦成腳氣此諸腳氣皆令人腳脛大腳趺腫重悶甚則上衝心腹滿悶短氣中間有乾濕二腳氣濕者腳腫乾者腳不腫漸覺枯燥皮膚甲錯須細察之若先覺脅肋心腹刺痛胃脘滿悶喫食之後此狀彌加時時氣短手腳沉重骨髓疼多臨氣

每食諸粘臟陳敗臭物即諸狀轉劇此即飲氣下流而成腳氣有此候者自宜依療飲將成水氣細辛等八味湯葶藶子等十五味丸療之若先無前狀但覺腳腫疼悶沉重有緩弱乍衝心腹滿悶小腹下不仁有時急痛宜依吳茱萸等五味湯桑根白皮等六味丸側子等十味酒細細服之

陶華六書

手足寒熱辨

或曰人之手足乃胃土之末凡脾胃有熱手足必熱脾胃有寒手足必寒理之常也惟傷寒乃有厥深熱亦深厥微熱亦微之論何邪曰胃寒則手足冷胃熱則手足熱此病之常也若夫極則變不可以常道拘也蓋亢則害承乃制火氣亢極反象水化故有此象耳陰陽反覆病之逆從未可以常理論也凡經言厥逆厥冷厥寒手足寒冷等語皆變文耳不可以論輕重若言四肢則有異也亦未可純爲寒證若厥冷直至臂脛以上則爲眞寒無疑矣急用薑附等藥溫之少緩則難療矣謂其寒上過乎肘下過乎膝非內有眞寒邪逆於四肢而何然更當與厥并所象之證參之庶乎其無誤也凡看傷寒不可以厥逆便斷爲寒必須以厥象證參之方知端的如手足厥逆象之以腹痛腹滿泄利清白小便亦清口不渴惡寒戰慄面如刀刮皆寒證也若腹痛後重泄利稠粘小便亦澁渴而好飲皆熱證也宜詳審之

自汗

手足乃諸陽之本熱聚於胃胛則津液旁達於四肢也蘊熱則燥屎譫語手足汗出者大承氣湯下之挾

木則水數不分手足汗出者理中湯溫之是有承氣理中之不同也

拘急

拘急者手足不能自如屈伸不便如蹉跌惡風之貌四肢諸陽之本因發汗亡陽陽虛而有此證自汗脈浮小便數心煩惡寒足攣拳急芍藥甘草湯太陽病發汗後遂漏不止惡風小便難拘急者桂枝加附子湯吐利後汗出發熱惡寒拘急手足厥冷者四逆湯溫之也

王綸明醫雜著

腿中熱痛

問兩脚自膝以下或時內熱或骨中覺熱或有一點酸痛熱者何答曰此血熱也但是風病其血必熱惟其血熱故風寒之氣一襲之則外寒束內熱而爲痛丹溪論痛風謂血熱得寒汚濁凝滯所以作痛遇夜痛甚行於陰也遇風雨陰寒痛甚寒濕甚也又風病必血燥風木生火故血熱而燥

薛立齋先生云醫風先醫血血行風自滅蓋肝藏血而主風又肝氣爲陽爲火肝血爲陰爲水若肝火旺則肝血必虛故凡風病多因肝經風火爲患當推五臟相勝相生以益其血經云腎藏精而主骨故腎虛者則骨中熱或湧泉穴兩脛兩足內熱多患骨痿以致不起屬足三陰虧損之虛熱耳滋其化源庶可保其生也

足軟

若足軟弱無力者補陰丸加牛膝酒洗二兩虎脛骨酥炙透一兩防己酒洗木瓜各五錢

按此證多因足三陰虛虧損若脾腎不足而無力者用還少丹肝腎虛熱而足無力者用六味丸如不應急用八味丸

薛己醫按

脫疽

脫疽調疔生於足指或足濵而自脫故名脫疽亦有發於手指者名曰蛀節疔重者腐去本節輕者筋攣痛者除濕攻毒更以隔蒜灸至不痛

煩痛或不痛者隔蒜灸之更用解毒藥若色黑急割去遠服補劑庶可救黑延上亦不治

色赤煩痛者托裏消毒更參灸

作渴者滋陰降火色黑者不治

此證因膏粱厚味酒癖炙煿積毒所致或不慎房勞腎水枯竭或服丹石補藥致有先渴而後患者有先患而後渴者皆腎水涸不能制火故也初發而色黑者不治赤者水未涸尚可若失解其毒以致肉死色黑者急斬去之緩則黑延上足必死此患不問壅潰雖隔蒜灸有效亦有色赤作痛而自濵者元氣未脫易治夫至陰之下血氣難到毒肉易腐藥力又不易達況所用皆攻痛之藥未免先干腸胃又不能攻敵其毒不若隔蒜灸并割去最爲良法故孫眞人云在指則截在肉則割即此意也

脫疽因醉酒炙煿膏粱傷脾或房勞損腎故有先渴而後患者有先患而後渴者若色赤作痛自濵者可治色黑不濵者不治色赤作痛者元氣虛而濕毒壅盛也先用隔蒜灸活命飲托裏散再用十全大補湯加減八味丸色黯不痛者腎氣敗而虛火盛也隔蒜灸桑枝灸亦用十全大補湯加減八味丸則毒氣不致上侵元氣不致虧損庶可保生亦有因修手足口咬等傷而致者若元氣虛弱或犯房事外塗寒涼內服尅伐損傷脾胃患處不濵若黑黯上延亦多致死重者須當以脚刀轉解周圍經拽去之則筋隨骨出而毒得洩亦不痛否則毒筋內斷雖去而仍潰

鶴膝風 又名鼓槌風

兩大小腿瘦如蘆柴止有膝蓋大者行履不得用小續命湯料內加草薢川樗子獨活乾木瓜吮咀不用生薑用水煎熬於椀底先用麝香少許去滓傾於椀內服之服至數十貼後加五積散同煎服永瘥

鶴膝風乃調攝失宜虧損足三陰經風邪乘虛而入以致肌肉日瘦內熱減食肢體攣痛久則膝大而腿細如鶴之膝故名之若傷於脾胃者補中益氣湯爲主傷於肝腎者六味丸爲主若欲其作膿或潰後十全大補湯爲主皆佐以大防風湯初起須以葱熨可以內消若津涸口乾中氣不足也補中益氣湯加五味子頭運頭痛陽氣不升也補中益氣湯加蔓荊子發熱晡熱陰血虛弱也用四物參芪白朮畏寒惛寒陽氣虛弱也用十全大補湯飲食少思胃脘膨脹脾胃虛痞也用四君子湯面色痿黃飲食少思脾胃虛弱也用六君子湯膿水清稀肌肉不生氣血俱虛也用八珍湯熱來復去有時而動無根虛火也用十全大補湯形瘦嗜臥寢息發熱痰盛作渴小便頻數五臟虛損也用六味丸臍腹疼痛夜多溲溺脚膝無力頭運吐痰腎氣冷敗也用八味丸發熱大渴不欲近衣面目赤色脈大而虛血虛發躁也用當歸補血湯

或有痢後而患者亦治以前法餘當臨證制宜

大抵此證雖云腫有淺深感有輕重其所受皆因眞氣虛弱而邪得以深襲故附骨癰疽及鶴膝風證腎虛者多有之前人用附子者以溫補腎氣而又能行藥勢散寒邪也亦有體虛之人夏秋露臥爲冷氣所襲寒熱伏結多成此證不能轉動乍熱而無汗按之痛應骨者是也若經久不消極陰生陽寒化爲熱而潰也若被賊風所傷患處不甚熱而洒淅惡寒不時汗出覺之痛少止須大防風湯火龍膏治之又有攣曲僵枯堅硬如石謂之石疽若勢緩積久不潰肉色亦紫皮肉俱爛名緩疽其始末皆宜服前湯欲其驅散寒邪以補虛托裏也

夫立方之義各有所宜凡體氣虛弱邪入骨界過絕隧道若非用附桂辛溫之藥開散關節腠理之寒邪通暢隧道經絡之氣血決不能愈且本草云附子治寒濕痿躄拘攣膝痛不能行步以白朮佐之爲寒濕之聖藥又云桂通血脈消瘀血堅骨節治風痹骨攣脚緩宣導諸藥及十全大補湯以治前證不但不可去桂亦不可不加附子無此二味何以行參芪之功健脾歸之性而補助血氣使之宣通經絡扶大虛之證以收必效之功哉況前證在骨節之間關鍵之地治之不速使氣血循環至此鬱而爲膿從此而泄氣血涸盡無可生之理矣

膝瘡

膝瘡生於兩膝初起赤腫久而腐潰或浸淫搔癢破而膿水淋漓蓋因飲食起居虧損肝腎或因陰火下流外邪相搏而致外膝屬足三陽濕熱可治內膝屬足三陰虛熱難治若初起惡寒壯熱腫譽作痛者屬濕熱用槇蘇敗毒散若浸腫作痛或不腫不痛者屬陰虛用補陰八珍湯若膿水淋漓體倦食少內熱口乾者屬脾虛用補中益氣加茯苓酒炒白芍藥若午後熱或作痛頭目不清者屬陰火前湯加酒炒黑黃蘗及六味地黃丸若午後發熱至子時分方止是血虛前湯加芎歸熟地若鬱結傷脾而甚用歸脾湯加柴胡山梔芩怒動肝火而甚用補中益氣湯加川芎山梔黃芩內熱口乾肢體倦怠或痰涎上升或口舌生瘡屬脾腎虛熱用六味地黃丸補中益氣湯若患處黑黯肢體畏寒飲食少思屬脾腎虛敗用八味丸若誤用攻伐復損胃氣耙其化源治亦難矣

足跟瘡

足跟乃督脈發源之所腎經所過之地若飲食失節起居失宜虧損足三陽經則成瘡矣若漫腫寒熱或體倦少食屬脾虛下陷也用補中益氣湯若痛熱作痛頭目不清屬脾虛陰火也前湯并六味丸若痰涎上升或口舌生瘡屬腎水乾涸也前湯并加減八味丸凡此皆當滋其化源若徒治其外則誤矣俗云兎嚙瘡者蓋獵人被兎咬足跟久而不斂氣血涸盡而死

脚發

脚發之證屬足三陰經精血虧損或足三陽經濕熱下注若色赤腫痛而潰膿者屬濕熱下注爲可治若色微赤微腫而膿清者屬精血虧損爲難治若黑黯不腫痛不潰膿煩熱作渴小便淋漓者陰敗未傳惡證也爲不治其法濕熱下注者先用隔蒜灸活命飲以解壅毒次服益氣湯六味丸以補精氣若色黯不痛者肉灸桑枝灸以行壅滯助陽氣更用十全大補湯八味丸壯脾胃滋化源多有復生者若專治其瘡復傷元氣吾未見其生者

王肯堂證治準繩

脚氣

按東垣論南方脚氣外感清濕作寒治北方脚氣內傷酒乳作濕熱治此實前人之未發者後學泥之遂成南北二派互相詆毀南毀北者曰彼所論乃北方病也彼所治乃北方法也不可施於南北毀南者曰彼所論乃南方病也彼所治乃南方法也不可施於北鳴呼立論之始不究內經首尾所言輒創其名以致後人守其說者知其一不知其二故相乖忤若此夫素靈諸篇上窮天文下究地理中知人事之變疊出不一書者爲天地以二氣食於人而人以六經三陰三陽上奉之是故三陰三陽亦是在人之六經氣也內以養於藏腑壯精神運水穀以爲生化百骸之用及乎天地六氣一有不正則變變則襲人身形之虛入客以爲病者謂之外邪若人之三陰三陽一有不正則變變則淫泆爲病者謂之內邪二者皆得致周身之百病況足之六經皆起於脚五指行過於腿膝上屬臟腑統身半以下氣血之運行故外入之邪客之則壅閉其經氣凝泣其絡血若人氣內注之邪著而留之則亦必如外邪壅閉氣血者無異也及其衝痛痿痹厥逆之狀亦無異也於是皆以脚氣名也此四方之所同今乃以南方者止中外邪之濕北方者止中內注之濕豈理也哉然北方縱無地之卑濕

其在踐雨露履汗穢洗濯足皆濕也與夫脫卸鞾履汗出而風吹之而血凝於足者寧不與南方地之濕同類盡屬外中者乎南方雖無潼乳之濕其在酒食與臟腑所傷津液水穀停積之濕而下注者寧不與北方潼乳同類盡屬內注者乎能達此理弟恐自責辨邪之不易奚暇相毀哉

太陽經脚氣病者頭痛目眩項强腰脊身體經絡外踝之後循京骨至小指外側皆痛宜隨四時之氣發散而愈麻黃左經湯

陽明經脚氣病者翕翕寒熱呻欠口鼻乾腹脹髀膝臏中循胻外廉下足跗入中趾內間皆痛宜隨四時之氣微利之大黃左經湯

少陽經脚氣病者口苦上喘脅痛而垢體無光澤頭目皆痛缺盆并腋下如馬刀腫自汗振寒發熱胷中脅肋髀膝外至胻絕骨外踝及諸節指皆痛宜隨四時之氣和解之半夏左經湯

三陽并合脚氣病者憎寒壯熱自汗惡風或無汗惡寒眩運重著關節掣痛手足拘攣疼痛冷痹腰腿緩縱不隨心躁氣上嘔吐下利其脈必浮弦緊數宜大料神祕左經湯加味敗毒散

太陰經脚氣病者腹滿挾咽連舌系急胷膈痞滿循胻骨下股膝內前廉內踝過核骨後連足大趾之端內側皆痛宜六物附子湯

少陰經脚氣病者腰脊痛小趾之下連足心循內踝入跟中上腨內出膕中內廉股肉皆痛上衝胷咽饑不能食面黑小便淋閉咳唾不已善恐心惕惕如人將捕之小腹不仁者難治四氣偏勝各隨其氣所中輕重而溫之宜八味丸

厥陰經脚氣病者腰脅偏疼從足大趾連足趺上廉上膕至內廉循股環陰抵小腹挾臍諸處脹痛兩脚攣急嗌乾嘔逆洞泄各隨四氣所中輕重而調之神應養眞丹

三陰併合脚氣病者四肢拘攣上氣喘滿小便祕澀心熱煩悶徧身浮腫脚膝痿弱緩縱不能行步宜追毒湯

已上六經受風寒暑濕流注自汗爲風勝無汗疼痛爲寒勝熱煩爲暑勝重著腫滿爲濕勝各隨其氣所勝者而偏調之不可拘於一方也

濕熱爲病肢節煩疼肩背沉重胷膈不利兼徧身疼痛流注手足足脛腫痛不可忍者當歸拈痛湯主之本草十劑云宣可去壅通可去滯內經云濕淫所勝治以苦溫羌活苦辛透關節勝濕防風甘辛溫散經絡中流濕故以爲君木性潤下升麻葛根苦辛平味之薄者陰中之陽引而上行以苦發之也白朮苦甘溫和平除濕蒼朮體輕浮氣力雄壯能除膚腠間濕故以爲臣夫血壅而不流則爲痛當歸身辛溫以散之使血氣各有所歸人參甘草甘溫補脾養正氣使苦藥不能傷脾胃仲景云濕熱相合肢節煩疼苦參黃芩知母茵陳苦寒乃苦以泄之者也凡酒製炒以爲因用治濕不利小便非其治也猪苓甘溫平澤瀉鹹平淡以滲之又能導其留飲故以爲佐氣味相合上下分流其濕使壅滯之氣得宣通也

三因十全丹續斷丸薏苡仁酒虎骨酒皆藥性平良病人下虛而無實積者可以常服

四肢拘急

傷寒有四肢拘急者拘强難以屈伸也不拘病證在何經凡見是證皆陰寒所致寒主收引故也仲景之法雖太陽表證及風濕相搏而見攣急者亦處以桂枝加附子湯甘草附子湯之類況陰經裏病霍亂之候四逆之劑其可缺諸

凡傷寒大汗已出因而露風則汗不流通風邪乘虛襲於經絡故手足攣搐不能屈伸節脈拘急也宜牛蒡根散主之

寸疔

寸疔生手指骨節間

虎口疔

虎口疔生合谷穴

蛇頭疔

蛇頭疔生手指頭兩旁狀如蛇頭膿甚腥穢紫黑色痛引心有潰爛脫落者

臂癰

鬼遺云垂臂兩處發接骨下臂鵝上起如雞鴨卵大皆由榮衛不調所爲也喜患實處而不透內亦宜急消或發穴早療

兩臂肘起在接骨下引手至小骨之上發癰節此處雖實奈連大小筋骨舉動不便垂手多墜疼如膿深沉徹骨即傷筋脈拳縮不舒攣搐宜急以緩慢筋脈藥餌治之

元機云在臂外爲癰在臂內爲魚肚發在臂上節腫連臂髃爲臂風毒宜活命飲加羌活獨活桂枝桔梗水酒各半煎服及奪命丹紫金丹勝金丹選用壯實

有裏證者一粒金丹八陣散下之若漫腫無頭服敗毒之藥不能消者宜十全大補湯加桂枝桔梗托之有嘔吐而數日不食者潰出膿則愈

臑癰 俗名病藕包

臑臂表裏俱腫痛赤色惟肘節處差小故名藕包以內外分陰陽

或問手臂陽明經分生瘡初如粟米漸大如赤豆痛不可忍旬日大如胡桃枯紫色何如曰此名骨瘭疽若毒游徧身拘急發搐嘔噦不食冷汗自出滑泄煩躁脈亂者死犯房勞怒氣者死一人患此證一月之後徧身攻串口吐黃水穢氣滿室既而嘔吐膿血旬日而亡其人三四日前尚進飲食人與沐浴扶起皮肉俱爛患者不信醫者不識以致隕身此由七情不和積怒積憂積熱所致眞元虛敗不能勝邪故也縱有九丹天命而已惟智者防患於未然急服黃連消毒散勝金丹烏金散活命飲加羌活選用治之稍緩七惡證多者必死也

按此證發之暴死之速乃陰虛極而火獨光之故前藥不滋化源而揚湯止沸其能濟乎

手心毒

手心結毒畀赤腫痛俗名病穿掌又名穿窗天蛇又名貧子盂若偏於掌邊者名穿邊天蛇又名穿堵天蛇此手厥陰心包絡積熱所致初宜隔蒜灸之以泄其毒服活命飲加桂枝薑黃實者量表裏爲汗下於紫金丹奪命丹烏金散一粒金丹選用既潰參芪大劑補之

虎口疽

虎口結毒畀赤腫痛名合谷疽又名丫刺毒又名擘蟹毒又名手叉發此手陽明大腸經風熱積毒之所致也初覺宜隔蒜灸之服活命飲加桂枝薑黃桔梗升麻木酒煎服壯實者量表裏爲汗下老弱者十全大補湯十宣散托裏散中選用

鴉叉

五指叉處結毒畀腫者俗名鴉叉

腕癰

手屈之處結毒畀赤爲手屈發俗名手牛押屈此手三陰經風熱聚毒之所致也治法同前

手發背 俗名蜘蛛背

鬼遺云兩手背發癰疽初生如水刺無頭腦頑然滿手背腫滿後聚毒成瘡深入至骨而爲手發背此屬五種皆發毒之類也

手背腫毒乃三陽經風熱鬱滯而發宜服活命飲加芩連山梔桔梗升麻柴加桂枝熱加薑黃木酒煎服有表證者紫金丹烏金散奪命丹汗之有裏證者一粒金丹八陣散下之老弱者宜大補之劑

大指疽

手大指頭發小點如粟漸大如豆或如桃李或青或紫乍黃乍黑乍白或癢或麻木不痛或大痛徹心此名調疽屬手太陰肺經積毒毒盛者宜截去之四日刺得血膿者生得黑血者死急服烏金散紫金丹汗之壯實者一粒金丹下之毒氣攻心嘔吐不食膨脹者死齒縫出血者死

天蛇頭

手中指頭結毒畀赤腫痛或不拘何指俱名天蛇頭若有膿裂開有口臂如蛇頭狀是以名焉屬手厥陰心包絡積熱所致宜服活命飲加柴胡羌活桔梗黃連消毒飲紫金丹烏金散選用雖黑色頑麻潰爛脫指者亦不死

敦疽

五指頭生疽名爲敦疽係臟腑積熱治不可緩宜內疏黃連湯紫金丹烏金散及一粒金丹下之

手指節發

手指節結毒畀赤腫痛又名病藕又名蛇節疔又名疔節天蛇又名病蛇節治法與天蛇頭大同小異

代指

代指者先腫畀熱痛色不黯綠爪甲邊結膿劇者爪皆脫落但得一物冷藥汁潠漬之佳爪者筋之餘筋根血養血熱甚注於指端故指腫熱結聚成膿甚則爪甲脫落此病類於指疽然無藉毒故色不黯黑雖久亦不殺人

內服方聖濟總錄有漏蘆湯藍花湯中用漏蘆藍花升麻大黃黃芩元參矾硝既無藉毒何爲用硝黃下藥輕病重治能無過乎故今不取

股陰疽 與附骨疽參看

鬼遺云陰疽發腿髀及陰股始發腰强數飲不能多七日發堅腫脹惡疼心煩躁死不治

或問大股之內陰囊之側生毒何如曰在左爲上馬癰在右爲下馬癰在肛門旁名肛門癰俱屬足太陽經濕熱七情不和憂憤所致宜服內補黃芪湯內托羌活湯十全大補湯選用勝金丹紫金丹壯實者一粒金丹八陣散下之嘔吐不食痲木黑陷膨脹六脈

徹或代冷汗不止煩躁狂妄小水不利泄瀉者不治未潰先便宜服臺閣紫微丸

按足三陽之脈在外皆曰髀足三陰之脈在內皆曰股今曰大股之內陰囊之側則屬三陰經而厥陰爲多明矣乃以爲足太陽不亦謬乎

股陽疽

或問腿外側髀下五六寸生疽何如曰此名伏兔發寒熱大作疼痛徹心畀腫無頭是也屬足陽明胃經先賢謂不治之證早覺早治爲上急隔蒜灸灸而飽起者可治無飽者難治服活命飲加牛膝木瓜漢防己紫金丹勝金丹汗之壯實者八陣散一粒金丹下之

腿遊風

或問腿股忽然赤腫何如曰此名腿遊風風熱相搏而然屬足太陽經宜砭出惡血服防風通聖散去白朮加黃蘗牛膝防己主之

委中毒

或問一女年十四往來寒熱膝後腘內約紋中堅硬如石徹紅徹腫何如曰此名委中毒此穴在膝後摺紋中屬太陽膽經由藏腑積熱流入膀胱而發用八珍散下瘀血斗許而消若治之稍遲潰則筋縮必成廢疾

鶴膝風

或問兩膝腫痛股漸小何如曰此名鶴膝風一名鼓槌風起於中濕或因痢後脚弱緩痛不能行履名曰痢風或傷寒餘毒不能發散風寒濕氣結於經絡血脈不流以致筋愈縮而股愈瘦屬足少陽足陽明經宜用玉龍膏酒調敷腿上以住痛回陽又宜冲和膏塗足跗以引氣行血服大防風湯追風丸倍加乳香以住痛舒筋亦宜隔蒜灸之若堅如石者用生樟腦根擦之效

或問膝上腫痛何如曰此非一端要須明辨若兩膝內外皆腫痛如虎咬之狀寒熱間作股漸細小膝愈腫大名鶴膝風急隔蒜灸服大防風湯但一膝痛引上下不甚腫而徹紅名膝遊風宜服聖授丹換骨丹防風通聖散加牛膝木瓜但膝之兩旁腫痛憎寒壯熱晝夜偏劇腫處手不可近爲膝眼毒膝蓋上腫痛者爲膝癰此二證宜服勝金丹或紫金丹八陣散活命飲加牛膝

脛陰癰

或問足小肚內側徹紅徹腫堅硬如石三四寸許痛楚難禁何如曰此名黃鱔癰屬足太陰與足厥陰二經濕熱又積憤所致宜服五香湯流氣飲加牛膝木瓜防己黃蘗壯實者一粒金丹下之或萬病解毒丹不足者十全大補湯加牛膝木瓜若過時潰出清水虛火上升嘔吐不食者不治

三里發

鬼遺云三里兩處起癰疽初發如牛眼睛青黑便五七日破穴出黑血汁膿腫攻膀肚連腿裏拘急冷疼此因傷筋氣勞力所成宜用湯藥注射其外毒自平息矣

接骨發

鬼遺云兩脚接骨近上膀肚下一處起丹疽如胡桃大硬如物打磕之狀不苦疼但腫急脹慮其損筋亦須早出膿毒可保平安也

青蛇便

或問足肚之下結塊長二三寸許寒熱大作飲食不進何如曰此名青蛇便屬足少陰與足太陽經由腎經虛損濕熱下注所致頭向上者難治頭向下者刺出惡血服活命飲加木瓜牛膝黃蘗或烏金散紫金丹選用老弱之人嘔吐腹脹神昏脈躁者死青蛇便生小膀上下頭生望上攻走入腹者不可治頭生向下尾在上即爲順可治也急服二十六味托裏散外用神方鐵箍散薑汁陳酢猪膽同調敷之上望下趕蛇頭上用三稜針針入二寸出黑紫血出針急下保生散用紙撚蘸藥送入

瓜藤纏

或問足股生核數枚腫痛久之潰爛不已何如曰此名瓜藤纏屬足太陽經由藏腑濕熱流注下部所致用防風通聖散加檳榔牛膝防己主之

內踝疽

或問足內生疽何如曰此名鞋帶癰由寒濕滯於足陽明與足厥陰肝經血澀氣阻所致初宜隔蒜灸之服流氣飲加牛膝木瓜防己壯實者一粒金丹下之老弱者十全大補湯內托黃芪柴胡湯主之

外踝疽

或問足外踝生疽何如曰此名脚拐毒屬少陽膽經足太陽膀胱經濕熱下注宜服內托羌活湯黃連消毒散內托復煎散選用勝金丹烏金丹紫金丹皆可用

腓腸發

或問足小肚生疽寒熱煩躁何如曰此名腓腸發疽屬足少陰腎經由腎水不足積熱所致古方書云不治宜活命飲加牛膝木瓜黃蘗老弱者八珍湯加牛膝壯實者一粒金丹下之涉虛者難治以腎氣丸十全大補湯主之潰出血膿者生潰出清水者死

臁瘡

鬼遺云兩曲腁膀胱下內外兩踝前有廉刃兩邊爲裏外廉上結癰腫此處近骨難瘥宜用收毒散外貼四畔中心卽用活血肉藥貼無害

或問足內外廉生瘡連年不已何如曰此由濕熱下注瘀血凝滯於經絡以致肌肉紫黑癢痛不時女人名爲裙風褲口瘡卽臁瘡也最難克效蓋以裙扇地風濕盛故也宜服獨活寄生湯防風通聖散加牛膝木瓜防己外用隔紙膏或製女貞葉貼之

風疽

凡脚膕及曲腁中瘙搔則黃汁出名風疽以風疽方治之

脫疽

鬼遺云腫敎疽發兩足指五日不亢死四日可刺其色發黑癰者不堪未過節者可治

足指生疔重者潰而自脫故曰脫疽或曰惟足大指患之爲脫疽其餘足指患之曰敎疽易治惟脫疽難治

初發結毒燃赤腫痛者以五神散及以紫河車金線釣葫蘆金雞舌金牖香搗爛敷及以汁塗敎又以萬病解毒丸磨酢緩塗之

未成腁痛者除濕攻毒更以隔蒜灸之至不痛用十二經消毒散加引經藥若膿勢盛未得緊急者宜作此傷治之及作癰氣治之效

未成腁痛或不痛或大痛者宜隔蒜灸更用解毒以消毒萬全湯臨證加減

未成若色黑急割去速服補劑庶可救若黑涎上不可治

未成若色赤腁痛者托裏消毒更兼灸以人參敗毒散去桔梗加赤牛膝銀花白芷大黃痛止次以十宣散加天花粉金銀花赤牛膝

未成欲成若色紫不痛隔蒜灸五十壯尚不知痛又明灸之服活命飲次以托裏散潰脫而愈

未成欲成大痛色赤而腫隔蒜灸至痛止以加味荊芥敗毒散加赤牛膝銀花白芷大黃次以活命飲

脚氣瘡

夫腎主於脚若腎虛爲風濕所搏攻於脚膝則名脚氣因其氣血壅滯濕毒氣盛在於膚腠不得宣通故令脚上生瘡也若風毒不散其瘡漸增黃水腫痛身體壯熱經久難瘥也

甲疽 狀甲

足三陰經皆起於足指氣血沮而不行結於指甲之間能成甲疽此皆經絡之所流注非特肌肉之病也或得於剪甲傷肌或得於甲長侵肉或得於履絇之不適使氣血沮遏而不通腐潰爲疽久則爛指上引於踁膝之間而瘡疱者是已然病在四末不必治其內惟塗敷滌濯去惡而除穢及適其行履則愈矣

按足指在人體最下氣血易沮藥力難到虛弱之人小有破損卽成瘡癤久而不斂況其大者非大補氣血豈能易愈此云病在四末不必治內非通論也

足跗發

鬼遺云陽疽起足趺及足下二十日不穴死十日可刺發赤白膿血不多其瘡上癢及赤黑者死

跗亦作趺足面也其處結毒腫痛亦名足發背屬足厥陰肝陽明胃經之會多因濕熱乘虛而下注宜服活命飲加木瓜肉桂牛膝及隔蒜灸之繼以十全大補湯托裏溫中湯膿稠可治膿清紫陷者死

足跟疽

或問足跟生疽何如曰是名兌嚼以其狀若兌嚼故以爲名屬足太陽經穴名申脈在足跟骨下此處乃陰陽二蹻發源之所由臟腑積熱所致其毒深重最忌毒藥敷貼宜隔蒜灸之及服活命飲加牛膝肉桂或勝金丹烏金散紫金丹選用若紫陷癍木神昏脈亂者不治過時潰爛者有妨飲食二便不調或涉房勞怒氣迷悶者死

婦人足跟足指腫痛足心發熱者皆因胎產經行失於調攝虧損足三陰虛熱所致若腫痛或出膿用六味丸爲主佐以八珍湯胃虛嫩食佐以六君子湯寒熱內熱佐以逍遙散補熱益甚頭目不清佐以補中益氣湯痰盛作渴或口舌生瘡亦用前二藥以滋化源大凡發熱補熱內熱自汗盜汗等證皆陰虛假熱也故丹溪謂火起九泉陰虛之極也男子酒色過度者多患此證

琉璃疽

或問足跟之旁生疽何如曰此名琉璃疽屬足太陽經其色黃腫如琉璃多由行路崎嶇內傷筋骨脈而

成寒熱併作元氣不足嘔吐昏迷者難治急服五香湯活命飲勝金丹烏金散選用壯實者一粒金丹或八陣散下之

足心癰

鬼遺云兩脚心發徹骨者不治如脚心徹皮破不至深發膿不多者可治

足心發毒腫痛亦名涌泉疽俗名病穿板又名穿窟天蛇屬少陰腎經虛損所致宜隔蒜灸之實者服活命飲送六味地黃丸有表裏證量爲汗下虛者十全大補湯八味地黃丸大劑不問晨夜投之潰爛嘔逆迷悶脈微代者死

肉刺

肉刺者生於足指間形如硬胝與肉相附隱痛成刺由靴履急窄相摩而成

無名腫毒

手背脚背腫大有赤痕如蝦之狀名病蝦證也用油炒鹽糟令香以熱湯淬之泡湯乘熱淋洗之即消要服排瘡藥

膝內廉近摺紋之處結核腫痛但核形長如魚之狀名上水魚以稜針亂刺去惡血以樗枯雷廷藤山樟子葉搗糟炒縛之又用山雷廷藤赤牛膝山蘇木樗枯搗鹽糟炒縛之又方山雷廷根皮樗枯搗炒縛及用七聖膏敷之却用九金六馬散服之

脚背或脚趾腫痛不可忍以脚高懸起其疼方止些若以脚垂下其疼不可當也名曰倒拔腫瘡先用兩面龜一味煎酒服次服兩面龜散如不應以蛇蓌磨酒服大效

陳實功外科正宗

脫疽

夫脫疽者外腐而內壞也此因平昔厚味膏粱熏蒸臟腑丹石補藥消鑠腎水房勞過度氣竭精傷或兼房術澀精霸道藥嚼舌下化水直至丹田或納臍中使熱徑泡內腎或爲九掌握作香鼻息塗抹陰鼎或搽陽器圖使堅鋼希求常濟多致陽精煽惑淫火猖狂其蘊蓄於臟腑者終成燥熱火證其毒積於骨髓者終爲疽毒陰瘡誠爲巧人行拙誰防禍起蕭牆智者多愚自謂喜從天降不顧後日之骨枯髓涸臟敗腑亡方知今日摧敗有故解脫無方凡患此者多生於手足夫手足乃五臟枝幹瘡之初生形如粟米頭便一點黃泡其皮猶如羹熟紅裏黑氣侵漫相傳五指傳遍上至脚面其疼如湯潑火燃其形則骨枯筋爛其穢異香難解其命仙方難活故謂血死心敗筋死肝敗肉死脾敗皮死肺敗骨死腎敗此五敗者雖有靈丹竟喪命而已是生此疾者死生付於度外孫眞人曰在肉則割在指則切即此病也治之得早乘其未及延散時用頭髮十餘根纏患指本節盡處遶紮十餘轉漸漸緊之毋得毒氣攻延良肉隨用蟾酥餅放原起粟米頭上加艾灸至肉枯瘡死爲度次日本指盡黑方用利刀尋至本節縫中將患指徐順取下血流不住用金刀如聖散止之餘腫以妙貼散敷之次日倘有黑氣未盡單用蟾酥錠研末摻之膏蓋黑氣自退患上生膿照常法用玉紅膏等藥生肉護骨完口此爲吉兆內服滋腎水養氣血健脾安神之劑若內無變證外無混雜此十中可保其三四矣若割取之後黑色仍漫痛腫尤甚敗惡無膿口乾舌硬精神不爽食不知味者終死凡治此不可一己臆治必與高明衆議聽患者願情割取況此證首尾吉凶變駁難定故不可輕易用之又有形似而證非穴眞而受異詳註在後宜參觀之

看法

起瘡不渴口潤舌和性志尋常無妄暴急循禮爲吉初出形如麻子煞熱作痛一指皆腫根腳收束者吉已成頭便作腐肉不紫黑疼痛有時膿出腫消者吉已潰先膿後腐肉色紅活毒不走散氣不腥穢者吉未瘡先渴喜冷無度昏睡舌乾小便頻數陽瘡者逆初起形如粟米肉便紫色不腫刺疼黑氣延散者逆已成瘡形枯蕈肉黑皮焦痛如刀剜毒傳好指者逆已潰肉枯筋腐血水臭污疼苦應心伶仃徹骨者逆

治法

脫疽多生足指少生手指初起水窠黃泡者即灸之初生如粟窠可容谷皮色紫赤不作煞腫髮紮仍灸已灸之後瘡受火氣發泡作膿外藥箍之內兼補托毒勢已成瘡形稍陷但紫色未攻脚面者評議割取既割取之後血水淋漓疼痛不減和氣血補脾胃已成飲食減少身體倦怠便數口乾滋津液壯腎水破後氣血受傷脾胃虛弱自汗盜汗惡心乾嘔睡臥不寧日晡發熱疼痛苦楚煩悶譫妄俱宜大補氣血富貴及膏粱素饕色欲毒瘀房術縱恣日久禁行割法

痼發

痼發乃天時不正之氣感而發之非毒內作也此患多生於手足掌心或腰腿臀下伸縮之處漫腫無頭

惛寒發熱四肢沉重頭渴爲甚初起宜服萬靈丹發汗解表腫仍不消者必欲作膿托裏消毒散兼蟾蜍丸間服後法俱照癰疽潰瘍法推治爲當

石榴疽

石榴疽者乃少陽相火與外濕煎搏而成其患生在肘尖上一寸是也初起一點黃色小泡根便開大色紅堅硬腫如覆椀皮破泛出壘壘如榴子令人寒戰猶如重瘧初起即灸九壯內服蟾酥丸發汗以解蘊毒炎頂上蟾酥餅貼之膏蓋煅腫處金黃散敷之內服菊花清燥湯琥珀蠟礬丸煩躁熱甚者護心散金液戊土丹九日後患上作膿稠黃疼苦稍減表裏證退飲食微進者可保無虞反此爲逆潰後元氣虛弱雜證相兼者照癰疽調理法治之

穿踝疽

穿踝疽足三陰濕熱下流停滯而成初起內踝腫痛疼微骨底舉動艱辛甚則串及外踝通腫有頭者屬陽易破無頭者屬陰難潰此二者初起必寒熱交作宜荊防敗毒散加牛膝散之日久膿成脹痛者針之腐而不斂孔大者玉紅膏培之形體虛弱者補之此證若不治因循致成廢疾也有矣

甲疽

甲疽者或因甲長侵肌又因修甲損傷良肉靴鞋窄小俱易生之其患多肉裹上指甲腫痛異常難於步履初宜三品一條鎗貼多肉上化盡自愈日久多肉堅硬須冰蝑散化之後用珍珠散摻上必瘥

天蛇毒

天蛇毒一名蛇頭疔也心火旺動攻注而成其患指尖腫若蛇頭赤腫煩痛疼及連心甚者寒熱交作腫痛延上腫頂上小艾灸五壯以雄黃散塗之內服蟾酥丸發汗解毒輕者漸消腫者潰膿甚則腐爛破後腫仍不消者以蟾酥條插入孔內膏蓋自效腐爛者玉紅膏搽之虛而不斂者兼服補劑

合谷疔

合谷疔俗稱虎口百丫也此患多有疙瘩泡起亦有紅絲走上故有疔名之稱此手陽明胃經濕毒攻注作癢或熱煩疼初起挑破貼蟾酥餅膏蓋金黃散敷之三日後腫聚必欲作膿換膏貼之軟腫脹痛者膿已成針之即愈腫甚寒熱者必內外消托

臁瘡

臁瘡者風熱濕毒相聚而成有新久之別內外之殊新者只用三香膏乳香法紙貼之自愈稍久紫黑者以解毒紫金膏搽紮漸可又年久頑臁皮肉烏黑下陷臭穢不堪者用蜈蚣餌法去風毒化瘀腐方可得愈外臁多服四生丸內臁多服腎氣丸妙

血風瘡

血風瘡乃風熱濕熱血熱三者交感而生發則搔癢無度破流脂水日漸沿開甚者內服消風散加牛膝黃蘗外搽解毒雄黃散或如意金黃散俱可敷之如年久紫黑堅硬氣血不行者用針砭去黑血以神燈照法熏之以解鬱毒次以前藥敷之方效

婦人脚丫作癢

婦人脚丫作癢乃從三陽風濕下流凝結不散故先作癢而後生濕爛又或足底灣曲之處癢濕皆然枯礬散摻之

手足破裂

手足破裂者乾枯之象氣血不能榮養故也因熱肌腠被風寒所逼凝滯血脈以致皮膚漸枯漸槁乃生破裂日襲於風風熱相乘故多作痛以玉肌散洗擦潤肌膏潤之甚者兼服當歸飲子爲妙

螻蛄串

螻蛄串者乃得於思慮傷脾脾氣鬱結所生是疾氣血澆薄者多蓋四肢屬脾土其患多生於兩手初起骨中作痛漸生漫腫堅硬不熱不紅手背及內關前後連腫數塊不能轉側日久出如豆腐漿汁串通諸竅日夜相流腫痛仍在患者面黃肌瘦飲食減少久則寒熱交作內證並出首尾俱宜益氣養榮湯加味逍遙散調和氣血扶助脾胃其中可生者十有二三補而不應氣血涸盡而亡者多矣

臭田螺

臭田螺乃足陽明胃經濕火攻注而成此患多生足指脚丫隨起白斑作爛先癢後痛破流臭水形似螺螄甚者脚面俱腫惡寒發熱先宜甘草湯洗淨貼蟾酥餅三日三枚後用珍珠散猪脊髓調搽膏蓋煅腫上眞君妙貼散敷之其腫漸消戒步履

牛程蹉

牛程蹉遂奔急熱脚下水見風以致氣滯血枯結成頑硬皮肉榮衛不滋漸生腫痛腫高突起支脚難行久則破裂膿水相流每日溫湯淨洗搽牛角散又有內膿攻注皮頑難破者以大線針眠頭挑破出膿乃寬硬皮破裂者剪而去之肉不生者玉紅膏長之肉滿不生皮者珍珠散搽上生皮乃愈

蠶蜘蛄

蠶蜘蛄多生手指節中不紅不熱腫如蟬腹乃手少陰痰氣凝滯而生初起不疼日久方痛痛久方腐腫仍不消蟾酥餅膏貼漸作稀膿近者一載遠者三年此屬體弱者有之內服補劑免變癆瘵之證

田螺泡

田螺泡多生手足忽如火燃隨生紫白黃泡此脾經風濕攻注不久漸大脹痛不安線針挑破泄去毒水太乙膏蓋挑破又生者內服解毒瀉脾湯可愈

鵝掌風

鵝掌風由手陽明胃經火熱血燥外受寒凉所凝致皮枯槁又或時瘡餘毒未盡亦能致此初起紫斑白點久則皮膚枯厚破裂不已二蘚湯熏洗卽愈

拾遺證

膈疽生在膊上連肩通腫長堅而硬

兌疽生在當手動脈之處腫痛寒熱痛微手臂舉動不便

附陰疽生在內踝上三寸初生小泡漸生赤腫破流血水痛亦微骨不能步履

咬骨疽發在大腿內股不腫不紅痛徹骨髓初宜雷火針針之內服萬靈丹酒調服效

陰疽生於右腿夾縫之下三寸痛連陰子小腹亦疼元疽生於左腿夾縫之下三寸漫腫連陰疼及大腿已上初起有表證者便宜解表有裏證者卽宜通利潰後宜補托久則宜收斂此爲一定治法不可混亂妄投藥餌致其危亡也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百十二卷目錄

醫部彙考一百九十二

四肢門四

吳崑醫方考　脚氣方論
喻昌醫門法律　論增損八味丸治脚氣　四肢不舉　脚膝痿弱　鶴膝風
張介賓景岳全書　脚氣論證　論治　敷熨淋洗　禁忌　論古　鶴膝風
陳士鐸石室祕籙　手足痛　手痲木　脚板紅　手足脫落　指甲脫落　指縫流血　掌中突高　脚肚肉塊　脚下生指
方一　小建中湯　崔氏八味丸　白虎湯　四逆湯　附子湯　桂枝加附子湯　眞武湯　礬石湯　三聖散　烏頭湯　越婢湯　脚弱神驗方　風引湯　小鼈甲湯　風緩湯　脚氣方　又方　又方　犀角旋覆花湯　大犀角湯　犀角麻黃湯　茱萸湯　小風引湯　四物附子湯　又方　深師增損腎瀝湯　石膏湯　半夏湯　烏頭湯　追毒湯　防風湯　防風湯　甘草湯　恆山甘草湯　丹參牛膝煮散　小續命湯　神功丸　五柔丸　檳榔散　木瓜散　赤茯苓丸　除濕升　無礙丸　加減白通湯　既濟解毒湯　蟬蛻丸

藝術典第二百十二卷

醫部彙考一百九十二

四肢門四

明吳崑醫方考

脚氣方論

脚氣類傷寒則察之難脚氣能令人死則治之難一病而有二難是非可以淺淺論脚氣矣考方七首同志者尚教我哉

脚氣憎寒壯熱者防己飲主之蓋脚氣者濕熱在足而作氣痛也濕熱分爭濕勝則令人憎寒熱勝則令人壯熱此其爲證亦有兼頭疼者頗類傷寒惟其得病之始本於脚氣爲異耳又不可以脚腫爲拘亦有痛而不腫者名曰乾脚氣亦有緩縱不隨者名曰緩風亦有疼痛不仁者名曰濕痹亦有轉筋攣急者名曰風毒此在醫者體會而辯證爾各有治法不同大抵脚氣之疾壅疾也喜通而惡塞故孫眞人曰脚氣之疾皆由氣實而死終無一人以服藥致虛而殂故脚氣之人皆不得大補亦不得大瀉是方也木通防己檳榔通劑也可以去塞犀角黃蘗生地黃甘草梢寒劑也可以去熱蒼白二朮燥劑也可以去濕然川芎能散血中之氣犀角能利氣中之血先痛而後腫者氣傷血也重用川芎先腫而後痛者血傷氣也重用犀角若大便實者加桃仁小便澀者加牛膝內熱加芩連時熱加石膏有痰加竹瀝全在活法初勿拘也凡脚氣衝心喘息不止嘔吐不休者皆死水犯火故也

脚氣痛腫寒熱相搏脈來沉細者越婢湯主之蓋氣不得通則痛血不得行則腫此脚氣之所以爲壅疾也寒熱相搏者邪氣與正氣相激搏也脈來沉者爲裏細者爲陰名曰越婢者越以發越爲義婢卑也是方能發越至卑之氣故以越婢名之石膏性寒而重寒能勝熱重能就下附子味辛而熱辛能行壅熱能壯氣佐之以麻黃則寒熱之壅滯皆從汗孔而泄矣用白朮甘草取其氣味溫平能致沖和之氣於發越之餘耳而甘草獨少者恐其性緩多則不能速達於卑下之區也

寒濕脚氣疼痛不仁兩尺脈來沉細者六物附子湯主之此痹證也內經曰寒氣勝者爲痛痹濕氣勝者爲著痹今疼痛不仁是寒而且著也兩尺主兩足脈來沉者爲裏遲者爲寒是方也用桂心附子溫其寒防己白朮制其濕甘草茯苓脾家藥也扶土氣之不足制濕氣之有餘然必冷服者欲桂附之性行於下而不欲其橫於上也

乾脚氣者謂脚氣入腹不得通泄也脚氣干於肝則左脅有塊脚氣干於脾則令人痞脚氣干於心則令人死於夜以夜氣助其陰邪也因大寒不知人者陰進而陽不舒也以杉木湯主之蓋杉木節質重而氣芳質重則能達下氣芳則能疏壅橘葉味苦而厚過於青皮檳榔質實而重等於鐵石味厚則泄質重則降故能令邪氣大下童便鹹寒物也鹹則能引邪氣以走濁陰寒則能平熱氣使不上逆經曰道之遠者制大其服故其量數五升云

凡人患寒濕脚氣疼痛不仁者內服煎劑外宜以椒湯洗之蓋川椒能療寒濕之痹薑葱辛溫能利肌膚之氣又曰諸脚氣者皆壅疾也洗之無有不良

脚氣疼腫濕熱發黃者當歸拈痛湯主之蓋脚氣內壅故令疼腫濕熱不得泄越故令發黃是方也羌活防風升麻葛根蒼朮皆辛散之劑也可以泄越壅塞之脚氣苦參黃芩茵陳知母皆苦寒之品也可以解除內壅之濕熱乃澤瀉猪苓白朮淡滲物耳能導利下焦之濕當歸人參甘草者所以養血於敗壞之餘益氣於泄越之後也

脾氣虛弱胃氣下注令人足跗氣腫者升陽順氣湯

主之蓋脾雖具坤靜之德而有乾健之運故脾氣沖和則升清降濁無跗腫也脾氣一虛土不制水則胃中水穀之氣隨經而下注令人跗腫是方也半夏甘草所以益脾人參黃芪所以益氣神麴豆蔻所以消磨水穀升麻柴胡所以升舉胃氣當歸能使諸藥歸脾陳皮能利中宮之氣而藥皮者取其味厚引升麻柴胡下走足跗而升舉其陷下之陽爾

醫門法律 臣 喻昌 著

論增損八味丸治腳氣

古方崔氏八味丸用附桂二味陽藥入地黃等六味陰藥之中金匱取治腳氣上入少腹不仁其意頗微蓋地氣上加於天則獨用薑附之猛以勝之地氣纔入少腹適在至陰之界無事張皇所以但用陽藥加於陰藥內治之不必偏於陽也至腎水泛溢婦人轉胞小便不利則變其名爲腎氣丸而藥仍不變蓋收攝腎氣則腎水歸源而小便自行亦無取偏陽爲矣觀此則治陽虛陰盛之卒病其當用純陽無陰更復何疑後人於腳氣入腹少腹不仁而見上氣喘急嘔吐自汗不識其證地氣已加於天襲用此方不應乃云此證最急以腎乘心水尅火死不旋踵用本方加附桂各一倍終是五十步笑百步不達卒病大關徒以腎乘心水尅火五藏受尅爲最急不知五藏互相尅賊危則危矣急未急也厥後朱奉議治腳氣變八味丸爲八味湯用附子乾薑芍藥茯苓甘草桂心人參白朮其義頗精於中芍藥甘草人參臨證更加裁酌則益精矣奈何無識之輩復以此湯插入己見去桂心加乾地黃以陰易陽豈啻千里而方書一槩混收詿識其爲奉議之罪人乎

四肢不舉

中風四肢不舉有虛有實陽明虛則宗筋失潤不能束骨而利機關陽明實則肉理緻密加以風邪內淫正氣故不週流也虛用六君子湯實用三化湯合承氣湯

凡治中風四肢不舉證不辨虛實妄行補瀉者醫之過也四肢不舉皆屬脾土膏粱太過積熱內壅者爲脾土瘀實宜瀉以開其壅食少體羸怠惰嗜臥者爲脾土虛衰宜補以健其運若不辨而實者補之虛者瀉之寧不傷人乎

腳膝痿弱

又有腳膝痿弱下部尻臀皆冷陰汗臊臭精滑不固脈沉數有力爲火鬱於內逼陰向外卽陽盛拒陰當用苦寒藥下之者此水火徵兆之微脈證治例之妙當取之爲法

鶴膝風

鶴膝風者卽風寒濕之痹於膝者也如膝骨日大上下肌肉日枯細者且未可治其膝先養血氣俾肌肉漸榮後治其膝可也此與治左右半身偏枯之證大同夫既偏枯矣急漬其未枯者然後既枯者得以通氣而復榮倘不知從氣引血從血引氣之法但用麻黃防風等散風之套藥鮮有不全枯而遂死者故治鶴膝風而亟攻其痹必并其足痿而不用矣比而論之其治法不益明乎

古方治小兒鶴膝風用六味地黃丸加鹿茸牛膝共八味不治其風其意最善蓋小兒非必爲風寒濕所痹多因先天所稟腎氣衰薄陰寒凝聚於腰膝而不解從外可知其內也故以六味丸補腎中之水以鹿茸補腎中之火以牛膝引至骨節而壯其衰撼之筋此治本不治標之良法也舉此爲例而推之

景岳全書 臣 張介賓 著

腳氣論證

腳氣之說古所無也自晉蘇敬始有此名然其腫痛麻頑卽經之所謂痹也其縱緩不收卽經之所謂痿也其甚而上衝卽經之所謂厥逆也逮夫後世則有類傷寒四證而以腳氣居其一謂凡頭痛發熱身痛便閉而但見腳膝屈弱無力者便是腳氣此說太混予不然之夫腳氣本水濕下壅之病而實非陽邪外感證也若諸證之兼見者則或有之若以外感之腳軟者便認作腳氣則淆亂意見大不通也茲予刪諸繁瑣述其節要法既無遺庶便理會

夫腳氣之證其初甚微飲食動作無不如故或無他疾而忽得之或因病後而漸得之及其病也則自膝至足或見麻痹或見冷痛或見痿弱或見攣急或腫或不腫或日漸枯細或蒸蒸發熱或洒洒惡寒或如水冷或如火熱或到底能食或不能食或有物如指發自踹腓而氣上衝心是皆腳氣之正病也其有爲發熱頭痛寒熱往來或腹內作痛或見飲食則嘔吐或惡聞食氣或不欲見明或語言錯亂精神昏憒是皆腳氣之兼證也大抵此證有緩急緩者其來漸或二三月而日甚急者其來速或一二日而卽起治之若緩恐其氣上衝心亦能殺人

腳氣之因有二一則自外而感一則自內而致也自

外而感者以陰寒水濕雨霧之氣或坐臥濕地致令濕邪襲人皮肉筋脈而凡清濕襲虛則病始於下致爲腿足之病此外因也自內而致者以肥甘過度酒醴無節或多食乳酪濕熱等物致令熱壅下焦走注足脛而日漸腫痛或上連手節者此內因也然在古人謂南方卑濕病多外因北方嗜酒酪病多內因此固一說然北方亦有寒濕南方豈少酒濕此固不必分南北其或內或外凡受邪氣有病始於足而漸致他證者卽脚氣之謂也必察其因而治之則自無失矣

論治

脚氣之病實三氣之所爲也然亦有虛實之異又脚氣本爲壅疾古人忌用補劑然必下元不足及陽明之氣有虧者而後邪氣得以犯之此其中亦有虛證總之凡治此者只因證施治則萬全也但察其因於表者以發散爲主因於裏者以疏利爲主外因者多寒濕宜用溫熱內因者多濕熱宜用清凉若元氣本虛及病久致虛者必當培補下元不得以忌補之說爲拘也

脚氣初起無非濕滯如無他證兼見而身體重著者單宜治濕以分利爲主

凡脚膝中濕或腰腿疼疼重著腫痛者宜除濕湯不問久近乾濕並可用若脚膝疼軟重著而胃氣不清或見噫氣吞酸脹滿者平胃散若脚氣浮腫而兼泄瀉者宜五苓散或胃苓湯

寒濕外侵致成脚氣者十居六七其證疼痛拘攣惡寒清厥脈多弦細治宜以溫經除濕爲主是以古人治此之法大抵熱藥多寒藥少故每用麻黃川烏桂附乾薑之屬內經曰濕淫於內治以苦熱正以烏附麻黃走而不守故能通行經絡官桂乾薑辛甘大熱故能助陽退陰清濕旣除病無不愈

凡感寒濕雨水或四氣流注致成脚氣腫痛不可忍者宜雞鳴散如神若寒濕內侵陽虛陰盛胃氣不强經氣不行頑水浮腫或疼痛不已者獨活湯若寒邪入腹喘急疼痛或筋急上衝悶亂危急欲絕者茱萸丸或茱萸木瓜湯若寒濕在經血脈不和腰脚筋骨痠軟無力或拘攣疼痛脈弱而濇者酒浸牛膝丸若寒濕壅腫氣滯不行或冷或痛者立效散若寒濕兼風者如五積散小續命湯皆宜用詳具後條

一濕熱內蒸致成脚氣者多因酒食不節其證必煩熱多渴脈見滑數二便或多不利治宜利濕清火爲主若濕熱下壅足脛腫痛不消者防己飲加減治之或蒼朮黃檗丸或二妙散或加味二妙丸俱妙若濕熱氣壅上衝胃腹煩渴悶亂頭疼口乾者活人犀角散若濕熱流注經絡肢節煩痛肩背沉重手足偏身疼痛熱腫者當歸拈痛丸若感冒暑濕肢節疼痛身熱口渴小便赤澁氣虛氣促者清暑益氣湯若肝腎陰虛血熱脚膝疼痛行止艱難小水不利者續斷丸

脚氣有壅滯氣逆者其證必喘滿氣急上攻心腹甚至危急可畏治宜行滯降氣爲主

凡脚氣上衝心腹喘急不得眠臥者紫蘇散檳榔湯或加減檳榔湯甚者四磨飲若脚氣喘急腹滿脚腫者桑白皮散或木通散若脚氣騰下氣升衝心煩悶者木香散或檳榔散若脚氣心胃壅悶嘔逆多痰不食者半夏散或紫蘇湯若浮腫心腹痞悶小水不利大腹皮散

凡風濕合邪而爲脚氣者其證必兼外感而或爲寒熱往來或爲喘欬氣急或流走無常或筋骨疼痛治宜以散風除濕通行經絡爲主若感四時風疫風濕或處陰濕之地致爲脚氣痿弱筋骨疼痛或寒熱往來者敗毒散若寒熱如瘧赤腫疼痛者加味敗毒散若脚氣以風寒濕邪客於經絡而骨髓疼痛不可忍或遍身疼痛惡寒嘔逆者五積散一法加全蠍三箇入酒煎服若脚氣以風濕留滯而陰寒外閉表邪不解或欬嗽喘滿寒熱者小青龍湯若風濕留滯肢節煩疼心神壅悶者大腹子散

千金云若脚氣脈大而緩宜服小續命湯二劑立瘥活人云脚氣屬冷者以小續命湯煎成入生薑自然汁服之最快若脚氣風濕勝而兼發熱欬嗽肢體疼痛者芎蘇散若脚氣濕流注憎寒發熱無汗惡寒者麻黃左經湯

脚氣有虛證者凡脾胃肝腎之脈皆出於足邪之易入多有乘虛故肝虛則筋病腎虛則骨病脾虛則肌肉病胃虛則宗筋病或以勞慾不節或以酒濕太過或以病後失調凡內有虧損而外有脚氣者無非虛證此當以調補爲主而兼察四氣以治之若肝腎陰虛感觸四氣而癱瘓頑木半身不遂脚膝無力通體疼痛者神應養眞丹或三因四斤丸或虎骨酒或八味地黃丸若脾胃大虛陰寒在下陽氣不行而病脚氣者獨活湯附子八味湯若精血不足陰虛於下氣不歸精而脚氣上逆衝心者地黃湯若脾胃虛寒兼食者半夏散或紫蘇湯若浮腫心腹痞悶小水不利大腹皮散

風濕外邪而成脚氣者風引獨活湯或追毒湯若以脾腎虛寒而兼欬嗽氣逆嘔吐者兼補厚朴湯

脚氣有實邪凡壅盛腫痛而或爲閉結或爲脹滿者治宜以疏導通利爲主若風濕壅盛脚氣腫痛便結腹滿者羌活導滯湯或枳實大黃湯若四氣流注陽明風熱腰脚腫痛大小便祕喘滿腹痛者大黃左經湯若脚氣飲食不消心下痞悶腿脚腫痛者開結導飲丸

敷熨淋洗

凡脚氣腫痛之甚者可用敷藥以散之或用椒艾囊以溫之或香散之藥煎湯以洗之如百草煎及防風荊芥威靈仙艾葉蒼术蛇牀子當歸烏藥之類皆可或單用紫蘇或忍冬藤煎湯淋洗之俱妙

禁忌

觀活人等書云凡脚氣服補藥及用湯淋洗者皆醫之所禁也此亦一偏之說耳蓋補有宜禁者以邪壅氣實者也淋洗有宜禁者以水濕湯氣之宜避者也如果下部虛寒或以病後或以尅伐太過而脚氣不愈者豈尚堪禁補乎又若寒邪濕熱壅結不散而爲腫爲痛者最宜以辛香疏散之藥煎湯蒸洗則退邪極速豈禁洗乎惟是濕熱氣逆而上衝心腹者不可驟洗恐助濕氣上升也此必先降其氣俟其毒止在脚再行熏洗自無不利蓋補以補其弱也洗以逐其滯也夫何禁之有

論古

楊大受曰脚氣是壅疾當用宣通之劑使氣不能成壅也如羌活導滯湯之類所通用又如蒼白术防己南星以去濕羌活獨活木瓜檳榔行氣利關節以去壅佐木通牛膝以引經當歸生地黃以和血此必用之藥也又如東垣拈痛之類亦甚捷餘因證之虛實寒熱而辨治之此即通變活法也

鶴膝風

凡肘膝腫痛腿脛細小者名爲鶴膝風以其象鶴膝之形而名之也或止以兩膝腫大脛腿枯細不能屈伸俗又謂之鼓槌風總不過風寒濕三氣流注之爲病也然腫痛者必有邪滯枯細者必因血虛凡治此者必宜以養氣滋血爲主有風者兼散其風有寒濕者兼去其寒濕若果由邪鬱成熱者必宜滋陰清火自無不愈其有痢後而成者又名痢後風此以瀉痢亡陰尤宜壯腎凡寒勝者宜三氣飲五積散或大防風湯之類主之濕勝者宜五苓散理中湯之類主之熱勝者宜保陰煎大秦艽湯之類主之若以陽氣不足而敗及四肢者非右歸丸理陰煎及八味地黃丸之類不可

石室祕錄 臣陳士鐸著

手足痛

如人手足痛者人以爲脾經之熱不知非脾也乃肝木之鬱結也散其鬱氣則手足之痛自去用逍遙散加梔子三錢牛夏白芥子各二錢水煎服一劑即痛如失蓋肝木作祟則脾不敢當其鋒氣散於四肢結而不伸所以作楚今一旦平其肝氣而脾氣自舒脾舒而痛在手足有不盡除者乎

手足疼痛者以一人抱住身子以兩人兩腿夾住左右各足一條輕輕槌之千數覺兩足少快然後以手執其三里之間少爲伸之者七次放足執其兩手捻之者千下而後已左右手各如是一日之間而手足之疼痛可已

兩足痛腰以下痛用黃酒二升黃芪半斤薏仁五兩杜仲一兩茯苓防風各五錢車前子三錢肉桂一錢水一椀煎二沸取汁二椀入酒內一醉而愈以上皆風入四肢頭上背間腰以下也借黃酒一味無經不達引其藥味而直中病所也夫腰足痛明屬腎虛而氣衰不能運動更加之濕自必作楚妙在不補腎而單益氣氣足則血生血生則邪退而又助之薏仁茯苓車前之去濕濕去則血更活矣況更助之杜仲之健腎肉桂之溫腎防風之蕩風乎相畏而相使相佐而相成必然之理也

兩腿痠痛此濕氣入於骨中而皮外無濕也方用薏仁二兩芡實一兩茯苓三錢肉桂草薢各一錢牛膝二錢水煎服此方之妙妙在薏仁能入骨而去水加芡實健脾以去濕不使濕以增濕而牛膝草薢又是最利雙足之品又加肉桂引經直入於骨中濕有不去痠痛有不止者乎但脚中之病乃人身之下流一有病不易去之況濕氣在骨如陸地低窪之處久已成潭如何車水即乾必多用人功而後可以告竭故此必須多服久服正是此意

脚痛之證最多而最難治蓋脚乃人身之下流水濕之氣一犯則停蓄不肯去須提其氣而水濕之氣始可散也今人動以五苓散治濕亦是正經然終不能上升而盡去其濕也予今立一方可以通治濕氣之侵脚者方用人參白术各三錢黃芪一兩防風柴胡

肉桂各一錢薏仁白芍芡實各五錢陳皮五分半夏二錢水煎服此方乃去濕之神劑用防風於黃芪之中已是提氣而去濕又助之柴胡之舒氣則氣更升騰氣升則水亦隨之而入於脾矣方中又有白朮芡實薏仁俱是去水去濕之聖藥有不奏功如響者乎

人大腿腫痛堅硬如石疼苦異常欲以繩繫足高懸梁上其疼乃止放下疼即如砍腿中大響一聲前腫即移大臂之上腫如斗不可著席將布兜之懸掛其疼乃止此亦祟憑之也方用生甘草一兩白芍三兩水煎服蓋生甘草專瀉毒氣白芍平肝木以止痛也痛止則腫可消毒出則祟可杜也

手痲木

手之痲木乃氣虛而風濕中之必須用手經之藥引入手中而去風去濕之藥始能有效方用白朮黃芪各五錢人參二錢陳皮防風桂枝各五分甘草一錢水煎服方中黃芪人參白朮補氣去濕防風去風然必得桂枝始能入於手經也經絡既清自能奏功

脚板紅

人脚板中色紅如火不可落地又非瘍毒終歲經年不愈此病亦因人用熱藥立而行房火聚於脚心而不散故經歲經年不愈也法當用內藥消之若作外治必然爛去脚板方用熟地三兩山茱黃萸芡苓甘菊花各五錢北五味澤瀉車前丹皮牛膝各三錢麥冬元參沙參金釵石斛各一兩萆薢二錢水煎服十劑消二十劑全愈須忌房事三月否則必發發則死矣

手足脫落

人有手足脫下而人仍不死之證此乃傷寒之時口渴過飲凉水以救一時之渴孰知水停腹內不能一時分消遂至四肢受病氣血不行久而手足先爛手指與脚指墮落或脚指墮落之後又爛脚板久之連脚板一齊墮落矣若有傷寒口渴過飲凉水者愈後倘手足指出水者急用吾方可救指節脚板之墮落也方用薏仁三兩茯苓二兩肉桂一錢白朮一兩車前子五錢水煎服一連十劑小便大利而手脚不出水矣永無後患不必多服

指甲脫落

更有人手指甲盡行脫下不痛不癢此乃腎經火虛又於行房之後凉水洗手遂成此病方用六味湯加柴胡白芍骨碎補治之而愈

指縫流血

有人指縫流血不止有蟲如蜉蝣之小鑽出少頃即能飛去此證乃濕熱生蟲也然何故生蟲而能飛耶蓋不止濕熱而又帶風邪也凡蟲感風者俱有羽翼能飛安在人身得風之氣轉不能飛也方用白朮茯苓當歸白芍生甘草各三錢人參柴胡川芎荊芥各一錢熟地黃芪薏仁各五錢水煎服此方之妙全不去殺蟲而但補其氣血而佐之去濕去風人身氣血和自不生蟲補氣血之和則蟲自無藏身之窟兒又逐水消風蟲更從何處生活耶此方之所以平而奇也服四劑則血不流而蟲不出再服四劑手指完好如初矣

掌中突高

人掌中忽高起一寸不痛不癢此乃陽明經之火不散而鬱於手也論理該痛癢而今不痛癢不特火鬱於腠理而且水壅於皮毛也法當用外藥消之蓋陽明之火盛必然作渴引飲不休今又不渴是胃中之火盡散而流毒於掌中必其人本陽明之火盛因手按於牀席之上作房過於用力使掌上之氣血不行久而突高不痛不癢乃成死肉矣方用附子一箇煎湯以手漬之至涼而止如是者十日必然作痛再漬必然作癢又潰而高者平矣蓋附子大熱之物無經不入雖外漬無不內入者也倘以附子作湯飲之則週身俱熱又引動胃火掌肉不消而內證蜂起矣所以外治而愈也或附子湯中再加輕粉一分引入骨髓更爲奇效耳

脚肚肉塊

人有脚肚之上忽長一大肉塊如瘤非瘤如肉非肉按之痛欲死此乃脾經濕氣結成此塊而中又帶火不消故手不可按按而痛欲死也法宜峻補脾氣而分消其濕爲是然而外長怪狀若在內一時消之恐不易得當用內外夾攻之法自然手到病除內服方用白朮薏仁芡實各一兩澤瀉五錢肉桂五分車前子人參萆薢白蘚白芥子各三錢半夏陳皮牛膝各二錢水煎服二劑後用蚯蚓糞一兩炒水銀一錢冰片麝香各五分硼砂一分黃蘗五錢炒兒茶三錢各爲細末研至不見水銀爲度將此藥末用酢調成膏敷在患處一日即全消矣神效之極凡有塊者以此內外治之無不效應如響

脚下生指

有人脚板下忽生二指痛不可忍者乃濕熱之氣結成簡犯神祖之故方用硼砂一分瓦葱一兩冰片三

分人參一錢爲末以刀輕刺出血刺在生出指上卽時出水數星星在血流之處隨出隨摻以血盡爲度流三日不流水矣而痛亦少止再用白朮五錢生甘草人參牛膝萆薢白芥子各三錢薏仁一兩半夏一錢水煎服四劑可全愈而指盡化爲水矣外用膏藥加生肌散敷之卽愈矣

方一

小建中湯 仲景 下同

治虛勞四肢痠疼手足煩熱

桂枝去皮 甘草炙 生薑各三兩 芍藥六兩

大棗十二枚 膠飴一升

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微火消解溫服一升日三服

崔氏八味丸

治脚氣上入少腹不仁

熟地黃八兩 山茱萸 薯蕷各四兩 澤瀉

茯苓 牡丹皮各三兩 桂枝 附子炮各一兩

右八味末之煉蜜和梧子大酒下十五丸日再服

白虎湯

治陽明病手足冷者此屬熱深厥深也

知母六兩 石膏一斤碎 甘草二兩 粳米六合

右四味以水一斗煮熟湯成去滓溫服一升日三服

四逆湯

治少陰病溫溫欲吐手足寒脈弦遲者

乾薑一兩半 附子一枚生用去皮破八片

甘草炙二兩

右三味咬咀以水三升煮取一升二合去滓分溫再服強人可用大附子一枚乾薑三兩凉服

附子湯

治少陰病身體疼手足寒骨節痛脈沉者

茯苓 芍藥各三兩 白朮四兩 人參二兩

附子二枚去皮

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

桂枝加附子湯

治太陽病發汗汗不止惡風小便難四肢微急難以屈伸

桂枝去皮 芍藥 生薑各三兩 甘草炙二兩

大棗十二枚 附子一枚炮去皮破八片

右六味咬咀以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服

眞武湯

治少陰病有水氣四肢沉重疼痛者

附子一枚炮去皮破八片 茯苓 芍藥 生薑

白朮各三兩

右五味以水八升煮去滓溫服七合日三服

礬石湯

治脚氣衝心

礬石二兩

右一味以漿水一斗五升煮三五沸浸脚良

三聖散 子和

治臁瘡

葱白 馬齒莧 石灰各一斤

右三味濕搗爲團陰乾爲細末貼瘡如有死肉者宜先用潰死肉藥

烏頭湯 仲景 下同

治脚氣疼痛不可屈伸

麻黃 芍藥 黃芪各三兩 甘草炙一兩

川烏五枚咬咀以蜜二升煎取一升卽出烏頭

右五味咬咀四味以水三升煮取一升去滓內蜜煎中更煎之服七合如不止盡服之

越婢湯

治風痹脚弱

麻黃六兩 石膏半斤 白朮四兩 生薑三兩

大附子一枚 甘草二兩 大棗十五枚

右七味咬咀以水七升先煮麻黃再沸掠去沫入諸藥煮取三升分三服覆取汗胡治方只五味若惡風者加附子一枚多痰水者加白朮四兩

脚弱神驗方 千金方 下同

治脚弱

防己 蜀椒 細辛 桂心 麻黃 石膏

獨活 防風 黃芩 茵芋 葛根 芍藥

甘草各一兩 生薑 茯苓各二兩

烏頭二枚

右十七味咬咀以竹瀝一斗煮取四升分六服令一日一夜服盡其間可常作赤小豆飲有人脚弱

先服常用竹瀝湯四劑未覺增損作此方後覺得力又云脈沉細駛風在內者作此湯也

風引湯

治兩脚疼痹腫或不仁拘急不得行

麻黃　石膏　獨活　茯苓各二兩　吳茱萸
附子　秦艽　細辛　桂心　人參　防風
芎藭　防己　甘草各一兩　乾薑一兩半
白朮三兩　杏仁六十枚

右十七味㕮咀以水一斗六升煮取三升分三服取汗

小龜甲湯

治身體虛脹如敗腫胃心痞滿有氣壯熱小腹厚重兩脚弱

龜甲　黃芩　升麻　麻黃　羚羊角　桂心
杏仁研各三兩　前胡四兩　烏梅二十枚
薤白三十枚

右十味㕮咀以水一斗煮取二升七合分三服此常用若體強壯欲須利者加大黃二兩

風緩湯

治脚弱舉體痹不仁熱毒氣入臟胃中滿塞不通食卽嘔吐

獨活　麻黃　犀角各三兩　半夏一升　大棗
烏梅各二十枚　桂心　龜甲　升麻　橘皮
枳實　甘草　吳茱萸　大黃各一兩　生薑
石膏各六兩　貝齒七枚

右十七味㕮咀以水一斗四升煮取四升分五服日三夜二不瘥至三劑必瘥一方有羚羊角無犀角　旋覆花各二兩　豉一斤　橘皮　茯苓　生薑各二兩　大棗七枚　紫蘇莖葉一握

右八味㕮咀以水八升煮取二升七合分三服相去十里久服之以氣下小便利爲度崔氏名小犀角湯如其不下服後大犀角湯

大犀角湯

療脚氣毒攻心變成水身體遍腫悶絕欲死

犀角　旋覆花　白朮　桂心　防己　黃芩
生薑　橘皮　茯苓各二兩　豉一升　桑白皮
前胡各四兩　紫蘇莖葉一握　大棗十枚

右十四味㕮咀以水九升煮取二升七合分三服相去十里久服之取下氣爲度若得氣下小便利脚腫卽消能食若服湯竟不下氣急不定仍服後犀角麻黃湯崔氏又以白前代白朮無防己黃芩桑白皮名旋覆花湯

犀角麻黃湯

服大犀角湯後仍不下氣急不定

犀角　麻黃　防風　獨活　羚羊角　芎藭
白朮　防己　當歸　黃芩各二兩　石膏四兩
生薑　甘草　杏仁　桂心各三兩

右十五味㕮咀以水二斗煮麻黃去沫取汁八升下藥煮取三升分三服相去十里久服訖覆取汗若不瘥五日後更一劑取汗同前崔氏無獨活羚羊角杏仁有附子茯苓細辛

茱萸湯（藥見史方）

治脚氣入腹困悶欲死腹脹

吳茱萸六斤　木瓜兩顆切

角

脚氣方

治脚氣初發從足起至膝脛骨腫疼者

蜱麻葉切

搗蒸薄裹之日二三易卽消蜱麻子似牛蜱蟲故名蜱麻也若冬月無蜱麻取蒴藿根搗研和酒糟三分根一分合蒸熱及熱封裹腫上如前法日二卽消亦治不仁頑痹此方非湯不當見然以前後三方俱出蘇長史更不分出

又方

治腫已入胜至小腹脹小便澀少者

烏特牛尿一升

右溫服日二取消乃止千金翼云羸瘦人二分尿一分牛乳合煮乳浮結乃服之

又方

若腫已消仍有此候者急服此湯

麻黃　射干　人參　白茯苓　防己　前胡
枳實各二兩　半夏　犀角　羚羊角　青木香
橘皮　杏仁　升麻各一兩　生薑五兩　獨活三兩　吳茱萸

右十七味㕮咀以水一斗二升煮取四升分五服相去二十里久服之中間進少粥以助胃氣此湯兩日服一劑取病氣退乃止以意消息之若熱盛喘煩者加石膏六兩生麥門冬一升去吳茱萸若心下堅加龜甲一兩

犀角旋覆花湯

治脚氣初起

右二味以水一斗三升煮取三升分三服相去如人行十里久進一服或吐或汗或利或大熱悶卽癒此起死回生之方也又二味等分爲末酒丸每服五十丸或百丸溫酒下名茱萸丸治證同

小風引湯

治中風腰脚疼痛弱者胡洽名大風引湯無乾薑石斛有桂心黃芪

獨活　茯苓　人參各三兩　防風　當歸身　甘草　乾薑　石斛各二兩　附子一枚去皮　大豆二升

右十味㕮咀以水九升酒三升煮取三升分四服服相去如人行十里久胡洽云南方治脚弱與此別用升麻半夏芍藥各一兩合十三味本只有十味減當歸石斛名小風引湯刪繁方無石斛以療肉極寒肌肉變舌瘖名曰惡風腰痛脚弱

四物附子湯

治風濕相搏骨節煩痛四肢拘急不可屈伸近之則痛自汗出而短氣小便不利惡風不欲去衣或頭面手足時時浮腫

附子二枚　桂心四兩　白朮　甘草各二兩

右四味㕮咀以水六升煮取三升分三服微汗愈大汗煩者一服五合

體腫者加防己四兩

悸氣小便不利加茯苓三兩既有附子令加生薑三兩

又方

治脚弱風毒實及嶺南瘴氣面腫乍寒乍熱似瘧狀脚腫氣上心悶欬嗽癰瘍頑痹

麻仁　升麻　麻黃　射干　菖蒲　芒硝　甘草　大黃各二兩　豉三合

右九味㕮咀以水六升煮取二升半內芒硝又煎三沸分三服微利一二行解毒熱有腫卽消之凡覺氣滿輒服一劑佳延年祕錄作芒硝半兩外臺同

深師增損腎瀝湯

治風虛勞損熱毒脚弱疼痹或不隨下焦虛冷胃中微有客熱心虛驚悸不得眠食少失氣味日夜數過心煩迫不得臥小便不利又時復下湘東王至江州王在嶺南病悉如此極困篤余作此湯令服卽得力病似此者服無不瘥隨宜增損

人參　黃芪　甘草　芍藥　麥門冬　肉蓯蓉　乾地黃　赤石脂　茯神　地骨白皮　當歸　遠志　磁石　枳實　防風　龍骨各一兩　桂心　芎藭各二兩　生薑四兩　五味子三合　半夏一升　大棗三十枚　白羊腎一具

右二十三味㕮咀以水二斗煮羊腎取汁一斗二升內諸藥煮取四升分爲五服不利下者除龍骨赤石脂小便澀以赤茯苓代茯神加白朮三兩多熱加黃芩一兩遺溺加桑螵蛸二十枚胡洽方無黃芪蓯蓉赤石脂地骨皮磁石枳實防風龍骨半夏有黃芩爲十五味

石膏湯

治脚氣風毒熱氣上衝頭面面赤筋急鼻塞去來來時令人昏憒心智恍惚或若驚悸身體顫掉手足緩縱或痠痹頭目眩重眼反鼻辛熱氣出口中或患味甜諸惡不可名狀者

石膏　龍腦　升麻　芍藥　貝齒　甘草　鼈甲酥炙　黃芩　羚羊角各一兩　橘皮當歸各二兩

右十一味㕮咀以水八升煮取三升分爲三服半夏湯

治脚氣上入腹腹急上衝胃氣急欲絕

半夏一升　桂心八兩　乾薑五兩　甘草人參　細辛　附子各二兩　蜀椒二合

右八味㕮咀以水一斗煮取三升分三服初稍稍進恐氣衝上格塞不得下小小服通人氣耳

烏頭湯

治風冷脚痹疼痛攣弱不可屈伸

烏頭　細辛　蜀椒各一兩　甘草　秦艽　附子　桂心　芍藥各二兩　乾薑　茯苓　防風　當歸各三兩　獨活四兩　大棗二十枚

右十四味㕮咀以水一斗二升煮取四升分五服若熱毒多服亦佳

追毒湯

治脚弱風熱上入心腹煩悶欲絕

半夏　生薑各四兩　黃芪　甘草　當歸　人參　厚朴　獨活　橘皮各一兩　枳實　麻黃　乾地黃　芍藥各二兩　桂心一兩　貝子七枚　大棗十枚

右十六味㕮咀以水一斗二升煮取三升六合分四服日三夜一

防風湯

治脚氣幷治毒氣上衝心胷嘔逆宿癖積氣疝氣諸病常服

防風　麻黃　芎藭　人參　芍藥　當歸　茯苓　半夏　甘草　橘皮各一兩　鼈甲　生薑　桂心各二兩　杏仁兩半　赤小豆一升　貝子　烏梅各五枚　大棗二十枚　吳萸五合　犀角　羚羊角各半兩　薤白十四枚

右二十二味㕮咀以水一斗煑取三升分三服一日令盡一方用水一斗二升間食糜一方半夏二兩隨時用

防風湯

治肢體虛風微痙發熱支節不隨恍惚狂言來去無時不自覺悟南方支法存所用多得力溫和不損人爲勝於續命越婢風引等湯羅廣州一門及南州士人常用亦治脚弱甚良

石膏半兩　防風　麻黃　獨活　生薑　秦艽　半夏各一兩　麝香六銖　當歸　遠志　甘草　防己　人參　黃芩　升麻　芍藥各一兩

右十六味㕮咀以水一斗三升煑取四升一服一升初服厚覆取微汗亦當兩三行下其間相去如人行十里久更服一方有白朮一兩

有熱加大黃二兩

先有冷心痛疾者倍用當歸加桂心三兩不用大黃

甘草湯

治脚弱舉身洪腫胃反食穀吐逆胷中氣結不安而寒熱下利不止小便難服此湯卽愈亦服女麴散利小便腫消服大散摩膏有驗

吳茱萸二升　甘草　人參各一兩　半夏一升　桂心　蜀椒各三兩　小麥八合　大棗二十枚　生薑八兩

右九味㕮咀以水一斗三升煑小麥取一斗去小麥內諸藥煑取三升分爲六服

恆山甘草湯

若寒熱日再三發可服此方

恆山三兩　甘草一兩半

右二味㕮咀以水四升煑取一升半分三服相去五里久一服

丹參牛膝煑散

治脚痹弱氣滿身微腫

丹參　牛膝　桑白皮　杏仁　升麻　茯苓　猪苓各四兩　犀角　黃芩　橘皮　防己　白前　澤瀉　桂心　秦艽各二兩　生薑　李根白皮各二兩　大麻仁二升

右十八味搗粗篩以水一升半內散方寸匕煑取七合輕絹濾去滓頓服日再夏日熱不得服圓散此煑散須年常用大驗

小續命湯 活人書

治脚氣痹弱不能轉側者

附子生削去皮臍五錢　防風一兩半　芍藥　白朮　人參　川芎　麻黃去節湯泡三次焙乾　防己　黃芩　桂枝　甘草各一兩

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓取八分淸汁入生薑汁再煎一二沸溫服日三夜二

神功丸 子和

治風氣下流腰疼脚重臍下脹痛溺赤如金

大黃三兩　人參半兩　麻子仁五兩另研　訶子皮炮取二兩

右杵研爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服二十丸溫水下日三服以通爲度

五柔丸

治老人虛人脚氣津液虛大便結調補三焦

大黃四兩　前胡一兩　半夏洗　蓯蓉酒浸　芍藥　茯苓　細莘　當歸　葶藶炒各半兩

右搗羅爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大溫水下二十丸以通利爲度

檳榔散

治脚腫

橘葉一大握　沙木一握　童子小便一小盞　酒半盞

右同煎數沸調檳榔末二錢食後服

木瓜散

治脚氣

大腹皮一枚　紫蘇一分　乾木瓜　甘草炙　木香　羌活各一分

右細剉爲散分作三服每服用白水一盞煎至半盞去滓通口服

赤茯苓丸 儒門事親下同

治脾濕太過四肢腫滿腹脹喘逆氣不宣通小便

赤濕

木香半兩　赤茯苓　防己各二兩　葶藶四兩

右爲末棗肉丸如桐子大每服三十丸煎桑白皮湯送下食前一本赤茯苓一兩

除濕丹

治諸濕腫咨博腰膝重痛足脛浮腫

乳香研　沒藥研各一兩　牽牛頭末半兩

大戟炒三兩　檳榔　威靈仙　赤芍藥　澤瀉　葶藶　甘遂各二兩　陳皮去白四兩

右爲末糊丸如桐子大每服五十丸至七八十丸溫水送下食前得更衣止後服如服藥前後忌酒一日濕麵兩三日食後溫淡粥補胃尤佳

無礙丸

治脾病橫流四肢腫滿

木香半兩　蓬莪茂炮　京三稜炮　檳榔生

椰李仁湯泡去皮各一兩　大腹皮二兩

右六味爲末炒麥芽炸爲粉糊丸如桐子大每服二十九生薑湯送下無時

加減白通湯

治形寒飲冷大便自利完穀不化臍腹冷痛足脛寒而逆

附子炮去皮臍　乾薑炮各一兩　官桂去皮　甘草炙　半夏湯泡　草豆蔻麵裹煨　人參　白朮各半兩

右八味㕮咀每服五錢水二盞半生薑五片葱白五莖煎一盞三分去粗空心宿食消盡溫服

既濟解毒湯

治上熱頭目赤腫而痛胃腑煩悶不得安臥身半以下皆寒足膝尤甚大便微祕

大黃酒製大便利勿服　桔梗　黃連酒炒　甘草炙

黃芩酒製炒各二錢　柴胡　升麻　當歸身

連翹各一錢

右㕮咀作一服水二盞煎至一盞去粗食後溫服忌酒濕麵大料物及生冷等物

蚯蚓丸

治鶴膝風及腰膝風縮胡蹩望博士病風疰手足指節如桃李痛不可忍服之悉愈

蚯蚓一條頭尾全者　白附子　阿魏研　桂心　白芷各一兩　乳香三分　當歸　漏蘆　芍藥　威靈仙　地骨皮　川牛膝　羌活　安息香

桃仁各一兩生同安息香研　沒藥三分

右十六味蚯蚓桃仁白附阿魏桂心白芷安息香乳香沒藥九味同童子小便并酒二升炒熱冷定入餘藥爲末蜜丸彈子大空心溫酒化下一丸無時

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百十三卷目錄

醫部彙考一百九十三

四肢門五

方二 柴胡升麻湯 火鬱湯 除濕補氣湯 補中湯 升陽益氣湯 芎藭湯 人參益氣湯 升陽益胃湯 加味蒼朮散 活血通經湯 便宜丹 防己飲 加味蒼朮散 應病丸 又方 膿瘡方 又方經驗二防飲 五臟三圓丸 松節湯 紅花蒼朮丸 檳榔蒼朮丸 羌活導滯湯 鄧林筋痛方 蘇合香丸 桑枝煎 蒼朮湯 鄧氏筋痛方 續骨丹 桑枝煎 蒼朮散 乳香沒藥丸 上馬丸 防風湯 檳虎丹 羌活散 第二竹瀝湯 第三竹瀝湯 第四竹瀝湯 第五竹瀝湯 第六竹瀝湯 第七竹瀝湯 第八竹瀝湯 第九竹瀝湯 第十竹瀝湯 第十一竹瀝湯 第十二竹瀝湯 第十三竹瀝湯 第十四竹瀝湯 第十五竹瀝湯 第十六竹瀝湯 第十七竹瀝湯 第十八竹瀝湯 第十九竹瀝湯 第二十竹瀝湯 第二十一竹瀝湯 第二十二竹瀝湯 第二十三竹瀝湯 第二十四竹瀝湯 第二十五竹瀝湯 第二十六竹瀝湯 第二十七竹瀝湯 第二十八竹瀝湯 第二十九竹瀝湯 第三十竹瀝湯 第三十一竹瀝湯 第三十二竹瀝湯 第三十三竹瀝湯 第三十四竹瀝湯 第三十五竹瀝湯 第三十六竹瀝湯 第三十七竹瀝湯 第三十八竹瀝湯 第三十九竹瀝湯 第四十竹瀝湯 第四十一竹瀝湯 第四十二竹瀝湯 第四十三竹瀝湯 第四十四竹瀝湯 第四十五竹瀝湯 第四十六竹瀝湯 第四十七竹瀝湯 第四十八竹瀝湯 第四十九竹瀝湯 第五十竹瀝湯 第五十一竹瀝湯 第五十二竹瀝湯 第五十三竹瀝湯 第五十四竹瀝湯 第五十五竹瀝湯 第五十六竹瀝湯 第五十七竹瀝湯 第五十八竹瀝湯 第五十九竹瀝湯 第六十竹瀝湯 第六十一竹瀝湯 第六十二竹瀝湯 第六十三竹瀝湯 第六十四竹瀝湯 第六十五竹瀝湯 第六十六竹瀝湯 第六十七竹瀝湯 第六十八竹瀝湯 第六十九竹瀝湯 第七十竹瀝湯 第七十一竹瀝湯 第七十二竹瀝湯 第七十三竹瀝湯 第七十四竹瀝湯 第七十五竹瀝湯 第七十六竹瀝湯 第七十七竹瀝湯 第七十八竹瀝湯 第七十九竹瀝湯 第八十竹瀝湯 第八十一竹瀝湯 第八十二竹瀝湯 第八十三竹瀝湯 第八十四竹瀝湯 第八十五竹瀝湯 第八十六竹瀝湯 第八十七竹瀝湯 第八十八竹瀝湯 第八十九竹瀝湯 第九十竹瀝湯 第九十一竹瀝湯 第九十二竹瀝湯 第九十三竹瀝湯 第九十四竹瀝湯 第九十五竹瀝湯 第九十六竹瀝湯 第九十七竹瀝湯 第九十八竹瀝湯 第九十九竹瀝湯 第一百竹瀝湯 第一百一竹瀝湯 第一百二竹瀝湯 第一百三竹瀝湯 第一百四竹瀝湯 第一百五竹瀝湯 第一百六竹瀝湯 第一百七竹瀝湯 第一百八竹瀝湯 第一百九竹瀝湯 第一百十竹瀝湯 第一百十一竹瀝湯 第一百十二竹瀝湯 第一百十三竹瀝湯 第一百十四竹瀝湯 第一百十五竹瀝湯 第一百十六竹瀝湯 第一百十七竹瀝湯 第一百十八竹瀝湯 第一百十九竹瀝湯 第一百二十竹瀝湯 第一百二十一竹瀝湯 第一百二十二竹瀝湯 第一百二十三竹瀝湯 第一百二十四竹瀝湯 第一百二十五竹瀝湯 第一百二十六竹瀝湯 第一百二十七竹瀝湯 第一百二十八竹瀝湯 第一百二十九竹瀝湯 第一百三十竹瀝湯 第一百三十一竹瀝湯 第一百三十二竹瀝湯 第一百三十三竹瀝湯 第一百三十四竹瀝湯 第一百三十五竹瀝湯 第一百三十六竹瀝湯 第一百三十七竹瀝湯 第一百三十八竹瀝湯 第一百三十九竹瀝湯 第一百四十竹瀝湯 第一百四十一竹瀝湯 第一百四十二竹瀝湯 第一百四十三竹瀝湯 第一百四十四竹瀝湯 第一百四十五竹瀝湯 第一百四十六竹瀝湯 第一百四十七竹瀝湯 第一百四十八竹瀝湯 第一百四十九竹瀝湯 第一百五十竹瀝湯 第一百五十一竹瀝湯 第一百五十二竹瀝湯 第一百五十三竹瀝湯 第一百五十四竹瀝湯 第一百五十五竹瀝湯 第一百五十六竹瀝湯 第一百五十七竹瀝湯 第一百五十八竹瀝湯 第一百五十九竹瀝湯 第一百六十竹瀝湯 第一百六十一竹瀝湯 第一百六十二竹瀝湯 第一百六十三竹瀝湯 第一百六十四竹瀝湯 第一百六十五竹瀝湯 第一百六十六竹瀝湯 第一百六十七竹瀝湯 第一百六十八竹瀝湯 第一百六十九竹瀝湯 第一百七十竹瀝湯 第一百七十一竹瀝湯 第一百七十二竹瀝湯 第一百七十三竹瀝湯 第一百七十四竹瀝湯 第一百七十五竹瀝湯 第一百七十六竹瀝湯 第一百七十七竹瀝湯 第一百七十八竹瀝湯 第一百七十九竹瀝湯 第一百八十竹瀝湯 第一百八十一竹瀝湯 第一百八十二竹瀝湯 第一百八十三竹瀝湯 第一百八十四竹瀝湯 第一百八十五竹瀝湯 第一百八十六竹瀝湯 第一百八十七竹瀝湯 第一百八十八竹瀝湯 第一百八十九竹瀝湯 第一百九十竹瀝湯 第一百九十一竹瀝湯 第一百九十二竹瀝湯 第一百九十三竹瀝湯 第一百九十四竹瀝湯 第一百九十五竹瀝湯 第一百九十六竹瀝湯 第一百九十七竹瀝湯 第一百九十八竹瀝湯 第一百九十九竹瀝湯 第二百竹瀝湯 第二百一竹瀝湯 第二百二竹瀝湯 第二百三竹瀝湯 第二百四竹瀝湯 第二百五竹瀝湯 第二百六竹瀝湯 第二百七竹瀝湯 第二百八竹瀝湯 第二百九竹瀝湯 第二百十竹瀝湯 第二百十一竹瀝湯 第二百十二竹瀝湯 第二百十三竹瀝湯 第二百十四竹瀝湯 第二百十五竹瀝湯 第二百十六竹瀝湯 第二百十七竹瀝湯 第二百十八竹瀝湯 第二百十九竹瀝湯 第二百二十竹瀝湯 第二百二十一竹瀝湯 第二百二十二竹瀝湯 第二百二十三竹瀝湯 第二百二十四竹瀝湯 第二百二十五竹瀝湯 第二百二十六竹瀝湯 第二百二十七竹瀝湯 第二百二十八竹瀝湯 第二百二十九竹瀝湯 第二百三十竹瀝湯 第二百三十一竹瀝湯 第二百三十二竹瀝湯 第二百三十三竹瀝湯 第二百三十四竹瀝湯 第二百三十五竹瀝湯 第二百三十六竹瀝湯 第二百三十七竹瀝湯 第二百三十八竹瀝湯 第二百三十九竹瀝湯 第二百四十竹瀝湯 第二百四十一竹瀝湯 第二百四十二竹瀝湯 第二百四十三竹瀝湯 第二百四十四竹瀝湯 第二百四十五竹瀝湯 第二百四十六竹瀝湯 第二百四十七竹瀝湯 第二百四十八竹瀝湯 第二百四十九竹瀝湯 第二百五十竹瀝湯 第二百五十一竹瀝湯 第二百五十二竹瀝湯 第二百五十三竹瀝湯 第二百五十四竹瀝湯 第二百五十五竹瀝湯 第二百五十六竹瀝湯 第二百五十七竹瀝湯 第二百五十八竹瀝湯 第二百五十九竹瀝湯 第二百六十竹瀝湯 第二百六十一竹瀝湯 第二百六十二竹瀝湯 第二百六十三竹瀝湯 第二百六十四竹瀝湯 第二百六十五竹瀝湯 第二百六十六竹瀝湯 第二百六十七竹瀝湯 第二百六十八竹瀝湯 第二百六十九竹瀝湯 第二百七十竹瀝湯 第二百七十一竹瀝湯 第二百七十二竹瀝湯 第二百七十三竹瀝湯 第二百七十四竹瀝湯 第二百七十五竹瀝湯 第二百七十六竹瀝湯 第二百七十七竹瀝湯 第二百七十八竹瀝湯 第二百七十九竹瀝湯 第二百八十竹瀝湯 第二百八十一竹瀝湯 第二百八十二竹瀝湯 第二百八十三竹瀝湯 第二百八十四竹瀝湯 第二百八十五竹瀝湯 第二百八十六竹瀝湯 第二百八十七竹瀝湯 第二百八十八竹瀝湯 第二百八十九竹瀝湯 第二百九十竹瀝湯 第二百九十一竹瀝湯 第二百九十二竹瀝湯 第二百九十三竹瀝湯 第二百九十四竹瀝湯 第二百九十五竹瀝湯 第二百九十六竹瀝湯 第二百九十七竹瀝湯 第二百九十八竹瀝湯 第二百九十九竹瀝湯 第三百竹瀝湯

藝術典第二百十三卷

醫部彙考一百九十三

四肢門五

方二 柴胡升麻湯 火鬱湯 除濕補氣湯 補中湯 升陽益氣湯 芎藭湯 人參益氣湯 升陽益胃湯 加味蒼朮散 活血通經湯 便宜丹 防己飲 加味蒼朮散 應病丸 又方 膿瘡方 又方經驗二防飲 五臟三圓丸 松節湯 紅花蒼朮丸 檳榔蒼朮丸 羌活導滯湯 鄧林筋痛方 蘇合香丸 桑枝煎 蒼朮湯 鄧氏筋痛方 續骨丹 桑枝煎 蒼朮散 乳香沒藥丸 上馬丸 防風湯 檳虎丹 羌活散 第二竹瀝湯 第三竹瀝湯

第四竹瀝湯 第五竹瀝湯 第六竹瀝湯 第七竹瀝湯 第八竹瀝湯 第九竹瀝湯 第十竹瀝湯 第十一竹瀝湯 第十二竹瀝湯 第十三竹瀝湯 第十四竹瀝湯 第十五竹瀝湯 第十六竹瀝湯 第十七竹瀝湯 第十八竹瀝湯 第十九竹瀝湯 第二十竹瀝湯 第二十一竹瀝湯 第二十二竹瀝湯 第二十三竹瀝湯 第二十四竹瀝湯 第二十五竹瀝湯 第二十六竹瀝湯 第二十七竹瀝湯 第二十八竹瀝湯 第二十九竹瀝湯 第三十竹瀝湯 第三十一竹瀝湯 第三十二竹瀝湯 第三十三竹瀝湯 第三十四竹瀝湯 第三十五竹瀝湯 第三十六竹瀝湯 第三十七竹瀝湯 第三十八竹瀝湯 第三十九竹瀝湯 第四十竹瀝湯 第四十一竹瀝湯 第四十二竹瀝湯 第四十三竹瀝湯 第四十四竹瀝湯 第四十五竹瀝湯 第四十六竹瀝湯 第四十七竹瀝湯 第四十八竹瀝湯 第四十九竹瀝湯 第五十竹瀝湯 第五十一竹瀝湯 第五十二竹瀝湯 第五十三竹瀝湯 第五十四竹瀝湯 第五十五竹瀝湯 第五十六竹瀝湯 第五十七竹瀝湯 第五十八竹瀝湯 第五十九竹瀝湯 第六十竹瀝湯 第六十一竹瀝湯 第六十二竹瀝湯 第六十三竹瀝湯 第六十四竹瀝湯 第六十五竹瀝湯 第六十六竹瀝湯 第六十七竹瀝湯 第六十八竹瀝湯 第六十九竹瀝湯 第七十竹瀝湯 第七十一竹瀝湯 第七十二竹瀝湯 第七十三竹瀝湯 第七十四竹瀝湯 第七十五竹瀝湯 第七十六竹瀝湯 第七十七竹瀝湯 第七十八竹瀝湯 第七十九竹瀝湯 第八十竹瀝湯 第八十一竹瀝湯 第八十二竹瀝湯 第八十三竹瀝湯 第八十四竹瀝湯 第八十五竹瀝湯 第八十六竹瀝湯 第八十七竹瀝湯 第八十八竹瀝湯 第八十九竹瀝湯 第九十竹瀝湯 第九十一竹瀝湯 第九十二竹瀝湯 第九十三竹瀝湯 第九十四竹瀝湯 第九十五竹瀝湯 第九十六竹瀝湯 第九十七竹瀝湯 第九十八竹瀝湯 第九十九竹瀝湯 第一百竹瀝湯 第一百一竹瀝湯 第一百二竹瀝湯 第一百三竹瀝湯 第一百四竹瀝湯 第一百五竹瀝湯 第一百六竹瀝湯 第一百七竹瀝湯 第一百八竹瀝湯 第一百九竹瀝湯 第一百十竹瀝湯 第一百十一竹瀝湯 第一百十二竹瀝湯 第一百十三竹瀝湯 第一百十四竹瀝湯 第一百十五竹瀝湯 第一百十六竹瀝湯 第一百十七竹瀝湯 第一百十八竹瀝湯 第一百十九竹瀝湯 第一百二十竹瀝湯 第一百二十一竹瀝湯 第一百二十二竹瀝湯 第一百二十三竹瀝湯 第一百二十四竹瀝湯 第一百二十五竹瀝湯 第一百二十六竹瀝湯 第一百二十七竹瀝湯 第一百二十八竹瀝湯 第一百二十九竹瀝湯 第一百三十竹瀝湯 第一百三十一竹瀝湯 第一百三十二竹瀝湯 第一百三十三竹瀝湯 第一百三十四竹瀝湯 第一百三十五竹瀝湯 第一百三十六竹瀝湯 第一百三十七竹瀝湯 第一百三十八竹瀝湯 第一百三十九竹瀝湯 第一百四十竹瀝湯 第一百四十一竹瀝湯 第一百四十二竹瀝湯 第一百四十三竹瀝湯 第一百四十四竹瀝湯 第一百四十五竹瀝湯 第一百四十六竹瀝湯 第一百四十七竹瀝湯 第一百四十八竹瀝湯 第一百四十九竹瀝湯 第一百五十竹瀝湯 第一百五十一竹瀝湯 第一百五十二竹瀝湯 第一百五十三竹瀝湯 第一百五十四竹瀝湯 第一百五十五竹瀝湯 第一百五十六竹瀝湯 第一百五十七竹瀝湯 第一百五十八竹瀝湯 第一百五十九竹瀝湯 第一百六十竹瀝湯 第一百六十一竹瀝湯 第一百六十二竹瀝湯 第一百六十三竹瀝湯 第一百六十四竹瀝湯 第一百六十五竹瀝湯 第一百六十六竹瀝湯 第一百六十七竹瀝湯 第一百六十八竹瀝湯 第一百六十九竹瀝湯 第一百七十竹瀝湯 第一百七十一竹瀝湯 第一百七十二竹瀝湯 第一百七十三竹瀝湯 第一百七十四竹瀝湯 第一百七十五竹瀝湯 第一百七十六竹瀝湯 第一百七十七竹瀝湯 第一百七十八竹瀝湯 第一百七十九竹瀝湯 第一百八十竹瀝湯 第一百八十一竹瀝湯 第一百八十二竹瀝湯 第一百八十三竹瀝湯 第一百八十四竹瀝湯 第一百八十五竹瀝湯 第一百八十六竹瀝湯 第一百八十七竹瀝湯 第一百八十八竹瀝湯 第一百八十九竹瀝湯 第一百九十竹瀝湯 第一百九十一竹瀝湯 第一百九十二竹瀝湯 第一百九十三竹瀝湯 第一百九十四竹瀝湯 第一百九十五竹瀝湯 第一百九十六竹瀝湯 第一百九十七竹瀝湯 第一百九十八竹瀝湯 第一百九十九竹瀝湯 第二百竹瀝湯 第二百一竹瀝湯 第二百二竹瀝湯 第二百三竹瀝湯 第二百四竹瀝湯 第二百五竹瀝湯 第二百六竹瀝湯 第二百七竹瀝湯 第二百八竹瀝湯 第二百九竹瀝湯 第二百十竹瀝湯 第二百十一竹瀝湯 第二百十二竹瀝湯 第二百十三竹瀝湯 第二百十四竹瀝湯 第二百十五竹瀝湯 第二百十六竹瀝湯 第二百十七竹瀝湯 第二百十八竹瀝湯 第二百十九竹瀝湯 第二百二十竹瀝湯 第二百二十一竹瀝湯 第二百二十二竹瀝湯 第二百二十三竹瀝湯 第二百二十四竹瀝湯 第二百二十五竹瀝湯 第二百二十六竹瀝湯 第二百二十七竹瀝湯 第二百二十八竹瀝湯 第二百二十九竹瀝湯 第二百三十竹瀝湯 第二百三十一竹瀝湯 第二百三十二竹瀝湯 第二百三十三竹瀝湯 第二百三十四竹瀝湯 第二百三十五竹瀝湯 第二百三十六竹瀝湯 第二百三十七竹瀝湯 第二百三十八竹瀝湯 第二百三十九竹瀝湯 第二百四十竹瀝湯 第二百四十一竹瀝湯 第二百四十二竹瀝湯 第二百四十三竹瀝湯 第二百四十四竹瀝湯 第二百四十五竹瀝湯 第二百四十六竹瀝湯 第二百四十七竹瀝湯 第二百四十八竹瀝湯 第二百四十九竹瀝湯 第二百五十竹瀝湯 第二百五十一竹瀝湯 第二百五十二竹瀝湯 第二百五十三竹瀝湯 第二百五十四竹瀝湯 第二百五十五竹瀝湯 第二百五十六竹瀝湯 第二百五十七竹瀝湯 第二百五十八竹瀝湯 第二百五十九竹瀝湯 第二百六十竹瀝湯 第二百六十一竹瀝湯 第二百六十二竹瀝湯 第二百六十三竹瀝湯 第二百六十四竹瀝湯 第二百六十五竹瀝湯 第二百六十六竹瀝湯 第二百六十七竹瀝湯 第二百六十八竹瀝湯 第二百六十九竹瀝湯 第二百七十竹瀝湯 第二百七十一竹瀝湯 第二百七十二竹瀝湯 第二百七十三竹瀝湯 第二百七十四竹瀝湯 第二百七十五竹瀝湯 第二百七十六竹瀝湯 第二百七十七竹瀝湯 第二百七十八竹瀝湯 第二百七十九竹瀝湯 第二百八十竹瀝湯 第二百八十一竹瀝湯 第二百八十二竹瀝湯 第二百八十三竹瀝湯 第二百八十四竹瀝湯 第二百八十五竹瀝湯 第二百八十六竹瀝湯 第二百八十七竹瀝湯 第二百八十八竹瀝湯 第二百八十九竹瀝湯 第二百九十竹瀝湯 第二百九十一竹瀝湯 第二百九十二竹瀝湯 第二百九十三竹瀝湯 第二百九十四竹瀝湯 第二百九十五竹瀝湯 第二百九十六竹瀝湯 第二百九十七竹瀝湯 第二百九十八竹瀝湯 第二百九十九竹瀝湯 第三百竹瀝湯



防風二錢五分　升麻　葛根　獨活　羌活　白芍藥　人參各五錢　炙甘草　柴胡各三錢　生甘草二錢

右㕮咀每服五錢水二大盞煎至一盞去柤熱服忌寒冷之物

火鬱湯

治五心煩熱是火鬱於地中四肢乃脾土心火下陷於脾土中鬱而不得伸也經云火鬱則發之

升麻　葛根　柴胡　白芍藥各一兩　防風　甘草各五錢

右㕮咀每服五錢水二大盞入連鬚葱白三寸煎至一盞去柤稍熱不拘時候服

除濕補氣湯

治兩腿麻木沉重無力多汗喜笑口中涎下身重如山語聲不出寸脈洪大

升麻六錢　蒼朮四錢　黃蘗酒浸炒　柴胡　黃芪各三錢　知母酒浸炒　葉本　生甘草當歸各二錢　五味子　陳皮各一錢五分

右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去柤空心服之待少時以早飯下之

人參益氣湯

治兩手指麻木四肢困倦怠惰嗜臥乃熱傷元氣也

黃芪八錢　生甘草　人參各五錢　白芍三錢　炙甘草　升麻各二錢　五味子一百四十箇

柴胡二錢五分

右㕮咀分作四服每服水二盞煎至一盞去柤熱食遠服

導氣湯

治兩腿麻木沉重

黃芪八錢　甘草六錢　青皮四錢　升麻　柴胡　當歸梢　澤瀉各二錢　橘皮一錢　紅花　五味子一百二十箇

右㕮咀分作四服每服水二大盞煎至一盞去柤食前熱服

補中湯

治面黃汗多目赤四肢沉重食減腹中時時痛欬嗽兩手寸脈短右手脈弦細兼濕鬬脈虛

升麻　柴胡　當歸身各二分　神麯三分炒　澤瀉四分　紅花少許　大麥麵　蒼朮各五分　黃芪二錢五分　炙甘草八分　五味子二十箇

右㕮咀分作二服水二盞煎至一盞去查食遠服

升陽益胃湯

治脾胃虛怠惰嗜臥四肢不收

黃芪二兩　半夏製熟者用　人參　甘草炙各一兩　獨活　防風　白芍　羌活各五錢　橘皮四錢　柴胡　澤瀉下焦勿用　茯苓小便利者勿用　白朮各三錢　黃連一錢

右㕮咀每服秤三錢水三盞生薑五片棗二枚煎至一盞去查溫服早飯後或加至五錢

加味蒼朮散　醫學入門

治濕熱脚氣痿躄

蒼朮一錢　白朮八分　知母　黃蘗　黃芩各六分　當歸　芍藥　生地各四分　木瓜　檳榔

羌活　獨活　木通　防己　牛膝各三分　甘草一分

右剉作一貼薑三片水煎服

活血通經湯

治風淫四末手足攣急芍藥五分　升麻　葛根　人參　當歸身　炙甘草各一錢　酒黃蘗　桂枝各二錢

右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞熱服不拘時令煖房中近火摩搓其手

價寶丹（丹溪下同）

治五勞七傷四肢無力腿脚沉困下元虛憊失精陽痿

川楝子　牛膝酒浸　檳榔　蛇牀子　蓮子　菟絲子酒浸　茯神　五味　巴戟去心　蒐絲子　鹿茸酥炙　大茴香　人參　澤瀉　白芍藥　山藥　熟地　麥冬各一兩　穿山甲一大片炙乳香另研　仙靈脾　鳳眼草各三錢　沉香　白檀香　胡盧巴　破故紙炒各五錢

右爲末煉蜜丸梧子大空心服七十丸白湯下

防己飲

治脚氣須升提其濕

白朮　木通　防己　檳榔　川芎　甘草梢　犀角　蒼朮鹽炒　黃蘗酒炒　生地酒炒

右㕮咀水煎服

大便實加桃仁

小便澀加杜仲牛膝

有熱加黃芩黃連大熱及時熱加石膏

有痰加竹瀝薑汁

如常腫者專主平濕熱宜後方

後方

蒼朮二兩　防風一兩　川芎　檳榔各六錢　香附子八錢　條黃芩四錢　滑石一兩二錢　甘草三錢

右爲末或丸或散皆可服

應痛丸

治脚氣痛不可忍此藥爲劫劑

赤芍藥煨去皮　草烏去皮尖各半兩

右爲末酒糊丸空心服十丸白湯下

又方

治脚氣腫痛

芥子　白芷等分

右爲末薑汁和敷貼或用仙朮羌活獨活白芷細辛爲末入帛內作襯用

膝痛方

滴乳香　沒藥　水銀　當歸各半兩　川芎　貝母　黃丹各二錢半　眞麻油五兩

右㕮咀除黃丹水銀外先將餘藥用香油熬黑色去查下黃丹水銀又煎黑色用柳桃枝攪成膏油紙攤貼

又方

龍骨生用　血竭　赤石脂　黃蠟各一兩　頭髮如指大　白膠香　香油不拘多少

右件先以香油煎頭髮三五沸去髮入黃蠟白膠香却入龍骨血竭赤石脂攪勻安在水盤內候冷取起以磁器盛之每遇一瘡捻作薄片貼瘡口以竹箬貼在外三日後翻過再貼仍服活血藥

（經驗二防飲醫學正傳）

治痢後脚痛如刀剜虎咬之狀膝腫大不能行步名曰鶴膝風

熟地黃　人參各一錢　白朮　黃芪　當歸　川芎　白芍藥　杜仲　萆薢各七分　防風　防己　羌活　牛膝　甘草各五分　附子童便浸三日炮七分冬則一錢

右剉作一貼薑三棗二水煎服

五獸三圓丸（丹溪下同）

治血氣耗損肝腎不足兩脚痿軟

鹿茸　麒麟竭　虎脛骨　牛膝　金毛狗脊各等分（即五獸也）　附子一枚去皮剜去中心入辰砂塡滿又用木瓜一枚去皮剜去中心入前附子於內以附子末蓋口（即三圓也）

以三圓正坐於磁罐內重湯蒸至極爛取出和五獸搗丸焚實大木瓜酒下

松節湯

治脚氣入腹心腹脹急煩躁腫痛

松節炒黃　桑白皮　蘇葉各一兩　檳榔三錢　甘草五錢

每三錢入燈心二十根生薑三片童便三分煎服

紅花蒼蘚丸

治足脛腫婦人亦宜

蒼朮　黃蘗　紅花　牛膝　生地黃　南星　龍膽草　川芎各等分

右爲末酒糊丸服

檳榔蒼藥丸

治濕熱食積痰飲流注

黃蘗　檳榔　蒼朮　防己　南星　川芎

白芷　犀角各等分

右爲末酒糊丸服如血虛加牛膝龜板肥人加痰藥

羌活導滯湯

治脚氣初發一身盡痛或肢節腫痛便溺阻隔先以此藥導之後用當歸拈痛湯以徹其邪

羌活　獨活各一錢二分　大黃二錢四分

防己　歸尾各七分　枳實五分

右水煎溫服

脚軟筋痛方

牛膝二兩　龜板　黃蘗酒炒各一兩　知母炒

甘草各半兩　白芍一兩半

右爲末酒糊爲丸

脚氣方（醫學綱目下同）

控涎丹　加蘇脂一錢　檳榔　木瓜各一兩

卷柏半兩先以鹽水煮半日次以白水煮半日

右共爲丸每三十丸加至四五十丸服下惡物立效

茵芋丸

治風氣積滯成脚氣常覺微腫發則或痛

椰李仁一兩　牽牛子三兩生取頭末一兩半

茵芋炒　薏苡仁各半兩

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服二十丸薑棗湯下未利加至三十丸日三快利爲度白粥補之

大防風湯（醫學正傳）

治鶴膝風

熟地黃一錢半　白朮　防風　當歸　白芍藥

杜仲　黃芪各一錢　附子　川芎　牛膝

羌活　人參　甘草各五分

右剉作一貼薑五片棗二枚水煎服祛風順氣活血脈壯筋骨

脚氣方

治諸般脚氣一服除根

防風三錢　羌活　蟬退各三分　薄荷五分

紫蘇四分

右爲末每服五錢以無灰酒半椀熱調服一時久用紫蘇半斤忍冬花四兩木饅頭七箇蘇木二兩水一桶煎之分三次添用傾桶內披衣上坐勿令走氣熏脚腿自下而上汗至頂門如水盡爲度

續骨丹

治兩脚軟弱虛羸無力及小兒不能行

天麻明淨者酒浸　白附子　牛膝　川羌活

木鼈子各半兩　烏頭炮　硃砂各一錢　乳香

沒藥各二錢　地龍去土一分

右以生南星末一兩無灰酒煮糊爲丸如雞頭大硃砂爲衣薄荷湯磨一丸食前服

桑枝煎

治風脚膝軟弱

桑枝剉三升　附子生用剉五兩　茄子根剉

黑豆各一升

已上四味用水三斗煮至一斗濾去滓再熬取五升入後藥末

石斛去根剉　天雄炮裂去皮臍　天麻　牛膝

川芎　桂心各二兩

右爲末入前汁中於銀鍋慢火熬用柳木篦不住手攪候如膏盛於磁盒中每日空心用熱酒調下一茶匙臨食前再服尤妙

蒼朮散

治風濕常服壯筋骨健步

蒼朮一斤用粟米泔水浸過用竹刀刮去筋皮以童子小便浸半斤無灰好酒浸半斤

右浸至春五日夏三日秋七日冬十日取出蒼朮於淨地上掘一坑以炭火煅坑紅去炭將浸蒼朮酒小便傾在坑內却放蒼朮在坑內以瓦器蓋覆用泥封固經一宿取出蒼朮研爲細末每服二錢空心鹽湯或酒調服

乳香沒藥丸

治遠年近日風濕脚氣攻注脚膝或腫或疼筋攣不能屈伸脚不能踏地及一切疼痛往來不已

乳香別研　沒藥別研　骨碎補去毛　縮砂仁

五靈脂去土　白附子　甜瓜子　牛膝酒浸

當歸酒炒　木瓜　地龍去土　木鼈子各一兩

白牽牛三兩微炒

右爲細末酒煮豬糊爲丸如梧桐子大每服二十丸木瓜湯下或溫酒亦可不拘時服

上馬丸

治寒濕骨痛腿疼筋骨諸疾

川烏炮　木香各半兩　虎骨酥炙　當歸酒浸　牛膝　杜仲　木瓜　龜板酥炙　自然銅醋淬　黃芪蜜炙　白朮各一兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三四十丸　溫酒下

防風湯

治腳氣痹弱神驗

防風　防己　蜀椒　細辛　桂心　麻黃　石膏　獨活　黃芩　茵芋　葛根　芎藭　芍藥　甘草各一兩　生薑　茯苓各二兩　烏頭二枚

右㕮咀以竹瀝一斗煮取四升分作六服令一日一夜服盡其間可常作赤小豆飲有人脚弱先服常用竹瀝湯四劑未覺增損作此方後覺得力又云脈沉細駛風在內者作此湯也一方無竹瀝赤小豆每服三錢水一大盞生薑三片煎至七分去滓不拘時溫服

搶虎丹

治風寒濕走注脚痹腰膝重痛五靈脂　荊芥　川烏炮去皮臍　當歸切焙　白膠香　自然銅火煅醋淬七次別研各二兩

右爲細末酒煮糊爲丸如梧桐子大每服二十丸用熱酒送下食後服日進二服

羌活散

治腰脚冷痹及諸風痲木不仁骨髓疼痛不欲飲食漸加瘦削

羌活　五加皮　棗仁炒　桂心各二兩　防風　當歸炒　赤芍藥　丹參各三兩　茵芋二分　牛膝　附子炮去皮臍　漏蘆各一兩

右㕮咀每服三錢水一大盞生薑三片同煎至六分去滓食前溫服

萆薢丸

治腰脚冷痹沉重無力

熟地黃　石斛　白芍藥各二分　牛膝二兩　五加皮　桂心　酸棗仁炒　羌活各半兩　萆薢　附子各一兩炮去皮臍

右爲細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三十丸食前用溫酒送下

熏蒸法

治腎氣衰弱脾腎肝三經受風寒濕停於腿膝使經絡凝而不行變成脚痹故發疼痛此藥和榮衛通經絡

小椒　鹽各一把　葱三大掘切　小麥麩五升　酒一盞

右以酢不拘多少日攪拌上件等濕潤爲度用銀器炒令極熱攤臥榻下將所患腿脚就臥熏蒸薄衣被蓋得汗出勻徧約半箇時辰撤去炒麩止就鋪褥中臥待一兩時辰覺汗稍解再用收陽粉撲傳汗孔畢然後出鋪臥中勿見風

通痹散

治腰以下至足感受風寒濕三者合而成痹兩足至膝冷如冰不能自舉或因酒熱立冷水中久成此疾

獨活　川芎　天麻　當歸　白朮各等分　右爲細末每服二錢食前用好酒調服

六生散

治周痹身體疼痛腰脚痛痹

生石菖蒲九節者去毛切焙　生地黃切焙　生商陸根洗淨切焙　生枸杞根切焙各一斤　生薑去皮切焙二斤　生烏頭去皮臍四兩

右先焙了各秤分兩復以醇酒一斗五升浸一宿濾出曝乾復內酒中再曝乾搗爲細末每服半錢以清酒一盞調下漸加至一錢空心臨臥各一服

天雄丸

治風寒濕痹皮肉不仁骨髓疼痛不可忍者

天雄炮去皮臍　附子炮去皮臍各一兩　官桂去皮一兩半　乾薑炮二兩　防風三兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食前用溫酒送下

茯苓湯

治風寒濕痹留著不去四肢痛痲拘攣浮腫

赤茯苓　桑白皮各二兩　防己　川芎　官桂　芍藥　麻黃去根節先煮掠去沫焙乾　當歸各一兩半　甘草炙三兩

右㕮咀每服六錢水二盞棗三枚去核煎至一盞去滓空心臨睡服如欲出汗服藥了以生薑熱粥投之汗出懊外風一方去防己用防風

檳蘇散

治風濕脚氣疼痛疏通氣道

檳榔　陳皮　甘草　木瓜各一錢　香附子　紫蘇各三錢

右作一服水二鍾生薑五片葱白二根煎至一鍾食前服

烏藥平氣湯

治脚氣上攻頭目昏眩脚膝痠疼行步艱苦氣不和喘滿迫促並皆治之

烏藥　茯神　白芷　當歸　白朮　五味子　川芎　紫蘇子　人參　木瓜　甘草炙各一錢

右剉作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾食前服

檳榔湯

治一切脚痛

檳榔　香附子去毛　陳皮去白　紫蘇葉　木瓜去瓤　五加皮　甘草炙各二錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

婦人脚氣多由血虛加當歸一錢

室女脚痛多由血實加芍藥一錢半

如大便秘結虛弱者加枳實壯盛者加大黃

神烏丸

治遠年近日乾濕脚氣

川烏炮去皮臍切八片炒令色變　虎脛骨酥炙　海桐皮　川萆薢各一兩　川牛膝去蘆酒浸　肉蓯蓉酒浸各一兩半　金毛狗脊燎去毛半兩

右爲細末用木瓜膏子和丸如梧桐子大每服七十丸空心用溫酒送下

紫蘇子湯

治脚氣虛弱上攻陰陽交錯清濁不分上實下虛中滿喘急嘔吐自汗

紫蘇子炒　半夏洗　前胡　厚朴去皮薑製炒　當歸　甘草炙各二錢　桂心　桔梗各一錢半

右作一服水二鍾生薑七片紅棗二枚煎至一鍾食前服虛甚者加炮附子黃芪各一錢

秘方換腿丸

治腎經虛弱下注脚膝或當風取凉冷氣所乘沉重少力移步遲緩筋脈攣痛不能屈伸脚心隱痛有妨履地大治乾濕脚氣赤腫痛楚發作無時呻吟難忍氣滿喘促舉動艱難面色黧黑傳送祕瀉並皆治之

薏苡仁　石楠葉　肉桂　天麻去苗　當歸　附子炮去皮臍　羌活　防風　天南星湯泡　石斛去根　萆薢炙　川牛膝酒浸　黃芪　續斷各一兩　檳榔半兩　蒼朮米泔浸一兩半　乾木瓜四兩

右爲細末麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸空心用溫酒或木瓜湯送下日二三服常服紆筋輕足永無脚氣之患

木瓜牛膝丸

治寒濕脚氣冷濕下注脚弱無力及腎經虛弱腰膝沉重腿脚腫急筋攣或時疼痛步履艱難大小便不利日見倦之

木瓜　川牛膝去蘆浸　當歸去尾　石楠藤　烏藥　熟地黃　肉蓯蓉酒浸焙　杏仁去皮尖　陳皮去白　黑牽牛炒　續斷　赤芍藥各等分

右爲細末酒糊爲丸如梧桐子大每服三十丸空心用木瓜煎湯送下鹽湯亦可未效用羌活木瓜酒浸或加牛膝同浸溫煖一盡許送下

抱龍丸

治肝腎臟虛風濕寒邪流注腿膝行步艱難漸成風濕脚氣足心如火上氣喘急小腹不仁不食

赤小豆四兩　白膠香另研　破故紙炒　狗脊　木鼈子去殼另研　海桐皮　威靈仙　草烏以鹽炒熟去鹽不用　五靈脂炒　地龍去土炒各一兩

右爲細末酒糊和丸桐子大辰砂爲衣每服五十丸空心用鹽酒任下臨晚食前再進一服

大鼈甲湯

治脚弱風毒攣痹氣上及傷寒惡風溫毒山水瘴氣熱毒四肢痹弱

鼈甲二兩　防風　麻黃　白朮　石膏　知母　升麻　茯苓　橘皮　芎藭　杏仁去皮尖　人參　半夏　當歸　芍藥　萎蕤　甘草　麥門冬各一兩　羚羊角屑六銖　大黃一兩半　犀角屑　雄黃　青木香各半兩　大棗十枚　貝齒　烏頭七枚　生薑三兩　薤白十四枚　麝香三銖　赤小豆三合　吳茱萸五合

以水二斗煮取四升分六服去查食前溫服如人行十里久得下止一方用大黃半兩煨畏下可止用六銖一方用羚羊角半兩毒盛可用十八銖胡洽有山茱萸半升爲三十二銖千金翼方無知母升麻橘皮芎藭人參當歸萎蕤

麻黃湯

治惡風毒氣脚弱無力頑痹四肢不仁失音不能言毒氣衝心有人病者但其病相當卽服此第一

方次服第二第三第四方

麻黃一兩　杏仁三十枚　防風　白朮　當歸　升麻　芍藥　茵蕪　黃芩　桂心　麥門冬　甘草各二兩　茯苓三兩　大棗二十枚

右㕮咀以水九升清酒二升合煮取二升半分四服日三夜一覆令小汗粉之莫令見風

第二服獨活湯

獨活四兩　熟地黃三兩　生薑五兩　葛根　桂心　甘草　芍藥　麻黃各二兩

右㕮咀以水八升清酒二升合煎取二升半分四服日三夜一服弱特忌食瓠子菘菜犯之一世治不愈

第三服兼補厚朴湯

井治諸氣咳嗽逆氣嘔吐

厚朴　芍藥　桂心　熟地黃　芍藥　當歸　人參各二兩　黃芪　甘草各三兩　吳茱萸半夏七兩　生薑一斤

右㕮咀以水二斗煮豬蹄一具取汁一斗二升去上肥井肉入清酒三升合煮取三升分四服相去如人行二十里久更進服

第四服兼補風引獨活湯

獨活四兩　茯苓　甘草各三兩　升麻一兩半　大豆二升　人參　桂心　防風　當歸　芍藥　黃芪　乾薑　附子各二兩

右十三味㕮咀以水九升清酒三升合煮三升半分四服相去如人行二十里久更進服

酒浸牛膝丸本事方

治腰脚筋骨疲無力

牛膝三兩炙黃　川椒半兩去目并合口者　附子一箇炮去皮臍　虎脛骨眞者半兩酥炙黃

右㕮咀用生絹作袋入藥紮口用煮酒一斗春秋浸十日夏浸七日冬浸十四日每日空心飲一大盞酒盡出藥爲末酢糊爲丸每服二十丸空心溫酒鹽湯任下忌動風等物

透骨丹

專治脚氣

川烏炮　羌活　沉香　乳香研　川芎　檳榔

木瓜各一兩　木香一兩半　白茯苓二兩

右爲細末麪糊和丸如梧桐子大每服六十丸食前用生薑湯送下

五斤丸

治筋不足腰脚緩弱行步艱難一切寒濕脚氣

沒藥另研　川烏炮去皮臍　虎骨酥炙令黃色　山藥各四兩　天麻切焙　川牛膝去蘆酒浸肉蓯蓉酒浸焙　木瓜各一斤

右爲細末將木瓜爛蒸研作糊和藥末如不就更用原浸牛膝酒打糊搜和杵一二千下丸如梧桐子大每服五十丸食前用溫酒或鹽湯送下

四斤丸

治腎經虛寒下攻腰脚筋脈拘攣掣痛不已履地艱辛脚心隱痛及風寒濕痹亦皆治之

木瓜　天麻　牛膝　肉蓯蓉各焙一斤

已上四味用無灰酒五斤浸春秋各五日夏三日冬十日取出焙乾再入附子炮去皮臍二兩虎骨酥炙一兩同爲細末用浸藥酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服五十丸空心煎木瓜酒鹽湯任下常服補虛除濕大壯筋骨

加味四斤丸

治肝腎俱虛精血不足足膝疲痛步履不隨如受風寒濕氣以致脚氣疼痛最宜服之

肉蓯蓉酒浸焙　乳香另研　沒藥另研各半兩

川烏炮去皮臍　虎脛骨酥炙各一兩　天麻

木瓜去瓤蒸各一斤　牛膝酒浸一兩半

右爲細末入木瓜膏和酒糊杵爛爲丸如梧桐子大每服七十丸空心用溫酒或鹽湯送下

經效立應散

治風濕脚氣

殭蠶炒去絲　麻黃去節各二兩　丁香一錢　乳香另研　沒藥另研各半兩

右爲細末和勻每服三錢用酒一盞溫熱調服取醉蓋覆得汗卽愈

不老地仙丹

治腎臟風毒輕脚壯筋

牛膝酒浸焙　當歸酒浸焙　肉蓯蓉酒浸焙　虎骨酒炙　蒺藜炒去刺　川椒去目炒出汗　莫藥鹽水煮　川芎各一兩　赤小豆　茴香炒　木鼈子去油　地龍去土　乳香另研　防風　血竭各半兩　杜仲薑汁炒去絲　沒藥另研　羌活　獨活各七錢半　天南星炮　白附子炮　何首烏　黃芪蜜炙各七錢

右爲細末酒糊爲丸如梧桐子大每服四十丸空

心煎木瓜陳皮湯送下
導氣飲
治寒濕脚氣腫赤疼痛心腹膨脹頭面手足浮腫身體腰背疼痛並皆治之
羌活　獨活　木瓜　薏苡仁　青皮　陳皮
枳殼　桑白皮　紫蘇　檳榔　木通　大腹皮
赤茯苓　大腹子　青木香　甘草各一錢
右作一服水二鍾煎一鍾食前服熱加大黃寒加蒼朮同煎湯服之郭鎮廷注知縣云昔年太學士人圍閉中多患脚腫至腹則死前後如此者非一人後卽施此方幷甘豆湯服之皆愈蓋神方也
旋覆花丸
治風毒脚氣壅熱生瘀頭項强痛
旋覆花微炒　薏苡仁炒　地骨皮　赤茯苓
升麻各一兩　白檳榔煨五枚　麥門冬去心焙
大麻仁別研如泥　前胡　防風　羌活　芎藭
馬牙硝別研各一兩半　枳殼麩炒　羚羊角鎊
白蒺藜炒去角　黑參各三分
右爲細末別研藥相和煉蜜爲丸如梧桐子大每服二十丸食後用溫漿水送下日三夜一
細辛散
治脚氣發動心腹痰壅頭痛惡聞食氣
細辛　羚羊角鎊　旋覆花　枳殼麩炒　防風
半夏　蔓荊子　芎藭　黃芩　甘草炙各半兩
蘇葉　檳榔各一兩　石膏二兩　赤茯苓三分
右㕮咀每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服
立效散
療脚氣攻心
檳榔大者七枚　生薑二兩　橘皮　吳茱萸
紫蘇　木瓜各一兩
右切碎以水二升煮取一升二合分再服
蔥蓉牛膝丸
治脚氣
肉蔥蓉洗淨焙乾　牛膝焙乾　天麻洗淨曝乾
木瓜已上各剉碎用酒三升入瓶內密封春五夏三秋七冬十日取出焙乾爲末　枸杞子揀淨洗
黃芪蜜炙　虎骨酒浸炙黃　青鹽另研各二兩
右爲細末和勻以前浸藥酒煮麪糊和丸如梧桐子大焙乾每服三五十丸食前溫酒白湯送下
乳香木瓜丸
專治遠年近日脚氣
乳香另研　血竭另研各等分
右和勻用木瓜一箇竹刀去皮心批取頂蓋將藥末攪勻將滿却用批下頂蓋合縛以麪裹之約半指厚於砂鍋內煮熟極爛爲度連麪於石臼內杵如泥丸如梧桐子大每服三十丸漸加至四十丸空心溫酒木瓜湯任下乾物壓之忌動氣生冷濕腻等物
甘簫散
治脚氣
木簫子去殼雌雄各一箇　連珠甘遂一兩
右爲細末用猪腰子二箇批開以藥末一錢摻勻紙裹數重火煨熟放溫五更初細嚼米飲湯下
如左脚患則用左腰子右脚患則用右腰子藥末只須一錢
獨活酒
治腰脚腿弱衆頭眩氣滿
獨活　石斛　生薑（一本用乾薑）　白茯苓赤者亦可
白朮各三兩　牛膝　丹參　側子炮去皮臍
草薢各二兩　薏苡仁　防風　桂心　人參
當歸切焙　山茱萸　秦艽　天雄炮去皮臍
甘菊花　芎藭各一兩半　生地黃四兩焙
右細剉用絹袋盛內淨磁甕中以清酒三斗漬之密封春夏五日秋冬七日取開量情飲之日五六服常令酒力不絕如冷加蜀椒一兩去目幷合口者炒出汗脚弱痛甚者作散每服三錢酒調下
辰砂丹
治足掌疼
辰砂　蝟楮去毒各一錢　乳香　生麝各半錢
右研爲末用皺皮草烏去皮尖三錢爲末一半入藥一半以米醋調煮熟取起和丸如菉豆大每服五十丸空心用溫酒送下
五加皮丸
治脚氣皮膚不仁發歇不定
五加皮剉　人參　惡實炒　吳茱萸湯洗焙乾
官桂　檳榔剉各二分　茯苓　柏子仁別研
芎藭各一兩　仲杜去皮炒去絲　羌活各二兩
椰李仁去皮尖研　枳殼麩炒　厚朴薑汁製
牛膝酒浸切焙各一兩半
右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空

心用溫酒送下不飲酒者橘皮湯下

沉香丸

治風毒脚氣上攻臟腑散入四肢虛腫無力

雄黑豆小者一升　附子二兩炮去皮臍切

吳茱萸湯泡焙炒　青橘皮湯浸焙各八兩

生薑四兩切碎已上五味用葛布袋盛內大鍋中以水一斗煮令水盡泣乾取袋中黑豆驅乾搗羅爲末其餘四味不用更入後藥　白附子炮　巴戟肉薤察切焙　沉香各二兩　牛膝剉酒浸焙

獨活　海桐皮炙　羌活　山芋　澤瀉　萯蕷生地黃切焙各一兩

右除前四味不用外搗爲細末拌勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心溫酒送下近晚再服

沉香大腹皮散

治脚氣腫滿沉重疼痛筋脈不利此證皆由濕氣鬱滯經絡所致服之宣通經絡使上下無礙血氣和平腿脚輕利爲效

沉香　檳榔　烏藥　桑白皮炒　木通　茴香

甘草　紫蘇子　陳皮洗焙　白茯苓　荆芥穗　紫蘇各一兩　連皮大腹子三兩　枳殼炒半兩

乾木瓜二兩半

右㕮咀每服五錢水一盞生薑五片蘿蔔五大片同煎至七分去滓食前溫服日進二服十日後日進一服病愈卽止如無蘿蔔用蘿蔔子一錢微炒搗碎同煎代之如覺大便乾燥卽服加減神功丸

甘豆湯

治脚氣腫

黑豆一兩　甘草半兩

右同煎湯服之

木瓜湯

治脚氣

乾木瓜　大腹皮　紫蘇葉　木香　羌活　甘草炙各二錢　白茯苓　陳皮各一錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

吳茱萸湯

治脚氣

吳茱萸　桂心各二兩　橘皮三兩　生薑五兩　檳榔大者十枚合皮子碎

右剉碎以水七升煮取二升半去滓分溫三服相去如人行七八里久一服覺諸狀可欲重合服亦佳服湯後將息經三四日卽服後桑根白皮等六味丸忌生葱

桑根白皮丸

治脚氣

桑根白皮五兩　生薑屑六兩　蜀椒炒出汗　五味子　桂心　升麻各四兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大初服十丸九月要服漸加至三十丸以飲送下覺熱食前服覺冷食後服忌生葱至九月以後宜合側子等十味酒服之兼服下丸方

側子酒

治脚氣

側子　牛膝　續斷各五兩　桑根白皮　白朮　生薑各八兩　五加白皮　丹參各六兩　細辛　桂心各四兩

右剉碎以絹袋盛用無灰酒五升浸五六日初服一雞子黃許日再服稍稍加之以知爲度必用前數法不覺可宜依舊脚氣方用之忌猪肉冷水桃李雀肉生菜生葱

茯苓丸

治脚氣心腹脹急不思飲食

茯苓去黑皮　枳殼去瓤麩炒　人參各三分　訶黎勒皮　陳橘皮去白　高良薑　乾薑炮　吳茱萸湯泡焙乾炒黃　官桂去粗皮　木香　白朮各半兩　木瓜一枚半切

右爲細末先將木瓜飯上蒸熟研如膏次入諸藥末和勻煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十丸空心人參茯苓煎湯送下兼治乾濕霍亂泄瀉轉筋

蓬莪朮散

治風毒脚氣吐逆

蓬莪朮煨兩半　蛤粉三兩　延胡索酒炒　陳橘皮去白各一兩

右爲細末每服一錢用炒黑豆五十粒生薑三片以水一盞將豆薑同煎至七分去滓調藥溫服不拘時候

麻仁湯

治脚氣大腸結澀不通

麻仁二合半炒　升麻三兩　豉二兩　大黃炒　射干各一兩半　陳皮炒一兩　甘草炙一分半

右剉碎每服五錢水一盞半生薑一片棗六枚煎至八分去滓下芒硝末半錢匕更煎一二沸空心

溫服

沉香羌活散

治脚氣大小便祕入腹衝心疼痛腫滿

沉香　羌活　木香　白芍藥　檳榔各三錢

川芎　枳殼　青皮　甘草各二錢　紫蘇葉

紫蘇子　木瓜各二錢半

右㕮咀每服四錢水二盞生薑三片煎至八分去滓食前溫服

海蛤散

治脚氣變成水腫小便不通喘息

海蛤　新澤漆葉　防己　木通　百合各一兩

檳榔　牽牛炒　槨李仁去皮尖雙仁炒各半兩

桑白皮炒一兩半

右剉碎每服三錢水一盞煎六分去滓日午溫服

猪苓湯

治脚氣兼水氣膈氣通身腫滿氣急小便不通坐臥不得者服之

猪苓去黑皮　赤茯苓去皮　防己各三分

桑白皮五兩炙　槨李仁去皮尖炒　澤瀉

木香各二兩　大腹皮七枚和皮子剉

右㕮咀每服六錢以水二盞煎至七分去滓食前服當利小便立效日三服

葶藶子丸

治脚氣成水腫兼上氣喘急咳嗽大小便苦澀所服利水藥反利大便惟小便轉澀者

葶藶子隔紙炒別研三兩　防己　甘草各一兩

杏仁去皮尖炒別研如脂　貝母去心各二兩半

右爲細末入葶藶杏仁拌勻以棗肉和丸如梧桐子大每服三十丸空心用大棗桑白皮糯米煎飲下如小便未快即加至四十丸

五加皮散

治江東嶺南春夏不免暑濕鬱蒸臟腑虛弱羸瘦瘴毒攻擊脚氣發動兩脚枯疼或即浮熱腫滿或即皮肉焦燥不能久立筋攣掣痛或氣衝心悶亂胷隔痰逆四肢不仁腹脹壅悶目眩頭旋并宜服之

五加皮　麻黃去根節各一兩　防風　澤瀉

獨活　丹參　桂心各半兩　石膏　赤茯苓

牛膝　防己　羚羊角鎊　升麻　黃芪各三分

薏苡仁一兩半微炒

右㕮咀每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

知母散

治瘴毒脚氣憎寒壯熱頭痛脚膝煩疼腹中妨悶飲食無味口乾多渴

知母　升麻　赤茯苓　瓜蔞根　黃芩各三分

木香半兩　柴胡一兩半　鼈甲去裙襴酥炙

檳榔各一兩

右㕮咀每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

漏蘆丸

治脚氣腫盛生瘡久不瘥膿血長流疼痛發歇不常

漏蘆　葳蕤　秦艽　大黃微炒　枳殼麩炒

檳榔各一兩　防風　獨活　黃芩各半兩

五加皮　赤芍藥　黃芪各三分　烏蛇三兩酒浸去皮骨炙微黃

右爲細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服三十丸不拘時溫酒送下

足踏丸

治脚氣腫滿痛連骨髓

烏頭三兩生去皮臍搗爲細末　樟腦二兩細研

右再研令勻釅酢爲丸如彈子大置藥一丸於爐子上中心踏之衣被蓋覆汗出如涎爲效

熏洗方

治脚氣

防風半兩　蛇牀子　黃芪各一兩　木通兩半

荊芥　莽草各二兩

右爲粗末濃煎湯極滾沸閣腿在桶上熏令通手時即洗之須是露出脚指不可洗

芎枳香蘇散（得效方）

川芎七錢　甘草二錢　紫蘇　乾葛　白茯苓

柴胡各半兩　枳殼炒三錢　桔梗生二錢半

陳皮三錢半　半夏六錢

每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎八分不拘時溫服

第一竹瀝湯（千金方下同）

治兩脚痹弱或轉筋皮肉不仁腹脹起如腫按之不陷心中惡不欲食或患冷

竹瀝五升　甘草　秦艽　葛根　黃芩　麻黃

防己　細辛　桂心　乾薑各一兩　茯苓三兩

防風　升麻各兩半　附子二枚　杏仁五十枚

水七升合竹瀝煮取三升分三服取汗千金翼方

無茯苓杏仁有白朮一兩

第二大竹瀝湯

治卒中風口噤不能言四肢縱緩偏痹擧急風入五藏恍惚恚怒無常手足不隨

竹瀝一斗四升　獨活　黃芩　防風　茵芋

生甘草　白朮土炒　葛根　細辛　白芍藥

芎藭各二兩　鳶頭一枚　桂心　防己　人參

石膏　麻黃　生薑　茯苓各三兩

以竹瀝煮取四升分六服先未汗者取汗一服相當卽止

第三竹瀝湯

治風毒入人五內短氣心下煩熱手足煩疼四肢不舉皮肉不仁口噤不能語

竹瀝一斗九升　茯苓　秦艽　防風各三兩

黃芩　人參　芎藭　細辛　當歸身　桂心

甘草　升麻　麻黃　白朮各二兩　附子二枚

蜀椒一兩　葛根五兩　生薑八兩

以竹瀝煮取四升分五服初得病時卽須摩膏日再病定止千金翼升麻作通草芎藭作防己黃芩作芍藥無麻黃蜀椒生薑

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百十四卷目錄
醫部彙考一百九十四
四肢門六
方三麻黃左經湯大黃左經湯大料神祕左經湯荷葉葉本湯半夏左經湯大料神祕左經湯
加味敗毒散六物附子湯八味丸十全
升麻四蓋木瓜丸蒼龜丸開結導飲丸
又方杉露湯二炒蒼朮散蒼莎仁酒擴脈丸虎骨酒大三脫散大腹子散
畢角散茱萸木瓜湯檳榔散木香散
地黃湯沉香散又方半夏散薤甲散
紫蘇散木香散橘皮湯沉香散
人參散
大腹皮散附子八味湯大腹皮散木通散
澤瀉散活絡丹虎骨四斤
丸膝痛餅子虎耳草丸芎歸散大聖散
加減檳榔湯導氣除濕湯更
甦丹消積萬溫湯檳榔散當歸拈痛湯
換風丸獨活寄生湯羌活勝濕湯
換骨丹
驗丸巴豆丸外應散五加皮湯琥肝丸
三帥軍丸涂濕湯牛勞根散鵝掌風
齊方藥方青葉方骨痛方
青翠玉膏生肌散黃芪丸膿瘡方
方又方奇妙駐子散又方又方
藝術典第二百十四卷
醫部彙考一百九十四
四肢門六
方三
麻黃左經湯彙驗方
治風寒暑濕流注足太陽經腰足攣痹關節重痛行步艱難憎寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭疼眩運
麻黃去節　乾葛　細辛　白朮　茯苓　防己
桂心　羌活　防風　甘草炙各等分
右㕮咀每服七錢水二盞薑五片棗一枚煎至一盞空心服
自汗去麻黃加肉桂芍藥
重著加白朮陳皮
無汗減桂加杏仁澤瀉
大黃左經湯
治風寒暑濕流注足陽明經腰脚痹痛行步艱難涎潮昏塞大小便祕澀腹痛嘔吐或復下利惡閒食氣喘滿肩息自汗譫妄並宜服之
大黃煨　細辛　茯苓　防己　羌活　黃芩
前胡　枳殼麩炒　甘草炙　杏仁去皮尖麩炒
厚朴薑製
右各等分每服七大錢水一盞半薑五片棗一枚煎空心熱服
腹痛加芍藥
祕結加阿膠
喘息加桑白皮紫蘇
小便祕加澤瀉
四肢猪痒浸淫加升麻並等分
荷葉葉本湯
治脚膕生瘡浸淫腿膝膿水淋漓熱痹痒痛
乾荷葉四箇　葉本二錢半
右㕮咀水二斗煎至五升去查溫熱得所淋漬仍服大黃左經湯佳
半夏左經湯
治足少陽經受風寒暑濕流注發熱腰脚俱痛頭疼眩運嘔吐酸水耳聾驚悸熱悶心煩氣上喘滿肩背腿痹腰腿不隨
半夏　乾葛　細辛　乾薑炮　白朮　白茯苓
桂心　防風　黃芩　甘草炙　柴胡　麥門冬各七錢半
右爲㕮咀每服七大錢水一盞半薑五片棗二枚煎至一盞去查空腹服熱悶加竹瀝每服半合喘滿加杏仁桑白皮
大料神祕左經湯
治風寒暑濕流注足三陽經手足拘攣疼痛行步艱難憎寒發熱自汗惡風或無汗惡寒頭眩腰重關節掣痛或卒中昏塞大小便祕澀或腹痛嘔吐下利惡聞食臭髀腿頑痹緩縱不隨熱悶驚悸心煩氣上膳下冷痹喘滿氣粗
麻黃去節　乾葛　細辛　厚朴　茯苓　防己
枳殼麩炒　桂心　羌活　防風　柴胡　黃芩
半夏　乾薑炮　麥門冬　甘草炙各等分
右㕮咀每服五錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至一盞去查空心服
自汗加牡蠣白朮去麻黃
腫滿加澤瀉木通
熱甚無汗減桂加橘皮前胡升麻
腹痛吐利去黃芩加芍藥附子炮
大便祕加大黃竹瀝
喘滿加杏仁桑白皮紫蘇並等分
凡有此病備細詳證逐一加減無不愈者
加味敗毒散

治三陽經脚氣流注脚踝疼熱赤腫寒熱如瘧自汗惡風或無汗惡寒

人參　赤茯苓　甘草炙　芎藭　前胡　柴胡
羌活　獨活　枳殼麩炒　桔梗　大黃煨　蒼朮
米泔浸各等分

右每服五錢水一盞半生薑五片薄荷五葉煎至一盞去查熱服

皮膚瘙痒赤疹加蟬蛻

六物附子湯

治四氣流注於足太陰經骨節煩疼四肢拘急自汗短氣小便不利惡風怯寒頭面手足腫痛

附子炮去皮臍　桂心　防己各四兩　白朮
茯苓各三兩　炙甘草二兩

右㕮咀每服五錢水二盞生薑七片煎至一盞去查空心溫服

八味丸

治少陰腎經脚氣入腹小腹不仁上氣喘急嘔吐自汗此證最急以腎乘心水尅火死不旋踵

牡丹皮　澤瀉　茯苓各三兩　附子炮去皮臍
桂心各二兩　山茱萸　山藥各四兩　熟地八兩

右爲細末煉蜜和丸梧桐子大每服五十九食前溫酒米湯送下

十全丹

治脚氣上攻心腎相繫足心隱痛小腹不仁煩渴小便或祕或利關節攣痹疼痛

肉蓯蓉酒浸　石斛　狗脊　萆薢酒浸　茯苓
牛膝酒浸　枸杞子　遠志各一兩　熟地黃

杜仲去粗皮剉炒去絲各三兩

右爲細末煉蜜和丸桐子大每服五十丸溫酒鹽湯任下

四茶木瓜丸

治肝腎脾三經氣虛受風寒暑濕搏著流注經絡遠年近日治療不痊凡遇六氣更變七情心神不寧必然動發或腫滿或頑痹憎寒壯熱嘔吐自汗

木瓜四枚　威靈仙萆薢同入　黃芪續斷同入
烏藥黃松節同入　蒼朮橘皮同入

右各半兩以木瓜切去頂蓋去瓤填藥在內却用頂蓋簪定酒灑蒸熟三蒸三曬取藥出焙乾爲末研木瓜爲膏和搗千餘下丸如梧子大每服五十丸空心溫酒鹽湯下黃松節卽茯苓中木

蒼龜丸　醫學入門

治痢後脚弱漸細

蒼朮　龜板　白芍各二兩半　黃檗鹽酒炒五錢

右爲末粥丸梧子大以四物湯加陳皮甘草煎下五七十九

開結導飲丸　東垣

治飲食不消心下痞悶

陳皮　白朮　澤瀉　茯苓　半夏製　神麯
麥糵各一兩　枳實炒　青皮　乾薑各半兩

右爲末湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服三五十九至七十九溫湯下食遠服

如有積塊者加巴豆霜一錢半

又方

治溫熱幷諸溫客搏腰膝重痛足脛浮腫

檳榔　甘遂　赤芍藥　威靈仙　澤瀉　萆薢
乳香研各二兩　沒藥研一兩　牽牛半兩

大戟炒三兩　陳皮四兩

右爲末麪糊爲丸如桐子大每服五十丸加至七八十丸食前溫水送下得更衣止後服前藥忌酒二日又忌麪及甘草三兩日食溫淡粥補胃

杉節湯　醫學正傳

治脚氣入腹衝心危急欲絕以此救之

杉木節四兩　大腹皮一兩　檳榔大者七個
青橘葉四十九片無則用皮

右剉作一貼以順流水煎服

續斷丸　本事方　下門

治肝腎風虛氣弱脚不可踐地腰脊疼痛風毒流注下部行止艱難小便餘瀝此藥補五臟內傷調中益氣凉血強筋骨益智輕身耐老

杜仲五兩　牛膝酒浸　薏苡仁　羌活　防風
五加皮　續斷各三兩　萆薢四兩　生地黃五兩

右爲末好酒三升化青鹽三兩用木瓜半斤去皮子以鹽酒煮成膏和杵丸如梧子大每服三五十丸空心食前溫酒鹽湯任下

虎骨酒

去風補血益氣壯筋骨強脚力

虎脛骨眞者　萆薢　仙靈脾　薏苡仁　牛膝
熟地黃各二兩

右細剉絹袋盛浸酒二斗飲了一盞入牛盞可得

百日婦人去牛膝

二妙散　醫學入門

治濕熱脚氣令足膝痛或赤腫脚骨間作熱痛難一點能令步履艱苦令人痿躄百用百效

蒼朮泔浸一日夜鹽炒　黃蘗酒浸一日夜炒焦各四兩

右剉五錢水煎服或水和丸服亦可

薏苡仁酒　活人書下同

治脚痹

薏苡仁　牛膝各二兩　海桐皮　五加皮　獨活　防風　枳殼炒　杜仲薑汁炙各一兩

乾生地黃二兩半　白朮半兩

右爲粗末入生絹袋內用好酒五升浸春秋冬二七日夏月盛熱分作數貼逐貼浸酒每日空心溫服一盞或半盞日三四服常令酒氣醺醺不絕久服覺皮膚下如數百條蟲行卽風濕氣散

大三脘散

治脚氣衝心腹氣飽悶大便祕滯

甘草炙半兩　獨活　木瓜焙　大腹皮炙黃　白朮　紫蘇各一兩　陳皮湯浸去白　沉香　木香　川芎　檳榔麪裹煨熟各七錢半

右共杵爲粗散每服二錢半水二盞同煎至一盞去查分三服熱服取便利爲效

大腹子散

治風毒脚氣肢節煩疼心神壅悶

大腹子　紫蘇　木通　桑白皮　羌活　木瓜　荆芥　赤芍　青皮　獨活各一兩　枳殼二兩

每四錢水一盞薑五片葱白七寸煎去查空心服

犀角散

治脚氣衝心煩喘悶亂頭痛口乾坐臥不得

犀角屑　枳殼去瓤麩炒　沉香各七錢半　檳榔　紫蘇葉　麥門冬　赤茯苓各一兩　木香　防風各半兩　石膏研細二兩

右㕮咀每服八錢以水一中盞半煎至一大盞去查入淡竹瀝一合更煎一二沸溫服不拘時候

茱萸木瓜湯

治脚氣衝心悶亂不識人手足脈欲絕

吳茱萸半兩　乾木瓜一兩　檳榔二兩

右㕮咀每服八錢以水一中盞半生薑五片煎至一盞去查溫服不拘時候

檳榔散

治脚氣衝心煩悶不識人

檳榔　木香　茴香各半兩

右㕮咀每服五錢以童子小便一中盞煎至七分去查溫服不拘時候

木香散

治脚氣衝心煩悶臍下氣滯

木香　檳榔　木通各一兩

右㕮咀每服八錢以水一中盞半入生薑五片葱白七寸煎至一盞溫服不拘時候

地黃湯

治穿心脚氣

熟地黃四兩　當歸二兩　芍藥　牛膝酒浸　川芎　三柰子各一兩　杜仲半兩薑製

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至一盞去查溫服

沉香散

治脚氣衝心煩悶喘促脚膝疼痠神思昏憒

沉香　赤芍藥　木通　紫蘇葉　訶黎勒皮　檳榔各一兩　吳茱萸半兩

右㕮咀每服八錢水一中盞半入生薑五片煎至一大盞去查不拘時溫服

桑白皮散

治脚氣盛發兩脚浮腫小便赤澀腹脅脹滿急坐臥不得

桑白皮　檳李仁各一兩　赤茯苓二兩　木香　防己　大腹子各一兩半　蘇子　木通　檳榔　青皮各七錢半

右爲末每服三錢薑三片水煎　集驗方

桑白皮散

治脚氣上衝坐臥不得咽喉不利四肢煩疼

桑白皮　赤茯苓　柴胡各一兩　甘草炙半兩　生乾地黃一兩半　射干　枳殼麩炒　貝母　前胡　赤芍　天門冬　百合　檳榔各七錢半

每服八錢水一中盞生薑五片煎至六分去查溫服不拘時

紫蘇散

治脚氣上衝心胷壅悶不得眠臥

紫蘇　桑白皮　赤茯苓　檳榔　木通各一兩　甘草炙　紫菀　前胡　百合　杏仁去皮尖各七錢半

右㕮咀每服八錢水一中盞半生薑五片煎至一盞去查溫服不拘時

木香散

治脚氣心腹脹滿堅硬不消
木香　訶黎勒皮　檳榔　川大黃煨　鼈甲醋炙
各一兩　桂心七錢半
右每服八錢水一盞半薑五片煎一盞服無時
又方
治脚氣上衝心腹妨悶
檳榔二枚　杏仁二十枚湯洗去皮
右㕮咀以水一大盞煎至七分去查分爲二服如
人行七八里再服

半夏散 集驗方

治脚氣煩悶嘔逆心胷壅悶不能飲食
半夏湯洗七次切片　桂心各七錢半　人參
赤茯苓　陳橘皮去白　前胡　檳榔各一兩
紫蘇葉一兩半
右㕮咀每服五錢水一中盞半生薑七片淡竹茹
二錢煎至七分去查溫服無時

草豆蔻散

治脚氣發時嘔逆胃中滿悶不下飲食
草豆蔻仁　紫蘇葉　赤茯苓　前胡　木通
檳榔各一兩　吳茱萸二錢五分　半夏製
枳實麩炒各七錢半
右㕮咀每服八錢水一中盞半生薑七片煎至一
盞去查溫服無時

人參散

治脚氣嘔逆心煩不能飲食
桂心七錢半　人參　赤茯苓　陳橘皮去白
麥門冬去心　檳榔各一兩
右煎服法俱同上

橘皮湯

治脚氣痰壅嘔逆心胷滿悶不思飲食
陳橘皮去白　人參　紫蘇葉各一兩
右㕮咀每服八錢水一中盞半生薑五片煎至一
盞去查溫服不拘時

沉香散

治脚氣心腹脹滿四肢壅悶不思飲食
沉香　枳殼麩炒　桂心各七錢半　大腹皮
赤茯苓　檳榔　赤芍藥　大黃煨　訶黎勒皮
桑白皮各一兩　吳茱萸湯洗　木香各半兩
右㕮咀每服八錢水一中盞半生薑五片煎至一
盞去查溫服不拘時

鼈甲散

治脚氣心腹脹滿小便不利
鼈甲去裙襴醋炙焦黃　赤茯苓　檳榔　木通
椰李仁湯浸去皮各七錢半
右㕮咀每服八錢水一中盞半煎至一大盞去查
溫服不拘時

大腹皮散

治脚氣風毒頭面脚膝浮腫心腹痞悶
大腹皮　桑白皮　赤茯苓　椰李仁　檳榔
枳殼麩炒　紫蘇葉各一兩　防風　木香
羌活各半兩　木通　羚羊角屑各七錢半
右㕮咀每服八錢水一中盞半生薑五片煎至一
大盞去查食前溫服

大腹皮散

治前證
大腹皮三兩　木瓜　蘇子　檳榔　荊芥穗
烏藥　陳皮　紫蘇葉各一兩　蘿蔔子半兩
沉香　桑白皮　枳殼麩炒各一兩半
右㕮咀每服八錢水一盞半薑五片煎至一大盞
去查溫服御醫楚侍藥方加木通白茯苓炒茴香
炙甘草四味

木通散

治脚氣遍身腫滿喘促煩悶
木通　紫蘇葉　猪苓各一兩　桑白皮　檳榔
赤茯苓去皮各二兩
右㕮咀每服四錢水一中盞半生薑五片葱白五
寸煎至一大盞去查溫服不拘時

檳榔丸

治脚氣發時大小便祕澁腹中滿悶膀胱裏急四
肢煩疼
檳榔　赤茯　蘇葉　大麻仁　椰李仁各一兩
大黃煨二兩　木香　桂心各半兩　枳殼麩炒
木通　澤瀉　羚羊角屑各七錢半
右爲細末煉蜜和搗二三百下丸如梧子大每服
三四十丸食前溫水送下以利爲度

澤瀉散

治脚氣大小便祕澁膀胱氣壅上攻心腹痞悶
澤瀉　赤茯苓　枳殼麩炒各七錢半　木通
猪苓　檳榔各一兩　牽牛二兩炒
右爲細末每服二錢生薑葱白湯調下日二三服
以利爲度

附子八味湯 活人書
治脚氣
附子炮去皮臍 乾薑炮 白芍藥 白茯苓
甘草炙 桂心各三兩 白朮四兩 人參
每服四錢水一盞煎七分食前溫服又方去桂心加乾地黃三兩

活絡丹 和濟
治前證
川烏炮去皮臍 草烏炮去皮臍 地龍去土
南星炮各六兩 乳香研 沒藥研各二兩二錢
右爲末酒糊丸如梧桐子大每服二十丸空心日午冷酒送下荊芥湯亦可

虎骨四斤丸
治前證
木瓜 天麻 肉從蓉洗淨 牛膝各焙乾一斤
附子炮去皮尖二兩 虎骨酥炙一兩
以上各如法修製先將前四味用無灰酒五升浸春秋各五日夏三日冬十日取出焙乾入附子虎骨共研爲末用浸藥酒打糊丸如梧子大每服五十丸食前鹽湯送下

勝濕餅子 醫學正傳
治遠年脚氣足脛腫如瓜瓠者
黑丑二兩取頭末五錢 白丑二兩取頭末五錢
甘遂五錢
右爲極細末用蕎麥麪一兩半調水和藥揑爲餅子如折三錢大放飯上蒸熟每一餅空心清茶嚼下以利爲度

鹿茸丸
治脚氣腿腕生瘡
鹿茸酥炙另搗成泥 五味子 當歸 熟地黃
右等分爲細末酒糊和丸如梧桐子大每服二四十丸溫酒或鹽湯食前下次服後芎歸散

芎歸散
川芎 當歸
右二味等分爲細末每服二三錢煎荊芥湯調下食後空心日進二服

大聖散 濟生
治脚氣
木香 人參 甘草炙各半兩 白茯苓 川芎
麥門冬 黃芪蜜炙 當歸酒浸各一兩
右每服四錢水一盞薑五片煎七分溫服不拘時

雞鳴散
治脚氣疼痛不問男女皆可服如人感風濕流注脚足痛不可忍筋脈浮腫宜服之
陳皮 木瓜各一兩 吳茱萸 紫蘇葉各三錢
桔梗 生薑和皮各半兩 檳榔七枚
右咬咀只作一遍煎用水三大椀慢火煎至一椀半去查再入水二椀煎查取一小椀兩次藥汁相和安置牀頭次日五更分作三五服只是冷服冬月略溫服亦得服了用乾物壓下如服不盡留次日漸漸服之亦可服藥至天明大便當下黑糞水卽是腎家元感寒濕毒之氣下也至早飯痛住腫消只宜遲喫飯候藥力作效此藥不是宣藥並無所忌

加減檳榔湯
治一切脚氣春夏多宜服之
檳榔 橘紅 紫蘇莖葉各一兩 甘草炙半兩
右每服五錢水一盞半生薑五片煎至八分去查溫服不拘時
如脚痛不已者加木瓜五加皮
婦人脚痛卽當歸
室女脚痛多是肝血盈實宜加赤芍藥師尼寡婦亦然
中滿不食者加枳實
痰欬或嘔者加半夏
腹痛大便不通者用此湯下青木香丸如更不通加大黃
小便不利者加木通
轉筋者加吳茱萸
脚腫而痛者加大腹皮木瓜
足痛而熱加地骨皮

導氣除濕湯
治脚氣
威靈仙 荊芥穗 當歸 地骨皮 白芍藥
萵薹葉 防風 升麻
右等分剉細水二斗煮取一斗五升去查乘熱淋洗無時

更甦丹 華佗
治骨節疼痛語言不正行步艱難手足顫掉搐搦
川烏頭二兩 草烏頭一兩 五靈脂四兩
右爲末滴水爲丸如雞頭大每服一丸研碎入酒

一盞生薑三片地黃三條乳香少許同煎至七分臨臥通口服喫了須摩擦患處令熱徹以助藥力如合時入乳香末一二錢即煎時更不須入

清熱瀉濕湯（醫學正傳）

治濕熱脚氣腫痛諸證

蒼朮　黃蘗鹽酒炒各一錢　紫蘇葉　赤芍藥　木瓜　澤瀉　木通　防己　檳榔　枳殼麩炒　香附子　羌活　甘草各七分

右剉作一貼水煎服

痛加木香

腫加大腹皮

熱加黃連大黃

檳蘇散

治風濕脚氣腫痛拘攣用此疏通氣道

蒼朮二錢　香附子　紫蘇葉　陳皮　木瓜　檳榔　羌活　牛膝各一錢　甘草五分

右剉作一貼入薑三片葱白三莖同煎服

當歸拈痛湯（傷生寶鑑）

治濕熱脚氣腫痛

羌活　茵陳酒炒　黃芩酒炒　甘草炙各一錢　知母鹽水炒　澤瀉　赤茯苓　猪苓　白朮　防己各六分　人參　苦參　升麻　乾葛　當歸　蒼朮各四分

右剉作一貼水二盞浸藥少時煎至一盞空心臨臥各一服

搜風丸（丹溪心法）

治脚氣腫痛

黑牽牛子頭末二兩　大黃　檳榔　枳實各五錢

右爲末糊丸梧子大米飲下三五十丸

獨活寄生湯（同上）

治肝腎虛弱筋攣骨痛脚膝偏枯緩弱冷痹

獨活　當歸　白芍藥　桑寄生各七分　川芎　熟地黃　人參　白茯苓　牛膝　杜仲　秦艽　細辛　防風　肉桂各五分　甘草三分

右剉作一貼薑三片水煎空心服

羌活續斷湯（證疑）

治脚氣肝腎虛弱筋攣骨痛

羌活　防風　白芷　細辛　杜仲　熟地黃　秦艽　續斷　牛膝　當歸　人參　白芍藥　赤茯苓　桂心　川芎各五分

右剉作一貼薑三片水煎服

勝駿丸（三因方）

治脚氣拘攣疼痛行步不隨去一切足弱病

木瓜四兩　當歸酒浸　天麻酒浸　牛膝酒浸　酸棗仁炒　熟地黃酒浸蒸搗　防風各二兩　全蠍去毒一兩　附子一枚炮去皮臍　乳香　沒藥　羌活　木香　甘草各五錢　麝香二錢

右爲末生地黃二斤洗淨杵爛如泥好酒四升同煮如膏和前藥搗令堅每一兩作十丸每取一丸臨睡細嚼酒下或丸如梧子大酒下五十丸亦可服至半月行步如飛故名曰勝駿冬月不用地黃只煉蜜作丸

捉虎丹（醫學入門）

治脚氣走注疼痛不可忍

五靈脂　白膠香　草烏用黑豆同煮去豆不用　木鼈子　地龍各一兩半　乳香研　沒藥研　當歸各七錢半　麝香研　松烟墨煅研各二錢半

右爲末糯米糊和丸芡實大每一丸空心溫酒化下趕到脚面赤腫不散再服一丸趕至脚心中出黑汗乃除根

卷柏散（得效方）

治遠年脚氣難治者此方特效

卷柏東向者佳先以鹽水煮半日即甘冷水煮半日焙乾　黑牽牛頭末　甘遂　檳榔

右各爲末不得相雜每服每件各取一錢惟檳榔二錢五更初濃煎葱白湯調下至辰巳時取下惡物如魚凍虛人減半服隨喫淡粥更服湯藥加消熱瀉濕湯調之

枳殼散

治脚氣春夏即發或心腹塞悶脚膝煩痛大便不利小便赤少

枳殼麩炒　紫蘇莖葉　赤茯苓各三分　檳榔　大黃剉微炒　赤芍藥各一兩　木通　五加皮　羚羊角屑　獨活　黃芩　甘草炙各半兩

右剉碎每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓食前溫服

高良薑丸

治脚氣心腹脹滿兩膝疼痛

良薑　當歸　威靈仙　檳榔　羌活各七錢半　牽牛炒　蘿蔔子炒各二兩　桂心　橘皮各半兩

右爲細末煉蜜和搗二三百下丸梧桐子大每服

三四十丸溫酒送下不拘時以利爲度
巴豆丸
治脾胃內傷酒食下注脚氣
白朮炒　陳皮炒　澤瀉　麥芽炒　神麴炒
茯苓　半夏薑製各一兩　青皮　乾薑各五錢
枳實炒　巴霜各一錢半
右爲末湯浸蒸餅丸梧桐子大每服五六丸或十丸溫水下此藥能引水下行運脾中濁氣
外應散
治脚氣用此熏蒸
石楠葉　矮樟葉　杉片　紫荆皮　藿香
藁本　獨活　大蓼　白芷　紫蘇　羌活
加大料五十粒葱一握煎水二斗置盆內令病者以足加其上用厚衣盖覆熏蒸痛處候可下手時令人淋洗
五加皮湯
治筋實極咳則兩脅下痛不可轉動並脚心痛不可忍手足爪甲青黑四肢筋急
羌活　羚羊角鎊　赤芍藥　防風　五加皮洗
秦艽　枳實麩炒　甘草炙各半兩
右爲細末用雄羊腎兩對以葱椒酒煮爛入少酒糊杵丸桐子大每七十丸空心鹽湯下
積肝丸
治四肢攣縮不伸等證曾有人自幼年酒多長而風痰爲酒使痰注骨節四肢不能運動服此有效
茯神去心木　白茯苓去皮　薑黃　五加皮
白朮　黃芪　羌活　川烏炮去皮臍　薏苡仁

木瓜　半夏麴　神麴　天雄炮去皮　白芍藥
乳香別研　沒藥別研　防風　獨活　延胡索
當歸　桑寄生　海桐皮去粗皮　陳皮去白
木香　枳殼麩炒　天南星炮　地龍去土焙
荆芥穗各三錢　麝香一錢
右用豬肝一具洗淨煮存性研爛同藥末酒糊爲劑搗千杵丸如梧桐子大每服三十丸用溫酒吞下如不飲酒用木瓜湯送下
三將軍丸（得效方）
治脚氣衝心大便不通
吳茱萸　木瓜　大黃各等分
右爲末米糊和丸梧子大枳殼湯下五七十丸
滲濕湯
治坐臥濕地或爲雨露所襲身重脚弱關節疼痛發熱惡寒或多汗惡寒或小便不利大腑溏泄
白朮三錢　乾薑炮　白芍藥　附子炮去皮臍
白茯苓　人參各一錢　桂枝　甘草炙各半錢
右作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎至一鍾不拘時服
牛蒡根散
治傷寒汗不出手足攣搐不能屈伸
牛蒡根十段　麻黃去根節　牛膝　南星各六錢
右細剉於石器內入好酒一升同研細另用炭火半杵燒一黃土地坑令通赤去火掃淨投藥於坑內再用炭火燒令黑色取出研爲細末每服一錢以好酒溫熱調下日三服效外以百草膏貼之良
鵝掌風癬方（葉心仰方下同）

木銀　蛇牀子　花椒各六錢　大槐子八錢
枯礬三錢　木鼈子四箇　樟腦　輕粉各二錢
爲末以猪油調搽脚上亦同用
鵝掌風方
川烏　草烏　何首烏　赤芍　防風　荆芥
天花粉　蒼术　地榆　艾葉
共煎水熏洗
膏藥方
治裙邊瘡
蒺藜四錢　冰片　麝香各一分　乳香去油
沒藥去油　輕粉各一錢　龍骨　象皮各二錢
右八味爲末用麻油四兩熬滾先放松香二兩熬至滴水成珠後入鉛粉二錢黃丹一兩取起聽貼
膏藥方
治裙邊瘡及久爛者
柏子油一斤用文武火熬至黑色再入鉛粉八兩熬滴水成珠取起入後藥末　輕粉　象皮各三錢
乳香　沒藥各四錢二味去油
右共研末入前油內紙攤貼
隔紙膏藥方
治爛脚
桐油一斤熬滾入頭髮四兩熬至髮鎔化濾去查
黃蠟　白蠟　象皮末各一兩　輕粉三錢
右共爲細末入油內調勻用
生肌散
治爛脚
甘石　龍骨各四兩　麝　冰片各五分　象皮

沒藥各二兩　雄黃　硃砂各三錢　輕粉
光粉各五錢　黃丹　黃蠟各一兩五錢　牡蠣煅
三兩
共研末摻患處

黃芪丸局方

治兩膝脚膝生瘡服此立安
川烏頭炮去皮臍　川楝子　地龍去土炒
馥香炒　杜蒺藜炒去刺　赤小豆　防風
黃芪剉各一兩　烏藥
右爲細末酒煮粳糊爲丸如梧子大每服十五丸
溫酒下鹽湯亦得婦人酢湯下並空心服

膝瘡方

白膠香　黃蠟　軟石膏另研各一兩　青黛
龍骨各半兩
右爲細末以香油調敷患處

又方

用羯羊尿二分　石膏一分　赤石脂半分
爲細末香油和之舊黑油傘紙作隔膏縛之除根

翠玉膏

治膝瘡
瀝青一兩　黃蠟　銅綠各二錢　沒藥去油
乳香去油各一錢
右件先將銅綠爲細末入香油調勻又將黃蠟瀝
青火上鎔開次下油銅綠火上攪勻將沒藥等二
味旋旋入攪勻用河水一椀將藥傾在內用手扯
拔勻油紙裹看瘡大小作大小塊口嚼捻成餅子
貼於瘡上紙封三日易之

乳香散郭氏

一名白膠香散治諸瘡浸蝕日久不愈下注膝瘡
內外踝生頑瘡等證
枯礬　白膠香　赤石脂各半兩　黃丹　乳香
沒藥各三錢　輕粉二錢
右爲細末加麝些少如瘡濕乾上乾則香油調敷

膝瘡方

鼠糞　苦參　桃枝　杉樹刺　柳枝　松枝
麩醬　雞子殼　皂角　雀糞　芍藥　木綿子
芝麻　桑枝　蛇殼　鍋底煤　杜當歸鬚各四錢
右爲細末先將松明不拘多少搥碎和諸藥於瓦
銚中掘一地坑將藥銚安坑中四圍用火熬鎔取
出再研令勻敷瘡自然痊可忌一切發氣熱物

隔紙膏

治內外膝瘡
輕粉一錢　黃丹六錢　當歸　黃連　五倍子
海螵蛸　雄黃　白芷　沒藥　血竭　白蘞
白芨　黃蠟　厚朴各半兩　乳香研二錢半
右爲細末研勻用清油調成膏用油紙貼藥敷瘡
上絹帛縛定有膿水解開刮去不淨潔再貼藥如
此數次卽愈須先用燒鹽湯洗淨片帛拭乾待片
時水氣乾然後貼藥

又方

治膝瘡久不愈
龍骨二錢半　輕粉少許　乳香　沒藥各一錢
檳榔　乾猪糞各半兩燒灰存性
右爲細末先以燒鹽湯洗瘡以軟絹帛拭乾清油
調敷瘡濕則乾摻之

又方

治膝瘡下注
白石脂　龍骨各半兩　五倍子二兩燒存性
黃丹三錢飛　雄黃少許　白礬一兩枯
右爲細末先將葱鹽湯洗瘡見赤肉然後將前藥
敷瘡上用藥如法厚者却用帛子包縛著不要動
直候乾自脫去瘡皮

膝瘡方

黃丹　輕粉　白芨　樟腦　敗船灰各等分
右爲細末以桐油調成膏攤在油紙袋內先將溫
葱湯洗淨以帛拭乾將藥置瘡上紮住用了一面
番轉如前洗貼一方無輕粉若用糞船灰亦妙

又方

詹武子年三十時曾患膝瘡用之屢效
白芨　白蘞　黃蠟　黃丹另研各等分
右爲極細末入輕粉些少研勻以煉蜜和成劑捏
作餅貼瘡上深者填滿以帛片包紮一日一週時
來瘡漸乾或有裂處只須乾摻以瘥爲度

血注脚方

牛屎菰又名石灰菰生地上如有石成塊者碎其中
有灰起　肥儲樹菰　桑樹菰　胎髮男用男女用
女一本男用女　女用男三箇
右將三菰焙乾各五錢胎髮燒灰存性三錢並爲
細末研勻溫則乾摻乾則清麻油調塗

膝瘡方

冬青葉　臘猪膽　百草霜二味和勻

右將冬青葉與本人嚼爛先以葱椒湯洗淨瘡口以膏敷後却傅嚼葉在上三四次即可

奇妙梔子散

治遠年日久內外臁瘡

輕粉少許　山梔子不拘多少燒存性研爲細末乳香另研各半錢

右研末以磁器盛每用時先以葱白花椒煎湯洗淨瘡稍歇再以溫漿水又洗二次候惡水去盡再將白水煎百沸候溫再洗但瘡口無膿水血絲清水各盡又用粉帛片拭乾然後傅藥如乾者香油調敷濕者乾摻但將瘡口實滿軟絹帛護之堅硬不作膿者未可用腫而軟有膿者依前法再洗後敷貼之二三次即愈乃一藥二洗之功也

又方

治男子兩足搔癢生瘡連年累月俗爲腎風瘡宜服此藥

黃芪　牛膝各半兩　羌活　獨活　白附子　川芎　防風　木香各二錢半　白殭蠶一兩去刺

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服三十丸空心鹽湯送下仍以後藥傅之

又方

檳榔　木香　防風　白芷各二錢　白芍一錢　龍骨五分煅研　麝香一字研　臘粉十五筒　蛇退一條燒灰

右爲細末研勻先以鯽魚一條搥碎百部一兩切碎南椒三錢油一兩煎令得所去藥只以油搽瘡口却傅末藥上以油紙裹之三日一換每上先用柳枝甘草煎湯洗瘡淨拭乾傅藥

驢蹄散

治腎臟風毒下注生瘡

驢蹄二十片燒灰　輕粉一錢七　麝香半錢七　密陀僧二錢半研

右研細末以帛拭去膿用些少乾摻日三四次瘥

氈蠻散

治脚爛瘡

竹蛀屑　氈燒灰　紅褁燒存性　黃丹　韶粉　白礬枯

右各等分爲細末摻之

龍骨散

治脚疽并久遠惡瘡他藥不效者

白龍骨研　輕粉各二錢半　檳榔一錢研

猿猪糞不拘多少新瓦焙乾入火中燒令紅取出存性研爲細末五錢

右研令勻先以口含鹽水或溫鹽湯洗令瘡淨見肉却以眞麻油調藥隨瘡大小傅之未愈再傅三五日可

牛黃金虎丹

牛黃研二兩半　龍腦研五兩　臘粉　白礬枯

天竺黃研　天南星湯洗焙研末用牛膽汁和作餅陰乾無牛膽用法酒蒸七晝夜研各二十五兩

雄黃研飛一百五十兩　金箔八十片爲衣

天雄炮去皮臍研十二兩半

爲末煉蜜搜和每一兩半作十九以金箔爲衣每服一丸新汲水化下有孕婦不可服

牛膝散

治足蜘蛛背

雞屎子　詐死子　兩面龜　赤牛膝　紫金皮　山蜈蚣　凌霄根　脫殼蘇　天布根　赤葛根　背子蜈蚣

天蕎麥　鹿葱根　紫金皮　山布瓜　凌霄根　藜蘆子　天南星　赤葛根　雞屎子　苦薄荷　天布瓜　背子蜈蚣

右水煎入酒和服

敷藥方

右砍爛入些酢暖塗敷

松脂膏

治肉刺

松脂　白蠟香各一兩　黃蠟半兩

右於火上鎔成膏冷貼用物紮定

無食膏

治肉刺

無食子三枚　肥皂角一挺

右燒令烟盡細研以醯酢於沙盆內別磨皂角如糊和末敷之立效

熏硫散

治肉刺

熏陸香　石硫黃

右等分研勻塗肉刺上以燒釵烙之效

蟾酥膏

治肉刺

蟾酥五片湯浸溫　臘粉一錢

右將蠟酥於盆子中以膩粉同和令勻先用針撥破頭邊然後塗藥密裹之

潤肌膏 寶鑑

治手足皴澀皮膚裂開疼痛

珠子瀝青四兩　黃蠟八錢　乳香二錢

右三味於鐵器內用文武火熬下瀝青在鐺內隨手便下黃蠟乳香次入清芝麻油一二匙候瀝青盡鎔開微微熬動放大淨水一盆於其旁以攪藥用匙取一二滴滴於水中試之如硬再入油如軟硬合宜用新綿濾淨入水中折疊扯之以白爲度油當旋旋入勿令軟了磁器盛或油紙裹亦得每用不拘多少先於火上炙裂子口却捻合裂子藥亦火上炙軟塗於裂子上用紙少許貼之卽合

丹溪方

治老人脚膝疼稍腫

生地　當歸頭　白芍藥　蒼朮　炒蘗各三錢

川芎　桂各二錢　木通一錢半

分四貼煎取小盞食前熱服

祕傳隔紙膏

治內外臁瘡年久月深不愈者

老松皮一本松香　樟腦谷　丹砂炒一本黃丹　水龍骨

輕粉　川芎　海螵蛸

右爲細末鎔化松香加清油少許和之入藥勻以油紙隨瘡口大小糊袋盛藥夾之用水洗瘡乾淨方貼上用絹紮三日換一次若單用白芷川芎海螵蛸煎水洗亦可此證多年久不愈者多是腎水虛敗下流爲患又有脾潰溢可服前苦參丸補腎水及用解毒生肌定痛散次用前隔紙膏藥

華佗方

治嵌甲累效

硇砂　乳香并研各一錢　橄欖核三箇燒存性

黃丹一字　膩粉半錢

右爲末以生麻油調先以鹽湯洗淨挹乾傅之二次效

換骨丹

通治風兼治鶴膝風

防風　牛膝　當歸　虎骨酥炙　羌活　獨活

敗龜板　秦艽　萆薢　松節　蠶沙各一兩

枸杞二兩半　茹根洗二兩　蒼朮四兩

酒浸或酒糊丸皆可

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百十五卷目錄

醫部彙考一百九十五

四肢門七

方四　隔紙膏　六神丹　防風湯
海桐皮酒　犀角散　方　遲少丹
獨活湯　地仙丹　二蠶湯　治傷手痛方
龜骨膏　馬齒膏　桐油膏　新
艾膏　蠟礬膏　黃蠟膏　仙方活
命飲　黃白散　三香膏　泥油膏
柿根膏　蛾蛻散　又方　敷穿
掌穿板藥　浚洗方　接毒散　治蛇齒腫
又方　地龍散　敷毒方　散
除痺治痛散　蛇頭瘡方　升麻湯　赤箭膏
雄黃散　解毒內生湯　蛾蛻錢　風石蜴藥
金膏　四生丸　解毒雄黃散　神聖驅法　解毒瀉脾
如意金黃散　枯礬散　牛角散　消毒
湯氣飲　生鳳玉紅膏　枳殼湯　苦參丸　定痛
流氣飲　定痛流氣飲　消毒　流氣飲　定痛
內托飲　內托流氣飲　定痛　敗毒流氣
敗毒散　內托消氣飲　內托散　飲
木香流氣飲　紫蘇　流氣飲　追風除濕圓藥
又方　加味　流氣飲　木瓜槓
檳散　羌活散　除陽二氣丹　消腫散　雞
蜂露蘆火　金箔戊土丹　保安　揭鑒丹　聖
愈湯　蟾酥丸　除濕木瓜湯

藝術典第二百十五卷

醫部彙考一百九十五

四肢門七

方四

隔紙膏

治臁瘡濕毒瘡

石膏煅研末　白礬枯研末

各等分桐油調成膏作隔紙膏貼之更服荊防敗毒散如數劑不應宜服人參黃芪湯

六神丹

治男婦小兒內外臁瘡身上癰者俱愈

花粉炒黃三兩六錢　冰片二分　輕粉四錢

黃丹水煮過曬乾一兩

共爲末每用少許摻患處外用冬青葉貼住一日換二次

癬瘡方

治脚上生癬瘡者

水銀六分　雄黃　花粉炒黃各一兩　吳茱萸

黃蘗二兩

右共爲末燭油調搽

防風湯

治風毒中人留於血脈不散與營衛相搏結成風疽身體煩熱昏冒腫痛

防風　柴胡　羌活　當歸切焙　白芷　木通
附子炮去皮臍　麻黃去根節煎掠去沫焙
桔梗炒　甘草炙各一兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後臨臥各一服如欲出汗空心併兩服後投以熱薑湯稀粥蓋覆取汗愼外風

海桐皮酒

治熱毒風結成疽腫痛不得安

生地焙三兩　海桐皮　五加皮　獨活　杜仲
防風　乾蠍炒　薏苡仁炒　牛膝酒浸各一兩

右㕮咀生絹囊貯以好酒一斗五升浸磁瓶中密封秋夏三日冬春七日食前溫服三合或四五合不拘時常令酒氣相續

犀角散

治脚氣風毒生瘡腫痛心神煩熱

犀角屑　天麻　羌活　防風　黃芪　白蒺藜
黃芩　枳殼炒　白蘞皮各七錢半　檳榔一兩

烏蛇二條酒浸　甘草炙半兩

右㕮咀每服八錢以水一中盞半生薑五片煮至一大盞去滓溫服不拘時

又方

治脚氣上生風毒瘡腫疼痛

蒺藜二兩　漏蘆　白蘞　槐白皮　五加皮
甘草各七錢半

右㕮咀每用五兩水一斗煮取六升去查看冷熱於無風處淋洗之

還少丹

治足三陰經虛損患鶴膝等證又補脾腎進飲食之良劑也

肉蓯蓉酒浸去甲　遠志甘草湯泡去骨　山藥
蘘荷炒　巴戟去心　枸杞子　牛膝　石菖蒲
杜仲　熟地搗膏　五味子　白茯苓　楮實子
山茱萸肉各等分

右爲末用紅棗肉同蜜爲丸梧子大每服七十丸溫酒下每日三服白湯亦可

獨活湯

治鶴膝風不問腫潰疼痛及腰背四肢不仁

甘草炙五分　獨活　當歸　白朮　黃芪炒
薄桂　牛膝各一錢

右薑葱水煎服量人加減

地仙丹

治腎氣虛憊風濕流注脚膝痠疼行步無力

川烏炮一兩　川椒去目及閉口者炒出汗　附子炮　蒺藜酒浸焙各四兩　菟絲子製　羌活　防風　覆盆子　白附子　牛膝酒浸　首烏　萆薢　南星薑製　赤小豆　狗脊去毛　烏藥　骨碎補去毛各三兩　人參　黃芪各一兩半　白茯苓　白朮　甘草各一兩　地龍去土　木鼈去殼各三兩

右爲細末酒糊丸梧子大每服四十丸空心溫酒下

二妙湯 外科正宗

治鶩掌風皮膚枯厚破裂作痛宜用此湯熏洗輕則不宜越重越效

白礬　皂礬各四兩　孩兒茶五錢　柏葉半斤

右用水十椀入上藥四味煎數滾候用先用桐油搽抹患上以桐油蘸紙燃點着以烟焰向患上熏之片時方將前湯乘滾貯淨桶內手架上用布蓋以湯氣熏之勿令洩氣待微熱傾入盆內蘸洗良久一次可愈七日忌下湯水永不再發

謝傳傷手瘡方

治手上生瘡腫痛作膿抓破汁流

猪屎火煅　檳榔各五錢　片腦五分　花椒　龍骨各三分

右爲末乾摻濕者麻油調搽有膿水加輕粉一錢

龍骨膏

治臁瘡

五色龍骨煅　乳香　沒藥　密陀僧各二錢　海螵蛸錢半　肥皂子五箇燒存性

右共爲末用綿紙雙重以針扎亂孔清油調藥夾內縛貼瘡上隔日一番兩面貼之

馬齒膏

治三十六種風瘡多年惡瘡及臁瘡濕癬白禿杖瘡旋加梳垢可封疔腫

馬齒莧

右一味煎汁一釜入黃蠟三兩慢火熬成膏塗之

窑土膏

治臁瘡

經年窑竈土 黃丹　輕粉　黃檗　乳香　沒藥　赤石脂

右各等分爲末清油調成膏用傘紙夾住貼之以絹縛定縱癢不可動直待臁瘡結痂去之未愈再貼先以清茶洗過方貼

桐油膏

治臁瘡

桐油二兩　百草霜　黃丹　髮灰　乳香各三錢

右同熬成膏攤油紙上貼之血虛痛甚者尤宜冷者加鹿角灰如經年紫黑色者先用爐灰膏去瘀後用此膏

靳艾膏

治臁瘡

靳艾　川椒各五錢　水粉一兩　黃丹三錢　輕粉一錢

右爲細末熟麻油調膏隔紙貼之效

蠟礬紙

治臁瘡

綿紙疊十二重看瘡大小剪成方塊以紙撚釘住却用麻油二兩入川椒四十九粒

右用慢火煎枯黑去查入槐枝四十九寸煎枯黑去滓入黃蠟一兩枯礬一錢輕粉二錢俟鎔化卽入前紙令油滲透勿使焦黃取起貼時用槐枝蔥椒煎湯洗拭取前紙貼上外另用油紙絹緊縛周時取下近瘡紙一重候紙取盡則瘡全愈其效如神氣虛膿多者尤宜

黃蠟膏

治臁瘡

香油一兩入胎髮如梅子大熬消化　入白膠香　黃蠟各一兩鎔化　入生龍骨　赤石脂　血竭末各一兩攪勻俟冷磁器收貯

右每用捏作薄片貼瘡上外以箬葉絹帛縛之三日後翻過藥貼以活血藥煎湯洗之外臁亦妙

爐灰膏

治一切無名腫毒惡瘡及臁瘡經年紫黑色者

礬糖爐內灰一升半　風化石灰一升炒紅

右以竹箕盛貯用滾湯三椀慢慢淋自然汁一椀銅鍋盛慢火熬如稀糊先下巴豆末次下蟾酥各二錢白丁香末五分炒石灰一錢攪勻再熬如乾麪糊取起俟冷以磁罐盛貯勿令泄氣每用時以箸頭挑少許放指甲上研口呵氣調勻如泥將患處用針撥開以藥點之

仙方活命飲

治一切癰毒瘡瘍并臁瘡發寒熱者
甘草節　赤芍藥　白芷　天花粉　貝母
乳香各一錢　防風七分　歸尾　皂角刺
陳皮各一錢半　金銀花三錢　沒藥五分
大黃五錢　穿山甲三片
右用瓦罐煎密封罐口勿令泄氣煎熟隨瘡上下飲之服後再飲酒二三杯側臥而睡忌酸物鐵器此藥不動臟腑不傷氣血

黃白散
治臁瘡濕毒及遍身熱瘡
黃檗一兩　輕粉三錢
右爲末用猪膽汁調塗濕則乾摻

三香膏
治遠近臁瘡潰爛至骨疼痛
乳香二錢　松香三錢
右爲細末用眞香油調用芰荷葉密密刺孔將藥攤在上用荷葉貼患處藥居中上用完荷葉蓋之帛紮住登時止痛

夾紙膏
治臁瘡頑瘡
松香　黃丹　蓖麻子去殼各等分
右爲末用香油調隔油紙攤藥夾紙中貼患處

泥油膏
治病藕包
塘泥一分　桐油二分
右和勻以鴨毛掃時時塗勿令乾

二瓜散
治前證
山布瓜根　天布瓜根
右砍爛入米醋少許和暖塗之

柿根膏
治蜘蛛背
紫背草　狐柿子根皮
右砍爛糟炒敷之又方加巖松子或單用亦可

蜈蚣散
治穿掌
穿山蜈蚣　花心蜈蚣　背子蜈蚣　赤牛膝
金頭蜈蚣　臭不待根　飛天蜈蚣　山蘇木
酒罐子根　紫背草　紫金藤
右酒煎服不飲酒人水煎入少酒和服又用過路蜈蚣溪女葉煎水浸洗

又方
穿山蜈蚣　雞屎子　金腦香　紫金藤
右水煎入酒和服

敷穿掌穿板藥
仙人掌根　雞屎根皮　赤葛根草　背子蜈蚣
山樟根皮　落鵝鎗根　天布瓜根　山布瓜根
葛合根　赤牛膝　紫河車　山枇杷根皮
紫金皮
右擂爛入醋少許和塗患處

浸洗方
石楠藤　赤牛膝　赤麻黃　九節香　猪屎蘇
鐵綫角　舍笑葉　鐵梗子　落鵝鎗　山蓼葉
穿山蜈蚣　八角茴香　赤黃子
右煎水熏浸淋洗之

落鵝鎗散
治鵝叉
落鵝鎗　大金錢　羊蹄菜　水楊柳根
右砍爛糟炒敷之

紫金牛膝散
治手牛押瘤及脚上一切腫毒堆核煞痛者
赤葛根皮　赤毛桃根　山布瓜根　天布瓜根
魚桐皮根　落鵝鎗根　紫金皮　赤牛膝
右砍爛糟炒熟敷患處

又方
魚桐皮根　落鵝鎗根　紫金皮
右砍爛糟炒敷之

又方
落鵝鎗　葛合根　馬藍草　天布瓜　山蘇木
紫金皮　赤毛桃　赤牛膝　山布瓜　芙蓉葉
魚桐根　赤葛根　李子根
右搗爛糟炒敷之久不退加山樟子葉及根皮

拔毒散
治毒瘡生於手指赤腫堅硬俗呼爲發指徹骨疼痛不可忍者
乳香少許研　泥蜂巢研
右爲末用釅醋調塗乾則以醋潤之痛立止

治蛇消腫散
治蛇咬及蛇節疔蛇腹疔蛇頭疔蛇背疔等證
蛇頭抓　天虌藤　木蝨藥　仙人著　土木香
紫金藤　大小青

右擂酒溫服以查敷之

除瘴消痛散

治蛇頭毒及一切蝮蛇瘴

紫金藤又名開心草

右擂酒服之以查敷患處大效

地萹蓄散

治蛇頭毒

耳環尻又名琉璃草又名花管草又名地萹蓄

右擂酒服又以砍爛酒炒敷之

敷毒方

治蛇頭一切蝮蛇瘴

地萹蓄　金腦香　紫河車　紫蜈蚣　金鳳尾

金雞舌　飛天蜈蚣

右砍爛酒炒敷之

浸毒散

治前證並效

飛天蜈蚣　石楠藤　鐵菱角　穿山蜈蚣

背子蜈蚣　赤麻蕒　金腦香　梭婆子根

毛藤子　赤梗過路蜈蚣

右水煎入些酢和煖浸洗

蛇頭瘡方

其形生時在手足上瘡旁一塊開如蛇口之狀痛而流血不止者此藥治之

雄黃　蜈蚣　全蠍各一錢

右爲細末看瘡濕劈開入藥擦在瘡上却以小磨油抹裁帛拴住如乾小磨油調搽

升麻湯

治代指

升麻　甘草各半兩

右細剉水二升煎至一升去滓下芒硝末半兩攪勻溫浸指上數十遍冷即再煖以差爲度一方用梔子仁甘草各一兩一方單用甘草一方單用芒硝一方單用麻黃並如上法煎浸

赤葛膏

治病藕節及臂臑腕掌等處結毒

赤葛根皮　山布瓜根　山蘇木　山樟根皮

紫金皮　赤牛膝　赤芎根　赤毛桃根

右用皮砍爛糟炒敷塗患處

肌石蝓藥

山樟木葉

右砍爛糟炒敷之又用根煎酒服之

雄黃散 外科正宗下同

治天蛇毒初起紅腫發熱疼痛徹心者宜用之

雄黃明亮者二錢　蟾酥二分微焙　冰片一分

輕粉五分

共爲細末新汲水調塗紙蓋口用三次極效矣

解毒濟生湯

治脫疽初起惡寒體倦發熱作渴或腫或紫或痲或痛四肢倦怠心志恍惚不寧者並宜服之

川芎　當歸　黃蘗　知母　遠志　天花粉

柴胡　黃芩　犀角屑　白茯苓　金銀花

麥門冬各一錢　甘草　紅花各三分

水二盃煎八分臨服入童便一盃隨病上下服手指加升麻足指加牛膝各五分

蜈蚣餞

治臁瘡多年黑腐臭爛作疼諸藥不效者

獨活　白芷　甘草　蜈蚣各一錢

桐油二兩以上四味入油內煎滾先將臁上洗淨用白麪水調作圈圍在瘡之四邊毋令洩氣走油將脚放平以茶匙挑油漸漸乘熱加滿待油溫取去已後腐肉風毒自然脫下用解毒紫金膏搽上紙蓋絹紮三日一換

解毒紫金膏

治臁瘡毋論新久及頑瘡年久不愈者並用之

細塊礬　紅明淨松香各一斤

共搗極細末麻油調稠先將患上用前湯熏洗潔淨搽上此藥油紙蓋住以軟布條要紮至緊毋令血行三日一換如無前湯熏洗只煎葱艾甘草等湯俱可洗換又治諸毒頑臁等瘡神效愈後忌發物煎炒

四生丸

治外臁血風頑瘡骨節疼痛不能舉動或行步不前或渾身搔癢或痲痹不仁或生斑疹並效

地龍去土　殭蠶炒去絲　白附子　五靈脂

草烏去皮尖炮各等分

右爲細末米糊丸梧子大每服三四十丸食前茶酒任下

解毒雄黃散

治風濕流注腿脚致生血風頑瘡紫黑搔癢者

雄黃四兩　硫黃八兩

右二味共研細末柏油調搽敷蓋之三日一換

神燈照法
治年久紫黑血風頑瘡流水作癢不絕先用葱湯洗淨患上點火以燈焰熏之每熏以三撚爲度
雄黃　硃砂　血竭　沒藥各二錢　麝香四分
右研爲細末每用三分綿紙裹藥爲撚長約尺許以眞麻油潤透燈火離瘡半寸許自外而內周圍徐徐照之火頭向上藥氣入內瘡毒隨火解散自不內侵臟腑初用三條漸加至四五條候瘡勢漸消漸減

如意金黃散
治證同前
天花粉上白十斤　黃檗色重者　薑黃各五斤
白芷三斤　紫厚朴　陳皮　甘草　蒼术
天南星各二斤
右咬咀曬極乾爲細末磁罐收貯勿令洩氣用時以公猪膽汁調稠敷患上油紙蓋托勿動待其自脫脫後色紅再敷之以色白爲度

枯礬散
治婦人脚丫作癢
枯礬五錢　石膏煅　輕粉　黃丹各三錢
右爲末溫湯洗淨搽藥即愈

牛角散
治牛程蹙
牛角尖燒灰　水龍骨　松香　輕粉各等分
共爲末牛骨髓調搽虛弱者兼服十全大補湯

解毒瀉脾湯
治田螺泡
防風　牛蒡子　山梔　石膏　黃芩　蒼术
甘草　木通各一錢
水二鍾燈心二十根煎八分量病食前後服之

生肌玉紅膏
脫腐肉生新肉收斂之神藥也
白芷五錢　甘草一兩二錢　紫草二錢　白蠟
歸身各二兩　血竭　輕粉各四錢　麻油一斤
右先用當歸甘草紫草白芷四味入油內浸三日大杓內慢火熬藥微枯色細絹濾清將油復入杓內煎滾下整血竭化盡次下白蠟微火亦化先用茶鍾四枚預頓水中將膏分作四處傾入鍾內候片時方下研極細輕粉每鍾內投和一錢攪勻候至一伏時取起不得加減致取不效

枳殼湯（痛瘍全書下同）
治訓疽
枳殼　射干　升麻　生地　黃芩　金銀花
前胡　連翹　大黃炒　甘草節　犀角汁（臨服加入）
水二鍾煎一鍾日二服

苦參丸
專治脚背發
苦參四兩酒拌炒　羌活　獨活　茯苓　赤芍
蔓荊子　川芎　何首烏　當歸　荊芥　甘草
白芷　防風　白蒺藜　山梔仁　山藥　黃芪
牙皂　川烏生去皮炮各三錢
酒糊爲丸每服二錢或酒或鹽湯下茶清亦可

清毒流氣飲
治發臂毒
人參　木香　當歸　川芎　檳榔　黃芪
芍藥　防風　甘草　厚朴　桔梗　枳殼
烏藥　白芷
薑三片棗一枚煎服

定痛流氣飲
治天蛇頭發臂毒
人參　當歸　蟬蛻　黃連　桔梗　防風
甘草　白芷　乳香　青皮　白芍　山梔仁
烏藥
水煎服

清毒流氣飲
治臂面毒
紫蘇　桔梗　枳殼　甘草　烏藥　白芷
腹皮　黃芩　當歸　芍藥　川芎　防風
柴胡　羌活　白芨　連翹
薑三片棗一枚煎服

定痛內托飲
治證同上
人參　當歸　芍藥　厚朴　桔梗　川芎
甘草　防風　白芷　黃芪　茯苓　羌活
烏藥　官桂　紫蘇　香附
薑三片棗一枚煎服

定痛解毒方
治手心毒
紫蘇　芍藥　甘草　桔梗　枳殼　烏藥
白芷　防風　羌活　獨活　川芎　茯苓
黃芩　薄桂　乳香　威靈仙

薑三片水煎服
內托流氣飲
治證同上
木香　乳香　當歸　川芎　黃芪　芍藥
防風　甘草　厚朴　枳殼　桔梗　烏藥
白芷　檳榔　紫蘇
薑三片棗一枚煎服
定痛敗毒散
治手腕毒
白芍　白芷　桔梗　枳殼　乳香末　威靈仙
防風　當歸　羌活　茯苓　金銀花　甘草
薄桂　木通
右薑三片棗一枚水煎服夏天加黃芩
內托清氣飲
治證同上
人參　黃芪　紫蘇　桔梗　枳殼　金銀花
青皮　甘草　厚朴　川芎　防風　天花粉
木香　羌活　當歸　芍藥
薑三片棗一枚水煎服
鐵粉散
治冷疔
黃丹一兩　生鐵粉即針砂二兩炒　松香五錢
麝香　輕粉各五分
右爲末清油調貼瘡口上立愈
敗毒流氣飲
治委中毒
紫蘇　厚朴　枳殼　桔梗　陳皮　烏藥
白芍　白芷　香附　檳榔　木香　木瓜
牛膝　杜仲　防風　甘草
薑三片棗一枚煎服
紫蘇流氣飲
治委中毒
紫蘇　厚朴　甘草　香附　烏藥　檳榔
杜仲　木瓜　枳殼　桔梗　川芎　防風
當歸
薑三片棗一枚空心服排膿加人參黃芪
搽藥
治腿游風
輕粉　枯礬各二錢　黃連　韶粉各三錢
孩兒茶　黃蘗　白芷　荊芥　雞子黃各一錢
冰片二分
右爲細末和勻先用溫苦茶洗淨再用紙挹乾摻
上
追風除濕圈藥
治鶴膝風
多年陳小粉四兩炒焦色　乾薑　官桂　白芷
五倍子　龜板酥炙　當歸　防風　烏藥
乳香各一兩　白芨三兩
右爲細末用老薑汁釀酢各半盞葱汁一分蜜少
許火上熬熟調藥乘熱遍手搽膝四向空其中出
毒時用餘汁熱潤之以助藥力
木香流氣飲
治膝毒
蒼术　當歸　白芍　白术　白芷　川芎
木香　牛膝　木瓜　烏藥　澤瀉　薄桂
紅花　茯苓　五加皮　威靈仙
水二鍾薑七片葱白二根煎服
又方
治膝腫
歸尾　赤芍　桃仁　蒼术各一錢　黃蘗七分
連翹　羌活　黃芩各五分　金銀藤二錢
木通　紅花　生甘草各三分
水煎服
加味流氣飲
治足發背
川芎　麻黃　甘草　肉桂　乾薑　半夏
茯苓　枳殼　白芷　厚朴　芍藥　陳皮
蒼术
薑三片水煎服
木瓜檳榔散
治足發背
檳榔　木瓜　紫蘇　陳皮　甘草　木香
當歸　赤芍
服後再服檳榔丸
羌活散
治手發背
羌活　獨活　前胡　甘草　荊芥　威靈仙
烏藥　桔梗　薄桂　升麻　當歸
水調服
陰陽二氣丹（外科正宗下同）
治脫疽久服丹石補藥致虧腎水多成口燥咽乾

至飲冰雪不知其冷此孤陽獨旺宜服此解之
天冬搗膏　麥冬搗膏　五味子炒研　黃蘗
人中白小兒溺者生研　元參湯泡搗膏各一兩
青黛　甘草　枯礬　澤瀉各二錢　冰片一錢
各爲細末同元參二冬膏子加煉蜜少許再搗千
餘下軟硬得中丸如梧子大辰砂二錢爲衣每服
六十九童便乳汁各一杯空心送下安睡一時其
效如神
清神散
治脫疽疔瘡發背毒積甚者腠理發越不盡多致
煩躁悶亂睡則譫言嘔吐不食者並宜服之
甘草節五錢　眞豆粉一兩　大硃砂三錢
梅花冰片五分　牛黃三分
右爲細末每服一錢淡竹葉燈心湯調服
雄雄霹靂火
治脫疽及一切發背初起不疼痛者並宜灸之
斬艾茸二錢　丁香　雌黃　雄黃各二分
麝香一分
右下四味共研極細搓入艾中作豌豆大丸放於
患上灸之毋論痛癢以內焦爲度如毒已經走散
就紅暈盡處排灶灸之痛則至癢癢則至痛爲妙
灸後仍用提疔麥子貼上膏蓋灸服蟾酥丸及解
毒濟生湯兼治轉回活色有膿爲妙
金液戊土丹
治脫疽及疔瘡發背縱食膏粱厚味法酒又或丹
石補藥勉力房勞多致積毒臟腑久則胃汁中乾
腎水枯竭不能上制心火以致消渴消中消腎饒
飲多乾能食多瘦九竅不通驚悸健忘此證若出
後必發疽多難治療宜預服此亦可轉重就輕移
深就淺又解五金八石之毒藥也
人中黃研　茯神　胡黃連　生地酒蒸搗膏
烏梅肉搗膏　五味子各一兩　石菖蒲　遠志
雄黃研　辰砂飛　硝石研各三錢　牛黃另研
冰片各一錢　金箔二十張爲衣
各爲淨末配准前數共入乳鉢內再研千轉於端
午七夕或二至二分吉辰在淨室中先將烏梅地
黃二膏搗極爛和藥漸加煉蜜少許徐徐添搗軟
硬得中每藥二兩分作十九金箔爲衣每服一九
用人乳童便共一大杯化藥隨病上下食前後服
之此藥最解膏粱金石藥毒殺三尸除勞熱極有
奇功又治煩熱顛狂安神志辟瘴瘟及諸邪魅譫
語妄情失心喪志者俱效修合之時服藥之際俱
忌婦人僧尼孝服雞犬等見之此藥用蠟封固收
藏不泄藥味愈久愈效
保安萬靈丹
治癰疽疔毒對口發頤風溫風溫濕痰流注附骨
陰疽鶴膝風證左癱右瘓口眼喎斜半身不遂氣
血凝滯偏身走痛步履艱辛偏墜疝氣偏正頭風
破傷風牙關緊閉感冒風寒無不應效
全蠍　石斛　明天麻　甘草炙　麻黃　當歸
羌活　荊芥　防風　細辛　草烏湯泡去皮尖
何首烏　川芎　川烏湯泡去皮尖各一兩　雄黃
六錢　茅术八兩
右爲細末煉蜜丸彈子大每藥一兩分作四九一
兩作六九一兩作九九三等做下以備年成老壯
病勢緩急殊砂六錢研細爲衣磁罐收貯用時以
蓮鬚大葱白九枝煎湯一茶鍾化開一九服盡被
蓋出汗爲效如汗遲再用葱湯催之得汗漸漸退
下衣物其汗自斂未成者隨消已成者隨即高腫
服後避風當食稀粥忌冷物房事孕婦勿服
聖愈湯
治潰瘍膿水出多氣血虛極脈細空而無力以致
心煩不安眠睡不寧或五心煩躁等證並服
熟地黃　生地黃　川芎　人參各五錢　歸身
黃芪鹽水炒各一錢
右作一劑水二茶鍾煎八分食遠服
蟾酥丸
治疔瘡發背腦疽乳癰附骨臀腿等疽一切惡證
及疳不痛或痲木或嘔吐病重者必多昏憒此藥
服之不起發者即發不痛者即痛痛甚者即止昏
憒者即甦嘔吐者即解未成者即消已成者即潰
眞同生之功乃惡證中至寶丹也
蟾酥二錢酒化　輕粉五分　枯礬　寒水石煅
銅綠　乳香　沒藥　麝香另研各一錢
雄黃二錢　蝎牛二十一箇　硃砂二錢
以上各爲末稱準於端午日午時在淨室中先將
蝎牛研爛再同蟾酥和研稠粘方入各藥共搗極
勻九如菜豆大每服三九用葱白五寸患者自嚼
爛吐於男左女右手心包藥在內用無灰熱酒一
茶杯送下被蓋如人行五六里出汗爲效甚者再
進一服修合時婦人雞犬等忌見

除濕木瓜湯

治腫疽

蒼术　白茯苓　白术　甘草　木瓜　薄桂
澤瀉　薏苡仁　柴胡　青皮　蟬蛻　當歸
白芍　生地黃　烏藥　牛膝　黃檗　知母
防風

服後待其將潰用針挑破出膿水貼金絲紫金二
膏檗如痛加乳香虛加人參黃芪冬加附子

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百十六卷目錄

醫部彙考一百九十六

四肢門八

單方

藝術典第二百十六卷

醫部彙考一百九十六

四肢門八

單方

石村劉大尹治臁瘡膏藥用芝麻油四兩銅鍋內煎葱白三根煑黑色取出入川椒去目一兩煑黑色濾去入銅青末一兩以槐枝十根各長一尺合攪焦一節截去一節以盡爲度後入白礬一兩黃蠟五錢煎良久傾椀內成膏每以油單紙夾膏一匙於中以銀針刺之密密多孔先以濃茶洗瘡口貼膏於上反覆轉換時得痛爲佳止用一二貼立效年深者不過五七貼其膏存久益效

劉川州治臁瘡方用香油一兩鐵杓煎入黃蠟五錢化開用銅綠三錢研極細末徐徐入鐵杓內作五十餘次入將銅錢剉末另放椀裏將藥傾入椀內冷定將瘡洗淨用氈一塊如瘡大攤藥於上勒放患處一日一換換時先要洗淨瘡上

足上轉筋以故綿浸酢中甑蒸熱裹之冷卽易勿停取瘥止外臺秘要

凡脚心腫痛或因久行久立致者以水和蚯蚓糞厚傅一夕卽愈永類鈐方

寒濕脚氣用古甎燒紅以陳臭米泔水焠之乘熱布包三塊用膝夾住綿被覆之三五次愈扶書方

風濕脚痛用鍼砂川烏頭爲末和勻炒熱綿包熨之摘元方

脚腿紅腫熱如火炙俗名赤遊風用鐵銹水塗解之惠濟方

脚氣痛楚無名異末化牛皮膠調塗之頻換易簡方

風氣脚弱孔公孽二斤石斛五兩酒二斗浸服肘後方

風冷脚氣白礬石煅三斤酒三斗漬三日稍稍飲之肘後方

脚縫出水好黃丹入花乳石末摻之試效方

一切脚氣鹽三升蒸熱分裹近壁以脚踏之令脚心熱又和槐白皮蒸之尤良夜夜用之食療本草

脚氣疼痛每夜用鹽擦腿膝至足甲淹少時以熱湯泡洗有一人病此曾用驗救急方

風毒脚氣痹弱硫黃末三兩鍾乳五升煑沸入水煎至三升每服三合

又方牛乳三升煎一升半以五合調硫黃末一兩服厚蓋取汗勿見風未汗再服將息調理數日更服北人用此多效亦可煎或爲丸服肘後方

風濕脚氣石亭脂生用一兩川烏頭生一兩無名異二兩爲末葱白自然汁和丸梧子大每服一錢空心淡茶生葱吞下日一服瑞竹堂方

脚氣衝心白礬三兩水一斗五升煎沸浸洗千金方

脚氣風濕虛汗少力多痛燒礬末一匙頭投沸湯淋洗痛處

南方地卑濕人多患足瘡歲久生蟲如蛭乃風毒攻注而然用牛肚或羊肚或猪肚去糞不洗研如泥看瘡大小入煅過枯礬半兩共研勻塗帛上貼之須臾癢入心徐徐連帛取下火上炙之蟲出如絲髮馬尾千萬或青白赤黑以湯洗之三日一作不過數次蟲盡瘡愈岣嶁神書

嵌甲作瘡乃足趾甲入肉作瘡不可履靴礬石燒灰傅之蝕惡肉生好肉細細割去甲角旬日取愈此方神效肘後方

雞眼肉刺枯礬黃丹矾硝等分爲末搽之日浴二三次卽愈多能鄙事

甲疽延爛或因割甲傷肌或因甲長侵肉遂成瘡腫黃水浸淫相染五指俱爛漸上脚趺泡漿四邊起如火燒瘡日夜怪憎醫不能療綠礬石五兩燒至汁盡研末色如黃丹收之每以鹽湯洗拭用末傅之以軟帛緩裹之當日卽汁斷瘡乾每日一遍鹽湯洗濯有膿處使淨其痂乾處不須近但有急痛則塗酥少許令潤三日卽覺瘡上痂起依前洗傅十日痂漸剝盡軟處或更生白膿泡卽擦破傅之自然瘥也張侍郎病此臥經六十日諸醫無效得此法如神外臺秘要下同

甲疽瘡膿生足趾甲邊赤肉突出時常舉發者黃芪二兩藺茹一兩酢浸一宿以猪脂五合微火上煎取三合絞去查以封瘡口上日三度其肉自消

嵌甲腫痛知母燒存性研摻之多能方

病後足腫但節食以養胃氣外用狗脊煎湯漬洗吳授

纂要

毒熱足腫作痛欲脫者苦參煑酒漬之集驗方

脚氣腫痛用白芍藥六兩甘草一兩爲末白湯點服李林寶記

凡患脚氣人每旦飽食午後少食日晚不食若饑可食豉粥若覺不消欲吐者卽以高良薑一兩水三升煑一升頓服盡卽消若卒無者以母薑一兩代之清酒煎服雖不及高良薑亦甚效也

脚丫濕爛荊芥葉搗傅之簡便方

膝風疼痛菊花陳艾葉作護膝久則自除也吳旻扶壽方

寒濕脚氣腿膝疼痛行步無力胡盧巴酒浸一宿焙破故紙炒香各四兩爲末以木瓜切頂去瓤安藥在內令滿用頂合住簽定爛蒸搗丸梧子大每服七十丸空心溫酒下家藏方

一切癰疽發背惡瘡用鐵掃箒銅松毛十斤以水煎服乾坤生意

脚氣脛腫骨疼蒴藋根研碎和酒酢共三分根下合蒸熟封裹腫上一二日卽消亦治不仁千金方

脚暴軟赤蓼燒灰淋汁浸之以桑葉蒸署立愈

割甲傷肉不愈鬼鍼草苗鼠黏子根搗汁和臘猪脂塗之千金方

濕氣脚軟商陸根切小豆大煑熟更以菉豆同煑爲飯每日食之以瘥爲度最效斗門方

脚氣作痛蓖麻子七粒去殼研爛同蘇合香丸貼足心痛卽止也外臺祕要

兩足心凸腫上生黑頭瘡硬如釘脛骨生碎孔髓流出身發寒顫惟思飲酒此是肝腎二經冷熱相吞用炮川烏頭末傅之內服韭子湯效奇疾方

割甲成瘡連年不愈川烏頭尖黃蘗等分爲末洗了貼之以愈爲度

膝風作痛草烏細莘防風爲末摻靴襪中及安護膝內能除風濕健步

遠行脚腫草烏細莘防風等分爲末摻鞋底內如草鞋以水微濕摻之用之可行千里甚妙經驗方

脚氣掣痛或胯間有核生草烏頭大黃木鼈子作末薑汁煎茶調貼之

又方草烏一味爲末以薑汁或酒糟同搗貼之末類方

濕滯足腫早輕晚重草烏頭一兩以生薑一兩同研交感一宿蒼朮一兩以葱白一兩同研交感一宿各焙乾爲末酒糊丸梧子大每服五十丸酒下如宜方

遠行足趼水調半夏末塗之一宿卽沒永類方

小麥麩酢蒸熨手足風濕痹痛寒濕脚氣互易至汗出並良時珍下同

足上凍瘡以酢洗研藕傅之

風毒脚氣以白楊皮切片浸酒頻飲

風毒脚氣捻之沒指者牽牛子搗末蜜丸小豆大每服五丸生薑湯下取小便利乃止亦可吞之肘後方

腰脚痹軟行履不穩者萆薢二十四分杜仲八分搗篩每旦溫酒服三錢禁牛肉貞元廣利方

風毒脚弱痹滿上氣田舍貧家用此最良菝葜洗剉一斛以水三斛煑取九斗漬麴去查取一斛漬飲如常釀酒任意日飲之肘後方

脚氣入腹脹悶喘急用威靈仙末每服二錢酒下痛減一分則藥亦減一分簡便方

腰脚諸痛用威靈仙末空心溫酒服一錢逐日以微利爲度千金方

又方用威靈仙一斤洗乾好酒浸七日爲末麪糊丸梧子大以浸藥酒每服五十丸經驗方

脚氣作痛筋骨引痛鷺鷥藤卽金銀花爲末每服二錢熱酒調下衛生易簡方

痢後下虛不善調養或遠行或房勞或外感致兩足痿軟或痛或痹遂成痢風宜用獨活寄生湯吞虎骨四斤丸仍以骨碎補三分之一同研取汁酒解服之外用杜仲牛膝杉木節萆薢白芷南星煎湯頻頻熏洗此亦從腎虛骨痿而治也

脚膝爛瘡金星草背上星刮下傅之卽乾集簡方

濕毒脛瘡甎縫中生出野芫荽夏月采取曬收爲末每以五錢汞粉五分桐油調作隔紙膏周圍縫定以茶洗淨縛上膏藥黃水出五六日愈

趾間雞眼割破出血以血見愁草搗傅之乾坤祕韞

脚氣腫滿大麻仁熬香以水研取一升再入水三升煑一升入赤小豆一升煑熟食豆飲汁外臺祕要下同

脚氣痛痹大麻仁一升研碎酒三升漬三宿溫服大良

遠行脚趼成泡者水調生麪塗之一夜卽平

脚氣冲心黍穰一石煑汁入椒目一升更煎十沸漬脚三四度愈

腫從脚起豉汁飲之以查傅之肘後方

丈夫脚冷不隨不能行者用醇酒三斗水三斗同入甕中灰火溫之漬脚至膝常著灰火勿令冷三日止千金方

鶴膝風病酒醅糟四兩肥皂一箇去子芒硝一兩五味子一兩砂糖一兩薑汁半甌研勻日日塗之加入燒酒尤妙也

腰脚無力韭子一升揀淨蒸兩炊久暴乾簸去黑皮炒黃搗粉安息香二大兩水煮一二百沸慢火炒赤色和搗爲丸梧子大如乾入少蜜每日空腹酒下三十丸以飯三五匙壓之大佳 海上方

水病足腫葱莖葉煑湯漬之日三五次妙 獨行方

脚肚轉筋大蒜擦足心令熱即安仍以冷水食一瓣 攝生方

脚氣浮腫心腹脹滿小便澀少馬齒草和少粳米醬汁煮食之 食醫心鏡

足趾甲疽腫爛者屋上馬齒莧崐崘青木香印城鹽等分和勻燒存性入光明硃砂少許傅之 外臺秘要

夏月趾腫不能行走者九月收茄根懸簷下夏日煎湯洗之

風毒膝掌骨節痛用豉三五升九蒸九暴以酒一斗浸經宿空心隨性溫飲 食醫心鏡

足趾肉刺先以湯浸刮去一層用黑木耳貼之自消爛不痛 近效方

脚氣腫痛桃花一升陰乾爲末每溫酒細呷之一宿即消 外臺秘要

脚氣腫急用木瓜切片囊盛踏之或煎湯飲之

脚筋攣痛用木瓜數枚以酒水各半煑爛搗膏乘熱貼於痛處以帛裹之冷即換日三五度

脚肚生瘡初起如粟搔之漸開黃水浸淫癢痛潰爛遂致遶脛而成痼疾用酸榴皮煎湯冷定日日掃之取愈乃止 醫學正宗

脚氣冲心或心下結硬腹中虛冷陳皮一斤和杏仁五兩去皮尖熬少加蜜搗和丸如梧子大每日食前米飲下三十丸 食療本草

嵌甲作痛不能行走者濃煎陳皮湯浸良久甲肉自離輕手剪去以虎骨末傅之即安 醫林集要

嵌甲疼爛胡桃仁皮燒灰貼之

脚氣壅痛以沙牛屎一盞磨檳榔一枚空心暖服 梅師脚氣論

脚氣冲心悶亂不識人用白檳榔十二分爲末分二服空心暖小便五合調下日二服或入薑汁溫酒同服

脚氣脹滿非冷非熱或老人弱人病此用檳榔仁爲末以檳榔殼煎汁或茶飲或紫蘇湯或豉汁調服二錢甚效 外臺秘要

脚氣冲心吳茱萸生薑搗汁服甚良 孟詵方

轉筋入腹茱萸炒二兩酒二盞煎一盞分二服得下即安 聖濟錄

水氣脚氣桑條二兩炒香以水一升煎二合每日空心服之亦無禁忌 聖濟總錄

疏導脚氣枳殼炒二兩四錢甘草六錢爲末用木瓜湯服二錢 直指方

手指掣痛醬清和蜜溫熱浸之愈乃止 千金方

脚氣掣痛鄉村無藥初發時即取土烏藥不犯鐵器布揩去土瓷瓦刮屑好酒浸一宿次早空心溫服溏泄即愈入麝少許尤佳痛入腹者以烏藥同雞子瓦罐中水煮一日取雞子切片蘸食以湯送下甚效 永類鈐方

甲疽弩肉膿血疼痛不愈用乳香爲末膽礬燒研等分傅之內消即愈

脚氣攻注用生大田螺搗爛傅兩股上便覺冷起至足而安又可傅丹田利小便董守約曾用有效 稗史

下注脚瘡鹿角燒存性入輕粉同研油調塗之 集要

嵌甲疼痛血竭末傅之 醫林集要

療脚氣風痹五緩筋急用熊肉半斤於豉汁中和薑椒葱白鹽醬作臛腊空腹食之 食醫心鏡

赤小豆和鯉魚煑食甚治脚氣 孟詵

風毒脚氣猪肝作生膾食之取利

老人脚氣嘔逆者用猪腎一對以酢蒜五味治食之日作一服或以葱白粳米同煑粥食之 奉親養老方

脚氣煩懣用烏雄雞一隻治如猪腎法入粳米作羹食 養老書

脚肚轉筋蜈蚣燒研存性猪脂和傅 肘後方

脚脛爛瘡臭穢不可近用蜒蚰十條瓦焙研末油調傅之立效 救急方

熱毒攻手足赤腫暴熱疼痛欲脫煑馬屎與羊屎汁漬之日三度 千金方

又方濃煎虎杖根適寒溫以漬手足令至踝上一尺止

又方稻穰灰汁漬之

又方猪膏和羊屎塗之亦佳

又方取常思草絞取汁以漬之一名蒼耳

一切脚氣奇方用穿山甲前兩足者燒存性研細入麝香當門子少許多少隨人斟酌要服此藥須去他

事至晚不可進飲食候至夜深腹空時調服坐臥隨意及雞鳴又一服痛立止過一二日便能步履如常極妙如神

老人脚氣猪肚一枚洗淨細切以水洗布絞乾和蒜椒醬酢五味常食亦治熱勞 養老方

一少年新娶後得脚軟病日暮疼甚醫作脚氣病治不效路鈐孫琳診之用杜仲一味寸斷片折每以一兩用半酒半水一大盞煎服三日能行又三日全愈琳曰此乃腎虛非脚氣也杜仲能治腰膝痛以酒行之則效矣

脚肚風瘡如癩用桐油人乳等分頻掃之數次即愈 集簡方

脚氣腫痛皂角赤小豆爲末酒酢調貼腫處 末類方

脚氣疼痛羊角一付燒過爲末熱酒調塗以帛裹之取汗末不發也

脚多汗濕楊花著鞋及襪內穿之 摘元方

脚氣腫痛蘇方木鷺鷥藤等分細剉入官粉少許水二斗煎一斗五升先熏後洗 普濟方

狐尿刺人足腫痛用熱蠟著瘡并烟熏之令汗出即愈 肘後方 下同

脚氣痹弱牛乳五升硫黃三兩煎取三升每服三合羊乳亦可或以牛乳五合煎調硫黃末一兩服取汗尤良

雞眼作痛剝去皮以燖雞湯洗之 簡便方

消除脚氣每寅日割手足甲少侵肉去脚氣 外臺祕要

久近脛瘡用白膠香爲末以酒瓶上箬葉夾末貼之 補珍方

脚肚生瘡初起如粟米大搔之不已成片包脚相交黃水出癢不可忍久成痼疾用百藥煎末唾調逐瘡四圍塗之自外入內先以貫衆煎湯洗之日一次 醫林集要

風寒濕痹四肢攣急脚腫不可踐地用紫蘇子二兩杵碎以水三升研取汁煑粳米二合作粥和葱椒薑豉食之 聖惠方

火把花除脚膝痹痛四肢拘攣搗汁入膏中不入湯藥 別錄

鵝掌風鴿屎白雄雞屎炒研煎水日洗

何首烏治骨軟風腰膝痛何首烏一斤牛膝半斤黑豆三升煑取汁拌蒸三次共搗成泥曬乾爲末棗肉和丸梧子大酒下五七十丸 入門

脚跟腫痛不能著地黃牛屎入鹽炒熱罨之 王末輔惠濟方

寒濕脚氣牛皮膠一塊細切以麪炒成珠研末每服一錢酒下其痛立止 萬氏方

脚底木硬牛皮膠生薑汁化開調南星末塗上烘物熨之

尸脚坼裂烊膠著布上烘貼之 千金方

脚指雞眼先挑破取黑白蝨各一枚置於上縛之數日自愈也 便民圖纂

虎骨酒治腰脚疼痛攣急不得屈伸及腿膝冷麻用虎骨一具及脛骨二莖酥炙黃搥碎無灰酒三斗密封七日空心晚食酒隨意飲 本事方

治腰脚蒸法取黃荊葉不限多少蒸熟熱置於甕中其下著火溫之以病人置於葉中須臾汗出葉中旋旋喫飯稍倦即止以棉衣蓋避風仍進葱豉酒以瘥爲度

嶺南脚氣從足至膝脛腫滿連骨疼者用蓖麻子葉切蒸薄裹二三易即消 千金方

脚氣連腿腫滿久不瘥用黑附子一兩去皮臍生用搗爲散生薑汁調如膏塗傅腫上藥乾再塗之候腫消爲度 易簡方

理脚腫滿轉上入腹殺人赤小豆一升水五升煑令極熟去豆適寒溫浸脚冷重煖之

治脚氣冲心煩悶亂不識人大豆一升水三升濃煎取汁頓服半升如未定可更服

寒濕脚氣痛不可忍用團魚二箇水二斗煑一斗去魚取汁加蒼耳蒼朮尋風藤各半斤煎至七升去查以盆盛熏蒸待溫浸洗神效 乾坤生意

甲疽潰痛弩肉裹趾甲膿血不瘥者用牡蠣頭厚處生研爲末每服二錢紅花煎酒調下日三服仍用傅之取效 勝金方

脚指濕爛蚌蛤粉乾搽之 壽域

行路足腫被石墊傷者以草鞋浸尿缸內半日以毹一塊燒紅置鞋於上將足踏之令熱氣入皮裏即消 救急方

腰膝痛脚氣羊肉一脚草果五枚粳米二升回回豆即胡豆半升木瓜三斤取汁入砂糖四兩鹽少許煑肉食之名木瓜湯 正要

石斛治脚膝疼冷弱煎服丸服並佳 本草

脚弱病用杉木爲桶濯足排樟腦兩股間以脚綳繫定月餘即效 續博物志

轉筋攣急松節一兩剉如米大乳香一錢銀石器慢

火炒焦存一二分性出火毒研末每服一二錢熱木瓜酒調下一應筋病皆治之孫用和祕寶方

尸脚坼裂無冬夏者取雞屎煑湯漬半日取瘥乃止千金方

天蓼除脚氣煑濃汁漬之蘇頌

薏苡仁去乾濕脚氣大驗和槲李仁作粥常服良本草

三白草根療脚氣風毒脛腫搗酒服亦甚有驗時珍

足蹙筋急桂末白酒和塗之一日一上皇甫謐甲乙經

脚上臭瘡熟雞子黃一箇黃蠟一錢煎油塗之

鹿蹄肉治脚膝痠痛不得踐地取蹄四隻治如食法著五味熟食之本草

足跟凍瘡潰破用椒葱湯洗刮去腐肉用三稜針出血將馬屁勃入生牛骨髓調和傅之效綱目下同

手足凍瘡用茄根燒灰洗了用雀兒腦髓塗之

又方臘月牡鼠死者一枚油一大升煎之使爛絞出查再煎成膏塗凍瘡及坼破瘡

手足凍瘡用煎熟桐油調密陀僧敷之

又方用五倍子煎湯洗

纏脚生瘡用荊芥燒灰葱汁調傅先以甘草湯洗之摘元方

脚氣螽魚及饅鱺魚作膾常食鯽魚膾亦佳本草下同

脚氣上冲取田螺煮食之蜆肉亦佳

脚弱無力取生栗以袋盛風乾每日空心食十餘枚

手足煩痛地膚苗葉煎水日服時珍

手足凍瘡痛者橄欖核燒存性爲末用香油調塗患處其痛隨愈綱目下同

手足皴裂春夏不愈者用生薑汁紅糟白鹽猪膏臘月者佳共研爛炒熱擦入皴內一時雖痛少頃便皮軟皴合再用即安

手足寒皴裂台椒三四合煑浸半食頃須臾再浸又傅以羊猪髓腦甚妙梅師方

脚跟皴裂用頭髮一大握桐油一椀於瓦器內熬候油沸頭髮鎔爛出火攤冷以瓦器收貯不令灰入百沸湯泡洗皴裂令軟傅其上即安一方加水粉綱目

割甲侵肉久不瘥硇砂礬石爲末裹之以瘥爲度外臺秘要

婦人指甲內生瘡惡肉突出日久不愈名臭田螺甲皂礬日曬夜露每以一兩煎湯浸洗仍以皂礬末一兩加雄黃二錢硫黃乳香沒藥各一錢研勻搽之醫方摘要

代指腫痛甘草煎湯漬之千金方

四肢腫滿白朮三兩㕮咀每服半兩水一盞半大棗三枚煎九分溫服日三四服不拘時候本事方

痿躄脚弱五加皮釀酒服或水煎如茶飲之本草

手足皴裂白芨末水調塞之勿犯水濟急方

犬肝猪肝並主脚氣上冲作膾以薑酢食之當微泄若先泄即勿服本草

治腰絡不隨兩脚攣腫蜀椒四升以水四斗煑取二斗半甕盛下著火暖之懸板爲橋去湯二寸許以脚踏板拄脚坐以綿絮密塞勿令洩氣若疲即出入被以粉摩之一食久更入甕常令甕下火不絕勿使湯洗如此消息不過七日得伸展并腫亦消千金方

治臁瘡久不愈者用川烏頭黃蘗各等分爲末用唾津調塗紙上貼之大有效矣儒門事親

臁瘡方用砂糖水煎冬青葉三五沸撈起石壓平將葉貼瘡上換日二次丹溪心法下同

又方以頭垢燒灰和棗肉搗作膏先以蘇椒葉煎湯洗淨用輕粉摻上却以前膏雨傘紙攤貼之

又方地骨皮一兩白蠟甘草節各半兩以香油入地骨皮甘草節文武火熬熟去查入黃丹一兩半緊火熬黑下蠟攪勻提起白紙攤貼之次用冬青葉酢煎過以藥貼之

脚膝痛痿弱不可屈伸用牛膝煎服丸服或浸酒服並佳腰腿之疾必用藥也本草下同

脚氣腫痛成瘡水蓼水煑汁漬捋之

治脚汗白礬乾葛等分二味爲末每半兩水三椀煎十數沸洗逐日一次纏三五日自然無汗本事方

鵝掌風癬用猪前蹄爪破開入菊花蒼耳末以線縛定炊爛食之次日用白蘚皮皂角雄黃各五分鉛製水銀三分爲末臨夜用鵝脂薑汁調搽次日以絹擦去然後量體服去風之藥此癬乃楊梅瘡類如多年不愈者先用磁鋒磨刮次以蓖麻子一兩枯礬二錢爲末桐油調搽火烘極熱再以棗肉三兩水銀五錢枯礬三錢搗爛如泥每日擦手十餘下次以肥皂酒糟洗淨十次神效更灸勞宮或內關一穴斷根入門

脚氣赤腫行步脚痛猫兒眼睛草鷺鷥藤蜂窩等分各用一兩水五椀煎三椀熏洗之易簡方

嵌甲用細茶嚼爛敷之因暑手抓兩脚爛瘡亦宜能解熱燥故也入門

指縫搔癢成瘡血出不止用多年糞桶箍篾燒灰敷之

脚上及指縫中沙瘡用燕窠泥略炒黃蘗二味爲末香油調敷痛者加乳香

手足煩者小便三升盆中溫浸手足千金方

治脚氣冷痹椒囊法用川椒三斤實於疎布袋中置火踏上跣足踏椒囊蓋椒性熱加以火氣則寒濕脚氣自然避去或碎檳榔熟艾各三分之一尤效

代指腫痛痲沸湯浸之卽安千金方

又方猪膏和白堊土敷之肘後方

脚底多汗燒人塲上土鋪於鞋底內搓之集元方

女人紮足脫骨湯用杏仁一錢桑白皮四錢水五椀新瓶煎三椀入矾硝五錢乳香一錢封口煎化置足於上先熏後洗三日一作十餘次後軟若束綿也閨閣事宜

風濕脚氣紫蘇子高良薑橘皮等分蜜丸梧子大每服十丸空心酒下葉性論

鵝掌風病蘄艾眞者四五兩水四五椀煑五六滾入大口瓶內盛之用麻布二層縛之將手心放瓶上熏之如冷再熱如神陸氏積德堂方

毒攻手足腫痛欲斷蒼耳搗汁漬之并以滓傅之立效春用心冬用子千金翼

腰膝疼痛或頑痲無力蔓絲子洗牛膝各一兩同入銀器內酒浸一寸五分暴爲末將原酒煑糊丸梧子大每空心酒服二三十丸經驗方

游風手脚軟痹用人肝藤生研服之塗之藏器下同

丁公藤强腰膝除痹煑汁服冬月浸酒服

清風藤治風濕流注歷節鶴膝痲痹搔癢損傷瘡腫入酒藥中用時珍下同

脚氣腫以落鴈木枌木皮同煮汁洗之立效

腹內冷腰膝痛弱小便白數陽道乏用牛領藤煑汁或浸酒服藏器

腰脚風冷石花浸酒飲之聖惠方

腰脚疼痛新胡麻一升熬香杵末日服一小升服至一斗永瘥溫酒蜜湯薑汁皆可下千金方

手脚痠痛微腫用芝麻熬研五升酒一升浸一宿隨意飲外臺秘要

手肢腫作痛生胡麻搗塗之千金方

臂脛疼痛歷節風虎脛骨一具炙黃搥碎同麴米如常釀酒飲亦可浸酒本草

脚氣腫痛木鼈子仁每箇做兩邊麩炒過切碎再炒去油盡爲度每兩入厚桂半兩爲末熱酒調服二錢令醉得汗愈夢祕授方也末類方

氣滯風壅手背脚膝痛用大麥酢糟炒熱布裹熨之三兩換當愈孟詵

手足赤色隨月生死以生薤一把苦酒煑熟搗爛塗之愈乃止肘後方

腰脚痹痛蕓薹煑食良藏器

脚氣走痛蘿蔔煎湯洗之仍以蘿蔔曬乾爲末鋪襪內聖濟總錄

風熱脚氣苦竹筍蒸煑食之食醫心鏡

腰脚風血積冷筋急拘攣疼痛茄子五十斤切洗以水五斗煮取濃汁濾去滓更入小鐺中煑至一升以來卽入生粟粉同煎令稀稠得所取出搜和更入麝香硃砂末同丸如梧子大每日用秫米酒送下三十丸近暮再服三月乃瘥男子女人通用皆驗圖經本草

手足凍裂附子去皮爲末以水調麪塗之良談埜翁試驗方

手足凍瘡老絲瓜燒存性和臘猪脂塗之海上方

病脚氣者宜食紫菜時珍下同

大指忽然腫痛梅核仁搗爛和酢浸之

鷓鴣脂膏塗手皴瘃令不龜裂蘇頌

手足皴裂生白果嚼爛夜夜塗之

手足心腫乃風也椒鹽末等分酢和傅之良肘後方

脚弱痹痛松節煑取汁釀酒取清飲之良本草

腰腿疼痛甜瓜子三兩酒浸十日爲末每服三錢空心酒下日三壽域神方

腰脚肢腿痛葡萄煎湯淋洗之良時珍下同

凍脚裂坼蒸熟藕搗爛塗之

轉筋及足腫楠木煎湯洗之枝葉同功大明

木腫自足起削楠木桐木煑汁漬足并飲少許日日爲之肘後方

獨足鳥窩表作履履治脚氣時珍

風毒脚氣用杜仲嫩葉作蔬亦可煎湯蘇頌

手足浮腫桐葉煑汁漬之并飲少許或加小豆尤妙聖惠方

腰脚風痛不能履地皂角子一千二百箇洗淨以少酥熬香爲末蜜丸梧子大每空心以蒺藜子酸棗仁湯下三十丸千金方

脚氣濕瘡極癢有蟲烏柏根爲末敷之少時有涎出良摘元方

手背皴裂大楓子搗泥塗之壽域方

陷甲入肉痛苦用蛇皮一具燒灰雄黃一彈丸同研先以溫湯洗瘡針破貼之初虞世方

鶴膝風攣紫荊皮三錢老酒煎服日三次直指方

放杖木治一切風血理腰脚浸酒服之藏器

手足皴裂牛鼻繩五倍子爲末塡入薄紙貼之救急方

脚指間肉刺瘡以黑蝨搗傅之根亦出也

人指甲軟薄者用白殭蠶燒煙熏之則厚時珍

女人趾瘡甲內惡肉突出不愈蜈蚣一條焙乾敷之外以南星末酢和敷四圍醫方摘要

代指疼痛蚯蚓杵敷之聖惠方

腿脚不隨虎腰脊骨一具前兩脚全骨一具並於石上槌碎安鐵牀上文炭火炙待脂出則投無灰濃酒中密封春夏七日秋冬三七日任性日飲三度患十年以上者不過三劑七年已下者一劑必瘥海上方

麋皮作靴襪除脚氣孟洗

鹿皮作靴襪除濕氣脚痹時珍

腰脚錐痛支腿者猫兒屎燒灰唾津調塗之永類鈐方

手足皴裂用兎腦髓生塗之聖惠方

脚氣生瘡腫痛用漏蘆白蘞槐白皮五加皮甘草各七錢半蒺藜子二兩煎湯於無風處淋洗

手足皴破以酒醇猪脛洗并敷之肘後方

凍指欲墮馬糞煮水漬半日卽愈千金方

治風軟脚以丹參酒浸服之可逐奔馬奇效良方

又方用龜殼炙之爲末酒調服之

治風濕寒痹痲木不仁粥法用川烏生爲末用香熟白米作粥半椀藥末四錢同米熬熟稀薄不要稠下薑汁一茶匙脚許蜜三大匙攪勻空心啜之溫爲佳如是中濕更入薏苡仁末二錢增米作一中椀服此粥大治手足四肢不隨痛不能舉者有此證者須預服防之左氏曰風淫末疾謂四肢爲四末也脾主四肢風邪客於肝則淫脾脾爲肝尅故疾在末穀氣引風濕之藥徑入脾經故四肢得安此湯劑極有力予嘗製此方以授人服者皆驗

臁瘡不乾用白堊土煅研末生油調搽集元方

足臁爛瘡用韭地蚯蚓泥乾研入輕粉清油調傅

臁瘡久爛用竈內黃土年久者研細入黃蘗黃丹赤石脂輕粉末等分清油調入絹中貼之勿動數日愈縱癢忍之良濟急方

臁瘡頑癬銅綠七分研黃蠟一兩化熬以厚紙拖過表裏別以紙隔貼之出水妙筆峰雜興

血風臁瘡用官粉四兩水調入椀內以蘄州艾葉燒烟熏乾入乳香少許同研香油調作隔紙膏反覆貼之集驗方

又方用官粉炒過桐油調隔紙貼之簡便方

血風臁瘡黃丹一兩黃蠟一兩香油五錢熬膏先以薑椒湯洗貼之積德堂方

遠近臁瘡黃丹飛炒黃蘗酒浸七日焙各一兩輕粉半兩細研以苦茶洗淨輕粉塡滿次用黃丹護之外以蘗末攤膏貼之勿揭動一七見效集效方

血風臁瘡密陀僧香油入粗盌內磨化油紙攤膏反覆貼之集效方

臁瘡不合以蠶汁溫洗拭乾用葱汁調輕粉傅之

胻疽青爛生於腨脛間惡水淋漓經年瘡冷敗爲深疽青黑好肉虛腫百藥不瘥或瘥而復發先以藥蝕去惡肉後用豭猪屎散甚效以猪屎燒研爲末納瘡孔令滿白汁出吮去更傅有惡肉再蝕去乃傅以平爲期有驗千金方

血風臁瘡生脚股上乃溫毒成風也黃蠟一兩鎔化入銀硃一兩攪攤紙上刺孔貼之簡便方

臁瘡日久雄黃二錢陳艾五錢青布捲作大撚燒烟熏之熱水流出數次愈筆峰雜興

臁瘡潰爛無名異虢丹細研油調塗濕則乾摻濟急方

血風臁瘡船上舊油灰將泥作釜火煅過研末入輕粉少許苦茶洗淨傅之忌食發物經驗方

臁瘡經年鹽中黑泥曬研搽之永類方

臁瘡潰爛覆盆葉爲末酸漿水洗後摻之

臁瘡不斂葱鹽湯洗淨拭乾以馬屁勃爲末傅之卽愈仇遠稗方

蛀脚臁瘡乾馬齒莧研末蜜調傅上一宿其蟲自出神效海上方

臁瘡潰爛端午日午時采翻白草洗收每用一握煎湯盆盛圍住熏洗極效

臁脛爛瘡用柿霜柿蔕等分燒研傅之甚效筆峰雜興

臁瘡不合血竭末傅之以乾爲度濟急仙方

臁瘡熱瘡黃蘗末一兩輕粉三錢猪膽汁調搽或用蜜調亦可

血風臁瘡胡粉煅過研桐油調作隔紙膏貼之

又方用船上陳桐油石灰煅過又以人髮拌桐油炙乾爲末仍以桐油調作膏塗紙上刺孔貼之

臁脛爛瘡用桃柳槐椿楝五枝同荊芥煎湯洗拭淨以生黃蠟攤油紙上隨瘡大小貼十層以帛拴定三日一洗除去一層不用一月全愈醫林集要

臁脛生瘡頭垢枯礬研勻猪膽調傅壽域

臁瘡不斂牛胞衣一具燒存性研搽海上方

臁瘡朽臭生龜一枚取殼酢炙黃更煅存性出火氣入輕粉麝香葱湯洗淨搽傅之急救方

濕毒臁瘡枯竹蛀屑黃蘗末等分先以葱椒茶湯洗淨搽之日一上

脚脛生瘡雄雞胞內皮洗淨貼之一日一易十日愈小山奇方

裹外臁瘡羊屎燒存性研末入輕粉塗之集要

臁脛生瘡用中鯽魚三尾洗淨穿山甲二錢以長皂莢一挺劈開兩片夾住紮之煨存性研末先以井水洗淨膿水用白竹葉刺孔貼之候水出盡以麻油輕粉調藥傅之日一次直指方

臁脛爛瘡牛蹄甲燒灰桐油和傅海上方

臁瘡生蟲用小鰕三十尾去頭足殼同糯米飯研爛隔紗貼瘡上別以紗罩之一夜解下掛看皆是小赤蟲即以葱椒湯洗淨用舊茶籠內白竹葉隨大小剪貼一日二換待汁出盡逐日煎苦楝根湯洗之以好膏貼之將生肉勿換膏藥忌發物直指方

血風臁瘡生鰕黃丹搗和貼之日一換集簡方

臁瘡潰爛三四年馬牙匡骨燒研先以土窖過小便洗數次搽之聖惠方

治臁瘡極妙地骨皮一斤黃蘗二兩剉爲粗末用香油一斤半煎濾過藥油六七兩入淨松香十兩黃丹二兩同煎候黃丹微黑色却入輕粉七角光粉二角煎法皆如煎膏法用長條紙拖過掛乾用若瘡紫黑先用三稜針去惡血以冷水洗淨隨瘡大小剪膏藥掩上用絹帛紮緊俟一周時再換膏藥換時須用冷水洗瘡不過數換不問新久即愈須忌日氣火氣陽氣儻換膏藥再看如有黑腫未盡可再出血以紫黑血盡爲度綱目下同

臁瘡用糯米泔嗽口過洗瘡拭淨却以地骨皮爲細末蜜調敷瘡上又以油紙縛之

臁瘡用韭汁洗淨挹乾剉虎骨敷上

捷應散治脚濕氣成瘡癢不可當爬之流黃水用羯羊糞曬乾爲末安於瓦上手把竹柴火燒作灰又研細先用葱椒湯洗之次用香油調厚傅上以山茶花葉罨之帛縛四五日即可

脚上爛瘡久不瘥先以酸漿豆腐水洗二三次尋懸鉤擔葉地暴扭葉搗細入鹽些少盦之地暴扭葉即覆盞子葉也丹溪

足跟瘡久不愈毒氣攻注用白朮爲細末先以鹽漿水溫洗乾貼二日一換可以負重涉險海藏

血風濕瘡用千年陳石灰研搽痛即止瘡即愈神效蘭氏方

敷穿板藥地燈心桁胡根酢蒸熏之併敷上

又方滑菜砍爛敷之

又方仙人掌水楊根二味砍爛敷之

又方赤梗蜈蚣煎水浸洗之

治足蜘蛛背用地燈心砍爛敷之

又方金雞舌砍爛敷之

又方臭藤天布瓜根砍爛酒炒敷之

又方紫鼈蘇擂酒服以查敷患處

脚面惡瘡如桐油浸淫延漫及治一切惡瘡不問乾濕癢痛日近年深百藥不瘥者用羊屎二三十粒置瓦上四畔炭火燒烟住火筯鉗於地上以盞覆存性羅成白灰研細以紗片篩去沙麻油調癢入輕粉痛入麝香少許效名百草膏

臁瘡先以葱白漿水熬湯洗淨瘡口拭乾徐以輕粉末摻上瘡口却用五靈脂黃蘗各等分研細末涼水調傅瘡上紙蓋定三五次即平復

手指腫毒又指惡瘡消毒止痛鏡面草搗爛敷之壽域神方

天蛇頭指痛臭甚者用黑豆生研末入蠶繭內以指籠之濟急方

代指毒痛取痿黃葱葉煑汁熱漬之千金方

手足凍瘡山藥一截磨泥敷之儒門事親

指頭腫毒痛甚者烏梅肉和魚鮓搗封之妙李樓奇方

櫧子嫩葉貼臁瘡一日三換良

足上風瘡作癢甚者皂角炙熱烙之潘氏方

穿掌腫毒新桑葉研爛盦之即愈通元論

代指作痛崔氏云乃五臟熱注而然刺熱湯中七度刺冷水中一度即以羊膽塗之立愈甚效外臺秘要

天蛇頭用蒲公英草清明時節如虀菜狀中開一朵花如菊花者取曬乾與蒼耳草二味等分爲末以好酢濃煎浸洗即愈丹溪

蟹叉用碌碡草葉砍爛酒炒敷之又以梗煎水浸洗

天蛇頭用蒲公英搗細水和調去查服之又搗查盦患處屢效

天蛇頭用野落蘇即金絲草金銀花藤五葉紫葛天蕎麥共等分切細用好米酢濃煎先熏後洗

又方用人糞雜黃泥搗之裹在患處即愈

手指腫痛名爲代指以烏梅入醋研浸患處立瘥
病蟹又用山馬梢根皮砍爛糟炒敷之
手指腫用酸漿水入少鹽熱浸之冷卽愈千金方
婦人足瘡經年不愈名裙風瘡用男子頭垢桐油調作隔紙膏貼之簡便方
穿掌穿板潰爛者用舊飯箚燒存性爲末相油掃患處濕以末摻之或用生肌散亦大效飯箚要用農家者取其日日貯飯藏氣者效
手足甲疽熏黃蛇皮等分爲末以泔洗淨割去甲入肉處傳之一頃痛定神效近效方
臁瘡用棘葉搗傳之亦可曬研麻油調傳普濟方
臁瘡潰爛海上方詩云左脚草鞋將棒挑水中洗淨火中燒細研爲末加輕粉洗以鹽湯傳卽消
穿掌穿板方仙人掌根磨米醋暖塗傳又用藜蘆子煎醋熏又用零香子煎水浸洗
手足皴裂五倍子末同牛骨髓填納縫中卽安也醫方大成
臁瘡浸淫用黃魚破開入蒐麻子二十粒紮定安厠坑中冬三日春秋一日夏半日取出洗淨黃泥固濟煅存性研香油調傳
人指咬爛久欲脫者鼈甲燒灰傳之搨元方
兩脚癬瘡白犬血塗之立瘥寧效
足趾肉刺刺破以新酒醋和羊腦塗之一合愈古今驗錄
草靈散治病蟹又用解叉草又名解叉穫右砍爛酒炒敷之
又方落鵝鎗根搗爛糟炒敷之
治惡指俗名天蛇頭蜈蚣一條火上燒以烟熏病指一二次卽安
治蛇頭子及一切蝮蛇瘴金腦香葉擂酒服以查敷之
又方蛇頭抓草又名赤田蕫又名一麻二麻有一箇根卽一麻有兩箇根卽二麻砍爛酒炒敷之
又方溪女樹葉過路蜈蚣砍爛糟炒敷之如痛不止用雄黃末燒烟熏之不拘已成未成卽刻取效或加蜈蚣等分亦妙
又方紫金鍾倒金鍾野芋子香附子砍爛糟炒敷之
又方井邊羊莧子砍爛糟炒敷之
又方山布瓜根磨酢刷以赤楝蜈蚣過路蜈蚣穿山蜈蚣飛天蜈蚣煎水熏洗亦效
又方獨龍蘘根卽大葉白槲根砍爛糟炒敷之
又方地蜈蚣葉溪女樹葉砍爛冷敷之
又方飛天蜈蚣葉砍爛冷敷之
又方金腦香葉又名壯茶砍爛冷敷之
又方雞卵一枚開竅傾出少許以指時時浸之
又方軟骨草赤麻蕫金盞草耳環尻砍爛鹽酒炒敷之
又方山蓼葉田麻蕫地扁蓄田螺砍爛鹽酒炒敷之
又方山布瓜根金腦香葉搗爛酒炒敷之
又方紫金鍾六月雪二味砍爛糟炒敷之
金雞舌散治病瘭用金雞舌磨酒服或磨半泔半酢煖塗之
病蟹又用宿地薤白根葉砍爛酒炒敷之
又方椒子葉砍爛糟炒敷之又以小葉淨瓶子煎水熏洗亦效
風疽以青竹筒一枚徑一寸半長三尺當中著大豆一升以糠馬屎二物燒爲灰當竹筒中燒之以器承兩頭取汁先以泔清和鹽熱洗瘡了卽塗豆汁不過三度極效
又方鴨胡麻傅以綿裹之日一易神效

素問曰肝熱病者熱爭則狂言及驚脅滿痛手足躁不得安臥庚辛甚甲乙大汗氣逆則庚辛死刺足厥陰少陽

腎熱病者先腰痛脈痿苦渴數飲身熱熱爭則項痛而強脈寒且痿足下熱不欲言其逆則項痛員員澹澹然戊己甚壬癸大汗氣逆則戊己死刺足少陰太陽

熱病先胃脘痛手足躁刺足少陽補足太陰病甚者爲五十九刺

熱病手臂痛者刺手陽明太陰而汗出止

熱病始於足脛者刺足陽明而汗出止

靈樞經曰正月二月三月人氣在左無刺左足之陽四月五月六月人氣在右無刺右足之陽七月八月九月人氣在右無刺右足之陰十月十一月十二月人氣在左無刺左足之陰

手太陰之別名曰列缺起於腕上分間並太陰之經直入掌中散入於魚際其病實則手鋭掌熱虛則欠欬小便遺數取之去腕半寸別走陽明也

手少陽之別名曰外關去腕二寸外繞臂注胸中合心主病實則肘攣虛則不收取之所別也

足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者循脛骨外廉上絡頭項合諸經之氣下絡喉嚨其病氣逆則喉痹卒痛實則狂顛虛則足不收脛枯取之所別也

邪在肝則兩脅中痛寒中惡血在內行善掣節時脚腫取之行間以引脅下補三里以温胃中取血脈以散惡血取耳間青脈以去其掣

身有所傷血出多及中風寒若有所墮墜四肢懈惰不收名曰體惰取其小腹膺下三結交三結交者陽明太陰也臍下三寸關元也

暴挫癰眩足不任身取天柱

病始手臂者先取手陽明太陰而汗出病始頭首者先取項太陽而汗出病始足脛者先取足陽明而汗出

熱病面青膺痛手足躁取之筋間以第四鍼於四逆筋蹙目浸索筋於肝不得索之金金者肺也

足脛不可舉側而取之在梱合中以員利鍼大鍼不可刺病注下血取曲泉

雲門關骨空中髓空此八者以瀉四肢之熱也

左足應立春其日戊寅己丑左手應立夏其日戊辰己巳右手應立秋其日戊申己未右足應立冬其日戊戌己亥膕尻以下應冬至其日壬子大禁太乙所在之日及諸戊己凡此九者善候八正所在之處所主左右上下身體有癰腫者欲治之無以其所直之日潰治之是謂天忌日也

金匱要略曰病跌厥其人但能前不能却刺踹入二分此太陽經傷也

甲乙經曰寒熱懈惰逕溏脛痠四肢重痛少氣難言至陽主之

胃中膨膨然甚則交兩手而瞀暴痹喘逆刺經渠及天府此謂之大命

寒熱咳嘔沫筆中熱盛則肩背寒慄少氣不足以息寒厥交兩手而瞀口沫出實則肩背熱痛汗出四肢暴腫身温搖時寒熱候則煩飽則善面色媛口噤不開惡風泣出列缺主之

心痛如懸陰厥腳腦後廉急不可前却血瘕腸澼便膿血足跗上痛舌卷不能言善笑足痿不收履溺青赤白黃黑青取井赤取榮黃取輸白取經黑取合

寒熱痠痛四肢不舉厥下應馬刀瘻喉痹髀膝頸骨搖痠痹不仁陽輔主之

寒熱善睡頭重足寒不欲食脚攣京骨主之

寒熱算後出癘瘧脚腦痠重戰慄不能久立脚急腫跗痛足筋攣少腹痛引喉嚨大便難承筋主之

跟厥膝急腰脊痛引腹篡陰股熱陰暴痛寒熱脾痠重合陽主之

胃脘脹滿鬲逆不通呼吸少氣喘息不得舉臂步趨主之

胃滿鬲刀臂不得舉關厥主之

善驚悲不樂厥脛足下熱面盡熱渴行間主之
膽眩寒厥手臂痛善驚妄言面赤泣出腋門主之
腰脊痛強引背少腹俛仰難不得仰息脚痿重尻不
舉溺赤腰以下至足清不仁不可以坐起膀胱俞主
之
腰痛怏怏不可以俛仰腰以下至足不仁入脊腰背
寒次窌主之先取缺盆後取尾骶與八窌
腰痛不可舉足跟中踝後痛脚痿僕參主之
氣癃癩疝陰急股樞腨內廉痛交信主之
胷滿膨膨然實則癃閉腋下腫虛則遺溺脚急兢兢
然筋急痛不得大小便腰痛引腹不得俛仰委陽主
之
熱病先手臂瘈瘲脣口聚鼻張目下汗出如轉珠兩
乳下二寸堅脅滿悸列缺主之
振寒瘈瘲手不伸咳嗽唾濁氣鬲善嘔鼓頷不得汗
煩滿因爲瘲衄尺澤主之左窒刺右右窒刺左
振寒小指不用寒熱汗不出頭痛喉痹舌卷小指之
間熱口中熱煩心心痛臂內廉及脅痛聾咳瘈瘲口
乾頭痛不可顧少澤主之
振寒寒熱肩臑臂痛頭不可顧煩滿身熱惡寒目赤
痛眥爛生瞖膜暴痛鼽衄發聾臂重痛肘攣痂疥胷
中引臑泣出而驚頸項強身寒頭不可以顧後谿主
之
振寒熱頸項腫實則肘攣頭項痛狂易虛則生疣小
者痂疥支正主之
氣喘熱病衄不止煩心善悲腹脹逆息熱氣足脛中
寒不得臥氣滿胷中熱暴泄仰息足下寒中悶嘔吐
不欲食飲隱白主之
熱痛煩心足寒清多汗先取然谷後取太谿大指間
動脈皆先補之
手足寒至節喘息者死
手足清煩熱汗不出手肢轉筋頭痛如錐刺之狀熱
不可以動動益煩心喉痹舌卷乾臂內廉不可及頭
耳聾鳴竅陰皆主之
膝外廉痛熱病汗不出目外眥赤痛頭眩兩頷痛寒
逆泣出耳鳴聾多汗目癢胷中痛不可反側痛無常
處俠谿主之
目視不明振寒目瞖瞳子不見腰兩脅痛脚痠轉筋
丘墟主之
頭重鼻衄及瘈瘲汗不出煩心足下熱不欲近衣項
痛目瞖鼻及小便皆不利至陰主之
鼽衄腰脊脚腨痠重戰慄不能久立腨如裂脚跟急
痛足攣引少腹痛喉咽痛大便難膻脹承山主之
四厥手足悶者使人久持之厥熱脛痛內庭主之
痓驚互引脚如結腨如裂束骨主之
痓脊強項眩運脚如結腨如裂崐崘主之
風痹注病不可已者足如履冰時如入湯中肢脛淫
濼煩心頭痛時嘔時悶眩已汗出久則目眩悲以喜
怒短氣不樂不出三年死
足痹不可舉側而取之在樞闔中以員利鍼大鍼不
可
膝中痛取犢鼻以員利鍼鍼發而間之鍼大如氂刺
膝無疑
足不仁刺風府
腰以下至足清不仁不可以坐起尻不舉腰俞主之
足下熱痛不能久坐濕痹不能行三陰交主之
膝外廉痛不可屈伸脛痹不仁陽關主之
髀樞中痛不可舉以毫鍼寒而留之以月生死爲痏
數立已長鍼亦可
偏枯四肢不用善驚大巨主之
手臂不得上頭尺澤主之
兩手攣不收伸及腋偏枯不仁手瘈偏小筋急大陵
主之
足不收痛不可以行天泉主之
足下緩失履衝陽主之
手及臂攣神門主之
痱痿臂腕不用脣吻不收合谷主之
肘痛不能自帶衣起頭眩頷痛面黑風肩背痛不可
顧關衝主之
嗌外腫肘臂痛五指瘈不可屈伸頭眩頷額顱痛中
渚主之
偏枯臂腕發痛肘屈不得伸手又風頭痛涕出肩臂
頸痛項急煩滿驚五指掣不可屈伸戰怵腕骨主之
風眩驚手腕痛泄風汗出至腰陽谷主之
風逆暴四肢腫濕則唏然寒饑則煩心飽則眩大都
主之
風逆四肢腫復濇主之
痿厥風頭重頞痛樞股腨外廉骨痛瘈瘲痹不仁振
寒時有熱四肢不舉趺陽主之
腰痛頸項痛歷節汗出而步履寒復不仁腨中痛飛
陽主之

肩中熱指臂痛肩髃主之
肩重不舉臂痛肩節主之
肩重肘臂痛不可舉天宗主之
肘痛尺澤主之
肩肘中痛難屈伸手不可舉腕重急曲池主之
肩肘節痠重臂痛不可屈伸肘窌主之
肘中濯濯臂內廉痛不可及頭外關主之
肘痛引肩不可屈伸振寒熱頸項肩背痛臂痿痹不仁天井主之
肘臂腕中痛頸腫不可以顧頭項急痛眩淫濼肩胛小指痛前谷主之
肩痛不可自帶衣臂腕外側痛不舉陽谷主之
臂不可舉頭項痛咽腫不可嚥前谷主之
肩痛欲折臑如拔手不能自上下養老主之
嗜臥四肢不欲動搖身體黃灸手五里左取右右取左
女子手脚拘攣腹滿疝月水不通乳餘疾絕子陰癢陰交主之
婦人陰挺出四肢淫濼身悶照海主之
膝內廉痛引臏不可屈伸連腹引咽喉痛膝關主之
痹脛重足跗不收跟痛巨虛下廉主之
脛痛足緩失履濕痹足下熱不能久立條口主之
脛苦痹膝不能屈伸不可以行梁丘主之
膝寒痹不仁不可屈伸髀關主之
髀痹引膝股外廉痛不仁筋急陽陵泉主之
寒從足小指起脈痹上下帶胷脅痛無常處至陰主之

足大指搏傷下車挃地遍背指端傷爲筋痹解谿主之
熱病煩心心悶而汗不出掌中熱心痛身熱如火浸淫煩滿舌本痛中衝主之
熱病刺然谷足先寒上至膝乃出鍼
厥四逆喘氣滿風身汗出而清髖髀中痛不可得行足外皮痛臨泣主之
身懈寒少氣熱甚惡人心惕惕然取飛揚及絕骨跗下臨泣立已淫濼脛痠熱病汗不出皆主之
寒濯濯舌煩手臂不仁唾沫脣乾引飲手腕攣指肢痛肺脹上氣耳中生風欬喘逆痹臂痛嘔吐飲食不下膨膨然少商主之
千金方曰掖門主手臂痛
巨闕主手清
肩貞主手痲木不舉
陰交主手脚拘攣
少商主手不仁
列缺主手臂身熱
大陵主手攣不伸又云主手掣小偏
內關主手中風熱
間使主手痛
曲澤主手背逆氣
中衝勞宮少衝大泉經渠列缺主手掌熱肘中痛
前腋主臂裹攣急手不上舉
尺澤主掣痛手不可伸
神門少海主手臂攣
養老主手不得上下

內庭主四厥手足悶
腕骨中渚主五指掣不可屈伸
曲池主手不可舉重腕急肘中痛難屈伸又云主手不舉
陽谿主臂腕外側痛不舉
心腧肝腧主筋急手相引
尺澤關衝外關竅陰主臂不及頭
前谷後谿陽谿主臂重痛肘攣
臑會支溝曲池腕骨肘窌主肘節痹臂痠重腋急痛肘難屈伸
中脘腧譩譆主腋攣
腕骨前谷曲池陽谷主臂腕急腕外側痛脫如拔
天井外關曲池主臂痿不伸
大泉經渠主臂內廉痛
巨骨前谷主內不舉
肩窌天宗陽谷主臂痛
曲池關衝三里中渚陽谷尺澤主肘痛時寒
關衝主肘疼不能自穿衣
魚際靈道主肘攣柱滿
大陵主肘攣腋腫
間使主肘內廉痛
地五會陽輔申脈委陽天池臨泣主腋下腫
天宗主肩重臂痛
肩外腧主肩甲痛而寒至肘
腕骨主肩臂痛
陽關主膝外廉痛不可屈伸脛痹不仁
崑崙主脚如結踝如裂

陰陵泉主足痹痛
京骨承山承筋商丘主脚攣
承山承筋主脚脛痠脚急跟痛脚筋急痛兢兢
浮白主足緩不收
天柱行間主足不任身
行間主厥足中熱
然谷主足不能安脛痠不能久立
中都主足下熱脛寒不能久立濕痹不能行
衝陽三里僕參飛揚復留完骨主足痿失履不收
僕參主足跟中踝後痛
飛揚主腦中痛
復留主脛寒不能自温又主脚後廉急不可前足跗痛
京骨然谷腎臟主足痛
太谿次竅陰膀胱臟主足清不仁
太谿主手足寒至節
地倉太泉主足痿躄不能行
光明主痿躄坐不能起
風府腰臟主足不仁
條口三里承山承筋主足下熱不能久立
丘墟主腕不收坐不得起髀樞脚痛
陽輔陽交陽陵泉主髀樞膝骨痹不仁
環跳束骨交信陰交陰谷主髀樞中痛不可舉
臨泣三陰交主髀中痛不得行足外皮痛
申脈隱白行間主脛中寒熱
太衝涌泉主脛痠
趺陽主腦外廉骨痛
至陰主風寒從足小指起脈痹上下
至陽主脛痠四肢重少氣難言
厲兌條口三陰交主脛寒不得臥
內庭環跳主肢痛不可屈伸
陽間環跳承筋主脛痹不仁
涌泉然谷主五趾盡痛足不踐地
風市主兩膝攣痛引脅拘急躄躃或青或焦或枯或黧如腐木
太衝主膝內踝前痛
梁丘曲泉陽關主筋攣膝不得屈伸不可以行
犢鼻主膝中痛不仁
犢鼻主膝不仁難跪
中封主少氣身重温膝踵內踝前痛
解谿條口丘墟太白主膝股腫脈酸轉筋
合陽主膝股重
上廉主風水膝腫
陰市主膝上寒
伏兔主膝中寒
俠谿陽關主膝外廉痛
髀關主膝寒不仁痿痹不得屈伸
光明主膝痛脛熱不能行手足偏小
膝關主膝內廉痛引臍不可屈伸連腹引咽喉痛
凡犢鼻腫可灸不可刺若其上堅勿攻攻之即死
章門主四肢懈惰喜怒
列缺主四肢厥喜笑
曲泉趺陽天池大巨支溝小海絕骨前谷主四肢不舉
照海主四肢淫漯
五里三陽絡天井厲兌三間主嗜臥四肢不欲動搖
復溜豐隆大都主風逆四肢腫
脚氣初灸風市次灸伏兔次灸犢鼻次灸膝兩眼次灸三里次灸上廉次灸下廉次灸絕骨
凡灸八處第一風市穴可令病人起正身平立垂兩臂直下舒十指掩著兩髀便點當手中央指頭髀大筋上是灸之百壯多亦任人輕者不可減百壯重者乃至一處五六百壯勿令頓灸三報之佳第二伏兔穴令病人累跃端坐以病人手掌橫掩膝上指下旁與曲膝頭齊上旁側肉際當中央是灸百壯亦可五十壯第三犢鼻穴在膝頭蓋骨上際外骨邊平處以手按之得節解則是一云在膝頭下近外三骨箕腫中動脚以手按之得窟解是灸之五十壯可至百壯第四膝眼穴在膝頭骨下兩旁陷者宛宛中是第五三里穴在膝頭骨飾下五寸附脛骨外是一云在膝頭骨飾下二寸人長短大小當以病人手度取灸之百壯第六上廉穴在三里下一寸亦附脛骨外是灸之百壯第七下廉穴在上廉下一寸一云附脛骨外是灸之百壯第八絕骨穴在脚外踝上一寸一云四寸是凡此諸穴灸不必一頓灸盡壯數可日日報灸之三日之中灸令盡壯數爲佳凡病一脚則灸一脚病兩脚則灸兩脚凡脚弱病皆多兩脚又一方云如覺脚惡便灸三里及絕骨各一處兩脚惡者合四處灸之多少隨病輕重大要雖輕不可減百壯不瘥連以次灸之多多益佳一說灸絕骨最要人有患此脚弱不即治及少腹腹腫大上氣於是乃須大法灸隨

諸臉及諸關節腹背盡灸之并服八風散往往得瘥者覺病入腹若病人不堪痛不能盡作大灸但灸胷心腹諸穴及兩脚諸穴亦有得好瘥者凡量一夫之法覆手并舒四指對度四指上中節上橫過爲一夫夫有兩種有三指爲一夫者此脚弱灸以四指爲一夫也亦依支法存舊法梁丘犢鼻三里上廉下廉解谿太衝陽陵泉絕骨崑崙陰陵泉三陰交足太陰伏溜然谷涌泉承山束骨等凡一十八穴舊法多灸百會風府五臟六腑臉募頃來灸者悉覺引氣向上所以不取其法氣不止者可用之其要病已成恐不救者悉須灸之其足十趾去指奇一分兩足凡八穴曹氏乃曰八衝極下氣有效其足十指端名曰氣端日灸三壯並大神要其八衝可日灸七壯氣下卽止病者非深相知悉愼勿爲人灸之愼之愼之凡灸八衝須小作艾炷

衛生寶鑑曰腑寒氣海一穴在臍下一寸五分任脈所發三里二穴在膝下三寸腑外廉兩筋間舉足取之足陽明脈所合也可灸三壯鍼入五分三陰交二穴足內踝上三寸骨下陷中足太陰少陰厥陰之交會可灸三壯鍼入三分

髓會絕骨鍼經云腦髓消脛痠耳鳴絕骨在外踝上輔骨下當腦中是也髓會之處也潔古老人云頭熱如火足冷如冰可灸陽輔穴又云腑痠冷絕骨取之陽輔二穴在足外踝上四寸輔骨前絕骨端如前三分去丘墟七寸足少陽脈之所行也可灸三七壯鍼入五分

醫學綱目曰足跟紅腫凍瘡於足指面後跟赤白肉際骨下刺入三分彈鍼出血可灸二七壯

脚氣腫痛取三里絕骨各二寸半丘墟鍼入一寸瀉之行間五分留八吸瀉之解谿鍼入五分留十吸瀉之商丘鍼入五分瀉十吸

治脚氣諸穴隨經選用之陷谷三分瀉之前谷五分瀉之灸中封瀉之灸俠谿先瀉後補灸陽輔絕骨各二寸半瀉之灸通谷一分瀉之灸

扁鵲治脚氣取腎氣在臍旁相去各四寸肩井三里氣海交龍

寒濕脚氣紅腫生瘡取中封五分瀉之陽輔絕骨各二寸半瀉之灸

又法取行間三里照海崑崙絕骨京骨委中三陰交兩足痲及足膝無力取風市在腿外廉垂手中指點到處是穴鍼五分補多瀉少留五呼先瀉成後補生又足不能行取丘墟行間崑崙太衝陽輔三陰交復溜三里此一穴大治足不能行

刺灸諸痛法先明經脈次別淺深蓋經脈者爲手足十二經脈也

臂膊疼痛肩顒手三里外關

臂膊疼痛并痲痹肩顒肩井曲池

又法取肩顒曲池手上廉合谷不應再取肩井列缺

臂痛連腕取腋門沿皮向後透陽池瀉之中渚沿皮透腕骨瀉之

臂內廉痛取經渠一分忌灸靈道一分臥鍼向前三分少海五分

臂痠攣取肘窌竅陰尺澤前谷後谿

腕痛取陽谿曲池

腕無力併痛取腕骨橫鍼入三分痛則瀉無力則補曲池補瀉同上

五指拘攣取三間一分先瀉後補灸之前谷一分瀉之灸

五指皆痛取陽池外關合谷

胯痛腿支風取環跳在髀樞中側臥伸下足屈上足方可鍼可入三寸半補少瀉多留八吸居窌一寸二分留八吸瀉之委中出血

胯痛蹶足取環跳懸鍾摘英作丘墟鍼五分留三呼灸三壯

胯痛脚支風不能轉側舉動艱難取環跳三寸半灸七七壯風市灸二七壯又取委中崑崙三里陽陵泉如不已取下穴五樞陽輔

腰脚痛取委中崑崙人中

側脚風取絕骨太衝

髀樞痛足脛寒熱足外廉皮骨痛取臨泣一分足三陰寸半陽輔

髀筋急脛痛足緩痿痹腨疼膝冷外廉不可屈伸濕痹流腫取風市中瀆陽關懸鍾

腿痛取陽陵泉三里伏兔陰市

腿膝拘攣痛引脅或青或焦或黧或枯如腐木狀風市灸之取陽陵泉曲泉崑崙

腿膝外廉痛股腫腑痠轉筋痿痹或膝脛熱不可行動取俠谿五分髀關光明各一寸

髀痹引膝股外廉急痛脛痠搖動有聲諸節痠不能行取陽陵泉絕骨中封

腿膝內廉痛引臏不可屈伸連腹引咽喉痛取太衝

五分中封膝關
脛痠寒足下熱不能久立濕痹不仁取中都衝陽承山承筋
脛寒四肢重少氣難言不得臥取至陽三陰交
草鞋風取崑崙瀉之留六呼太谿瀉之留六呼申脈五分補少瀉多留二呼忌灸
草鞋風足腕痛取崑崙透太谿又取丘墟商丘各寸半瀉之灸
又法取崑崙丘墟商丘照海如不已取後穴太衝解谿
足腕不任痿躄坐不起髀脚痛取光明沿皮五分丘墟直五分
腕緩不收覆足不任脛痠取然谷浮白崑崙
外踝紅腫痛取申脈半寸瀉之
繞踝風取曲池如繞外踝痛兼刺孫絡如繞內踝痛取足少陽小指間三分兼刺大都三分如繞前廉痛刺行間六分
脚背紅腫取太衝丘墟衝陽彈指出血臨泣
又法取太衝臨泣行間內庭如不已取崑崙丘墟
大拇指本節前骨疼取太衝彈鍼出血
足五指盡痛不得踐地取湧泉二分然谷一分
鶴膝風腫及腿痛取髖骨在膝蓋骨上一寸梁丘穴兩旁各五分鍼入五分留一吸瀉之又取膝關在膝蓋骨下犢鼻內旁橫鍼透膝眼在犢鼻外旁禁灸留八呼瀉之
又法取膝關委中三寸半俱紫脈上出血爲妙又取三里如不已取陽陵泉中脘豐隆

膝腫取行間又取陽陵泉橫透陰陵泉補生瀉成取陰陵泉橫透陽陵泉補生瀉成又取膝間
脚拗痛取委中出血
脚膝痛筋急取風池三間三陰交三里
蹇膝伸不屈治其楗在髀輔骨上橫骨下股外之中側立搖動取之筋動應手
坐而膝痛治其機在髀骨兩旁相接處
立而暑解治其骸關膝解爲骸關若膝痛起立而膝骨解中熱者治其骸關
膝痛痛及拇指治其膕在膝解之後曲脚之中委中穴
坐而膝痛如物隱者治其關在楗之後背立按之動搖筋應手
膝痛不可屈伸治其背內大杼穴也
連胻若折治陽明中俞髎三里穴也
膝痛若別治巨陽少陽榮然谷穴也
淫濼脛痠不能久立治少陽之雜在外踝上五寸光明穴也
兩肘俱攣取曲池九分先瀉後補補四呼瀉九呼尺澤手如弓方可鍼五分先補後瀉
筋攣骨痛取魂門補之
張仲文神仙灸法治脚筋攣急不可屈伸灸曲厥兩文頭左右脚四處各三壯即內外曲交穴每灸一脚二火齊下艾炷纔燒至肉初覺疼便用二人齊吹至火滅午時著艾至人定已來臟腑自動一二行或轉動如雷聲其疾立愈此法神效卒不可量也
膝曲筋急不可舒取曲泉一寸半

膝筋拘攣不開取兩膝外曲交尖灸二十七壯即委陽穴
景岳全書曰凡脚氣初覺即灸患處二三十壯或用雷火鍼以導引濕氣外出及飲醪醴以通經散邪其要法也
若壅既成而邪盛者必腫痛熱甚一時藥餌難散宜砭去惡血以消熱腫砭刺之後以藥繼之

導引

奇效良方曰治脚轉筋急伸脚將脚緊鉤向前其痛即止
保生祕要曰手足痲風導引法將左足搭右膝上以右手扳左脚左手托脚跟扳向右頭即轉左右亦如之兼法運動氣脈自潮運功氣血兩虛之證起於歸元會意運法漸行患處多旋百轉以還原位行住坐臥得閑皆可運用或時以指甲捻痲處捻之覺痛使血來朝之意
手足瘋病念臍行通關法或念背再推散四肢去手骨節疼痛想火燒之
手指痛依患處念用環轉再折分散
手足不仁目轉臍輪并氣海夜翻背水溉崑崙徧身汗出四肢瘥要在勤行是妙功還宜兩足交相擦更可三陰穴處同
手足餒先念臍次涌泉處肋拔上至臍又從臍處肋拔下至涌泉止又從左手肋拔過右手右手肋拔過左手每次行六徧

手足火燒患處推散想水洗之
手生瘡瘍手內外骨節處想火燒之又以水洗之再
遍散四肢血脈
足脛腫痛依患處念用環轉數次推開分散用火燒
之即愈
手臂風從左手心處想火起轉至於肩過心頭直至
右手心處亦想火轉至肩過心頭於左手心處
脚氣湧泉穴在足心濕氣皆從此入日夕之間常以
兩足赤肉更次用一手握指一手摩擦數目多時覺
足心熱即將脚指略略動轉倦則少歇或令人擦之
亦得終不若自擦爲佳脚力強健無痿弱痠痛之疾
矣
附通關法從北極定樞斗柄大旋三徧天地包羅行
於臍下分開兩路旋下兩腿之前聯絡不絕雙行轉
腿底向後繞元海上至命門會合從右轉左大旋三
徧從椎骨下分行兩肩經肘後外關達掌心循內關
過肩井由項後透泥丸行明堂漸落雙瞳自面部下
胃腸會心窩從左轉下降大旋三徧如前臍下分開
循環徧體周流運用卯酉二辰行之或九度或二十
一度而止愼勿執著若有若無此所謂煉其形和其
氣也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百十八卷目錄

醫部彙考一百九十八

四肢門十

醫案一

藝術典第二百十八卷

醫部彙考一百九十八

四肢門十

醫案一

三國志華佗別傳曰人有在青龍中見山陽太守廣陵劉景宗景宗說中平曰數見華佗其治病手脈之候其驗若神琅邪劉勳爲河內太守有女年幾二十左脚膝裏上有瘡癢而不痛瘡愈數十日復發如此七八年迎佗使視佗曰是易治之當得稻糠黃色犬一頭好馬二匹以繩繫犬頸使走馬牽犬馬極輒易計馬走三十餘里犬不能行復令步人拖曳計向五十里乃以藥飲女女卽安臥不知人因取大刀斷犬腹近後脚之前以所斷之處向瘡口令去二三寸停之須臾有若蛇者從瘡中而出便以鐵錐橫貫蛇頭蛇在皮中動搖良久須臾不動乃牽出長三尺許純是蛇但有眼處而無童子又逆鱗耳以膏散著瘡中七日愈

兵部手集曰武元衡相國在西川自苦脛瘡焮癢不可堪百醫無效及到京有廳吏上此方用之便瘥也方用馬齒莧搗爛傅上不過三兩徧

揮麈錄曰會稽楊梅爲天下冠童貫苦脚氣或云楊梅仁可治之郡守王嶷餽五十石貫用之而愈取仁法以柿漆拌核暴之則自裂出也

儒門事親曰新寨馬叟年五十九因欠秋稅官杖之得驚氣成風搐已三年矣病大發則手足顫掉不能持物食則令人代哺口目張睒脣舌嚼爛抖擻之狀如線引傀儡每發市人皆聚觀夜臥發熱衣被盡去徧身燥痒中熱而反外寒久欲自盡手不能繩傾產求醫至破其家而病益堅叟之子邑中舊小吏也以父母病訊戴人戴人曰此病甚易治若隆暑時不過一涌再涌則愈今已秋寒可三之如未愈更刺腧穴必愈先以通聖散汗之繼服涌劑則吐痰一二升至晚又下五七行其疾小愈待五日再一涌出痰三四升如雞黃成塊狀如湯熱叟以手顫不能自探妻與代探咽嗌腫傷昏憒如醉約一二時許稍醒又下數行立覺勢輕顫減熱亦不作足亦能步手能巾櫛自持匙筯未至三涌病去如濯病後但覺極寒戴人曰當以食補之久則自退蓋大疾之去衛氣未復故宜以散風導氣之藥切不可以熱劑溫之恐反成他病也

黃如村一叟兩手搐搦狀如拽鋸冬月不能覆被適戴人之舞陽道經黃如不及用藥鍼其兩手大指後中注穴上戴人曰自肘已上皆無病惟兩手搐搦左氏所謂風淫末疾者此也或刺後谿手太陽穴也屈小指握紋盡處是穴

李氏一小兒病手足搐搦以示戴人戴人曰心火勝也勿持捉其手當從搐搦此由乳母保抱太極所致乃令掃淨地以水灑之乾令復灑之令極濕俛臥兒於地上良久渾身轉側泥涴皆滿仍以水洗之少頃而瘥矣

一稅官風寒濕痹腰脚沉重浮腫夜則痛甚兩足惡寒經五六月間猶著綿襪足膝皮膚少有跣露則冷風襲之流入經絡其病轉劇走注上下往來無定其痛極處便攣急而腫起肉色不變腠理如蟲行每遇風冷病必轉增飲食減少肌體瘦乏須人扶稍能行立所服者烏附薑桂種種燥熱燔鍼著灸莫知其數前後三年不愈一日予脈之其兩手皆沉滑有力先以導水丸通經散各一服是夜瀉三十餘行痛減半漸服赤茯苓湯川芎湯防風湯此三方在宣明論中治痹方是也日三服煎七八錢漐漐然汗出又作玲瓏竈法熏蒸而愈

潁皐韓吉卿自髀至足生濕慝瘡大者如錢小者如豆痒則搔破水到則浸淫狀類蟲行袴襪愈而復生瘢痕成凹十餘年不瘥戴人哂之曰此濕慝瘡也由水濕而得故多在足下以舟車濬川大下十餘行一去如掃

谷陽鎭酒監張仲溫謁一廟觀匠者砌露臺高四尺許因登之下臺或肭一足外踝腫起熱痛如火一醫欲以鉼鍼刺腫上出血戴人急止之曰肭已痛矣更加鍼之二痛俱作何以忍也乃與神祐丸八九十丸下二十餘行禁食熱物夜半腫處發痒痛止行步如常戴人曰吾此法十治十愈不誑後人

常仲明之妻每遇冬寒兩手熱痛戴人曰四肢者諸陽之本也當夏時散越而不痛及乎秋冬收斂則痛以三花神祐丸大下之而愈

鄧城梁賈人年六十餘忽曉起梳髮覺左手指痲斯須半臂痲又一臂痲斯須頭一半痲比及梳畢從脊至足皆痲大便二三日不通往問他醫皆云風也或藥或鍼皆不解求治於戴人戴人曰左手三部脈皆伏比右手小三倍此枯澀痹也不可純歸之風亦有火燥相兼乃命一湧一泄一汗其痲立已後以辛涼之劑調之潤燥之劑濡之惟小指次指尚痲戴人曰病根已去此餘烈也方可鍼谿谷谿谷者骨空也一日晴和往鍼之用靈樞中雞足法向上臥鍼三進三引訖復卓鍼起向下臥鍼送入指間皆然手熱如火其痲全去昔劉河間作原病式常以痲與濕同歸燥門中眞知病機者也

鄧夏胡家婦手足風裂其兩目昏漫戴人曰厥陰所至爲墨又曰鳴紊啓坼皆風之用風屬木木鬱者達之遂謂吐也先令涌之繼以調胃承氣湯加當歸瀉之立效

戴人女僮足有凍瘡戴人令服舟車丸溶川散大下之遂愈人或疑之戴人曰心火降則下寒消何疑之有

痲先生兄村行爲犬所嚙舁至家脛腫如罐堅若鐵石毒氣入裏嘔不下食頭痛而重往問戴人女僮曰痛甚利減以檳榔丸下之見兩行不瘥適戴人自舞陽回謂痲曰脛腫如此之三陰三陽可行乎痲曰俱不可行如是何不大下之乃命夜臨臥服舟車丸百五十粒通經散三四錢比至夜半下十四行腫立消作胡桃紋反細於不傷之脛戴人曰愼勿貼膏紙當令毒氣出流膿血水常行又一日戴人恐毒氣未盡又服舟車丸百餘粒溶川散三四錢見六行病人曰十四行易當六行反難何也戴人曰病盛則勝藥病衰則不勝其藥六日其膿水盡戴人曰膿水行時不畏風盡後畏風也乃以愈風餅子日三服之又二日方與生肌散一傅之而成痂嗚呼用藥有多寡使差別相懸向使不見戴人則利減之言非也以此知知醫已難用醫尤難

痲先生妻病代指痛不可忍酒調通經散一錢半夜先吐吐畢而痛減予因嘆曰向見陳五曾病此醫以爲小蟲傷或以草上有毒物手因觸之遷延數月膿盡方已以今日觀之可以大笑

息帥膕股沉痛行步坐馬皆不便或作脚氣寒濕治之或作虛損治之烏附乳沒活血壯筋骨之藥無不用之至六十餘日目赤上熱大小便俱濟膕股之病如故戴人診其兩手脈皆沉遲沉者在裏也宜泄之以舟車丸溶川散各一服去積水二十餘行至早晨服薤白粥一二頓與之上馬已能躍鐙矣

棠溪李十八郎病膕脚大不伸偃僂跛蹩而行已數年矣服藥無功止藥却愈因秋暮涉水病復作醫氏使服四斤九其父李仲安乞藥於戴人戴人曰近日服何藥仲安曰四斤九曰目昏赤木其父驚曰目正暴發戴人曰宜速來不來則喪明矣始來策杖而行目腫無所見戴人先令涌之藥下忽走二十行兩目頓明策已棄去比再涌泄能讀官曆日調一月令服當歸丸健步而歸矣

東垣十書曰靈壽縣董監軍癸卯冬大雪時因事到眞定忽覺有風氣暴至診候得六脈俱弦甚按之洪實有力其證手攣急大便祕澀面赤熱此風寒始至加於身也四肢者脾也以風寒之邪傷之則搐慾而攣瘁乃風淫末疾而寒在外也內經曰寒則筋攣正謂此也本人素飲酒內有濕熱乘於腸胃之間故大便祕澀而面赤熱內則手足陽明受邪外則足太陰脾經受風寒之邪用桂枝甘草以却其寒邪而緩其急搐又以黃蘗之苦寒以瀉實而潤燥急救腎水用升麻葛根以升陽氣行手足陽明之經不令遏絕更以桂枝辛熱入手陽明之經爲引用潤燥復以芍藥甘草專補脾氣使不受風寒之邪而退木邪專益肺金也加人參以補元氣爲之輔佐加當歸身去裏急而和血潤燥活血通經湯主之

乙巳春廉平章年三十八身體充肥脚氣始發頭面渾身肢節微腫皆赤色足脛赤腫痛不可忍不敢扶策手著皮膚其痛轉甚起而復臥臥而復起晝夜苦楚難以名狀求予治之平章以北土高寒故多飲酒積久傷脾不能運化飲食下流之所致投以當歸拈痛湯一兩二錢其痛減半再服腫痛悉除止有右手指末微赤腫以三稜鍼刺手爪甲端多出惡血赤腫全去不數日因食濕羹肢體覺痛再以枳實大黃湯治之夫脚氣之疾皆水濕之爲也勢茲其濕血壅而不行故肢節煩疼內經曰風能勝濕羌活辛溫透關節去濕故以爲主血留而不能行則痛當歸之辛溫散壅止痛枳實之苦寒治痞消食故以爲臣大黃苦

寒以導麪之濕熱併治諸老血留結取其峻駛故以爲使也

丹溪心法曰恂奶脚底如錐刺痛或跗腫手腕亦痛而腫大便泄滑裏急此血少又下焦血分受濕氣爲病健步丸主之

一村夫背傴僂而足攣已成廢人予診其脈兩手皆沉弦而濇遂以戴人煨腎散與之上吐下瀉過月餘久吐瀉交作如此凡三貼然後平復

司丞叔平生脚自踝以下常覺熱冬不可加棉於上嘗自言曰我資稟壯不怕冷予曰此足三陰虛宜斷慾事以補養陰血庶乎可免笑而不答年方十七患痿半年而死

衛生寶鑑曰眞定府張大年二十九素好嗜酒至元辛未五月間病手指節腫痛屈伸不利膝臏亦然心下痞滿身體沉重不欲飲食食即欲吐面色痿黃精神減少至六月間來求予治之診其脈沉而緩緩者脾也難經云腧主體重節痛腧者脾之所主四肢屬脾蓋其人素飲酒加之時助濕氣大勝流於四肢故爲腫痛內經云諸濕腫痛皆屬脾土仲景云濕流關節肢體煩痛此之謂也宜以大羌活湯主之內經云濕淫於內治以苦溫以苦發之以淡滲之又云風能勝濕羌活獨活辛溫透關節而勝濕故以爲君升麻苦平咸靈仙防風蒼朮苦辛溫發之者也故以爲臣血壅而不流則加當歸辛溫以散之甘草甘溫益氣煖中澤瀉鹹平茯苓甘平導濕而利小便以淡滲之也使氣味相合上下分散其濕也

中書粘合公年四旬軀幹魁梧丙辰春從征至揚州北之東武偶脚氣忽作徧身肢體微腫其痛手不能近足脛尤甚履不任穿跣以騎馬空兩鐙而以竹器盛之以困急來告予思內經有云飲發於中胕腫於外又云諸痛爲實血實者宜決之以三稜鍼數刺其腫上血突出高二尺餘漸漸如線流於地約半升許其色紫黑頃時腫消痛減以當歸拈痛湯重一兩半服之是夜得睡明日再服而愈本草十劑云宣可去壅通可去滯內經云濕淫於內治以苦溫羌活苦辛透關節而勝濕防風甘草溫散經絡中流濕故以爲主水性潤下升麻葛根苦辛平味之薄者陰中之陽引而上行以苦發之也白朮苦甘溫和中勝濕蒼朮體輕浮氣力雄壯能去皮膚腠理間濕故以爲臣夫血壅而不流則痛當歸身辛溫以散之使血氣各有所歸人參甘草甘溫溫脾胃養正氣使苦劑不能傷胃仲景云濕熱相合肢節煩疼苦參黃芩知母茵陳苦寒乃苦以泄之者也凡皆製炒以爲因用治濕不利小便非其治也猪苓甘溫平澤瀉鹹平淡以滲之又能導其留飲故以爲佐氣味相合上下分消其濕使壅滯之氣得宣通也

征南副元帥大忒木兒年六旬有八戊午秋征南予從之過揚州十里時仲冬病自利完穀不化臍腹冷疼足胻寒以手搔之不知痛癢嘗燒石以溫之亦不得煖予診之脈沉細而微予思之年高氣弱深入敵境軍事繁冗朝暮形寒飲食失節多飲乳酪履於卑濕陽不能外固由是清濕襲虛病起於下故胻寒而逆內經云感於寒而受病微則爲咳盛則爲泄爲痛此寒濕相合而爲病也法當急退寒濕之邪峻補其陽非灸不能病已先以大艾炷於氣海灸百壯補下焦陽虛次灸三里二穴各三七壯治胻寒而逆且接引陽氣下行又灸三陰交二穴以散足受寒濕之邪遂處方云寒淫所勝治以辛熱濕淫於外平以苦熱以苦發之以附子大辛熱助陽退陰溫經散寒故以爲君乾薑官桂大熱辛甘亦除寒濕白朮半夏苦辛溫而燥脾濕故以爲臣人參草豆蔻炙甘草甘辛大溫溫中益氣生薑大辛溫能散清濕之邪葱白辛溫以通上焦陽氣故以爲佐又云補下治下制以急急則氣味厚故大作劑服之不數服瀉止痛減足胻漸溫調其飲食逾十日平復明年秋過襄陽值霖雨閱旬餘前證復作再依前灸添陽輔各灸三七壯再以前藥投之數服良愈

至元壬午五月二十八日王伯祿年踰五旬有七右臂膊腫盛上至肩下至手指色變皮膚涼六脈沉細而微此乃脈證俱寒予舉瘍醫孫彥和視之曰此乃附骨癰開發已遲以燔鍼啓之膿清稀解次日肘下再開之加吃逆不絕彥和與丁香柿蔕散兩服稍緩次日吃逆尤甚自利臍腹冷痛腹滿飲食減少時發昏憒於左乳下黑盡處灸二七壯又處托裏溫中湯用乾薑附子木香沉香茴香羌活等藥哎咀一兩半欲與服或者曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火又當盛暑之時用乾薑附子可乎予應之曰理所當然不得不然內經曰脈細皮寒瀉利前後飲食不入此謂五虛況吃逆者胃中虛寒故也諸痛痒瘡瘍皆屬心火是言其定理也此證內外相反須當捨時從證也非大方辛熱之劑急治之則不能愈也遂投之諸證悉去飲

食倍進瘡勢溫膿色正彥和復用五香湯數服後月餘平復噫守常者衆人之見知變者智者之事知常而不知變細事因而取敗者亦多矣况醫乎哉守常知變豈可同日而語哉

醫學綱目曰有人重病足不履地者十年良醫殫技莫能治所親置之道旁以求救者遇一游僧見之告曰此疾一藥可治但不知此土有否因爲之入山求索果得乃咸靈仙也使服之數日能步履其後山人鄧思濟知之遂著其法云採得陰乾月餘搗篩溫清酒和二錢匕空心服之如人本性殺藥可加及六錢匕利過兩行則減之病除乃停服其性甚善不觸諸藥但惡茶及麪湯以甘草梔子代飲可也

一男子手足常自汗醫用芩連梔蘗并補劑皆不效又足汗常多以八物半芩爲君白附川烏佐使其汗即無

孫少府監韓彥正暴得疾手足不舉諸醫皆以爲風鍼手足亦不知痛遂召孫診之孫曰此脚氣耳用檳榔末三錢生薑三片紫蘇七葉陳皮三錢水一大盞煎至七分去查熱服數劑而愈

一男子年近三十滋味素厚性多焦怒秋間髀樞左右一點發痛延及於膝晝靜夜劇惡寒口或渴或不渴或痞或不痞醫多用風藥兼用補血至次年春其膝漸腫痛愈甚食漸減形羸瘦至春末膝腫如桃不可屈伸診其脈左弦大頗實寸濇甚大率皆數知其小便必數而短遂作飲食痰積在太陽陽明治之炒黃蘗一兩生甘草梢犀角屑蒼朮鹽炒各三錢川芎二錢陳皮牛膝木通芍藥各五錢遇暄熱加條芩三錢爲細末每三錢重與生薑自然汁同研細多少以水盪起煎令沸帶熱食前飲之一晝夜四次與至半月後數脈漸減痛漸輕去犀角加牛膝敗龜板半兩當歸半兩如前服又與半月腫漸減食漸進不惡寒唯脚膝痠軟未能久立久行乃於前方中去蒼朮黃芩時當夏熱加炒黃蘗至一兩半予依本方內加牛膝春夏用莖葉冬用根杵取汁用之效尤速須斷酒肉濕麪胡椒當仲夏加生地黃半兩冬加茱萸桂枝不月而愈

有人嗜酒日須五七十杯後患脚氣甚危或教以巴戟半兩糯米同炒米微轉色不用米大黃一兩剉炒同爲末熟蜜爲丸溫水下五七十丸仍禁酒遂愈

薛己醫按曰文選姚海山中暑頭痛發熱氣高而喘肢體倦怠兩手痲木余謂熱傷元氣用人參益氣湯頓安又用補中益氣湯加麥門五味而痊

舉人于尚之素腎虛積勞足痿不能步履後舌瘖不能言面色黧黑余謂腎氣虛寒不能運及所發用地黃飲子治之而愈後不愼調攝而復作或用牛黃清心丸之類發熱痰甚誠似中風用祛風化痰之類小便祕澀口舌乾燥仍用前飲及加減八味丸漸愈又用補中益氣湯而痊

一男子元氣素弱或頭目眩運或肢體倦熱仲夏因勞役飲食不時兩手痲木肢體倦怠余以爲暑熱傷元氣用人參益氣湯而愈

知州韓廷儀先患風證用疏風化痰養血之藥而痊其腿膝骨內發熱作痛服十味固本丸天麻丸益甚兩尺脈數而無力余以爲腎水虛不能生肝木虛火內動而作非風邪所致也不信又服羌活愈風丹之類四肢痿軟偏身痲木痰涎上湧神思不清余曰皆脾氣虧損不能榮養周身又不能攝涎歸源先用六君子加芎歸木香數劑壯其脾氣以攝涎歸源又以八珍湯數劑以助五臟生化之氣以榮養周身而諸證漸愈乃朝以補中益氣湯培養脾肺夕以六味地黃丸滋補肝腎如此三月餘而安

靳閣老夫人先胷脅脹痛後四肢不收自汗如水小便自遺大便不實口緊目瞤飲食頗進十餘日或以爲中臟公甚憂余曰非也若風既中臟眞氣既脫惡證即見禍在反掌焉能延之乃候其色面目俱赤而或靑診其脈左三部洪數惟肝尤甚余曰胷乳脹痛肝經血虛肝氣否塞也四肢不收肝經血虛不能養筋也自汗不止肝經風熱津液妄泄也小便自遺肝經熱甚陰挺失職也大便不實肝木熾盛尅脾土也遂用犀角散四劑諸證頓愈又用加味逍遙散調理而安後因鬱怒前證復作兼發熱嘔吐飲食少思月經不止此木盛尅土而脾不能攝血也用加味歸脾湯爲主佐以逍遙散調補肝脾之氣清和肝脾之血而愈後每遇怒或睡中手足搐搦復用前藥即愈

一婦人素經水過期因勞怒四肢不能屈曲名曰瘲證此血虛而風熱所乘先用八珍湯加釣藤鉤柴胡漸愈更佐以加味逍遙散調理而痊

冢宰劉紫岩因勞下體軟痛發熱痰盛用清燥湯入竹瀝薑汁服之熱痛減半再劑而全愈

吾師僉憲高如齋自大同回謂余曰吾成風病矣兩腿逸則痿軟而無力勞則作痛如鐵刺脈洪數而有

力余告之曰此肝腎陰虛火盛而致痿軟無力異病之形作痛如錐邪火之象也用壯水益腎之劑而愈先生曰向寓宦邸皆以爲風恨無醫藥若服風劑豈其然哉乃吾之幸也竊謂前證往往以爲風疾輒用發散而促其危者多矣

一婦人素血虛因大勞兩足發熱晡熱月經過期或用四物芩連飲食少思胃痞吐痰用二陳枳實黃連大便不實吐痰無度足跟作痛余曰足熱晡熱月經過期乃肝脾血虛也胃痞吐痰飲食少思脾胃氣虛也蓋胃爲五臟之根本胃氣一虛諸病悉至先用補中益氣加茯苓半夏脾胃漸健乃佐以六味丸以補脾腎不兩月而痊

一男子足痿軟日晡熱余曰此足三陰虛當用六味滋腎二丸補之一婦人腿足無力勞則倦怠余曰四肢者土也此屬脾虛當用補中益氣及還少丹主之俱不從余言各執搜風天麻二丸并愈風丹而瘥

余素性愛坐觀書久則倦怠必服補中益氣加麥門五味酒炒黑黃檗少許方覺精神清爽否則夜間少寐足內痠熱若再良久不寐腿內亦然且兼腿內筋似有抽縮意致兩腿左右頻移展轉不安必至倦極方寐此勞傷元氣陰火乘虛下注丁酉五十一歲齒縫中有如物塞作脹不安甚則口舌如有瘡然日晡益甚若睡良久或服前藥始安至辛丑時五十有五晝間齒縫中作脹服補中益氣一劑夜間得寐至壬寅有內艱之變日間難服前劑夜間齒縫亦脹每至午前諸齒并肢體方得稍健午後仍脹觀此可知血氣日衰治法不同

一儒者四時喜極熱飲食或吞酸噯腐或大便不實足指縫濕痒此脾氣虛寒下陷用六君子加薑桂治之而愈稍爲失宜諸疾仍作用前藥更加附子錢許數劑不再發

一男子形體倦怠飲食適可足指縫濕痒行坐久則重墜此脾胃氣虛而下陷用補中益氣加茯苓半夏而愈

一儒者雖盛暑喜燃火四肢常欲沸湯漬之面赤吐痰一似實火吐甚宿食亦出惟食椒薑之物方快余謂食入反出乃脾胃虛寒用八味丸及十全大補加炮薑漸愈不月平復

一儒者善飲便滑溺濇食減胃滿腿足漸腫證屬脾腎虛寒用加減金匱腎氣丸食進腫消更用八味丸胃強脾健而愈

侍御譚希曾咳嗽吐痰手足時冷余以爲脾肺虛寒用補中益氣加炮薑而愈

閻老梁厚齋氣短有痰小便赤澁足跟作痛尺脈浮大按之則澁此腎虛而痰飲也用四物逐六味丸不月而康仲景先生云氣虛有飲用腎氣丸補而逐之誠開後學之矇瞶濟無窮之天札腎氣丸即六味丸也

一儒者患夢遺腳跟作痛口乾作渴大便乾燥午後熱甚用補中益氣湯加芍藥元參并加減八味丸而愈

大尹徐克明因飲食失宜日晡發熱口乾體倦小便赤澁兩腿痠疼彼知醫自用四物黃蘗知母之劑反頭眩目赤耳鳴唇燥寒熱痰湧大便熱痛小便赤澀又用四物芩連枳實之類胃脘痞滿飲食少思汗出如水再用二陳芩連黃蘗知母麥門五味言語譫妄兩手棗拂余謂汗多亡陽神無所依用參芪各五錢歸朮各三錢遠志茯神酸棗仁炙甘草各一錢服之熟睡良久四劑稍安又用八珍湯調補而愈

一儒者因累婚腿腳軟痛面黑食減惡寒足腫小腹脹痛上氣痰喘余以爲少陰虧損陽氣虛寒之證用八味丸料煎服諸證頓除又服丸劑半年元氣漸充形體如故

一婦人發熱口乾月經不調半載後兩腿無力服祛風散濕之劑腿益腫痛體更倦怠經事不通余作肝脾腎虛寒用六味八味二丸兼服兩月諸證漸愈

一男子腿內作痛用滲濕化痰藥痛連臀肉面赤吐痰脚跟發熱予曰乃腎虛陰火上炎當滋化源不信服黃蘗知母之類而歿

通府黃廷用飲食起居失宜兩足發熱口乾吐痰自用二陳四物益甚兩尺數而無力余曰此腎虛之證也不信仍服前藥足跟熱痒以爲瘡毒又服導濕之劑赤腫大熱外用敷藥破而出水久而不愈及用追毒丹瘡突如桃始信余言滋其化源半載得痊

儒者草立之左股作痛用清熱滲濕之藥色赤腫脹痛連臀脅腿足無力余以爲足三陰虛用補中益氣六味地黃兩月餘元氣漸復諸證漸退喜其憤疾年許而痊

府庠鍾之英兩腿生瘡色黯如鐵似癬者三四月痒痛相仍膿水淋漓脯熱內熱口乾面黧此腎虛之證用加味六味丸數日而愈此等證候用祛風敗毒之

劑以致誤人多矣

一男子素遺精腳跟作痛口乾作渴大便乾燥午後熱甚用補中益氣加芍藥元參及六味丸而愈

大尹王汝鄰兩足發熱吐痰如湧左尺數而無力余謂足三陰虛彼反服四物二陳黃檗知母之類喉舌作痛又服清熱敗毒之劑其舌如赤桃脈洪數而無力此脾肺復傷腎經虧甚虛火上炎水泛而爲痰也當滋化源以生腎水遂用補中益氣湯六味地黃丸而痊

閣老靳介庵腳指縫作痒出水腫煩腳面敷止痒之藥不應服除濕之劑益甚余以爲陰虛濕熱下注用六味地黃丸補中益氣湯而愈

大參李北溪左足赤腫作痛此足三陽經濕熱下注先用隔蒜灸活命飲一劑其痛頓止灸患處出水赤腫頓消次用托裏敗毒散四劑灸患處出膿而愈

儒者楊舉元患脚發微腫痛微赤煩此足三陰經陰虛濕熱下注用隔蒜灸托裏散而起發用十全大補湯而膿成又與加減八味丸料百劑而斂

一儒者患脚發腫硬色白兩月餘矣此足三陰經虧損爲外寒所侵用大防風湯及十全大補兼服而消後塌屋不利飲食勞倦前證復作盜汗內熱飲食不化便滑肌瘦此脾土虛寒而命門火不能相生用八味丸益氣湯百餘劑喜其年壯得愈

一男子脚心發熱作渴引飲或用四物芩連黃檗知母輩腹痛作嘔煩熱大渴此足三陰虧損前藥復傷脾胃也先用六君加炮薑數劑而脾胃醒再用補中益氣加茯苓半夏而脾胃健乃以加減八味丸兼服半載而愈

一儒者脚心發熱作痒以滾湯浸漬潰而出水肌體骨立作渴吐痰此脾腎虛而水泛爲痰也服益氣湯六味丸年餘元氣復而諸證愈

少宗伯顧東江面黧作渴余曰此腎經虧損當滋化源以杜後患彼雖然之而終不服次年九月內左足面患疽色黯不痛脚腿沉重用隔蒜灸三十餘壯足腿即輕瘡出血水數日而消瘡色仍黯時公將北行賀萬壽余診之曰脾脈衰憊陽氣虛極不宜遠行公曰余得夢屢驗向夢羣仙待我此壽徵也至河間驛聚仙堂病篤歎曰立齋豈能留我果卒於此亦異數也

一人足指患脫疽煩痛色赤發熱隔蒜灸之更以人參敗毒散去桔梗加金銀花白芷大黃二劑痛止又以十宣散去桔梗官桂加天花粉金銀花數劑而痊

一人年踰四十左足大指赤腫煩痛此脾經積毒下注而然名曰脫疽喜色赤而腫以人參敗毒散去人參桔梗加金銀花白芷大黃二劑更以金銀花甘草節苦蔞四劑頓退再以十宣散去桔梗官桂加金銀花防己數劑愈

一人足指患脫疽色紫赤不痛隔蒜灸五十餘壯尚不痛又明灸百壯始痛更投仙方活命飲四劑乃以托裏藥潰脫而愈

一青粱人年逾五十亦患脫疽色紫黑脚煩腫孫眞人曰脫疽之證急斬去之毒延腹必不治色黑不痛者亦不治喜其飲食如故動息自寧爲瘡瘍之善證也尚可治遂以連翹敗毒散六劑更以金銀花甘草節苦蔞二十餘劑患指潰脫更以芎歸生地連翹金銀花白芷二十餘劑而愈次年忽發渴予治以加減八味丸不聽服生津等藥愈甚服八味丸而止

一荔莞左足指患一泡麻木色赤次日指黑五日連足黑冷不知疼痛脈沉細此脾胃受毒所致進飛龍奪命丹一服翌日令割去足上死黑肉割後骨始痛可救治以十全大補湯而愈蓋死肉乃毒氣盛而拒截榮氣所致況至陰之下血氣難達經云風淫末疾是也向若攻伐之則邪氣乘虛上侵必不救也

一人足指患脫疽色黑不痛令明灸三十餘壯而痛喜飲食如常予謂急割去之速服補劑彼不信果延上遂致不救

一人足指患脫疽色赤煩痛作渴隔蒜灸數壯以仙方活命飲三劑而潰更服托裏藥及加減八味丸潰脫而愈

一婦人年踰四十近環跳穴生一毒尺脈沉緊腿不能伸經曰脾寒移於肝癰腫筋攣夫脾主肉肝主筋肉溫則筋舒肉冷則筋急遂與乳香定痛丸治之少愈更以助胃壯氣血藥二十餘劑而消

王汝道膝腿赤腫筋骨疼痛服十宣散不應診其脈沉細予以五積散二劑而痛止更以十宣散去桔梗加牛膝杜仲三十餘劑潰而愈此寒氣之腫八風之變也

一男子足指患脫疽大痛色赤而腫令隔蒜灸至痛止以人參敗毒散去桔梗加金銀花白芷大黃而潰更以仙方活命飲而痊此證形勢雖小其惡甚大須隔蒜灸之不痛者宜明灸之庶得少殺其毒

一男子脚背患脫疽赤腫作痛令隔蒜灸三十餘壯痛止以仙方活命飲四劑而潰更以托裏消毒藥而愈

一男子足指患脫疽色黯赤煩痛作渴隔蒜灸數壯服仙方活命飲三劑而潰更服托裏藥及加減八味丸潰脫而愈

一男子脚背患脫疽色黯而不腫痛煩躁大渴尺脈大而濇此精氣已絕不治後果然

一婦修甲傷次指成膿不潰煩痛至手誤數冷藥以致通腕煩腫微嘔少食彼以爲毒氣內攻而然予診其脈沉細此痛傷胃氣而然也遂刺之服六君子湯加藿香當歸食進更以八珍湯加黃芪白芷桔梗月餘而愈

一幼女因凍傷兩足至春發潰指俱壞遂去之服以大補藥而愈

一女患嵌甲傷指年餘不愈日出膿數滴予謂足大指乃肝脾二經發源之所宜灸患處使瘀肉去陽氣至瘡口自合否則不治彼愈之不早治後變勞證而歿蓋至陰之下血氣難到女人患此多因紮縛致血脈不通或被風邪所襲則無血氣榮養遂成死肉惟當壯脾胃行經絡生血氣則愈有成破傷風以致牙關緊急口眼喎斜者先與玉真散一二服後投以生血通經之劑則可

一男子修傷足指色黑不痛而欲脫余曰此因陽氣虛不能運達於患處也急去之速服補劑以壯元氣否則死肉延足必不救矣不信果黑爛上脛而死大抵手足氣血罕到之地或生瘡或傷損若戕其元氣邪氣愈甚潰爛延上必死不潰而色黯者亦死若骨斷筋皮尚連者急剪去之

趙子固母劉氏年六十左足面一瘡下連大指上延外踝以致臁骨每歲輒數發發必兼旬累月昏暮痒甚抓搔移時出血如泉流呻吟痛楚殆不可忍夜分即漸已明日復然每一更藥則瘡轉大而劇百試不驗如是二十餘年淳熙甲辰仲冬之末先生爲大府丞一夕母病大作相對悲泣無計困極就睡夢四神僧默坐一室旁有一長榻子固亦坐因而發噱一僧問其故子固答之以實僧云可服牛黃金虎丹又一僧云硃砂亦可服既覺頗驚異試取藥半粒强服之良久大痛舉家相泣且悔俄而下礧磈物如鐵石者數升是夕瘡但微痒不痛而無血數日成痂自此遂愈其硃砂之說竟不復試先生因圖僧像如所夢者而記其事金虎丹出和劑局方本治中風痰涎壅塞所用牛黃龍腦麝粉金箔之類皆非老人所宜今乃取奇效意熱積臟腑而發於皮膚歲久根深未易洗滌故假凉劑以攻之不可以常論神僧之夢蓋孝感云

大尹陳汝鄰兩腿瘦軟或赤或白足跟患腫或痛或痒後痛而或如無皮或如皺裂日晡至夜脹痛煩熱用補中益氣湯加八味丸料補其肝腎而愈

一男子足跟作痛熱渴體倦小便如淋誤用敗毒散致頭痛惡寒欲嘔不食吐痰咳嗽此足三陰虧損而藥復傷余用十全大補湯加減八味丸各五十餘劑而愈

一男子素不愼起居內熱引飲作渴體倦兩足發熱後足跟作痛或用清熱除濕之劑更加發腫又服敗毒之藥煩赤痛甚恪用祛毒清熱潰裂翻張狀如赤櫑熱痛如錐內熱晡熱此因足三陰虧損朝用十全大補湯夕用加減八味丸外數當歸膏兩月餘而愈其服消毒等藥而歿者不能枚舉

一男子亦患足跟瘡服消毒散搽追蝕藥虛證疊出其形體骨立自分必死余用十全大補湯加山茱萸山藥兩月餘而愈

朱佐问因失足劃然有聲坐立久則左足痲木雖夏月足寒如冰嘉靖己亥夏月因醉睡覺而飲水復睡遂覺右腹痞結以手摩之腹間漉漉有聲熱摩則氣泄而止每加劇飲食稍多則作痛瀉求治於醫令服枳术丸固守無效甲辰歲求治於予曰此非脾胃病乃命門火衰不能生土虛寒使之然也若專主脾胃誤矣可服八味丸則愈敬服之果驗蓋八味丸有附子醫家罔敢輕用夫附子斬關奪旗回生起死非良將莫能用

楊錦衣脚跟生毒如豆許痛甚狀似傷寒予謂獵人被兎咬脚跟成瘡淫蝕爲終身之疾若人脚跟患瘡亦終不愈因名兎囓也遂以還少丹內塞散治之稍可次因納寵作痛反服攻毒藥致血氣愈弱腿膝痿軟而死蓋足跟乃二蹻發源之處腎經所由之地瘡口不合則蹻氣不能發生腎氣由此而泄故爲終身之疾兎彼瘡先得於虛復不知戒雖大補氣血猶恐不及況服攻毒暴悍之藥以戕賊之乎

一膏粱之人兩脚發熱作渴左尺脈數而無力余謂此足三陰虧損防患疽不信反服清熱化痰之藥更

加補熱頭運又服四物黃蘗知母日晡熱甚飲食漸少脚小面發疽余用補中益氣六味地黃丸百餘服而愈其不信患疽以致不起者多矣

一婦人經候不調發熱晡熱胃腸不利飲食少思服清熱寬中消導之劑前證益甚更兼肢體痠痛服除濕化痰等藥經候兩三月一至服遍經降火之劑足跟足指作痛其熱如炙余以爲足三陰虧損用補中益氣六味地黃丸兩月諸證漸退又用前湯并八珍湯兩月而康

一婦人足跟患腫兩腿痠軟或赤或白或痛或痒或如無皮或如皴裂日晡至夜脹痛燃熱此屬足三陰虛損用加減八味丸及逍遙散加熟地川芎百餘劑而愈

一婦人勞則足跟熱痛余以爲足三陰虛用八珍而痊後偏身瘙痒誤服風藥發熱抽搐肝脈洪數此肝家血虛火盛而生風以天竺騰屋爲丸用四物麥門五味芩連炙甘草山梔柴胡煎送下而愈

一婦人兩足發熱足跟作痛日晡熱甚余以爲肝腎血虛用加味逍遙散六味丸五十餘劑諸證悉愈

新都楊太僕年踰四十左足大指赤腫燃痛此脾經積毒下注而然名曰脫疽也喜色赤而痛以人參敗毒散去人參桔梗加金銀花白芷大黃二劑更以苦蘡金銀花甘草節四劑頓退再以十宣散去桔梗官桂加金銀花防己數劑而愈

韓判官亦患脫疽色紫赤不痛以隔蒜灸至五十餘壯尚不知痛又明灸百壯方知乃以敗毒散加金銀花白芷數劑而愈

一婦人臂痛筋攣不能伸屈遇寒則劇脈緊細正陳良甫所謂肝氣虛爲風寒流於血脈經絡搏於筋筋不榮則乾急而爲痛先以舒筋湯更以四物湯加牡丹皮澤蘭白朮治之而痊亦有臂痛不能舉或轉左右作痛由中脘伏痰脾氣滯而不行宜茯苓丸或控涎丹治之

胡縣丞遍身走痛兩月後左脚面結腫未幾腿股又患一塊脈輕診則浮重診遲緩此氣血不足腠理不密寒邪襲虛而然以加減小續命湯四劑及獨活寄生湯數劑疼痛頓去更以托裏藥倍加參芪歸朮百貼而愈

劉生手臂結核如栗延至頸項狀如瘰癧此風濕流注亦以前藥治之而愈

一婦人兩腿脘紫黯寸許搔破出水或用祛風砭血年餘漸開如掌許乃服草烏等藥遍身搔痒時出血水內熱體倦飲食無味月經三月一至脈洪而數按之則濇此燥劑愈傷脾血也先以補中益氣湯加芍藥川芎五味十餘劑乃與加味逍遙散加熟地釣藤鉤二十餘劑再用歸脾湯加川芎熟地黃治之而不發

一男子善怒面青腿內臁瘡類色赤作痒或爲砭刺出血發熱燃腫作痛服消風散而益甚服遇仙丹愈加發熱作渴仍服之膿水淋漓其脈洪數左關爲甚余謂肝經血虛火內動復傷其血而瘡甚耳先用柴胡清肝散數劑又用四物山梔子治之諸證漸愈用八珍湯地黃丸兩月餘而痊

一人腿內側患癰未作膿而腫痛以內托黃芪柴胡湯二劑稍愈又二劑而消

一人腿內患癰漫腫作痛四肢厥咽喉塞發寒熱諸治不應乃邪鬱經絡而然也用五香連翹湯一劑諸證少退又服大便行二次諸證悉退而愈

丁蘭年二十餘股內患毒日久欲求內消診脈滑數知膿已成因氣血虛不潰遂刺之膿出作痛用八珍湯稍可但膿水清稀用十全大補湯加炮附子五分服數劑漸愈仍服十全大補湯二十餘劑而痊丹溪云膿出反痛者虛也河間亦云

有僧股內患腫一塊不痛不潰治以托裏藥二十餘劑膿成刺之作痛予謂腫而潰潰而反痛此氣血虛甚也宜峻補之彼云痛無補法予謂正氣不足不可不補補之則氣化而痛自除遂以參芪歸朮熟地黃治之兩月餘而平大凡瘡瘍先發爲腫氣血鬱積蒸肉爲膿故多痛膿潰之後腫退肌寬痛必漸減而痛愈盛者此氣血不足也亦丹溪河間虛甚之說

一人股外側患癰漫腫大痛以內托黃芪湯酒煎二劑少可更以托裏散數劑潰之而愈

一人年踰二十稟弱左腿外側患毒三月方潰膿水清稀肌肉不生以十全大補湯加牛膝二十餘劑漸愈更以豆豉餅灸月餘而痊

一男子素有脚氣忽下作痛發熱頭運嘔吐腿痹不仁服消毒護心等藥不應左關脈緊右關脈弦此亦脚氣也以半夏左金湯治之而愈

一人腿癰內潰瘍之膿出四五桶許惡寒畏食脈診如絲此陽氣微也以四君子加炮附子一錢畏寒少止又四劑而止以六君子加桂數劑飲食頓進乃以

十全大補湯及灸附子餅兩月愈

一老人腿癰膿自潰忽發昏瞀脈細而微此氣血虛極也以大補之劑而甦

一人腿癰兼筋攣痛脈弦緊用五積散加黃蘗柴胡蒼朮而痊

一婦左腿痛不能伸脈弦緊按之則濇以五積散二劑痛少止又二劑而止以神應養眞丸愈以脈弦緊濇屬寒故用五積散辛熱以散之

一人右腿赤腫燥痛診其脈沉數用當歸拈痛湯四支反痛乃濕毒壅遏又兄下部藥力難達非藥不對證遂砭患處去毒血仍用前藥一劑頓減又四劑而消

一人年踰五十冬患腿癰脈數煩躁飲冷便祕腫痛燥甚此熱淫於內也宜用苦寒之藥投清凉飲倍加黃芩其熱頓退更以四物湯加黃芩而愈

一人年三十連得憂患作勞好色左腿外側紅腫如粟醫以大府寶與承氣兩貼下之又一醫與大黃硃砂血竭三貼而脈大虛後果死此厥陰多氣少血故也

一人腿癰膿成鍼之出膿二椀許飲托裏藥一劑大發熱更用聖愈湯二劑而止翌日惡寒不食脈細如絲以人參一兩熟附三片薑棗煎服而愈但食少不寐更以內補黃芪湯而平

一人腿腫發熱惡寒以補中益氣湯治之彼以爲緩乃服芩連等藥熱愈盛復請治予以人參養榮湯二十餘劑而潰更以參芪歸朮炙甘草肉桂月餘而斂

夫火之爲病當分虛實芩連苦寒能瀉心肺有餘之火若老弱或飲食勞倦而發者此爲不足當以甘溫之劑治之未嘗有實熱而畏寒虛熱而喜寒者此其驗

陳監生年踰三十左腿微腫而隱痛雖日久肉色如故不思飲食東垣云瘡瘍之證腫下而堅者發於筋骨此附骨疽也乃眞氣虛濕氣襲於肉理而然蓋諸腫皆稟於胃食少則胃弱法當助胃壯氣遂以六君子湯加藿香當歸數劑飲食漸進更以十全大補湯而愈

一人遍身走痛兩月後在脚面結腫未幾腿股又患一塊脈輕診則浮重診則弱此氣血不足腠理不密寒邪襲虛而然以加減小續命湯四劑及獨活寄生湯數劑疼痛頓去更以托裏藥倍加參芪歸朮百貼而愈

南司馬王荊山腿腫作痛寒熱發渴飲食如常脈洪數而有力此足三陽經濕熱壅滯用檳蘇敗毒散一劑而寒熱止再劑而腫痛消更用逍遙散而元氣復兩月後因怒腫痛如錐赤暈散漫用活命飲二劑而痛緩又用八珍湯加柴胡山梔丹皮而痛止復因勞役倦怠懶食腿重頭運此脾胃氣虛不能升舉也用補中益氣湯加蔓荊子而安

一儒者兩腿腫痛肉色不變惡寒發熱飲食少思肢體倦怠此脾氣不足濕痰下注也以補中益氣加半夏芍藥茯苓二劑寒熱退而腫痛消又十餘劑脾胃壯而形體健

一男子入房後患兩腿腫硬二便不通余謂腎開竅於二陰此乃肝腎虧損也用六味丸料加車前子牛膝而二便利用補中益氣湯而腫硬消喜其年少得生

一上舍腿痛如錐肉色如故面黃懶食痛甚作嘔此痛傷胃也用六君子以壯其脾胃用十全大補以助其膿而鍼之更用前湯倍加參芪芍歸麥門五味遠志貝母而瘡斂

一男子因負重飲食失節胃間作痛誤認爲瘡毒服大黃等藥右腿股腫肉色如故頭痛惡寒喘渴發熱脈洪大而無力此勞傷元氣藥損胃氣而然耳用補中益氣湯四劑又用十全大補湯數劑喜其年少而愈

鴻臚翟少溪兩臁生瘡漸至遍身發熱吐痰口燥咽乾盜汗心煩溺赤足熱日晡益甚形體日瘦此腎經虛火也用六味丸不月諸證悉退三月元氣平復

一男子左腿腫肉色如故寒熱惡心飲食少思此脾氣不足而爲外邪所感也用六君加藿香桔梗川芎而寒熱止又用補中益氣湯而腫痛消

陳湖陸懋誠素因陰虛過飲入房發熱腿痛似臁瘡用發表之劑兩腿腫黯熱氣如蒸欲發痙脈皆洪數兩尺尤大余曰屬足三陰虛酒濕所乘元氣損而邪益甚耳用十全大補加山藥山茱萸附子一劑脈證頓退却去附子又二劑全愈

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百十九卷目錄

醫部彙考一百九十九

四肢門十一

醫案二

藝術典第二百十九卷

醫部彙考一百九十九

四肢門十一

醫案二

薛己醫案欽天薛循齋年六十一兩臁患風瘡膿水淋漓發熱吐痰四年此腎臟風也與六味丸四生散而瘥年餘復作延及遍身日晡益甚痰渴盜汗脣舌生瘡兩目昏赤皆腎經虛火水汎爲痰用加減八味丸而愈三年後小便淋漓莖中濇痛此陰痿思色精不出而內敗用前丸及補中益氣加麥門五味而愈

州守張天澤左膝腫痛胷膈痞滿飲食少思時欲作嘔頭運痰壅日晡益倦此脾肺氣虛用葱熨法及六君加炮薑諸證頓退飲食少進用補中益氣加蔓荊子頭目清爽間與大防風湯十餘劑又用補中益氣三十餘劑而消

通府劉國威先筋攣骨痛右膝漫腫用化痰消毒之劑腫痛益甚食少體倦加祛風消毒等藥寒熱作嘔大便不實用二陳除濕之類腫起色赤內痛如錐余診其脈滑數而無力此膿已成元氣虛而不能潰也用十全大補湯四劑佐以大防風湯一劑而潰又百餘劑而痊

一儒者腿筋弛張月餘兩膝腫痛此陰虛濕熱所乘也用六味丸爲主佐以八珍湯加牛膝杜仲間以補中益氣湯三月餘而消

一男子腿痛膝腫脈浮按之弦緊此肝腎虛弱爲鶴膝風也用大防風湯二劑已退彼惑於附子有毒乃服治瘡之藥日漸消瘦虛證漸至復求治余曰倦怠消瘦脾胃衰而不能營運也小便不禁膀胱虛而不能約制也燥熱虛痞胃氣弱而不能化也恍惚健忘精神失而憒亂也惡證蜂集余辭之後果歿此證多患於不足之人故以加減小續命大防風二湯有效若用攻毒之藥必悞

一婦膝腫痛遇寒痛益甚月餘諸藥不應脈弦緊此寒邪深伏於內也用大防風湯與火龍膏而消

一男子左膝腫大三月不潰予謂體虛之人風邪襲於骨節使氣滯而不行故膝愈大而腿愈細名曰鶴膝風遂以大防風湯三十餘劑而消

張上舍患鶴膝風伏枕半載流膿三月云初服大防風湯去附子將潰服十宣散今用十全大補湯去肉桂俱不應予視脈證甚弱以十全大補湯每貼加熟附子一錢服三十餘劑少愈乃去附子五分服至三十餘劑將愈却去附子更三十餘劑而痊夫立方之義各有所宜體氣虛弱邪入骨骱遏絕隧道非用附桂之辛溫開散關節腠理之寒邪通暢隧道經絡之氣血決不能愈且本草云附子治寒濕之聖藥桂通血脈消瘀血堅骨節治風痹骨攣脚軟宣導諸藥十全大補湯以治前證不但不可去桂亦不可不加附子無此二味何以行參芪之功健芎歸之性而補助血氣使之宣通經絡扶大虛之證以收必捷之效哉況前證在骨節之間關鍵之地治之不速使血氣循環至此鬱而爲膿從此而泄氣血瀝盡無生之理亦有秋夏露臥爲寒折之怫熱內作遂成附骨疽有賊風搏於肢節痛徹於骨遇寒尤甚以熱熨之少減尤當用大防風湯更以蒜搗爛攤患處用艾鋪蒜上燒之蒜壞易之皮膚破無妨若經久不消及陰生陽潰而出水必致偏枯或爲漏證宜服內塞散及附子灸之或脈大發渴不治以其眞氣虛而邪氣實也

居庸關王揮使臂腫一塊不痛不赤唯脈弱懶食時嘔以六君子湯加藿香酒炒芍藥治之嘔止食進再以八珍湯二十餘劑膿成刺之又以十全大補而愈次年傷寒後此臂仍腫微痛乃傷寒餘毒也然無表證但虛弱先用十宣散四劑取參芪歸芎扶助元氣防風桔梗白芷厚朴行散腫結肉桂引經破血腫退三四再以八珍湯膿潰而愈至冬臂復作痛因服祛風藥反筋攣痛甚予謂此血虛不能養筋筋虛不能束骨遂以加味十全大補湯百貼而愈

王文遠臂患腫作痛服寒涼藥遂致食少大便不實予以理中丸二服更以六君子湯加砂仁藿香治之再以托裏藥膿潰而愈大凡瘡痛甚者如稟厚有火則宜苦寒之劑若稟薄者則宜補中益氣湯加芩連之類在下加黃蘗人肥而瘡作痛者宜用荊防羌獨之類蓋取其風能勝濕也

一婦人年二十餘飲食後每因怒氣吞酸噯腐或兼脚跟骱腫服越鞠丸等藥不應此脾氣虛濕氣下陷而然也予以六君子湯香附砂仁藿香炮薑數劑少愈更以六君子湯數劑而愈

陳揮使年踰五十冬月腿患癰脈數頗躁引冷便祕腫痛骱甚此熱浮於內也法當以苦寒之藥投以清凉飲倍加黃芩治之其勢頓退更以四物湯加黃芩而痊

張甫北京人年踰三十素怯弱不能食冷臂患一毒脈虛弱予以托裏藥治之而潰但飲食少思或作脹或吞酸日漸羸瘦參苓等藥不應但右尺脈弱此命門火衰不能生土遂以八味丸補土之原飲食漸進而愈又有兩膝痛起以至徧身骨節皆痛婦人類血風男子類軟風此名風濕痹又名歷節宜以附子八物湯加減用之

一婦人患臂癰瘡口紫陷膿清不斂彼以爲毒未盡欲服攻毒之劑予謂瘡瘍之證腫起堅硬膿稠者實也腫下軟慢膿稀者虛也用附子餅灸之及飲十全大補湯百劑始愈

操江都憲張恆山左足次指患疔痛不可忍急隔蒜灸三十餘壯即能舉步彼欲速愈自數凉藥遂致血凝肉死毒氣復熾再灸百壯服活命飲出紫血其毒方解脚底通潰腐筋爛肉甚多將愈予考續北上又誤用生肌藥反助其毒使元氣虧損瘡口難斂予回用托裏藥補之喜其藥實且客處至三月餘方瘥

表甥居富右手小指患疔或用鍼出血數以凉藥掌指腫三四倍六脈洪大此眞氣奪則虛邪氣勝則實也先以奪命丹一服活命飲二劑勢稍緩余因他往或又遍刺出血腫延臂腕如大甕手指腫大數倍不能消潰乃眞氣愈虛邪氣愈盛余回用大劑參芪歸朮之類及頻灸遍手腫勢漸消後大便不實時常泄氣此元氣下陷以補中益氣湯加補骨脂肉豆蔻吳茱萸五味子又以生脈散代茶飲大便漸實手背漸潰又用大補藥五十餘服而愈

鄰人蘇子遇之內左手指患疔痲痒寒熱惡心左半體皆痲脈數不時見余曰凡瘡不宜不痛不可大痛煩悶者不治今作痲痒尤其惡也用奪命丹二服不應又用解毒之劑痲痒始去乃作腫痛余曰勢雖危所喜作痛但毒氣無從而泄欲鍼之適值墅日其家但言尻神不從勢愈腫甚余强鍼之諸證頓退又用解毒之劑其瘡全愈

一男子腿外側患癰漫腫大痛以內托黃芪酒煎湯二劑少可更以托裏散數劑潰之而愈

一婦人腿癰久而不愈瘡口紫陷膿水清稀予以爲虛彼不信乃服攻毒之劑虛證蜂起復求治余灸以附子餅服十全大補湯百餘貼而愈凡瘡膿清及不斂或陷下者皆氣血虛極也最宜大補否則成敗證若更患他證尤難治療

一婦人兩腿作痛不能伸展脈弦緊按之則濇先以五積散二劑痛少止又一劑而全止更以神應養眞湯而能屈伸

一婦人患脚氣或時腿腫筋攣腹作痛諸藥不應漸危篤諸書云八味丸治足少陰脚氣入腹疼痛上氣喘促欲死遂投一服頓退又服而愈腎經虛寒之人多有此患乃腎乘心水尅火死不旋踵宜急服之

一男子腿痛兼筋攣骨痛脈弦緊以大防風湯二劑攣少愈又二劑而腫消但內一處尚作痛脈不弦緊此寒邪已去乃所滯瘀濁之物欲作膿故痛不止也用托裏藥數劑腫發起脈滑數乃膿已成矣鍼之用十全大補湯月餘而安

一男子先腿痛後四肢皆痛遊走不定至夜益甚服除濕敗毒之劑不應診其脈滑而濇此濕痰濁血爲患以二陳湯加蒼朮羌活桃仁紅花牛膝草烏治之而愈凡濕痰濕熱或死血流注關節非辛溫之劑開發腠理流通隧道使氣行血和焉能得愈

一男子腿痛每痛則痰盛或作嘈雜脈滑而數以二陳湯加升麻二朮澤瀉羌活南星治之而安

一男子膝脛兼踝脚皆痛治以加味敗毒而愈

一婦人兩腿痛脈濇而數此血虛兼濕熱先以蒼朮黃檗知母龍膽草茯苓防風防己羌活數劑腫痛漸愈又以四物湯加二朮黃檗牛膝木瓜月餘而愈

一男子肢節腫痛脈遲而數此濕熱之證以荊防敗毒散加麻黃二劑痛減半以檳榔敗毒散四劑腫亦消更以四物湯加二朮牛膝木瓜數劑而愈

一婦人脚脛腫痛寒熱脈浮數此三陽經濕熱下注爲患在表用加味敗毒散治之不應乃瘀血凝結藥不能及也於患處砭去瘀血仍用前藥二劑頓退以當歸拈痛湯四劑而愈楊大受云脚氣是爲壅疾治法宜宣通之使氣不能成壅也壅既成而甚者砭去惡血而去其勢經云蓄則腫熱砭射之後以藥治之

一婦人兩腿痛遇寒則筋攣脈弦而緊此寒邪之證

以五積散對四物湯數劑痛止更以四物湯加木瓜牛膝枳殼月餘而愈

一男子腿腫筋攣不能動履以烫加散二劑而愈

一婦人患腿痛不能屈伸遇風寒痛益甚諸藥不應甚苦先以活絡丹一丸頓退又服而瘳次年復痛仍服一丸亦退大半更以獨活寄生湯四劑而愈

一男子素有脚氣又患附骨癰作痛服活絡丹一丸二證並瘥

一婦人肢節腫痛脛足尤甚時或自汗或頭痛此太陽經濕熱所致用麻黃左經湯二劑而愈

一婦人患血痔兼腿痠痛似痹此陰血虛不能養於筋而然也宜先養血爲主遂以加味四斤丸治之而愈

一老人筋攣骨痛兩腿無力不能步履以局方換腿丸治之而愈

一婦人筋攣痹縱兩腿無力不能步履以三因勝濕丸治之而愈

一婦人患腿痛兼足脛攣痛服發散藥愈甚脈弦緊此腎肝虛弱風濕內侵也以獨活寄生湯治之痛止更以神應養眞丹而弗攣矣

一男子素有腿痛飲食過傷痛益甚倦怠脈弱以六君子湯加山楂神麴蒼术芎歸升麻柴胡而愈

一男子每飲食少過胃脘痞悶或吞酸兩腿作痛用導引丸二服頓愈更以六君子湯加神麴蒼术麥芽二十餘劑遂不復作

金臺王時亨年踰四十臂患毒瘃痛作嘔服托裏消毒藥愈甚予以涼膈散二劑頓退更以四物湯加芩連四劑而消按此所謂腫瘍熱毒攻心而作嘔也

邵黃門子手合骨處患一核半年後潰一小孔如粟又年餘不合日出清膿數滴或止三四滴面上赤脈數口乾夜則發熱晝則惡寒行履如故此氣血俱虛也辭不治月餘後他處相會彼云小兒有不藥之功矣余曰過火令方爲喜也已而果斃

一男子患腿癰膿已成予鍼之出二椀許飲以托裏藥一劑大發熱更以聖愈湯二劑而止翌日惡寒不食脈細如絲以人參一兩熟附子三片薑棗煎再服而愈但少食不寐更與內補黃芪湯而平

山西宋琰年踰三十臂患癰潰而不痛膿稀脈弱丹溪云疽潰深而不痛者胃氣大虛而不知痛也東垣云膿水清稀瘡口不合氣血俱虛也當以大補藥治彼不聽服消毒藥氣血虛甚遂不救丹溪云纔見腫痛參之脈證虛弱便與滋補氣血無虧可保終吉又云潰瘍內外皆虛宜以補接爲主

一女臂患腫潰久不斂寒熱交作五心煩熱飲食少思月水不通以逍遙散月餘少可更服八珍湯加丹皮香附又月餘經通再加黃芪白蘞兩月餘而愈

一人手臂結核如粟延至頸項狀似瘰癧此風濕流注用加減小續命湯及獨活寄生湯更以托裏藥倍加參芪歸术百貼而愈按此條有證無脈認作風濕流注而治當時必有所見也後用補劑百貼而愈是終不離於虛也

一兒三歲臂患毒瘃痛服解毒丸搽神功散而消嘗治臂毒便閉煩躁服五福化毒丹亦效若膿成急刺用紙撚蘸麻油紮瘡內以膏藥貼之若兒安靜不必服藥候有膿取去仍用紮貼

一人臂患疽脈數飲槐花酒一服熱頓退再與金銀花黃芪甘草十餘服而平槐花治濕熱之功最爲神速胃寒不宜過劑

尹老家貧形志皆苦自幼癩疝孟冬於手陽明大腸經分出癰第四日稠膿臂外皆腫痛在手陽明左右經中其脈俱弦按之洪緩有力此得自八風之變以脈斷之邪氣在表飲食如常大小便如故腹中和冂知味知不在裏也不惡風寒只熱躁脈不浮知不在表也表裏既和邪在筋脈之中故曰疑於血脈爲癰是也癰出身半已上故風從上受因之爲八風之變而痛只在經脈之中法當却寒調和經脈中血氣使無疑滯可愈矣宜以白芷升麻湯按此方舉一身而言故陽明爲一身之中若以各經言之而陽明亦自有表裏中三等之劑太陽亦有表裏中之方餘經皆可以類推也

一人兩臂腫痛服托裏藥日盛予謂腫屬濕痛屬火此濕熱流注經絡也用人參敗毒散加威靈仙酒黃芩南星數劑漸愈更以四物湯加蒼术黃檗桔梗二十餘劑而消按此托裏藥日盛故改作濕熱治也

一男子先患兩臁後及遍身生瘡似疥非疥時或膿水淋漓兩腿爲甚肢體倦怠作痒煩熱年餘不愈余作腎經虛火用加減八味丸而痊

奇效良方曰董守約苦脚氣攻注或教以田螺數枚搥碎傅兩股上便覺冷氣趨下至足而安蓋螺性能泌別清濁故能療脚氣之濕熱也

毘陵有姓馬人鬻酒宿患腎臟風一足發腫如瓠自

腰以下粗細通爲一律痛不可忍臥欲轉側用兩人挾持方可動或者用以鍼刀決之予用甘遂散服之至五更初細嚼米飲下至辰巳時下膿如水晶者數升卽時痛止腫退一月尚柱拐而行予再以赤烏散塗貼其膝方愈後十年過毘陵率其子致謝云向脚疾至今不發腎臟風併已失去今健步不苦矣

紹興府戒珠寺一僧病數年足不能行服立效丹而愈亭老亦傳此方

一人體充肥脚氣始發頭面渾身肢節微腫皆赤色足脛赤腫痛不可忍不敢扶策手近皮膚其痛轉甚坐而復臥臥而復起晝夜苦楚難以名狀乃北方高寒故多飲酒積久傷脾不能運化飲食下流之所致投以當歸拈痛湯一兩二錢其痛減半再服腫痛悉除止有右手指微赤腫以三稜鍼刺手爪甲端多出黑血赤腫全去不數日因食濕麪肢體覺痛又以枳實半錢大黃酒煨三錢羌活一錢半當歸身一錢水煎溫服利下兩行痛卽止矣

丁酉歲在臨安是時劇暑見吳寬夫用火踏上冀一布囊烘足卽其所以答云某舊有脚氣之疾近得一方用川椒二三斤實於疎布囊中冀火踏上跌足踏椒囊蓋椒氣性熱能辟去寒濕氣言甚有理用之月餘亦漸有效庚子歲在淳安寬夫經過因問其疾云愈之已久乃椒囊之力也不特某用之效傳之數親知皆無慁矣冀奇方也壬寅再來臨安適於賓天中邂逅都司王成之見其用火踏亦有一布囊問之豈非椒乎云又添破開檳榔并熟艾各三分之一且云果是奇妙大抵足膝之病居下屬陰又加寒濕陰盛甚矣血氣爲冷凝結非至熱不可除今用川椒性熱復加以火蒸之自然寒濕俱去信乎處方之妙也

醫方考曰唐柳子厚救死方云元和十二年二月得乾脚氣夜成痞絕左脅有塊大如石且死因大寒不知人家人號哭滎陽鄭洵美傳杉木湯服半食頃大下三次氣通塊散病蓋死矣會有救者因得不死恐他人不幸有類予病故以方傳焉

顧安中廣德人久患脚氣筋急腿腫行履不得因至湖州附船船中先有一袋物爲腿疼痛遂作腿閣之袋上微覺不痛及筋寬而不急乃問舟人袋中何物應曰宣瓜自此脚氣頓愈噫藥氣相感且能愈疾則用藥當病者從可知矣

外科正宗曰一男子年近五旬右足小指初生如粟米漸成白泡三日始痛請治頭已腐爛一指紫腫此脫疽也隨用艾火明灸十三壯始大痛乃止又用鍼刺灸頂以蟾酥餅貼灸上膏蓋本指腫上用鈹鍼擊刺七八處發泄毒血用蟾酥錠磨濃塗之腫外以眞君妙貼散敷護良肉庶不外侵其時患者脈數身發寒熱惡心體倦先用人參敗毒散解其表證次用黃連內疏湯通其大便而惡心煩熱亦止又以托裏消毒散加金銀花牛膝數服早以八味丸晚用蠟礬丸相兼服之喜其火疏毒氣隨散又用鍼刺並泄其毒故不變作解毒爲膿其腫方散後用十全大補湯加山萸五味麥冬等藥調理月餘而愈此疽若不鍼灸發泄毒氣專假藥力數圍再加峻藥攻利必致傷其元氣能保毒不侵犯得安之理

一客商右足次指生一紫泡痒痛異常次日指甲俱紫肉黑視之乃肝腎二經之毒彼曰何別也予曰甲乃肝之餘氣甲紫則肝受毒也肯乃腎之餘氣腎傷則骨黑此理甚明彼曰何以致之予曰凡人勞疲筋力傷於肝悞服熱藥傷於腎旁者曰情實有此因彼久居客旅交結私妓情懷最密極力承奉但夜並服興陽細丸期許常至立交戲謔有此二年矣前言正中其病此勞力熱藥傷腎傷筋之實也其病尤險欲辭不治彼哀告客遂欲得生返再三求治予又料酌先取妓者頂髮十餘根撚線纏紫患指盡處隨將艾炷安於所紫上面紫色處排勻三處每灸七壯各放蟾酥餅膏蓋次後脹痛相忍不令解此紫髮過夜一指皆黑相量筋骨皮肉俱死仍用利刀順節取脫患指乃冰冷惡物預煎甘草湯浸洗良久候瘀血稍盡以止血散摻之次日灸上紫色不退恐其上延又以神燈照法照之候血散皮縐旋合蟾酥丸料多加海羊研爛敷之早晚二次腫不復作紫色變紅紅色潰膿外用生肌止痛活血收斂之藥又熬參朮地黃膏朝服接補眞元午服健脾藥以回胃氣晚用金液丹以解藥毒如此調理三月而愈後人問之用妓者頂髮熬之何也予曰彼之頂髮乃心契之物也以髮靠肉雖疼而不疼彼又如在目前此釋情之意也

一婦人中年肥胖生渴三載右手食指癢痒月餘後節間生一小泡隨後本指漸腫疼脹不堪視之原泡處已生黑斑半指已變紫黑此亢陽之極乃成脫疽診之脈洪大數而有力此與肥人相反如再黑色上延壞人迅速詢問此婦先居富室無嗣每縱膏粱架烘爐炭又兼多服種子熱藥中年喪夫家業盡被嗣

人侵費致久懷憂鬱後與寡母同棲身耽寂寞此先富後貧所願不得又爲失榮證也辭不可治彼婦母子再三哀懇予亦無之奈何乃遵孫眞人治法在肉則割在指則切此外無他彼願從之先用人參養榮湯隨用軟絹條尺許纏裹黑色盡處好肉節上以漸收緊紮之庶不通行血絡次用利刀放準依節切下將手隨浸甘草溫湯中片時其血不大多其疼亦不大甚患者曰惟心之懼不知指之切下似神力之佑也予曰所嫌者切而不痛此爲氣血筋骨俱死此物雖脫其證未可得愈每以八味丸料加人參麥冬大劑煎服先救腎水次扶脾胃間用金液戊土丹以解藥毒後三日所紮指上漸漸放鬆以通血脈搽貼紅黑二膏生肉止痛次後手背手掌日漸發腫勢惡之甚惟不黑色此內毒已出之故仍用神燈照法兼以猪蹄湯淋洗後又腫上皆出數頭流去膿血不計幾許兩月外方得原腫稍退膿穢稍減又以參朮膏人參養榮湯兼服半年外方妥其婦雖活五指失矣

一男僕冬月嚴寒主使赤足履地不敢移隨後血水痲木次日十指俱紫又數日全變黑色痲木不痛請視之强用辛熱散寒活血熏洗等藥終至不應後必十指齊脫又延黑脚面骨節一段甚作疼痛彼主恐脫疽也予曰似是而本非後必不妨令患者常用桑木火炙之取其溫煖活血又能解散鬱毒其患漸腐漸脫自不走散內服健脾養血之藥調理外用生肌紅黑二膏培長肌肉百日外愈矣

一侍女年十二歲容貌頗美新主嫌其脚大用脚布任意纏緊以線密縫其脚脹痛不堪訴主不聽至半月後流出臭水方解視之其雙足前半段盡皆黑腐請視之骨肉已死予曰此已壞者不能復活則救將來未壞者可也先煮參粥食之次煎葱湯令彼家侍婦將患足浸入湯內淋洗再換湯浸但腐黑不痛者逐一剪割連續知痛者又以花蕊石散搽之保將壞者復其生已壞者得其脫內服補中益氣湯接其勞外搽生肌玉紅膏長其肉後雖得愈但二足俱致跛躄終身

一男人右足小指縫中初生一點黃粟泡皮肉隨變紫色陰疼不腫常以鍼刺視其形色眞脫疽也診其脈細數無力此腎經傷敗證也但患者生平大飲內有正副三人此必精力已竭縱治其功予强辭之後果延至脚面足底皆穿痛徹不已又飲食日少氣血日衰形體自削兩月後百苦而終

醫門法律曰徐嶽生軀盛氣充昔年因食指微傷見血以冷水濯之遂至血凝不散腫潰出膿血數升小筋脫出三節指廢不伸邇來兩足間纔至秋月便覺畏冷重綿敝之外拊仍熱內揣獨覺其寒近日從踵至膝後筋痛不便遠行雲間老醫令服八味丸深中其意及僕診自云平素脈難摸索乃肝肺二部反見洪大大爲病進況在冬月木落金寒時尤爲不宜方來之勢將有不可嚮邇者八味丸之桂附未可輕服也何也筋者肝之合也附筋之血既經食指之挹取存留無幾不能榮養筋脈加以忿怒數動肝火傳熱於筋足跗之大筋得熱而短是以牽强不便於行也然肝之所主者惟肺木性畏金稟令擁戴若君主然故必肺氣先清週身氣迺下行今肺脈大則肺氣又爲心主所傷壅窒不清是以陽氣不能下達而足寒也然則所患雖微已犯三逆平素脈細而今脈大一逆也肝脈大而熱下傳二逆也肺脈大而氣上壅三逆也設誤以桂附治之熱者愈熱壅者愈壅即日便成痿痹矣此際用藥淵乎有尋常不能測識者蓋筋脈短勁肝氣內錮須亟講於金伐木榮之道以金伐木而木反榮筋反舒匪深通元造者其孰能知之然非金氣自壅則木且奉令不暇何敢內拒惟金失其剛轉而爲柔是以木失其柔轉而爲剛故治此患先以清金爲第一義也然清金又先以清胃爲第一義不清其胃則飲酒焉而熱氣輸於肺矣厚味焉而濁氣輸於肺矣藥力幾何能勝清金之任哉金不清如大敵在前主將懦弱已不能望其成功況舍清金而更加以助火鑠金倒行逆施以爲治耶必不得之數矣翁見藥石之言漫無忌諱反疑爲張大其說而莫之信竟服八味丸一月後痿痹之情悉著不幸所言果驗乃臥牀一載必不令僕一見聞最後陽道盡縮小水全無乃肺金之氣先絕於上所以致此明明言之而竟蹈之奈何奈何

庚辰冬於鼎翁公祖園中識先生半面竊見身體重著行步艱難面色滯晦語言遲緩以爲有虛風卒中之候也因爲過慮辛巳秋召診問細察脾脈緩急不調肺脈勁大然肝木尚平陽氣尚旺是八風之邪未可易中而筋脈掣痛不能安寢者大率風而加之以濕交煽其虛所致以斯知尚可引年而施治何也風者肝之病天之氣也濕者脾之病地之氣也天氣迅疾故發之暴益以地氣之迂緩反有所牽制而不能

暴矣然氣別則病殊而氣交則病合有不可不明辨者病殊者在天氣則風爲百病之長其來微則隨相尅爲傳次必徧五臟而始烈其來甚則不繇傳次而直中唯體虛之人患始不測焉在地氣則濕爲下體之患其來微則足跗腫大然得所勝亦旋消其來甚則害及皮肉筋脈以漸而上攻亦唯陽虛之人勢始騰越焉兩者一本之天一本之地病各懸殊治亦異法者也病合者天之氣入於筋脈地之氣亦入於筋脈時乎天氣勝則筋脈張而勁焉時乎地氣勝則筋脈弛而緩焉兩者其源雖異其流則同交相醞結蔓而難圖者也先生房中之風始雖不可知然而所感則微也至若濕之一字既以醇酒厚味而釀之於內又爲炎蒸嵐瘴而襲之於外是以足患日熾雖遇身筋脈舒展亦不自如究竟不若足間晝夜掣痛癢瘍腫潰浸淫無已也夫春時之風也夏時之濕與熱也秋時之燥也三時之氣皆爲先生一身之患者也而一身之患又惟一隅獨當之亦良苦矣設內之風濕熱燥不攘足患其有寧宇乎所可嘉者惟冬月寒水司令勢稍末減而醫者不識此意每投壯筋骨之藥酒以驅其濕不知此乃治寒濕之法惟冬月病增者方宜豈以風濕熱濕而倒行逆施專不重其困耶況乎先生肺脈勁大三四日始一大便雖冬月亦喜形寒飲冷而不常近火何所見其爲寒濕也哉所以孫眞人大小竹瀝等方風濕熱燥寒五治之藥具備籠統龐雜後人全不知用若識此義爲去取則神而明之之事矣然則不辨證而用方者幾何而不誤耶

錢叔翁形體清瘦平素多火少痰邇年內蘊之熱蒸濕爲痰及辛巳夏秋間濕熱交勝時忽患右足痲木其冷有如冰石蓋熱極似寒如暑月反雨冰雹之類醫者以其足跗之冷也不細察其爲熱極似寒悞以牛膝木瓜防己加皮羌活獨活之屬溫之甚且認爲下元虛憊悞用桂附河車之屬補之以火濟火以熱益熱繇是腫潰膿水浸淫數月踝骨以下足背指踵糜而不用總爲悞治而至於如此其極耳其理甚明無難於辨若果寒痰下墜不過堅凝不散止耳甚者不過痿痹不仁止耳何至腫而且潰黃水淋漓腐肉穿筋耶彼不知爲醫藥所悞乃委咎於方隅神殺所致豈其然哉此與傷寒壞證熱邪深入經絡而生流注無少異也所用參膏但可顧理元氣而無清解濕熱之藥以佐之是以未顯厥效以元老之官不可以理繁劇設與竹瀝同事人參固其經竹瀝通其絡則甘寒氣味相得益彰矣徐太掖服人參以治盧風悞佐以附子之熱迄今筋脈短縮不便行持亦繇不識甘寒可通經絡也今用參膏後脾氣亦既大旺健運有加矣此時儻能樽節飲食俾脾中所生之陽氣得顓力以驅痰驅熱則痰熱不留行而足患並可結局乃日食而外加以夜食雖脾氣之旺不爲食所傷然以參力所生之脾氣不用之運痰運熱止用之以運食誠可惜也今者食入亦不易運以助長而反得衰迺至痰飲膠結於胃中爲飽爲悶爲煩咳而痰不應總爲脾失其健不爲胃行津液而飲食反以生痰漸漬充滿肺竅咳不易出雖以治痰爲急然治痰之藥大率耗氣動虛恐痰未出而風先入也唯是碓以甘寒之藥杜風消熱潤燥補虛豁痰乃爲合法至於辛熱之藥斷斷不可再悞矣醫者明明見此輒用桂附無算想必因膿水易乾認爲辛熱之功而極力以催之結局耳可勝誅哉

錢小魯奕秋之徒也兼善飲每奕必飲飲必醉歲無虛日辛巳秋浩飲晚歸嘔吐寒熱兼作骨節煩疼醫以時行感冒表散藥治之不愈更醫知爲酒毒於寒涼藥中用熱藥爲鄉導治之亦不愈臥牀二十餘日始請余診其脈洪大促急身軟著席不能動展左腿痛如刀刺鼻煤從病起至是總未大便此癰疽之候也歸語兩門人王生欣然有得曰迄今燥金司令酒客素傷濕熱至此而發金盛則木衰是也筋骨疼痛而不能起於牀臟燥則腑亦燥是以津液乾枯而大腸失其潤以清金潤燥治之可矣吳生曰不然酒毒大發腸胃如焚能俟掘井取水乎是必以大下爲急也余曰下法果勝但酒客胃氣素爲多嘔所傷藥入胃中必致上湧不能下達即數膈導瀉等法無所用之掘井固難開渠亦不易奈何奈何吾爲子輩更開一竇夫酒者清洌之物不隨濁穢下行惟喜滲入者也滲入之區先從胃入膲膲爲清淨之府同氣相求故也然膲之攝受無幾其次從胃入腸膀胱滲之化溺爲獨多焉迨至化溺則所存者酒之餘質其烈性實惟膲獨當之每見善飲者必淺斟緩酌以俟腹中之滲若連飛數觥有傾囊而出耳是以酒至半酣雖懦夫有揮拳厲座之膽雖寶人有千金一擲之膽雖猶士有鑽穴踰垣之膽甚至兇徒有撫劍殺人之膽以及放浪形骸之流且有一飲數斛不顧餘生之膽以小魯之赤貧而膲不喪落者大非借資於酒乎其

受病實有較他人不同者蓋膽之腑原無輸瀉膽之熱他人可移於腦濁涕從鼻竅源源而出亦少殺其熱若小魯則陽分之陽過旺陽分之陰甚衰鬢髮全無直似南方不毛之地熱也極矣肯受膽之移熱乎幸其頭間多汗腦熱暗洩不爲大患乃膽熱既無可宣又繼以酒之熱時之燥熱淫內熾脈見促急幾何不致極慮耶故膽之熱汁滿而溢出於外以漸滲於經絡則身目皆黃爲酒癉之病以其滲而出也可轉驅而納諸膀胱從溺道而消也今獨攻環跳之穴則在膽之本屬無可驅矣且其步履素爲此穴所苦受傷已久氣離血散熱邪瀰漫留連服藥縱多有拒而不納耳何能取效即欲鍼之此久傷之穴有難於祛瀉者設遇良工如古人輩將何法以處此乎吾更有慮焉有身以後全賴穀氣充養穀氣即元氣也穀入素少之人又即藉酒爲元氣今以病而廢飲何所恃爲久世之資耶吾諦思一法先搐腦中黃水出鼻次鍼膽穴之絡腦間者數處務期膽中之熱移從腦鼻而出庶乎環跳穴中結邪漸運而腸胃之枯槁漸回然後以瀉膽熱之藥入酒中每日仍痛飲一醉飲法同而酒性異始得陰行而妙其用蓋其以生平之偏造爲堅壘必藉酒轉爲鄉導乃克有濟也豈清金潤燥與下奪之法能了其局乎兩生踴躍曰蒙誨治法令人心地開朗請筆之以誌一堂授受之快錄此付渠子令送商顧幼疏孝廉求救小魯竟阻之或以余言爲不然耶

黃鴻軒手臂忽生癰癤漫腫頭痛極莫耐外科醫者咸謂熱毒所致揆之平素淡泊明志寧靜居心絕無生熱致毒之因究莫識其所起也尊公我兼謂昌善議病盍舍樽俎而一代庖人乎昌曰吾議此證請先爲致賀後乃言之瘡瘍之起莫不有因外因者天行不正之時毒也起居傳染之穢毒也內因者醇酒厚味之熱毒也鬱怒橫決之火毒也治火毒與治諸毒原自天淵蓋火與元氣勢不兩立以寒涼折之則元氣轉涸矣鴻軒於四者總無其因不問知爲胎毒之餘也凡人稟受天地之氣有清濁之不同惟純粹以精之體其福澤壽算俱不可限量然從父母搆精而有身未免夾雜慾火於形骸所賴者惟在痘瘡一舉暗將所藏慾火運出軀外復其粹精之恒體如鑛金相似必經紅爐煅煉而查滓與精瑩始分之爲兩吾嘗以此法觀出痘者之眸子七八日後眼開之時黑白分明者精金也赤筋紅膜包裹者混金也至於瞳人模糊神光不現則全非金也鴻軒幼時出痘太多元氣不能充灌又爲雜證所妨臟腑中之火毒雖盡而軀殼間之留滯猶存所以痘癰之發必於手足之委中曲池者則以零星小毒無處可容而潛避於呼吸難到之處耳今之癰癤正當委中之穴其爲痘毒何疑毒伏肘腋之下原無所害但粹精之體微有夾雜是亦寶鑑之纖塵白璧之微纇也日者太和元氣充滿周身將十五年前之餘滓盡欲化爲膿血而出他人見之爲毒吾早已卜其爲興者機矣豈有暢於四肢而不發於事業者哉治法外用馬齒莧熬膏敷之速破內用保元湯托之盡出仍以痘癰門藥爲治即日自當痊愈必不似瘡毒之曠日持久但不識證而以治瘡毒寒涼瀉火諸藥投之適以增楚貽患耳孰謂外科小恙可無樽俎折衝之人耶如法治之潰出膿水甚多果不用生肌長肉而自愈

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百二十卷目錄

醫部彙考二百

前陰門一

黃帝素問陰陽應象大論　陰陽別論　診要經終論　熱論　風論　五藏生成篇　脈要精微論　平人氣象論　大奇論　脈解論　痿論　厥論　玉機眞藏論　千金要方論　四時刺逆從論　至眞要大論　五常政大論
靈樞經邪氣臟腑病形篇　經脈篇　經筋篇　五音五味篇　刺節眞邪篇　本神篇　本藏篇
張機金匱要略陰陽易差後勞復病脈證並治　陰陽毒　陰狐惑　陰陽毒　陰陽易　陰陽差後勞復　陰陽

也此臟腑皆病榮衛不行故經氣絕而死也

風論

腎風之狀多汗惡風面痝然浮腫脊痛不能正立其色始隱曲不利脛在肌上其色黑

註風邪干腎則水氣上升故面痝然浮腫風行則水涘也腎主骨故脊痛不能正立腎主藏精少陰與陽明會於宗筋風傷腎氣故隱曲不利水氣上升故黑在肌上水乘土也

五臟生成篇

黃脈之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝女子同法得之疾使四肢汗出當風

註四肢汗出當風則風濕內乘於脾而爲積氣蓋風木之邪內干脾土濕與陰土同氣相感故留聚而爲積也脾氣不能灌溉於四旁則逆於中而爲厥氣矣名曰厥疝者氣逆而痛也

黑脈之至也上堅而大有積氣在小腹與陰名曰腎痹得之沐浴清水而臥

註尺以候腎黑脈之至上堅而大者腎藏有積而腎脈堅大也上堅者堅大在上而不沉也與陰者小腹而兼於前陰也腎藏寒水主氣亦同氣相感也

脈要精微論

帝曰診得心脈而急此爲何病病形何如岐伯曰病名心疝少腹當有形也帝曰何以言之岐伯曰心爲牡藏小腸爲之使故曰少腹當有形也

註諸急爲寒心爲陽藏而畏寒故脈急心爲君主之官而不受邪故脈見於藏而形見於腑也

平人氣象論

寸口脈沉而弱曰寒熱及疝瘕少腹痛

註寸爲陽沉爲陰寸口脈沉而弱此正氣虛而陽邪直入於裏陰陰陽相乘故主寒熱陽邪入裏故又主疝瘕而少腹痛也

脈急曰疝瘕少腹痛

註諸急爲寒故主疝瘕在內

大奇論

腎脈大急沉肝脈大急沉皆爲疝心脈搏滑急爲心疝肺脈沉搏爲肺疝三陽急爲瘕三陰急爲疝

註大則爲虛急則爲寒沉爲在下在裏故皆爲疝心疝之有形在少腹其氣上搏於心故心脈搏而滑急也肺脈浮而反沉搏是肺氣逆聚於內而爲肺疝矣瘕假也假物而成形疝字從山艮止高起之象故病三陽之氣者爲瘕三陰之氣者爲疝

脈解篇

厥陰所謂癲疝婦人少腹腫者厥陰者辰也三月陽中之陰邪在中故爲癲疝少腹腫也

註厥陰木火主氣故主於三月四月之交三月陽盛之時而厥陰主氣故爲陽中之陰邪爲陰氣也厥陰之氣在內而未得盡出故爲癲疝腹腫也所謂癲癰疝膚脹者曰陰亦盛而脈脹不通故曰癲癰疝也

註陰亦盛者厥陰之氣亦盛於外而脈脹不通故癲癰膚脹也癲癰疝者陰器腫而不得小便也

痿論

思想無窮所願不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱發爲筋痿及爲白淫故下經曰筋痿者生於肝使內也

註思想無窮所願不得則肝氣傷矣前陰者宗筋之所聚足厥陰之脈循陰股入毛中過陰器意淫於外則慾火內動入房太甚則宗筋縱弛陰痿白淫乃慾火盛而淫精自出也筋痿者又生於所願不遂而傷肝兼之使內入房之太甚也

陽明者五臟六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也

註陽明爲水穀血氣之海五臟六腑皆受氣於陽明故爲臟腑之海宗筋者前陰也前陰者宗筋之所聚太陰陽明之所合也諸筋皆屬於節主束骨而利機關宗筋爲諸筋之會陽明所生之血氣爲之潤養故諸痿獨取於陽明

衝脈者經脈之海也主滲灌谿谷與陽明合於宗筋

註衝脈起於胞中上循背裏爲經絡之海其浮而外者滲灌於谿谷之間與陽明合於宗筋是以宦者去其宗筋則傷衝任血瀉不復而鬚不生陰陽總宗筋之會會於氣街而陽明爲之長

註少陰太陰陽明衝任督脈總會於宗筋循腹上行而復會於氣街氣街者腹氣之街在衝脈於臍左右動脈間乃陽明之所主故陽明爲之主也故陽明虛則宗筋縱

註陽明爲水穀之海主潤宗筋陽明虛則宗筋縱宗筋縱弛不能束骨而利機關則成痿躄矣故諸痿獨取陽明

厥論

前陰者宗筋之所聚太陰陽明之所合也

註 宗筋根起於胞中內連於腎臟陰陽二氣生於胃腑輸於太陰藏於腎臟太陰陽明合聚於宗筋者中焦之太陰陽明與下焦之少陰太陽中下相合而會合於前陰之間

厥陰之厥則少腹腫痛腹脹涇溲不利好臥屈膝陰縮腫胕內熱

註 足厥陰之脈內抵少腹挾胃屬肝絡膽故厥則少腹腫痛而腹脹其下循陰股入毛中環陰器抵少腹是以涇溲不利陰縮而腫肝主筋膝者筋之會筋脈厥逆不能濡養筋骨故好臥而屈膝其脈起於大指叢毛之際上循足胕厥陰木火主氣榮俞厥逆故胕內腫熱也

玉機眞藏論

風者百病之長也弗治脾傳之腎病名曰疝瘕少腹冤熱而痛出白一名曰蠱

註 邪聚下焦故少腹冤熱而痛溲出淫濁也蠱言陰邪居下而壞事之極

骨空論

任脈爲病男子內結七疝女子帶下瘕聚

註 七疝者其病各異其名不同瘕者假血液而時下汁沫聚者氣逆滯而爲聚積也衝脈之血氣散於脈外之氣分故病則逆氣裏急

督脈生病從少腹上衝心而痛不得前後爲衝疝

註 其脈從少腹直上貫心故衝心而痛繞於前後二陰之纂間故不得前後而爲衝痛之疝

四時刺逆從論

厥陰滑則病孤疝風少陰滑則病肺風疝太陰滑則病脾風疝陽明滑則病心風疝太陽滑則病腎風疝少陽滑則病肝風疝

註 滑者陽氣盛微有熱氣病之謂疝氣盛而生熱則爲疝痛所謂風者熱所生也

至眞要大論

太陽在泉寒淫所勝民病少腹控睾引腰脊上衝心痛血見噦痛頷腫

註 丑未之歲太陽在泉寒淫於下則膀胱與腎受之膀胱居於少腹故少腹痛腎主陰器故控引睾丸太陽之脈挾脊抵腰中絡心故引腰脊腎脈絡心故上衝心痛心主血而寒氣逼之故血見噦痛頷腫乃小腸經病小腸者心之腑也亦水邪上侮火臟火腑而然

陽明司天丈夫癲疝婦人少腹腫

註 癲疝少腹腫皆肝經之病

太陽之復少腹控睾引腰脊上衝心

註 此亦厥陰之病也

陽明之勝清發於中左胠脅痛溏泄內爲噦塞外發癲疝胃中不便噦塞而欬

註 金氣寒肅故清發於中金勝則木氣受虧故爲脅痛癲疝

太陰在泉主勝則寒氣逆滿食飲不下甚則爲疝

註 主勝則寒氣逆滿者水淫而上乘於土也四之客氣乃厥陰風木食飲不下甚則爲疝者濕氣上逆而病及厥陰之經也

五常政大論

太陰司天濕氣下臨腎氣上從胃中不利陰痿氣大衰而不起不用

註 胃中不利水氣上逆也陰痿者腎氣衰於下也夫陽氣生於腎陰而運用於膚表腎氣大衰故陰器不起不用

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

肝脈微大爲肝痹陰縮滑甚爲癪疝

註 大主肝氣盛陰縮癪疝肝氣逆於下也

心脈微滑爲心疝引膺小腹鳴

脾脈微大爲疝氣滑甚爲癪癰濇甚爲腸癪微濇爲內癪多下膿血

註 脾爲陰濕之土濕熱則爲疝癪虛而有寒則爲腸癪脾臟多血少氣故下膿血

腎脈滑甚爲癰癪大甚爲陰痿

註 腎有熱則爲睾丸腫癪痿者陰器痿而不舉也

經脈篇

肝足厥陰之脈是動則爲腰痛不可以俛仰丈夫癪疝婦人少腹腫是主肝所生病者孤疝

註 腰痛不可以俛仰蓋厥陰從少陽中氣之化厥陰之化氣病也癪疝少腹腫皆厥陰之本氣病也足厥陰氣絕則筋絕厥陰者肝脈也肝者筋之合也筋者聚於陰器而脈絡於舌本也故脈弗榮則筋急筋急則引舌與卵故脣青舌卷卵縮則筋先死庚篤辛死金勝木也

註 足厥陰之氣主筋故氣絕則筋絕厥陰者肝脈肝者筋之合謂厥陰之氣合於肝脈肝臟之氣合

於筋也聚於陰器者脈氣之會於宗筋也筋聚於陰器而絡於舌本故脈不榮於筋則筋急而舌卷卵縮矣厥陰氣絕則筋先死庚篤辛死金勝木而肝藏之木氣絕也

經筋篇

手少陰經筋之病寒則反折筋急熱則筋縱挺不收陰痿不用陽急則反折陰急則俛不伸焠刺者刺寒急也熱則筋縱不收無用熠鍼名曰季冬痹也

註手少陰其病在氣而爲經筋之病者寒則反折筋急熱則筋縱不收陽急則反折陰急則俛不能伸蓋少陰本陰而標陽故有寒熱陰陽之證少陰之從本從標也少陰主氣故爲季冬之痹

足厥陰之筋起於大指之上上循陰股結於陰器絡諸筋其病陰器不用傷於內則不起傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收治在行水清陰

註陰器乃宗筋之會而主筋故連絡於三陰三陽之筋也其病爲陰器不用傷於內則陰痿不用傷於寒則陰器縮入傷於熱則陰挺不收厥陰從中見少陽之火化故有寒熱之分夫金氣之下水氣治之復行一步木氣治之厥陰之木氣本於水故治在行水以清厥陰之氣也

五味篇

陰者積筋之所終也故酸入而走筋矣

註陰者前陰積筋者宗筋也宗筋者筋之主也酸入於宗筋故走筋蓋足厥陰肝經主宗筋而外合於遍體之筋

五音五味篇

黃帝曰士人有傷於陰陰氣絕而不起陰不用然其鬚不去其故何也宦者獨去何也願聞其故岐伯曰宦者去其宗筋傷其衝脈血瀉不復皮膚內結脣口不榮故鬚不生

註宦者去其宗筋傷其衝脈血瀉而不復上榮於脣口故鬚不生此因割去前陰而傷其先天之精氣也

有天宦者此天之所不足也其任衝不盛宗筋不成有氣無血脣口不榮故鬚不生

註天宦者謂之天閹不生前陰即有而小縮不挺不長不能生子此先天所生之不足也其衝任不盛宗筋不成有氣無血脣口不榮故鬚不生

刺節眞邪篇

莖垂者身中之機陰精之候津液之道也

註莖垂者乃宗筋之會腎者胃之機關主受藏津液夫腎臟所藏之津液從宗脈而上滲於空竅故曰莖垂者身中之機陰精之候津液之道也

本神篇

肝悲哀動中則傷魂魂傷則狂忘不精不精則不正當人陰縮而筋攣兩脅骨不舉毛悴色夭死於秋

註悲哀肺之情也如肝因悲哀動中則傷肝臟所藏之魂魂傷則狂忘不精蓋肝將軍之官謀慮出焉肝志傷則不能處事精詳矣膽爲中正之官決斷出焉臟氣傷則膽志亦不正而無決斷矣肝主筋而脈絡陰器陰縮筋攣脅骨不舉情志傷而及於形也

本臟篇

耳後陷者腎下腎下則爲狐疝

註狐疝者偏有大小時上時下如狐之出入無時此腎臟之疝也

漢張機金匱要略

陰腫濕

心水者其身重而少氣不得臥煩而躁其人陰腫

腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足逆冷面反瘦

陰吹

胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也膏髮煎導之

食忌

魚無腸膽者不可食食之三年陰不起女子絕生

疝

腹痛脈弦而緊弦則衛氣不行即惡寒緊則不欲食邪正相搏即爲寒疝寒疝遶臍痛若發則白津出手足厥冷其脈沉緊者大烏頭煎主之

寒疝腹中痛及脅痛裏急者當歸生薑羊肉湯主之

寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛灸刺諸藥不能治抵當烏頭桂枝湯主之

其脈數而緊乃弦狀如弓弦按之不移脈數弦者當下其寒脈緊大而遲者必心下堅脈大而緊者陽中有陰可下之

趺陽脈當伏今反緊本自有寒疝繞臍中痛醫反下之下之即胸滿短氣

陰狐疝氣者偏有小大時時上下蜘蛛散主之

陰蝕

少陰脈滑而數者陰中即生瘡陰中蝕瘡爛者很牙

湯洗之

華佗中藏經

卵縮

脾中寒足熱則皆使人腹中痛不下食又病其舌强語澀轉卵縮牽陰股中引痛

驗病生死

凡病舌卷卵縮者死

掌腫舞紋臍腫出囊莖俱腫者死

疝脈

左手寸口陽絕則無小腸也六日死病則臍脾小腹中有疝瘕也

唐孫思邈千金方

陰癩

癩有四種有腸癩卵腫氣癩水癩腸癩卵脹難瘥氣癩水癩針灸易治

妒精瘡

有人自少至長陰下常有乾癬者宜依癬方主之有五勞七傷而得陰下瘡濕搔之黃汁出者宜用補丸散主之仍須傳藥治之亦有患妒精瘡者以妒精方治之夫妒精瘡者男子在陰頭節下婦人在玉門內並以疳瘡作臼齊食之大痛疳即不痛也

跌陽脈滑而數法當下重少陰脈滑而數婦人陰中生瘡

宋朱肱活人書

囊縮

傷寒六七日煩滿囊縮其脈尺寸俱微緩此足厥陰肝經受病也

脈浮緩必囊不縮外證必發熱惡寒似瘧爲欲愈宜桂枝麻黃各半湯若尺寸脈俱沉短者必是囊縮毒氣入藏宜承氣湯下之

大抵傷寒病藏腑傳變陽經先受病故次第傳入陰經以陽主生故太陽水傳足陽明土土傳足少陽木爲微邪也陰主殺故木傳足太陰土土傳足少陰水水傳足厥陰木至六七日當傳厥陰肝木必移氣赴於脾土脾再受賊邪則五藏六腑皆困而危始營衛不通耳聾囊縮不知人而死矣速用承氣湯下之可保五死一生古人云脾熱病則五藏危又云土敗木賊則死若第六七日傳厥陰脈得微緩微浮爲脾胃脈故知脾氣全不再受客邪無所容否極泰來榮衛將復水升火降則寒熱作而大汗解矣

嚴用和濟生方

七疝

巢氏云疝者痛也皆由榮衛虛弱飲食寒溫不調致風冷邪氣乘虛入於腹中遂成諸疝發則小腹疼痛痛或繞臍或逆上搶心引心背痛甚則手足厥冷自汗嘔逆或大小便祕難大抵諸疝之脈當弦緊蓋弦者寒也緊者痛也疝有七證厥疝癥疝寒疝氣疝盤疝附疝狠疝是也何以言之厥疝則心痛足冷食已則吐癥疝腹中氣乍滿氣積如臂寒疝因寒飲食卒然當下腹中痛氣疝腹中乍滿乍減而痛盤疝腹中痛引臍旁附疝腹痛連臍下有積聚狠疝小腹與陰相引而痛諸疝不愈邪氣留滯乃成積聚其爲病也或左或右或下有如覆杯或臍上下如臂或腹大如盤令人羸瘦少氣洒淅寒熱晝臥飲食不爲肌膚或腹滿嘔泄或遇寒則痛其脈厥而緊浮而牢皆積聚之脈也但牢彌急者生虛弱急者不可治

陰癩

夫陰癩之證有四種一曰腸癩二曰氣癩三曰卵脹四曰水癩是也聖惠云腎氣虛風冷所侵流入於腎不能宣散而然也三因云陰癩屬肝係宗筋胃陽明養之考之衆論俱爲至當多由不自衛生房室過度久蓄憂思恐怒之氣或坐臥冷濕處或勞役無節皆能致之病則卵核腫脹偏有大小或堅硬如石或臍腹絞痛甚則膚囊腫脹多成瘡毒輕則時出黃水甚則成癰潰爛大抵卵脹腸癩皆不易治氣癩水癩灸之易愈也又有小兒有生以來便如此者乃宿疾也四癩治法橘核丸用之屢驗

寶漢卿瘡瘍全書

腎癰

此毒年高者因宿有疝氣疾及感冒寒濕氣辛勤少壯爲因房事所得初起陰囊赤腫身發寒熱攻水道歸來二穴痛不可忍用手按之皮寬不急可用敗毒散加入當歸製川楝子發散用手按之急脹似火之熱急用陰囊毒之藥治之更服黃礬丸

倘或開刀須待其熟以油頭繩紮住腎子以小刀開海底穴其膿血即流盡矣外貼金絲等膏少勞戒色并避湯火風氣及諸毒物

陰囊毒　卽外腎癰

此證因肝經濕熱不利遂流毒於膀胱腎經感冒寒暑邪氣偏盛於陰之經絡以致血氣凝聚寒濕不散陰囊上壓而痛或潰爛皮脫腎子懸挂宜用瀉肝清

熱湯服之外用鐵箍散圍之

此證腐壞急用烏金散敷之或潰爛飲食少思日晡發熱急服加味小柴胡湯痛甚加黃連小便不利加木通車前子口渴加天花粉麥門冬五味子

陰蝕瘡

陰蝕瘡之生皆由臟中虛怯腎氣衰少風邪入腑毒惡損傷榮衛或與有毒婦人交接不曾洗淨故時痛時癢以漸成竅作疳膿水湧流若不早治命亦難保先用蛇牀子地骨皮桑槐枝煎湯溫洗內服清熱消疳解毒湯外用摻藥先用金絲膏後用紫金膏拔出毒水易能長肉

夫陰蝕瘡者即下疳也陰汗臊臭故莖根生疳瘡乃肝經所屬之分野

內外蛀疳身熱小便澀滯宜服小柴胡湯加龍膽草黃連車前子

左右便毒 又名血癥

夫便毒者生於小腹兩腿合縫之間或行路遠涉辛苦或上或下低閃肭氣或房事所傷或男女大慾不得直遂其志故敗精滯血留聚中途或夢寐之間而不洩或妄想不能忘情息念故結成毒然腎者作強之官伎巧所出一有所感精血凝滯此證遂生初起之時寒熱交作兩腿牽絆腫起不能屈伸乃證之漸也急服龍膽湯

小腸流注

此證受在心經伏熱結聚成毒也當用敗毒流氣飲再服清心流氣飲治之時服蠟礬丸

金劉完素六書

癩疝

癩疝少腹控卵腫急絞痛也寒主拘縮寒極而土化治之故腫滿經言丈夫癩疝謂陰器連少腹急痛其婦人少腹腫皆肝足厥陰脈之爲病經註曰寒氣聚而爲疝也又按難經言五臟皆有疝但脈急也註言脈急者寒之象然寒則脈當短小而遲今言急者非急數而洪也由緊脈主痛急爲痛甚病寒雖急亦短小也所以有痛而脈緊急者脈爲心之所養也凡六氣而痛則心神不寧而緊急不得舒緩故脈亦從之而見欲知何氣爲其痛當適其緊急相兼之脈而可知如緊急洪數則爲熱痛之類又經言脾傳之腎病名曰疝瘕少腹煩寃而痛出白液一名曰蠱註言少腹痛溲出白液也一作客熱內結銷鑠脂肉如蟲之食故名曰蠱也然經之復言熱爲疝瘕則亦不可止言爲寒當以脈證別之

小腸氣

甲乙經云小腸病結於腰上而不下痛衝心肺邪所系茴香楝實丸主之

陰疝

足厥陰之脈環陰器抵小腹腫或痛腎虛寒水涸宜瀉邪補脈爲治蒺藜湯主之

蠱疝

脾風傳腎一名疝氣小腹痛出白液名曰蠱左傳云以喪志名爲蠱病乃眞精不守也大建中湯主之

心疝

心脈急小腹有形心不受邪必傳於腑故小腹有形心氣逆不順則痛不已當兼心氣治不止爲有寒邪所中木香散主之

元張從政儒門事親

莖中痛

莖中痛者先宜清劑寒劑奪之後以淡劑甘劑分之

疝本肝經宜通勿塞論

疝有七前人論者甚多非靈樞素問銅人之論余皆不取非余好異也但要窮其源耳七疝者何寒疝水疝筋疝血疝氣疝狐疝癩疝是謂七疝俗工不識因立謬名或曰膀胱或曰腎冷或曰小腸氣小兒曰偏氣立名既謬併喪其實何哉蓋醫者既斷爲膀胱腎冷小腸氣又曰虛寒所致其藥之用也不鹿茸巴戟則杜仲蓯蓉不附子烏頭則乾薑官桂不楝實蘹香則金鈴補骨脂朝吐暮餌曾無殊效三二十年牢不可去間因微病稍似開通執此微芒浸成大錯標既不除本必歸甚處處相傳曾無覺者豈知諸疝皆歸肝經其奈通流歸之小腸脬囊大膀胱水腑專司滲泄小腸水道專主通流腎爲少陰總統二水人之小溲自胃入小腸滲入膀胱膀胱者脬囊也氣化則水出莖端此常道也及其爲疝乃屬足厥陰肝經蓋環陰器而上入小腹者足厥陰肝經也夫肝腎皆屬於下與衝任督相附然靈樞經言足厥陰肝經病則有遺溺癃閉狐疝專主腎與膀胱小腸三經則不言疝是受疝之處乃肝之部分也且內經言男子宗筋爲束骨之會而肝專主筋睪者囊中之丸雖主外腎非厥陰環而引之則玉莖無由伸縮在女子則爲篡戶其內外爲二其一曰廷孔其二曰窈漏此足厥陰與衝任督之所會也靈樞言足厥陰之經筋聚於陰器

其病傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收治在行水清陰氣故陽明與太陰厥陰之筋皆會於陰器惟厥陰主筋故爲疝者必本之厥陰靈樞又言足厥陰之別名曰蠡溝去內踝五寸別走少陽循脛上睪結於莖其病氣逆睪腫卒疝實則挺長虛則暴痒取之所別也豈非厥陰爲受病之處耶靈樞又言邪在小腸連睪系屬於腎貫肝絡肺心系氣盛厥逆上衝腸胃熏肝散於肓結於臍故取之肓原以散之取太陰以平之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以調之此其初雖言邪在小腸至其治法必曰取厥陰以下之乃知諸疝關於厥陰可以無疑以脈考之素問云厥陰滑爲狐風疝少陽滑爲肺風疝太陰滑爲脾風疝陽明滑爲心風疝太陽滑爲腎風疝少陰滑爲肝風疝凡此六疝雖見於他脈中皆言風疝者足厥陰肝經之氣也靈樞亦曰心脈微滑爲心疝肝脈滑甚爲癀疝腎脈滑甚爲癃癀凡此三臟脈之疝亦以滑爲疝也素問又云脈大急皆爲疝心脈滑傳爲心疝肺脈沉傳爲肺疝三陰急爲疝三陽急爲瘕王太僕云太陽受寒血凝爲瘕太陰受寒氣聚爲疝此言太陰受寒傳之肝經可以溫藥逐之而不可以溫藥補之若補之者是欲病去而強挽留之也歷考素問三陽爲病發寒熱其傳爲癩疝此亦言膀胱非受病之處必傳於厥陰部分然後爲疝也又言病在少腹腹痛不得大小便病名曰疝得之寒言脈急者曰疝瘕少腹痛凡言少腹者豈非厥陰之部分耶又言脾風傳胃名曰疝瘕此謂非肝木不能爲風氣名曰厥疝蓋脾土虛而不能制水又爲肝木所凌也又言督脈爲衝疝蓋厥陰與衝任督俱會於前陰也豈不明哉至如運氣中又言歲太陽在泉寒淫所勝民病少腹控睪蓋寒客於小腸膀胱則肝木縮而不得伸此母傳之子也陽明司天燥淫所勝丈夫癩疝婦人少腹痛此言肝氣不得上行爲金所抑鬼賊故也又言太陰在泉土勝則寒氣逆滿食飲不下甚則爲疝此亦言寒客太陰濕土土不勝水水傳之肝經也又嘗徧閱銅人俞穴亦相表裏如背上十三椎俞肝經言寒疝腹部中行惟陰交一穴言寒疝任脈之所發也關元一穴言暴疝小腸之募足三陰任脈之會也中極一穴言疝瘕膀胱之募亦足三陰任脈之會也曲骨一穴言癀疝任脈足厥陰之會也其腹部第二行肓腧二穴言寒疝衝脈足少陰之會也四滿二穴言疝瘕衝任脈足少陰腎之會也其腹部第三行大巨二穴言癀疝足陽明脈氣之所發也氣衝二穴言癩疝莖中痛兩丸寒痛亦足陽明脈氣之所發也其腹部第四行府舍二穴言疝痛足太陰厥陰陰維之交會也衝門二穴言陰疝足太陰厥陰之會也其在側脅者五樞二穴言寒疝陰邪上入少腹帶脈下三寸也其在足六經者足厥陰穴十名言疝者七謂大敦行間太衝中封蠡溝中都曲泉足少陽穴十四名言疝者一謂丘墟穴也足太陰穴十一名言疝者一謂陰陵泉也足陽明穴十五名言疝者一謂陰市穴也足少陰穴十名言疝者五謂然谷太谿照海交信築賓也足太陽穴十八名言疝者二謂金門合陽也由是言之惟厥陰言疝獨多爲疝之主也其他經穴雖亦治疝終非受疝之地但與足厥陰相連耳或在泉寒勝木氣攣縮禁於此經或司天燥勝木氣抑鬱於此經或忿怒悲哀憂抑頓挫結於此經或藥淋外固閉尾縮精壅於此經其病差別如此不知世間之方多熱補信俗方則素問靈樞銅人非也信素問靈樞銅人則俗方非也嗚呼余立於醫四十餘歲識練日久因經識病然後不惑且夫遺溺閉癃陰痿脬痹精滑白淫皆男子之疝也不可妄歸之腎冷血涸不月月能腰膝上熱足躄嗌乾癃閉少腹有塊或定或移前陰突出後陰痔核皆女子之疝也但女子不謂之疝而曰瘕若少年得之不計男子婦人皆無子故隱蔽委曲之事了不干脬腎小腸之事乃足厥陰肝經之職也俗方止言脬腎小腸殊不言肝木一句惑人甚矣且肝經乙木也木屬東方爲心火之母也凡疝者非肝木受邪則肝木自甚也不可便言虛而補之難經所謂東方實西方虛瀉南方補北方此言瀉火木自平金自清水自旺也昔審言爲蔡之參軍也因坐濕地疝痛不可堪諸藥莫救余急以導水丸禹功散瀉三十餘行腫立消痛立減又項關一男子病卒疝暴痛不任倒於街衢人莫能動呼予救之余引經證之邪氣客於足厥陰之絡令人卒疝故病陰丸痛也余急瀉大敦二穴大痛立已夫大敦穴者乃足厥陰之二穴也殄寇鎮一夫病瘖瘧發渴痛飲蜜漿劇傷冰水醫者莫知瀉去其濕反雜進薑附濕爲燥熱所壅三焦閉溢水道不行陰道不興陰囊腫墜大於升斗余先以導水百餘丸少頃以猪腎散投之是夜瀉青赤水一斗遂失痛之所在又一夫病卒疝赤腫大痛數日不止諸藥如水投石余以導

水一百五十九令三次咽之次以通經散三錢空腹淡酒調下五更下臟腑壅積之物數行痛腫皆去不三日平復如故內經曰木鬱則達之謂吐之令條達也肝積本當吐然觀其病之上下以順爲貴仲景所謂上宜吐下宜瀉也

七疝病形

寒疝久而無子其狀囊冷結硬如石陰莖不舉或控睾丸而痛得於坐臥濕地或寒月涉水或置雨雪或坐臥磚石或風冷處使內過勞宜以溫劑下之

水疝其狀腎囊腫痛陰汗時出或囊腫而狀如水晶或囊痒而燥出黃水或少腹中按之作水聲得於飲水醉後使內過勞汗出而遇風寒濕之氣聚於囊中故水多令人爲卒疝宜以逐水之劑下之有漏針去水者人多不得其法

筋疝其狀陰莖腫脹或潰或膿或痛而裏急筋縮或莖中痛痛極則痒或挺縱不收或白物如精隨溲而下得於房室勞傷及邪術所使宜以降心之劑下之

血疝其狀如黃瓜在大腹兩旁橫骨兩端約中俗云便癰得於重感春夏大熇勞動使內氣血流溢滲入脬囊留而不去結成癰腫膿少血多宜以和血之劑下之

氣疝其狀上連腎區下及陰囊或因號哭忿怒則氣鬱之而脹怒哭號罷則氣散者是也有一治法以鍼出氣而愈者然鍼有得失宜以散氣之藥下之或小兒亦有此疾俗曰偏氣得於父已年老或年少多病陰痿精怯强力入房因而有子胎中病也此疝不治惟築賓一穴言之

狐疝其狀如瓦臥則入小腹行立則出小腹入囊中狐則晝出穴而溺夜則入穴而不溺此疝出入上下往來正與狐相類也亦與氣疝大同小異今人帶鉤鈐是也宜以逐氣流經之藥下之

癲疝其狀陰囊腫縶如升如斗不痒不痛者是也得之地氣卑濕所生故江淮之間泗塘之處多感此疾宜以去濕之藥下之女子陰戶突出雖亦此類乃熱則不禁固也不可便謂虛寒而澀之燥之補之本名曰瘕宜以苦下之以苦堅之王氷云陽氣下墜陰氣上爭上爭則寒多下墜則筋緩故睾垂縱緩因作癲疝也已上七疝下去其病之後可調則調可補則補各量病勢勿拘俗法經所謂陰盛而腹脹不通者癲癰疝也故不可不下

便癰

夫便癰者乃男子之疝也俗呼爲便癰言於不便處害一癰故名便癰便癰者謬名也難素所不載然足厥陰肝之經絡是氣血行流之道路衝任督脈亦屬肝經之旁絡難經曰男子有七疝是也便癰者血疝也治之以導水丸桃仁承氣湯或抵當湯投之同瘀血不散而治大作劑料峻瀉一二十行次以玉燭散和氣血通經絡之類則是世只知多用大黃牡蠣而已間有不愈者是不知和血通經之道也

下疳

夫下疳久不愈者俗呼曰臊疳是也先以導水禹功瀉肝經外以木香散摻之日上三兩度然後服淡粥一二日則止

李梁十書

隱曲不利

經曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月釋之者謂男子則脾受之而昧不化故少精女子則心受之而血不流故不月分心脾爲男女各受立說竊獨謂不然夫二陽陽明也胃與大腸之脈也腸胃有病心脾受之發心脾猶言延及於心脾也雖然脾胃爲合胃病而及脾理固宜矣大腸與心本非合也今大腸而及心何哉蓋胃爲受納之府大腸爲傳化之府食入於胃濁氣歸心飲入於胃輸精於脾者以胃之能納大腸之能化也腸胃既病則不能受不能化心脾何所資乎心脾既無所資則無所運化而生精血矣故腸胃有病心脾受之則男爲少精女爲不月矣心脾當總言男女不當分說至隱曲不月方可分說耳若如釋者之言則男之精獨資於脾而不資於心女之血獨資於心而不資於脾有是理耶蓋男女之精血皆出五臟之相養而後成可謂之男精資於脾女血資於心乎經本曰男女皆有心脾之病但在男子則隱曲不利在女子則月事不來耳

論疝

前陰分大寒大熱囊垂縮陰陽別論云三陽爲病發寒熱下爲癰腫及爲痿厥腨腓其傳爲索澤又傳爲癲疝夫熱在外寒在內則囊垂此九夏之氣也寒在外熱在內則卵縮此三冬之氣也足太陽膀胱之脈逆上迎手太陽小腸之脈下行至足厥陰肝之脈不得伸其任脈並厥陰之脈逆則如巨川之水致陽氣下墜是風寒濕熱下出囊中致兩睾腫大謂之曰疝大甚則爲癲足厥陰之脈與太陽膀胱寒水之脈同

至前陰之末傷寒論云足厥陰肝經爲病煩滿囊縮急下之宜大承氣湯以瀉大熱靈樞經筋篇云足厥陰肝傷於寒則陰縮入前說囊縮爲大熱此說爲大寒又說囊縮垂睾下引癩疝腳氣爲大寒風濕盛下垂爲寒與上二說不同何也曰以平康不病人論之夏暑大熱囊卵累垂冬天大寒急縮收上與前三說又不同何也曰傷寒家囊卵縮大熱在內宜承氣湯急下之與經筋說陰縮入大寒在外亦是熱在內與傷寒家同故再引平康人以證之冬天湯氣在內陰氣在外人亦應之故寒在外則皮急皮急則囊縮夏月陰氣在內陽氣在外人亦應之故熱在外則皮緩皮緩則囊垂此癩疝之象也三說雖殊皆一理也

論陰瘡

夫陰瘡者大槩有三等一者濕陰瘡二者妬精瘡三者陰蝕瘡又曰下疳瘡蓋濕瘡者由腎經虛弱風濕相搏邪氣乘之瘙痒成瘡浸淫汁出如疥癬者是也妬精者由壯年精氣盈滿久曠房室陰上生瘡赤腫作害妨悶痒痛者是也陰蝕瘡者由腎臟虛邪熱結下焦經絡否澀氣血不行或房勞洗浴不潔以致生瘡隱忍不醫熾腫尤甚由瘡在裏措手無方疼痛注悶或小便如淋陰丸腫痛是也或經十數日潰爛血膿肌肉侵蝕或血出不止以成下疳若身體壯熱煩渴惡寒宜急治之以大豆甘草湯漬之漬毒之湯洗浴之服五香連翹湯漏蘆湯等疏之更以截疳抵聖散乾摻之四畔用摩風膏溫潤之後以將護忌慎之渴不止者服竹葉黃芪湯大便軟者宜服托裏茯苓湯調治之夫如是則無不差矣

朱震亨心法

疝痛

疝痛濕熱痰積流下作病大槩因寒鬱而作卽是痰飲食積幷死血

專主肝經與腎經絕無相干大不宜下

痛甚者不宜參朮

癩濕多成疝氣宜灸大敦穴在足大指爪甲後一韭葉聚毛間是穴

食積與死血成痛者梔子桃仁山楂枳子一作枳實吳茱萸並炒以生薑汁順流水煎湯調服一方加茴香附子

亦有水氣而腫痛者

又有挾虛者當用參朮爲君佐以疏導之藥其脈沉緊豁大者是

按之不定者屬虛必用桂枝山梔炒烏頭細切炒爲末薑汁糊丸每服三四十丸薑湯下大能劫痛

按戴思恭云疝本屬厥陰肝之一經余常見俗說小腸墜下部氣者皆妄言也

木腎

木腎者心火下降則腎水不患其不溫眞陽下行則腎氣不患其不和旣溫且和安有所謂木强者哉夫惟嗜慾內戕腎家虛憊故陰陽不相交水火不相濟而沉寒痼冷凝滯其間脹大作痛頑痹結硬勢所必至矣不可純用燥熱當溫散溫利以逐其邪邪氣內消榮衛流轉如寒谷回春蓋有不疾而速不行而至者矣

治法

凡治七疝多用熱藥而獲效者卽內經從治之法耳須用寒凉藥監制之不可純用大熱之劑如烏頭附子之類令人久服多服必變劇不可治矣但宜以二陳湯加枳實橘核梔子山楂等藥煎入生薑汁熱稍飲之

恐有瘀血作痛者本方加延胡索桃仁泥

如有氣作痛者本方加木香茴香楝實等藥

如六脈沉細手足厥冷者本方加附子乾薑肉桂之類以佐之

如睾丸痛甚者加荔枝核乳香沒藥爲細末調入本方煎藥內或另用順流水調服亦可

如木腎腫大如升斗者本方去甘草加海藻昆布荔枝核茴香川楝子等藥爲末順流水調服作丸子服亦可

囊癰

外科精要云癰疽入囊者死囊屬厥陰今以死言之將以爲屬少陰腎經邪乎親見入囊者七八人悉以濕熱入肝經施治而用補陰藥佐之雖膿潰皮脫睾丸懸掛可畏者皆不死但不知下虛年老者如何耳囊癰濕熱下注也有作膿者此濁氣潤下將流入滲道因陰道或虧水道不利而然膿盡自安不藥可也惟在善於調攝耳又有因腫漸流入囊腫甚而囊自裂開睾丸懸掛水出以杉木炭末傅外以紫蘇葉包裹仰臥養之

大抵此證屬陰道虧濕熱不利所致故滋陰降濕藥不可缺常治腫痛小便祕滯者用除濕爲主滋陰佐之腫痛已退便利已和者除濕滋陰藥相兼治之欲

其成膿用托裏爲主滋陰佐之候膿成即針之仍用托裏滋陰若濕毒已盡者專用托裏如膿清或多或斂遲者用大補之劑或附子餅灸之

陰瘡

男子陰瘡又名恥瘡或痛在莖之竅或痛在莖之標皆手足太陽經不利熱毒下傳入於足厥陰經故變紫黑色作蝕瘡毀其莖而死宜以子和泄水丸散導濕毒無不愈者若已成瘡先泄其根次從標而治外以葱白黑豆汁漬洗拭乾以黃連木香密陀僧乾臘脂之類細末搽之如內潰膿不出以追膿散上之又用子和泄水丸如後發膿少可用黃連木香臘脂等貼之

格致餘論

疝氣論

疝氣之有甚者睾丸連小腹急痛也有痛在睾丸者有痛在五樞穴邊者皆足厥陰之經也或有形或無形或有聲或無聲有形如瓜有聲如蛙自素問以下歷代名醫皆以爲寒蓋寒主收引經絡得寒故收引不行所以作痛理固然也有得寒而無疝者又必有說以通之可也予嘗廬因門戶雪上有霜沒膝之水踢冰徒涉不曾病此以予素無熱在內也因而思之此證始於濕熱在經鬱而至久又得寒氣外束則濕熱之邪不得疏散所以作痛若只作寒論恐爲未備或曰厥陰一經其道遠其位卑鬱積濕熱何由而致予曰大勞則火起於心醉飽則火起於胃房勞則火起於腎大怒則火起於肝本經火積之既久毋能令子虛濕氣便盛厥陰屬木係於肝爲將軍之官其性急速火性且又暴今既爲寒所束宜其痛之大暴也愚見有用烏頭梔子等分作湯用之其效亦敏捷後因此方隨證與形加減用之無有不應然濕熱又須分多少而施治但濕者腫多癪疝是也又有挾虛而發者當以參朮爲君而以疏導藥佐之診其脈有甚沉緊而強大無力者是也其痛亦輕惟覺重墜牽引耳

下部癪氣不痛之方細思非痛斷房事與厚味不可若徒恃用藥惟促其壽若蒼朮神麴白芷山梔川芎枳實半夏皆要藥人視其藥皆鄙賤之物以啓慢心又不能斷慾以愛護其根本非徒無益而反被其害者多矣且其藥宜隨時月寒濕更按君臣佐使加減大抵癪疝屬濕者多

羅天益衛生寶鑑

疝

至眞要大論云小腹控睾引腰脊上衝心唾出清水及爲白淫其則入心善悲善忘甲乙經曰邪在小腸也小腸病者小腹痛引腰脊貫肝肺其經虛不足則風冷乘間而入邪氣既入則厥其誤上衝肝肺客令散於胃結於腸挾引睾丸上而不下痛而入腹其衝心胃蓋其經絡所屬所系也

胞痹

痹論云胞痹者小腹膀胱按之內痛若沃以湯澆於小便上爲清涕夫膀胱者爲州都之官津液藏焉氣化則能出矣今風寒濕邪氣客於胞中則氣不能化出故胞滿而水道不通其證小腹膀胱按之內痛若沃以湯澆於小便以足太陽經其直行者上交顛入絡腦下灌鼻竅則清涕也

明虞摶醫學正傳

疝氣論

愚按子和論七疝病源至爲詳悉但其處方一以攻下之法爲主治不能使人無疑耳既曰多由房勞致虛而作其可一例施之以攻下之法乎大抵七疝爲病若非房勞所致即是遠行辛苦涉水履冰熱血得寒而凝滯於小腸膀胱之分或濕熱乘虛而流入於足厥陰之經古方一以爲寒而純用烏附等熱藥爲治我丹溪先生獨斷爲濕熱此發古人之所未發者也大熱鬱於中而寒束於外宜其有非常之痛故治法宜驅逐本經之濕熱消導下焦之瘀血而以寒因熱用之法立方處治即邪易伏而病易退也其攻下之法愚故未敢試而行之以俟識者

王綸明醫雜著

陰痿

男子陰痿不起古方多云命門火衰精氣虛冷固有之矣然亦有鬱火甚而致痿者經云壯火食氣譬如人在暑熱而倦怠痿弱遇冬寒而堅強也予嘗親見一二人腎經鬱火而有此證令服黃蘗知母清火堅腎之藥而效故須審察不可偏認作火衰也

註　陰莖屬肝之經絡蓋肝者木也如木遇湛露則森立遇酷熱則萎悴若因肝經濕熱而患者用龍膽瀉肝湯以清肝火導濕熱若因肝經燥熱而患者用六味丸以滋腎水養肝血而自安

陰虛疝

若陰虛兼有疝氣病者補陰丸加蒼朮鹽水炒一兩

半黃連薑汁炒山梔炒各六錢川芎一兩吳茱萸炒青皮去穰各五錢

疝證專主肝經者多如運氣或在泉寒勝木氣攣縮禁於此經或司天燥勝木氣抑鬱於此經或忿怒悲哀憂抑頓挫結於此經或藥淋外固閉尾縮精壅於此經其病差別如此且夫遺溺閉癃陰痿脬痹精滑白淫皆男子之疝也不可妄歸之腎冷血涸不月罷腰膝上熱足躠盜乾癰閉少腹有塊或定或移前陰突出後陰痔核皆女子之疝也但女子不謂之疝而謂之瘕若年少而得之不計男子婦人皆無子故隱蔽委曲之事了不干脬腎小腸之事乃足厥陰之證也爲謂前證若因肝經濕熱當用炒山梔茯苓黃蘗澤瀉川芎當歸吳茱萸黃連山梔若肝腎二經濕熱當用六味地黃丸料加柴胡山梔若肝脾二經陰虛濕熱宜補中益氣加炒山梔炒黑黃連吳茱萸蓋疝名有七形證所因不同治法亦異

方賢奇效良方

囊縮

此厥陰經證其筋脈循陰器絡舌本厥陰經受病其筋脈動急故舌捲囊縮者難治治用當歸四逆湯吳茱萸生薑湯治之

疝論

巢氏病源論疝者痛也其名曰厥曰癥曰寒曰盤曰氣曰附曰狠此七者疝之名也其厥逆心痛足寒嘔吐飲食不下曰厥疝腹中氣乍滿心下盡痛氣積如臂曰癥疝因寒飲食即脅下腹中盡痛曰寒疝腹中乍滿乍減而痛曰氣疝腹中痛在臍旁曰盤疝腹中臍下有積聚曰附疝小腹與陰相引而痛大便難曰狠疝其證發則可驗又有石疝血疝陰疝妒疝氣疝此五者有名而無形也外有心疝寒疝儉疝癖數者其名不同病則大同小異世俗呼爲小腸氣膀胱氣奔豚氣蟠腸氣橫弦貫弦偏墜木腎腎餘陰腫與疝病其名有別也至於張子和論七疝曰寒疝木疝筋疝血疝狐疝氣疝癥疝之名又與諸論不同且如癥疝者外腎堅腫也痛者爲陰腫不痛者爲木腎一邊墜下者爲偏墜疝諸論立名雖多且異靈樞經云邪在小腸連睾系屬腎貫肝絡肺系心氣盛厥氣上衝也內經又云任脈爲病男子內結七疝女子帶下瘕聚衝脈逆爲氣裏急然則任脈雖病有七疝之名而無七疝之狀而任脈者是疝病之本源各經是病疝之支流也又云厥陰脈滑爲狐疝少陽脈滑爲肝風疝太陰脈滑爲脾風疝少陰脈滑爲心風疝太陽脈滑爲腎風疝陽明脈滑爲肺風疝此風非外入之風乃肝木陽臟氣動之風也此六疝者應乎六經在於五臟何謂疝病皆屬肝病生於陰起於下陰者內之太陰脾厥陰肝少陰腎皆足之陰經也下者地下寒氣也足常履地蓋天地之風寒皆入於地人之風濕皆從足起或因經虛聚於脬囊小腹兩陰相併二氣相搏則爲疼痛矣或冷飲過情水流歸腎或坐臥處濕寒搏留陰以寒攻陰則爲疝痛經曰痛者通也疝氣作痛宜通不宜塞宜溫不宜凉通謂瀉其實不瀉其虛塞謂補其虛不補其實實者邪氣也虛者正氣也若正氣虛極則先溫而後瀉若邪氣盛極則先瀉而後補溫者必兼於氣瀉者必兼於寒寒則入於經而導其邪溫則疏其氣養其正也大凡內外之氣交入於腎者爲腎氣入於膀胱者爲膀胱氣入於小腸者爲小腸氣腎與膀胱爲臟腑其氣相通連爲外腎系於睾丸此三經乃相連而病者也其脈當以弦緊弦則爲寒緊則爲痛從寒則痛從濕則腫始得不愈邪氣留滯結成積聚而爲疼痛或脅左右如杯或脅上下如臂或腹大如盤令人羸瘦少氣洒淅寒熱嗜臥飲食不爲肌膚腹滿嘔吐醫者當臨期審察若因七情而得者當調其氣安五臟外邪相干者散濕祛寒爲先去邪之實補肝之虛無不愈矣

戴思恭證治要訣

囊縮

舌捲囊縮不特陰中之陰有之陽明之熱陷入厥陰亦有之蓋陽明主宗筋宗筋爲熱風所吹故弗榮而急引舌與卵是以舌捲囊縮當瀉陽以救陰宜大承氣湯

厥陰舌捲囊縮宜急下如此等證當速用利下之劑苟或當下而不下則熱毒轉深遂致失下不可救療豈可一以下藥宜遲爲說

小腸氣

氣因寒聚爲疝血因寒聚爲瘕即是疝氣今謂之橫弦豎弦繞臍走注小腹疼痛宜蟠葱散吞下茱萸內消丸或鹽酒調異功散

不問何證皆可用生料五苓散加炒茴香半錢或一錢服藥未效大痛攻刺不已陰縮手足厥冷宜香附子仍炒鹽乘熱用綿裹熨臍下若大小腑不甚通者

五苓散加桂下青木香丸
初發或頭疼身熱或惡寒壯熱並宜參蘇飲加木香
氣逆上攻心下不覺痛而見心疼者宜以生韭搗取
自然汁和五苓散爲丸苘香湯下亦於心痹疼證中
互言之有腎氣纔動心氣亦發上下俱疼者宜異功
散吞茱萸內消丸或且專治下下痛定則上痛定矣

癩疝

一核偏墜或俱腫脹或一核縮入小腹痛不可忍用
手按捺方得還舊是爲癩氣宜蟠葱散吞下茱萸內
消丸若未愈華澄茄散下大茴香丸
若大小腑不通宜木香丸半貼以通潤之却以盤蝕
十箇去頭足翅剉碎同炒去蝕出火毒濃煎燈心湯
調五苓散下五七十丸或用燈心葱入水酒內煎去
燈心葱調五苓散若痛入腹逆上攻心至成嘔逆先
用鹽酒下養正丹次用生料五積散加吳茱萸茴香
桃仁延胡索各炒入牛錢有因登高墮傷外核以致
腫疼或小便出血或小便不通宜五苓散和復元通
氣散服
有陰癩大如斗諸藥不能效者宜當歸四逆湯加生
薑茱萸曾用之效

櫻萸醫學綱目

運氣爲疝

疝痛屬足厥陰肝經也小腹亦肝經也故疝痛與小
腹痛同一治法所謂疝者睾丸連小腹痛也其痛有
獨在睾丸者有獨在小腹偏於一邊者有睾丸如升
斗者癩疝是也又立臥出入往來者狐疝是也
運氣小腹痛有三一曰肝病小腹引脅痛是也經云
厥陰之復少腹堅滿裏急暴痛是風氣助肝盛而然
治法當瀉肝也又云歲金太過民病兩脅下痛小腹
痛又云歲木不及燥乃大行民病中清胠脅痛小腹
痛又云歲土不及風乃大行民病腹痛復則脅暴
痛下引小腹者是燥邪攻肝虛而然治法當補肝瀉
金也又寒氣客於厥陰之脈則血泣脈急故脅與小
腹相引痛者治法亦同也
二曰小腸其病小腹引睾丸腰脊痛是也經云少陰
之脈心下熱善饑臍下痛又云少陰之復燠熱內作
小腹絞痛者是熱助小腸盛而然治法當瀉小腸也
又太陽在泉寒淫所勝與太陽之復皆病小腹控睾
引腰脊上衝心痛及太陰司天大寒且至病小腹痛
者是寒邪攻小腸虛而然法當補小腸瀉寒邪也
三曰膀胱其病小腹痛腫不得小便是也經云太陰
在泉病小腹痛腫不得小便者是濕邪攻膀胱虛而
然治法當補膀胱瀉濕土邪也
夫滑脈關已上見者爲大熱蓋陽與陽併也故大熱
滑脈尺部見爲大寒生癩疝滑脈者命門包絡之名
也爲丙丁火熱併於下蓋丙丁不勝壬癸故從寒水
之化而生癩疝
運氣癩疝有一經云陽明司天燥淫所勝丈夫癩疝
婦人小腹痛又云陽明之勝外發癩疝者是燥邪攻
肝氣虛而然治法當補肝瀉燥金也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百二十一卷目錄
醫部彙考二百一
前陰門二
李梴醫學入門 痛 路岐 陰痛 陰縮 陽痿 堅中痒 妒精 陰痛 諸痛 治法 賽癰 便毒
張三錫醫學準繩六要 前陰諸病
薛己醫按 懸癰 便毒 賽癰 下疳
李中梓醫宗必讀 痛論 治法
龔信古今醫鑑 痛病治法
徐春甫古今醫統 陰腫 痛 木腎
王肯堂證治準繩 痛論 懸癰 便毒 陰瘡
毛際盛 懸癰 便毒 陰瘡
吳崑醫方考 七痛方論
陳實功外科正宗 腎囊風 陰疳 下疳 看法 治法 魚口便毒 看法 治法 賽癰 看法 治法 懸癰 看法 治法
喻昌醫門法律 痛

明李梴醫學入門

痛

醉飽勞役房慾忿怒動火火鬱久則生濕津液凝爲痰濁流入肝經肝性急速又暴爲外寒所束是以痛甚有專言寒者論其標耳大要熱者遇熱則發一便赤澁小腹肛門俱熱外腎累垂玉莖挺急寒者遇寒則發一便皆利脅腹清冷外腎緊縮又有冷熱不調者外腎小腹或冷或熱一便或閉或利

局方多以爲小腸氣膀胱氣腎氣者亦自其標末而言其實主於肝也蓋肝環陰器而上入小腸又肝腎皆屬於下與衝任督相附腎與膀胱爲臟腑其氣相通運爲外腎系於睾丸此三經相連相會然肝主筋睾丸雖名外腎非厥陰環而引之則玉莖無由伸縮在女子則爲纂戶經云邪在小腸連睾系屬於腎貫肝絡肺心系氣盛厥逆上衝腸胃熏肝散於肓結於臍惟取厥陰以下之及論三藏脈皆以滑爲痛每云風痛者非外風也乃肝木腸臟氣動之風論三陽痛發寒熱言膀胱非受病之處必傳於肝而後爲痛又明堂穴法治痛皆取厥陰部分可見痛主肝經

小腸多氣少血之經忿怒憂思起於肝而心氣因之鬱結心與小腸爲表裏膜外氣聚無出攻及膀胱腎納氣房勞過度敗精蓄爲邪水氣滯入裏胞絡與氣膀胱氣脈然皆肝所主也所以病發不特外腎小腹作痛或攻刺腰脊或遊走胃背或攪心痛或遶臍痛男子遺精女人不月令人羸瘦少氣酒漸寒熱食少嘔吐吞酸久則遂成暴吐甚則角弓反張咬牙戰汗冷汗流不止者難治

痛有睾丸痛者有連小腹痛者感冷觸怒則塊物逆上囊根心和氣平則塊物自循營系歸入囊中

水痛囊腫如水晶或囊痒而流黃水陰汗自出小腹按之作水聲得於醉酒行房遇外邪結於囊中

筋痛陰莖腫脹或挺長不收或痛痒至極得於房勞血痛如黃瓜在小腹兩旁俗云便毒得於春夏大熾氣勞於使內血滲入脬囊結氣癰腫

氣痛上連腎俞下及陰囊得於號哭忿怒氣鬱而脹或勞役坐馬致核腫脹偏有大小者難治

狐痛狀如仰瓦臥則入小腹如狐之晝出穴而溺夜入穴而不溺亦與氣痛大同

寒痛囊冷結硬如石陰莖不舉或挺睾丸而痛得於寒濕使內過勞久而無子此七痛之名從經旨也餘皆謬妄不取凡痛久則成積盤附臍之上下左右爲癥爲瘕

腫痛硬如石者卽癩痛在婦人則爲陰戶突出寒勝則痛濕勝則腫寒濕相搏熱毒又重則腫硬如石

腸癩卽小腸氣屯外腎偏墜腫痒

卵癩玉莖腫硬引臍絞痛甚則陰縮肢冷囊上生瘡成癰二證出水不止者死

氣癩素有濕熱因怒激起相火舌脫手搐如狂面黑睾丸能左右相過氣痛欲黃連梔石丸寒冷者五積散蟠葱散當歸四逆湯木香勻氣散青木香丸茱萸內消丸黑錫丹

水癩外腎腫大如斗如升不痛不痒得於卑濕五苓散加小茴韭汁爲丸單竹茹湯熱者三白散橘核散久者橘核丸

木腎堅硬頑痹不痛乃心火不降腎水不溫活腎丸四製茱萸丸四炒川楝丸或單用雄楢樹葉不結子者是驚乾爲末酒糊丸梧子大每五十丸空心鹽酒下又有跌傷驚氣與敗血攻入者當消瘀血

偏墜腫有大小偏左多瘀血怒火或腎氣虛橫偏右多濕痰食積是知癩痛證兼七痛治宜詳審外治摩

腰膏

疝雖濕熱然生於陰起於下四氣每先傷足三陰部分所以遇外感而發風證小腸陰筋走注痛甚有汗身痛烏頭桂枝湯遺泄者四君子湯加羌活附子

寒證心痛筋縮肢冷食已則吐古梔附湯五積散加吳萸小茴及食鹽少許四製茱萸丸硫荔丸

暑證小腹脹急溺澀香茹飲加瞿麥木通

濕證身重小便不利大便或溏五苓散最妙濕熱入裏暴痛難當者加減柴苓湯加減乙正散濕盛者導水丸三白散或復元通聖散加黑丑虛者十味蒼葉散在表有寒熱者柴胡桂枝湯

七情疝乍滿乍減濕熱者氣疝飲古黃連丸寒冷者蟠葱散生料木香勻氣散

通用五苓散豬苓澤瀉分陰陽以和心與小腸白朮利膜膀間濕及死血茯苓利膀胱水木得桂則枯故用以伐肝木風換桂枝寒加紫蘇生薑鹽少許暑加白芍濕加白朮小腸氣加小茴膀胱氣加金鈴子橘核腎氣加檳榔木通少許

凡疝痛走注無形屬氣痛有常處有形乃濕痰食積瘀血下聚而成

痰疝海石香附二味薑汁調服痰飲食積守效丸

食積瘀血者梔桃枳楂散失笑散食積挾熱者積疝丸食積挾虛者八味茴香丸

虛疝暴痒四君子湯加川楝子茴香枳實山楂山梔按之不痛者加肉桂薑汁按之不定者用桂枝烏頭山梔爲末薑汁糊丸薑湯下大能刼痛久者三黃內消丸凡虛疝不宜預補經云邪之所湊其氣必虛留而不去其病則實必先瀉其所蓄之熱而後補之是以諸方多借巴豆氣者此也虛甚上爲吐逆下有遺精者危要知濕熱爲病俱宜瀉南方補北方不可妄用劑劑

久成癥瘕腹滿氣積如臂者白蔻散或理中湯加阿魏腹痛有塊盤臍旁者聚香飲子壺盧巴丸腹痛有塊附臍下者去鈴丸欲作奔豚者茯苓桂甘湯奔豚

疝痛者大七氣湯加炒牽牛

通用二陳湯加薑汁積加枳實山楂熱加山梔痛加橘核瘀血加延胡索桃仁鬱加木香茴香川楝子痛甚加乳香沒藥荔枝核腎大如斗加茴香青皮昆布海藻爲丸服水疝加豬苓澤瀉以逐水筋疝加黃連白朮茯苓以降火血疝合四物湯以調血不愈清肝益榮湯或清暑益氣湯氣疝加柴胡青皮香附行氣狐疝加青皮香附蒼朮逐氣流經更以蜘蛛十四枚枝桂五錢爲末蜜丸米飲下癩疝加白朮蒼朮豬苓澤瀉煎調荔枝核散寒疝加吳萸薑桂溫散

常用辛平破血消痰積之劑橘核散辛溫散氣溫散之劑五炒川楝丸四炒川楝丸金鈴丸四味茴香散古延蠍散辰砂一粒丹神聖代針散選用

路岐

腫痛者內服單蜘蛛方外用炒葱熨三五次後以消毒消腫藥加大黃木鼈子南星草烏敷之破者用生肌散其證小兒患之多因食積痰滯

陰瘡

陰瘡由腎虛風濕相搏邪氣乘之瘙痒成瘡浸淫汁出狀如瘡癬

妬精

妬精瘡因久曠房室思色動慾以致敗精流入莖內初發如粟赤腫潰爛作白痛痒妨悶

陰蝕

陰蝕瘡因婦人子宮有敗精濡濁或月水未淨與之交合房室後又未洗浴男子腎虛邪穢滯氣遂令陰莖連睾丸腫痛小便如淋

楊梅

經久潰爛侵蝕肌肉血出不止以成下疳瘡久不愈乃成楊梅瘡宜服仙遺糧湯預防之

身體煩熱壯熱惡寒宜急治之陰血虛而有熱者小柴胡湯加參朮芎歸腫痛發熱者四物湯加柴胡山梔濕熱腫痛破裂寒熱者小柴胡湯加膽草黃連青皮熱勝二便祕者八正散濕熱甚則腫痛潰爛及莖縮縱作痛或出白津者龍膽瀉肝湯如氣虛者補中益氣湯加膽草山梔煩渴不止者竹葉黃芪湯腫潰後氣血虛而有火者八物湯加柴胡山梔無火大便軟者托裏散內托十宣散大要此證肝經陰虛爲本腫痛寒熱爲標宜常服腎氣丸若專治肝則誤矣

莖中痒

莖中痒出白津多因脾土軟弱不能滋生金水以致肝經血虛火燥宜補中益氣湯與清心蓮子飲間服蓋脾胃爲肝腎之源心實主之

諸瘡治法

外治濕陰瘡藥蛤散銅綠散妬精瘡津調散蘆腦散陰蝕瘡鳳衣散下疳瘡旱螺散玉莖破裂腫痛者鵝

管散爛臭成瘻者截疳散或用洗藥莖上生瘡久不合口者用經布燒灰蜜調塗上即愈有陰毛間生蟲作痒者搗桃仁泥塗之

陰囊兩旁生瘡濕痒甚者牡礬丹或連兩腿上生風濕瘡者硫檳散

囊癰

初起腫赤脹痛小便澀滯寒熱作渴當清肝火分消濕熱以泄之宜黑龍湯吞滋腎丸如或因入房囊腫大如斗許小腹脹悶溺澀發熱口乾痰壅命在反掌宜腎氣丸料加車前子牛膝煎吞滋腎丸滲利濕熱後仍腫痛者宜補陰托裏以速其膿而針之若膿焮而便祕者熱毒壅滯也宜托裏消毒散或又不減者熱毒未解也宜清肝益榮湯膿已成者活命飲

膿潰皮脫睪丸懸掛或內見筋一條不消陰囊悉腐玉莖下面貼囊者亦腐如半邊筆管只宜托裏散加故紙黃芪五味子菟絲子或四物湯加參朮吞腎氣丸兼服補中益氣湯倍黃芪歸朮大補氣血脾胃切忌寒冷攻伐及淡滲損陰之藥外塗白蠟膏囊莖旬日可復雖曾去陰子亦無害

便毒

俗云便毒實血疝也生腿胯小腹之間乃厥陰肝經及衝任督三脈隧道乃精氣出入之路也

或入房忍精或思色不遂或當泄不泄敗精凝滯爲瘀腫痛在胯腹之間先用五苓散利去敗精便祕加大黃有寒熱者小柴胡湯加山梔澤瀉後用腎氣丸以補精兼逐瘀血

內有濕熱外被寒邪相拒敗瘀不得散治宜清肝火活瘀血滲利腎經邪水體實二便難者兩解湯八正散挾鬱怒者流氣飲子或復元通氣散加花粉白芷青木香腫痛甚者活命飲濕熱壅滯者龍膽瀉肝湯體薄大便易小便澀者小柴胡湯加芎歸知蘗澤瀉或神效苦蔞湯加柴胡山梔痛甚者活命飲去大黃濕熱因勞倦氣滯者補中益氣湯潰後俱宜托裏散八物湯加柴胡或十全大補湯久欲成漏者蠟礬丸單方用紫花地丁擂酒服最妙

便毒左右兩邊俱發或先有疳瘡而發或卒然起核疼痛而發用藥同前古方初起宜國老膏入皂角炭少許主之外用鳳尾草煎湯洗淨以明松香爲末日三次乾摻自愈愈後仍戒房室行動

張三錫醫學準繩六要

前陰諸病

陰痿證方書云男子精盛而思室內經曰男子二八精氣盛陰陽溢泄若夫斲喪太過精液枯竭則陽道痿弱不舉中年人雖舉亦不得壯者皆精力乏所致昧者悉指爲陽虛妄投桂附鎖陽蓯蓉徒助邪火煎熬眞陰卒至毒發中風暴亡莫之能悟朱子曰有子後一點不宜虧泄誠保命良方也人惟知慾而不知重命鞭馬於危途良可太息倘無子而有此須大補氣血滋陰助精佐以鹿茸鹿角膠蓯蓉瑣陽一二味以兼補命門相火鼓舞元陽又須審氣血虛實肥人大補氣集靈膏瘦人大滋陰八味丸爲主

瘦人六味地黃丸加枸杞菟絲五味鹿角膠大效

陰痿責之精衰斲喪太過所致經曰足厥陰之經傷於內則不起是也仲景八味丸特妙甚者加人參鹿膠鹿茸或加蓯蓉瑣陽枸杞是兼補右腎相火也按前論雖有不可妄投桂附等藥煎熬眞陰之戒苟果屬眞陽虧損即當益火之源而又何必規規於斯論哉

陰汗陰臭俱屬下焦濕熱酒麪厚味過度而然龍膽瀉肝湯妙虛者內服青娥丸外用爐甘石蛤粉撲或密陀僧和蛇牀子研末撲之

陰汗多者二陳二朮加風藥以勝之防風羌活藁本之類

陰縮謂前陰受寒入腹內也陰縱謂前陰受熱挺長不收也經曰足厥陰之筋傷於寒縮入傷於熱則挺縱不收

陰痒亦是肝家濕熱瀉肝湯妙瘦人燥痒屬陰虛坎離爲主外用蛇牀子煎湯洗之蠶瘡同治要分虛實耳

陰莖痛足厥陰經氣滯兼熱用甘草梢蓋欲緩其氣耳若病淋而痛似難一槩治必用清肺氣而清濁自分氣虛六君血虛四物各加黃蘗知母滑石石葦琥珀

陰痛宜舒鬱和血四物加香附紅花千金方有人陰冷漸漸入陰囊腫滿晝夜疼悶不已用上好川椒爲末帛包裹囊如不覺熱烘熱更妙以知爲度內煎大薊湯汁服妙陰冷兩丸如水出汗兩脚痿弱宜補肝湯

病後動淫卵痛大傷氣血而然八珍加肉桂附子

病後陰腫連小腹及腿屬脾腎兩虛少食大便不實責之脾補脾爲先小水短少責之腎腎氣丸主之妙

在桂附
薛己醫按
懸癰
瘍痛或發熱者清肝解毒
腫痛者解毒爲主
腫痛小便赤澁者肝經濕熱也宜分利清肝
不作膿或不潰者氣血虛也宜補之
懸癰謂生於玉莖之後穀道之前屬足三陰虧損之證輕則爲瘡澁盡氣血而亡重則內潰而卽隕若初起濕熱壅滯未成膿而作痛或小便澁滯用龍膽瀉肝湯腫瘍甚仙方活命飲並以製甘草佐之如此雖患亦輕雖潰亦淺若不能成膿或膿成不潰者八珍散補之若膿已成者急針之欲其生肌收斂腎虛者六味地黃丸血虛者四物加參朮氣虛者四君加芎歸脾虛者補中益氣湯氣血俱虛者八珍湯并十全大補湯若用寒凉消毒則誤矣
懸癰原係肝腎二經陰虛惟一於補初起不治或膿成而又尅伐不死何待常治初起腫痛或小便亦澁先以製甘草一二劑及隔蒜灸更飲龍膽瀉肝湯若發熱腫痛者以小柴胡加車前黃蘗芎歸膿已成卽針之已潰用八珍湯加製甘草柴胡梢酒炒黃檗知母小便澁而脈有力者仍用龍膽瀉肝湯加製甘草小便澁而脈無力者用清心蓮子飲加製甘草膿清不斂者用大補劑間以豆豉餅或久而不斂者亦用附子餅灸並效
水穀道前後生癰謂之懸癰乃肛門前陰囊後生核子如橄欖樣或如梅李狀初不作痛至旬日漸熱不早治瘡潰膿血日出數盞至有腸腐而大便從瘡口出者其苦不可言近亦數月遠至一二年亦愈須是作核未痛以前以甘草膏治之不過一二服便自消此病初發如松子大漸如蓮子數十日後始覺赤腫如桃李卽破若破則難治服此藥雖不能急消過二十餘日必消盡矣投兩服亦無害
大抵此證屬陰虛故不足之人多患之寒凉之劑不可過用恐傷胃氣惟製甘草一藥不損氣血不動臟腑其功甚捷
便毒
內蘊熱毒外挾寒邪者解散之
勞役而患者補之
不遂交感或強固精氣致敗精而結者解之
濕熱而致者清肝導濕
便癰屬厥陰肝經內熱外寒或勞倦過度或房慾不節或慾心不遂或強固其精或肝經濕熱而致治法內熱外寒者雙解散勞倦過度者補中益氣湯房慾不節者六味丸料慾心不遂者先用五苓散加大黃疏其精滯後用地黃丸以補其肝腎強固其精或濕熱壅滯者宜龍膽瀉肝湯疏肝導滯夫便癰血疝也屬厥陰肝經之絡脈衝任督脈之隧道婦人患此多在兩拗腫痛或腹中結塊小便澁滯苟治者得法患者又能調攝何難愈之有若慨用大黃等劑以求其內消或令膿從便下損其氣血及不愼起居飲食者皆爲不治
大抵便癰者血疝也俗呼爲便毒言不便處患之故也乃足厥陰肝經絡及衝任督脈亦屬肝之旁絡也是氣血流通之道路今壅而腫痛此則熱毒所致宜先疏導其滯更用托裏之劑此臨證制宜也
囊癰
腫痛未作膿者疏肝導濕
腫硬發熱者清肝降火
膿成脹痛者急針之更飲清毒之劑
已潰者滋陰托裏
膿清不斂者大補氣血
囊癰屬肝腎二經陰虛濕熱下注若小便滴滯者先分利以泄其毒繼補陰以令其自消若濕熱退而仍腫痛宜補陰托裏以速其膿膿斂而便秘者熱毒壅閉也先用托裏消毒散後用針以泄之膿去卽解若膿去而腫痛不減者熱毒未解也用清肝養榮湯口乾而小便數者腎經虛熱也六味丸內熱晡熱者肝經血虛也四物加參朮體倦食少者脾氣虛熱也補中益氣湯膿水清稀者氣血俱虛也十全大補湯此證雖大潰而睾丸懸露治得其法旬日肉漸生而愈若專攻其瘡陰道益虛則腫者不能潰潰者不能斂少壯者多成痼疾老弱者多致不起亦有患痔漏久而患及於囊者當兼治其痔切忌寒藥尅伐虧損胃氣
下疳
腫痛或發熱者肝經濕熱也清肝除濕
腫痛發寒者邪氣傳表也發散之
腫痛小便亦澁者肝經濕熱壅滯也疏肝導濕
下疳瘡屬肝經濕熱下注或陰虛火燥治法腫痛發熱者血虛而有熱也四物湯加柴胡山梔腫痛寒熱

者肝經濕熱也小柴胡湯加龍膽草黃連腫痛腐潰者氣血虛而有火也八物湯加山梔柴胡日晡熱甚者陰血虛而有熱也小柴胡湯加參朮芎歸日晡倦怠者陽氣虛而下陷也補中益氣湯其經久不愈而發寒熱者腎水不能生肝木也用六味丸若筋縮縱或爲痒痛或出白津此筋疝也用龍膽瀉肝湯氣虛者補中益氣加炒山梔炒龍膽陰虛火燥者用六味丸莖中痒出白津用補中益氣湯與清心蓮子飲間服蓋此證肝經陰虛爲本腫痛寒熱等證爲標須用六味丸以生肝血凡脾土虛不能生金水而見一切肝證者當佐以補中益氣湯加麥門冬以滋化源

李中梓醫宗必讀

疝論

愚按內經所謂任脈爲病內結七疝合言疝證之原也所謂衝疝狐疝癩疝厥疝寢疝癰疝分言七疝之狀也巢氏不能詳考內經原具七疝乃强分厥癰寒氣盤附很自附於內經之七疝不亦妄乎宜張子和非之曰此俗工所立謬名似矣及其立論但辨陰器與小腸膀胱腎了不相干專屬肝經受病竟不知任脈爲七疝之原亦不知經文自有七疝散見於各論之中又添寒水筋血氣狐癩之七種此其疵謬與巢氏未有以異也若言疝爲筋病皆挾肝邪則可若言止在厥陰一經不亦與內經相戾耶且執病在下者引而竭之不問虛實槩與攻下其禍有不可勝言者豈待下後始補而可回其生乎學者但當以內經爲正不當惑於多岐丹溪以爲疝證皆始於濕熱蓋大勞則火起於筋醉飽則火起於胃房勞則火起於腎大怒則火起於肝火鬱之久濕氣便盛濁液凝聚并入血隧流於厥陰肝性急速爲寒所束宜其痛甚此亦補前人未備之一端不可守爲揆度也故夫治法寒則多痛熱則多縱濕則腫墜虛者亦腫墜在血分者不移在氣分者多動蓋睪丸有兩左丸屬木水生肝木木生心火三部皆司血統納左之血者肝也右丸屬火火生脾土土生肺金三部皆司氣統納右之氣者肺也是故諸寒收引則血泣而歸肝下注於左丸諸氣臌鬱則濕聚而歸肺下注於右丸且睪丸所絡之筋非盡由厥陰而太陰陽明之筋亦入絡也故患左丸者痛多腫少患右丸者痛少腫多此確然者耳

巢氏七疝證厥疝者厥逆心痛吐食癥疝者氣乍滿心下痛氣積如臂寒疝者寒飲食脅腹盡痛氣疝者乍滿乍減而痛盤疝者臍旁作痛附疝者臍下有積氣很疝者小腹與陰相引痛大便難

小腸氣乃小腸之病小腹引睪丸必連腰脊而痛小腸虛則風冷乘間而入邪氣既入則厥而上冲肝肺撐引睪丸上而不下

膀胱氣乃小腹腫痛不得小便是也

治法

狐疝者臥則入腹立則出腹是也仲景治狐疝特土時下者蜘蛛散或用牡蠣六兩鹽泥固濟炭三斤煅至火盡取二兩乾薑一兩焙爲細末二味和勻水調得所塗痛處小便大利即愈

癩疝者陰囊腫大如升如斗甚而如栲栳大者三層茴香丸荔核散宜胞丸地黃膏子丸木腎不痛南星半夏黃蘗蒼朮枳實山楂白芷神麴滑石茱萸昆布酒糊丸空心鹽湯下雄楮葉不結子者曬乾爲末酒糊丸鹽湯下又用馬鞭草搗塗效

厥疝者脾受肝邪氣逆有積肝邪甚者當歸四逆湯川苦楝散木香楝子散

寢疝者脾傳腎少腹熱痛出白即巢氏之癥疝子和之筋疝也丹溪所謂內鬱濕熱者與此疝相似烏頭梔子湯或加橘核桃仁吳茱萸丹溪云陽明受濕熱傳入太陽發熱惡寒小腹閉痛梔子桃仁枳實山楂等分同煎加生薑汁

癩疝乃足陽明筋病內有膿血即巢氏之附疝子和之血疝也宜用桃仁延胡索廿草茯苓白朮枳實山楂橘核荔枝核

癰疝者內有膿血小便不通加味通心散或五苓散加桃仁山楂

氣上冲心二便不通巢氏很疝略似宜用木香散

醫信古今醫鑑

疝病治法

寒疝宜以溫劑下之禹功散加味五苓散下青木香丸或五積蟠葱之類水疝宜禹功散三花神祐丸導水丸逐水之劑下之筋疝以降心火之劑下之瀉心湯主之血疝宜玉燭散和血之劑下之氣疝宜散氣藥下之濕疝丸或蟠葱散主之狐疝宜以逐氣流經之劑下之癩疝宜去濕之劑下之三花神祐丸之類元神虛弱受寒作小腸疝氣滾痛以蟠葱散加故紙小茴川楝子木香之類體壯實小腸氣痛或小便不

通以八正散加破故紙小茴香川楝子

陰腫

夫陰腫者皆由膀胱蘊熱風濕相乘或濕熱流注或疝氣攻作或暴風客熱及小兒啼叫怒氣結聚或蟲蟻吹毒所致詳其所因施以方治

疝

疝脈緊急洪數則爲熱痛經言脾傳之腎病名曰疝瘕少腹煩冤而痛出白名曰蠱註言少腹痛溲出白液也一作客熱內結銷鑠脂肉如蠱之食故名曰蠱然經復言熱爲疝瘕則不止爲寒當以脈證辨之

辨疑錄云每見男子小腸疝氣痛不可忍陰囊腫大或偏墜一邊發作之時小腸捫之聲如青蛙狀如桃李木瓜衝上則面黑墜下則仆地病者不勝痛苦諸醫治療莫測其機有云疝本肝經與腎經絕無相干恐爲未備之說原夫疝氣肝經屬本心腎屬標疝者多濕熱怒氣傷肝房勞過度心腎包絡鬱結小腸皮裏膜外氣聚無出以致如斯或曰以心腎爲標今以房勞過傷是獨言其腎也譬如小兒偏墜無房勞斯疾何由而作也曰小兒因稟父母濕熱氣鬱小腸而成偏墜皆不作疼痛至於中年房勞過度戕其眞氣包絡氣虛腎邪衝上往來疼痛故發作無度今世俗作寒氣或作鬱結而治每用香燥及用大黃牽牛巴霜利其大便元氣轉傷而病愈甚予考小腸多氣少血之經心氣鬱結則腑受邪肝氣一盛則子亦盛矣故二氣攻入小腸膀胱而痛病者但以手捫之可忍殊不知皮膜漸寬其氣愈熾服藥不能避忌年遠根深故難治救每用五苓散內加行氣之藥獲效者多利小便以出邪者鮮矣按葉性猪苓澤瀉分理陰陽以和心與小腸之氣白朮調脾幷利臍腰間濕及死血茯苓淡利膀胱之水桂能伐肝邪茴香善治小腸之氣金鈴子橘核去膀胱之氣檳榔下氣少加木通以爲導引小腸之邪出也屢用屢驗

木腎是濕熱頑痹結硬如痰核之類反不痛是也治宜溫散疏利以逐之

王肯堂證治準繩

疝論

或問疝病古方有以爲小腸氣者有以爲膀胱氣者唯子和丹溪專主肝經而言其說不同何以辨之曰小腸氣小腸之病膀胱氣膀胱之病疝氣肝經之病三者自是不一昔人以小腸膀胱氣爲疝者誤也殊不知足厥陰之經環陰器抵少腹人之病此者其發睪丸脹痛連及少腹則疝氣之係於肝經可知矣小腸氣俗謂之橫弦豎弦遶臍走注少腹攻刺而膀胱氣則在毛際之上小腹之分作痛與疝氣之有形如瓜有聲如蛙或上於腹或下於囊者不同也但小腸膀胱因經絡並於厥陰之經所以受病連及於肝則亦下控引睪丸爲痛然止是二經之病不可以爲疝也

趙以德曰此條本爲睪丸之證立名然內經以疝者痛也有腹中臟腑之痛一以疝而名者故通叙於此其腹中五臟之疝得以就此而考焉有睪丸之痛內經謂任脈爲病男子內結七疝女子帶下瘕聚衝脈爲病逆氣裏急然稱任脈有七疝之名而無七疝之狀及按諸篇以雙字命其名曰癩疝者以三陽爲病發寒熱痿厥其傳爲癩疝及陽明司天陽明之勝肝是動病足陽明筋病皆爲癪疝謂厥疝者面黃脈之至大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝謂疝瘕以脾邪傳之腎病名疝瘕少腹冤熱而痛出白一名曰蠱謂衝疝者以衝任督生病上衝心痛不得前後謂卒疝者邪客厥陰之絡則卒疝暴痛與厥陰之別蠡溝氣逆亦睪丸卒痛謂癪癃疝者厥陰之陰盛而脈脹不通謂狐疝者肝所生病也殆非及此雙字之名者由任脈行諸經之會而有七疝者歟此外獨稱一字疝者則有太陰在泉主勝則寒氣逆滿甚則爲疝有太陽在泉少腹控睪上引心痛有少腹痛不得大小便名曰疝得之寒有足太陰經病陰器紐痛上引臍有心疝脈急小腸爲之使少腹當有形有腎脈大急滑皆爲疝心脈搏滑急爲心疝肺脈沉搏爲肺疝三陰急爲疝靈樞有謂心脈微滑爲心疝肝脈滑甚爲癪疝脾脈微大爲疝氣腹中裹大膿血在腸胃之外滑甚爲癪癃疝腎脈滑甚爲癃癪諸脈之滑者爲陽氣甚盛微有熱夫如是者名爲七疝中分邪氣之寒熱者也內經又云厥陰滑則病狐疝風少陰脈滑病肺風疝太陰脈滑病脾風疝陽明脈滑病心風疝太陽脈滑病腎風疝少陽脈滑病肝風疝所言風者非外入之風由肝木陽臟自動之風也故經云脈滑曰風然連以疝稱者蓋腎肝同居下焦而足厥陰佐任脈之生化因肝腎之氣並逆所以任之陰氣爲疝肝之陽氣爲風所以風疝連稱也李東垣謂脈滑者爲內丁火熱併於下不勝壬癸從寒水之化故生癩疝亦用熱治內經亦不專主尺部而言也豈不爲

外寒鬱內熱之故乃曰熱火從寒化恐理未當而經更有莖垂者身中之樣陰陽之候津液之道也或飲食不節喜怒不時津液內溢下流於睾血道不通日久不休俛仰不便趨翔不能此病榮然有水不上不下若此者亦癭疝之一也張仲景言疝皆由寒邪得之亦同內經之云脈緊者當溫散之或曰內經言疝似若各從諸經脈所生今子何爲盡屬於任脈乎曰任脈是疝病之本源各經是疝病之支流何以言之蓋腎臟以四方分部者言則屬五行之寒水以居在下位者言則屬地道之陰陰形偶故腎有兩其形兩則地道之剛柔立焉包居兩形之間出納腎臟之精血以行坤土之化生成百骸萬象及夫生長壯老已之天癸與作強伎巧之用悉在於斯然而坤土居尊不自司其職司其職者乃衝任二脈起於胞中者行其化也是故五臟六腑之經皆受氣於六脈因以海名之所以二脈貴乎流通而忌閉塞流通則天之陽氣下降與之從事故施化之道行閉塞則天之陽絕故地之陰亦結而百病作矣故疝是二者所致也任脈之病者若剛柔自相勝負與內外邪之感傷皆得使其陰陽不和陰偏勝則寒氣衝擊陽偏勝則熱氣內入陰反之外悉致任脈爲疝縱其邪不自任脈而起初由各經所受而得者亦必與任脈相犯故也所犯者何或所勝之經脈相傳或受不以次所乘或任脈過處與受邪之經相會或六經受氣之際挾邪犯其海則皆足以感動任脈內含結固不化之陰上擊臟腑則爲嗌中之疝下入厥陰會於陰器則爲睾丸之疝蓋疝自立名偶爲任脈所職在地之陰特然起

擊者而命之也若諸經受邪不與任脈相干則不名爲疝矣不然何內經舉痛篇靈樞百病始生篇專爲發明經脈腹中諸痛者乃無一字名其疝也此可見任脈者是疝病之本源諸經所云疝者是其支流餘裔耳若夫巢氏所叙七疝曰厥癰寒氣盤附狠及言諸疝之候止以陰氣積於內爲寒氣所加使榮衛不調血氣虛弱故風冷入於腹內而成疝也小兒癭者陰核腫大由啼哭嘔氣不止動於陰氣結聚不散所致者也觀於五疝皆是痛在心腹之疝獨舉癭疝屬小兒病後人述其說更舉內經謂脾風傳之於腎名曰蠱疝寢少腹煩寃而痛一名曰蠱者謂之蠱病又立陰疝條即癩疝也將以足七疝之數此言五條爲心腹痛者之治療則曰若因七情所傷者當調氣安其五臟外邪所干者當溫散之治之不當內外之氣交入於腎者爲腎氣入於膀胱者爲膀胱氣入於小腸者爲小腸氣腎與膀胱一臟一腑其氣通於外腎小腸系於睾丸系會故也又謂陰疝一名癩疝其種有四腸氣卵水也至張戴人非之曰此俗工所立謬名也蓋環陰器上抵少腹乃屬足厥陰肝經之部分是受疝之處也或在泉寒滕木氣挛縮攣於此經或司天燥勝木氣抑鬱於此經或忿怒悲哀憂抑頓挫結於此經或藥淋外固閉尾縮精瀆於此經了不相干膀胱腎小腸之事乃厥陰肝經之職也凡疝者非肝木受邪則肝木自甚也由是於陰疝中亦立七疝之名曰寒水筋血氣狐癩也夫既曰用內經靈樞明堂之論要窮疝病之源而不及於任脈生病之源何也蓋因力辨陰器與小腸腎膀胱了不相干是屬足

厥陰部分受病之原立說所以不及於任脈然已三見於論中矣其間引治疝之穴多與任脈所會一也又稱衝任督與厥陰會於曲骨環陰器二也復言凡精滑白淫皆男子之疝也血涸不月月罷腰膝上熱嗌乾少腹有塊女子之疝也但女子不謂之疝而謂之瘕即任脈內結之病尤明三也凡戴人辨論之詞強直專主其一則不復顧其二任癩疝中有無六經外證之可辨若果有膀胱小腸之證者又安得不從之如靈樞謂小腸病者小腹痛腰脊控睾丸而痛之類論治法亦然因病在下必先下之更不問虛弱之人於首尾不可下者下之有不旋踵之禍豈待下後始補而可回其生乎然而戴人之書其詞直其義明讀之使人豁然以去胷中之茅塞滅是諸醫書之冠及乎詳究之則少溫潤反覆之意且夫陰陽變化生病於無窮治法亦無窮非一人所能究學者當因其已明益其未至然後得爲善用其書者丹溪先生嘗論睾丸連小腹急痛者或有形或無形或有聲或無聲人皆以爲經絡得寒收引不行而作痛不知此病始於濕熱鬱遏至久又感外寒濕熱被鬱而作痛也其初致濕熱之故蓋大勞則火起於心醉飽則火起於胃房勞則火起於腎大怒則火起於肝火鬱之久濕氣便盛濁液凝聚并入血隧流於厥陰肝屬木性急速火性又暴烈爲寒所束宜其痛甚而暴也此論亦就厥陰受病處發明戴人之未至者也誠有功於後學蓋癩疝不離此三者之邪熱則縱寒則痛濕則腫須分三者多少而治之兩丸俱病固然也設有偏於一者子又不能無其說焉腎有兩分左右其左腎

屬水水生肝木木生心火三部皆司血統納左之血者肝木之職也其右屬火火生脾土土生肺金三部皆司氣統納右之氣者肺金之職也是故諸寒收引則血泣所以寒血從而歸肝下注於左丸諸氣臌鬱則濕聚所以濕氣從而歸肺下注於右丸且夫睾丸所絡之筋非盡由厥陰而太陰陽明之筋亦入絡也往往見人偏患於左丸者則痛多腫少偏於右丸者則痛少腫多此便可驗也

懸癰

懸癰生於篡間謂前陰之後後陰之前屏翳處也即會陰穴屬任脈別絡俠督脈衝脈之會癰生其間人起立則若懸然故名懸癰

便毒

鬼遺云腿胜兩旁處起爲便毒胯下兩臂尖下穀道前水道後成懸癰皆是虛極若近穀道左右亦名痔癰宜急補脾臟及發處貼藥即用發穴散破後用抽腦膏膿盡用合瘡口散慎勿過冬即成冷漏難治

便毒生於小腹下兩腿合縫之間初發寒熱交作腿間腫起疼痛是也夫腎爲作强之官所藏者精與智男女大慾不能直遂其志故敗精搏血留聚經隧乃結爲便毒矣蓋合縫之間精氣所出之道路也或觸景而動心或夢寐而不洩既不得偶合陰陽又不能忘情息念故精與血滯而成腫結也初起切不可用寒凉之藥恐氣血愈滯不得宣通反成大患惟當開鬱散氣清利熱毒使精血宣暢則自然愈矣

前論爲思想無窮所願不遂者設而意猶未完果如此論當僧尼孀婦宮人曠夫多有此患然予目擊商賈中野合不潔淫妓便構此疾或疳瘡或楊梅者亦由慾火淫熾一旦交合不潔爲淫火冲動膚腠開通是以受毒初發之時慎不宜以敗毒之藥瀉之何也毒邪非虛不入若復虛胃氣則毒邪下陷治之非彌年累月不愈也捷法只宜發汗其次利小便膚腠所感之邪易散也陰莖腿縫皆肝經絡肝腎主下焦又肝主小便使毒邪從小便中出所治皆順也故治之不旬日便可奏功若會已發汗利小便體厚邪固而不得宣通者乃以破毒活血調氣之劑攻之俟毒氣宣通隨以補劑托之亦不失先後著也

陰瘡

陰器屬足厥陰肝經任脈之會素問云厥陰之脈絡陰器繫於肝靈樞曰筋者聚於陰器而脈絡於舌本肝者筋之會也又屬督脈素問曰督脈者其絡循陰器合篡間是也至於足太陽外合清水內屬膀胱而通水道手太陽外合淮水內屬小腸而水道出焉則又屬手足太陽也腎主水則又屬足少陰也飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱則又屬手太陰也素問又謂前陰者宗筋之所聚太陰陽明之所合則又屬脾與胃矣癰瘡生其間須細心求而責之不可專主一厥陰肝經而惟清肝導濕之爲事斯無誤矣

隱處瘙痒成瘡挾有耳鳴目痒鼻赤齒浮指縫白等證爲腎臟風瘡生於陰頭爲陰頭癰生於莖口爲下疳瘡今但生於陰莖者皆爲下疳姑從之

毛際瘍

或問小腹至陰之下玉莖之根痒極沸湯沃之稍止而復作有三四發黃水淋漓何如曰此廣瘡結毒也詢之幼時曾生惡瘡旬日後大痛腫甚飲食少進作結毒治之

吳崑醫方考

七疝方論

疝隱疾也證有七皆有虛實今考七方誌七疝耳若虛實之辨則在夫人之變通也

寒疝腰痛牽引睾丸屈而不伸尺內脈沉遲者吳茱萸加附子湯主之夫七疝寒水筋血氣孤癏也寒疝之由是寒客下體如坐於卑冷涉於寒濕所致寒氣自外入內束其少火鬱其肝氣故令腰痛痛而牽引睾丸者肝之經絡環陰器也寒主收引故屈而不伸尺內主腰以下脈沉遲陰脈也寒亦明矣故用吳茱萸附子之辛熱以温其寒生薑大棗之辛温以和其氣邪傷之後其正必虛人參之補以去其虛

水疝者腎囊腫大陰汗不絕升陽除濕湯主之子和云水疝者得之飲水醉酒勞於使內其言當矣蓋飲水醉酒則濕氣勝勞於使內則腎氣虛腎氣虛則濕勝而流坎也故令腎囊腫大如水晶陰汗下溼如霑漏內經曰下者舉之又曰風能勝濕是方也柴胡羌活蒼朮防風升麻藁本蔓荊獨活皆味辛而氣清風藥也升藥也故可以勝濕升陽而黃芪之甘可使托其陷下之氣甘草之温可使培其防水之土當歸之潤可使調榮血於風藥之隊也胃苓湯亦可酌用

外腎因撲損而傷睾丸偏大有時疼痛者此中有死血名曰血疝宜按摩法詳導引中

筋疝者甘草梢黑豆湯主之夫筋疝者莖筋挈痛挺

脹不堪也子和云此以邪術得之邪術者房術春方之類也治宜解毒緩急故用甘草梢黑豆以主之氣疝者拂鬱則睾丸腫大悲哀則不藥而消虎潛丸主之蓋邪之所湊常乘其虛拂鬱而睾丸腫大者肝氣乘腎之虛也悲哀不藥而消者氣有所泄也夫肝腎之病同一治故知蘡薁地芩藥牛膝當歸瑣陽味厚之品補腎補肝龜得天地之陰氣最厚虎得天地之陰氣最雄以血氣中之陰類以補陰欲其同氣相求耳陳皮者取其能推陳腐之氣羊肉者取其能補五藏之陽也或問何以不用楊核枳實細辛川楝子青皮之輩余曰此皆破氣藥也昔醫固多用之然而治標云爾況蹈重虛之戒乎氣實者用之可也

孤疝者晝則氣出而腎囊腫大令人不堪夜則氣入而腫脹皆消略無疾苦補中益氣加黃蘗知母湯主之病愈而止夫孤之爲物也晝則出穴而溺夜則入穴而不溺以斯證肖之故曰孤疝夫晝陽也夜陰也晝病而夜否者氣病而血不病也故用人參黃芪白朮甘草以益氣方內有升麻柴胡則能舉其陷下之陽方內有黃蘗知母則能益夫不足之坎當歸味辛可以活其壅滯之血陳皮氣芳可以利其陳腐之氣或問何以不主辛香流氣之劑余曰本以氣不足而致疾復以流氣之劑主之非惟無益而又害之矣

癩疝者頑疝也睾丸雖大而無疾苦也此以父子相傳得於有生之初已然非若有生之後三因所致之疾也故不必主治或有先是癩疝後來疼痛疾苦者此象前件六證也宜於前方消息之

陳實功外科正宗

腎囊風

腎囊風乃肝經風濕而成其患作痒喜浴熱湯甚者疙瘩頑痲破流脂水宜蛇牀子湯熏洗二次即愈

陰蝨

陰蝨又名八脚蟲也乃肝腎二經濕氣而成生此不吉宜銀杏無憂散津調擦之內服六味地黃丸每斤加蜜炒黃檗一兩蕪荑五錢以清化源愈後不發

下疳

下疳者邪淫慾火鬱滯而成其來有三一由男子慾念萌動陽物興舉淫火猖狂而未經發泄者以致敗精濁血流滯中途結而爲腫者一也二由婦人陰器瘀精濁氣未淨接與交媾以致淫精傳襲而成者二也三由房術熱藥塗抹玉莖洗搽陰器興助陽火煽動陰精僥倖不衰久頓不泄多致火鬱未發而成者三也男子萌念火鬱之證初起先必澀淋小便溺痛次流黃濁敗精陽物漸損甚則腫痛腐爛法當疏利肝腎邪火如八正散清肝導滯湯之類是也婦人陰器不潔初起皮膚腫光亮甚則如水晶皮破流水腫痛日生痒痲時發治當解毒消風如龍膽瀉肝湯兼平胃散合而用之男婦房術所傷蘊毒所致初起陽物痒痛堅硬紫色疙瘩漸生腐爛漸作血水淋漓不時興舉治當瀉火解毒如黃連解毒湯蘆薈丸之類是也外以銀粉散珍珠散人中白散選用又有先發時瘡悞用熏條擦藥結毒於此者詳結毒門

看法

初起不紅不腫睡不舉陽玉莖微損小水自利者輕已成微熱微腫皮色光亮小便赤色更兼白濁者平已損肉色紅活煩熱堅腫小便不疼大便不祕者易初起小便淋漓傷損陽物堅硬作疼腐爛漸開者險已成腐潰內攻傷損玉莖色紫無膿疼如針刺者重

治法

初起腫痛發熱小水澀滯肝經濕熱也宜瀉肝滲濕腫痛堅硬煩發寒熱口燥咽乾大便祕者通利二便玉莖腫痛小便如淋自汗盜汗時或尿血清心滋腎莖竅作痒時出白濁發熱口乾津液少者益腎清心潰後腫痛小便赤澀日則安靜夜則痛甚滋陰瀉火潰爛不已腫硬又作疼痛日深穢氣不回清肝解毒

魚口便毒

夫魚便者左爲魚口右爲便毒總皆精血交錯生於兩胯合縫之間結腫是也近之於小腹之下陰毛之間結腫名曰橫痃又名外疝是也得之入房忍精强固不洩或慾念已萌停而不遂以致精血走動凝滯結而爲腫治當散滯行瘀通利大小二便九龍丹山甲內消散是也七日已後服之根本堅固恐其作膿宜用火針法刺之亦妙已出膿者十全大補湯服之庶易收斂遲則恐生別證難愈

看法

初起結腫不紅微熱行走稍便無寒熱交作者爲輕已成紅赤腫痛發熱煩疼舉動艱辛至夜尤甚者易已潰膿稠肉色紅活腫消痛止新肉易生作痒者順初起結腫堅硬如石硬强刺疼起坐不便寒熱者重已潰肉爛腫痛不減膿水清稀孔深口大不斂者險

治法

初起漫漫結腫疼痛兩胯牽强身發寒熱宜散表邪

已成堅硬發熱疼痛內熱口乾大小便祕宜通利之發散疏利之後腫痛仍作欲其作膿宜用托裏消毒焮腫發熱疼痛日久急脹苦甚內膿已成宜急開之已潰之後膿水不乾新肉生遲不斂健脾胃補氣血

囊癰

夫囊癰者乃陰虛濕熱流注於囊結而爲腫至潰後睪丸懸掛者猶不傷人以其毒從外發治當補陰清利濕熱取效者十有八九近時人悞用疝家熱藥多致熱甚爲膿後難收斂初宜龍膽瀉肝湯稍久滋陰內托散外敷如意金黃散俱可內消又一種水疝皮色光亮無熱無紅腫痛有時空囊聚水宜用針從便處引去水氣則安如腫痛日久內膿已成脹痛者可速針之內服十全大補湯加山茱萸牡丹皮澤瀉治之間以六味地黃丸服之亦愈

看法

初起不紅微腫腎子引痛不作寒熱起坐自便者輕已成紅腫發熱形色光亮疼痛有時飲食有味者順已潰膿稠腫消痛止新肉漸生不痛作痒收斂者吉潰後腐爛囊皮脫落甚者睪丸突出能食不疼者可初起堅硬紫色日夜痛甚小水不利大便瀉泄者重已成堅而不潰頭腐無膿疼痛無時常流血水者重潰後膿口開張腫痛不減身發寒熱睡臥不寧者險

治法

初起寒熱交作腎子腫痛疼連小腹者宜發散寒邪已成紅腫發熱口乾焮痛小水不利大便祕者利之已潰疼痛不減膿水清稀朝寒暮熱者宜滋陰內托潰後不能收斂日晡發熱飲食減少者宜養血健脾潰後睪丸懸掛不能收斂者當外用生肌內加補托

懸癰

夫懸癰者乃三陰虧損濕熱結聚而成此穴在於穀道之前陰器之後又謂海底穴也初生狀如蓮子少痒多痛日久漸如桃李赤腫焮痛欲潰爲膿破後輕則成漏重則瀝盡氣血變爲痨瘵不起者多矣初起時元氣壯實宜用九龍丹瀉去病根稍虛者內消沃雪湯利去濕熱亦有可消者十中三四如十餘日後腫勢已成不得內消宜托裏消毒散加山甲皂角刺服之自破如腫高光亮膿熟不破頭者用針急破之穢膿一出其患易安如膿出之後朝服六味地黃丸午服十全大補湯加丹皮澤瀉溫補滋陰如厚味膏粱氣體壯實者初服龍膽瀉肝湯潰後滋陰八物湯以清蘊熱體瘦房勞氣血虛弱者初服八珍湯加澤瀉製甘草潰後十全大補湯加丹皮熟附子脾弱者補中益氣湯以滋化源日久成漏者國老膏化湯吞服蠟礬丸首尾悞服寒凉損胃傷脾冰凝氣血以致患孔漸開穢膿不止者定變成虛羸痨瘵終爲難愈

看法

初起如松子漸大若梅李紅赤腫痛光亮發熱者輕已成高腫作痛根腳不散皮薄易破膿成脹痛者易已潰膿稠而黃氣味不臭焮腫易消痛止作痒者順初起色紫堅硬根腳漫腫痛連臀膝二便不利者重已成腫如黃瓜紫斑腐爛穢水無膿痛甚氣息者難已潰穢膿不絕瘡口開張肉不紅活虛熱食少者逆

治法

初起寒熱如瘧喜覆衣被口乾好飲熱湯宜發散已成焮熱作痛內熱口乾喜冷大便祕澀者微利之日久內膿已成不破頭而脹痛者急針之法當補托潰後膿水清稀虛熱不退腫痛不消者宜滋陰健脾瘡口不斂飲食減少餘腫不消新肉不生峻補脾胃

醫門法律 臣喻昌著

疝

凡治水腫病遇少腹素有積塊疝瘕誤行發表攻裏致其人濁氣上衝胷胃大嘔大逆痛引陰筋卒死無救者醫殺之也

發明金匱腹痛脈弦而緊弦則衛氣不行即惡寒緊則不欲食邪正相搏即爲寒疝寒疝繞臍痛若發則自汗出手足厥冷其脈沉弦者用大烏頭煎絲內經心疝之名推之凡腹中結痛之處皆可言疝不獨睪丸間爲疝矣然寒疝繞臍痛其脈陽弦陰緊陽弦故衛氣不行而惡寒陰緊故胃中寒盛不殺穀邪即胃中之陰邪正即胃中之陽氣也論胃中水穀之精氣與水穀之悍氣皆正氣也今寒入榮中與衛相搏則榮即爲邪衛即爲正矣繞臍腹痛自汗出手足厥冷陽微陰盛其候危矣故用烏頭之溫合蜜之甘入胃以建其中而緩其勢俾衛中陽旺榮中之邪自不能留亦不使虛寒自下而上之微旨也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百二十二卷目録

醫部彙考二百二

前陰門三

張介賓景岳全書陰器縱痿　痼冷　便毒　論治　痼癰　陰莖下疳

陳士鐸石室秘錄強陽不倒　痿陽不振　孤方一閉氣丹　升陽降濁湯　龍膽瀉肝湯　補肝湯　溫腎湯　清震湯　大蒜丸　陰汗濕痒方　蝙蝠散　銅綠散　蟬蛻散　膨藥　清濕瀉肝湯　又方　防風羌活湯　洗方　控涎丸　又方　內補托裏流氣飲　又方　麻黃湯　茯苓補心湯　補心養胃湯　一拂散　洗方　龍蛻湯　荆芩湯　敗毒散　敗毒流氣飲　又方　又方　清心流氣飲　乳香湯　子肉湯　悉白散　內味香丸　又方　當歸四逆湯　碾傳榮潰　又方　神聖代鐵散　為前丸　牡蠣丹　加減紫苓湯　聚香飲子　三香丸　天台烏藥散　敷命活血丸　鈴丸　加味通心飲　硼砂丸　加味通心散　去皮散　榮黃內消丸　鍚貝膏丸　金鈴散　三福湯　楊梅瘡　二白散　四味荷香散　香安野湯　金鈴子丸　加減香苓飲　川楝散　九仙散　應痿　加減內固丸　十補丸　柴榮黃湯　活血清遠湯　助陽散　陰痿方　聚榮散　膀胱熱　四生散　乳香龍竹散　烏龍丸　薤白神曲丸　木香金鈴丸　四妙川楝丸　五珍門楝丸　丁香楝實丸　十味蒼柏散　神清散　谷奇湯　清心蓮子飲　加味托裏散　加味十全大補湯　腎臟風方　全蠍散　牡蠣散　桂附枸杞之類主之

凡肝腎濕熱以致宗筋弛縱者亦為陽痿治宜清火以堅腎然必有火盛火脈內外相符者方是其證宜滋陰八味丸或丹溪大補陰丸虎潛丸之類主之如火之甚者滋腎丸大補丸之類皆可用

痼論

痼氣病者凡小腹睾丸為腫為痛止作無時者皆是也但痼證不一如內經所謂狐痼者以其出入不常也有言癩痼者以其頑腫不仁也有衝痼者以其自少腹上衝而痛也有厥痼者以結氣在陰而氣逆為痼也有痼瘕者以少腹冤熱而痛出白一名曰蠱也有六經風痼者如四時刺逆從論所言者是也有小腸痼者如邪氣藏腑病形篇所言者是也凡此七者總皆痼之為義然痼之為病不獨男子有之而婦人亦有之經曰有積氣在腹中有厥氣名曰厥痼女子同法又曰厥陰所謂癩痼婦人少腹腫也至若衝痼瘕之屬亦皆男婦之所同病者然惟睾丸之病獨在男子而他則均當詳察也觀張子和曰夫遺溺閉癃陰痿脬痹精滑白濁皆男子之病也若血淋不止月罷腰膝上熱足蹙嗌乾癖閉少腹有塊或定或移前陰突出後陰痔核皆女子之病也但女子不謂七痼而謂之瘕若年少而得之不計男子婦人皆無子此誠非熱也然今人但言男子之痼而全不知婦人之痼殊失之矣

痼氣所屬本非一經如內經所云任脈為病男子內結七痼女子帶下瘕聚怪脈生病從少腹上衝心而痛不得前後為衝痼又曰脾傳之腎病名曰痼瘕又

景岳全書臣張介賓著

陰器縱痿

凡男子陽痿不起多由命門火衰精氣虛冷或以七情勞倦損傷生陽之氣多致此證亦有濕熱熾盛以致宗筋弛縱而為痿弱者譬以著熱之極則諸物綿萎經云壯火食氣亦此謂也然有火無火脈證可別但火衰者十居七八而火盛者僅有之耳

凡思慮焦勞憂鬱太過者多致陽痿蓋陰總宗筋之會會於氣街而陽明為之長此宗筋為精血之孔道而精血實宗筋之化源若以憂思太過抑損心脾則病及陽明衝脈而水穀氣血之海必有所虧氣血虧而陽道斯不振矣經曰二陽之病發心脾有不得隱曲及女子不月者即此之謂

凡驚恐不釋者亦致陽痿經曰恐傷腎即此謂也故凡遇大驚卒恐能令人遺失小便即傷腎之驗又或於陽旺之時忽有驚恐則陽道立痿亦其驗也

命門火衰精氣虛寒而陽痿者宜右歸丸贊育丹石刻安腎丸之類主之若火不甚衰而止因血氣薄弱者宜左歸丸斑龍丸全鹿丸之類主之

凡思慮驚恐以致脾腎虧損而陽道痿者必須培養心脾使胃氣漸充則衝任始振而元陽可復也宜七福飲歸脾湯之類主之然必大釋懷抱以舒神氣庶能奏效否則徒資藥力無益也其有憂思恐懼太過者每多指抑陽氣若不益火終無生意宜七福飲加

曰三陽爲病發寒熱其傳爲癇疝又曰邪在小腸者連睪系屬於脊又曰邪客於足厥陰之絡令人卒疝暴痛又如心肝脾肺腎五疝之脈各有所辨此素問言諸經之疝也又經筋等篇言足陽明之筋病癭疝腹筋急足太陰之筋病陰器紐痛下引臍兩脅痛足厥陰之筋病陰器不用等義此靈樞言諸經之疝也自張子和云疝有七前人論者甚多其非靈樞素問銅人之言予皆不取乃引靈樞之論曰足厥陰之筋聚於陰器故陽明與太陰之筋皆會於陰器惟厥陰主筋故爲疝者必本之厥陰此子和之意以疝爲筋病而筋主於肝故爲疝必厥陰似亦有理而實則不然觀內經諸論之如前者謂非靈素之言而子和皆可不取乎且筋雖主於厥陰然散見諸經即爲諸經之筋矣若病在諸經固可因筋而廢經乎矧如厥論曰前陰者宗筋之所聚太陰陽明之合也又痿論曰陰陽總宗筋之會會於氣街而陽明爲之長此亦可以不取乎然則小腹前陰之經則厥陰少陰太陰陽明少陽太陽以至衝任督脈皆有所涉今考銅人經治疝之法則諸經皆有俞穴若謂止屬厥陰則諸經皆廢矣即子和亦歷指諸經之穴謂諸穴雖亦治疝然終非受疝之地此何說也自後丹溪遂因子和之言謂經有七疝寒水筋血氣狐癩也專主肝經與腎經絕無相干再至戴原禮又因丹溪之說云疝本屬厥陰之一經余嘗見俗說小腸膀胱下部氣者皆妄言也嗚呼此等讒論皆後學應見果堪信乎果堪法乎醫失眞傳類多如此故非靈素銅人之言余誠不敢取也

疝氣之病有寒證亦有熱證然必因先受寒濕或犯生冷以致邪聚陰分此其肇端之始則未有不因寒濕而致然者及其病鬱既久則鬱而成熱者有之或以陽臟之人火因邪聚而濕熱相資者亦有之故在內經言疝則寒熱皆有所論如曰病在少腹腹痛不得大小便病名曰疝得之寒曰陰亦盛而脈脹不通故曰癲疝也曰肝脾得之寒濕與疝同法曰太陽太陰陽明之勝復皆有疝氣是皆言疝之寒也又如曰脾風傳腎名曰疝瘕少腹冤熱而痛出白一名曰蠱曰足厥陰之筋病陰器不用傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收是皆言疝之熱也此內經之言寒言熱未嘗偏廢者如此觀丹溪曰自素問而下皆以爲寒蓋寒主收引經絡得寒則引而不行所以作痛者然亦有陽氷涉水終身不病此者無熱在內故也大抵此證始於濕熱在經鬱而至久又得寒氣外束不得疏散所以作痛若只作寒恐未爲備此丹溪之論如此故其治多從火而倍用山梔黃蘗之屬余則不能無言也觀內經之言疝者如前原非只作寒論第言寒者較多於熱亦自疝家之正理不可易也矧疝以寒邪入經所以爲痛及其久也方爲鬱熱使其始不受寒何由致疝此寒爲本而熱爲標也若謂始於濕熱在經又得邪氣外束所以作痛則反以熱爲本而寒爲標矣豈其然乎至若陽氷涉水終身不病者此雖有貴賤之分久暫之異然必以陽氣內實而寒不能犯者有之若謂無熱在內故寒自不入又豈其然乎此致病之因有不得不辨也是以內經之論凡至切至當者胡可弗遵後世之談其多鑿多偏者

安庸盡信再若治此之法固不可必其爲寒又不可必其爲熱但治初受之邪必當以溫經散寒行氣除濕爲主切不可早用寒凉致留邪氣則遺害非淺及其久也則有始終以寒者有因寒鬱熱者有元陽受傷而虛陷日甚者但當察其形氣病因而因病制方若果有熱證熱脈顯然外見者方可治以寒凉如無熱證可據而執云大抵疝由濕熱則無者生之有者甚之矣此習俗之通弊又不可不鑒也

論治

凡治疝之法當察所由此雖以受寒受濕因而成疝然或以色慾或以勞損或以鬱怒或以飲食酒濕之後不知戒慎致受寒邪則以陰求陰流結於衝任血氣之海而下歸陰分遂成諸疝故其爲病則有遇寒而發者有鬱久成熱遇熱而發者有鬱則氣逆遇鬱怒而發者有濕因寒滯遇濕而發者有疲極則傷筋遇勞苦而發者有虛邪在少陰厥陰遇色慾而發者有飲食之濕有陽明太陰遇酒酪而發者至其久也則正氣陷而不舉邪氣留而不去而爲癥爲木難於愈矣故治此者必當因其所因辨而治之則無不隨手可愈若茫然混然徒執一偏之見而至老不瘳者即與之談終無益也

治疝必先治氣故病名亦曰疝氣非無謂也蓋寒有寒氣熱有熱氣濕有濕氣逆有逆氣氣在陽分則有氣中之氣氣在陰分則有血中之氣凡氣實者必須破氣氣虛者必須補氣故治疝者必於諸證之中俱當兼用氣藥如疝之暴痛或痛甚者必以氣逆宜先用茴香散氣實多滯者宜實鹽川楝散或天台烏藥

散非有實邪而寒勝者宜煖肝煎主之
寒疝最能作痛多因觸冒寒邪或犯生冷所致凡喜煖惡寒脈弦細鼻尖手足多冷大小便無熱之類皆是也寒微者宜荔香散煖肝煎腎氣丸神應散丁香楝實丸之類主之寒甚者宜醫林四神丸百一選方十補丸壺盧巴丸沉香桂附丸之類主之一法以五積散加鹽炒吳茱萸小茴香各一錢薑五片葱白五寸同煎空心熱服大治氣痛不可忍
熱疝大能作痛凡火邪聚於陰分而爲痛者必有熱證熱脈或大便祕結或小水熱閉不通或爲脹爲滿而煩熱喜冷者是也宜大分清飲或茵陳飲加茴香川楝子之類或以加味通心飲葵子湯之類主之又有腎本不虛而肝經濕熱火旺莖中作痛筋急縮或痛或痒或腫或挺縱不收白物如精隨溺而下者此筋疝也宜龍膽瀉肝湯主之
濕疝多爲重墜脹滿然亦有痛者宜以前寒熱證參而治之有不痛而久墜不愈者是卽癩疝之屬單宜治濕理氣以加味五苓散或局方守效丸或蒼术散或三層茴香丸之屬主之一云凡治癩疝非斷房事厚味不能取效
疝病遇酒而發者多因濕熱當先去其濕濕而熱者大分清飲加茴香川楝之屬濕兼寒者宜加味五苓散主之或以葛花解醒湯加減用之
血結少腹間者是爲血疝但察其非氣非食小腹鞕而有形大便祕結而黑小水利者必血積血疝之屬宜桃仁膏或桃仁煎或玉燭散之類下之
疝遇色慾而發者是必陰虛之屬若陰虛兼動相火者宜以六味地黃湯加黃檗知母山梔茴香川楝之類主之若陰虛無火或兼有寒而痛精虛者宜理陰煎或八味地黃湯加茴香枸杞之類或用煖肝煎主之
疝久者必多虛證或以元氣本虛而偶患者或不耐勞苦而微勞卽發者當以脈證辨之凡治虛疝當察其虛在陰分或在陽分陰分者輕則煖肝煎八味地黃湯甚則理陰煎補陰益氣煎之類酌而用之若陽虛者宜溫胃飲歸脾湯補中益氣湯之類主之若陽虛至甚者必用桂附椒薑或以六味回陽飲之類主之若虛中挾滯者宜以前法爲主而加以疏導之藥如川楝子茴香枳實山楂梔子之屬酌其宜而佐用之
疝有邪實當下者詳張子和論中
按子和七疝之治雖各有不同然無非用下則不能無偏故劉宗厚徐用誠皆疑而議之亦謂其太過耳非謂盡不可用也再觀丹溪之法則曰治疝大不宜下是又相左之甚矣余因考子和治按如治蔡參軍因坐濕地疝痛不堪用導水丸下之而愈又治一人因瘧渴遇飲漿水病疝醫進薑附爲燥熱所壅以致陰囊重墜大如升斗乃先以導水丸後用猪膚散大下之而愈又如一夫病卒疝赤腫大痛數日不止諸藥如石投水遂以導水丸次以通經散大下之而愈若此類者豈皆不可下乎故但宜酌其虛實緩急如或爲邪熱所閉或以少年暴疾或以腫硬赤痛之極者則如導水丸三花神祐丸禹功散之類皆所當用蓋邪盛而急勢不可當有非行氣利水等劑所能及者則不得不攻此子和之法亦自有必不可廢者是不可不察也

陰瘡

凡治此之法若腫痛內外俱潰者宜芍藥蒺藜煎爲最佳或四物湯加梔子丹皮騰草荊芥或用加味逍遙散
若濕痒者宜芍藥蒺藜煎或歸脾湯加柴梔丹皮
淋瀝者宜龍膽瀉肝湯加白术丹皮
淋瀝而火盛痛脹者宜大分清飲或抽新飲
腫而堅毒者補中益氣湯加山梔丹皮
可洗者用百草煎
可敷者宜蟅蛸散完瘡散

下疳

下疳一證本肝腎濕熱證也若無外因而病者不過去其濕熱或滋眞陰濕熱既清其瘡自愈無足慮也惟感觸淫毒而患者毒有淺深則病有微甚皆宜用百草煎洗外以蟅蛸散敷之則輕者自愈若濕熱甚而爲腫爲痛者宜用芍藥蒺藜煎兼而治之如毒甚者必用萆薢湯亦可
若感觸淫邪毒自少陰直入精宮者不易愈卽治如前法然不見便毒廣瘡發出而後下疳始愈既見瘡毒卽當於本證條下求法治之

便毒

便毒論治如薛氏之法固已詳矣然又惟交感不潔遭淫毒而患者爲最多每每先起下疳下疳未已便毒繼之此濕熱穢毒之爲患也凡初起腫痛尚未成膿而元氣尚强者速宜先去其毒惟倉廩散或牡蠣

散爲最善若已成膿則或針或蝕惟速去其膿隨因證調補使速收口爲善

若初起一核其痛微其腫漫者此有二證一以邪輕一以元氣虛弱毒深而然若邪輕者只用會通散加麝香貼之無有不散或降癰散亦可若元氣虛弱而毒深者既不肯散又不早潰愈久必愈甚最爲可畏及其潰後多不能收輕則爲瘻重則殞命此惟大補元氣方不致害

若燄腫痛甚處已將成勢不能消宜用降癰散當頭圍之則勢可斂痛可解膿可速成而潰也

石室秘錄 陳士鐸著

強陽不倒

強陽不倒此虛火炎上而肺金之氣不能下行故爾若用黃蘗知母二味煎湯飲之立時消散然而自倒之後終歲經年不能重振亦自苦也方用元參麥冬各三兩肉桂三分水煎服即倒此方妙在元參以瀉腎中浮遊之火尤妙肉桂三分引其入宅而招致其沸越之火同氣相求火自同合況麥冬又助肺金之氣清肅下行以生腎水水足火自息矣

痿陽不振

至於痿而不振者乃過於琢削日泄其腎中之水而腎中之火亦日消亡蓋水去而火亦去必然之理如一家人口廚下無水又何以羹飯而生烟必汲其泉源而後取其薪炭可以鑽燧取火以羹飲食否則空鑿安爨也方用熟地一兩山茱萸四錢遠志巴戟天杜仲肉蓯蓉各一錢人參枸杞子各三錢茯神肉桂各二錢白朮五錢水煎服一劑起二劑強三劑妙老人倍加此方用熱藥於補水之中則火起而不愁炎燒之禍自然羹湯可飲羹米可餐斷不致焦釜沸乾或虞爆碎也

陽倒不舉方用熟地一斤黃芪二斤巴戟天當歸各六兩肉桂柏子仁去油覆盆子麥冬各三兩白朮八兩各爲末蜜爲丸每日白滾湯送下一兩自然陽旺不倒矣

狐疝

男子與女子之治原無分別然而亦有殊處男子與婦人殊者疝病陽強不倒痿而不舉然而疝病與婦人異者止狐疝不同耳餘俱相同狐疝者日間縮在糞之上夜間垂在囊之下也此乃寒濕又感陰陽不正之氣乘於交感之際或在神道之旁或在風濕之際感而成之也方用杜若五錢搗汁以涼水浣之取汁一椀加沙參一兩肉桂桂枝小茴香橘核各一錢水煎服一服即伸出二服即消三服全愈

方一

固眞湯 東垣十書下同

治陰汗濕痒正月內定此方

升麻　柴胡　羌活各一錢　炙甘草　澤瀉各一錢半　草龍膽炒　知母炒　黃蘗各二錢

右剉如麻豆大水三盞煎至一盞稍熱空心服以美膳壓之

升陽除濕湯

治兩外腎冷雨髀樞陰汗前陰痿弱陰囊濕痒腺氣

澤瀉　升麻各一錢半　紅花少許　生甘草　黃蘗酒製各二錢　草龍膽　當歸梢　羌活　麻黃根　柴胡　漢防己　白茯苓各一錢　五味子二十粒

右水三大盞煎至一盞稍熱服食前忌酒濕麵房事

龍膽瀉肝湯

治陰部時復濕痒及臊臭

柴胡梢　澤瀉各一錢　車前子　木通各五分　當歸梢　龍膽草　生地黃各三分

右㕮咀水三大盞煎至一盞空心稍熱服更以美膳壓之

溫腎湯

治前證二月定此方

麻黃　柴胡梢各六分　澤瀉二錢　防風根　蒼朮各一錢半　白朮　猪苓　升麻　白茯苓　黃蘗酒炒各一錢

右件分作二服每服水二大盞煎至一盞稍熱服食前天晴明服之候一時辰許方食

補肝湯

治前證

黃芪七分　人參　白茯苓　葛根各三分　甘草炙　蒼朮各五分　猪苓　升麻各四分　知母　柴胡　羌活　陳皮　歸身　黃蘗炒　防風　澤瀉　神麴末　連蘊各二分

水二大盞煎一盞稍熱空心食前服忌酒濕麵

清震湯

治前證十二月定此方

羌活　酒黃蘗各一錢　升麻　柴胡　蒼术

黃芩各五分　防風　猪苓　麻黃根各三分

藁本　甘草炙　當歸身各二分　紅花一分

澤瀉四分

水二盞煎一盞臨臥服忌同前

大蒜丸

治陰汗濕痒

大蒜不拘多少

右煨剝去皮爛研同淡豆豉末搜丸如梧子大朱砂爲衣每服三十九棗子燈心煎湯送下

陰汗濕痒方

爐甘石二錢半　眞蛤粉一錢二分半

右爲粉撲傳

蟠葱散和劑

治男子婦人脾胃虛冷攻築心腹脅肋刺痛胷膈痞悶背膊連項拘急疼痛不思飲食時或嘔逆霍亂轉筋腹冷泄瀉膀胱氣刺小腸及外腎腫痛及治婦人血氣攻刺癥瘕塊硬帶下赤白或發寒熱胎前產後惡血不止臍腹疼痛一切虛冷

延胡索三兩　蒼术泔浸一宿　甘草爐各半斤

白茯苓　蓬术　三稜煨　青皮各六兩　丁皮

縮砂仁　檳榔各四兩　肉桂　乾薑炮各二兩

右揭羅爲末每服二錢水一盞連根葱白一莖煎七分空心食前稍熱服

又方

治陰忽疼痛

桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃　苦楝子

薤香子　沒藥各一兩

右爲細末每服二錢食前熱酒調服

銅綠散醫學入門下同

治男女陰濕瘡蟲蝕瘡

五倍子五錢　白礬一錢　乳香　銅綠各五分

輕粉二分半

右爲末先以藥水洗後摻之

蟬蛻散

治脬囊忽腫多因坐臥濕地或爲蟻咬著

蟬蛻半兩

右用水一椀煎湯洗再溫再洗仍與五苓散合三痾湯加燈心煎服

瀉肝清熱湯療瘍全書下同

治肝經濕熱流毒膀胱經生腎囊癰

龍膽草酒拌炒　當歸梢　車前子炒　澤瀉

生地　芍藥　黃連　黃蘗　知母　淡竹葉

木通　防風各一錢　甘草梢五分

右作一劑水二椀煎八分食前服

烏金散

治前證腐壞用此敷之

麩不拘多少煅存性　紫蘇葉

右爲細末香油調搽乾摻亦可

加味小柴胡湯

治前證潰爛飲食少思日晡發熱

柴胡　人參　黃芩　川芎　白术　黃芪

當歸　甘草　黃蘗　知母各一錢　半夏

白芍各五分

右水煎服

摻藥

治前證

輕粉　孩兒茶各二錢　紅絨灰一錢五分

飛丹　雞內金煅存性　爐甘石煅各一錢

冰片三分　眞珠五分　麝香二分

右爲極細末摻瘡上

清濕瀉肝湯

治腫毒疳瘡

升麻　羌活　柴胡　知母　黃蘗　澤瀉

青皮　川芎　生地　蒼术　木通　龍膽

生甘草

右㕮咀水煎服

熱加黃芩

小便不利加車前子

虛加人參

又方

治氣弱無力莖根下生瘡膿水不止

人參　黃芪　當歸　柴胡　升麻　甘草梢

黃蘗　知母　紅花　白芍　黃芩　龍膽草

右㕮咀水煎服

防風羌活散

治下疳

防風　羌活　荊芥　獨活　製黃芪　牛蒡子

山梔　甘草　木通　蒼术　車前子　天花粉

右咬咀水煎服

洗方

治下疳

冬青葉四五十片　甘草　黃蘗　防風

右咬咀煎湯洗之

摻藥

治下疳

孩兒茶　輕粉　黃蘗　冰片　橄欖核煅各一錢

右爲末摻之

又方

治內外蛀疳瘡并小便一切疳疾

蒼朮　黃蘗　滑石各二錢　秦艽一錢

右咬咀水煎服

如小便澀滯疼痛加甘草節蒲黃

又方

治前證

黃芪　白蒺藜　羌活　白附子各二錢

右末之用猪腰子一副竹刀切破入藥在內線紮定白酒煮熟空心服之

隔紙膏

治小便疳瘡大爛者

麪粉　白蠟各一兩　黃蠟八錢　冰片一錢

先用麻油三兩火上熬化二蠟隨下麪粉次下冰片爲隔紙膏貼之五日後痛卽止肉卽生矣

茯苓補心湯

治一切妬精陰瘡

白茯苓　乾葛　前胡　桔梗　甘草　陳皮　白芍　紫蘇　人參　半夏　當歸　熟地　川芎　枳殼

右咬咀薑三片棗肉二枚燈心二十莖水二鍾煎服

補心養胃湯

治前證

陳皮　半夏　茯苓　甘草　白朮　黃連　當歸　生地　青皮　白芍　檳榔　烏藥　遠志　滑石　山梔　車前子　延胡索　川芎

右咬咀水煎服

內補托裏流氣飲

治前證

茯苓　澤瀉　猪苓　紫蘇　山梔　甘草節　黃連　白朮　川芎　當歸　生地　白蒺藜　白芍　人參　黃芪　木通　青皮　香附子　苦參

右咬咀水煎服

水黃膏

治前證

黃連二兩水二椀文武火煎至一椀濾去查再重湯慢火煎至一酒杯　加冰片三分　麝香三分　輕粉五分　硫黃末一錢

右俱研末以黃連汁調和用鵝毛潤患處立效

一抹散

治前證

黃連末　鹿角灰　雞內金灰各一錢　紅絨灰　孩兒茶各七分　珍珠末　冰片　輕粉各五分　麝香三分

右爲細末乾摻患處

洗方

治陰蝕瘡瘡

川椒五分　蛇牀子半斤　白礬三錢　桃枝　柳枝各七枝　斬艾　苦參各一兩

右用米泔水五六椀煎滾去查乘熱熏洗之

又方

治前證

雄黃一錢　硫黃五分　木鼈子一枚去殼剉片　桃仁五粒

艾五錢入前藥在內作條放在馬桶熏之其蟲卽死

麻黃湯

治陰腫或瘡或爛

麻黃　黃連　蛇牀子各五錢　斬艾三錢　烏梅三枚　大棗　防風　白礬各八錢

右剉煎湯熏洗再用孩兒茶一錢輕粉冰片杏仁灰各五分爲末摻之

黃芩湯

治妬精陰瘡

當歸　黃芩　川芎　大黃　白礬各二錢　黃連三錢

右剉水五椀煎熏洗洗後敷雄黃硫黃輕粉末

又方

治陰爛

孩兒茶　雞內金各一錢　輕粉五分　冰片三分

右爲細末乾摻上

又方

治陰瘡與男子妬精瘡略同

黃丹　枯礬　萹蓄　藁本各一兩　硫黃五錢

蛇蛻一條燒灰

右爲細末搽之如不乾再用芍藥末摻之

龍膽湯

治左右便毒

龍膽草一錢　木鼈子三枚　大黃三錢　桃仁

紅花　當歸鬚各等分　苦蔞一枚

右㕮咀水酒各一椀煎八分去查夜露一宿次早

空心溫服行利十餘次

荊防敗毒散

治前證

穿山甲　甘草　紅花　羌活　當歸　金銀花

天花粉　赤芍　防風　生地黃　木通　枳殼

川芎　烏藥各一錢　槐花末二錢　牛膝五錢

右水煎服

敗毒流氣飲

治小腸流注

紫蘇　桔梗　枳殼　甘草　香附　防風

川芎　羌活　獨活　白芷　白芍　檳榔

茴香　澤瀉　延胡索

右㕮咀薑三片棗一枚水煎空心服

清心流氣飲

治前證

白朮　茯苓　猪苓　澤瀉　麥冬　青皮

防風　柴胡　羌活　赤芍　香附　生地黃

川芎　紫蘇　甘草

右㕮咀薑三片棗一枚水煎服

小便不利加車前子滑石木通

乳香散 儒門事親

治下疳

乳香　沒藥　輕粉　黃丹　龍骨　烏鰂骨

黃連　黃芩　銅綠各等分　麝香少許

右爲細末先以溫漿水洗過摻疳瘡上

疳蝕散

治同上

蝦蟆　木香　硫黃　鐵精等分

右五月五日爲末入麝香少許摻敷患處

青木香丸 醫學入門

治寒疝及膀胱疝氣腫氣

破故紙　蓽澄茄　檳榔各二兩　青木香一兩

黑丑頭末三兩

右爲末水丸梧子大空心鹽湯下五十丸

又方

青木香丸二百粒　螫蝥七箇

右同炒令微香以磁器盎之候冷去蝥每五十丸

茴香酒吞下蓋疝屬肝故借蝥以治風

當歸四逆湯 醫學綱目

治寒疝臍下冷痛

當歸一錢二分　附子　肉桂　茴香各一錢

白芍藥　柴胡各九分　延胡索　川楝子

茯苓各七分　澤瀉五分

右剉作一貼水煎空心服

羊肉湯 金匱要略

治寒疝臍腹脹痛手不敢近

羊肉一斤　生薑五兩　當歸三兩

右水八升煑取三升每服七合日三服

葱白散 三因方

治寒冷氣入膀胱作痛

川芎　當歸　枳殼　厚朴　蓬朮　三稜

肉桂　乾薑　人參　神麴　麥芽　青皮

茴香　木香　熟地黃　白芍藥　赤茯苓

川楝肉各五分

右剉作一貼葱白二莖鹽一匙煎服

四神丸 丹溪心法

治冷疝脹痛

吳茱萸一半酒浸一半酢浸焙乾　蓽澄茄

青木香各五錢　大香附一兩

右爲末糊丸梧子大鹽湯下七八十丸

祕傳茱萸內消丸 直指方

治疝氣及陰癀偏大或生瘡出黃水

吳茱萸半酒半酢浸一宿焙乾　山茱萸　肉桂

馬藺花酢浸焙　木香　黑丑頭末　茴香鹽炒

延胡索炒　川楝肉　青皮　陳皮並去白

海藻洗去鹹焙　桃仁炒　白蒺藜炒各五錢

右爲末酒糊丸梧子大鹽湯或溫酒下五七十丸

牡礬丹 醫學入門下同

治陰囊生瘡出水其痒甚苦搔之無足後必痛

牡蠣粉　黃丹各二兩　枯白礬四兩

右爲末遇夜用手捏藥於痒處擦之連擦三四次自然平復

加減柴苓湯

治諸疝因濕熱鞕痛出水

柴胡　澤瀉各一錢　半夏　赤茯苓　荔枝核　白术　豬苓　山楂　梔子各七分

右剉作一貼水煎服無荔核則代以橘核

神聖代鍼散（醫學正傳）

治血積疝痛及諸疝刺痛服之神效

乳香　沒藥並去油研　當歸　白芷　川芎　芫青製各一錢

右爲末每服一字甚者五分先點好茶一盞次摻藥末在茶上不得吹攪立地細細呷之

蕩疝丸（古今醫鑑）

治氣疝

蓬术　木香各四錢　黑丑頭末　破故紙炒　茴香炒　川楝子炒各一兩　青皮　陳皮各三錢

右爲末酒糊和丸梧子大空心酒下五七十丸

氣疝飲（醫學入門）

治氣疝

黃連以吳茱萸煎水浸炒二錢　甘草三分　人參　白术各一錢　白芍藥　陳皮各七分

右剉作一貼薑三片水煎服

三茱丸（丹溪心法）

治氣疝腫痛

山茱萸　吳茱萸　食茱萸各二兩　川楝一兩

破故紙炒一兩七錢　蟹螯十四箇同炒赤去螯　黑丑頭末炒一兩　青鹽　青皮　茴香炒各三錢

右爲末酢麪糊和丸梧子大先嚼桃仁十五粒以溫酒或鹽湯下三五十丸

聚香飲子（醫學入門）

治七情所傷遂成疝氣

乳香另研　沉香　白檀香　木香　藿香葉　丁香各八分　延胡索　薑黃　烏藥　桔梗　桂心　甘草各四分

右剉作一貼薑三片棗二枚水煎服

二香丸（丹溪心法）

治狐疝上下出入作痛或疝痛作則腹內塊痛止疝痛止則腹內塊痛復作

木香　香附子各三兩　山楂肉二兩　三稜　蓬术並醋煮　神麯　薑黃　南星各一兩　黃連與吳茱萸同炒　蘿蔔子　桃仁　梔子仁　橘核炒各五錢

右爲末薑汁浸蒸餅丸梧子大白湯下五七十丸

天台烏藥散（東垣十書）

治小腸氣

川楝子十箇以巴豆十四粒同麩炒黑色去豆麩　烏藥　木香　茴香炒　良薑　青皮各五錢　檳榔三錢

右爲細末每一錢溫酒調下痛甚炒薑熱酒下

救命通心散（醫學綱目）

治小腸氣痛

川烏一兩以青鹽一錢酒一盞浸一宿去皮尖焙　川楝子肉一兩以巴豆肉二十一粒同炒黑去豆　茴香五錢　右燕一對火煅醋淬　土狗五枚　芥子一錢六分

右爲末每三錢入羊石子內濕紙裹煨熟夜半時好酒半斤入鹽細嚼石子以酒嗽下不得作聲小便大利其病即去

去鈴丸（醫學入門）

大治小腸疝氣

茴香一斤以生薑一斤取自然汁浸一宿約薑汁盡入茴香然後入青鹽二兩同炒赤取出焙燥

右爲末酒糊丸梧子大每三五十丸溫酒米飲任下此藥全實脾胃且有鹽能引入下部有薑汁專一發散而無疏導之害服之累效

加味通心飲（醫方）

治小腸疝氣熱痛小便不通

瞿麥　木通　梔子　黃芩　連翹　枳殼　川楝子　甘草各一錢

右剉作一貼燈心三十莖車前草五葉同煎服

獨痛丸（直指方）

治小腸膀胱氣痛

延胡索一兩　川楝子肉　茴香炒各五錢　白丑頭末炒　當歸　良薑　青皮　木香　烏藥各二錢半　全蠍焙七箇

右爲末薑汁浸蒸餅和丸梧子大燒綿灰調酒送下三五十九

消疝丸（集略）

治小腸疝氣

蒼术一斤泔浸切片　川椒微炒　白茯苓

茴香炒各四兩　葱白一斤切鹽一兩同炒黃去葱右爲末酒糊和丸梧子大空心溫酒下五七十九　立效散（資生方）

治小腸氣痛

全蝎七箇　縮砂三七枚　茴香一錢

右爲末分三貼熱酒調下空心即效　茱萸內消丸（醫學入門）

治膀胱腎虛結成寒疝偏墜引痛及小腸奔豚疼痒等證

山茱萸　吳茱萸　川楝子　馬蘭花　茴香　青皮　陳皮　山藥　肉桂各二兩　木香一兩

右爲末酒糊和丸梧子大酒下五十九　楊氏麝香丸（通指方）

能尋諸處痛凡膀胱氣脅下痛最難治此藥主之

木香　胡椒各一兩　全蝎炒　巴豆各四錢　麝香一錢

右爲末蒸餅和丸麻子大硃砂爲衣熟水下五十九　金鈴散（通指方）

治膀胱小腸氣腫痛

大川楝肉三十枚切片以巴豆肉三十粒作片同炒焦去巴豆　茴香炒與川楝肉等分　木香一錢半

右爲末每二錢水酒各半煎葱白湯調下空心　三疝湯（焦氏咸）

治膀胱氣腫痛

車前子二錢四分　茴香一錢六分　沙參八分

葱白一錢二分　右剉作一貼水煎服　橘核散（丹溪心法）

治四種癪疝久者用橘核丸新者用橘核散

橘核一錢半　桃仁十五枚　梔子仁一錢

川烏炮　吳茱萸各五分

右各炒爲麤末作一貼水煎服入門曰按橘核單止痛烏頭散寒鬱山梔除濕熱又引烏頭速下不令胃中停留用之甚捷　三白散（袖珍方）

治膀胱氣蘊熱陰囊腫脹大小便不通

白丑頭末一兩　桑白皮　白术炒　木通

陳皮各二錢半

右爲末每服二錢薑湯或葱白湯調下　四味茴香散（醫學入門）

治囊草抽痛不可忍俗名小腸氣

烏藥酒浸一宿焙　良薑　茴香　青皮各一兩

右爲末每二錢發時熱酒調下　金鈴子九（濟生）

治疝氣偏墜痛不可忍

川楝子肉五兩剉作五分　一用螫螯十箇同炒去螫螯　二用茴香三錢鹽半錢同炒去鹽揀茴香

三用黑丑三錢同炒去黑丑　四用破故紙三錢同炒留故紙　五用蘿蔔子一錢同炒去蘿蔔子

右爲末酒糊和丸梧子大溫酒下三五十九　茱萸內消丸（得效方）

治陰癪偏大腎囊腫脹或生瘡瘍時出黃水

川楝肉一兩半　大腹皮　五味子　延胡索

海藻各一兩二錢半　木香七錢　桔梗　青皮

山茱萸各一兩　川烏炮　吳茱萸　食茱萸

茴香　桂心　桃仁各五錢

右爲末酒糊和丸梧子大溫酒下三五十九　馬蘭花丸（醫學正傳）

治癪疝偏墜及婦人陰癪小兒偏墜無有不效

橘核丸　加馬蘭花一兩　檳榔五錢

右服法同橘核丸　茴香安腎湯（古今醫鑑下附）

治左邊偏墜丸如雞鴨子大

人參　白术　白茯苓　茴香　破故紙　檳榔

烏藥　香附童便製　縮砂　荔枝核各八分

黃蘗　澤瀉各六分　木香　延胡索各四分

升麻　甘草各二分

右剉作一貼煎服　加減香苓散

治偏墜氣初起壯熱憎寒乃發表分利藥也一服愈

枳殼　陳皮　蒼术　麻黃　猪苓　香附子

澤瀉　木通　滑石　三稜　蓬术　車前子

川楝子　延胡索　甘草各七分

右剉作一貼入生薑三片葱白二莖水煎服　川楝散（通指方）

治木腎外腎脹大麻木痛硬并奔豚疝氣偏墜

川楝子四十九箇先切七箇取肉以茴香二錢半同炒併留　又切七箇以破故紙二錢半同炒併留　又切七箇以黑丑二錢半同炒併留　又切七箇以

鹽一錢同炒併留　又切七箇以蟹螯十四箇同炒去螯　又切七箇以巴豆肉十四箇同炒去巴豆　又切七箇以蘿蔔子二錢半同炒去蘿蔔子乃入下藥　茴香炒　木香各五錢　蓽桂二錢半

右爲末酒麪糊和丸梧子大空心鹽酒下三五十丸瘀血木腎以此方加延胡索五錢略炒劑之以沒藥末和溫酒吞下

九仙靈應散 萬病回春

治男子陰濕陽痿每逢不舉

附子炮　蛇牀子　紫梢花　石菖蒲　海螵蛸　遠志　丁香　木鼈子各二錢　片腦一錢半

右爲麤末每五錢水三椀煎至一椀半溫洗濕處并陰囊日二次留水再溫洗多洗尤好

加減內固丸 醫學入門

治命門火衰腎寒陰痿元陽虛憊

巴戟　肉蓯蓉　山茱萸　菟絲子各三兩　破故紙二兩半　釵石斛　胡盧巴各二兩　茴香一兩　附子五錢

右爲末蜜丸梧子大溫酒或鹽湯下五七十丸

十補丸 丹溪心法

治寒疝陰冷及小腸膀胱奔豚等證

附子　防風各一兩剉豆大　鹽四兩　黑豆一合　四味同炒附子裂去諸藥只用附子　胡盧巴　川楝肉　巴戟　肉桂　延胡索　破故紙炒　木香　蓽澄茄　茴香炒各一兩

右爲末糯米粉酒打糊和丸梧子大硃砂爲衣酒下五七十丸

吳茱萸湯 醫學正傳

治厥疝上逆陰冷囊寒

川烏　細莘各七分半　吳茱萸五分　良薑　當歸　乾薑　肉桂各二分半

右剉作一貼水煎服

清魂湯 東垣十書

治外腎冷前陰痿陰囊濕痒

柴胡　黃蘗酒炒　甘草生各一錢　升麻　澤瀉各七分半　當歸梢　羌活　麻黃根　草龍膽　防己　赤茯苓各五分　紅花一分　五味子九粒

右剉作一貼水煎服

回春散 古今醫鑑下同

治陰冷如神

歌曰一錢白礬八分丹 黃丹也 二分胡椒細細研焰硝一分共四味好酢調和手內攤男左女右合陰處渾身是汗濕衣衫此方用者如神效不義之人不可傳

助陽散

治急陰冷

乾薑　牡蠣各一兩

右爲末以燒酒調稠搽手上用雙手揉外腎婦人揉兩乳

陰瘡膏

治男女陰瘡

米粉一酒杯許　芍藥　黃芩　牡蠣　附子　白芷各七錢半

右六味爲㕮咀以不入水猪膏一斤微火上煎三上三下候白芷黃膏成絞滓去內白粉和取敷瘡上

活血驅風散 直指方下同

治腎臟風囊下濕癢脚生瘡癬

白蒺藜炒　當歸　川芎　白芷　細莘　桃仁　半夏　槐潤　白芍　五靈脂　甘草生各六分　蒼朮　杜仲　薏苡仁　桂皮　天麻　橘紅　檳榔　厚朴　枳殼各二分

右剉作一貼薑五片棗二枚水煎入乳香末少許空心服之乳香以佐心氣使心腎相交也

蒺藜散

治癀風上攻耳鳴目眩下注陰濕瘡痒

草烏水浸三日夜逐日換水取出去皮曬乾　白蒺藜炒各五錢　白芷　白附子生　蒼朮炒　荊芥穗各二錢半

右爲末米糊和丸梧子大鹽酒下三五十丸

四生散 局方

治腎臟風脚下生瘡癬或兩耳鳴痒

白蒺藜　黃芪　獨活　白附子各等分

右爲末每一錢薄荷酒調下或以猪腰批開入藥末二錢合定裹煨香熟空心細嚼以鹽酒送下即瘥

乳香龍骨散 東垣十書

治外腎濕痒淫爛

龍骨　石膏生　五倍子各二錢半　白芨　乳香　黃丹各一錢二分半　麝香少許

右爲末先以苦參大腹皮紫蘇葉煎湯溫洗後摻

戴
烏龍丸本事方
一名烏頭丸治腎臟風下注生瘡癬
川烏　草烏各一兩以黑豆半升煮透軟去皮臍切
曬乾　大白附子　天麻　地龍各五錢
右爲末酒糊和丸梧子大空心鹽湯吞下三五十丸
椒粉散東垣十書
治陰囊濕痒
麻黃根二錢　黑狗脊即貫衆　蛇牀子各一錢
川椒　當歸梢　猪苓各六分　螢蟲四枚
輕粉　紅花各少許
右爲末乾摻避風冷
茴香楝實丸丹溪心法
治男子七疝婦人帶下瘕聚痛不可忍皆任脈所主治法同焉
川楝子炒　茴香　山茱萸　吳茱萸　食茱萸
青皮　陳皮　馬蘭花　芫花各一兩
右爲末酢糊和丸梧子大溫酒下五十丸
木香金鈴丸古今醫鑑
治諸般疝氣及外腎腫脹痛一服立應
乳香　沒藥　木香　附子炮　茴香鹽炒
川楝肉　延胡索　全蠍炒　人參各等分
右爲末酒糊和丸梧子大空心黃酒下百丸
丁香楝實丸醫學綱目
治男子七疝女子瘕聚帶下
當歸　附子炮　川楝肉　茴香各一兩並剉好酒三升煮酒盡爲度焙作細末每末一兩　入丁香木香各二錢　全蠍十三箇　延胡索一兩
右並爲末與前藥拌勻酒糊和丸梧子大空心酒下百丸凡疝氣帶下皆屬於風全蠍治風之聖藥川楝茴香皆入小腸經當歸延胡索和血止痛疝氣帶下皆積寒邪於小腸之間故以附子佐之丁香木香爲引導也有人患疝痛三年服此三劑良愈
四炒川楝丸醫學入門下同
治一切疝氣腫痛縮小久服斷根
川楝肉一斤作四分一分用麩一合螢蟲四十九枚同炒　一分用麩一合巴戟一兩同炒　一分用麩一合巴豆四十九枚同炒　一分用鹽一兩茴香一合同炒
並以麩黃色爲度揀去同炒藥只取川楝肉再加木香破故紙炒各一兩爲末酒糊和丸梧子大每五十丸鹽湯下日三服
五炒川楝丸
治諸疝
川楝肉五兩將一兩螢蟲三箇同炒　一兩茴香三錢五分同炒　一兩黑丑三錢同炒　一兩破故紙三錢同炒　一兩蘿蔔子一錢同炒
揀去同炒藥只留茴香破故紙川楝肉爲末酒糊和丸梧子大溫酒下五十丸
烏附通氣湯
治新久疝病四氣七情疝皆效
烏藥　香附子　當歸　白芍藥　山楂肉　橘皮各一錢　赤茯苓　澤瀉各五分　猪苓木香　甘草各三分　白朮七分
右剉作一貼水煎空心服
十味蒼朔散
通治濕熱疝痛
蒼朮　黃蘗　香附子各一錢　青皮　延胡索　益智仁　桃仁各七分　茴香炒　附子炮　甘草各五分
右剉作一貼空心水煎服
神消散古今醫鑑
治諸般疝氣外腎脹痛
益智仁炒七錢　山梔仁鹽水炒黑　橘核炒　茴香鹽水炒各一兩　荔枝核八錢　檳榔五錢　青皮油炒三錢
右爲末每二錢燒酒調空心服不飲酒鹽湯服
浴毒湯
治小腸風陰瘡痒痛
木通　藁本　枳殼　貫衆　荊芥　甘松　薄荷　白芷
右剉碎用藥二兩水五升入芒硝半兩煎至三升去滓熱洗浴瘡
清心蓮子飲
治懸癰勢退惟小便赤澀
黃芩五錢　黃芪蜜炙　石蓮肉去心　人參　赤茯苓各七錢半　車前子炒　麥門冬去心　甘草炙　地骨皮　製甘草
每服一兩用水二鍾煎至八分食前服如發熱加

柴胡薄荷
加味托裏散
治懸癰不消不潰
人參　黃芪鹽水拌炒　當歸酒拌　麥門冬
川芎　知母酒拌炒　黃蘗酒拌炒　芍藥炒
柴胡　金銀花　製甘草各一錢
右作一劑用水二鍾煎八分食前服
加味十全大補湯
治懸癰潰而不斂或發熱飲食少思
人參　黃芪鹽水拌炒　白朮炒　茯苓　川芎
熟地黃酒蒸　當歸酒拌　白芍藥炒各一錢
肉桂　麥門冬　甘草炒　五味子搗炒各五分
右作一劑用水二鍾煎一鍾食前服
葶藶加青皮
熱加黃芩柴胡
日晡熱加柴胡地骨皮
小便赤加酒製知母黃檗
小便澀加車前子山梔子俱炒
腎臟風方
凡指縫白者只一二服效
黃芪一兩　木通　甘草　黑牽牛各半兩
右四味細剉用盤蚯七枚去翅同藥炒焦黑去蚯
蚓餘爲末蒸餅糊爲丸如桐子大空心鹽湯下三
十丸
全蠍散
治腎臟風發瘡痒
全蠍三枚焙　明礬黃二錢研　生硫丹一錢
檳榔一大箇破開用好黃丹一錢合內濕紙裹煨
麝香少許研　輕粉半錢
右爲細末研勻磁盒收每用少許麻油調抹兩掌
先以鼻嗅男以兩掌揉外腎女以兩掌揉兩乳各
睡至醒次日依前再用藥便效
牡蠣散
治陰囊兩旁生瘡或陰濕出水其痒甚苦夜則孤
之無足後必自痛或兩腋汗腳板心汗濕無可奈
何此藥主之予親得此證受苦數十年得此方隨
用一二日如法擦之二十餘年不發實爲神效
牡蠣　黃丹炒各二兩　枯白礬四兩
右爲細末遇夜睡時用手捏藥於陰痒處痛擦之
不一時又搽之三四次後頓減次夜再搽雖大減
又搽後自然平復如腋汗亦有頓搽方如卽汗先
搽後裝藥於靴或鞋底上腳板上塗藥纏腳裹之
亦可

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百二十三卷目錄
醫部彙考二百三
前陰門四

方二人參酒 豬蹄湯 愈白膏 正陽散 立效散 活腎丸 尊命丹 壺盧巴丸 一捏金散 蜜少許 沐浴方 五精丸 上丹 鎖精散 納補丸 天丸 小沐浴方 長春散 八于抑湮水丸 下疳藥方 大萬全丸 教痂 正散 洗毒湯 金銀花散 洗舟藥湯 丹溪方 七寶楓椰散 玉粉散 救痘散 甘石散 博金散 勝金散 雙解散 益腎丸 加減龍膽瀉肝湯 導赤散 補中益氣湯 玉鍾散 補腎腦脫 又方 又方 又方 又方 三物蒲黃散 治毒五聖湯 消毒飲 止痛妙絕仙方 雞皮鳥後元通氣散 苦楝散 追毒散 立消散 敷藥方 又方 效靈 仙散 胃苓散 金白散 痔瘡方 又方 又方 又方 丁香柿氣丸 柏葉湯 川楝子丸 沉香柱附丸 烏頭桂枝湯 烏頭煎 壺盧巴丸 薏苡湯 丹溪方 又方 倉卒激 木香導氣丸 補腎湯 獻金丸 腰子散 奪命丹 救命散 五苓加川楝散 硝矾丸 茯苓湯 惡白散 茵蔯蒿湯 香散 木香散 檳木煎散 海蛤丸 第一料藥 第二料藥 第三料藥 貫衆丸 地黃膏子丸 安息香丸 金牛丸 椒柏丸 橘核丸 昆布丸 雄黃洗方 香附散 海澤丸

前陰門四

方二

人參酒 千金方下同

治交接過度或病未平復交接傷氣筋絕舌卷唇青引卵縮脈脈疼急腹中絞痛欲絕不能飲食

人參　防風　白茯苓　細辛　秦椒　黃芪　當歸　牛膝　桔梗各一兩半　丹參　乾地黃　薯蕷　鍾乳石　礬石　山萸　萯蔚各二兩　白朮　麻黃各二兩五錢　大棗三十枚擘開　五加皮一升　生薑切炒乾　烏麻碎各二升

右二十二味咬咀鍾乳別以小袋子盛清酒二斗半浸五宿溫服三合日再不知隨意增進一本無烏麻用杜仲一兩半

豬蹄湯

治服石發熱因勞損熱盛當風露臥莖腫

豬蹄一隻　蒴藋三升　葵菜子研二升　葶藶子　五合　黃蘗五兩

右五味咬咀以水一斗煮取三升冷浴陰莖日三

葱白膏

治證同上

葱白　松菜子　葶藶子　蒴藋根　葵菜子　丹參各半升　豬膏五升

右七味咬咀煎如煎膏法去滓用之

正陽散

治陰縮囊縮大小便俱通地道不塞不渴不飲邪不在裏宜溫之灸之外相接以復陽氣

附子炮去皮臍　皂角酥炙去皮弦各一兩　乾薑炒　甘草炙各二錢半　麝香一錢研極細

右爲末每服二錢水一盞煎五分不拘時和滓溫服

立效散

治疝因食積作痛

山楂醋炒一錢五分　青皮醋炒一錢二分　小茴香鹽水炒　枳實麩炒　蒼术米泔浸炒　香附　吳茱萸　山梔炒黑　川楝肉各一錢

右咬咀水二鍾薑三片煎八分食前服

活腎丸 醫學入門

治木腎不痛

昆布　吳茱萸各三錢　蒼术鹽水炒一兩　黃蘗酒洗　枳實　滑石各七錢　南星炮半夏製　山楂肉　神麴炒　白芷各五錢

右爲末酒糊和丸梧子大鹽湯下七十九一方無枳實有枸杞子

尊命丹 局方

治奔豚疝氣上沖小腹引痛神效

吳茱萸一斤分四處以四兩酒浸　四兩醋浸　四兩白湯浸　四兩童便浸並焙乾　澤瀉二兩

右爲末酒麪糊和丸梧子大空心鹽湯下五七十丸

壺盧巴丸 直指方

治奔豚疝氣上沖痛不可忍

茴香炒三兩　白丑頭末二兩　川烏炮　巴戟　吳茱萸各一兩半　川楝子　壺盧巴各一兩

右爲末酒糊和丸梧子大空心酒下二三十丸

一捏金散 醫學正傳

治奔豚疝氣上沖及小腸氣腎腹大痛

延胡索　川楝肉　全蠍炒　茴香炒

右爲末每二錢熱酒調下神驗

還少丹 集略

治下部脈微細陰痿不起

熟地二兩　枸杞子　山藥　牛膝各一兩半

山茱萸　巴戟　白茯苓　五味子　遠志
肉蓯蓉　楮實子　杜仲　小茴香各一兩
石菖蒲五錢
右爲末蜜和棗肉爲丸梧子大空心溫酒或鹽湯下三五十丸節齋曰按亦有鬱火盛而致痿者非還少丹所能起常服黃蘗知母清火堅腎之藥

五精丸（丹溪心法）

治腎虛陰痿

秋石　鹿角霜　茯苓　陽起石　山藥各等分
右爲末酒糊和丸梧子大每服五十丸常近火氣使乾燥服之無鬱腦之患

上丹（局方）

治勞傷虛損男子絕陽房事不興

五味子八兩　蛇牀子　菟絲子　杜仲　防風
百部根　白茯苓　巴戟　肉蓯蓉　枸杞子
山藥　遠志　柏子仁各二兩
右爲末蜜丸梧子大空心溫酒鹽湯下五七十九

臘腊補天丸（醫學入門）

治虛損陰痿

胡桃肉三兩　白朮二兩半　白芍藥　熟地黃
黃芪　杜仲炒去絲　牛膝　破故紙　川楝肉
遠志各二兩　臘腊臍　人參　白茯苓　當歸
枸杞子　川芎　茴香各一兩半　木香　茯神
甘草蜜炙各一兩　沉香五錢
右爲末用酒製臘腊臍煮麵糊和丸如梧子大空心溫酒或鹽湯下五七十九

小浴方

治虛勞陰濕痒生疳

川椒　苦參　蛇牀子各一兩半　白礬　白芷
香附子　狗脊　細辛各一兩　桂心三分
右咬咀每用藥一兩以水三升煎至二升去滓傾入盆子內但乘熱氣坐盆子上熏之良久遍身汗出便洗患處甚者不過三兩度

沐浴長春散

治男子下元陰濕久冷陰囊左右夜痒抓之則喜住之則痛成瘡流水爲害甚苦此藥見效及治婦人下部陰濕胎元久冷

牡蠣　蛇牀子　破故紙　紫梢花　官桂
乾荷葉各等分
右咬咀每用一兩半水一小鍋入葱白數莖煎至八分去滓先熏後洗却用後藥

枯礬一兩　黃丹　蛤粉各半兩
右件共研爲細末熏洗了後以手捏藥末揉濕痒處

銅綠散

治男婦陰部濕瘙瘡

銅綠少許　白礬一錢　乳香半錢　輕粉一字
五倍子細研半兩
右爲細末洗淨摻之

子和泄水丸

一名大智丸治下疳瘡

大戟　芫花　海帶洗　海藻洗　椰李仁
甘遂　續隨子各半兩　樟柳根一兩
右爲細末水煮棗肉爲丸如小豆大每服五七十丸熟水下按此藥太峻用者愼之

下疳瘡方

先用張子和泄水丸去根後用此藥乾上

黃連　滑石各半兩　定粉三錢　輕粉少許
乳香一錢　蜜陀僧二錢
右細末乾上或加乾胭脂或加木香檳榔

大蘆薈丸

一名九味蘆薈丸治肝火炎盛下疳潰爛或作痛欵腫或治小兒疳膨食積口鼻生瘡牙齦蝕爛等證并蟲蝕肛門痒痛

胡黃連　蘆薈　黃連　木香　白蕪荑　青皮
白雷丸　鶴蝨草各一兩　麝香一錢
右爲末蒸餅糊丸桐子大每服二錢空心米飲下

八正散

治下疳使毒小便淋漓脈證俱實者

大黃　車前子　瞿麥穗　萹蓄　山梔子仁
木通各一錢　滑石二兩　甘草五分
右水煎服

洗毒湯

治陰蝕瘡

苦參　防風　露蜂房　甘草炙各等分
右咬咀水煎濃汁洗瘡

金銀花散

治下疳瘡

金銀花　荊芥　矾硝　蛇牀子　甘松　白芷
檳榔各一錢
右咬咀每用五錢水五椀加葱白三根同煎數沸

盆盛水先熏後洗

洗疳藥

黃連　黃蘗　當歸　白芷　獨活　防風

矾硝　荊芥各等分

右入錢五十文烏梅五箇鹽一匙入水同煎溫洗日五七次敷下項藥

敷疳藥

木香　檳榔　黃連　銅青　輕粉　枯礬

麝香　海螵蛸各等分

右爲極細末洗後至夜敷上

丹溪方

治下疳瘡

蛤粉　臘茶　苦參　青黛　密陀僧

右用河水洗瘡淨臘猪脂調敷并治臁瘡

追膿錠子 海藏

下疳有膿內潰不出此藥追之

雄黃二錢　巴豆一錢半　輕粉一字

右爲細末敷之

七寶檳榔散

治下元玉莖上或陰頭上有疳瘡漸至蝕透久不愈者

檳榔　雄黃　輕粉　密陀僧　黃連　黃蘗

矾硝

右爲細末和勻先以葱白漿水洗淨軟帛挹乾如瘡濕乾摻如乾小磨麻油調塗

玉粉散

治下陰瘡疼不止

滑石　密陀僧　寒水石煅各半兩　膩粉

麝香各少許

右爲細末油調敷或乾貼患處

截疳散

治年深疳瘻瘡大效

白芨　白蘞　黃丹　密陀僧各一兩　冰片

麝香各半錢　黃連半兩　輕粉一錢

右爲細末和勻每用或摻或紙瘡中以膏藥貼之

甘石散

治下部疳瘡

爐甘石　密陀僧各一錢半　輕粉一分　橡斗子

燒灰存性三錢　龍骨半錢　麝香少許

右爲細末先用荊芥杜仲川椒煎湯放溫洗罷次用藥些少乾貼

博金散

治下疳瘡臭爛腫痛

白礬　密陀僧各五錢同爲末相和入於沙鍋內火炮汁盡　白堊二錢　乳香五分　麝香一字

黃丹　輕粉各一錢

右爲細末先須另用槐枝葱白鹽甘草熬湯淋溻洗一二時挹乾摻上項藥每用藥先須洗溻然後摻藥甚者三五次瘥

勝金散

治下疳潰爛或疼痛

黃連　黃蘗　輕粉　銀硃　孩兒茶各五分

冰片一分

右爲細末香油調搽內服加味瀉肝湯

雙解散

治便癰內蘊熱毒外挾寒邪或交感強固精氣致精血交錯腫結疼痛大小便祕者宜用此藥通解更隨證調治

粹桂　大黃酒拌炒　白芍藥　牽牛炒搗

桃仁去皮尖　澤瀉　甘草炒　乾薑炮各五分

右作一劑水二鍾煎八分空心服

滋腎丸

治下焦陰虛小便澀滯或脚膝無力陰汗陰痿或足熱不能履地不渴而小便閉

黃蘗酒洗焙　知母酒洗焙各一兩　肉桂二錢

右爲末水丸如梧子大每服百丸加至二百丸白滾湯送下

加減龍膽瀉肝湯

治肝經濕熱玉莖患瘡或便毒懸癰腫痛小便赤澀或潰爛不愈又治陰囊腫痛或潰爛作痛小便澀滯或睪丸懸掛

龍膽草酒拌炒黃　澤瀉各一錢　車前子炒

木通　生地黃酒拌　當歸尾酒拌　山梔炒

黃芩　甘草各五分

右作一劑水二鍾煎八分食前服如熱盛加黃連大便祕加大黃炒

導水丸

治便癰初起腫痛及下疳大小便祕又治楊梅瘡初起濕盛之際宜先用此丸數服

大黃酒拌炒　黃芩炒二錢　黑牽牛末炒

滑石煅各二錢

右爲末糊爲丸梧子大每服五十丸臨臥溫湯下
玉燭散
治便癰初起腫痛發熱大小便祕用此以散之
川芎　當歸酒拌　芍藥　生地黃酒拌　芒硝
大黃煅各二錢　甘草炙五分
右作一劑水二鍾煎八分食前服
托裏當歸湯
治潰瘍氣血俱虛發熱及瘭癰流注乳癰不問腫潰但瘡瘍氣血虛而發熱者皆宜服之久服能收斂瘡口
當歸酒拌　黃芪鹽水拌炒　人參　川芎
熟地黃酒拌蒸　白芍藥酒炒各一錢　柴胡
甘草炙各五分
右作一劑水二鍾煎八分食遠服
補中益氣湯
治勞役患便癰不消
人參　黃芪鹽水拌炒　白朮炒各一錢五分
當歸酒拌　陳皮各一錢　柴胡　升麻各五分
右作一劑薑三片棗二枚水二鍾煎八分食前服
補骨脂散
治不慎房勞患便癰或勞役患此腫痛並治之
補骨脂研炒一兩　牛蒡子研炒　牽牛研炒
大黃酒拌炒各五錢
右爲末每服五錢痛甚者一兩空心熱酒調下
又方
治便毒
劉寄奴　王不留行　大黃　金銀花　木鼈子
右等分酒水煎露一宿五更服
又方
治便毒初起
射干二寸　生薑如指大搗細
右取順流水煎微沸服之以瀉爲度又用牛皮膠酢煮塗患處射干紫花者是紅花者非
又方
治便毒已結成膿者
連翹　大黃各半兩　枳實　厚朴各三錢
甘草節一錢　桃仁泥二十一枚
右分三服薑三片水煎服
又方
治便毒
青皮　白芷　柴胡　赤芍藥　檳榔　砂硝
烏藥　木瓜　大黃　連翹　苦蘘　生地黃
甘草節　黃芩　三稜　蓬朮　犀角　皂角刺
右爲咬咀以水三椀煎至一椀候大饑服以瀉爲度
三物湯
治便癰
牡蠣　大黃　山梔子各等分
右爲末以酒水一大盞煎至七分露一宿空心溫服
狠牙湯仲景
治陰蝕瘡
狠牙三兩
右一味以水四升煮取半升以綿纏筋如繭浸湯遲陰中日四遍
消毒五聖湯
治便毒腫疼神效
五靈脂　白殭蠶　雙金　貝母　大黃各三錢
右酒水各半煎服連服三貼立愈
消毒飲
治便毒初發三四日可消
皂針　金銀花　防風　當歸　大黃　甘草節
苦蘘實各等分
右咬咀酒水各半煎食前溫服仍頻提掣頂中髮立效
止痛妙絕飲
治便毒腫硬不消不潰疼痛無已此方一服立能止痛
人參　大黃各五錢
右用酒水各一鍾煎至一鍾入乳香沒藥各一錢空心食前服
牡蠣散
治血疝卽便毒
酒當歸　甘草節　滑石煅　牡蠣煅各一錢半
大黃三錢　木鼈子五枚杵
右作一劑用水二鍾煎一鍾露一宿五更頓服冬月火溫服已未潰膿血從大便出薛己曰按此方乃鹹寒導滯之劑若久曠房室大小便祕發熱煩痛或交感强固精氣致精血交錯腫結疼痛便祕者宜用若勞倦之人不甚煩腫大小便如常或小便赤色發熱不作膿及潰而不斂宜用十全大補

湯蓋此證多起於勞役不足或房勞過度精氣俱虛之人俗云一石米瘡此言百日後可愈也若大補氣血不旬日而愈何用百日蓋瘡之收斂在乎血氣之盛也嘗治舉人凌待之虛而服尅伐藥幾致危殆予用托裏健脾藥而消秀才王文遠勞苦患之服小柴胡湯而表證散後用托裏藥膿成針之而旬日愈胡判官膿清脈弱以大補之藥而已愈因新婚復發自用連翹消毒湯致瀉痢不止竟致不救可見此證屬不足多矣非補不可大抵便毒屬肝經初起堅硬肝主筋故也五七日後當赤軟膿成若尚堅硬乃元氣虛不能腐化往往人見堅硬只欲內消反服攻散藥以致虛虛之禍前所治者即其驗也

又方

治便毒

山梔　大黃　乳香　沒藥　當歸各半錢

苦蔞仁二錢　代赭石一錢

右作一服水煎

防風通聖散

治瘡瘍便毒若瀉去芒硝大黃能解暑月熱毒或遍身頭面患瘡

芍藥　芒硝　滑石煅　川芎　大黃煨　桔梗

石膏煅　荊芥　麻黃各四分半　白朮　連翹

當歸　薄荷葉　甘草生　防風　山梔子仁

黃芩焙各八分

右作一劑水二鍾煎八分服薛己曰按此方非表裏俱實大小便秘者恐不可用宜審之

蘇方散

治便毒

木鼈肉　當歸尾　芍藥　白芷　甘草　川芎

射干　大黃　沒藥　蘇木　穿山甲煉火煨

忍冬各六分（即金銀花）

右細切作一服酒水各一盞煎至一盞食前服

青皮湯

治便毒

青皮　防風　當歸身　甘草梢生各等分

右㕮咀分作四服水一小椀煎至八分去柤大溫服空心日進三服

復原通氣散

便毒初發用此

南木香　延胡索　天花粉酒浸　船上檳香炒

白牽牛炒　白芷　當歸尾　生甘草各一兩

青木香半兩　穿山甲酒浸炙焦二兩

右爲細末每服二錢食前溫酒調服木香湯亦可

苦蔞散

治便癰等惡瘡

苦蔞一枚　金銀花　牛蒡子炒各三錢　生薑

甘草各半兩

右將藥不犯銅鐵器槌碎用酒一大升煎數沸空心溫服

追毒散

治便毒腫結

穿山甲醋炙焦五錢　木猪腰子醋微炙三錢

右爲末每服二錢食前老酒調下次以醋煮肥皂研膏敷之妙木猪腰子即木猪苓

立消散

消便毒癰腫如神

全蝎炒　核桃去殼肉只用隔膜炒

右等分爲末空心酒調下三錢下午再服三日全愈

敷藥方

治便毒腫痛

雄黃　乳香各二兩　黃蘗一兩

右爲細末用新汲水調敷腫處自消

又方

治便毒

乳香研　沒藥研各半兩　大黃　黃連　黃蘗

半夏　防風　羌活　皂角刺　木鼈子　苦蔞

甘草節　草烏頭　阿膠炒　南星

右爲細末酢調成膏入石器內火熬黑色鵝翎蘸傅之

威靈仙散

治便毒

威靈仙　貝母　知母各一兩

右三味爲末每服三錢空心溫酒調下如不散再服薛己曰按此方通經去膿消毒補虛益氣蓋此證多患於陰虛之人此方乃是一見也亦有炊痛小便數者宜用加減龍膽瀉肝湯大小便秘炊腫作痛宜八正散憎寒發熱荊防敗毒散然後用此方若不作膿或膿不潰宜用大補之劑潰而不斂者更用豆豉餅灸之

胃苓散

治便毒

猪苓　澤瀉　白朮　茯苓　蒼朮　厚朴

陳皮各一錢　甘草炙　肉桂各五分

右作一劑水二鍾薑三片棗二枚煎八分服

金白散 東心仰方

治疳瘡

鉛粉不拘多少銀窠傾過取出去鉛每用六錢

輕粉三錢　冰片三分

共研末搽於患處少許先用茶洗淨然後用藥

疳瘡方

燈心灰二錢　輕粉二錢　冰片一分

共研末搽於患處如水管腫硬用酸棗樹去粗皮

用內白皮煎水浸洗即消以便摻藥

又方

海蛇子燒灰三錢　孩兒茶二錢　輕粉一錢

片腦一分　黃蘗末五分

共研末搽於患處

又方

牆上久爛螺螄殼洗淨泥煆過五錢　輕粉三錢

片腦一分

共研末搽患處

妬精瘡方

孩兒茶　黃丹各二錢　黃連　赤石脂各一錢

硃砂四分　輕粉三分　黃蘗六分　片腦一分

共爲末用生猪油三兩取油去查調末搽於患處

以苦蠶菜葉貼住

川楝子丸

治疝氣一切下部之疾悉皆治之腫痛縮小雖多

年服此藥永去根本

川楝子淨肉一斤分四處四兩用麩一合螫螫四十

九箇同炒麩黃色去麩螫螫不用　四兩用麩一合

巴豆四十九粒同炒麩黃色去麩巴豆不用　四兩

用麩一合巴戟一兩同炒麩黃色去麩巴戟不用

四兩用鹽一兩川茴香一合同炒黃色去鹽茴香不

用　木香不見火　破故紙炒香爲度各一兩

右爲末酒糊丸如梧子大每服五十丸鹽湯下甚

者日進三兩服空心食前

沉香桂附丸 衛生寶鑑

療七疝痛引小腹不可忍腰屈不能伸熱熨稍緩

沉香　附子炮去皮臍　川烏炮去皮臍　官桂

乾薑炮　高良薑炒　吳茱萸熱湯浸去苦

茴香炒各一兩

右研爲末酢煮麪糊爲丸如桐子大每服五十丸

至七八十丸食前米飲下日二忌生冷

丁香疝氣丸 東垣十書下同

治腎疝

當歸　茴香各一兩　延胡索　甘草梢各五錢

羌活七分半　麻黃根節　丁香　川烏　肉桂

防己各二錢半　全蠍三十箇

右爲細末酒糊丸如豌豆大每服五十丸淡鹽湯

或溫酒送下須空心宿食消盡服之

川苦楝散

治疝

川楝子剉細用巴豆十粒打破一處炒黃去巴豆

茴香鹽一匙炒黃去鹽　木香各一兩

右爲細末每服二錢空心食前溫酒調下

木香楝子散 易簡方

治小腸疝氣膀胱偏墜久藥不效者服此神效

川楝子三十箇巴豆二十枚同炒黃赤色去巴豆不

用　萆薢半兩　石菖蒲炒　青木香各一兩炒

荔枝核二十枚炒

右研爲細末每服二錢入麝香少許空心炒茴香

鹽酒調下

烏頭桂枝湯 金匱要略下同

治寒疝

桂枝去皮　芍藥　生薑各三兩　甘草炙二兩

大棗十二枚擘

右用烏頭一味以蜜二斤煎減半去滓以桂枝湯

五合解之得一升後初服二合不知即服三合又

不知復加至五合其知者如醉狀得吐者爲中病

烏頭煎

烏頭大者五枚熬去皮不咬咀

右以水三升煮取一升去滓納蜜二升煎令水氣

盡取二升強人服七合弱人服五合不瘥明日更

服又不可日再服

胡盧巴丸 和劑

治小腸疝氣偏墜陰腫小腹有形如卵上下來去

痛不可忍或絞結繞臍攻刺嘔吐悶亂

胡盧巴炒一斤　茴香鹽炒十二兩　吳茱萸洗炒

十兩　川楝子去核炒一斤二兩　巴戟去心炒

川烏炮去皮臍各六兩
右爲末酒糊丸桐子大每服十五丸至二十丸空心溫酒下小兒五丸茴香湯下一方有黑牽牛

蒺藜湯 衛生寶鑑

治陰疝牽引小腹痛諸厥疝卽陰疝也房慾勞役輒痛不可忍者

蒺藜炒去刺　附子炮去皮臍　山梔仁各等分
右爲末每服三錢水一盞半煎至七分食前溫服

丹溪方

治寒熱疝

橘核　桃仁　梔子　吳茱萸　川烏各等分
右研水煎服

又方

治疝作急痛

蒼朮　香附子俱鹽炒　茴香炒爲佐　延胡索
黃蘗酒炒爲君　青皮去瓤麩炒　益智仁
桃仁爲臣　附子鹽水炒　甘草爲使
右研末作湯服後一痛過更不作痛矣

倉卒散

一名梔附湯治寒疝入腹卒痛及小腸膀胱氣疠刺脾腎氣攻攣急痛不可忍屈伸不能腹中冷重如石白汁出

山梔子四十九箇燒半過　附子一枚炮
右剉散每服二錢水一盞酒半盞煎七分入鹽一捻溫服卽愈

木香導氣丸

治男子小腸氣肚疼一切氣積補下元虛冷

木香　乳香　川楝子去核　八角茴香　丁香
香附　破故紙　胡盧巴　三稜　甘草各一兩
杜仲炒去絲半兩
右爲細末酒糊爲丸梧桐子大每服三十丸加至五十丸用溫酒或鹽湯空心送下日進三服

補腎湯

治寒疝入腹小腸疠痛時復泄瀉胷膈痞塞

沉香木研五分　人參　茯苓　附子炮去皮臍
黃芪　白朮　木瓜各一錢半　羌活　芎藭
紫蘇　甘草炙各一錢
右作一服水二鍾薑三片紅棗一枚煎一鍾食前服嘔吐加半夏一錢生薑七片煎服

敵金丸

治疝氣外腎腫脹極大或生瘡出黃水其痛繞腹寒熱往來

京三稜煨　蓬朮煨　猪苓　白附子　蘿蔔子
赤芍藥　黑牽牛　川楝子　山茵陳　青木香
陳橘皮　五靈脂　海藻酒浸焙　小蘹香
穿山甲灰火煨焦　薑黃各一兩　澤瀉一兩半
海浮石酢浸煅紅酢淬再煅再淬黑色爲度一兩
青皮去白二兩一兩生用一兩剉以蟹螯五十枚去頭足翅同炒黃色去蟹螯不用　南木香半兩
香附子淨二兩一兩生用一兩以巴豆五十粒去殼同炒色焦去巴豆不用　丁香二錢半
右爲細末酒煮麪糊爲丸如梧子大每服二十丸用溫酒下此藥能泄斟酌用之

腰子散

治腎氣作痛

黑牽牛炒熟　白牽牛炒熟等分
右爲細末每用三錢猪腰子一對薄切開縫入川椒五十粒茴香一百粒以牽牛末徧摻於腰子中線紮濕紙數重裹煨香熟取出放地上出火氣燈後空心嚼喫好酒送下少頃就枕天明取下惡物卽愈

腎氣疼痛方

治丈夫腎氣婦人血氣疼痛不可忍面青脣黑幾於不救丈夫則攻擊臟腑腰背拳曲婦人則腹中成塊結爲癥瘕驟然疼痛便至危困經年累月痛無暫停者並宜服之

當歸　白芍各一錢　沒藥　麒麟竭　延胡索
蓬朮　三稜　牽牛酢煮焙乾　木香各半兩
狼毒半兩碎　芫花四兩同狼毒於瓦器內酢炒黃
右先修製芫花狼毒乳鉢內研如泥又將麒麟竭等亦作一處研如飛塵餘藥又作一處爲細末方將芫花狼毒麒麟竭沒藥等末相和勻更研千遍每服一錢半氣痛時葱酒調下和滓喫不可飽食後喫若大腑熱祕出後不通脣皮焦黑口中涎溢喫藥一服效

木香湯

治寒疝攻注胷脅滿痛汗出

木香七分半　檳榔　細辛　赤茯苓　人參
芍藥　當歸切焙　官桂　前胡　青皮各一兩
右剉每服三錢水一盞煎七分去滓服無時

喝起丸

治小腸氣及腰痛

杜仲酥炙去絲　胡盧巴芝麻炒　破故紙炒
小茴香鹽水浸一宿　胡桃肉湯浸去皮研泥
等分各一兩

右爲細末入胡桃肉和勻丸如桐子大每服三十丸或五十丸空心鹽酒或鹽湯下

奪命丹

治遠年近日小腸疝氣偏墜搶痛臍下脹痛以致悶亂及外腎腫硬日漸滋長陰間濕痒抓之成瘡等證

吳茱萸一斤去枝梗淨四兩酒浸　四兩鹽湯浸
四兩酢浸　四兩童便浸　澤瀉二兩酒浸一夜

右爲細末酒糊丸如梧子大每服五十丸食前鹽酒或鹽湯送下

救命散

治小腸疝氣築心疼痛不可忍

肉豆蔻劈裹煨　木香煨各半兩　荊三稜煨
馬蘭花酢炒　金鈴子去核　茴香炒各一兩

右爲細末每服一錢痛時熱酒調服立效

五苓加川楝散

治疝氣卒痛小便澀

猪苓　澤瀉　白茯苓　白朮黃土炒各十八銖
肉桂去粗皮半兩　川楝子一分

澹寮云治疝氣發作痛不可忍眞料五苓散一貼連根葱白一寸燈心七莖煎湯吞下青木香九五十粒卽效又法以青木香九二百粒螫蚵七枚去頭翅爲粗末瓦銚以文武火同炒令藥微香用磁碟蓋之放冷處去螫蚵取丸子分二服空心茴香酒吞下累效

硇砂九本事

治膀胱疝氣

木香　沉香　巴豆各一兩　青皮去白二兩

銅青半兩研　硇砂一錢研

右末香沉香及青皮三味同巴豆慢火炒令紫色去巴豆爲細末入硇砂二味同研勻蒸餅和丸如桐子大每服七丸至十九鹽湯下日二三服空心食前

葵子湯濟生方

治膀胱濕熱腹脹小便不通口乾舌燥

赤茯苓　猪苓　葵子　枳實　瞿麥　車前子
木通　黃芩　滑石　甘草各等分

每服五錢入薑煎空心服

葱白散

治一切冷氣不和及本藏膀胱發氣攻刺疼痛及治婦人產後腹痛或血刺痛及治臟腑宿冷百節倦痛怯弱傷勞滯癖久服盡除但婦人一切疾病宜服

川芎　當歸　枳殼去瓤麩炒　厚朴薑汁製炒
蓬朮醋浸焙　官桂　乾薑炮　川楝子炒
茴香炒　神麴炒　麥蘗炒　乾地黃　三稜煨
人參　茯苓　芍藥　青皮　木香煨各一兩

右爲末每服三錢水一盞葱白二寸煎七分入鹽少許熱服如大便祕澀加大黃煎大便通利加訶子煎食前服

茴香散

治膀胱氣痛

茴香　蓬朮　京三稜　金鈴子肉各一兩
炙甘草半兩

右爲細末每服二錢熱酒調服每發痛甚連日只二三服立定

木香散

治心疝小腹痛悶不已

木香　陳皮　高良薑　乾薑炮　訶子去核
枳實各一錢半　草豆蔻　黑牽牛　川芎各一錢

水二鍾煎至一鍾食前服或爲細末每服二錢白湯調服

廣朮煮散

治心疝心痛肢體虛冷

蓬莪朮煨　檳榔　官桂　附子炮去皮臍
廿草炙各半兩　芎藭　白朮各七錢半

右剉碎每服二錢水一盞煎七分溫服無時

海蛤丸濟古

治癲疝

海蛤煆酢淬七次　當歸　海金沙　膩粉
硇砂各一錢　海藻　粉霜各五分　青黛
地龍去頭尾　水蛭各二十一條炒　滑石
乳香各一錢　硃砂二錢另研

右爲細末鹽煮麪糊爲丸如小豆大硃砂爲衣每服十九燈心湯空心服小便下冷膿惡物乃效却以黃連紫河車板藍根各二錢煎湯漱口以固牙齒或去板藍根加貫衆

荔枝散
治疝氣陰核腫大痛不可忍
荔枝核新者十四枚燒灰存性　八角穞香炒
沉香　木香　青鹽　食鹽各一錢　川楝肉
小穞香各二錢
右爲細末每服三錢空心熱酒調服
三層茴香丸
治腎與膀胱俱虛爲邪氣搏結遂成寒疝伏留不
散臍腹疼痛陰核偏大膚囊壅腫重墜滋長有妨
行步瘙痒不止時出黃水浸成瘡瘍或長怪肉屢
治不差以致腎經閉結陰陽不通外腎腫脹冷硬
如石漸大皆由頻服熱藥內攻或因兜取以致如
此用藥溫導陽氣漸退寒邪補虛消疝暖養腎經
能使復元一應小腸氣寒疝之疾久新不過三料
全愈
第一料藥
船上茴香用鹽半兩同炒焦黃和鹽秤　沙參
川楝子炮去核　木香各一兩
右爲細末水煮米糊爲丸如桐子大每服二十丸
空心用溫酒或鹽湯下日三服小病一料可安纔
盡便可用第二料
第二料藥
前藥加蓽茇一兩　檳榔半兩
右共前藥六味重五兩半爲末糊丸丸數湯使俱
如前若病未愈服第三料
第三料藥
前藥加茯苓四兩　黑附子炮去皮臍半兩或一兩
右通前八味重十兩並依前糊丸湯使丸數加至
三十丸小腸氣發頻及二十年者寒疝氣如栲栳
大者皆可消散神效
宣胞丸
治外腎腫痛
黑牽牛半生半熟取頭末　木通炒　青木香各一
兩以螫螫七枚同炒香用螫螫五枚
右爲細末酒糊爲丸如桐子大每服三十丸溫酒
鹽湯任下
地黃膏子丸 海藏
治男子婦人臍下奔豚氣塊小腹疼痛卵痛即控
睾相似漸成腫陰痛上衝心腹不可忍者
血竭　沉香　木香　廣木炮　延胡索　人參
蛤蚧　當歸　川芎　川楝子去核麩炒　續斷
白朮　全蠍　茴香炒　柴胡　吳茱萸　沒藥
已上分兩不定隨證加減用之共爲細末地黃膏
子丸如桐子大空心溫酒下二十丸日加一丸至
三十丸氣多加青皮血多加肉桂
安息香丸 易簡方
治陰氣下墜痛脹卵核腫大堅硬如石痛不可忍
延胡索炒　海藻洗　昆布洗　青皮去白
茴香炒　川楝子去核　馬蘭花各一兩半
木香半兩不見火　大麯酒浸三宿切片焙乾三錢
半
右爲細末另將硇砂眞阿魏安息香三味各三錢
半用酒一盞醋一盞將上三味淘去砂土再用酒
醋合一盞熬成膏入麝香一錢沒藥二錢半俱各
另研細入前藥一同和丸如菉豆大每服十九至
十五九空心用綿子灰調酒下
念珠丸 本事方
治膀胱疝氣外腎腫痛不可忍
乳香　硇砂飛各三錢　黃蠟一兩
右二味同研勻鎔蠟和丸分作一百八丸以線穿
之露一宿次日用蛤粉爲衣旋用乳香湯下
蜘蛛散
治狐疝
蜘蛛十四枚炒焦　肉桂半錢要入厥陰取肉厚者
右爲散每服一錢蜜丸亦可雷公云凡使蜘蛛勿
用五色者兼大身上有刺毛者井薄小者須用屋
西南有網身小尻大腹內有蒼黃臟者眞也凡用
去頭足了研如膏投藥中此余之法若炒焦用則
全無功矣
又方
治水癩偏大上下不定疼痛不止
牡蠣不拘多少鹽泥固濟炭三斤煅令火盡冷取二
兩　乾薑一兩焙
右爲細末二味和勻冷水調得所塗病處小便大
利卽愈
橘核丸 濟生方
治四種癩病卵核腫脹偏有大小或堅硬如石痛
引臍腹甚則膚囊腫脹成瘡時出黃水或成癰潰
爛
橘核炒　海藻　昆布　海帶各洗　川楝肉炒
桃仁麩炒各一兩　製厚朴　木通　枳實麩炒

延胡索炒　桂心　木香各半兩

右爲細末酒糊丸如梧子大每服七十丸空心鹽酒湯下虛寒甚者加炮川烏一兩堅脹久不消者加硇砂二錢酢煮旋入

昆布丸

治陰疝腫大偏墜

昆布　海藻各洗去鹹炙　蕪荑仁炒　蒺藜子炒去角　檳榔剉各一兩半　枳殼麩炒　火麻仁研各二兩　訶藜勒炒去核　黃芪　木香各七錢五分　陳皮去白炒　桃仁去皮尖炒研　菟絲子酒浸一宿另研各一兩

右爲細末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫酒或鹽湯送下

雄黃洗方

治陰疝腫痛不能忍及陰腫大如斗核痛者

雄黃研　甘草各一兩　白礬研二兩

右爲細末每用藥一兩熱湯五升通手洗腫處良久再煖洗至冷候汗出瘥

香附散

治癩疝脹及小腸氣

香附不拘多少

右爲末每用酒一盞入海藻一錢煎至半盞先撈海藻細嚼用煎酒調香附末二錢服一方以海藻爲末用熱酒調尤妙甚者灌之一方熱酒下荊芥末

海藻丸

治偏墜小腸氣效

螫蝥去足翅　巴豆各二十八箇去殼完全者

海藻　海帶各一兩

右螫蝥巴豆二味同裝生絹袋中用好酢一椀以瓦銚盛四味同煮將乾去螫蝥巴豆不用只將海帶二味細研爲末以淡豆豉一百粒以煮藥餘酢略浸蒸餅爲膏和藥末爲丸如梧子大每服用麝香少許硃砂三錢乳鉢細研至無聲却入麝香研勻爲衣日乾以新瓦瓶收之每初服七粒再服十粒三服十五粒若未愈再進三兩服皆用十五粒仍用鹽炒茴香細嚼酒吞下空心服忌鴨子并鮓醬動氣等物久病三五服效此藥貴新合效速若合下稍久多服爲佳

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百二十四卷目錄

醫部彙考二百四

前陰門五

方三

癩疝方　兩解湯　狼毒丸　益智仁湯
延附湯　又方　回春丸　藿香養胃
湯　大建中湯　木香散　六合散　香穀散
疝痛方　刦痛方　又方　守效丸　又方
便癰方　黑龍湯　漏蘆湯　五香連翹湯
摩風膏　沉香內消丸　抵聖散　疝方
又方　腎氣方　又方　又方　又方
復元通氣散　控引睪丸　代灸塗臍膏
延胡索苦楝湯　大戟丸　四製茱萸丸　三
萸內消丸　八味茴香丸　麝香輕粉散　積
疝丸　又方　將軍散　禹功散　文蛤散
神消散　三香酒　全鹿丸　仙傳斑龍丸
加味虎潛丸　四聖散　大小茴香丸　回陽
丹　壯精固本丸　蛇牀子湯　狼毒膏　銀
杏無憂散　清肝導滯湯　清肝滲濕湯　解
毒木通湯　九龍丹　紅花散瘀湯　黃芪內
托散　滋陰內托散　導水消腎丸　木香補
腎丸　滋陰八物湯　還元保眞湯　滋陰丸
寶飲　左歸丸　右歸丸　七福飲　大營煎
補陰益氣煎　保陰煎　抽薪飲　洗薪飲
大分清飲　滋陰八味丸　六味回陽飲
理陰煎　溫胃飲　五君子煎　鎮陰煎　援
肝煎　壽脾煎　祕元煎　固陰煎　清化飲
贊育丹　荔香散　芍藥蒺藜煎　百草煎
螵蛸散　銀珠煙　完瘡散　銀粉散　珍
珠散　山甲內消散

藝術典第二百二十四卷

醫部彙考二百四

前陰門五

方三

癩疝方 千金方

桃仁　蜘蛛各五十枚　桂心　蒺藜子　澤瀉
地膚子　防風　五味子　橘皮　茯苓　防葵
芍藥各二兩　牡丹皮　細莘　海藻各一兩
狐陰一具

右十六味爲末蜜和丸如梧子大初服十丸稍加至三十丸方角處一丸令頓上兩爪角各令半丸上爪指灸七壯愈

兩解湯 醫學入門

治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精氣交錯腫結疼痛

辣桂　大黃　白芍藥　澤瀉　牽牛　桃仁各一錢　乾薑五分　甘草二分半

右水煎溫服

狼毒丸 濟生方下同

治七疝久而不愈發作無時臍腹堅硬疼痛

狼毒剉炒　芫花酢炒　川烏炮去皮尖各一兩
椒紅炒　乾薑炮　乾漆炒烟盡　鼈甲酢煑
三稜　沒藥各半兩　全蠍去毒九枚

右爲細末酢糊爲丸如梧桐子大每服四十丸空心薑湯溫酒任下

益智仁湯

治疝痛連小腹攣搐叫呼不已診其脈沉緊是腎經有積冷所致

益智仁　乾薑炮　甘草炙　茴香炒各三錢
烏頭炮去皮　生薑各半兩　青皮去白二錢

右㕮咀每服四錢水二盞入鹽少許煎至七分去滓空心食前溫服

延附湯

治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗大腑泄瀉

延胡索炒去皮　附子炮去皮臍各一兩　木香不見火半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至七分去滓溫服不拘時

又方

治偏墜疝氣不拘遠年近日

木香三錢　破故紙一兩　大茴香　川楝二兩
小茴香各五錢　青鹽一錢五分

右爲末每服一錢溫酒調下

回春丸

治小腸疝氣

白朮炒　茯苓　山楂炒　枳實炒　八角茴香
吳茱萸炒　荔枝核　橘核各一兩

右共爲末煉蜜爲丸如梧桐子大薑湯下

藿香養胃湯 醫學入門

治陽明經虛不榮肌肉陰中生瘡不愈

藿香　薏苡仁　神麴　烏藥　砂仁　半夏
白茯苓　白朮炒　人參各五分　蓽澄茄
甘草各三分半

右薑棗煎服

大建中湯 濟生方下同

治蠱病小腹急痛便溺失精溲而出白液

黃芪　遠志去心　當歸　澤瀉各三兩　芍藥
人參　龍骨　甘草炙各二兩

右爲末每服三錢水一盞生薑五片煎至八分去滓溫服不計時候

木香散

治心疝小腹痛悶絕不已者

木香　陳皮各一兩　良薑　乾薑　訶子皮
赤芍藥　枳實麩炒各半兩　草荳蔻　川芎

黑牽牛各三兩
右爲末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服
六合散
一名金鑰匙散治小腸氣結心腹滿胷中結痞走注疼痛
大黃一兩紙裹煨　白牽牛生　黑牽牛微炒
甘遂各半兩　檳榔生三錢　輕粉一錢
右爲細末每服一錢蜜水調下服量虛實加減
香殼散
治小腸氣臍腹攪痛急陰股中痛悶不省人事
舶上茴香鹽炒　枳殼各一兩　沒藥半兩
右爲末每服一錢溫熱酒下不計時候併二三服
疝痛方平治會萃下同
治食積與瘀血成痛者
梔子　桃仁　山楂　枳實　吳茱萸
右爲末生薑汁順流水作湯調服
刼痛方
治疝按之不痛必用桂枝屬虛也
桂枝　山梔炒　烏頭細切炒
右爲末薑汁爲丸每服三十丸
又方
定痛速效
山梔炒　糖毬炒　吳茱萸炒各等分　枳殼十五箇
右或湯或丸服濕勝者加荔枝核炮
守效丸
治癩要藥不疼者

蒼朮　南星　白芷　山楂　川芎　半夏
枳實一本枳核
右爲末神麴作丸
又方
治陽明受濕熱傳入大腸惡寒發熱小腸連毛際結核悶痛不可忍
山梔炒　枳殼炒　桃仁炒　山楂各等分
右研細砂鉢內入生薑汁用水一盞煎令沸熱服之治諸疝發時用海石香附二味爲末以生薑汁湯調服亦能治心痛
便癰方儒門事親
牡蠣　大黃　甘草各五錢　苦蔞一箇
右酒浸露一宿服之以利爲度
黑龍湯醫學入門
治陰囊腫痛溺澀寒熱作渴
龍膽草炒黑　柴胡　木通　甘草節　金銀花
當歸　皂刺　赤芍　防風　黃連吳萸炒各等分
右水煎服一服腫痛止後加川芎茯苓
漏蘆湯東垣十書下同
治一切癰疽井下疳陰瘡
漏蘆　白蘞　黃芩去黑心　麻黃去節　升麻
芍藥　枳實麩炒去瓤　甘草炙　砂硝各一兩
大黃二兩
右除硝外餘㕮咀與硝同和勻每服三錢氣實人五錢水一盞半文武火煎七沸去查空心熱服
五香連翹湯
治前證

麝香一字　沉香　藿香　木香　丁香俱另研
連翹　射干　獨活　升麻　甘草炙　寄生草各一兩　大黃一兩五錢
右七味㕮咀與前五味和勻每服五錢水一盞半煎至一盞去查溫服取利爲度未利再服如前
摩風膏
治前證
白附子　白芍藥　白茯苓　零陵香　白芨
白蘞　白芷　白檀香　藿香　升麻　細莘
黃芪　甘草　杏仁去皮尖各五錢　腦子一分
苦蔞根一兩　大苦蔞去皮二兩　黃蠟六兩
芝麻油一斤
右先藥十四味剉油內浸百日於臘月慢木炭火上銀石器內煎至白芷微黃色離火入苦蔞二味著內煑百沸重綿濾去查再慢火上煉油香下淨黃蠟鎔開爲度傾在磁器內收貯上摻腦子密封旋用摩風膏貼之
沉香內消丸
治陰癩腫痛偏墜或小腸疝氣下元虛冷久不愈者
沉香　木香各半兩　胡盧巴酒浸炒　小茴香炒各二兩
右爲末酒糊丸梧子大每服五七十丸鹽酒下
抵聖散
治前證
白枯礬一兩　烏魚骨三錢　乳香二錢　輕粉
乾臙脂一錢　麝香五分

右爲細末或摻或紙以膏貼之

疝方

治諸疝定痛速效

枳實十五片（一作橘核）　山梔仁炒　山楂肉炒　吳茱萸炒各等分

右爲末酒糊丸服或爲末生薑水煎服或長流水調下一二錢空心如濕勝加荔枝核炮

又方

治癩疝

天南星　山楂　蒼术各二兩　白芷　半夏　枳核　神麯各一兩　海藻　昆布各半兩　元明粉　吳茱萸各二錢

右爲末酒糊丸

腎氣方

治前證

舶上茴香　破故紙　吳茱萸鹽水炒各五錢　胡盧巴七錢半　木香二錢半

右爲末蘿蔔搗汁丸鹽湯下

又方

一人疝痛作腹內塊痛止疝痛止腹內塊痛作

三稜　莪术醋煮　炒麯　薑黃　南星各一兩　山楂二兩　木香　沉香　香附子醋炒各三錢　黃連用吳茱萸炒去茱萸淨五錢　蘿蔔子　桃仁　山梔　枳實炒各半兩

右爲末薑汁浸蒸餅爲丸

又方

治木疝不痛

枸杞子　南星　半夏　黃蘗酒炒　蒼术鹽炒　山楂　白芷　神麯炒　滑石　昆布　吳茱萸

右爲末酒糊丸桐子大空心鹽湯下七十丸

又方

治腎囊濕瘡

吳茱萸　樟腦　蛇牀子各半兩　輕粉十盞　黃蘗　硫黃　檳榔各二錢　白芷　寒水石　白礬各三錢

右爲末先用吳茱萸煎湯洗後用麻油調搽

又方

治疝作痛

蒼术鹽炒　香附鹽炒　黃蘗酒炒　附子鹽炒　延胡索　青皮　益智仁　桃仁　茴香　甘草

右爲末作湯服後一痛過更不再作矣

復元通氣散

治諸氣澁閉耳聾耳痛腹癰便癰瘡疽無頭遍一切氣

青皮　陳皮各四兩　甘草三兩半生半熟　穿山甲炮　苦蘆根各二兩　金銀花一兩

右爲末每服二錢熱酒調下如瘡無頭津液調塗此方活血止痛內消癰腫

搽引睾丸

治小腸病結

芫花醋炒五錢　茴香炒　楝實剉炒　食茱萸　陳皮　馬蘭花醋炒各一兩

右爲末酢糊丸如桐子大每服十丸至二十丸溫酒送下空心食前

代灸塗臍臍

附子　馬蘭子　蛇牀子　木香　肉桂　吳茱萸

右六味爲細末用麪一匙藥一匙生薑汁和煨成膏攤紙上圓三寸許貼臍下關元氣海自曉至晚其火力可代灸百壯臍痛亦可貼之

延胡索苦楝湯（醫學綱目下同）

治膀下冷攝陰冷大寒

肉桂　附子各三分　熟地黃一錢　延胡索　苦楝子各二分　甘草梢炙半錢　黃蘗一錢

右作都作一服水四盞煎至一盞依法食前服

大戟丸

治陰癩腫脹或小腸氣痛

麝香另研　大戟去皮剉炒黃　附子炮去皮臍　檳榔　茴香　訶子煨去核各半兩　川楝五兩　胡盧巴四兩　木香一兩

右爲末獨取川楝以好酒二斤葱白頭七枚長三四寸煮川楝軟去皮核取肉和上件藥杵丸如桐子大空心溫酒下十丸潮發疼痛炒薑熱酒下十五丸

四製茱萸丸（奇效良方下同）

治遠年近日疝氣疼痛偏墜腫硬陰間濕痒抓成瘡

吳茱萸一斤用酒醋白湯童便各浸四兩過一宿焙乾　澤瀉二兩

右爲末酒糊丸梧子大每三十丸空心鹽湯下

三黃內消丸

治腎虛受邪結成寒疝陰囊偏墜痛引臍腹或生

瘡瘍時出黃水
山茱萸　貪茱萸　吳茱萸　梔梗　川烏
茴香　蒺藜　青皮　肉桂　川楝各二兩
桃仁　枳實　陳皮各一兩　木香一兩半
大腹皮　五味子　海藻　延胡索各二兩半
右爲末酒糊丸如梧子大每三十丸空心溫酒下
八味茴香丸
治疝如神
橘核三兩　枳實八錢　茯苓　白朮　山楂
角茴　吳茱萸　荔枝核各一兩
右爲末蜜丸彈子大每細嚼一丸鹽湯下
麝香輕粉散
治血疳瘡陰蝕瘡一切惡瘡皆治
麝香　輕粉各半錢　乳香　沒藥　白礬各一兩
右爲細末量瘡乾貼
積疝丸
治積疝
山梔一兩　茴香　柴胡各二錢　牡丹皮一錢
右爲末酒糊丸梧子大每五六十丸鹽湯下
又方
治疝痛
山楂炒四兩　枳實　茴香炒　山梔炒各二兩
牡丹皮　柴胡　桃仁炒　八角茴香炒各一兩
吳茱萸炒半兩
右爲末酒糊丸桐子大每服五十丸空心鹽湯下
將軍散
治陰囊腫痛溺澀寒熱作渴
大黃煅　貝母　白芷　甘草節
右爲末酒調空心服虛弱加當歸
禹功散
治寒疝
黑牽牛頭末一錢　小茴香二錢五分　木香一錢
右共爲末每服三錢薑汁調下
文蛤散
治偏墜氣神效
五倍子五六箇燒存性
右爲末陳酒調服以醉爲度
神消散（秘方下同）
治諸般疝氣外腎腫脹疼痛
益智仁炒七錢　山梔子鹽水炒黑　橘核炒
小茴香鹽水炒各一兩　青皮香油炒六錢
檳榔一錢　荔枝核八錢
右爲細末每服二錢燒酒調服如不用酒以燈草煎湯加鹽少許調服立效
三香酒
治偏墜氣
南木香　小茴香　八角茴香　川楝肉各三錢
右合一服鍋內炒四味入葱白連鬚五根水一椀淬入鍋將椀罩住候煎至半椀取出去查加陳酒半椀合和入炒鹽一茶匙空心熱服神效
全鹿丸
健陽道補虛損功效不能盡述人製一料服之可以延年一紀其法須四人共製一鹿分服逾年又共製之四人共製四年則每人得一全鹿若一人獨製一料恐久留變壞藥力不全矣
中鹿一隻殺之退去毛將肚雜洗淨鹿肉加酒煮熟將肉橫切焙乾爲末取皮同雜仍入原湯熬膏和藥末肉末加煉蜜和搗爲丸其骨須酥炙爲末同入
人參　白朮炒　茯苓　炙甘草　當歸　川芎
生地黃　熟地黃　黃芪蜜炙　天冬　麥冬
枸杞　杜仲鹽水炒　牛膝酒拌蒸　山藥炒
芡實炒　菟絲子製　巴戟　五味子　肉蓯蓉
瑣陽酒拌蒸　破故紙酒炒　胡盧巴酒拌蒸
覆盆子酒拌蒸　楮實酒拌蒸　秋石　川續斷
陳皮各一兩　川椒去目炒　小茴香炒　沉香
青鹽各半斤
右先須精製諸藥爲末和勻一處候鹿膠成就和搗爲丸桐子大焙乾用生黃絹作小袋五十條每袋約盛一斤懸置透風處用盡一袋又取一袋陰濕天須用火烘一二次爲妙每服八九十九空心臨臥薑湯鹽湯白湯任下冬月溫酒亦可
仙傳斑龍丸
壯精神興痿弱養氣血補百損
鹿角膠　鹿角霜　柏子仁　菟絲子酒拌蒸
熟地黃各八兩　白茯苓　補骨脂各四兩
右將膠先鎔化量入無灰酒打糊丸桐子大每服六七十丸空心淡鹽湯或酒任下
加味虎潛丸
治陽痿腰痛行步無力壯元氣滋腎水
熟地八兩　人參　黃芪製　當歸　杜仲酥炙
牛膝酒蒸　瑣陽酒洗　龜板酥炙　菟絲子製

茯苓　破故紙炒　黃蘗蜜水炒　知母酒炒　虎骨酥炙各一兩　山藥炒　枸杞子各二兩　右煉蜜加猪脊髓酒蒸熟同搗丸梧子大每服百餘丸空心淡鹽湯或酒任下

四聖散

治疝氣外腎腫脹

小茴香炒　穿山甲炒　全蠍炒　南木香各等分　右爲末每服二錢陳酒調一服痛止

大小茴香丸

治疝氣如神

大茴香　小茴香　吳茱萸　川楝　川椒各一兩　右共爲末連鬚葱頭八兩同藥搗成餅子曬乾用粘米五合同藥餅研碎微火炒黃爲末酒糊爲丸如梧子大每服八九十丸空心鹽湯或酒下忌發氣物

回陽丹

治陰寒囊縮

船上硫黃　附子炮　木香　全蠍　華澄茄　吳茱萸洗炒各半兩　乾薑炒二錢半　右爲末酒糊丸如梧桐子大生薑湯下三五十丸併二三服併熱投之衣被取汗

壯精固本丸

填精起痿

枸杞子　人參　沙苑蒺藜　山藥　山茱萸　瑣陽　菟絲子各二兩　地黃四兩　麥門冬　歸身　天門冬各一兩　砂仁五錢酒蒸九次　白茯苓　鹿角膠　澤瀉　五味子各兩半　共爲末蜜丸桐子大每服一百丸空心白湯下

蛇牀子湯　外科正宗下同

治腎囊風濕熱爲患疙瘩作痒搔之作疼宜洗

蛇牀子　當歸尾　威靈仙　苦參各五錢　水五椀煎數滾入盆內先熏待溫浸洗二次愈

狠毒膏

治證同前

狠毒　檳榔　硫黃　五倍子　川椒　楓子肉　蛇牀子各三錢　右爲末用香油一大杯煎滾入皮硝三錢再煎滾次下公猪膽汁一箇和勻調前藥搽患上此藥諸痒瘡用之並效

銀杏無憂散

治陰蝕

水銀　杏仁去皮搗膏　輕粉　雄黃　狠毒　蘆薈各一錢　麝香一分　除水銀杏仁膏餘藥共碾篩細入上二味再碾勻先用土菖蒲煎湯洗之用針挑去蝕孔隨用津唾調搽使藥氣入內愈不復生切忌牛犬鼈肉

清肝導滯湯

治肝經濕熱玉莖腫痛小水澀滯作疼者服之

萹蓄四錢　瞿麥三錢　滑石二錢　甘草一錢　水二鍾燈心二十根煎八分空心服便減加大黃二錢

清肝滲濕湯

治陰囊玉莖濕腫如猪肚小水不利墜重作痛

蒼朮　白朮　茯苓　山梔　厚朴　澤瀉　陳皮　木通　昆布　花粉各一錢　甘草五分　川芎　當歸各六分　木香三分　水二鍾煎八分空心服作熱紅色加黃連龍膽草各七分

解毒木通湯

治男婦房術熱藥所傷致玉莖陰戶痒痛小水澀滯白濁滑精至夜陽物興起不得眠者服之

木通　黃連　龍膽草　瞿麥　滑石　山梔　黃蘗　知母各一錢　蘆薈　甘草各五分　水二鍾燈心二十根煎八分食前服

九龍丹

治魚口便毒騎馬癰橫疙初起未成膿者服之

兒茶　血竭　乳香　沒藥　巴豆不去油　木香　右各等分爲末生蜜調成一塊磁盒盛之臨時旋丸寒豆大每服九丸空心熱酒一杯送下行四五次方喫稀粥腫甚者間日再用一服自消

紅花散瘀湯

治入房忍精强固不泄以致瘀精濁血凝結兩胯或小腹之旁結成腫痛小水澀滯者並服之

當歸尾　皂角針　紅花　蘇木　瓜蔞　連翹　石決明　乳香研　穿山甲　貝母去心各一錢　大黃三錢　牽牛二錢　酒水各一椀煎八分空心服行五六次方喫稀粥補之

黃芪內托散

治魚口便毒橫疙等證已成不得內消者服之

川芎　當歸　黃芪各二錢　白朮　金銀花

天花粉　皂角刺各一錢　甘草　澤瀉各五分
水三鍾煎八分食前服
滋陰內托散
治囊癰已成腫痛發熱服之有膿即可穿潰也
當歸　川芎　白芍　熟地　黃芪各一錢半
皂角針　澤瀉　穿山甲各五分
水二鍾煎八分食前服
導水消腎丸
治囊癰內傷生冷外受風寒以致寒濕浸入囊中小者如升大者若斗皮膚頑厚陽物短縮小水不利不痛多冷俗稱沙鼓是也宜服此藥引導水氣日久漸消終身不爲廢也此方常驗
茅山蒼朮一斤米泔水浸切片炒黃　木通半斤
肉桂一兩去麤皮　牽牛二兩微炒　木香一兩
共爲細末陳米粉打糊丸桐子大每服百丸空心白滾湯清米湯任下忌生冷麪食雖夏月炎天亦以衣被覆之爲妙
木香補腎丸
治偏墜一名木腎不疼不痒漸漸而大最爲頑疾有妨行動多致不便但灸木腎子根後宜服此藥俱可內消此藥功效不獨治疝中年後宜服之益壽延年黑髮壯筋塡髓明目聰耳補腎助元陽調飲食其功不可盡述婦人服之顏如童女肌膚瑩潔如玉又精寒血冷久無嗣息者服之更妙
懷慶生地四兩酒煮搗膏　菟絲子　肉蓯蓉
黃精　黑棗肉　牛膝　蛇牀子微炒　茯苓
遠志各一兩二錢　當歸二兩四錢　丁香三錢
大茴香　木香各六錢　枸杞子二兩半　巴戟
杜仲各三兩　青鹽　人參各五錢
右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服六七十丸空心溫酒送下又諸疝不常舉發者服之亦宜
滋陰八物湯
治懸癰初起狀如蓮子紅赤漸腫悠悠作痛者
川芎　當歸　赤芍　生地　牡丹皮　天花粉
甘草節各一錢　澤瀉五分
水二鍾煅心二十根煎八分食前服便祕加蜜大黃一錢
還元保眞湯
治懸癰已潰瘡口開張膿水淋漓不能收斂者
當歸　川芎　白芍　熟地黃　白朮　白茯苓
人參　黃芪各一錢　牡丹皮　枸杞子各八分
甘草炙　熟附子各五分　肉桂　澤瀉各二分
水二鍾煨薑三片大棗二枚煎八分食前服
滋陰九寶飲
治懸癰厚味膏粱蘊熱結腫小水澀滯大便祕結內熱口乾煩渴飲冷及六脈沉實有力者服
川芎　當歸　白芍　生地　黃連　天花粉
知母　黃蘗　大黃蜜水拌炒各二錢
水二鍾煎八分空心服
左歸丸　景岳全書下同
治眞陰腎水不足不能滋養營衛漸至衰弱宜壯水之主以培左腎之元陰而精血自充矣宜此方主之
大熟地八兩　山藥炒　枸杞子　山茱萸肉
鹿角膠敲碎炒珠　龜板膠切碎炒珠　無火者不用
菟絲子各四兩　川牛膝酒洗蒸三兩　精滑者勿用
右先將熟地蒸爛杵膏加煉蜜丸桐子大每食前用滾湯或淡鹽湯送下百餘丸
右歸丸
治元陽不足或先天稟衰或勞傷過度以致命門火衰宜益火之原以培右腎之元陽而神氣自強矣此方主之
大熟地八兩　山萸微炒三兩　當歸三兩　便瀉勿用
鹿角膠炒珠　枸杞微炒　山藥炒　菟絲子製
杜仲薑汁炒各四兩　肉桂二兩漸可加至四兩
製附子自二兩漸可加至五六兩
右九法如前或丸如彈子大每嚼服二三丸以滾白湯送下其效尤速
七福飲
凡五臟氣血虧損者此能兼治之足稱王道之最
人參　熟地各隨宜　當歸二三錢　棗仁二錢
白朮炒一錢半　炙甘草一錢　遠志三五分製
水二鍾煎七分食遠溫服或加生薑三五片凡治氣血俱虛等證以此爲主或宜溫者加薑附宜散者加升麻柴葛左右逢源無不可也
大營煎
治眞陰精血虧損及婦人經遲血少腰膝筋骨疼痛或氣血虛寒心腹疼痛等證
當歸二三錢或五錢　熟地三五七錢　枸杞子
杜仲炒去絲各二錢　炙甘草　肉桂各一二錢
牛膝一錢半

水二鍾煎七分食遠溫服

補陰益氣煎

此補中益氣湯之變方也凡屬陰氣不足而虛邪外侵者用此升散無不神效

人參一二三錢　當歸　山藥酒炒各二三錢　熟地三五錢或一二兩　陳皮　炙甘草各一錢　升麻三五分（火浮于上者勿用）　柴胡一二錢（無外邪者勿用）

水二鍾加生薑三五七片煎八分食遠溫服

保陰煎

治男婦帶濁遺淋色赤帶血脈滑多熱便血不止及血崩血淋或經期太早或一切陰虛內熱動血等證

生地　熟地　芍藥各二錢　山藥　川續斷　黃芩　黃檗各一錢半　生甘草一錢

水二鍾煎七分食遠溫服

柚薪飲

治諸凡火熾盛而不宜補者

黃芩　石斛　木通　梔子炒　黃檗各一二錢　枳殼　澤瀉各一錢半　細甘草三分

水一鍾半煎七分食遠溫服內熱若甚者冷服更佳

徙薪飲

治三焦火一切內熱漸覺而未甚者先宜清以此劑其甚者宜柚薪飲

陳皮八分　黃芩二錢　麥冬　芍藥　黃檗　茯苓　牡丹皮各一錢半

水一鍾半煎七分食遠溫服

大分清飲

治積熱閉結小水不利或致腰腹下部極痛或濕熱下利黃疸溺血邪熱蓄血腹痛淋閉等證

茯苓　澤瀉　木通各二錢　豬苓　枳殼　梔子（炙倍之）　車前子各一錢

水一鍾半煎八分食遠溫服

滋陰八味丸

治陰虛火盛下焦濕熱等證此方變丸爲湯卽名滋陰八味煎

山藥　山茱萸肉各四兩　牡丹皮　白茯苓　澤瀉　知母鹽水炒　黃檗鹽水炒各三兩　熟地黃八兩蒸搗

右加煉蜜搗丸梧桐子大或空心或午前用滾白湯或淡鹽湯送下百餘丸

六味回陽飲

治陰陽將脫等證

人參二兩或數錢　製附子　炮乾薑各二三錢　炙甘草一錢　熟地五錢或一兩　當歸身三錢

水二鍾武火煎七八分溫服

理陰煎

此理中湯之變方也通治眞陰虛弱脈滿嘔噦痰飲惡心吐瀉腹痛婦人經遲血滯等證

熟地五七錢或一二兩　當歸一二錢或五七錢　炙甘草一二錢　乾薑炒黃色一二三錢

水二鍾煎七八分熱服或加肉桂一二錢溫胃飲

治中寒疝氣不思飲食

人參一二三錢或一兩　白朮炒一二錢或一兩　扁豆二錢炒　陳皮一錢或不用　炙甘草一錢　乾薑炒焦一二三錢　當歸一二錢（痛證者勿用）

水二鍾煎七分食遠溫服

如下寒帶濁者加破故紙一錢

如兼外邪及肝腎之病者加桂枝肉桂甚者加柴胡

五君子煎

治脾胃虛寒嘔吐泄瀉而兼濕者

人參二三錢　白朮土炒　白茯苓各二錢　炙甘草一錢　乾薑炒黃一二錢

水一鍾半煎服

鎮陰煎

治陰虛於下格陽於上則眞陽失守血隨而溢以致大吐大衄六脈細脫手足厥冷危在頃刻而血不能止者速宜用此使孤陽有歸則血自安也如治格陽喉痹上熱者當以此湯冷服

熟地黃一二兩　牛膝二錢　炙甘草一錢　澤瀉一錢半　製附子五七分或一二三錢　肉桂一二錢

水二鍾速煎服

煖肝煎

治肝腎陰寒小腹疼痛疝氣等證

當歸二三錢　枸杞三錢　沉香一錢（或木香亦可）　茯苓　小茴香　烏藥各二錢　肉桂一二錢

水一鍾半加生薑三五片煎七分食遠溫服如寒甚者加吳茱萸乾薑再甚者加附子

壽脾煎
一名攝營煎治脾虛不能攝血等證凡憂思鬱怒積勞及誤用攻伐等藥犯損脾陰以致中氣虧陷神魂不寧大便脫血不止或婦人無火崩淋等證凡衆嘔惡尤爲危候速宜用此單救脾氣則統攝固而血自歸原此歸脾湯之變方其效如神若犯此證再用寒凉則胃氣必脫無不即斃者并治血疝

白朮二三錢　當歸　山藥各二錢　棗仁錢半　遠志三五分　乾薑炮一二三錢　炙甘草一錢　蓮肉炒二十粒　人參隨宜一二錢急者用一兩　水二鍾煎服

秘元煎
治遺精帶濁等病此方專主心脾

遠志八分炒　山藥炒　芡實炒　金櫻子去核　棗仁炒搗碎各二錢　白朮炒　茯苓各錢半　炙甘草一錢　人參一二錢　五味十四粒（畏酸者不用）　水二鍾煎七分食遠服

此治久遺無火不痛而滑者乃可用之如尚有火覺熱者加苦參一二錢

如氣大虛者加黃芪一二三錢

固陰煎
治陰虛滑泄帶濁淋遺及經水因虛不固等證此方專主肝腎

人參隨宜　熟地黃三五錢　山藥炒二錢　山茱萸一錢半　遠志七分炒　炙甘草一二錢　五味子十四粒　菟絲子炒香二三錢　水二鍾煎七分食遠服

清化飲
治血熱妄行陰虧諸火不清等證

芍藥　麥冬各二錢　丹皮　茯苓　黃芩　生地各二三錢　石斛一錢　水一鍾半煎七分食遠溫服

贊育丹
治陽痿精衰虛寒無子等證妙方

熟地蒸搗　白朮各八兩　當歸　枸杞各六兩　杜仲酒炒　仙茅酒蒸一日　巴戟肉甘草湯炒　山茱萸　淫羊藿羊脂拌炒　肉蓯蓉酒洗去甲　韭子炒黃各四兩　附子製　蛇牀子微炒　肉桂各二兩

右加煉蜜丸服或加人參鹿茸亦妙

荔香散
治疝氣痛極凡在氣分者最宜用之并治小腹氣痛等證神效

荔枝核炮微焦　大茴香等分炒

右爲末用好酒調服二三錢如寒甚者加製遇臭茱萸減半用之

芍藥蔌藥煎
治遍身濕熱瘡疹及下部紅腫熱痛諸瘡神效外以螵蛸粉敷之

龍膽草　梔子　黃芩　木通　澤瀉各錢半　芍藥　生地各二錢　白蒺藜連刺槌碎五錢甚者一兩　水二鍾煎八分食遠服

如火不甚者宜去龍膽梔子加當歸茯苓薏苡仁之屬

如濕毒甚者加土茯苓五錢或一二兩

百草煎
治百般癰毒諸瘡損傷疼痛腐肉腫脹或風寒濕氣留聚走注疼痛等證無不奇效

田野山間百草無論品皆可取用然猶以山草爲勝辛香者佳冬月可用乾者須預爲收採之

右不論多寡取以多煎濃湯乘熱熏洗患處仍用布帛蘸之良久務令藥氣蒸透然後敷貼他藥每日二三次不拘但以類數爲善蓋其性之寒者可以除熱熱者可以散寒香者可以行氣毒者可以解毒無所不用亦無所不利湯得藥性則湯氣無害藥得湯氣則藥力愈行凡用百草以煎膏者其義亦此此誠外科中最要最佳之法亦傳之於方外人者也

螵蛸散
治濕熱破爛毒水淋漓等瘡或下部腎囊足股腫痛下疳諸瘡無不神效

海螵蛸　人中白等分（或人中黃研砂皆可）

右爲細末先以百草多煎濃湯乘熱熏洗後以此藥摻如乾者以麻油或熬豬油或蜜水調敷之若腫而痛甚者加冰片少許更妙若濕瘡膿水甚者加密陀僧等分或煅過官粉亦可加煅製爐甘石更佳

銀硃烟
治頭髮生蝨及諸瘡之有蟲者

銀硃四五分揩擦厚紙上點著置一椀中上用一濕椀露縫覆之其烟皆著於濕椀之上

右用指揩椀上烟擦髮中覆以氈帽則蟣蝨皆盡矣此烟以棗肉捻作餅或作丸或擦於猪雞熟肝之間用貼諸瘡癬之有蟲者及蟲蝕肛門者以綿裹棗丸納肛門中一宿無不神效須留綿帶在外以便出之

完瘡散

治濕爛諸瘡肉平不斂及諸瘡毒內肉既平而有口不收者皆宜用此最妙

滑石飛一兩　赤石脂飛五錢　粉甘草三錢

右爲末乾摻或用麻油調敷或加枯礬一錢痒者極宜若痒甚者必有蟲先用水銀三四錢同松香二錢研勻後拌前藥和勻敷之

銀粉散

治下疳瘡毋論新久但腐爛作痛及誤熏楊梅瘡後致結毒玉莖腐爛或陽物半傷半全者並宜用之

好錫六錢化開入硃砂末二錢攪炒砂枯去砂留錫再化開投水銀一兩和勻傾出聽用　杭粉一兩鋪夾紙平地上捲成一條一頭點火燒至紙盡爲度吹去灰用粉　眞輕粉一兩

右共成一家研細凡遇前患先用甘草湯淋洗挹乾隨用此藥摻上止痛生肌收斂極妙

珍珠散

治下疳皮損肉爛痛極難悉及諸瘡新肉已滿不能生皮又湯潑火燒皮損肉爛疼痛不止者

青缸花五分如無可用頭刀蔴花體輕虛而色翠者代之然終不及缸花爲妙

珍珠一錢不論大小以新白爲上入豆腐內煑數滾研爲極細無聲　眞輕粉一兩

右三味共研千轉如飛麪方入罐收凡下疳初起皮損搽之卽愈腐爛疼痛者甘草湯洗淨猪脊髓調搽如諸瘡不生皮者用此乾摻卽可生皮又婦人陰蝕瘡或新嫁內傷痛甚者亦用此搽極效湯潑火燒痛甚者用玉紅膏調搽之

山甲內消散

治魚口便毒騎馬癰橫痃等證初起未成膿者

當歸梢　甘草節　大黃各三錢　土木鼈三箇

穿山甲炮三大片　殭蠶　黑牽牛各一錢

右以酒水各一椀煎八分空心服查再煎服大便行三四次方喫稀粥淡味飲食爲妙

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百二十五卷目錄

醫部彙考二百五

前陰門六

單方

鍼灸

導引

藝術典第二百二十五卷

醫部彙考二百五

前陰門六

單方

丈夫陰囊濕癢及陰汗取鑄鏵鉏孔中黃土細末撲之藏易

男陰卒腫及陰冷發悶冷氣入腹腫滿殺人用釜月下上和雞子白傅之千金方下同

陰冷疼悶冷氣入腹腫脹殺人酢和熱灰頻熨之

陰下濕汗用滑石一兩石膏半兩白礬少許研摻之集簡方

陰汗濕癢用爐甘石一分眞蚌粉半兩細研粉撲之直指方

偏墜氣痛陳石灰炒五倍子山梔子等分爲末麪和酢調敷之一夜即可消醫方摘要

小腸疝氣莖縮囊腫者用浮石爲末每服二錢木通赤茯苓麥門冬煎湯調下直指方

又方海石香附等分爲末每服二錢薑汁調下丹溪方

陰濕瘡疱硫黃傅日三梅師方

交接勞復卵腫或縮入腹痛欲絕礬石一分硝三分大麥粥調服方寸匕日三服熱毒從二便出也肘後方

陰下濕癢甘草煎湯日洗三五度古今錄驗

陰汗濕癢用綿黃芪酒炒爲末以猪心煮熟蘸吃妙濟急方

卒得疝氣小腹及陰中相引痛如絞白汁出欲死者沙參搗篩爲末酒服方寸匕立瘥肘後方

寒疝腹痛小腹陰中相引痛自汗出欲死丹參一兩爲末每服二錢熱酒調下聖惠方

陰癩偏腫白頭翁根生者不限多少搗傅腫處一宿當作瘡二十日愈

男子陰腫脹痛蛇牀子末雞子黃調傅之永類方

癩疝偏墜氣脹不能動者牡丹皮防風等分爲末酒服二錢甚效千金方

小腸臟氣非時痛不可忍蓬莪朮研末空心葱酒服一錢護命方

癩疝脹痛及小腸氣香附末二錢以海藻一錢煎酒空心調下并食海藻集簡方

陰癩腫痛荊芥穗瓦焙爲散酒服二錢即消壽域神方

疳瘡簡便方用油透羅緞舊帽沿燒灰杭粉瓦上煅黃色各等分共研極細磁罐收貯先用紅棗十五箇甘草三錢煎湯洗患上挹乾搽藥即效外科正宗

蝦蟆散治陰蝕欲盡瘡痛甚者蝦蟆一枚燒灰兔糞一兩同研細每用少許傅瘡上日三四次

小腸氣痛胡盧巴炒研末每服二錢茴香酒下直指方

冷氣疝瘕胡盧巴酒浸曬乾蕎麥炒研麪各四兩小茴香一兩爲末酒糊丸梧子大每服五十丸空心鹽湯或鹽酒下服至兩月大便出白膿則除根心法附餘

寒疝不能食及腹內一切諸疾消食肥肌馬藺子一升每日取一把以麪拌煮吞之服盡愈集驗方

胭脂散治陰瘡坯子胭脂眞菉豆粉各等分同研勻傅之

小腸疝氣木賊細剉微炒爲末沸湯點服二錢煖服取效一方用熱酒下本草衍義

寒疝絞痛來去用烏雞一隻治如常法生地黃七斤剉細甑中同蒸下以銅器承取汁清旦服至日晡令盡其間當下諸寒癖訖作白粥食之久疝者作三劑肘後方

疝氣危急地膚子即落蒂子炒香研末每服一錢酒下簡便方

狐疝陰癩超越舉重卒得陰癩及小兒狐疝傷損生癩並用地膚子五錢白朮二錢五分桂心五分爲末米飲或酒服三錢忌生葱桃李必效方

陰冷悶痛漸入囊內腫滿殺人車前子末飲服方寸匕日二服千金方

陰下癢痛車前子煮汁頻洗外臺秘要

男子陰腫大如升核痛人所不能治者馬鞭草搗塗之集效方

男子偏墜作痛大黃末和酢塗之乾則易梅師方

陰疝欲死丸縮入腹急痛者用狼毒四兩防風二兩附子三兩炮以蜜丸梧子大每服三丸日夜三度白湯下肘後方

疝氣偏腫甘遂茴香等分爲末酒調二錢食前服之

儒門事親

心痛疝氣濕熱因寒鬱而發用梔子降濕熱烏頭破寒氣各一錢爲末順流水入薑汁一匙調下

小腸膀胱痛不可止者神砂一粒丹用熟附子去皮鬱金橘紅各一兩爲末酢麪糊丸如酸棗大朱砂爲衣每服一丸男人酒下女人酢湯下宣明方

寒疝引脅肋心腹皆痛諸藥不效者大烏頭五枚去皮臍四破以白蜜一斤煎令透取焙爲末別以熟蜜和丸梧子大每服二十丸冷鹽湯下末除

寒疝滑洩腹痛腸鳴自汗厥逆熟附子去皮臍延胡索炒各一兩生木香半兩每服四錢水二盞薑七片煎七分溫服濟生方

寒氣心疝三十年者射罔食茱萸等分爲末蜜丸麻子大每酒下二丸日三服東陽方

偏墜疝氣白附子一箇爲末津調塡臍上以艾灸三壯或五壯卽愈簡便方

陰腫疝刺發時腫痛如刺用生射干搗汁與服取利亦可丸服肘後方

血疝初起胡椒菜葉挼按揉之集簡方

偏疝痛極刼之立住用綿袋包暖陰囊取天花粉五錢以醇酒一盌浸之自卯至午微煎滾露一夜次早低凳坐定兩手按膝飲下卽愈未下再一服本草蒙筌

小腸偏墜天門冬三錢烏藥五錢以水煎服活人心鏡

陰潰囊腫木蓮卽木饅頭燒研酒服二錢

又方木饅頭子小茴香等分爲末每空心酒服三錢取效集簡方

疝氣作痛天仙藤一兩好酒一盌煎至半盌服之神效集效方

陰汗濕癢石菖蒲蛇牀子等分爲末日搽二三次濟急仙方

陰下濕癢蒲黃末傅三四度瘥千金方

陰囊生瘡胡麻嚼爛傅之良肘後方

陰冷悶痛漸入腹腫滿酢和麪熨之千金方

小腸疝氣蕎麥仁炒去尖胡盧巴酒浸曬乾各四兩小茴香炒一兩爲末酒糊丸梧子大每空心鹽酒下五十丸兩月大便出白膿去根集效方

治腎氣偏墜牽引及心腹痛茴香浸酒煮飲之

津調散治妬精瘡膿汁淋漓臭爛黃連款冬花各等分麝香少許共爲細末先以地骨皮蛇牀子煎湯洗軟帛拭乾摻上忌生湯洗

陰囊或玉莖腫痛葱白乳香搗塗卽時痛止腫消山居四要

又方用煨葱入鹽杵如泥塗之

陰腫如刺汗出者小蒜韭根楊柳根各一斤酒三升煎沸乘熱熏之永類方

陰汗作癢大蒜淡豉搗丸梧子大硃砂爲衣每空腹燈心湯下三十丸

陰腫如斗生蔓菁根搗封之治人所不能治者集療方

疝氣入腹茴香炒作二包更換熨之簡便方

小腸氣墜用八角茴香小茴香各三錢乳香少許水服取汗直指方

又方用大茴香荔枝核炒黑各等分研末每服一錢溫酒調下集效方

又方用大茴香一兩花椒五錢炒研每酒服一錢良集簡方

膀胱疝痛用舶茴香杏仁各一兩葱白焙乾五錢爲末每酒服二錢嚼胡桃送下本事方

一方用茴香鹽炒晚蠶砂鹽炒等分爲末煉蜜丸彈子大每服一丸溫酒嚼下集要方

疝氣偏墜大茴香末小茴香末各一兩用牙猪尿胞一箇連尿入二末子內繫定罐內以酒煮爛連胞搗丸如梧子大每服五十丸白湯下仙方也筆峰雜興

陰囊濕癢松毛煎湯頻洗簡便方

丈夫陰瘡莖及頭潰爛痛不可忍久不瘥者以五月五日繫縷燒灰五分入新出蚯蚓屎二分入少水和研作餅貼之乾卽易禁酒麪五辛及熱食等物效

陰腫痛極馬齒莧搗傅之良

陰囊癩腫萵苣子一合搗末水一琖煎五沸溫服

卵瘡偏墜用雙蔕茄子懸於房門上出入用眼視之茄蔫所患亦蔫茄乾亦乾矣又法用雙茄懸門上每日抱兒視之二三次釘針於上十餘日消矣保壽堂方

小腸氣痛遶臍衝心連蔕老絲瓜燒存性研末煉蜜調成膏每服三錢熱酒調下甚者不過二三服消

卵腫偏墜絲瓜架上初結者留下待瓜結盡葉落取下燒存性爲末煉蜜調成膏每晚好酒服一匙如在左左睡在右右睡保壽堂方

陰子偏墜絲瓜葉燒存性三錢雞子殼燒灰二錢溫酒調服遇奇方

小腸氣痛大棗一枚去核用蟹螯一枚去頭翅入棗內紙包煨熟去螯食棗以桂心蓽澄茄湯下直指方

偏墜疝氣山棠梂肉茴香炒各一兩爲末糊丸梧子

大每服一百丸空心白湯下（易簡方）

小腸疝氣及陰核腫痛橘核炒研五錢老酒煎服或酒糊丸服甚效

陰冷入腹有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿日夜疼悶欲死以布裹川椒包囊下熱氣大通日再易之以消爲度（千金方）

腎風囊癢川椒杏仁研膏塗掌心合陰囊

寒疝往來吳萸一兩生薑半兩清酒一升煎溫分服

陰下濕癢吳茱萸煎湯頻洗取效（外臺秘要）

陰腫痛癢荷葉浮萍蛇牀等分煎水日洗之（醫壘元戎）

偏墜氣塊雞頭根切片煮熟鹽醋食之（壯天生意）

疝氣痛杉子一歲一粒燒研酒服

外腎偏腫桂末水調方寸匕塗之（梅師方）

小腸疝氣烏藥一兩升麻八錢水二鍾煎一鍾露一宿空心熱服（集效方）

癩疝疼痛敗精惡血結在陰囊所致阿魏二兩酢和薑麥麪作餅裹之煨熟大檳榔二枚鑽孔鍾乳香塡滿亦以薑麥麪裹之煨熟入硇砂末一錢赤芍藥末一兩糊丸梧子大每食前酒下三十丸（危氏得效方）

丈夫疝氣本臟氣傷勝肭連小腸等氣金鈴子一百箇溫湯浸過去皮巴豆二百箇微打破以麪一升同於銅鍋內炒至金鈴子赤爲度放冷取出去核爲末巴麪不用每服三錢熱酒或酢湯調服一方入鹽炒茴香半兩亦妙（經驗方）

疝氣癩腫用荔枝核炒黑色大茴香炒等分爲末每服一錢溫酒下皆效（孫氏方）

來笑丹用荔枝核四十九箇陳皮連白九錢硫黃四錢爲末鹽水打麪糊丸菉豆大遇痛時空心酒服九

九良久再服不過三服其效如神亦治諸氣痛（方玉衡）

陰腎腫痛荔枝核燒研酒服二錢

腎腫如斗荔枝核青橘皮茴香等分各炒研酒服二錢日三

木病囊腫牡蠣煅粉二兩乾薑炮一兩研末冷水調糊塗上須臾囊熱如火乾則再上小便利卽愈一方用葱汁白麪同調小兒不用乾薑（初虞世古今錄驗方）

陰腎癩腫檳榔核荔枝核山楂核等分燒存性研末每服二錢空心茴香湯調下

腎風囊癢用猪尿胞火炙以鹽酒吃之（救急方）

男子陰冷以食茱萸納牛膽中百日令乾每取二七枚嚼納陰內良久如火（千金方）

腎冷偏墜疝氣用生雀三枚燎毛去腸勿洗以舶上茴香三錢胡椒一錢縮砂肉桂各二錢入肚內濕紙裹煨熟空心食之酒下良（直指方）

小腸疝氣用帶毛雀兒一枚去腸入金絲礬末五錢縫合以桑柴火煨成炭爲末空心無灰酒服年深者二服（瑞竹堂方）

陰囊濕癢鮫鯽骨蒲黃撲之（醫宗三法）

小腸氣痛胡桃一枚燒灰研末熱酒服之（奇效良方）

治下疳瘡以孩兒茶研爲細末先洗淨瘡乾則小油調傅濕則乾摻之神效

下部疳瘡用生白果杵塗之（趙原陽）

疝氣墜痛用猪脬一枚洗入小茴香大茴香破故紙川楝子等分塡滿入青鹽一塊縛定酒煮熟食之其藥焙搗爲丸服之

陰蝕作癢乃陰毛際肉中生蟲如蝨或紅或白癢不可忍者白果仁嚼細頻擦之取效（劉長春方）

小腸疝氣每頓用鯽魚十箇同茴香煮食久食自愈（生生編）

小腸疝氣雞子黃攪溫水服之三服效

陰囊濕瘡出水不瘥用五倍子臘茶各五錢爲粉少許研末先以葱椒湯洗拭過香油調搽以瘥爲度（太平聖惠方）

小腸氣痛地膚去翅足頭微炒硃砂各半兩滑石一兩爲末每用苦杖酒食前調服二錢卽愈（宜明）

小腸疝氣用緊小全蠍焙爲末每發時服一錢入麝香半字溫酒調服少頃再進神效

下疳蒼耳葉爲末傅之

男子陰疝卵腫婦人陰門癢痛及下部濕癢槐白皮水煮取湯淋浴之（本草下同）

陰癢白礬蛇牀子煎水淋洗

陰瘡癢不可忍硫黃白礬煎湯洗之杏仁燒灰油調塗之

外腎腫痛桂心末和酒塗之桂能洩奔豚故效

陰痿牛膝煎服或釀酒服之

蛇牀子溫陰之主藥煎湯浴男女陰去風冷益陽事去陰汗又爲末和米粉綿裹納陰中卽溫

地膚子治跳躍舉重卒得陰癢地膚子二兩半白术一兩半桂心五錢共爲末酒下三錢（千金方）

疝痛欲死取沙參爲末酒服三錢或剉一兩煎服亦佳（本草）

下疳瘡及陰莖上瘡黃蘗蛤粉等分爲末摻之卽愈

蓋黃蘗去熱蛤粉燥濕故也丹溪心法

木腎取雄楮葉曬乾爲末酒糊和丸梧子大空心鹽酒下三十丸楮無實者雄也綱目

寒疝痛四肢逆冷桂心末一錢熱酒調下本草下同

腎氣痛須用川椒水煎服

奔豚氣及內外腎牽痛椒葉和艾及葱白同研爛以酢湯拌署妙秦椒亦可

神妙方治莖頭三五孔小漏瘡出血微膿用油髮燒作灰存性研細傅之乾則津唾調傅仍以米飲調髮灰食前服直指方

陰蝕瘡鰌鯽魚骨爲末傅之又治小戶嫁痛燒爲末酒服二錢本草下同

壯陽起陰痿令交接不倦原蠶蛾焙爲末酒服一錢或丸服亦佳

鰻鱺魚起陽取魚和五味煑熟空心食甚補益

陰蝕瘡癢取鰻鱺油塗或燒烟熏

小兒陰囊腫痛取地龍糞甘草汁調傅薄荷汁調傅尤好

乾地龍爲末葱椒湯洗後唾調傅綱目下同

治偏墜大者桂心乾薑各一錢爲末綿一兩水三椀同煑曬乾又浸煮又曬水盡爲度用綿包陰丸汗出數次便愈亦治癀疝不痛

陰痿用覆盆子作丸久服能令堅長本草下同

淫羊藿主陰痿此與陽之劑也取一斤酒浸服之或作丸久服亦佳

海藻療疝癀核腫常食消男子癀疝入藥服亦佳海帶昆布同功

奔豚疝氣痛葱白濃煎湯飲之

癀疝小腹痛細切葱白和鹽炒熨之

壯陽強陰取雀肉以蛇牀子熬膏和丸服名驛馬丸雀卵和天雄菟絲子丸服令陰強盛

鹿腎壯陽氣作酒及煑粥服

鹿頭骨髓和蜜煑服壯陽令有子

牡狗陰莖主陰痿令強熱大能生子焙乾爲末和酒服

黃狗肉壯陽道和五味煑熟空心食

膃肭臍主陰痿助陽氣治疝冷酥炙爲末空心酒下一錢或丸服之

疝痛牛陰莖炙乾作末溫酒調服俗方下同

卒疝痛取貂鼠四足燒爲灰酒調服青鼠足黃獷足亦同

偏墜氣痛用五倍子一箇放食鹽少許在內以火紙包定用水浸濕放文武火灰內煨存性爲末酒調服之

血疝便毒不拘已成未成隨即消散螫蝥三箇去翅足炒滑石三錢同研分作三服空心白湯下日一服

毒從小便出如痛以車前木通澤瀉猪苓煎飲名破毒飲甚效東垣方

偏墜疼痛青娘子紅娘子各十枚白麪拌炒黃色去前二物熟湯調服立效也談埜翁方

治交接傷損卵縮筋攣燒婦人月經衣灰服方寸匕千金方

治男子卵大如斗核痛人所不能療者雄黃一兩研礬石二兩研甘草生半兩切以水五升煑減半洗腫痛處

治陰腫皮癢熬桃仁令香細研爲末酒服方寸匕日三

治陰冷冷氣漸入陰囊腫滿不得眠搗莧菜根傅之

又方煑大蒯根汁服一升日三不過三劑愈

陰痛用甘草石蜜等分爲末乳和塗之

小腸疝痛不省人事茴香鹽炒枳殼各一兩沒藥五錢爲末酒下二錢

又方麝香黃礬青礬各等分三味爲末小便後傅上不過三度

陰蝕瘡用蒲黃一升水銀一兩二味研成粉小便後即傅上瘥止

又方以肥猪肉五斤水三斗煑令極爛去肉以湯令極熱浸瘡冷即易不過三十斤瘥

又方狼牙草兩把切以水五升煑取一升溫洗之日五度

陰蝕生瘡或癢用雄黃礬石各二分麝香半分三味治下篩爲粉傅瘡上即愈

陰部惡瘡蜜煎甘草末塗之

男女陰瘡石硫黃爲末以傅瘡上

陰下生瘡地榆黃蘗各八兩二味㕮咀以水一斗五升煑取六升去滓適冷暖便洗瘡日再或只取黃蘗汁洗亦佳

下疳摻藥輕者用輕粉一味摻上瘡瘍全書

蛀疳輕粉韶粉各等分爲末摻之

內外蛀疳冰片二分輕粉六分麝香五分爲細末摻孔內

下疳摻藥青黛槐燒灰孩兒茶各一錢冰片三分爲細末先用杏仁四分去皮尖另研又加輕粉四分和研如泥先傅患上一日米泔洗之後用前摻藥

又方紅棗去核嵌明礬二分珍珠四分煅過存性末之乾摻

又方疼痛不可忍者用黑羊角穿山甲煅過研末各二錢乳香沒藥各一錢空心酒下

下疳熏法蓖豆一升煮極爛茶葉五錢研末乘熱傾在多年馬桶內在無風處熏之待出一身汗妙甚男婦並用

銀粉散治下疳陰頭生瘡用牆上白螺螄殼不拘多少火內煅酥爲末水內飛過先去上石粗者次用輕粉隨分兩入在末內每以少許乾貼在瘡上

陰部生瘡以鯽魚膽搽之

小腸疝痛延胡索鹽炒五錢全蝎一錢爲末酒下一錢或與乾薑等分末服亦佳（人門）

隱處疼痛鹽三合炒熱青布包熨之立止

卒疝痛欲死茴香莖葉搗取汁一合和熱酒一合服之（本草下同）

小便濇痛牛膝五兩酒二升煮半升去查作三服服之

小腸疝氣三服除根地椒一名地蔗藜五錢大戟五錢水煮食前服服後比口如三角形上於臍中兩脇旁各灸三壯艾炷如小麥大

疝氣用鬼饅頭黃泥固濟煅過爲末空心酒下

丹胞散治玉莖生瘡臭爛者以猪胞一箇連尿去一半留一半用新甎兩口炭火煅將猪胞連尿於甎上焙乾不住手移放於兩口甎上輪流不歇莫與火煅著胞待尿乾爲度研爲末入黃丹一錢先用葱湯以鵝毛林洗以舊帛拭乾此藥摻三五次立見效

小腸氣上攻者用烏藥良薑白牽牛青皮末之酒下二錢

又神方用硫黃火中鎔化即投水中去毒荔枝核炒焦黃陳皮等分爲末飯丸每服五丸其痛立止疼甚略用六丸不可多也

小腸疝氣用川楝子一兩破四分巴豆三箇同炒黃色去巴豆用之茴香一兩鹽炒黃色去鹽之共爲細末每服三錢葱白酒調下空心服之名抽刀散（普事便）

陰痛不可忍吳茱萸二兩洗七遍焙乾微炒檳榔茴香各一兩爲細末酢糊爲丸熱酒送下十九食前服之

治偏墜巴戟去心川楝炒茴香炒各等分爲末溫酒調二錢服之

疝氣腫硬地龍不去土爲末唾津調塗病處

小腸氣痛全蝎一兩茴香一兩炒黃共爲細末酢糊和丸如梧桐子大如發時每服五七十丸溫酒送下食前服之

疝病用枇杷葉野紫蘇葉椒葉木賊葡萄葉以水煎熏洗（丹溪心法）

小腸氣及木腎偏墜黑牽牛一斤用猪尿胞裝滿以線縛定口子好酒米酢各一椀於砂鍋內煮乾爲度取出黑牽牛用青紅娘子各十九箇於鐵鍋內炒燥去青紅娘子將牽牛碾取頭末四兩另入猪苓澤瀉細末各二兩酢糊丸如梧桐子大每服三十丸空心鹽酒送下不可多服多服令人頭眩如頭眩可服黑錫丹

腎囊溫瘡密陀僧乾薑滑石爲末摻上

騎馬癰用大粉草帶節四兩長流水一椀以甘草浮焙水盡爲末入皂角炭少許作四服湯調頓服效

梔子散治下疳瘡用梔子一枚去穰入明礬末麪糊封合口火燒存性爲末乾摻上即效

小腸氣用血師一兩米酢一升以火燒血師通赤焠入酢中以焠竭爲度搗羅如麪用湯調下一大盞即瘥如神血師代赭石也

敷藥方治便毒腫痛雄黃乳香各二兩黃蘗一兩爲細末用新汲水調敷腫處自消（奇效良方）

治腎癰用石蟹熱水磨服

蚯蚓散治陰莖瘡蚯蚓二分菉豆粉一分用水研塗上乾又傅之一方用豉一分（袖珍方）

石灰散治腎漏陰囊先腫後穿破出黃水瘡如魚口能致命用五倍子同石灰炒黃色去灰攤地出火毒砂盆內研細末不犯銅鐵乾摻瘡上五七次可

青黛散治下部生濕瘡熱癢而痛寒熱大小便澀食亦減身面微腫因多食魚蝦發風熱物得之用馬齒莧四兩研爛入青黛一兩再研勻塗上立有神效仍服八正散日二服

爐腦散爐甘石一兩半黃連八錢同入砂鍋煮一宿去黃連取甘石曬乾入腦五分爲末乾摻治下疳瘡或湯泡少許洗一切眼疾

單竹茹湯竹茹一兩水煎濃汁服之治交接勞役卵

腫腹痛欲絕

猪脬丸黑雄猪腰子一對不見水去膜切碎以大小茴香末各二兩同猪腰拌勻再以前猪尿脬一箇入腰子於內紮定用酒三椀於砂鍋內懸煑至半椀取起焙乾爲末將餘酒打糊丸梧子大每五十丸溫酒下治諸疝除根

國老湯治懸癰用橫紋大甘草一兩截長三寸許取出山澗東流水一椀不用井水河水以甘草蘸水文武火慢炙不可急性須用三時久水盡爲度劈視草中潤透却以無灰酒二椀煑至一椀溫服一日一服半月消盡爲度（古今醫鑑）

鳳衣散治下疳瘡腫痛神效用鳳凰衣煅黃連各等分輕粉片腦各少許爲末濕用乾摻乾用鴨子清調搽（醫學入門）

便毒用大黃五錢穿山甲二錢半泥土炒二味共爲細末新酒調服諒力多寡（醫貫）

疳蟲下蝕下部用蒲黃水銀研勻敷入外以鶴蝨草煎湯熏洗（景岳全書）

妬精陰瘡鉛粉二錢銀杏仁七箇銅銚內炒至杏黃去杏取粉出火毒研搽效（集簡方）

下疳瘡用鏡銹同五倍子末等分米泔洗後傅之鏡銹即鏡上綠也俗名楊妃垢

便毒初起用古錢與胡桃同嚼食二三枚能消之便毒屬肝金伐木也

便毒初發取千步峯用生薑蘸酢磨泥塗之千步峯者人家行步地上高起土也乃人往來鞵履沾積而成者

下疳陰瘡爐甘石火煅酢淬五次一兩孩兒茶三錢爲末麻油調傅立見效（御眞人方）

疳瘡不愈海浮石燒紅酢淬數次二兩金銀花一兩爲末每服二錢半水煎服病在上食後在下食前一年者半年愈（儒門事親）

飛絲纏陰腫痛欲死以威靈仙搗汁浸洗一人病得此效（惟證方）

陰上粟瘡取停水濕處乾卷皮爲末或油或酢調傅之神效（外臺秘要）

陰莖生瘡痛爛者以豉一分蚯蚓濕泥二分水研和塗上乾即易之禁熱食酒蒜芥菜（藥性論）

便毒腫痛貫衆酒服二錢良（多能鄙事）

便癰腫痛貝母白芷等分爲末酒調服或水煎服以查貼之（永類鈐方）

便毒諸瘡石蒜搗爛塗之即消若毒太甚者洗淨以生白酒煎服得微汗即愈（王末輔濟世方）

便癰腫痛鼠黏子二錢炒研末入蜜一匙矾硝一匙空心溫酒服（袖珍方）

便毒初起芭蕉葉熨斗內燒存性入輕粉麻油調塗一日三上或消或破皆無痕也（直指方）

便毒初起冬葵子末酒服二錢（儒門事親）

便毒初發用黃苦蔞一箇黃連三錢水煎連服有效（末類方）

露岐便毒生薑蒲根搗傅之（證治要訣）

又方用葱根和蜜搗傅以紙密護之外服通氣藥即愈

治下疳瘡雄黃黃連等分爲末濕者乾摻乾者油調傅先用荊芥射干煎湯洗拭傅之妙

便毒初起胡桃七箇燒研酒服不過三服見效

便毒腫痛皂角炒焦米粉炒等分研末以熱酢調攤貼患處頻以水潤之即效

又方猪牙皂角七片煨黃去皮弦出火毒爲末空心溫酒服五錢

便毒癰疽皂角一條酢熬膏傅之屢效（直指方）

玉莖瘡潰絲瓜連子搗汁加五倍子研末搽之（丹溪方）

冷淋莖痛槲葉研末每服三錢水一盞葱白七寸煎六分去查食前溫服日二

下疳青黛海蛤密陀僧黃連共爲末敷上

男子陰瘡有二種一者陰蝕作臼膿出一者只生熱瘡熱瘡用黃蘗黃芩等分煎湯洗之仍以黃蘗黃連作末敷之

又法黃蘗煎湯洗之塗以白蜜（附後方）

陰瘡濕癢槐樹北面不見日枝煎水洗三五遍冷再煖之（必效方）

下疳瘡用密陀僧黃蘗各一分半膩粉一錢麝香少許先洗瘡拭乾傅之甚者三四次即瘥

外腎偏疼皁角和皮爲末水調傅之良

便毒初起肥皁搗爛傅之甚效（簡便方）

玉莖濕癢肥皁一箇燒存性香油調搽即愈（攝生方）

陰卒腫痛柳枝三尺長二十枝細剉水煑極熱以故帛裹包腫處仍以熱湯洗之（集驗方）

囊瘡痛癢紅椒七粒葱頭七箇煑水洗之一人途中苦此相山寺僧授此方數日愈名驅風散（經驗方）

男女下疳母猪屎黃泥固濟煅存性爲末以米泔洗

淨搽立效簡便單方

陰頭生瘡人不能治者鼈甲一枚燒研雞子白和傅千金翼

療人陰生瘡膿出成坎取高昌礬麻仁等分研煉猪脂相和成膏槐白皮煎湯洗瘡拭乾即塗膏然後以楸葉貼其上不過三五度瘥

下疳陰瘡白海巴三箇煅紅研末搽之簡便單方

妬精陰瘡大田螺二箇和殼燒存性入輕粉同研傅之效醫林集要

陰頭生瘡用溪港年久螺螄燒灰傅之奇效良方

陰囊生瘡用蠟面茶爲末先以甘草湯洗後摻之妙經驗方

便毒初起黃脚蜈蚣一條瓦焙存性爲末酒調服取汗即散濟生秘覽

陰頭疳蝕雞內金不落水拭淨新瓦焙脆出火毒爲細末先以米泔水洗瘡乃搽之亦治口疳經驗方

便毒便癰穿山甲半兩猪苓二錢並以酢炙研末酒服二錢外以穿山甲末和麻油輕粉塗之或只以土塗之直指方

下部疳瘡用五倍子枯礬等分研末先以虀水洗過搽之全幼心鑑

又方用五倍子花椒去子炒各一錢細莘焙三分爲末先以葱湯洗淨搽之一二日生肉也杏林摘要下同

魚口瘡毒初起未成膿者五倍子炒黃研末入百草霜等分以臘酢調塗於患處一日一夜即消

便癰膿血白膠香一兩爲末入麝香輕粉少許摻之袖珍方

便毒腫痛已大而軟者用魚鰾膠熱湯或酢煮軟乘熱研爛貼之直指方

台露瘕即羊核用石首膠一兩燒存性研末酒服外以石菖蒲生研盦之效叢氏方

地連散治玉莖上生瘡用地骨皮煎湯洗以訶子連核燒存性爲末乾摻

一切疳瘡馬明退燒灰三錢輕粉乳香少許先以溫漿水洗淨傅之良僧門事親

男子陰瘡因不忌月事行房陰物潰爛用室女血衲瓦上燒存性研末麻油調傅之

腎風下注生瘡用驢蹄二十片燒灰密陀僧輕粉各一錢麝香半錢爲末傅奇效方

陰上疳瘡用駝絨燒灰水澄過入炒黃丹等分爲末搽之即效龔氏經驗方

便毒初起大黑蜘蛛一枚研爛熱酒一椀攪服隨左右側臥取利不退再服必效壽域方

便毒初起水膠鎔化塗之即散直指方

川連散治下部注瘡以黃連爲細末漿水調成餅攤於椀面上內用艾及穿山甲三片燒烟覆椀熏成黑色再取下如是者五次以黃連餅黑色爲度地上出烟毒再研細濕則乾塗乾則清油調塗三四次先用黃蘗藿香茵陳煎湯濕洗

下部生瘡槲皮櫸皮煮汁熬如飴糖以導下部肘後方

下部鼈瘡皂角燒研棉裹導之肘後方

妬精下疳大訶子燒灰入麝香少許先以米泔水洗後搽之或以荊芥黃蘗甘草馬鞭草葱白煎湯洗亦可有人莖爛一二寸用此取效夷堅志

下部鼈蟲痛癢膿血旁生孔竅蜣螂七枚五月五日收者新牛屎半兩肥羊肉一兩炒黃同搗成膏丸蓮子大炙熱綿裹納肛中半日即大便中蟲出三四度末瘥董炳集驗方

下蝕疳瘡破絲網燒存性孩兒茶各五分研末以濃茶洗淨摻之三五次效忌生酒房事發物集簡方

陰囊汗癢龍骨牡蠣粉撲之醫宗三法

陽事痿弱紫梢花生龍骨各二錢麝香少許爲末蜜丸梧子大每服二十丸燒酒下欲解飲生薑甘草湯集簡方

陰癢生瘡紫梢花一兩胡椒半兩煎湯溫洗數次即愈總微論

陰囊濕癢欲潰者用板兒松香爲末紙卷作筒每根入花椒三粒浸油燈琖內三宿取出點燒淋下油搽之先以米汁洗過簡便方

胯上便毒鯽魚一枚山藥五錢同搗敷之即消醫林集要

下疳濕瘡髮灰一錢棗核七枚燒研洗貼心鑑

下疳濕瘡蠶繭盛頭垢再以一繭合定煅紅出火毒研搽楊氏方

玉莖生瘡牛蹄甲燒灰油調敷之奚囊

腎風陰癢以稻草燒皂角熏十餘次即止濟急仙方

偏墜腫痛蘇方木二兩好酒一壺煮熟頻飲立效集簡方

木腎疝氣楮葉雄黃等分爲末酒糊丸梧子大每鹽酒下五十丸醫學集成

疝氣入囊五月五日采穀樹葉陰乾爲末每服一二匙空心溫酒下簡便方

陰腫如斗取雞翅毛一孔生兩莖者燒灰飲服左腫取右翅右腫取左翅雙腫並取（肘後方）

陰卒腫痛雞翮六枚燒存性蛇牀子末等分隨左右敷之（肘後方）

時疾陰腫囊及莖皆熱腫以羊屎黃蘗煮汁洗之（外臺秘要下同）

玉莖下疳雞卵殼炒研油調敷之

外腎癰瘡抱出雞卵殼黃連輕粉等分爲細末用鍊過香油調塗（醫林正宗）

橫痃便毒雞子一箇開孔入紅娘子六箇紙包煨熟去紅娘子食雞子以酒下小便淋瀝出壞血立愈（陸氏積祕堂方）

治下疳瘡久不愈橡斗子二箇各盛黃丹令滿相合以亂髮纏定燒烟盡爲度同研爲末先以葱白熱葉水洗瘡膿盡次上藥甚者不過三次如神

鍼灸

素問曰腰痛不可以轉搖急引陰卵刺八髎與痛上八髎在腰尻分間

病在少腹腹痛不得大小便病名曰疝得之寒刺少腹兩股間刺腰踝骨間刺而多之盡見病已

督脈者起於小腹以下骨中央女子入繫廷孔其孔溺孔之端也其絡循陰器合纂間繞纂後別繞臀至少陰與巨陽中絡者合少陰上股內後廉貫脊屬腎其男子循莖下至纂與女子等此生病而從少腹上衝心而痛不得前後爲衝疝其女子不孕癥痔遺溺嗌乾督脈生病治督脈治在骨上甚者在臍下營

邪客於足厥陰之絡令人卒疝暴痛刺足大指爪甲上與肉交者各一痏男子立已女子有頃已左取右右取左

靈樞曰足太陰之筋其病陰器紐痛下引臍兩脅痛治在婚鍼刺以知爲數以痛爲輸

小腸控睾引腰脊上衝心邪在小腸者連睾系屬於脊貫肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃熏肝散於肓結於臍故取之肓原以散之刺太陰以予之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以調之

足厥陰之別名曰蠡溝去內踝五寸別走少陽其別者循脛上睾結於莖其病氣逆則睾腫卒疝實則挺長虛則暴癢取之所別也

小腸病者小腹痛腰脊控睾而痛時窘之後當耳前熱若寒甚若獨肩上熱甚則手小指次指之間熱若脈陷者此其候也手太陽病也取之巨虛下廉

甲乙經曰腰足痛而清善偃睾跳拳上踵主之

腰痛急難陰痛下重不得小便秩邊主之

小腹痛控睾引腰脊疝痛上冲心腰脊強溺黃赤口乾小腸俞主之

狐疝驚悸少氣巨缺主之

陰疝引睾陰交主之

少腹痛溺難陰下縱橫骨主之

少腹痛疝臥善驚氣海主之

暴疝少腹大熱關元主之

陰疝氣疝天樞主之

癩疝大巨及地機中都主之

陰疝痿莖中痛兩丸騫臥不可仰臥刺氣街主之

陰疝冲門主之

男子陰疝兩丸上下小腹痛五樞主之

陰股內痛氣癰狐疝走上下引少腹痛不可俛仰商丘主之

狐疝太冲主之

陰跳遺溺小便難而痛陰上下人腹中寒疝陰挺出偏大腫腹臍痛腹中悒悒不樂大敦主之

腹痛上搶心心下滿癰莖中痛怒瞋不欲視泣出長太息行間主之

癩疝陰暴痛中封主之

疝癰臍少腹引痛腰中痛中封主之

氣癰癩疝陰急股樞內廉痛交信主之

陰跳腰痛實則挺長寒熱攣陰暴痛遺溺偏大虛則暴癃氣逆腫睾卒疝小便不利如癰狀數噫恐悸氣不足腹中悒悒少腹痛堅中有熱如有瘕肉狀如著欲出背攣不可俛仰蠡溝主之

丈夫癩疝陰跳痛引纂中不得溺腹中支脅下榰滿閉癃陰痿後時洩四肢不收實則身疼痛汗不出目眩眩然無所見怒欲殺人暴痛引髓下節時有熱氣筋攣膝痛不可屈伸狂如新發鼠不食喘呼少腹痛引噫足厥痛溏泉主之

癰疝然谷主之

卒疝少腹痛照海主之病在左取右右取左立已

疝四肢淫漯身悶至陰主之

千金方曰失精筋攣陰縮入腹相引痛灸中封五十壯在內踝前筋裏宛宛中

又云灸下滿各五十壯老人加之小兒隨年壯法

會陰主陰頭寒

行間主莖中痛

陰谷主陰痿不用小腹急引陰內廉痛

陰纍灸足大趾下理中十壯隨腫邊灸之肘後方云灸足趺趾第二節下橫文正中央五壯姚氏云足趺指本三壯

陰腫痛灸大敦三壯

曲泉主癩疝陰跳痛引臍中不尿陰痿一云痛引莖中不得尿

中都主癩疝崩中

中院主衝疝冒死不知人

合陽中郤主癩疝崩中腹上下痛腸澼陰暴敗痛

照海主四肢淫濕身悶陰暴起疝

太谿主胞中有大疝瘕積聚與陰相引

關元主癩疝又云主暴疝痛

肩井旁肩解與臂相接處主偏癩

臍中石門天樞氣海主小腹疝氣遊行五藏繞臍痛冲胃不得息

四滿主臍下疝積

大陰郤衝門主疝疾陰疝

天樞主氣疝嘔

大巨主癩疝偏枯

少府主陰痛實時挺長寒熱陰暴痛遺尿偏虛則暴癢氣逆卒疝小便不利

大赫然谷主精溢陰上縮

陰市主寒疝下至腹脅膝腰痛如清水小腹諸痛按之下至膝上伏兔中寒疝痛腹脹滿痿少氣

太冲中封地機主癩疝精不足又云太冲主狐疝嘔厥

陰交石門主兩丸騫又云石門主腹滿疝疾

太冲主兩丸騫縮腹堅不得臥

濟生方曰陰卵偏大癩病關元在臍下三寸灸百壯良

七疝用鹽半斤炒極熱以故帛包熨痛處

儒門事親曰疝病以艾炷放疝邊豎紋左右交互灸七壯

東垣十書曰卒疝痛刺足厥陰

奇效良方曰張仲文神仙灸法腰膝重痛不可轉側起坐難及冷痹脚筋攣急不可轉側屈伸灸曲膝兩文頭左右脚四處各三壯每灸一脚二火齊下艾炷到肉初覺疼痛用二人兩邊齊吹至火滅午時著灸人定以來藏腑自動一兩行或轉動如雷聲其疾立愈此法神效卒不可量

醫學綱目曰內經刺灸小腹痛共四法一曰肝經曰肝病者兩脅下痛引小腹取其經厥陰少陽又曰邪客厥陰之絡令人卒疝暴痛刺足大指爪甲上與肉交者各一痏男子立已女子有頃已左取右右取左者是也

二曰小腸經曰小腸病者小腸痛腰脊控睾而痛時窘之後取巨虛下廉又云小腸控睾引腰脊上衝心邪在小腸取之盲原以散之刺太陰以予之取厥陰以下之巨虛下廉以去之按其所過之經以調之是也又云疝暴痛取足太陰厥陰盡刺去其血絡

三曰膀胱經云膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之卽欲小便而不得取委中央又云小腹痛腫不得小便邪在三焦約取之足太陽大絡者是也

四曰督任衝脈經曰督脈生病從少腹上衝心而痛不得前後爲衝疝任脈爲病男子內結之疝女子帶下瘕聚是也

元藏發動臍下痛不可忍取氣海三陰交立愈左取右右取左

疝氣少腹偏痛取大敦二分沿皮向後三分瀉之幷灸左取右右取左三陰交一寸瀉十呼

又法取大敦水道小海

又法取中極印腎

卒疝少腹痛不可忍取大敦三分陷六呼灸七壯

陰市三分灸五壯照海三分灸七壯已上皆左取右右取左

痃癖小腸膀胱腎餘疝氣取氣海五樞各用燔針刺入五分灸百壯又取三里三陰交

疝取三陰交三里足三間

疝取行間三里

大法疝病取關門關元水道三陰交不已再取海底歸來

少腹痛取關元三里

內經刺灸癩疝共四法其一節此篇文所謂鈹石取睾囊中水液者是也其法今世人亦多能之睾丸囊大如斗者中藏穢液必有數升信知此出古法也

其二取肝經云足厥陰之脈是動則病丈夫癩疝婦人少腹腫是也是於足厥陰肝經視盛虛熱寒陷下而施補瀉留疾與灸也

其三取肝之絡經云足厥陰之別名曰蠡溝去內踝五寸別走少陽其別者循脛上睾結於莖其病氣逆則睾腫卒疝取之所別是也是於內踝上五寸貼脛骨後近肉處蠡溝取之也

其四取足陽明筋經云足陽明之筋聚於陰器上腹其病轉筋髀前腫癀疝腹筋急治在燔針劫刺以知爲數以痛爲輸是也是於轉筋痛處用火針刺之也

治偏墜當外腎縫沿皮針透卽消

木腎紅腫如升大不痛取大敦三陰交海底歸來在水道下二寸針入二寸半灸七壯

木腎紅腫陰汗偏墜取關門在毛際玉莖旁開二寸針入二寸半又取三陰交

古今醫鑑曰治一切偏墜氣痛用苘麻子一歲一粒去皮研爛貼頭頂顖上却令患者仰臥將兩脚掌相對以帶上綁二中指於兩指合縫處艾炷大灸七壯卽時上去

古今醫統曰潔古云男子陰頭女人陰中痛宜灸刺大敦恠穴陰中濕癢外腎生瘡灸瀉海底

男子陰囊冷女子陰中寒歸來穴灸之

外科正宗曰火針法治魚口便毒橫痃等證用行藥不得內消者用粗線針二條將竹筯一頭劈開將針雜分半許夾在筯頭內以線紮緊用桐油燈盞內貯之燈草五根挑入油內點著用針蘸油燒紅向患頂重手刺入五六分隨出或血或膿以膏蓋貼卽得輕便以後漸愈盡者兼服十全大補湯完口

灸偏墜法候取天曉不犯人神日患者平身仰臥取木腎子根下硬梗盡處以墨點記用安豆大艾炷三年之內灸七壯年多者灸九壯十一壯爲止內服木香補腎丸戒食生冷兼忌房事百日爲妙

景岳全書曰治疝用泥葱白一握置臍中上用熨斗熨之或上置艾灼之妙

又法以葱白爲一束去鬚葉切爲寸厚葱餅烘熱置臍上仍以熨斗熨之尤便而妙

導引

醫學入門曰疝病導引法坐舒兩脚以兩手捉大拇指使足上頭下極挽五息止引腹中氣週行身體去疝瘕病利諸竅往來易行久行清爽聰明修長

一法以兩手合搓一二百回以熱手捻大子久久自消而痛亦止

醫方考曰外腎因撲損而傷睾丸偏大有時疼痛者中有死血名曰血疝宜於夜分之時自以一手托其下一手按其上由輕至重九弄百遍彌月之間瘀血盡散陳氣皆行誠妙術也雖年深日久無不愈之疾

保生祕要曰小腸疝氣導引法用手緊頂幽闕納氣數口而緊緊頂閉納之立見功效

運功法因慾火積滯外腎復感冷氣故作脹痛不可勝言注意從外腎提氣至內腎又運二七遍卽從內腎想一火提至頂門外略凝而後行吹吸之法

偏墜外法熨以椒囊散其寒冷待溫熱後作意升法行之

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百二十六卷目錄
醫部彙考二百六
前陰門七
醫案

史記倉公傳曰安陵阪里公乘項處病臣意診脈曰牡疝牡疝在鬲下上連肺病得之內臣意謂之慎毋爲勞力事爲勞力事則必嘔血死處後蹴踘要厥寒汗出多卽嘔血臣意復診之曰當旦日日夕死卽死病得之內所以知項處病者切其脈得番陽番陽入虛裏處旦日死一番一絡者牡疝也臣意曰他所診期決生死及所治已病衆多久頗忘之不能盡識不敢以對

齊北宮司空命婦出於病衆醫皆以爲風入中病主在肺刺其足少陽脈臣意診其脈曰病氣疝客於膀胱難於前後漫而溺赤病見寒氣則遺溺使人腹腫出於病得之欲溺不得因以接內所以知出於病者切其脈大而實其來難是厥陰之動也脈來難者疝氣之客於膀胱也腹之所以腫者言厥陰之絡結小腹也厥陰有過則脈結動動則腹腫臣意卽炙其足厥陰之脈左右各一所卽不遺溺而漫清小腹痛止卽更爲火齊湯以飲之三日而疝氣散卽愈

游宦紀聞曰辛稼軒自北方還朝官建康忽得癩疝之疾重墜大如杯有道人教以取葉珠（卽薏苡仁也）用東方壁土炒黃色然後水煮爛入砂盆內研成膏每用無灰酒調下二錢卽消沙隨先生晚年亦得此疾辛親授此方服之亦消然城郭人患不能得葉珠只於生藥鋪買薏苡仁亦佳按本草薏苡仁上等上之藥爲君主養命多服不傷欲輕身養命不老延年者本上經味甘微寒無毒主拘攣不可屈伸除風濕痺下氣除筋骨寒邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食久服輕身益氣其根下三蟲生眞定平澤及田野八月採實採根無時今在在有之眞良藥也蜀中巴蓬間甚多士大夫以此相饋遺雜之飲食間也饒之城中有宗子善平病腎虛腰痛沙隨先生以其尊人所傳宋誼叔方用杜仲酒浸透炙乾搗羅爲末無灰酒調下趙如方製之三服而愈

儒門事親曰律科王敏之病寒疝臍下結聚如黃瓜每發遶腰急痛不能忍戴人以舟車丸猪腎散四五行覺藥繞病三五次而下其瀉皆水也猪腎甘遂皆苦寒經言以寒治寒萬舉萬全但下後忌飲冷水及寒物宜食乾物以寒疝本是水故也卽日病減八分食進一倍又數日以舟車丸百餘粒通經散四五錢服之利下候三四日又服舟車丸七八十粒猪腎散三錢乃健步如常矣

一僧病疝發作冷氣上貫齒下貫腎緊若繩挽兩睾時腫而冷戴人診兩手脈細而弱斷之曰秋脈也此因金氣在上下伐肝木木畏金抑而不伸故病如是肝氣盤礴不能下榮於睾丸故其寒實非寒也木受金制傳之胃土胃爲陽明故上貫齒病非齒之病肝木者心火之母也母既不伸子亦屈伏故下冷而水化乘之經曰木鬱則達之土鬱則洩之令涌洩四次果覺氣和睾丸癢而暖戴人曰氣已入睾中矣以茴香莪朮之藥使常服之首尾一月而愈

霍秀才之子年十二歲睾丸一旁腫墜戴人見之曰此因驚恐得之驚之爲病上行則爲嘔血下則腎傷而爲水腫以琥珀通經散一瀉而消散

汝南司候李審言因勞役王事飲水坐濕地乃濕氣下行流入脬囊大腫痛不可忍以金鈴川楝子等藥不效求治於戴人曰可服洩水丸審言惑之又數日痛不可堪竟從戴人先以舟車丸瀉川散下青絲沫十餘行痛止次服茴香丸五苓散以調之三日而腫退至老更不復作夫疝者乃肝經也青沫者肝之色也

東垣十書曰一富者前陰間嘗聞臊臭又因連日飲酒腹中不和求予治之予應之曰夫前陰者足厥陰之脈絡陰器出其挺孔凡臭者心之所主散入五方爲五臭入肝爲臊此其一也當於肝經中瀉行間是治其本後於心經中瀉少衝乃治其標如惡針當用藥除之酒者氣味俱陽能生裏之濕熱是風濕合於下焦爲邪故經云下焦如瀆又云在下者引而竭之酒是濕熱之水亦宜決前陰而去之

證治準繩曰飽兒二十餘歲玉莖挺長腫而痿皮塌

常洞磨股不能行兩脅氣上手足倦弱先以小柴胡加黃連大劑行其濕熱略加黃蘗降其逆上之氣其挺腫漸消漸減及半但莖中有堅塊未消遂以青皮一味爲君佐以散風之劑末服外以絲瓜汁調五倍子末敷之而愈

平江王氏子年三十歲忽陰挺長腫而痛脈數而實用砂硝荊芥湯浸洗又用三一承氣湯大下之愈

一鄰人年三十餘性狡而躁素患下疳瘡或作或止夏初患自利肩上微悶醫與治中湯兩貼昏悶若死片時而甦予脈之兩手皆滑重取略弦似數予曰此下疳瘡之深重者與當歸龍薈丸去麝四貼而利減又與小柴胡去半夏加黃連芍藥川芎生薑煎五六貼而安

予嘗治一人病後飲水患左丸痛甚灸大敦穴適有摩腰膏內用烏附丁香麝香將與摩其囊上橫骨端火温扇覆之痛即止一宿腫亦消

予舊有柑橘積後因山行饑甚遇橘芋食之橘動舊積芋復滯氣即時右丸腫大寒熱先服調胃劑一二貼次早注神思氣至下焦嘔逆覺積動而吐吐後和胃氣疏通經絡而愈

赤岸朱同道年四十歲八月望雨後得凉半夜後腹痛甚汗如雨兩脚踏破壁痛在小腹手不可近六脈弦而細實重取如循刀刃責責然問之云六月大熱時於深潭浴水病或起於此與大承氣湯大便微利痛遂頓止至次日酉時其痛復作痛在小腹堅硬手不可近又與大承氣加桂兩服研桃仁同煎大便下紫黑血升餘而痛頓止至次日酉時痛復作如初脈雖少減而責責然猶在與大承氣湯加附子兩貼研桃仁同煎下大便五行得黑紫血如破絮者二升許痛遂頓止一夜得睡次日酉時痛復如初詢之小腹和軟痛在臍腹間其脈亦和似若無病但呻吟如舊詢知乃食蘿蔔菜苗羹兩頓與小建中湯一貼愈

鄭子敬因吃酒後飲水與水果病偏腎大時作痛聲或作痛用枳實一兩炒茴香鹽炒梔子炒各三錢研煎下保和丸而愈

昌世官病膀胱氣下墜有如雷聲予用臭橘子核炒十枚桃仁二十枚蘿蔔自然汁研下保和丸七十粒而愈

湜兄年三十左腎核腫痛此飲食中濕墜下成熱以臭橘核五枚桃仁七枚細研順流水一盞煎沸熱下保和丸而愈

衛生寶鑑曰癸丑歲奉詔至六盤山上命治火兒赤紐鄰久病疝氣復因七月間饑飽勞役過飲潼乳所發甚如初面色青黃不澤臍腹陣痛擣撮不可忍腰曲不能伸熱物熨之稍緩脈得細小而急予思難經云任之爲病男子內結七疝皆積寒於小腸之間所致也非大熱之劑不能愈遂制一方名之曰沉香桂附丸服之而癒

趙運使夫人年五十八歲於至元甲戌三月中臍腹冷疼相引脅下痛不可忍反復悶亂不得安臥予以當歸四逆湯主之先灸中庭穴即愈

醫學綱目曰楊淳三哥因舊有腎氣上引乳邊及左脅痛多痰有時膈上痞塞大腑祕結平時少汗脈弦甚與保和温中各二十九研桃仁榔李仁吞之愈

姬提領因疾服凉劑數日遂病臍腹下大痛幾至於死與薑附等劑雖稍蘇痛不已隨於本方內倍芍藥服之愈

三十七太尉忽患小腸氣痛醫官及京城醫家用藥皆不效每一發幾死上召杜至進藥數服不驗太尉曰我命不久致良醫不能治上召杜問所以杜對臣用古方書皆不獲愈今日撰一方已成未敢進先合藥以進太尉一服十愈八九再服全愈然後進方名曰救命通心散川烏頭一兩用青鹽一錢酒一盞浸一宿去皮尖焙乾川楝子一兩用巴豆二十一粒同炒候黑色去巴豆茴香半兩石燕一對土狗五枚芥子一錢六分爲末每服三錢入羊石子內濕紙裹煨香熟夜半時用好酒半斤入鹽細嚼石子以酒嚥下不得作聲小便大利其病遂去

項在獄城日欽尉朱荀甫病膀胱氣作疼不可忍醫者咸以剛劑與之而痛愈甚小便不通已三日矣臍下虛脹心悶予因候之見其面赤黑脈洪大予曰投熱藥太過陰陽痞塞氣不得通爲之奈何朱尚手持四神丹數粒云醫謂不止更服此予曰若服此定斃後無悔渠求治予適有五苓散一兩許令作三服用連鬚葱一莖茴香一撮鹽一錢水一盞半煎至七分令接續而服中夜下小便如墨汁者一二升臍下寬得睡翌日診之脈已平安矣續用硇砂丸與之數日癒

嘗治一男子下疳瘡每恣飲酒則發醫與小柴胡湯加黃連數貼不效又與玉燭散下之反劇予以甘草節小建中湯各半煎服之下咽痛止後以四物湯建

中甘草等分與之遂安

醫宗必讀曰常州尹文輝嗜火酒能飲五斤五月間入閩中溪水驟漲涉水至七里覺腹痛之甚半月後右丸腫大漸如斗形閩中醫者與肝經之劑及溫熱之品半載無功歸而就商於余余曰嗜火酒則濕熱滿中涉大水則濕寒外束今病在右正是脾肺之濕下注睾丸以胃苓湯加梔子枳殼黃蘗茴香十劑而略減即以為丸服至十八斤全安經今十五年不再發

文學駱元賓十年患疝形容枯槁余視之左脅有形其大如臂以熱手握之瀝瀝有聲甚至上攻於心悶絕者久之熱酢惠炙方甦余曰此經所謂厥疝也用當歸四逆湯半月積形衰小更以八味丸間服喜其遵信余言半載無間積塊消盡嗣後不復患矣

薛氏醫按曰學士徐崦西口乾有痰欲服瓊玉膏余曰此沉陰降火之劑君面白口乾而有痰屬脾肺氣虛也當用溫補之劑不信仍服兩月餘大便不實飲食少思且兼陰痿始信余言先用補中益氣加茯苓半夏二味以溫補脾胃飲食漸加大便漸實乃去二味服月餘而痿更服六味丸三月餘陰道如常矧瓊玉膏固本丸坎離丸此輩俱是沉寒瀉火之劑非腸胃有燥熱者不宜服若足陰經陰虛發熱者久而服之令人無子蓋謂損其陽氣則陰血無所生故也慶驗

一婦人吐痰發熱遍身痛小便類數陰中作癢日晡熱甚余曰此肝脾血虛氣滯而兼濕熱也用加味逍遙散加車前子而愈

靳閣老子玉莖腫痛服五苓散等藥不應予診其脈左關弦數此肝經積熱而成以小柴胡湯送蘆薈丸一服勢去三四再服頓愈

黃吏部設道前水道後患毒瘍痛寒熱此肝經濕熱所致名曰懸癰屬陰虛證先以製甘草二服頓退再以四物湯加車前子青皮甘草節酒製黃蘗知母數服而消

一弱人陰莖根結一核如大豆許若少勞則腫痛先以十全大補湯去桂加車前子麥門冬酒製黃蘗知母少愈更服製甘草漸愈仍以四物湯加車前之類而消

一人患懸癰瘍痛發熱以龍膽瀉肝湯二劑及製甘草四劑而潰再用滋陰之劑而愈若或膿未成以葱炒熱數上冷易之隔蒜灸之亦可數日不消或不潰或潰而不斂以十全大補湯加柴胡梢為主間服製甘草並效若不保守必成漏矣

一男子患懸癰瘍痛發寒熱以小柴胡湯加製甘草二劑少退又製甘草四劑而消大抵此證屬陰虛故不足人多患之寒凉之劑不可過用恐傷胃氣惟製甘草一藥不損氣血不動臟腑其功甚捷最宜用之不可忽也

一男子患懸癰腫痛小便赤澀以加減龍膽瀉肝湯加製甘草二劑少愈以參芪歸朮黃蘗知母製甘草四劑而潰更以四物湯加黃蘗知母參芪製甘草而痊

一男子患懸癰久而不斂脈大而無力以十全大補湯加五味子麥門冬灸以豆豉餅月餘而愈

一老人患懸癰年餘不斂診其脈尚有濕熱以龍膽瀉肝湯二劑與服而濕退乃以托裏藥及豆豉餅灸之愈

一男子患懸癰腫痛發熱以小柴胡湯加黃連青皮四劑少愈更以加減龍膽瀉肝湯而消

一男子患懸癰腫痛未作膿以加減龍膽瀉肝湯二劑少愈以四物湯加木通知母黃蘗而消

一男子患懸癰膿熟不潰脈痛小便不利急針之尿膿皆利更以小柴胡湯加黃蘗白芷金銀花四劑痛止以托裏消毒散數劑而愈常見患者多不肯用針待其自破殊不知緊要之地若一有膿宜急針之使毒外發不致內潰故前人云凡瘡若不針烙毒結無從而解膿瘀無從而洩又云宜開戶以逐之患者反謂地部緊要而不用針何其相違之遠哉

一男子患懸癰膿熟不潰脈數無力此氣血俱虛也欲治以滋陰養氣血之劑更針之使膿毒外洩彼疑而不從仍用降火敗毒藥致元氣愈虛瘡勢愈盛後潰不斂竟至不救夫懸癰之證原係肝腎二經陰虛雖一於補尤恐不治況膿成而又尅伐不死何俟常治初起腫痛或小便赤澀先以製甘草一二劑及隔蒜灸更飲龍膽瀉肝湯若發熱腫痛者以小柴胡湯加車前黃蘗川芎當歸膿已成即針之已潰者用八珍湯加製甘草柴胡梢酒炒黃蘗知母小便澀而脈有力者仍用龍膽瀉肝湯加製甘草小便澀而脈無力者用清心蓮子飲加製甘草膿清不斂者用大補之劑間以豆豉餅灸之久而不斂者用附子餅灸之並效

尚寶鮑希傳足發熱服四物黃蘗知母之類年餘患懸癰唾痰作渴飲湯其熱至膝更加黃連二陳熱痰益甚謂余曰何也余曰此足三陰虧損水泛爲痰寒凉之劑傷胃而甚耳遂朝用補中益氣夕用六味丸間佐以當歸補血湯半載乃愈

趙州守患懸癰腫多作痛已五月餘矣晡熱口乾盜汗食少體倦氣短脈浮數而無力此足三陰氣血俱虧損也用補中益氣湯加製甘草五味子麥門冬三十餘劑食進熱緩又用六味丸料五十餘劑膿潰瘡斂後因怒作痛少食發痛發熱仍用前藥賴其禀實愼疾而愈

一鄉人年三十有下疳瘡雖屢求治以其不能忌口却之愈一日頭痛發熱自汗衆作傷寒陽證治之反劇予診其脈弦甚七至重按則澀予曰此證在厥陰藥與證不相應遂作小柴胡湯加草龍膽黃連胡黃連帶熱服四劑而病脫然

庶吉士劉華甫或莖中作痛或竅出白津或小便祕澀先用小柴胡湯加山梔澤瀉黃連木通膽草茯苓二劑以清肝火導濕熱諸證漸愈後因勞倦忽然寒熱此元氣復傷也用補中益氣湯而安又用六味丸生肝血滋腎水而全愈

州守姜節甫患下疳膿水淋漓作渴吐痰午前惡寒午後發熱余曰午前惡寒屬陽氣虛弱午後發熱屬陰血不足不信反服二陳黃蘗知母之類飲食益少大便不實又日晡熱渴小腹重墜患處燃痛乃用四物湯加黃蘗知母之類飲食亦不思余以脾氣虛而下陷先用補中益氣湯調養脾胃以升陽氣諸證漸愈又用六味丸滋補腎水以生肝血而痊

一小兒十五歲患下疳雜用消毒之藥虛證悉具二年餘矣詢之乃稟受所致用蓽解湯月餘諸證漸愈又用補陰八珍補中益氣二湯而痊

一儒者莖中作癢發熱倦怠外皮浮腫二年矣用八珍加柴胡山梔及六味地黃丸而愈有衆陰毛間生蟲作癢者用桃仁研爛塗之

一儒者因勞而患下疳燃痛寒熱體倦頭痛小便赤澀用補中益氣湯加車前牛膝山梔而愈

一儒者陰莖腐爛腫痛不止日晡熱甚口乾體倦食少欲嘔此肝脾血虛也先用六君子加柴胡升麻脾胃醒而諸證退更以補中益氣加炒山梔肝火退而腫痛痊

一老人患疳小便淋瀝脈細體倦此氣虛兼濕熱也用清心蓮子飲及補中益氣湯治之而愈

一弱人拗中作痛小便淋瀝此因火燥下焦無血氣不能降而滲洩之令不行用四物湯加黃蘗知母茯苓牛膝木通十餘貼痛止便利

先君氣短拗中苦痛小便不通製四物湯加參芪煎吞滋腎丸而愈蓋前證以虛爲本以病爲末益其本則末自去設若不固元氣專攻其病害滋深矣

王錦衣年踰四十素有淋患疳瘡燃痛倦怠用小柴胡湯加黃連黃蘗青皮當歸而愈

杜舉人名京年踰三十陰囊濕癢莖出白物如膿舉則急痛此肝疝也用龍膽瀉肝湯而愈有陰莖腫或縮或挺或癢亦以此藥治之

王上舍遺精勞苦愈甚拗中結核服清心蓮子飲連翹消毒散不應予以八珍湯加山藥山茱萸遠志十餘劑漸愈更以茯菟丸治之遂不復作蓽巡檢患此云諸藥不應虛丹谷與八味丸治之而愈

一男子患下疳腫硬燃痛寒熱先以人參敗毒散二劑而止更以小柴胡湯加黃連青皮治之而愈

一男子下疳潰而腫痛小便赤澀以加減龍膽瀉肝湯加青皮黃連二劑少愈以小柴胡湯加黃蘗知母當歸茯苓數劑而愈

一男子因勞莖竅作癢時出白物發熱口乾以清心蓮子飲治之而安

一男子下疳潰而腫痛發熱日晡尤甚以小柴胡湯加黃連知母當歸而愈

一男子下疳已愈惟莖中一塊不散以小柴胡湯加青皮荆防服之更以荆芥防風牛膝何首烏滑石甘草各五錢煎湯熏洗各數劑而消

一男子莖腫不消又一男子潰而腫痛發熱小便祕澀日晡或熱又一小兒腫痛諸藥不應各以小柴胡湯吞蘆薈丸數服並愈

一男子玉莖腫痛小便如淋自汗甚苦時或尿血少許尺脈洪數按之則澀先用清心蓮子飲加牛膝山梔黃蘗知母柴胡數劑少愈更以滋腎丸一劑而痊

玉機微義云如自汗小便少不可以藥利之既已自汗則津液外亡小便自少若利之則榮衛枯竭無以制火煩熱愈甚當俟熱退汗止小便自行況此證乃陽明經大忌利小便也

一男子陰莖或腫或作痛或挺縱不收一男子莖中作痛筋急縮或作癢白物如精隨溺而下此筋疝也

並用龍膽瀉肝湯治之皆愈張子和曰遺溺閉癃陰痿腎痹精滑白淫皆男子之疝也不可妄歸之腎冷若血涸不月月罷腰膝上熱足躠蹙乾癯閉少腹有塊或定或移前陰突出後陰痔核皆女子之疝也但女子不謂之疝而謂之瘕

一男子患便毒腫而不潰余謂此因陽氣虛弱用參芪歸朮以補托元氣用白芷皂角刺柴胡甘草節以排膿清肝數劑而潰以八珍加柴胡補其氣血數劑而愈

胡判官患便毒膿稀脈弱以十全大補湯加五味麥門白蔹三十劑稍愈更以參芪歸朮膏而平因新婚復發聚腫堅硬四肢冷脈弱皮寒飲食少思此虛極也仍用前藥加桂附三劑稍可彼欲速愈自用連翹消毒飲洩利不止而歿

京臺王文遠年踰四十素勞苦患便毒發寒熱先以小柴胡湯加青皮一服表證悉退次以補中益氣湯加穿山甲二劑腫去三四更以托裏之藥五六服膿成刺去旬日而斂

一人便毒腫而不潰以參芪歸朮甘草節皂角針白芷柴胡數劑而潰以八珍湯加柴胡數劑愈

一人便毒潰而腫不消且不斂診脈浮而濇以豆豉灸更以十全大補湯月餘而愈

一老婦便毒腫痛膿未作小便澀肝脈數以加減龍膽瀉肝湯加山梔黃蘗四劑而消

一儒者便毒腫痛便澀用八正散二劑清肝火導濕熱而腫痛愈更以小柴胡加芎歸澤瀉山梔二劑清肝火補脾血而小便利

一男子便毒潰而腫痛不止此餘毒未解用活命飲一劑而痛止再劑而腫消

一男子便毒痛甚發熱用前飲一劑痛止再以神效瓜蔞散加山梔柴胡二劑而消

一男子便毒已潰而痛不止小便祕澀此肝火未解也與小柴胡湯加黃蘗知母芎歸痛止便利更以托裏當歸湯而瘡斂若未解而痛不止者須用活命飲消之

一人便毒膿未成大痛服消毒托裏內疏藥不應脈洪大毒尚在以仙方活命飲一劑痛止又劑而消

一人便毒潰而痛不止諸藥不應診之脈大按之則數乃毒未解也以仙方活命飲而止又一劑而消

一人便毒腫痛日晡發熱以小柴胡加青皮天花粉四劑痛止熱退以神效瓜蔞散四劑而消

沈尹文年二十左拗患便毒余以肝腎陰虛先用托裏藥潰而將愈因入房發熱作渴右邊亦作痛膿水清稀虛證悉至脈洪大而無力勢甚可畏用十全大補加附子一錢脈證頓退再劑全退後用大補湯三十餘劑而痊

一人便毒腫痛惡寒發熱以荊防敗毒散二劑而止以雙解散二劑而消

一人便毒煩腫作痛大小便祕脈有力以玉燭散二劑頓退更以龍膽瀉肝湯四劑而消

一人便毒服尅伐藥以求內消致瀉利少食以二神丸先止其瀉以十全大補倍加白朮茯苓數劑消

一婦素清苦因鬱怒患便毒或用敗毒寒涼之藥反脯熱內熱自汗盜汗月經不行口乾咽燥余謂此鬱氣傷脾因藥復損先以當歸湯數劑後兼逍遙散各五十餘劑而諸證皆愈

一舉人凌待之年踰四十患便毒尅伐太過飲食少思大便不實遺精脈微東垣云精滑不禁大便自利腰脚沉重下虛也仲景曰微弱之脈主氣血俱虛也先以六君子湯加破故紙肉豆蔻煎服瀉止食進更以十全大補湯加行經藥十餘劑而消

一男子膿熟作脹致小便不利令急針之以小柴胡湯加黃蘗白芷金銀花四劑少愈更以托裏消毒散數劑而愈

一男子陰囊腫狀如水晶時痛時癢出水小腹按之作水聲小便頻數脈遲緩此醉後飲水入房汗出遇風寒濕毒乘聚於囊為患名水疝也先以導水丸二服腹水已去小便如常再飲胃苓散倍用白朮茯苓更用氣針引去聚水而痊

一弱人囊癰腫痛未成膿小便赤澀以製甘草青皮木通黃蘗當歸麥門冬四劑少愈以清心蓮子飲而消

一男子囊癰煩腫痛甚小便澀發熱脈數以龍膽瀉肝湯倍用車前子澤瀉木通茯苓四劑勢去半仍以前湯止加黃蘗金銀花四劑又減二三便利如常惟一處不消此欲成膿也再用前湯加金銀花白芷皂角刺六劑微腫痛脈滑數乃膿已成令針之腫痛悉退投滋陰托裏藥及紫蘇末敷之而愈

一男子囊癰病勢已甚脈洪大可畏用前湯二劑腫少退以仙方活命飲二劑痛少止診其脈滑數乃膿已成須針之否則陰囊皆潰彼疑余言遂用他醫果

大潰峯丸掛懸復求治診之脈將靜以八珍湯加黃芪黃藥知母山梔更數紫蘇末數日而痊此證勢雖可畏多得保全患者勿懼

一弱人囊癰膿熟脹痛大小便祕急針之膿出三椀許卽鼾睡覺而神思少健但針遲難敷解毒藥亦潰盡矣故用托裏藥三十餘劑始瘥大抵此證屬陰道虧濕熱不利所至故滋陰除濕藥不可缺常治腫痛小便祕澀者用除濕爲主滋陰佐之腫痛已退便利已和者除濕滋陰藥相兼治之欲其成膿用托裏爲主滋陰佐之候膿成卽針之仍用托裏滋陰藥濕毒已盡者專用托裏如膿清或多或斂遲者用大補之劑及豆豉餅或附子餅灸之

盧武選封君年踰五十患囊癰瘡口年餘不斂診之微有濕熱以龍膽瀉肝湯治之濕熱悉退乃以托裏藥及豆豉餅灸之而愈次年復患濕熱頗盛仍用前湯四劑而退又以滋陰藥而消若潰後虛而不補少壯者成漏老弱者不治膿清作渴脈大者亦不治

胡同知陝西人年踰五十陰囊腫痛得熱愈盛服蟠葱散等藥不應肝脈數此囊癰也乃肝經濕熱所致膿已成急針之進龍膽瀉肝湯脈證悉退更以托裏滋陰藥外搽杉木灰紫蘇末月餘而愈此證雖潰盡而無害患者審之

一道官年六十餘陰囊潰痛不可忍等丸露出與龍膽瀉肝湯服之及數劑炭紫蘇末不應予意此濕氣熾盛先飲槐花酒一椀次服前湯少愈更服托裏加滋陰藥月餘而平設以前藥不應加之峻劑未有不損中氣以致敗也

一人連日飲酒陰挺并囊濕癢服滋陰等藥不應予謂前陰肝脈絡也陰器縱挺而出索有濕繼以酒爲濕熱合於下焦而然經曰下焦如瀆又云在下者引而竭之遂以龍膽瀉肝湯及清震湯而愈此或不應宜補肝湯及四生散治之

儒者陳時用考試不利一夕飲燒酒入房妻不納翌日陰囊腫脹燄痛遣人求治予以除濕熱清肝火之劑城門夜閉不及歸服翌早報云夜來陰囊悉腐玉莖下面貼囊者亦腐此肝火挾酒毒而濕熱熾盛也仍以前藥加參芪歸朮四劑腐肉盡脫睪丸懸掛用大補氣血藥并塗當歸膏囊莖全復而愈

給事陸貞山囊癰腫赤脹痛小便澀滯寒熱作渴此肝腎陰虛濕熱下注也當清肝火除濕毒遂用柴胡炒龍膽吳茱萸炒黃連當歸金銀花皂角刺赤芍藥防風木通甘草節一劑腫痛漸退少加防風木通川芎茯苓作飲下滋腎丸以補陰其熱腫俱退但內有一條筋不消此肝經血氣虛損也當滋腎水用六味丸料去茯苓加玉味二劑再用補中益氣加茯苓作飲送滋腎丸筋頓消而愈

京兆朱二峯陰囊脹痛彼以爲疝予診其脈數而滑此囊癰也因肝腎二經陰虛濕熱所致膿已成矣服活命飲一劑而潰用補陰托裏藥而斂

一膏粱之客陰囊腫脹小便不利此中焦積熱乘虛下注先用龍膽瀉肝湯加黃蘗知母黃連牛膝四劑漸愈後用補陰八珍湯加柴胡山梔而愈後不守禁忌前證復作仍用補陰八珍湯補中益氣湯六味丸而痊又因勞發熱自用四物黃蘗知母之類虛證悉具瘡口開大予謂五臟氣血俱虛也朝用補中益氣夕用六君子加當歸各五十餘劑瘡口漸斂又用六味丸調補而愈

一男子醉而入房陰囊腫脹大如斗小腹脹悶小水淋赤發熱口乾痰涎壅甚此膀胱陰虛酒毒所乘也用六味丸料加車前牛膝作飲下滋腎丸諸證頓退再加五味子麥門冬二劑而愈却以補中益氣湯加麥門冬五味子調理而康若用淡滲復損真陰決致不起

知州王汝道先痛熱發熱肢體倦怠入房則腿足酸軟足心熱至腿膝六脈洪數兩尺爲甚余以足三陰虛欲滋補化源彼反服苦寒降火之劑後陰囊腫脹用治疝之藥腫脹益甚形氣愈虛復用溫補之劑腫痛上攻小便不利兩尺脈洪滑按之虛甚余曰此囊癰也因氣血虛而不能潰先用補中益氣湯加山藥山茱萸車前子柴胡山梔一劑腫脹頓消隨用六味丸料加車前牛膝柴胡山梔一劑小便漸通乃用活命飲與前二藥消息兼用至二十餘劑囊裂出穢膿甚多乃用托裏消毒散六劑膿穢清又用托裏散數劑膿水漸少更用補陰托裏散及十全大補湯五十餘劑而痊

一人不慎房勞患便毒腫痛以雙解散二服通之其痛卽止更以補中湯數劑而膿成針之以八珍湯加五味麥門冬柴胡三十餘劑而痊

通府張敬之患懸癰久不愈日晡熱甚作渴煩喘或用四物湯黃蘗知母之類前證益甚肢體倦怠少食大便不實小便頻數謂余曰何也余曰此脾虛之證前

藥復傷而然遂用補中益氣加茯苓半夏數劑飲食漸進前證漸愈更加麥冬五味調理乃痊經云脾屬太陰爲陰土而主生血故東垣先生云脾虛元氣下陷發熱煩渴肢體倦怠等證用補中益氣湯以升補陽氣而生陰血若誤認爲腎虛輒用四物黃蘗知母之類反傷脾胃生氣是虛其虛矣況黃蘗知母乃瀉陽益陰之劑若非膀胱陽火盛而不能生陰水以致發熱者不可用也

一男子年踰五十患懸癰膿清肝腎脈弱此不愼酒色濕熱壅滯也然膿清脈弱老年值此何以收斂況毅道前爲任脈發源之地肝經宗筋之所聚辭不可治後果死嘗治此癰惟洞水製甘草有效已破者兼以十全大補湯爲要法

一儒者患懸癰服坎離丸及四物黃蘗知母之類不應脈浮洪按之微細余以爲足三陰虛用托裏散及補陰托裏散漸愈又用六味丸補中益氣湯調補化源半載而痊大凡瘡瘍等證若腎經陽氣亢盛致陰水不能化生而患陰虛發熱者宜用坎離丸取其苦寒能瀉水中之火令陽氣衰而水自生若陽氣衰弱致陰水不能化生而患陰虛發熱者宜用六味丸取其酸溫能生火中之水使陽氣旺則陰自生況此證屬腎經精氣虧損而患者十有八九屬腎經陽氣亢盛而患者十無一二然江南之人患之多屬脾經陰血虧損元氣下陷須用補中益氣湯升補陽氣使陽生而陰長若嗜慾過多虧損眞水者宜用六味丸補腎經元氣以生精血仍用補中益氣湯以培脾肺之生氣而滋腎水經云陰虛者脾虛也但多誤以爲腎經火證用黃蘗知母之類復傷脾肺絕其化源反致不起惜哉

上舍劉克新懸癰潰後作痛發熱口乾小便赤澁自恃知醫用清熱消毒之藥不應乃延予診左尺洪數余以爲陽氣盛而陰氣虛也先用四物湯加黃蘗知母等諸劑瀉其陽氣使陰自生服數劑諸證漸愈後用補中益氣湯六味地黃丸補脾肺滋腎水而痛口愈

一儒生懸癰小便赤澁勞則足軟腫痛發熱口乾舌燥食少體倦日晡益甚此氣血虛而未能潰也遂用八珍加麥門山藥倍用製甘草數劑諸證悉退但患處腫痛此膿內燄也又五劑膿自通出又五十餘劑而瘡口將完又因勞役且停藥寒熱作渴腫痛膿多用補中益氣湯加炒山梔二劑少愈又以八珍湯加麥冬五味百餘劑腫痛悉去喜其愼起居節飲食常服補劑而安但勞則出膿一二滴後惑於他言內用降火外用追蝕必其收斂致患處大潰幾至不起仍補而愈

外科正宗曰一男子患懸癰十餘日燄腫作痛至晚發熱尤甚小水不利以龍膽瀉肝湯二服小水稍通微痛不止此欲作膿以托裏消毒散加穿山甲皂角刺澤瀉二服而膿出又與十全大補湯月餘而斂

一男子患懸癰腫甚眼痛此內膿已成即針之出臭膿椀許疼痛頓減以十全大補湯十餘服而飲食漸進燄痛亦消惟瘡口原潰之甚不易完合間用製甘草吞蠟礬丸外以附子餅灸之調理三月而愈

一男子協內結腫四日作痒微痛以九龍丹一服利五六次腫漸消又以四物加花粉黃蘗知母而愈

一男子橫痃腫痛堅硬二便澁滯以九龍丹一服通利大便腫稍減間日又用一服二便通利而消

一男子患魚口十餘日形勢已成腫痛日甚因公事急出不能行走以火針法針之出紫血鍾許外用膏貼拔出微膿服托裏消毒散而便可行亦且速愈

一男子魚口潰而口大不斂此服洩藥之過以十全大補湯加澤瀉丹皮十餘劑外搽玉紅膏月餘而斂

一男子先出疳瘡久之不愈後發橫痃十餘日始生腫痛予欲托裏潰膿以洩毒氣彼欲內消自服槐花酒蜈蚣全蝎等藥腫未得潰元氣已損轉致筋骨疼痛舉動艱辛仍復請治形體瘦弱脈虛而數此瘡元受傷邪氣從之雖當補萎後必欲發時瘡方愈彼不爲信自仍服敗毒消風等藥元氣愈虛飲食不進筋骨疼甚微夜不睡又復請治先用補中益氣湯倍參芪六服元氣稍醒又以八珍湯加麥門冬五味子遠志酸棗仁牡丹皮十餘服夜間方睡惟疼痛不能大減此內虛瘡毒下陷故難取效朝服六味丸午服十全大補湯又十餘服遍身方發紅點此瘡毒欲出仍服前藥紅點漸高始成瘡樣彼時瘡毒一出疼痛頓減元氣漸復更服八珍湯加薏仁銀花土茯苓服至半年其瘡方得漸漸而痊彼悔執方治病之尤始信因病用方之妙

一男子風寒未經發散寒中腎囊作腫痛甚以萬靈丹一服洗浴發汗寒邪頓退又以四物湯加澤瀉蒼朮山梔天花粉數如意金黃散數次而全消

一男子囊腫甚大不熱不疼按之軟而即起此濕水

流注聚而不散以鈹針導去黃水椀許以導水消腎丸服月餘而腫消又以木香補腎丸服之不作

一男子患此十餘日腫甚脹痛內膿已成針之出膿椀許以十全大補湯加澤瀉丹皮十餘劑而斂

一老人素有疝氣因怒傷肝舉發疼痛自服蟠葱散熱藥腫痛益甚視之腎囊半邊堅硬皮損紫黑此欲腐爛見睪丸候也彼不爲信尚欲內消請別醫治之內服龍膽瀉肝湯外敷四黃散寒涼等藥堅硬果腐飲食少進虛熱不睡痛甚昏憒又復請治予曰凡病有本末治有權宜初以藥治疝非疝也凡疝爲患小腹作疼牽引腎子多寒少熱好飲熱湯此證乃惱怒傷肝陰虛濕熱爲患囊紅腫發熱小便赤澀內熱口乾堅重作痛此爲囊癰之候初宜清利則愈而反用疝家熱藥已成宜用補陰托裏又用瀉肝涼劑此年老氣血有虧攻補機關已悞其疾豈有不致危亡者即當養氣血固根本爲主而佐以安神定痛之藥接補元氣死生在進退之間尚可轉也隨以八珍湯加麥冬五味子遠志牡丹皮外以甘草湯淋洗腐上將已壞黑肉盡行剪落其睪丸已露數日後其患得於補力前證漸退飲食漸進外腐已盡腎子已突大半搽玉紅膏外以膏蓋長肌漸收調理半年外而始得安

一男子腫痛十餘日堅硬無膿囊頭腫上紫色作爛此欲外腐以蟾酥錠爲末摻上膏蓋三日腐肉脫下搽玉紅膏太乙膏掩之內服補陰滋腎藥而安

一男子素有痰火久服降下之藥致腎囊下結腫疼痛脈細而數此陰虛濕熱流注而成潰後必難收斂辭不治後果出臭膿不禁日漸開大發熱不止飲食不進強以溫中健脾補托氣血終至不應而歿

一男子慾後受寒致陰囊牽引小腹作痛惡寒發熱診之脈緊數而無力以五積散一服寒熱乃退痛亦稍止更以八珍湯加肉桂丹皮澤瀉數服而愈

一童子十五歲患下疳玉莖腫痛外皮浮腫比常粗大一倍他醫治之皆以解毒清肝等藥愈腫愈痛予視之亦用瀉水清熱滲濕等劑俱不見效診之脈細數而無力此中氣不足脾經濕水乘虛流注停聚不散當行從治之法也以四物湯合平胃散加木香熟附子人參各五分一服而腫痛頓退又四五服而全消

一男子下疳玉莖腫痛發寒熱以荊防敗毒散二劑而退又以龍膽瀉肝湯腫痛亦減用四物加黃蘗知母而消

一男子年四十色慾過度小便澀痛出如白漿結凍成塊此腎傷濕熱爲患朝以八味丸午以八珍湯加山茱萸牡丹皮黃蘗知母服之月餘而澀痛亦退小便漸清但數中常有滑精不時滲出久至腰膀腳腫無力偶以三因勝濕丸服至月餘而證悉愈

一男子莖頭腐爛小水澀痛外以珍珠散內服木通湯四服澀痛亦止更服四物湯加黃蘗花粉而痊

一男子初婚玉莖傷損出血疼甚先以葱湯浸洗良久隨用珍珠散加冰片摻之腐皮漸乾痛亦漸止內服四物湯加木通山梔四服其腫痛漸止而愈

一男子皮腫光亮發熱疼甚外數如意金黃散內服龍膽瀉肝湯加大黃便痛稍愈去大黃又服而消

寓意草曰養翁王太翁先生精神內守百凡悉處謙退年登古稀面貌若童子蓋得於天全而不受人損也來從但苦脾氣不旺食飲厚白樺節邇年少腹有疝形如鵲卵數發以後其形漸大而長從少腹墜入睾囊其易返位甚難下體稍受微寒即發發時必俟塊中冷氣漸轉煖熱始得軟溜而縮入不然則鼓張於隘口不能入也近來其塊益大發時如臥酒瓶於胯上半在少腹半在睾囊其勢堅緊如石其氣迸入前後腰膀各道筋中同時俱脹繇是上攻入胃大嘔大吐繇是上攻巔頂戰慄畏寒安危止關呼吸去冬偶見暴發光景知爲地氣上攻巫只大劑參附薑桂投之一劑而愈以後但遇寒發悉用桂附速效今五月末旬值昌他往其證連日爲紫服十全大補湯二十餘劑其效甚遲然証重不疑藥輕也值年家翁老先生皆俯浙中遙議此證亦當十全大補用到百劑自效乃決意服至中秋其證復發時昌仍用薑桂參附取效令郎諫議固翁老先生兩疑而莫所從也昌請深言其理焉夫人陽不足則用四君陰不足則用四物陰陽兩不足則合四君四物而加味爲十全大補此中正和平之道也若夫濁陰之氣結聚少腹而成有形則陰盛極矣安得以陰虛之法治之助邪而滋疾乎何以言之婦女有娠者之病傷寒不得已而用麻桂葛黃等傷胎之藥但加入四物則萬藥即不能入胞而傷胎豈欲除塊中之邪反可用四物護之乎此一證也凡生癥瘕痞塊者馴至身羸血枯百計除之不減一用四物則其勢立增大四物不能生血活血而徒以增患此又一徵也人身之血脈全賴

飲食爲充長四物之滯脾原非男子所貴既已濁陰極盛時至橫引陰筋直冲陽絡則地氣之上陵者大有可慮何得以半陰半陽之藥蔓而圖之四物之不當用無疑矣即四君亦元老之官不可以理繁治劇必加以薤柱附子之猛始克勝病何也陰邪爲害不發則已其發必暴試觀天氣下降則清明地氣上升則晦塞而人身大略可觀然人但見地氣之靜而未見地氣之動也方書但言陰氣之衰而未言陰氣之盛也醫者每遇直中陰經之病尚不知所措手況雜證乎請縱譚天地之道以明之天地之道元會運世一書論之精矣至於戊亥所以混茫之理則置之不講以爲其時天與地混而爲一無可講耳殊不知天不混於地而地則混於天也蓋地氣小動尚有山崩川沸陵遷谷變之應況於地氣大動其雷碎迅擊之威百千萬億遍震虛空橫冲逆撞以上加於天寧不至混天爲一耶必至于而天開地氣稍下而高覆之體始露也必至丑而地闢地氣始返於地而太空之體始廓也其時人物尚不能生者則以地氣自天而下未至淨盡其青黃紅紫赤白碧之九氣而外更有諸多悍疾之氣從空注下者動輒綿亘千百丈如木石之直墜如箭弩之橫流人物非不萌生其中但爲諸多暴氣所摧殘而不能長育耳必至寅而駁劣之氣悉返冲和然後人物得遂其生以漸趨於繁衍耳陰氣之慘酷暴烈一至於此千古無人論及何從知之耶大藏經中佛說世界成毀至詳而無此等論說者蓋已包括於地水火風之內不必更言也夫地水火風有一而非陰邪也哉羣陰之邪釀成劫運昌之所謂地氣之混於天者非臆說矣堪輿家尚知趨天干之吉而避地支之凶奈何醫之爲道遇地氣上奔之證曾不思避其凶禍耶漢代張仲景特著卒病論十六卷祿山兵火以後蕩潰沒不傳後人無緣便見昌因悟明地氣混天之理凡見陰邪上冲孤陽擾亂之證陡進純陽之藥急驅陰氣呴呴有聲從大孔而出以闢乾坤而揭日月功效亦既彰彰如太翁之證屢用無附奏績者毋謂一時之權宜實乃萬世經常之法也但悍烈之性似非居恆所宜服即舉發時服之未免有口乾舌苦之過其不敢輕用者孰不知之而不知不得不用也即如兵者毒天下之物而善用之則民從不善用之則民叛今討寇之師監而又監制而又制強悍之氣化爲軟尻不得不與寇爲和同至於所過之地搶劫一空荊棘生而凶年兆盡驅良民而爲寇矣廟堂之上罷兵不能用兵無策大略類然昌請與醫藥之法互相籌酌夫堅塊達在少腹漫無平期而毒藥從喉入胃從胃入腸始得下究薤病未除新病必起矣於此而用治法先以薤柱附子爲丸曝令堅乾然後以參朮厚爲外廓俾喉胃間知有參朮不知有薤柱附子遞送達於積塊之所猛烈始露庶幾堅者削而窠囊可盡空也今監督之旅充滿行間壯士金錢飽他人腹性命懸他人手其不能辦寇固也而其大病在以兵護監督不以監督護兵所以迄無成功耳誠令我兵四面與寇相當而令監督於附近賊界堅壁清野與土著之民習且耕且戰之法以厚爲我兵之外廓則不至於繁騷驥而縛孟賁我兵可以賈勇而前或擊其首尾或搗其中堅或盡息夜奮以亂其爲合而擾清之功自致矣況有監督以護之於外諸凡外入之兵不敢越伍而譁庶幾民不化爲寇而寇可返爲民耳山澤之癘何如當世然聊舉醫法之一端若有可通者因并及之或問曰外廓一說於理甚長何以古法不見用耶答曰古法用此者頗多如用硃砂爲衣者取養南方赤色入通於心可以護送諸藥而達於心也如用青黛爲衣者取義東方青色入通於肝可以護送諸藥而達於肝也至於攻治惡瘡之藥包入葱藥之中更嚼葱厚嚼而吞入取其不傷喉膈而直達瘡所也即煎劑亦有此法如用大劑附桂藥煎好再投生黃連二三分一滾即取起俟冷服之則熟者內行下行而生者上行外行豈非外廓之意耶仲景治陰證傷寒用整兩附子煎熟而入生猪膽汁幾滴和之可見聖神用藥悉有法度也

景岳全書曰余嘗治一少年因偶觸穢毒遘患下疳始潰龜頭數治不效隨從馬口延入尿管以漸而深直至肛門逐節腫痛形如魚骨每過夜則臃結馬口脹不得出潤而通之則先膿後尿數洗皆不能及甚爲危懼余嘗遇一山叟傳得槐花惡方因以治之不十日而堅根漸愈半月後即自內達外退至馬口而全愈疳愈後即見些微廣瘡復與五加皮飲十餘劑而全愈向彼傳方者曰此方善治淫瘡熱毒悉從小便洩去所以能治此疳但服此者可免終身瘡毒後患然猶有解毒奇驗則在瘡發之時但見通身忽有雲片紅斑數日而沒者即皆瘡毒應發之處瘡毒已解而瘡形猶見是其驗也予初未之信及此人瘡發

之時瘡固不多而通身紅斑累見凡兩日而發予始知瘡之有奇一至於此

余嘗治一强壯少年遭酷吏之恐病似脹非脹似熱非熱絕食而困衆謂痰火宜清中焦余診之曰此恐懼內傷少陽氣索而病及心腎大虧證也遂峻加溫補參治心脾一月而起愈後形氣雖健如初而陽萎不舉余告之曰根蒂若斯腎傷已甚非少壯所宜之兆速宜培養心腎庶免他慮彼反以恐嚇爲疑全不知信未及半載竟復病而發可見恐懼之害匪小也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百二十七卷目錄

醫部彙考二百七

後陰門一

黃帝素問 陰陽應象大論 五臟別論 生氣通天論 至眞要大論
靈樞經 邪氣臟腑病形篇 癰疽篇
扁鵲難經 肛門考
孫思邈千金方 通閉辨 肛蟹論 五痔論
竇漢卿瘡瘍全書 痔分二十五 脫肛 穿襠發 生馬癰 臟毒 臀癰
劉完素六書 痔論
張從政儒門事親 脫肛 廣腸痛 痔漏腫痛
李杲十書 痔瘻論
朱震亨心法 脫肛 痔瘡 痔漏
格致餘論 臀癰
羅天益衛生寶鑑 痔漏
戴思恭證治要訣 脫肛 痔漏腸風下血痒 痔漏宜兼內外治 肛門蟲出 肛門別名
李梴醫學入門 脫肛諸因 臀癰 臀坦瘡 五痔
薛己醫按 脫肛 痔漏 臀癰
虞摶醫學正傳 痔漏
方賢奇效良方 腸澼痔漏論 脫肛論
龔信古今醫鑑 二十四證痔歌
樓英醫學綱目 痔漏
徐春甫古今醫統 痔漏 復瘡治痔法
王肯堂證治準繩 騙馬痤 穿襠發 涌泉疽 臀癰
吳崑醫方考 脫肛方論 痔漏 論痔漏諸藥
陳實功外科正宗 痔瘡論 看法 治法 臀癰論 看法 治法

張介賓景岳全書 論脫肛 論治

藝術典第二百二十七卷

醫部彙考二百七

後陰門一 臀附

黃帝素問

陰陽應象大論

清陽出上竅濁陰出下竅

註 人之清陽本乎天而出上竅人之濁陰本乎地而出下竅人之陰陽猶雲之升雨之降通乎天地之氣也

陰味出下竅陽氣出上竅

註 味有質故下流於便瀉之門氣無形故上出於呼吸之門

五臟別論

魄門亦爲五臟使水穀不得久藏

註 魄門肛門也上合於肺故名魄門五臟之濁從此而出故亦爲五臟之下竅腸胃之腐穢從此而瀉出故曰水穀不得久藏

生氣通天論

陽氣者精則養神柔則養筋開闔不得寒氣從之乃生大僂陷脈爲瘻留連肉腠

註 陽氣者內養五臟之神出而榮養筋骨有開有闔有出有入者也如失其開闔之機則寒氣從而內薄矣背爲陽陽虛則寒邪痹閉於背而形體爲之俯僂如陽虛不能爲榮血之衛邪陷於脈中而爲瘻留連於肉腠之間也

因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔

註 陽氣傷而不能爲陰之固致精血有傷而復飽食强力故見證之如此也夫肝主血而主筋食氣入胃散精於肝淫氣於筋邪傷肝而復飽食不能淫散其食氣而筋脈橫解於下矣食氣留滯則濕熱之氣澼積於陽明大腸而爲痔蓋腸胃相通入胃之食不能上淫則反下泆矣

至眞要大論

太陽之勝凝凜且至非時水冰羽乃後化痔瘧發寒厥入胃則內生心痛陰中乃瘍隱曲不利互引陰股

註 太陽寒水氣勝故凝凜且至非時水冰者勝氣在於歲半以前是以羽蟲後化也足太陽是主筋所生病者爲痔瘧者太陽寒熱之邪也厥逆而入於胃者水侮土也胃絡上通於心故心痛也陰中乃瘍是以隱曲不利而互引陰股

少陰之復痱疹瘡瘍癰疽痤痔

註 復者鬱極而復發也熱傷氣血故爲此諸病

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

腎脈微濇爲沉痔

註氣血不行故也

癰疽篇

癰疽發於尻名曰銳疽其狀赤堅大急治之不治三十日死矣

註尻乃足太陽之部分太陽之上寒水主之故亦應月而死夫腎爲陰而主骨故癰膿搏骨而不外發腑爲陽而太陽之氣主於膚表故其狀赤堅而大夫陽毒起發於外而亦致死者太陽爲諸陽主氣也

扁鵲難經

肛門考

肛門重十二兩大八寸徑二寸大半長二尺八寸受穀九升三合八分合之一

唐孫思邈千金方

通閉辨

肛門者主大行道肺大腸候也號爲通事令史重十二兩長一尺二寸廣二寸三分應十二時若臟傷熱則肛門閉塞大行不通或腫縮入生瘡若腑傷寒則肛門開大行洞瀉肛門凸出良久乃入熱則通之寒則補之

肛門主肺肺熱應肛門熱則閉塞大行不通腫縮生瘡兌通方白蜜三升煎令燥冷水中調可得爲丸長六七寸內肛門中倒身向上頭向下少時取烊斯須卽通洞泄

肛䘌論

凡得傷寒及天行熱病腹中有熱又人食少腸胃空虛三蟲行作求食蝕人五臟及下部若齒斷無色舌上盡白甚者脣裏有瘡四肢沉重忽忽善眠當數看其上脣內有瘡唾血脣內如粟瘡者心內懊憹痛悶此蟲在上蝕其五臟下脣內生瘡者其人喜眠此蟲在下蝕其下部人不能知可服此蝕蟲藥不爾䘌蟲殺人又曰凡患濕䘌者多是熱病後或久下不止或有客熱結在腹中或易水土溫涼氣著多生此病亦有乾䘌不甚泄痢而下部瘡癢不問乾濕久則殺人凡濕得冷而若痢單煮黃連及艾葉苦參之屬皆可用之若病人齒斷無色舌上白者或喜眠煩憒不知痛癢處或下痢急治下部不曉此者但攻其上不以下部爲意下部生蟲蟲蝕其肛肛爛見五臟便死燒艾於竹筒熏之

五痔論

夫五痔者一曰牡痔二曰牝痔三曰脈痔四曰腸痔五曰血痔牡痔者肛邊如鼠乳時時潰膿血出牝痔者肛腫痛生瘡脈痔者肛邊有瘡癢痛腸痔者肛邊核痛發寒熱血痔者大便清血隨大便汚衣又五痔有氣痔寒溫勞濕卽發蛇蛻皮主之牡痔生肉如鼠乳在孔中頗出見外妨於更衣鼈甲主之牝痔（集驗作酒痔）從孔中起外腫五六日自潰出膿血蝟皮主之腸痔更衣則挺出久乃縮入母猪左足懸蹄甲主之脈痔更衣出清血蜂房主之五藥皆下篩等分隨其病倍其主藥爲三分旦以井華水服方寸匕病甚者旦暮服之亦可四五服禁寒冷食猪肉生魚菜房室惟得食乾白肉病瘥之後百日乃通房內又用藥導下部有瘡內藥瘡中無瘡內孔中又用野葛燒末刀圭內藥中服藥五日知二十日差三十日愈痔痛通忌蓴菜

宋竇漢卿瘡瘍全書

痔分二十五

凡痔有五卽牡痔牝痔腸痔脈痔血痔素問曰因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔臟腑所發多由飲食不節醉飽無時恣食肥膩胡椒辛辣炙煿釅酒禽獸異物任情醉飽耽色不避嚴寒酷暑或久坐濕地恣意耽看久忍大便遂致陰陽不和關格壅塞風熱下衝乃生五痔天道失常民心益肆今痔變成五五二十五類或左或右或內或外或狀如鼠奶形如櫻桃或膿或血或痛或痒或腫或畀久而不治漸成漏矣大法以涼血爲主徐徐取效切不可用砒霜毒藥亦不可輕易割取致成漏瘡又有肛門左右別有一竅出膿血名曰單漏治之須以溫煖之劑補其內生肌之藥敷其外其竅在皮膚者易愈臟腑有損而致竅者未易治也

蓮子痔狀如蓮子也通腸痔其根生於臟內出糞卽下也氣痔感氣卽下也漏痔氣血衰敗久勞淹膩不曾洗淨而然也勾腸痔其形繞腸頭也蓮花痔形如蓮花也雞心痔形如雞心也垂珠痔其形垂下如珠也貫鍊痔穿而貫膿血也栗子痔形如栗子也菱角痔形如菱角也盤腸痔盤附腸內而生也子母痔一大一小也翻花痔形如翻花登厠卽出也鼠奶痔形如鼠奶也雙頭痔有兩頭也迫腸痔緊迫肛門者也血攻痔出血之痔也夫妻痔一圓一長卽雌雄也珊瑚痔形如珊瑚也脫肛痔肛門下脫也擔腸痔橫於肛門者也三迷痔有三珠財迷酒迷色迷實爲病起

之因故名之櫻桃痔形如櫻桃也雌雄痔乃酒色食毒不愼致中間一黑色一白色也以上諸痔名類不同其種則一何也皆由大腸傳道以成風熱深而腎虛爲冷氣相攻飽食猪雞魚膾燒酒釅酒生酒辛辣等味或登厠臟虛爲風邪所襲六氣七情所感人生素不能飲酒亦患痔者臟虛故也亦有父子相傳者母血父精而成腸風者血痔之漸也速服凉血補劑少勞戒怒遠色忌口斯能愈矣

脫肛

肺與大腸相爲表裏故肺臟蘊熱則肛閉結肺臟虛寒則肛脫出此至當之論又有婦人產育過多力盡血枯氣虛下陷及小兒久痢皆能使肛門突出治之惟溫補肺臟滋榮腸胃久則能自收矣

血虛脫肛以四物湯爲主氣虛脫肛以參芪歸朮爲主血熱以凉血爲主四物湯加黃蘗

穿襠發

此毒因辛苦得之生於窮骨穴上若不速治毒潰傷於穀道內爛臟腑卽死急服蠲毒飲

坐馬癰

此毒癰受在腎經虛毒氣熱毒傷於內大腸之經並聚成毒發爲漏瘡此乃毒證先用宣毒湯次用敗毒流氣飲後用內托追毒飲

臟毒

臟毒者生於大腸盡處肛門是也其勢兇惡皆喜怒不測飲食不節陰陽不調臟腑不和或房勞太過或飲釅戾之酒或食五辛炙煿等味蓄毒在內流積爲癰肛門腫痛大便堅硬則脹痛其旁生小者如貫珠大者如李核煎寒作熱疼痛難安勢盛腫脹翻凸虛浮早治易愈失治潰膿爛陷孔內寸許者難生膿血出而腫消痛減者易生也

臀癰

此癰受在腎經而臀屬少陽膀胱乃陰中之陰其道遠位僻藥力所難及者須預補之皆因受虛寒濕毒結聚生風故生此證也當用上下助癰藥治之如敗毒流氣飲內托流氣飲內托羌活湯是也

金劉完素六書

痔論

夫腸風痔病者所發手太陰手陽明經以應動脈謂肺與大腸爲表裏爲傳道以行糟粕腸風痔病有五種其證亦異蓋因陽氣虛而元府疎風邪乘而熱自生風濕邪熱攻於腸中致使大便澀而燥熱鬱血熱散而流溢衝浸淫腸裏故以先血後便爲熱在下先便後血爲熱在上久而不愈乃作痔

素問云因而飽食筋脈橫解房室勞傷腸澼爲痔蓋以風熱不散穀氣流溢傳於下部故令肛門腫滿結如梅李核甚者乃變成而爲瘻也五臟切宜保養勿令受邪

手陽明大腸名曰害蜚六元正紀論陽明曰司殺府大腸名害蜚謂金能害五蟲又曰司殺府謂金主殺既有此二名何以自生蟲蓋謂三焦相火盛而能制陽明金故木來相侮經曰侮謂勝己也木主生五蟲叔和云積氣生於脾臟旁大腸疼痛陣難當只宜稍瀉三焦熱莫謾多方立紀綱此言飲酒多食熱物脾生大熱而助三焦氣盛火能生土也當瀉三焦火熱退使金得氣而反制木木受制則五蟲不生病自愈矣

元張從政儒門事親

脫肛

大腸熱甚也用酸漿水煎三五沸稍熱漾洗三五度次以苦劑堅之則愈

廣腸痛

治法同上又大黃牽牛丸散奪之燥澀亦同痔漏廣腸痛腸風下血皆同臟毒治法

痔漏腫痛

乳痔腸風必肛門左右有核屬大腸經可服枳殼之屬大癖生腸風乳痔相連

凡痔漏腫痛內經曰因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔不愈變爲漏痔與漏其治同法至眞要大論云太陽之勝凝溧且至非時水冰痔瘧注云水氣太勝陽火不行此言陽火畏水鬱而爲痔又少陰之復痱疹瘡瘍癰疽痤痔注云火氣內蒸金氣外拒陽熱內鬱故爲痱疹瘡瘍疹甚亦爲瘡也熱少則外生痱疹熱多則內結癰痤小腸有熱則中外爲痔其熱復之變皆病於身後及外側也又靈樞云太陽經虛則爲痔瘧癲疾蓋水虛則爲火所乘故也可先用導水丸禹功散瀉訖次服枳殼丸木香檳榔丸更以葵菠菜通利腸胃大忌房室雞魚酒酢辛熱之物

李杲十書

痔瘻論

內經曰因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔夫大腸庚也主津本性燥清肅殺之氣本位主收其所司行津液

以從足陽明之化若旺則化生萬物者也足陽明爲中州之土若陽明衰亦能殞殺萬物故曰萬物生於土而歸於土者是也然以手足之陽明同司其化焉既在西方本位爲之害蜚司殺之府因飽食行房忍泄前陰之氣歸於大腸以致木乘火勢而侮燥金以火就燥也則大便必閉而痔漏作矣其疾甚者當以苦寒瀉火以辛溫和血潤燥疏風止痛是其治也以秦艽當歸梢和血潤燥以桃仁潤血以皂角仁除風燥以地榆破血止血以枳實之苦寒補腎以下泄胃實以澤瀉之淡滲使氣歸於前陰以補清燥使不受胃之濕邪也白术之苦甘以苦補燥氣之不足其甘味以瀉火而益元氣也故曰甘寒泄火乃假枳實之寒也古人用藥爲下焦如瀆又曰在下者引而竭之多爲大便祕澀以大黃推去之其津血益不足以當歸和血及油潤之劑大便自然耎利矣宜作剉湯以與之是下焦有熱以急治之之法也以地榆酸苦而壞胃故宿食消盡空心作丸服之曰秦艽白术丸

有白膿秦艽蒼术湯加白葵花頭五朶去蕚心青皮半錢不去白入正藥中同煎木香三分爲細末同檳榔等三味依前煎服餌古人治此疾多以歲月除之此藥一服即愈

夫痔瘻之候其名有五一曰牝痔二曰牡痔三曰氣痔四曰血痔五曰酒痔又曰腸風痔脈痔雌雄痔皆五痔之別名也其狀初生悉在肛邊或如鼠乳或結小核痒痛注悶甚者身熱惡寒諸方論之皆由房酒過度久嗜甘肥不愼醉飽以合陰陽勞擾血脈腸澼滲漏衝注下部肛邊生瘡變爲痔疾治法始覺痔作便服通氣丸槐角丸熱實者服諸利湯疏利臟腑及浴洗熏熨以取消散切忌酒麪辛熱房室肥膩稍縱嗜欲腐潰膿血或逗留淫汁歲月已深旁穿竅穴即變痔漏即須用寸金鋌子三五次痊愈若能味無味之味正味足矣事無事之事百事備矣其次服餌調節謹愼合宜未有不差者也

朱震亨心法

脫肛

脫肛屬氣熱氣虛血熱血虛

氣虛者補氣參芪芎歸升麻

血虛四物湯

血熱者凉血四物湯加炒蘗

氣熱者條芩六兩升麻一兩麴糊丸外用五倍子爲末托而上之一次未收至五七次待收乃止又東北方壁土泡湯先熏後洗

肺與大腸爲表裏故肺臟蘊熱則肛門閉結肺臟虛寒則肛門脫出又有婦人產育用力小兒久痢皆致此治之必須溫肺臟補腸胃久則自然收矣

痔瘡

痔瘡專以凉血爲主

痔者皆因臟腑本虛外傷風濕內蘊熱毒醉飽交接多慾自戕以致氣血下墜結聚肛門宿滯不散而衝突爲痔也

其肛邊發露肉珠狀如鼠乳時時滴漬膿血曰牡痔

肛邊生瘡腫痛突出一枚數日膿潰即散曰牝痔

腸口大顆發癰且痛且痒出血淋瀝曰脈痔

腸內結核有血寒熱往來登溷脫肛曰腸痔

若血痔則每遇大便淸血隨下不止

若酒痔則每遇飲酒發動瘡腫痛而流血

若氣痔則憂恐鬱怒適臨乎前立見腫痛大便艱難强力則肛出而不收矣此諸痔之外證也

治法總要大抵以解熱調血順氣先之蓋熱則血傷血傷則經滯經滯則氣不運行氣與血俱滯乘虛而墜入大腸此其所以爲痔也諸痔久不愈必至穿穴爲漏矣

痔頭向上是大腸熱甚收縮而上用四物湯解毒加枳殼白术槐角秦艽

如欲凉大腸寬大腸則用枳殼去穰入巴豆於內鐵線纏緊煑透去巴豆入藥用若丸藥則搗爛用煎藥則乾用

痔漏

漏瘡先須服補藥以生氣血用參术芪芎歸爲主大劑服之外以附子末津唾和作餅子如錢厚以艾灸之漏大炷大漏小炷小但灸令微熱不可使痛乾則易之則再研如末作餅再灸如困則止來日再灸直至肉平爲度亦有用附片灸仍用前補劑作膏貼之尤妙

澀竅用赤石脂白石脂枯礬黃丹腦子

漏竅外塞用童子小便煅爐甘石牡蠣粉

用五倍子砂硝桑寄生蓮房煎湯先熏後洗腫者用木鼈子五倍子研細末調傅

漏專以凉藥爲主

漏者諸瘻之潰漏也狼瘻鼠瘻螻瘻蛄瘻蜂瘻蚍蜉瘻蠐螬瘻浮蛆瘻轉筋瘻古所謂九瘻是也析而言

之三十六種其名目又不同焉大抵外傷四氣內窘七情與夫飲食乖常染觸蠱動含靈之毒未有不變爲瘡瘍穿孔一深膿汁不盡得冷而風邪併之於是淋漏而成漏矣然有近年漏者有久年漏者近則帶淡紅或微腫或有小核久則上而槁白內而黑爛淫蟲惡臭生焉

格致餘論

腎癰

或曰太陽經非多血少氣者乎何腎癰之生初無甚苦往往間有不救者吾子其能治之乎予曰醫居小瘕之後加又在其下此陰中之陰也其道遠其位僻雖日多血氣達不到氣既不到血亦罕來中年之後不可生瘕縱有痛腫瘀之脈證但見虛弱便與滋補血氣無虧可保終吉若用尋常驅熱拔毒舒氣之藥虛虛之禍如指諸掌

羅天益衛生寶鑑

痔漏

腸風痔漏總辭也分之則異若破者謂之痔漏大便祕澀必作大痛此由風熱乘胃食飽不遍氣逼大腸而作也故經曰因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔也受病者燥氣也爲病者胃熱也胃刑大腸則化燥火以乘燥熱之實也風附熱而來是濕熱風燥四氣相合故大腸頭成塊者濕也作大痛者風也大便燥結者主病兼受火邪熱也當去此四者其西方肺主諸氣其體收下亦助病爲邪須當以破氣藥兼之治法全矣不可作丸以劑子與之效如神速泰艽蒼朮湯主之

明戴思恭證治要訣

脫肛

脫肛一證最難爲藥熱則肛門閉寒則肛門脫內用磁石末每二錢食前米飲調下外用鐵銹磨湯溫洗

痔漏腸風下血辨

腸風之血出於腸臟間五痔之血出於糞門濁孔處治各不同無擇翁烏連湯治腸痔外無形而所下血一線如箭或點滴而不已此由脈竅中來也

痔漏宜兼內外治

痔漏證狀頗多既血自內出不可全仗外傅宜只涪散吞釣腸丸痔正發而血多者亦宜自裏托之宜千金內補散滅桂之半加龍頭血尤妙

大腸頭出寸餘痛苦直候乾自退落落去又出名菽腸病若腸盡出不治但初截寸餘可治用芝麻油器盛之以臀坐之飲大麻子汁數升即愈

肛門蟲出

肛門蟲出不斷斷之復生行坐不得用鶴蝨末五錢水調服之自愈

肛門別名

肛門者大腸之下截也一曰廣腸言其廣闊於大小腸也又曰魄門言大腸爲肺之腑肺藏魄故曰魄門也肛者言其處似車缸形也

李梴醫學入門

脫肛諸因

難經曰病之虛實入者爲實出者爲虛肛門脫出非虛而何勞倦房慾過度及產育用力久痢久瀉小兒叫呼耗氣俱有此證宜參芪芎歸升麻木煎服血虛加芍藥地黃虛寒加炒黑乾薑虛挾熱者縮砂散

脫肛間有熱者熱則流通意也氣熱者用條芩六兩升麻一兩麪糊丸服血熱者四物湯加黃蘗升麻風邪者敗毒散暑熱者黃連阿膠丸薄荷煎

肺與大腸爲表裏肺熱則肛門閉結肺寒則肛門脫出必須溫肺臟補腸胃宜補中益氣湯加訶子橘皮少許或升陽舉經湯蜘皮散釣腸丸挾濕熱者升陽除濕湯有兼痢者四物湯加槐花黃連升麻有腎虛者腎氣丸八味丸

腎癰

初起未成膿者隔蒜灸再用慈熨法欲作膿者內托羌活湯痛甚者活命飲腫硬痛者托裏消毒散微腫痛者托裏散脾虛不能消散或食少不作膿者六君子湯加歸芪黃芪偏右腎腿者尤宜腎虛不能消散或作渴溺淋者腎氣丸有脾虛誤服消導藥以致氣陷下腫痛甚者補中益氣湯或十全大補湯潰後尤宜進此二藥以固其裏兼節酒色戒躁暴乃可萬全

腎蛆瘡

腎蛆瘡疼痒者摩風膏只痒甚有蟲者用硫黃一兩入言一錢爲末用醋調勻慢火熬乾復熬化如火起將醋洒數次傾地下待冷成餅用麻油磨濃候瘡痒抓破撥上三日即愈

五痔

經曰因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔蓋飽食則脾不能運食積停聚大腸脾土一虛肺金失養則肝木寡畏風邪乘虛下流輕則腸風下血重則變爲痔漏或醉飽入房精氣脫泄熱毒乘虛下注或淫極入房過

甚傷筋忍精停毒甚則以男交男致傷膀胱與腎肝筋脈蓋膀胱筋脈抵腰絡腎貫臀走肝環前後二陰故痔乃筋脈病發則面青痛甚肝苦急也

五痔牡痔肛邊如鼠乳牝痔肛邊一枚生瘡陷入腸痔結核腸內脫肛出血血痔大便清血隨下如線脈痔腸口頓類發癰出血且痛且痒五痔散主之又有氣痔肛門腫痛難便強力則肛不收加味香蘇散酒痔飲酒則發乾葛湯蠱痔浸淫濕爛歲積月累蝕腸穿穴蝦蟆丸黑玉丹凡毒深者大如雞冠蓮花核桃毒淺者小如松子牛乳鷄心鼠乳桃仁皆三陰虛也痔非外邪乃臟內濕熱風燥四氣相合蘊久流入大腸而成毒有腸頭腫塊者濕也肛腫後墜濕兼熱也出膿血水者熱勝血也痛極者火熱也痛序者風熱也大便祕者燥熱也小便澀者肝火濕熱也又瘡頭向上或硬者熱多向下或軟者濕多

熱則傷血血滯則氣亦不運而大腸下墜作痛大要以槐花槐角生地凉血芎歸仁和血生血枳殼行氣寬腸芩連山梔清熱黃蘗防己澤瀉行濕麻仁大黃潤燥秦艽荊芥疏風風邪陷下久者防風升麻提之氣弱者人參黃芪補之氣不順木香檳榔和之古方熱痔黃連阿膠丸槐角丸槐膽丹濕熱加味連殼丸或四物湯合敗毒散風濕秦艽湯燥痔四順清凉飲下血者芎歸丸苦參丸痛者止痛丸痒者黑玉丹腫硬者脈蝟丸

刀割線別損臟傷命藥點藥敷閉毒變漏初起只宜隔蒜灸已成者防風荊芥槐花木鼈甘硝煎湯熏洗滑脫加文蛤蓮蓬洗後用古熊冰膏蜈蚣油塗之內痔宜內生肌丸忌擦藥

體實屬肺與大腸風熱者加味槐角丸加味地黃丸三神丸斷根更易體薄屬肝脾腎三經陰精損者腎氣丸補中益氣湯十全大補湯以滋化原更節嗜慾謹起居方可斷根又有兼下疳瘡者有蝕中出白津者有兼痂者皆肝腎不足變出勿專服寒凉瀉火

痔漏及五痔皆因酒色過度即成此疾人多以外治數洗不知病在腸中有蟲若不去根其病不除

痔則有穿腸穿腎穿陰者又有無痔肛門左右別生一竅流出膿血名爲單漏竅在皮膚者易愈藏腑損者難治又有原有痔漏肛邊別生一塊作膿就在痔孔出者乃貪積注下也宜連翹散

痔止出血始終是熱漏流膿血初是濕熱久是濕寒初起淡紅微腫小核宜凉血清熱燥濕犀牛酒加味槐角丸臟頭丸古枳巴丸連歸丸久則內如槁白外如黑腐淫蟲惡臭宜澀竅殺蟲溫補黑玉丹釣腸丸芎歸丸苦參丸臙礬丸又有初起因風冷者久則虛而挾濕熱者

薛己醫按

脫肛

脫肛屬大腸氣血虛而兼濕熱有久痢氣血俱虛而脫者有因肺虛而脫者有因中氣虛而脫者有因腎虛而脫者濕熱者升陽除濕湯血熱者四物加條芩槐花血虛者四物加白朮茯苓兼痔而痛者四物加槐花黃連升麻久痢者補中益氣湯加酒炒芍藥中氣虛陷者前湯加半夏炮薑茯苓五味腎虛者六味丸虛寒者八味丸肺與大腸爲表裏肛者大腸之門肺實熱則祕結肺虛寒則脫出腎主大便故腎虛者多患此證

痔漏

大便祕澀或作痛者潤燥除濕

肛門下墜或作痛者瀉火導濕

下墜腫痛或作癢者祛風勝濕

腫痛小便澀滯者清肝導濕

痔者貧富男女皆有之富者酒色財氣貧者擔輕負重飢露早行皆傷心肝二血喜則傷心怒則傷肝喜怒無常氣血侵於大腸到穀道無出路結積成塊出血生乳各有形相婦人因經後傷冷月事傷風餘血在心經血流於大腸小兒因利後或丼腹中受熱也

水潛膏

痔屬肝脾腎三經故陰精虧損難治多成漏證若肺與大腸二經風熱濕熱者熱退自愈不守禁忌者亦成漏證此因醉飽入房筋脈橫解精氣脫泄熱毒乘虛流注或淫極強固其精以致木乘火勢而侮金或炙煿厚味或勞傷元氣陰虛火熾所致初起瘀痛便祕或小便不利者宜清熱凉血潤燥疏風若氣血虛而寒凉傷損者調養脾胃滋補陰精若破而久不愈多成痔漏有穿臀穿陰穿腸者其腸頭腫塊者濕熱也作痛者風熱也便結者火燥也潰膿者熱勝血也大便作痛者潤燥除濕肛門墜痛者瀉火除濕小便澀滯者清肝導濕其成漏者養元氣補陰精爲主經云因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔其屬肝脾腎也明矣若有患痔而兼痂患疝而兼下疳皆屬肝脾不足之變證但用地黃丸益氣湯以滋化源爲善若專服

寒凉治火者無不致禍

臀癰

炊痛尺脈緊而無力者托之

腫硬痛甚者隔蒜灸之更以解毒爲要

不作膿而痛者解毒爲主

不作膿者托裏爲主

不潰或潰而不斂者托裏爲主

臀膀胱經部分也居小腹之後此陰中之陰其道遠其位僻雖太陽多血氣運難及血亦罕到中年後尤慮此患治者毋傷脾胃毋損氣血但當固根本爲主若腫硬作痛者形氣虛而邪氣實也用托裏消毒散主之微腫微痛者形氣病氣俱虛也用托裏散補之欲作膿用托裏羌活湯若痛甚用仙方活命飲大勢既退亦用托裏消毒散若脾虛不能消散或不潰不斂者六君加芎歸黃芪若陰虛不能消散或作渴便溏者六味丸加五味子若陽虛不能潰或膿清不能斂者用補中益氣湯氣血俱虛者十全大補湯若腫硬未成膿者用隔蒜灸活命飲潰後豆豉餅補中益氣十全大補二湯若灸後大勢已退餘毒未消頻用葱熨以補其氣以消餘毒爲善

虞摶醫學正傳

痔漏

經曰因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔又曰脾胃者倉廩之官五味出焉大腸者傳導之官變化出焉若夫飽食太過則脾氣倦甚不能運化精微朝傷暮損清濁混淆故食積下流於大腸之間而爲病也蓋脾胃一虛肺氣亦乏而大腸之氣亦從而虛其肝木得以乘虛下流而爲腸風病是皆金失所養木寡於畏之所爲耳其爲變見名狀種種不同曰牛奶曰鼠奶曰鷄心曰鷄冠曰蓮花曰翻花曰蜂窠曰穿腸曰外痔雖爲狀不一而其因則同焉治法以苦寒瀉火芩連梔子槐花之類以辛温和血當歸川芎桃仁之類風邪在下以秦艽防風升麻之類提之燥熱怫鬱以大黃枳殼麻仁之類調之邁此疾者自宜愼口節欲依法調治無有不安者也

方賢奇效良方

腸澼痔漏論

經曰風客淫氣精乃亡邪傷肝也因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔蓋緣風氣通於肝肝生風風生熱風客則淫氣傷精精亡則邪熱傷肝因飽食行房則筋脈橫解而腸澼痔漏生焉夫痔者巢氏病源論有五曰牡痔牝痔脈痔腸痔血痔也及古諸方又有酒痔氣痔蟲痔翻花螻蛄等痔之名不一且痔於肛門生瘺或在外或在內有似鼠乳者有似櫻桃者其形不一其病有痛有癢有硬有軟有膿潰者有不潰者有腫痛便難者有隨大便下清血不止者有穿竅血出如線者至有失治而成漏者成漏而穿臀者及有穿腸成孔糞從孔中出者或肛門四圍生瘡數枚膿血浸淫若蓮花者詳此諸證大凡肛邊生鼠乳時出膿血者爲牡痔肛邊生瘡且疼且癢者爲脈痔肛內結核寒熱出血者爲腸痔肛門腫痛大便難强力則肛出不收者爲氣痔肛門瘡腫流血飲酒即發者爲酒痔肛邊有竅血出如射線者爲血痔肛門浸淫濕爛內有蟯蟲蝕腸穿穴遂成漏者爲蟲痔也然此諸證皆本之於大腸也大腸者庚金也本性燥清肅殺之氣本位主收所司主行津液以從足陽明中州土之所化若旺則能生化萬物而衰則損傷萬物故云萬物生於土而歸於土此之謂也然手足之陽明同司其化焉若人醉飽行房精氣脫泄其脈空虛酒熱之毒流著於脈或因醉飽淫極而强忍其精或用藥固其精弗能泄越停積於脈歸注大腸以致木乘火勢而侮燥金以火就燥則大便閉而痔漏作矣治宜苦寒瀉火辛温和血潤燥疏風止痛之劑也靈樞經云足太陽膀胱之脈及筋皆抵腰中入絡腎其支者貫臀足故主筋爲病則生此疾由是推之足厥陰之脈環繞前後二陰故亦能爲痔矣每見人患痔其發則色青痛甚蓋謂肝苦急而然也且夫痔與漏初致之由雖同所患之病實異初生肛邊成瘡不破者曰痔破潰而出膿血黃水浸淫淋瀝久不止者曰漏也原此受病者燥氣也爲病者濕熱也胃刑大腸則化燥火以乘濕熱之實也若夫腸頭成塊者濕也作痛者風也膿血潰出者熱勝血腐也潰成黃水者濕熱風燥也大便閉作大痛者風熱鬱滯弗能通泄氣逼大腸而作也大腸結燥者主病兼受火邪也凡此疾者皆由濕熱風燥四氣相合而致也而腸澼者爲大便下血也蓋因人之不避風毒恣飲醇酒炙煿之物縱慾喜怒無常臟腑鬱抑飲食自倍腸胃乃傷陰陽不和關格壅滯熱毒下注血滲大腸其腸澼痔漏不可得而無矣經云筋脈橫解腸澼爲痔者此也至於臟毒腸風痔漏而名雖殊其源實一大抵腸澼之病有可治可不治者若便血

身寒則可治腸澼下白沫脈沉者生脈浮者死如下膿血脈滑大者生脈懸絕則死腸澼脾脈外鼓沉久自已而肝脈小緩則易治腎脈搏沉身熱則死也醫療之法惟宜祛風消毒解熱凉臟和血潤燥以施治無不瘥矣

脫肛論

脫肛之證難經云病之虛實出者爲虛入者爲實肛門之脫非虛而何哉蓋實則溫溫則內氣充而有所蓄虛則寒寒則內氣餒而不能收況大腸有厚薄與肺爲表裏肺臟蘊熱則閉虛則脫三因之論且婦人有此疾者產育用力過多小兒此疾皆因久利大腸虛冷所爲也肛門爲大腸之候大腸傷於塞滯而用力努則其氣下衝肛門脫出也用香附子荊芥等分煎湯洗之或以五倍子碾爲細末放於紙上托其肛緩緩揉入若或長久男子變成腸風痔漏腸出不收至於出數寸者以五倍子矾硝等分煎湯洗之亦用木賊燒灰不令烟盡入麝香少許大便了貼少許效又有久痢臟虛皆能令人肛門突出有腸頭作痒即腹中有蟲丈夫由酒色過度大腸者傳道之官腎者作强之官蓋腎虛而洩母氣因肺虛是以大腸氣無所主故自肛脫治法實原氣去蘊熱之劑外用煎藥洗之醫治無不愈矣

龔信古今醫鑑

二十四證痔歌

痔證分三種憑君仔細看莫教年月久見者膽心寒菱角看形怪蓮花不可觀穿腸名鼠奶酒色兩相干莫怨翻花惡蜂窠亦不寬雌雄同氣血子母及腸盤元珠尤可怪腸釣痛如鑽核桃與流血見者便心酸栗子於中大鷄心在外安珊瑚形可惡那更脫肛難內痔紅不出搭腸裏內盤垂珠更難治日久有鷄冠切莫輕刀火令君性命殘用功無半月去病更除根

按治痔之法不過凉血清熱而已至於治漏初宜凉血燥濕久則澀竅殺蟲而兼溫散也或曰痔漏屬火何故用溫澀之藥殊不知痔止出血始終是熱漏流膿水始是濕熱終是濕寒十漏大金丹方雖溫散又兼補養故丹溪云漏當大補氣血爲主有所自矣

樓英醫學綱目

痔漏

運氣痔發皆屬寒經云太陽之勝痔瘡發治以苦熱是也

凡痔用周先生枯藥早辰上一次日午一次洗去舊藥申時又洗去又上一次如要急安至夜半子時又洗上一次至次日且看痔頭淡淡黑色兩三日如烏梅四五日內用竹篦子輕輕敲打痔頭見如石堅至七八日便住更不須上枯藥且待自然如蘿蔔根乃脫去也然後用甘草荊芥槐花煎湯洗去舊藥方上新藥

凡醫痔之法且如明日要下手今日先與此藥所以寬大腸使大便軟滑不與痔相礙則不泄瀉痔頭未脫落者須要日日與之以大黃一兩煨枳殼炒當歸酒洗一兩同爲細末如桐子大好酒吞下

治枯痔頭慮生他證凡用枯藥或觸壞腎根或水道赤澁痛用大黃木通生地各一兩滑石瞿麥各半兩同爲細末每用四錢煎服

催痔方如枯盡未脫落以此催之好磁石一錢白殭蠶生川烏五分同爲細末冷水調傅上立脫

凡用枯藥去盡乳頭恐留痔硬頭損破肛門四圍成瘡用龍骨石膏各一錢沒藥膩粉各五分同研極細先以荊芥湯洗次摻之切忌毒物生薑痔脫後用甘草湯豆豉湯洗再用荊芥五倍子煎水洗便不生膿痔脫後肉痒用大粉草濃煎湯洗之

收腸方用枯藥脫下乳頭隨即與此以收其腸此方補氣又收膿去血生肉令痕完

治痔切勿用生砒毒氣入腹反至奄忽忌吃生冷硬物冷菜之類及酒濕麪五辣辛熱大料物及乾薑之類犯之無效此東垣格言也

腸澼爲痔如大澤中有小山突出爲痔人於九竅中凡有小肉突出皆曰痔不獨於肛門邊生也有鼻痔眼痔牙痔等其狀不一方書分出五種曰牡曰牝曰脈曰腸曰氣牝痔者肛邊生瘡腫突出一日數腫膿潰即散牡痔者肛邊發露肉珠狀如鼠奶時時滴漬膿血脈痔者腸口顆顆發癰且痛且痒出血淋漓腸痔者腸內結核有血寒熱往來登溷脫肛氣痔者遇怒則發肛門腫痛氣散則愈又有酒痔每遇飲酒發動腫痛流血血痔則每遇大便清血隨下不止宜解熱調血順氣爲主若久不愈必至穿穴爲漏矣

徐春甫古今醫統

痔漏

春甫每用痔漏治法無出濕熱之方病機誠如東垣丹溪之論大抵輕淺者瀉水流濕潤燥疏風悉可以愈至於成漏穿腸串臀中有鵝管年久深遠者必是

永類鈐方掛線治法庶可除根予郡程復齋深得此法之妙誠所謂拔本塞源治無不愈茲併采其方法之詳附錄以公天下庶患斯疾者之有救也

復齋治痔法

生氣通天論云因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔東垣以爲飽食用力房勞以致脾胃濕熱之氣下迫大腸澼裂又云飽食負重婦人難產小兒痢疾或苦用力亦致腸澼此實受病之源故澼之淺者則大腸半破濕熱之氣溼歸腸之半表半裏留連下陷結核肛內形如葡萄蓬蓬阻塞穀道臨厠脫肛良久方收名曰翻花若因風熱糞燥便難糞未下而痔先破血出者有之糞已下而痔後破血出者有之此皆內痔所爲因糞難易血出不同又何有腸風下血遠近前後之理故澼之深者則大腸全破濕熱之氣滲出腸外留連肉腠橫流肛外結核如櫻桃牛奶鷄冠或串陰或串陽爲漏爲癰爲懸癰或串臀爲臀癰膿水流久內結鶇管瘡瘻譬猶山洞之水涓滴日久結爲鍾乳鶇管枝幹蕃生痞孔散出形如蜂窩爛爪膚筋肉陷允成痼疾此皆外痔所致故痔雖有內外腸澼淺深不同治者不思拔本塞源但見大便結實爲燥兼熱瘡腫後重腸頭成塊爲濕兼熱大痛爲風兼熱蟲蝕爲木傷金蓋木先朽而後生蟲腸已澼而毒始流先正立方行氣和血瀉火疏風以調其內又用砒撚紲瘡爛去鶇管死肌以治其外觀此不過治標緩急而已若併處迫近肛門死肌既去腸頭肉長此幸收功而已併處幽遠如以杖通陰溝併處反大是以旁瘡雖愈正孔難收不久復作咎歸病人予患此疾一十七年遍覽羣書悉遵古治法療無功殘中砒毒寢食憂懼後遇江右李春山只用芫根羹線掛破大腸七十餘日方獲全功病間熱思天啓斯理後用治數人不拘數瘡上用草探一孔引線繫腸外墜鉛錘懸取速效藥線日下腸肌隨長併處既補水逐線流未穿瘡孔鶇管內消七日間腐全如舊譬築堤決防水既歸漕衆流俱涸有何氾濫線落日期在瘡遠近或旬日半月不出二旬線既過肛如錘脫落以藥生肌百治百中若治內痔則用敷藥不犯砒硇或用藥翻肛或候自脫以藥日數黃水既乾內痔焦黑七八日間黑肉脫去以藥生肌腸收如舊縱有熱毒皆隨糞下後患再無譬如夾洲既去水歸中流何有旁通壅滯之患近因浙衢魯秋泉專門痔漏線裹蛛網每瘡紲砒亦頗收功但其用藥很虎目擊心傷所得方理不敢自私因書膚見公之天下永除斯疾云

王肯堂證治準繩

騙馬墜（俗名跨馬癰）

鬼遺云垂珠左右兩處起癰爲騙馬墜初起大小不定此處皮肉薄紋緊口亦難合初起宜以藥貼令內消但易成漏硬卽難爲功矣又云交襠一處近稜線上亦爲騙馬墜宜預防成漏

穿襠發

或問背之下極發疽何如曰此名穿襠發屬督脈及太陽經由勞傷憂思積鬱所致活命飲加羌活黃蘗內托羌活湯主之及勝金丹神仙追毒丸壯實者八陣散一粒金丹下之老弱者十全大補湯入參養榮湯此證速治稍緩則潰爛難收斂成漏者多麻木黑陷泄瀉嘔噦疲倦者不治

涌泉疽

鬼遺云湧泉疽腫起發太陰（太陰足也）如伏鼠二十日不穴死十日可刺發清膿赤黑者死白者可治

臀癰

或問臀上生癰何如曰腫高根淺爲癰腫平根深爲疽俱屬足太陽經濕熱所致宜服內托羌活湯內托復煎散加羌活主之勝金丹黃芪木香散選用壯實者一粒金丹八陣散下之老弱者十全大補湯入參養榮湯先賢云此瘡當服補養之劑若無補養之功其禍多在結痂之後治之難愈切須戒謹勿輒大補之劑腫而不潰者服托裏圍紫微丸

吳崑醫方考

脫肛方論

久瀉脫肛者丹溪脫肛方主之蓋瀉久則傷氣下多則亡陰是氣血皆虧矣故令腸虛脫氣不足補之以甘溫故用參芪陰不足者養之以厚味故用膏歸下者舉之故用升麻

泄瀉虛寒脫肛者舉肛丸主之夫濕盛則濡瀉久瀉則胃虛而臟寒乃無陽以升舉故令肛脫而不上燥能去濕故用半夏南星枯能制濕故用紅白枯礬溫能燥臟故用黑白附子若雞冠花刺蝟皮枳殼所以驅風訶子苦蕓核桃仁之灰取其澀以固脫也

熱瀉脫肛者收肛散途之良夫熱則肛門澀而便不易出故努責久則令脫肛此與寒脫不同者此則肛門澀寒脫則洞泄而不澀也苦可以勝熱故用熊膽澀可以固脫故用兒茶辛可以拔邪故用冰片

痔漏

內熱痔漏下血者四物加芩蘗槐花湯主之夫痔漏廣腸之毒也其疾多見於膏粱富貴之人而藜藿之徒未見其多也一有病根則勞思便作飲酒便作所以然者內熱而血妄行也是方也生地槐花黃芩黃蘗清其熱也當歸芍藥川芎調其血也

年高氣弱痔血不止四君子湯主之誤服攻痔之藥致血大下不止而虛脫者亦此方主之夫血有形之陰也必賴無形之氣以固之故年高而氣弱則血下久藥損氣則血下是方參朮芩草甘溫益氣之品也大氣充盈自足以固有形之血譬之乾元充溢於兩間自能舉乎大地而無傾陷之危也

論痔漏諸藥

按古方醫痔漏下血有用槐角柏葉蝟皮露蜂房牛角鰕胡桃等灰者俱以方寸匕酒調下此皆枯痔之法也湯液之中有用防風秦艽皂角仁荊芥白芷者此皆責之風熱入臟也有用芒硝大黃檳榔枳實者此皆責之實熱可下也有用胡黃連酒苦參石蓮肉番木鼈者此皆責之實熱可清也有用桃仁紅花蒲黃蘇木者此皆責之瘀血未消也有用杏仁麻仁地黃黃蘗者此皆責其燥金無液也有用地榆靳艾枯龍骨鹿角霜者此欲強止其血也有用象牙蛾螂八爪蟹爪者此欲放出其肛而外施藥以愈之也有用熏法者有用洗法者有用藥坐者無非枯痔止血之品也有用插藥者有用掛線者無非爛肌去腐之輩也嗚呼任醫猶任將用藥猶用兵神於兵者壘石可以為營駟牛可以破敵神於藥者心解而機自靈見

超而術自神則不拘拘於紙上之陳言矣

陳實功外科正宗

痔瘡論

夫痔者乃素積濕熱過食炙煿或因久坐而血脈不行又因七情而過傷生冷以及擔輕負重竭力遠行氣血縱橫經絡交錯又或酒色過度腸胃受傷以致濁氣瘀血流注肛門俱能發痔此患不論老幼男婦皆然蓋有生於肛門之內有突於肛外之旁治分內外各自隄防大者若蓮花蜂窠翻花鷄冠菱角珊瑚等狀小者如櫻珠鼠尾牛奶鷄心核桃蚬肉之形故積毒深者其形異而頑惡毒漫者其形正而平常久則崩潰成漏新則墜腫刺疼其者費從孔出血流竅中氣血日有所傷形容漸有所削若不早治終至傷人因常治法多用針刀砒礵線墜等法患者受之苦楚聞者因循都不醫治予療此證藥味數品從火煅煉性卽純和百試百驗此方訣由來異矣凡療內痔者先用通利藥蕩滌臟腑然後用喚痔散塗之肛門內片時痔自然泛出卽用葱湯洗淨搽枯痔散早午晚每日二次俱用溫湯洗淨然後搽藥輕者七日重者十一日其痔自然枯黑乾硬停止枯藥其時痔邊裂縫流膿換用起痔湯日洗一次待痔落之後換搽生肌散或鳳雞膏等藥生肌斂口庶者兼服補藥其口半月自可完矣外痔者用消毒散煎洗隨用枯痔散照內痔搽法用之自始至終無異完口百日入房乃吉至於穿腸久漏者用胡連追毒丸黃連閉管丸服之不用針刀掛線效如拾芥耳

看法

初起形如牛奶不腫不紅無瘀無痛行走不覺者輕已成腫痛有時遇勞而發或軟或硬頭出黃水者輕久如鷄冠蜂窠蓮花翻花等狀膿血不止者重漏通臀腿膿水淋漓疼痛不已糞從孔中而出者逆

治法

初起及已成漸漸大而便濕作痛者宜潤燥及滋陰肛門下墜大便去血時或疼痛堅硬者宜清火滲濕紫色疼痛大便虛祕兼作痒者涼血祛風疏利濕熱腫痛堅硬後重墜刺便出難者外宜熏洗內當清利內痔去血登厠脫肛而難上收者當健脾升泉中氣便前後下血面色痿黃心忪耳鳴者宜養血健脾諸痔欲斷其根必須枯藥以完其竅必杜房勞乃愈

臀癰論

臀癰生於小腹後位蓮僻奧氣血罕到皆濕熱凝滯結束乃成必使發外庶不內攻初起毒從五臟蘊積者患必有頭紅熱墜重如石內必口乾發熱宜內消沃雪湯通利積熱外以膏貼瘡頂四邊以如意金黃散敷之拔出瘀膿紫血兼服托藥自愈若內服敗毒寒劑外敷涼藥氣血冰凝毒氣不得外發反致內攻其瘡頭軟陷無膿根腳平散不痛內熱口乾煩躁譫語痰喘氣粗恍惚不寧者俱為不治但此多從毒積於內自裏至表者十有八九從風寒暑濕自外至裏者百中一二既出而復入裏者終為死候

看法

初起有頭紅赤腫痛頂高發熱根腳高聳者為易治已成膿腫發熱疼痛有時皮薄光亮色紅易膿者順已潰膿稠而黃色如猪腦腫消痛止起坐自便者易

初起如粟形或黃泡一點平塌作痒根腳散漫者重已成色紫堅硬臀股俱腫小便澀滯日久無膿者險潰後無棉膿頂空根軟塌手按不知疼神昏無治法

治法

初起惡寒體倦喜覆衣被脈浮緊而在表者微散之已成內熱口乾好飲冷物小水澀而大便祕者通之頂高色赤痛發熱疼痛有時者宜托裏更兼解毒腫已高而作疼膿已熟而不破脹痛難忍宜即針之潰後堅硬不消膿水不止飲食無味宜補虛健脾

景岳全書 臣張介賓著

論脫肛

大腸與肺爲表裏肺熱則大腸燥結肺虛則大腸滑脫此其要也故有因久瀉久痢脾腎氣陷而脫者有因中氣虛寒不能收攝而脫者有因勞役吐瀉傷肝脾而脫者有因酒濕傷脾色慾傷腎而脫者有因腎氣本虛關門不固而脫者有因過用寒凉降多亡陽而脫者有因濕熱下墜而脫者然熱者必有熱證如無熱證便是虛證且氣虛卽陽虛非用溫補多不能效凡小兒元氣不實者常有此證故陳自明曰大腸虛寒其氣下陷則肛門翻出或因產努力其肛亦然是誠確見之論

論治

內經曰下者舉之徐之才曰澀可去脫皆治脫肛之法也故古人之治此者多用參芪歸朮川芎甘草升麻之類以升之補之或兼用北五味烏梅之類以固之澀之仍外用熏洗收澀之藥則無有不愈

凡中氣微虛而脫者宜四君子湯或五味異攻散中寒吐瀉而脫者五君子煎或溫胃飲瀉痢不止而滑脫者胃關煎或加烏梅北五味文蛤木香之屬以佐之脾虛下陷而脫者補中益氣湯或舉元煎陰虛肝腎不足而下陷者補陰益氣煎陰中陽虛而脫者理陰煎或大補元煎以上諸證凡虛中挾火或熱赤或腫痛宜用補中益氣湯加黃連黃芩梔花之類加減治之然必眞有火證火脈方可酌用寒凉若非實火則大忌苦寒以防其沉降敗脾也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百二十八卷目錄

醫部彙考二百八

後陰門二

方一蒼术澤瀉丸　淋洗藥　香殼丸　檳榔子丸　黃連丸　乳香沒藥散　木香丹朴湯　消毒飲　冰香散　內托羌活湯　代乃散　內托追毒飲　法製粘連子湯方　生肌散　熨痔藥　生肌散　辰砂散　子　腸痔藥盤　腸痔散　益氣清臟湯　木香散　檳榔散　杏仁湯　挑皮法　豬胞苦酒湯　雄黃史散　陶先生枯痔法　貫腸藥　敬賜方　周先生劑痔麻藥　連翹丸　加味連翹丸

藝術典第二百二十八卷

醫部彙考二百八

後陰門二

方一

蒼术澤瀉丸（河間六書下同）

治痔

皂子燒存性　澤瀉　枳實各二兩　地榆一兩

蒼术四兩去皮

右爲細末燒飯爲丸桐子大每服三十丸食前酒或米飲下

淋洗藥

治痔

天仙子　荊芥　小椒　蔓荊子各等分

右以水煎洗

香殼丸

治濕熱內甚因而飽食腸澼成痔久而成癰速服悉愈之

木香　荊芥穗　黃蘗各三錢　枳殼去瓤麩炒

厚朴各半兩　黃連一兩　刺蝟皮一箇燒存性

當歸四錢

右爲末麪糊爲丸如桐子大每服二三十丸溫水食前日三服

檳榔子丸

治腸風瀉血濕熱內甚因爲諸痔久而不治乃變成癰

黃芪　枳實　槐花　荊芥穗　鳳眼草各二兩

檳榔子一對炙　皂子三百箇炙

右爲細末麪糊爲丸如桐子大每服二三十丸空心酒下米飲亦得忌油膩冷猪魚臭血等物

黃連散

一名雞冠散治腸風下血疼痛不止

雞冠花　黃連　貫衆　川大黃　烏梅各一兩

甘草三分炙

右爲末每服二錢溫米飲調下日三服不計時候

乳香沒藥散

治五種腸風痔癢無問久新

宣黃連　白礬各一兩　穀精草半兩　石榴一箇

用刀子割下頂蓋取去裏面子三停之一停次將黃連白礬碎內入石榴內用元頂蓋合上

右以濕紙一張裹了後用膠泥拍作餅子裹石榴以炭火燒通赤爲度取出去泥紙次將穀精草於銚子內炒焦黃爲度與石榴研細後入麝香一錢乳香二錢沒藥一錢研細拌勻每服一錢熱酒小半盞調下日三服

木香厚朴湯

治痔癢脫肛腸胃間冷腹脅虛脹不思飲食

木香　桂心　桃仁　陳皮留白　肉豆蔻

赤石脂各半兩　皂角子三兩去皮子酢炙黃

大附子三分炮

右爲末每服二錢溫粥飲調下食前

消毒飲

治便毒初發三四日可消

皂角刺　銀花　防風　當歸　大黃　甘草節

苦蘆仁等分

右㕮咀水酒各半煎食前溫服仍頻提掣頂中髮立效

冰香散

治臟毒初起微腫即用蚯蚓糞灸後以此藥搽之

爐甘石火煅二錢黃連膏淬之待乾乳末聽用

乳香另研　沒藥另研各一錢　冰片二分

麝香一分

右和研細末田螺搗爛取汁調塗患上偶無田螺煎黃連汁亦可

內托羌活湯

治臀癰

羌活　官桂酒洗　大黃酒洗各四分　藁本

連翹　歸梢各一錢　黃芪一錢五分　炙甘草

陳皮　蒼朮各五分　白芷

右作一服水酒各一鍾煎空心熱服以被覆患上使藥力行之方能奏功如或不愈用鐵箍散薑汁酢火上熬熱調敷留孔時令熱餘汁潤之以助藥力

代刀散

治臟毒

穿山甲　殭蠶　枳殼　薑黃　牽牛　赤石脂

大黃　白芷　貝母各等分

右爲細末每服五錢早晨空心用酒調下行利十餘次用薄粥補之其膿血從大便中出

宣毒湯

治坐馬癰

大黃三錢酒蒸　白芷　赤芍　甘草各五分

連翹　枳殼各一錢　當歸梢二錢

右水酒各一鍾煎一滾去查早晨空心服

內托追毒飲

治坐馬癰

人參　黃芪　厚朴　甘草　桔梗　枳殼

黃連　金銀花　烏藥　當歸　芍藥　白芷

川芎　防風

右水酒各一鍾煎去查服

法製枯藥

治痔

信一兩　白礬三兩爲末　巴豆五粒去殼

飛丹　硃砂臨時生用各五錢

先將礬一兩半安瓦盆中隨將信摻在礬上再將礬覆上火熬枯取出爲末加硃砂末五錢和勻碾細末如塵先用魚腥草煎湯洗淨每用少許點上少頃黃水漸出一日夜三四次如無魚腥草或茶蘗花或野薔薇花紅白槿樹花代之或甘草湯亦可

祕方

治痔

砒霜白色明淨者五錢　白礬明淨者一兩二錢

黃丹六錢水飛二次焙乾　蠍梢八箇瓦上焙乾

草烏頭二錢爲末去皮生用

右件用舊鐵杓或熟鐵銚先將炭燒鐵銚透紅放冷揩拭淨將砒打碎如豆大將白礬燒令滾沸將碎砒投礬內拌勻以文武火煅旋旋攪入草烏蠍梢黃丹同研末收放新小瓶內如用先將痔漏以甘草湯或葱湯洗淨將生麻油調藥少許以鵝翎掃藥在痔漏上日三次第一日第二日瘡內必出黃水如膠其痔漸消看漏深淺就將薄綿紙裹猪騣三根先入在漏內試漏深淺就將藥紙撚之藥插入漏內其藥紙撚久不取出如換藥紙撚方取出再換新藥紙撚入漏內日上三次蚤午晚用藥俱要洗淨漏用藥三五日痔漏頭併瘡口俱黑色然後不用紙撚藥其漏瘡根自落如漏不深入內上用藥點搽如瘡紅活平復不收口方用生肌散藥敷之立愈其瘡根永除再不發矣

生肌散

白芷　黃連　血竭　龍骨各五錢　光粉二兩

黃丹三錢水飛炒　軟石膏　海螵蛸各一錢

黃蘗　五倍子各一兩

右爲細末如瘡孔深用蘆管吹入裏面如瘡口淺止乾摻入內生肌平伏不用

點痔藥

冰片　乳香　沒藥　熊膽

右俱爲末用蝸牛一枚碎其底入前四末放盞內化水以銀簪滴汁痔上甚效田螺代之亦可

痔漏藥

牛黃末一分銅杓內先炒微煙即下　砒末二錢候煙起再下　白礬末九錢待滾乾取起仍入火微炒安地上出火毒爲末後入　乳香　辰砂　沒藥

冰片各一錢

右共爲極細末每用一錢許以稠麪糊調和隨漏孔之大小深淺以爲條子之粗細長短如瘡孔爛

大止用津唾調之填入孔內待痔已潰動毒水自流如好肉上生瘡卽以五黃膏護外仍用唾調前藥末傅在痔根上如痔根脫落摻生肌散并多服蠟礬丸

生肌散

末出毛小鼠二枚炙乾　龍骨煅　海螵蛸　赤石脂各一錢　乳香　沒藥　血竭　輕粉　雄黃各五分

右各爲末如塵臨用加冰片少許

生肌散

寒水石煅一錢　龍骨煅五分　乾胭脂三分　輕粉

右爲細末乾摻新瘡加薄荷一分老瘡依此

辰砂錠子

久痔成漏

信一錢　白礬二錢　密陀僧　辰砂各五分

先研信細入磁盆中次用礬信火上煅以烟盡爲度再將密陀僧辰砂研細白麪一些和作尖錠子頑漏納瘡口腐去敗盡方可生肌

盤腸通腸痔散

痔在內用此敷之痔頭頂自出以前藥枯之

磁石一錢　白礬枯過五分　白乾薑五分

草烏尖三枚

右爲末葱汁調敷

益氣清臟湯

治痔漏

人參　當歸　條芩　黃連　生地　赤芍藥　槐角　川芎　升麻　枳殼　秦艽　白朮　茯苓　甘草

右水二鍾薑一片燈心二十根煎服

木香散

內痔用藥後小便不通服此藥外痔不用

山梔子　木通　車前子各三錢　淡竹葉

生地黃各一兩　黃芩五錢　燈心三十根

右㕮咀每服四錢水一鍾半煎七分空心服

懊憹散千金方下同

治濕瘡爛殺蟲除蟨

萹竹半兩　藿蘆　雷丸　青葙子　女青

桃仁各三兩

右六味治下篩粥飲服方寸匕日三加至二匕酒服亦可

杏仁湯

治蟨

杏仁五十枚　苦酒二升　鹽一合

右三味和煮取五合頓服之小兒以意量服

桃皮湯

治蟯蟲蛔蟲及痔蟨蟲食下部生瘡

桃皮　艾葉各一兩　槐子三兩　大棗二十枚

右四味㕮咀以水三升煮取半升頓服之良

豬膽苦酒湯

治熱病有蟨上下攻移殺人

豬膽一具　苦酒半升和之

右火煎令沸三上三下藥成放溫空腹飲三滿口蟲死便愈

雄黃兌散

治時氣病蟨下部生瘡

雄黃研半兩　桃仁一兩　青葙子　黃連

苦參各三兩

右五味爲末綿裹如棗大內下部亦可漿汁服方寸匕日三

針粉散

治脫肛歷年不愈

針粉一味

右研細末每用少許摻之按入卽愈

周先生枯痔法

赤石脂五錢　辰砂痛加一錢　明礬　黃丹

右爲末先用鬱金末護肛門如無鬱金用薑黃末代之調塗四圍好肉如不就加菜豆粉打合却將枯藥敷上如肛門疼急濃煎甘草湯放溫拂四圍肛門上就與寬腸藥

寬腸藥

槐花　大黃　枳殼　木通　連翹　瞿麥　當歸

右半酒半水煎

收腸方

人參　當歸各一兩　川芎　甘草　白芷　防風　厚朴　桔梗　桂枝　黃芪

右爲細末半酒半水煎如惡酒少水多煎之夏月減桂朴加苓藥

周先生割痔麻藥

川烏　草烏尖　胡椒　吳萸　花椒　白殭蠶炒

右爲末酒調敷四邊然後割之又以此藥敷之否

則亦用麝香龍骨塗之
按枯痔繫痔割痔三法用前藥服及敷貼不退者然後用之必敬謹之不可視爲常法

連翹散

治食積痔

黃連　阿膠　山楂　神麯　桃仁　連翹　槐角　犀角各等分

右爲末以少許置掌中時時舐之津液嚥下如三分治二即止後服

連歸丸

治痔漏及牝疽便血

全當歸　酒黃連各四兩　防風　枳殼各二兩

右爲末用前浸黃連酒打糊丸梧子大每六七十丸米飲下忌羊魚雜腸煎炒熱物

加味連殼丸

治濕熱內甚飽食賜澼發爲諸痔久而成瘻

黃連一兩　枳殼　厚朴各五錢　當歸四錢　木香　黃蘗各三錢　荊芥二錢　蝟皮一箇

右爲末糊丸梧子大每服三十丸溫水下

秦羌湯

治痔漏成塊下垂不任

秦艽　羌活各一錢　黃芪二錢　升麻　麻黃　柴胡　炙甘草各五分　藁本三分　防風七分　細辛　紅花各少許

水煎服忌風處大小便

槐贖丹

不問遠年近日痔瘻服之如神久服黑髮固齒十月上巳日揀肥實槐子用瓦盆如法固濟於背陰牆下掘一坑約二三尺深埋之預先取黑牛贖五六箇臘月八日取前槐子裝在贖內高懸陰乾至次年清明日取出

右用磁器收貯每空心白湯下一日服一粒二日二粒漸加至十五粒止以後一日減一粒週而復始

加味地黃丸

五痔滋陰必用之

熟地　黃芪各一兩半　槐花　黃蘗　杜仲　白芷各一兩　山茱萸　獨活　山藥各八錢　牡丹皮　茯苓　澤瀉各六錢　白附子二錢

右爲末蜜丸梧子大每五十丸空心米飲下

牽牛酒

通行痔漏中惡水自大腸出

黑牽牛末一分入豬腰子內以線紮箬葉包慢火煨熟

右每空心細嚼溫酒送下

內生肌丸

枯礬　鹿角　芝麻各一兩

右爲末蜜丸梧子大溫酒下三十丸瘀塞後去鹿角加象牙一兩黃蠟爲丸常服斷根

加味蠟礬丸

治新久諸漏

象牙五錢　露蜂房　白殭蠶　蛇退　血竭　木香各三錢　乳香二錢　白礬二兩

右爲末黃蠟四兩爲丸梧子大溫酒下二十丸齒髮散

治漏瘡惡瘡生肌裹欲乾者用之

人齒　頭髮　雞脞脞各等分俱燒存性　麝香　輕粉各少許

右爲末濕則乾摻乾者麻油調搽

蜂房散

治久年漏瘡或暫差復發或移於別處

露蜂房炙黃三分　穿山甲　龍骨各一分　麝香少許

右爲末臘月豬脂調敷濕則乾摻

蝸牛膏

治痔疼痛

蝸牛一錢　片腦　麝香各少許

右搗爛取汁敷痔上痛止腫消

青龍五生膏

治癰疽痔漏惡瘡膿血出皆以此方導之

生梧桐白皮　生桑白皮　生竹茹　生柏白皮　生龍膽　蜀椒　附子　苦蔘各五兩　蜂房　蝟皮　蛇蛻皮　雄黃　雌黃各一兩

右十三味咬咀以三年苦酒二斗浸一宿於炭上炙乾搗下細篩以豬脂二升半微火煎攪令相得如飴著末水中新白磁器中盛稍稍隨病深淺傳之并以清酒服如棗核大日一

黃蠟丸

治臟毒

黃蠟四兩

右一味隔水煮軟丸如桐子大月朔服一九次日

服二九三日服三九漸加至月盡三十丸已後每日減一丸至一丸止用酒送下輪流服之其瘡自痊則不必服矣

五九散古今醫鑑下同

治痔漏如神

白牽牛頭末　大黃　五倍子　乾蓮蕊各一兩　黃連三錢　礬紅以皂角煉紅　當歸各五錢　沒藥　乳香各一錢竹葉焙乾

右共爲末初服五分二服六分三服七分四服八分五服九分爲止每日清晨用牙猪肉湯半椀加無灰酒一小鍾調下忌猪腸肚驢肉燒酒

三八全應丸

痔漏效驗

胡桃十八箇內取隔三十六片　地骨皮酒炒乾　當歸酒洗微炒　刺蝟皮一箇連刺酒浸麤乾　槐角酒浸炒　黃連酒炒　甘草蜜炙各二兩　乳香二錢

右爲末酢糊爲丸如梧子大每服三五十丸白湯或酒早晚二服一月後平復

地榆丸

治痔漏通用

槐角　生地黃各二兩　當歸身　黃芪　黃連　防風　連翹　黃芩　枳殼　秦艽　地榆　升麻各一兩　阿膠　川芎　白芷各五錢

右爲末酒糊丸如梧子大每服五六十丸加至七八十丸空心米湯下或酒任下

追風補腎十漏大金丹

治漏庚申甲子戊除日合

當歸　麥冬　破故紙　川烏　肉蓯蓉　山藥　白茯苓　枳殼　白芷　杏仁各二兩　人參　生地　小茴　鹿茸　木香　青木香　砂仁　厚朴　青皮　陳皮　烏藥　肉豆蔻　天麻　乳香　沒藥各一兩　硇砂　丁香各五錢　熟地　大茴　枳實各三兩　大附子一箇　香附　松節各四兩

右爲末煉蜜丸如彈子大金箔爲衣每服一丸空心酒化下

升陽除濕湯

治脫肛自下而上者引而竭之

柴胡　升麻　防風　豬苓　澤瀉　蒼术　陳皮　神麯炒　麥芽炒　甘草

右剉水煎空心溫服胃寒腸鳴加益智半夏

提氣散

治氣虛下陷脫肛

黃芪　人參　白术　當歸　白芍　乾薑炮　柴胡　升麻　羌活　甘草炙

右水煎服

皋肛丸

治無火遺瀉久脾虛脫肛

半夏　天南星　枯白礬各五錢　雞冠花炒　白附子各五兩　胡桃仁十五箇燒存性　枳殼　訶子肉煨　黑附子各一兩　刺蝟皮二枚炙

苦蕒一枚燒存性

右共爲末酢糊丸空心溫酒下三十丸

水澄膏

治痔以此保護良肉再用後藥以枯痔

鬱金　白芨各一兩　一方加黃連

右二味爲細末如內痔候登厠翻出在外用溫湯洗淨側臥卽出用蜜水調令得中筆蘸塗敷道四邊好肉上留痔在外以紙蓋藥上良久方用枯藥搽痔上用筆蘸溫水於紙上不令藥乾及四散

枯痔方

白礬四兩　生信石二錢半　硃砂一錢研極細

右各研爲細末先用砒入紫泥罐次用白礬末蓋之用火煅令烟斷其砒盡隨烟去借砒氣於礬中耳用礬爲極細末看痔頭大小取礬末在掌中更入硃砂少許以唾調稀用筆頭塗痔上周遍一日三上候看痔頭顏色焦黑爲效至夜有黃水出切勿他疑水盡爲妙至中夜七藥一遍來日依然上藥三次有小痛不妨換藥時以椀盛新水或溫湯在痔邊用筆輕洗去痔上舊藥更上新藥仍用護肉藥次用荊芥湯洗之三兩日之後黃水出將盡却於藥中增硃砂減白礬則藥力卽緩三兩日方可增減漸漸取之庶不驚人全在用藥人看痔頭轉色增減厚薄傳藥方是活法此藥只是借砒信耳又有硃砂解之一方士將此二方在京治人多效致富一富商因驗以百金求得之錄於予予雖未用傳人無不言效但枯藥趙宜眞煉師已刋於青囊雜纂如神千金方未見刋傳大抵今人言能取痔者皆此方也恐氣血虛或內邪者還當兼治其內庶不有失

秦艽當歸湯 東垣十書下同

治痔漏大便結燥痛甚

大黃煨四錢 秦艽 枳實各一錢 當歸尾 澤瀉 皂角仁 白朮各五分 紅花少許

桃仁二十枚去皮尖

水二盞煎一盞食前服忌生冷硬物及酒麵大料椒薑等物若犯之其藥無效

清凉飲

治諸痔熱證大便祕結

當歸 赤芍藥 甘草炙 大黃蒸各等分

右㕮咀每服三錢新汲水煎服

收痔丸 直指方

治諸痔通用

阿膠炒 黃連 貫衆各半兩 皂角刺略燒 尺長皂角去弦酢炙 蝟皮炙焦 蜂房炒焦 蛇皮略燒 當歸 穿山甲微火燒令焦 川芎 槐花 猪後蹄垂甲燒存性各二錢半

右酢糊丸梧桐子大每服七十丸空心荊芥湯下

無比丸 秘方

治一切痔漏

象牙屑 血竭各半兩 明雄黃另研 沒藥 乳香 明硃砂各三錢三分 蜂房炒 蟬蛻 牙皂莢皮去弦炙各三錢

右爲末用好黃蠟二兩鎔化布攩淨再入酒內蒸化冷定取起蠟化開和前藥急手爲丸如梧桐子大每服空心熱酒浸一錢五分嚼下本酒吞送七日全效

孫尚書方 東谷

治痔漏有效

明硃砂 明雄黃各另研二味再合乳極細聽用

皮硝淨一斤

右用健猪大腸頭二尺去油淨以皮硝一斤盡裝入腸內兩頭縛定入甑蒸熟取出連腸埋土地中一七日取起去腸將硝收貯淨磁瓶中每服用硝七分半雄砂二分半共一錢再搗勻熱酒衝空心服之七日全愈

五灰散 三因方

治五種痔瘡不問內外並宜服之

龜甲治牝痔 蝟皮治牡痔 蜂房治脈痔 蟬蛻治氣痔 猪左足懸蹄治腸痔各等分

右各燒存性隨證倍用一分爲末空心臨臥酒調二錢服

茄柯湯 心鏡

洗痔極效

茄柯 槐花俱陳者佳 冬瓜皮 枳殼各等分

右煎湯先熏後洗却敷後項藥愈

蓮房枳殼湯 聖惠方

洗痔極效

乾蓮房 荊芥穗各一兩 枳殼 薄荷葉 砒硝各半兩

右爲粗末水三椀煎二椀半熱熏洗

熏洗法

諸痔流血皆效

乾蓮房一箇 荊芥二錢 五倍子 槐花 地榆半兩

右爲末每用半兩水二碗煎入明礬二錢如法熏洗

側柏葉湯

熏洗諸痔

側柏葉一兩 槐枝一握 黃連 黃芩 荊芥 蛇牀子各一兩 鏡面草 蚵蚾草各一把

右作四次新汲水煎放桶中如法熏洗

七物湯

熏痔效

皂莢三挺 艾一把 龜甲一枚 草烏二枚 乾蝦蟇一箇 雄黃半兩 麝香五分

右爲末拌勻穿地上一穴置炭火在內上用蓋密惟留一孔旋入藥末一撮在上熏

神效散

洗痔凡富貴之人多因嗜慾飲酒過度喜怒不常致生痔漏或如鼠奶連珠或肛門腸腫流膿漏血其痛如割不可忍者但是諸腫痔漏及腸風下血此藥治之無有不效

苦參 川椒 苦壺盧 芫荽子 槐花 白芷 金銀花 連翹 枳殼 荊芥 獨活 小茴香 麻黃 牡蠣煅 威靈仙 椿樹皮各二兩

右㕮咀每用半兩水五椀葱白三莖煎五七沸去查以盆盛之坐上熏洗甚效一方加老黃茄子二箇尤妙

熬藥線法 後齋

治外痔并漏囊癰懸癰臀癰

芫花入土根不拘多少搗自然汁於銅銚內慢火熬成膏以生絲線入膏再熬良久膏濃爲度線陰乾膏留後用

一治外痔有頭者以藥線繫之候痔焦黑落下再用線裹猪鬃蘸藥當納於竅中永不發

一漏井三癰不論瘡孔數十但擇近肛者以馬蓮草探之若一孔通腸者先將銀條曲轉探入穀道鉤出草頭將線六七寸一頭挽成活套扣以不挽線頭繫草上引過大腸解線頭穿活扣內出寸長繫三錢四五分重之鉛錘懸空墜之坐臥方便使不粘衣可取速效每日早將線洗淨約日長出五分仍要收上止留一寸線穿七日線下三寸之餘僻處補完源頭既塞未穿漏孔及三癰膿水再無鵝管化盡俱先平復瘡近肛十日半月線過肛門即下瘡隔遠者二十日後即落若七日及落線後旁瘡有未乾此原腸澼非止一口仍要再穿若穿不動者以紙撚蘸代鍼散頂至痛即曲折處三二次通即穿線其線落下再用生肌散銀條式雙折約三寸餘形如長又字形馬蓮草即北方鐵刷帚也

生肌散

龍骨一兩火煅　訶子炮取肉二錢

右爲細末加輕粉三錢和勻先洗瘡拭乾敷上日二次

敷藥

治內痔并因痔腫脫肛

猪胰半斤將大雄雞一隻籠餓一日揀淨地以胰子喂之取糞曬乾四兩之上爲末　綠膽礬半兩

晉礬　砂硝各一兩　千葉雌黃　雄黃各六錢

右各爲末以寬砂鍋盛之先下雞屎一兩次下晉礬一兩次雌黃次硝次雄再加晉礬雞屎以新瓦蓋鍋之上簇火以青烟去盡爲度冷定取出加乳香沒藥各半兩爲極細末或用脫肛散脫出肛門或候自脫將藥少許唾津調和以新筆蘸敷瘡上患者側臥縮脚任瘡流去黃水日上五次夜上二次逐次水洗拭乾方可上藥至三日後瘡已焦黑頻用防風荊芥連翹苦參倍子煎湯洗之黑肉既落上前生肌散瘡去平復腸收神效此方不用砒硇不作便閉常用以治內痔之聖藥也

脫肛散復齋

磁石　軍薑各一錢　枯礬五分

右爲極細末以葱涎調以綿絮蘸塞肛內其瘡自翻出瘡既愈後內須服補中益氣之劑六味丸八味丸

消痔千金散心鏡

搽大便諸痔腫疼不已

甘草三分　赤石脂　黃連各六分　硼砂一分

寒水石　孩兒茶各五分　冰片半分　熊膽二分

右爲細末猪膽汁調搽或入膽內竹管內以線縛口緊插入肛門內捽之自然痔病愈

半夏散

治痔初生急以此藥治之

半夏生搗末

先以生薑自然汁洗肛門後以半夏末泡湯洗之不過三五日自愈

護肛膏

白芨　石膏煅　黃連各等分爲末

右以雞子清調如膏搽上剪油紙如月樣圈護痔四旁好肉一次洗一次換藥

翻痔藥

治內痔必以翻痔藥取出腸頭方可上枯藥

草烏不拘多少

右爲末調敷肛門內其痔即翻出

金寶膏

漏瘡用之能去腐肉而不傷良肉

桑柴灰五椀用沸湯十椀淋汁用草紙一層皮紙二層放箕底次放灰上面淋洗　穿山甲二兩

信一錢另研　杏仁去皮七枚同信末研塗山甲

辰砂一字　粉霜一錢半

右將灰汁澄清下鍋煎滾下甲末候煎乾一半下麝次下粉霜乾及九分下辰砂候成膏下石灰以成塊爲則密罐收勿見風

五灰膏范氏

治臟腑一切蘊毒發爲痔瘡不問遠年近日形似雞冠梅核牛乳或內或外並皆治之此方親傳之劉叔茂累試極驗

蕎麥燒灰半斗許　荊柴　老杉枝　山白竹

雜硬柴各截二尺長劈成片各取一束曬乾火燒成炭置密罎內自死

右炭以水煮取炭汁又用酒漏以布帛實其竅置蕎麥灰於酒漏內以炭汁淋之然後取汁於鍋內

慢火熬約有一小椀候冷入石灰虢丹調成膏以密罐貯之上用石灰傅之勿令泄氣臨用時去石灰以冷水調開令病人洗淨痔瘡仰臥搭起一足先以濕紙於瘡四圍貼護却用竹篦挑藥塗痔上須臾痛息用紙揩去藥再塗如此三四次要痔瘡如墨樣黑方止以水洗淨每日常置冷水一盆以葱湯和之日洗三五次六七日後膿穢出盡其瘡自消

玉紅散 秘方

治諸痔

硇砂三兩先燒在鍋內　明礬二兩放硇上火煅枯以烟盡爲度用礬爲末　硃砂四錢另研

右爲極細末敷痔乾用津調貼濕乾敷上

代鍼膏

枳殼二箇大者去瓤　巴豆半兩去皮

右將巴豆裝在枳殼內合縛定放罐內酢煮乾將二味曬乾研末用絲綿蘸濕展藥傅瘡上及根底痔去再不可用止用生肌散如頑漏日久以津調敷瘡口敗肉自去

雞峰烏金散

治痔漏

穿山甲　刺蝟皮　黃牛角心　牙皂角　槐子　皂角刺　枳殼　貫衆　阿膠各等分再夾和牛角

右以蝟皮穿山甲同炒另研爲末和入一處每服一錢半用胡桃肉研爛調酒食前服漏血不止當歸煎湯調下

代赭石丸

治痔變瘻膿出不止

黛赭石煅酢淬研　磁石煅煮酢數沸淬七次研　白礬枯　牡蠣煅灰　龍骨研　刺蝟皮炙焦　皂角刺炒焦　猪後蹄垂甲燒灰各存性爲末　赤石脂　川椒焙　木賊焙　蜂房炒各等分

右爲細末神麴糊丸小豆大每服五十丸空心艾湯下

地黃丸

治五痔滋陰必用之藥

地黃酒蒸　黃芪各一兩半　槐花炒　黃蘗炒　杜仲炒　白芷各一兩　茯苓七錢　山茱萸肉　山藥　獨活各八錢　澤瀉　牡丹皮各六錢　白附子二錢

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服五十丸空心米飲下

三黃二地湯

治腸風諸痔便血不止及面色痿黃四肢無力

生地黃　熟地黃各一錢五分　蒼朮　厚朴　陳皮　黃連　黃蘗　黃芩　當歸身　白朮　人參各一錢　烏梅二箇　甘草　防風　澤瀉　地榆各六分

水二椀煎八分食前服

粟殼散

治諸痔作疼及腸風下血諸藥不止者宜服之

粟殼溫湯泡去內瓤去蒂切絲蜜水拌炒二錢　當歸身　陳皮　秦艽　黃芪蜜炙　生地黃　熟地黃各一錢　黃蘗　黃芩　人參　蒼朮　厚朴　升麻各六分　荷葉蒂七箇　甘草五分　地骨皮一錢三分

水三椀煎八分食前服或爲細末每服二錢空心溫酒調服

洗痔枳殼湯

治痔瘡腫痛肛門下墜毋論新久洗之痛自消

癩蝦蟆草 一名荔枝草四季常有面青紫白麻紋疊疊者是　枳殼各二兩

河水二瓢同上二味煎數滾先熏後洗良久湯留再熱熏洗甚者三次即消洗淨當搽後五倍子散

五倍子散

治諸痔舉發堅硬疼痛難忍或臟毒肛門泛出腫硬不收亦效

大五倍子敲一小孔用陰乾　癩蝦蟆草揉碎填塞五倍子內用紙塞孔濕紙包煨片時許取出待冷去紙碾爲細末每一錢加　輕粉三分　冰片五釐

共研極細待前枳殼湯洗後用此乾搽痔上即睡勿動其腫痛即除凡外痔用二方搽洗亦可除根永不再發

田螺水

治痔瘡堅硬作痛及脫肛腫泛不收者並用之

大田螺一枚用大冰片五釐研末用尖刀挑起螺蓋將冰片入內平放片時待螺滲出漿水用雞翎蘸搽患上勤勤掃之其腫痛自然消散

生肌鳳雛膏

用雞子煮熟去白用黃十餘箇銅杓內熬油傾入盞內約油三錢加　輕粉細末一錢　乳香　血竭　龍骨末各五分

右共入油內和勻每日早午晚雞翎蘸塗患孔內膏蓋避風涼者半月可以完口

熬藥線方

治諸痔及五癆六癰凡帶小而頭面大者宜用此線繫其患根自效

芫花五錢　礬錢二錢

用白色細扣線三錢同上二味用水一椀盛貯小磁罐內慢火熬至湯乾爲度取線陰乾凡遇前患用線一根患大者二根雙扣繫於根帶兩頭留線日漸緊之其患自然紫黑冰冷不熱爲度輕者七日重者十五日後必枯落後用珍珠散收口至妙

臟連丸

治痔無論新久但舉發便血作痛肛門墜重者

黃連淨末八兩　公豬大臟盡頭一段長一尺二寸

溫湯洗淨將連末灌入臟內兩頭以線紮緊用時酒二斤半砂鍋內熬酒將乾爲度取起臟藥共搗如泥如藥爛再晒一時許復搗

右丸如桐子大每服七十丸空心溫酒送下久服除根此與猪臟丸無大異

胡連追毒丸

治痔漏不拘遠年近日有漏通腸污從孔出者先用此丸追盡膿毒服後丸藥自然取效最穩

刺蝟皮一箇炙切片再炒黃爲末　麝香二分

胡黃連二兩切片薑汁拌炒

右以軟飯爲丸麻子大每服一錢食前酒下服藥後膿水反多是藥力到也勿懼之

黃連閉管丸

胡黃連淨末一兩　穿山甲麻油內熬黃色

石決明煅　槐花微炒各五錢

右爲末煉蜜丸如麻子大每服一錢空心清米湯送下早晚日進二服至重者四十日而愈此方不用針刀掛線不受苦楚誠起痼疾之良方也如漏之四邊有硬肉突起者加蜈蚣二十箇炒末和入藥中此方遍身諸漏皆效

活血散瘀湯

治將癰初起紅赤腫痛墜重如石及大便秘澀

川芎　當歸　防風　赤芍藥　蘇木　連翹

紅花　天花粉　皂角針　黃芩　枳殼各一錢

大黃二錢

水二鍾煎八分食前服便通者去大黃加乳香

黃芪內托散

治將癰已成服前藥勢定者欲其潰膿宜服之

黃芪二錢　當歸　川芎　金銀花　皂角針

穿山甲　甘草節各一錢

水二鍾煎八分入酒一杯食前服

四君子湯

治脾胃氣虛脫肛者

人參　白朮　茯苓各二錢　炙甘草一錢

右加薑棗水煎服或加粳米百粒

異功散

治前證

人參　白朮炒　茯苓　炙甘草　陳皮各一錢

右加薑棗水煎服

加味四物湯

治血熱陰虛脫肛者

五味子九粒　熟地三錢　麥冬　當歸　黃蘗

蒼朮各一錢　白芍藥　川芎各七分　人參

黃連各五分　杜仲七分半　知母各三分

右水二鍾煎一鍾空心溫服酒糊丸服亦可足軟加牛膝三分

補中益氣湯

治勞倦傷脾中氣不足清陽不升而致脫肛者

人參　黃芪炒　白朮炒　甘草炙各一錢半

升麻　柴胡各三分　當歸一錢　陳皮五分

右加薑棗水煎空心午前服

大補元煎（景岳全書下同）

治陰中陽虛以致脫肛者

人參少則用一二錢多則一二兩　山藥炒二錢

熟地少則用二三錢多則二三兩　杜仲一錢

枸杞　當歸各二三錢（若泄瀉者去之）　炙甘草一二錢

山茱萸一錢（若有濕熱者去之）

水二鍾煎七分食遠溫服

如元陽不足多寒者於本方加附子肉桂炮薑之類隨宜用之

如氣分偏虛者加黃芪白朮胃口多滯者不必用

如血滯者加川芎去山茱萸

如滑泄者加五味故紙之屬

補陰益氣煎

此補中益氣湯之變方也治脾虛下陷而脫肛者

人參一二三錢　當歸　山藥酒炒各二三錢

熟地三五錢或一二兩　陳皮　炙甘草各一錢

升麻三五分（火浮於上者去之） 柴胡一二錢（表外邪者去之）
水二鍾加生薑三五七片煎八分食遠溫服
舉元煎
治前證
甘草炙一二錢 升麻五七分 白朮炒一二錢
人參 黃芪炙各三五錢
水一鍾半煎七八分溫服
如兼陽氣虛寒者桂附乾薑隨宜佐用
如兼滑脫者加烏梅二箇或文蛤七八分
抽薪飲
治濕熱下墜疼痛脫肛
黃芩 石斛 木通 梔子炒 黃檗各一二錢
枳殼 澤瀉各一錢半 細甘草三分
水一鍾半煎七分食遠溫服內熱甚者冷服更佳
熱在血分大小腸者加槐蕊黃連以清之
熱在下焦小水痛澀者加草龍膽車前以利之
熱在陰分津液不足者加門冬生地芍藥之類以滋之
熱在腸胃實結者加大黃芒硝以通之
大分清飲
治前證
茯苓 澤瀉 木通各二錢 豬苓 枳殼
梔子或倍之 車前子各一錢
水一鍾半煎八分食遠溫服
如內熱甚者加黃芩黃藥草龍膽之屬
如大便堅硬脹滿者加大黃二三錢
約營煎
治前證
生地 芍藥 甘草 續斷 地榆 黃芩
槐花 荊芥穗炒焦 烏梅二箇
水一鍾半煎七分食前服
如下焦火盛者可加梔子黃連草龍膽之屬
如氣虛者可加人參白朮
如氣陷者加升麻防風
溫胃飲
治中寒嘔吐吞酸瀉泄不思飲食脫肛者
人參 白朮炒各一二錢或一兩 扁豆二錢炒
陳皮 炙甘草各一錢 乾薑炒焦一二三錢
當歸一二錢（酒灌者去之）
水二鍾煎七分食溫遠服
如脾氣陷而身熱者加升麻五七分
五君子煎
治前證
人參二錢 白朮 茯苓各二錢 炙甘草一錢
乾薑炒焦一二錢
水一鍾半煎服
胃關煎
治前證
熟地三五錢或一兩 山藥炒 扁豆炒各二錢
炙甘草一二錢 吳茱萸製五七分 焦乾薑
白朮炒各一二三錢
水二鍾煎七分食遠溫服
瀉甚者加肉豆蔻一二錢麪裹煨或破故紙亦可
氣虛勢甚者加人參隨宜用
陽虛下脫不固者加製附子一二三錢
滑脫不禁者加烏梅二箇或北五味二十粒
腸風痔漏方
赤芍藥 官桂去皮 甘草炙各等分
右㕮咀每服二錢薑二片白糖一塊水一盞同煎
七分去查空心服
淋漯方
治下部痔腫大腸頭痒痛
威靈仙 枳殼麩炒各一兩
右爲粗末熬水熏洗冷卽再煖臨臥避風洗三次
挹乾貼蒲黃散
痔方
治痔瘡痛不可忍
槐樹根皮七兩不犯鐵器搗碎 片腦一分
指甲草七顆（蜀人呼爲芒草採喂豬亦可救食高二三寸）
右作一劑用水二鍾煎一小盞入冰片末候溫頓
數患處內服槐子酒無指甲草亦可
又方
治肉痔
槐花炒 白礬枯各一兩 附子五錢
右爲細末研勻蒸餅丸如桐子大每服二十丸米
飲下食前日三服
又方
治風痔不論有頭無頭定三日安
藜蘆燒灰 老乾薑 天麻各五錢 蓮子草
明礬 石硫黃各一兩 皂角針炒黃二錢
大苦苦蕒一枚 麝香少許

右將苦蕒開一孔入麝并硫黃在內孔如小錢大就將原蓋合定綿紙糊却用瓦罐子盛炭火煅令烟盡爲度候冷取出研細同前六味藥末和勻煉蜜丸如桐子大每服十丸至十五丸空心溫酒下日三服三日效忌油麪醃藏牛馬肉魚腥生冷行房遠行勞力一切等事

神妙方

治痔

羌活　當歸　川芎　獨活　黃連　山茱萸肉　金蠍　三稜　蓬朮各半兩　枳殼去瓤十二兩　商陸白者一兩　巴豆去殼不拘數　鼠黏子炒　木香　甘草節　苦參　藁本　柴胡　蝟皮炒　猪牙皂角去皮弦子淨各一兩

右將巴豆二粒或三粒入枳殼內線紮定却用酢煮爛記冷水洗淨去巴豆不用曬焙乾入前藥同爲細末酢煮麪糊爲丸如桐子大每服三四十九空心酢湯下更用五倍子羌活獨活煎湯洗如大便燥結用煮過巴豆六七粒加入同丸一方加白朮半夏荊芥薄荷檳榔各一兩

又方

治血箭痔

苦楝子肉

右爲細末酒煮糊爲丸如梧桐子大每服三十九空心蒼耳子煎湯送下日二服

治漏神丹

川芎半兩　細辛　白芷梢各二錢半　甘草末

右每日作湯飲上痛食後下痛食前看痛孔大小用隔年黃麻根刮去粗皮槌軟撚成繩子紐入孔中至不可入則止日淺一日痛用好膏藥貼之

枯藥方

赤足蜈蚣一條香油煎酥挹乾　人指甲五錢　乳香　沒藥各二錢　麝香　粉霜各五分

右除麝香另研餘俱用泥裹煨乾爲末以鵝翎管吹上患處如有水卽時出盡不疼

又方

治痔漏

人參　黃芪　生地　川芎　當歸　升麻　條芩　枳殼　槐角　黃連

一方無黃連

熏洗方

五倍子　礬硝　桑寄生　蓮房　荊芥

右煎湯先熏後洗

便毒方

山梔子　大黃　乳香　沒藥　當歸各五分　苦蕒仁三錢　代赭石一錢

右作一服煎

又方

治坐馬癰

人參　桔梗　枳殼　甘草　柴胡　川芎　羌活　白芷　防風　白朮　芍藥　金銀花

右㕮咀薑三片棗一枚煎服

又方（千金方下同）

治五痔衆醫所不能愈者

秦艽　白芷　厚朴　石楠　柴參　亂髮　廣蟲　紫菀各一兩　雷丸　藁本各二兩　貫衆　蚘蟲各半斤　猪後懸蹄十四枚

右十三味合搗下篩以羊髓脂煎和丸如梧子大空腹飲下十五丸日二若劇者夜一服四日肛邊痒止八日膿血盡鼠乳悉瘥滿六十日終身不復發久服益善忌魚猪肉等

獨毒飲

治穿襠發

甘草　貝母　赤芍　當歸　白芷　青皮　木通　連翹　桃仁　金銀花　天花粉各一錢

穿山甲炮

如毒氣欲泄加酒蒸大黃三四錢煎服飲酒隨量以助藥力行利十餘次其毒化膿血從大便中出

又方

治濕瘡

黃連　生薑各十兩　艾葉八兩　苦參四兩

右四味㕮咀以水一斗煮取三升分三服重者服三劑

又方

治濕病下部有瘡蟲蝕人五臟

雄黃　皂莢各一分　麝香　硃砂各二分

右四味爲末蜜和搗萬杵初病酒服如梧子大一丸日二若下部有瘡取如梧子大末內下部日二

溫慝方

青黛　黃連　黃蘗　丁香各一兩　麝香二分

右五味治下篩以小棗大內下部中日一度重者棗大和羊脂二三合灌下部中日二服

痔漏方

野葛　芍藥　薤白　當歸　通草各二分

附子一分

右六味㕮咀酢浸半日先煎猪脂八合令烟出內亂髮一分令消盡下之待冷又內松脂八分蠟二分更著火上和次內諸藥煎令沸三上三下去查以故帛傳藥貼腫上乾卽易如春月去附子其髮須盡洗去垢不爾令瘡痛

痔腫痛方

枳殼一兩陳米炒令黃色去米不用　青木香一分

右爲末每服二錢飯飲調下

又方

治腸痔在腹內有鼠奶下血

白蘞蔓　椿樹東行根　狠牙根　蝟皮炙焦

貫衆　雄黃各半兩　白鱔魚頭一箇炙焦

槐樹東行根白皮一分

右爲細末臘月猪脂和一丸彈子大綿裹納下部淋洗法

天仙子　荊芥穗　小椒　蔓荊子

右水煎熏洗

貼痔法

蜀葵子半兩　蟬蛻五箇　檳榔一箇並爲末

右用棗三枚取肉研細搜和藥末如覺硬滴少蜜研成膏量大小貼於病處

又方

治痔漏因大腸感風熱而生

生白礬　腻粉各一字　水銀一粒如米大

麝香一粒如小豆大

右件並入乳鉢內研極細如病有珠子者將攀湯淨洗拭乾用手撚藥揩在痔上覺痒便是藥行一日二次又洗五日後住藥見效如或有孔只用紙撚引藥送之令徹其內更紙貼孔前一日二次

蘗皮丸

治臟毒痔漏下血不止

川黃蘗皮刮淨一斤分作四分　一分用酒浸七日洗曬乾　一分用酢浸七日洗曬乾　一分用童便浸七日洗曬乾　一分生炒黑色

右爲末煉蜜丸梧子大每空心用溫酒下五十丸久服除根

溫白丸　僧門事親

治臟毒下血

椿根白皮去粗皮酒浸曬乾

右爲末研槀肉和丸梧子大每淡酒服五十丸或酒糊丸亦可

洗痔漏方

花椒　艾葉　葱頭　五倍子　皮硝　馬齒菜　苏根

右爲散水煎先熏後洗當時痛止指日可愈

欽定古今圖書集成物博彙編藝術典

第二百二十九卷目錄

醫部彙考二百九

後陰門三

方二　涼血清腸湯　參木貫腑湯　參木芍藥湯　參木貫腑湯　參木芍藥湯　參木貫腑湯　參木芍藥

治久痢大腸脫

訶子　赤石脂　龍骨各等分

右爲末臘茶少許和藥摻腸頭上絹帛揉入又以龜頭骨煅少入枯礬爲末入藥同上

蟠龍散

治陽證脫肛

地龍一兩　風化硝二兩

右爲末每用一二錢肛門濕則乾塗燥則清油調塗先以見毒消荊芥生薄荷水候温洗輕輕拭乾然後傳藥

伏龍肝散

治陰證脫肛

伏龍肝一兩　龜頭骨五錢　百藥煎二錢半

右爲末每用一二錢濃煎紫蘇湯候温洗和清油調塗並如前法

磁石散

治脫肛

磁石半兩火煅醋淬七次

右爲末每服一錢空心米飲調下

寸金錠子（東垣十書）

治前證

牡蠣粉　紅藤根　乾漆各五錢　藤黃　雄黃　雌黃　舶硫黃　輕粉　粉霜　麝香　砒霜

枯黃丹各一錢

右爲末陳米飯和搗丸如棗核大每一丸納肛門深二寸用新磚毬子二箇炭火燒赤淬醋中綿裹一箇於肛門熨之冷即換之下惡物除根

參芪湯（治病同春）

一名提肛散治肛門虛寒脫出

人參　黃芪蜜炒　當歸　白朮　生地黃　白芍藥酒炒　白茯苓各一錢　升麻　桔梗　陳皮　乾薑炒各五分　甘草炙三分

右剉作一貼水煎服

熏龜法（古今醫鑑）

治痔漏脫肛

龜一箇放鑊內　麝香一二分

右將淚水傾入鑊內泡龜坐其上熏之良久將水洗痔後將肉作羹食之將龜頭作末摻肛上

獨虎散（直指方）

治脫肛

五倍子半兩

右水三椀煎至椀半入焰硝荊芥各一錢乘熱熏洗用五倍子末摻之

文蛤散（得效方）

治脫肛不收

五倍子末　白礬　蛇牀子

右煎湯熏洗後以赤石脂末摻芭蕉葉上托入或長尺餘者以兩牀相接中空以器盛藥水滿架起與牀平令病者仰臥浸器中逐日如此縮盡爲度

浮萍散

治脫肛

秋暮取霜露侵過浮萍不拘多少以淨瓦攤開陰乾其瓦一日一易不可見日務要陰乾用紙包起

右研爲細末先以井水洗淨肛門後以藥末摻上其肛徐徐卽入

孩兒散（醫學入門下同）

治肛脫熱腫

熊膽五分　孩兒茶二分　片腦一分

右爲末入乳調敷肛上熱汁自出而肛收

茯苓麪

治脫肛

白茯苓　麻子去皮

右爲末和勻九蒸九曬入蜜少許常食之能斷酒肉鹽醬可治久痔

七聖丸（醫學正傳）

治肛門痛不可忍脈訣曰積氣生於脾臟旁大腸疼痛陣難當此藥主之

椰李仁泥一兩五錢　羌活一兩　大黃煨八錢　檳榔　桂心　木香　川芎各五錢

右爲末蜜丸梧子大白湯下三五十丸微利卽愈切不可快利其痔滋甚

槐角丸

治痔漏腫痛或便血

槐角　防風　地榆　枳殼麩炒　當歸酒洗炒　荊芥各一兩

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服五十丸空心淡湯下腫痛或便祕飲槐花酒膿多或倦宜服黃芪人參湯潰而作痛宜服乳香止痛散

雙解散

治男子交感强固精氣以致精血交錯肛門連拗腫痛大小便澀滯

辣桂　大黃炒　白芍藥　澤瀉　黑牽牛炒搗
桃仁去皮尖各二錢半　甘草五分　乾薑一錢
右作二劑水二鍾煎七分空心幷食前服

秦艽白朮湯 東垣十書下同

治痔瘡作痛大便乾燥或下血
秦艽　桃仁去皮尖研膏　澤瀉　枳殼麩炒
皂角仁煅存性　歸尾酒拌　白朮各一錢二分
地榆一錢 血不止倍之
右作一劑用水二鍾煎八分食前服亦可爲丸

祛風潤燥湯

治痔瘡焮腫作痛大便祕澀
防風　荊芥穗　羌活　黃連　黃芩　秦艽
枳殼各一錢五分　澤瀉　皂角仁去皮燒存性
桃仁去皮尖研　紅花各一錢　大黃煨二錢
右作一劑用水二鍾煎八分食前服

痔藥膏子 醫學綱目

治外痔及翻花痔脫肛腫痛膿水不止
柴灰淋濃汁兩椀熬至一椀入　草烏片　大黃片
各二錢慢火熬至半椀入　甘草一錢滾數沸入
淨石灰細末半匙略滾三五次
右用絹兩重濾過再熬成膏候冷入膽礬五分研
極細瓦器盛貯臨用入龍腦末少許和勻以銀篦
薰藥塗傅日一次重者塗三五次先以藥水洗乾
乃塗之神效

秦艽蒼朮湯 東垣十書下同

治前證
秦艽　桃仁去皮尖另研　防風　蒼朮製
皂角仁燒存性爲末各一錢半　當歸梢酒洗
澤瀉各一錢　大黃少許 雖大便過澀亦不宜多用　黃蘗酒洗
各五分 若大腸頭沉重者濕勝也更加之如天氣大熱或病人燥熱喜冷以意加之
右除桃仁皂角仁二味外餘藥㕮咀如麻豆大都
作一服水三盞煎一盞二分去滓入桃仁等二味
再上火煎至一盞空心候宿食消盡熱服之待少
時以美饍壓之不犯胃也服藥日忌生冷硬物冷
菜之類及酒濕麪大料物乾薑之類犯之其藥無
效如有白膿加白葵花五朶去萼青皮半錢去白
入正藥中同煎又用木香三分爲細末同桃仁等
二味再上火同煎依上法服餌古人治此疾多以
歲月除之此藥一服立愈病大者再服而愈

紅花桃仁湯

治前證
黃蘗　生地黃各一錢半　猪苓　澤瀉　蒼朮
當歸梢　漢防己　防風各一錢　麻黃　紅花
桃仁各半錢
右水三盞煎一盞稍熱食前服

當歸椰李仁湯

治前證
椰李仁　皂角仁各一錢　枳實七分　秦艽
麻仁各一錢半　當歸尾　生地　蒼朮各五分
大黃煨　澤瀉各三分
右除皂角仁別爲末外餘藥用水三盞煎一盞去
查入皂角仁末空心食前服

秦艽羌活湯

治前證
秦艽　黃芪各一錢　防風七分　藁本三分
升麻　炙甘草　麻黃　柴胡各五分　細莘
紅花各少許　羌活一錢二分
右水二盞煎至一盞空心服

搜風順氣丸

治痔漏風熱祕結
車前子一兩五錢　大麻子微炒　大黃各五錢半
生半熟　牛膝酒浸　椰李仁　菟絲子酒浸
枳殼　山藥各二錢
右爲末煉蜜丸如桐子大每服三十丸溫湯下

秦艽防風湯

治痔漏每日大便時發疼痛如無疼痛者非痔漏
也此藥主之
秦艽　防風　當歸　白朮各一錢半　炙甘草
澤瀉各六分　桃仁三十箇　黃蘗五分　柴胡
升麻各二分　大黃煨　橘皮各三分　紅花少許
右水三盞煎一盞稍熱空心服

乳香散

治牡痔
箬葉去頭粗梗剉四兩　蛇蛻一條頭尾俱全者
黃牛角尖長二寸者一對剉　乳香　猪牙皂角
鮫鯉甲各二兩
右入砂罐內蓋口鹽泥固濟曬乾用炭十斤煅候
碧篠出去火放冷取出研細每服二錢匕以胡桃
肉一枚細研拌藥空心酒調下

猪蹄灰丸

治前證

猪懸蹄甲燒存性研一兩　水銀三大豆許
右先取木銀用蒸棗肉二枚研勻次入猪蹄灰和爲丸如芡實大先以鹽湯洗下部內一丸夜臥再用以瘥爲度

檳榔散
治風氣積留下部結成牝痔生瘡下血腫疼
檳榔炒　澤瀉酒浸　瞿麥　防己　甜葶藶炒　藁本去苗土　陳皮去白炒　椰李仁同陳皮炒滑石各半兩　木香　芫花醋拌炒黃各一兩
乾漆炒烟盡一錢二分半
右爲細末每服二錢不拘時溫酒調下日三

椵藤散
治痔下血不止生瘡腫痛
椵藤子仁　龜甲酢炙　黃芪　蛇蛻燒灰存性　槐角子炒　川大黃炒　藁本　桂心各半兩
當歸剉炒　蜂房炙各七錢五分　猪後懸蹄甲七枚炙焦黃
右爲細末每服二錢食前米飲下

麝香散
治牝痔及一切內外痔疼痛不可忍
新黃大苦婁一枚切開頂子不去瓤選不蛀皂角子塡滿以開下頂蓋合別用紙筋泥固濟約三指厚以炭火簇合燒令紅放於地坑內出火毒一宿取出入麝香末一錢
右研極細以磁盒盛每服一錢匕米飲調下

赤小豆散
治前證
赤小豆炒熟　生地黃　黃芪各一兩　赤芍藥　白斂　桂心各半兩　黃芩　當歸微炒各七錢半
右爲細末每服二錢食前槐子煎湯調下

乾葛湯
治前證
乾葛　枳殼炒　半夏薑製　生地黃　茯苓　杏仁各一錢五分　黃芩　甘草炙各五分
右水二鍾黑豆一百粒薑五片白梅一箇同煎至一鍾食前服

橘皮湯
治前證
橘皮　枳殼炒　槐花炒　川芎各一錢五分　桃仁去皮尖炒　木香　檳榔　紫蘇　香附　甘草炙各一錢
右咬咀水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾食前溫服

威靈仙丸
治氣痔大便溏
威靈仙　乳香另研　枳殼麩炒各一兩
右爲細末以粟米飯和爲丸桐子大每服十五丸食前米飲送下日三服

熏熨方
治氣痔脫肛
枳殼麩炒　防風各一兩　白礬枯二錢五分另研
右咬咀拌勻水三椀煎至二椀乘熱熏之仍以軟帛蘸湯熨之通手卽淋洗

桑木耳散
治痔疾肛邊痒痛
桑木耳炙　槐木耳炙　蝟皮炙黃　羌活　當歸炒各一兩　枳殼二兩炒
右爲細末每服二錢食前粥飲調下

皂角煎丸
治內痔腸頭裏面生核寒熱往來
滿尺皂角三挺去核弦酢炙　薏苡仁　白礬煅　刺蝟皮炙黃　白芷各一兩　桃仁去皮尖炒　甜葶藶炒　川芎　桔梗各半兩　猪後蹄垂甲十枚燒存性
右爲細末蜜丸如桐子大每服五十丸空心桑白皮煎湯服

龜甲丸
治內痔
龜甲　刺蝟皮炙焦黑　穿山甲炙焦　白礬枯　附子　猪牙皂角各半兩炙焦存性二分
右爲細末研勻蒸餅丸桐大子米飲下二十丸食前日三服

蝟皮丸
治諸痔出血裹急疼痛
刺蝟皮一張炙焦　川芎　白芍藥　槐花微炒　枳殼炒　艾葉炒黃　地榆　當歸身　黃芪炙　白礬煅　貫衆各半兩　猪後懸蹄甲十枚炙焦
盈尺皂角一挺去弦核酢炙黃　頭髮三錢燒存性
右爲細末蜜丸如桐子大每服五十丸食前米飲送下

痛甚能消丸

治諸痔疼痛不可忍者

威靈仙四兩　防風　刺蝟皮燒灰存性　卷柏

阿膠炙燥各半兩　糯米炒一合

右爲細末蜜丸如梧子大每服十丸加至二十丸不拘時用人參湯送下日二服

試蟲散

治前證

臭椿皮　懷火草陰乾一名景天　地骨皮各二兩

馬牙硝一兩

右爲細末用精猪肉一片摻藥末三錢匕在肉上就上坐一二時起看有蟲即出無即已

龍腦散

治痔瘡熱毒

活鯽魚一尾去腸雜入穀精草填滿以泥固濟煆火煅存性

右爲細末入龍腦少許蜜調傅之

白金散

治久新痔痛如神

海螺蛸去粗皮

右一味爲細末每用二三錢生麻油調成膏以雞翎拂上每日夜用之日久自消

烟熏方

治痔漏痛

白蠐魚骨　熟艾各等分

右剉碎和勻用新盆子一箇盛藥在內用紙封盆口上通一竅以火燒藥候烟出竅上坐熏之烟盡即止

黑玉丹

治新久腸風痔漏著牀疼痛不可忍者服此藥不過三四次便見功效初得此疾發癢或疼穀道週遍多生梗核此是痔如破是漏只下血是腸風皆酒色氣風食五事過度即成此疾人多以外醫塗治病或在腸中自有蟲蝕若不去根本其病不除此藥眞有奇效

刺蝟皮　槐角各三兩　猪後懸蹄甲四十九枚

牛角鰓刨　亂髮皂角水洗　敗棧各二兩以上六味俱裝入鍋內燒存性　苦楝皮一兩二錢五分

芝麻生　雷丸各一兩　乳香五錢　麝香一錢

右爲末酒煮麪糊丸如桐子大每服八九先嚼胡桃一枚以溫酒吞下或海藻煎酒吞下空心食前日三服切忌別藥不過三五日永除根本

地榆散

治痔瘡腫痛

地榆　黃芪炙　枳殼炒　檳榔　川芎　黃芩

槐花　赤芍　羌活各一錢　白蘞　蜂房炒焦

甘草炙各五分

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

皂刺丸

治痔漏愈而復痒

皂角刺二兩燒煙盡存性　槐花　防風七錢半

蛇牀子　白礬煅　枳殼　白蒺藜炒去刺

羌活各五錢　蜂房炒焦　五倍子各二錢五分

右爲細末酢調菉豆粉糊爲丸如桐子大每服五十丸食前用苦楝根煎湯送下仍用熱童便入白礬末洗肛門

蒲黃散

治痔漏

蒲黃　血竭半兩

右爲細末每用少許貼患處

槐角地榆丸

治痔漏脈荒下血者

地榆　槐角　白芍藥炒　山梔子炒焦　枳殼

黃芩　荊芥穗

右入生地黃水煎服

槐角枳殼散

治痔漏下血

槐角炒　枳殼炒　黃連　黃芩　當歸　白芍

赤茯苓　甘草　烏梅燒存性

右入生地黃水煎服

荊枳湯

治前證

荊芥穗　枳殼炒　槐花　紫蘇莖葉　香附

甘草炙各等分

右爲細末每服二錢空心米飲調下

逐瘀湯

通利大小便腸取下惡物

川芎　白茯神　白芷　木通　赤芍　甘草生

白茯苓　乾地黃　五靈脂　枳殼　蓬莪朮

阿膠各一錢　桃仁去皮尖炒　大黃各一錢五分

右作二服用水二鍾生薑三片蜜三匙同煎食前服以利爲度

骨碎補丸

治前證

骨碎補　補骨脂　熟地黃　川當歸　續斷

石楠葉　黃芪　釵石斛　牛膝　杜仲炒去絲

萆薢各二兩　附子炮一兩　白芍藥　川芎

菟絲　沙參　羌活　防風　獨活　天麻各兩半

右爲末煉蜜丸空心鹽湯下

大瘻方

羌活　防風　細辛　附子　甘草　川芎

續斷　白芍藥　白朮　當歸　桂心　麻黃

黃芪　熟地黃

右爲細末煉蜜丸空心鹽湯下三錢此方與前骨碎補丸相表裏

桂附丸

治氣漏諸瘡

乳香二錢　厚朴薑製　粉草炙　白朮　桂心

附子炮裂米酢中浸再炮三五次去皮臍各一兩

木香二錢五分

右爲細末煉蜜丸如桐子大空心米飲下二三十丸丹溪云精要治漏諸瘡與桂附丸此屬冷只因瘡久不合風冷乘之血氣不潮而成也厚朴雖溫其瀉衛尤速恐不若參芪佐以陳皮庶乎與病情相得此方治冷漏瘡若寒而虛者只以加味十全湯隨時令經絡加減用之爲當又虛甚者宜參朮歸芪膏

陷脈散

治漏瘡及二三十年瘻瘤大或如盃盂久久不瘥致有漏潰令人骨肉消盡或堅或軟或潰令人驚惕臥寐不安體中掣痛愈而復作

乾薑炮　琥珀研　附子炮去皮　大黃各一兩

丹參七錢半　石硫黃研　白石英研　鍾乳研

鷦鷯骨研各半兩

右爲末貯以磁盒韋囊勿令泄氣若瘡濕即傅無汁即煎猪脂和傅之以乾爲度或死肌不消加芒硝二兩益佳一法加胡燕窠一枚

蜈蚣油（醫學入門）

治諸痔

端午日取大蜈蚣一條竹簽陰乾

右俟臨發剪一寸煅存性麻油調塗輕則不發重則次年對周日又發再剪一寸煅塗斷根又法用生蜈蚣數條浸麻油內俟生黴略化塗痔及諸瘡癬

枯痔方（醫學綱目）

治諸痔消腫

雄黃　硫黃　明礬各等分

右爲末用新盞先鋪礬末一半次鋪餘藥又以礬末蓋上火煅候礬枯爲度研爲末津唾調傅乾落爲度後用石膏五倍子爲末敷收瘡口神效

黑靈散

治漏瘡

牡蠣粉　虢丹　硫黃研各一分　露蜂房剉二分

右同炒令烟盡爲細末入髮灰一分麝香少許和勻傅之

馬齒莧膏

治一切瘻

馬齒莧陰乾　臘月燭燼各等分

右爲細末以臘猪脂和先以溫泔水洗拭乾然後以藥傅之日三

神應膏

宋褚防禦治理宗久漏瘡諸方不效獨此膏愈之如腸毒胃毒爲丸服之神效

當歸一兩一錢　赤芍藥　大黃各兩半　白芷

莪朮　官桂各一兩　元參一兩三錢　川續斷

生地黃各一兩二錢

右九味細剉用眞香油二斤浸春五日夏三日秋七日冬十日入鍋內以文武火煎令黑色濾去查如熱天用黃丹二十兩冷月十五兩旋旋下丹不住手攪試水中沉爲度不可令婦人雞犬見如漏有孔者以膏送入孔內外以膏攤貼之

檳榔散

治癰疽瘡癤膿潰之後外觸風寒腫焮僵硬膿出清稀出而不絕肉腠空虛惡汁臭敗瘡邊乾急好肌不生及療疳瘻惡瘡不斂口

木香　檳榔　黃連

右等分爲細末猪脂和傅瘡口即斂

治漏外塞藥

爐甘石煅童便淬　牡蠣粉

右爲極細末傅之

截疳散（東垣十書）

治年深疳瘻瘡

黃連　麝香　龍腦各半兩　密陀僧　黃丹

白芨　白蘞各一兩　輕粉一錢
右爲細末和勻乾摻或紐上以膏貼之
黑丸子（奇效良方）
專治久年痔漏下血
百草霜　白殭蠶各一兩　木馥頭三兩　烏梅
敗棷　側柏葉　亂髮各一兩二錢半俱燒存性
桂心三錢　白芷五錢
右爲細末研勻酢糊爲丸如梧桐子大每服三五十丸空心用米飲湯送下
加味四君子湯
治五痔下血面色萎黃心忪耳鳴脚弱氣乏口淡食不知味
人參　白朮炒　白茯苓　白扁豆蒸　黃芪炙　甘草炙各等分
右爲細末每服二錢白湯點服一方有五味無甘草
臭樗皮散
治痔漏下血及臟不止
艾葉三分微炒　臭樗皮微炒　黃連　地榆
酸石榴皮　眞阿膠炒令黃各一兩
右爲細末每服二錢食前粥飲調下
神效方
治痔疾下血日夜不止
白蠟五兩　綠礬三兩　黃丹飛　伏龍肝
蝟皮各二兩
右搗碎入磁罐子內用炭火五七斤燒炭盡爲度候冷取出研如粉以麵糊爲丸如梧桐子大每服十丸空心米飲下
芎歸丸
治前證
川芎　當歸　神麴炒　黃芪　槐花微炒
地榆各半兩　荊芥穗　頭髮燒存性　木賊
阿膠炒各一兩
右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十丸食前用米飲送下
猪臟丸
治痔漏下血
猪臟一條洗淨控乾　槐花炒爲末入臟內兩頭紮定石器內米酢煮爛
右搗和丸如梧子大每服五十丸食前當歸酒下
勝金丸
一名百藥散治痔瘡下血及臟毒便血
百藥煎二兩一兩生用一兩炒焦一兩燒存性
右爲細末軟飯和丸如桐子大每服五十丸空心米飲下一方爲細末米湯調二錢服
應效散
一名托裏散治氣瘻痔蝕瘡多年不效者
地骨皮不拘多少冬月取皮陰乾
右爲細末每用紙撚蘸紐瘡口內自然生肉更用米飲調二錢不拘時服三日見效
內托黃芪酒煎湯
治寒熱濕瘧難堅硬浸腫作痛
黃芪鹽水拌炒　歸尾各二錢　柴胡一錢半
連翹　肉桂各一錢　甘草炙　黃藥各五分
升麻七分　大力子炒一錢
右作一劑水酒各一鍾煎八分食前服
神應散
治五痔
黃牛角鰓一枚槌碎　猪牙皂角七箇去皮弦子
蛇蛻皮一條　穿山甲七片　刺蝟皮一兩
右各細剉入罐內黃泥固濟火煅通紅候冷細研爲末臨臥時細嚼胡桃仁一箇如糊用好酒一盞送下使睡至五更時以溫酒調下藥三錢至辰時更進一服雖久病不過三服立效
加味香蘇散（得效方）
一名橘皮湯治氣痔
陳皮　枳殼　川芎　槐花各一錢　紫蘇莖葉
檳榔　木香　桃仁　香附　甘草各五分
右剉作一貼薑三片棗二枚同煎服
上品錠子（醫學入門）
專治十八種痔漏
紅蠟一兩二錢五分　信砒火煅五錢　乳香
沒藥　硃砂各二錢五分　牛黃二分五釐
硇砂五分熟二分生三分
右爲末麵糊和勻捻成錠子看瘡大小深淺插入竅內肉變黑色直待黑肉去盡方可上生肌散
釣腸丸（得效方）
治諸痔及久瘻脫肛下臟血
黃芪蕎　蝟皮各一箇　胡桃肉七箇俱燒存性
雞冠花二兩半　白附子　南星　半夏各二兩
枳殼　訶子皮各一兩　綠礬煅　白蠟煅

附子生各五錢
右爲末酢糊和丸梧子大空心溫酒下三五十丸
寬腸丸
治痔大便祕澀痛用此寬腸
黃連　枳殼各等分
右爲末麪糊和丸梧桐子大米飲下五十丸
又方
凡用藥枯痔後大便堅硬難下宜用此方
大黃煨　枳殼　當歸酒洗各等分
右爲末煉蜜丸梧子大服如上法
血竭散 直指方
治痔漏痛不可忍
血竭　牡蠣粉　髮灰各等分
右爲末入麝香少許津唾調敷或杏仁泥調敷
清心丸 丹溪心法
治痔痒痛內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火此諸痔受病之源也此藥主之
黃連一兩　茯神　赤茯苓各五錢
右爲末蜜丸梧子大空心米飲下百丸
枯礬散 得效方
治五痔痒痛
枯白礬一錢　片腦五分
右爲末先以藥湯洗後摻少許
水馬散
治一切痔
夏月三伏內於止水中採婆子一名水馬兒高脚水面跳走者是也採取三十箇用三張紙包每包十箇於背陰處懸掛陰乾
右每包作一服研爛空心溫酒調下良久乃吃飯三日連三服十日內見效久患痔膿血者二三十服絕根
黑地黃丸 河間六書
治久痔痔漏下膿血虛者服之神妙治痔之聖藥
蒼朮一斤米泔浸　熟地黃一斤　五味子八兩
乾薑秋冬一兩春七錢夏五錢
右爲末棗肉和丸如梧子大空心米飲或溫酒下百丸
三神丸 東垣十書
治僧道流因久坐飽食發爲諸痔
枳殼　皂角煅　五倍子炒各等分
右爲末蜜丸梧子大空心溫水下五七十丸
脚毒湯 萬病回春
洗痔漏
焰硝一兩　瓦松　馬齒莧　甘草各五錢
五倍子　川椒　防風　側柏葉　枳殼　葱白
蒼朮各三錢
右水五椀煎至三椀熏洗日二次
熊冰膏 醫學入門
治五十年久痔及一切痔漏脫肛止痛絕勝他藥
熊膽二分半　片腦半分研勻
右以白雄雞膽三箇取汁調勻以雞羽蘸塗痔上先以藥水洗淨乃上藥神效
取痔蟲方 丹溪心法
痔漏有蟲如細絲黑頭取去除根
瞿麥半升　猪牙皂角一寸
右爲末入猪腰子一隻內用米泔煑空心食之少頃腹痛上厠蟲皆隨出作地坑埋之薄粥補之
涼血飲
治痔漏因風熱燥歸於大腸故涼血爲主
人參　黃芪　黃連　生地黃　當歸　川芎
槐角　條芩　枳殼　升麻各一錢
右剉作一貼水煎空心服或丸服
蓮花蕊散
治痔漏二三十年不愈者三服效
蓮花蕊　黑烏頭末各一兩五錢　當歸五錢
礬紅二錢
右爲末先忌食肉六七日空心食肉一頓取溫酒下藥三錢取下膿血或蟲是效
取漏膿法 醫學入門
治內痔久漏取膿最妙
焰硝三兩　苦參一兩五錢
右爲末用布四寸長二寸闊縫一袋入藥半袋以砒三分放藥末中間方入全藥袋滿縫袋中兩頭安帶子如跨馬繫住
活龜丸
治腸風痔漏
大烏龜一箇以火燒地熱蓋龜於地逼出臭屁盡通身用草包縛外用黃泥固濟灰火煨熟取肉研泥龜殼用牛骨髓塗炙五七次透心酥乾爲末
黃連一兩九蒸九曬　當歸尾三錢三分
右共爲末和龜肉搗丸梧子大白湯下五七十丸

豚胃丸

治痔漏亦治諸瘻

槐花二兩　黃連　牡丹皮各一兩　蝎皮七錢

羌活六錢

右剉入猪肚內縫定煮爛去藥食肚如硬再服以患處軟方止或同上諸藥爲丸服亦可

辰砂膏 丹溪心法

痔漏塞竅

信砒一錢　白礬二錢　密陀僧　辰砂各五錢

右先研信砒細鋪鍋底次用礬末鋪砒上火煅烟盡爲度次將陀僧辰砂研細白糕和勻作尖挺如小麥大取一粒納漏孔內俟敗肉盡後貼生肌散

田螺膏

治痔瘡腫痛坐臥不得諸藥不效者

大田螺八九箇以針挑開頂蓋入白礬末少許於內置地上尖底埋土中其頂蓋仰天經一宿次日取蓋上水汁以雞羽塗痔上五七次即消

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百三十卷目錄

醫部彙考二百十

後陰門四

單方

鍼灸

導引

醫案

藝術典第二百三十卷

醫部彙考二百十

後陰門四

單方

大腸脫肛烏龍尾同鼠屎燒烟於桶內坐上熏之數次即不脫烏龍尾即梁上塵也外臺秘要

風熱脫肛鐵粉研同白蔹末傅上按入直指方

虛冷脫肛石灰炒熱故帛裹坐冷即易之聖惠方

大腸脫肛磁石半兩火煅酢淬七次爲末每空心米飲服一錢直指方

又方用磁石末麪糊調塗頗上入後洗去簡便方

大腸脫肛苦參五倍子陳壁土等分煎湯洗之以木賊末傅之醫方摘要

痔痢脫肛冷水調黃連末塗之良經驗方下同

大腸脫肛蛇牀子甘草各一兩爲末每服一錢白湯下日三服并以蛇牀末傅之

老小脫肛香附子荊芥穗等分爲末每服一匙水一大椀煎十數沸淋洗之三因方

下血脫肛白雞冠花防風等分爲末糊丸梧子大空心米飲每服七十丸

又方白雞冠花炒椶櫚灰羌活一兩爲末每服二錢米飲下永類鈐方

肛門腫痛生苧根搗爛坐之良集簡方

脫肛不收苧根搗爛煎湯熏洗之聖惠方

大腸脫肛木賊燒存性爲末摻之按入即止一方加龍骨三因方

脫肛不收莨菪子炒研傅之聖惠方

大腸脫肛曼陀羅子連殼一對橡斗子十六箇同剉水煎三五沸入矾硝少許洗之

大腸脫肛生苦蔞搗汁溫服之以猪肉汁洗手按之令暖自入肘後方

久痢脫肛女萎切一升燒熏之楊氏產乳方

大腸脫下木饅頭連皮子切炒茯苓猪苓等分爲末每服二錢米飲下亦治夢遺名鎖陽丹普濟方

脫肛不收蒲黃和猪脂傅日三五度子母秘錄

大腸脫肛用紫浮萍爲末乾貼之危氏得效方

脫肛不收生韭一斤切以酥拌炒熱綿裹作二包更互熨之以入爲度聖惠方

大腸脫肛生萊菔擣實臍中束覺有痛即除摘元方

諸瘡痔漏久不結痂用生薑連皮切大片塗白礬末炙焦研細貼之勿動良普濟方

痔漏脫肛胡荽子一升粟糠一升乳香少許以小口瓶燒烟熏之儒門事親

凡大人小兒脫肛每天冷及吃冷食即暴痢不止肛則下脫久療不瘥者春間收紫堇花二斤曝乾爲散加磁毛末七兩相和研細塗肛上納入即使人噀冷水於面上即吸入腸中每日一塗藥噀面不過六七度即瘥又以熱酒半升和散一方寸匕空腹服之日再漸加至二方寸匕以瘥爲度若五歲以下小兒即以半杏子許和酒服之忌生冷陳倉米天寶單方

穀道生瘡荇葉搗爛棉裹納之下部日三次范汪方

脫肛瀉血不止用桑黃一兩熟附子一兩爲末煉蜜丸梧子大每米飲下二十丸聖惠方

大腸脫肛久積虛冷以鼈頭炙研米飲服方寸匕日二服仍以末油調塗腸頭上托入千金方

大腸脫肛蜣蜋燒存性爲末入冰片研勻摻肛上托之即入醫學集成

痔漏脫肛每日空心嚼川椒一錢涼水送下二三次即收救急方

大腸脫肛脫下三五寸者用大田螺二三枚將井水養三四日去泥用雞爪黃連研細末入臍內待化成水以濃茶洗淨肛門將雞翎蘸掃之以軟帛托上自然不再復發也德生堂經驗方

腸頭挺出蟾蜍皮一片瓶內燒烟熏之并傅之千金方

陽證脫肛以荊芥生薑煎湯洗之用地龍蟠如錢樣者去土一兩矾硝三錢爲末油調傅之全幼心鑑

大腸脫肛狗涎抹之自上也扶壽精方

大腸脫肛蝸牛殼去土研末羊脂鎔化調塗送入即愈李延壽方

大腸脫肛炙麻鞋底頻按入仍以故麻鞋底鼈頭各一枚燒研傅之按入即不出也千金方

脫肛不收貼水荷葉焙研酒服二錢仍以荷葉盛末

坐之（袖驗良方）

大腸脫肛蝟皮一斤燒磁石煅五錢桂心五錢爲末每服二錢米飲下（葉氏摘元方）

脫肛痔疾五倍子半斤燒烟熏之或水煮極爛盛坐桶上熏之待溫以手輕托上內服參芪升麻藥（簡便方）

又方用五倍子百草霜等分爲末酢熬成膏鵝翎掃傅上即入（袖珍方下同）

瀉血脫肛石耳五兩炒白枯礬一兩密陀僧半兩爲末蒸餅丸梧子大每米飲下二十丸

下痢脫肛橡斗子燒存性研末猪脂和傅（直指方）

又方橡斗殼燒存性研末猪脂和搽井煎汁洗之

大腸脫肛不蛀皂角五挺搥碎水浸取汁二升浸之自收上收後以湯盪其腰肚上下令皂角氣行則不再作仍以皂角去皮酥炙爲末棗肉和丸米飲下三十丸（聖惠方）

大腸脫肛黃皮桑樹葉三升水煎帶溫暈貯之（直指方）

坐板瘡疥絲瓜皮焙乾爲末燒酒調搽之（攝生集妙方）

脫肛不收五花構葉陰乾爲末每服二錢米飲調下

兼塗腸頭（聖惠方）

大腸久積虛冷每因大便脫肛用蝸牛一兩燒灰猪脂和傅立縮

又方治上氣及痢後脫肛用乾蝸牛一百枚炒研每用一錢以飛過赤汁磁石末五錢水一盞煎半盡調服日三

泄痢脫肛已久者黑聖散主之大蜘蛛一箇匾葉兩重包紮定燒存性入黃丹少許爲末先以白礬葱椒煎湯洗拭乾以前藥末置軟帛上托入收之甚是有效也（集驗方）

鷹嘴爪炙入麝香煎酥爲末酒一盞服之治痔漏有驗（王右軍鷹嘴帖）

肛門腫痛欲作痔瘡急取屠刀磨水服之甚效（集驗方）

臀生濕瘡日以新磚坐之能去濕氣（集元方）

痔瘡腫痛鉛白霜白片腦各半字酒調塗之隨手見效（嬰童百問）

外痔腫痛黃丹滑石等分爲末新汲水調日五上之

漏瘡不合童尿製爐甘石牡蠣粉外塞之內服滋補藥（雜病治例）

痔漏腫痛無名異炭火煅紅米醋淬七次爲細末以溫水洗瘡綿裹筋頭填末入瘡口數次愈（簡便方）

痔瘡有蟲井漏古礦石灰川烏炮等分爲末燒飯丸梧子大每服二三十丸食前酒或米飲下（活法機要）

痔瘡熱腫用鴨嘴青膽礬煅研蜜水調傅可以消脫（直指方）

一切漏瘡有孔用信石新瓦火煅研末以津調少許於紙撚上插入蝕去惡管漏多勿齊上最妙（救急易方）

一切漏瘡故布裹鹽燒赤爲末每服一錢（外臺秘要）

痔瘡漏瘡白礬青鹽各四兩爲末猪尿脬一箇盛之陰乾每服五錢空心溫水下（經驗方）

冷瘡成漏明礬半生半熟熟者生肉生者追膿五靈脂水飛各五分爲末以皮紙裁條唾和末作小撚子香油捏濕於末上拖過剪作大小撚安入漏內早安午換候膿出盡後有些少血出方得乾水住藥自然生肉痊好

外痔腫痛白頭翁草一名野丈人以根搗塗之逐血止痛（衛生易簡方）

雞冠痔疾黃連末傅之加赤小豆末尤良（斗門方）

痔病祕結用此寬腸黃連枳殼等分爲末米糊丸梧子大每服五十丸空心米飲下（醫方大成）

脫肛取東壁土湯泡先熏後洗亦治小兒脫肛

痔瘡痔腫不可忍者胡黃連末鵝膽汁調搽之（集效方）

下部漏瘡苦參煎湯日日洗之（直指方）

痔瘡腫痛不可忍蛇牀子煎湯熏洗（簡便方）

痔漏出血香白芷爲末每服二錢米飲下井煎湯熏洗神效（直指方）

痔瘡腫痛先以皂角烟熏之後以鵝膽汁調白芷末塗之即消（醫方精要）

痔瘡腫痛鬱金末水調塗之即消（醫方摘要）

痔漏腫痛荊芥煮湯日日洗之（簡易方）

野雞痔病先以槐柳湯洗過以艾炙上七壯取效（經驗良方）

酒痔便血青蒿用葉不用莖用莖不用葉爲末糞前冷水糞後酒水調服（永類鈐方）

痔疾下血益母草葉搗汁飲之（食醫心鏡）

五痔肛腫久不愈變成漏瘡用雞冠花鳳眼草各一兩水二椀煎湯頻洗（衛生寶鑑）

腸痔下血多年不止用木賊枳殼各二兩乾薑一兩大黃二錢半並於銚內炒黑存性爲末每粟米飲服二錢甚效也（圖經本草）

痔漏瘡發旱蓮草一把連根鬚洗淨用石臼搗如泥以極熱酒一盞冲入取汁飲之查傅患處重者不過三服即安累治有效（保壽堂方）

痔瘡腫痛連蕁煎湯熏洗後以刀上飛過綠礬入麝香貼之集驗方

痔發腫痛扁竹搗汁服一升一二服未瘥再服亦取汁和麪作餺飥煑食日三次藥性論

內痔不出草烏爲末津調點肛門內痔卽翻出乃用枯痔藥點之集驗方下同

下部䘌蟲痛痒膿血旁生孔竅蜣螂七枚五月五日收者新牛糞半兩肥羊血一兩炒黃同搗成膏丸蓮子大炙熱綿裹納肛中半日卽大便中蟲出三四度永瘥

穀道赤痛或痔如蟲咬菟絲子炒黃黑爲末雞子白和塗之肘後方

肛門痔痛用木鼈仁三枚砂盆搗如泥入百沸湯一椀乘熱先熏後洗日用三次仍塗少許秘寶方

又方用木鼈仁帶潤者雌雄各五箇乳細作七丸椀覆濕處勿令乾每以一丸唾化開貼痔上其痛卽止一夜一丸自消也屢用有效集簡方

痔瘻腫痛以馬兜鈴於瓶中燒烟熏病中良日華本草

五痔下血榼藤子燒存性米飲服二錢有功寇氏衍義

痔漏有蟲黑白牽牛各一兩炒爲末以猪肉四兩切碎炒熟蘸末食盡以白米飲三匙壓之取下白蟲爲效

又方白牽牛頭末四兩沒藥一錢爲細末欲服藥時先日勿夜飲次早空心將猪肉四兩炙切片蘸末細細嚼食取下膿血爲效量人加減用忌酒色油膩三日儒門事親

漏瘡水溢乃腎虛也牽牛末二錢半入切開猪腎中竹葉包定煨熟空心食溫酒送下借腎入腎一縱一橫兩得其便惡水旣泄不復淋瀝

一切漏疾王瓜根搗傅之燥則易千金方

腸風痔漏用萆薢貫衆去土等分爲末每服三錢溫酒空心服之秘寶方

痔瘡腫痛威靈仙三兩水一斗煎湯先熏後洗冷再溫之外科精義

瘡久成漏忍冬草浸酒日日常飲之叢原禮要訣

瘀血內漏蒲黃末二兩每服方寸匕水調下服盡止肘後方

腸痔出血蒲黃末方寸匕水服之日三服

痔瘡腫痛虎耳草陰乾燒烟桶中熏之

痔瘡腫痛鵝不食草搗貼之

痔瘡出血雀林草一大握水二升煑一升服日三次見效外臺秘要

痔瘡風腫作痛胡麻子煎湯洗之卽消

一切漏瘡鹽麪和團燒研傅之千金方

下血成痔稻藁燒灰淋汁熱洗三五度瘥崔氏纂要

腸痔有血小豆二升苦酒五升煑熟日乾再浸至苦酒盡乃止爲末酒服一錢日三服肘後方

凡肛門凸出取故屋東壁上土一升研末以長皂莢挹末粉之仍炙皂莢更互熨之外臺秘要

痔瘡作痛用盆盛沸湯以器蓋之留一孔用洗淨韭菜一把泡湯中乘熱坐孔上先熏後洗數次自然脫體也袖珍方

腸痔有血葱白三斤煑湯熏洗立妙外臺秘要

痔瘡腫痛芥菜搗餅頻坐之經效方

五痔作痛胡荽子炒爲末每服二錢空心溫酒下數服見效或水煑取汁冷服半升日二海上仙方

肛門腫痛馬齒莧菜三葉酸草等分煎湯熏洗一日二次有效瀕湖方

痔瘡初起馬齒莧不拘鮮乾煑熟急食之以湯熏洗一月內外其孔閉卽愈矣經驗方

痔瘡腫痛魚膽草一握煎湯熏洗仍以草挹痔卽愈

又方魚膽草煎湯熏洗後以枯礬入片腦少許傅之

痔瘡腫痛苦壺盧苦蕒菜煎湯先熏後洗乃貼熊膽密陀僧膽礬片腦末良摘元方

肛門酒痔絲瓜燒存性研末酒服二錢嚴月軒方

痔漏脫肛絲瓜燒灰多年石灰雄黃各五錢爲末以猪膽雞子清及香油和調貼之收上乃止集效方

五痔下血桑耳作羹空心煎食三日一作待孔卒痛如鳥啄狀取大小豆各一升合搗作兩囊蒸之及熱更互坐之卽瘥聖惠方

腸痔下血用槐樹上木耳爲末飲服方寸匕日三服肘後方

五痔下血杏仁去皮尖及雙仁者水三升研濾汁煎減半同米煑粥食之食醫心鏡

腸痔出血桃葉一斛杵納小口器中坐蒸之有蟲自出肘後方

五痔作痛桃根水煎汁浸洗之當有蟲出

又方用桃皮井葉杵爛水漬令濃去查盛盆中漬之蟲自出本草

翻花痔瘡木瓜爲末以鱓魚身上涎調貼之以紙護住醫林集要

痔瘡腫痛隔年曬乾橙子桶內燒烟熏之神效（醫方摘要）

痔瘡腫痛枇杷葉蜜炙烏梅肉焙爲末先以烏梅湯洗貼之（醫林集要）

痔瘡出血櫟子粉糯米各一升炒黃滾水調作果子取出蒸熟食之不過四五次效（李楼奇方）

腸風血痔熱多者尤佳槲葉微炙研末一錢米飲調服未止再服（危氏衍義）

螻蛄漏疾槲葉燒存性研以米泔別浸槲葉取汁洗瘡後乃納灰少許於瘡中（聖惠方）

蟲痔裏急橫梛爲末每日空心以白湯調服二錢

漏瘡惡穢大腹皮煎湯洗之（直指方）

痔漏脫肛每旦空心嚼川椒一錢涼水送下三五次即收（救急方）

痔漏腫痛椒目一撮碾細空心水服三錢如神（海上方）

腸痔下血下部痒痛如蟲咬者掘地作坑燒赤以酒沃之搗吳茱萸二升入坑乘熱坐有孔板熏之冷乃下不過三四度愈（肘後方）

久近痔漏三十年者三服除根用蓮花蕊黑牽牛頭末各一兩半當歸五錢爲末每空心酒服二錢忌熱物五日見效（衆效方）

漏瘡膿血白乳香二錢牡蠣粉一錢爲末雪糕丸麻子大每蓋湯服三十丸（直指方下同）

血痔腸風血竭末傳之

內外痔瘡片腦一二分薑汁化搽之（簡便方）

大腸脫肛緣桑蟲燒研和豬脂塗之立縮（范汪方）

痔漏腸風臟毒下血者用百藥煎燒存性烏梅連核燒過白芷不見火爲末米糊丸如梧子大每服七十丸米飲下（濟生方）

又方蓍艾子生用甘草炙爲末每服二錢水煎服之（普濟方）

痔瘡腫痛藩籬草根煎湯先熏後洗（直指方）

內外痔瘡用槐角子一斗搗汁曬稠取地膽爲末同前丸梧子大每米飲服十丸兼作槐子湯下或以苦參末代地膽亦可（外臺秘要）

外痔長寸用槐花煎湯頻洗併服之數日自縮（集簡方）

腸風痔疾用槐葉一斤蒸熟曬乾研末煎飲代茶久服明目（食醫心鏡）

痔瘡有蟲作痒或如膿血多取槐白皮濃煮汁先熏後洗良久欲大便當有蟲出不過三度即愈仍以皮爲末綿裹納下部中（梅師方）

漏瘡腫痛柳根紅鬚煎水日洗

一方用楊柳條罐內燒烟熏之出水即效

痔瘻腫痛楮葉半斤搗爛敷之（集簡方）

痔瘡腫痛枳殼煨熟熨之七枚立定（必效方）

又方枳殼末入瓶中水煎百沸先熏後洗（本事方）

痔漏水煮棘根汁洗之（千金方）

痔漏出水用蜣螂一枚陰乾入冰片少許爲細末紙撚蘸末入孔內漸漸生肉藥自退出即愈（唐氏方）

又方用蜣螂焙乾研末先以礬湯洗過貼之（袖珍方）

痔瘡腫痛紫荊皮五錢新水食前調服（直指方）

一切漏瘡不拘蜂癆鼠癆蜣螂燒末酢和傅（千金方）

痔瘡用二十年鍼線袋取袋口燒灰水服（藏器）

年久痔漏田龜二三箇煮取肉入荷香葱醬常食累驗此疾大忌糟酢等熱物（便民食療）

痔漏脫肛虎脛骨兩節以蜜二兩炙赤搗末蒸餅丸梧子大每侵晨溫酒下二十丸取效（勝金方）

肛門凸出虎骨燒末水服方寸匕日三（外臺秘要）

鵲重巢柴燒研飲服方寸匕一日三服治積年漏下不斷困篤者一月取效

十年痔瘡熊膽塗之神效一切方不及也（外臺秘要）

腸風痔瘻熊膽半兩入片腦少許研和豬膽汁塗之（普濟方）

坐板瘡疥生芝麻細嚼敷之（肇峰雜興）

漏瘡不合以紙粘臘猪脂納瘡中日五夜三（千金翼方）

臟毒下血新槐花炒研酒服三錢日三服或用槐白皮煎湯服（普濟方）

痔漏疼痛用田螺一箇入片腦一分在內取水搽之仍先以冬瓜湯洗淨（乾坤生意）

臟毒下血苦楝子炒黃爲末蜜丸梧子大米飲每吞十丸至二十丸（經驗方）

又方馬齒莧湯洗淨搗活螺螄敷上其病即愈（袖珍方）

痔漏神方赤白茯苓去皮沒藥各二兩破故紙四兩石臼搗成一塊春秋酒浸三日夏二日冬五日取出木甑蒸熟曬乾爲末酒糊丸梧子大每酒服二十丸漸加至五十丸（華佗秘方）

腸風痔瘻下血年深日近者如聖散用臘月野狸一枚蟠在罐內炒大棗半斤甘草四兩猪牙皂莢二兩同入罐內蓋定瓦上穿一孔鹽泥固濟煅令乾作一地坑以十字瓦支住罐于用炭五秤煅至黑烟盡青烟出取出濕土罨一宿爲末每服二錢鹽湯下

又方以狸肉作羹其骨燒灰酒服（楊氏家藏方）

痔瘡疼痛用赤足蜈蚣焙爲末入片腦少許唾調傅之直指方

又方用蜈蚣三四條香油煑一二沸浸之再入五倍子末二三錢瓶收密封如遇痛不可忍點上油即時痛止大效集效方

痔瘡初起痛痒不止用氈襪烘熱熨之冷又易集元方

痔漏疼痛鯉魚鱗二三片綿裹如棗形納入坐之其痛即止[illegible]

腸風血痔用活鯽魚翅側穿孔去腸留鱗入白礬末二錢以棧包紙裹煨存性研末每服二錢米飲下每日二服直指方

腸痔下血鱧魚作鱠以蒜虀食之忌冷毒物外臺秘要

內痔出血鱔魚煑食即止其性涼也便民食療

風痔腫痛發歇不定者是也白殭蠶二兩洗剉炒黃爲末烏梅肉和丸梧桐子大每薑蜜湯空心下五丸妙勝金方

痔漏下血蠶紙半張椀內燒灰酒服自除吳蘇備急方

肛門鼠痔蜘蛛絲纏之即落

諸痔發痒用全蠍不拘多少燒烟熏之即效祕法也袖珍方

痔瘡腫毒麝香當門子印城鹽等分塗之不過三次外臺秘要

大腸痔疾蟾蜍一箇以磚砌四方安於內泥住火煅存性爲末以猪廣腸一截紮定兩頭煑熟切碎蘸蟾末食之如此三四次其痔自落

血痔漏瘡鴛鴦一隻治如常法炙熟細切以五味酢食之作羹亦妙食醫心鏡

痢頻脫肛黑色堅硬用巴豆殼燒灰芭蕉自然汁煑入砂硝少許洗軟用眞麻油點火滴於上以枯礬龍骨少許爲末摻肛頭上以芭蕉葉托入危氏得效方

諸痔疼痛青蛙丸用青色蛙長脚者一箇燒存性爲末雪糕和丸如梧子大每空心先吃飯二匙次以枳殼湯下十五丸直指方

蟲蝕腎腑肛盡腸穿用青蛙一枚雞骨一分燒灰吹入數用大效外臺秘要

痔漏有蟲用狗肉煑汁空腹服能引蟲也永類鈐方

又方用熟犬肉蘸鹽汁空心食七日效得效方

痔瘡下蟲不止者用翫月砂慢火炒黃爲末每服二錢入乳香五分空心溫酒下日三服集驗方

痔瘡腫痛用蝸牛浸油塗之或燒研傅之丹溪

腸風痔疾用鼈皮及骨燒灰米飲空心服二錢甚者入紅雞冠花白礬爲末和之蘇頌

腸痔有血獺肝燒末水服一錢肘後方

脫肛不收茜根石榴皮各一握酒一盞煎七分溫服聖惠方

花上粉主治諸蟲瘻惡瘡痔疾納之藏器

腸痔氣痔出膿血用穿山甲燒存性一兩肉豆蔻三枚爲末每米飲服二錢甚者加蝟皮灰一兩中病即止衍義

鼠痔成瘡腫痛用穿山甲尾尖處一兩炙存性鼈甲酥炙一兩麝香五分爲末每服一錢眞茶湯服取效直指方

諸漏有膿蛇蛻灰水和傅上即蟲出千金方

痔瘡腫痛蚺蛇膽研香油調塗立效醫方摘要

一切冷漏白死蛇取骨爲末封之大痛以杏仁膏摩之即止千金方

大腸氣痔作痛下血百藥煎末每服三錢稀粥調服日二次集簡方

五痔下血蝟皮三指大雄黃如棗大熟艾一錢穿地作坑調和取便熏之口中有烟氣爲佳火氣稍盡即停三日將息更熏之三度未瘥勿犯風冷羹臛將養切忌雞魚猪生冷二十日後補之外臺秘要

腸痔有蟲蝟皮燒末生油和塗肘後方

痔瘡成漏膿水不止用羊羔兒膏鹽泥固濟煅過研末五錢入麝香雄黃末各一錢塡瘡口三日外必合總論

下部漏痔大露蜂房燒存性研摻之乾則以眞菜子油調唐氏經驗方

五痔及腸風脫肛五倍子白礬各五錢爲末順流水丸如梧子大米飲下七丸綱目

漏血不止水蛭炒爲末酒服一錢日二服惡血消即愈千金方

穀道生瘡久不愈用雞膍胵燒存性爲末乾貼之如神兒[illegible]

肛門生瘡蓋肛門主肺肺熱即肛塞腫縮生瘡白蜜一升猪膽汁一枚相和微火煎令可丸丸三寸長作挺塗油納下部臥令後重須臾通洩梅師方

痔瘻出水用牛膽蝟膽各一枚膩粉五十文麝香二十文以三味和勻入牛膽中懸四十九日取出爲丸如大麥大以紙撚送入瘡內有惡物流出爲驗經驗方

鼠乳痔疾牛角鰓燒灰酒服方寸匕寒上方

脫肛五倍子末三錢白礬一塊同煎湯先熏後洗又取末摻肛托入

諸痔腫痛蠶繭內入男子指甲令滿外用童子頂髮纏裹燒存性研末蜜調傅之仍日日吞牛膽製過槐子甚效（簡要濟衆方）

九漏有蟲乾人屎乾牛屎隔綿貼之蟲聞其氣即出若痒則易之蟲盡乃止（千金方）

蟲食肛爛見五臟者即死以猪脂和馬蹄灰綿裹導入下部日數度瘥（附後方）

內外痔瘡片腦一二分葱汁化搽之（簡便方）

一切漏疾白馬通汁每服一升良（千金方）

治血痔用地榆皮爲細末每服二錢食前米飲調下日三服（奇效良方）

痔漏脫肛生鐵一斤水一斗煮取五升日再洗（集驗方）

治痔以白芷煮白苧作線快手緊縶痔上微疼不妨其痔自然乾瘡而落（得效方）

臟毒下血車前草連根一握生薑一小塊新水研碎取汁候血欲下時腰間必覺重便服一盞血即止甚者不過再服（丹溪心法）

痔漏蟲蝕肛門熟艾一團雄黃少許同燒灰以竹筒納下部引烟熏之良（本草）

血痔取雞冠花不拘多少濃煎湯空心服一盞（得効）

腸風血痔及脫肛木賊槐花及桑耳水煎脫肛爲末摻肛托上（得效方）

五痔及腸風臟毒槐花炒水煎服或同荊芥側柏葉爲末米飲下二三錢名曰槐花散（丹溪心法）

五痔及腸風臟毒槐實剉爲末米飲下一錢或密丸服亦佳（本草下同）

槐木上耳治諸痔及腸風臟毒取耳爲末米飲下一錢日三

五痔及腸風下血痔漏桑耳二兩粳米三合煮粥空心食之（入門）

桑樹木上寄生治腸風痔漏如神取葉乾爲末水酒米飲任下一錢或爲丸服亦佳（丹溪心法）

馬蘭根治痔漏取根研細傅上片時看肉平去藥稍遲恐肉反出以爐甘石煅牡蠣粉末塞之

血痔腸風臟毒取楮根白皮人參等分爲末空心米飲下二錢佳

腸痔及痔漏取有子蜂房焙乾爲末麪糊和丸梧子大空心酒下二三十丸（同春）

五痔漏瘡取鼈鼈魚治如食法煮熟入椒鹽醬調和食之（本草）

血痔腸風臟毒取楮根白皮切酒浸蜜炒爲末棗肉和丸酒下三五十丸（丹溪心法）

酒痔下血取蘿蔔二十枚留葉寸許及根入罐內水煮極爛以醋鹽醋腌空心食之立止（入門）

肛門脫出取胡荽切一升燒熏之卽入又酢煮熨之亦效（本草）

肛門熱腫取青葱葉刮取涎對停入蜜調勻先以藥水洗後敷痔上其冷卽冰（得效方）

治瘻取冬瓜藤濃煎湯熏洗卽愈（丹溪心法）

痔漏取啄木鳥燒爲末納孔中不過二三度瘥（本草下同）

諸痔臘月牛脾一具熟食之勿與鹽醬未瘥再吃

五痔痔漏腸風脫肛一切痔病取蝟皮燒爲末米飲下一錢空心服

痔漏裡骨炙和麝香雄黃爲丸服或爲末酒下二錢十服見效

五痔猪懸蹄甲不拘多少燒爲末米飲下二錢名曰猪甲散（丹溪心法）

血痔腸風瀉血取野猪肉二斤切著五味炙熟空心食之作羹亦得又取外腎連皮燒作末米飲空心下卽止（本草下同）

痔漏陰蝕爛瘡取鼷鼠燒爲灰空心米飲下二錢又取油塗之妙

痔漏濕墨猪膽一枚苦酒一合同煎三兩沸滿口飲之蟲立死出卽愈或灌肛內亦下蟲及惡物

大腸熱腫木鼈子五倍子研末蜜水調敷（丹溪心法下同）

塞漏孔方如痔漏有竅用赤石脂白石脂枯白礬黃丹腦子同爲末塞之或飯和撚條插入

痔漏祕方用煉蜜半盡入熊膽一分再煉入水成珠不散將猪鬃綿裹撚成撚子將蜜塗在撚子上仍用片腦熊膽各半分研細搽在撚子上插入漏眼內底至盡頭則止如眼多醫得一箇又醫一箇不可一齊上藥如見外皮潰爛用黃蠟黃丹麻油煎膏貼瘡上縛緊一七日效（古今醫鑑）

取朽骨久疽及痔漏烏骨雞脛骨以上等雄黃賫之鹽泥固濟火煅通紅取出地上出火毒去泥用骨研細飯丸如粟大以紙撚送入孔中竅內更用膏藥貼之

痔漏用鯊魚腸以五味炙熟貼之良久蟲出卽去之（本草下同）

三次盡出

痔瘡有蟲蜣螂生搗爲丸塞肛門中引蟲出盡末差便毒用木鼈子大黃苦蘘桃仁草龍膽右咬咀濃煎露星月一宿侵早溫服立愈

又方白殭蠶槐花爲末酒調服一方加酒大黃

痔漏反花瀉血者用狐手足一副陰乾穿山甲蝟皮各三兩黃明膠白附子五靈脂蜀烏頭川芎鶏乳香各二兩剉細入砂鍋內固濟候乾炭火煅紅爲末入木香末一兩以芫荽煎酒調下二錢日三服屢效（永類鈐方）

治濕氣方取生薑刮去皮斷理切之極熟研取汁一升半又以水一升半合和先得平旦空腹服之仍削生薑二枚如繭大以楸葉苦桃葉數重裹訖於爐灰中燒令極熱內下部中食頃若濕盛者三日一作頻服無有不瘥

治蟲蝕下部方胡粉雄黃二味各等分爲末著穀道中亦治小兒濕瘡

治傷寒熱病多睡變成濕瘧四肢煩疼不得食方羊桃十斤切搗以熟暖湯三斗淹浸之日正午時入中坐一炊久不過二度瘥

下部蟲瘡病人齒無色脣上白喜睡憒憒不知痛痒處或下痢乃下部生蟲食肛也桃仁十五枚苦酒二升鹽一合煮六合服之（肘後方）

下部瘡瘡桃白皮煮取濃汁如稀湯入熊膽少許以綿蘸藥納入下部瘡上（梅師方）

臟毒下血烏犀散用淡豉十文大蒜二枚煨同搗丸梧子大煎香菜湯服十二丸日二服安乃止永絕根本無所忌

治腸隨肛出轉廣不可入方生苦蘘根爲粉以猪脂膏溫塗隨手抑按自得縮入

治積冷利脫肛方枳實一枚石上磨令滑澤鑽安柄蜜塗炙令暖熨之冷更易取縮入止

痔漏脫肛粟糠和諸藥熏之（時珍）

臟毒欲作未作之時服之立消牙皂七片炭火煅黃色去皮陰地上去火毒爲末酒下

痔漏祕方用牡蠣二兩煅過入地穴坑埋之去火氣爲末瘡若濕乾摻若乾以津調搽痔上（瘡瘍全書）

痔漏鯽魚一箇去腸入白礬令滿合之於瓦上燒過爲末以雞羽掃藥敷之立效（簡易）

諸痔用螻蛄五枚搗碎水銀一錢麝香冰片各五釐用銀簪蘸汁滴患上

痔漏用團魚一枚扯出頭殺之取血卽將團魚頭燒灰爲末血爲丸如棗核大諒痔大小爲之入內

漏孔不合用石楠葉煎湯放在桶內熏洗待湯通手就將漏洗淨後將黃牛面前牙齒四枚裝在小瓶內用木屑燃之待白烟出爲度取出研末用津液蘸牙末點入漏孔處出黃水爲效黃牛牙齒須預製備用

痔貼藥之後恐毒水未盡將槐米一兩炒黃色用水一鍾煎至七分加酒半鍾溫服之痔永不發矣

治下部生蟲者桃皮煎如飴取內下部口中有瘡含之（千金方）

股陰瘼癤無名異二錢麝香一字研酒半盞午後空腹服立效（多能鄙事）

治大孔蟲痒方蒸大棗搗膏以水銀捻和長三寸綿裹內大孔中明日蟲皆出也然水銀損腸胃宜愼之

（梅師方）

痔漏用青荷葉燒灰爲末空心酒下三錢（瘡瘍全書下同）

又方用金銀藤井花爲末每日酒下三錢

五痔及腸痔下血蠹魚作膾和薑醋食之又和五味作羹食之亦佳（本草下同）

五痔及血痔鯽魚作膾和薑醋芥醬食之又作羹飽食良

熏痔方用大雄雞宰去血在湯鍋內燖去毛取出雞將此燖毛垢湯燒之二沸傾在淨桶內蓋定俟少溫將陽物放桶上坐緊熏之候湯溫洗痔淨拭乾隨將蜈蚣一條碾末艾二錢和捻成條放馬桶內坐熏之其痔焦熟尤妙新生者一兩次得愈久生者五次得愈加蜈蚣并艾熏後隨服益氣清臟湯泰艽蒼朮湯調治之

洗痔方馬蘭頭一斤皮硝四兩煎滾坐熏候湯溫洗之

又方牛膝搗爛煎洗之

又方水紅花子打碎煎湯洗之

又方魚腥草煎湯洗之

又方白地菘煎湯洗之

下部生瘡已決洞者牡丹末湯服方寸匕日三（肘後方）

鯽魚同米粉煮羹食調中收痔（吳球）

治男女脫肛用五倍子荊芥小便濃煎洗之

治腸風并脫肛及有血用蛇牀子不拘多少炒爲末貼大腸脫垂處立收甚妙

治諸般痔脫肛以死蛇一條如指大濕者用掘地坑燒之將有孔板蓋坑上坐熏烟絕爲愈

大腸脫肛權皮或葉煎湯熏洗後以白礬五倍末傳之（救急方）

腸頭出用皂角熏炙用蜓蚰一箇入蜜浸去蜓蚰將蜜調土硃傅上卽入

治穀道赤痛熬杏仁杵作膏傅之良愈

患五種痔水研山豆根服

治痔瘡用半新馬桶一箇入新磚一箇放桶底上再用新磚一箇燒紅於磚上用全蝎兩三枚燒烟患人坐桶上熏之二三次卽愈

穿腸痔漏極痛魚鰾搗如泥貼之其痛卽止（萬病回春）

痔瘡便血用活鯽魚一箇八兩重者洗淨鱗尾腸肚皆不去用樷皮二兩洗淨寸截先將樷一兩鋪在瓦罐內次安魚上面却將樷一兩蓋之罐口黃泥固濟火畔炙乾量罐大小開一地坑先安小磚一片後坐罐子四面用炭火七斤燒煅候烟絕取罐於淨地以瓦盆合定淨土壓勿令透氣經一宿出火毒取藥細研每服一錢食前用米飲調下忌動風之物

治痔瘡痛不可忍者木綿花煎湯旋入矾硝乘熱熏之候溫浸之單用硝木極妙

又方用槐花艾葉荊芥枳殼水煎入白礬末打勻熏洗（醫統）

腸風痔漏有蟲如絲黑頭取去除根瞿麥半升牙皂角一寸共爲末入猪腰子一雙內米泔煮空心食之

少頃肚痛上攻蟲皆隨出作地坑埋之薄粥補之

治五痔方蒼耳莖葉以五月五日採乾爲末水服方寸匕或丸桐子大服之立效（千金翼方）

洗痔方輕者用朝東馬齒莧劉寄奴濃煎湯熏待溫却用手洗拭乾重者加大青葉梗乾者一半同煎

痔痒用灰苴菜根濃煎湯先熏後洗

又方取河水頻洗用蝸牛塗之

一方治痔用雄雞膽片腦和勻貼之

肛門邊腫硬痛痒用白礬三分碎研用熱童便一盞化開洗痔上一日二三次洗之

治痔痛不可忍以枸杞根杵爛煎湯熏洗痛立止（方今醫統）

肉痔腫痛朝陽黃土黃連末皮硝各一兩用猪膽汁同研如泥每日旋丸棗大納入肛門過一夜隨大便去之內服烏梅黃連二味丸藥（孫氏集效方下同）

痔瘡腫痛孩兒茶麝香爲末唾津調傅

脫肛氣熱孩兒茶二分熊膽五分片腦一分爲末入乳搽肛門上熱汁自下而肛收也亦治痔瘡（董炳方）

漏瘡腫痛猪膽七箇綿臟脂十箇清水和勻搽七次卽可（救急方）

吐血痔血向東蓖荷根一把搗汁三升服之（肘後方）

臟毒下血黃連爲末獨頭蒜煨研和丸梧子大每空心陳米飲下四十九（濟生方）

酒痔下血黃連酒浸炙熟爲末酒糊丸梧子大每服三四十丸白湯下一方用自然薑汁焙炒（醫學集成）

臟毒赤白地錦草洗暴爲末米飲服一錢立止（經驗方）

地柏主臟毒下血與黃芪等分爲末米飲每服二錢

蜀人甚神此方（宋圖經）

鍼灸

靈樞曰熱病頭痛顳顬目瘳脈痛善衄厥熱病也取之以第三鍼視有餘不足寒熱痔

甲乙經曰痔痛攢竹主之

痔會陰主之凡痔與陰相通者死陰中諸病前後相引痛不得大小便皆主之

痔骨蝕商丘主之

痔篡痛飛揚委中及承扶主之

痔篡痛承筋主之

脫肛下利氣街主之

千金方曰飛揚主痔篡傷痛

絕骨主癭馬刀腋腫

天突章門天池支溝主漏

商丘復溜主痔血泄後重

勞宮主熱痔

承筋承扶委中陽谷主痔痛腋下腫

久冷五痔灸脊中百壯

五痔便血失屎灸回氣百壯穴在脊窮骨上

病寒冷脫肛出灸臍中隨年壯

脫肛歷年不愈灸橫骨百壯又灸龜尾七壯龜尾卽後窮骨是也

瘡瘍全書曰臟毒初起微腫卽用濕蚯蚓糞搗成餅如錢厚放患上艾壯如半粒豆大者燒之微熱卽去再換餅燒之再易如前法以十四壯爲期外用冰香散搽之

虛人脫肛夫冬至前天道嚴寒其氣極沉極降之際乳人身小天地天在上人居中地居下豈不相應乎

治之不能即奏功也陽生後日長一線陽漸長陰漸消矣宜用灸法治之無不效者病人亦要戒氣少勞爲上策擇晴明和暖吉日在不通風淨煖室中坐臥取頂上旋毛中百會穴以醬一匕搽上艾炙三壯隨服升元大補湯其肛漸收矣蓋百會爲一身之樞紐大能升提下陷之氣故能奏功若冬至前不可灸灸之何益次日再灸尾骶骨又灸臍中隨年壯此法余用之甚效諸痔漏亦治之

丹溪心法曰凡痔瘡先取頭垢揑成餅子安痔頭上其上又安大蒜一片以艾灸之

又痔痛以附子末津唾和作餅子如錢大安漏上以艾灸令微熱乾則易以新餅再灸明日又灸直至肉平爲效

醫學綱目曰脫肛取大腸俞百會長强肩井合谷氣衝

針灸痔獨取足太陽經云足太陽之脈所生病者痔瘧視盛虛熱寒陷下取之蓋後世取承山穴者是也其二論督脈而不見其取法經云督脈生病癰痔蓋後世取長强穴是也

痔漏下血裏急後重或痒或疼二白在掌後橫紋上四寸手厥陰脈兩穴相並一穴在兩筋中一穴在大筋外針入三分瀉兩吸

又法取長强一寸大痛方到穴瀉三吸如灸可七壯雖久不愈者亦效

又法取承山二寸半補一呼如灸可七壯

古今醫統曰命門一穴脊在中與臍相對灸七壯治五種痔病

又法長强一穴在尾骶上隨年壯灸之治五痔便血最效

又法治痔疾大如黃瓜貫於腸頭發則僵仆以荊芥湯洗之次以艾灸其上三五壯若覺一道熱氣入腸中大瀉鮮紅血穢一時許痛後其疾乃愈

又法治痔初起痛痒不止以舊布鞋底烘熱頻頻熨之痛痒處冷則再烘熨其痛痒立止

脫肛灸長强穴三壯愈臍中隨年壯百會一穴在頂中灸三壯治小兒脫肛

導引

古今醫統曰痔漏乃氣血下墜衝突爲痔既不能坐又不能行立惟導引之法可愈矣其法高枕偃臥息心調氣氣定其腫自收

又法兩手抱足頭不動足向口受氣衆節氣散來去三七欲得捉左右側身各急挽腰不動去四肢腰上下氣血凝滯髓內冷血冷筋急痔漏腫痛

又法兩足相蹈向陰踹急蹙將兩手捧膝頭兩向急勢捧之二七竟身側兩向取勢二七前後努腰七去心勞痔病

又法踞坐合兩膝張兩足不息兩通治五痔

又法一足蹈地一足屈膝兩手抱髕鼻下急挽向身極勢左右換易四七去痔五勞三里氣不下

保生祕要曰痔瘡導引法於尾閭骶骨間長强穴上掐六十四度擦亦如數兼用吸提呵法自爾安樂

運功坐定息均注念存瘡吸提咽濁九口再凝良背法運尾閭運瘡百徧復升腰俞運二七數逐日行功不間自去患根

痔漏導引法依患處念推而散之復兩手抱兩膝吹而吸之

又法吹而散之各六徧旋轉其皮膚患處想火燒之次升湧泉水入肺經推而散之

良背法靜坐片時將萬慮掃除凝神定志於本穴之中背之腔子裏平心元虛處初從口念太乙救苦而漸歸於心歸於背存無守有念茲在茲有復冥於無神自虛而靈矣

醫案

瘡瘍全書曰一人患痔每日食海螺螄半升因鹹以苦茶漱口納及一斗又能清心寡慾痔即消矣痔乃臟火屬陽海螺螄乃性寒味鹹屬陰寒能散火鹹能軟堅茶又苦涼之味殆有理也

儒門事親曰趙君玉常病痔鳳眼草刺蝟皮槐根俚首之類皆用之或以乾薑作末塗脯肉炙食之大便燥結不利且腫後數日因病黃疸治令大通瀉數次不言痔作麻先生偶記而書之君玉自識戴人之後痔更不發耳

丹溪心法曰許孺人產後痔作瘡有頭如蒜頭大或下鮮血或紫血大便疼與黑神散又多食肉大飽此濕熱在大腸所爲以槲李仁麻仁槐角各七錢枳實皂角仁各五錢蒼术歸尾生地各三錢大黃炒一錢分六貼內三樣仁另研煎服而愈

醫學綱目曰一女子脫肛以糯米濃煎汁洗肛將磚燒紅沃酢青布鋪其上令溫和坐布上肛自吸入

唐峽州王文顗充西路安撫司判官乘驟入駱谷有

痔疾因此大作其狀如胡瓜貫於腸頭熱如湯灰火至驛僵仆主驛吏云此病予曾患來須灸即瘥用柳枝濃煎湯先洗痔便以艾炷其上連灸三五壯忽覺一道熱氣入腸中因轉瀉鮮血穢物一時出至痛楚瀉後遂失胡瓜所在登圊而馳去

薛氏醫案曰一人不慎酒色患痔燬腫肛門墜痛下血便燥脈洪大而濇以當歸槲李仁湯加桃仁四劑少愈連以四物湯加紅花桃仁條芩槐花數劑而愈

一人素有痔勞役便脫肛腫痛出水中氣下陷也用補中益氣湯加茯苓芍藥十餘劑中氣復而愈後復脫作痛誤服大黃丸腹鳴惡食幾危余用前湯加炮薑芍藥漸愈後去薑加熟地五味三十餘劑而愈

一人脾胃素弱或因勞或入房肛門即下腫痛甚用補中益氣湯加麥冬五味兼六味丸而愈後因過飲下墜腫痛誤用降火消毒虛證蜂起余用前湯加炮薑木香一劑再用前湯并加減八味丸兩月而安

一男子患痔大便燥結燬痛作渴脈數按之則實以秦艽蒼朮湯二劑少愈更以四物湯加芩連槐花枳殼四劑而愈

一人患痔成漏每登廁則痛以秦艽防風湯加條芩枳殼四劑而愈以四物加升麻芩連荊防不復作

一男子患痔漏每登廁則肛門下脫作痛良久方收以秦艽防風湯數劑少愈乃去大黃加黃芪川芎芍藥而痛止更以補中益氣二十餘劑後再不脫

一婦人患痔腫燬痛甚以四物湯加芩連紅花桃仁牡丹皮四劑少止又數劑而愈

一婦人素患痔漏每因熱則下血數滴以四物湯加黃連治之即愈後因大勞瘡腫痛經水不止脈洪大按之無力此勞傷血氣火動而然也用八珍湯加芩連蒲黃二劑而止後去蒲黃芩連加地骨皮數劑而安丹溪云婦人崩中者由臟腑傷損衝任二脈血氣俱虛故也二脈爲脈經之海血氣之行外循經絡內營臟腑若氣血調適經下依時若勞動過極臟腑俱傷衝任之氣虛不能約制其經血故忽然而下謂之崩中暴下治宜大補氣血之藥調養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰瀉陽經自正矣

一男子有痔漏每登廁肛脫良久方上診其脈細而微用補中益氣湯二十餘劑遂不再作丹溪云脫肛屬氣熱氣虛血熱血虛

一男子脅患漏口乾發熱喜膿不清稀脈來遲緩以豆豉餅灸及服八珍湯加麥門冬五味子軟柴胡地骨皮三月餘而愈後因不慎房勞復潰膿清脈大請辭不治果歿河間云因病致虛則爲輕蓋病勢尚淺元氣未虛也至病初愈而勞復或飲食勞倦或房勞七情六慾陽痿陰弱加致羸損此因虛致損則爲重病勢已過元氣已索故也

一男子痔瘡腫痛便血尤甚脈洪且濇經云因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔蓋風氣通於肝肝生風風生熱風客則淫氣傷精而成斯疾遂與黃連當歸黃芪生地黃防風枳殼白芷柴胡槐花地榆甘草治之漸愈次以黃連丸而瘥又養生便血數年百藥不應面色痿黃眼花頭眩亦以黃連丸治之而平

曹銓因飲法酒肛門腫痛便閉脈實服荊防敗毒散不應予用黃連內疏湯而愈

一男子患痔脈浮鼓午後發熱作痛以八珍湯加黃芪柴胡地骨皮治之稍可彼欲速效用刼藥蝕之痛甚絕食而歿夫瘡之潰斂氣血使然也脈浮鼓日晡痛此氣血虛也丹溪云瘡口不合用大劑參芪朮歸芎補之外以附子餅灸之更以補藥作膏貼之

一男子年踰四十有痔漏大便不實服五苓散愈加泄漏飲食少思予謂非濕毒乃腸胃虛也當以理中湯治之彼不爲然仍服五苓散愈甚復請予乃以理中湯及二神丸月餘而平

李逵因痔瘡怯弱以補中益氣湯少加芩連枳殼治之稍愈後因怒加甚時仲冬脈得洪大予謂脈不應時此乃腎水不足火來乘之藥不能治果歿於火旺之月常見患痔者腎脈不足俱難治

劉商有痔肛門脫出此濕熱下注眞氣不能升舉診其脈果虛遂以四君子湯加黃芪芎歸蒼朮黃檗升麻柴胡服之更以五倍子煎湯熏洗彼以爲緩乃用砒霜等毒藥蝕之而歿夫劫藥特治其末且能伐眞元鮮不害人愼之愼之

徐生因痔氣血愈虛飲食不甘小便不禁夜或遺精此氣虛兼濕熱而然非瘡故也以補中益氣湯加山茱萸山藥五味子兼還少丹治之而愈

一男子患痔漏膿出大便諸藥不應診其脈頗實令用豬腰子一箇切開入黑牽牛末五分線紮以荷葉包煨熟空心細嚼溫鹽酒送下數服頓退更以托裏藥而愈

一男子患痔漏口乾胃脈弱此中氣不足津液短少不能上潤而然以黃芪六一湯七味白朮散治之或

曰諸痛痒瘡皆屬心火遂服苦寒之藥大便不禁而殁夫諸痛痒皆屬心火言其常也始熱終寒則反常矣可泥此而不察乎

一男子臀癰腐潰肌肉不生用藥數之四沿反硬予診之脈濇而弱此氣血虛不能榮於患處故數涼藥反硬乃氣血受寒凝結而非毒也用大補藥而愈

一男子臀癰腫硬作痛尺脈浮緊按之無力以內托羌活湯一劑痛止以金銀花散四劑膿潰而愈

一男子臀癰腫硬痛甚隔蒜灸之更服仙方活命飲二劑痛止腫消以托裏消毒散加黃蘗蒼朮羌活瘡頭膿潰而愈

一男子臀癰作膿而痛以仙方活命飲二劑痛止更以托裏消毒散膿潰而瘥

一男子臀癰不作膿飲食少思先用六君子湯加芎歸黃芪飲食漸進更以托裏消毒散膿潰而愈

一男子潰而膿清不斂以豆豉餅灸之更飲十全大補湯兩月餘而痊凡瘡不作膿或不潰或潰而不斂皆氣血之虛也若膿清稀尤其虛甚也

一男子臀癰膿水不止肌肉漸瘦飲食少思胃脈微弦以六君子湯加藿香當歸數劑飲食遂進以十全大補湯及豆豉餅灸之兩月餘而斂

一弱人臀癰膿成不潰以十全大補湯數劑始托起乃針之又二十餘劑而愈夫臀居僻位氣血罕到老弱人患之尤宜補其氣血庶可保全

一男子臀漫腫色不變脈滑數而無力此臀癰也膿將成尚在內予欲治以托裏藥待發出而用針彼欲內消服攻伐藥愈虛復求治仍投前藥托出針之以大補藥而愈凡瘡毒氣已結不起者但可補其血氣使膿速成而針去不可論內消之法膿成又當辨其生熟淺深而針之若大按之乃痛者膿深也小按之便痛者膿淺也按之不甚痛者未成膿也按之卽復起者有膿也按之不復起者無膿也若腫高而突發於血脈腫下而堅者發於筋骨肉色不相變者發於骨髓也

巡撫陳和峯脾胃不健服消導之劑左腿股及臀患腫此脾氣虛而下注非瘡毒也當用補中益氣倍加白朮彼惑於衆論云白朮能潰膿乃專以散腫消毒爲主而腫益甚體益倦余用白朮一味煎飲而消

儒者楊啓元左臀患癰數貼涼藥腫微內股服連翹消毒散左體皆痛余以爲足三陰虛損用補中益氣湯以補脾肺用六味丸加五味子以補肝腎股內消而臀間潰又用十全大補湯而瘡口斂

一儒者臀癰腫痛甚此邪毒壅滯用活命飲隔蒜灸而消後因飲食勞倦腫痛仍作寒熱頭疼此元氣虛而未復也與補中益氣湯頻用葱熨法兩月而愈

一男子臀癰漫腫而色不變脈滑數而無力膿將成矣余用托裏而欲針彼畏針而欲內消誤用攻伐之劑頓加惡寒發熱自汗等證余用十全大補湯數劑腫起色赤仍外針內補而愈

吳輔之父患臀癰內潰腫脹發熱口乾飲食少思此脾胃虛弱也先用六君加芎歸參芪數劑而潰又用十全大補湯倍加參芪五十餘劑而愈

一人年三十脈如屋漏雀啄臀癰腫硬色夭膿水清稀誤服敗毒之藥余曰此足三陰虧損而藥復傷也余用六君加歸芪附子一錢二劑膿潰色赤又減附子五分數劑元氣復而瘡愈

一男子臀癰硬痛發熱此膀胱氣虛而濕熱壅滯用內托羌活湯二劑熱痛悉退後用托裏消毒散而潰又用托裏散四十餘劑而斂

平湖袁上舍患痔外數寒凉內服消毒攻潰於臀膿水清稀脈洪大而數寒熱作渴余辭不治後果歿此足三陰虧損之證失於化源以致眞氣益虛邪氣愈甚矣不死何俟

進士周希輔素有疝痔勞則小腹作痛莖出白津痔亦腫痛若飲食勞倦起居失宜則發寒內熱肢體疲倦服十全大補湯諸證並退彼欲去病根乃用攻病生肌之藥肌體骨立余用益氣湯地黃丸元氣漸復但自弛調攝不能全愈

寓意草曰舊鄰治父母張受先先生久患穿腸痔漏氣血大爲所耗有薦以吾鄰黃生善數割者先生神其術一切內治之藥並取決焉不省昌雅重先生文章道德之身昔居瀛海時曾令門人往候脈息私商善後之策大意謂先生久困漏卮一旦平成精氣內榮自可百年無患然新造之區尚未堅固則有浸淫之虞臟氣久虛腸蓄易滑則有轉注之虞清氣久陷既服甘溫升舉矣然漏下已多陰血暗耗恐毗於陽水穀易混既用養臟厚腸矣然澗劑過多脾氣易溜恐毗於陰且漏孔原通精孔精稍溢出勢必旁滲則豢精當如豢虎厚味最足濡脾味稍不節勢必走泄則生陰無取傷陰蓋人身脾氣每喜燥而惡濕先生漏孔已完敗濁下行者無路可出必轉滲於脾濕固

倍之是宜補脾之陽勿傷脾之陰以復健運之常而收和平之益云云及至婁中應召往診指下輕取鼓動有力重按若覺微細是陽未見不足陰則大傷矣先生每進補陰之藥則夜臥甚窘腸滑亦稀以致瘍醫妄引槐角地榆治腸風下血之法治之亦不覺其悞其實漏病乃精竅之病蓋搆精之時氣留則精止氣動則精泄大凡強力入房者氣每衝激而出故精隨之橫決四射不盡繇孔道而注多溢於精管之外久久漸成漏管今漏管雖去而肉中之空隙則存瘍補隧非此等藥力所能勝也不肖姑不言其非但於渠方中去槐角地榆等而加鹿角霜一味所謂惟有斑龍頂上珠能補玉堂關下缺者是也況羣陰之藥最能潤下不有以砥之則腸中之水更滑聚可虞耶然此特微露一班耳瘍醫不解已沮爲不可用因思吾鄉一治漏者潰管生肌外更有二神方先以九藥半斤服之令人陽道驟痿俟管中肉滿管外緻密後以丸藥半斤服之令人陽道復興雖宜於少未必宜於老然用意亦大奇矣不肖纔欲填補竅隧而黃生沮之豈未聞此人此法乎

外科正宗曰一男子患痔六年每遇酒色勞役痔則發腫堅硬疼苦十餘日方得稍可彼欲斷其根以枯痔散上至七日外其痔漸黑外有裂縫至十六日痔枯脫落孔若雞心以生肌散逐日用之內服養血健脾藥而愈

一男子痔患瘃腫作痛大便結燥脈數有力以內疏黃連湯二服便行痛止又以四物湯加芩連枳殼天花粉數劑而腫消更以臟連丸一料而不復發

一男子患痔凡遇勞苦發腫作痛以枳殼湯熏洗內服防風秦艽湯數服痛腫頓減令彼常洗前湯每月五六次內與六味地黃丸加黃蘗知母服之不發

一男子好飲多慾內痔虛墜下血以四物湯加芩連升麻葛根數服虛墜乃止又以當歸椰李仁湯二劑痔腫亦消更服臟連丸月餘便血亦止又月餘兼節酒色不發

一男子患痔十餘年頭已穿潰未及通腸每發疼苦以三品一條鍼插至七日痔變黑色瘡邊漸漸裂縫至十五日脫落以鳳雞膏搽至半月口斂而平

一男子怯弱內痔便血面色痿黃自服凉血止血藥不應診之脾脈虛而無力此中氣不能統血以補中益氣湯十餘服精神頓倍便血亦少又以加味四君子湯兼前湯間服月餘不發大抵此證所致之由不同當究其因治之如元氣有餘形黑氣盛先糞而後紫血更兼脈實有力者此屬有餘法當凉血止血藥應自效至若形體瘦弱面色痿黃先鮮血而後糞更兼脈虛無力者此屬不足豈可反用凉藥止之致傷脾胃此證若不溫中健脾升舉中氣其血不得歸原故藥難效傷其根本也

一男子患臀癰四五日始生疼痛至晚作寒六脈浮而帶數以人參敗毒散二劑寒熱頓退疼痛稍止彼值公務相關欲出乃用針點入患頂五六分流去紫血用蟾酥條插入膏蓋以活血散瘀湯二服次日流出紫血隨便可行更服托裏藥五六服而安

一男子患臀癰六七日瘃痛發熱口乾便燥以托裏消毒散加花粉大黃二服便通渴止仍用前湯加角針山甲數服而膿潰又以十全大補湯半月而斂

一男子患臀癰堅硬不潰此先寒凉之過也以十全大補湯加皂針蒼术丹皮四劑堅硬漸軟又以透膿散二服膿熟針之以前湯倍參芪歸术月餘而斂

一男子暑月患臀癰自爲內毒外用老鴉草搗爛敷之每日續飲凉水十餘碗如此三日瘡毒內陷患上平塌冰冷口噤不言六脈沉細如絲辭不可治至夜而死

一人冬月患臀癰外用四黃散凉水調傳內服敗毒凉藥毒亦內陷煩躁口乾鼻掀氣急思上平塌原頭存一空孔無水無膿予曰瘡毒已陷定不可治復請別醫俱曰無事予曰臀居小腹之後肌肉頑厚毒既到此必須內托爲膿潰後最易收斂今已內外寒凉毒既內入豈能再出衆醫強投內消解毒定躁除煩之藥終至不應半月而死

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百三十一卷目錄

醫部彙考二百十一

皮門

黃帝素問 金匱眞言論 六節藏象論 五藏生成篇 診要經終論 經脈別論 經脈論 皮部論 四時刺逆從論 五常政大論 至眞要大論 疏五過論 玉機眞藏論 本神篇 決氣篇 脈要精微論 五藏別論 本病篇 論勇篇 論痛論 衛氣失常篇 論疾診尺篇 刺節眞邪篇 九宮八風篇

扁鵲難經 皮聚 皮膚痛

張機金匱要略不仁 甲錯

王叔和脈訣 燥澁 痛酸

孫思邈千金方 虛實

朱肱活人書 寒在皮膚熱在骨髓熱在皮膚寒在骨髓論

劉完素六書 搏擊 鍼灸枯燥

李杲十書 皮毛論 乾燥 煩痹

朱震亨心法 病應各經

虞搏醫學正傳 被揭

戴思恭證治要訣 搔痒

樓英醫學綱目 皮部屬肺 肺絕外微 痛屬心火 痒屬血虛 索澤胗疾 鍼灸揭 皮痹

龔信古今醫鑑 被揭 皮痹

張三錫醫學準繩六要 肺應皮 被揭

徐春甫古今醫統 痒燥

王肯堂證治準繩 不仁

陳士鐸石室秘錄 皮內蟲聲 閭裂

方 胡氏經驗方 陰旦湯 小柴胡加牲蠣 白虎加人參湯 麻黃桂枝各半湯 四逆湯 通脈四逆湯 大柴胡湯 漆洗洗肌痹 瓊玉膏 天門冬膏 宇宙被肌湯 生血潤膚飲 黃芪酒 茜 風散 六和湯 薏苡附子敗醬散 鍼裂方 蜱蛻散 桑皮飲 淨膚膏 紫菀湯 芍藥補氣湯 活血應痛丸

單方

鍼灸

導引

醫案

醫部彙考二百十一

皮門

黃帝素問

金匱眞言論

西方白色入通於肺開竅於鼻藏精於肺故病在肩其味辛其類金其畜馬其穀稻其應四時上爲太白是是以知病之在皮毛也其音商其數九其臭腥

註 肺主皮毛故病在皮毛

六節藏象論

肺者氣之本魄之處也其華在毛其充在皮爲陽中之太陰通於秋氣

註 肺主氣而藏魄故爲氣之本魄之處也肺主皮毛故華在毛充在皮也臟眞居高而屬陰故爲陽中之太陰而通於秋氣秋主肺也

五藏生成篇

肺之合皮也其榮毛也其主心也多食苦則皮槁而毛拔

註 肺主氣氣主表故合於皮傷寒論曰寸口脈緩而遲緩則陽氣長其聲商毛髮長毛附於皮氣長則毛榮多食苦是火味太過而傷肺則皮槁而毛落矣

診要經終論

太陰終者腹脹閉不得息善噫善嘔嘔則逆逆則面亦不逆則上下不通不通則面黑皮毛焦而終矣

註 足太陰脈入腹屬脾故爲腹脹手太陰脈上膈屬肺而主呼吸故爲不得息脹滿則升降難不得息則氣道滯故爲噫爲嘔嘔則氣逆於上故爲面赤不逆則否塞於中故爲上下不通脾氣敗則無以制水故黑色見於面肺氣敗則治節不行故皮毛焦

經脈別論

脈氣流經經氣歸於肺肺朝百脈輸精於皮毛

註 脈氣者水穀之精氣而行於經脈中也言入胃之穀氣先注氣於脈百脈之經氣總歸於大經經氣歸於肺是以百脈之氣皆朝會於肺也肺合皮毛故復輸精於皮毛

痹論

黃帝問曰痹之安生岐伯對曰風寒濕三氣雜至合而爲痹也以秋遇此者爲皮痹故骨痹不已復感於邪內舍於腎筋痹不已復感於邪內舍於肝脈痹不已復感於邪內舍於心肌痹不已復感於邪內舍於脾皮痹不已復感於邪內舍於肺所謂痹者各以其時重感於風寒濕之氣也

註 痹者閉也邪閉而爲痛也言風寒濕三氣錯雜

而至相合而爲痹蓋皮肉筋骨內合於五臟五臟之氣外合於四時始病在外之有形復傷在內之五氣外內形氣相合而邪舍於內矣

帝曰痹其時有死者或疼久者或易已者其故何也岐伯曰其入臟者死其留連筋骨間者疼久其留皮膚間者易已

註夫風寒濕氣中其俞其臟氣實則邪不動臟若神氣消亡則痹聚在臟而死其留連筋骨間而不內舍於其合者疼久其留皮膚間者隨氣而易散若中其俞則內通五臟兼之陰氣不藏則邪直入於臟而爲不治之死證矣

帝曰善痹或痛或不痛或不仁或寒或熱或燥或濕其故何也岐伯曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者病久入深榮衛之行濇經絡時疎故不通皮膚不營故爲不仁通當作痛

註不仁不知痛癢也寒氣勝者爲痛痹故痛者寒氣多也病久入深者久而不去將內舍於其合也邪病久則榮衛之道傷而行濇邪入深則不痹閉於形身而經絡時疎故不痛也榮衛行濇則不能營養於皮膚故爲不仁

帝曰夫痹之爲病不痛何也岐伯曰痹在於骨則重在於脈則血凝而不流在於筋則屈不伸在於肉則不仁在於皮則寒故具此五者則不痛也

註骨有骨氣脈有脈氣筋有筋氣肌有肌氣皮有皮氣皆五臟之氣而外合於形身如病形而不傷其氣則止見骨痹之身重脈痹之血凝不行筋痹之屈而不伸肉痹之肌肉不仁皮痹之皮毛寒冷故具此五者之形證而不痛也

皮部論

黃帝問曰余聞皮有分部脈有經紀筋有結絡骨有度量其所主病各異別其分部左右上下陰陽所在病之終始願聞其道岐伯對曰欲知皮部以經脈爲紀者諸經皆然陽明之陽名曰害蜚上下同法視其部中有浮絡者皆陽明之絡也其色多青則痛多黑則痹黃赤則熱多白則寒五色皆見則寒熱也絡盛則入客於經陽主外陰主內少陽之陽名曰樞持上下同法視其部中有浮絡者皆少陽之絡也絡盛則入客於經故在陽者主內在陰者主出以滲於內諸經皆然太陽之陽名曰關樞上下同法視其部中有浮絡者皆太陽之絡也絡盛則入客於經少陰之陰名曰樞儒上下同法視其部中有浮絡者皆少陰之絡也絡盛則入客於經其入經也從陽部注於經其出者從陰內注於骨心主之陰名曰害肩上下同法視其部中有浮絡者皆心主之絡也絡盛則入客於經太陰之陰名曰關蟄上下同法視其部中有浮絡者皆太陰之絡也絡盛則入客於經凡十二經絡脈者皮之部也是故百病之始生也必先於皮毛邪中之則腠理開開則入客於絡脈留而不去傳入於經留而不去傳入於腑廩於腸胃邪之始入於皮也泝然起毫毛開腠理其入於絡也則絡脈盛色變其入客於經也則感虛乃陷下其留於筋骨之間寒多則筋攣骨痛熱多則筋弛骨消肉鑠䐃破毛直而敗帝曰夫子言皮之十二部其生病皆何如岐伯曰皮者脈之部也邪客於皮則腠理開開則邪入客於絡脈絡脈滿則注於經脈經脈滿則入舍於臟腑也故皮者有分部不與而生大病也帝曰善

註此章論十二經之絡脈分絡於皮膚之間病之始生必先於皮毛入客於絡脈隨皮部所循之脈而傳入於經入舍於所主之臟腑如不入於絡則留於筋骨之間而爲筋攣骨痛也

四時刺逆從論

少陰有餘病皮痹癮疹不足病肺痹滑則病肺風疝濇則病積溲血

註肺主皮毛毛脈合精於皮膚之間是以少陰之爲皮痹肺痹也疝則病在氣也溲血則病在血也秋氣在皮膚秋者天氣始收腠理閉塞皮膚引急

五常政大論

太陽司天寒氣下臨心氣上從而火且明土迺潤水豐衍寒客至沉陰化濕氣變物水飲內稸中滿不食皮痛肉苛筋脈不利甚則胕腫身後癰

註太陽司天則太陰濕土在泉故土乃潤稸積蓄癰痹也水飲中滿皮痹肉苛皆水濕之爲病也身後癰者癰發於背也

至眞要大論

歲少陰在泉熱淫所勝則焰浮川澤陰處反明民病腹中常鳴氣上衝胷喘不能久立寒熱皮膚痛目瞑齒痛頞腫惡寒發熱如瘧少腹中痛腹大蟄蟲不藏

註少陰在泉卯酉歲也少陰君火生於水中故焰浮川澤少陰標陰而本火故陰處反明腹中常鳴者火氣奔動也氣上衝胷者火氣炎上也喘不能久立寒熱皮膚痛者火淫肺金也目瞑者熱甚陰

虛長陽光也齒痛顫腫熱乘陽明也發熱如瘧者少陰標本之氣病也熱在下焦則少腹中痛熱在中焦則腹大也

少陰司天熱淫所勝怫熱至火行其政民病胃中煩熱嗌乾右胠滿皮膚痛寒熱欬喘

註少陰司天子午歲也蓋少陰之火發於陰中故爲怫熱少陰太陽陰中有陽陽中有陰陰陽相從標本互換是以火熱甚而大雨至水寒極而運火炎民病胃中煩熱嗌乾右胠滿皮膚痛肺受火熱而津液不生也

少陽司天火淫所勝則溫氣流行金政不平民病頭痛發熱惡寒而瘧熱上皮府痛色變黃赤傳而爲水身面附腫腹滿仰息泄注赤白瘕瘍欬唾血煩心胃中熱甚則骯鰓病本於肺天府絕死不治

註少陽司天寅申歲也火淫所勝故金政不平少陽之火在天爲暑故民病頭痛寒熱瘧熱上皮膚色變黃赤火上淫於肺也肺者太陰皆積水也傳爲水者逼其金水外溢故爲腫滿之水病也仰息肺氣逆而不得偃息也泄注赤白瘕瘍唾血煩心火熱盛也骯鰓甚而及於肺此火淫勝金故病本於肺天府肺脈在腋下三寸動脈應手肺氣已絕故死不治

太陽之勝凝慄且至非時水冰羽乃後化痔瘧發寒厥入胃則內生心痛陰中乃瘍隱曲不利互引陰股筋肉拘苛血脈凝泣絡滿色變或爲血泄皮膚否腫腹滿食減

註太陽寒水氣勝故凝慄且至非時水冰者勝氣在於歲半以前是以羽蟲後化也靈樞經曰足太陽是主筋所生病者爲痔瘧者太陽寒熱之邪也厥逆而入於胃者水侮土也胃絡上通於心故心痛也陰中乃瘍是以隱曲不利而互引陰股足太陽主筋故筋肉拘苛也血脈凝泣絡滿色變或爲血泄邪入於經也皮膚否腫者太陽之氣主表也腹滿食減者水氣乘脾也

少陰之復燠熱內作煩躁骯鰓少腹絞痛火見燔焫嗌燥分注時止氣動於左上行於右欬皮府痛暴瘖心痛鬱冒不知人乃洒淅惡寒振慄譫妄寒已而熱渴而欲飲少氣骨痿隔腸不便外爲浮腫噦噫

註骯鰓燠熱上乘於肺也少腹絞痛少陰之陰氣發於下也火見燔焫君火之氣發於上也嗌燥火爍金也夫陰寒在腹則注泄得火氣則注止少陰標本並發故時注時止也氣動於左者君火之氣發於左腎之水中上行於右者肺腎上下相交腎爲本而肺爲末也火淫肺金則欬而皮膚痛金主聲故暴瘖也心痛者火氣自傷也鬱冒不知人者寒熱之氣亂於上也洒淅振慄者陰陽相搏也寒已而熱者少陰之陰寒從火化而爲熱也是以渴而欲飲少氣骨痿蓋火盛則少氣熱盛則骨痿也噦者小腸之氣不通逆氣上走心而爲噫也

疏五過論

始富後貧雖不傷邪皮焦筋屈痿躄爲攣

註始富後貧則傷其志意志意者所以御精神收魂魄適寒溫和喜怒者也是故榮衛調志意和則筋骨健強勝理緻密故傷其志意則精神不能內守外爲皮焦筋骨攣躄之病

靈樞經

壽夭剛柔篇

形與氣相任則壽不相任則夭皮與肉相果則壽不相果則夭血氣經絡勝形則壽不勝形則夭

註形謂皮肉筋骨人之形氣天命所生皮膚緩者天道之元亨也是以緩則壽而急則夭

本神篇

肺喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人皮革焦毛瘁色天死於夏

註喜樂心之情也如肺因喜樂無極則傷肺藏之魄魄傷則狂狂者意不存意者心之發蓋喜樂無極則神亦憚散而不存矣肺主皮毛故人皮革焦

決氣篇

上焦開發宣五穀味熏膚充身澤毛若霧露之溉是謂氣穀入氣滿淖澤注於骨骨屬屈伸洩澤補益腦髓皮膚潤澤是謂液

註上焦氣宣發五穀之精微充膚熱肉潤澤皮毛若霧露之溉是謂氣穀入氣滿淖澤注於骨使骨屬屈伸洩澤從髓空而補益腦髓皮膚潤澤是謂液

脹論

三焦脹者氣滿於皮膚中輕輕然而不堅

五變篇

黃帝曰人之善病消癉者何以候之少俞答曰五臟皆柔弱者善病消癉此人皮膚薄而目堅固以深者長衝直揚其心剛剛則多怒怒則氣上逆胃中蓄積

血氣逆留腠皮充肌血脈不行轉而爲熱熱則消肌膚故爲消癉

註 五藏主藏精者也五藏皆柔弱則津液竭而善病消癉夫形體者五藏之外合也薄皮膚而肌肉弱則五藏皆柔弱矣夫柔弱者必有剛強謂形質弱而性氣剛也故此人薄皮膚而目堅固以深者其氣有長衝直揚之勢其心剛剛則多怒怒則氣上逆而血積於胷中氣逆留則充塞於肌肉血蓄積則脈道不行血氣留積轉而爲熱熱則消肌膚故爲消癉此言其人暴剛而肌肉弱者也

本藏篇

衛氣者所以溫分肉充皮膚肥腠理司開闔者也衛氣和則分肉解利皮膚調柔腠理緻密矣

肺應皮皮厚者大腸厚皮薄者大腸薄皮緩腹裏大者大腸大而長皮急者大腸急而短皮滑者大腸直皮肉不相離者大腸結

心應脈皮厚者脈厚脈厚者小腸厚皮薄者脈薄脈薄者小腸薄皮緩者脈緩脈緩者小腸大而長皮薄而脈冲小者小腸小而短諸陽經脈皆多紆屈者小腸結

腎應骨密理厚皮者三焦膀胱厚粗理薄皮者三焦膀胱薄疎腠理者三焦膀胱緩皮急而無毫毛者三焦膀胱急毫毛美而粗者三焦膀胱直稀毫毛者三焦膀胱結也

論勇篇

黃帝曰四時之風病人如何少俞曰黃色薄皮弱肉者不勝春之虛風白色薄皮弱肉者不勝夏之虛風青色薄皮弱肉不勝秋之虛風赤色薄皮弱肉不勝冬之虛風也黃帝曰黑色不病乎少俞曰黑色而皮厚肉堅固不傷於四時之風其皮薄而肉不堅色不一者長夏至而有虛風者病矣其皮厚而肌肉堅者長夏至而有虛風不病矣其皮厚而肌肉堅者必重感於寒外內皆然乃病黃帝曰善

註 皮膚肌腠乃五藏元眞之所通會是以薄皮弱肉則藏眞之氣虛藏氣虛則不能勝四時之虛風矣虛風者虛邪不正之邪風也黑者水之色論腎氣之厚薄也不傷於四時之風者謂土旺於四季也不病長夏之風者謂土主於長夏也設有皮厚肉堅而傷於四時之風者必重感於寒也夫在地爲水在天爲寒腎爲水藏上應天之寒氣是以色黑而皮厚肉堅之爲病者必重感於寒外內皆然乃病謂外受天之寒邪內又傷腎藏之水氣

論痛篇

人之骨強筋弱肉緩皮膚厚者耐痛其於鍼石之痛火熨亦然加以黑色而美骨者耐火熨堅肉薄皮者不耐鍼石之痛於火熨亦然

註 少陰秉先天之精氣陽明化水穀之精徼故筋骨之強弱肌肉之堅脆皮膚之厚薄腠理之疎密皆秉氣於少陰陽明者也黑色而美骨者少陰之血氣盛也肉緩皮膚厚者陽明之血氣盛也莫子晉曰腎爲水藏故少陰之氣盛者能耐火熨陽明秉秋金之氣故氣弱則不能耐鍼石火熨矣

衛氣失常篇

黃帝曰人有肥瘦大小如何伯高曰膏者多氣而皮縱緩故能縱腹垂腴肉者身體容大脂者其身收小

註 衛氣盛則腠理肥是以膏者多氣而皮縱緩故能縱腹垂腴腴者臍下之少腹也肉者身體容大此衛氣盛而滿於分肉也脂者其身收小此衛氣深沉不能充於分肉以致脂膜相連而肌肉緊密故其身收小也

論疾診尺篇

尺膚滑其淖澤者風也尺肉弱者解㑊安臥脫肉者寒熱不治尺膚滑而澤脂者風也尺膚濇者風痹也尺膚粗如枯魚之鱗者水泆飲也尺膚熱甚脈盛躁者病溫也其脈盛而滑者病且出也尺膚寒其脈小者泄少氣尺膚炬然先熱後寒者寒熱也尺膚先寒久大之而熱者亦寒熱也

註 此診尺而知外內之病也夫津液淖澤於皮膚故尺膚滑其淖澤者知風在於皮膚而鼓動其津液也脂者肌肉文理間之脂膜尺膚滑而澤脂者風在於肌肉間也夫在外者皮膚爲陽筋骨爲陰病在陽者名曰風病在陰者名曰痹如尺膚濇者此風痹於筋骨間也此以尺膚之淖澤滑濇而知風邪之淺深也肌肉者五藏元眞之所通會脾土之所主也故尺肉弱者主脾土虛而解㑊安臥解㑊者懈惰也脫肉者形損也寒熱者陰陽血氣虛也陽虛則惡寒陰虛則發熱陰陽形氣皆以虛脫故爲不治如枯魚之鱗者皮膚起寒粟也寒者水之氣此水邪泆飲於內故寒色見於外也溫病者寒毒藏於肌膚至春發爲溫病故尺膚熱甚而脈盛燥者知其爲病溫也其脈盛而滑者知病且出

於外也尺膚寒其脈小者少氣蓋氣者所以溫膚熱肉從陰而生自內而外故知其泄於內而虛於外也尺膚之先熱後寒先寒後熱而皆爲寒熱者尺膚主三陰三陽之氣也

刺節眞邪篇

黃帝曰官鍼奈何岐伯曰陰陽者寒暑也熱則滋雨而在上根荄少汁人氣在外皮膚緩腠理開血氣減汗大泄皮淖澤寒則地凍水冰人氣在中皮膚緻腠理閉汗不出血氣強肉堅濇治厥者必先熨調和其經掌與腕肘與脚項與脊以調之火氣已通血脈乃行然後視其病脈淖澤者刺而平之堅緊者破而散之氣下乃止此所謂以解結者也

註人之陰陽出入應天地之寒暑往來熱則滋雨在上而萬物之根荄少汁蓋言精水亦隨氣而上出也熱則人氣在外腠理開而汗大泄津氣外洩故在內之血氣減少此言人之血氣本於下焦之精氣也地凍水冰則天氣收藏而人氣在中皮膚緻密而汗不出精氣內藏故血氣自強也治厥者必先熨通其氣也調和其經通其經也謂所受於天之精氣行於經脈之外內者也調之掌與腕肘與脚項與脊謂血氣之行於上下四旁無處不到也淖澤者行之太過當刺而平之緊濇者澀滯不通當破而散之此所謂以鍼而解結者

虛邪之中人也漸漸動形氣毫毛而發腠理其入深內搏於骨則爲骨痹搏於筋則爲筋攣搏於脈中則爲血閉不通則爲癰搏於肉與衛氣相搏陽勝者則爲熱陰勝者則爲寒寒則眞氣去去則虛虛則寒搏於皮膚之間其氣外發腠理開毫毛淫氣往來行則爲痒痛而不去爲痹衛氣不行則爲不仁

註此言虛邪之傷形也漸漸動形故搏於皮脈肉筋骨而爲痹爲攣爲癰爲痒陰勝則爲寒寒則眞氣去有傷衛氣則爲不仁此皆邪氣之所生也

九宮八風篇

風從西方來名曰剛風其傷人也內舍於肺外在於皮膚其氣主爲燥

扁鵲難經

皮聚

一損損於皮毛皮聚而毛落二損損於血脈血脈虛少不能榮於五臟六腑三損損於肌肉肌肉消瘦飲食不能爲肌膚四損損於筋筋緩不能自收持五損損於骨骨痿不能起於牀反此者至於收病也從上下者骨痿不能起於牀者死從下上者皮聚而毛落者死

皮膚痛

寒熱之病候之如何也然皮寒熱者皮不可近席毛髮焦鼻槁不得汗肌寒熱者皮膚痛脣舌槁無汗

註靈樞二十一篇曰皮寒熱者不可附席毛髮焦鼻槁腊不得汗取三陽之絡以補手太陰肌寒熱者肌痛毛髮焦而脣槁腊不得汗取三陽於下以去其血者補足太陰以出其汗

漢張機金匱要略

不仁

酒疸下之久久爲黑疸目青面黑心中如噉蒜虀狀大便正黑皮膚爪之不仁其脈浮弱雖黑微黃故知之

甲錯

五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷房室傷飢傷勞傷經絡榮衛氣傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑緩中補虛大黃䗪蟲圓主之

腸癰之爲病其身甲錯腹皮急按之濡如腫狀腹無積聚身無熱脈數此爲腸內有癰膿薏苡附子敗醬散主之

晉王叔和脈訣

燥濕

三部俱遲腎臟寒皮膚燥澀髮毛乾

沉細仍兼滑因知是骨蒸皮毛皆總澀寒熱兩相承口鼻氣出不復廻唇反無文黑似煤皮毛焦乾爪枯折程途三日定知災

痛酸

三部俱浮肺臟風鼻中多水喘稠濃壯熱惡寒皮肉痛喉乾雙目淚酸疼

關前弱脈陽道虛關中有此氣多疎若在尺中陰氣絕酸疼引髮上皮膚

唐孫思邈千金方

虛實

夫五臟六腑者內應骨髓外合皮毛膚肉若病從外生則皮毛膚肉關格強急若病從內發則骨髓痿疼然陰陽表裏外皮內髓其病源不可不詳之也皮虛者寒皮實者熱凡皮虛實之應主於肺大腸其病發於皮毛熱則應臟寒則應腑

宋朱肱活人書

寒在皮膚熱在骨髓熱在皮膚寒在骨髓論

病人身大熱反欲得衣熱在皮膚寒在骨髓也仲景無治法宜先與陰旦湯寒已次以小柴胡加桂以溫其表病人身大寒反不欲近衣寒在皮膚熱在骨髓也仲景亦無治法當先與白虎加人參湯熱除次以桂枝麻黃各半湯以解其外大抵病有標本治有先後表熱裏寒者脈須沉而遲手或微厥下利清穀也所以陰證亦有發熱四逆湯通脈四逆湯主之表寒裏熱者脈必滑而厥口燥舌乾也所以少陰惡寒而踡時時自煩不欲厚衣用大柴胡湯下之此皆仲景之餘議也

金劉完素六書

瘙癢

癢得爬而解者爬爲火化微則亦能癢甚則癢去者謂令皮膚辛辣而屬金化辛能散火故金化見則火力分解矣

人近火微熱而癢熱甚則痛附近則灼而爲瘡皆火之用也癢者美疾故火旺於夏而萬物蕃美也或云痛爲實癢爲虛非謂虛爲寒也正謂熱之微甚也

皴揭枯燥

皴揭皮膚皆裂也乾爲天而爲燥金坤爲地而爲濕土天地相反燥濕異用故燥金主於緊斂所以秋脈緊細而微濕土主於縱緩所以六月其脈緩大而長也如地濕則縱緩滑澤乾則緊斂燥澀皴揭之理明可見焉俗云皴揭爲風者由風能勝濕而爲燥也經言厥陰所至爲風府爲坐啓由風勝濕而爲燥也所謂寒月甚而暑月衰者由寒能收斂勝理閉密無汗而燥故病甚也熱則皮膚縱緩腠理疎通而汗潤故病衰也或以水濕皮膚而反喜皴揭者水濕自招風寒故也

諸澀枯涸乾勁皴揭皆屬於燥澀枯者水液氣衰少血不榮於皮肉氣不通利故皮膚皴揭而澀也及其則麻痹不仁涸乾者水少火多繁辭云燥萬物者莫熯乎火故火極熱甚水液乾而不潤於身皮膚乃皆裂手足有如斧傷而深三二分者冬月甚而夏月衰故法曰寒能收斂收斂則燥澀皴揭熱能縱緩縱緩則滋榮潤澤皆屬燥金之化也王注曰物之生滑利物之死枯澀其爲治也宜開通道路養陰退陽凉藥調之榮血通流痲木不仁澀涸乾勁皴揭皆得其所慎無服烏附之藥經所謂金木水火土運行之數寒暑燥濕火風臨御之化則天道可見民病可知凡受諸病者皆歸於五行六氣勝復盛衰之道矣王注曰人生有形不能無患既有其患亦常有逃生化出陰陽者也故曰謹守病機各司其屬有者求之無者求之盛者責之虛者責之必先五勝疏其血氣令得條達而政和平此之謂也

燥乾者金肺之本肺藏氣以血液內損氣虛或風則皴揭風能勝濕熱能耗液皆能成燥故經云風熱火兼爲陽寒濕燥同爲陰又燥濕亦異也然燥金難屬秋陰而其性異於寒濕燥陰盛於風熱火也故風熱甚而寒濕同於燥也然中寒吐瀉亡液而成燥者亦以此矣故經云諸澀枯涸乾勁皴揭皆屬於燥也

元李杲十書

皮總論

心主榮肺主衛榮者血也脈者血之府神之所居也衛者元氣七神之別名衛護周身在於皮毛之間也肺絕則皮毛先絕神無所依故內傷飲食則亦惡風寒是榮衛失守皮膚間無陽以滋養不能任風寒也皮毛之絕則心肺之本亦絕矣蓋胃氣不升元氣不生無以滋養心肺乃不足之證也

乾燥

大腸者庚也燥氣也主津小腸者丙也熱氣也主液此皆屬胃胃虛則無所受氣而亦虛津液不濡睡覺口燥咽乾而皮毛不澤也

燥瘡

皮膚燥瘡經曰諸瘡爲虛血不榮肌膚所以癢也當與滋補藥以養陰血血和肌潤癢自不作

朱震亨心法

病應各經

體無膏澤足少陽膽經見證也

氣滿皮膚殼殼然堅而不痛手陽明大腸經見證也

皮膚暴癢足厥陰肝經見證也

皮膚痛及痲木手太陰肺經見證也

明虞摶醫學正傳

皴揭

丹溪曰皮膚皴揭圻裂血出大痛或肌膚燥癢者火鍼肺金燥之甚也宜以四物湯去川芎加麥門冬人參天花粉黃蘗五味子之類治之

戴思恭證治要訣

瘙癢

暑月身癢如針刺間有赤腫處亦名暑風末子六和

（原闕詳考證）

毛者也氣不榮則皮毛焦皮毛焦則津液去皮絕者津液既去則爪枯毛折毛折者毛先死

痛屬心火

皮膚痛屬心實經云夏脈者心也夏脈太過則病身熱膚痛爲浸淫

運氣皮膚痛皆屬火邪傷肺經云少陰在泉熱淫所勝病寒熱皮膚痛又云少陰司天火淫所勝熱上皮膚痛又云少陰之復咳皮膚痛治以諸寒是也

癢屬血虛

經云諸癢爲虛血不榮肌膚所以癢也當以滋補藥以養陰血和肌潤癢自不作矣

索澤屬燥

皮膚索澤即仲景所謂皮膚甲錯蓋皮膚澀而不滑澤者是也

運氣皮膚索澤屬燥傷膽氣經云陽明在泉燥淫所勝病體無膏澤治以苦寒是也

龔信古今醫鑑

皺揭

經云諸濕枯涸乾勁皺揭皆屬於燥故燥氣在裏耗其津液則大便祕結煩渴生焉血脈枯而氣亦滯也或過食辛辣厚味之物而助火邪伏於血中耗散眞陰津液虧少燥結有時或風燥於表鍾於皮膚皮毛燥澀乾癢爪枯勁強緊急口噤善伸數欠或時惡寒筋惕而搐延溢胃腸燥糞瘈瘲昏冒僵仆皆由陰血衰少不能制火火熾赶金金受邪則不能平木以致肝氣獨盛風邪內生而成此疾矣治之之法以辛潤之以苦泄之因虛者滋陰養血因火者瀉火軟堅因風者消風散結此三者乃治燥證之大法也

皮痹

痹病在皮者多寒遇寒則急遇熱則縱應乎肺其證皮膚無所知覺氣奔喘滿

張三錫醫學準繩六要

肺應皮

五臟一或有虛必見證於外故肺主氣外司皮毛肺虛則色白而多汗行動多喘因其流而補其源可謂上工矣

肺虛則皮毛焦津液枯力乏腹脹喘息宜紫菀湯人參黃芪白石英

皺揭

大都因血氣有火變爲燥病易曰燥萬物者莫熯乎火是也在外則皮毛枯焦在上則咽乾口燥在中則煩渴不已治宜生津養血凉血滋陰潤燥切忌燥劑如半夏蒼朮之類

徐春甫古今醫統

癢燥

皮膚鬱熱生風作癢者宜清熱疏風凉血子和法妙經曰諸癢爲虛肺主氣司布皮毛肺氣不通而癢者宜防風麥芪白朮之類補之衞陽勝實閉固熱鬱衞氣不和爲之實宜調氣和血散鬱之劑

劉河間分大便祕結或消渴之類爲燥病之裏證身熱皮膚燥澀乾疥爪枯之類爲燥病之表證而於陽結陰結氣血少疾鬱風熱可得而悉

王肯堂證治準繩

不仁

皮膚間有痲木此肺氣不行也芍藥補氣湯

風濕客於腎經血脈凝滯腰背腫疼不能轉側皮膚不仁偏身痲木頸項頭目虛腫耳內常鳴下注脚膝重痛少力行履艱難項背拘急不得舒暢宜活血應痛丸

石室秘錄臣陳士鐸著

皮內蟲聲

如人有皮膚手足之間如蚯蚓唱歌者此乃水濕生蟲也方用蚯蚓養斃於患處鳴即止以水調塗之厚

一寸可也鳴止再用煎湯方用白朮防風各五錢薏仁芡實各一兩生甘草三錢黃芩二錢附子三分水煎服即愈此治濕則蟲無以養況又有生甘草以解毒化蟲防風去風而逐瘀附子斬關而揭邪所以奏功如神也

開裂

喉中似有物行動吐痰則痛更甚身上皮膚開裂有水流出目紅腫而又不痛足如斗腫而又可行眞絕世不見之證此乃人食生菜有蜈蚣在葉上不知而食之乃生蜈蚣於胃口之上入胃則胃痛上喉則喉痛飢則痛更甚也方用雞一隻煮熟五香調治芬馥之氣逼人乘人睡熟將雞刻在病人口邊則蜈蚣自然外走倘有蜈蚣走出立時拏住不許其仍進口中或一條或數條不等出盡自愈大約喉間無物走動則無蜈蚣矣然後以生甘草三錢薏仁當歸黃芪各一兩茯苓三兩白芍五錢防風五分荊芥陳皮各一錢水煎服十劑則皮膚之裂自愈而雙足如斗亦消矣蓋蜈蚣在上焦非藥能殺因藥下喉即至胃中而蜈蚣知在胃口之上故不能殺之也所以引其外出然後以藥調治其氣血自愈皮膚開裂者乃蜈蚣毒氣盤踞肺邊肺主皮毛故皮膚開裂兩足如斗足乃腎之部位肺居上爲腎之母母病則子亦病然腎水終是不乏而毒氣留於腎部故足之皮大而浮非骨之病也所以能走斗眼屬肝肝受肺氣之毒熏蒸而紅腫矣

方

葫蘿蒸法（千金方下同）

治皮虛主大腸病寒氣關格

細糠一斗　葫蘿根葉切三升　菖蒲葉切

桃葉皮枝剉各二升　秫米五升

右五味以水一石五斗煮取米熟爲度大盆器貯之於盆上作小竹牀子單盆人身坐牀中四面周迴將蓆圍障風身上以衣被蓋覆若氣息時開孔對中泄氣取通身接汗可得兩食久許如此三日蒸還溫藥足汗用之若盆裏不過熱盆下安炭火非但治寒但是皮膚一切勞冷悉皆治之

梔子煎

治皮質主肺病熱氣

生元參五兩　梔子仁　枳實　大青　杏仁

柴胡　芒硝各二兩　石膏八兩　生地黃

淡竹葉切各一升

右十味以水九升煮取三升去滓下芒硝分爲三服

陰旦湯（仲景下同）

治身大熱反欲近衣乃熱在皮膚寒在骨髓

芍藥　甘草炙各二兩　乾薑炮　黃芩各三兩

桂四兩

右剉如麻豆大每服五錢棗二枚水一盞半煎至八分去滓溫服日三夜二

小柴胡加桂湯

治前證服陰旦湯後寒已者

柴胡八兩　人參　甘草炙　半夏湯浸七次切　黃芩　桂去皮各三兩

右剉如麻豆大每服抄五錢水一盞半生薑七片棗二枚煎至八分去滓取六分清汁溫服日三夜二若渴者去半夏加人參苦蘘根同煎服之

白虎加人參湯

治身大寒反不欲近衣乃寒在皮膚熱在骨髓也

人參二分　知母一兩五錢　粳米一合半

甘草炙二兩或作半兩　石膏四兩碎綿裹

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分取米熟爲度去滓溫服

桂枝麻黃各半湯

治前證服白虎加人參湯後熱除者又病不得小汗偏身皮癢此屬太陽故并治之

桂枝　甘草炙　芍藥各八錢　麻黃半兩湯泡焙秤　杏仁十二箇湯浸去皮尖兩仁者

右剉如麻豆大每服抄五錢生薑四片棗子一枚水一盞半煎至八分去滓溫服

四逆湯

治前證熱在皮膚寒在骨髓脈沉而遲手或微厥下利清穀

甘草炙二兩　附子一箇生用　乾薑炮一兩半

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫服強人加附子半箇乾薑加一兩半

通脈四逆湯

治證同四逆湯

附子大者一枚去皮破八片生用　甘草炙二兩　乾薑炮三兩

面赤者加連鬚葱九莖
腹中痛者去葱加芍藥二兩
嘔者加生薑二兩
咽痛去芍藥加桔梗一兩
利止脈不出者去桔梗加人參二兩

大柴胡湯

治少陰惡寒而踡時時自煩不欲厚衣

柴胡四兩　黃芩　芍藥各一兩五錢　半夏一兩
一分洗　枳實二枚去瓤炒

右剉如麻豆大每服抄五錢生薑四片棗子一枚
水一盞半煑至八分去滓溫服以利爲度未利再
服本方無大黃欲下者加大黃一兩

澡洗藥 衛生寶鑑下同

治一切諸風及遍身瘙癢光澤皮膚可常用

乾荷葉三十二兩　威靈仙十五兩　零陵香
藁本　茅香　藿香各十六兩　甘松八兩
白芷八兩

右八味爲粗末每用二兩生絹袋盛水二桶約四
斗煎四五沸放熱於無風處淋渫洗了避風少時
如水冷少時更添熱湯斟酌得所使用勿令添水
不添藥末

潤肌膏

治手足皴澀皮膚裂開疼痛不能迎風入手屢用
屢效故錄於此

珠子青四兩　白黃蠟八錢　乳香二錢

右於鐵鐺內先下瀝青隨手下黃蠟乳香次入麻
油一二匙俟瀝青溶開微微熬動放大淨水盆於
其旁以攪藥用鐵筯滴一二點於水中試之如硬
入少油看硬軟合宜新綿濾於水中揉扯以白爲
度磁器內盛或油紙裹每用先火上炙裂口子熱
捻合藥亦火上炙軟塗裂口上用紙少許貼之自
然合矣

瓊脂膏 醫仙方下同

治血虛皮膚枯燥及消渴等證

生地黃二十斤洗淨搗取眞汁去滓　酥油一斤
鹿角膠一斤　白沙蜜二斤煎一二沸掠去沫
生薑二兩搗取眞汁

右先以文武火熬地黃汁數沸絹濾取淨汁又煎
二十沸下鹿角膠次下酥油蜜同煎良久候稠如
餳以磁器收貯每服一二匙空心溫酒調下之

瓊玉膏

治前證

人參十二兩　白茯苓去皮淨者二十五兩
白砂蜜五斤煎滾去沫　琥珀　沉香各五錢
生地黃十斤洗淨石器內杵爛取自然汁忌鐵器

右以人參茯苓沉香琥珀俱爲細末先將地黃汁
與蜜攪勻用密絹濾去細滓入藥末攪勻入好磁
瓶或銀瓶內用綿紙十數層外加箭箬包封紮瓶
口入砂鍋內或銅鍋內以長流水浸沒瓶頸用桑
柴文武火煑三晝夜取出換蠟紙數重包紮瓶口
浸井中半日出火毒提起仍入前鍋內煑半日以
出水氣然後收藏每日清晨及午前後取一二匙
用溫酒一盞調服不飲酒人白湯亦可此法須用
不聞雞犬聲處煅煉之及不許孝服婦人見之

天門冬膏

治血虛肺燥皮膚坼裂及肺痿咳膿血證

大門冬新掘者不拘多少

右淨洗去皮心搗絞取汁澄清濾去滓用砂鍋慢
火熬成膏每用一二匙空心溫酒調服

辛潤緩肌湯 東垣

治皮膚燥澀及肌燥諸渴等證

生地黃　細莘各一分　熟地黃　石膏各四分
黃蘗酒洗　黃連　生甘草　知母各半錢
柴胡去蘆　歸身　荊芥穗各二錢　桃仁泥
防風各一錢　升麻一錢半　杏仁六箇另研
紅花少許　川椒一粒

右細切作一服水二盞煎至一盞稍熱服食遠

生血潤膚飲 醫學正傳下同

治血虛皮膚燥澀

升麻二分　生地黃　熟地黃　黃芪　當歸
麥門冬去心各一錢　天門冬去心一錢五分
黃芩去朽酒洗　苦蔞仁　桃仁泥各五分
五味子九粒　酒紅花一分

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服如大便結
燥加麻仁榔李仁各一錢

黃芪酒

治風寒濕痹皮膚頑麻燥癢筋脈攣急語言蹇澀
手足不遂等證

黃芪　防風　桂枝　天麻　萆薢　白芍藥
石斛　虎脛骨酥炙　當歸　雲母粉　白朮
茵芋葉　木香　仙靈脾　甘草　續斷各一兩

右細切以生絹袋盛用無灰好酒一斗以瓷罐浸之包封罐口勿令泄氣春五夏三秋七冬十日每服一盞溫飲之不拘時候

消風散

治風熱皮膚搔癢

荊芥穗　甘草炙　陳皮去白　厚朴　人參　白殭蠶炒　蟬蛻去土炒　茯苓　防風　川芎　藿香　羌活各等分

右爲細末每服二錢煎薄荷湯或茶清調下

六和湯

治暑風皮痛如針刺瘧吐瀉者

白朮土炒　半夏製　砂仁　杏仁　人參　甘草各五分　赤茯苓　白扁豆薑汁拌炒　藿香　木瓜各一錢　厚朴薑汁炒　香薷各二錢

右細切加生薑三片大棗一枚水二盞煎至一盞溫服

藿香正氣散

治前證

大腹皮　白芷　紫蘇　白茯苓　藿香各二錢　厚朴　陳皮去白　白朮　桔梗　半夏各二兩　炙甘草一兩

右㕮咀每服三錢薑三片棗一枚煎熱服

四物湯

治血虛皮膚燥癢及一切血證

生地　當歸酒洗各三錢　芍藥二錢　芎藭錢半

右爲粗末水煎服

大黃䗪蟲圓（仲景下同）

治五勞虛極諸傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑

大黃十分酒拌蒸　黃芩二兩　乾地黃十兩　生甘草三兩　芍藥四兩　乾漆一兩　桃仁　杏仁研　蝱蟲　蠐螬各一升　水蛭百枚　廬蟲半升

右十二味爲末蜜丸小豆大酒飲服五丸日三

薏苡附子敗醬散

治腸癰肌膚甲錯

薏苡仁十分　附子三分　敗醬五分

右三味杵爲末取方寸匕以水二升煎減半頓服小便當下

皴裂方（東垣）

治手足皮膚皴裂春夏不愈者

生薑汁　紅糟　白鹽　豬骨臘月者佳

右研爛炒熱擦入皴內一時雖痛少頃便皮軟皴合再用即安

蟬蛻散（得效方）

治酒後偏身皮癢搔至血出

蟬蛻　薄荷葉各等分

右爲末每二錢酒水調服

桑皮飲

治皮膚痛不可以手按

桑皮二錢　乾葛　柴胡　黃芩　元參各一錢　生甘草　木通各四分　地骨皮　天門冬　麥門冬各一錢半

右水二盞薑三片葱一根煎八分食遠服取微汗

澤膚膏

治皮膚枯燥如魚鱗

牛骨髓　眞酥油各等分

右二味合研一處以淨磁器貯之每日空心用三匙熱酒調服蜜湯亦可久服滋陰養血止嗽榮筋

紫菀湯

治氣虛皮毛焦枯四肢無力喘息短氣

紫菀洗　乾薑炮　黃芪　人參　五味子　鍾乳石粉　杏仁麩炒去皮尖　甘草炙各等分

右爲末每服四錢水一盞薑五片棗一枚煎服無時

芍藥補氣湯（東垣）

治皮膚間癬木

黃芪　陳皮　甘草炙各一兩　白芍藥一兩半　澤瀉半兩

右每服一兩用水二大盞煎至一盞去滓溫服

活血應痛丸（資壽）

治風濕客於腎經血脈凝滯腰背腫疼不能轉側偏身皮膚不仁痲木上項頭目虛腫耳內常鳴下注腳膝重痛少力行履艱難項背拘急不得舒暢

狗脊去毛六兩　茅山蒼朮米泔浸一宿十兩　香附炒十二兩　陳皮九兩　沒藥一兩二錢　草烏炮二兩半　威靈仙三兩

右爲細末酒麪糊爲丸如桐子大每服十五九溫酒或熱湯送下不拘時候常服和血脈壯筋骨使氣脈宣通忌桃李雀鴿諸血物

單方

皮膚皴裂川椒三四合水煮去滓浸患處半食頃出令燥再浸再塗以猪羊髓腦甚妙梅師方

皮膚搔癢無如鹽濃煎湯浴身最妙醫學綱目

海水浴皮癢尤妙俗方

皮膚麻痺搔癢用莽草煎湯洗浴效古今醫鑑

皮膚風熱徧身生癮疹搔癢牛蒡子浮萍等分爲末以薄荷湯調下二錢日二服本草拾遺

風氣搔癢不止蜂房炙過蟬蛻等分爲末酒調一錢服日二三次

治皮膚風癢疾藜蒸湯服之兼浴之

徧身皮膚風癢欲生瘡疥菌陳蒸濃汁洗之

婦人風搔癮疹身癢不止取蒼耳花葉子等分爲末豆淋酒調下二錢

肺風毒皮膚搔癢取樺皮煮湯服之

皮風搔癢及白癜瘋瘡風以鰻鱺魚燒炙常食之又火炙取油塗之

暴風搔癢及身生白癜瘋瘡風斑點取白花蛇肉爲末酒服一二錢烏蛇尤妙

皮風搔癢及白癜瘋瘡風用鵪鴣炙食之

皮膚中毒名癥疰用酢和燕窠土傅之千金方

皮中如有蟲行此風熱也鹽一斗水一石煎湯浴之二四次亦療一切風氣外臺秘要

徧身皮膚風癢凌霄花爲末酒服一錢醫學正傳

皮裏作痛不問何處用何首烏末薑汁調成膏塗之以帛裹住火炙鞋底熨之經驗方

多瓜仁去皮膚風及黑黯潤肌膚可作面脂大明

皮膚皴裂取牛鼻繩末和五倍子末填入薄紙貼之救急方

皮膚風癢用蟬蛻薄荷葉等分爲末酒服一錢日三集驗方

狠膏潤燥澤皴塗諸惡瘡腎珍

皮膚皴裂桐油一盞髮一握熬化瓶收每以溫水洗

令軟傅之即安救急方

毒氣遊移在皮膚中及疣癖等用白楊木皮酒漬服

鍼灸

靈樞經曰病有在毫毛腠理者故刺毫毛無傷皮皮傷則內動肺肺動則秋病溫瘧泝泝然寒慄

黃帝曰刺六腑有道乎岐伯曰刺此者必中氣穴無中肉節中氣穴則鍼遊於巷中肉節卽皮膚痛補瀉反則病益篤中筋則筋緩邪氣不出與其眞相搏亂而不去反還內著用鍼不審以順爲逆也

寒氣客於皮膚陰氣盛陽氣虛故爲振寒寒慄補諸陽

病在皮膚無常處者取以鑱鍼於病所膚白勿取

直鍼刺者引皮乃刺之以治寒氣之淺者也

所謂三刺則穀氣出者先淺刺絕皮以出陽邪再刺則陰邪出者少益深絕皮致肌肉未入分肉間也已入分肉之間則穀氣出

半刺者淺內而疾發鍼無鍼傷肉如拔毛狀以取皮氣此肺之應也

熱病先膚痛窒鼻充面取之皮以第一鍼五十九苛軫鼻索皮於肺不得索之火火者心也

黃帝問於伯高曰何以知皮之病也伯高曰色起兩眉薄澤者病在皮皮有部皮之部輸於四末黃帝曰取之奈何伯高曰百病變化浮沉深淺不可勝窮各在其處病間者淺之甚者深之間者少之甚者衆之隨變而調氣故曰上工

風疹膚脹爲五十七痏取皮膚之血者盡取之

皮寒熱者不可附席毛髮焦鼻槁腊不得汗取三陽之絡以補手太陰

春取絡脈絡脈治皮膚

皮者肺之合也人之陽也故爲之治鍼必以大其頭而銳其末令無得深入而陽氣出

甲乙經曰熱病頭痛引目外背而急煩滿汗不出引頷齒面赤皮痛懸癰主之

欬而嘔鬲寒食不下寒熱皮肉膚痛少氣不得臥胃滿支南脅鬲上兢兢脅腹膜胃脘暴痛上氣肩背寒痛汗不出喉痹腹中痛積聚默然嗜臥怠惰不欲動身常濕濕心痛無可搖者脾俞主之

肺系急胃中痛惡寒胃滿悒然善嘔膽胃中熱喘逆氣氣柅追逐多濁唾不得息肩背風汗出面腹腫鬲中食饐不下食喉痹肩息肺脹皮膚骨痛寒熱煩滿中府主之

胃中滿耳前痛齒痛目赤痛頸腫寒熱渴飲輒汗出不飲則皮乾熱曲池主之

水腫水氣行皮中陰交主之

水腫腹大水脹水氣行皮中石門主之

身腫皮膚不可近衣淫漯苛獲久則不仁屋翳主之

醫學綱目曰皮膚痛取肺經云邪在肺則病皮膚痛

寒熱上氣喘汗出煩動肩背取之膺中外俞背二節五椎之旁以手疾按之快然乃刺之取之缺盆中以越之是也

皮膚索澤取足少陽經云足少陽之脈是動則病體無膏澤視盛虛熱寒陷下取之也

秋感風寒濕者爲皮痹久而不已則內入於肺病煩滿喘嘔取太淵合谷

古今醫統曰至陰屋翳治遍身皮癢

導引

保生秘要曰皮膚搔癢導引法先行外法用火推至尾閭令人以手跪指摩熱至濕出如汗即愈次推開心頭及痰吐出以手覆臍上想火轉於腹中燒之或從頭腦推開至臍亦好

醫案

衛生寶鑑曰國信副使覃公年四十九歲至元丙寅春病臍腹冷疼完穀不化足脈寒而逆皮膚不仁精神困弱診其脈沉細而微遂投以大熱甘辛之劑及灸氣海百壯三里二穴各三七壯陽輔各二七壯數日亦不發十日後痛亦更不作膿瘡口皆乾癸丑歲初予隨朝承應冬屯於瓜忽都地面學鍼於竇子聲先生因詢穴腧曰凡用鍼者氣不至而不效灸之亦不發大抵本氣空虛不能作膿失其所養故也更加不愼邪氣加之病必不退異日因語鍼灸科忽教授亦以爲然至元戊辰春副使除益都府判到任未幾時風疾半身痲木自汗惡風妄喜笑又多健忘語言微澀醫以續命湯復發其汗津液重竭其證愈甚因求醫還家日久神氣昏憒形容羸瘦飲食無味便溺遺失扶而後起屢易醫藥皆不能效因思內經云陽氣者若天與日失其所則折壽而不彰今因此病而知予聲先生之言矣或云副使肥甘足於口輕煖足於體使令足於前所爲無不如意君言失其養何也予曰汝言所養養口體者也予論所養養性命者也且覃氏壯年得志不知所養之正務快於心精神耗散血氣空虛因致此疾靈樞經云人年十歲五藏始定血氣已通其氣在下故好走二十歲血氣始盛肌肉方長故好趨三十歲五藏大定肌肉堅血氣盛滿故好步四十歲五藏六腑十二經脈皆大盛以平定腠理始疎華榮頹落髮漸斑白平盛不搖故好坐五十歲肝氣始衰肝葉始薄膽汁始減目始不明六十歲心氣始衰善憂悲血氣懈惰故好臥七十歲脾氣始衰皮膚已枯八十歲肺氣衰魂魄散離故言善悞九十歲腎氣焦臟枯經脈空虛百歲五藏皆虛神氣皆去形骸獨居而終矣蓋精神有限嗜慾無窮輕喪性命一失難復其覃氏之謂歟

省郎中張子敬六十七歲病眼目昏暗唇微黑色皮膚不澤六脈絃細而無力一日出示治眼二方問予可服否予曰此藥皆以黃連大苦之藥爲君諸風藥爲使自人年五十腸汁減而目始不明內經云土位之主其寫以苦諸風藥亦皆寫土人年七十脾胃虛而皮膚枯重寫其土使脾胃之氣愈虛而不能營運營衞之氣以滋養元氣胃氣不能上行腸氣吐食諸病生焉又已年高衰弱起居皆不同此藥不可服只宜愼言語節飲食懲忿窒慾此不治之治也子敬只爲然明年春除關西路按察使致仕還精神清勝脈遂平和此不妄服寒藥之效也內經曰誅罰無過是謂大惑解之可也

醫學綱目曰東垣老人路次方城北獨樹店之客舍有推小車者皮膚皺裂甚痛兩手不能執轅足不能履地而車上宿制此藥傳之即效明日遂行自後屢用屢效方用生薑汁紅糟白臘臘月豬膏研爛炒熱擦入皺內一時雖痛少頃便皮軟皺合再用即安也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百三十二卷目錄

醫部彙考二百十二

肉門一

黃帝素問 六節臟象論 五臟生成篇 平人氣象論 臟氣法時論 宣明五氣論 血氣形志篇 逆調論 痹論 痿論 氣穴論 調經論 四時刺逆從論 五常政大論 至眞要大論

靈樞經 根結篇 本神篇 經脈篇 五癃津液別篇 五變篇 本臟篇 論勇篇 論痛篇 衛氣失常篇 五禁篇 刺節眞邪篇 九宮八風篇 九鍼篇

扁鵲難經 肌肉消瘦 肉痹 肉病治療

孫思邈千金方 肉極 虛實

劉完素六書 麻木

成無己明理論 不仁 瞤動

張從政儒門事親 不仁

李杲十書 痿痛消削

朱震亨心法 麻木

虞摶醫學正傳 麻木 祇法

樓英醫學綱目 肉部所主 病因

李中梓醫宗必讀 肉脫者死 肉痿

龔信古今醫鑑 脾痹 麻木

張三錫醫學準繩六要 脾應肉 痿瘦 肉極 麻木

陶華六書 瞤惕 不仁

徐春甫古今醫統 麻木論 治麻木以疏導鬱滯爲先

王肯堂證治準繩 麻木

藝術典第二百三十二卷

醫部彙考二百十二

肉門一

黃帝素問

六節臟象論

脾胃大腸小腸三焦膀胱者倉廩之本榮之居也名曰器能化糟粕轉味而入出者也其華在脣四白其充在肌其味甘其色黃此至陰之類通於土氣

註 足太陰獨受水穀之濁爲轉輸之官腸胃主受傳水穀三焦主決瀆水道膀胱爲水精之腑故皆爲倉廩之本脾藏榮故爲榮之居器者生化之宇具升降出入之氣脾能運化糟粕轉味而入養五臟輸出腐穢於二陰故名之曰器也四白脣之四際白肉也口爲脾竅而主肌故華在脣四白其充在肌甘者土之味黃者土之色也脾爲陰中之至陰通於土氣此節指脾而言以腸胃三焦膀胱並受傳水穀之精粗故總爲倉廩之本受濁者爲陰故曰至陰之類

五臟生成篇

脾之合肉也其榮脣也其主肝也

註 脾主中央土乃倉廩之官主運化水穀之精以生養肌肉故合肉脾開竅於口故榮在脣脾主土而受制於肝木是肝乃脾臟生成之主也

多食酸則肉胝臅而脣揭此五味之所傷也

註 多食酸是木味太過而傷脾則肉胝臅而脣掀揭矣五味所以養五臟者也臟有偏勝則所不勝之臟受傷此又承制之不可太過也

平人氣象論

臟眞濡於脾脾藏肌肉之氣也

註 土臟之元眞濡於脾而主藏肌肉之氣

臟氣法時論

脾病者身重善肌肉痿足不收行善瘈脚下痛

註 脾主肌肉主通會元眞之氣脾氣傷故身重而肌肉善痿痿者肌肉委棄不仁也足太陰經脈循脛膝邪在經絡故足不收氣傷故善瘈而痛此言經病而及於氣也

宣明五氣篇

甘走肉肉病無多食甘

註 脾主肌肉甘爲土味脾病而多食之則反傷脾氣也

陰病發於肉

註 脾爲陰中之至陰在體爲肉是以太陰之病而發於所主之肌肉

脾主肉久坐傷肉

註 五臟元眞之氣通會於肌肉腠理脾氣通於五臟故所主在肉脾喜運動故久坐傷肉

血氣形志篇

形樂志樂病生於肉治之以鍼石

註 過於安樂則神機不轉氣血羈留故病生於肉宜治以鍼石引而通之

形數驚恐經絡不通病生於不仁治之以按摩醪藥

註 驚則氣亂恐則氣下蓋血隨氣行氣數亂逆則經絡不通榮衛不行是以病生於不仁宜按摩醪藥以行其榮衛血氣焉

通調論

帝曰人之肉苛者雖近衣絮猶苛也是謂何疾岐伯曰榮氣虛衛氣實也榮氣虛則不仁衛氣實則不用榮衛俱虛則不仁且不用肉如故也

註苛虐也肉雖近衣絮而苛虐如故也虛實者不和也言榮氣不得衛氣之和則榮氣虛衛氣不與榮氣相和則衛氣實也蓋陽道常實故曰實然則過猶不及也不仁者不知痛痒不用者痿而不勝於用蓋言榮衛不和則兩者皆虛矣榮衛兩虛者不仁且不用不仁不用而肉苛如故者不和而致虛也

痹論

痹在於肉則不仁

註臟氣外合於形身如病形而不傷其氣則止見肌肉不仁而不痛也

瘘論

有漸於濕以水爲事若有所留居處相濕肌肉濡漬痹而不仁發爲肉瘘故下經曰肉瘘者得之濕地也

註有漸於濕者地氣之中於下也以水爲事者好飲水漿濕淫之留於中也若有濕濁之所留而居處又兼卑下外內相濕以致肌肉濡漬痹而不仁發爲肉瘘也

脾氣熱則胃乾而渴肌肉不仁發爲肉瘘

註陽明燥金主氣從中見太陰之濕化是以脾氣熱則胃乾而渴矣脾胃之氣亟主肌肉今陽明津液不生太陰之氣不至故肌肉不仁發爲肉瘘也

氣穴論

帝曰願聞谿谷之會也岐伯曰肉之大會爲谷肉之小會爲谿肉分之間谿谷之會以行榮衛以會大氣邪溢氣壅脈熱肉敗榮衛不行必將爲癰內消骨髓外破大腘留於節湊必將爲敗積寒留舍榮衛不居卷肉縮筋肋肘不得伸內爲骨痹外爲不仁命曰不足大寒留於谿谷也谿谷三百六十五穴會亦應一歲其小痹淫溢循脈來往微針所及與法相同

註肉有大分者如股胻之肉各有界畔小分者肌肉之內皆有文理然理路雖分而交相會合是大分處即是大會處小分處即是小會處也分會之間以行榮衛之氣故名之曰谿谷大氣宗氣也夫氣爲陽邪留於肌腠之氣分邪正相搏則爲病熱故有壅腫消破之敗證矣邪氣淫溢則正氣自壅谿谷之氣與脈相通是以脈熱於內而肉敗於外也榮衛不行則血氣留滯而爲壅腫邪留於腘肉節湊之間則筋骨必將自敗矣夫積寒留舍攻榮衛不能居其間寒邪凝滯又不得正氣以和之以致肉卷而筋縮也肋肘乃筋骨之機關故不得伸針邪閉於外故內爲骨痹榮衛內逆故外爲不仁命曰不足蓋熱邪淫溢是屬有餘寒性凝滯故爲不足此大寒之邪留於谿谷之間以致筋骨皆爲病也谿谷之間亦有三百六十五穴會以應一歲與孫絡之相同可以微鍼刺取以瀉其邪小痹者謂邪始入於皮膚未傷筋骨脈謂孫絡脈也邪在皮膚循脈往來見而瀉之與治孫絡之法相同而亦不必問其穴會之所在也此言邪之客於人也必先始於皮膚次於孫絡入於肌肉以及於筋骨在淺之時微鍼所及易於解散無使其入深而爲大痹也

調經論

血氣未并五臟安定肌肉蠕動命曰微風

註蠕蟲行動貌蓋風傷衛衛氣行於肌肉之間故蠕動也

四時刺逆從論

太陰有餘病肉痹寒中不足病脾痹

註有餘而在外則爲肉痹不足而在內則爲脾痹長夏氣在肌肉長夏者絡經皆盛內溢肌中

五常政大論

太陽司天水飲內稽中滿不食皮痛肉苛筋脈不利其則附腫身後癰

註太陽司天則太陰濕土在泉水飲中滿皮痹肉苛皆水濕之爲病身後癰者癰發於背也

厥陰司天風氣下臨脾氣上從體重肌肉萎食減口爽風行太虛雲物搖動目轉耳鳴

註隆平之紀其類土其臟脾土從木化則受其勝制故土用變革而爲體重食減之脾病也目轉耳鳴風行於上也

六元正紀大論

太陽司天之政四之氣風濕交爭風化爲雨乃長乃化乃成民病大熱少氣肌肉萎足痿注下赤白

註加臨之氣乃厥陰風木四之主氣乃太陰濕土是以風濕交爭風化爲雨加臨之氣從時而化也夏秋之交濕土主氣故乃長乃化乃成蓋夏主長秋主成長夏主化也民病大熱少氣者風熱之病

肉萎足痿者濕土之氣注下赤白者濕熱交感也

至眞要大論

太陽之勝痔瘧發寒厥入胃則內生心痛陰中乃瘍隱曲不利互引陰股筋肉拘苛

註靈樞經曰足太陽是主筋所生病者爲痔瘧者太陽寒熱之邪也厥逆而入於胃者水侮土也胃絡上通於心故心痛也陰中乃瘍是以隱曲不利而互引陰股足太陽主筋故筋肉拘苛也

靈樞經

壽夭剛柔篇

伯高曰形與氣相任則壽不相任則夭若形充而大肉胭堅而有分者肉堅肉堅則壽矣形充而大肉無分理不堅者肉脆肉脆則夭矣

註脾主地而主肉肉堅者壽不堅者夭此後天之土基有厚薄也

本神篇

心怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破胭脫肉毛悴色夭死於冬

註思慮脾之情也如心因怵惕思慮則傷心藏之神神傷則不能主持而恐懼自失矣脾主土而主肌肉肺主氣而主皮毛肉之膏肥曰胭色者氣之華也胭肉者地所成之形也毛色者天所生之氣也破胭脫肉毛悴色夭天地所生之命絕矣死於冬者死於四時之勝尅也

經脈篇

足太陰氣絕者則脈不榮肌肉脣舌者肌肉之本也脈不榮則肌肉軟肌肉軟則肉萎人中滿人中滿則脣反脣反者肉先死甲篤乙死木勝土也

註足太陰之氣生於脾脾藏榮而外主肌肉是以太陰氣絕則脈不榮於肌肉矣脾開竅於口主爲衛使之迎糧故脣舌爲肌肉之本脈不榮則肉萎脣反太陰之生氣絕於外也甲篤乙死脾臟之氣死於內也

五癃津液別篇

天暑衣厚則腠閉理故汗出寒留於分肉之間聚沫則爲痛

註腠理者分肉之文理津液三焦出氣滲注於皮膚肌肉之間故腠理開則汗大泄如有寒而留聚於分肉之間則排裂分肉而爲痛沫者津聚而爲沫也

五變論

黃帝曰人之善病風厥漉汗者何以候之少俞答曰肉不堅腠理疎則善病風黃帝曰何以候肉之不堅也少俞答曰胭肉不堅而無分理理者粗理粗理而皮不緻者腠理疎此言其渾然者

註朱丞年曰此言皮不緻密肉理粗疎致風邪厥逆於內而爲漉漉之汗蓋津液充於皮腠之間皮潰理疎則津洩而爲汗矣委中之下曰胭太陽之部分也蓋太陽之氣主於皮膚如胭肉不堅而無分理無分理者粗理也理粗而皮不緻密則腠理疎而渾然汗出矣

黃帝曰何以候人之善病癉者少俞答曰粗理而肉不堅者善病癉黃帝曰癉之高下有處乎少俞答曰欲知其高下者各視其部

註理者肌肉之文理若文理粗疎而不緻密則邪留而爲癉蓋皮肉脈筋骨五藏之分部也癉論曰風寒濕三氣雜至合而爲癉以冬遇此者爲骨癉以春遇此者爲筋癉以夏遇此者爲脈癉以至陰遇此者爲肌癉以秋遇此者爲皮癉故各視其部則知癉之高下蓋心肺之癉在高肝腎脾癉在下也

黃帝曰人之善病腸中積聚者何以候之少俞答曰皮膚薄而不澤肉不堅而淖澤如此則腸胃惡惡則邪氣留止積聚乃傷脾胃之間寒溫不次邪氣稍至稸積留止大聚乃起

註夫皮膚薄而氣不充身澤毛肉不堅而津液不能淖澤如此則腸胃惡蓋津液血氣腸胃之所生也惡則邪氣留止而成積聚乃傷脾胃之間若再飲食之寒溫不節邪氣稍至即稸積而大聚乃起夫腸乃肺之合而主皮主氣胃乃脾之合而主肉主津故皮膚薄而肉不堅則氣不充而津液不淖澤矣氣不充而液不澤則毫毛開而腠理疎疎則邪氣留止漸溜於腸胃之間而成積聚矣

本藏篇

衛氣者所以溫分肉充皮膚肥腠理司開闔者也衛氣和則分肉解利皮膚調柔腠理緻密矣

註言人之血氣神志調和則形體乃安

脾應肉肉胭堅大者胃厚肉胭麤者胃薄肉胭小而麤者胃不堅肉胭不稱身者胃下胃下者下脘約不利肉胭不堅者胃緩肉胭無小裏累者胃急肉胭多小裏累者胃結胃結者上脘約不利也

註倪氏曰胭肥脂也麼亦小也約約束也胃有上脘中脘下脘故胃下則下脘約不利結則上脘約不利也

論勇篇

黃帝曰四時之風病人如何少俞曰黃色薄皮弱肉者不勝春之虛風白色薄皮弱肉者不勝夏之虛風青色薄皮弱肉不勝秋之虛風赤色薄皮弱肉不勝冬之虛風也黃帝曰黑色不病乎少俞曰黑色而皮厚肉堅固不傷於四時之風其皮薄而肉不堅色不一者長夏至而有虛風者病矣其皮厚而肌肉堅者長夏至而有虛風不病矣其皮厚而肌肉堅者重感於寒外內皆然乃病

註薄皮弱肉則臟眞之氣虛矣五臟之氣虛則不能勝四時之虛風矣虛風者虛鄉不正之邪風也黑者水之色論腎氣之厚薄也不傷於四時之風者謂土旺於四季也不病長夏之風者謂土主於長夏也設有皮厚肉堅而傷於四時之風者必重感於寒也夫在地爲寒腎爲水藏上應天之寒氣是以色黑而皮厚肉堅之爲病者必重感於寒外內皆然謂外受天之寒邪內傷腎藏之水氣此言人之五藏與天之六氣相合是以五色之薄弱者不能勝四時之風氣也

論痛篇

人之骨強筋弱肉緩皮膚厚者耐痛其於鍼石之痛火焫亦然加以黑色而美骨者耐火焫堅肉薄皮者不耐鍼石之痛於火焫亦然

註人之皮肉筋骨皆藉少陰陽明之所資生而資養者也少陰稟先天之精氣陽明化水穀之精微是以筋骨之強弱肌肉之堅脆皮膚之厚薄腠理之疎密皆稟氣於少陰陽明者也黑色而美骨者少陰之血氣盛也肉緩皮膚厚者陽明之血氣盛也

衛氣失常篇

黃帝曰何以度知其肥瘦伯高曰人有肥有膏有肉黃帝曰別此奈何伯高曰腘肉堅皮滿者肥腘肉不堅皮緩者膏皮肉不相離者肉

註腠理者肌肉之文理如豕之精肉條分而有理路理中之白膜曰脂肉外連皮之肥肉曰肥故曰腘肉堅而皮滿者肥蓋肥在皮之內肉之外故肉堅而皮滿也膏者即肥之脂膏謂如豕之紅白相間而有數層者爲膏蓋肥膏之間於肉內故肉不堅而皮緩也此論衛氣之肥腠理故止論膏而不論肥然先言人有肥者以明膏肥之有別也皮肉不相離者謂肉勝而連於皮內無膏而外無肥此亦衛氣之勝於肉理者也

黃帝曰身之寒溫何如伯高曰膏者其肉淖而粗理者身寒細理者身熱脂者其肉堅細理者熱粗理者寒

註膏者肉不堅故其肉淖而膏與肉之相間而相和者也脂者腠理固密故其肉堅粗理者衛氣外洩故身寒細理者衛氣收藏故身熱

黃帝曰其肥瘦大小奈何伯高曰膏者多氣而皮緩故能縱腹垂腴肉者身體容大脂者其身收小

註衛氣盛則腠理肥是以膏者多氣而皮緩故能縱腹垂腴腴者臍下之少腹也肉者身體容大此衛氣深沉不能充於分肉也脂者其身收小此衛氣盛而滿於分肉也腠理相連而肌肉緊密故其身收小也

黃帝曰三者之氣血多少何如伯高曰膏者多氣多氣者熱熱者耐寒肉者多血多血則充形充形則平脂者其血清氣滑少故不能大此別於衆人者也

註膏者衛氣盛故熱而耐寒肉者肌肉隆盛故多血血氣盛則充膚熱肉故充形血隨氣行血氣皆盛是爲榮衛和平脂者肌肉緊密是以血清氣少故不能大此三者有肥瘦大小之不同故與平人之有別也

黃帝曰衆人奈何伯高曰衆人皮肉脂膏不能相加也血與氣不能相多故其形不大不小各自稱其身命曰衆人黃帝曰善治之奈何伯高曰必先別其三形血之多少氣之清濁而後調之治無失常經是故膏人縱腹垂腴肉人者上下容大脂人者雖脂不能大也

註三者之人有肥大之太過瘦小之不及故當審其血之多少氣之清濁而後調之無失衛氣之常經斯爲平和之人矣此因衛氣失常是故膏人縱腹垂腴肉人者上下容大脂人者雖脂不能大也蓋衛氣主於皮肉筋骨之間浮沉淺深各在其處若獨充盛於皮膚分肉之間而使縱腹垂腴上下容大或深沉於筋骨之間以致脂不能大皆衛氣之失常也是以浮沉深淺不可勝窮隨變而調其氣命曰上工

五禁篇

著痹不移腳肉破身熱脈偏絕是爲逆也

註著痹不移腳肉破身熱者濕邪傷形久而化熱也脈偏絕者脾胃之氣敗也

刺節眞邪篇

虛邪之中於身也深寒與熱相搏久留而內著寒勝其熱則骨疼肉枯熱勝其寒則爛肉腐肌爲膿內傷骨內傷骨爲腎蝕有所疾前筋筋屈不能伸邪氣居其間而不反發爲筋溜有所結氣歸之衝氣留之不得反津液久留合而爲腸溜久者數歲乃成以手按之柔已有所結氣歸之津液留之邪氣中之凝結日以易甚連以聚居爲昔瘕以手按之堅有所結深中骨氣因於骨骨與氣并日以益大則爲骨疽有所結中於肉宗氣歸之邪留而不去有熱則化而爲膿無熱則爲肉疽凡此數氣者其發無常處而有常名也

註寒與熱搏者形中之陰陽二氣也蓋形合氣氣歸形形氣之相合也是以傷形則病氣傷氣則病形結氣歸之者寒熱相搏之氣歸於邪留之形所也凡此數氣者其發無定處而有肉枯骨蝕筋溜昔瘕之定名也

九宮八風篇

風從西南方來名曰謀風其傷人也內舍於脾外在於肌其氣主爲弱風從東南方來名曰弱風其傷人也內舍於胃外在肌肉其氣主體重

九鍼篇

形樂志樂病生於肉治之以鍉石形數驚恐筋脈不通病生於不仁治之以按摩醪藥

形樂志樂則心廣體胖故當治之鍼石以疏氣驚傷心肝恐則傷腎是以形數驚恐則筋脈不通榮氣不行則爲不仁

扁鵲難經

肌肉消瘦

三損損於肌肉肌肉消瘦飲食不能爲肌膚

漢華佗中藏經

肉痹

肉痹者飲食不節膏粱肥美之所爲也痹者肉之本氣以食則肉不榮肌膚不澤則紋理疎凡風寒暑濕之邪易爲入故不早治則爲肉痹肉痹之狀其先能食而不能充悅四肢緩而不收持者也其右關脈按舉皆無力而往來澁也宜節飲食以調其臟常起居以安其痹然後依經補瀉以求其愈也

肉病治療

按摩則可以驅浮淫於肌肉宜按摩而不按摩則使人淫墮肌肉久留未消

病若虛而不補則使人氣血消散肌肉耗亡精神脫失志意昏迷不當汗而汗則令人肌肉消絕津液枯耗不當按摩而按摩則使人肌肉膿脹筋骨舒張

唐孫思邈千金方

肉極

凡肉極者主脾也脾應肉肉與脾合若脾病則肉變色又曰至陰遇病爲肌痹肌痹不已復感於邪內舍於脾體痒淫淫如鼠走其人身上津液脫腠理開汗大泄鼻端色黃是其相也凡風氣藏於皮膚肉色則敗以季夏戊己日傷於風爲脾風脾風之狀多汗陰動傷寒寒則虛虛則體重怠惰四肢不欲舉不嗜飲食食則欬欬則右脅下痛引肩背不可以動轉名曰厲風裏虛外實若陽動傷熱熱則實實則人身上如鼠走唇口堺皮膚色變身體津液脫腠理開汗大泄名曰惡風須決其綱紀知其終始陰陽動靜肉之虛實實則瀉之虛則補之能治其病者風始入肉皮毛肌膚筋脈之間卽須決之若入六腑五臟則半死矣

扁鵲曰肉絕不治五日死何以知之皮膚不通外不得泄凡肉應足太陰太陰氣絕則脈不營其肌肉口脣者肌肉之本也脈不榮則肌肉濡肌肉濡則人中滿人中滿則脣反脣反氣盡則肉先死甲篤乙死木勝土死良醫妙藥終不治也

虛實

夫肉虛者坐不安席身危變動肉實者坐安不動喘氣肉虛實之應主於脾若其腑藏有病從肉生熱則應臟寒則應腑

金劉完素六書

痲木

風寒濕三氣留著不去卽四肢痲木拘攣也

濕者物濕則滑澤乾則澁滯燥濕相反故也如偏身中外濕潛皆屬燥金之化故私脈滿然痲亦猶澁也由水液衰少而燥澁氣行壅滯而不得滑澤通利氣强攻衝而爲痲也如平人抑其手足則其氣頓行之甚而澁滯壅礙不得通利而痲亦猶鼓物之象也其不欲動者動則爲陽使氣行之轉其故轉痲也俗方治痲病多用烏附者令氣行之暴甚以故轉痲因之衝開道路以得通利乘氣盡則平氣行通而痲愈也

然六氣不必一氣獨爲病氣有相兼若亡液爲燥或痳而無熱證即當此方或風熱勝濕爲燥因而病痳則宜以追風散熱活血養液潤燥通氣之涼藥調之則痳自愈也治諸燥澀悉如此法

成無己明理論

不仁

傷寒肉不仁何以明之仁柔也不仁不柔和也痒不知也痛不知也寒不知也熱不知也任其屈伸灸刺不知所以然者是謂不仁也由邪氣壅盛正氣爲邪氣閉伏鬱而不發榮衛血氣虛少不能通行致斯然也內經曰榮氣虛則不仁針經曰衛氣不行則爲不仁經曰榮衛不能相將三焦無所仰身體痹不仁即是言之知榮衛血氣虛少不能通行爲不仁者明矣經曰諸乘寒者則爲厥鬱冒不仁言此厥者是正氣爲寒氣所乘爲厥氣也非四肢逆冷之厥也何者蓋以鬱冒爲昏目不仁爲不知痛痒得不爲尸厥之厥耶經曰少陰脈不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胷膈宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此爲尸厥其乘寒之厥鬱冒不仁即此尸厥可知矣昔越人入虢診太子爲尸厥以鬱冒不仁爲可治刺之而得痊愈者實神醫之診也嗚呼設或脈浮而洪身汗如油喘而不休水漿不下形體不仁此謂命絕雖越人其能起之歟

瞤動

經曰動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤是發汗而動肝氣者也

傷寒肉瞤何以明之傷寒頭痛身疼惡寒發熱者必然之證也其於肉瞤非常常有之者必待發汗過多亡陽則有之矣內經曰陽氣者精則養神柔則養筋發汗過多津液枯少陽氣太虛筋肉失所養故惕惕然而跳瞤瞤然而動也太陽病脈微弱汗出惡風者不可服大青龍湯服之則厥逆筋惕肉瞤此爲逆也太陽病發汗汗出不解其人仍發熱頭眩身瞤動振振欲擗地者眞武湯主之動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤即是觀之筋惕肉瞤由發汗多亡陽則陽虛可見矣茲雖逆也止於發汗亡陽而表虛治以溫經益陽則可矣或因吐下發汗表裏俱虛而有此狀者又非若但發汗後所可同也經曰傷寒吐下發汗虛煩脈甚微八九日心下痞鞕脅下痛氣上衝咽喉眩冒筋脈動惕者久而成痿此爲逆之甚者也太陽病發汗復下之後表裏俱虛復加燒針因胷煩面色青黃膚瞤者難治茲爲逆之甚者也發汗吐下庸可忽諸

元張從政儒門事親

不仁

凡肌肉不仁乃風濕寒三氣合而爲痹及手足痳痹不仁內經曰榮虛衛實皮膚不仁痹而不知痿痛可用鬱金散吐之次服導水丸輕寒之藥泄之泄訖次以辛溫之劑汗出後常服當歸芍藥烏附行經和血之藥則愈矣

李杲十書

痿痛消削

脾氣熱生肉痿故痹而不仁諸痿皆屬於上者指病之本在肺也故必先於起肺然後熱傳入五臟散爲諸證

肌肉痿足太陽膀胱經也

肉痛足太陰脾經也

脾虛則肌肉消削蓋人之肉如地之土豈可人而無肉故肉消則死矣

朱震亨心法

痳木

痳是氣虛木是濕痰死血或有氣血俱虛但痳而不木者有虛而感濕痳木兼作者有因虛而風寒濕三氣乘之故周身掣痛痳木併作者若此其甚宜先汗而後補有痰滯四肢或一指痳木逾年而有中風之病此皆氣血先虛之兆也若此者須負治之

明虞摶醫學正傳

痳木

經曰風寒濕三氣合而爲痹故風氣勝者爲行痹寒氣勝者爲痛痹濕氣勝者爲著痹河間曰留著不去四肢痳木拘攣也又曰痛者寒氣多也有寒故痛其不痛不仁者病久入深榮衛之行濇經絡時疎故不痛皮膚不榮故爲不仁夫所謂不仁者或周身或四肢唧唧然痳木不知痛痒如繩紮縛初解之狀古方名爲痳痹者是也丹溪曰痳是氣虛木是濕痰死血然則曰痳曰木者以不仁中分而爲二也雖然亦有氣血俱虛但痳而不木者亦有虛而感濕痳木兼作者又有因虛而風寒濕三氣乘之故周身掣痛兼痳木併作者古方謂之周痹治法宜先汗而後補也醫者宜各以類推而治之不可執一見也

脈法

脈浮而濇屬氣虛關前得之痲在上體關後得之痲在下體也

脈浮而緩屬濕爲痲痹脈緊而浮屬寒爲痛痹脈濇而芤屬死血爲木不知痛痒

樓英醫學綱目

肉部所主

脾主肉經云脾主肉在體爲肉在臟爲脾又云邪在脾胃則病肌肉痛是也

脾病在谿經云北方黑色入通於腎故病在谿谿者肉之小會也

病因

濕傷肉甘傷肉經云濕傷肉風勝濕甘傷肉酸勝甘又云甘走肉肉病無多食甘又云多食酸則肉胝腘而脣揭是也

坐樂傷肉經云久坐傷肉又云形樂志樂病生於肉治之以針石是也

李中梓醫宗必讀

肉脫者死

形肉已脫九候雖調猶死此岐伯欲人以脈合形也蓋形肉者脾之所主脾土爲萬物之母觀其形肉脫則知脾壞於內而根本喪矣九候雖調猶不免於死形可以弗視乎哉

肉痿

經云脾氣熱則胃乾而渴肌肉不仁發爲肉痿蓋脾痿者肉痿也脾與胃以膜相連而開竅於口故脾熱則胃乾而渴脾主肌肉熱蓄於內則精氣耗傷故肌肉不仁發爲肉痿

龔信古今醫鑑

脾癉

癉病在肌者多不仁應乎脾其證四肢懈怠發嗽嘔吐

痲木

肌肉痲木者因風濕熱下陷入血分陰中陽道不利亦有痰在血分者其證合眼則渾身肌肉痲木痒者血不榮於肌腠治以參芪能助陽道以當歸能行陰道二木苓甘藥以除濕熱柴升芍藥以升提之痰加二陳治當活法

如感風濕手臂或痛或木或偏身肌肉痲木用五積散主之

張三錫醫學準繩六要

脾應肉

五臟一或有虛必見證於外脾虛則面與手足肌肉削腫因其流而補其源可謂上工矣

痿瘦

心脾損及胃損飲食不爲肌膚宜益氣和血調飲食十全大補湯補腎金剛丸

肉極

脾實則肌肉癉腠理開汗大泄四肢緩弱急痛宜薏苡仁散

痲木

榮衛滯而不行則痲木如久坐壓住一處痲不能舉理可見矣痲屬痰屬虛木則全屬濕痰死血一塊不知痛痒若木然是也

脈沉滑體厚人多痰與濕二木二陳或少佐風藥羌獨柱杖一二味兼參芪補氣

婦人及素有鬱抑者當舒鬱

脈微弱或弦大無力病久體羸者血氣虛補中益氣或加製附子一片夏月對生脈散

一塊不知痛痒陰寒益甚或日輕夜重脈濇而芤痰挾死血宜活血行氣芎歸桃仁泥紅花牛膝二陳之類加韭汁大便黑而閉者桃仁承氣湯下之

陶華六書

瞤惕

肉瞤筋惕者非常有之陽氣者精則養神柔則養筋發汗過多津液涸少陽氣偏枯筋肉失所養故惕惕然動瞤瞤然跳也非溫經助陽之藥何可愈乎故設眞武湯以救之因汗吐下後表裏俱虛有此證者逆之甚也

不仁

肌肉不仁者謂不柔和雖痛痒不知針火不知是也諸虛乘寒則爲鬱冒不仁血氣虛弱不能周流於一身於是正氣爲邪氣所伏故肢體頑痲不仁厥如死屍用桂麻各半湯不愈者補中益氣湯入薑汁設或身體如油汗出不休喘而直視水漿不入者此爲命絕也

徐春甫古今醫統

痲木論

內經以風寒濕三氣雜至合而爲痹其風氣勝者爲行痹寒氣勝者爲痛痹濕氣勝者爲著痹其不痛不仁者爲痲痹是也今夫痲木之證正經所謂不痛不仁病久入深榮衛之行澁經絡時疎故不痛皮膚不

榮故不仁如繩紮縛初解之狀

治痲木以疏導鬱滯爲先

凡坐臥及倚靠之久而致經絡氣血不通卽痲而木可見其鬱滯也凡痲木多在四肢及手足之指者此則四末氣血不充榮不通故多痲木也丹溪謂當多用附子行經則此意也

十指痲木者胃中多有濕痰死血宜二陳湯加蒼白术桃仁紅花之類

王肯堂證治準繩

痲木

原病式列痲論在六氣燥金諸濕條下釋之曰物得濕則滑澤乾則澁滯痲猶澁也由水液衰少而燥澁氣行壅滯而不得滑澤通利氣強攻衝而爲痲也俗方治痲病多用烏附者令氣行之暴甚以故轉痲因之衝開道路以得通利而痲愈也然六氣不必一氣獨爲病氣有相兼若亡液爲燥或痲木無熱證卽當此治或風熱勝濕爲燥因而病痲則宜以退風散熱活血養液潤燥通氣之涼藥調之東垣則曰痲者氣之虛也眞氣弱不能流通填塞經絡四肢俱虛故生痲木不仁或在手或在足或通身皮膚盡痲者皆以黃芪人參白术甘草五味芍藥當歸升麻柴胡之類隨時令所乘之氣出入無方但補其虛全不用攻衝之峻劑竊詳劉李二公生同時居同地無世運方土之異宜何乃凡病遽有補攻之別如此蓋因悟入聖人之道不同劉以人稟天賦本無虧欠因邪入擾亂其氣而後成病所以攻邪爲要邪退則正氣自安李以人之眞氣榮養百骸周於性命凡眞氣失調少有所虧則五邪六淫便得乘間而入所以補正爲要正復則邪氣自却今宜酌量二公之法當攻當補從中調治無執泥其說丹溪又分痲木爲二以痲止習習然尚無氣血攻衝不行之狀木則氣血已痹不仁莫知其痛痒也癘風初起者其手足必先木而後皮膚瘍潰與夫癱瘓者手足亦時痲木當自求之本門

素問曰榮氣虛則不仁衛氣虛則不用榮衛俱虛則不仁且不用靈樞曰衛氣不行則必痲木東垣治痲痹必補衛氣而行之蓋本諸此

渾身痲木不仁或左或右半身痲木或面或頭或手臂或脚腿痲木不仁並神效黃芪湯

皮膚間有痲木此肺氣不行也芍藥補氣湯如肌肉痲必待瀉榮而愈如濕熱相合四肢沉痛當瀉濕熱

金匱方血痹陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證身體不仁如風痹狀黃芪桂枝五物湯主之

濕氣風證不退脏運痲木不已除風濕羌活湯主之

榮虛衛實肌肉不仁致令瘡重名曰肉苛宜前胡散苦參丸

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百三十三卷目錄

醫部彙考二百十三

肉門二

方 肉極方 西州續命湯 石楠散 大黃芪酒 又方 五加酒 半夏湯 地黃煎 眞武湯 清脾飲子 防風白朮牡蠣湯 小建中湯 射金散 導水丸 柏子仁丸 補氣升陽和中湯 雙合湯 神效黃芪湯 補氣湯 開結舒經湯 參苓丸 前胡散 谷靈丸 五積散 十全大補湯 補中益氣湯 桃仁承氣湯 生風散 薏苡仁散 金剛丸 桂枝麻黃各半湯 易簡方 桂枝五物湯 除風瀉羌活湯 苦參丸

單方

鍼灸

醫案

藝術典第二百三十三卷

醫部彙考二百十三

肉門二

方

肉極方 千金方下同

治肉熱極肌痹淫淫如鼠走身上津液脫腠理開汗大泄爲脾風風氣藏於皮膚肉色敗鼻見黃色

麻黃 防己一作防風 枳實 細莘 白朮各三兩

生薑 附子各四兩 甘草 桂心各二兩

石膏八兩

右十味㕮咀以水九升煑麻黃去沫下諸藥煑取三升分三服

西州續命湯

治肉極虛熱肌膚淫淫如鼠走身上津液開泄或痹不仁四肢急痛

麻黃 生薑各三兩 當歸 石膏各二兩

杏仁四十枚 芎藭 桂心 甘草 黃芩

防風 芍藥各一兩

右十一味㕮咀以水九升先煑麻黃除沫下諸藥煑取三升去滓分四服日再

石楠散

治肉極熱則體上如鼠走或如風痹脣口壞皮膚色變主諸風大病

石楠三十銖 薯蕷 白芍藥一作甘草 天雄

桃花一作桃仁 甘菊花各一兩 黃芪十八銖

山茱萸二兩十八銖 眞珠十八銖 石膏二兩

升麻 葳蕤各一兩半

右十二味治下篩酒下方寸匕日再食後服

大黃芪酒

治肉極虛寒爲痹風陰動傷寒體重怠惰四肢不欲舉關節疼痛不嗜飲食虛極所致

黃芪 桂心 巴戟天 石斛 柏子仁 澤瀉

茯苓 乾薑 蜀椒各三兩 防風 獨活 人參各二兩 天雄 芍藥 附子 烏頭 茵芋

半夏 細莘 花粉 白朮 黃芩 山萸各一兩

右二十三味㕮咀絹袋貯以清酒三斗漬之秋冬七日春夏三日初服三合漸漸加微痹爲度日再

又方

治肉極虛寒卒中風口噤不能言四肢緩縱偏攣急痛注五臟恍惚喜怒無常手脚不隨

獨活 茵芋 黃芩各三兩 甘草 防風

芍藥 芎藭 麻黃 葛根各三兩 人參一兩

烏頭三枚

右十一味㕮咀以水一斗入竹瀝四升合煑取四升分四服日三夜一

五加酒

治肉虛坐不安席好動主脾病寒氣所傷

五加皮 枸杞皮各二升 地黃 丹參各八兩

石膏 杜仲各一升 乾薑四兩 附子三兩

右八味㕮咀以清酒二斗漬三宿一服七合日再

半夏湯

治肉實坐不安席不能動作喘氣主脾病熱氣所加關格除喘

麻黃一兩 半夏 宿薑各八兩 杏仁五兩

細莘 橘皮各四兩 石膏七兩 射干二兩

右八味㕮咀以水九升煑取三升分三服須利下加芒硝三兩

地黃煎中藏經

解勞傷生肌肉進飲食活血氣養心神

鵝梨汁一升 生地黃汁 杏仁汁 生薑汁

紫蘇汁 薄荷汁各五升 法酒二升 沙蜜四兩

右慢火熬成膏入後藥

柴胡三兩 木香 人參 茯苓 山藥 遠志

柏子仁微炒另研　白朮　枳殼各一兩麩裹煨
泰艽二兩　桔梗　熟地黃各四兩酒浸切焙
麝香半兩細研
右九如桐子大每日食後甘草湯下二十九

異武湯 仲景

治悞發太陽汗致筋惕肉瞤以此救之
附子一枚炮去皮破八片　白茯苓　白芍藥
生薑切　白朮各三兩
右五味以水八升煮去滓溫服七合日三服若煩者加五味半合細辛乾薑各一兩若小便利者去茯苓若下利者去芍藥加乾薑若嘔者去附子加生薑足前成半斤

清肺飲子 衛生寶鑑

長肌肉補肺氣養脾胃定心神
白芍五錢　人參　升麻　柴胡各四錢　天冬麥冬各三分　陳皮二分半　黃芩　甘草生黃蘗　甘草炙各二分
右十一味㕮咀作一服水二盞煎至一盞去滓溫服食後汗多者加黃芪五分

防風白朮牡蠣湯 仲景同

治發汗多頭眩汗出筋惕肉瞤
防風　牡蠣粉炒黃　白朮等分
右搗羅爲細末每服二錢以酒調下米飲亦得日進二三服汗止便服小建中湯

小建中湯

治前證汗已止者
桂枝　甘草炙　生薑切各三兩　芍藥六兩
大棗十二枚劈　膠飴一升
右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微火消解溫服一升日三服

蔚金散 千金同

治肌肉不仁以此探吐吐後宜服導水丸
蔚金　滑石　川芎各半兩
右爲細末每服一二錢量虛實加減以薤汁調下空心服之

導水丸

治前證
大黃　黃芩各二兩　滑石　黑牽牛頭末各四兩
右爲細末滴水丸梧桐子大每服五十丸或加至百丸臨臥溫水下

柏子仁丸 丹溪

補益元氣充實肌膚
山茱四兩　柏子仁炒　遠志各半兩　覆盆子
山藥另爲末各一兩　當歸梢　澤瀉各半錢
陳皮　紅花少許　五味子三十粒
右細切作一服水二盞煎至一盞溫服

補氣升陽和中湯 東垣

治閉目則渾身肌肉瞤木書減夜甚開目則瞤退
生甘草　黃蘗酒炒　白茯苓　澤瀉　升麻
柴胡各二分　蒼朮　草豆蔻各三分　陳皮
歸身　白芍藥　人參各六分
佛耳草　炙甘草各八分　黃芪一錢
右細切作一服水二盞煎至一盞去滓食遠服

雙合湯 古今醫鑑

治濕痰死血作痲木
當歸　川芎　白芍藥　生地黃　陳皮　半夏
白茯苓　白芥子各一錢　桃仁八分　酒紅花甘草各三分
右剉作一貼水煎入竹瀝薑汁調服

神效黃芪湯 東垣下同

治渾身痲木不仁或頭面手足肩背腿脚痲木並皆治之
蔓荊子二分　陳皮五分　人參八分　炙甘草
白芍藥各一錢　黃芪二錢
右細切作一服水二盞煎至一盞去滓臨臥稍熱服如痲木不仁雖有熱不加黃蘗只加黃芪一錢
通三錢如痲木甚者加芍藥一錢通二錢如小便淋瀝加澤瀉五錢一服去則止如有大熱證加酒洗黃蘗三分

補氣湯

治肌肉痲木神效
黃芪　陳皮　甘草各一錢二分　澤瀉六分
芍藥八分
右細切作一服水二盞半煎至一盞溫服

開結舒經湯 古今醫鑑

治七情六鬱氣滯肌肉手足痲痹
紫蘇葉　陳皮　香附　烏藥　川芎　蒼朮
羌活　南星　半夏　當歸各八錢　桂枝
甘草各四分
右剉作一貼薑三片煎入竹瀝薑汁調服

參苓丸 古今醫鑑

治胃中結熱消穀善食不生肌肉此名食㑊

人參　石菖蒲　遠志　赤茯苓　地骨皮

牛膝酒浸各一兩

右爲末蜜丸梧子大米飲下三五十丸不拘時服

前胡散 河間

治肉苛證苛者癟重也

川椒三錢　前胡　白芷　細莘　官桂　白朮

川芎各三兩　吳茱萸　附子炮　當歸各二兩

右剉搗以茶酒三升拌勻同窨一宿以猪脂五斤入藥微煎候白芷黃色去滓熬成膏在病處摩之以熱爲度

谷靈丸 濟陰綱目

治肌肉消索

黃芪　人參　牛膝　當歸各一兩　熟地黃

白茯苓各五錢　杜仲　蒼朮　白朮　肉桂

枸杞子各三錢　附子炮一枚

右爲末酒糊和丸梧子大人參湯下百丸

五積散 和劑

治風濕肌肉痲木

白芷　茯苓　半夏湯洗七次　當歸　川芎

甘草炙　肉桂　芍藥各三兩　枳殼去瓤麩炒

麻黃去節根　陳皮去白各六兩　桔梗十二兩

蒼朮泔浸去皮二十四兩　厚朴去粗皮薑製

乾薑爁各四兩

右㕮咀每服四錢水一盞薑三片葱白三根煎七分熱服

十全大補湯

治氣血兩虛脾弱肌肉瘦削手足逆冷脈沉微無火證者

人參　白朮　茯苓　熟地黃　川芎　當歸

芍藥　肉桂　黃芪各等分　甘草減半

右㕮咀水一盞半生薑三片棗二枚煎八分不拘時溫服

補中益氣湯 東垣

治病久體羸氣虛痲木脈微弱或弦大無力者

黃芪病甚熱甚者一錢　人參三分 嗽者去之　橘皮

歸身酒浸　升麻　柴胡各二錢　白朮三錢

甘草炙五分

右㕮咀水二盞煎至一盞量氣弱氣盛臨病斟酌水盞大小去滓食遠稍熱服如傷重者不過二服而愈若病久者以權立加減之法治之

桃仁承氣湯 仲景

治一塊痲木屬死血大便見血而便閉者

桃仁五十枚去皮尖研　大黃四兩　芒硝

甘草　桂枝各二兩

右水煎溫服

生脈散 醫錄

治夏月氣虛肌肉痲木者

人參五錢　五味子　麥門冬各三錢

右水煎服

薏苡仁散

治肉實極肌膚淫淫如鼠走津液開泄或時痲痹不仁

薏苡仁　石膏煅　川芎　肉桂　防風　防己

羚羊角鎊屑　赤芍藥　杏仁去皮尖麩炒黃

甘草炙各等分

右㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎服無時

金剛丸 保命集

治心肺胃損肌肉消削及腎損骨痿

萆薢　杜仲炒去絲　蓯蓉酒浸　菟絲子酒浸各等分

右爲細末酒煑猪腰子搗和丸如梧桐子大每服五七十丸空心用溫酒送下

桂枝麻黃各半湯 仲景

治肌肉頑痲厥如死屍

杏仁二十四箇去皮尖及雙仁者　大棗四枚擘

桂枝去皮二兩十六銖　芍藥　生薑　甘草炙

麻黃去節各一兩

右七味以水五升先煑麻黃一二沸去上沫內諸藥中煑取一升八合去滓溫服六合

易簡方

治徧身肌肉痲痹

黃芪一兩　人參　白芍各五錢　附子炮一枚

當歸三錢

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服三五十丸酒下

桂枝五物湯 仲景

一名黃芪枝桂五物湯治肌肉痲痹

黃芪　桂枝　白芍藥各三兩　生薑六兩

大棗十二枚

右水六升煑二升溫服七合日三服一方有人參

除風濕羌活湯 東垣

治風濕不退眩運痲木
黃連一分　羌活　防風各一兩　柴胡　獨活
甘草炙各五分　升麻七分　茯苓二錢　藁本
陳皮　黃蘗　川芎各三分　蒼朮米泔製
黃芪各一錢　澤瀉　猪苓去皮各二分
每服三錢或五錢水二盞煎至一盞去滓稍熱服
量虛實施用

苦參丸

治肉苛
苦參取粉二兩　丹參炙　沙參　人參　防風
五加皮　蒺藜炒去刺　烏蛇肉酒浸　蔓荊子
敗龜板酥炙黃　虎骨酥炙黃　黑參各一兩
右爲細末用不蛀皂角一斤剉碎以水三升挼取
汁去滓於無油鐵器內熬成膏用煉蜜四兩和丸
如梧桐子大每服十五丸至二十丸食後良久夜
臥共三服荊芥薄荷酒下

單方
乾地黃長肌肉令人肥健作丸或釀酒久服佳本草下同
薯蕷長肌肉補虛勞羸瘦能肥人生者磨如泥和酪
作粥服甚佳
何首烏治積年勞瘦能肥人末服丸服並佳
五加皮療虛羸能肥人釀酒服或煎服並佳
海松子羸瘦人可令肥健作粥常服甚佳
鮒魚羸瘦人能肥健作羹食蒸食皆佳
鼈肉勞瘦人能肥健取肉作羹常食又取甲炙爲末
酒服一錢
芋充肌膚令人肥白作羹常食甚佳
胡麻長肌肉肥健人蒸曝久服妙
大豆黃末補勞瘦肥健人煉猪膏和丸服之又鴈脂
和丸服亦可
蔓菁子令人肥健蒸曬作末酒飲任下二三錢其根
作羹常食佳
韭薤俱能肥健人作葅常食並佳
人乳汁治瘦瘁令人肥白悅澤可久服之
人胞即胎衣也主血氣羸瘦能肥人蒸熟和五味食
之或合滋補藥和丸久服尤佳
牛乳補羸瘦肥健人作粥常食佳
黃雌雞治羸瘦著牀能肥人煑爛作羹服甚良
羊肉治瘦病能肥健人或煑或燒常食佳
黑牛髓治瘦病能肥人和地黃汁白蜜等分作煎服
之佳
茶久服去人脂令人瘦太肥者可服
赤小豆能瘦人久服令人黑瘦枯燥肥盛者可服
人太肥欲得瘦輕健取冬瓜長食作羹作葅佳欲肥
則勿食
桑枝茶逐濕令人瘦過肥者宜久服之
昆布下氣久服瘦人作臛作菜常食佳
肌肉痲木疼痛萬靈膏用甘遂二兩蓖麻子仁四兩
樟腦一兩搗作餅貼之內飲甘草湯摘元方
身體痲木芥子末酢調塗之濟生秘覽

鍼灸
素問曰月始生則血氣始精衛氣始行月郭滿則血
氣實肌肉堅月郭空則肌肉減經絡虛衛氣去形獨
居是以因天時而調血氣也是以天寒無刺天溫無
凝月生無瀉月滿無補月郭空無治是謂得時而調
之因天之序盛虛之時移光定位正立而待之
病有在皮膚者刺皮無傷肉肉傷則內動脾脾動則
七十二日四季之月病腹脹煩不嗜食
刺皮無傷肉者病在皮中鍼入皮中無傷肉也
黃帝曰夫經脈之小大血之多少膚之厚薄肉之堅
脆及腘之大小可爲度量乎岐伯答曰其可爲度量
者取其中度也不甚脫肉而血氣不衰也若夫度之
人痟瘦而形肉脫者惡可以度量刺乎審切循捫按
視其寒暑盛衰而調之是謂因適而爲之鍼也
春取絡脈夏取分腠秋取氣口冬取經輸凡此四時
各以時爲齊絡脈治皮膚分腠治肌肉氣口治筋脈
經輸治骨髓
春刺絡脈血氣外溢令人少氣春刺肌肉血氣環逆
令人上氣春刺筋骨血氣內著令人腹脹
夏刺經脈血氣乃竭令人解㑊夏刺肌肉血氣內却
令人善恐夏刺筋骨血氣上逆令人善怒
冬刺經脈血氣皆脫令人目不明冬刺絡脈內氣外
泄留爲大痹冬刺肌肉陽氣竭絕令人善忘
靈樞經曰病在分肉間取以圓鍼於病所
所謂三刺則穀氣出者先淺刺絕皮以出陽邪再刺
則陰邪出者少益深絕皮致肌肉未入分肉間也已
入分肉之間則穀氣出

合谷刺者左右雞足鍼於分肉之間以取肌痹此脾之應也春氣在毛夏氣在皮膚秋氣在分肉冬氣在筋骨刺此病者各以其時爲齊故刺肥人者以秋冬之齊刺瘦人者以春夏之齊

邪在脾胃則病肌肉痛陽氣有餘陰氣不足則熱中善饑陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹痛陰陽俱有餘若俱不足則有寒有熱皆調於三里

肌寒熱者肌痛毛髮焦而脣槁腊不得汗取三陽於下以去其血者補足太陰以出其汗

風寒濕氣客於外分肉之間迫切而爲沫沫得寒則聚聚則排分肉而分裂也分裂則痛痛則神歸之神歸之則熱熱則痛解痛解則厥厥則他痹發發則如是

黃帝問於伯高曰何以知肉之病也伯高曰脣色青黃赤白黑者病在肌肉肉有柱肉之柱在臂脛諸陽分肉之間與足少陰分間黃帝曰取之奈何伯高曰百病變化浮沉深淺不可勝窮各在其處病間者淺之甚者深之間者少之甚者衆之隨變而調氣故曰人之所以應士者肉也故爲之治鍼必笵其身而圓其末令無得傷肉分傷則氣得竭

甲乙經曰缺上氣喘暴瘖不能言及舌下挾縫青脈頸有大氣喉痹咽中乾急不得息喉中鳴翕翕寒熱項腫冒痛胃滿腹皮熱瘧氣短哽心痛隱疹頭痛面皮赤熱身肉盡不仁天突主之

寒氣在分肉間痛上下痺不仁中瀆主之

醫學綱目曰凡夏感風寒濕者爲肉痹久而不已則內入於脾病四支懈惰發欬嘔汁取太白三里

醫案

儒門事親曰鄜城梁賈人年六十餘忽聽起梳髮覺左手指麻斯須半臂麻又一臂麻斯須頭一半麻比及梳畢從脊至足皆麻大便二三日不通往問他醫皆云風也或藥或鍼皆不解求治於戴人戴人曰左手三部脈皆伏比右手小三倍此枯澀痹也不可純歸之風亦有火燥相兼乃命一涌一泄一汗其麻立已後以辛涼之劑調之潤燥之劑濡之惟小指次指尚麻戴人曰病根已去此餘烈也方可鍼谿谷谿谷者骨空也一日晴和往鍼之用靈樞中雞足法向上臥鍼三進三引乾復卓鍼起向下臥鍼送入指間皆然手熱如火其麻全去昔劉河間作原病式常以麻與濕同歸燥門中眞知病機者也

衛生寶鑑曰張撫初病時右肩臂膊痛無主持不能舉動多汗出肌肉瘦不能正臥臥則痛甚經曰汗出偏沮使人偏枯予思內經云虛與實鄰決而通之又云留瘦不移節而刺之使經絡通和血氣乃復又言陷下者灸之爲陽氣下陷入陰中肩膊時痛不能運動以火導之火引而上補之溫之以上證皆宜灸刺謂此先刺十二經之井穴於四月十二日右肩臂上肩井穴內先針後灸二七壯及至疳發漸於枯瘦處漸添肌肉汗出少肩臂微有力至五月初八日再灸肩井次於尺澤穴各灸二十八壯引氣下行與正氣相接次日臂膊又添氣力自能搖動矣時值仲夏暑熱漸盛以清肺飲子補肺氣養脾胃定心氣

薛己醫案曰一產婦兩手麻木服愈風丹天麻丸徧身皆麻神思倦怠睡熟作渴自汗盜汗余謂氣血俱虛用十全大補湯數劑諸證悉退又數劑而全愈但內熱用加味逍遙散而痊

一婦人元氣素虛勞則體麻發熱痰氣上攻或用烏藥順氣散祛風化痰丸之類肢體痿軟痰涎自出面色痿黃形體倦怠而脾肺二脈盛甚此虛而類風也朝用補中益氣湯夕用十全大補湯漸愈又用加味歸脾湯調理尋愈

證治準繩曰李正臣夫人病診得六脈中俱弦洪緩相合按之無力弦在其上是風熱下陷入陰中陽道不行其證閉目則渾身麻木晝減而夜甚覺而目開則麻木漸退久則絕止常開其目此證不作懼其麻木不敢合眼故不得眠身體皆重時有痰嗽覺胃中常是有痰而不利時煩躁氣短促而喘肌膚充盛飲食大小便如常惟畏麻木不敢合眼爲最苦觀其色脈形病相應而不逆內經曰陽病開目而動輕陰病閉目而靜重又云諸脈皆屬於目靈樞曰開目則陽道行陽氣徧布周身閉目則陽道閉而不行如晝夜之分知其陽衰而陰旺也且麻木爲風難三尺之童皆以爲然細校之則非如久坐而起亦有麻木假如爲繩緊縛之人釋之覺麻木作而不敢動久則自已以此驗之非風邪乃氣不行也不須治風當補其肺中之氣則麻木自去矣知其經脈陰火乘其陽分火動於中爲麻木也當兼去陰火則愈矣時痰嗽者秋涼在外濕在上作也當實其皮毛以溫劑身重脈緩者濕氣伏匿而作也時見躁作當升陽助氣益血徵瀉陰火去濕逼行經脈調其陰陽則已非五臟六腑之本有邪也補氣升陽和中湯主之

李夫人立冬嚴霜時得病四肢無力乃痿厥溫熱在下焦也酢心者是濁氣不降欲滿也合眼麻木者陽道不行也開眼不麻木者目開助陽道故降寒之氣少退也頭旋眩運者風氣下陷於血分不伸越而作也溫經除濕湯主之

大理少卿韓珠泉偏身麻痹不能舉動求治於予予以神效黃芪湯方加減授之用芪一兩二錢參芍各六錢他稱是一服減半彼欲速效遂併兩劑爲一服之旬日而病如失矣予以元氣初復宜靜以養之完固而後可出渠不能從盛夏遽出見朝謁客勞煩旋日偶從朝房出上馬忽欲墜仆從者扶至邸寓邀予視之予辭不治數日而歿

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百三十四卷目錄

醫部彙考二百十四

筋門一

黃帝素問 上古天眞論 生氣通天論 陰陽應象大論 六節臟象論 五臟生成篇 脈要精微論 平人氣象論 玉機眞臟論 經脈別論 宣明五氣篇 血氣形志篇 氣厥論 痹論 痿論 奇病論 大奇論 皮部論 氣穴論 四時刺逆從論 氣交變大論 五常政大論 至眞要大論 疏五過論

靈樞經 邪氣臟腑病形篇 本神篇 經脈篇 經筋篇 本臟篇 陰陽二十五人篇 邪客篇 九鍼論

扁鵲難經 損病筋緩 轉筋 筋會

張機金匱要略 筋緩 轉筋

華佗中藏經 筋病善惡

王叔和脈訣 筋病脈

孫思邈千金方 筋極

劉完素六書 轉筋 攣急 強痿 吐法

成無己明理論 瘛瘲 筋傷

李杲十書 病屬外感 辨內外傷 痿縱

朱震亨心法 筋病應經 轉筋

虞摶醫學正傳 筋燥 筋痛

戴思恭證治要訣 筋緩急 轉筋

樓英醫學綱目 瘛瘲

龔信古今醫鑑 青筋

趙獻可醫貫 筋縮

陳士鐸石室祕錄 筋病治法

藝術典第二百三十四卷

醫部彙考二百十四

筋門一

黃帝素問

上古天眞論

女子四七筋骨堅髮長極身體盛壯

註 女子四七精血盛極之時是以筋骨堅髮長極也血氣盛則充膚熱肉是以身體盛壯

丈夫三八腎氣平均筋骨勁強故眞牙生而長極

註 丈夫三八眞牙生而筋骨所長以至於極矣

七八肝氣衰筋不能動天癸竭精少腎臟衰形體皆極

註 肝乃腎之所生腎氣衰故漸及於肝矣肝生筋肝氣衰故筋不能運動腎主骨筋骨皆衰故形體疲極也

生氣通天論

因於濕首如裹濕熱不攘大筋緛短小筋弛長緛短爲拘弛長爲痿

註 陰濕之邪上干陽分而冒明故首如裹也濕傷陽氣則因陽而化熱矣陽氣者柔則養筋陽氣傷而不能榮養於筋故大筋緛短小筋弛長蓋大筋連於骨節之內故鬱熱而緛短小筋絡於骨肉之外故因濕而弛長短則縮急而爲拘攣長則放縱而爲痿棄

陽氣者大怒則形氣絕而血菀於上使人薄厥有傷於筋縱其若不容

註 大怒則陽氣上逆而形中之氣絕其旋轉之機矣血隨氣行則菀而上氣血並逆而使人迫厥也血脈所以濡筋骨利關節者陽氣傷而血逆於上則有傷於筋骨矣筋傷而弛縱則四體有若不容我所用也

味過於辛筋脈沮弛精神乃央是故謹和五味骨正筋柔氣血以流腠理以密如是則骨氣以精謹道如法長有天命

註 金氣偏盛則肝氣受傷故筋脈弛懈腎主藏精而主骨肝主藏血而主筋大風客淫氣則邪傷肝而精乃亡謹和五味則骨正筋柔而腠理以密

陰陽應象大論

故善治者治皮毛其次治肌膚其次治筋脈其次治六腑其次治五臟治五臟者半死半生也

註 邪入於內而又不從腑解則干及於臟矣邪在五臟經氣之間尚可救治而生如干臟則死矣故曰半死半生也

六節臟象論

肝者罷極之本魂之居也其華在爪其充在筋以生血氣其味酸其色蒼此爲陽中之少陽通於春氣

註 爪者筋之餘故其華在爪其充在筋

五臟生成篇

肝之合筋也其榮爪也其主肺也多食辛則筋急而爪枯

註 辛乃金味太過傷肝則筋縮急而爪枯矣

諸筋者皆屬於節

註 筋生於骨連絡於骨節之間

脈要精微論

帝曰癰腫筋攣骨痛此皆安生岐伯曰此寒氣之腫八風之變也

註此言四時風寒之邪變爲癰腫攣痛之熱病

平人氣象論

臟眞散於肝肝藏筋膜之氣也

註臟眞者眞臟所藏之神也神在臟爲肝在體爲筋言眞臟之神散於肝而主藏筋膜之氣

玉機眞臟論

風者百病之長也腎傳之心病筋脈相引而急病名曰癉當此之時可灸可藥弗治滿十日法當死

註心主血脈而屬火火熱盛則筋脈燥縮而手足拘急也當此危急之證尚可灸可藥言不可以其危篤而棄之也失而弗治滿十日法當死

經脈別論

食氣入胃散精於肝淫氣於筋

宣明五氣篇

酸走筋筋病無多食酸

註肝合筋酸走肝筋病而多食之則反傷其肝氣

肝主筋久行傷筋

註筋生於骨故行走罷極則傷筋

血氣形志篇

形苦志樂病生於筋治之以熨引

註勞苦其形則傷筋志逸而樂則血脈未病故治之以熨烙導引使血脈榮養於筋則就安矣

氣厥論

脾移寒於肝癰腫筋攣

註肝主血寒則血凝注經曰榮氣不行乃發爲癰

肝主筋故筋攣也

痹論

風寒濕三氣合而爲痹也以春遇此者爲筋痹筋痹不已復感於邪內舍於肝

帝曰痹其時有死者或疼久者或易已者其故何也岐伯曰其入臟者死其留連筋骨間者疼久其留皮膚間者易已

註風寒濕中其俞其臟氣實則邪不動臟若神氣消亡則痹聚在臟而死其留連筋骨間而不內舍其合者疼久其留皮膚間者隨氣而易散

帝曰夫痹之爲病不痛何也岐伯曰痹在於骨則重在於脈則血凝而不流在於筋則屈不伸在於肉則不仁在於皮則寒故具此五者則不痛也

註如病形而不傷其氣則止見骨痹之身重脈痹之血凝不行筋痹之屈而不伸肉痹之肌肉不仁皮痹之皮毛寒冷故具此五者之形證而不痛也

痿論

肝氣熱則膽泄口苦筋膜乾筋膜乾則筋急而攣發爲筋痿

註膻者中精之腑其應在筋是周身之筋膜由膽臟之精汁以榮養膽附於肝肝氣熱則膽汁泄而口苦矣膽汁泄則筋膜無以榮養而乾燥矣筋膜乾則攣急而發爲筋痿也

思想無窮所願不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱發爲筋痿及爲白淫故筋痿者生於肝使內也

註思想無窮所願不得則肝氣傷矣前陰者宗筋之所聚意淫於外則欲火內動入房太甚則宗筋縱弛是以發爲陰痿及爲白淫

奇病論

帝曰人有尺脈數甚筋急而見此爲何病岐伯曰此所謂疹筋是人腹必急白色黑色見則病甚

註衝脈者主滲灌谿谷與陽明合於宗筋是以筋病而腹必急也夫十二經之筋病惟手太陰甚則成息賁脅急吐血足少陰筋病甚者死不治是以白色黑色見者則病甚也

大奇論

心脈滿大癇瘛筋攣肝脈小急癇瘛筋攣

註心爲火臟火熱太過是以脈大而癇瘛筋攣肝主筋而主血小則爲虛急則爲寒此肝臟虛寒而不能榮養於筋故爲攣癘之病

皮部論

邪之入客於經也則感虛乃陷下其留於筋骨之間寒多則筋攣骨痛熱多則筋弛骨消肉鑠腘破毛直而敗

註邪留於筋骨之間則爲筋攣骨痛鑠肉破腘毛直天焦之敗證

氣穴論

積寒留舍榮衛不居卷肉縮筋肋肘不得伸內爲骨痹外爲不仁命曰不足大寒流於谿谷也

註積寒留舍致榮衛不能居其間寒邪凝滯又不得正氣以和之以致肉卷而筋縮也肋肘乃筋骨之樞關故不得伸舒邪閉於外故內爲骨痹榮衛內逆故外爲不仁命曰不足蓋熱邪淫溢是屬有餘寒性凝滯故爲不足此大寒之邪流於谿谷之

間以致筋骨皆爲病也

四時刺逆從論

少陽有餘病筋痹脅滿不足病肝痹滑則病肝風痛濇則病積時筋急目病

註脈氣散於皮毛復從太陰所主之肉少陽所主之筋太陽所主之骨而內通於五藏是以有餘而在外則爲肉痹筋痹骨痹不足而陷於內則爲脾痹肝痹腎痹矣至氣有餘於內而爲熱則爲疝血有餘於內而爲寒則爲積矣

氣交變大論

歲水復則筋骨併辟肉瞤瘛目視眩眩物疏豐肌肉胗發氣井嗌中痛於心腹黃氣迺損

註陽明主潤宗筋諸筋皆屬於骨陽明之中土氣傷是以筋骨併辟也瞤瘛動掣也眩眩者眼目不明因風勝而傷血也物裂曰豐物因風而破裂也

五常政大論

明陽司天脅痛目赤掉振鼓慄筋痿不能久立

註脅痛目赤振掉筋痿皆肝木之病

太陽司天水飲內稸中滿不食皮痛肉苛筋脈不利甚則腑腫身後癰

註水飲中滿皮痛肉苛皆水濕之爲病也身後癰者癰發於背也

至眞要大論

陽明司天燥淫所勝筋骨內變

註陽明司天卯酉歲也燥金淫勝則肝血傷而不能榮養筋骨故筋骨內變

太陽之勝筋肉拘苛血脈凝泣絡滿色變

註足太陽主筋故筋肉拘苛也血脈凝泣絡滿色變或爲血泄邪入於經也

陽明之復清氣大舉甚則入肝驚駭筋攣太衝絕死不治

註陽明之復發於本位主令之時是以清氣大舉清氣入肝則干藏干藏者半生半死蓋邪雖薄藏而藏眞不傷者生如太衝脈絕眞元傷矣

少陽司天客勝則丹胗外發及爲丹熛瘡瘍嘔逆喉痹頭痛驚腫耳聾血溢內爲癉瘛

註少陽司天初氣三氣乃君相二火二之氣乃太陰濕土丹胗即斑疹因火熱而發於外者也丹熛即赤遊發於外而欲遊於內者也嘔逆癉瘛濕土之氣合於內也瘡瘍驚腫諸證亦皆感濕熱而生蓋亦自上而下從外而內也

厥陰在泉客勝則大關節不利內爲痙強拘攣外爲不便主勝則筋骨緜併腰腹時痛

註大關節者手足之十二節也厥陰在泉始之客氣乃陽明燥金厥陰主筋筋燥是以關節不利次之客氣乃太陽寒水太陽爲諸陽主氣陽氣者柔則養筋寒氣淫於內則太陽受之故內爲痙強拘攣即痓證也

疏五過論

診有三常必問貴賤始富後貧雖不傷邪皮焦筋屈痿躄爲擧

註始富後貧則傷其志意志意者所以御精神收魂魄適寒溫和喜怒者也是故榮衛調志意和則筋骨健強腠理緻密故傷其志意則精神不能內守外爲筋骨攣躄之病

嘗富大傷斬筋絕脈身體復行令澤不息故傷敗結留薄歸陽膿積寒炅粗工治之亟刺陰陽身體解散四肢轉筋死日有期

註如嘗富而一旦喪其資斧則大傷其神魂故心主之脈肝主之筋有若斬絕此傷左之血脈也然右關之脾藏未傷故身體尚復能行肺腎所主之精氣未傷而尚生長之不息也然病雖先起於陰久則將及於陽故傷敗心肝之血而結於左則留薄於氣分而復歸於陽左右血氣皆傷而膿積寒炅也此因傷陰而流薄歸陽是以膿積於陰陽寒熱之間夫陰陽血氣俱傷補陽則陰竭寫陰則陽脫如是者止可飲以甘藥而不宜灸刺粗工不知亟刺陰陽以致身體解散則脾氣傷矣四肢轉筋則胃氣絕矣

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

心脈急甚者爲癉瘛

心爲火臟故寒甚則爲癉瘛蓋手足諸節神氣之所遊行出入寒傷神氣故癉瘛也

肝脈微濇爲癉攣筋痹

註肝氣虛而有寒故爲癉攣筋痹肝主筋也

脾脈急甚爲癉瘛

註癉者急而收引瘛者縱而懈弛脾主四肢故急甚爲癉瘛

本神篇

肝悲哀動中則傷魂魂傷則狂忘不精不精則不正

當人陰縮而舉筋兩脅骨不舉毛悴色天死於秋

註悲哀肺之情也如肝因悲哀動中則傷肝臟所藏之魂魂傷則狂忘不精肝主筋而脈絡陰器陰縮筋舉脅骨不舉情志傷而及於形也

經脈篇

足厥陰氣絕則筋絕厥陰者肝脈也肝者筋之合也筋者聚於陰器而脈絡於舌本也故脈弗榮則筋急筋急則引舌與卵故脣青舌捲卵縮則筋先死庚篤辛死金勝木也

註足厥陰之氣主筋故氣絕則筋絕矣厥陰肝脈也肝者筋之合謂厥陰之氣合於肝脈肝臟之氣合於筋也聚於陰器者筋氣之會於宗筋也筋聚於陰器而絡於舌本故脈不榮於筋則筋急而舌捲卵縮矣厥陰氣絕則筋先死庚篤辛死金勝木而肝臟之木氣絕也

經筋篇

足太陽之筋起於足小指上結於踝邪上結於膝其下循足外側結於踵上循跟結於腘其別者結於踹外上腘中內廉與腘中并上結於臀上挾脊上項其支者別入結於舌本其直者結於枕骨上頭下顏結於鼻其支者爲目上綱下結於頯其支者從腋後外廉結於肩髃其支者入腋下上出缺盆上結於完骨其支者出缺盆邪上出於頯其病小指支跟腫痛腘攣脊反折項筋急肩不舉腋支缺盆中紐痛不可左右搖治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸名曰仲春痹也（網目作痺）

註劫刺者如劫奪之勢刺之即去無迎隨出入之法知者血氣和而知其伸舒也以痛爲俞者隨其痛處而即爲所取之俞穴也夫在外者皮膚爲陽筋骨爲陰病在陰者名曰痹痹者血氣留閉而爲痛也卯者二月主左足之太陽故爲仲春之痹蓋手足陰陽之筋應天之四時歲之十二月故其爲病亦應時而生非由外感也

足少陽之筋起於小指次指上結外踝上循脛外廉結於膝外廉其支者別起外輔骨上走髀前者結於伏兔之上後者結於尻其直者上乘胁季脅上走腋前廉繫於膺乳結於缺盆直者上出腋貫缺盆出太陽之前循耳後上額角交巔上下走頷上結於頯支者結於目背爲外維其病小指次指支轉筋引膝外轉筋腄不可屈伸腘筋急前引髀後引尻即上乘胁季脅痛上引缺盆膺乳頸維筋急從左之右右目不開上過右角並蹻脈而行左絡於右故傷左角右足不用命曰維筋相交治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸名曰孟春痹也

註維筋左右之交維也左絡於右故傷左角者病從左而右也右足不用者復從上而下也蓋維者爲一身之綱維從左之右右之左下而上上而下左右上下交維故命曰維筋相交此足少陽之筋交於陽維之筋而爲病也寅者正月之生陽也主左足之少陽故爲孟春之痹

足陽明之筋起於中三指結於跗上邪外上加於輔骨上結於膝外廉直上結於髀樞上循脅屬脊其直者上循骭結於（缺）其支者結於外輔骨合少陽其直者上循伏兔上結於髀聚於陰器上腹而布至缺盆而結上頸上挾口合於頯下結於鼻上合於太陽太陽爲目上綱陽明爲目下綱其支者從頰結於耳前其病足中指支胻轉筋脚跳堅伏兔轉筋髀前腫潰疝腹筋急引缺盆及頰卒口僻急者目不合熱則筋縱目不開頰筋有寒則急引頰移口有熱則筋弛縱緩不勝收故僻治之以馬膏膏其急者以白酒和桂以塗其緩者以桑鉤鉤之即以生桑炭置之坎中高下以坐等以膏熨急頰且飲美酒噉美炙食不飲酒者自強也爲之三拊而已治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸名曰季春痹也

註太陽寒水主氣而爲開故寒則筋急而目不合陽明燥熱主氣而爲闔故熱則筋縱而目不開頰筋有寒則急引頰移口而爲僻有熱則筋縱緩不收而爲僻蓋左筋急則口僻於左右筋緩則口僻於右也以馬之脂膏熬膏桑之鉤曲者而鉤架之高下如座之相等即以生桑炭置之坎中令坐於上如左頰筋急而口僻於左者以白酒和桂以塗其右頰之緩者以馬膏熨左之急頰左右之緩急更變即以其法易之且飲以美酒噉以炙食不飲酒者自強飲之爲之三拊而止此治口頰喎僻之法也其轉筋潰疝諸證治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸俞辰者三月主左足之陽明故爲季春之痹夫在足陽明飲以美酒噉以美食者諸筋皆由胃腑之津液以濡養故陽明主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也

足太陰之筋起於大指之端內側上結於內踝其直者絡於膝內輔骨上循陰股結於髀聚於陰器上腹

結於膀胱腹裏結於肋散於胃中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引髀而痛陰器紐痛下引臍兩脅痛引膺中脊內痛治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸命曰孟秋痹也（王作仲）

註 西者八月主左足之太陰故爲仲秋之痹

足少陰之筋起於小指之下並足太陰之筋邪走內踝之下結於踵與太陽之筋合而上結於內輔之下並太陰之筋而上循陰股結於陰器循脊內挾膂上至項結於枕骨與足太陽之筋合其病足下轉筋及所過而結者皆痛及轉筋病在此者主癇瘛及痙在外者不能俛在內者不能仰故陽病者腰反折不能俛陰病者不能仰治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸在內者熨引飲藥此筋折紐紐發數甚者死不治名曰仲秋痹也（仲當作孟）

註 在外在內者病陰陽之氣也少陰之上君火主之少陰爲陰陽水火之主宰故有外內陰陽之見證陽外而陰內也紐折者癇瘛強痙也如紐發類數而甚者死不治蓋少陰主藏津液所以濡筋骨而利關節陽氣者柔則養筋紐折數甚精陽之氣絕也申者七月之生陰也主左足之少陰故爲孟秋之痹

足厥陰之筋起於大指之上上結於內踝之前上循脛上結內輔之下上循陰股結於陰器絡諸筋其病足大指支內踝之前痛內輔痛陰股痛轉筋陰器不用傷於內則不起傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收治在行水清陰氣其病轉筋者治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸命曰季秋痹也

註 金氣之下水氣治之復行一步木氣治之厥陰之木氣本於水故治在行水以清厥陰之氣其病在有形之筋而爲轉筋者治在燔鍼劫刺矣

手太陽之筋起於小指之上結於腕上循臂內廉結於肘內銳骨之後彈之應小指之上入結於腋下其支者後走腋後廉上繞肩胛循頸出走太陽之前結於耳後完骨其支者入耳中直者出耳上下結於頷上屬目外眥其病小指支肘內銳骨後廉痛循臂陰入腋下腋下痛腋後廉痛繞肩胛引頸而痛應耳中鳴痛引頷目瞑良久乃得視頸筋急則爲筋瘻頸腫寒熱在頸者治在燔鍼劫刺之以知爲數以痛爲俞其爲腫者復而銳之本支者上曲牙循耳前屬目外眥上頷結於角其病當所過者支轉筋治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸名曰仲夏痹也

註 本支者本於直者而支行也本筋與支筋皆屬於目外眥筋之分行而復連絡也午者五月主手太陽故名曰仲夏痹也

手少陽之筋起於小指次指之端結於腕上循臂結於肘上繞臑外廉上肩走頸合手太陽其支者當曲頰入繫舌本其支者上曲牙循耳前屬目外眥上乘頷結於角其病當所過者卽支轉筋舌卷治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸名爲季夏痹也

註 未者六月乃少陽主氣故名曰季夏痹也

手陽明之筋起於大指次指之端結於腕上循臂上結於肘外上臑結於髃其支者繞肩胛挾脊直者從肩髃上頸其支者上頰結於頄直者上出手太陽之前上左角絡頭下右頷其病當所過者支痛及轉筋肩不舉頸不可左右視治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸名爲孟夏痹也

註 三月四月乃兩陽合明故名曰孟夏痹也

手太陰之筋起於大指之上循指上行結於魚後行寸口外側上循臂結肘中上臑內廉入腋下出缺盆結肩前髃上結缺盆下結胃裏散貫貫合貫下抵季脅其病當所過者支轉筋痛甚成息賁脅急吐血治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸名曰仲冬痹也

註 十二經筋合陰陽六氣氣逆則爲喘急息奔血鬲氣奔則爲吐血子者十一月太陰主氣故名曰仲冬痹也

手心主之筋起於中指與太陰之筋並行結於肘內廉上臂陰結腋下下散前後挾脅其支者入腋散胃中結於臂其病當所過者支轉筋前及胃痛息賁治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸名曰孟冬痹也

註 亥者十月主兩陰交盡故名曰孟冬痹也

手少陰之筋起於小指之內側結於銳骨上結肘內廉上入腋交太陰挾乳裏結於胃中循臂下繫於臍其病內急心承伏梁下爲肘網其病當所過者支轉筋筋痛治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸其成伏梁唾膿血者死不治經筋之病寒則反折筋急熱則筋弛縱不收陰痿不用陽急則反折陰急則俛不伸焠刺者刺寒急也熱則筋縱不收無用燔鍼名曰季冬痹也

註 少陰本陰而標陽故有寒熱陰陽之證少陰之從本從標也丑者十二月少陰主氣故爲季冬痹足之陽明手之太陽筋急則口目爲噼皆急不能卒

視治皆如右方也

註足陽明之筋上挾口爲目下綱手太陽之筋結於頷屬目外眥故二經之左筋急則口僻於左而當刺其左右筋急則口僻於右而當取之右如左目不能卒視其病在左右目不能卒視其病在右如兩目皆急則左右皆病故治法皆如右方而其病則有左右之分也

本臟篇

經脈者所以行血氣而榮陰陽濡筋骨利關節者也是故血和則經脈流行營覆陰陽筋骨勁強關節清利矣

陰陽二十五人篇

足太陰之下血氣皆少則善轉筋踵下痛

註轉筋踵下痛者血氣少而不能營養筋骨也

邪客篇

地有林木人有募筋

肺心有邪其氣留於兩肘肝有邪其氣留於兩腋脾有邪其氣留於兩髀腎有邪其氣留於兩膕凡此八虛者皆機關之室眞氣之所過血絡之所遊邪氣惡血固不得住留住留則傷經絡骨節機關不得屈伸故病攣也

註兩肘兩腋兩髀兩膕乃關節交會之處心臟之神氣從此而出如五臟有邪則氣留於此而不得布散矣眞氣之所過謂五臟之經脈各從此而經過邪氣住留則傷經絡謂邪在於皮膚留而不去則傷經絡矣此言機關之室在於骨節之交五臟之血氣從此而出於分肉皮膚不涉於血脈也故五臟有邪則氣留於此如外感於邪氣惡血留滯於此則骨節機關不得屈伸而病攣也

虛邪之入於身也深寒與熱相搏久留而內著寒勝其熱則骨疼肉枯熱勝其寒則爛肉腐肌爲膿內傷骨內傷骨爲骨蝕有所疾前筋筋屈不能伸邪氣居其間而不反發爲筋溜

註寒與熱搏者形中陰陽之氣也蓋形舍氣氣歸形形氣之相合也故形傷則病氣氣傷則病形結氣歸之者寒熱相搏之氣歸於邪留之形所也

九鍼論

形苦志樂病生於筋治之以熨引

扁鵲難經

損病筋緩

四損損於筋筋緩不能自持

轉筋

假令得肝脈其外證善潔面青善怒其內證臍左有動氣按之牢若痛其病四肢滿閉淋溲便難轉筋有是者肝也無是者非也

註得肝脈診得弦脈也肝與膽合爲清淨之府故善潔肝爲將軍之官故善怒面青肝之色也此外證之色脈情好也臍左肝之部也按之牢若痛者謂其動氣按之牢堅而不移或痛也

筋會

筋會陽陵泉

註足少陽之筋結於膝外廉陽陵泉在膝下一寸外廉陷中又膽與肝爲配肝者筋之合故爲筋會

漢張機金匱要略

筋緩

味酸則傷筋筋傷則緩名曰泄鹹則傷骨骨傷則痿名曰枯枯泄相搏名曰斷泄榮氣不通衛不獨行榮衛俱微三焦無所御四屬斷絕身體羸瘦獨足腫大黃汗出脛冷假令發熱便爲歷節也

轉筋

轉筋之爲病其人臂脚直脈上下行微弦轉筋入腹者雞屎白散主之

華佗中藏經

筋病善惡

心脈急甚則瘈瘲微急心中痛引腰背痛不下食

脾脈急甚則瘈瘲微急則膈中不利食不入而還出筋絕魂驚虛恐手足爪甲青呼罵不休者八九日死筋痹者由怒叫無時行步奔急淫邪傷肝肝失其氣因而寒熱所客久而不去流入筋會則使人筋急而不能舒緩也故名曰筋痹宜活血以補肝溫氣以養腎然後服餌湯丸治得其理合自瘳已不然則害人矣其脈左關中弦急而數浮沉而有力是也

晉王叔和脈訣

筋病脈

肝脈歌曰緊因筋急有些些

又曰甚浮筋弱身無力遇此還須四體癱

又曰二十九動濇匿匿本臟及筋終絕塞

又曰溢關過寸口相應目眩頭重與筋疼

脾脈歌曰有緊脾家痛仍兼筋急拘欲吐卽不吐冲冲未得疏

唐孫思邈千金方

筋極

凡筋極者主肝也肝應筋筋與肝合肝有病從筋生又曰以春遇病爲筋痹筋痹不已復感於邪內舍於肝則陽氣入於內陰氣出於外若陰氣外出出則虛虛則筋虛筋虛則善悲色青蒼白見於目下若傷寒則筋不能動十指爪皆痛數好轉筋其源以春甲乙日得之傷風風在筋爲肝虛風也若陽氣內發發則實實則筋實筋實則善怒嗌乾傷熱則欬欬則脅下痛不能轉側又脚下筋滿痛故曰肝實風也然則因其輕而揚之因其重而減之因其衰而彰之審其陰陽以別柔剛陽病治陰陰病治陽善治病者病在皮毛肌膚筋脈而治之其次治六腑若治五臟則半死半生矣

金劉完素六書

轉筋

經云轉反戾也熱氣燥鑠於筋則攣瘛而痛火主燔灼燥動故也或以爲寒客於筋者誤也蓋寒雖主於收引然止爲厥逆禁固屈伸不便安得爲轉筋也所謂轉者動也陽動陰靜熱證明矣夫轉筋者多因熱甚霍亂吐瀉所致以脾胃土衰則肝木自甚而熱燥於筋故轉筋也大法渴則爲熱凡霍亂轉筋而不渴者未之有也或不因吐瀉但外冒於寒而腠理閉密陽氣鬱怫內作熱燥於筋則轉筋也故諸轉筋以湯漬之而使腠理開泄陽氣散則愈也因湯漬而愈故俗反疑爲寒也

熱氣燥鑠於筋故筋轉而痛應風屬肝甚則吐不止暍熱之氣加之以泄濕勝也若三氣雜至乃爲霍亂

攣急

身寒大衣不能熱腎脂枯涸不行髓少筋弱凍慄故攣急附子湯主之

蠱腹痛腎傳心筋脈相引而急精液少筋脈不榮灌而引急建中加減湯主之

人有尺脈數甚筋急而見於腹外必急數亦爲虛筋見以名耳柏子仁散主之

諸熱瞀瘛皆屬於火熱氣勝則濁亂昏昧也瞀昏也經所謂病筋脈相引而急名曰瘛者故俗謂之搐是也熱勝風搏併於經絡故風主動而不寧風火相乘是以熱瞀而瘛生矣治法祛風滌熱之劑折其火勢瘛可立愈矣若妄加灼火或飲以發表之藥則死不旋踵

强痿

經云諸暴强直支痛緛戾裏急筋縮皆屬於風暴卒也强强勁有力而不柔和也直筋勁强也支痛支持也堅固支持筋攣不柔而痛也緛緛縮也戾乖也謂筋縮裏急乖戾失常而病也然燥金主於緊斂短縮勁切風木爲病反見燥金之化由亢則害承乃制也況風能勝濕而爲燥也亦十月風病勢甚而成筋緩者燥之甚也故諸風甚者皆兼於燥

諸痓强直筋勁强直而不柔和土主安靜故也陰痓曰柔痓陽痓曰剛痓亢則害承乃制故濕過極則反兼風化制之然兼化者虛象而實非風也

思想無窮所願不得意淫於外入房太甚筋縱發爲筋痿及爲白淫太過者白物爲淫隨溲而下故爲勞弱祕眞丸主之

吐法

或曰筋病吐之何爲答曰木鬱達之所謂達者令其條達也或又有打撲墜墮先吐之用金花散後下之用承氣湯蓋承者順也

婦人筋攣骨痛用神應散吐之

成無己明理論

瘛瘲

傷寒瘛瘲何以明之瘛者筋脈急也瘲者筋脈緩也急者則引而縮緩者則縱而伸或縮或伸動而不止者名曰瘛瘲俗謂之搐者是也黃帝內經曰病筋脈相引而急名曰瘛瘲瘛謂若契合之契也瘲謂若放縱之縱也行則緩臥則緊從則縱此其以急爲瘛以緩爲瘲理至明矣瘛瘲者風疾也而癲癇則瘛瘲焉傷寒瘛瘲者邪熱氣極也熱盛則風搏之併於經絡風主動故四肢瘛瘲而不寧也故風溫被火者曰發微黃色劇者如驚癇時瘛瘲言其熱氣之劇盛也傷寒病至於發瘛瘲者疾勢已過矣多難可治內經曰太陽終者戴眼反折瘛瘲絕汗乃出大如貫珠著身不流是見其瘛瘲爲已過之疾也又有四肢漐習爲四肢動而不止似瘛瘲而無力不得伸縮者也此爲肝絕瘛瘲之證雖難已若能以祛風滌熱之劑折其大熱則瘛瘲亦有生者若妄加灼火或飲以發表之藥則死不旋踵

筋惕

傷寒筋惕何以明之傷寒頭痛身疼惡寒發熱者必然之證也其於筋惕肉瞤非常有之者必待發汗過多亡陽則有之矣內經曰陽氣者精則養神柔則養

筋發汗過多津液枯少陽氣太虛筋肉失所養故惕惕然而跳瞤瞤然而動也太陽病脈微弱汗出惡風者不可服大青龍湯服之則厥逆筋惕肉瞤此爲逆也動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤卽是觀之筋惕肉瞤由發汗多亡陽陽虛可見矣茲雖逆也止於發汗亡陽而表虛治以溫經益陽則可矣或因吐下發汗表裏俱虛而有此狀者又非若但發汗後所可同也經曰傷寒吐下後發汗虛煩脈甚微八九日心下痞鞕脅下痛氣上衝咽喉眩冒筋脈動惕者久而成痿此爲逆之甚者也

經曰動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤是發汗而動肝氣者也

元李杲十書

病屬外感

天之邪氣感則害人五藏是八風之邪乃風邪傷人筋骨風從上受之風傷筋寒傷骨蓋有形質之物受病也繫在下焦肝腎是也肝腎者地之氣難經解云肝腎之氣已絕於內以其肝主筋腎主骨故風邪感則筋骨疼痛筋骨乏絕則腎肝之本亦絕矣乃有餘之證也

辨內外傷

內傷等病是心肺之氣已絕於外必怠惰嗜臥四肢沉困不收此乃熱傷元氣脾主四肢既爲熱所乘無氣以動經云熱傷氣又云熱則骨消筋緩此之謂也若外傷風寒是腎肝之氣已絕於內腎主骨爲寒肝主筋爲風自古腎肝之病同一治以其遞相維持也故經言膽主筋膀胱主骨是也或中風或傷寒得病之日便著牀枕非扶不起筋骨爲之疼痛不能動搖乃形質之傷經云寒傷形又云寒則筋攣骨痛此之謂也

痿縱

肝氣熱生筋痿故宗筋弛縱諸痿皆屬於上者指病之本在肺也故必先起於肺然後熱傳入五臟散爲諸痿

朱震亨心法

筋病應經

脈善瘛瘲轉筋而陰縮兩足筋攣皆屬足厥陰肝經見證也

筋攣急屬手厥陰太陰

轉筋

轉筋不住男子以手挽其陰女子以手牽乳近兩邊此千金妙法也

轉筋皆屬乎血熱四物湯加酒芩紅花蒼朮南星煎服

或有寒腹滿而痛四肢拘急轉筋下利者以理中湯加生附子官桂

明虞摶醫學正傳

筋燥

經曰諸濇枯涸乾勁皴揭皆屬於燥原病式曰經云風熱火同陽也寒燥濕同陰也又燥濕少異也然燥金肺屬秋陰而異乎寒濕故反同其風熱也故火熱則金衰而風生緣風能勝濕熱能耗液而反寒陽實陰虛則風熱勝於水濕而爲燥也凡人風病多因熱盛而風燥者爲其衆化以熱爲其主也蓋肝主於筋而風氣自甚又燥熱加之則筋大燥也燥金主於收斂其脈緊澁故爲病勁強緊急而口噤也或病燥熱太甚而脾胃乾涸成消渴者或風熱燥甚怫鬱在表而裏氣平者或善伸數欠筋脈拘急或時惡寒筋惕而搐又或風熱燥併而鬱甚於裏故煩滿而或祕結也及風癇之發作者由熱甚而風燥爲其衆化涎溢胃膈燥鍊而痙瘓昏冒僵仆也凡此諸證皆由熱甚而生風燥病各有異者由風熱燥之微甚不等故也所謂中風筋緩者因其風熱勝濕而爲燥之甚也然筋緩不收而痿痹故諸腑鬱病瘓皆屬於肺金乃燥之化也如秋深燥甚則草木萎落而不收病之象也是以掌得血而能持足得血而能步夫燥之爲病者血液衰少不能榮養百骸故若是也

筋痛

中風動止筋痛是無血滋筋故痛曰筋枯不治

戴思恭證治要訣

筋緩急

肝主筋屬木風易入之各從其類肝受風則筋緩不榮或緩或急所以中風有喎斜癱瘓不遂舌强語澁等證也

轉筋

霍亂轉筋理中湯加凍膠剉炒一錢仍令其繫縛腿脛若筋入腹及通身轉筋者不可治轉筋者以造麴蓼汁暖熱浸之或用濃鹽湯浸之詳霍亂門

脚轉筋用龍膽散

脚氣類傷寒若卒起脚弱或小腹不仁或舉體轉筋或見食嘔逆或兩脛赤腫便當於脚氣門中求治法

也

樓英醫學綱目

瘛瘲

素問云心脈急甚者爲瘛瘲此心火虛寒也治宜補心牛黃散主之靈樞云心脈滿大癇瘛筋攣此心火實熱也治宜瀉心火凉驚丸主之肝脈小急亦癇瘛筋攣此肝虛也續斷丸主之若肝脈盛者先救脾宜加減建中湯素問云脾脈急甚者亦爲瘛瘲此脾虛肝乘而之瘛也故宜實土瀉肝木之劑

瘛瘲而汗多不止爲虛無汗能食爲實

運氣瘛瘲有二其一曰火經曰火鬱之發民病嘔逆瘛瘲又曰少陽所至爲暴注瞤瘛又曰少陽司天客勝則爲瘛瘲是也

其二曰水經曰陽明司天燥氣下臨木氣上從民病脅痛目赤掉振鼓慄又曰歲土太過雨濕流行民病足痿不收行善瘛又曰太陰之復頭項痛重而掉瘛尤甚是也按陽明司天乃肝木之病今曰水者誤也

龔信古今醫鑑

青筋

夫青筋之證原氣逆而血不行俾惡血上攻於心也多由一切怒氣相冲或憂鬱氣結不散或惱怒復傷生冷或房勞後受寒濕以致精神恍惚心忡氣喘噎塞上壅嘔噦惡心頭目昏眩胷膈痞滿心腹絞刺脅肋腰背頭腦疼痛口苦舌乾面青脣黑四肢沉困百節酸疼或憎寒壯熱徧身痲痹不仁手足厥冷顫掉默默不已不思飲食等證皆惡血攻心而致之也自古以來無人論此但有患此疾者無方可治惟以砭鍼於兩手曲池青筋上刺之出紫血不勝其數而疾有即愈者有不愈者而變爲大患者常慣病此者或有一月一次或兩三次者屢患屢刺莫之能愈愚惟慮人之生命以氣血爲主故丹溪曰氣血和一疾不生虧則百病生焉況此病先傷於氣而後復損其血不致於夭枉者蓋亦鮮矣雖然未有退血之法又不得不刺不刺則惡血攻心須臾不救予製一方屢獲效驗名白虎丸者西方肺金之謂也青筋者東方肝木之屬也以白虎而治青筋是金能尅木故耳何病之不愈哉此方之妙不惟代刺青筋之苦愈青筋之病而亦免後日之患其惠也不亦大乎此方兼治男子久患痢疾便血婦人崩漏帶下并一切打撲內損血不能散心腹痛欲死者服之其效不啻桴鼓之影響也按此青筋之病北人多患之南人有即痧證也趙獻可醫貫

筋縮

素問曰諸風掉眩支痛強直筋縮爲厥陰風木之氣自大寒至小滿風木君火二氣之位風主動善行數變木旺生火風火屬陽多爲堅化且陽明燥金主於緊斂縮勁風木爲病反見燥金之化由亢則害承乃制謂己極過則反似勝己之化故木極似金況風能勝濕而爲燥風病勢甚而成筋縮燥之甚也如此等證候正所謂風淫所勝治以清凉者也不宜用桂附或問曰當此之時小續命湯可用乎曰未必然小續命湯此仲景金匱要略治冬月直中風寒之的方即麻黃桂枝湯之變方也其間隨六經之形證逐一加減未便可按方統用其全方也如太陽無汗於本方倍麻黃杏仁防風如有汗惡風於本方中倍桂枝芍藥杏仁如陽明無汗身熱不惡風於本方中加石膏知母甘草有汗身熱不惡風於本方中加葛根桂枝黃芩如太陽無汗身凉於本方中加附子乾薑甘草少陰經中有汗無熱於本方中加桂枝附子甘草凡中風無此四證六經混淆係手少陽厥陰或肢節攣痛或痲木不仁每續命八兩加羌活四兩連翹六兩此係六經有餘之表證須從汗解如有便溺阻隔宜三化湯或局方麻仁丸通利之雖然邪之所湊其氣必虛世間內傷多而外感少此方終不可輕用也

石室祕錄臣陳士鐸著

筋病治法

一身之筋不可有病病則筋縮而身痛矣欲筋之舒在於血和故治筋必須治血人若筋急拳縮傴僂而不能立俯仰而不能直者皆筋病也方用當歸一兩白芍薏仁生地元參各五錢柴胡一錢水煎服此方之奇在用柴胡一味入於補血藥之中蓋血虧則筋病用補血藥以治筋宜矣何以又用柴胡以舒散之不知筋乃肝之餘肝氣不順筋乃縮急甚而傴僂今用柴胡舒其肝脈之鬱鬱氣既除而又濟之以大劑補血之品則筋得其養而寬筋寬則諸證悉愈矣筋病之方當歸三錢芍藥一兩熟地二兩白朮五錢肉桂柴胡白芥子各一錢水煎服此方乃腎肝同治之法筋雖屬肝而滋肝必責之腎今大補其腎又加之舒肝之藥而筋有不快然以養者耶

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百三十五卷目錄

醫部彙考二百十五

筋門二

方

雞屎白散　橘皮通氣湯　丹參散　地黃煎　五加皮酒　人參酒　眞武湯　甘草乾薑湯　芍藥甘草湯　調胃承氣湯　四逆湯　附木散　香薷散　祕眞丸　附子湯　加減建中湯　柏子仁散　金花散　風引湯　活血通經湯　四物湯　理中湯　薑香散　大補丸　鄧熱筋痛方　黃芪丸　當歸龍膽丸　茗葱丸　左經丸　半夏湯　五苓散　理中丸　青娥丸　黃芪酒　續斷丸　牛黃散　涼驚丸　白虎丸　太公丸　牛膝丸　四君子湯　加味逍遙散　麥門冬散　補中益氣湯　十全大補湯　薏苡仁散　五積散　烏頭湯　木瓜散　柴胡飲子　瀉青丸　五加皮湯　人參益氣湯　防風散　養血地黃丸　羊角散　羚羊角湯　煨腎散　防風散　羚羊角散

單方

鍼灸

醫案

藝術典第二百三十五卷

醫部彙考二百十五

筋門二

方

雞屎白散 仲景

治轉筋入腹

雞屎白

右一味爲散取方寸匕以水六合和溫服

橘皮通氣湯 千金方下同

治筋實極則欬欬則兩脅縮痛痛甚則不可轉動

橘皮四兩　白朮　石膏各五兩　細莘　當歸

桂心　茯苓各三兩　香豉一升

右八味㕮咀以水九升煑取三升去滓分三服

丹參散

治筋實極則兩脚下滿而痛不得遠行脚心如割筋如斷折痛不可忍者

丹參　芎藭　杜仲　續斷　地骨皮各二兩

乾地黃　當歸　通草　升麻　麥門冬　麻黃

禹餘糧各一兩十八銖　牛膝二兩六銖　甘草

桂心各一兩六銖　生薑炒　牡蠣各二兩半

右十七味治下篩爲粗散以絹袋子盛二方寸匕以井華水二升煑數動袋子煑取一升頓服日二

地黃煎

治筋實極手足爪甲或青或黃或黑烏黯四肢筋急煩滿

生地黃汁三升　生葛汁　生元參汁各一升

大黃　升麻各二兩　芎藭四兩　麻黃　梔子

犀角各三兩　石膏五兩

右十味㕮咀以水七升先煑七物取二升去滓次下地黃汁煎一兩沸次下葛汁煎取三升分三服日再

五加皮酒

治筋虛極筋痹好悲思顏色蒼白四肢噓吸手脚拘攣伸動縮急腹中轉痛

五加皮一升　乾薑　芎藭各五兩　薏苡半升

枳刺　天麻仁各二升　猪椒根白皮　丹參各八兩　桂心　當歸　甘草各三兩　天雄　秦椒

白蘚　通草各四兩

右十五味㕮咀以絹袋盛清酒四斗漬春夏四日秋冬六七日初服六七合稍稍加以知爲度

人參酒

治筋虛極則筋不能轉十指爪皆痛數轉筋或交接過度或病未平復交接傷氣內筋絕舌捲脣青引卵縮胻脈疼急腹中絞痛或便欲絕不能飲食

人參　防風　白茯苓　細莘　秦椒　黃芪炙

當歸　牛膝　桔梗各一兩半　乾地黃　丹參

薯蕷　鍾乳石　礬石　山茱萸　芎藭各二兩

白朮　麻黃各二兩五錢　大棗三十枚擘

五加皮一升　生薑切炒乾　烏麻碎各二升

右二十二味㕮咀鍾乳別研以小袋子盛清酒二斗半浸五宿溫服三合日再不知隨意增進一本無烏麻用杜仲一兩半

眞武湯 仲景下同

治誤發太陽汗致筋惕肉瞤者

白茯苓　芍藥炒　生薑切　白朮炒各三兩

附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煑去滓溫服七合日三服

若欬者加五味半合細莘乾薑各一兩

若小便利者去茯苓

若下利者去芍藥加乾薑二兩

若嘔者去附子加生薑足前成半斤

甘草乾薑湯

治太陽病小便數心煩脚攣急厥逆咽中痛煩躁

吐逆者

甘草四兩　乾薑炮二兩

右㕮咀以水二升煑取一升五合去滓分溫再服

芍藥甘草湯

治前證足溫者

白芍藥　甘草炙各四兩

右二味㕮咀以水三升煑取一升半去滓分溫再服

調胃承氣湯

治前證兼胃氣不和讝語者

大黃四兩　甘草炙二兩　芒硝半斤

右三味㕮咀以水三升煑取一升去滓內芒硝更上火微煑令沸少少溫服

四逆湯

治前證重發汗加燒針者

乾薑一兩半　附子一枚生用去皮破八片

甘草炙二兩

右三味㕮咀以水三升煑取一升二合去滓分溫再服强人可用大附子一枚乾薑三兩凉服

附术散

治傷寒手足逆冷筋脈拘急汗出不止項强直搖頭口噤

附子炮　白术各一兩　獨活半兩　川芎三錢

桂心二錢

右搗羅爲末每服三錢水一鍾棗子二枚同煎至五分溫服

香薷散

治霍亂吐利不已百脈昏亂榮衛俱虛令搏於筋令轉筋宜服此方

厚朴　黃連各二兩人生薑四兩取汁同杵炒紫

香薷穗一兩半

右搗爲粗末每服三錢水一盞酒一盞半同煎至七分去滓用新汲水頻頻浸換令極冷頓服之藥冷則效速也仍煎服時不得犯鐵器慢火煎之兼治非時吐利霍亂腹中撮痛大渴煩躁四肢逆冷冷汗自出兩脚轉筋疼痛不可忍者須井中沉令極冷頓服之乃有神效一方有白扁豆尤良

祕眞丸 河間下硝

治筋痿及白淫隨溲而下

訶子皮大者五箇　縮砂仁去皮半兩　龍骨研

硃砂各一兩研細一分爲衣

右爲末麪糊爲丸如菉豆大每服一丸空心溫酒下冷水亦得不可多服大祕葱白湯茶下

附子湯

治筋弱攣急身寒大衣不能熱者

附子炮　獨活　防風去苗　川芎　丹參

萆薢　菖蒲　天麻　官桂　當歸各一兩

黃芪　細莘去苗　山茱萸　白术　甘菊花

牛膝酒浸　甘草炙　枳殼麩炒去穰各半兩

右爲末每服三錢水一大盞生薑五片煎至七分去滓溫服不計時候日進三服

加減建中湯

治筋脈不榮灌而引急

人參　甘草炙　官桂　白茯苓去皮　附子炮

當歸　厚朴生薑製各一兩　龍骨　麥門冬

黃芪　白芍藥　生地黃各四兩

右爲末每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚餳少許煎至一盞去滓溫服

柏子仁散

治筋急見於腹外

柏子仁　茯苓　防風　細莘　白术　官桂

枳殼　川芎各三兩　附子　當歸　檳榔各半兩

右爲末每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚同煎至八分去滓溫服不計時候

金花散

治打撲墜墮傷筋先以此吐之後以承氣湯下之

半夏湯洗一兩　檳榔二錢　雄黃一錢半

右爲細末薑汁浸蒸餅爲丸如桐子大小兒另丸生薑湯下從少至多漸次服之以吐爲度羈絆於脾故飲食不下

風引湯 仲景

治風熱瘛瘲及驚癇瘛瘲

紫石英　白石英　寒水石　石膏　乾薑

大黃　龍齒　牡蠣　甘草　滑石各等分

右㕮咀水一升煎至三分食後溫服無不效者

活血通經湯 東垣

治手筋攣急大便祕澀面赤而熱

芍藥五分　升麻　葛根　人參　當歸身

炙甘草各一錢　酒黃蘗　桂枝各二錢

右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞熱服不拘時令煖房中近火摩搓其手

四物湯 局方

治一切血熱血虛筋脈攣急

當歸酒洗　生地黃各三錢　白芍藥二錢

川芎一錢半

右剉如麻豆大水二鍾煎一鍾去滓熱服

理中湯 仲景

治有寒腹滿而痛四肢拘急轉筋下利者

人參　甘草　乾薑　白朮等分

右剉每服五錢水煎溫服

藿香散 局方

治中暑霍亂四肢冷冷汗出脚轉筋

大腹皮　茯苓　白芷　紫蘇各一兩　陳皮

桔梗　白朮　厚朴　半夏麴　甘草各二兩

藿香三兩

右爲末每服二錢薑三片棗一枚煎服

大補丸 丹溪下同

去腎經火燥下焦濕治筋骨軟氣虛以補氣藥下

血虛以補血藥下並不單用

川黃蘗炒褐色

右一味以水丸服

脚軟筋痛方

牛膝二兩　白芍藥一兩半　敗龜板酒炙

黃蘗酒炒各一兩　知母炒　甘草各半兩

右爲末酒糊爲丸

黃芪丸

治風虛勞羸瘦虛煩筋脈拘攣疼痛不臥

黃芪　人參　熟乾地黃　薏苡仁　白茯苓

山萸各一兩　酸棗仁　羌活　當歸　枸杞子

桂心　羚羊角屑各七錢半　防風　遠志各半兩

右爲末蜜丸桐子大每服三十丸溫酒送下

當歸龍膽丸 衛生寶鑑下同

治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸筋惕搐搦神志

不寧營衛壅滯頭目昏眩肌肉瞤動胷膈痞滿咽

嗌不利腸胃燥澀小便淋閉筋脈拘急肢體痿弱

暗風等病常服宣通血氣調順陰陽病無再作

當歸身　龍膽草　大梔子　黃連　黃蘗

黃芩各一兩　大黃　蘆薈　青黛各五錢

木香二錢半　麝香五分另研

右十一味爲末蜜丸菉豆大每服二十丸薑湯送

下食後

苓葱丸

治寒濕筋骨冷疼不能舉動

川烏去皮尖生　黑牽牛頭末　鹽豉各三錢

乳香研　沒藥研各一錢

右爲末入研藥勻用肥葱　握洗去土淡酢一升

不犯銅鐵文武火熬葱酢一半濾去滓慢火再熬

成膏滴水中不散爲度將前藥末和丸如桐子大

每服十丸加至二十丸溫酒送下大便微利則愈

左經丸

治筋骨諸疾手足不隨不能行步運動但不曾鍼

灸傷筋脈者四五丸必效服後小便淋澀其驗也

當歸一兩　木鼈子去殼另研　白膠香另研

五靈脂各三兩半　草烏生去皮臍三兩半

蟹蝥一百箇去頭足翅少酢煮熟

右爲末以另研二味和勻用黑豆去皮生杵粉一

斤酢煮爲糊共和丸如雞頭大每服一丸酒磨下

半夏湯

治霍亂轉筋吐利不止

茯苓　白朮　半夏麴各十兩　甘草二錢半

淡桂一錢半

右爲末渴者涼水不渴者溫水調下三錢無時

五苓散 [illegible]

治霍亂轉筋渴欲飲水者

猪苓　茯苓　白朮炒各十八銖　桂半兩

澤瀉一兩六銖半

右爲末每服三錢服後多飲熱水汗出愈

理中丸

治霍亂轉筋不欲飲水者

白朮東壁土炒　人參　乾薑炮　甘草炙各等分

右爲末蜜丸如桐子大

青娥丸 [illegible]

治腎虛腰痛常服壯筋骨

杜仲炒　破故紙炒各一斤　生薑十兩炒

右爲細末用胡桃肉一百二十箇湯浸去皮膜研

爲膏加煉蜜些少丸如梧桐子大每服五十丸鹽

湯薑湯任下

黃芪酒 醫學正傳

治風寒濕痹身體頑麻皮膚燥痒筋脈攣急語言

蹇澀手足不遂等證

黃芪　防風　桂枝　天麻　萆薢　石斛

虎脛骨酥炙　當歸　白芍藥　雲母粉　白朮

茵芋葉　木香　仙靈脾　甘草　續斷各一兩
右細切以生絹袋盛用無灰好酒一斗以磁罐浸之包封罐口勿令泄氣春五夏三秋七冬十日每服一盞溫飲之不拘時候

續斷丸 醫學綱目下門

治肝勞虛寒脅痛脹滿眼昏不食攣縮癆瘵
續斷酒浸　川芎　當歸酒浸　半夏湯炮薑製　橘紅　乾薑炮各一兩　桂心　甘草炙各半兩
右爲細末蜜丸如桐子大每服百丸白滾湯下

牛黃散

治心虛風筋脈攣搐神昏語澀
牛黃　龍腦　硃砂　麝香各一錢　蟬蛻　烏蛇肉酒浸各一兩　全蠍炒　白殭蠶炒　桑螵蛸　羚羊角　阿膠炒　天麻　甘菊花　防風　蔓荊子　桂心　細辛　側子炮去皮　獨活去蘆　犀角各半兩　麻黃七錢半
右爲細末和勻再研每服一錢豆淋酒下

涼驚丸

治心火亢盛筋脈攣搐
草龍膽　防風　青黛研各三兩　龍腦研一錢　黃連末五分　牛黃　麝香各一字
右爲細末麪糊爲丸如粟米大每服一二十丸金銀泡湯下之

白虎丸古今醫鑑

治青筋歌曰白虎丸丹古石灰谷神子製救人災
白中爲末水飛過手上成丸日曬來引宜燒酒一二盞每服須吞五十枚保全世患青筋證厥積陰功徧九垓
千年古石灰不拘多少刮去雜土爲末水飛過
右曬勿令太燥量可丸卽收丸如梧桐子大每服五十丸看輕重加減燒酒送下此藥能順氣散血化痰消滯治青筋初覺頭疼惡心或腹痛或腰痛或徧身作痛不思飲食卽進一服當時血散若過三五日青筋已老多服取效又治心腹痛及婦人崩漏帶下或因氣惱致病或久患赤白痢疾或打撲內損血不能散服之大效

太公丸宋吉周

治緊陰青筋心腹疼痛
乾薑　白蘞枯過各二兩
右爲末用糯米糊爲丸如菉豆大每服三十丸滾水下如不止再飲滾水三口

牛膝丸保命集

治肝腎損骨痿不能起於牀筋弱不能收持宜益精緩中
牛膝酒浸　萆薢　杜仲炒去絲　白蒺藜　防風　菟絲子酒浸　肉蓯蓉酒浸各等分
官桂減半
右爲細末酒煮猪腰子搗和丸如梧桐子大每服五七十丸空心用溫酒送下

四君子湯

治氣虛癆瘵
人參　白术土炒　茯苓各二錢　甘草一錢
右水煎服

加味逍遙散

治虛弱癆瘵或亡血多誤汗下而致者
柴胡　當歸酒拌　白芍酒炒　白术土炒　茯苓　丹皮　梔子各一錢　甘草炙五分
右加煨薑薄荷煎

麥門冬散

治風虛勞筋攣肢疼心神煩熱不得睡臥
麥門冬　茯神　柴胡　黃芪　白术各一兩　防風　赤芍藥　枳殼麩炒　芎藭　酸棗仁　羚羊角屑各七錢半　甘草炙半兩
右爲末每服五錢水一盞生薑五片煎至七分去滓溫服

補中益氣湯東垣

治氣虛癆瘵
黃芪病甚熱甚者一分　人參三分 咳嗽者去之　甘草炙五分　當歸身酒浸　橘皮　升麻　柴胡各二錢　白术三分
右咬咀水二盞煎至一盞量氣弱氣盛臨病斟酌水盞大小去滓食遠稍熱服如傷重者不過二服卽愈若病久者以權立加減之法治之

十全大補湯

治筋脈抽掣顛掉陽氣虛敗者
人參　白术　茯苓　熟地黃　川芎　當歸　芍藥　肉桂　黃芪各等分　甘草減半
右咬咀水一盞半生薑三片棗二枚煎八分不拘時溫服

薏苡仁散

治熱攣大筋縮短

薏苡仁　石膏煅　川芎　肉桂　防風　防己
羚羊角鎊　赤芍藥　杏仁去皮尖并雙仁麩炒
甘草炙各等分
右㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎服無時

五積散

治感寒筋攣骨痛
白芷　茯苓　半夏湯洗七次　當歸　川芎
甘草炙　肉桂　芍藥各三兩　麻黃去節根
枳實麩炒　陳皮去白各六兩　桔梗十二兩
厚朴薑製　乾薑爁各四兩　蒼朮泔浸二十四兩
右㕮咀每服四錢水一盞薑三片葱白三根煎七分熱服冒寒用煨薑

烏頭湯本事方

治寒冷濕痹留於筋脈攣縮不能轉側冬月服之
大烏頭　細辛　川椒　甘草　秦艽　附子
官桂　白芍藥各一兩七錢半　乾薑　白茯苓
防風炙　當歸各一兩　獨活一兩二錢半
右爲粗末每服三錢水一盞半棗二枚同煎至八分去滓空心食前服

木瓜散

治筋虛極脚手拘攣十指甲痛數轉筋甚則舌卷卵縮脣青面黑
木瓜　虎脛骨酥炙　五加皮洗　柏子仁
當歸身酒浸　桑寄生　酸棗仁製　人參
黃芪各一兩　炙甘草半兩
右每服四錢薑三片煎六分溫服

柴胡飲子

治肝熱轉筋
黃芩　甘草炙　大黃　芍藥　柴胡　人參
當歸各半兩
右每服四錢薑三片煎六分溫服

瀉青丸

治肝火轉筋
黃連
右爲末糊丸麻子大每服二三十丸白湯下

五加皮湯

治筋實極欬則兩脅下痛不可轉動並脚心痛不可忍手足爪甲青黑四肢筋急
羌活　羚羊角鎊　赤芍藥　防風　五加皮洗
秦艽　枳實去瓤麩炒　甘草炙各半兩
右每服四錢薑三片煎六分溫服

人參益氣湯

治虛而瘛搐
黃芪五錢　人參　黃蘗　陳皮　白芍藥
升麻　柴胡各三分　當歸　炙甘草　白朮
生甘草各二分
右㕮咀水二盞先浸一時煎至一盞熱服早飯後午後各一服

防風散

治肝氣筋脈拘攣四肢疼痛心膈痰壅不思飲食
防風　麻黃各一兩　赤茯苓　麥冬　薏苡仁
牛膝酒浸　羚羊角屑　犀角屑各一兩　白朮
半夏湯洗七次　芎藭　人參　當歸　大黃
炙甘草各半兩　杏仁麩炒去皮尖各七錢半
右爲㕮咀每服五錢水一中盞生薑五片同煎至六分去滓溫服不拘時候

養血地黃丸

治筋攣春夏服之
熟地黃　蔓荊子各二錢半　山茱萸五錢
黑狗脊炙　地膚子　白朮　乾漆炒　蠐螬炒
天雄　車前子各七錢半　萆薢　山藥　澤瀉
牛膝各一兩
右爲細末蜜丸如梧子大每服五十丸溫酒下

羚羊角湯

治筋攣痹肢節束痛秋宜服之
羚羊角　肉桂　附子　獨活各一兩三錢半
白芍藥　防風　芎藭各一兩
右爲粗末每服五大錢水一盞半生薑三片同煎至八分取清汁服日可二三服

煨腎散

治筋攣
甘遂末三錢
以獖猪腰子細批破少鹽椒醃透摻藥末荷葉包裹燒熟溫酒嚼服之

防風散

治風虛勞筋脈拘攣腰膝疼痛
防風　五加皮　萆薢酒浸　薏苡仁　海桐皮
枳殼麩炒　赤芍　桂心　黃芪　杜仲炒去絲
熟乾地黃　牛膝酒浸各一兩　續斷　鼠黏子
羚羊角屑各七錢半
右爲細末每服二錢溫酒調下日三四服忌生冷

油膩毒滑魚肉

羚羊角散

治肝風筋脈拘攣四肢疼痛

羚羊角屑一兩　甘草炙　梔子仁各半兩

升麻　防風　酸棗仁　桑白皮　羌活各七錢半

右㕮咀每服三錢水一中盞入生薑五片煎至六分去滓溫服不拘時忌熱麪猪肉大蒜

單方

轉筋入腹取屠兒几垢一雞子大溫酒調服得吐即愈 精珍

人身上結筋用木勺打之三下自散 藏器

脚上轉筋劉禹錫續傳信方用黃蠟半斤銷之塗舊絹帛上隨患大小闊狹乘熱纏脚須當脚心便著襪裹之冷即易仍貼兩手心 圖經

霍亂轉筋洗法用大蓼一握水煎熏洗立效 醫學正傳

肝虛轉筋用赤蓼豆葉切作三合水一盞酒三合煎至四合去滓溫分二服 聖惠方

脚轉筋疼痛攣急松節二兩細剉如米粒乳香一錢用銀石器內慢火炒令焦只留一分性出火毒研細每服一錢至二錢熱木瓜酒調下同是筋病皆治之

一方用松節一兩 孫用和祕寶方

轉筋取故綿以醯酢浸甑中蒸及熱用綿裹病人脚冷更易勿停瘥止 外臺方

治轉筋徧身入肚不可忍者作極鹹鹽湯於槽中暖浸之 丹溪心法

舒筋法治破傷後筋攣縮不能伸他病筋縮亦可用大竹管長尺餘兩頭鑽一竅繫以繩掛於腰間一坐則舉足搓滾之勿計工程久當有效有人墮馬折脛脚筋攣縮不能行步遇一道人教以此法數日便愈如常 得效方

風寒筋骨攣縮溫泉內浴之濕多者不可 本草下同

薏苡仁主熱風筋脈攣急又主筋急拘攣煮粥常服之

筋骨拳攣獨活煮湯服之

筋骨攣急淫羊藿煮湯飲之又可釀酒服之

何首烏長筋力或丸或散或浸酒久服佳

五加皮堅筋骨或煮服或釀酒久服

筋骨風攣痛酸棗仁作末和酒服或煮粥服

杜仲能使筋骨強或煮服或丸服並佳

木瓜入肝故益筋能強筋骨凡筋病皆治之煮服丸服皆佳

覆盆子益力又云倍力末服丸服皆佳

手足筋急荊芥煮湯飲嫩者作虀食亦可

筋急痛鹿髓以溫酒和服

風病筋攣羚羊角鎊取屑煮湯服

諸筋食之令人多筋力六畜及獐鹿之筋皆可食

筋骨痛攣王瓜子炒開口爲末酒服一錢日二服仍常服溫補藥 集簡方

脚肚轉筋蜈蚣燒猪脂和傅 肘後方下同

筋骨攣痛用羊脛骨酒浸服之

轉筋酢煮羊毛裹脚 注洗

風血積冷筋急拘攣疼痛者取茄子五十斤切洗以水五斗煮取濃汁濾去查更入小鐺中煎至一升以來即入生粟粉同煎令稀稠得所取出摟拌更入麝香硃砂末同丸如梧子大每旦用秫米酒送下三十丸近暮再服一月乃瘥男子女人通用皆驗 本草溫經

筋骨疼痛用烏龜一箇分作四脚每用一脚入天花粉枸杞子各一錢二分雄黃五分麝香五分槐花三錢水一椀煎服 暮要奇方

腰脚不隨攣急冷痛取虎脛骨五六寸刮去內膜塗酥炙黃搗細絹袋盛之以瓶盛酒一斗浸之煻火微溫七日後任情飲之當微利便效也

又方虎腰脊骨一具前兩脚全骨一具並於石上以斧搥碎安鐵牀上文炭火炙待脂出則投無灰濃酒中密封春夏七日秋冬三七日任情日飲三度患十年以上者不過三劑七年以下者一劑必瘥 海上方

筋骨急痛虎骨和通草煮汁空肚服半升覆臥少時汗出爲效切忌熱食損齒小兒不可與食恐其齒不生 食療

筋攣用酒煮木瓜爛研成粥裹筋急處冷即易 治法彙

天師栗久食已風攣 精珍

脚轉筋以赤蓼莖水酒煎服外以大蒜摩脚心桃柳楮桑槐五枝煎湯洗亦佳 治法彙下同

又捷法樟木煎湯先熏後洗

又方荊條葉燒烟熏湧泉穴出汗妙

羚羊肉和五味炒熟投酒中經宿飲之治筋骨急強甚佳 本草下同

筋骨疼痛鹿角燒存性爲末酒服一錢日二

轉筋入腹釜底墨末和酒服一錢 肘後方下同

風疾筋骨攣急用茵陳蒿炙黃一斤秫米一石麴三斤如常釀酒飲

一切風虛弱筋骨攣痛脚氣緩痹松節煑汁同麴米釀酒飲松葉煎汁亦可

肝臟氣虛風冷搏於筋遍體轉筋入腹不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱浸之聖惠方

筋骨痛攣馬雹兒子炒開口爲末酒服一錢日二次服集簡方

寬筋治損何首烏十斤生黑豆半升同煎熟皂莢一斤燒存性牽牛十兩炒取頭末薄荷十兩木香牛膝各五兩川烏頭炮二兩爲末酒糊丸梧子大每服三十丸茶湯下

風痹筋急腫痛屈轉易常白蘞二分熟附子一分爲末每酒服半刀圭日二服以身中熱行爲候十日便覺忌猪肉冷水千金方

筋骨攣急用秫米一石麴三斗地黃一斤茵陳蒿炙黃半斤依釀酒法服之良

脚肚轉筋大蒜擦足心令熱卽安仍以冷水食一瓣攝生方

足蹩筋急桂末白酒和塗之一日一上甲乙經

強筋補益四聖不老丹用明松脂一斤以無灰酒砂鍋內桑柴火煑數沸竹枝攪稠乃住火傾入水內結塊復以酒煑九遍其脂如玉不苦不澀乃止爲細末用十二兩入白茯苓末黃菊花末柏子仁去油取霜各半斤煉蜜丸如梧子大每空心好酒送下七十二丸須擇吉日修合勿令婦人雞犬見之

又方松梅丸用松脂以長流水桑柴煑拔三次再以桑灰滴汁煑七次扯拔更以好酒煑二次仍以長流水煑二次色白不苦爲度每一斤入九蒸地黃末十兩烏梅末六兩鍊蜜丸梧子大每服七十丸空心鹽米湯下健陽補中強筋潤肌大能益人方外奇方

鍼灸

素問曰春刺秋分筋攣逆氣環爲咳嗽病不愈令人時驚又且哭

病有在脈者刺脈無傷筋筋傷則內動肝肝動則春病熱而筋弛

刺筋無傷肉者至肉而去不及筋也刺肉無傷筋者過肉中筋也此之謂反也

病在筋筋攣節痛不可以行名曰筋痹刺筋上爲故刺分肉間不可中骨也病起筋炅病已止

靈樞曰關刺者直刺左右盡筋上以取筋痹愼勿出血此肝之應也或曰淵刺一曰豈刺

恢刺者直刺旁之舉之前後恢筋急以治筋痹也

手屈而不伸者其病在筋伸而不屈者其病在骨在骨守骨在筋守筋

轉筋於陽治其陽轉筋於陰治其陰皆卒刺之

暴攣癇眩足不任身取天柱

筋癲疾者身倦攣急大刺項大經之大杼脈嘔多沃沫氣下泄不治

熱病面青腦痛手足躁取之筋間以第四鍼於四逆筋躄目浸索筋於肝不得索之金金者肺也

熱病數驚瘛瘲而狂取之脈以第四鍼急瀉有餘者癲疾毛髮去索血於心不得索之水水者腎也

厥心痛與背相控善瘲如從後觸其心傴僂者腎心痛也先取京骨崑崙發鍼不已取然谷

黃帝曰人之彈者何氣使然岐伯曰胃不實則諸脈虛諸脈虛則筋脈懈惰筋脈懈惰則行陰用力氣不能復故爲彈因其所在補分肉間

黃帝問於伯高曰何以知筋之病也伯高曰目色青黃赤白黑者病在筋筋部無陰無陽無左無右候病所在黃帝曰取之奈何伯高曰百病變化浮沉深淺不可勝窮各在其處病間者淺之甚者深之間者少之甚者衆之隨變而調氣故曰上工

甲乙經云卒心中痛瘛瘲互相引肘內廉痛心熬熬然間使主之

熱病先手臂瘛瘲脣口縱鼻張目下汗出如轉珠兩乳下二寸堅脅滿悸列缺主之

振寒瘛瘲手不伸欬嗽唾濁氣膈善嘔尺澤主之

大風默默不知所痛嗜臥善驚瘛瘲天井主之

頭重鼻衄及瘛瘲至陰主之

身熱狂走讝語見鬼瘛瘲身柱主之

難經云筋會陽陵泉筋病治此

千金方云腹滿瘛瘲心痛氣滿不得息巨闕主之

嘔血時瘛善搖頭顏青汗出不過肩傷寒溫病曲澤主之

轉筋十指攣急不得屈伸灸脚外踝骨上七壯

失精筋攣陰縮入腹相引痛灸中封五十壯在內踝前筋裏宛宛中

又云灸下滿各五十壯老人加之小兒隨年壯法

又云此二穴喉腫厥逆五臟所苦鼓脹悉以主之

轉筋脛骨痛不可忍灸屈膝下廉橫筋上三壯

腹脹轉筋灸臍上一寸二七壯

勞冷氣逆腰髖冷痹脚屈難伸灸陽蹻一百壯在外踝下容爪

腰背不便轉筋急痹筋攣灸第二十一椎隨年壯

衛生寶鑑曰張仲文傳神仙灸法腰膝重痛不可轉側起坐難及冷痹脚筋攣急不可轉側屈伸灸曲膝兩文頭左右脚四處各三壯每灸一脚二火齊下艾炷到肉初覺疼痛用二人兩邊齊吹至火滅乍時著灸人定已來藏腑自動一兩行或轉動如雷聲其疾立愈此法神效卒不可量也

尺澤去肘疼筋緊尺澤肺經在肘約橫紋中

醫學綱目曰筋攣骨痛補魂門

脉曲筋急不能舒取曲泉

筋急不能行內踝筋急灸內踝四十壯外踝筋急灸外踝三十壯立愈

膝筋攣急不開兩膝內外曲交尖各灸二七壯即委陽穴

轉筋而痛瀉承山或灸二七壯

肝熱生筋痿補行間瀉太衝

筋攣陰縮痛灸中封五十壯

醫案

儒門事親曰黃如村一叟兩手搐搦狀如拽鋸冬月不能覆被適戴人之舞陽道經黃如不及用藥鍼其兩手大指後中注穴上戴人曰自肘已上皆無病惟兩手搐搦左氏所謂風淫末疾者此也或刺後谿手太陽穴也屈小指握紋盡處是穴也

李杲十書曰靈壽縣董監軍癸卯冬大雪時因事到眞定勿覺有風氣暴至診得六脈俱弦甚按之洪實有力其證手攣急大便祕澁面赤熱此風寒始至加於身也四肢者脾也以風寒之邪傷之則搐急而攣痹乃風淫末疾而寒在外也內經曰寒則筋攣正謂此也本人素飲酒內有實熱乘於腸胃之間故大便祕澁而面赤熱內則手足陽明受邪外則足太陰脾經受風寒之邪川桂枝甘草以祛其寒邪而緩其急搐又以黃蘗之苦寒以瀉實而潤燥急救腎水用升麻葛根以升陽氣行手足陽明之經不令遏絕更以桂枝辛熱入手陽明而潤燥復以芍藥甘草專補脾氣使不受風寒之邪而退木邪專益肺金也加人參以補元氣爲之輔佐加當歸身去裏急而和血潤燥名活血通經湯更令暖房中近火摩搓其手乃愈

薛己醫按曰一產婦筋攣臂軟肌肉抽掣皆屬氣血虛用十全大補湯而痊

一婦人素有痰火忽然昏憒瘛瘲抽搐善驚數欠四肢筋攣痰涎上升此肺金燥甚血液衰少而然也用清燥湯六味丸兼服尋愈

寓意草曰徐嶽生軀盛氣充昔年因食指微傷見血以冷水濯之遂至血凝不散腫潰出膿血數升小筋脫去三節指廢不伸邇來兩足間纔至秋月便覺畏冷重綿裹之外衲仍熱內搐獨覺其寒近日從踵至膝後筋痛不便遠行雲間老醫令服八味丸深中其意及僕診自云平素脈難摸索乃肝肺二部反見洪大大爲病進況在冬月木落金寒時尤爲不宜方來之勢將有不可禦邇者八味丸之桂附未可輕服何也筋者肝之合也附筋之血既經食指之挹取存留無幾不能榮養筋脈加以忿怒數動肝火傳熱於筋足跗之大筋得熱而短是以牽強不便於行也然肝之所主者惟肺木性畏金稟令擁戴若君主然故必肺氣先清週身氣乃下行今肺脈大則肺氣又爲心主所傷壅窒不清是以陽氣不能下達而足寒也然則所患雖微已犯三逆平素脈細而今脈大一逆也肝脈大而熱下傳二逆也肺脈大而氣上壅三逆也設誤以桂附治之熱者愈熱壅者愈壅即日便成痿痹矣此際用藥漏乎微乎有尋常不能測識者蓋筋脈短勁肝氣內鋼須亟講以金伐木榮之道以金伐木而木反榮筋反舒匪深通元造者其孰能知之然非金氣自壅則木且奉令不暇何敢內拒惟金失其剛轉而爲柔是以木失其柔轉而爲剛故治此患先以清金爲第一義也然清金又先以清胃爲第一義不清其胃則飲酒焉而熱氣輸於肺矣厚味焉而濁氣輸於肺矣藥力幾何能勝清金之任哉金不清如大敵在前主將懦弱已不能望其成功況舍清金而更加以助火鑠金倒行逆施以爲治耶必不得之數矣

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百三十六卷目錄

醫部彙考二百十六

骨髓門

黃帝素問　生氣通天論　六節藏象論　五藏生成篇　五藏別論　診要經終論　脈要精微論　平人氣象論　宣明五氣篇　通調論　痺論　標本病傳論　氣交變大論　六元政紀大論　四時刺逆從論　靈樞經邪氣藏府病形篇　壽夭剛柔篇　本神篇　經脈篇　村度篇　決氣篇　海論　五變篇　本藏篇　論病篇　陰陽二十五人篇　九宮八風篇　九鍼論

扁鵲難經　骨極　節痛　髓會

張機金匱要略　節痛

華佗中藏經　骨痛　病絕　經痛

王叔和脈訣　痛疼　蒸熱　絕枯

孫思邈千金方　骨極　骨虛實　髓虛實

李杲十書　脾內外傷　骨疼

朱震亨心法　骨病應經　節痛

戴思恭證治要訣　節痛

樓英醫學綱目　論骨大過　骨生

方　甘草附子湯　附子湯　烏頭湯　千金三黃湯　吐骨酒　又方　針髓秘方　大秘皮消金鼎丸　虎潛丸　牛膝丸　地仙丹　破毒散　乳香丸　虎潛丸　大黃活血湯　接骨散　加味虎潛丸　地黃丸　龍角丸　龍骨丸　乳香補髓丸　柴胡發證湯　理驗方

單方

鍼灸

醫案

生氣通天論

黃帝素問

聖人陳陰陽筋脈和同骨髓堅固氣血皆從如是則內外調和邪不能害耳目聰明氣立如故

註內外陰陽調和而邪弗能害精氣注於耳血氣注於目邪不外淫則耳目聰明氣立如故也

味過於鹹大骨氣勞短肌心氣抑

註大骨腎腑也過食鹹則傷腎故骨氣勞傷水邪盛則侮土故肌肉短縮水上凌心故心氣鬱也是故謹和五味則骨正筋柔氣血以流腠理以密如是則骨氣以精謹道如法長有天命

註謹和五味則骨正筋柔而腠理以密是陽氣生於陰精而爲陰之外衛故曰陰者藏精而起亟也陽者衛外而爲固也知陰陽外內之道無煩勞以傷其陽節五味以養其陰謹能調養如法則陰陽和平而長有天命矣

六節藏象論

腎者主蟄封藏之本精之處也其華在髮其充在骨爲陰中之少陰通於冬氣

註冬令之時陽氣封閉蟄蟲深藏腎主冬藏故爲蟄封藏之本蓋蟄乃生動之物以比生陽之氣至春一陽初生而蟄蟲復振矣腎爲水臟受五臟之精液而藏之故爲精之處也髮乃血之餘血乃精之化故其華在髮腎主骨故其充在骨也腎爲陰臟而有坎中之陽故爲陰中之少陰而通於冬氣

冬主水也

五藏生成篇

腎之合骨也其榮髮也其主脾也

註腎藏精而主髓故所合在骨髮乃精血之餘故其榮在髮

多食甘則骨痛而髮落此五味之所傷也

註多食甘是土味太過而傷腎則骨痛而髮落矣

諸髓者皆屬於腦

註腦爲精髓之海

五藏別論

腦髓骨脈膽女子胞此六者地氣之所生也皆藏於陰而象於地故藏而不瀉名曰奇恒之府

註地主閉藏而上升天主化施而下降言人之臟腑形骸應象天地陰陽之氣此六者與傳化之腑不同故名曰奇恒之府

診要經終論

少陽終者耳聾百節皆縱目銳眥絕系絕系一日半死其死也邑先青白乃死矣

註手足少陽經脈皆循於耳經氣絕故耳聾也少陽主骨諸節皆屬於骨少陽氣終故百節皆縱手足少陽之脈皆至目銳眥終則牽引於目故目如驚而邪視也絕系目系絕也少陽屬腎腎藏志系絕則志先絕故一日半死也青者甲木之氣外脫也白者三焦之業內亡也夫陽生於陰邑生於氣是以六經之氣終而先見於邑

脈要精微論

帝曰諸癰膿筋攣骨痛此皆安生岐伯曰此寒氣之腫八風之變也帝曰治之奈何岐伯曰此四時之病以其勝治之愈也

註以勝治之者以五行氣味之勝治之而愈也如寒淫於內治以甘熱如東方生風風生木木生酸辛勝酸之類

脈諸細而沉者皆在陰則爲骨痛其有靜者在足

註無論左右三部之細而沉者皆在於陰分其沉細而有靜者在足之三陰也

平人氣象論

藏眞下於腎藏骨髓之氣也

註水臟之元眞下藏於腎而主藏骨髓之氣

宣明五氣篇

苦走骨骨病無多食苦

註腎主骨炎上作苦苦走骨者火氣下交於腎也

骨病而多食之則火氣反勝矣

腎主骨久立傷骨

註腎藏精髓而注於骨故所主在骨久立則傷腰腎膝脛故傷骨

逆調論

帝曰人有身寒湯火不能熱厚衣不能溫然不凍慄是爲何病岐伯曰是人者素腎氣勝以水爲事太陽氣衰腎脂枯不長一水不能勝兩火腎者水也而生於骨腎不生則髓不能滿故寒甚至骨也所以不能凍慄者肝一陽也心二陽也腎孤藏也一水不能勝二火故不能凍慄病名曰骨痹是人當舉節也

註身寒而湯火不能熱厚衣不能溫者太陽氣衰而寒在表也不凍慄者二陽火熱之在裏也腎氣勝者腎水之氣勝也以水爲事者膀胱之水腑也水寒偏勝則太陽氣衰而孤陰不長矣水精水也腎臟之精枯不長而膀胱之一水不能勝二火矣夫腎生骨髓髓生肝腎脂不生則髓不能滿於骨是以寒至骨也肝者一陽初生之木火也心者地二所生之君火也腎爲牝藏孤藏也孤藏之陰藉太陽標本以合化太陽氣衰則孤陰不長矣膀胱之津液不能勝二火故其人不能凍慄者二陽之火熱在內也病名曰骨痹病在髓枯而骨痛故其人當骨節拘攣也

痹論

風寒濕三氣雜至合而爲痹也以冬遇此者爲骨痹骨痺不已復感於邪內舍於腎腎痹者善脹尸以代踵脊以代頭

註皮肉筋骨內合於五藏五藏之氣外合於四時始病在外之有形復傷在內之五氣外內形氣相合而邪舍於內矣腎者胃之關關門不利則胃氣不轉故善脹也腎主骨骨痿而不能行故尸以代踵陰病者不能仰故脊以代頭

痿論

腎氣熱則腰脊不舉骨枯而髓減發爲骨痿

註腎主藏精腎氣熱則津液燥竭矣腰者腎之腑是以腰脊不能仰舉腎生骨髓在體爲骨腎氣熱而精液竭則髓減骨枯而發爲骨痿也

有所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣內伐內伐則熱舍於腎腎者水藏也今水不勝火則骨枯而髓虛故足不任身發爲骨痿故下經曰骨痿者生於大熱也

註遠行勞倦則傷腎逢大熱則暑暍傷陰渴則陰液內竭是以陽熱之氣內伐其陰而熱舍身腎矣腎者水藏水盛則能制火今陽盛陰消水不勝火以致骨枯髓虛足不任用於身而發爲骨痿也

氣穴論

積寒留舍營衛不居卷肉縮筋肋肘不得伸內爲骨痹外爲不仁命曰不足大寒流於谿谷也

積寒留舍營衛不能居其間寒邪凝滯又不得止氣以和之以致肉卷而筋縮也肋肘乃筋骨之樞關故不得伸邪閉於外故內爲骨痹營衛內逆故外爲不仁命曰不足蓋熱邪淫溢是屬有餘寒性凝滯故爲不足此大寒之邪流於谿谷之間以致筋骨皆爲病也

邪溢氣壅脈熱肉敗營衛不行必將爲膿內銷骨髓外破大腘留於節湊必將爲敗

註此邪客於谿谷間而爲熱也大氣爲陽邪留於肌腠之氣分邪正相搏則爲病熱故有壅膿消破之敗證矣邪氣淫溢則正氣自壅谿谷之氣與脈相通是以脈熱於內而肉敗於外營衛不行則血氣留滯而爲壅膿也節湊筋骨相連之處邪留其間則筋骨必將爲敗矣

調經論

血氣未并五藏安定骨節有動

註骨節有動者亦爲徵風所傷也

四時刺逆從論

太陽有餘病骨痹身重
冬氣在骨髓中冬者蓋藏血氣在中內著骨髓通於五臟

氣交變大論

歲火太過炎暑流行身熱骨痛而爲浸淫
註身熱骨痛者火亢而水亦傷也浸淫火熱瘧也

六元正紀大論

陽明司天之政氣化運行後天四之氣病骨痿
註四之加臨客氣乃太陽寒水主氣乃太陰濕土

故寒凝於外火鬱於內而病骨痿也

火鬱之發民病癉瘧骨痛節乃有動

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

腎脈急甚爲骨癲疾
註腎爲陰藏而主骨陰寒太甚故爲骨癲疾也

壽夭剛柔篇

伯高曰形與氣相任則壽不相任則夭皮與肉相果則壽不相果則夭若形充而顏不起者骨小骨小而夭矣
註腎秉先天之陰陽而主骨顏乃腎之外候故顏不起者骨小骨小則夭此先天之氣薄也

本神篇

恐懼而不解則傷精精傷則骨痠痿厥精時自下
註恐傷腎故恐懼不解則傷腎藏之精腎主骨故精傷則骨痠痿厥精下者臟氣傷而不能藏也

經脈篇

足少陰氣絕則骨枯少陰者冬脈也伏行而濡骨髓者也故骨不濡則肉不能著也骨肉不相親則肉軟却肉軟却故齒長而垢髮無澤髮無澤者骨先死戊篤己死土勝水也
註足少陰之氣主骨故氣絕則骨枯冬脈者謂五臟之脈氣合四時而外濡於皮肉筋骨者也夫谿谷屬骨肉本於骨也故骨不濡則肉不能著於骨而骨肉不相親矣骨肉不相親則骨氣外脫而齒長矣夫腎主藏精而化血髮者血之餘也髮無澤者腎臟之精氣絕而骨先死矣

骨度篇

黃帝問於伯高曰脈度言經脈之長短何以立之伯高曰先度其骨節之大小廣狹長短而脈度定矣
註此言經脈之長短從骨節之大小廣狹長短而定其度數也

黃帝曰願聞衆人之度人長七尺五寸者其骨節之大小長短各幾何伯高曰頭之大骨圍二尺六寸
註此言頭之大骨度數衆人乃天下之人長七尺五寸者上古適中之人也適中之人則頭骨亦適中矣頭骨適中通體之骨皆適中矣

胃圍四尺五寸腰圍四尺二寸
註此胃骨腰骨圍轉一周之總數也

髮所覆者顱至項尺二寸髮以下至頤長一尺君子終折
註此言頭顱前後上下之骨度髮所覆謂從前額顱之髮際上至巔頂以至後項之髮際計髮所覆者度一尺二寸髮以下至頤者謂從前額顱之髮際以下至於兩頤計長一尺君子終折者謂從髮際之始以至髮際之終可折中而度量蓋君子之人面方廣而髮際高髮所覆者從顱至項度一尺一寸髮以下至頤長一尺一寸也

結喉以下至缺盆中長四寸缺盆以下至髑骬長九寸過則肺大不滿則肺小髑骬以下至天樞長八寸過則胃大不及則胃小天樞以下至橫骨長六寸半過則廻腸廣長不滿則狹短橫骨長六寸半橫骨上廉以下至內輔之上廉長一尺八寸內輔之上廉以下至下廉長三寸半內輔下廉下至內踝長一尺三寸內踝以下至地長三寸膝腨以下至跗屬長一尺六寸跗屬以下至地長三寸故骨圍大則太過小則不及
註此仰面之骨度也結喉下兩旁巨骨陷中爲缺盆蓋形如缺盆因以爲名髑骬骨名一名尾翳即鳩尾骨也自兩旁缺盆而下至髑骬計長九寸過則肺大不滿則肺小蓋髑骬之內心肺之所居也天樞在臍旁二寸乃足陽明之穴從兩旁髑骬而下至天樞計長八寸過則胃大不及則胃小蓋自鳩尾以至於臍胃腑之所居也橫骨在毛際橫紋中自天樞而下至於橫骨計長六寸半過則廻腸廣大不滿則狹短蓋自臍以至小腹大腸之部分也橫骨橫長亦六寸半內輔者內之輔骨也內輔之上廉長一尺八寸者在上之腿度也內輔之上廉以下至下廉長三寸半者膝之連骸一名膝蓋骨也內輔下廉下至內踝長一尺三寸者在下之腿度也曰內輔內踝者以足八字分立則內骨偏向於面也踝者下廉之腿骨與足骨相連之凹處

在內者爲內踝在外者爲外踝內踝以下至地長三寸者足跟骨也膝胭者膝前下之腿骨跗者足面上之跗骨卽足陽明之動脈處自膝前而下至於跗面計長一尺六寸也屬者屬足面而言也跗屬以下至地長三寸者從足面而下至足底之骨也骨圍大者骨之粗大也小者骨之細小也

角以下至柱骨長一尺行腋中不見者長四寸腋以下至季脅長一尺二寸季脅以下至髀樞長六寸髀樞以下至膝中長一尺九寸膝以下至外踝長一尺六寸外踝以下至京骨長三寸京骨以下至地長一寸

此側身之骨度背縱而數之也耳上之旁爲角肩胛上之頭骨爲柱骨自角以下至柱骨長一尺肋下臑內爲臂自柱骨至腋中計長四寸季脅骨之下爲季脅自腋以下至季脅計長一尺二寸捷骨之下爲髀樞一名髀厭在臀之兩旁卽足少陽之環跳穴處自季脅以下至髀樞計長六寸髀樞以下至膝蓋骨內之中分計長一尺九寸卽上之腿數也膝以下至外踝長一尺六寸卽下之腿數也京骨足太陽膀胱經穴名在足外側大骨下赤白肉際陷中外踝骨以下至京骨長三寸京骨以下至地長一寸此側身之骨度也

耳後當完骨者廣九寸耳前當耳門者廣一尺三寸兩額之間相去七寸

註此頭側之橫度也耳後高骨爲完骨入髮際四分廣者橫闊也耳後當完骨者從耳以至於腦後也耳前當耳門者從耳而至於鼻準也此頭側之橫度也兩額之間相去七寸者此當面之橫度也

兩乳之間廣九寸半

註此形身前面之橫度也

兩髀之間廣六寸半

註此形身背面之橫度也

足長一尺二寸廣四寸半

註此兩足之縱橫數也

肘至肘長一尺七寸肘至腕長一尺二寸半腕至中指本節長四寸本節至其末長四寸半

註此兩臂兩手之骨度也本節者指掌交接之骨節末者指尖也

項髮以下至背骨長二寸半脊骨以下至尾骶二十一節長三尺上節長一寸四分分之一奇分在下故上七節至於臍骨九寸八分分之七

註此脊背之骨度也項髮以下至背骨者自項後之髮際至背骨之大椎計長二寸五分臍骨脊骨也自背骨之大椎循臂骨以下至於尾骶計二十一節共長三尺上節每節長一寸四分一釐其奇分之九釐在下節計算故臂骨以上計有七節每節長一寸四分一釐則七得七寸四七二寸八分共九寸八分又每節一釐共計九寸八分七釐故曰九寸八分分之七也

此衆人骨之度也所以立經脈之長短也是故視其經脈之在於身也其見浮而堅其見明而大者多血細而沉者多氣也

註此總結骨之度數定經脈之長短也經脈之浮而堅明而大者多血細而沉者多氣此篇論骨氣而結經脈之血氣者血脈資始於腎骨之精氣盛則經脈之血氣亦盛矣

決氣篇

穀入氣滿淖澤注於骨骨屬屈伸洩澤補益腦髓皮膚潤澤是謂液液脫者骨屬屈伸不利色夭腦髓消脛痠耳數鳴

註液脫者骨屬屈伸不利不能潤澤皮膚故毛色夭焦也腎主骨而骨髓上通於腦故腦髓消而脛痠耳鳴也

海論

腦爲髓之海其輸上在於其蓋下在風府

註腦爲髓之海氣在頭者止之於腦故其輸上在於其蓋下在督脈之風府是髓海之上通於天而下通於經水也

五變篇

黃帝曰人之善病寒熱者何以候之少俞答曰小骨弱肉者善病寒熱黃帝曰何以候骨之小大肉之堅脆色之不一也少俞答曰顴骨者骨之本也顴大則骨大顴小則骨小皮膚薄而其肉無胭其臂懦懦然其地色殆然不與其天同色汗然獨異此其候也然後臂薄者其髓不滿故善病寒熱也

註腎主骨顴者腎之外候也故顴骨爲骨之本顴大則周身之骨皆大顴小則知其骨之小也臂薄者股胻之大肉不豐也地色者地閻之色殆不與天庭同色此土氣之卑汚也髓者骨之充骨小則其髓不滿矣夫在外者皮膚爲陽筋骨爲陰骨小皮薄則陰陽兩虛陽虛則生寒陰虛則發熱故其

人骨小皮薄者善病寒熱也

本臟篇

經脈者所以行血氣而榮陰陽濡筋骨利關節者也是故血和則經脈流行營覆陰陽筋骨勁強關節清利矣

論痛篇

人之骨強筋弱肉緩皮膚厚者耐痛其於鍼石之痛火熨亦然加以黑色而美骨者耐火熨堅肉薄皮者不耐鍼石之痛於火熨亦然

註人之皮肉筋骨皆藉少陰陽明之所資生而資養者也少陰秉先天之精氣陽明化水穀之精微是以筋骨之強弱肌肉之堅脆皮膚之厚薄腠理之疎密皆稟氣於少陰陽明者也黑色而美骨者少陰之血氣盛也肉緩皮膚厚者陽明之血氣盛也堅肉薄皮者乃陽明氣弱故不能耐鍼石火熨也

陰陽二十五人篇

足少陽感於寒濕則善痹骨痛爪枯也

註在外者皮膚為陽筋骨為陰病在陽者名曰風病在陰者名曰痹爪者筋之餘血氣皆少不能榮養筋骨以故寒濕之邪留痹而為骨痛爪枯也

九宮八風篇

風從北方來名曰大剛風其傷人也內舍於腎外在於骨與肩背之筋筋其氣主為寒也

註久立則傷腰骨脛縱故傷骨

九鍼篇

鍼走骨病在骨無食鍼

扁鵲難經

骨痿

一損損於皮毛皮聚而毛落二損損於血脈血脈虛少不能榮於五臟六腑三損損於肌肉肌肉消瘦飲食不能為肌膚四損損於筋筋緩不能自收持五損損於骨骨痿不能起於牀反此者至於收病也從上下者骨痿不能起於牀者死從下上者皮聚而毛落者死

腎之積名曰賁豚發於小腹上至心下若豚狀或上或下無時久不已令人喘逆骨痿少氣以夏丙丁日得之

節痛

假令得脾脈其外證面黃善噫善思善味其內證當齊有動氣按之牢若痛其病腹脹滿食不消體重節痛怠惰嗜臥四肢不收有是者脾也無是者非也

髓會絕骨

漢張機金匱要略

節疼

病人語聲寂然喜驚呼者骨節間病

太陽病關節疼痛而煩脈沉而細者此名濕痹濕痹之候小便不利大便反快但當利其小便

風濕相搏骨節疼煩掣痛不可屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨節疼煩時嘔白虎加桂枝湯主之

寸口脈沉而弱沉即主骨弱即主筋沉即為腎弱即為肝汗出入水中如水傷心歷節黃汗出故曰歷節少陰脈浮而弱弱則血不足浮則為風風血相搏即疼痛如掣

盛人脈濇小短氣血汗出歷節疼不可屈伸此皆飲酒汗出當風所致

諸肢節疼痛身體尪羸腳腫如脫頭眩短氣溫溫欲吐桂枝芍藥知母湯主之

味酸則傷筋筋傷則緩名曰泄鍼則傷骨骨傷則痿名曰枯枯泄相搏名曰斷泄榮氣不通衛不獨行榮衛俱微三焦無所御四屬斷絕身體羸瘦獨足腫大黃汗出脛冷假令發熱便為歷節也

病歷節不可屈伸疼痛烏頭湯主之

劑中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛脈沉者有留飲

太湯病脈浮而緊痛在骨節欬而喘不渴者此為脾脈虛狀如腫發汗即愈然病此者渴而下利小便數者不可發汗

風水其脈自浮外證骨節疼痛惡風

太陽病脈浮而緊法當骨節疼痛反不疼身體反重而痠其人不渴汗出即愈此為風水惡寒者此為極虛發汗得之渴而不惡寒者此為皮水身腫而冷狀如周痹胸中窒不能食反聚痛暮躁不得眠此為黃汗痛在骨節欬而喘不渴者此為脾脹其狀如腫發汗即愈然諸病此者渴而下利小便數者皆不可發汗

華佗中藏經

骨痛

陰邪入腎則骨痛腰痛上引脊背疼

痹絕

骨痹者乃嗜慾不節傷於腎也氣內消則不能關禁不能關禁則中上俱亂中上亂則三焦之氣否而不通三焦否則飲食不糟粕飲食不糟粕則精氣日衰精氣日衰則邪氣妄入邪氣妄入則上衝心舌上衝心舌則爲不語中犯脾胃則爲不充下流腰膝則爲不遂旁攻四肢則爲不仁寒在中則脈遲熱在中則脈數風在中則脈浮濕在中則脈濡虛在中則脈滑其證不一要在詳明

骨絕腰脊痛腎中重不可反側足脉後平者五日死

節痛

歷節疼痛者因醉犯房而得之

脾病色黃體重失便目直視臂反張爪甲青四逆吐食百節疼痛不能舉其脈當浮大而緩今反弦急其色反青此十死不可治也

脾病其色黃飲食不消腹脹滿身體重骨節痛大便硬小便不利其脈微緩而長者可治

胃實則中脘便難肢節疼痛不下食嘔吐不已

腎病手足冷面赤日黃小便不禁骨節煩痛小腹結痛氣上衝心脈緩

王叔和脈訣

痛痿

心脈歌曰盛關骨痛心煩躁更兼頭面赤驚驚

腎臟歌曰奔豚臍下積究竟骨將痿

蒸熱

肺脈歌曰沉細仍兼滑因知是骨蒸

濡脈歌曰四體骨蒸勞熱甚臟腑終傳命必殂

絕枯

生死歌曰脊疼腰重反覆難此是骨絕五日看

病人骨絕者齒黃落十日死

濡脈歌曰按之似有舉之無髓海丹田定已枯

唐孫思邈千金方

骨極

骨極者主腎也腎應骨骨與腎合又曰以冬遇病爲骨痹骨痹不已復感於邪內舍於腎耳鳴見黑色是其候也若腎病則骨極牙齒苦痛手足疼不能久立屈伸不利身瘁腦髓疼只冬壬癸日中邪傷風爲腎風風歷骨故曰骨極若氣陰陰則虛虛則寒寒則面腫垢黑腰脊痛不健久立屈伸不利其氣衰則髮墮齒槁腰背相引而痛痛甚則欬唾甚若氣陽陽則實實則熱熱則面色焰隱曲膀胱不通牙齒腦髓苦痛手足疼煩耳鳴色黑是骨極之至也須精別陰陽審其清濁知其分部視其喘息善治病者始於皮膚筋脈卽須治之若入臟腑則半死矣扁鵲云骨絕不治病而切痛伸縮不得十日死骨應足少陰少陰氣絕則骨枯髮無澤骨先死矣

骨虛實

骨虛者痠疼不安好倦骨實者苦煩熱凡骨虛實之應主於腎膀胱若其腑臟有病從骨生熱則應臟寒則應腑

髓虛實

髓虛者腦痛不安髓實者勇悍凡髓虛實之應主於肝膽若其腑臟有病從髓生熱則應臟寒則應腑

元李杲十書

辯內外傷

內傷等病是心肺之氣已絕於外必怠惰嗜臥四肢沉困不收此乃熱傷元氣脾主四肢既爲熱所乘無氣以動經云熱傷氣又云熱則骨消筋緩此之謂也若外傷風寒是腎肝之氣已絕於內腎主骨爲寒肝主筋爲風自古腎肝之病同一治以其遞相維持也故經言膽主筋膀胱主骨是也或中風或傷寒得病之日便著牀枕非扶不起筋骨爲之疼痛不能動搖乃形質之傷經云寒傷形又云寒則筋攣骨痛此之謂也

骨痿

腎氣熱生骨痿故足不任身諸痿皆屬於上者指病之本在肺也故必先起於肺然後熱傳入五臟散爲諸痿

朱震亨心法

骨病應經

骨中脅肋髀膝外至脛絕骨外踝前諸骨痛屬足少陽膽經見證也

脛善瘛節時腫屬足厥陰肝經見證也

節痛

熱伏於下腎虛受之腿膝枯細骨節痠疼精走髓空引水自救此渴水飲不多隨卽瀉下小便多而濁病屬下焦謂之消腎

如肢節疼痛須用羌活去風濕亦宜用之

如肥人肢節痛多是風濕與痰飲流注經絡而痛宜

南星半夏
如瘦人肢節痛是血虛宜四物湯加防風羌活
如瘦人性急躁而肢節發熱是血熱宜四物湯加黃芩酒炒黃蘗
如肢節腫痛脈滑者當是燥濕宜蒼朮南星兼行氣藥木香枳殼檳榔在下者加漢防己
若肢節腫痛脈澀數者此是瘀血宜桃仁紅花當歸川芎及大黃微利之
如倦怠無力而肢節痛此是氣虛兼有痰飲流注宜參朮星半
明戴思恭證治要訣

節痛

徧身骨節疼痛晝靜夜劇如虎之嚙名曰白虎歷節風治法詳風門中
中濕之證關節痛重浮腫喘滿腹脹煩悶昏不知人治法詳濕門中
樓英醫學綱目

論骨大意

經云腎主骨在體爲骨在臟爲腎又云腎之合骨也其榮髮也又云少陰者冬脈也伏行而濡骨髓者也

骨空

素問云髓空在腦後三分在顱際銳骨之下王註云是謂風府通腦中也
一在齗基下王註云當頤下骨陷中有穴容豆
一在項後中復骨下王注云瘖門穴也
一在脊骨上空在風府上王注云上謂腦戶穴也
脊骨下空在尻骨下空林億云長强在脊骶端正在尻骨下
數髓空在面挾鼻王註云顴髎等穴也
或骨空在口下當兩肩王註云大迎穴也
兩髆骨空在髆中之陽王註云近肩髃穴
臂骨空在臂陽去踝四寸兩骨空之間王註云在支溝上同身寸之一寸是謂通間
股骨上空在股陽出上膝四寸王註云在陰市上伏兔穴下在承楗也
胻骨穴在輔骨之上端王註云犢鼻也
股際骨空在毛中動下
尻骨空在髀骨之後相去四寸王註云八髎穴也
扁骨有滲理腠無髓孔易髓無空王註云扁骨謂尻間扁戾骨也其骨上有滲灌文理歸腠之無別水孔也

方

甘草附子湯 仲景下同

治骨節煩勢掣痛

甘草　白朮各二兩　附子二枚炮去皮
桂枝四兩去皮
右四味以水六升煑取三升去滓溫服一升日三服初服得微汗則解能食汗出復煩者服五合恐一升多者服六七合爲妙

附子湯

治少陰病身體疼手足寒骨節疼脈沉者
茯苓　芍藥各三兩　人參二兩　白朮四兩
附子二枚去皮臍
右五味以水八升煑取三升去滓溫服一升日三

烏頭湯

治歷節疼痛不可屈伸
麻黃　芍藥　黃芪各三兩　甘草炙一兩
川烏五枚㕮咀以蜜二升煎取一升
右五味㕮咀四味以水三升煑取一升去滓內蜜煎中更煎之服七合不知盡服之

千金三黃湯

治中風手足拘急百節疼痛煩熱心亂惡寒經日不欲飲食
麻黃五分　獨活四分　細莘　黃芪各二分
黃芩三分
右五味以水六升煑取二升分溫三服一服小汗二服大汗
心熱加大黃二分
腹滿加枳實一枚
氣逆加人參三分
悸加牡蠣三分
渴加苦蔞根三分
先有寒加附子一枚

虎骨酒 千金方下同

治骨虛痠疼不安好倦主膀胱寒
虎骨一具通炙取黃焦汁盡碎如雀頭大
右取骨釀米三石麴四斗水三石如常釀酒法酒

熟封頭五十日開飲之

又方

治骨蒸苦痠疼煩熱

葛根汁　生地黃汁　赤蜜各一斤　麥冬汁五合

右四味相和攪調微火上煎三四沸分三服

骨髓疼方

虎骨四兩　芍藥一斤　生乾地黃五斤

右三味㕮咀以清酒一斗漬三宿曝乾復入酒中如此取酒盡爲度搗篩酒服方寸匕日二

大橘皮湯（活人）

治動氣在下悞發其汗心中大煩骨節疼痛日連惡食食則反吐穀不得下

橘皮去白一兩半　甘草炙半兩　人參一分

竹茹半升

右剉如麻豆大每服五錢生薑四片棗子一枚以水二鍾煎取一鍾去滓分二服

金剛丸（保命集下同）

治腎損骨痿不能起於牀宜益精

菟蘚　杜仲炒　蓯蓉酒浸　菟絲子酒浸各等分

右爲細末酒煮豬腰子爲丸每服五七十丸空心酒下

牛膝丸

治腎肝損骨痿不能起於牀筋緩不能收持宜益精緩中

牛膝酒浸　菟蘚　杜仲炒去絲　蓯蓉酒浸

防風　菟絲子酒浸　白蒺藜各等分　桂枝減半

右爲細末酒煮豬腰子搗丸空心酒下五七十丸

地仙丹（丹溪下同）

治歷節疼痛

牛膝　蓯蓉　附子　川椒各四兩　木鼈子一兩

大羌活湯（衛生寶鑑下同）

治風濕骨節疼痛難以屈伸

羌活　升麻各一錢　獨活七分　蒼朮　防風　威靈仙　白朮　當歸　白茯苓　澤瀉各半錢

右十味㕮咀作一服水二盞煎至一盞去滓溫服食前一服食後一服忌酒麪生冷硬物

拈痛散

治肢節疼痛熨烙藥

羌活　獨活　防風　細辛　肉桂　白朮

良薑　麻黃不去節　天麻　川烏生去皮

葛根　吳茱萸　乳香研　川椒去目　全蠍生

當歸各一兩　川薑生半兩

右十七味爲粗末入乳香研勻每抄藥十錢痛甚者十五錢同細鹽一升炒令極熱熟絹袋盛熨烙痛處不拘時早晚頓用藥冷再炒一次用畢甚妙藥不用棄之

加味虎潛丸

虎之精力潛於脛骨人腎主骨而司精精弱則骨痿用此強骨補精故名虎潛

人參　黃芪　芍藥　黃蘗酒浸　當歸酒浸

山藥　牛膝酒洗各一兩　枸杞　瑣陽酥炙黃

虎脛骨酒浸一宿酥炙黃　五味子各七錢五分

熟地四兩

右煉蜜加豬脊髓丸桐子大每服一百丸空心溫

陳皮鹽水潤各二兩

右爲末羯羊肉酒煮爛搗爲丸鹽湯下冬加乾薑一兩

大羌活湯（衛生寶鑑下同）

治風濕骨節疼痛難以屈伸

羌活　升麻各一錢　獨活七分　蒼朮　防風　威靈仙　白朮　當歸　白茯苓　澤瀉各半錢

右十味㕮咀作一服水二盞煎至一盞去滓溫服食前一服食後一服忌酒麪生冷硬物

拈痛散

治肢節疼痛熨烙藥

羌活　獨活　防風　細辛　肉桂　白朮

良薑　麻黃不去節　天麻　川烏生去皮

葛根　吳茱萸　乳香研　川椒去目　全蠍生

當歸各一兩　川薑生半兩

右十七味爲粗末入乳香研勻每抄藥十錢痛甚者十五錢同細鹽一升炒令極熱熟絹袋盛熨烙痛處不拘時早晚頓用藥冷再炒一次用畢甚妙藥不用棄之

加味虎潛丸

虎之精力潛於脛骨人腎主骨而司精精弱則骨痿用此強骨補精故名虎潛

人參　黃芪　芍藥　黃蘗酒浸　當歸酒浸

山藥　牛膝酒洗各一兩　枸杞　瑣陽酥炙黃

虎脛骨酒浸一宿酥炙黃　五味子各七錢五分

熟地四兩

右煉蜜加豬脊髓丸桐子大每服一百丸空心溫

酒下

鹿角丸

治骨虛極面腫垢黑脊痛不能久立氣血衰憊髮落齒枯甚則喜唾

鹿角二兩　牛膝酒浸焙一兩半

右爲細末蜜丸桐子大每服七十丸空心鹽湯下

羌活補髓丸 千金方 下同

治髓虛腦病不安膽腑中寒

羌活　芎藭　當歸　桂心各二兩　人參四兩

大棗肉研如脂　羊髓　酥各一升　牛髓

大麻仁各二升熬研如脂

右十味先搗五種乾藥爲末下棗膏麻仁又搗相濡爲一家下二髓并酥內銅鉢中重湯煎取爲丸如梧子酒服三十丸日二服稍加至四十丸

柴胡發泄湯

治髓實勇悍驚熱主熱

柴胡　升麻　黃芩　細莘　枳實　梔子仁

芒硝各三兩　淡竹葉　牛地各一升　澤瀉四兩

右十味㕮咀以水九升煮取三升去滓下硝分三服

經驗方

治風毒藏於髓中

芍藥二分　虎骨炙一兩

右爲末用夾絹袋盛酒三升漬五日每服三合日三服

單方

渾身骨痛破草鞋燒灰香油和貼痛處即止 救急方

磁石強骨氣酢淬九次水飛爲末鹽湯調下 本草 下同

牛膝塡骨髓或煎或丸或釀酒服並佳

石斛治骨中久冷虛損丸服皆佳久服未無骨痛

五味子壯筋骨作丸久服佳

知母主骨熱勞或丸服或煎服佳

補骨脂主骨髓傷敗或丸服或末服並佳

地骨皮主骨熱煮湯常服佳

鼈甲除骨節間勞熱取甲炙黃爲末酒下一錢其肉作羹食之佳

川椒逐骨節寒濕痹痛煮服丸服並佳

海松子主骨節風可作粥常服

牛髓塡骨髓以酒和服良

黃狗肉塡骨髓爛煮食之

骨髓中冷痛取地黃汁　石酒二斗相攪重煎溫服日三補髓 千金方

濕氣作痛白朮切片煎汁熬膏白湯點服 [illegible]

中濕骨痛白朮一兩酒三盞煎一盞頓服不飲酒以水煎之 三四方

筋骨疼痛因風熱者石膏三錢飛羅麵七錢爲末水和煅紅冷定滾酒化服被蓋取汗連服三日即除根 筆峯雜興

筋骨疼痛猩紅三錢枯礬四錢爲末作三紙撚每日以一撚蘸油點火熏臍被覆臥之取汗 纂要奇方

歷節風痛松葉搗汁一升以酒三升浸七日服一合日三服 千金方

筋骨疼痛不拘風濕氣楊梅瘡及女人月家病先用此藥止痛然後調理乾馬齒莧一斤濕馬齒莧二斤五加皮半斤蒼朮四兩舂碎以水煎湯洗澡急用葱薑搗爛冲熱湯三椀服之暖處取汗直時痛止也 海上名方

薏苡仁酒去風濕強筋骨益肺腎健脾胃用絕好薏苡仁粉同麴米釀酒或袋盛煮酒飲

風毒骨痛在髓中芍藥二分虎骨一兩炙爲末夾絹袋盛酒三升漬五日每服三合日三服 經驗方

鍼灸

素問曰脾之大絡名曰大包出淵液下三寸布胷脅實則身盡痛虛則百節盡皆縱此脈若羅絡之血者皆取之大絡脈也

病有在筋者刺筋無傷骨骨傷則內動腎腎動則冬病脹腰痛

刺骨無傷筋者鍼至筋而去不及骨也刺筋無傷骨者過筋中骨也此之謂反也

病在骨骨重不可舉骨髓痠痛寒氣至名曰骨痹深者刺無傷脈肉爲故其道大分小分骨熱病已止

刺骨無傷髓髓傷則銷鑠胻痠體解㑊然不去矣

春刺夏分脈亂氣微入淫骨髓病不能愈令人不嗜食又且少氣

靈樞經曰經輸治骨髓

刺脊間中髓爲傴

短刺者刺骨痹稍搖而深之致鍼骨所以上下摩骨也

輸刺者直入直出深內之至骨以取骨痹此腎之應

也
手伸而不屈者其病在骨在骨守骨
邪在腎則病骨痛陰痹陰痹者按之而不得腹脹腰痛大便難肩背頸項痛時拘取之湧泉崑崙視有血者盡取之
骨寒熱者病無所安汗注不休齒未槁取其少陰於陰股之絡齒已槁死不治骨厥亦然
骨痹舉節不用而痛汗注煩心取三陽之經補之
骨癰疾者顧齒諸臉分肉皆滿而骨居汗出煩悗嘔多沃沫氣下泄不治
少氣身潔潔也言吸吸也骨痠體重懈惰不能動補足少陰
熱病身重骨痛耳聾而好瞑取之骨以第四鍼五十
九刺骨病不食齒耳青索骨於腎不得索之十七者腑也
黃帝問於伯高曰何以知骨之病也伯高曰耳焦枯受塵垢病在骨骨有屬骨之屬者骨空之所以受益而益腦髓者也黃帝曰取之奈何伯高曰百病變化浮沉深淺不可勝窮各在其處病間者淺之甚者深之間者少之甚者衆之隨變而調氣故曰上工
八風傷人內舍於骨解腰脊節腠理之間爲深痹也故爲之治鍼必長其身銳其末可以取深邪遠痹
熱病不知所痛耳聾不能自收口乾陽熱甚陰頗有寒者熱在髓死不可治
難經曰骨會大杼骨病治此宜灸之
保命集曰百節疼痛實無所知三稜針刺絕骨出血
醫學綱目曰筋攣骨痛補魂門

古今醫統曰骨寒髓冷火來燒靈餌妙穴分明記

醫案

衛生寶鑑曰眞定府張大年二十有九素嗜酒至元辛未五月間病手指節腫痛屈伸不利膝腕亦然心下痞滿身體沉重不欲飲食食卽欲吐面色萎黃精神減少至六月間來求予治之診其脈沉而緩緩者脾也難經云脈主體重節痛脈者脾之所主四肢爲脾蓋其人素飲酒加之時助濕氣大勝流於四肢故爲腫痛內經云諸濕腫痛皆屬脾土仲景云濕流關節肢體煩痛此之謂也宜以大羌活湯主之內經云濕淫於內治以苦溫以苦發之以淡滲之又云風能勝濕羌活獨活苦溫透關節而勝濕故以爲君升麻苦平威靈仙防風蒼朮苦辛溫發之者也故以爲臣血壅而不流則求當歸辛溫以散之甘草益氣緩中澤瀉鹹平茯苓甘平導濕而利小便以淡滲之爲使氣味相合上下分散其濕也
薛己醫按曰錦衣楊永與筋骨軟痛氣粗痰盛作渴喜水或用愈風湯天麻丸更加痰甚體麻余以爲脾腎俱虛用補中益氣湯加減八味丸三月餘而痊

陶天爵妾膝素多時患頭運痰甚勞則肢體萎軟筋骨作痛殊類風證余以爲腎虛不能納氣歸源用加減八味丸而痊後因房勞氣惱頭運項强耳下作痛此肝火證仍用前藥滋腎水生肝血制風火而愈
太宜人年七十五偏身作痛筋骨尤甚不能伸屈口乾目赤頭眩痰湧胃腸不利小便赤澀而短少夜間痰熱殊甚偏身作癢如蟲行此肝經氣燥而風動也用六味地黃丸料加山梔柴胡治之而愈

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百三十七卷目錄

醫部彙考二百十七

風門一

黃帝素問陰陽應象大論　生氣通天論　陰陽別論　移精變氣論　玉版論要篇　八正神明論　風論
靈樞經邪氣藏腑病形篇　五變篇　五邪篇　百病始生篇　論勇篇　論疾診尺篇　刺節眞邪篇　歲露論
張機金匱要略中風病脈證治
華佗中藏經風中有五生五死　論治中風偏枯之法死候
孫思邈千金方論雜風狀　風痺　風癇
嚴用和濟生方中風
劉完素六書中風　卒中暴死　風痺

藝術典第二百三十七卷

醫部彙考二百十七

風門一

黃帝素問

陰陽應象大論

東方生風風生木木生酸酸生肝肝生筋風傷筋

註此言能生我者亦所能害我也

生氣通天論

風者百病之始也清靜則肉腠閉拒雖有大風苛毒弗之能害此因時之序也

註風邪直透於肌腠風者善行而數變入於肌腠則及經脈或爲熱中或爲寒中或爲偏枯或成積聚或入腑而生或干臟而死邪氣淫溢不可勝論故曰風者百病之始也人能順蒼天清靜之氣而調攝其元神則肉腠固密雖有大風苛毒弗之能害此因四時之序而能順養者也

汗出偏沮使人偏枯

註陽氣者外衛於皮膚充塞於四體如汗出而只半身沮濕者是陽氣虛而不能充身徧澤必有偏枯之患矣

風客淫氣精乃亡邪傷肝也

註風爲陽邪客於膚表則淫傷於氣矣陽氣傷則精自出風邪內通肝氣肝藏血肝受邪則傷血矣

陰陽別論

三陽三陰發病爲偏枯痿易四支不舉

註三陽三陰者太陽太陰之爲病也偏枯者半身不遂痿易者委棄不能如常太陽爲諸陽主氣而主筋陽氣虛則爲偏枯陽虛不能養筋則爲痿脾屬四支故不舉

移精變氣論

中古之治病至而治之湯液十日以去八風五痹之病十日不已治以草蘇草荄之枝本末爲助標本已得邪氣乃服

註八風者八方之風觸五臟邪氣病發五痹者五臟痹也草蘇之枝莖旁枝也草荄之枝根旁枝也蓋蘇荄爲本而旁枝爲末病以五臟爲本而經俞筋骨爲標五臟有病則以蘇荄治之如邪在經脈之外者則以草蘇草荄之枝治之是以本治本而以末治標也

玉版論要篇

八風四時之勝終而復始逆行一過不復可數論要畢矣

註風寒客於人始傷皮毛而內舍於肺肺傳之肝肝傳之脾脾傳之腎腎傳之心逆行一過則死矣不復如順行之循環無端之可數也

八正神明論

八正者所以候八風之虛邪以時至者也四時者所以分春秋冬夏之氣所在以時調之也八正之虛邪而避之勿犯也

註風從其所居之鄉來爲實風主生長養萬物如月建在子風從北方來冬氣之正也月建在卯風從東方來春氣之正也月建在午風從南方來夏氣之正也月建在酉風從西方來秋氣之正也如春夏之交風從東南來夏秋之交風從西南來秋冬之交風從西北來春冬之交風從東北來此四方四維之正氣主生長萬物者也從其衝後來爲虛風傷人者也主殺主害衝後來者從衝犯之方而來如太乙居子風從南方來火反衝水也太乙居卯風從西方來金來犯木也故以八方之位以候八風之正氣候八節之虛邪四時之氣所在如春氣在經脈夏氣在孫絡長夏氣在肌肉秋氣在皮膚冬氣在骨髓又如正月二月人氣在肝三月四月人氣在脾五月六月人氣在頭七月八月人

氣在肺九月十月人氣在心十一月十二月人氣在腎此皆氣之所在以時而調之也八方之虛邪主殺主害者謹候而避之故聖人日避虛邪之道如避矢石然邪弗能害也

以身之虛而逢天之虛兩虛相感其氣至骨入則傷五臟工候救之弗能傷也故曰天忌不可不知也

註身之虛血氣虛也天之虛虛鄉之邪風也兩虛相感故邪氣至骨而入傷五臟上工調其九候而救之始弗能傷害其性命天忌者太乙徙居中宮乃天道所當避忌之日太乙北極也斗杓所指之辰謂之月建即氣令所主之方如冬至四十六日月建在北太乙居叶蟄之宮叶蟄坎宮也立春四十六日居天留天留艮宮也春分四十六日居倉門倉門震宮也立夏四十五日居陰洛陰洛巽宮也夏至四十六日居天宮天宮離宮也立秋四十六日居元委元委坤宮也秋分四十六日居倉果倉果兌宮也立冬四十五日居新洛新洛乾宮也明日復居叶蟄之宮曰冬至矣此太乙一歲所居之宮也又太乙日遊以冬至之日居叶蟄之宮數所在日從一處至九日復反於一常如是無已終而復始太乙移日天必應之以風雨以其日風雨則吉歲美民安少病矣移日者始移宮之第一日也如太乙徙立於中宮乃朝八風以占吉凶其日大禁者也徙入中宮日者乃九日中之第五日也其日風從南方來名曰大弱風其傷人也內舍於心外在於脈氣主熱風從西南方來名曰謀風其傷人也內舍於脾外在於肌其氣主爲弱風從西方來名曰剛風其傷人也內舍於肺外在於皮膚其氣主爲燥風從西北方來名曰折風其傷人也內舍於小腸外在於手太陽脈絕則溢脈閉則結不通善暴死風從北方來名曰大剛風其傷人也內舍於腎外在於骨與肩背之膂筋其氣主爲寒也風從東北方來名曰凶風其傷人也內舍於大腸外在於兩脇腋骨下及肢節風從東方來名曰嬰兒風其傷人也內舍於肝外在於筋紐其氣主爲身濕風從東南方來名曰弱風其傷人也內舍於腎外在肌肉其氣主體重此八風皆從其虛之鄉來乃能病人三虛相搏則爲暴病卒死兩實一虛病則爲淋露寒熱犯其雨濕之地則爲痿乂身形之應九野左足應立春其日戊寅己丑左脇應春分其日乙卯左手應立夏其日戊辰己巳膺喉頭首應夏至其日丙午右手應立秋其日戊申己未左骭應秋分其日辛酉右足應立冬其日戊戌己亥腰尻下竅應冬至其日壬子六腑腸下三關應中州大禁太乙所在日及諸戊己是謂天忌宜避鍼刺

虛邪者八正之虛邪氣也正邪者身形若用力汗出腠理開逢虛風其中人也微故莫知其情莫見其形上工救其萌芽必先見三部九候之氣盡調不敗而救之故曰上工下工救其已成救其已敗救其已成者言不知三部九候之相失因病而敗之也知其所在者知診三部九候之病脈處而治之故曰守其門戶焉莫知其情而見邪形也

註所謂虛邪者乃八方虛鄉所來之邪氣其入於身也深所謂正邪者八方之正氣也正氣者正風也從一方來非實風又非虛風也其中人也淺是以逢人之汗出腠理開而後入於肌腠絡脈之間然其中人也亦微故莫知其情莫見其形虛邪入深則博於筋骨傷人五臟故上工救其萌芽始發見其漸漸動形而即治之不使有傷三部九候之氣足爲上工也已成者人傷榮衛而病已成已敗者三部九候之氣已爲邪所傷敗下工救其已成者言不知三部九候之相失者因邪病而敗之也上工知診三部九候之病脈故能知其所在即於病脈處而守其眞氣之門戶則邪自去矣

風論

黃帝問曰風之傷人也或爲寒熱或爲熱中或爲寒中或爲厲風或爲偏枯或爲風也其病各異其名不同或內至五藏六腑不知其解願聞其說

註風乃陽動之邪而人之表裏陰陽血氣臟腑又有虛有實故其爲氣也善行而數變因其善行數變是以或爲寒熱或爲偏枯或外在於形身或內至于臟腑其病各異其名不同

岐伯對曰風氣藏於皮膚之間內不得通外不得洩風者善行而數變腠理開則洒然寒閉則熱而悶其寒也則衰食飲其熱也則消肌肉故使人怯慄而不能食名曰寒熱

註此論風邪客於膚腠而爲寒熱也皮膚肌腠之間乃三焦通會元眞之處風邪客之則氣不內通邪不外泄風動之邪善行而數變動而腠理開則元氣弛而洒然寒變而腠理閉則邪熱留而胃腸

悶其爲寒也則三焦虛而食飲衰其爲熱也則邪熱甚而肌肉鑠邪之所湊其正必虛正氣爲邪所傷故使人怯懼而不能食也名曰寒熱

以春甲乙傷於風者爲肝風以夏丙丁傷於風者爲心風以季夏戊己傷於邪者爲脾風以秋庚辛中於邪者爲肺風以冬壬癸中於邪者爲腎風

註風者虛鄉不正之邪風故曰風曰邪曰傷曰中蓋言不正之風或傷之輕或中之重也

風中五臟六腑之俞亦爲臟腑之風

註五臟之氣外合於四時故各以時受病者病五臟之氣也如風中於經俞則內連臟腑故亦爲臟腑之風病五臟之經也

各入其門戶所中則爲偏風

註門戶者血氣之門戶也如風各入其門戶而中其血氣者則爲偏枯謂偏入於形身之半也故風者百病之長也至於變化乃爲他病也無常方然致有風氣也

註風乃東方之生氣能生長萬物亦能害萬物故爲百病之長至其變化無常故爲病不一如春時之非東風夏時之非南風或從虛鄉來之剛風謀風之類皆其變化而爲他病也風邪之客於人無有常處如風氣客於皮膚之間則爲寒熱客於脈中則爲寒中熱中客於臟腑則爲臟腑之風循於風府則爲腦風入於頭系則爲目風無有常處而致有風氣也

帝曰五臟風之形狀不同者何願聞其診及其病能岐伯曰肺風之狀多汗惡風色皏然白時欬短氣晝日則差暮則甚診在眉上其色白

註風爲陽邪開發腠理故多汗風氣傷陽邪正不合故惡風肺金色白而主氣其變動爲欬風邪迫之故時欬短氣也晝則陽氣盛而能勝邪故差暮則氣衰故病甚眉上乃闕庭之間肺之候也

心風之狀多汗惡風焦絕善怒嚊赤色病甚則言不可快診在口其色赤

註心爲火臟風淫則火盛故脣舌焦而津液絕風化木木火交熾故善爲怒嚊心主舌病甚則舌本強而言不可快心和則舌能知五味故診驗在口口者兼脣舌而言也

肝風之狀多汗惡風善悲色微蒼嗌乾善怒時憎女子診在目下其色青

註肝開竅於目而主泣故善悲風木合邪則火熱盛而嗌乾肝氣病故善怒也怒勝思故時憎女子目者肝之官也故診在目下

脾風之狀多汗惡風身體怠惰四肢不欲動色薄微黃不嗜食診在鼻上其色黃

註脾主肌肉四肢身體怠惰四肢不欲動脾氣病也足太陰之脈屬脾絡胃是主脾所生病者食不下土位中央故所診在鼻

腎風之狀多汗惡風面痝然浮腫脊痛不能正立其色炲隱曲不利診在肌上其色黑

註風邪干腎則水氣上升故面痝然浮腫風行則水瀁也腎主骨故脊痛不能正立炲煙煤黑色也腎主藏精少陰與陽明會於宗筋風傷腎氣故隱曲不利水氣上升故黑在肌上水乘土也

胃風之狀頸多汗惡風食飲不下膈塞不通腹善滿失衣則腸鳴食寒則泄胗形瘦而腹大

註頸有風池風府乃經脈之要會故頸多汗胃腑受邪故飲食不下膈塞不通腹善滿也胃氣不足則身以前皆寒腹脹滿是以形寒則腸脹飲冷則泄者胃氣虛傷也胃者肉其應腹者胃之郛故主形瘦而腹大

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

身半以上者邪中之也身半以下者濕中之也故曰邪之中人也無有常中於陰則溜於腑中於陽則溜於經

註邪氣者風雨寒暑天之邪也故中人也高濕乃水土之氣故中於身半以下然無有恆常或中於陰或中於陽或溜於經或溜於腑或入於臟

諸陽之會皆在於面中人也方乘虛時及新用力若飲食汗出腠理開而中於邪中於面則下陽明中於項則下太陽中於頰則下少陽其中於膺背兩脅亦中其經

註諸陽之會皆在於面者精陽之氣皆上於面而走空竅也中於面則下陽明中於項則下太陽中於頰則下少陽此手足三陽之絡皆循項頸而上於頭面循頭項而下於胷脅肩背也

黃帝曰邪之中人臟奈何岐伯曰愁憂恐懼則傷心黃帝曰五臟之中風奈何岐伯曰陰陽俱感邪乃得往

註陰陽俱感外內皆傷也

黃帝曰邪之中人其病形何如岐伯曰虛邪之中身也洒淅動形正邪之中人也微先見於色不知於身若有若無若亡若存有形無形莫知其情

註 風寒暑濕燥火六者天之正氣而偏寒偏熱偏濕偏燥故曰正邪

肺脈微緩爲痿瘧偏風

註 病在皮膚爲肺寒熱病在血脈爲寒熱鼠瘻在分腠則爲偏風肺主周身之氣而朝百脈也

五變篇

黃帝曰一時遇風同時得病其病各異願聞其故少俞曰善乎哉問請論以比匠人匠人磨斧斤礪刀削斲材木之陰陽尚有堅脆堅者不入脆者皮弛至其交節而缺斤斧焉夫一木之中堅脆不同堅者則剛脆者易傷況其材木之不同皮之厚薄質之多少而各異耶夫木之蚤花先生葉者遇春霜烈風則花落而葉萎久曝大旱則脆木薄皮者枝條汁少而葉萎久陰淫雨則薄皮多汁者皮潰而漉卒風暴起則剛脆之木枝折杌傷秋霜疾風則剛脆之木根搖而葉落凡此五者各有所傷況於人乎黃帝曰以人應木奈何少俞曰木之所傷也皆傷其枝枝之剛脆而堅未成傷也人之有常病也亦因其骨節皮膚腠理之不堅固者邪之所舍也故常爲病也

註 形之皮膚肌腠筋骨有厚薄堅脆之不同故邪舍有淺深而其病各異卽五臟之病消癉腸胃之有積聚亦因形之皮膚肌肉而病及於內也故以木之皮汁堅脆多少方之陰陽者木之枝榦皮肉也交節而缺斧斤者比人之皮弛肉脆而骨節之堅剛也是以一木之中尚有堅脆之不同堅者則剛脆者易傷況其材木之不同耶木之皮厚枝脆者比人之皮不緻密膚腠疎也木之多汁少汁者比皮膚之津液多少也木之蚤花先葉者木氣外敷而不禁風霜也皮薄多汁者遇久陰淫雨則潰而漉剛脆之木遇卒風暴起則枝折杌傷益汁多者不宜陰雨剛脆者又忌暴風以比人之腠理疎者漉汗剛直多怒者消癉也木之傷皆傷其枝枝之剛脆者易傷而堅者未成傷也人亦因骨節皮膚腠理之不堅固者邪之所舍而常爲病也

黃帝曰人之善病風厥漉汗者何以候之少俞答曰肉不堅腠理疎則善病風黃帝曰何以候肉之不堅也少俞答曰腘肉不堅而無分理理者粗理粗理而皮不緻者腠理疎此言其渾然者

註 津液充於皮腠如皮潰理疎則津漉而爲汗矣

太陽之氣主皮膚如腘肉不堅而無分理無分理者粗理也則皮不緻密腠理疎而渾然汗出矣

五色篇

雷公曰小子聞風者百病之始也厥逆者寒濕之起也別之奈何黃帝曰常候闕中薄澤爲風沖濁爲痹在地爲厥此其常也各以其色言其病

註 地者面之下部名地閣也風乃天氣故常候於闕庭寒濕者地氣故候在地部風乃陽邪故其色薄澤寒濕者陰邪故其色沖濁言風寒濕邪可并於脈中可入於臟腑而爲卒死之不救

論勇篇

黃帝曰四時之風病人如何少俞曰黃色薄皮弱肉者不勝夏之虛風青色薄皮弱肉不勝秋之虛風赤色薄皮弱肉不勝冬之虛風也黃帝曰黑色不病乎少俞曰黑色而皮厚肉堅固不傷於四時之風其皮薄而肉不堅色不一者長夏至而有虛風者病矣其皮厚而肌肉堅者長夏至而有虛風不病矣其皮厚而肌肉堅者必重感於寒外內皆然乃病

註 薄皮弱肉則藏真之氣虛而不能勝四時之虛風矣不傷於四時之風者謂土旺於四季也不病長夏之風者謂土主於長夏也設有皮厚肉堅而傷於四時之風者必重感於寒也色黑而皮厚肉堅之爲病者必重感於寒外內皆然乃病謂外受天之寒邪內傷腎臟之水氣也

百病始生篇

風雨寒熱不得虛邪不能獨傷人卒然逢疾風暴雨而不病者蓋無虛故邪不能獨傷人此必因虛邪之風與其身形兩虛相得乃客其形兩實相逢衆人肉堅其中於虛邪也因於天時與其身形參以虛實大病乃成氣有定舍因處爲名上下中外分爲三員

註 虛邪之中人也漉淅動形正邪之中人也微先見於色不知於其身若有若無若亡若存有形無形莫知其情是虛邪傷形而正邪傷氣也正邪者天之正氣寒暑濕燥火也蓋天有此六氣而人亦有此六氣是以正邪中氣同氣相感也故曰風雨寒熱不得虛邪不能獨傷人傷人者傷人之形也

論疾診尺篇

尺膚滑其淖澤者風也尺膚滑而澤脂者風也

註津液淳澤於皮膚故尺膚滑其淳澤者知風在於皮膚而鼓動其津液也脂者肌肉文理間之脂膜尺膚澤脂者風在於肌肉間也此以尺膚之淳澤滑濇而知風邪之淺深也

刺節眞邪篇

黃帝曰余聞氣者有眞氣有正氣有邪氣何謂眞氣岐伯曰眞氣者所受於天與穀氣并而充身者也正氣者正風也從一方來非實風又非虛風也邪氣者虛風之賊傷人也其中人也深不能自去正風者其中人也淺合而自去其氣來柔弱不能勝眞氣故自去

註所受於天者先天之精氣穀氣者後天水穀之精氣合并而充身者也正氣者大塊噫氣其名爲風從一方來非實風又非虛風此天地之正氣也虛風者從虛鄉來之賊風傷人正氣其中人也深不能自去正風者其中人也淺與眞氣合而自去蓋其氣來柔弱不能勝眞氣故自去

虛邪之中人也洒淅動形起毫毛而發腠理其入深內搏於骨則爲骨痹搏於筋則爲筋攣搏於脈中則爲血閉不通則爲癰搏於肉與衞氣相搏陽勝者則爲熱陰勝者則爲寒寒則眞氣去去則虛虛則寒搏於皮膚之間其氣外發腠理開毫毛淫氣往來行則爲痒留而不去爲痹衞氣不行則爲不仁

註洒淅動形故搏於皮脈肉筋骨而爲痹攣癰痒陰勝則爲寒寒則眞氣去有傷衞氣則爲不仁此皆邪氣之所生也

虛邪偏客於身半其入深內居榮衞榮衞稍衰則眞氣去邪氣獨留發爲偏枯其邪氣淺者脈偏痛

註邪氣偏客於形傷其榮衞則眞氣去而爲偏枯其邪氣淺者脈偏痛蓋偏枯者邪直傷於筋骨也

歲露論

黃帝問於少師曰余聞四時八風之中人也故有寒暑寒則皮膚急而腠理閉暑則皮膚緩而腠理開賊風邪氣因得以入乎將必須八正虛邪乃能傷人乎少師答曰不然賊風邪氣之中人也不得以時然必因其開也其入深其內極病其病人也卒暴因其閒也其入淺以留其病也徐以遲

註八風之中人也有寒風而有暑風寒則皮膚急而腠理閉暑則皮膚緩而腠理開然賊風邪氣之中人也蓋因人氣之虛實開闔而入有淺深不因寒暑之開閉也

黃帝曰有寒溫和適腠理不開然有卒病者其故何也少師答曰帝弗知邪入乎雖平居其腠理開閉緩急其故常有時也黃帝曰可得聞乎少師曰人與天地相參也與日月相應也故月滿則海水西盛人血氣積肌肉充皮膚緻毛髮堅腠理鄧煙垢著當是之時雖遇賊風其入淺不深至月郭空則海水東盛人氣血虛其衞氣去形獨居肌肉減皮膚縱腠理開毛髮殘焦理薄煙垢落當是之時遇賊風則其入深其病人也卒暴

註衞氣盛則肌肉充皮膚緻毛髮堅腠理鄧煙垢著當是之時雖遇賊風其入淺不深至月郭空則海水東盛人氣血虛其衞氣去而形獨居肌肉減皮膚縱腠理開毛髮殘焦理薄煙垢落當是之時遇賊風則其入深其病人也卒暴

逼會之處故曰焦理煙垢者火土之餘也三焦主火肌肉主土故焦理薄則煙垢落謂肌肉減腠理開則肌腠之氣亦消散也當是之時遇賊風則其入深其病人也卒暴

黃帝曰其有卒然暴死暴病者何也少師答曰三虛者其死暴疾也得三實者邪不能傷人也黃帝曰願聞三虛少師曰乘年之衰逢月之空失時之和因爲賊風所傷是謂三虛故論不知三虛工反爲粗帝曰願聞三實少師曰逢年之盛遇月之滿得時之和雖有賊風邪氣不能危之也命曰三實

逢年之虛者六氣司天在泉之不及也逢月之空者月郭空之時也失時之和者四時不正之氣也夫衞氣與天地相參與日月相應是年之虛月之空時之違和皆主衞氣失常蓋衞氣者衞外而爲固也衞氣虛則腠理疎而邪氣直入於內故爲暴病卒死

漢張機金匱要略

中風病脈證治

夫風之爲病當半身不遂或但臂不遂者此爲痹脈微而數中風使然

寸口脈浮而緊緊則爲寒浮則爲虛寒虛相搏邪在皮膚浮者血虛絡脈空虛賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣即急正氣引邪喎僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經即重不勝邪入於腑即不識人邪入於臟舌即難言口吐涎沫

寸口脈遲而緩遲則爲寒緩則爲虛榮緩則爲亡血衞緩則爲中風邪氣中經則身痒而瘕痊心氣不足

邪氣入中則胃滿而短氣
肺中風者口燥而喘身運而重冒而腫脹肺死臟浮之虛按之弱如葱葉下無根者死
肝中風者頭目瞤兩脅痛行常偃令人嗜甘
肝死臟浮之弱按之如索不來或曲如蛇行者死
肝著其人常欲蹈其胷上先未苦時但欲飲熱旋復花湯主之
心中風者翕翕發熱不能起心中儌儌食即嘔吐
心死臟浮之實如九豆按之益躁疾者死
脾中風者翕翕發熱形如醉人腹中煩重皮目瞤瞤而短氣
脾死臟浮之大堅按之如覆盃潔潔狀如搖者死
華佗中藏經

風中有五生五死

風中有五者謂心肝脾肺腎五臟之中其言生死各不同心風之狀汗自出而好偃仰臥不可轉側語言狂妄者生宜於心俞灸之若唇面青白黃黑赤其色不定眼瞤動不休心絕者不可救過五日即死矣肝風之狀青色圍目額坐不得倨僂者可治若喘目直唇面俱青者死肝風宜於肝俞灸之脾風之證一身通黃腹大而滿不嗜食四肢不收或可治者手足不青而面黃不然則脾風宜於脾俞灸之腎風者腰脚痛重視脅下未生黃點者可治不然則死矣腎風宜灸腎俞也肺風者胷中氣滿冒脉汗出鼻不聞香臭喘而不得臥者可治若失血及妄言者不可治七八日死肺風宜於肺俞灸之凡診其風脈滑而散者風也緩而大浮而緊軟而弱皆屬風也又風之病舉下赤黑相象吐沫身直者七日死又中風人口噤筋急脈遲者生脈急而數者死又心脾俱中風即舌強不能言者也肝腎中風則手足不遂風之脈皆由中於四時不從之氣故爲病焉有經疹者有偏枯者有失音者有歷節者有癲厥者有疼痛者有聾瞽者有瘖癰者有脹滿者有喘乏者有赤白者有青黑者有瘡痒者有狂妄者皆起於風也其脈浮虛者自虛而得之實大者自實而得之弦緊者汗出而得之喘乏者飲酒而得之癲厥者自勞而得之手足不遂者言語蹇失者房中而得之癮疹者自痹濕而得之歷節疼痛者因醉犯房而得之聾盲瘖瘂者自五味飲食冒犯禁忌而得之千端萬狀莫離於五臟六腑而生矣所使之飲酌以此耳

論治中風偏枯之法

人病中風偏枯其脈數而面乾黑鬱手足不遂言語蹇澁治之奈何在上則吐之在中則瀉之在下則補之在外則發之溫之按之熨之吐謂出其涎也瀉謂通其塞也補謂益其不足也發謂發其汗也溫謂驅其濕也按謂散其氣也熨謂助其陽也治各合其宜安可一揆在求其本脈浮則發之滑則吐之脈伏而澁則瀉之脈緊則溫之脈遲則熨之脈閉則按之要察其可否故不能一揆治者也
風寒暑濕之邪中人或痛痒或淋或急或緩而不能收持或拳而不能舒張或行立艱難或言語蹇澁或半身不遂或四肢拳縮或口眼偏邪或手足欹側或行步而不能言語或不能行步而左偏枯或右壅滯或上不通於下或下不通於上或臟腑閉塞或左右手疼痛或病而卽死或感邪而未亡或喘滿而不寐或昏昧而不醒其於脈候證治之法亦各不同焉

死候

病中風瘧厥不仁脈緊急者死
病風人脈緊數浮沉有汗出不止呼吸有聲者死不然則生

唐孫思邈千金方

論雜風狀

岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰風痱三曰風懿四曰風癉夫諸急卒病多是風初得輕微人所不悟宜速與續命湯依腧穴灸之夫風者百病之長岐伯所言四者說其最重也
偏枯者半身不遂肌肉偏不用而痛言不變智不亂病在分腠之間溫溫欲取汗益其不足損其有餘乃可復也
風痱者身無痛四肢不收智亂不甚言微可知則可治甚則不能言不可治
風懿者奄忽不知人咽中塞窒窒然舌強不能言病在臟腑先入陰後入陽治之先補於陰後瀉於陽發其汗身轉輸者生汗不出身直者七日死凡風多從背五臟腧入諸臟受病肺病最急肺主氣息又冒諸藏故也肺中風者其人偃臥而胷滿短氣冒悶汗出者肺風之證也視目下鼻上兩邊下行至口色白者尚可治急灸肺腧百壯服續命湯小兒減之若色黃者此爲肺已傷化爲血矣不可復治其人當妄言掇空指地或自拈衣尋縫如此數日死若爲急風邪所中便迷漫恍惚狂言妄語或少氣憒憒不能復言若

不求師即治宿昔而死即覺便炙肺腧及膈腧肝腧數十壯急服續命湯可救也若涎唾出不收者既炙當並與湯也諸陽受風亦恍惚妄語與肺病相似然著緩可經久而死

肝中風者其人但踞坐不得低頭繞兩目連額上色微有青者肝風之證也若脣色青面黃尚可治急炙肝腧百壯服續命湯若大青黑面一黃一白者此爲肝已傷不可復治數日而死

心中風者其人但得偃臥不得傾側悶亂冒絕汗出者心風之證也若脣正赤尚可治急炙心腧百壯服續命湯若脣或青或白或黃或黑者此爲心已壞爲水面目亭亭時悚動者不可復治五六日死（一云旬日死）

脾中風者其人但踞坐而腹滿身通黃吐穢汁出者尚可治急炙脾腧百壯服續命湯若目下青手足青者不可復治

腎中風者其人踞坐而腰痛起若左右未有黃色如棗餅大者尚可治急炙腎腧百壯服續命湯若背黃赤髮直面土色者不可復治

大腸中風者臥而腸鳴不止灸大腸腧百壯可服續命湯賊風邪氣所中則傳於陽陽外先受之客於皮膚傳入於孫脈孫脈滿入傳於絡脈絡脈滿則輸於大經中成病歸於六腑則爲熱不時臥止爲啼哭其脈堅大爲實實者外堅充滿不可按按之則痛也經絡諸脈旁支去者皆爲孫脈也

風邪客於肌膚虛實成風疹瘙癢風邪入深寒熱相搏則肉枯邪客半身入深眞氣去則偏枯邪客榮關中卽攣筋中亦然邪淫於臟夢藏大形小淫於腑夢

臟小形大邪隨目系入腦則目轉眩邪中精則散視見兩物風邪入臟寒氣客於中不能發則瘖瘂喉痹舌緩不時服藥鍼灸風逐脈流入臟使人卒瘖緩縱噤瘈致死風入陽經則狂入陰經則癲陽邪入陰病則靜陰邪入陽病則怒

若因熱食汗浴通腠理得開其風自出則覺肉中如針刺步行運力欲汗亦如此也

凡覺肌肉中如刺皆由腠理閉邪氣閉在肌中因欲出也宜解肌湯則善

夫口瞤動口脣動偏喎皆風入脈故須急服小續命湯將八風散磨神明白膏丹參膏依經針灸之

風痱

夫風痱者卒不能語口噤手足不遂而彊直者是也治之以伏龍肝五升爲末冷水八升和攪取汁飲之

能盡爲善

凡欲醫此病當知先後次第不得漫投湯藥以失機宜非但殺人因茲遂爲痼疾已既得之當進三味竹瀝飲少似有勝更宜常進湯也竹瀝飲子患熱風者必先用此制其熱毒

古人皆準病根冷熱以制方今人臨急造次搜尋卽丸散多不驗所以欲用方者先定其冷熱乃可檢方用無不效湯藥既爾丸散亦然凡風之發也必由熱盛故有竹瀝葛汁等諸冷藥焉後之學者不能仔細識其方意故有此論具而述之其人無密室者不可與療以強人居室不密尚中風邪見服藥之人乎

風懿

脾脈絡胃俠咽連舌本散舌下心之別脈係舌本今心脾二臟受風邪故舌強不得語也

宋嚴用和濟生方

中風

經云風者百病之長也由是觀之中風在傷寒之上爲病急卒岐伯所謂大法有四一曰偏枯二曰風痱三曰風懿四曰風痹言最重也外有五臟諸風皆載之於千金茲不復叙大抵人之有生以元氣爲根榮衛爲本根本强壯榮衛和平腠理緻密外邪客氣焉能爲害或因喜怒憂思驚恐或飲食不節或勞役過傷遂致眞氣先虛榮衛失度腠理空疎邪氣乘虛而入及其感也爲半身不遂肌肉疼痛爲痰涎壅塞口眼喎邪偏廢不仁神智昏亂爲舌強不語頑痹不知精神恍惚驚惕恐怖或自汗惡風筋脈攣急變證多端治療之法當推其所自若內因七情而得之者法當調氣不當治風外因六淫而得之者亦先當調氣然後依所感六氣隨證治之此良法也但髮直吐沫搖頭上攩面赤如妝或頭面青黑汗綴如珠眼閉口開聲如鼾睡遺尿不知人者皆不可治

金劉完素六書

中風

經云風者百病之始善行而數變者也風本生於熱以熱爲本以風爲標凡言風者熱也叔和云熱則生風冷生氣是以熱則風動宜以靜勝其燥是養血也治須少汗亦宜少下多汗則虛其衛多下則損其榮汗下各得其宜然後可治其在經雖有汗下之戒而有中臟中腑之說中腑者宜汗之中臟者宜下之此雖合汗下亦不可過也仲景曰汗多則亡陽下多則

亡陰亡陽則損其氣亡陰則損其形經曰血氣者人之神不可不謹養也初證表裏不和須汗下之表裏已和是宜治之在經也其中腑者面加五色有表證脈浮而惡寒拘急不仁或中身之後或中身之前或中身之側皆曰中腑也其治多易中臟者昏吻不收舌不轉而失音鼻不聞香臭耳聾而眼昏大小便祕結或服合直視搖頭口開手撒遺溺痰如拽鋸鼻鼾皆曰中臟也其治多難經曰六腑不和流經爲癰五臟不和九竅不通若外無留結內無不通必知在經也初證既定宜以大藥養之當順時令而調陰陽安臟腑而和榮衛察病機審氣宜而亦有愈者若風中腑者先以加減續命湯隨證發其表中臟者則大便多祕澀宜以三化湯通其滯表裏證已定別無他變故以大藥和治之大抵中腑者多著四肢中臟者多滯九竅雖中腑者多兼中臟之證至於舌強失音久服大藥能自愈也中風濕者夏月多有之其證身重如山不能轉側宜服除濕去熱之藥可灸不可鍼今具六經續命湯通治八風五痺痿厥等疾以一歲爲總以六經爲別春夏加石膏知母黃芩秋冬加桂附又於六經隨證細分加減自古名醫不能越此

凡中風必先審六經之候慎勿用大熱藥烏附之類故陽劑剛勝積火燎原爲消狂瘡腫毒之屬則天癸竭而榮衛涸是以中風有此誡故經所謂邪風之至疾如風雨易曰撓萬物者莫疾乎風若感之淺者留於肌膚感之深者達於骨髓蓋禍患之機藏於細微非常人之豫見及其至也雖智者不能善其後是以聖人之教下皆謂之虛邪賊風避之有時故中風者

俱有先兆之證凡人如覺大拇指及次指麻木不仁或手足不用或肌肉蠕動者三年內必有大風之至經曰肌肉蠕動名曰微風宜先服八風散愈風湯天麻丸各一料爲效故手大指次指手太陰陽明經風多著此經也先服祛風滌熱之劑辛涼之藥治內外之邪是以聖人當未病不治已病又曰善治者治皮毛是止於前萌也故初成獲愈因久者伐形是治病之先也

中風之人如小便不利不可以藥利之既得自汗則津液外亡小便自少若利之使榮衛枯竭無以制火煩熱愈甚當候熱退汗止小便自行也兼此證乃陽明大忌利小便須當識此凡中風之人多能食者蓋甲己化土脾盛故能食由是多食則脾氣愈盛土剋制腎水水虧則病增劇也急宜廣服藥不欲多食病能自愈中風多食風木盛也盛則剋脾脾受敵求助於食經曰實則夢與虛則夢取是也當瀉肝木治風安脾脾安則食少是其效也

中風之人不宜用龍腦牛珠犀之提鈴巡於街使盜者伏而不出益使風邪入於骨髓如油入麵莫能出也若痰潮不省昏憒不知事宜用此藥下其痰涎

凡中風不審六經之加減雖治之不能去其邪也內經云開則漸然寒閉則熱而悶如暴中風邪宜先以加減續命湯隨證治之如中風無汗惡寒麻黃續命主之中風有汗惡風桂枝續命主之已上二證皆太陽經中風也

中風無汗身熱不惡寒白虎續命主之中風有汗身熱不惡風葛根續命主之已上二證陽明經中風也

中風無汗身凉附子續命主之中風有汗無熱桂枝續命主之此證少陰經中風也中風六證混淆繫之於少陽厥陰或肢節攣痛或痲木不仁宜羌活連翹續命主之

古之續命混淆無六證之別今各分經療治又分經鍼刺之

中風外無六經之形證內無便溺之阻隔知血弱不能養筋故手足不能運動舌強不能言語宜養血而筋自業大秦艽湯主之

中風外有六經之形證先以加減續命湯隨證治之內有便溺之阻隔復以三化湯主之

法曰四肢不舉俗曰癱緩故經所謂土太過則令人四肢不舉又曰土太過則敦阜阜高也敦厚也既厚而又高則令除去此真所謂脊梁之疾非肝腎經虛何以明之經所謂三陽三陰發病爲偏枯痿易四肢不舉王注云三陰不足發病爲偏枯三陽有餘則爲痿易易爲變易常用而痿弱無力也其治則瀉令氣弱陽氣土平而愈或三化湯調胃承氣湯選而用之若脾虛則不用也經所謂土不及則卑陷故脾病四肢不用四肢皆禀氣於胃而不能至經必因於脾乃得禀受也今脾不能爲胃行其津液四肢不能禀水穀氣日以衰脈道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉其治可補宜十全散加減四物去邪留正

中風證內邪已除外邪已盡當服愈風湯以行導諸經久服大風悉去縱有微邪只從此藥加減治之然治病之法不可失其通塞或一氣之微汗或一旬之通利如此爲常治之法也久則清濁自分榮衛自和

如初覺風動服此不致倒仆

衛氣凝而不行故其肉有不仁也分肉之間衛氣行處風與衛氣相薄俱行肉分故氣道濕而不利氣道不利風熱內鬱衛氣相持肉腠膜而瘡出衛氣被風鬱不得伸凝而不行則肉不仁也謂皮肉痺而不知寒熱痛癢如木石也

卒中暴死

暴病暴死火性疾速故也斯由平日衣服飲食安處動止精魂神志性情好惡不循其宜而失其常久則氣變與衰而為病也或心火暴甚而腎水衰弱不能制之熱氣怫鬱心神昏冒則筋骨不用卒倒而無所知是為僵仆甚則水化制火熱甚生涎至極則死微則發過如故至微者但眩聚而已俗云暗風由火甚制金不能平木故風木自甚也或風熱甚而筋惕或瘛瘲僵仆口出涎沫俗云風癎病欲知病有兼風者陰陽變化之道也故陰陽相搏剛柔相摩五行相錯六氣相盪變而為病則無窮矣大法予能制鬼賊則已當自實而與子同為病者不必皆然由乎六氣陰陽同異不等故經曰風熱火同陽寒燥濕同陰又燥濕小異也然燥金運屬秋陰而異於寒濕故反同其風熱也故火熱勝金衰而風生則風能勝濕熱能耗液而反寒陽實陰虛則風熱燥也凡人風病多因熱甚而風燥者為其兼化以熱為其主也俗云風者言未而忘其本也所以中風雜邪者非謂肝木之風實甚而卒中之也亦非外中於風由乎將息失宜而心火暴甚腎水虛衰不能制之則陰虛陽實而熱氣怫鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無所知也多因喜怒思悲恐之五志有所過極而卒中者由五志過極皆為熱甚故也若微則但僵仆氣血流通筋脈不攣緩者發過如故或熱氣太盛鬱結壅滯氣血不能宣通陰氣暴絕則陽氣後竭而死或即不死而偏枯者由經絡左右雙行而熱甚鬱結氣血不得宣通鬱極乃發若一側得通則否者痹而癱瘓也其人已有怫熱鬱滯而氣血偏行微甚不等故經言汗出偏沮令人偏枯然汗偏而出者由怫熱鬱結氣血壅滯故也人卒中則氣血不通而偏枯也所謂肥人多中風者蓋人之肥瘦由血氣虛實使之然也氣為陽而主輕微血為陰而主形體故西方金北方水為陰而剛也東方木南方火為陽而柔也故血實氣虛則肥氣實而虛則瘦所以肥者能耐寒不能熱瘦者能熱不能寒由寒則傷血熱則傷氣損其不足則陰陽愈偏故不能也損其有餘者以使平調故能之矣故瘦者腠理疎通而多汗泄血液衰少而為燥熱故多為勞嗽之疾也俗以為卒暴病甚而為熱勞徐久病微而為冷勞者是以遲緩為言而病非冷也藏其證候為熱明矣但熱行微甚或言肥人多中風由氣虛非也所謂腠理緻密而多鬱滯氣血難以通利若陽熱又甚而鬱結故卒中故肥人及勞者由暴然亡液損血過極瘦人及中風者由暴然陽熱太甚而鬱結不通所謂中風口噤筋脈緊急者由陽熱暴甚於內亢則害承乃制津液湧溢聚於胃腸熱燥以為痰涎初廣世言涎者乃偏身之脂脈津液也然陽實陰虛而風熱太甚以勝水濕因而成燥肝主於筋而風氣自甚又燥熱加之液還聚於胃腸則筋太燥筋主於收斂勁切緊濇故為病筋脈勁強緊急而口噤或破傷中風亦同但以從微至甚而不偏枯也夫破傷中風之由因瘡熱甚鬱結而榮衛不得宣通怫熱因之偏體故多發白痂是時瘡口閉寒氣難通泄故陽熱易為鬱結而熱甚則生風不已則表傳於裏亦由觸冒寒邪而怫熱鬱甚周身似為傷寒之疾不解則表傳於裏也但有風熱微甚兼化之殊耳大法破傷中風風熱燥甚怫鬱在表而裏氣尚平者善伸數欠筋脈拘急或時惡寒或筋惕而搐脈浮數而弦宜以辛熱治風之藥開衛結滯榮衛宣通而愈猶為寒表熱怫鬱而以麻黃湯辛熱發散也凡用辛熱開衛風熱結滯或以寒藥佐之尤良免致藥不中病而風熱轉甚俯陽寒論熱藥發表不中效則熱轉甚也故夏熱用麻黃桂枝湯類熱藥發表須加寒藥不然則熱甚發黃或斑出矣故發表者方佐以黃芩石膏知母柴胡地黃芍藥梔子黃芩陳葱白豆豉之類寒藥消息用之如世以甘草滑石葱豉寒藥發散甚妙是以甘草甘能緩急溫能潤燥滑石淡能利竅滑能通利葱辛甘微寒豉氣寒潤溫苓散結緩急潤燥除熱之物因熱服之而元府鬱結宣通則怫熱無由再作病勢雖甚而不得頓愈者亦後小效而無加害此方散結無問上下中外但有發而無損散結之方何必辛熱耶若破傷中風表不已而漸入於裏則病勢漸甚若裏未太甚而在脈在肌肉者宜以退風熱開鬱滯之寒藥調之或微加治風辛熱藥以意消息之若裏勢已甚而子强口噤項背反張驚惕搐搦涎唾稠粘胃腹滿塞而或便溺閉結或時汗出厥洪數而

弦也然汗出者由風熱鬱甚於裏而表熱稍罷則腠理疎泄而心之火熱從汗出也大法風熱怫鬱因汗而解者乃裏熱出之於表因汗而結散熱去則氣和而愈若不解者乃風熱鬱甚於裏而未出表故雖汗泄而熱不退則不能解猶陽明證熱甚於裏則日晡潮熱大汗雖出熱不退而不能解也故當大承氣湯下其裏熱也今火熱極甚筋勁急而口噤風熱加之故驚而搐風熱燥月鬱甚於裏故煩滿而或悶結法宜除風散結以寒藥下之使鬱滯流通而後以退風熱開結滯之寒藥調之而熱退結散則風自愈矣嗚呼俗醫所治破傷中風不明淺深但以半熱燥藥任其天命而已若始覺風熱鬱結於表而裏尚平未傳也或以寒物佐之亦佳如至寶丹治風痹雖用硫黃鍾乳桂心木香辛熱之類是亦能令開結也佐以牛黃腦子苦參芒硝之類以使結散而無復鬱也況至寶丹乃散風熱鬱痹之寒藥凡治風熱結滯宜戒熱藥過甚早令導引按摩自不能者令人以屈伸按摩使筋脈稍舒緩而氣通行及頻幹牙關勿令口噤若緊噤則常以橛當之勿損牙齒免致口噤粥藥不能下也及風癇之發作者由熱甚而風燥爲其兼化涎溢胷膈燥爍而瘛瘲昏冒僵仆也或驚風者亦由心火暴甚而制金不能平木故風火相搏而昏冒驚悸潮搐也凡此諸證皆由熱甚而生風燥各有異者由風熱燥各微甚不等故也所謂中風或筋緩者因其風熱勝濕而爲燥乃燥之甚也然筋緩不收而痿痹故諸臏鬱病痿皆屬肺金乃燥之化也如秋深燥甚則草木痿落而不收病之象也是以手得血而能握足得血而能步夫燥病血液衰少也而又氣血不能通暢故病然也或云筋攣有力則爲實熱筋緩不收則爲虛寒或謂寒主收引而熱主舒緩則筋攣爲寒筋緩爲熱者皆誤也凡治諸風方通言主療筋脈攣緩豈分寒熱虛實之異然筋攣雖勢惡而易愈諸筋緩難以平復也或云中風爲肝木實甚大忌臟腑脫泄若脾胃土氣虛損受肝木鬼賊之邪而當死當溫脾補胃土實則肝木不能尅乃治未病之法所謂似是而非也或云肝爲中州而當溫者亦誤也所以寒暑燥濕風火六氣應於十二經絡臟腑也以其本化則能補之相反則能泄之然脾胃土本濕也濕氣自甚則爲積飲痞隔或爲腫滿以藥燥去其濕是謂瀉其脾胃土之本也或病燥熱太甚而脾胃乾涸成消渴者土濕之氣衰也宜以寒溫之藥補陰瀉陽除濕潤燥而土氣得平是謂補其脾土之本也故仲景言傷寒裏熱太甚而胃中乾涸煩躁者以調胃承氣湯急下之救其胃氣所以陰陽異用而寒濕同性然上爲陰故異於風熱燥也土爲萬物之母水爲萬物之元故水土同在於下而爲萬物之根本也如地乾而無水濕之性則萬物根本不潤而枝葉皆衰矣經言動物神機爲根在於中故食入於胃而脾爲變磨布化五味以養五臟之氣而敷榮百骸根本乃固然胃中水穀潤澤而已亦不可太過與不及猶地之旱澇也故五臟六腑四支百骸受氣皆在於脾胃之濕潤經言積濕成熱豈可以溫藥補於濕土也溫屬春木正以勝其土濕或以臟腑不分六氣而爲假令之濕一槩言陽氣盛而熱爲實陽氣衰而寒爲虛者乃寒熱陰陽之虛實而非五行興衰尅伐之道也然臟腑經絡不必本氣興衰而能爲病六氣互相干而病也假令胃寒爲虛冷者是胃中陰水實而陽火虛也當大溫補胃中陽火之虛而退其陰水之實豈可以胃土本虛而補其濕也夫補瀉脾胃之本者燥其濕則爲瀉潤其燥則爲補今夫土本濕也若陽實陰虛風熱勝其水濕而成燥者則爲水濕衰可以退風散熱養液潤燥而救其已衰之陰濕若反以溫補欲令臟腑無壅塞不亦妄謬之甚耶或言中風由腎水虛冷者誤也蓋陰水既衰則陽火自盛而熱豈能反爲寒耶以證驗之則爲熱明矣或云中風既爲熱甚治法或用烏附之類熱藥何也答曰欲令藥氣開通經絡使氣血宣行而無壅滯也然亦以消風熱開結滯之類寒藥佐之可以制其藥之熱若服峻熱藥而熱證轉加者不可服也鬱結不通而强以攻之則陰氣暴絕而死矣故諸方之中至寶靈寶丹最爲妙藥今詳本草言至寶丹之藥味合而爲一乃寒藥也靈寶丹雖用溫熱之味而復用寒物制之參而爲一亦平藥也況皆能散風壅開結滯而使氣血宣通怫熱除而自愈世方雖有治風之熱藥當臨時消息適其所宜扶其不足損其有餘慎不可但以峻熱攻痹而反絕其已衰之陰氣也

人之生也負陰而抱陽人居一氣道在其中矣外有八風之相盪內有喜怒之交侵眞氣內弱風邪襲之風之傷人或爲寒熱或爲疼痛或爲偏枯或爲拘攣其候不一風者善行而數變此乃風者百病之始萬病之長若內不能通外不得泄此謂病生於變亂或

失音而昏冒或口目而喎斜可用三聖散吐之或不知人事或牙關緊急藥不能下者煎三聖散鼻內灌之吐出涎沫口自開也次服無憂散通解丸通聖涼膈人參半夏丸桂苓甘露散消風散熱除濕潤燥養液之寒藥排而用之切忌雞猪魚兔油膩酒酢蕎麪動風之物及引痰之食

風痱

內奪而厥舌瘖不能言二足廢不爲用腎脈虛弱其氣厥不至舌不仁經云瘖痱足不履用音聲不出者地黃飲子主之

暴瘖卒瘂也金肺主聲故五行惟金響金應於乾乾爲天爲陽爲健爲動金本燥爲涸爲收爲斂爲勁切爲剛潔故諸能鳴者無越此也凡諸發語聲者由其形氣之鼓擊也鼓擊者乃健動之用也所以謂物寒則能鳴者水實制火火不尅金也其或火旺水衰熱乘金肺而神濁氣鬱則暴瘖無聲也故經言內奪而厥則爲瘖痱此腎虛也瘖者瘂也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百三十八卷目錄
醫部彙考二百十八
風門二
張從政儒門事親 口眼喎斜是經非竅辯
李杲十書 中風　不可與痰同治
朱震亨心法 中風
王履溯洄集 中風
羅天益衛生寶鑑 中風雜說　論犀角升麻湯
虞摶醫學正傳 總論
戴思恭證治要訣 總論中風　偏枯　譯證　口眼喎斜
樓英醫學綱目 論中風
王綸明醫雜著 問答

元張從政儒門事親

口眼喎斜是經非竅辯

口眼喎斜者俗工多與中風掉眩證一概治之其藥則靈寶至寶續命清心一字急風烏犀鐵彈丸其方非不言治此病也然而不愈者何也蓋知竅而不知經知經而不知氣故也何謂知竅而不知經蓋人之首有七竅如日月五星七政之在天也故肝竅目目爲肝之外候肺竅鼻鼻爲肺之外候心竅舌舌無竅心與腎合而寄竅於耳故耳與舌俱爲心之外候俗工止知目病歸之肝口病歸之脾耳病病歸之腎舌病歸之心更無改張豈知目之內皆上下二經足太陽及足陽明起於此目之銳眥足少陽起於此手少陽至於此鼻之左右足陽明手陽明俠乎此口之左右亦此兩經環乎此故七竅有病不獨歸之五臟當歸之六陽經也余曰俗工知竅而不知經者此也何謂知經而不知氣蓋世之談方藥者不啻千萬人不過本草性味豈知十二經所出所入所循所環所交所合所過所注所起所會所屬所絡所上所下所俠所貫所布所散所結所繞所抵所連所係所約所同所別千萬人中或見一二名明可謂難其人矣然而不過執此十二經便爲病本將陽經爲熱陰經爲寒向本草中尋藥藥架上檢方而已矣病之不愈又何訝焉豈知靈樞經曰足之陽明手之太陽筋急則口目爲僻此十二經及受病之處也非爲病者也其爲病者天之六氣也六氣者何風暑燥濕火寒是也故曰俗工知經而不知氣者此也然則口目喎斜者此何經也何氣也足之太陽足之陽明左目有之右目亦有之足之陽明手之陽明口左有之口右亦有之此兩道也靈樞又言足陽明之筋其病頰筋有寒則急引頰移口熱則筋弛縱緩不勝收故僻是左寒右熱則左急而右緩故偏於左右寒左熱則右急而左緩故偏於右也夫寒不可徑用辛熱之劑蓋左中寒則逼熱於右右中寒則逼熱於左陽氣不得宣行故也而況風者甲乙木也口眼陽明皆爲胃土風偏賊之此口目之所以僻也七竅惟口目喎斜而耳鼻獨無此病者何也蓋動則風生靜則風息天地之常理也考之易象有足相符者震巽主動坤艮主靜動者皆屬木靜則皆屬土觀卦者視之理也視者目之用也目之上綱則貶下綱則不貶故觀卦上巽而下坤頤卦者養之理也養者口之用也口之下頷則嚼上頷則不嚼故頤卦上艮而下震口目常動故風生焉耳鼻常靜故風息焉當思目雖斜而目之眶骨未嘗斜口雖喎而口之輔車未嘗喎此經之受病非竅之受病明矣而況目有風輪脣有飛門者耶余嘗治此證未嘗用世俗之藥非故與世參商方鑿圓枘自然齟齬者嘗過頷一長吏病此命予療之目之斜灸以承泣口之喎灸以地倉俱效苟不效者當灸人迎夫氣虛風入而爲偏上不得出下不得泄真氣爲風邪所陷故宜灸內經曰陷下則灸之正謂此也所以立愈又嘗過東杷一夫亦患此予脈其兩手急數如張弓弦甚有力而實其人齒壯氣充與長吏不同蓋風火交勝余用調胃承氣湯六兩水四升煎作三升分四服令稍熱啜之前後約瀉四五十行去一兩盆次以苦劑投之解毒數服以升降水火不旬日而愈脈訣云熱則生風若此者不可純歸其病於隱隙之間而得亦風火素感而然也蓋火勝則制金金衰則木茂木茂則風生若東杷之人止可流濕潤燥大下之後便使加槍通鬱爲大法靈樞雖有馬膏桂酒雙塗之法此但治其外耳非治其內也今人不知其本欲以單服熱水強引而行之未見其愈者也向之用薑附

烏桂起石硫黃之劑者是耶非耶

李杲十書

中風

中風爲百病之長乃氣血閉而不行此最重疾凡治風之藥皆辛溫上通天氣以發生爲體是元氣始出地之根蒂也

中風從內出其治法則如外入之證亦以發表攻裏行中道二法也

中血脈則口眼喎斜中腑則肢節廢中臟則性命危急此三者治各不同如中血脈外有六經之形證則從小續命湯加減及疏風湯治之如中腑內有便溺之阻隔宜三化湯或局方中麻仁丸通利之外無六經之形證內無便溺之阻隔宜養血通氣大秦艽湯羌活愈風湯治之中臟痰涎昏冒宜至寶丹之類鎮墜若中血脈中腑之病初不宜用龍麝牛黃爲麝香入脾治肉牛黃入肝治筋龍腦入腎治骨恐引風深入骨髓如油入麪莫之能出又不可一概用大戟芫花甘遂瀉大便損其陰血則眞氣愈虛

朱震亨心法

論中風

中風大率主血虛有痰治痰爲先次養血行血或屬虛挾火（一作與）濕又須分氣虛血虛

半身不遂大率多痰在左屬死血瘀（一作少）血在右屬痰有熱併氣虛左以四物湯加桃仁紅花竹瀝薑汁右以二陳湯四君子等湯加竹瀝薑汁

痰壅盛者口眼喎斜者不能言者皆當用吐法一吐不已再吐輕者用瓜蒂一錢或稀涎散或蝦汁以蝦半斤入醬葱薑等料物水煮先喫蝦次飲汁後以鵝翎探引吐痰用蝦者蓋引其風出耳重者用黎蘆半錢或三分加麝香少許薑汁調吐若口噤昏迷者灌入鼻內吐之虛者不可吐

氣虛卒倒用參芪補之有痰濃煎參湯加竹瀝薑汁血虛用四物湯俱用薑汁炒恐泥痰故也有痰再加竹瀝薑汁入內服能食者去竹瀝加荊瀝

肥白人多濕少火用烏頭附子行經凡用烏附必用童便煮過以殺其毒

初昏倒急掐人中至醒然後用痰藥以二陳湯四君子湯四物湯加減用之

瘦人陰虛火熱用四物湯加牛膝竹瀝黃芩黃蘗有痰者加痰藥

治痰氣實而能食用荊瀝氣虛少食用竹瀝此二味開經絡行血氣故也入四物湯必用薑汁助之

遺尿屬氣虛以參芪補之

筋枯者舉動則痛是無血不能滋養其筋不治也脈訣內言諸不治證口開手撒眼合遺尿吐沫直視喉如鼾睡肉脫筋痛髮直搖頭上竄面赤如粧或頭面青黑汗綴如珠皆不可治

按內經已下皆謂外中風邪然地有南北之殊不可一途而論惟劉守眞作將息失宜水不能制火極是由今言之西北二方亦有眞爲風所中者但極少爾東南之人多是濕土生痰痰生熱熱生風也邪之所湊其氣必虛風之傷人在肺臟爲多

許學士謂氣中者亦有此七情所傷脈微而數或浮而緊緩而遲必也脈遲浮可治大數而極者死若果外中者則東垣所謂中血脈中腑中臟之理其於四肢不舉亦有與痿相類者當細分之局方風痿同治大謬發揮甚詳子和用三法如的係邪氣卒中痰盛實熱者方可用否則不可

氣中一證與中風相似但風中多痰涎氣中口中無涎治之之法調氣爲先經言治風者以理氣氣順則痰消徐理其風庶可收效又有中風言不變志不亂病在分腠之間者只宜溫臥取少汗爲可復也

凡中風脈多沉伏大法浮遲者吉急實者凶先用麻油調蘇合香丸或用薑汁或用白湯調如口噤抉開灌之稍甦則服八味順氣散若痰盛者只宜省風導痰湯服之若中則昏沉不省人事口噤急以生半夏末吹入鼻中或用細莘皂角爲末吹之噴嚏則甦無嚏者不治

肥人中者以其氣盛於外而歉於內也肺爲氣出入之道肥者氣必急氣急必肺邪盛肺金尅木膽爲肝之腑故痰涎壅盛所以治之必以理氣爲急中後氣未順痰未除調理之劑惟當以薷香正氣散和星香散煎服此藥非特可治中風之證治中惡中氣尤宜尋常嘔而多痰者亦可用之

若前證多怒宜小續命湯加羚羊角熱而渴者湯中去附子加秦艽半錢恍惚錯語加茯神遠志各半錢不得睡加酸棗仁半錢不能言加竹瀝一蜆殼許入虛無力者去麻黃加人參如其數

若人自甦能言能食惟身體不遂急則攣踡緩則癱曳經年不愈難以起止以加減地僊丹常服

若中飲食坐臥如常但失音不語俗呼爲啞風只以

小續命去附子加石菖蒲一錢

治風之法初得之卽當順氣及日久卽當活血此萬古不易之理古有以四物湯吞活絡丹愈者正是此義若先不順氣化痰遽用烏附又不活血徒用防風天麻羌活輩吾未見能治也又見風中於膚腠輒用腦麝治之者是引風入骨髓也尤爲難治深可戒哉如口喎斜未正者以蓖麻去殼爛搗右喎塗左左喎塗右或鱓魚血入麝香少許塗之卽正

初卒倒僵仆不知人事急以皂角末或不臥散於鼻內吹之就提項髮立甦有嚏者可治無嚏者不治

經曰風從汗泄似可微汗解表表實無汗者散之刼之表虛自汗者溫之解之若氣滯者難治宜吐之可下者此因內有便溺之阻隔故裏實若三五日不大便者可與機要三化湯或子和搜風丸老人只以潤腸丸

理氣者氣滯氣鬱肩膊麻痛之類此七情也宜烏藥順氣八味順氣之類

理血者無表裏之急血弱舉發不時者用大秦艽湯或羌活愈風湯兼用化痰丸子

中風不可與痿同治

今世所謂風病多與痿證混同論治良由局方多以治風之藥通治諸痿也古聖論風痿各有篇目源流不同治法亦異不得不辯按風論風者百病之長至其變化乃爲他病又曰善行數變曰因於露風曰先受邪曰在腠理曰客曰入曰傷曰中歷陳五臟與胃之傷皆多汗而惡風其發明風邪係外感之病有臟腑內外寒熱虛實之不同若是之明且盡也別無癱瘓痿弱卒中不省僵仆喎斜攣縮眩運語澀不言之文也或曰吾子謂內經風論主於外感局方用麻黃桂附輩將以解風寒也用腦麝威靈仙黑牽牛輩將以行凝滯也子之言過矣曰風病外感善行數變其病多實少虛發表行滯有何不可治風之外何爲又歷述神魂恍惚起便須人手足不隨神志昏憒癱瘓躽曳手足筋攣眩運倒仆半身不遂膝脚緩弱四肢無力顫掉拘攣不語語澀等諸痿證兼治之考諸痿論肺熱葉焦五臟因而受之發爲痿躄心氣熱生脈痿故經縱不任地肝氣熱生筋痿故宗筋弛緩脾氣熱生肉痿故痹而不仁腎氣熱生骨痿故足不任身又曰諸痿皆生於上謂之上者指病之本在肺也又曰昏惑曰瘈瘲曰瞀昧曰暴病曰鬱冒曰蒙昧暴瘖曰瞀瘈皆屬於火又曰四肢不舉曰舌本强曰足痿不收曰痰涎有聲皆屬於上又禮記注曰魚肉夭產也以養陽作陽德以爲倦怠悉是濕熱內傷之病當作諸痿治之何局方治風之方兼治痿者十居八九不思諸痿皆起於肺熱傳入五臟散爲諸證大抵只宜補養若以外感風寒治之寧免實實虛虛之禍乎風病外感之邪有寒熱虛實而挾寒者多痿病內熱之傷皆是虛證無寒可散無實可瀉局方本爲外感立方而以內傷熱證混同一治其爲害也似非細故王履溯洄集

總論

人有卒暴僵仆或偏枯或四肢不舉或不知人或死或不死者世以中風呼之而方書亦以中風治之余嘗考諸內經則曰風者百病之始也又曰風者百病之長也至其變化乃爲他病無常方又曰風者善行而數變又曰風之傷人也或爲寒熱或爲熱中或爲寒中或爲癘風或爲偏枯或爲風也其卒暴僵仆不知人四肢不舉者並無所論止有偏枯一語而已及觀千金方則引岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰風痱三曰風懿四曰風痹解之者曰偏枯者半身不隨風痱者身無痛四肢不收風懿者奄忽不知人風痹者諸痹類風狀金匱要略中風篇曰寸口脈浮而緊緊則爲寒浮則爲虛虛寒相搏邪在皮膚浮者血虛絡脈空虛賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣卽急正氣引邪喎僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經卽重不勝邪入於腑卽不識人邪入於臟舌卽難言口吐涎沫由是觀之知卒暴僵仆不知人偏枯四肢不舉等證固爲因風而致者矣故用大小續命西州續命排風八風等諸湯散治之及近代劉河間李東垣朱彥修三子出所論始與昔人異矣河間曰中風癱瘓者非謂肝木之風實甚而卒中之亦非外中於風由乎將息失宜心火暴甚腎水虛衰不能制之則陰虛陽實而熱氣怫鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無所知也多因喜怒思悲恐五志有所過極而卒中者由五志過極皆爲熱甚故也俗云風者言末而忘其本也東垣曰中風者非外來風邪乃本氣病也凡人年逾四旬氣衰之際或因憂喜忿怒傷其氣者多有此疾壯歲之時無有也若肥盛則間有之亦是形盛氣衰而如此彥修曰西北氣寒爲風所中或有之矣東南氣溫而地多濕有風病者非風也皆濕土生痰痰生熱熱生風也三子之論河間主乎火東

垣主乎氣彥修主於濕反以風爲虛象而大異於昔人矣吁昔人與三子也果孰是而果孰非歟以三子爲是則昔人爲非也而三子未出之前固有從昔人治之而愈者矣以昔人爲是則三子爲非也而三子已出之後亦有從三子治之而愈者矣故不善讀其書者往往致亂以余觀之昔人三子之論皆不可偏廢但三子以相類中風之病視爲中風而立論故使後人狐疑而不決不知因於風者眞中風也因於火與氣與濕者類中風而非中風也三子所論者自是因火氣濕而爲暴病暴死之證與風何相干哉如內經所謂三陰三陽發病爲偏枯痿易四肢不舉亦未嘗必因於風而後能也夫風火氣濕之殊望聞問切之異豈無所辯乎辯之爲風則從昔人以治辯之爲火氣濕則從三子以治庶乎析理明而用法當惟其以火氣濕之證強以風而合論之所以眞僞不分而名實相紊若以火氣濕證分出之則眞中風病彰矣所謂西北有中風東南無中風者其然歟否歟

羅天益衛生寶鑑

中風雜說

風者動而多變熱則動宜以靜勝是養血也宜和是行榮衛壯筋骨也天麻丸主之非大藥不能治也

如中風自汗昏冒發熱不惡風寒不能安臥此是風熱煩躁瀉青丸主之如小便少不可以藥利之既自汗津液外泄小便內少若利之使榮衛枯竭無以制火煩熱愈甚俟熱退汗止小便自行也兼此證屬陽明經大忌利小便須當識此

中風人多能食蓋甲己化土脾盛故能多食由此脾氣愈盛下尅腎水腎水虧則病增劇宜廣服藥不欲多食病能自愈

論犀角升麻湯

足陽明者胃也經云腸胃爲市如市廛無所不有也六經之中血氣俱多腐熟水穀故飲食之毒聚於腸胃此方以犀角爲主解飲食之毒也陽明經絡環脣挾口越於鼻交頞中循頞車上耳前過客主人循髮際至額顱故王公所患此一經絡也以升麻佐之餘藥皆滌除風熱升麻黃芩專入胃經爲使也

明虞搏醫學正傳

總論

內經曰風之傷人也或爲寒熱或爲熱中或爲寒中或爲癘風或爲偏枯又曰風者百病之長也至其變化乃爲他病無常方又曰諸風掉眩皆屬肝木千金云岐伯所謂中風大法有四一曰偏枯謂半身不遂也二曰風痱謂身無疼痛四肢不收也三曰風懿謂奄忽不知人也四曰風痹謂諸痹類風狀也是以古之名醫皆以外中風邪立方處治惟河間劉守眞氏所謂中風癱瘓者非謂肝木之風實甚而卒中之亦非外中於風良由將息失宜心火暴甚腎水虛衰不能制之則陰虛陽實而熱氣怫鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無所知也亦有因喜怒思悲恐五志有所過極而卒中者夫五志過極皆爲熱甚俗云風者言末而忘其本也東垣李氏明之亦謂中風者非外來風邪乃本氣自病也凡人年逾四旬氣衰之際或憂喜忿怒傷其氣者多有此證壯歲之時無有也若肥盛者則間而有之亦是形盛氣衰故如此耳丹溪先生亦曰有氣虛有血虛有痰盛又曰西北二方眞爲風所中者有之東南之人皆是濕土生痰痰生熱熱生風也夫上古之論中風一以爲外感風邪之候及乎三先生之論一出皆以風爲虛象而謂內傷正氣爲病然三先生又別各有外感之論而使後學狐疑不決故王安道有論二子主氣主火主濕之不同而與昔人之主風不合而立眞中類中之目岐爲二途愚竊疑焉卒中曰暴仆曰暴瘖曰蒙昧曰喎僻曰癱瘓曰不省人事曰語言蹇澁曰痰涎壅盛其爲中風之候不過如此無此候者非中風之病也夫外候既若是之相侔而病因又何若彼之異耶欲求歸一之論終不可得於是積年歷試四方之病此者若干人盡因風濕痰火挾虛而作何常見其眞中類中二者之分哉是以一旦豁然有所感悟未知是否請陳梗槩與明達者共議夫中風之證蓋因先傷於內而後感於外也但有標本輕重之不同假如百病皆有因有證因則爲本證則爲標古人論中風者言其證三先生論中風者言其因知此則中風之候可得而詳論矣其所謂眞中風邪者未必不由氣體虛弱榮衛失調然後感於外邪若非體虛所致則西北二方風寒大盛之地而中風者比比皆是何暇爲他證哉其所謂因火因氣因濕者亦未必絕無外邪侵侮而作也若無外邪侵侮則因氣因火因濕自爲他證豈有喎僻癱瘓暴仆暴瘖之候乎經曰邪之所湊其氣必虛是也豈可以一中風之證岐爲二途哉治之之法重於外感者先驅外邪而後補中氣重於內傷者先補中氣而後驅外邪或以散風藥爲君而以補損

藥爲臣使或以滋補藥爲君而以散邪藥爲臣使全在活法量輕重而處治之也內經曰有取本而得者有取標而得者有本而標之者有標而本之者又曰急則治其標緩則治其本若夫初病暴仆昏悶不省人事或痰涎壅盛舌强不語兩寸脉浮大而實者急宜以瓜蒂藜蘆等藥吐之以遏其勢或人迎脉緊盛或六脉俱浮弦者急宜以小續命湯表之蓋風氣太盛心火暴升而痰涎壅遏於經絡之中於斯時也豈尋常藥餌而能通達於上下哉故本方用附子以其稟雄壯之資而有斬關奪將之勢能引人參輩並行於十二經以追復其散失之元陽又能引麻黃防風杏仁輩發表開腠理以散其在表之風寒引當歸芍藥川芎輩入血分行血養血以滋養其虧損之眞陰或加石膏知母以降胃火或加黃芩以清肺金看所挾見證與夫時月寒溫加減施治病勢稍退精神稍復輒當改用丹溪之法而以補氣補血清痰之劑調養其本氣而安此急則治其標與夫標而本之之治法也凡人手足漸覺不隨或脣脾及髀股指節痲痺不仁或口眼歪斜語言蹇澁胃腸迷悶吐痰相續或六脉弦滑而虛軟無力雖未致於倒仆其爲中風運厥之候可指日而定當急從丹溪法調治其左手脉不足及左半身不遂者以四物湯補血之劑爲主治右手脉不足及右半身不遂者以四君子湯補氣之劑爲主治痰盛者二陳導痰等湯兼用氣血兩虛而挾痰者八物湯加南星半夏枳實竹瀝薑汁之類若夫眞元漸復痰飲漸消或覺有風邪未退者仍以羌活愈風湯防風通聖散之類出入加減調治而安此緩則治其本與夫本而標之之治法也抑考先哲有云其證有中臟中腑之分證不同中腑者多著四肢故面加五色脉浮而惡風寒四肢拘急不仁或中身之前或中身之側皆曰中腑也其治多易中臟者多滯九竅故骨緩失音耳聾鼻塞目瞀大小便祕結皆曰中臟也其治多難大法中腑者小續命等湯以發其表中臟者三化等湯以通其裏腑臟兼見者又不可以拘泥或一氣之微汗或一旬之通利又曰治須少汗亦須少下多汗則虛其衛多下則損其榮斯又不可不知或外無六經之形證內無便溺之阻隔但手足不遂語言蹇澁者此邪中於經也又當從乎中治而不可以標本論也是宜養血通氣大秦艽湯羌活愈風湯之類夫所謂諸方論治乃先哲立權衡以爲後學之矜式耳其於臨證切脉之際又當順時令而調陰陽安臟腑以和榮衛察病機審氣宜全在活法以度其輕重之權量其毋膠柱以調瑟也

先哲製小續命湯以治中風初病無汗及手足癱瘓關節不利表實等證此急則治標之藥也後人不分表裏虛實通用以治中風之證故張易水授東垣以加減之法夫中風無汗表實者固宜其有汗表虛之證雖有加減之法恐不可以膠柱鼓瑟也

戴思恭證治要訣

總論

天地間惟風無所不入一罅不塞來不可禦人之一身縝密者少疎漏者多風乘之也輕則爲感重則爲傷又重則爲中古人謂避風如避寇蓋欲窒源以防患中風之證卒然運倒昏不知人或痰涎壅盛咽喉作聲或口眼喎斜手足癱瘓或半身不遂或舌强不語風邪既盛氣必上逆痰隨氣上停留壅塞昏亂運倒皆痰也五臟雖皆有風而犯肝經爲多蓋肝屬木風易入之各從其類肝受風則筋緩不榮或緩或急所以有喎斜癱瘓不遂舌强語澁等證治之宜調氣爲先經云善治風者以氣理風氣順則痰消徐理其風庶可收效先用麻油調蘇合香丸或用薑汁或用白湯調如口噤抉開灌之稍甦則進八味順氣散諸中或未甦或已甦或初病或久病忽吐出紫紅色者死昏沉不省人事口噤不可進藥急以生半夏爲末吹入鼻中或用細辛皂角爲末吹入喉噴嚏則甦此可以驗其受病深淺則知其可治不可治若稍得甦省者八味順氣散便服治風藥然未遽絕治氣藥小續命湯煎熟去查調蘇合香丸一粒或五積散加麝香少許或星香散或醒風湯加木香一錢如服前藥不效其人頑涎愈盛或前證不解或增困重宜星附湯或三生飲加全蠍三箇間磨沉香湯下養正丹肥人多有中病以其氣盛於外而歉於內也肺爲氣出入之道人肥者氣必急氣急必肺邪盛肺金尅木膽爲肝之腑故痰涎壅盛所以治之必先理氣爲急中後氣未盡順痰未盡除調理之劑惟當以藿香正氣散星香散煎服此藥非特可治中風之證治中氣中惡霍亂尤宜尋常嘔吐腹疼多痰者亦可用之若中後體虛有痰不可峻補熱燥者宜四君子湯和星香飲或六君子湯和之中而口眼喎斜者先燒皂角煙熏之以逐去外邪次燒乳香熏之以順其血脈若前證多怒宜小續命湯加羚羊角熱而渴者小續

命湯去附子加秦艽半錢恍惚錯語者加茯神遠志各半錢不得睡者加炒酸棗仁半錢不能言者加竹瀝一蜆殼許人虛無力者去麻黃加茯苓如其數

感冒後四逆手足不遂牙關緊急與霍亂後四逆手足搐搦欲成風者草果飲和星香散各半貼煎服

有無故口眼喎斜投以中風藥劑不效蓋緣骨虛中受風所致當於此求之不可例作尋常中風治之川烏一味決不可少宜炮熟用

病有終身不愈者其在腰或屈而不能伸或伸不能屈者在手足亦然以風傷肝肝主筋筋爲之也治法活血爲先多服四物湯吞活絡丹

風有偏枯風痱風懿風痹此皆言其至重也外有證狀不同其名亦衆非旦暮可愈非口耳可授不復繁引若中風人髮直吐清沫搖頭上瘋面赤如粧汁綴如珠或頭面赤黑眼閉口開手撒遺尿聲如鼾睡皆不可治所謂風中脈則口眼喎斜中腑則支體廢中臟則性命危不特中風他中亦然

有虛熱生風元氣虛則風乘之治虛當兼治風有虛證似風當治其虛不可以風論

中風而疼痛甚者或在遍身或在手足惟鐵彈丸佳

如碧霞丹青州白丸子防風丸犀角丸八風散骨碎丸烏荊丸大三五七散四生散省風湯五痹湯四生丸輕脚丸伏虎丹祕方換腿丸左經丸木瓜丸胡麻散皆治諸中風斟酌病源而用治效方藥

樓英醫學綱目

論中風

中風世俗之稱也其證卒然仆倒口眼喎斜半身不遂或舌强不言脣吻不收是也然名各有不同其卒然仆倒者經稱爲擊仆世又稱爲卒中乃初中風時如此也其口眼喎斜半身不遂者經稱爲偏枯世又稱爲左癱右瘓及腫腿風乃中倒後之證邪之淺者如此也其舌强不言脣吻不收者經稱爲痱病世又稱爲風懿風氣亦中倒後之證邪之深者如此也東垣以邪淺爲中脈中腑而易治邪深爲中臟而難治者得之矣凡病偏枯必先仆倒故內經連名稱爲擊仆偏枯也後世遂失經意以偏枯痱病之旨一以中風名之遂指偏枯爲枯細之枯而非左癱右瘓之證習俗之弊至於如此也殊不知仲景云骨傷則痿名曰枯蓋痿緩不收則筋骨氣肉無氣以生脈道不利手足不稟水穀之氣故曰枯非細之謂也或積日累月漸成細者間有之非可便指枯爲細也

仲景云夫風之爲病當半身不遂或但臂不遂者此爲痹脈微而數中風使然無擇諸方論中所謂左癱右瘓者蓋邪氣中人邪氣反緩正氣即急正氣引邪喎僻不遂也風懿者以心悶悶不能言但噫噫作聲蓋肺氣入心則不能言邪中心肺涎潮昏塞故使然也四肢緩縱爲風痱者以風涎散注於關節氣不能行故使四肢不遂也舌强不能言者以風入心脾經心之別脈系於舌本脾之脈俠咽連舌本散舌下今風涎入其經絡故舌不轉而不能言也四肢拘攣者以中風冷邪氣入肝臟使諸經攣急屈而不伸也風柔者以風熱入於肝臟使諸經張緩而不收也故經曰寒則攣急熱則弛張風顫者以風入於肝臟經絡上氣不守正位故使頭招面搖手足顫掉也風瘖者以風冷之氣客於中滯而不能發故使口噤不能言也與前所謂涎塞心肺同候此以口噤爲差耳腫腿風者半身不遂失音不語臨事不前亦偏中於心肺經所致也已上皆言風從外入者也

初中倒時隨即醒者宜治若不醒者宜招人中至醒若痰涎壅盛宜吐之口噤者亦宜吐之若口開手撒遺尿者爲陽暴絕速宜大料參芪補接之若眼戴上者宜灸之

風病口開手撒眼合遺尿鼻聲如鼾者五臟氣絕也蓋口開心絕手撒脾絕眼合肝絕遺尿腎絕聲如鼾肺絕也若見一證可用工若面赤時黑主陽上散腎水反尅心火兼遺尿口開氣喘者斷不救也

五臟氣絕速宜大料參芪煎濃湯灌之及臍下大艾灸之亦可轉死廻生也

潔古言中臟者大小祕澀東垣言中腑者有便溺阻隔二說當以東垣爲主蓋大小祕結不中臟者亦有之中臟者亦有大小便不祕結者也

丹溪中風不可與痿同治諸論蓋因局方治中風盂浪用發表行濕之藥戕賊血氣誅伐根本不知補養之法故引痿病以救局方之失而其言如此然局方所述中風足手不隨起便須人神魂恍惚不語語澀等證即內經熱病相同至於異處不得不察針經刺節眞邪云眞氣去邪獨留發爲偏枯痿論云陽明虛則宗筋縱帶脈不引而足痿不用由是知手足不隨者在偏枯則手足爲邪氣阻塞厥道而然在痿病則陽明虛宗筋縱帶脈不引而然也痱病有言變志亂之證痿病則無之也痱病又名風痱而內傷外感兼

備痿病獨得於內傷也痱病發於擊仆之暴痿病發於忘情之漸也凡此皆明痱與痿明是兩疾也

凡治中風莫如續命之類然此可扶持初病若要收全功火艾爲良中風皆因脈道不利血氣閉塞也灸則喚醒脈道而血氣得通故收全功

凡中風續命排風風引竹瀝諸湯及神精丹茵芋酒之類更加以灸無不愈者然此疾聚積之久非一日所能攻宜大劑久而取效唐書載王太后風痺不語醫者蒸黃芪防風湯數斛以熏之得瘥蓋此類也今人服三五盞求效則責醫也亦速矣孟子曰七年之病必求三年之艾久而後知爾

偏枯

偏枯證半身不遂者用追風散吐之諸風掉搖目直不知人事便可用懸頭膏吐涎立效諸厥氣中風不省人事便用神聖散鼻內灌之吐出涎立效吐後汗下之效三法俱用之者乃上古高醫神妙莫測今庸下之流只有諸方不知治法不識源流不行聖人法去聖日淺遠矣可惜悲哉

痱廢也痱即偏枯之邪氣深者痱與偏枯是二疾以其半身無氣榮運故名偏枯以其手足廢而不收或名痱或偏廢或全廢皆曰痱也

刺節眞邪篇論中風之淺深也其偏枯身偏痛而言不變志不亂者邪在分腠之間即仲景東垣所謂邪中腑是也痱病無痛手足不收而言痞志亂者邪入於裏即仲景東垣所謂邪中臟是也

偏枯證內傷外感相兼而成也至於河間東垣丹溪則專主內傷仲景陳無擇孫思邈則專主外感今詳偏枯邪淺者宜瀉外感爲主補內傷佐之痱病邪深者宜補內傷爲主瀉外感佐之也

語澀

運氣語澀皆屬風經云厥陰司天風淫所勝民病舌本強是風氣勝也又云厥陰司天主脒則舌難以言是風氣虛也

口眼喎斜

凡半身不遂者必口眼喎斜亦有無半身不遂之證而喎斜者故另附之

運氣口眼喎斜者多屬胃土風木不及金乘之土寡於畏也經云木不及曰委和委和之紀其動緩戾拘緩又云厥陰所至爲痙蓋緩縮短也木不及則金化縮短乘之以勝木之條達也戾者口目喎斜也拘者筋脈拘強也木爲金之縮短牽引而喎斜拘強也緩者筋脈縱也木爲金乘則土寡於畏故土兼化緩縱於其空隙而拘緩者自緩也故口目喎斜者多屬胃土有痰治法宜辛溫瀉金之短縮平土之濕痰也

口目喎斜之證大率在胃而有筋脈之分經云足之陽明手之太陽筋急則口目爲僻皆急不能卒視此胃土之筋爲喎斜也經云胃足陽明之脈挾口環脣所生病者口喎脣胗此胃土之脈爲喎斜也

內經治口眼喎斜多屬足陽明筋病蓋足陽明筋結頰上得寒則急得熱則弛左寒右熱則左頰筋急牽引右之弛者而喎向左也右寒左熱則右頰筋急牽引左之弛者而喎向右也故其治法宜火灸且爲之膏油熨其急者以白酒調和桂末塗其弛者又以桑爲鉤鉤其口吻之喎僻處使正平而高下相等復以木調生桑灰於鉤柄之坎縫處連頰途之以收其弛兼飲美酒啖美肉使筋脈和氣以助外之塗熨不飲酒者自強其筋骨以手拊拍其急處使證自去也

王綸明醫雜著

問答

問左手臂攣縮不能伸舉手指拳縮肩背重墜有似筋牽引作痛伸縮間骨節處筋作痛左手大指中指常欲反張難屈左手指掌時常作麻指縫近掌處但覺有物夾於其間左足底近前高突處如腫硬急脹摸之無形步履時只如多一氈墊者語言短澀拜起頭運口眼喎斜舌根痰繞胃膈痰礙咽中有痰核左肋下有痰不時打寒噤嘔噴呵欠便牽動手足之病左耳左面左體使手或粗衣摸擦則皮膚痛左腮左項左脅肋皆時常木而急如有物粘貼其上左體或頭項或手足作癢左眼時常有淚流凝不乾左口角似覺縫左面上似蟻蟻遊行被風吹襲左鼻孔清涕出即打噴噴等證答曰大經小絡貫串一身謂之脈脈者血之隧道也血隨氣行周流無停筋者周布四肢百節聯絡而束縛之此屬肝木得血以養之則和柔緩而不急脈皆起於手足指端故十二經皆以手足名之而筋則無處無之皮毛者屬肺主外而易於感冒人身之血行於脈絡而外充於皮毛滲透肌肉滋養筋骨故百體和運動無礙若氣滯則血滯氣逆則血逆得熱則瘀濁得寒則凝泣衰耗則運行不周滲透不徧而外邪易侵矣津液者血之餘行乎脈外流通一身如天之清露若血濁氣滯則凝聚而爲痰痰乃津液之變如天之露也故云痰遍身上下無處

不到蓋卽津液之在周身者津液生於脾胃水穀所乘濁則爲痰故痰生於脾土也所以古人論中風偏枯痲木痠痛不舉諸證以氣虛死血痰飲爲言是論其致病之根源至其得病則必有所感觸或因風或因寒或因濕或因酒或因七情或勞力勞心房勞汗出因感風寒濕氣遂成此病是血病痰病爲本而外邪爲標其病中於皮毛血脉經絡肌肉筋骨之間而未入臟腑故邪在皮毛肌肉則不知痛癢痲木不仁如有物重貼於上或如蟲行或洒洒寒慄或腫脹或自汗遇熱則或癢遇陰虛則沉重痠痛邪入血脉經絡則手足指掌肩背腰膝重硬不遂難於屈伸舉動或走注疼痛所陳諸證皆外自皮毛以至筋骨之病凡脉所經所絡筋所會所結血氣津液所行之處皆疑滯鬱遏不得流通而致然也亦何必一一强度某病屬某經某病屬某臟而雜治之哉若邪入臟腑則爲危病而難於用藥東垣論之明矣經云知其要者一言而終不知其要流散無窮此之謂也

註　按難經云邪在氣氣爲是動邪在血血爲所生病經云陽之氣以天地之疾風名之此風非外來風邪乃本氣病也故諸方多言皆由氣體虛弱榮衛失調或七情過度以致眞氣耗散腠理不密邪氣乘虛而入及其中也在左半體者肝腎所居之地肝主筋腎主骨肝藏血腎藏精精血枯槁不能滋養故筋骨偏廢而不用也河間曰風病多因熱甚俗云風者言未而忘其本也經云汗出偏沮使人偏枯如樹木一枝津液不到則此枝枯槁被風所害由此觀之實因肝腎二經精血枯槁之所致也前證云云亦當察其形證審其兼變而治之尤不可泥執於風經曰三陰三陽發病爲偏枯痿易四肢不舉亦未嘗必指於風也其眞中者當辯其中臟中腑而治之眼瞤者中於肝舌不能言者中於心脣緩便祕者中於脾鼻塞者中於肺耳聾者中於腎此五者病漸多爲難治中血脉者外無六經之形證內無便溺之阻隔肢不能舉口不能言用大秦艽湯主之中腑者多兼中臟如左關脉浮弦面目青左脅偏痛筋脉拘急目瞤頭目眩手足不收坐臥不得此中腠兼中肝也用犀角散之類如左寸脉浮洪面赤汗多惡風心神顚倒言語蹇澁舌强口乾忪悸恍惚此中小腸兼中心也用麻黃散之類如右關脉浮緩或浮大面脣黃汗多惡風口喎語澁身重怠惰嗜臥肌膚不仁皮肉瞤動腹脹不食此中胃兼中脾也用防風散之類如右寸脉浮濇而短必鼻流清涕多喘胃中冒悶短氣自汗聲嘶四肢痿弱此中大腸兼中肺也用五味子湯之類如左尺脉浮滑面目黧黑腰脊痛引小腹不能俯仰兩耳虛鳴骨節疼痛足痿善恐此中膀胱兼中腎也用獨活散之類此皆言眞中風之證治也其間亦有氣血之分焉氣虛而中者右手足不仁用六君子湯加釣藤薑汁竹瀝血虛而中者左手足不仁用四物湯加釣藤竹瀝薑汁氣血俱虛而中者左右手足皆不仁用八珍湯加釣藤薑汁竹瀝其與中風相類者不可不別如中於寒謂冬月卒中寒氣昏冒口噤肢攣惡寒脉浮緊用麻黃桂枝理中湯之類中於暑謂夏月卒冒炎暑昏冒痰厥吐瀉喘滿用十味香薷飲之類中於濕丹溪所謂因濕土生痰痰生熱熱生風也用清燥湯之類加竹瀝薑汁因於火者河間謂五志過極火盛水衰熱氣怫鬱昏冒而卒仆也用六味丸四君子湯獨參湯之類內有恚怒傷肝陰火上炎者用小柴胡湯之類中於氣者由七情過極氣厥昏冒或牙關緊急用蘇合香丸之類食厥者過於飲食胃氣不能運行故昏冒也用六君子加木香勞傷者過於勞役耗損元氣脾胃虛衰不任風寒故昏冒也用補中益氣湯房勞者因腎虛耗氣不歸源故昏冒也用六味丸此皆類於中風者也夫中風者內經主於風此眞中風也若河間主於火東垣主於氣丹溪主於濕皆是因火因氣因濕而爲暴病暴死之證類中風而非眞中風也治者審之卒中昏憒口眼喎斜痰氣上湧咽喉有聲六脉沉伏此眞氣虛而風邪所乘以三生飲一兩加人參一兩煎服卽甦若遺尿手撒口開鼾睡爲不治用前藥亦有得生者三生飲乃行經絡治寒痰之藥有斬關奪旗之功每服必用人參兩許以祛其邪而補助眞氣否則不惟無益適足以取敗矣觀先哲用芪附參附等湯其義可見

問兩腿自膝以下或時內熱或骨中覺熱或有一點痠痛熱者何答曰此血熱也但是風病其血必熱惟其血熱故風寒之氣一襲之則外寒束內熱而爲痛丹溪論痛風謂血熱得寒汚濁凝滯所以作痛遇夜痛甚行於陰也遇風雨陰寒痛甚寒濕勝也又風病必血燥風木生火故血熱而燥

註按前論最爲切當臨川陳先生云醫風先醫血血行風自滅蓋肝藏血而主風又肝氣爲陽爲火肝血爲陰爲木若肝火旺則肝血必虛故風病多因肝經風火爲患當推五臟相勝相生以益其血經云腎藏精而主骨故腎虛者則骨中熱或湧泉穴或兩膕兩足內熱多患骨痿以致不起屬足三陰虧損之虛熱耳滋其化源庶可保生

問有醫教以四物湯二陳湯間服後惑於南星半夏不可輕服之言二陳通不入口專用四物而痰藥亦少用枳朮丸可專服否答曰此少差耳用血藥而無行痰開經絡達肌表之藥以佐之血藥屬陰性頗凝滯焉能流通經絡驅逐病邪以成功也故古人以烏頭爲半身不遂行經絡者此也蓋風疾原於血虛血熱挾火與痰經絡肌表之間病根在矣後因感冒涼風寒氣或因過飲助痰火或因惱怒逆肝氣遂成半身不遂之證世謂之風病其病成於肌表皮毛筋骨經絡之間未入五臟六腑故治之亦兼在外而不專於內若只用四物湯是專補內也此病之痰亦在經絡若只用枳朮丸是亦專治內也須補養其內以固本攻治其外以去邪斯爲可耳

註按前證若因腎虛陰火而肝燥者宜用六味地黃丸生腎水滋肝血若因怒動肝火而血耗者用四物加柴梔丹皮茯苓以清肝火生肝血若因脾經鬱結而血耗者用歸脾四物二湯以補脾氣生肝血若脾氣虛而痰滯者用二陳加白朮柴胡健脾氣以化痰若因脾虛濕而風痰不利者用二陳加南星蒼朮防風勝濕以化痰脾經濕而爲痰者用二陳加白朮防風脾氣鬱而滯者用歸脾湯加柴胡半夏腎經敗液而爲痰者用六味丸

問或謂二陳湯南星半夏一切燥藥止能治痰飲濕痰其於陰虛火動之痰殊無相干且與補陰藥相反答曰陰虛火動之痰不宜用南星半夏若中風偏枯癱木證之痰必用南星半夏也蓋其感病在肌表經絡筋骨之間耳

註按丹溪云痰病之原有因熱而生痰者亦有因痰而生熱者有因風寒暑濕而得者有因驚而得者有因氣而得者有因食積而得者有脾虛不能運化而生者若熱病則多煩熱風痰多成癲癎奇證冷痰多成骨痹濕痰多怠惰軟弱驚痰多成心痛癲疾飲痰多脅痛臂痛食積痰多成癖塊痞滿其病難名竊謂前證若因腎水虛弱陰虧難降使邪木上溢故多痰唾宜滋其化源其痰自消若因肝木侮脾土而風痰壅滯者先用南星半夏清其痰後用六君之類調胃氣痰自不生若槩用風藥耗其陽氣而絕陰血之源適以成其風益其病也風證可灸手上如肩窩曲池合谷等是也口歪斜可灸夾車承漿口面上艾炷須小手足上則可粗也灸火須自上灸下不可先灸下後灸上

面上木處可將桂枝爲末用牛皮膠和少水化開調敷之厚一二分

註按前證若屬肺氣虛弱者補脾土如不應則補其土母

脚底硬木處可將牛皮膠溶化入生薑眞汁調和仍入南星末五錢和勻用厚紙攤貼二三分乘半熱裹貼脚底上用溫火烘之此外治法也膠和薑汁方出內經用治脾病謂風寒濕三氣合而成痹客於皮膚肌肉之間不知痛癢但不仁如木耳後人治腰硬作痛及手足痹木而兼痛者加入乳香沒藥或加羌活南星末用之多效煎調要得法則如膏藥在手足腰者用熱鞋底熨之

註經云風寒濕三氣雜至合而爲痹風氣勝者爲行痹寒氣勝者爲痛痹濕氣勝者爲著痹丹溪云大率因血虛受熱其血已自沸騰或加之以涉水寒濕熱血得寒汚濁凝滯不得運行所以作痛治以辛溫佐以辛凉流散寒濕開通鬱結血行氣順無有不安若因足三陰虧損當補元氣爲主

敷貼是治皮膚肌肉針灸是治血脈經絡滋血是兼治筋骨筋骨無血則不任矣

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百三十九卷目錄

醫部彙考二百十九

風門三

方賢奇效良方 風論
李中梓醫宗必讀 總論 口噤 不語 手足 不隨 自汗 半身不遂 口眼喎斜 小便不利 遺尿 多食 痰涎 壅盛 身痛 昏冒 豫防
張三錫醫學準繩六要 豫防
薛己醫案 治法
王肯堂證治準繩 分別陰陽
趙獻可醫貫 中風要旨
喻昌醫門法律 中風緒論 左右往還論 風痱 風懿 律五條

藝術典第二百三十九卷

醫部彙考二百十九

風門三

明方賢奇效良方

風論

謹按玉機眞藏曰風者百病之長也風之爲病善行而數變者也金匱論曰天有八風經有五風八風發邪以爲經風觸五臟邪氣發動且八風之名偏風腦風目風漏風內風首風腸風泄風此八風者皆中臟腑者言之以五音宮商角徵羽應乎五臟所感不同其疾大同小異岐伯曰風名有四一曰偏枯半身不遂口眼喎斜肌肉偏而不用且痛言不變智不亂病在分腠之間二曰風痱者身無疼痛四肢不收智亂不甚言微有知可治甚則不能言不可治內經脉解論曰內奪而厥則爲瘖痱此因腎虛所致瘖痱之狀舌瘖不能語足廢不爲用蓋腎脉挾舌本故不能言而爲瘖腎脉循陰股內廉斜入膕中循胻骨內廉及內踝後入足下腎氣不順故發而爲痱三曰風懿者一旦奄忽不知人事痰涎上迷心竅咽中窒塞舌强不語牙關不開手足拘攣氣不升降病在臟腑故風中臟則性命危中腑則肢體廢矣四曰風痹者脈浮而緩筋骨痿弱肢體麻痹不仁又有飲酒中風謂之漏風則身熱懈惰汗出少氣謂酒所以養陽酒入於胃與穀氣相搏熱盛於中其氣慓悍陽氣俱泄腠理疎風邪入以中之證似風懿其脈短而滑或洪而數內熱外汗法當清解消痰祛風及其內風名曰勞風由房勞虛損眞氣內虧風邪從此入病之所由皆從此始但髮直吐沫遺尿失禁口開眼合鼻鼾手撒搖頭上竄面赤如粧或頭面青黑汗綴如珠昏不知人皆爲不治風證多端所感各異臨病詳辨察脈觀形對證用藥故風者清淨則肉腠閉拒雖有大風苛毒弗之能害此因時之序也尤當切脈究之風以散之寒以溫之實以竭之虛以補之熱以凉之痰以越之又有中氣與中風相類語言蹇澀涎潮昏塞不知人事牙關緊急但手足不偏廢爲異耳大凡治中風之藥必先順氣後以疎風其功可獲若中風妄用風藥其悞豈淺鮮哉此病皆由七情不調氣鬱所致以富貴汲汲貧賤戚戚久思不遂鬱鬱而不得志者成此中氣之疾所用之劑調降其氣自然平復經云暴喜傷陽暴怒傷陰憂思不樂遂名厥逆此之謂也夫中風中氣何以別之當辨其脈若浮盛而弦緊或浮而洪斯爲風也脈沉而伏者爲中氣治中氣氣多風少先以蘇合香丸薑汁磨化擦牙通竅人事漸甦然後徐徐灌服看其虛實若虛則補若實則瀉寒則溫熱則清切其脈理察病詳細用藥主治無不效矣若一槩作風治之則愈傷脾氣所悞在反掌之間經云無故而得瘖脈不至者不治此爲寒氣暴逆故也俟其氣復則已切不可便用疏風泄氣之劑悞人性命醫工不諳是理反加發散導散眞氣虛邪愈作遂致不療可不痛哉

李中梓醫宗必讀

總論

凡中風昏倒先須順氣然後治風用竹瀝薑汁調蘇合香丸如口噤抉開灌之如抉不開急用牙皂生半夏細莘爲末吹入鼻內有嚏可治無嚏則死最要分別閉與脫二證明白如牙關緊閉兩手握固卽是閉證用蘇合香丸或三生飲之類開之若口開心絕手撒脾絕眼合肝絕遺尿腎絕聲如鼾肺絕卽是脫證更有吐沫直視肉脫筋骨痛髮直搖頭上竄面赤如妝汗出如珠皆脫絕之證宜大劑理中湯灌之及灸臍下雖曰不治亦可救十中之一若誤服蘇合香丸牛黃至寶之類卽不可救矣蓋斬關奪門之將原爲閉證設若施之脫證如人既入井而又下之石也世

人蹈此弊而死者不可勝數故特表而出之惟中臟之證是閉而非脫者宜蘇合香丸牛黃丸至寶丹活命金丹之類若中腑與中血脈之證斷不宜用爲內有麝香入脾治肉牛黃入肝治筋龍腦入腎治骨恐反引風邪深入骨髓如油入麪莫之能出

口噤

手三陽之筋結入於頷頰足陽明之筋上挾於口風寒乘虛入其筋則攣故牙關急而口噤也秦艽升麻湯或用甘草二段每段長一寸炭火上塗麻油炙乾抉開牙關令咬定約人行十里許又換甘草一段然後灌藥極效或以蘇合香丸擦牙或南星冰片擦之

不語

脾脈絡胃挾咽連舌本散舌下心之別脈系舌本心脾受風故舌强不語亦有因腎脈而上循喉嚨挾舌本者喉嚨者氣之所以上下會厭者音聲之戶舌者聲之機脣者聲之扇風寒客於會厭故卒然無音若因痰迷心竅當清心火若因濕痰當清肺熱若因風熱當清肝火若因風痰當導痰涎若因虛火上炎當壯水之主若因虛寒厥逆當益火之原神仙解語丹滌痰湯加味轉舌膏八味丸隨證選用或取龜尿少許點舌神效取龜尿法置龜於新荷葉上以猪鬃鼻內戳之立出

手足不隨

手足不隨肌膚盡痛諸陽之經皆起於手足而循行於身體風寒客於肌膚始爲痹復傷陽經隨其虛處而停滯與血氣相搏故風痹而手足不隨實者脾土太過當瀉其濕虛者脾土不足當補其氣血枯筋急者四物湯木旺風淫者四物湯加鉤藤秦艽防風痰多者六君子加秦艽天麻竹瀝薑汁

自汗

風多者桂枝湯若表虛者玉屏風散陽氣虛者芪附湯若兼盜汗者補中益氣送六味地黃丸或當歸六黃湯

半身不遂

譬如樹木或有一邊津液不蔭注而枝葉偏枯故知偏枯一證皆由血氣不周經曰風氣通於肝風搏則熱盛熱盛則水乾水乾則氣不榮精乃亡此風病之所由作也故曰治風先治血血行風自滅古方有順風勻氣散虎骨散虎脛骨酒外用蠶砂二石分作三袋蒸熱著患處冷再易以瘥爲度內用羊脂入粳米葱白薑椒豉煑熟日食一具十日止大效

口眼喎斜

口眼喎斜多屬胃土而有筋脈之分經云足之陽明手之太陽筋急則口目爲僻眥急不能卒視此胃土之筋病也又云足陽明之脈挾口環脣此胃土之脈病也夫口目常動故風生焉耳鼻常靜故風息焉先燒皂角熏之以逐外邪次燒乳香熏之以順血脈酒煎桂枝取汁一椀軟布浸收左喎搨右右喎搨左服清陽湯秦艽升麻湯或二方合用外感加葱白

小便不利

中風小便不利不可以藥利之自汗則津液外亡小便自少清熱止汗小便自行也

遺尿

遺尿多屬氣虛宜參芪湯少加益智頻頻啜之

多食

風木盛則尅脾脾受尅求助於食當瀉肝理風以安脾脾安則食自如常也

痰涎壅盛

痰涎壅盛宜用吐法稀涎散或橘紅一斤逆流水七椀煎至二椀頓服白湯導之吐痰之勝藥也二陳湯星香散加竹瀝薑汁虛者六君子同星香散脈沉伏無熱者三生飲加全蠍一箇養正丹可以墜下痰涎鎮安元氣

肥人多中氣盛於外而歉於內也人肥必氣急而肺盛肺金尅肝木故痰盛治法以理氣爲急

身痛

中腑者多身痛爲風氣所束經脈不和宜鐵彈丸虛寒者十味剉散

昏冒

心神不足痰滯於心包絡宜至寶丹或牛黃清心丸

豫防

寶鑑云凡大指次指痲木或不用者三年中有中風之患宜服愈風湯天麻丸薛立齋云豫防者當養氣血節飲食戒七情遠幃幕若服前方適所以招風取中也

張三錫醫學準繩六要

預防

病之生也其機甚微其變甚速達士知機思患而預防之庶不至於膏肓即中風證必有先兆中年人但覺大拇指時作痲木或不仁或手足少力或肌肉微掣三年內必有暴病急屏除一切膏粱厚味鵝肉麪

酒肥甘生痰動火之物卽以搜風順氣丸或滾痰丸防風通聖散時服之及審氣血孰虛因時培養更遠色戒性清虛靜攝乃得有備無患之妙肥人更宜加意愼口絕慾人參湯加竹瀝煎膏日不啜口方是辭己醫案

治法

中風若因腎虛陰火而肝燥者宜用六味地黃丸生腎水滋肝血若因怒動肝火而血燥者用四物加柴梔丹皮茯苓以清肝火生肝血若因脾經鬱結而血耗者用歸脾四物二湯以補脾氣生肝血若脾氣虛而痰滯者用二陳加白朮柴胡健脾以化痰若因脾虛濕而風痰不利者用二陳加南星蒼朮防風勝濕以化痰若脾經鬱而滯者用歸脾湯加柴胡半夏若腎經敗液爲痰者用六味丸

王肯堂證治準繩

分別陰陽

陰中顏青臉白痰厥喘塞昏亂眩運喎斜不遂或手足厥冷不知人多汗

陽中臉赤如醉善怒牙關緊急上視强直掉眩素問云諸風掉眩支痛强直筋縮爲厥陰風木之氣自大寒至小滿風木君火二氣之位風主動善行數變木旺生火風火屬陽多爲兼化且陽明燥金主於緊斂縮勁風木爲病反見燥金之化由亢則害承乃制謂己過極則反似勝己之化故木極似金兒風能勝濕而爲燥風病勢甚而成筋縮燥之甚也

有熱盛生風而爲卒仆偏枯者以麻桂烏附投之則殆當以河間法治之紺珠經云以火爲本以風爲標心火暴甚腎水必衰肺金旣摧肝木自旺治法先以降心火爲主或清心湯或瀉心湯大作劑料服之心火降則肝木自平矣次以防風通聖散汗之或大便閉塞者三化湯下之內邪已除外邪已盡當以羌活愈風湯常服之宣其氣血通其經絡病自已矣或舌蹇不語者轉舌膏或活命金丹以治之此聖人心法也或有中風便牙關緊急藥粥不入急以三一承氣湯灌於鼻中待藥下則口自開矣然後按法治之有元氣素弱或過於勞役或傷於嗜慾而卒然厥仆狀類中風者手必撒口必開非大劑參芪用至斤許豈能回元氣於無何有之鄉哉亦有不仆而但舌强語澀痰壅口眼喎斜肢體不遂者作中風治必殆以六君子湯加諸汁治之

趙獻可醫貫

中風要旨

王安道論昔人三子之言甚妙但類中風與眞中風並論無輕重緩急之分亦不能無弊愚意邪之所湊其氣必虛內傷者間而有之間字當專指虛不必兼風河間東垣發前人所未發至精但有論無方後人何所依從而彥修以陰虛立論亦發前人所未發惜乎以氣血濕痰爲主而不及眞陰不能無遺弊焉觀東垣中風非外來風邪乃本氣自病之論當以氣虛爲主縱有風邪亦是乘虛而襲經曰邪之所湊其氣必虛是也當此之時豈尋常藥餌能通達於上下哉急以三生飲一兩加人參一兩煎服卽甦夫三生飲乃行經治痰之劑斬關奪旗之將每服必用人參兩許駕馭其邪而補助眞氣否則不惟無益適以取敗觀先哲用芪附參附其義可見矣若遺尿手撒口開鼾睡爲不治然用前藥多有得生者不可不知

觀劉河間論中風非外中之風由將息失宜火盛水衰則陰虛陽實而卒倒無知之說則以風爲末而以火爲本世之尊劉氏者專以劉氏主火之說殊不知火之有餘水之不足也劉氏原以補腎爲本觀其地黃飲子之方可見矣故治中風又當以眞陰虛爲本但陰虛有二有陰中之水虛有陰中之火虛火虛者專以河間地黃飲子爲主水虛者又當以六味地黃爲主果是水虛辛熱之藥與夫參芪之品俱不可加河間東垣專治本而不治風可爲至當之論學者須以陰虛陽虛爲主自後世醫書雜出致後學狐疑不決丹溪曰有氣虛有血虛有濕痰左手脈不足及左半身不遂者以四物湯補血之劑爲主而加以竹瀝薑汁右手脈不足及右半身不遂者以四君補氣之劑而佐以竹瀝薑汁如氣血兩虛而挾痰盛者以八物爲主而加南星半夏竹瀝薑汁之類丹溪之論平正通達宜世之人盛宗之但持此以治中風而多不效久而必斃何也蓋治氣血痰之標而不治氣血痰之本也人之有是四肢也如木之有枝幹也人之氣血榮養乎四肢也猶木之以水灌溉乎枝葉也木有枝葉必有根本人之氣血豈無根本乎人有半身不遂而遷延不死者如木之根本未甚枯而一邊之枝幹先萎耳人有形容肥壯忽然倒仆而卽斃者如木之根本已絕其枝葉雖滋榮猶枯槁生華何可久也忽遇大風而摧折矣觀此則根本之論明矣然所謂氣血之根本者何蓋火爲陽氣之根水爲陰氣之根

而火與水之總根兩腎間動氣是也此五臟六腑之本十二經之源呼吸之門三焦之根又名守邪之神經曰根於中者命曰神機神去則機息根於外者名曰氣立氣止則化絕今人縱情嗜慾以致腎氣虛衰根先絕矣一或內傷勞役或六淫七情少有所觸皆能卒中此陰虛陽暴絕也須以參附大劑峻補其陽繼以地黃丸十補丸之類塡實眞陰又有心火暴甚腎水虛衰又兼之五志過極以致心神昏悶卒倒無知其手足牽掣口眼喎斜乃水不能榮筋筋急而縱也俗云風者乃風淫末疾之假象風自火出也須以河間地黃飲子峻補其陰繼以人參麥冬五味之類滋其化源此根陽根陰之至論也若夫所謂痰者凡人將死之時必有痰何獨中風爲然要之痰從何處來痰者水也其原出乎腎張仲景曰氣虛痰泛以腎氣丸補而逐之觀此凡治中風者既以前法治其根本則痰不治而自去矣若初時痰涎壅盛湯藥不入少用稀涎散之類使咽喉疏通能進湯液卽止若欲必盡攻其痰頃刻立斃矣戒之哉戒之哉

或問人有半肢風者必須以左半身屬血右半身屬氣豈復有他說乎曰未必然人身劈中分陰陽水火男子左屬水右屬火女子左屬火右屬水男子半肢風者多患左女子半肢風者多患右卽此觀之可見以陰虛爲主又有一等人身半以上俱無恙如平人身半以下軟弱痲痹小便或濇或自遺果屬氣乎屬血乎此亦足三陰之虛證也不可不知

經曰胃脈沉鼓濇胃外鼓大心脈小堅急皆得偏枯男子發左女子發右不瘖舌轉可治三十日起其從者瘖三歲起年不滿二十者三歲死蓋胃與脾爲表裏陰陽異位更實更虛更逆更從或從內或從外是胃陽虛則內從於脾內從於脾則脾之陰盛故胃脈沉鼓濇也濇爲多血少氣胃之陽盛則脾之陰虛虛則不得與陽主內反從其胃越出於部分之外故胃脈鼓大於臂外也大爲多氣少血心者元陽君主宅之生血生脈因元陽不足陰寒乘之故心脈小堅急小者陽不足也堅急者陰寒之邪也夫如是心胃脾三脈凡有其一卽爲偏枯者何也蓋心是天眞神機開發之本胃是穀氣充大眞氣之標標本相得則胷膈間之膻中氣海所留宗氣盈溢分布四臟三焦上下中外無不周徧若標本相失則不能致其氣於氣海而宗氣散矣故分布不周於經脈則偏枯不周於五臟則瘖卽此言之是此一條可爲後之諸言偏枯者綱領也未有不因眞氣不周而死者也

乾坤生氣云凡人有手足漸覺不遂或臂膊髀股指節痲痹不仁或口眼歪斜語言蹇澀或胷膈迷悶吐痰相續或六脈弦滑而虛軟無力雖未至於倒仆其中風運厥之候可指日而決矣須預防之愚謂預防之理當節飲食戒七情遠房事此至要者也如欲服餌預防須察其脈理之虛實如兩尺虛衰者以六味地黃八味地黃切補肝腎如寸關虛弱者以四君子十全大補之類急補脾肺纔有裨益若以搜風順氣及清氣化痰等藥適所以招風取中也不可不知

如正氣不足之證只補正氣不必祛邪如邪氣有餘若痹證之類雖以扶正氣爲主不可不少用祛邪之法如易老天麻丸之類

或曰風淫所勝治以辛凉天麻丸何故反用桂附藥使火盛制金不能平木而風木益甚邪曰此是腎虛眞陰失守孤陽飛越若非桂附何以追復其散失之元陽其痰涎上湧者乃水不歸源也其面赤煩渴者火不歸源也惟桂附能引火歸源故效水火既歸其源則水能生木木不生風而風自息矣

靈樞言足陽明之經其病頰筋有寒則急引頰移口熱則筋弛縱緩不能收故僻是左寒右熱則左急而右緩故偏於左右寒左熱則右急而左緩故偏於右也夫寒不可徑用辛熱之劑蓋左中寒則逼熱於右右中寒則迫熱於左陽氣不得宣行也所謂口之喎灸以地倉目之斜灸以承泣不效當灸人迎夫氣虛風入而爲偏上不得出下不得泄眞氣爲風邪所陷故宜灸經曰陷下則灸之是也

醫門法律 臣喩昌著

中風緒論

中風一證動關生死安危病之重大莫有過此者內經風痹痿厥四證各有顓論獨風論中泛及雜風至論中風惟曰風中五臟六腑之俞亦爲臟腑之風各入其門戶所中則爲偏風不過兩述其名而已後論五臟幷胃腑之風亦但各述其狀而已賴仲景金匱書表章云夫風之爲病當半身不遂或但臂不舉者此爲痹脈微而數中風使然又云寸口脈浮而緊緊則爲寒浮則爲虛寒虛相搏邪在皮膚浮者血虛絡脈空虛賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣卽急正氣引邪喎僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經卽重不勝邪入於腑卽不識人邪入於臟舌卽難言口

流溼沫又云寸口脈遲而緩遲則爲寒緩則爲虛榮緩則爲亡血衛緩即爲中風邪氣中經則身痒而癮疹心氣不足邪氣入中則胃滿而短氣以及五臟風脈死證語語金鍼大有端緒之可求矣仲景已後英賢輩出方書充棟何反漫無取裁坐令中風一證鮮盡一之法治之百不一效昌敢辭不敏逐條引伸內經仲景聖法爲治例而先立論以括其要焉然世咸知仲景爲立方之祖至中風證仲景之方首推侯氏黑散爲主方後人罔解其意也夫八風之邪皆名虛邪人身經絡榮衛素盛者無從入之因其虛而襲之耳內經謂以身之虛而逢天之虛兩虛相感其氣至骨入則傷五臟工候禁之不能傷也又謂賊風數至虛邪朝夕內至五臟骨髓外傷空竅肌膚靈樞亦謂聖人避邪如避矢石是則虛邪之來爲害最烈惟良工知禁之聖哲知避之矣然風爲陽邪人身衛外之陽不固陽邪乘陽九爲易入即如偏枯不仁要皆陽氣虛餒不能充灌所致又如中風卒倒其陽虛更審設非陽虛其人必輕矯便捷何得卒倒耶仲景之謂脈微而數微者指陽之微也數者指風之熾也所出諸脈諸證字字皆本陽虛爲言然非仲景之言而內經之言也內經謂天明則日月不明邪害空竅可見風性善走空竅陽虛則風居空竅漸入腑臟此惟離照當空羣邪始得畢散若胃中之陽不治風必不出矣扁鵲謂虢太子尸厥之病曰上有絕陽之絡下有破陰之紐見五絡之絡於頭者皆爲陽絡而邪阻絕於上其陽之根於陰陰陽相紐之處而正復破散於下故爲是病古人立言之精若此仲景以後醫脈斬焉中斷後賢之特起者如劉河間則主火爲訓是火名風入火爲本風爲標矣李東垣則主氣爲訓是氣名風入氣爲本風爲標矣朱丹溪則主痰爲訓是痰名風入痰爲本風爲標矣然一人之身每多兼三者而有之曷不曰陽虛邪害空竅爲本而風從外入者必挾身中素有之邪或火或氣或痰而爲標耶王安道謂審其爲風則從內經審其爲火爲氣爲痰則從三子徒較量於彼此之間得非無權而執一耶且從三子固各有方論可守從內經果何著落耶中風門中大小續命湯及六經加減法雖曰治風依然後人之法也金匱取古今錄驗續命湯治風痱之身無痛而四肢不收者仲景所重原不在此所重維何則驅風之中兼填空竅爲第一義也空竅一實庶風出而不復入其病瘳矣古方中有侯氏黑散深得此意仲景取爲主方隨製數方輔其未備後人目覩其方心炫其指訖知仲景所爲心折者原有所本乃遵內經久塞其空是謂良工之語耶觀方下云服六十日止藥積腹中不下矣久塞其空豈不彰明較後人以無師之智嬗亂成法中風之初治其表裏風邪非不外出而重門洞開出而復入迺至莫禦者多矣又謂一氣微汗一旬微利要亦五十步之走耳正如築堤禦水一旬一氣正程功課效之日豈有姑且開堤泄水重加版築之理哉是以後人委曲偏駁不似先聖直切精粹諸家中風方論直是依樣葫蘆不足觀矣非然也三人行必有我師況綜列羣方贊其所長核其所短俾學者一簡勘而心地朗然坐進此道用之如鍾離丹熟銅鐵皆金其師資於前賢豈不大耶

中風之脈各有所兼兼則益造其偏然必顯呈於脈蓋新風挾舊邪或外感或內傷其脈隨之忽變兼寒則脈浮緊兼風則脈浮緩兼熱則脈浮數兼痰則脈浮滑兼氣則脈沉濇兼火則脈盛大兼陽虛則脈微亦大而空兼陰虛則脈數亦細如絲陰陽兩虛則微數或微細虛滑爲頭中痛緩遲爲營衛衰大抵陽浮而數陰濡而弱浮滑沉滑微虛散數皆爲中風然虛浮遲緩正氣不足尚可補救急大數疾邪不受制必死無疑若大數未至急疾猶得不死經言風氣之病似七診而非故言不死可見大數爲風氣必有之脈亦未可定爲死脈耳

岐伯謂各入其門戶所中則爲偏風仲景謂風之爲病當半身不遂或但臂不舉者此爲痹脈微而數中風使然門戶指入絡入經入腑入臟言也經言百病之生必先於皮毛邪中之則腠理開開則邪入客於絡脈留而不去傳入於經留而不去傳入於腑廩於腸胃此則風之中人以漸而深其入之門戶未至洞開又不若極虛卒中入臟之緊也仲景會其意故以臂不舉爲痹叙於半身不遂之下謂風從上入臂先受之所入猶淺也世傳大拇一指獨痲者三年內定中風則又其淺者矣然風之中人必從榮衛而入風入榮衛則榮脈改微衛脈改數引脈以見其人必血舍空虛而氣分熱熾風之繇來匪朝伊夕也

內經言偏枯者不一曰汗出偏沮曰陽盛陰不足曰胃脈內外大小不一曰心脈小堅急曰腎水虛靈樞亦叙偏枯於熱病篇中皆不言風皆不言其本於何邪豈非以七情饑飽房室凡能虛其臟氣致榮衛經

脈痹而不通者皆可言邪耶何間主火卽腎水虛陽盛陰不足之一端也東垣主氣卽七情鬱遏之一端也丹溪主痰卽飲食傷脾之一端也一病之中每多兼三者而有之安在舉一以括其他乎經云不能問其虛安問其餘偏枯病陽盛陰不足者有之而陽氣虛衰痹而不通者九多可問其餘

中絡者肌膚不仁中經者軀殼重著中腑卽不識人中臟卽舌難言口流涎沫然中腑必歸胃腑中臟必歸心臟也中絡邪正入衞猶在經脈之外故但肌膚不仁中經則邪入於榮脈之中內而骨外而肉皆失所養故軀殼爲之重著然猶在軀殼之間至入腑入臟則離軀殼而內入邪中深矣腑邪必歸於胃者胃爲六腑之總司也廩於腸胃非舉大小二腸並重蓋風性善行空竅水穀入胃則胃實腸虛風邪卽進入腸中少頃水穀入腸則腸實胃虛風復迸入胃中見胃風必奔迫於二腸之間也風入胃中胃熱必盛蒸其津液結爲痰涎壅塞隧道胃之支脈絡心者纔有壅塞卽堵其神氣出入之竅故不識人也諸臟受邪至盛必迸入於心而亂其神明神明無主則舌縱難言廉泉開而流涎沫也

偏枯病脈之遲緩見於寸口榮衞之行不逮也外則身癢而癮疹內則胃滿而短氣榮脈內外邪氣充斥去腑不遠矣蓋脈之行度一晝一夜復朝寸口榮衞氣衰寸口之脈遲緩不逮身癢癮疹非但風見於外由榮衞氣弱自致津凝血滯也胃滿非獨風見於內由榮衞不行邪混胃中阻遏正氣也榮衞氣衰邪之入腑入臟孰從禁之故以寸口脈辨其息數斯邪入之淺深可得而諦之耳

昔人云中腑多著四肢用一多字明是卜度之辭乃遂執此語以當中腑見證何其疎耶夫四末在軀殼之外非腑也若謂脾主四肢脾更屬臟而非腑矣大抵風淫末疾但是風淫於內毋論中經中腑中臟必四末爲之不用其不專屬中腑明矣然則四肢何以不舉耶人身榮衞正行於軀殼之中者也風入榮衞卽邪氣盛而本氣衰如樹枝得風非搖則折故知四肢不舉者榮衞之氣短縮不行所致也

中臟多滯九竅此亦卜度之辭五臟開竅於眼耳鼻口舌固矣而前後二陰之竅又屬腑不屬臟未可並舉也五臟非一齊俱中但以何竅不利驗何臟受邪差可耳況諸家舍外候別無內諦之法且無畫一之方乎蓋風中入臟關係生死安危辨證既不清用藥自不當故特引內經金匱奧義詳之

風中五臟後世忽略諸家方論無津可問茲會經意以明其治經曰肺中於風多汗惡風時咳晝差暮甚診在眉上其色白此舉其外候也金匱曰肺中風狀口燥而喘身運而重胃虛而腫脹則幷詳其內證矣經曰死肺脈來如物之浮如風吹毛此形其浮散之狀也金匱則曰肺死臟浮之虛按之弱如葱葉下無根者死合沉以徵其浮而臟氣之存否始無疑矣大凡仲景表章內經皆自出手眼以述爲作他臟倣此

夫風既中肺則火熱隨之耗其津液搏其呼吸口燥而喘勢有必至然未入之先已傷及榮衞所主之肌肉水穀所容之胃腑逮風入肺而亂其魄運用之機盡失故身運而重胃虛而腫脹等證互見然臟氣未絕猶屬可生若脈見浮之而虛其臟真欲散可知加以有浮無沉按之弱如葱葉則在上之陽不下入於陰矣其下無根則孤陰且以漸而亡矣內經死陰之屬不過三日而死者正指此等無根之脈而言也

經曰肝中於風多汗惡風善悲色蒼蒼乾善怒時憎女子診在目下其色青金匱曰肝中風者頭目瞤而脅痛行常偃令人嗜甘肝死臟浮之弱按之如索不來或曲如蛇行者死夫風木之臟更中於風風性上搖必頭目瞤動風耗血液必筋脈縱急其死脈浮之弱按之如按索不來則浮沉之間陰陽已見決離或曲如蛇行仍是上下不動惟在中者儘力奔迫皆臟氣垂絕之象也

經曰心中於風多汗惡風焦絕善怒嚊病甚則言不可決診在口其色赤金匱分爲二候其曰心中風者翕翕發熱不能食心中饑食即嘔吐此外因也其曰心傷者勞倦即頭面赤而下重心中痛而自煩發熱當臍跳其脈弦此內因也心死臟浮之實如麻豆按之益躁疾者死夫心臟中風分之爲二者其一以外入之風必從他臟進至心不受邪故也宜隨其臟氣衆去其風其一以七情內傷神明眞陰不守而心火炎上頭目發赤臟眞既從火上炎陰之在下者無陽以舉之則下重其衞外之陽不得入通於心則發熱其受盛之腑臟氣不交鬱而內鼓則當臍跳動死心脈內經形容不一仲景總會大意謂心臟垂絕之脈一舉一按短數而動浮沉不可息數之狀如此

經曰脾中風狀多汗惡風身體怠惰四肢不欲動色薄微黃不嗜食診在鼻上其色黃金匱曰脾中風者

翕翕發熱形如醉人腹中煩重皮目瞤瞤而短氣脾死臟浮之大堅按之如覆杯潔潔狀如搖者死夫風入脾臟爲賊邪外掣皮目內亂意識四肢怠惰形如醉人有必至也加以胃中短氣脾臟之傷已見一班若脈更來去至止不常浮之益大堅是爲獨陽按之潔潔狀如搖是爲獨陰故其動非活動轉非圓轉非臟氣之垂絕而何

經曰腎風之狀多汗惡風面痝然如腫脊痛不能正立其色焰隱曲不利診在肌上其色黑金匱闕此腎死臟浮之堅按之亂如轉丸益下入尺中者死夫面痝然浮腫者腎氣不能鑿封收藏濁氣上干於面也脊痛不能正立者腎間生氣不鼓腰府憊而僂俯與隱曲不利同一源也金匱雖見缺文大要兩腎藏精宅神一身根本多慾致虛風最易入腰曲脊垂舌卷小便不禁皆其候也中腎從來兼此四者本實先撥可知然腎臟眞陽腎基未壞眞陽可居必無死脈若浮之而堅陽已離於陰位按之亂如轉丸則眞陽搏激而出不能留矣若益下入尺中則眞陽先去所餘孤陰亦亂而下趨正所謂陽從上脫陰從下脫也

風中入臟最防迸入於心後世悉用腦麝引風入心尤而效之莫有知其非者茲舉金匱二方以明其治如侯氏黑散治中風四肢煩重心中惡寒不足者外臺用之以治風癲仲景製方皆匠心獨創乃於中風證首引此散豈非深服其長乎夫立方而但驅風補虛誰不能之至於驅之補之之中行其堵截之法則非思議可到方中取用礬石以固澀諸藥使之留積不散以漸填其空竅服之日久風自以漸而熄所以初服二十日不得不用溫酒調下以開其痹著以後則禁諸熱貪惟宜冷食如此再四十日則藥積腹中不下而空竅填矣空竅填則舊風盡出新風不受矣蓋攀性得冷卽止得熱卽行故囑云熱食卽下矣冷食自能助藥力抑何用意之微耶

風引湯治大人風引少小驚癇瘛瘲日數十發醫所不療除熱方可見大人中風牽引少小驚癇瘛瘲正火熱生風五臟亢甚歸迸入心之候蓋驚癇之來初分五臟後迸入心故同治也巢氏用此治脚氣豈非以石性易於下達可勝其濕熱不使攻心乎夫厥陰風木與少陽相火同居火發必風生風生必挾木勢侮其脾土故脾氣不行聚液成痰流注四末因成癱瘓用大黃爲君以蕩滌風火熱濕之邪矣隨用乾薑之止而不行者以補之用桂枝甘草以緩其勢用諸石藥之濟以堵其路而石藥之中又取滑石石膏清金以伐其木赤白石脂厚土以除其濕龍骨牡蠣以收斂其精神魂魄之紛馳用寒水石以助腎水之陰俾不爲陽光所劫更用紫石英以補心神之虛恐主不安則十二官皆危也用此以治入臟之風游刃有餘矣何後世以爲石藥過多舍之不用而用腦麝以散其眞氣花蛇以增其惡毒智耶愚耶吾不解矣

按金匱風引湯當在侯氏黑散之下本文有正氣引邪喎僻不遂等語故卽以風引名之侯氏黑散顧主補虛以熄其風此方兼主清熱火濕以除其風也集者誤次於寸口脈遲而緩下則證與方不相涉矣

風中五臟其來有自臟氣先傷後乃中之火熱氣濕痰虛六賊深入一旦卒倒無知遍身牽引四末不用不死亦成癱瘓何臟先傷調之使平不令迸入於心爲要也夫五臟各藏一神不可傷之經謂神傷於思慮則肉脫意傷於憂愁則肢廢魂傷於悲哀則筋攣魄傷於喜樂則皮槁志傷於盛怒則腰膝難以俛仰是風雖未入臟眞先已傷火熱氣濕痰虛迎之內入多汗惡風等證因之外出治之難矣善治者乘風未入審其何臟先傷何邪徹土網繆最爲扼要之法

中風外證錯見不一風火相煽多上高巔風濕相搏多流四末手足痲木但屬氣虛關節腫痹濕痰凝滯偏正頭痛愈風丹目蜷面腫胃風湯風濕惹苡仁湯排風湯痲木人參補氣湯腫痹舒筋散寒熱似瘧解風爲宜風藏痰隧搜風最當

解風散搜風丸

經絡及腑治分淺深表裏之邪大禁金石

中絡桂枝湯中經小續命湯加減表裏兼治防風通聖散祛風至寶膏攻裏三化湯搜風丸

左癱右瘓風入筋骨宣導其邪緩以圖之

舒筋保安散

卒中灌藥宜用辛香開痰行氣調入蘇合

南星湯調蘇合丸順氣散勻氣散稀涎散

四肢不舉有虛有實陽明虛則宗筋失潤不能束骨而利機關陽明實則肉理緻密加以風邪內淫正氣自不週流也

虛用六君子湯實用三化湯合承氣湯

口眼喎斜邪急正緩左急治左右急治右先散其邪次補其正

左急三聖散右急勻氣散

轉舌正舌方名雖美少陰脈榮舌本三年之艾不言標矣資壽解語俞爲近之

轉舌膏正舌散資壽解語湯

風初入腑肌肉蠕動手足牽强面腫能食胃風宜投胃風湯

風初入臟發熱躁煩先用瀉青兼解表裏次用愈風磨入四白

瀉青丸愈風湯四白丹

養血豁痰枘鑿不入先其所急不宜並施

養血大秦艽湯當歸地黃湯天麻丸豁痰滌痰湯

青州白丸子熱痰竹瀝荊瀝湯貝母苦蘆散陰虛夾痰千金地黃湯

心火內蘊膻中如燔涼膈清心功見一班心血內虧恍惚不寐服二丹丸可以安睡火盛壯水勿辭迂緩

水升火降枯回燥轉

涼膈散清心散二丹丸壯水地黃湯

眞陽上脫汗多肢冷氣喘痰鳴此屬不治黑錫三建引陽回宅水土重封廣漏浴日

黑錫丹三建二香湯

腎水泛痰眞陽未脫治以星附十中九活

星附湯

外風暴發內風易熾熱漬甘寒避居密室毋見可欲毋進肥鮮謹調千日重享天年

世傳中風人每遇外風一發宜進續命湯以禦之殊謬風勢纔定更用續命重引風入添蛇足也惟用甘寒藥頻熱服俾內不召風外無從入之路且甘寒一可息風二可補虛三可久服何樂不用耶

左右往還論

門人問曰半身不遂原有左右之分豈左右分屬之後病遂一往不返予而治之迄無成效何也答曰風與痰之中人各隨所造初無定體病成之後亦非一往不返也蓋有往有復者天運人事病機皆然如風者四時八方之氣從鼻而入乃天之氣也痰者五穀百物之味從口而入脾胃之濕所結乃地之氣也勢本相遼亦嘗相兼似內傷與外感每夾雜易疚故風勝者先治其風痰勝者先治其痰相等則風痰兼治此定法也經云風之中人也先從皮毛而入次傳肌肉次傳筋脈次傳骨髓故善治者先治皮毛其次治肌肉若此乃從右而漸入於左也皮毛肌肉右肺與胃主之筋脈骨髓左肝與腎主之從外入者轉入轉深故治皮毛肌肉不使其深入也又曰濕之中人也先從足始此則自下而上無分於左右但內風素勝之人偏與外風相召內濕素勝之人偏與外濕相召內風之人大塊之噫氣未動而身已先惕內濕之人室中之礎磉未潤而體已先重是以治病必從其類也從外入者以漸而驅之於外從下上者以漸而驅之於下若任其一往不返安貴其治乎又曰從外入者驅而之外從下上者驅而之下聞之令人爽然不識古法亦有合歟曰此正古人已試之法但未挈出則不知作者之意耳如治風用大小續命湯方中桂附芩术麻防等藥表裏龐雜今人見爲難用不知用附桂者驅在裏之邪也用芩术者驅在中之邪也而用麻防等表藥獨多者正欲使內邪從外而出也至於病久體虛風入已深又有一氣微汗一旬微利等法平調半月十日又微微驅散古人原有規則也至於治痰之規則不見於方書如在上者用瓜蒂散梔豉湯等方在左者用龍膽丸在右者用滾痰丸以及虛人用竹瀝達痰丸沉寒錮冷用三建湯之類全無奧義豈得心應手之妙未可傳之紙上耶蓋五味入口而藏於胃胃爲水穀之海五臟六腑之總司人之食飲太過而結爲痰涎者每隨脾之健運而滲灌於經隧其間往返之機如海潮然脾氣行則潮去脾氣止則潮回所以治沉錮之法但取辛熱微動寒凝已後止而不用恐痰得熱而妄行爲害不淺也不但痰得熱而妄行即脾得熱而亦過動不息如潮之有去無回其痰病之決裂可勝道哉從來服峻補之藥者深夜亦欲得食人皆不知其故反以能食爲慶曾不思愛惜脾氣令其晝運夜息乃可有常況人身之痰既繇胃以流於經隧則經隧之痰亦必返之於胃然後可從口而上越從腸而下達此惟脾氣靜息之時其痰可返故凡有痰證者早食午食而外但宜休養脾氣不動使經隧之痰得以返之於胃而從胃之氣上下不從脾之氣四迄乃爲善也試觀人痰病輕者夜間安臥次早即能嘔出泄出痰病重者昏迷復醒反能嘔出泄出者豈非未曾得食脾氣靜息而予痰以出路耶世之喜用熱藥峻攻者知此乎噫天下之服辛熱而轉能夜食者多矣肯因俚言而三思否

再論半身不遂口眼喎斜頭目眩運痰火熾盛筋骨時疼乃原於血虛血熱挾痰挾火經絡肌表之間先已有其病根後因感冒風寒或過嗜醇酒膏粱而助痰火或惱怒而逆肝氣遂成此證其在於經絡肌表

筋骨之間尚未入於臟腑者並以通榮衛爲治如和榮湯中有補血活血之功不至於滯有健脾燥濕消痰之能不致於燥又清熱運動疎風開經絡通腠理內固根本外散病邪王道劑也多服可以見功

風痱

岐伯謂中風大法有四一曰偏枯半身不遂二曰風痱於身無痛四肢不收三曰風懿奄忽不知人四曰風痹諸痹類風狀後世祖其說而無其治金匱有古今錄驗三方可類推之經謂內奪而厥則爲風痱仲景見成方有治外感風邪兼治內傷不足者有合經意取其三方以示法程一曰古今錄驗續命湯再曰千金三黃湯三曰近效白朮附子湯前一方治榮衛素虛而風入者中一方治虛熱內熾而風入者後一方治風已入臟脾腎兩虛兼諸痹類風狀者學者當會仲景意而於淺深寒熱之間以三隅反矣

風懿

按風懿曰奄忽不知人卽該中風卒倒內金匱不重舉其證意可知矣

律五條

凡風初中經絡不行外散反從內奪引邪深入者醫之過也如傷寒邪在三陽引入三陰爲犯禁卽邪在太陽引入陽明少陽亦爲犯禁故風初中絡不可引之入經中經卽不可引之入腑中腑卽不可引之入臟引邪深入釀患無窮乃至多死少生可無戒歟

凡治中風自汗證反利其小便者醫之過也毋論風中淺深但見自汗則津液外出小便自少若更利之使津液下竭則榮衛之氣轉衰無以制風火之勢必增煩熱而眞陰日亡也況陽明經利其小便尤爲犯禁少陰經利其小便必失溲而殺人矣可無戒歟

凡治中風病不明經絡腑臟妄用下法傷人醫之罪也夫風中經絡只宜宣散誤下則風邪乘虛入腑入臟釀患無窮若中臟多有平素積虛臟眞不守者下之立亡惟在胃腑內實便祕者間有可下然不過解其煩熱非大下也所謂一氣之微汁一旬之微利亦因可用始用之至於子和以下立法機要以中臟者宜下則指下爲定法胡可訓耶然中臟有緩急二候中腑日久熱勢深極傳入臟者此屬可下使風與熱俱去填其空竅則風不再生若開其瘀壅必反增風勢也其卒中急證下藥入口卽不甦矣可無辨歟世以中腑之便祕指爲中臟誤下不致損人益信子和機要爲是設遇眞中臟證下不中病難可復追矣

凡治中風四肢不舉不辨虛實妄行補瀉者醫之過也膏粱太過積熱內壅爲脾土瘀實宜瀉以開其壅食少體羸怠惰嗜臥者爲脾土虛衰宜補以健其運若不辨而實者補之虛者瀉之寧不傷人乎

凡治外中於風不辨內挾何邪誤執一家方書冀圖弋獲其失必多醫之過也蓋風邪從外入者必驅之使從外出然挾虛者非補虛則風不出挾火者非清熱則風不出挾氣者非開鬱則風不出挾濕者非導濕則風不出挾痰者非豁痰則風不出河間東垣丹溪各舉一端以互明其治後學不知變通但宗一家爲主治倘一病兼此五者成方果安在況不治其所有反治其所無寧不傷人乎

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百四十卷目錄

醫部彙考二百二十

風門四

吳崐醫方考 中風方論
張介賓景岳全書 古今中風辨 論中風屬風 論河間中風虛 論東垣中風說 論丹溪中風發 論其中風 論證 論脈 論治法 非風論正名 論有邪無邪 論治療 論氣虛 論痰之本 論經絡筋骨 論用藥 論表裏 論治血氣 論治法 論用藥位使 辨經脈諸證 辨病之輕證 藏病之危證 不治證

藝術典第二百四十卷

醫部彙考二百二十

風門四

明吳崑醫方考

中風方論

風者百病之長得天行之象故其發也暴然上世論風主於外感乃河間主火東垣主氣丹溪主濕而末世之論紛然矣今考名方二十三首爲風爲火爲氣爲濕皆時出而主之初不泥於一說也

病人初中風筋急口噤不開便以鐵物開之恐傷其齒宜用烏梅肉擦其牙關牙關酸軟則易開矣此酸先入筋之故也其有中風證而口開不噤者筋先絕也不治

病人初中風暴仆痰涎湧盛稀涎散與之頻吐涎沫壅塞少疏續進他藥蓋清陽在上濁陰在下則天冠地履無暴仆也若濁邪風湧而上則清陽失位而倒置矣故令人暴仆所以痰涎壅者風盛氣湧而然也經曰病發而不足標而本之先治其標後治其本故不與疏風補虛而先爲之吐其涎沫白礬之味鹹苦鹹能軟頑痰苦能吐涎沫皂角之味辛鹹辛能利氣竅鹹能去污垢名之曰稀涎固奪門之兵也師曰凡吐中風之痰使咽喉疏通能進湯液便止若攻盡其痰則無液以養筋能令人攣急偏枯此大戒也

病人初中風不知人事口噤不能開用通頂散一字吹入鼻中有噦者肺氣未絕可治蓋中風不知人事病則急矣以平藥與之不能開其壅塞故用猛藥與人參細辛相反使其相反而相用也肺苦氣上逆故用石膏之重以墜之甘草之平以緩之乃川芎之用取其清氣利竅而已

病人初中風喉中痰塞水飲難通非香竄不能開竅故集諸香以利竅非辛熱不能通塞故用諸辛爲佐使犀角雖涼而不滯訶梨雖澀而生津世人用蘇合香丸於初中之時每每取效丹溪謂辛香走散眞氣又謂腦麝能引風入骨如油入麪不可解也醫者但宜用之以救急慎毋令人多服也

風盛痰壅既用稀涎等藥開其氣道續以二陳湯主之蓋風干於脾則痰壅然痰之生本於濕半夏所以燥濕也茯苓所以滲濕也濕去則痰無由以生痰之爲患本於脾虛氣滯甘草所以補脾也陳皮所以利氣也補脾利氣則土又足以制濕而痰且無壅滯矣此二陳之旨也名曰二陳以橘半二物貴乎陳久耳

丹溪曰半身不遂在左者屬瘀血以四物加桃仁紅花竹瀝薑汁方主之蓋肯歸芍地生血藥也新血生則瘀血滑而易去桃仁紅花消瘀藥也瘀血去則新血清而易生然亦加夫竹瀝薑汁者以痰之爲物靡所不之蓋無分於左右而爲患也

中風正氣虛痰涎壅盛者宜八味順氣散主之方內人參白朮茯苓甘草四君子湯也經曰邪之所湊其氣必虛故用四君子以補氣治痰之法利氣爲先故用青皮白芷台烏陳皮以順氣氣順則痰行而無壅塞之患矣此標本兼施之治也

中風遍身麻痹語言蹇澁口眼喎斜喉中氣急有痰者宜烏藥順氣散主之蓋遍身麻痹表氣不順也故治以麻黃川芎語言蹇澁裏氣不順也故治以烏藥陳朮口眼喎斜面部之氣不順也故治以白芷殭蠶喉中氣急甘草可緩肺氣上逆桔梗可下痰之爲物寒則結滯熱則流行佐以乾薑行其滯也此治標之

劑也然必邪實初病之人方可用之若氣虛病久者則勿與之也宜以補劑兼之

中風口眼喎斜無他證者牽正散主之蓋羌防之屬可以驅外來之風而內生之風非其治也星夏之輩足以治濕土之痰而虛風之痰非其治也斯三物者療內生之風治虛熱之痰得酒引之能入經而正口眼又曰白附之辛可使驅風蠶蝎之鹹可使軟痰辛中有熱可使從風蠶蝎有毒可使破結醫之用藥有用其熱以攻熱用其毒以攻毒者大易所謂同氣相求內經所謂衰之以屬也

中風體肥痰盛口不渴者星香湯主之蓋南星燥痰之品體肥痰盛不渴則宜燥也可知故用南星入於牛膽者制其燥也佐以木香者利痰氣也

中風口眼喎僻痰涎壅盛者省風湯主之蓋風湧其痰干於面部則口眼喎僻塞於胷中則痰涎壅盛是方也防風白附全蠍川烏可以活經絡之風痰而正口眼南星半夏甘草木香可以療胷汞之風痰而開壅塞方名曰省風者省減其風之謂也

中風口眼喎僻在左以改容膏傳其右喎僻在右以此膏傳其左今日傳之明日改正故曰改容或以蜣螂冰片傳之或以鱔血冰片傳之皆良蓋此三物者皆引風拔毒之品佐以冰片取其利氣而善走竅佐以蠶附取其溫熱而散寒冬月加之他時弗用也

古人以小續命湯混治中風未詳其證豈謂麻黃杏仁麻黃湯也仲景以之治太陽證之傷寒桂枝芍藥桂枝湯也仲景以之治太陽證之中風如此言之則中風而有頭疼身熱脊強者皆在所必用也人參甘草四君子之二也局方用之以補氣芍藥川芎四物湯之二也局方用之以養血如此言之則中風而有氣血虛者皆在所必用也風淫末疾故佐以防風濕淫腹疾故佐以防己陰淫寒疾故佐以附子陽淫熱疾故佐以黃芩蓋病不單來雜揉而至故其用藥亦兼該也熱者去附子用白附子筋急語遲脈弦者倍人參加葛苣當歸去黃芩芍藥以避中寒煩躁不大便去附桂倍加芍藥竹瀝日久大便不行胷中不快加枳殼大黃語言蹇澁手足顫掉加石菖蒲竹瀝口渴加麥門冬栝蔞天花粉身疼發擂加羌活煩渴多驚加犀角羚羊角汗多去麻黃舌燥加石膏去附桂中風手足不能運動舌強不能言語風邪散見不拘一經者大秦艽湯主之蓋中風虛邪也許學士云留而不去其病則實故用驅風養血之劑兼而治之用秦艽為君者以其主宰一身之風石膏所以去胃中總司之火羌活去太陽百節之風疼防風為諸風藥中之軍卒三陽數變之風邪責之細辛三陰內淫之風濕責之茶朮去厥陰經之風則有川芎去陽明經之風則有白芷風熱干乎氣清以黃芩風熱干乎血凉以生地獨活療風濕在足少陰甘草緩風邪上逆於肺用當歸芍藥熟地養血於疏風之後一以濟風藥之燥一使手得血而能握足得血而能步也

中風二便數日不利邪氣內實者以三化湯微利之蓋大黃厚朴枳實小承氣湯也上焦滿治以厚朴中焦滿破以枳實下焦實奪以大黃用羌活者不忘乎風也服後二便微行則二焦之氣無所阻塞而復其傳化之職矣故曰三化此方惟實者可用虛者勿妄與之若實者不用則又失乎通達之權是當大蒐而亡九伐之法矣非安內之道也

中風發熱不能安臥者瀉青丸主之蓋肝主風少陽膽則其腑也少陽之經行乎兩脅風熱相干故不能安臥此方名曰瀉青瀉肝膽也龍膽草味苦而厚故入厥陰而瀉肝少陽火實者頭角必痛故佐以川芎少陽火鬱者必生煩躁故佐以梔子肝者將軍之官風淫火熾勢不容以易治故又奪以大黃用當歸者培養乎血而不使其為風熱所燥也復用乎羌活防風者二物皆升散之品此火鬱發之木鬱達之之意乃上下分消其風熱皆所以瀉之也

中風手足不用日久不愈者經絡中有濕痰死血也活絡丹主之蓋南星之辛烈所以燥濕痰二烏之辛熱所以散寒濕地龍即蚯蚓也濕土所生用之者何易曰方以類聚欲其引星烏直達濕痰所聚之處所謂同氣相求也亦內經佐以所利和以所宜之意風邪注於肢節久久則血脈凝聚不行故用乳香沒藥以治瘀血

中風表虛手足頑痹者蠲痹湯主之內經曰榮氣虛則不仁衛氣虛則不用故用黃芪以實表氣然黃芪與防風相畏用之者何潔古云黃芪得防風而功愈速故竝用之欲其相畏而相使耳羌活驅散風邪得當歸不至燥血薑黃能攻痹血得赤芍足以和肝復用甘草調之取其味平也

風熱壅盛表裏三焦皆實者防風通聖散主之蓋防風麻黃解表藥也風熱之在皮膚者得之由汗而泄荊芥薄荷清上藥也風熱之在巔頂者得之由鼻而

泄大黃芒硝通利藥也風熱之在腸胃者得之由後而泄滑石梔子水道藥也風熱之在決瀆者得之由溺而泄風淫於腑肺胃受邪石膏桔梗清肺胃也而連翹黃芩又所以祛諸經之遊火風之爲患肝木主之川芎歸芍和肝血也而甘草白朮又所以和胃氣而健脾劉守眞氏長於治火此方之旨詳且悉哉

中風之久語言蹇澁半身不遂手足拘攣不堪行步瘂痹不仁者史國公藥酒神良蓋語言蹇澁風在舌本也半身不遂邪併於虛也手足拘攣風燥其筋也不堪行步風燥而血不濡也瘂痹不仁風而濕也是方也乾茄根蒼耳子羌活秦艽防風松節萆薢蠶砂可以去風亦可以去濕風去則蹇澁拘攣之證除濕去則不遂不仁之患愈當歸牛膝杜仲枸杞所以養血亦所以潤燥養血則手得血而能攝足得血而能步潤燥則筋得血而能舒矣若虎骨者用之以驅入骨之風白朮者用之以致沖和之氣風痹之久血必留居鼈甲之用所以治風邪之固血也

病人骨節疼痛緩弱無力稀簽丸主之良蓋骨節疼痛壅疾也壅者喜通此物味辛苦而氣寒用九蒸九曬則苦寒之濁味皆去而氣輕清矣本草云輕可以去實蓋輕清則無礙不入故能透骨驅風勁健筋骨若不九蒸九曬或蒸曬之數不滿於九濁味猶存陰體尚在則不能透骨驅風而却病也此陰陽清濁之義惟明者求之

景岳全書　臣張介賓著

古今中風辨

夫風邪中人本皆表證考之內經所載諸風皆指外邪而爲言故並無神魂昏憒直視僵仆口眼歪斜牙關緊急語言蹇澁失音煩亂搖頭吐沫痰涎壅盛半身不遂癱瘓軟弱筋脈拘攣抽搐瘈瘲遺尿失禁等說可見此等證候原非外感風邪總由內傷血氣也夫風自外入者必由淺而深由漸而甚自有表證既有表證方可治以疏散而今之所謂中風者則不然但見有卒倒昏迷神魂失守之類無論其有無表邪有無寒熱及有無筋骨疼痛等證便皆謂之中風誤亦甚矣雖熱病篇有偏枯一證曰身偏不用而痛此以痛痹爲言非今之所謂中風也陰陽別論有曰三陰三陽發病爲偏枯痿易四肢不舉此以經病爲言亦非所謂風也繼自越人仲景亦皆以外感言風初未嘗以非風言風也迨至漢末華元化所言五臟之風則稍與內經不同而始有吐沫身直口噤筋急舌強不能言手足不遂等說然猶不甚相遠也自隋唐以來則巢氏病源孫氏千金等方以至宋元諸家所列風證日多日詳而是風非風始混亂莫辨而愈失其眞矣故余悉採其要列證如前凡內經所不言者皆不得謂之風證即或稍有相涉亦必以四診相參必其眞有外感實邪方可以風論治否則誤人不小也

難經曰傷寒有幾其脈有變否然傷寒有五有中風有傷寒有濕溫有熱病有溫病其所苦各不同詳此難經之云中風者本五種傷寒之一又仲景曰太陽病發熱汗出惡風脈緩者名爲中風由此觀之可見內經之凡言中風者本以外感寒邪爲言也豈後世以內傷屬風等證悉認之爲外感中風耶

觀仲景之論中風其所云半身不遂者此爲痹乃指痛風之屬爲言謂其由於風寒也再如邪在皮膚及在絡在經入腑入臟者此謂由淺而深亦皆以外邪傳變爲言也惟喎僻吐涎二證在內經諸風並無言及而仲景刱言之故自唐宋以來則漸有中經中血脈中腑中臟之說而凡以內傷偏枯氣脫卒倒厥逆等證悉認爲中風而忘却眞風面目矣

論中風屬風

風有眞風類風不可不辨凡風寒之中於外者乃爲風邪如九宮八風篇之風占病候歲露論之虛風實風金匱眞言論之四時風證風論之臟腑中風玉機眞臟論之風痹風癉痹論賊風篇之風邪爲痹瘧論歲露論之瘧生於風評熱病論之風厥勞風骨空論之大風熱病篇之風瘧病能論之酒風欬論之感寒欬嗽是皆外感風邪之病也其有不由外感而亦名爲風者如病機所云諸暴強直皆屬於風諸風掉眩皆屬於肝之類是皆屬風而實非外中之風也何以見之蓋有所中者謂之中無所中者謂之屬夫既無所中何謂之屬此以五運之氣各有所主如諸濕腫滿皆屬於脾諸寒收引皆屬於腎是皆以所屬爲言而風之屬於肝者即此謂也蓋肝爲東方之臟其藏血其主風肝病則血病而筋失所養筋病則掉眩強直之類無所不至而屬風之證百出此所謂皆屬於肝亦皆屬於風也夫中於風者即眞風也屬風者內傷之裏即木邪也眞風者外感之表證也屬風者內傷之裏證也即厥逆內奪之屬也夫曰中曰屬此在內經固已顯然各有所謂即如年辰之屬鼠屬牛豈即爲鼠

爲牛乎後世不能明辨遂致方論混傳表裏誤治千古之弊莫此爲甚第在內經則原無眞中類中之分而王安道始有此論予甚善之第惜其辨有未盡故復述之以詳其說凡欲明此義者但當於中風屬風表證裏證四者之間默而思之當自見其眞矣

論河間中風說

據河間中風論謂非肝木之風亦非外中之風由乎將息失宜此獨得之見誠然善矣然皆謂爲熱甚則不然也凡將息失宜五志過極本屬勞傷證也而勞傷血氣者豈皆火證又豈無陽虛病乎經曰喜怒傷氣寒暑傷形暴怒傷陰暴喜傷陽夫傷陰者水虧也傷陽者火虛也以虛作火鮮不危矣

又云厥浮惡寒拘急不仁等證本皆傷寒之類也何又名爲中腑昏不收舌不轉失音耳聾等證本皆厥奪之類也何又名爲中臟自中臟中腑之說並列爲言而內傷外感之證斯無辨而混亂矣且續命湯三化湯之屬但可以散風寒攻實熱若所云將息失宜者豈尚堪治之以此

論東垣中風說

據東垣年逾四旬氣衰之說其發明病機切中病情誠出諸賢之表者余深服之然憂喜忿怒傷氣者固有此疾而酒色勞倦傷陰者尤多此疾何以言之蓋氣生於陽形成於陰余嘗曰察陽者察其衰與不衰察陰者察其壞與不壞夫陽衰則氣去故神志昏亂陰虧則形壞故肢體廢弛此衰壞之謂也所以此病多在四旬之外正以其漸傷漸敗而至此始見其非外感而總由內傷可知矣今以氣脫形壞之病顧可謂風熱而散之攻之也否乎

據東垣河間之說若有同者若有異者如云中腑中臟本皆同也而東垣又云中血脈則稍異矣又如續命湯在河間則以治腑病東垣則以治血脈三化湯在河間用以治中臟而東垣用以治中腑則又異矣此或因證施治各有所宜姑無論也再如河間曰此非肝木之風亦非外中之風東垣亦曰非外來風邪乃本氣自病也夫皆曰非風而又皆曰中腑中臟不知所中者爲何物則分明又指爲風矣夫既曰將息失宜又曰氣衰所致本皆言其虛也而治法皆用汗下則分明又作實邪矣此等名目混亂淫淆不分若曰是若曰非而含糊於可否之間因致後學茫然莫知所宗正以議論日多不得其要反滋千古疑竇深可慨也至若續命三化等湯恐亦非神衰形壞之人所能堪者故凡讀書稽古之士宜加精究勿謂古人之法如此便可執而混用

論丹溪中風說

據丹溪引內經以下皆謂外中風邪之說不知內經之凡言風者皆以外感爲言原非後世之所謂中風也觀難經五種傷寒之意可知矣而丹溪之言豈得內經之本意乎至若東南之人只是濕痰生熱熱生風此仍述河間熱甚之說而非風等證豈皆熱病即云爲痰又豈無寒痰而何以痰即生熱熱即生風也且非風則已是風則南北俱有若云東南寒少未必殺人則可而云風少則不可也非痰則已是痰亦南北俱有若水土之外濕東南雖多而乳酪之內濕則西北尤多也雖痰之爲物本爲濕動然脾健則無脾弱則有而脾敗則甚是可見因病所以生痰非因痰所以生病也凡治失其本而欲望病愈者未之有也據丹溪半身不遂在左在右之說似乎近理故人多信之而不知其有不然也夫人身血氣本不相離焉得以左爲血病右爲痰氣耶蓋丹溪之意以爲肝屬木而位左肝主血也肺屬金而位右肺主氣也脾屬土而寄位西南故亦在右而脾主濕與痰也然此以五行方位之序言其理耳豈曰西無木東無金乎且各經皆有左右五臟皆有血氣即如胃之大絡乃出於左乳之下則脾胃之氣亦出於左又豈左非脾右非肝左必血病右必痰氣乎然則何以辨之惟遵內經以陰陽分血氣以左右言輕重則至當也經曰左右者陰陽之道路也又曰陰勝則陽病陽勝則陰病又曰女子右爲逆左爲從男子左爲逆右爲從夫陽病者即氣病也氣本乎陽而陰邪勝之則病也陰病者即血病也血本乎陰而陽邪勝之則病也從者病輕男病宜右女病宜左也逆者病重男病畏左女病畏右也以此辨之而再參以脈色察其病因則在氣在血或重或輕斯得其眞矣若謂左必血病右必痰氣則未免非痰治痰非血治血而誅伐無過鮮不誤矣

論眞中風

靳劉宗厚玉機微義云余嘗居涼州其地高阜四時多風少雨天氣常寒每見中風或暴死者有之蓋折風燥烈之甚也時洪武乙亥秋八月大風起自西北時甘州城外路死者數人余始悟內經謂西北之折風傷人至病暴死之旨不誣丹溪之言有所本也吁

醫之不明運氣地理造化病機之微而欲行變通之法者難矣哉據此一說是誠風之殺人也然風氣兼溫雖烈未必殺人惟帶寒威則殺人耳矧以西北地寒而塞風起於八月則寒隨風至寒必微骨凡暴露之人雖曰中風而不知實中陰寒之毒也此在強者固能支持弱者焉得不死然亦以所遇之異故特紀若此方是眞中風邪則亦百十年間始或僅遭一二而此證之不多見者從可知矣此外如賊風虛邪之傷人則歲歲有之處處有之是無非外感之病未聞有因外感而卒然昏憒致死也矧今人之所謂中風者或於寂然無風之時或於食飲嚴密之處素無外感而忽然運仆忽然偏廢此其是風非風又可知矣而盡以風治其能堪哉

論續命等湯

按歷代相傳治中風之方皆以續命等湯爲主考其所自則始於金匱要略附方中有古今錄驗續命湯然此必宋時校正之所增而非仲景本方也此自隋唐以來則孫氏千金方乃有小續命大續命西川續命排風等湯故後世宗之無不以此爲中風主治矣夫續命湯以麻黃爲君而以薑桂並用本發散外邪之佳方也至小續命大續命西川續命等湯則復加黃芩以兼桂附雖曰相制而水火氷炭道本不同即有神妙終非余之心服者其他無論僞怪乎河間東垣丹溪三子者既於中風門皆言此病非風矣而何於本門皆首列小續命湯而附以加減之法曰無汗惡寒麻黃續命湯有汗惡風無熱桂枝續命湯有汗身熱不惡寒白虎續命湯有汗身熱不惡風葛根續命湯無汗身涼附子續命湯若此諸法但用治外感則可用治內傷則不可而三子之惛惛不舍者皆此數方又何前後之言不相應耶再如大秦艽等湯在機要發明俱云治中風外無六經之形證內無便溺之阻隔如是血弱不能養筋宜養血而筋自榮以大秦艽湯羌活愈風湯主之夫秦艽湯雖有補血之藥而寒散之劑居其半夫既無六經之外邪而用散何爲也既無阻隔之火邪而用寒何爲也寒散既多又果能養血氣而壯筋骨乎秦艽湯且不可愈風湯則尤其不可者也吾不知用此法者果出何意

治法

凡治風之法宜察淺深虛實及中經中臟之辨蓋中經者邪在三陽其病猶淺中臟者邪入三陰其病則深若在淺不治則漸入於深在經不治則漸入於臟此淺深之謂也又若正勝邪者乃可直攻其邪正不勝邪者則必先顧其本此虛實之謂也倘不知此則未有不致敗者

大風大寒直中三陰致危者必用金匱續命湯去石膏治之若風寒在經而頭疼惡寒拘急身痛者宜麻黃湯麻桂飲隨證加減主之甚者亦宜續命湯若頭疼有汗惡風者宜桂枝湯或五積散若風邪在經熱多寒少而爲偏枯疼痛發熱者宜大秦艽湯主之甚者愈風湯亦可

風寒諸病無非外感證也如輕淺在肺者則爲傷風稍深在表裏之間者則爲瘧疾留連經絡者則爲寒熱往來偏傳六經徹內徹外者則爲傷寒瘟疫久留筋骨者則爲風痹痛風或爲偏風風熱上壅者則爲大頭時毒風濕相搏者則爲大風癩風浮在肌膚者則爲斑疹瘡毒感在嶺南者則爲瘴風凡此者皆外感風寒之氣俱有門類方論具載各條舍此之外但無表證者均不得指爲風也

非風論正名

非風一證即時人所謂中風證也此證多見卒倒卒倒多由昏憒本皆內傷積損頹敗而然原非外感風寒所致而古今相傳咸以中風名之其誤甚矣故余欲易去中風二字而擬名類風又欲擬名屬風然類風屬風仍與風字相近恐後人不解仍爾模糊故單用河間東垣之意竟以非風名之庶乎使人易曉而知其本非風證矣

凡診諸病必先宜正名觀內經諸篇所言風證各有淺深臟腑虛實寒熱之不同前賢已詳本皆歷歷可考也若今人之所謂中風者則以內經之厥逆悉指爲風矣延誤至今莫有辨者雖丹溪云今世所謂風病大率與痰證混同論治此說固亦有之然何不云誤以厥逆爲風也惟近代徐東皐有云痙厥類風凡尸厥痰厥氣厥血厥酒厥等證皆與中風相類此言若乎近之而未善也使果風厥相類則凡臨是證者曰風可也曰厥亦可也疑似未決將從風乎將從厥乎不知經所言者風自風厥自厥也風之與厥一表證也一裏證也豈得謂之相類耶奈何後人不能詳察經義而悉以厥證爲風既名爲風安得不從風治既從風治安得不用散風之藥以風藥而散厥證所散者非元氣乎因致眞陰愈傷眞氣愈失是速其死矣若知爲厥則原非外感自與風字無涉此名之不

可不正證之不可不辨也但名得其正又何至有誤治之患諸厥證義詳厥逆本門當與此門通閱

論有邪無邪

凡非風等證在古人諸書皆云氣體虛弱榮衛失調則眞氣耗散腠理不密故邪氣乘虛而入此言感邪之由豈不爲善然有邪無邪則何可不辨夫有邪者卽傷寒瘧痢之屬無邪者則非風衰敗之屬有邪者必或爲寒熱走注或爲腫痛偏枯而神志依然無恙也無邪者本無痛苦寒熱而肢節忽廢精神言語倏爾變常也有邪者病由乎經卽風寒濕三氣之外侵也無邪者病出乎臟而精虛則氣去所以爲昏憒無知也有邪者邪必乘倒氣去則神去所以爲昏憒無知也有邪者邪必乘虛而入故當先扶正氣但逼經逐邪之品不得不用以爲佐無邪者救本不暇尚可再爲雜用以傷及正氣乎

論肝邪

凡五臟皆能致病而風厥等證何以獨重肝邪且其急暴之若此也蓋人之所賴以生者惟在胃氣以胃爲水穀之本也故經云人無胃氣曰死脈無胃氣亦死夫肝邪者卽胃氣之賊也一勝一負不相並立凡此非風等證其病爲強直掉眩之類皆肝邪風木之化也其爲四肢不用痰涎壅盛者皆胃敗脾虛之候也然雖曰東方之實又豈果肝氣之有餘耶正以五臟俱敗肝失所養則肝從邪化故曰肝邪在陰陽類論以肝臟爲最下者正謂其木能犯土肝能犯胃也然肝邪之見本由脾腎之虛使脾胃不虛則肝木雖強必無乘脾之患使腎水不虛則肝木得養又何有強直之虞所謂胃氣者卽二十五陽也非獨指陽明爲言也所謂腎水者卽五臟六腑之精也非獨指少陰爲言也然則眞陽敗者眞臟見眞陰敗者亦眞臟見凡脈證之見眞臟者俱爲危敗之兆所謂眞臟者卽肝邪也卽無胃氣也此卽非風類風之病之大本也

論氣虛

凡非風卒倒等證無非氣脫而然何也蓋人之死生全由乎氣氣聚則生氣散則死凡病此者多以素不能愼或七情內傷或酒色過度先傷五臟之眞陰此致病之本也再或內勞外傷復有所觸以損一時之元氣或以年力衰邁氣血將離則積損爲類此發病之因也蓋其陰虧於前而陽損於後陰陷於下而陽乏於上以致陰陽相失精氣不交所以忽爾昏憒卒然仆倒此非陽氣暴脫之候乎故其爲病而或爲汗出者榮衛之氣脫也或爲遺尿者命門之氣脫也或口開不合者陽明經氣之脫也或口角流涎者太陰臟氣之脫也或四肢癱軟者肝脾之氣敗也或昏倦無知語言不出者神敗於心精敗於腎也凡此者衝任氣脫形神俱敗而然故必於中年之後乃有此證何今人見此無不指爲風痰而治從消散不知風中於外痰鬱於中皆實邪爲病何遽令人暴絕若此且既絕如此尚堪幾多消散而人不能悟良可哀也觀東垣云氣衰者多有此疾誠知要之言也奈後人不明其說但以東垣爲主氣又豈知氣之爲義乎故凡治卒倒昏沉等證若無痰氣阻塞必須以大劑參附峻補元氣以先其急隨用地黃當歸甘杞之類填補眞陰以培其本蓋精卽氣之根氣生於下卽向生之氣也經曰精化爲氣卽此之謂舍是之外他無實濟之術矣雖然無養生之道而令病敗壞至此猶望復全誠非易也第治得其法猶可望其來復若誤治之則何堪再誤哉

論痰之本

凡非風之多痰者悉由中虛而然夫痰卽水也其本在腎其標在脾在腎者以水不歸原水泛爲痰也在脾者以食飲不化土不制水也不觀之強壯之人任其多飲多食則隨食隨化未見其爲痰也惟不能食者反能生痰此以脾虛不能化食而食卽爲痰也故凡病虛勞者其痰必多而病至垂危其痰益甚正以脾氣愈虛則全不能化而水液盡爲痰也然則痰之與病病由痰乎痰由病乎豈非痰必由於虛乎可見天下之實痰無幾故痰之宜伐者亦無幾治痰者必當溫脾強腎以治痰之本使根本漸充則痰將不治而自去矣治痰諸法見後及詳痰飲本門

論經絡痰邪

余嘗聞之俗傳云痰在周身爲病莫測凡癱瘓癒瘡半身不遂等證皆伏痰留滯而然若此痰飲豈非邪類不去痰邪病何由愈余曰汝知痰之所自乎凡經絡之痰蓋卽津血之所化也使果營衛和調則津自津血自血何痰之有惟是元陽虧損神機耗敗則水中無氣而津凝血敗皆化爲痰耳此果痰也果精血也豈以精血之外而別有所謂痰者耶若謂痰在經絡非攻不去則必并精血而盡去之庶乎可也否則安有獨攻其痰而津血自可無動乎精血復傷元氣

愈竭隨去隨化痰必愈甚此所以治痰者不能盡其所盡者惟元氣也別復有本無痰氣而妄指爲痰誤攻之者又何其昧也故凡用治痰之藥如滾痰丸清氣化痰丸搜風順氣丸之類必其元氣無傷偶有壅滯或見微痰之不清者而暫用分消豈云無效若病及元氣而但知治標則未有不日用而日敗者矣

論治痰

治痰之法凡非風初病而痰氣不甚者不必便猜其爲痰而妄用痰藥此大戒也若果痰涎壅盛填塞胷膈湯液俱不能入則不得不先開其痰以通藥食之道而開痰之法惟吐爲捷如古方之獨聖散茶調散稀涎散之屬皆吐痰之劑也但恐元氣太虛不能當此峻利之物或但用新方之吐法爲妥或用牛黃丸抱龍丸之類但使咽喉氣通能進湯飲即止不可盡攻其痰致令危困則最所當愼以故治痰之法又必察其可攻與否然後用之斯無誤也若其眼直咬牙肢體拘急面赤强勁有力者雖見昏沉亦可爲治先用粗筋挖開其口隨以堅實筆幹禁住牙關乃用淡鹽鹽湯徐徐灌之然後以中食二指探入喉中徐引其吐若指不能入則以鵝翎蘸湯代指探吐亦可如是數次得吐氣通必漸甦矣然後酌宜可以進藥此治實痰壅滯之法也若死證已具而痰聲漉漉於喉間者吐亦無益不必吐也若痰氣盛極而不能吐者亦不治之證也又凡形氣大虛者忌用吐法是皆不可攻者也

凡形證已定而痰氣不甚則萬勿治痰但當調理氣血自可漸愈如果痰涎未清則治痰之法當分虛實若氣不甚虛而或寒或濕生痰者宜六安煎二陳湯主之因火爲痰者宜清膈飲及竹瀝童便火甚者抽薪飲主之脾虛兼嘔而多痰者六君子湯或五味異功散陰氣不足多痰兼燥而欬者金水六君煎陰虛水泛爲痰者六味丸八味丸酌而用之或爲湯亦妙脾腎虛寒不能運化而爲痰者不必兼治痰氣只宜溫補根本若中氣虛者理中湯或溫胃飲陰不足者理陰煎之類最佳

論寒熱證

凡非風口眼歪斜有寒熱之辨在經曰足陽明之筋至缺盆而結上頸上挾口病則引缺盆及頰卒口僻急者目不合熱則筋縱目不開頰筋有寒則急引頰移口有熱則筋弛縱緩不勝收故僻此經以病之寒熱言筋之緩急也然而血氣無虧則雖熱未必緩雖寒未必急亦總由氣血之衰可知也嘗見有引內經之意而曰偏於左者以左寒而右熱偏於右者以右寒而左熱誠謬言也不知偏左者其急在左而右本無恙也偏右者亦然故無論左右凡其拘急之處即血氣所虧之處也以藥治者左右皆宜從補以艾治者當隨其急處而灸之蓋經脈既虛須借艾火之溫以行其氣氣行則血行故筋可舒而歪可正也凡諸灸法有言左灸右右灸左者此亦內經繆刺論之法從之亦無不可至若經言寒熱則凡如脣緩流涎聲重語遲舍糊者是皆縱緩之類縱緩者多由乎熱而間亦有寒者氣虛故也歪斜牽引抽搐反張者皆拘急之類拘急者多由乎寒而間亦有熱者血虛故也蓋經所言者言理之常余所言者言病之變亦無非理也使讀經不明理必反害經意矣故臨此證者不可不加之詳審

非風癮瘕等證亦有寒熱之辨經曰寒則反折筋急熱則筋弛縱不收此固其常也然寒熱能拘急亦能弛縱也如寒而拘急者以寒盛則血凝血凝則滯澀滯澀則拘急此寒傷其營也熱而拘急者以火盛則血燥血燥則筋枯筋枯則拘急此熱傷其營也又若寒而弛縱者以寒盛則氣虛氣虛則不攝不攝則弛縱此寒傷其衛也熱而弛縱者以熱盛則筋軟筋軟則不收不收則弛縱此熱傷其衛也以此辨之豈不明析且或寒或熱必有脈證可據但宜因證而治之若病無寒熱則當專治血氣無疑矣

論治血氣

凡非風口眼歪斜半身不遂及四肢無力掉搖拘攣之屬皆筋骨之病也夫肝主筋腎主骨肝藏血腎藏精精血虧損不能滋養百骸故筋有緩急之病骨有痿弱之病總由精血敗傷而然即如樹木之衰一枝津液不到即一枝枯槁人之偏廢亦猶是也經曰足得血而能步掌得血而能握今其偏廢如此豈非血氣衰敗之故乎臨川陳先生曰醫風先醫血血行風自滅蓋謂肝邪之見本由肝血之虛肝血虛則燥氣乘之而木從金化風必隨之故治此者只當養血以除燥則風自散矣若用風藥則風能勝濕血必愈燥大非宜也

偏枯拘急痿弱之類本由陰虛言之詳矣然氣血本不相離故陰中有氣陰中亦有血何以辨之夫血非氣不行氣非血不化凡血中無氣則病爲縱緩廢弛

氣中無血則病爲抽掣拘攣何也蓋氣主動無氣則不能動不能動則不能舉矣血主靜無血則不能靜不能靜則不能舒矣故筋緩者當責其無氣筋急者當責其無血無血者宜三陰煎或大營煎小營煎之類主之無氣者宜五福飲四君子湯十全大補湯之類主之其與痰證之不動痛風之不靜者義稍不同詳列本門

非風治法

凡非風證未有不因表裏俱虛而病者也外病者病在經內病者病在臟治此之法只當以培補元氣爲主若無衆證亦不宜攻補兼施徒致無益蓋其形體之壞神志之亂皆根本傷敗之病何邪之有能復其元則庶乎可望其愈

初病卒倒危急不醒但察其有無死證如無死證而形氣不脫又無痰氣但扶定搐其人中自當漸醒或以白湯薑湯徐灌之亦可待其甦醒然後察證治之若無痰無氣而息微色白脈弱暴脫者急以獨參湯或淡薑湯灌之俱可若其有痰甚者以前治痰法吐之其痰不甚或以白湯調抱龍丸一丸以暫開其痰無痰聲者不可用若因氣厥昏沉而氣壅喘滿氣閉不醒者則用淡薑湯調蘇合丸一丸以暫開其氣若氣不壅滿者不可用其有久之不醒或牙關不能開者則以半夏或牙皂細辛之類爲末少許吹入鼻中有嚏者可治無嚏者不可治或以皂莢爲末撚紙燒烟衝入鼻中亦可

人於中年之後多有此證其衰可知經云人年四十而陰氣自半正以陰虛爲言也夫人生於陽而根於陰根本衰則人必病根本敗則人必危矣所謂根本者卽眞陰也人知陰虛惟一而不知陰虛有二如陰中之水虛則多熱多燥而病在精血陰中之火虛則多寒多滯而病在神氣若水火俱傷則形神俱弊難爲力矣火虛者宜大補元煎右歸飲右歸丸八味地黃丸之類主之庶可以益火之源水虛者宜左歸飲左歸丸六味地黃丸之類主之庶可以壯水之主若氣血俱虛速宜大補元煎之類悉力挽回庶可療也凡多熱多火者忌辛溫及參朮薑桂之類多寒多濕者忌清凉如生地芍藥麥冬石斛之類若氣虛卒倒別無痰火氣實等證而或者妄言中風遽用牛黃丸蘇合丸之類再散其氣則不可救矣

非風有火盛而病者卽陽證也火甚者宜專治其火以徙薪飲抽薪飲白虎湯之類酌而用之火微者宜兼補其陰以一陰煎二陰煎或加減一陰煎之類主之凡治火之法但使火去六七卽當調治其本然陽勝者陰必病故治熱必從血分甚者用苦寒微者用甘凉欲其從乎陰也

非風有寒盛而病者卽陰證也專宜益火微寒者宜溫胃飲八味地黃丸之類主之寒甚者宜右歸飲回陽飲理中湯四逆湯之類主之然寒勝者陽必病故治寒之法必從氣分而從乎陽也如陽脫寒甚者仍宜灸關元氣海神闕以回其陽氣

非風眩運掉搖惑亂者總由氣虛於上而然經曰上氣不足腦爲之不滿頭爲之苦傾目爲之苦眩又曰上虛則眩此明訓也凡微覺此證卽當以五福飲之類培其中氣虛甚者卽宜用大補元煎或十全大補湯之類治之否則卒倒之漸所由致也丹溪曰無痰不作運豈眩運者必皆痰證耶此言最爲不妥別有詳義見眩運門

非風痲木不仁等證因其血氣不至所以不知痛癢蓋氣虛則痲血虛則木痲木不已則偏枯痿廢漸至日增此魄虛之候也經曰痺之爲病身無痛者四肢不收智亂不甚其言微知可治甚則不能言不可治也此卽其類而但有微甚之辨耳又經曰營氣虛則不仁衛氣虛則不用營衛俱虛則不仁且不用肉如故也人身與志不相有曰死亦此類也故凡遇此證只宜培養血氣勿得誤認爲痰

夏月卒倒忽患非風抽搐等證凡火赫金熱傷氣而然卽今人之所謂暑風也氣虛者宜用參芪或十味香薷飲亦可若水不制火而多煩渴者宜生脈散或人參竹葉石膏湯若火熾盛者宜瓜水菜豆飲或用芩連之屬暫解其熱若單由傷氣而無火者宜獨參湯或四君子湯若伏陰在內而陽虛氣脫者必用附子理中湯或六味回陽飲之類放膽用之勿謂夏月忌溫熱此不達之言也

肥人多有非風之證以肥人多氣虛也何以肥人反多氣虛蓋人之形體骨爲君也肉爲臣也肥人者柔勝於剛陰勝於陽者也且肉以血成總皆陰類故肥人多有氣虛之證然肥人多濕多滯故氣道多有不利若果痰氣壅滯則不得不先爲清利宜於前治痰之法隨宜暫用若無痰而氣脫卒倒者必宜四君六君或十全大補湯大補元煎之類主之

非風煩熱自汗小水不利者不可以藥利之蓋津液

外泄小水必少若再用滲利則陰水愈竭無以制火而躁煩益甚但使熱退汗止則小水自利也況自汗者多屬陽明之證亦忌利小便宜生脈散一陰煎之類主之火甚者宜加減一陰煎

非風遺尿者由腎氣之虛脫也最爲危證宜參芪歸朮之類補之是矣然必命門火衰所以不能收攝其有甚者非加桂附終無濟也

尸厥酒厥痰厥氣厥血厥之屬今人皆謂之中風而不知總屬非風也俱詳厥逆本門

論用藥佐使

凡非風而有兼證者則通經佐使之法本不可廢蓋其脈絡不通皆由血氣血氣兼證各有所因如因於風者必閉鬱因於寒者必凝濇因於熱者必乾涸因於濕者必壅滯因於虛者必不運行諸如此者皆能阻塞經絡此佐使之法所以亦有不同也凡風閉者宜散而通之如麻黃桂枝柴胡羌活細辛白芷之屬是也寒凝者宜熱而通之如葱椒桂附乾薑之屬是也熱燥者宜凉而通之如芩連梔蘗石膏知母之屬是也濕滯者宜溫利而通之如蒼朮厚朴茵陳萆薢五苓之屬是也血滯者宜活而通之如芎歸牛膝紅花桃仁大黃芒硝之屬是也氣滯者宜行而通之如木香香附烏沉枳殼之屬是也痰滯者宜開而通之如南星半夏牛黃天竺黃秫砂海石元明粉之屬是也氣血虛弱者宜溫補而通之如參芪歸朮熟地枸杞杜仲牛膝之屬是也凡此通經之法若乎盡矣然虛實之異猶當察焉蓋通實者各從其類使無實邪而妄用通藥則必傷元氣反爲害矣通虛者則或陰或陽尤當知其要如參芪所以補氣而氣處之甚者非薑附之佐必不能追散失之元陽歸地所以補精血而陰虛之極者非桂附之引亦不能復無根之生氣寒邪在經而客强主弱非桂附之勇則血脈不行寒邪不去痰濕在中而土寒水泛者非薑附之煖則脾腎不健痰濕不除此通經之法大都實者可用寒凉虛者必宜溫熱也但附子之性剛勇而熱凡陰虛水虧而多燥者自非所宜若無燥熱但涉陽虛而諸藥有不及者非此不能達也古人云附子與酒同功義可知矣今人謂附子有毒多不敢用不知製用得宜何毒之有此誠奇品其毋忽之

辨經臟諸證

凡非風等證當辨其在經在臟經病者輕淺可延臟病者深重可畏經病者病連肢體臟病者敗在神氣雖病在經者無不由中而表裏微甚則各有所主此經臟之不可不辨也然在經在臟雖有不同而曰陰曰陽則無不本乎氣血但知氣血之緩急知陰陽之虧勝則盡其善矣若必曰某臟某經必用某方某藥不知通變多失其眞故凡鑿執之談每有說得行不得者正以心之所至口不能宣也必也知幾知微斯足稱神悟之品

經病之輕證

皮毛枯澀汗出肢運鼻塞者肺之經病

血脈不榮顏色憔悴者心之經病

肌肉消瘦浮腫不仁肉瞤筋惕四肢不用者脾之經病

筋骨疲困拘急掉慄脅肋脹痛者肝之經病

口眼歪斜者足陽明及肝膽經病

骨弱無力坐立不能者腎之經病

經病之危證

皮膝冰冷滑汗如油畏寒之甚者肺之經病

舌强不能言者心腎經病

脣緩口開手撒者脾之經病

眼昏昏黑無見筋痛之極者肝腎經病

耳聾絕無聞骨痛之極者腎之經病

反張戴眼腰脊如折者膀胱經病

臟病之輕證

欬嗽微喘短氣悲愁不已者病在肺臟

言語無倫神昏多笑不寐者病在心臟

腹滿少食吐逆噯惡吞酸噯氣譫語多思者病在脾胃

胃脘氣逆多驚多怒者病在肝膽

少腹疼痛二便不調動氣上衝陰痿呻吟多恐者病在腎臟

臟病之危證

氣急大喘或氣脫失聲色灰白或紫赤者肺腎氣絕

神脫色脫昏沉不醒色赤黑者心臟氣絕

痰涎壅極吞吐不能咽逆不止腹脹之極色青黑者脾胃氣絕

眼閉不開急躁擾亂懊憹囊縮色青灰白者肝臟氣絕

聲瘖不出寒厥不回二便閉不能通泄不能禁者腎臟氣絕

不治證

凡非風口開眼閉手撒遺尿吐沫直視聲如鼾睡昏沉不醒肉脫筋痛之極髮直搖頭上竄面赤如裝或頭重面鼻山根青黑汗綴如珠痰聲漉漉者皆不治非風之脈遲緩可生急數弦大者死

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百四十一卷目錄

醫部彙考二百二十一

風門五

方一　笑氏黑散　醉仙丹　再甦丹　肯方　風引湯　乾薑附子湯　換骨丹　羌活湯　葛根湯　防風湯　葛根湯　獨活寄生湯　菊花酒　杜仲酒　竹瀝湯　又方　芎藭湯　獨活湯　石楠湯　附子湯　黃耆散　百花丸　又方　又方　口耳餅方　八風散　續命湯　仝公當歸湯　泰艽散　吳茱萸散　小駁麥湯　麻子湯　小金子酒　麻黃續命湯　桂枝續命湯　白虎續命湯　葛根續命湯　附子續命湯　桂枝附子續命湯　三化湯　愈風湯　四白丹　二丹丸　葛青丸　虎脛骨酒　二香二建湯　神應養真丹　買回如通聖散　崔宣武通聖散　改容肯　換風丸　駐風丸　又方　又方　家寶丹　地黃飲子　中風方　薏香正氣散　地仙丹　如神救苦散　不臥散　調腸散　加減冲和湯　大通聖白花蛇散　犀角防風湯　續命丹　趕風青　勝金丹　分漢至聖保命金丹　茯神散　河子湯　等痰　散　保命丹　風藥聖餅子　古魂　附丸　又方　蜀風飲子　搜風順氣丸　四神丹　擬治中風方　加味化痰丸　豨薟丸

藝術典第二百四十一卷

醫部彙考二百二十一

風門五

方一

侯氏黑散 金匱要略下同

治大風四肢煩重心中惡寒不足者

菊花四十分　防風　白朮各十分　細辛　茯苓　牡蠣　人參　礬石　當歸　乾薑　芎藭　桂枝各三分　桔梗八分　黃芩五分

右十四味杵爲散酒服方寸匕日一服初服二十日溫酒調服禁一切魚肉大蒜常宜冷食六十日止即藥積於腹中不下也熱食即下矣冷食日能助藥力

醉仙丹

治偏枯不遂皮膚不仁

麻黃水煮焙乾爲末一兩　天南星七箇炮黑附子三箇炮去皮　地龍七條去土

右除麻黃先爲末次將麻黃末入酒一升熬成膏入前末丸如彈子大每日食後臨臥酒化一兩汗出效偏枯不遂皮膚不仁者皆由五官虛氣風寒暑濕之邪蓄積在中久而不散乃成疾焉

再甦丹

治骨節疼痛語言不正行步艱難手足顫掉擩搦

川烏頭二兩　草烏頭一兩　五靈脂四兩

右爲末滴水爲丸如雞頭大每服一丸研碎入酒一盞生薑三片地黃三條乳香少許同煎至七分臨臥通服喫了須摩擦患處令熱徹以助藥力如合時入乳香末一二錢即煎時更不須入

換骨丹 千金方下同

治一切卒中手足頑麻腰膝沉重左癱右瘓四時傷寒婦人血刺胎前產後每一粒酒一盞搥碎至夜溫動化散臨睡和滓服

桑白皮　何首烏　吳白朮　紫河車　威靈仙　蔓青子　人參　川芎　防風　地骨皮各二兩　五味子　木香　苦參各一兩　犀角屑半兩　麝香　龍腦各半錢

右爲細末用後膏和

膏方

地黃三斤去根不去節剉細　蒼朮　槐角各半斤

右用水一斗八升同熬至三四升密絹濾去滓留清者再熬成膏和前藥每兩作八丸朱砂爲衣每服一丸

風引湯 金匱要略

除熱癱瘓

大黃　乾薑　龍骨各四兩　桂枝三兩　甘草　牡蠣各二兩　寒水石　滑石　石膏　赤石脂　白石脂　紫石英各六兩

右十二味杵粗篩以韋囊盛之取三指撮井華水三升煮三沸溫服一升

乾薑附子湯

治心虛寒風半身不遂骨節離解緩弱不收便利無度口面喎邪

乾薑　附子各八兩　桂心　麻黃各四兩　芎藭三兩

右五味㕮咀以水九升煮取二升分三服三日後服一劑

羌活湯

治中風身體疼痛四肢緩弱不遂及產後中風

甘草二兩　芍藥　羌活　桂心　葛根　麻黃　地黃各三兩　生薑五兩

右八味㕮咀以清酒三升水五升煮取二升溫服五合日三服

防風湯

治偏風甄權處療安平公方

防風　芎藭　白芷　牛膝　狗脊　萆薢

白朮各一兩　羌活　葛根　附子（外臺作人參）

杏仁各二兩　薏苡仁　石膏　桂心各三兩

麻黃四兩　生薑五兩

右十六味㕮咀以水一斗二升煑取三升分三服一劑覺好更進一劑即一度針九劑九針即瘥灸亦得按穴乃風池肩髃曲池支溝五樞陽陵泉巨虛下廉凡七穴法詳本門針灸

葛根湯

治四肢緩弱身體疼痛不遂婦人產後中柔風及氣滿

葛根　芍藥　桂心　乾地黃　羌活　麻黃

甘草各三兩　生薑六兩

右八味以清酒三升水五升煑取三升溫服五合日三

獨活寄生湯

夫腰背痛者皆由腎氣虛弱臥冷濕地當風得之若不速治流入脚膝爲偏枯冷痹緩弱疼重或腰痛攣脚重痹宜急服此方

獨活三兩　寄生（古今錄驗作續斷）　杜仲　牛膝

細辛　秦艽　茯苓　桂心　防風　芎藭

乾地黃　人參　甘草　當歸　芍藥各三兩

右十五味㕮咀以水一斗煑取三升分三服溫服勿冷風虛下利者除乾地黃服復取蒴藋葉火燎厚安席上及熱眠上冷復燎之冬月取根春取莖熬臥之佳其餘薄熨不及蒴藋蒸爲愈也諸處風濕亦用此法新產竟或患腹痛不得轉動及腰脚攣痛不能屈伸痹弱者宜服此湯除風消血

菊花酒

治男女風虛寒冷腰背痛食少羸瘦無顏色噓吸少氣去風冷補不足

菊花　杜仲各一斤　防風　附子　黃芪

乾薑　桂心　當歸　石斛各四兩　紫石英

蓯蓉各五兩　萆薢　獨活　鍾乳各八兩

茯苓三兩

右十五味㕮咀以酒七斗漬五日每服一合稍稍加至五合日三

杜仲酒

治腰脚疼痛不遂風虛

杜仲八兩　石楠二兩　羌活四兩　大附子五枚

右四味㕮咀以酒一斗漬三宿每服二合日再偏宜冷病婦人服之

竹瀝湯

共四方治四肢不收心神恍惚不知人不能言

竹瀝二升　生葛汁一升　生薑汁三合

右三味相和溫暖分三服平旦日晡夜各一服服訖覺四體有異似好次進後湯方

竹瀝一升　生葛汁五合　芎藭　防己　附子

人參　黃芩　甘草　芍藥　桂心各一兩

羚羊角三兩　石膏六兩　杏仁四十枚　麻黃

防風各一兩半　生薑四兩

右十六味㕮咀以水七升煑減半內瀝煑取二升五合分三服取汗間五日更服一劑與三劑漸覺少損仍進後方

竹瀝三升　防風　升麻　羚羊角　防己

桂心　芎藭各二兩　麻黃三兩

右八味㕮咀以水四升合竹瀝煑取二升半分三服兩日服一劑常用加獨活三兩最佳此方神良頻進三劑若手足冷者加生薑五兩白朮二兩若未除更進後方

竹瀝一升　人參　芎藭　獨活　升麻各一兩

防風　麻黃　芍藥各一兩半　生薑　羚羊角

防己　石膏　桂心　黃芩　甘草（一作甘草根）　白朮

各二兩　附子一枚（一作杏仁四十枚）

右十七味㕮咀以水八升煑減半內瀝取二升半分三服相去如人行十里久更服若有氣者加橘皮牛膝五加皮各一兩

又方

凡風痺服前湯得瘥訖可常服煑散除餘風

防風　防己　獨活　秦艽　黃芪　芍藥

人參　白朮　茯神　芎藭　遠志　升麻

石斛　牛膝　羚羊角　丹參　甘草　厚朴

天冬　五加皮　地骨皮　黃芩　桂心各一兩

橘皮　乾地黃　生薑　麻黃各二兩　檳榔

藁本　杜仲　烏犀角各二兩　薏苡仁一升

石膏六兩

右三十三味搗篩爲粗散和攪令勻每服以水三升藥三兩煑取一升綿濾去滓頓服之取汗日一服若覺胷中熱煩以竹瀝代水煑之千金翼無黃芩檳榔藁本杜仲烏犀角有薯蕷甘草附子麥門

冬山茱萸一本桂心四兩石膏三兩

芎藭湯

治卒中風四肢不仁善笑不息

芎藭一兩半　黃芩　石膏一作黃連　當歸　秦艽

麻黃　桂心　乾薑　甘草各一兩　杏仁三七枚

右十味㕮咀以水九升煑取三升分三服

獨活煑散

治諸風痱

獨活八兩　芎藭　芍藥　茯苓　防風　防己

葛根各六兩　羚羊角　當歸　人參　麥門冬

桂心　石膏各四兩　磁石十兩　甘草三兩

白朮五兩

右十六味各切剉分二十四分每分入生薑生地黃切一斤杏仁二七枚以水二升煑取七合或日晚或夜中或日一服或間日服無所忌

百花丸

凡風服湯藥多患虛熱翕翕然宜除熱

防風　人參　蓯蓉　乾地黃　羚羊角　麥冬

天門冬各一兩半　芍藥　獨活　乾薑　白朮

丹參　食茱萸一作山茱萸　甘草　茯神　升麻

黃芪　菊花　地骨皮　石斛　牛膝　五加皮

薯蕷各二十銖　秦艽　芎藭　桂心　防己

生薑　黃芩各一兩　附子十八銖　石膏三兩

寒水石二兩

右三十二味爲末白蜜和丸如梧子大生薑蜜湯服二十丸日三稍加至三十丸忌油麪蒜生冷酢滑及猪羊雞魚等肉

獨活湯

治風憒不能言四肢不收手足顫曳

獨活四兩　桂心　芍藥　花粉　生葛各二兩

生薑六兩　甘草三兩

右七味㕮咀以水五升煑取三升分三服日三

石楠湯

治六十四種風注走入皮膚中如蟲行腰脊彊直五緩六急手足拘攣隱疹搔之則作瘡風尸癢卒風面目腫起手不出頭口噤不能言

石楠　乾薑　黃芩　細莘　人參各一兩

桂心　麻黃　當歸　川芎藭各一兩五錢

甘草二兩　乾地黃十八銖　食茱萸三十銖

右十二味㕮咀以水六升酒三升煑取三升分三服大汗勿怪

附子散

治中風手臂不仁口面喎邪

附子　桂心各五兩　細莘　防風　人參

乾薑各六兩

右六味治下篩酒服方寸匕日三稍增之

甘草湯

治偏風積年不瘥手脚枯細面口喎僻精神不定言語倒錯

竹瀝四升　甘草　桂心　芎藭　麻黃　當歸

芍藥　人參　附子　側子各二兩　獨活

防己各三兩　生薑　石膏　茯神各四兩

白朮　黃芩　細莘各一兩　秦艽　防風各一兩

半　菊花一斤

右二十一味㕮咀以水一斗先煑麻黃去沫取七升內竹瀝及藥煑取三升分四服服三服訖間一盃粥後更進一服待藥勢自汗愼生冷酢蒜麪乳酪魚等

又方

治中風面目相引口偏著耳牙車急舌不得轉

獨活三兩　竹瀝　生地黃汁各一升

右三味合煎取一升頓服之卽愈

又方

治前證

牡蠣　礬石　附子　竈下黃土

右四味各等分爲末取三年雄雞冠血和藥傅其上持鏡候纔欲復故便急洗去之不速去便過不復還也千金翼云偏右塗左偏左塗右

又方

竹瀝三升　防風　防己　升麻　桂心　芎藭各二兩　麻黃四兩　羚羊角三兩

右八味㕮咀以水四升合竹瀝煑取一升半分三服日服一劑常用效

口耳僻方

杏仁三十枚　防風　附子　葛根各二兩

柏實　麻黃各三兩　獨活　生薑各四兩

右八味㕮咀以水一斗酒二升煑取三升分四服

八風續命湯

治卒半身不遂手足拘急不得屈伸身體冷或智或癡或身强直不語或生或死狂言角弓反張或欲得食或不用食或大小便不利皆療之

人參　桂心　當歸　獨活　黃芩　乾薑
甘草各十八銖　石膏一兩半　杏仁四十枚
右九味㕮咀以井華水九升煮取三升分三服日三復取汗不汗更合加麻黃五兩合服

倉公當歸湯

治賊風口噤角弓反張痙者

當歸　防風各十八銖　附子一枚　細辛半兩
麻黃三十銖　獨活一兩半
右六味㕮咀以酒五升水三升煮取三升服一升口不開者格口內湯一服當蘇二服小汗三服大汗

秦艽散

治半身不遂言語錯亂乍喜乍悲角弓反張皮膚風疹

秦艽　獨活　黃芪　人參　甘菊花各二兩
茵芋十八銖　防風　釵石斛　山茱萸肉
桂心各一兩半　五味子　芎藭　細辛　當歸
附子　甘草　白朮　乾薑　白薛皮各三十銖
麻黃　天雄　遠志各一兩
右二十二味治下篩酒服方寸匕日再漸漸加至二匕又云治風無新久並補胡洽無獨活菊花茵芋石斛芎藭白薛皮遠志有烏頭蜀椒茵草草薢桔梗白薇防己

吳秦艽散

治風注入肢體百脈身腫角弓反張手足痠疼皮膚習習身體盡痛眉毛墮落耳聾驚悸心滿短氣魂志不定陰下濕癢大便有血小便赤黃

秦艽　蜀椒　人參　茯苓　牡蠣　細辛
苦蔄根　麻黃各十八銖　乾薑　附子　白朮
桔梗　桂心　獨活　當歸各一兩　黃芩
柴胡　牛膝　天雄　石楠　杜仲　莽草
烏頭各半兩　甘草　芎藭　防風各一兩半
右二十六味治下篩盛以草袋食前溫酒一升服方寸匕日三服急行七百步更飲酒一升忌如常法

小巖蜜湯

治惡風角弓反張飛尸入腹絞痛悶絕往來有陰筋急少陰傷寒口噤不利

雄黃　青羊脂各一兩　當歸　乾薑　桂心
地黃　芎藭　甘草　細辛各四兩　大黃二兩
吳茱萸三兩
右十一味㕮咀以水二斗煮取六升分六服重者加藥用水二斗煮取九升分十服

麻子湯

治大風周身四肢攣急風行在皮膚身勢強服之不宜虛人又治精神蒙昧者

秋麻子三升水漬一宿　防風　桂心　生薑
石膏綿裹碎　橘皮各二兩　麻黃三兩　竹葉
葱白各一握　香豉一合
右十味㕮咀先以水二斗半煮麻子令極熟濾去滓取九升別煮麻黃兩沸掠去沫內諸藥汁中煮取三升去滓分三服空腹服當微汗若大汗出以粉塗身極重者不過三兩劑輕者一兩劑瘥有人患大風賊風刺風加獨活三兩比之小續命湯華

當六七劑

小金牙酒

主風痓百病虛勞濕冷緩弱不仁不能行步近人用之多效

金牙細辛　莽草　防風　地膚子　地黃　附子
茵芋　續斷　蜀椒　蒴藿根各四兩　獨活一斤
右十一物金牙搗末別盛練囊餘皆薄切同入一大囊以清酒四斤漬之密器泥口四宿酒成溫服二合日二次取效

麻黃續命湯河間下同

治太陽中風無汗惡寒

麻黃　防風　杏仁　續命湯依本方添加一倍

桂枝續命湯

治太陽中風有汗惡風

桂枝　芍藥　杏仁　續命湯依本方添加一倍

白虎續命湯

治陽明中風無汗身熱不惡寒

石膏　知母一斛各二兩　甘草依本方各加一倍
續命湯

葛根續命湯

治陽明中風有汗身熱不惡寒

葛根二兩　桂枝　黃芩依本方各加一倍
續命湯

附子續命湯

治太陰中風無汗身涼

附子加一兩　乾薑加二兩　甘草加三兩

續命湯

桂枝附子續命湯

桂枝　附子各一兩　甘草依本方加一倍

羌活連翹續命湯

小續命湯八兩　加羌活四兩　連翹六兩

三化湯

治中風外有六經之形證內有便溺之阻隔

厚朴　大黃　枳實　羌活各等分

右剉如麻豆大每服三兩水三升煎至一升半終日服之以微利爲度服無時

愈風湯

治中風證內邪已除外邪已盡當服此藥以行導諸經久服大風悉去縱有微邪只從此藥加減治之久服清濁自分榮衛自和如初覺風動服此不致倒仆

羌活　甘草　防風　蔓荊子　川芎　細辛

枳殼　人參　麻黃　甘菊　薄荷　枸杞子

當歸　知母　黃芪　獨活　杜仲　地骨皮

秦艽　柴胡　半夏　前胡　厚朴　吳白芷

熟地黃　防己各二兩　茯苓　黃芩各五兩

生地黃　蒼朮　石膏各四兩　芍藥三兩

桂枝一兩

已上三十三味剉碎每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服如遇天陰加生薑煎空心一服臨臥再煎藥滓服俱要食遠服

四白丹

清肺氣養魄調中風者多昏冒氣不清利也

白朮　白茯苓　人參　縮砂仁　川芎　防風

甘草　甜竹葉　香附子炒各五錢　龍腦另研

牛黃各五分　麝香另研一字　白芷一兩

白檀香一兩半　知母三錢　細辛二錢　羌活

獨活各二錢半　薄荷三錢半　藿香一錢半

右件二十味爲細末煉蜜爲丸每兩作十丸臨臥嚼一丸分五七次嚼之上清肺氣下强骨髓

二丹丸

治健忘養神定志和血內安心神外華腠理

丹參　熟地黃　天門冬去心各一兩半　茯神

麥門冬　甘草各一兩　遠志去心　人參

菖蒲各五錢　丹砂二錢爲衣

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服五十丸至一百丸空心食前常服安神定志一藥清肺一藥安神故氣中之清歸肺以助天眞氣中之濁堅强骨髓血中之清榮養於神血中之濁榮華腠理如素有痰久病中風津液涌溢在胃中氣不利用獨聖散吐之後用利氣瀉火之劑

瀉青丸

治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能安臥此是風熱煩躁

當歸　龍膽　川芎　梔子　羌活　大黃

防風各等分

右爲細末蜜爲丸彈子大每服一丸竹葉湯化下

虎脛骨酒

治風偏枯半死行勞得風若鬼所擊四肢不遂不能行步但是一切諸風攣急之證悉皆治療

石斛　石楠葉　防風　虎脛骨酥炙　當歸

茵芋葉　杜仲剉炒　牛膝　續斷　芎藭

金毛狗脊燎去毛　川巴戟各一兩

右件剉如豆大以絹囊盛藥以酒一斗漬之十日每服一盞盪熱服不拘時候

二香三建湯

治男子婦人中風虛極六腑俱微舌强不語痰涎併多精神如癡手足偏廢不能舉運此等證候不可攻風止可扶虛

天雄　附子　川烏并生去皮各一兩　木香不見火半兩　沉香旋磨水入

右㕮咀每服四錢水二盞生薑十片煎至七分去滓溫服空心食前

神應養眞丹

治厥陰經爲四氣所襲脚膝無力左癱右瘓半身不遂手足頑痲語言蹇澁氣血凝滯偏身疼痛

當歸酒浸搗　熟地黃酒蒸搗　川芎　芍藥

羌活　天麻　菟絲子酒製　木瓜各等分

右爲末入地黃當歸二膏加蜜搗丸桐子大每服百丸空心酒下鹽湯亦可

賈同知通聖散

防風　芍藥各二錢半　甘草　滑石各三兩

荊芥穗三錢五分　薄荷葉　黃芩　石膏

桔梗各一兩　川芎　當歸　大黃　麻黃

連翹各半兩　白朮　山梔子各一分

一方有芒硝縮砂

崔宣武通聖散
滑石三兩　防風　芍藥　荊芥　當歸　白朮
山梔子各一分　川芎　大黃　薄荷　連翹
黃芩　桔梗　縮砂各半兩　甘草　石膏各一兩
改容膏 醫方考
治中風口眼喎斜
蒺藜子一兩　眞冰片三分
右共搗爲膏寒月加乾薑附子各一錢喎左敷右
喎右敷左今日敷之明日改正故曰改容或以蜣
螂冰片敷之或以鱔魚冰片敷之皆良
搜風丸 河間 下同
治邪氣上逆以至上實下虛風熱上攻眼目昏耳
鳴鼻塞頭痛眩運躁熱上壅痰逆嘔噦心腹痞痛
大小便結滯清利頭面鼻聰耳鳴宣通血氣
人參　茯苓　薄荷葉　南星各半兩　乾生薑
藿香葉各一分　蛤粉二兩　白礬　寒水石
大黃　黃芩　半夏各一兩　牽牛　滑石各四兩
右爲末滴水爲丸如小豆大每服十九生薑湯下
加至二十九日三服
祛風丸
治中風偏枯手足顫掉語言蹇澁骨痛
菜豆粉　川烏頭炮　草烏頭炮　天南星
半夏各一兩　甘草　川芎　藿香葉　零陵香
地龍　蠍梢各三錢　白殭蠶淘米泔浸去絲
川薑各半兩炮
右爲末菜末一兩用菜豆粉一兩又一法用藥一
兩以白麪二兩滴水爲丸如桐子大量人虛實加
減細嚼茶酒下五九至七九食後初服三九漸加
地黃飲子
治瘖痱腎虛弱厥逆語聲不出足廢不用
熟地黃　巴戟去心　山茱萸　石斛　附子炮
肉蓯蓉酒浸焙　五味子　官桂　茯苓　菖蒲
麥門冬去心　遠志去心各等分
右爲末每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚薄
荷同煎至八分不計時候
中風方 丹溪 下同
肥人中風口喎手足痲木左右俱作痰治
貝母　苦蔞　南星　荊芥穗　防風　羌活
黃蘗　黃芩　黃連　白朮　陳皮　半夏
薄桂　甘草　威靈仙　天花粉
多食濕麪加附子竹瀝薑汁酒一匙以行經
又方
治左癱
附子三片　酒黃連　酒黃芩　酒黃蘗　防風
羌活　川芎　當歸各半兩　天南星　蒼朮
人參各一兩　麻黃　甘草各三錢
右九如彈子酒化下
又方
治體肥中風先吐後以藥
蒼朮　南星　酒黃芩　酒黃蘗　木通　茯苓
牛膝　紅花　厚朴　甘草　升麻
家寶丹
治一切癱瘓瘇痹不仁口眼喎僻邪入骨髓
川烏　南星　五靈脂薑汁製研　草烏各六兩
白附子　全蠍　沒藥　辰砂各二兩　羌活
乳香　天麻　殭蠶炒各三兩　片腦五錢
麝香二錢半　地龍四兩　雄黃　輕粉各一兩
右爲末作散調三分不覺半錢或蜜丸如彈子大
含化茶酒皆可
如神救苦散
治癱瘓風濕痹走注疼痛不止此劫劑也非痛不
可服痛止則已
米殼一兩去頂膜蜜炒　陳皮各五錢　虎骨炙
乳香研　沒藥研　甘草各二錢半
右爲末每服三錢水一盞煎連滓服病在上食後
在下食前煎時須順攪之
藿香正氣散
治中風順氣除痰
大腹皮　茯苓　白芷　紫蘇各一兩　陳皮
桔梗　白朮　厚朴　半夏麴　甘草各二兩
藿香三兩
右爲末每服二錢薑三片棗一枚煎服
地仙丹
治中風攣踡或癉曳者
牛膝　菟蓉　附子　川椒各四兩　地龍
木鼈子各三兩　覆盆子　白附子　菟絲子
赤豆　南星　骨碎補　羌活　何首烏　狗脊
蕪荑　防風　烏藥各二兩　白朮　甘草
白茯苓　川烏各一兩　人參　黃芪各一兩半
右爲末酒糊丸每服三四十九空心酒下
不臥散

治卒暴中風
川芎一兩五錢　石膏七錢五分　藜蘆五錢
甘草生二錢半
右爲細末口噙水嗑之
潤腸散
治中風便祕
麻子仁另研　大黃酒煨各一兩半　桃仁泥
歸尾　枳實麩炒　白芍　升麻各半兩　人參
生甘草　陳皮各三錢　木香　檳榔各二錢
右除麻仁桃仁外爲末却入二仁泥蜜丸梧子大
每服七八十丸溫水食前下
加減沖和湯
治中風升陽益氣瀉肝潤燥
升麻　當歸　甘草炙各三分　半夏　黃蘗
黃芩　人參　陳皮　芍藥各二分　柴胡
黃芪各五分
右十一味㕮咀水二盞煎至一盞去查溫服
大通聖白花蛇散
治諸風疾
杜仲　天麻　海桐皮　乾蠍　赤箭　槲寄仁
當歸　厚朴　蔓荊子　木香　防風　藁本
官桂　羌活　白附子　蕓薤　虎骨　白芷
山藥　菊花　白花蛇肉　牛膝　甘草　威靈仙
右二十四味等分爲末每服一二錢溫酒調下荊
芥湯亦得空心服之
犀角防風湯
治一切口眼喎斜手足顫曳語言蹇澁四肢痲木
犀角　防風　甘草炙　天麻　羌活各一兩
滑石三兩　石膏一兩半　麻黃七錢半不去節
獨活　山梔子各七錢　荊芥　連翹　當歸
黃芩　全蠍炒　薄荷　大黃　桔梗各半兩
白朮　細辛各四錢
右㕮咀每服五錢水二盞生薑十片煎至一盞去
查稍熱服未汗再一服如臟氣虛則去大黃
續命丹
治男子婦人卒中諸風口眼喎斜語言蹇澁牙關
緊急半身不遂手足搐搦頑痲疼痛涎潮悶亂
川芎　羌活　南星薑製　川烏炮去皮臍
天麻　白蘇皮　當歸　防風　海桐皮　地榆
虎骨　熟地黃　硃砂　烏蛇生　鈴白霜
乾蠍各三兩　肉桂一兩　牛黃　雄黃各三錢
輕粉二錢　麻黃去節四兩
右二十一味爲末麻黃酒汁入各半升同熬成膏
和丸彈子大每服一丸豆淋酒下不拘時候
趁風膏
治中風手足偏廢不舉
紅海蛤如棋子大　川烏去皮臍　穿山甲各二兩
生一半酥炙一半
右爲末每服用半兩糊葱白汁和成厚餅子約一
寸半貼在所患一邊脚心中虛處橫裹縛定於無
風密室中椅上坐椅前用熱湯一盆將貼藥脚於
湯內浸仍用人扶病人恐汗出不能支持候汗出
急去了藥汗欲出身痲木得汗遍遍爲妙宜謹避
風自然手足可舉如病未盡除候半月再用一次
自除根本仍服治風之藥補理忌口遠慾自養
至聖保命金丹
治中風口眼喎斜手足顫掣語言蹇澁四肢不舉
精神昏憒痰涎并多
買衆一兩　生地黃七錢　大黃半兩　青黛
枚藍根各三錢　硃砂研　蒲黃　牛黃研
薄荷各二錢半　珠子研　龍腦研各一錢半
麝香研一錢
右十二味爲末入研藥和勻蜜丸雞頭大每用一
丸細嚼茶清送下新汲水亦得如病人嚼不得用
薄荷湯化下無時此藥鎮墜痰涎大有神效用金
箔爲衣
茯神散
治中風舌强語澁
茯神心炒一兩　薄荷焙二兩　蠍梢去毒二分
右爲末每服二錢溫酒調下
勝金丹
治中風涎潮卒中不語合吐利者服此吐利風涎
青薄荷半斤　猪牙皂角二兩同薄荷以水二升搗
取汁盡用銀石器內慢火熬成膏　瓜蒂末
硃砂研各一兩留此爲衣　粉霜　洛粉各一錢
右以上四物研勻入前膏內入白內杵二三千杵
丸如櫻桃大以硃砂爲衣每服一丸酒磨下
分涎散
治中風涎潮作聲不得口噤手足搐搦
藿香　乾蠍　白附子　南星泡各一兩爲末
臘粉　粉霜各一錢

右六味同爲末研勻每服一錢匕至二錢薄荷湯或茶清湯調下未吐利再服

輕骨丹

主中風癱瘓四肢不遂風痹等疾

苦參三兩半　桑白皮　川芎　白芷　蒼朮

甘松一作梔子　麻黃去節河水三升煎一升去查熬膏

右七味爲末入前麻黃膏和丸彈子大每服一丸溫酒一盞研化溫服之臥取汗五七日間手足當即輕快卒中涎潮分利涎後用之

風藥聖餅子

治男子婦人半身不遂手足頑痲口眼喎斜痰涎壅盛及一切風他藥不效者小兒驚風大人頭風婦人血氣並皆治之

川烏　草烏生　麻黃去節各一兩　白芷二兩

蒼朮　何首烏　川芎　白附子　殭蠶各五錢

防風　乾薑　藿香葉　荊芥穗各二錢五分

雄黃一錢六分

右十四味爲末酢糊丸如桐子大捻作餅子每服二餅嚼碎茶清送下食後服

訶子湯

治失音不語

訶子四兩半生半炮　桔梗一兩半生半炒

甘草二寸半生半炒

右三味爲末每服五錢用童子小便一盞煎五七沸溫服甚者不過三服

導痰湯

治前證

法製硝同萊菔水煑化去蔔綿濾令結入臘月牛膽內風化秤五錢或只風化硝亦可又云一兩

蒙石二兩搥碎焰硝二兩同入小砂罐內瓦片蓋之鐵線縛定鹽泥固濟曬乾火煅紅候冷取出

右爲末神麯糊丸梧子大每服三五十丸白湯下一方加蒼朮半兩滑石一兩看病冷熱虛實作湯使一本有蒙石南星各一兩無枳實入門加香附烏藥沉香木香名順氣導痰湯加黃芩黃連名清熱導痰湯加羌活白朮名祛風導痰湯加遠志菖蒲黃芩黃連硃砂名寧神導痰湯

又方

治前證

半夏二兩　白朮一兩　茯苓七錢半　黃芩

蒙石一兩　風化硝二錢

右爲末同前

蠲風飲子

治中風癱瘓口眼喎斜及一切手足走注疼痛肢節攣急痲痹不仁等證

防風　杜仲薑汁炒　羌活　白芷　當歸酒炒

川芎　生地酒洗　白芍藥　牛膝酒洗　秦艽

何首烏　萆薢　蒼朮泔浸一宿　白朮　木通

大楓肉　威靈仙　血藤鬱邊山龍　防己　丁公藤

生薑杵細各一兩　荊芥穗　海桐皮　五加皮

南星煨裂　半夏湯炮七次　天麻　橘紅去白

赤茯苓　桑寄生　殭蠶炒　釣藤鉤各半兩

薄桂　草烏頭去皮尖　甘草節　川烏去皮臍

猪牙皂角各二錢半　兩頭尖　陰地蕨一名地茶

大薊　小薊　理省藤　桑絡各一兩半

右各細切用無灰酒二十五斤以磁罐一箇盛酒浸藥以皮紙十數重包封罐口冬半月夏七日秋春十日每日清晨午前午後臨臥各服一大白盞忌雞猪魚羊驢馬飛禽蝦蟹等肉味及煎煿油膩水果生冷麥麪一切動氣發風之物其效如神

搜風順氣丸醫學入門下同

治腸胃積熱胷膈痞悶二便燥澀腸風痔漏腰膝痠疼肢節頑痲手足癱瘓言語蹇澀一切風氣

車前子　槲李仁　白檳榔　大麻仁　菟絲子

牛膝　山藥　山茱萸各二兩　枳殼　防風

獨活各一兩　酒大黃五兩

右爲末蜜丸梧子大每二十丸早晨臨臥茶酒米飲任下久覺大腸微動以羊肚肺煑羹補之常服百病皆除如食色縱慾及老人大便結燥者最宜孕婦忌服

古硫附丸

治虛風癱瘓神效

附子一枚重一兩以童便入粉草五錢煑一日至中心無白點爲度取出挖空入礬製硫黃五錢以末蓋之又用麪包入火內煨熟去麪

右取硫附同搗丸梧子大每七分或五分量虛實大小溫酒送下

四神丹

治手足頑痲痰涎壅盛頭目昏眩肩背拘急

天麻　南星　防風各一兩　薄荷五錢

右爲末酒糊丸菉豆大每二十丸荊芥生薑湯下

擬治中風方 明醫雜著下同

治半身不遂手足欠利語言費力呵欠噴嚏面目口眼喎斜寃弛頭目眩運痰火熾盛筋骨時痛或頭痛心悸

川芎一錢二分　當歸　生地薑汁炒　熟地　牛膝酒洗　橘紅鹽水洗　黃芩酒炒　酸棗仁炒各八分　紅花酒洗　甘草炙各四分　羌活　防風　柳桂各六分　南星　半夏　白芍酒炒　白茯苓　天麻各一錢　白朮土炒一錢五分　黃蘗酒炒三分

右水煎入淡竹瀝薑汁二三茶匙侵晨服

加味二陳湯

治中風痰證

橘紅八分　麥芽一錢　半夏薑汁炒　白茯苓　白朮各一錢二分　甘草炙　連翹　黃芩炒　前胡各五分　香附米鹽水炒七分　苦蘆仁杵　桔梗各一錢

右水煎入生薑汁三匙竹瀝兩蜆殼半饋溫服蓋

治痰藥亦以脾胃爲主

加味化痰丸

治中風痰滿胃膈咽喉不利

半夏湯泡七次薑汁拌透　橘紅鹽水洗　桔梗　海蛤粉另研　苦蘆仁另研各三兩　枳殼麩炒　香附米淡鹽水炒　連翹　枯黃芩炒各五錢　貝母去心炒一兩　訶子皮　枯礬各二錢五分

右爲末煉蜜薑汁爲丸如黍米大淡薑湯下四五十丸不可過服恐傷上焦元氣

稀莶丸

治中風骨節疼痛緩弱無力

稀莶草不拘多少五月五日或七月七日九月九日採來曬乾鋪入甑中用好酒層層勻洒蒸之復曬如此九次

右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十丸空心無灰酒下

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百四十二卷目錄
醫部彙考二百二十二
風門六
方二　犀角散　決明子丸　射干湯　又方　萬
寶阿膠湯　麻合香丸　易簡三生飲　又方　還魂湯　小續
命湯　疏風湯　勝金丸　又方　人參順氣散　省風湯　芎
藭湯　防風湯　大秦艽湯　養榮湯　排風湯　加減排
風湯　至寶丹　激酒湯　牛黃清心丸　牛黃金虎丹　續生
飲　小省風湯　奪命散　開關散　烏藥順氣散　通關散　通頂散　嗆
鼻通天散　烏附丸　烏荊丸　碧霞丹　巴
豆丸　羌活湯　腎瀝湯　正吾散　轉舌膏
解語丸　清神解語湯　資壽解語湯　湯活
命金丹　牛黃定志丸　祛風至寶丹　清陽
湯　牽正丹　麻油　理氣祛風散　祛
痰順氣湯　犀角丹　麻湯　天仙膏　加減
調經湯　祛風除濕湯　加味大補湯　天台
散　全牛虎骨散　舒筋保安散　疏風順氣
散　加減導痰湯　導痰湯　大省風
湯　沉香半夏湯　青州加味青州
白丸子　白丸子　加味
防風通聖散　史國公藥酒　人參羌活散
勻氣散　換骨丹　定風餅子　通氣導風湯
麻仁丸　一粒金丹　木香保命丹　犛風丹　烏
龍丹　犛彈丸　辟異錠子　又
方　西州續命湯
藝術典第二百四十二卷
醫部彙考二百二十二
風門六
方二
犀角散　奇效良方下同
治肝臟中風流注四肢上攻頭面疼痛言語蹇澀
上焦風熱口眼喎斜脚脉疼痛無力
犀角　石膏各二錢　羌活　羚羊角各一錢半
人參　菊花　獨活　黃芩　天麻　枳殼麩炒
當歸　芎藭　白朮　酸棗仁　防風　黃芪
白芷各五分　甘草三分
右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服
決明子丸
治肝臟中風攻及手足緩弱無力口眼喎斜精神
不定行步艱難並宜服之
決明子　天雄炮去皮　獨活　天南星薑製
川芎　白朮　升麻　白附子炮去皮　防風
蔓荊子　當歸　細辛洗　酸棗仁　蕪荑酒浸
犀角屑　白花蛇肉酒浸　白殭蠶炒各半兩
牛黃別研　麝香另研　硃砂各二錢半
右爲細末入牛黃等三味再研和勻煉蜜爲丸如
梧桐子大每服三五十丸豆淋酒送下不拘時服
射干湯
治肝經受病多汗惡風善悲嗌乾喜怒時憎女子
目下青黃色可治急灸肝腧百壯更宜行經順氣
若目下大段青黑一黃一白者不可治
射干　芍藥各二錢半　荊芥三錢　桂心半錢
牡蠣　石膏各二錢
右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服
又方
治肝臟中風心神煩熱言語蹇澀不得臥
竹瀝　荊瀝　葛根汁　生薑汁　白蜜各一合
右五味汁相勻頻頻服之不拘時
麻黃散
治心臟中風虛寒顛掉心驚掣悸語聲混濁口喎
冒昧好笑並宜服之
麻黃去節　白朮　防風　川芎　防己　當歸
甘草炙　人參各一錢　桂心五分　羌活
遠志　茯神去木各一錢半　川升麻八分
右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾入竹瀝半
盞再煎一二沸不拘時服
蘇合香丸
療傳屍骨蒸瘕蠱肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐
利時氣魅魅瘴癘赤白暴痢瘀血月閉痙癖丁腫
驚癎鬼忤中人小兒吐乳大人狐狸等病
白朮　青木香　烏犀角屑　香附子炒去毛
硃砂研水飛　訶黎勒煨取皮　白檀香　沉香
安息香另末無灰酒一升熬膏　麝香　丁香
華茇各二兩　龍腦研　蘇合香油入安息膏內
薰陸香別研各一兩
右爲細末入研藥勻用安息香膏并煉白蜜和劑
每服旋丸如梧桐子大朝取井華水溫冷任意化
服四丸老人小兒化服一丸溫酒化服亦得並空
心服之用蠟紙裹一丸如彈子大絳絹袋當心帶
之一切邪神不敢近
易簡三生飲
治卒中昏不知人事口眼喎斜半身不遂咽喉作
聲痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒或六脈沉
伏或指下浮盛並宜服之兼治痰厥飲厥及氣虛
脫運悉有神效但口開手撒眼合遺尿鼻聲如鼾
者難治
天南星一兩　川烏去皮　生附子各半兩
木香二錢半

右㕮咀每服半兩水二盞薑十片煎至六分去滓溫服或口噤不省人事者用細莘皂角各少許爲細末以蘆管吹入鼻中候噴嚏其人少蘇然後進藥痰涎壅盛者每服加全蠍四枚仍用養正丹鎮墜之一方氣盛人止用南星半兩木香一錢加生薑七片名星香散一方氣虛人用生附子幷木香如前數煎名附香飲亦有天雄代附子者並治卒中始作無不尅效

萬寶回春湯 得效方

治一切風虛諸證去風和氣活血大有神效夫血和平榮衛調則風證自去

白芍一錢二分　黃芪八分　白朮六分　茯神　半夏各五分　附子　人參　麻黃　黃芩　熟地黃　生地黃　杏仁　川芎　當歸　陳皮　防風　防己　肉桂　乾薑　香附子　甘草各四分　沉香　烏藥　川烏各三分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

勝金丸 本事方

治中風忽然昏倒若醉形體昏悶四肢不收風涎潮於膈上氣閉不通

猪牙皂角二兩搥碎水一升同薄荷浸汁研成膏　薄荷　硃砂研各半兩　瓜蔕末一兩　藜蘆二兩

右將硃砂末二分與二味末研勻用膏子搜和丸如龍眼大以硃砂爲衣溫酒化下一丸甚者二丸以吐爲度得吐卽醒不醒者不可治必用方論中風無吐法引金虎碧霞爲戒且如卒暴涎生聲如引鋸牙關緊急氣閉不行湯藥不能入命在須臾者執以無吐法可乎但不當用銀粉藥恐損脾壞人四肢爾羅謙甫有粉霜鉛粉無藜蘆

又方

治急中風口閉涎壅垂死者

江子二粒去皮膜　白礬如拇指大一塊爲末

右將二味在於新瓦上煅令江子焦赤爲度煉蜜丸如芡實大每服一丸用綿裹放患人口中近喉處良久吐痰立愈

還魂湯 千金方

治卒感忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕無復覺或已死口噤不開挖齒下湯湯不下者分病人髮左右捉踏肩引之藥下復增取盡一升須臾立蘇

麻黃三兩　桂心二兩　甘草一兩　杏仁七十粒

右㕮咀水八升煑取三升分三服肘後方云張仲景方無桂心只三味

小續命湯 醫學入門

治卒中風不省人事喎斜癱瘓瘖瘂麻木眩運初中無汗表實等證及治一切諸風證

防風一錢半　防己　桂　杏仁　黃芩　人參　白芍　川芎　麻黃　甘草各一錢　附子炮五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服一方無防己附子有當歸石膏有熱用白附子

疎風湯 萬病回春

治風中腑手足不仁先宜解表後用愈風湯調理

羌活　防風　當歸　川芎　赤茯苓　陳皮　半夏　烏藥　白芷　香附子各八分　桂枝　細莘　甘草各三分

右剉作一貼入薑三片水煎服

人參順氣散 局方下同

治中風氣虛喎斜癱瘓語澀身疼

麻黃　陳皮　川芎　白芷　白朮　厚朴　桔梗　甘草各一錢　乾葛七分半　人參　乾薑各五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚薄荷七葉同煎服

省風湯 奇效良方

治痰厥中風

半夏湯泡八兩　甘草炙二兩　防風四兩

右㕮咀每服半兩薑二十片水二盞煎服

莽草膏 肘後方

治風入五臟恍惚腫痹

莽草一斤　烏頭　附子　蘛蘛各二兩切

右以水和酢一升漬一宿猪脂一斤煎三上三下絞去滓向火以手摩病上三百度應手卽瘥

茵蕷酒 圖經本草

治賊風手足枯痹拘攣

茵蕷　附子　天雄　烏頭　秦艽　女萎　防風　防己　石楠葉　蘛蘛花　細莘　桂心各一兩

右十二味切以絹袋盛清酒一斗漬之冬七夏三春秋五日藥成每服一合日三服以微痹爲度

養榮湯 萬病回春

治風中血脈外無六經之形證內無便溺之阻隔但肢不能舉口不能言或痰迷不省

當歸　川芎　白芍藥　生地黃　麥門冬

遠志　石菖蒲　陳皮　烏藥　白茯苓　枳實
黃連　防風　羌活　秦艽　半夏　天南星
甘草各六分
右剉作一貼入薑三片竹茹一塊水煎服
排風湯（局方）
治風中五臟精神恍惚手足不仁口眼喎斜半身不遂
獨活　麻黃　赤茯苓各一錢　白朮　肉桂
川芎　杏仁去皮尖　白芍藥　防風　當歸身
甘草各八分　白蘚皮五分
右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服
加減排風湯（古今醫鑑）
通治五臟風
天麻二錢　蒼朮一錢　防風　川芎　羌活
獨活各八分　麻黃七分　白蘚皮　當歸身
白芍藥　白朮　半夏　赤茯苓　黃芩　杏仁
甘草各四分
右剉作一貼入薑三片水煎服
大秦艽湯（易老）
治中風外無六經之形證內無便溺之阻隔知爲血弱不能養筋故手足不能運動舌強不能言語宜養血而筋自榮此方主之
秦艽　石膏各一錢　羌活　獨活　川芎
白芷　生地黃　熟地黃　當歸　白芍　黃芩
防風　白茯苓　白朮　甘草各七分　細辛三分
右剉作一貼水煎服不拘時
羌活愈風湯（丹溪心法）
治風中腑中臟先以本藥治之後用此藥調理凡中風內邪已除外邪已盡當服此藥以行導諸經久則大風悉去清濁自分榮衛自和矣
蒼朮　石膏　生地黃各六分　羌活　防風
當歸　蔓荊子　川芎　細辛　黃芪　枳殼
人參　麻黃　白芷　甘菊　薄荷　枸杞子
柴胡　知母　地骨皮　獨活　杜仲　秦艽
黃芩　白芍藥　甘草各四分　肉桂二分
右剉作一貼入薑三片水煎朝夕服或以此湯空心嚥下二參丹蹔臥嚥下四白丹
至寶丹（局方）
治卒中急風不語不省人事及風中臟精神昏冒
犀角　硃砂　雄黃　琥珀　玳瑁各一兩
牛黃五錢　龍腦　麝香各一錢半　銀箔　金箔各五十片　安息香酒濾去沙土淨一兩熬膏
右爲末入安息香膏搜和勻一兩分作四十丸以前金箔一半爲衣人參湯化下一丸一日二三服但安息香性硬難化倉卒難用宜減半代煉蜜爲佳
滋潤湯（舊病新春）
治風中臟二便閉澀先服此後以愈風湯調理
當歸　生地黃　枳殼　厚朴　檳榔　大黃
麻仁　杏仁各一錢　羌活七分　紅花酒焙三分
右剉作一貼水煎服
牛黃清心丸（古今醫鑑）
治卒中風不省人事痰涎壅塞精神昏憒言語蹇澁口眼喎斜手足不遂等證
甘草炒五錢　人參　蒲黃　神麴炒各二錢半
犀角二錢　山藥七錢　大豆黃卷炒　肉桂
阿膠炒各一錢七分半　白芍藥　麥門冬
黃芩　當歸　防風　硃砂飛　白朮各一錢半
雄黃八分　柴胡　桔梗　杏仁研　白茯苓
川芎各一錢二分半　牛黃二錢二分　羚羊角
麝香　龍腦各一錢　白蒺　乾薑炮各七分半
金箔百二十片　大棗二十枚蒸取肉研爲膏
右爲末棗膏入煉蜜和勻每一兩作十丸以前金箔四十片爲衣每取一丸溫水化下
牛黃金虎丹（局方）
治急中風不省身强口噤鼻乾面黑遍體壯熱汗出如油目瞪脣青心神迷悶形體如醉痰涎壅塞胷喉中如拽鋸聲
雄黃十五兩　牛黃二錢半　白礬枯　天竺黃
膽星各二兩五錢　天雄炮一兩二錢半　臘粉
龍腦各二錢
右爲末煉蜜和勻每一兩半分作十丸金箔八十片爲衣每一丸新汲水和灌之扶坐使藥行良久以薄荷汁更和一丸灌之立愈如肥盛體虛多涎有風宜常以此藥隨身備急爲妙
攝生飲（萬病回春）
治卒中風不省無熱者
南星　半夏各一錢半　木香　蒼朮　細辛
石菖蒲　甘草各一錢
右剉作一貼入薑七片水煎服
小省風湯

治卒中風不省有熱者
防風　南星各二錢　半夏　黃芩　甘草各一錢
右剉作一貼薑十片水煎服與導痰湯合煎服尤妙可以散風豁痰降火

奪命散（古今醫鑑下同）

治卒中風涎潮氣塞口噤目瞪
天南星　甜葶藶　半夏　巴豆去殼不去油　白芷各等分
右爲末每半錢薑汁一呷調下卽效凡口噤藥不下者宜用此

開關散

一名破棺散治卒中風目瞑口噤
天南星末五分　龍腦一字
右研和以中指蘸藥末揩齒一二十度其口自開每用半錢至一字端午日合尤佳

烏藥順氣散

治一切癱瘓歷節先服此疏通氣道後進風藥
麻黃　陳皮　烏藥各一錢半　川芎　白芷　白殭蠶　枳殼　桔梗各一錢　乾薑五分　甘草三分
右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

八味順氣散（演生）

凡中風人先服此藥順氣次進治風藥
白朮　白茯苓　青皮　香白芷　陳皮去白　烏藥　人參各一兩　炙甘草半兩
右爲細末每服三錢水一盞煎七分溫服

通關散（局方）

治卒中風不省口噤氣塞
細辛　皂角　薄荷　雄黃各一錢
右爲末每少許入鼻中有嚏可治無嚏不可治一方南星半夏皂角等分爲末用如上法

通頂散（丹溪心法下同）

治卒中風不省吹鼻卽甦
藜蘆　川芎　細辛　人參　甘草各四分
右爲末每取一字吹入鼻中卽提起頂中髮卽甦有嚏可治無嚏不可治

嚏鼻通天散

治前證
川芎　細辛　藜蘆　白芷　防風　薄荷　皂角
右等分爲末用如上法

烏附丸（濟衆方）

搜風順氣
川烏頭二十箇　香附子半斤薑汁浸一宿炒焙
右爲末酒糊丸梧子大每溫酒下十丸肌體肥壯有風疾者宜常服之

烏荊丸（局方下同）

治諸風縱緩言語蹇澁偏身麻痛皮膚瘙痒痛風攣搐頤頷不收者服六七服卽甦也
川烏頭炮去皮臍一兩　荊芥穗二兩
右爲末酢麪丸梧子大溫酒或熱水每服二十丸

碧霞丹

凡中風痰厥癲癎驚風痰涎上壅牙關緊急上視搐搦並主之
石綠研九度飛過十兩　烏頭尖　附子尖　蝎梢各七十箇
右爲末麪糊丸芡子大每用一丸薄荷汁半盞化下更服溫酒半合須臾吐出痰涎爲妙

巴豆丸（本事方）

治卒中風痰塞垂死
巴豆二枚去皮膜　白礬如拇指大一塊爲末
右二味瓦上煅令豆焦赤爲度蜜丸芡實大每丸綿裹放患人口中近喉處良久吐痰立愈

羌活湯（簡易方）

治中風偏廢
生附子一箇去皮臍　羌活　烏藥各一兩
右咬咀每服四錢生薑三片水一盞煎七分服

腎瀝湯（得效方下同）

治腎臟風語音蹇吃
羊腎一具　生薑二兩切　磁石碎一兩七錢三味以水一斗煮減半入後藥　元參　白芍藥　白茯苓各一兩二錢半　地骨皮五錢　黃芪　川芎　五味子　桂心　當歸　人參　防風　甘草各一兩
並剉再煮取二升去滓分三服

正舌散

治中風舌强語澁神妙
薄荷焙二兩　赤茯苓一兩　蝎梢二錢半
右爲末每一二錢溫酒調下寶鑑用茯神心一兩炒名茯神散治同

轉舌膏（醫學入門）

治中風舌强不語

凉膈散　加石菖蒲　遠志

爲末蜜丸彈子大硃砂爲衣每一丸薄荷湯化下

解語丸 [illegible]

治中風語言不正

白附子　石菖蒲　遠志　全蠍　羌活　天麻

膽星　白殭蠶

右等分爲末蜜丸菉豆大每五七十丸薑湯吞下

清神解語湯 古今醫鑑

治中風痰迷心竅言語蹇澀或不省人事

南星　半夏二味同白礬生芋皂角水浸三日曬乾

各一錢　當歸　川芎　白芍藥　生地黃

麥門冬　遠志　石菖蒲　陳皮　枳實　烏藥

白茯苓　黃連　防風　羌活　甘草各五分

右剉作一貼入芋三片竹茹一團水煎入童便薑

汁竹瀝調服

資壽解語湯 醫學入門

治風中心脾舌强不語蓋心之別脈係於舌本脾

之脈挾咽連舌本散舌下故也

羚羊角　桂皮各一錢　羌活　甘草各七分半

防風　附子炮　酸棗仁　天麻各五分

右剉作一貼水煎入竹瀝五匙薑汁一匙服

活命金丹 醫學編目

治中風臟神不清

辰砂四錢　大黃一兩半　桂心　芒硝各一兩

珍珠　牛黃　青黛　犀角屑　薄荷各五錢

麝香　龍腦各二錢　板藍根　貫衆　乾葛

甘草各七錢

右爲末蜜水浸蒸餅和勻每兩作十丸就濕以前

硃砂二錢爲衣再用金箔四十片爲衣每服一丸

如療風毒茶清化下臘月收合妙

牛黃定志丸 丹溪心法下同

治心臟中風昏冒精神不守壓驚鎮心化涎安神

硃砂飛　半夏薑製各二兩　雄黃飛　天麻

烏蛇肉　甘草各一兩　琥珀七錢半　牛黃

麝香二錢半　全蠍　白殭蠶炒　白附子炮

龍腦　膽星各五錢

右爲末蜜丸芡實大每一丸以人參薄荷湯嚼下

祛風至寶丹

治風中臟昏冒及風熱

石膏一兩半　川芎　當歸各一兩二錢半

防風　白芍藥各七錢半　白朮六錢半　石膏

黃芩　桔梗　熟地黃　天麻　人參　羌活

獨活各五錢　梔子三錢　連翹　荊芥　薄荷

麻黃　芒硝　黃連　大黃　黃蘗　細辛

全蠍各二錢半　甘草一兩

右爲末蜜丸彈子大每一丸細嚼茶酒任下此乃

防風通聖散加味也

清陽湯 東垣十書

治中風口眼喎斜頰顋急緊此胃中火盛必汗不

止小便數

升麻　黃芪　當歸身各二錢　葛根一錢半

甘草炙一錢　蘇木　甘草生各五分　酒黃蘗

紅花　桂枝各二分

右剉作一貼酒三盞煎至一盞三分溫服

秦艽升麻湯 衛生寶鑑

治風中手足陽明經口眼喎斜

升麻　葛根　白芍藥　人參　甘草各一錢半

秦艽　白芷　防風　桂枝各七分

右剉作一貼入連根葱白三莖水煎服食後

牽正散 丹溪心法

治中風口眼喎斜

白附子　白殭蠶　全蠍並生用各等分

右爲末每一錢熱酒調下

理氣祛風散 古今醫鑑

治中風口眼喎斜

羌活　獨活　青皮　陳皮　枳殼　桔梗

南星　半夏　烏藥　天麻　川芎　白芷

防風　荊芥穗　白芍藥　甘草各六分

右剉作一貼入薑五片水煎服

清痰順氣湯 萬病回春

治風中經絡口眼喎斜

南星　苦蔞仁　荊芥穗　貝母　陳皮　蒼朮

官桂　防風各一錢　黃連　黃芩並酒炒

甘草各六分

右剉入薑三片水煎入木香沉香末各五分調服

犀角升麻湯 衛生寶鑑

治中風鼻額間痛脣口頰車髮際皆痛口不可開

左額頰上如糊急手觸之則痛此足陽明經受風

毒血凝滯而然

犀角一錢半　升麻一錢二分半　甘草五分

防風　羌活各一錢　川芎　白附子　白芷
黃芩各七分半
右剉作一貼水煎服食後
天仙膏（得效方）
治卒中風口眼喎斜
南星大者一箇　草烏大者一箇　白芨一錢
白殭蠶七箇
右爲末生膠魚血調成膏敷喎處覺正便洗去
加減潤燥湯（衛生寶鑑）
一名愈生潤燥湯治左半身不遂屬血虛與死血
白芍藥酒炒二錢　當歸一錢二分　川芎
白茯苓　白朮　南星　半夏　天麻各一錢
生地黃酒炒　熟地黃薑汁炒　陳皮鹽水洗
川牛膝酒洗　黃芩酒炒　酸棗仁炒各八分
桃仁　羌活　防風　薄桂各六分　紅花酒洗
甘草炙各四分　黃蘗酒炒三分
右剉作一貼水煎入竹瀝薑汁調服
祛風除濕湯（萬病回春下同）
治右半身不遂屬氣虛與濕痰
白朮一錢二分　白茯苓　當歸酒洗　赤芍藥
陳皮　半夏　蒼朮　烏藥　枳殼　黃連酒炒
黃芩酒炒　羌活各一錢　人參　川芎　桔梗
防風各八分　白芷七分　甘草炙五分
右剉分二貼入薑五片水煎服
加味大補湯
治左右癱瘓此血氣大虛也
黃芪蜜炙　人參　白朮　白茯苓　當歸酒洗
川芎　白芍藥　熟地黃各七分　烏藥　木瓜
牛膝酒洗　杜仲酒炒　防風　羌活　獨活
薏苡仁各五分　附子炮　沉香　木香　肉桂
甘草各三分
右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服
天台散（古今醫鑑）
治中風癱瘓疼痛
烏藥　陳皮　麻黃　川芎　枳殼　桔梗
白芷　白殭蠶　乾薑　防風　羌活　天麻
當歸　續斷　威靈仙　甘草各六分　乳香
沒藥　麝香各二分
右剉作一貼水煎入乳沒麝三味細末調服
全生虎骨散（丹溪心法下同）
治半身不遂肌肉乾瘦名曰偏枯忌用發汗之劑
惟當潤筋去風
當歸一兩半　赤芍藥　續斷　白朮　青蒿
虎骨各一兩　烏蛇肉五錢
右爲末每二錢溫酒食後調下骨中疼痛加生地
黃一兩
舒筋保安散
治左癱右瘓筋脈拘攣身體不遂脚腿少力乾濕
脚氣及濕滯經絡久不能去宣導諸氣
木瓜五兩　草解　五靈脂　牛膝酒浸　續斷
殭蠶炒　烏藥　松節　白芍藥　天麻　黃芪
威靈仙　當歸　防風　虎骨酥炙各一兩
右剉以無灰酒一斗浸封口過二七日取出焙乾
爲細末每服二錢以槃酒調下酒盡米飲調下
疎風順氣湯（醫學正傳）
治中風半身不遂或全體不能舉動因元氣虛弱
兼酒色之過而更挾外邪也
人參　防風　麻黃　羌活　升麻　桔梗
石膏　黃芩　荆芥穗　天麻　南星　薄荷
葛根　芍藥　杏仁　當歸　川芎　白朮
細辛　皂角各五分
右剉作一貼入薑五片水煎更入竹瀝半盞服之
外以艾灸治風穴得微汗而愈
祕方（萬病回春下同）
治癱瘓如神
熟牛骨內髓一椀　煉熟蜜一斤二味濾過
入炒麪一斤　乾薑末二兩
拌勻如彈子大日服三四丸細嚼溫酒下大效
加減導痰湯
治中風痰盛不能言語熱者宜服
南星　半夏以皂角白礬生薑同煎湯浸透炒乾
白茯苓　陳皮　白朮　桔梗　枳殼各一錢
甘草三分　黃連　黃芩　薏仁　人參　當歸
木香各五分
右剉作一貼入薑三片水煎入竹瀝薑汁調服
滌痰湯（濟方）
治中風痰迷心竅舌強不能語
半夏　膽星並薑製各二錢五分　枳實　橘紅
茯苓各二錢　石菖蒲　人參各一錢　竹茹
甘草各五分
右剉作一貼入薑水煎服此藥治中風不語豁痰

清熱利氣補虛可謂簡而當也

大省風湯 醫學入門

治中風痰盛喎斜不遂

防風　半夏各二錢　川烏炮　南星生　木香

白附子生　甘草各一錢　全蠍三分

右剉作一貼入薑十片水煎服

沉香半夏湯 資生方

治中風痰盛去痰醒脾和氣益心

附子炮一枚　沉香研細　熟附子各五分

人參五錢　半夏製二錢　南星炮一錢

右爲細末每三錢水二盞薑十片煎一盞空心服

青州白丸子

治風痰湧盛嘔吐涎沫口眼喎斜手足癱瘓小兒驚風及痰盛泄瀉

白附子　南星各二兩　川烏去皮臍五錢

半夏水浸生衣七錢

右四味並生用爲末絹袋盛水擺出粉末盡再擂擺以盡爲度貯磁盆日暴夜露春五夏三秋七冬十日曬乾糯米糊丸菉豆大每服二十丸薑湯下

加味青州白丸子 丹溪心法

治中風壅塞喎斜癱瘓

白附子　天南星　半夏　白殭蠶　天麻

全蠍各一兩　川烏五錢

並生爲細末薑汁麪糊和丸梧子大薑湯吞下五七十丸不拘時

蠍麝白丸子 得效方

治中風痰涎壅塞一切風痰他藥不能療者

半夏七兩　南星三兩　白附子二兩　川烏

天麻　防風各一兩　全蠍五錢　麝香半錢

右並生爲末薑汁糊和丸梧子大薑湯下三五十丸癱瘓風溫酒下日三服數口後當有汗便能舒展經三五日頻呵欠是應

龍星丹 丹溪心法下同

治風熱壅痰涎盛昏冒眩運

膽星　硃砂各三錢　黃芩　黃連各二錢

全蠍　防風　薄荷各一錢　片腦　牛黃

麝香各三字　青黛一錢

右爲末蜜丸櫻桃大別以硃砂爲衣每一丸噙化嚥下不拘時凡風病多是濕土生痰痰生熱熱生風此方既治風熱又兼理痰凡風熱痰無不治也

蘇青丸

和氣卒散風痰

青州白丸子末三兩　蘇合香丸末一兩

右和勻薑汁糊和丸梧子大淡薑湯下三四十丸

防風通聖散

治諸風熱或中風不語暴瘖語聲不出熱極生風爲舌强口噤筋惕肉瞤

滑石一錢七分　甘草一錢二分　石膏　黃芩

桔梗各七分　防風　川芎　當歸　赤芍藥

大黃　麻黃　薄荷　連翹　芒硝各四分半

荊芥　白朮　梔子各二分半

右剉作一貼入薑五片水煎服此方治熱風燥三者之總劑也

史國公藥酒

治中風日久語言蹇澀半身不遂手足拘攣不堪行步痿痹不仁

防風去蘆　秦艽去蘆　油松節　虎脛骨酥炙

鼈甲酢炙　白朮炒各二兩　羌活　萆薢

晚蠶沙炒　當歸酒洗去土　川牛膝去蘆

杜仲去皮薑汁炒去絲各三兩　蒼耳子四兩

枸杞子五兩　乾茄根去土八兩

右爲粗末絹袋盛浸無灰酒三十斤煑熟退火毒服每日數次常令醺醺不斷

人參羌活散 得效方

治中風痰盛煩熱

羌活　獨活　前胡　人參　防風　天麻

薄荷　川芎　黃芩　枳殼　桔梗　赤茯苓

蔓荊子　甘草各七分

右剉作一貼入薑三片桑白皮七寸同煎服

勻氣散

一名順風勻氣散治中風氣虛不遂

白朮二錢　烏藥一半錢　人參　天麻各一錢

沉香　青皮　白芷　木瓜　紫蘇　甘草各五分

右剉作一貼薑二片水煎服

換骨丹 醫學入門

治中風喎斜癱瘓及暗風風癇

蒼朮　槐實　桑白皮　川芎　白芷　威靈仙

人參　防風　何首烏　蔓荊子各一兩　苦參

五味子　木香各五錢　龍腦　麝香各五分

右爲末以麻黃煎膏和搗萬杵每一兩分作十丸硃砂爲衣每取一丸磨溫酒半盞以物合定不透

氣食後臨臥一呷噀之衣覆取汗卽差
歌曰我有換骨丹傳之極幽祕疎開病者心扶起
衰翁臂氣壯卽延年神清目不睡南山張仙翁三
百八十歲槐皮芎朮莊仙人防首蔓十件各停勻
苦陳香減半龍麝卽少許硃砂作衣纏麻黃煎膏
丸大小如指彈修合在深房勿令陰人見夜臥服
一粒遍身汗津滿萬病自消除神仙爲侶伴

定風餅子 本事方

治中風面喎舁蜗痰厥頭痛眩運嘔吐

天麻 川烏 南星 半夏 白薑 川芎
白茯苓 甘草生

右等分爲末薑汁和丸芡實大作餅子硃砂爲衣
每一餅細嚼薑湯下預防風疾爽慧神志

通氣驅風湯 得效方

一名驅風通氣散治中風口眼喎斜半身不遂痰
涎壅盛語言蹇澁行步艱難精神不爽

烏藥一錢半 川芎 白芷 桔梗 陳皮
白朮 甘草各一錢 麻黃 枳殼 人參各五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

祕傳順氣散 古今醫鑑

治中風喎斜癱瘓一切風疾

青皮 陳皮 枳殼 桔梗 烏藥 人參
白朮 半夏 川芎 白芷 細辛 麻黃
防風 乾薑 白茯苓 白殭蠶 甘草各六分

右剉作一貼入薑五片水煎服

木香保命丹

治中風一切諸證

木香 白附子生 桂皮 杜仲 厚朴 蒼本
獨活 羌活 海桐皮 白芷 甘菊 山藥
白花蛇酒炒 全蠍炒 威靈仙酒洗 蔓荊子
天麻 當歸 虎骨酒浸酥炙 天南星漿水煮
防風 牛膝酒浸 甘草酥炙 赤芍藥各五錢
硃砂七錢半 麝香一錢半

右爲末蜜丸彈子大留前硃砂一半爲衣每一九
細嚼溫酒送下

禦風丹 醫學入門

治中風口眼喎斜半身不遂神昏語澁

防風 香白芷 麻黃去節各一兩半 乾生薑
甘草各七錢半 川芎 白芍藥 桔梗 細辛
白殭蠶 羌活 南星各五錢

右爲末蜜丸彈子大硃砂二錢半爲衣每一九熱
酒化下

烏龍丹 直指方

治中風口眼喎斜手足戰曳言語蹇澁神驗

川烏生去皮臍 五靈脂各二兩共爲末 龍腦
麝香各五分

右和勻滴水丸如彈子大每一丸先以薑汁研化
次日暖酒調服一日兩服五七丸便覺手移足步
十九可以自梳頭

一粒金丹 得效方

治一切諸風

川烏炮 附子炮 白附子炮各一兩 白殭蠶
白蒺藜炒 五靈脂 白礬枯過 沒藥各五錢
硃砂 細墨磨化 麝香各二錢半

右爲末以墨汁和勻每兩作六丸金箔爲衣每一
丸薑汁和酒半盞溫熱調服更飲一二升以助藥
力覆衣汗出爲效

鐵彈丸 局方

治中風喎斜癱瘓遲潮語澁筋攣骨痛應是風疾
無不治之

五靈脂 川烏炮各一兩 乳香 沒藥各五錢
麝香一錢

右爲末滴水和丸彈子大每一丸薄荷酒化下

辟巽錠子 丹溪心法

治一切諸風及破傷風小兒急慢驚風疾

硃砂一兩 膽星二錢 防風 川烏 天麻
川芎 白芷 人參 薄荷 木香 白朮
茯神各五錢 麝香二錢 牛黃 龍腦 乾薑
白附子各三錢 全蠍二十箇生 殭蠶三七箇生

右爲細末用麻黃一斤甘草八兩蜂蜜二兩煎作
膏子入藥末和勻一兩作十錠金箔爲衣每一錠
溫酒化下

又方 千金方下同

治中風不能言四肢垂曳皮肉痛癢不知

獨活 麻黃各二兩 芎藭 防風 當歸
葛根 生薑 桂心 茯苓 附子 細辛
甘草各一兩

右十二味咬咀以水一斗二升煮取四升分五服
老少半之若初得病便自大汗者減麻黃不汗者
依方上氣者加吳茱萸二兩厚朴一兩乾嘔者倍
加附子一兩嘔者加橘皮二兩若胷中吸吸少氣

者加大棗十二枚心下驚悸者加茯苓一兩若熱者可除生薑加葛根初得風未須加減便且作三劑停四五日已後更視病虛實行湯或針或灸

西州續命湯

治中風風痱入臟身體不知自收口不能言冒昧不識人拘急背痛不得轉側

麻黃六兩　石膏四兩　桂心二兩　甘草芎藭　乾薑　黃芩　當歸各一兩　杏仁三十枚

右九味㕮咀以水一斗二升煮取麻黃再沸掠去上沫後下諸藥煮取四升初服一升猶能自覺者勿熟眠臥可厚覆小汗出已漸減衣勿復大覆可熟眠矣前服不汗者後復服一升汗後稍稍五合一服安穩乃服勿頓服也汗出則愈勿復服飲食如常無禁忌勿見風凡服此湯不下者人口噓其背湯則下過矣病人先患冷汗者不可服此湯若虛羸人但當稍與五合爲佳

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百四十三卷目錄

醫部彙考二百二十三

風門七

方三　加味牛黃散　遠志湯　犀角丸　珠砂丸　石斛酒　白朮湯　細辛湯　仙茅湯　羚羊角丸　五味子湯　獨活散　獨活散　天雄散　天麻丸　狗脊丸　黃芪丸　萬靈丸　仙傳黑虎丹　不換金丹　三拗散　天麻丸　千金保命丹　酒浸仙茅方　起死方　秋大續命湯　大八風湯　八風散　小八風散　烏頭湯　大防風湯　獨活酒　金牙酒　胃風湯　奉先湯　三黃湯　逐黃湯　木瓜散　三聖散　續斷丹　羚羊角散　豬腰丸　世傳白花蛇酒　酸棗仁散　竹瀝湯　白花蛇酒　防風散　蒲黃散　茶調散　白花蛇膏　獨聖散　一字散　加減一字散　五補飲　右歸飲　三陰煎　大營煎　小營煎　六安煎　抽薪飲　從薪飲　六味回陽飲　理陰煎　溫胃飲　蔡豆飲

藝術典第二百四十三卷

醫部彙考二百二十三

風門七

方三

加味牛黃散

治心臟中風恍惚恐懼悶亂不得睡臥志意不定語言錯亂並皆治之

牛黃　龍齒　麝香俱另研　防風　羚羊角屑　犀角屑　獨活　人參　茯神　升麻　甘草炙　白蘚皮　天麻　遠志　天竺黃各一錢半另研　硃砂水飛　鐵粉另研　麥門冬各半兩

右爲細末研勻每二錢煎麥冬湯調下不拘時服

遠志湯

治心經受病多汗惡風善怒口不能言其狀但得偃臥不可傾側悶亂冒絕汗出風中於心也唇色正赤尚猶可治急灸心脘百壯或青黃不定面色瞪瞪戰慄動者不可治

遠志二錢半　人參　細辛　石菖蒲　羌活　麻黃去根各半兩　赤芍藥　白朮各一兩

右爲細末每服二錢煎小麥湯調下不拘時日服二次

犀角丸

治心臟中風語言顛倒神思錯亂頭面心胃煩熱或時舌強語澀驚悸不安並皆治之

犀角屑　羚羊角屑　防風　遠志　羌活　沙參　茯神　升麻　天麻　天門冬　蔵朮　元參各七錢半　牛黃以下俱另研細　麝香各二錢半　龍齒　鐵粉　硃砂飛各一兩　金箔銀箔各五十片

右爲細末研勻煉蜜和搗五七百下丸如梧桐子大每服五十丸不拘時以薄荷湯送下

硃砂丸

治心臟中風手足驚掣心神狂亂恍惚煩悶言語蹇澀

硃砂水飛　犀角屑　羚羊角屑　人參　茯神　遠志　龍齒研各一兩　黃芩　防風　漢防己　秦艽　天麻　升麻各七錢　鉛霜另研半錢　麥門冬各半兩

右爲細末入研藥勻煉蜜和搗三四百下丸如梧桐子大每服二十丸粳米湯送下不拘時服

石斛酒

治心臟中風下注腰脚除頭面遊風兼補損

石斛四兩　黃芪　人參　防風各一兩半　硃砂水飛　杜仲炒去絲　牛膝酒浸　五味子　茯苓　山萸　山藥　蕈解各二兩　細辛一兩　天門冬　生薑各三兩　薏苡仁　枸杞子各半升

右爲咬咀并入硃砂末酒五斗用稀絹袋裝藥浸三日三夜後溫熱酒隨量飲之不斷絕不拘時候

白朮湯

治脾經受病多汗惡風身體怠惰四肢不動不能飲食口角兩邊黃者可治其狀但踞而腹滿遍身黃色口吐蟲水風中於脾也急灸脾脘百壯目下及手足青者不可治

白朮　厚朴薑製　防風各二錢　白蘚皮　附子炮去皮臍　橘紅　五加皮各一錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

細辛散

治脾臟中風肉熱肌膚淫淫如蟲行或腠理開汗大洩脾肉色不澤脣鼻黃色

細辛　白朮　獨活　肉桂　附子炮去皮臍　防風各一錢　厚朴薑製　麻黃去節各二錢　枳實麩炒　甘草各半錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

羚羊角丸
治脾臟中風口面偏邪語蹇虛煩手足腰脚不隨
羚羊角　防風　漢防己　白芍藥　白茯苓
獨活　麥門冬　酸棗仁炒　杏仁湯浸去皮尖雙
仁麩炒微黃各七錢半　檳榔　人參　薏苡仁
附子炮去皮臍　熟地黃各一兩　川芎　桂心
柏子仁　當歸微炒各半兩
右爲細末煉蜜和搗二三百下丸如梧桐子大每
服五十丸空心及晚食前溫酒下忌雞猪肉粘滑
之物

五味子湯
治肺經受病多汗惡風時咳短氣晝瘥夜甚其狀
偃臥胷滿息促冒悶風中於肺也其鼻兩邊下至
於口上至於眉白色急炎肺臉百壯若色黃其肺
已傷化而爲血不可治也若妄撮空指地循衣摸
牀如此數日必死矣
五味子　杏仁去皮尖炒　桂心各一錢　防風
甘草炙　赤芍藥　川芎各二錢　川椒三分
右作一服水二鍾煎一鍾不拘時服

獨活散
治肺臟中風頭痛項强背痛鼻乾心悶語聲不出
胷中少氣四肢無力疼痛
獨活　細辛　甘菊花　麻黃去節　五味子
附子炮去皮臍　白芷　赤茯苓　肉桂　白朮
川芎　紫菀茸　桑白皮各一錢　甘草炙半錢
杏仁麩炒去皮尖　防風各一錢
右作一服水二鍾煎一鍾不拘時服

獨活散
治腎臟風邪所傷語言蹇澁腰脊不可轉側脚膝
軟弱疼痹頭旋耳鳴身體沉重無力
天雄炮裂去皮臍　麻黃去節　枳殼麩炒
桂心各六分　石龍芮　人參　防風　獨活
茯神　杜仲炒　萆薢酒浸　羌活　當歸炒
丹參　五味子　牛膝酒浸　細辛各一錢
右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

天麻丸
治腎臟氣虛風邪所中腰脚緩弱無力視聽不聰
腰脊疼疼臍腹虛冷顏色不澤志意昏沉
天麻　石斛　肉蓯蓉酒浸去麤皮炙各一兩半
菖蒲　附子炮去皮臍　巴戟酒浸　萆薢酒浸
天雄炮去皮臍　牛膝酒浸　當歸炒　肉桂
杜仲炒去絲　獨活　丹參　蛸蜍微炒各一兩
鹿茸酥炙　磁石各二兩炒研水飛
右爲細末煉蜜和搗三五百下丸如梧桐子大每
服二十丸空心及食前溫酒送下

狗脊丸
治腎臟風虛毒氣上攻下注腿膝脚氣腫痛
狗脊　萆薢酒浸　防風　肉蓯蓉酒浸去鱗
川烏頭炮去皮臍　牛膝酒浸　破故紙炒
巴戟天酒浸去心　胡盧巴炒　甜瓜子炒
威靈仙　沒藥另研去油　當歸身各一兩
自然銅四兩火煅醋淬七遍研極細
右爲細末酒糊爲丸如梧桐子大每服二十丸加
至三十丸前食用溫酒送下日服二次

黃芪丸
治腎臟風毒上攻下注痲痹腫痛少氣無力
黃芪　川椒炒　茴香炒　川烏去皮臍　防風
川楝子去皮子炒　白蒺藜炒　狠毒　地龍炒
黑附子去皮臍炮　赤小豆各等分
右爲細末酒糊爲丸如梧桐子大每服二十丸加
至四十丸食前溫酒送下日進二服

萬靈丸
治腎臟虛寒耳鳴腰痛筋骨痠疼
草烏去皮臍剉鹽炒　細辛　地龍炒　防風
黃芪　海桐皮　骨碎補　蒼术米泔浸　白附子
炮去皮　巨勝子　赤芍藥　川烏頭炮去皮臍
五靈脂　山茵陳各一兩　黑狗脊　何首烏
蔓荊子　青皮　牛膝酒浸　御米子炒各二錢
紫荊花三錢　黑牽牛半兩爲末
右爲細末酒糊丸如梧桐子大每服十丸至二十
丸空心溫酒送下

仙傳黑虎丹
治男婦血氣虛弱筋骨枯槁外邪乘虛傳入經絡

或濕痰流注足脛手足痲木腰腿疼痛久成偏枯
左癱右瘓口眼歪斜諸痰火濕熱有餘之證
蒼术米泔水浸二宿去皮　生薑洗淨擂碎
草烏洗淨去皮切片各一斤　葱半斤全用搗碎
右四味和一處拌勻醃之春五夏三秋七冬十日
每日一番拌勻候日數足曬乾
五靈脂洗淨　乳香另研　沒藥另研各五錢
穿山甲酥炙二兩　自然銅火煅醋淬七次
右同前藥爲末用好醋糊爲丸如桐子大每服三
十丸空心熱酒送下間日服尤妙
不換金丹
治風勢客於上焦口眼喎斜
荆芥穗　白殭蠶　甘草　防風各一兩　天麻
川烏頭生　白附子生　細辛　蝎梢炒去毒
羌活　川芎　藿香各半兩　薄荷三兩
右爲細末蜜丸彈子大每服一丸細嚼茶酒下如
左喎再以此塗於右右喎塗左
三蚣散
治諸風口眼喎斜
蜈蚣三條一條用蜜炙一條酒浸一條紙糊煨熟
南星三箇每箇作四塊製同蜈蚣法　白芷半兩
右爲末入麝香少許熱酒調一錢食後服
天麻丸　易老
治諸風肢體痲木手足不遂等證
杜仲七兩　天麻　牛膝二味俱酒浸三日焙乾
元參　草薢各六兩　羌活十兩　附子炮一兩
當歸二十兩　生地一斤
愈風丹與此方大同但愈風無附子加肉桂二兩
加地黃一斤其餘兩分品數俱同
千金保命丹
治諸風瘓癡不能言語心忪健忘恍惚來去頭目
眩運胃中煩鬱痰涎壅塞抑氣攻心精神昏憒
硃砂　南星　殭蠶炒　犀角鎊　麥冬　枳殼
地骨皮　神麴　茯神　遠志　人參　柴胡
毫車　天竺黃　防風　甘草　桔梗　白术
升麻各一兩　珍珠二錢　麻黃去節　天麻
白附子炮　雄黃　龍腦　麝香　蟬退各半兩
琥珀　牛黃各三錢　黃芩　荆芥各二兩
金箔一百片　牙硝四錢　腦子　麝香各少許
右爲細末煉蜜爲丸彈子大每服一丸薄荷湯化
下不拘時候忌猪羊蝦核桃動氣之物及猪羊血
更加大川烏炮去皮臍爲製半夏白芷川芎猪牙
皂角各一兩和前藥丸服尤妙
酒浸仙藥方
凡患風病四肢不舉服之三日枭手梳頭七日漸
舒十日行步半月偏身依舊覺得輕健眼目更明
大有神效
甘菊花　防風　羌活　杜仲　牡蠣　苦蕒根
丹皮　紫菀　菖蒲　人參　白蒺藜　牛蒡子
枸杞子各半兩　白花蛇肉　桔梗　白术
山茱萸　白茯苓　遠志　晚蠶砂　官桂
牛膝各二錢半　牛蒡子根　虎脛骨　乾薑
熟地　柏子仁　蛇牀子　草薢　天雄炮去皮
狗脊去毛焙　附子　肉蓯蓉　菟絲子　續斷
芎藭　石斛各三錢
右並擇揀眞正地道爲粗末用新絹袋盛藥用新
小瓮一箇放藥在內以無灰酒二斗將藥浸之密
封其口春夏浸二七秋冬浸三七開瓮早中晚三
時令病人自取冷酒三杯服之久病不過一月近
者十日見效不問男婦小兒骨節疼痛四肢浮腫
眼目生花半身不遂語言蹇澁口眼歪斜中風失
音並皆治之
起死方歌
治一切中風中氣中痰卒暴死證
暴死南星半夏葛木香蒼术細辛甘薑煎一劑調蘇
合全蠍加時可散痰先用半星辛角末鼻中吹入嚏
聲還即將前藥頻頻灌口噤烏梅肉最良將來共搗
辛星末中指揩牙口自張記取此歌能濟世何愁死
去不回陽
大續命散
治八風十二痹偏枯不仁手足拘急疼痛不得伸
屈頭眩不能自舉起止顛倒或臥苦驚如墮地狀
盜汗臨事不起婦人帶下無子風入五臟甚者恐
怖見鬼來收攝或與鬼神交通悲愁哭泣忽忽欲
走
麻黃　烏頭　防風　桂心　甘草　蜀椒
杏仁　石膏　人參　芎藭　當歸　薗茹
黃芩　茯苓　乾薑各一兩
右十五味治下篩以酒服方寸匕日再後加以知
爲度千金翼有芎藭無薗茹
大八風湯

治毒風頑痹彈曳手足不遂身體偏枯或毒弱不仁或風入五臟恍惚多語喜忘有時恐怖或肢節疼痛頭眩煩悶或腰脊强直不得俛仰腹滿不食咳嗽或始遇病時卒倒悶絕卽不能語便失痞半身不遂不仁沉重皆由體虛恃少不避風冷所致

當歸二兩半　五味子　升麻各一兩半　烏頭
黃芩　芍藥　遠志　獨活　防風　芎藭
麻黃　秦艽　石斛　人參　茯苓　石膏
黃芪　紫菀各一兩　杏仁四十枚　甘草
桂心　乾薑各二兩　大豆一升

右二十三味㕮咀以水一斗三升酒二升合煑取四升强人分四服羸人分六服千金翼大豆二合

八風散

治八風十二痹猥退半身不遂歷節疼痛肌肉枯焦皮膚瞤動或筋緩急痛不在一處卒起目眩失心恍惚妄言倒錯身上瘖癰面上起泡或黃汁出更相染漬或燥或濕顏色乍赤乍白或青或黑角弓反張乍寒乍熱

麻黃　白朮各一斤　羌活二斤　附子三十枚
大黃半斤　苦蔞根　甘草　芍藥　天門冬
石膏　欒荊　天雄　防風　白芷各一兩
山茱萸　食茱萸　蒟蒻各五升　茵蕷十四兩
黃芩一斤五兩　細莘　乾薑　桂心各五兩
雄黃　硃砂　丹參各六兩

右二十五味治下篩酒服方寸匕初日一服三十日後日再五十日知百日瘥一年平復長服不已佳先食服

小八風散

治迷惑如醉狂言妄語驚悸恐怖恍惚見鬼喜怒悲夏煩滿顛倒悒悒短氣不得語語則失妄或心痛徹背不嗜飲食惡風不得去帷帳時復疼熱惡聞人聲不知痛癢身悉振搖汗出猥退頭重浮腫爪不知痛頸項强直口面喎戾四肢不隨不仁偏枯攣挈不得屈伸悉主之

天雄　當歸　人參各五分　附子　天門冬
防風　蜀椒　獨活各四分　烏頭　秦艽
白朮　細莘　乾薑各三分　麻黃　山茱萸
五味子　桔梗　白芷　柴胡　莽草各二分

右二十味治下篩合相得酒服半方寸匕漸至一匕日三服以身中覺如針刺狀則藥行也

烏頭湯

治八風五尸惡氣遊走胷心流出四肢來往不住短氣欲死

烏頭　芍藥　乾薑　桂心　細莘　乾地黃
當歸　吳茱萸　甘草各二兩

右九味㕮咀以水七升煑取二升半分三服

大防風湯

治中風發熱無汗肢節煩腹急痛大小便不利

防風　當歸　麻黃　白朮　甘草各十八銖
黃芩三十銖　地黃　山萸　茯苓　附子各一兩

右十味㕮咀以水九升煑取二升半一服七合大小便不利加大黃人參各十八銖大棗三十枚生薑三兩煑取三升分三服深師加天門冬一兩

獨活酒

治八風十二痹

獨活　石楠各四兩　防風三兩　附子　烏頭
天雄　茵蕷各二兩

右七味㕮咀以酒二斗漬七日每服半合日三以知爲度

星附散

治中風雖能言口不喎斜手足彈曳

南星薑製　半夏薑製　人參　黑附子去皮臍
白附子　白茯苓　川烏去皮臍　白殭蠶炒
沒藥各等分

右㕮咀每服五錢水酒各一盞煎八分熱服并進得汗爲度

金牙酒

療積年八風五疰舉身彈曳行步跛躃不能收持

金牙碎如米粒（小絹袋盛）　熟地黃　蒴藋根　地膚子（去子）
（用莖葉一方用泛牀子）　附子　防風　細莘　莽草各四兩
川椒四合　羌活一斤（一方用獨活）

右十味㕮咀盛以絹袋用酒四斗於磁器中浸封固勿令泄氣春夏三四宿秋冬六七宿酒成去滓日服一合常令酒氣相接不盡一料病無不愈

胃風湯

白芷一錢二分　升麻二錢　葛根　蒼朮
蔓荊子　當歸各一錢　甘草炙　柴胡　羌活
藁本　黃蘗　草豆蔻　麻黃不去節各五分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分溫服

秦艽湯

服此藥去其風邪

秦艽　芍藥　柴胡各一錢七分　黃芩炒
防風各一錢二分　甘草炙一錢三分　人參
半夏各一錢一分
右分二貼每貼水二盞薑三片煎八分食遠服

三黃湯（集驗方）
治中風手足拘攣百節疼痛煩熱心亂惡寒不進
飲食兼治賊風偏退風半身不遂失音不語
麻黃　獨活各一兩　黃芪半兩　黃芩七錢半
右㕮咀每服四錢水一盞半煎至七分去查溫服
不拘時候取汗爲效

地黃湯
治中風四肢拘攣
地黃　甘草炙　麻黃去節各一兩
右爲㕮咀用酒三升水七升煎至四升去滓分作
八服不拘時日進二服

木瓜散
治中風虛極筋脈攣急手足拘攣屈伸短縮腹中
疼痛手足爪甲疼痛脚轉筋甚則舌卷囊縮面色
蒼唇青白不思飲食
木瓜　虎脛骨酢炙　五加皮　當歸　桑寄生
酸棗仁炒　人參　柏子仁　黃芪炙各一兩
甘草炙半兩
右爲㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七
分去查溫服不拘時

三聖散
一名舒筋散大治手足拘攣口眼喎斜左癱右瘓
骨節疼疼脚弱無力行步不正一切風疾
當歸　肉桂　延胡索
右等分爲細末每服二錢空心臨臥溫酒調下日
進三服惟孕婦不可服

酸棗仁丸
治風毒流注四肢筋脈拘攣疼痛少得睡臥
熟地黃二兩　酸棗仁　羚羊角屑　晚蠶沙炒
防風　槐㮈各一兩半　附子炮去皮臍　藁本
柏子仁　羌活　赤芍藥各一兩
右爲細末煉蜜和搗二三百下丸桐子大每服三
十丸溫酒送下不拘時日進二服

百倍丸
治男女中風腰膝疼痛筋脈拘攣行步艱難
敗龜板酢炙　虎骨　肉蓯蓉酒浸　牛膝酒浸
木鼈子去殼　乳香　沒藥俱另研　破故紙炒
骨碎補去毛　自然銅酢淬各等分
右爲細末酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服四五
十丸空心溫酒送下日進二服

續斷丸
治中風寒濕筋攣骨痛
續斷　萆薢酒浸　牛膝酒浸　杜仲炒去絲
乾木瓜各二兩
右爲細末以煉蜜和丸每兩作四丸每服一丸細
嚼溫酒下不拘時

羚羊角散
治肝風筋脈拘攣四肢疼痛
羚羊角屑一兩　甘草炙　梔子仁各半兩　升麻
防風　酸棗仁　桑白皮　羌活各七錢半
右㕮咀每服三錢水一中盞入生薑五片煎至六
分去滓溫服不拘時忌熱麪猪肉大蒜

酸棗仁散
治肝風筋脈拘攣四肢疼痛心神煩悶睡臥不得
酸棗仁一兩　桑白皮　芎藭　菊花　甘草炙
枳殼　羚羊角屑各半兩　羌活　防風各七錢半
右㕮咀每服三錢水一中盞生薑五片煎至六分
去滓溫服不拘時

防風散
治肝風筋脈拘攣四肢疼痛心膈痰壅不思飲食
防風　麻黃去節各一兩　赤茯苓　薏苡仁
麥冬　牛膝酒浸　羚羊角屑　犀角屑各一兩
半夏　白朮　芎藭　人參　當歸　大黃
炙甘草各半兩　杏仁麩炒去皮尖各七錢半
右㕮咀每服五錢水一中盞生薑五片同煎至六
分去滓溫服不拘時候

雷丸（集驗方）
治癱瘓頑風骨節疼痛下元虛冷諸風痔漏下血
一切風瘡
草烏　川烏　兩頭尖各三錢　硫黃　麝香
丁香各一錢　木鼈子五箇
右爲末以熟靭艾揉軟合成一處用鈔紙包裹燒
熏痛處

世傳白花蛇酒（瀹潤集簡方）
治諸風無論新久手足緩弱口眼喎斜語言蹇澁
或筋脈攣急肌肉頑痹皮膚燥痒骨節疼痛或生
惡瘡疥癩等疾

白花蛇一條酒洗淨頭尾各去三寸酒浸去骨刺淨肉一兩　全蠍炒　當歸　防風　羌活各一錢　獨活　白芷　天麻　赤芍　甘草　升麻各五錢

右剉碎以絹袋盛貯用糯米二斗蒸熟如常造酒以袋置缸中待成取酒同袋密封煮熟置陰地七日出毒每溫飲數杯常令相續

瑞竹堂白花蛇酒 程氏 方

治諸風癩癬

白花蛇一條酒潤去皮骨取肉絹袋盛之蒸糯米一斗安麴於缸底置蛇於麴上以飯安蛇上用物密蓋三七日取酒

右以蛇臛乾爲末每服三五分溫酒下仍以濁酒井糟作餅食之尤佳

瀕湖白花蛇酒 集簡方

治中風傷濕半身不遂口眼喎斜膚肉痛痹骨節疼痛及年久疥癬惡瘡風癩諸證

白花蛇一條取龍頭虎口黑質白花尾有佛指甲目光不陷者爲眞以酒洗潤透去骨刺取肉四兩　防風一兩　羌活　當歸身　眞天麻　眞秦艽五加皮各二兩

右各剉以生絹袋盛之入金華酒罐內懸胎安置入糯米生酒醅五壺浸袋著葉密封安罐於大鍋內水煮一日取起埋陰地七日取出每飲一二杯仍以渣日乾碾末酒糊丸梧子大每服五十丸用煮酒吞下切忌見風犯慾及魚羊鵝鴉發風物

二陳湯

治痰飲嘔惡風寒咳嗽或頭眩心悸或中脘不快或因生冷或飲酒過多脾胃不和等證

陳皮　半夏製各三錢　茯苓二錢　炙甘草一錢　水二鍾薑三五片棗一枚煎八分食遠服

稀涎散

吐頑痰

牙皂炙去皮弦一錢　藜蘆五分

右爲細末每服五分或一二錢漿水調下牙關不開者灌之

獨聖散

吐積蓄痰涎

甜瓜蒂不拘多少微炒

右爲細末每服一二錢薑汁調服胷痛加全蠍頭痛加鬱金煮服吐之

茶調散

吐除痰積

瓜蒂二錢　好茶一錢

右爲末每服二錢薑汁調服

白花蛇酒 聖惠 方

治榮衛不和陽少陰多手足舉動不快

白花蛇酒煮去皮骨瓦焙取肉一兩　天麻　狗脊各二兩

右爲細末以銀盂盛無灰酒一升浸之重湯煮稠如膏銀匙攪之入生薑汁半杯同熬勻瓶收每服半匙用好酒或白湯化服日二次神效極佳

大補元煎 景岳全書 卷十 方

治男婦中風氣血大壞精神失守危劇等證此回天贊化救本培元第一要方

人參少則用一二錢多則一二兩　山藥炒二錢　熟地少則用二三錢多則二三兩　杜仲二錢　當歸二三錢 溫湯者去之　山茱萸一錢 異酸吞酸者去之　炙甘草一二錢　枸杞二三錢

水二鍾煎七分食遠溫服

左歸飲

此壯水之劑也凡中風若是命門陰衰陽勝者宜此方加減主之此一陰煎四陰煎之主方也

熟地二三錢或至一二兩　山藥　枸杞各二錢　炙甘草一錢　茯苓一錢半　山萸一二錢 異酸者少用

水二鍾煎七分食遠服

右歸飲

此益火之劑也凡中風若是命門陽衰陰盛者宜此方加減主之

熟地如前　枸杞　杜仲鹽製　山藥炒各二錢　甘草炙　肉桂各一二錢　附子製一二三錢　山茱萸一錢

水二鍾煎七分食遠溫服

五福飲

凡五臟氣血虧損者此能兼治之足稱王道之最

人參隨宜　熟地黃隨宜　當歸身二三錢　白朮炒一錢半　炙甘草一錢

水二鍾煎七分食遠溫服或加生薑三五片凡治氣血俱虛等證以此爲主或宜溫者加薑附宜散者加升麻柴葛左右逢源無不可也

一陰煎

此治水虧火勝之劑故曰一陰凡中風係腎水眞

陰虛損而脈證多陽虛火發熱等證皆宜用此加減主之

熟地三五錢　甘草一錢　丹參　芍藥　生地　麥冬各二錢　牛膝一錢半

水二鍾煎七分食遠溫服

加減一陰煎

治證如前而火之盛者宜用此方

生地　芍藥　麥冬各二錢　熟地三五錢　炙甘草五七分　知母　地骨皮各一錢

水二鍾煎服

二陰煎

此治中風心經有熱水不制火之病故曰二陰

生地　麥冬各二三錢　棗仁二錢　甘草一錢　茯苓　木通　元參各二錢半　黃連或一二錢

水二鍾燈草二十根竹葉亦可煎七分食遠服

三陰煎

此治肝脾虛損精血不足及營虛失血等病故曰三陰凡中風血不養筋及瘧疾汗多邪散而寒熱猶不能止是皆少陽厥陰陰虛少血之病微有火者宜一陰煎無火者宜此主之

當歸二三錢　熟地三五錢　炙甘草一錢　芍藥酒炒　棗仁各二錢　人參隨用

水二鍾煎七分食遠服

大營煎

治中風眞陰精血虧損口眼喎斜筋骨疼痛等證

當歸二三錢或五錢　熟地三五七錢　枸杞　杜仲炒去絲各二錢　牛膝一錢半　甘草炙　肉桂各一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

小營煎

治血少陰虛此性味平和之方也

熟地二三錢　芍藥酒炒　山藥炒　當歸　枸杞各二錢　炙甘草一錢

水二鍾煎七分食遠溫服

金水六君煎

治肺腎虛寒水泛爲痰或年邁陰虛血氣不足及非風欬嗽嘔惡多痰喘急等證神效

熟地三五錢　陳皮一錢半　半夏　當歸　茯苓各三錢　炙甘草一錢

水二鍾生薑三五七片煎七八分食遠溫服

六安煎

治非風初感痰滯氣逆等證

陳皮一錢半　半夏二三錢　茯苓二錢　甘草　杏仁去皮尖并雙仁切各一錢　白芥子五七分年老氣弱者不用

水一鍾半加生薑三五七片煎七分食遠服

凡非風初感痰勝而氣不順者加藿香一錢半兼脹滿者加厚朴一錢暫開痰氣然後察其寒熱虛實而調之若氣虛猝倒及氣平無痰者皆不可用

抽薪飲

治諸凡火熾盛而不宜補者

黃芩　石斛　木通　梔子炒　黃蘗各一二錢　枳殼　澤瀉各錢半　細甘草三分

水一鍾半煎七分食遠溫服內熱甚者冷服更佳

徙薪飲

治三焦火一切內熱漸覺而未甚者先宜清以此劑其甚者宜抽薪飲

陳皮八分　黃芩二錢　麥冬　芍藥　黃蘗　茯苓　牡丹皮各一錢半

水一鍾半煎七分食遠溫服

六味回陽飲

治陰陽將脫等證

人參隨宜　製附子去皮臍　炮乾薑各二三錢　炙甘草一錢　熟地五錢或一兩　當歸身三錢瀉者以冬朮代之

水二鍾武火煎七八分溫服

理陰煎

此理中湯之變方也凡眞陰不足或素多勞倦之輩忽感寒邪不散及非風證等

熟地三五七錢或一二兩　炙甘草一二錢　當歸二三錢或五七錢　乾薑炒黃色一二三錢　或加肉桂一二錢

水二鍾煎七八分熱服

溫胃飲

治中寒嘔吐吞酸泄瀉不思飲食及婦人臟寒嘔惡胎氣不安等證

人參一二三錢或一兩　白朮炒一二錢或一兩　扁豆二錢炒　陳皮一錢或不用　炙甘草一錢　乾薑炒焦一二三錢　當歸一二錢瀉者勿用

水二鍾煎七分食遠溫服

菉豆飲

凡熱毒勞熱諸火熱極不能退者用此最妙

菉豆不拘多寡

右用寬湯煮糜爛入鹽少許或蜜亦可待冰冷或厚或稀或湯任意飲食之日或三四次不拘此物性非苦寒不傷脾氣且善於解毒除煩退熱止渴大利小水乃淺易中之最佳最捷者也若火盛口甘不宜厚味但略煮半熟清湯冷飲之尤善除煩清火

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百四十四卷目錄

醫部彙考二百二十四

風門八

單方

鍼灸

藝術典第二百四十四卷

醫部彙考二百二十四

風門八

單方

中風口噤不語心煩恍惚手足不隨或腹中痛滿或時絕復甦伏龍肝末五升水八升攪澄清灌之本草下同

中風喎斜痱痹一切風荊芥煮汁飲之

碧林丹治卒中風不語痰涎潮盛及一身風癱用生銅綠二兩乳細水化去石慢火熬乾取辰日辰時辰位上修合再研入麝香一分糯米粉糊和丸彈子大陰乾卒中者每丸作二服薄荷酒研下餘風硃砂酒化下吐出青碧涎瀉下惡物大效治小兒用綠雲丹銅綠不計多少研粉酢麪糊丸芡子大每薄荷酒化服一丸須臾吐涎如膠神效經驗方

中風喎斜取生鵲劈開腹及血熱貼喎緩處即正烏雞亦可本草

中風舌強用雄黃荊芥穗等分爲末豆淋酒服二錢衛生寶鑑

中風口喎新石灰一合酢炒調如泥塗之左塗右右塗左立便牽正寇氏衍義

急中風喎斜不遂取烏鴉全者鹽泥固濟火煅爲末和酒服之本草

風中心氣風熱手足不遂及風痹不任筋脈五緩恍惚煩躁用熊肉二斤切如常法調和作醃腊空肚服之醫學綱目

中風口噤不知人事白朮四兩酒三升煮取一升頓服千金方

男子諸風四寶丹用金毛狗脊鹽泥固濟煅紅去毛蘇木萆薢川烏頭生用等分爲末米酢和丸梧子大每服二十丸溫酒鹽湯下普濟方

偏風不遂皮膚不仁宜服仙靈脾酒仙靈脾一斤細剉生絹袋盛於不津器中用無灰酒二斗浸之重封春夏三日秋冬五日後每日暖飲常令醺然不得大醉酒盡再合無不效驗合之切忌雞犬婦人見聖惠方

中風口噤通身冷不知人獨活四兩好酒一升煎半升服千金方

中風不語獨活一兩酒二升煎一升大豆五合炒有聲以藥酒熱投蓋之良久溫服三合未瘥再服小品方

熱風癱瘓常舉發者羌活二斤構子一升爲末每酒服方寸匕日三服廣濟方

喉閉口噤羌活三兩牛蒡子二兩水煎一鍾入白礬少許灌之取效聖濟錄

暗風卒倒不省人事細莘末吹入鼻中得效方

諸風拘攣偏於血氣不通及痲痹取鴈肪四兩煉淨每日空心取二匙和溫酒服

中風喎斜取鹿肉和生椒同搗敷之正則去之本草下同

鹿骨釀酒治風補虛

一切偏風口眼喎斜用青荊芥一斤青薄荷一斤同入砂盆內研爛生絹絞汁於磁器中煎成膏濾去滓三分之一將二分日乾爲末以膏和丸梧子大每服三十丸白湯下早暮各一服忌動風物經驗方

中風口噤荊芥穗爲末酒服二錢立愈名荊芥散前後用之甚驗

風痰練鵲細剉炒香袋盛浸酒中每日溫飲服之

癱瘓走痛用蠍虎一枚炙黃陳皮五分罌粟殼一錢甘草乳香沒藥各二錢半爲末每服三錢水煎服正傳

風疾攣急茵陳蒿一斤秫米一石麴三斤和勻如常法釀酒服之聖濟總錄

六十二種風兼腹內血氣刺痛用紅花一大兩分爲四分以酒一大升煎鍾半頓服之不止再服圖經本草

一切風疾十年二十年者牛蒡根一升生地黃枸杞子牛膝各三升用袋盛藥浸無灰酒三升內每任意飲之外臺秘要

老人中風口目瞤動煩悶不安牛蒡根切一升去皮曬乾杵爲麪白米四合淘淨和作餺飥豉汁中煮加葱椒五味空心食之極效壽親養老書

中風舌強不語目睛不轉煩熱烏雌雞一隻治淨以酒五升煮取二升去查分作三次連服之食葱薑粥暖臥取小汗飲膳正要

中風虛弱羊肚一具粳米二合和椒薑豉葱作羹食

一切風毒并殺三蟲腸痔能進食若病胃脹滿心悶發熱即宜服之五月五日午時附地刈取枲耳葉洗

暴搗下篩每服方寸匕酒或漿水下日一夜三若覺吐逆則以蜜丸服準計方寸匕數也風輕者日二服若身體作粟或麻豆出此爲風毒出也可以針刺潰去黃汁乃止七月七九月九亦可採用

一切風氣蒼耳嫩葉一石切和麥蘗五升作塊於蒿艾中署二十日成麴取米一斗炊作飯看冷暖入麴三升釀之封二七日成熟每空心暖服神驗封此酒可兩重布不得令密密則溢出忌馬肉猪肉（食療本草）

中風癱瘓手足不舉用穿山甲左癱用右甲右瘓用左甲炮熟大川烏頭炮熟紅海蛤如棊子大者各二兩爲末每用半兩搗葱白汁和成厚餅徑寸半隨左右貼脚心縛定密室安坐以脚浸熱湯盆中待身麻汗出急去藥宜謹避風自然手足可舉半月再行一次除根忌口遠色調養亦治諸風疾（衛生寶鑑）

中風宜服豨薟丸於夏五月以來收豨薟每去地五寸剪刈以溫水洗去泥土摘葉及枝頭凡九蒸九曬不必太燥但以取足爲度仍熬搗爲末煉蜜丸如梧子大空心溫酒或米飲下二三十丸服至二千丸所患愈加不得憂慮是藥攻之力服至四千丸必得復舊至五千丸當復丁壯服後須喫飯三五匙壓之五月五日採者佳

中風諸病麻黃一秤去根以王相日乙卯日取東流水三石三斗以淨鐺盛五七斗先煑五沸掠去沫逐旋添水盡至三五斗濾去麻黃澄定濾去滓取清再熬至一斗再澄再濾取汁再熬至升半爲度密封收之一二年不妨每服一二匙熱湯化下取汁熬時要勤攪勿令著底恐焦了仍忌雞犬陰人見之此劉守眞祕方也（宣明方）

手足偏風蒴藋葉火燎厚鋪牀上趁熱眠於上冷復易之冬月取根舂碎熬熱用（外臺祕要下同）

半身不遂失音不語取蓖麻子油一升酒一斗銅鍋盛油著酒中一日煑之令熟細細服之

口目喎斜蓖麻子仁搗膏左貼右右貼左即正

又方用蓖麻子仁七七粒研作餅右喎安在左手心左喎安在右手心却以銅盂盛熱水坐藥上冷即換五六次即正也（婦人良方）

又方用蓖麻子仁七七粒巴豆十九粒麝香五分作餅如上用

中風不省牙關緊急者藜蘆一兩去苗頭濃煎防風湯浴過焙乾切炒微褐色爲末每服半錢小兒減半溫水調灌以吐風涎爲效未吐再服（簡要濟衆）

中風不語喉如曳鋸口中涎沫藜蘆一分南星一箇去浮皮於臍上剜一坑納入陳酢二橡斗四面火逼黃色研爲末生麪丸小豆大每三丸溫酒下（經驗方）

中風氣厥痰壅昏不知人六脈沉伏生附子去皮生南星去皮生木香半兩每服四錢薑九片水一盞煎七分溫服之（濟生方）

風寒濕痹痲木不仁手足不遂生川烏末每以香白米煑粥一盌入末四錢慢熬得所下薑汁一匙蜜三大匙空腹服之或入薏苡末二錢此湯極驗（本事方）

體虛有風外受寒濕身如在空中生附子生天南星各二錢生薑十片水一盞半慢火煎服

口眼喎斜生烏頭青礬各等分爲末每用一字嗃入鼻內取涕吐涎立效無比名通關散（藝中祕寶方）

口卒噤瘖用附子末吹入喉中瘥（千金方）

半身不遂遂令癖疰用附子一兩以無灰酒一升浸一七日隔日飲一合（延年祕錄）

諸風不遂用生草烏頭晚蠶沙等分爲末取生地龍搗和入少酢糊丸梧子大每服四五丸白湯下甚妙勿多服恐麻人（集驗方）

又方用草烏頭四兩去皮大豆半升鹽一兩同以砂瓶煑三伏時去豆將烏豆入木臼搗三百杵作餅焙乾爲末酒糊丸梧子大每空心鹽湯下十丸名至寶丹（經驗濟世方）

一切頑風用生草烏頭生天麻各洗等分擂爛絞汁傾盆中砌一小坑其下燒火將盆放坑上每日用竹片攪一次夜則露之曬至成膏作成小錠子每一錠分作三服用葱薑自然汁和好酒熱服（乾坤祕鑑下同）

一切風證不問頭風痛風黃鴉弔脚風痹生淮烏頭一斤生川烏頭一枚生附子一枚並爲末葱薑各一斤擂如泥和作餅子以草鋪盤內加楮葉於上安餅於葉上又鋪草葉蓋之待出汗黃一日夜乃曬之舂爲末以生薑取汁煑麪糊和丸梧子大初服三十丸日二服服後身痹汗出即愈避風

諸風口噤天南星泡剉大人三錢小兒三字生薑五片蘇葉一錢水煎減半入雄猪膽少許溫服（直指方）

口眼喎斜天南星生研末自然薑汁調之左貼右右貼左（仁存方）

星香散治壯人風痰及中風中氣初起用南星四錢木香一錢水二盞生薑十四片煎六分溫服（易簡方）

角弓反張南星半夏等分爲末薑汁竹瀝灌下一錢

仍灸印堂 摘元方

骨軟風疾腰膝疼行步不得遍身瘙痒用何首烏大而有花紋者同牛膝各一斤以好酒一升浸七宿暴乾木臼杵末棗肉和丸梧子大每一服三五十丸空心酒下 經驗方

大風半身不遂蒸鼠壤土袋盛熨之瘥即止 本草

一切諸風用青風藤出太平荻港上者二三月采之不拘多少入釜內微火熬七日夜成膏磁器收用時先備梳三五把量人虛實以酒服一茶匙畢將患人身上拍一掌其後遍身發痒不可當以梳梳之要痒止飲冷水一口即解風病皆愈避風數日良 集簡方

一切風痛風瘡百靈藤五斤剉水三斗煑汁五升熬膏每酒服一匙日三服

三十六風不能治者悉效菖蒲薄切日乾三斤盛以絹袋清酒一斛懸浸之密封一百日視之如菜綠色以一斗熟黍米納之封十四日取出日飲 神仙經

去風丹世傳宋時東京開河掘得石碑梵書大篆一詩無能曉者眞人林靈素逐字辨譯乃是治中風方名去風丹也詩云天生靈草無根幹不在山間不在岸始因飛絮逐東風汎梗青青飄水面神仙一味去沉疴采時須在七月半選甚癱風與大風些小微風却不算豆淋酒化服三丸鐵鏷頭上也出汗其法以紫色浮萍曬乾爲細末煉蜜和丸彈子大每服一粒以豆淋酒化下治左癱右瘓三十六種風偏正頭風口眼喎斜大風癩風一切無名風及脚氣并打撲傷折及胎孕育有傷服過百粒即爲全人此方後人易名紫萍一粒丹

諸風癱瘓筋骨不收用白龍鬚根皮一兩鬧羊花即老虎花七分好燒酒三斤封固煑一炷香埋土中一夜能飲者三盃不能飲者一盃臥時服服至三五盃見效但知痛者可治 皆效方

磚牆城垣上苔衣漬酒服之治暴風口噤 別錄

風氣脚弱用孔公孽二斤石斛五兩以酒二斗浸服 肘後方

龍手藤主偏風口喎手足癱瘓補虛益陽去冷氣風痹以醇酒浸近火令溫空心服之取微汗

風病痲木火麻花四兩草烏一兩炒存性爲末煉蜜調成膏每服三分白湯調下

火麻仁取汁煑粥去五臟風潤肺治關節不通 孟詵

中風口噤豉二升吳茱萸一升二味以水七升煑取三升漸飲之

賊風口噤角弓反張酒一斗膠二斤煑令烊得六升每服一升稍服得愈

卒中風口喎不正取空青末如豆大一枚口內含之即愈

卒不得語酒五合和人乳汁錘半分爲二服即能言矣

卒患偏風口喎語澀取衣中白魚即蠹書魚也摩耳下喎向左摩右向右摩左即正

暴得風疾四肢攣縮不能行取大豆三升淘淨蒸濕以酢二升傾入瓶中鋪於地上設蓆豆上令病人臥之仍重蓋五六層衣豆冷漸漸却衣仍令一人於被內引挽攣急處更蒸豆再作并飲荊瀝湯如此三日三夜即休 崔氏纂要

大豆炒黑投酒中飲之治風痹癱瘓口噤

風入臟中以大豆一斗水五斗煑取一斗二升去滓入美酒斗半煎取九升旦服取汗神驗 千金翼

卒風不語大豆煑汁煎稠如飴含之并飲汁 肘後方下同

卒不得語煑豉汁加入美酒服之

手足不隨豉三升水九升煑三升分三服

又法豉一升微熬囊貯漬三升酒中三宿溫服常令微醉爲佳

五加皮酒去一切風濕痿痹壯筋骨塡精髓用五加皮洗刮去骨煎汁和麴米釀成飲之或切碎袋盛浸酒煑飲或加當歸牛膝地榆諸藥

女貞皮酒治風虛補腰膝女貞皮切片浸酒煑飲之

中風强直不得屈伸用橘樹皮細切一升酒二升浸一宿每日溫服半斤酒盡再作 時珍

薏苡仁酒去風濕强筋骨塡精髓健脾胃用絕好薏苡仁粉同麴米釀酒或袋盛煑酒飲之

百靈藤酒治諸風百靈藤十斤水一石煎汁三斗入糯米三斗神麴九斤如常釀成三五日更炊糯飯投之即熟澄清日飲以汗出爲效 聖惠方

白石英酒治風濕周脾肢節濕痛及腎虛耳聾用白石英磁石煅酢淬七次各五兩絹袋盛浸酒中五六日溫飲酒少更添之

痰澼卒風生薑二兩附子一兩水五升煑取二升分再服忌猪肉冷水

薯蕷酒治諸風眩運益精髓壯脾胃用薯蕷粉同麴米釀酒或同山茱萸五味子人參諸藥浸酒煑飲

蒼朮酒治一切風濕筋骨諸病駐顏色耐寒暑用朮

三十斤去皮搗以東流水三石漬三十日取汁露一夜浸麴米釀成飲
三年中風松葉一斤細切以酒一斗煮取三升頻服汗出立瘥
南藤酒治風虛逐冷氣除痹痛強腰脚石南藤煎汁同麴米釀酒飲
中風不省涎潮口噤語言不出手足躽曳得病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人柏葉一握去枝葱白一握連根研如泥灰酒一升煎一二十沸溫服如不進酒分作四五分服方進他藥（朱臧）
中風口喎青松葉一斤搗汁滿酒二升浸二宿近火一宿初服半升漸至一升頭面汗出卽止（千金）方
枳茹酒治中風身直口僻眼急用枳殼刮茹浸酒飲之
諸風毒用牛蒡根切片浸酒飲之（本草）
偏風不遂失音不語生吞杏仁七枚不去皮尖日加至七七枚周而復始食後仍飲竹瀝以瘥爲度（外臺秘要）
麻仁酒治骨髓風毒痛不能動者取大麻子中仁炒香袋盛浸酒飲之
蠶沙酒治風緩頑痹諸節不隨腹內宿痛用原蠶沙炒黃袋盛浸酒飲
花蛇酒治諸風頑痹攣縮攣急疼痛惡瘡疥癩用白花蛇肉一條袋盛同麴置于缸底糯飯蓋之三七日取酒飲又有羣藥煮酒方亦多
三十六風結瘡馬齒莧一碩水二碩煮取汁入蜜蠟三兩重煎成膏塗之（外臺）
韭搗汁服治肥白人中風失音（日華）

卒風口偏不語及角弓反張煩亂欲死及鼓脹不消以雞屎白一升炒焦投酒中待紫色去滓頻飲名紫酒
身上浮風煮芋汁浴之愼風半日（食療）
卒然中風防風荊芥一兩升麻半兩薑三片水一盞煎半盞以絲瓜子研取漿半盞和勻灌之如手足麻痒以羌活煎湯洗之（經驗方）
中風口噤蘿蔔子牙皂莢各二錢以水煎服取吐（丹溪）
諸風諸癇用瓜蒂炒黃爲末量人以酸漿水一盞調下取吐風痫加蠍梢半錢濕氣腫滿加赤小豆末一錢有蟲加狗油五七點雄黃一錢甚則加芫花半錢立吐蟲出（活法機要）
風涎暴作氣塞倒仆用瓜蒂爲末每用一二錢臘粉一錢匕以水半合調灌良久涎自出不出舍沙糖一塊下咽卽涎出也（瓊瓜衍義）
男女諸風產後風尤妙鐵線草根五錢五加皮一兩防風二錢爲末以烏雞骨一斤重者水內淹死去毛腸砍作肉生入藥剁勻下麻油些少炒黃色隨人量入酒煮熟先以排風藤煎濃湯沐浴頭身乃飲酒食雞發出粘汗卽愈如不沐浴必發出風丹乃愈（普濟本事仁齋）
中風口喎面目相引偏僻頰急舌不可轉柱心酒煮取汁故布蘸搨病上正卽止左喎搨右右喎搨左常用大效（千金）方
中風逆冷吐清水宛轉啼呼柱一兩水一升半煎半升冷服（肘後）方
中風失音柱著舌下嚥汁

又方柱末二錢水二盞煎一盞服取汗（千金）方
口目喎斜乳香燒烟熏之以順其血脈（證治要訣）
婆律香膏摩一切風（聖惠）卷
祛風益顏眞乳香二斤白蜜二斤瓷器合煎如餳每日服二匙（古今效）方
中風失音炒槐花三更後仰臥嚥咽（得效）方
中風身直不得屈伸反覆者取槐皮黃白者切之以酒或水六升煮取二升稍稍服之（肘後）方
夜合枝酒治中風攣縮用夜合枝柏枝槐枝桑枝石榴枝各五兩並生剉糯米五升黑豆五升羌活二兩防風五錢紅麴七斤半先以水五斗煎五枝取二斗五升浸米豆蒸熟入麴與防風羌活如常釀酒法封三七日壓汁每飲五合勿過醉致吐常令有酒氣也（古今效）良方
中風口噤不聞痰涎潮壅大皂角一挺去皮猪脂塗炙黃色爲末每服一錢湯酒調下氣壯者二錢以吐出風涎爲度（淨樂）方
中風口喎皂角五兩去皮爲末三年米醋和之左喎塗右右喎塗左乾更上之（外臺秘要）
一切諸風不問遠近用檉葉半斤切枝亦可荊芥半升水五升煮二升澄清入白蜜五合竹瀝五合新瓶盛之油紙封入重湯煮一伏時每服一小盞日三服（石頑）方
中風口喎巴豆七枚去皮研左喎塗右手心右喎塗左手心仍以暖水一盞安藥上須臾卽正洗去（聖惠）方
中風不語穀樹枝葉剉細酒煮沫出隨多少日日飲之（肘後）方

諸風筋骨攣縮及肌皮頑痹手足不遂眉髮疥癬諸疾在皮膚骨節者入溫泉中浴浴訖當大虛憊可逐病與藥及飲食補養非有病人不宜輕入 藏器

防風子療風更優調食之 蘇恭

治中風及壅滯旋覆花淨洗搗末煉蜜丸如桐子大夜臥茶湯下五九七九至十九

中風不語喉中如拽鋸聲口中涎沫取藜蘆一分天南星一枚去浮皮却於臍上剜一坑子內入藜蘆陳酢和麪包裹四面用火逼令黃色同搗再研極細生麪爲丸如小豆大每服三九溫酒下

巴豆熏法治卒中風口噤不省巴豆去殼紙包搥油去豆以紙作撚條送入鼻內或加皂角末尤良或以前紙撚燒烟熏鼻內亦可 萬病回春

中風口噤不語以烏龜尿少許點舌下神妙取龜尿法以龜坐荷葉上用猪鬃鼻內刺之 類聚 外臺秘要

偏風不遂及癖疾用桃仁二千七百枚去皮尖雙仁以好酒一斗三升浸二十一日取出曬乾杵細作丸如梧子大每服二十九以原酒吞之延年去風令人光潤用桃仁五合去皮用粳米飯漿同研絞汁令盡溫洗面極妙 千金方

諸風脏連取乾菊花煮湯飲之或浸酒或釀酒服皆妙

賊風口偏不能語者茱萸一升薑豉三升清酒五升和煎五沸待冷服半升一日三服得少汗即瘥 食療

防風分頭身梢治上中下部三十六種風療風最要劑一兩酒水煎服

一切風氣蒼耳子三兩爲末水升半煎取七合溫服之又水煎如茶服

一百六十種惡風取葉本剉一兩水煎服

癱瘓不遂天麻苗名定風草又名赤箭不爲風所動剉水煎服

風瘡痒痹茱萸一升酒五升煮取一升半溫洗之立止 食療

一切風桑枝未生葉者剉炒水煎如茶每服一盞久服則終身不患偏風又可預防風氣霜後煮湯淋漬手足去風痹更勝 本草下同

中風口噤不語煩悶竹瀝一升飲之連飲佳

風痱恍惚竹瀝二升生葛汁三升薑汁五合相和服名曰竹瀝湯

中風語澀及風寒濕痹取烏雞肉作羹入葱薑椒鹽油醬煮熟食之

中風口眼喎斜取鮮魚大者以鍼刺頭上出血左斜塗右右斜塗左正則洗去鱻放水中 得效方

中風失瘖不語煩熱取梨汁服一合日一又風疾人喫舍消梨不限多少旬日頓爽 本草

風勞毒腫攣痛或牽引小腹及腰痛桃仁一升去皮尖熬令黑烟出熱研如脂膏以酒三升攪和服煖臥取汗不過三度瘥 食醫心鏡

蚺蛇酒治諸風癱瘓筋攣骨痛痹木瘡癬殺蟲辟瘴及瘴風疥癬惡瘡用蚺蛇肉一斤羌活一兩絹袋盛之用糯米二斗蒸熟安麴於缸底置蛇於麴上乃下飯密蓋待熟取酒以蛇焙研和藥其酒每隨量溫飲數杯忌風及慾事亦可袋盛浸酒飲 集簡方

手足風痹黃蜂窠大者一箇小者三四箇燒灰傅頭蒜一盌百草霜一錢半同搗傅上一時取下埋在陰處忌生冷葷腥 乾坤秘韞

一切風疾久服輕身明目黑髮駐顏用南燭樹春夏取枝葉秋冬取根皮細剉五斤水五斗慢火煎取二斗去滓淨鍋慢火煎如稀飴瓷瓶盛之每溫酒服一匙日三服一方入童子小便同煎 聖惠方同

中風不語舌根强硬三年陳醬人乳汁各五合相和研以生布絞汁隨時少少與服良久當語

搜風通滯風氣所攻臟腑積滯用牽牛子以童尿浸一宿長流水上洗半日生絹袋盛掛風處令乾每日鹽湯下三十粒極能搜風亦消虛腫 斗門方

中風喎僻骨疼煩躁者用烏驢皮燔毛如常治淨蒸熟入豉汁中和五味煮食 心鏡 下同

風虛濕痹醍醐二兩溫酒每服一匙效

中風煩熱膚痒醍醐四兩每半匙溫酒和服日一

中風口喎取蜘蛛研摩偏急頰上候正即止 千金方

癱瘓偏風及諸風手脚不遂腰脚無力者驢皮膠微炙熱先煮葱豉粥一升別又以水一升煮香豉二合去查入膠更煮七沸膠烊如餳頓服之乃暖喫葱豉粥如此三四劑即止若不喫粥令人嘔逆 廣濟方

風淫濕痹手足不舉筋節攣疼先與通關散次以全蝎七箇瓦炒入麝香一字研勻酒三盞空心調服如覺已透則止未透再服如病未盡除白後專以婆蒿根洗淨酒煮日二服 直指方

中風癱瘓追魂散用五靈脂研末以水飛去上面黑濁下面沙石研末每服二錢熱酒調下日一服繼服小續命湯 奇效良方

中風痰壅四肢不收昏憒若醉砒如菉豆大研新汲水調下少頃以熱水投之大吐卽愈未吐再服（聖惠方）

手足不遂大風及丹石熱風不遂用消石一兩生烏麻油二斤盛鐺中以土盤蓋口紙泥固濟火煎初時氣腥熟則氣香更以生麻油二升合煎得所收不津器中服時坐室中重作小低屋然火於內服一大合發汗力壯者日二服三七日頭面瘡瘡皆滅也然必以火爲使（波羅門僧方）

二月九日采葳蕤根切碎一石以水二石煮之從旦至夕以手挼爛布囊榨取汁熬稠其查滓爲末同熬至可丸丸如雞頭子大每服一丸白湯下日三服導氣脈强筋骨治中風濕毒去面皺益顏色久服延年（曜仙神隱書）

天麻丸消風化痰清利頭目寬胃利膈治心忪煩悶頭運欲倒項急肩背拘倦神昏多睡肢節煩痛皮膚瘙痒偏正頭痛鼻齆面目虛浮並宜服之天麻半兩芎藭二兩爲末煉蜜丸如芡子大每食後嚼一丸茶酒任下（普濟方）

中風偏痹半身不遂者用麻黃以湯熬成糊攤紙上貼不病一邊上下令遍但除七孔其病處不糊以竹蝨焙爲末三錢老人加麝香一錢研勻熱酒調服就臥須臾藥行如風聲口吐出惡水身出臭汗如膠乃急去糊紙別溫麻黃湯浴之暖臥將息淡食十日手足如故也（肘後救卒神書）

口眼喎斜活鮎魚切尾尖朝吻貼之卽正（箚珍）

一切風痰白殭蠶七箇直者細研薑汁調灌之（勝金方）

白龍鬚治男子婦人風濕腰腿疼痛左癱右瘓口目喎斜及產後氣血流散脛骨痛頭目昏暗腰腿痛不可忍並宜之惟虛勞癱瘓不可服研末每服一錢氣弱者七分無灰酒下密室隨左右貼牀臥待汗出自乾勿多蓋被三日勿下牀見風一方得疾淺者用末三錢煮瓶熨酒一壺每日先服桔梗湯少頃飲酒二盞早一服晚一服（保壽堂方）

槐膠治一切風化涎肝臟風筋脈抽掣及急風口噤或四肢不收頑痹或毒風周身如蟲行或破傷風口眼偏斜腰背强硬任作湯散丸煎雜諸藥用之亦可水煮和藥爲丸（嘉祐）

男女中風口噤不語並宜細研乳頭香末方寸匕以酒煎蘇方木調服立吐惡物癒（海藏）

胡麻炒食不生風病風人久食則步履端正語言不蹇（李廷飛）

威靈仙治風通十二經脈此藥朝服暮效疏通五臟六腑令出宿水微利不瀉人服四肢輕健手足溫煖專治男婦中風手足不遂口眼喎斜骨節風胎風暗頭風白癜風心風大痲風皮風搔痒手足頑痲言語蹇澁行立不得風疥癬毒濕熱浸淫面黃氣急腹脹腰重陰腫腎令婦人月水不來動經多日內服威靈仙外用煎湯頻洗無不平愈用威靈仙一味洗焙爲細末用好酒和令微濕入在竹筒內塞口九蒸九曬如乾漆以煉蜜和丸梧桐子大每服二十丸酒送下

鍼灸

靈樞經曰偏枯身偏不用而痛言不變志不亂病在分腠之間巨鍼取之益其不足損其有餘乃可復也痱之爲病也身無痛者四肢不收智亂不甚其言微知可治甚則不能言不可治也病先起於陽後入於陰者先取其陽後取其陰浮而取之

中藏經曰風中有五者謂心肝脾肺腎也心風宜於心俞灸之肝風宜於肝俞灸之脾風宜於脾俞灸之腎風宜於腎俞灸之肺風宜於肺俞灸之

甲乙經曰口僻頰窌及斷交下關主之

面目惡風寒頤腫臃痛招搖視瞻熒癡口僻巨窌主之

口不能水漿喎僻水溝主之

口僻噤外關主之

癒癡口沫出上關主之

偏枯四肢不用善驚大巨主之

大風逆氣多寒善悲大橫主之

頭身風善嘔怵寒中少氣掌中熱附急腋腫間使主之

足下緩失履衝陽主之

口噤不可開支溝主之

痱瘇臂腕不用曆吻不收合谷主之

大風默默不知所痛嗜臥善驚熒癡天井主之

偏枯臂腕發痛肘屈不得伸手叉風頭痛涕出肩臂頸痛項急煩滿驚五指掣不可屈伸戰怵腕骨主之

風肫驚手腕痛泄風汗出至腰陽谷主之

風入腹中俠臍急胃痛脅攣滿鼠不止五指端盡痛

足不任地湧泉主之
偏枯不能行大風默默不知所痛視如見星溺黃小
腹熱咽乾照海主之瀉在陰蹻右少陰俞先刺陰蹻
後刺少陰在橫骨中
風逆四肢腫復溜主之
風從頭至足面目赤口痛嚙舌解谿主之
大風目外眥痛身熱痱缺盆中痛臨泣主之
善自嚙頰偏枯腰髀樞痛善搖頭京骨主之
大風頭多汗腰尻腹痛腨跟腫上齒痛脊背尻重不
欲起喜食臭惡聞人音泄風從頭至足崑崙主之
千金方曰絕骨主風勞身重
天府曲池列缺百會主惡風邪氣泣血喜忘
陽谷主風眩驚手捲泄風汗出腰項急
陰蹻主風暴不知人偏枯不能行
崑崙主狂易大風
臨泣主大風痛
通理主不能言
肝風占候其口不能言當灸鼻下人中次灸大椎次
灸肝腧第九椎下是五十壯餘處隨年壯灸之得明
灸二三百壯良
心風寒灸心腧各五十壯第五節兩邊各一寸半是
脾風占候聲不出或上下手當灸手十指頭次灸人
中次灸大椎次灸兩耳門前脈去耳門上下行一寸
是次灸兩大指節上下各七壯
脾風灸脾腧夾脊兩邊各五十壯凡人脾腧無定所
隨四季月應病即灸臟腧是脾穴此法甚妙
又方灸百會次灸本神次灸承漿次灸風府次灸肩
髃次灸心腧次灸手五里次灸手髓孔次灸手少陽
次灸足五里次灸足髓孔次灸足陽明各五百壯
風痱不能語手足不遂度病者手小指內岐間至指
端爲度以置臍上直望心下以丹注度上端畢又作
兩度續所注上合其下間開其上取其本度橫置其
開上令三合其狀如倒作某字形男度左手女度右
手嫌不分了故上丹注三處同時起火灸之各一百
壯愈
卒中風口噤不得開灸機關二穴穴在耳下八分少
近前灸五壯即得語又灸隨年壯僻者逐僻左右灸
之中風失瘖不能言語緩縱不隨先灸天窻五十壯
息火仍移灸百會五十壯畢還灸天窻五十壯者始
發先灸百會則風氣不得洩內攻五臟喜閉伏乃失
音也所以先灸天窻次百會佳一灸五十壯悉洩火
勢復灸之視病輕重重者一處三百壯大效凡中風
服藥益劇者但是風穴悉皆灸之三壯無不愈也神
良決定勿疑惑也不至心者勿浪盡灸
又方以葦竹筒長五寸以一頭刺耳孔中四畔以麪
密塞之勿令泄氣一頭內大豆一顆幷艾燒令然灸
七壯即瘥患右灸左患左灸右千金不傳耳病亦可
灸之
又方灸手交脈三壯左灸右右灸左其注如鼠屎形
橫安之兩頭下火
風寒之氣客於中滯而不能發故瘖不能言及喉痹
失聲皆風邪所爲也入臟皆能殺人故附之於治風
方之末凡尸厥而死脈動如此故陽脈下墜陰脈上
爭氣閉故也針百會入三分補之熨斗熨兩脅下又
竈突墨彈丸大漿水和服之又針足中趾頭去甲如
韭葉又刺足大趾甲下內側去甲三分
眼瞤動口脣偏喎皆風入脈急與大續命湯附子散
摩神明膏丹參膏依穴灸之喉痹舌緩亦然入臟使
人瘖瘂卒死口眼相引牙車急舌不轉喎僻與伏龍
肝散和雞血及鼈血塗乾復塗幷灸吻邊橫文赤白
際逐左右隨年壯報之至三報三日不瘥更報之
儒門事親曰卒暴中風目之斜灸以承泣口之喎灸
以地倉俱效但不效者當灸人迎夫氣虛風入而爲
偏上不得出下不得泄眞氣爲風邪所陷故宜灸
丹溪心法曰卒暴中風灸風池百會曲池合谷風市
絕骨環跳肩髃三里等穴皆灸之以鑿竅疏風
衛生寶鑑曰大接經從陽引陰治中風偏枯
足太陽膀胱之脈出於至陰小指外側去爪甲如韭
葉爲井金十呼
足少陰腎之脈起於小指之下斜趨足心三呼
手厥陰心包之脈其直者循中指中衝出爪甲如韭
葉陷中爲井其支者別掌中小指次指出其端
手少陽三焦之脈起小指次指之端去爪甲如韭葉
爲井三呼
足少陽膽之脈起足竅陰小指次指之端去爪甲如
韭葉爲井其支者上入大指岐骨內出其端還貫爪
甲出三毛中三呼十三呼
足厥陰肝之脈起足大敦大指入叢毛之際去爪甲
如韭葉及三毛爲井十呼六呼
手太陰肺之脈起大指之端出於少商大指內側去
爪甲如韭葉爲井其支者出次指內廉出其端

手陽明大腸之脈起大指次指之端入次指內側去爪甲如韭葉爲井一呼中指內交三呼
足陽明胃之脈起足大指次指之端去爪甲如韭葉爲井其支者入大指出其端一呼
足太陰脾之脈起足大指端循指內側去爪甲角如韭葉爲井
手太陽小腸之脈起手小指之端去爪甲下一分陷中爲井
大接經從陰引陽治中風偏枯
手太陰肺之脈起手大指端出於少商大指內側去爪甲角如韭葉爲井一呼三呼
手陽明大腸之脈起手大指次指之端去爪甲如韭葉爲井其支者入大指間出其端
足陽明胃之脈起足大指次指之端去爪甲如韭葉爲井其支者入大指間出其端
足太陰脾之脈起足大指端循指內側去爪甲如韭葉爲井隱白也
手少陰心之脈起手小指內出其端循指內廉去爪甲如韭葉爲井
手太陽小腸之脈起手小指之端去爪甲下一分陷中爲井
足太陽膀胱之脈起足小指外側至陰去爪甲如韭葉爲井金
足少陰腎之脈起足小指之下斜趨足心爲井湧泉穴也

手厥陰心包之脈其直者循手中指出其端去爪甲如韭葉爲井中衝穴也其支者循掌中循小指次指出其端
手少陽三焦之脈起手小指次指之端去爪甲如韭葉爲井
足少陽膽之脈起於窻陰小指次指之端去爪甲如韭葉爲井其支者上入大指岐骨內出其端還貫爪甲出三毛中
足厥陰肝之脈起足大指之端入叢毛之際去爪甲如韭葉爲井大敦是也六呼
手太陰列缺偏風半身不遂
手陽明肩髃曲池偏風半身不遂
足陽明大巨偏枯四肢不舉
衝陽偏風口眼喎斜足緩不收
手太陽腕骨偏枯狂惕
足太陽輔陽風痹不仁四肢不舉
足少陰照海大風偏枯半身不遂善悲不樂
足少陽陽陵泉半身不遂
環跳風脚偏風半身不遂失音不語
手陽明天鼎暴瘖井喉痹
合谷瘖不能言
足陽明頰車地倉不語飲食不收水漿漏落左治右右治左
手少陰陰郄瘖不能言
靈道暴瘖不語
手少陽支溝暴瘖不語
三陽絡暴瘖不能言

手太陽天窻暴瘖不能言
足少陰通谷暴瘖不語
手厥陰間使瘖不能言
黃帝灸法療中風眼戴上不能視者灸第二椎井第五椎上各七壯一齊下火炷如半棗核大立愈
醫學綱目曰中風不語不省人事頂門灸七壯百會針入豆許先補後瀉瀉多補少
又撮要法中衝一分補之大敦灸一分百會一分瀉
怪穴又法十指尖出血此更詳之
中風失音瘖門二分留三呼瀉之不可深入中三分
留三吸瀉之天窻湧泉各五分神門支溝各三分
舌轉不語瘖門二分
舌緩不語風府三分
卒中失音不能言語緩縱不隨天窻刺之一分灸五十壯息火仍移灸百會五十壯畢復灸天窻五十壯
始發若先灸百會則風氣不得洩內攻五臟喜閉伏仍失音所以先灸天窻
口眼喎斜地倉鍼入二分沿皮斜向頰車一寸半留十吸瀉之頰車二分斜向地倉以上二穴喎右補瀉左喎左補瀉右
崇真中凡兩中風始則口眼喎斜次則涎潮閉塞左右共灸十二穴得氣通十二穴者謂聽會頰車地倉百會肩髃曲池風市足三里絕骨髮際大椎風池也依而用之無不效
本草綱目曰中風口噤熟艾灸承漿一穴頰車二穴各五壯
中風掣痛不仁不隨並以乾艾斛許採圍納瓦甑中

並下寒諸孔獨留一日以痛處著飢目而燒艾熏之一時即止矣

中風喎斜用苦葍絞汁和大麥麪作餅炙熱熨之正便止勿令太過

古今醫統曰治中風口眼喎斜聽會二穴在耳前陷中動脈宛宛中張口得之頰車二穴在耳下二韭葉陷中地倉二穴在口吻旁四分外近下有脈微微動者是上三穴左患灸右右患灸左

灸中風中腑手足不隨等疾百會一穴在頂中央肩髃二穴在兩肩端兩骨間陷處宛宛中舉臂得之曲池二穴在肘外橫紋頭屈肘曲骨取之是風市二穴在膝外兩筋間平立舒兩手著腿中指到處是足三里二穴在膝下三寸脛骨外大筋內筋骨之間是絕骨二穴在足外踝上三寸動脈中凡覺手足痲木不仁或痛良久乃止此將中腑之候也不論是風與氣可速灸此六穴在左灸右在右灸左

灸風中臟氣塞涎上不語昏危下火立效百會一穴如前風池二穴在項後髮際陷中大椎一穴在項後一椎上項中肩井二穴在缺盆上大骨前寸半以三指按之當其中指是間使二穴在掌後三寸兩筋間陷中足三里二穴如前曲池二穴如前凡覺手足痲痹心中昏亂神思不快此將中腑之候不論是風與氣可速灸此七穴依次第灸之立愈

景岳全書曰凡非風用灸法必其元陽暴脫及營衛血氣不調欲收速效惟艾火爲良然用火之法惟陽虛多寒經絡凝滯者爲宜若火盛金衰水虛多燥脈數發熱咽乾面赤口渴便熱等證則不可妄加艾火若誤用之必致血愈燥而熱愈甚是反速其危矣

一凡灸法頭面上艾炷宜小不宜大手足上乃可粗也又須自上而下不可先灸下後灸上

灸非風卒厥危急等證神闕用淨鹽炒乾納於臍中令滿上加厚鹽一片蓋定灸百壯至五百壯愈多愈妙鹽焦則易之或以川椒代鹽或用椒於下上蓋以鹽再蓋以鹽灸之亦佳

丹田氣海二穴俱連命門實生氣之海經脈之本灸之皆有大效

灸非風連臟氣塞涎上昏危不語等證百會風池大椎肩井曲池間使足三里

灸口眼歪斜聽會客主人俱灸眼頰車地倉承漿俱灸口合谷

灸手足不遂偏枯等證百會肩髃曲池風市環跳足三里絕骨 即懸鐘

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百四十五卷目錄
醫部彙考二百二十五
風門九
導引
醫案

藝術典第二百四十五卷
醫部彙考二百二十五
風門九
導引

保生祕要曰中風因腠理不密風邪乘虛而入始於中風或起四肢痲木或不覺疼或時疼者皆因受風濕之過耳其有口眼歪邪風中經絡左身不遂血死爲癱右身不遂濕痰氣弱爲瘓而左右癱瘓爲氣血兩虛也口喎語澀皆因血虛火盛而心氣不潤宜當養心運動

如患左手以右手指右回頭目左而視左患亦如之各運氣二十四口如患左足坐平凳子上以左足踏右膝上左手托脚跟右手扳脚尖轉頭向左患右亦如之用力扳之能除風寒暑濕遠年近日癱瘓之證無不應驗

運功三提三咽返念歸元氣積一九斡旋周天左邊氣不通於右手行功著意引在左手右亦如之各運五口專氣須百日候到氣脈全

偏風導引左偏於左內關穴掐之九九擦之九九亦掐五指尖右亦如之

運功取效全用周天通關法

周天法先立安土守中得訣純熟後行周天流通一身散徹四肢滯氣其法從前運於臍輪由小而大大而收小依次而上至璇璣穴向左臂打圈而下至曲池經內關邈掌心及指尖圈出手臂外關而上肘後肩井及大椎而下運於尾閭由下復上過玉枕逾崑崙泥丸面部上鵲橋而降重樓達胃口過臍至玉柱復氣海行入右腿歷膝關由鞋勞穴穿足背至指尖轉湧泉踵後上運過陰谷通尾閭又圈至頂門如前下鵲橋依次送左腿似右法而落湧泉又升泥丸及璇璣穴右行照左手轉過肩背貫崑崙而下攝元海如此將周身經脈宣暢徐徐迴轉但意至而氣自相隨是爲有作之周天法亦可與造化參

通關法從北極定樞斗柄大旋三徧天地包羅行於臍下分開兩路旋下兩腿之前聯絡不絕雙行轉脚底向後繞元海上至命門會合從右轉左大旋三徧從椎骨下分行兩肩經肘後外關達掌心循內關過肩井由項後透泥丸行明堂漸落雙瞳自面部下胷膈會心窩從左轉下降大旋三徧如前臍下分開循環徧體周流運用卯酉二辰行之或九度或二十一度而止愼勿執著若有若無此所謂煉其形和其氣也

中風病先飲熱茶或熱湯項要直舌捲托之上齶兩手作拳狀兩足指亦縮緊自然汗發而病愈

中風口歪右就右腎下肋頭拔過左左拔上至口又從口處拔回至左腎左同

醫案

史記扁鵲傳曰扁鵲過虢虢太子死扁鵲至虢宮門下問中庶子喜方者曰太子何病國中治穰過於衆事中庶子曰太子病血氣不時交錯而不得泄暴發於外則爲中害精神不能止邪氣邪氣積畜而不得泄是以陽緩而陰急故暴蹷而死扁鵲曰其死何如時曰雞鳴至今日收乎曰未也其死未能半日也言臣齊渤海秦越人也家在於鄭未嘗得望精光侍謁於前也聞太子不幸而死臣能生之中庶子曰先生得無誕之乎何以言太子可生也臣聞上古之時醫有俞跗治病不以湯液醴灑鑱石撟引案杭毒熨一撥見病之應因五藏之輸乃割皮解肌訣脈結筋搦髓腦揲荒爪幕湔浣腸胃漱滌五藏練精易形先生之方能若是則太子可生也不能若是而欲生之曾不可以告咳嬰之兒終日扁鵲仰天嘆曰夫子之爲方也若以管窺天以郄視文越人之爲方也不待切脈望色聽聲寫形言病之所在聞病之陽論得其陰聞病之陰論得其陽病應見於大表不出千里決者

至衆不可曲止也子以吾言爲不誠試入診太子當聞其耳鳴而鼻張循其兩股以至於陰當尚溫也中庶子聞扁鵲言目眩然而不瞚舌撟然而不下乃以扁鵲言入報虢君虢君聞之大驚出見扁鵲於中闕曰竊聞高義之日久矣然未嘗得拜謁於前也先生過小國幸而舉之偏國寡臣幸甚有先生則活無先生則棄捐填溝壑長終而不得反言未卒因噓唏服臆魂精泄橫流涕長潸忽忽承睞悲不能自止容貌變更扁鵲曰若太子病所謂尸蹷者也夫以陽入陰中動胃繚緣中經維絡別下於三焦膀胱是以陽脈下遂陰脈上爭會氣閉而不通陰上而陽內行下內鼓而不起上外絕而不爲使上有絕陽之絡下有破陰之紐破陰絕陽之色已廢脈亂故形靜如死狀太子未死也夫以陽入陰支蘭藏者生以陰入陽支蘭藏者死凡此數事皆五臟厥中之時暴作也良工取之拙者疑殆扁鵲乃使弟子子陽厲鍼砥石以取外三陽五會有間太子蘇乃使子豹爲五分之熨以八減之齊和奏之以更熨兩脅下太子起坐更適陰陽但服湯二旬而復故故天下盡以扁鵲爲能生死人扁鵲曰越人非能生死人也此自當生者越人能使之起耳

倉公傳曰陽慮侯相趙章病召臣意衆醫皆以爲寒中臣意診其脈曰迵音洞言洞徹五臟也風迵風者飲食下噫而輒出不留法曰五日死而後十日乃死病得之酒所以知趙章之病者臣意切其脈脈來滑是內風氣也飲食下噫而輒出不留者法五日死皆爲前分界法後十日乃死所以過期者其人嗜粥故中藏實中藏實故過期師言曰安穀者過期不安穀者不及期

濟北王病召臣意診其脈曰風熱胃滿即爲藥酒盡三石病已得之汗出伏地所以知濟北王病者臣意切其脈時風氣也心脈濁病法過入其陽陽氣盡而陰氣入陰氣入張則寒氣上而熱氣下故胃滿汗出伏地者切其脈氣陰陰氣者病必入中出及灑水也齊淳于司馬病臣意切其脈告曰當病迵風迵風之狀飲食下噫輒後之病得之飽食而疾走淳于司馬曰我之王家食馬肝食飽甚見酒來即走去驅疾至舍即泄數十出臣意告曰爲火齊米汁飲之七八日而當愈時醫秦信在旁臣意去信謂左右閣都尉曰意以淳于司馬病爲何曰以爲迵風可治信即笑曰是不知也淳于司馬病法當後九日死即後九日不死其家復召臣意臣意往問之盡如意診臣即爲三火齊米汁使服之七八日病已所以知之者診其脈時切之盡如法其病順故不死

臣意嘗診安陽武都里成開方開方自言以爲不病臣意謂之病苦眥風三歲四支不能自用使人瘖瘖即死今聞其四支不能用瘖而未死也病得之數飲酒以見大風氣所以知成開方病者診之其脈法奇咳言曰藏氣相反者死切之得腎反肺法曰三歲死也

千金方曰仁壽宮遍身患風脚不能行奉敕治之鍼瓌跳一穴陽陵泉一穴巨虛下廉一穴陽輔一穴凡鍼四穴即能起行

大理趙卿患風腰脚不隨不能跪起鍼上窌一穴環跳一穴陽陵泉一穴巨虛下廉一穴凡鍼四穴即能跪起

庫狄欽患偏風不得挽弓鍼肩髃一穴即得挽弓

儒門事親曰桑惠民病風面黑色畏風不敢出爬搔不已眉毛脫落作癩醫三年一日戴人到業路來求治於戴人戴人曰非癩也乃出素問風論曰腎風之狀多汗惡風脊痛不能正立其色焰面薄然浮腫今公之病腎風也宜先刺其面大出血其血當如墨色三刺血變色矣於是下鍼自額上下鼻鍼直至頤項皆出血果如墨色徧腫處皆鍼之惟不鍼目欽皆外兩旁蓋少陽經此少血多氣也隔日又鍼之血色乃紫二日外又刺其血色變赤初鍼時痒再刺則額覺痛三刺其痛不可任蓋邪退而然也待二十餘日又輕刺一遍方已每刺必以冰水洗其面血十日黑色退一月面稍赤三月乃紅白但不服除根下熱之藥病再作戴人在東方無能治者

高評事中風稍緩張令涌之後服鐵彈丸在普濟加減方中或問張曰君常笑人中風服鐵彈丸今亦用之何也張曰此收後之藥也今人用之於大勢方來之時正尤蚍蜉撼大樹不識次第故也

新寨馬叟年五十九因秋欠稅官杖六十得驚氣成風搐已三年矣病大發則手足顫掉不能持物食則令人代哺口目張睒唇舌嚼爛抖擻之狀如線引傀儡每發市人皆聚觀夜臥發熱衣被盡去徧身燥痒中熱而反外寒久欲自盡手不能繩頂產求醫至破其家而病益堅叟之子邑中舊小吏也以父母病訊戴人戴人曰此病甚易治若隆暑時不過一涌再涌奪則愈矣今已秋寒可三之如未愈更刺臉穴必愈

先以通聖散汗之繼服涌劑則吐痰一二升至晚又下五七行其疾小愈待五日再一涌出痰三四升如雞黃成塊狀如湯熱叟以手頓不能自探妻與代探咽噬腫傷昏憒如醉約一二時許稍稍省又下數行立覺勢輕顛減熱亦不作足亦能步手能巾櫛自持匙筯未至三涌病去如濯病後但覺極寒戴人曰當以食補之久則自退蓋大疾去衛氣未復故宜以散風導氣之藥切勿以熱劑溫之恐反成他病也呂君用妻年三十餘病風搐目眩角弓反張數日不食諸醫皆作豁風暗風風痫治之以南星雄黃天麻烏附用之殊無少效戴人曰諸風掉眩皆屬肝木曲直動搖風之用也陽主動陰主靜由火盛制金金衰不能平木肝木茂而自病先涌風痰二三升次以寒劑下十餘行以艾鼎鉞刺百會穴出血二杯愈

一衲子因陰雨臥濕地一年手足皆不遂若遇陰雨其病轉加諸醫皆作中風偏枯治之用當歸芍藥乳香沒藥自然銅之類久服反加大便溏風燥生經歲不已戴人以舟車丸下三十餘行去青黃涕水五升次以淡劑滲泄之數日手足能舉戴人曰此風寒濕三氣合而爲痹水濕得寒而浮蓄於皮膚之間久而不去內舍六腑宜用去水之藥可也水濕者人身中之寒物也寒去則血行血行則氣和氣和則愈矣

丹溪心法曰一婦人手足左癱口不能語健啖以防風荊芥羌活南星沒藥乳香木通茯苓厚朴桔梗麻黃甘草全蠍爲末湯酒調下不效時春脈伏漸以淡鹽湯盪汁每早一椀吐五日仍以白朮陳皮茯苓甘草厚朴菖蒲日二貼後以川芎山梔豆豉瓜蒂萊豆粉瀝汁鹽湯吐之吐甚快不食後以四君子湯服之以當歸酒芩紅花木通黏子蒼朮薑南星牛膝茯苓爲末酒糊丸服而瘥

一人體肥中風先吐後用化痰勝濕之藥而愈

衛生寶鑑曰眞定府臨濟寺趙僧判於至元庚辰八月間患中風半身不遂精神昏憒面紅頰赤耳鼾鼻塞語言不出診其兩手六脈弦數嘗記潔古有云中臟者多滯九竅中腑者多著四肢今語言不出耳鼾鼻塞精神昏憒是中臟也半身不遂是中腑也此臟腑俱受病邪先以三化湯一兩內疏三兩行散其壅滯使清氣上升充實四肢次與至寶丹加龍骨南星安心定志養神治之使各臟之氣上升通利九竅五日音聲出語言稍利後隨四時脈證加減用藥即稍能行步日以繩絡其病脚如履闊或高處得人扶之方可喻也又刺十二經之井穴以接經絡翌日不用繩絡能行步踰百日大勢已去戒之愼言語節飲食一年方愈

太尉忠武史公年六十八歲於至元戊辰十月初待國師於聖安寺丈室中煤炭火一爐在左側邊遂覺面熱左頰微有汗師及左右諸人皆出因左頰疎緩被風寒客之右頰急口喎於右脈得浮緊按之洪緩手舉醫學提舉忽君吉甫專科鍼灸先生於左頰上灸地倉穴一七壯次灸頰車穴二七壯後於右頰上熱手熨之議以升麻湯加防風秦艽白芷桂枝發散風寒數日而愈或曰世醫多以續命湯等藥治之今君用升麻湯加四味其理安在對曰足陽明經起於鼻交頞中循鼻外入上齒中手陽明經亦貫於下齒中兩頰皆屬陽明升麻湯乃陽明經藥香白芷又行手陽明之經秦艽治口噤防風散風邪桂枝寶表而固榮衛使邪不能再傷此其理也夫病有標本經絡之別藥有氣味厚薄之殊察病之源用藥之宜其效如桴鼓之應不明經絡所過不知藥性所主徒執一方不惟無益而又害之者多矣學者宜精思之

順德府張安撫字耘夫年六十一歲於己未閏十一月初患風證半身不遂語言蹇澀心神昏憒煩躁自汗表虛惡風如洒冰雪口不知味鼻不聞香臭聞木音則驚怖小便頻多大便結燥若用大黃之類下之加便飲食減少不敢用不然則滿悶最苦者晝夜不得瞑目而寐約有三月餘凡三易醫病全不減至庚申年三月初七日又因風邪加之痰嗽噎乾燥疼痛不利唾多中脘氣痞似噎予思內經有云風寒傷形憂恐怒傷氣氣傷臟乃病臟病形乃應又云人之氣以天地之疾風名之此風氣下陷入陰中不能生發上行則爲病矣又云形樂志苦病生於脈神先病也邪風加之邪入於經動無常處前證互見治病必求其本邪氣乃服論時月則宜升陽補脾胃瀉風木論病則宜實表裏養胃氣瀉肝木潤燥益元氣慎喜怒是治其本也宜以加減沖和湯治之自汗加黃芪半錢嗽加五味子二十粒晝夜不得睡乃因心事煩擾心火內動上乘陽分衛氣不得交入陰分故使然也以秫砂安神丸服之由是晝亦得睡十日後安撫曰不得睡三月有餘今困睡不已莫非他病生否予曰不然衛氣者晝則行陽二十五度夜則行陰亦二十五度此衛氣交入陰分循其天度故安撫得睡也

何病之有焉止眼白睛紅隱澁難開宜以當歸連翹湯洗之十三日後至日晡微有悶亂不安於前沖和湯中又加柴胡三分以升少陽之氣飲三服至十五日全得安臥減自汗惡寒躁熱胃脘痞滿小便多服藥之後小便減少大便一二日一行鼻聞香口知味飲食如常脈微弦而柔和按之微有力止咽喉中妨悶會厭後腫舌赤早辰語言快利午後微濇以元參升麻湯煎去查梢熱嚼漱時時嚥之前證良愈止牙齒無力不能嚼物用牢牙散入麝香少許研勻臨臥擦牙後以溫水漱之愈

安邊初病時右肩臂膊痛無主持不能舉動多汗出肌肉瘦不能正臥臥則痛甚繆曰汗出偏沮使人偏枯予思內經云虛與實鄰決而通之又云留瘦不拘飾而刺之使經絡通和血氣乃復又言陷下者灸之爲陽氣下陷入陰中肩膊時痛不能運動以火導之火引而上補之溫之已上證皆宜灸刺謂此先刺十二經之井穴於四月十二日右肩臂上肩井穴內先鍼後灸二七壯及至瘡發漸於枯瘦處漸添肌肉汗出少肩臂微有力至五月初八日再灸肩井次於尺澤穴各灸二十八壯引氣下行與正氣相接次日脾胃又添氣力自能搖動矣時值仲夏暑熱漸盛以清肺飲子補肺氣養脾胃定心氣

醫學綱目曰唐王太后中風不能言脈沉而口噤醫人許引宗曰既不能下藥宜湯氣熏之藥入腠理周時可瘥乃煎黃芪防風湯數斛置牀下氣如烟霧熏之其夕便得藥力熏蒸其效如此按丹溪云人之口通乎地鼻通乎天口以養陰鼻以養陽天主濡故鼻不受有形而受無形地主濁故口受有形而象乎無形王太后病風不言而脈沉其急非大補不可也若以有形之藥湯緩不及事今以黃芪防風煎湯熏之氣如烟霧滿室則口鼻俱受非智者通神之法不可爲也

一婦人年六十左癱手足不語多痰以防風荊芥羌活南星沒藥乳香木通茯苓厚朴桔梗甘草麻黃全蝎紅花爲末酒調下不拘時春脈漸伏以淡鹽湯蘸汁每早一椀吐五日仍以白术甘草陳皮厚朴薑蒲一日二貼後以川芎山梔豆豉瓜蒂菜豆粉鹽湯吐了用蒼术南星生薑牛膝茯苓酒糊丸服十日後夜間微汗手足動而能言

醫學正傳曰予長嫂何氏年五十七身肥白春初得中風暴仆不省人事身僵直口噤不語喉如拽鋸水飲不能入六脈浮大弦滑右甚於左以藜蘆末一錢加麝香少許灌入鼻竅吐痰一升許始知人事身體略能舉動急煎小續命湯倍麻黃連進二服覆以衣被得汗漸甦省能轉側但右手足不遂語言蹇澁後以二陳湯加芎歸芍藥防風羌活等藥合竹瀝薑汁日進二三服若四日大便不去則不能言語即以東垣導滯丸或潤腸丸微利之則語言復正如此調理至六十四歲得他病而卒

醫宗必讀曰徽商汪華泉忽然昏仆遺尿手撒汁出如珠衆皆以絕證既見決無生理余曰手撒脾絕遺尿腎絕法在不治惟大進參附或冀萬一遂以人參三兩熟附五錢煎濃灌下至晚而汗減復煎人參二兩芪术附各五錢是夜服盡身體稍稍能動再以參附膏加生薑竹瀝盡許連進三日神氣漸爽嗣後以理中補中等湯調養二百日安

延平太守唐東瀛多鬱多思又爲府事勞神昏冒痰壅口喝語澁四肢不隨時欲悲泣脈大而軟此脾肺氣虛風在經絡余以補中益氣去黃芪加秦艽防風天麻半夏十劑證減二三更加竹瀝薑汁倍用人參飲與八味丸兩月乃愈

吳門太史姚現閒中風昏憒語言不出面赤時笑是心臟中風也乙亥孟秋延余診之六部皆得石脈余歸謂唐名必曰石者冬令之脈也新秋見之非其時矣其象先見於非時當其時豈能再見耶果至冬月而歿

錢台石年近六旬昏憊不能言鼻塞二便閉此心脾二臟中風也服順氣疏風化痰之劑已漸於危矣比余診之六脈洪大按之搏指乃至虛反有盛候也宜補中爲主佐以祛風化痰方可回生舉家惶懼兩日不決余願日而呼曰今日無藥則斃矣若服參而病進余一人獨任其咎乃以大劑補中益氣加秦艽釣藤防風竹瀝再劑而神爽加減調治五十日始愈

燕郎張可貞遠歸忽然中風昏昧牙關緊閉遂先以牙皂末取嚏次以筋投開灌蘇合丸二丸後以防風散投之連進三服出汗如洗此邪自外解也去麻黃獨活羚羊角加桑艽牛夏膠星釣藤薑汁十劑痰清神爽服六君子加竹瀝薑汁釣藤六十日而痊

時己醫按曰重無王用之卒中昏憒口眼喎斜痰氣上湧咽喉有聲六脈沉伏此眞氣虛而風邪所乘以三生飲一劑加人參一兩煎服即甦若遺尿手撒口

開胼睡爲不治用前藥亦有得生者夫前飲乃行經絡治寒痰之藥有斬關奪旗之功每服必用人參兩許駕駛其邪而補助眞氣否則不惟無益適足以取敗矣觀先哲用芪附參附等湯其義可見

州判蔣大用年五十形體魁偉中滿吐痰勞則頭運所服皆清痰理氣余曰中滿者脾氣虧損也痰盛者脾氣不能運也頭運者脾氣不能升也指麻者脾氣虛而不能周於四末也遂以補中益氣加茯苓半夏以補脾土用八味地黃以補土母而愈後惑於乾坤生意方云凡人手指麻軟三年後有中風之疾可服搜風天麻二丸以預防之乃朝暮服致大便不禁飲食不進而殁夫預防之理當養氣血節飲食戒七情遠幃幕也若服前丸以預防適所以招風取中也

一男子卒中口眼喎斜不能言語遇風寒四肢拘急脈浮而緊此手足陽明經虛風寒所乘故舌本強而不能言用秦艽升麻湯治之稍愈以補中益氣加山梔而痊若舌瘖不能言足痿不能行屬腎氣虛弱名曰痱證宜用地黃飲子然此證由將息失宜腎水不足而心火暴盛痰滯於胷也輕者自甦重者或死

吾師僉憲高如齋自大同回謂余曰吾戍風病矣兩腿逸則痿軟而無力勞則作痛如鍼刺脈洪數而有力余告之曰此肝腎陰虛火盛而致痿軟無力眞病之形作痛如錐邪火之象也用壯水益腎之劑而愈先生曰向寓官邸皆以爲風恨無醫藥若服風劑豈其然哉乃吾之幸也切謂前證往往以爲風疾輒用發散而促其危者多矣

大尹劉孟春素有痰兩臂頑痲兩目流淚服祛風化痰藥痰愈甚臂反痛不能伸手指俱攣余曰痲屬氣虛誤服前藥肝火熾盛肝血乾涸筋無所養虛而攣耳當補脾肺滋腎水則風自息熱自退痰自清遂用六味地黃丸補中益氣湯不三月而痊

一儒者素勤苦惡風寒鼻流清涕寒禁嚏噴余曰此脾肺氣虛不能實腠理不信服祛風之藥肢體痲倦痰涎自出殊類中風余曰此因風劑耗散元氣陰火乘其土位遂以補中益氣加麥門五味治之而愈

外舅年六十餘素善飲兩臂作痛余曰此脾虛有濕也不信恪服祛風治痰之藥更加痲木發熱體軟痰湧腿膝拘痛口噤語澀頭目運重口角寬縱流涎兩月後身如蟲行掻起白屑始信謂余曰何也余曰臂痲體軟脾無用也痰涎自出脾不能攝也口斜語澀脾氣傷也頭目運重脾氣不能升也痒起白屑脾氣不能營也遂用補中益氣湯加神麴半夏茯苓三十餘劑諸證悉退又用參朮煎膏治之而愈

秀才劉允功形體魁偉素不慎酒色因勞怒頭運仆地痰涎上湧手足痲痹口乾引飲六脈洪數而虛余以爲腎經虧損不能納氣歸源而頭運不能攝水歸源而爲痰陽氣虛熱而痲痹虛火上炎而作渴用補中益氣合六味丸料治之而愈其後或勞役或入房其病即作用前藥隨愈

憲幕顧斐齋飲食起居失宜左半身并手足不遂汗出神昏痰涎上湧王竹西用參芪大補之劑汗止而神思漸清頗能步履後不守禁左腿自膝至足腫脹甚大重墜如石痛不能忍其痰甚多肝脾腎脈洪大而數重按則軟濇余朝用補中益氣加黃蘗知母麥門五味煎送地黃丸晚用地黃丸料加黃蘗知母數劑諸證悉退但自弛禁不能全愈耳

一婦人元氣素虛勞則體痲發熱痰氣上攻或用烏藥順氣散祛風化痰丸之類肢體痿軟痰涎自出面色痿黃形體倦怠而脾肺二脈虛甚此虛而類風也朝用補中益氣湯夕用十全大補湯漸愈又用加味歸脾湯調理尋愈

先母七十有五遍身作痛筋骨尤甚不能屈伸口乾目赤頭運痰壅胷膈不利小便短赤夜間殊甚遍身作癢如蟲行此肝經氣燥而風動也用六味地黃丸料加山梔柴胡治之諸證悉愈

一男子時瘡愈後遍身作痛服愈風丹半身不遂痰涎上湧夜間痛甚余作風客淫氣治以地黃丸而愈

一婦人四肢攣屈頰痛自汗小便短少畏見風寒脈浮弦緩此氣血虛而風寒濕熱相搏先用東垣清燥湯漸愈再用加味逍遙散及八珍湯加牡丹皮而痊

一婦人因怒發搐嘔吐痰涎口噤昏憒氣口脈大於人迎此氣滯而食厥用平胃散加茯苓半夏木香治之而甦更以六君子加木香漸愈乃去木香又二十餘劑而痊

一婦人脾胃虛弱飲食素少忽痰湧氣喘頭搖目斜手揚足擲雖以候脈視其面色黃中見青此肝木乘脾土用六君加柴胡升麻治之而甦更以補中益氣加半夏調理而痊

一婦人懷抱鬱結筋攣骨痛喉間似有一核服烏藥順氣散等藥口眼歪斜臂難伸舉痰涎愈甚內熱嘯熱食少體倦余以爲鬱火傷脾血燥生風所致用加

味歸脾湯加丹皮山梔二十餘劑痰熱少退喉核少利更用升陽益胃湯數劑諸證漸愈但臂不能伸此肝經血少用地黃丸而愈

一婦人素有痰火忽然昏憒痙瘛抽搐善伸數次四肢筋攣痰涎上升此肺金燥甚血液衰少而然也用清燥湯六味丸兼服尋愈

一婦人肢節作痛不能轉側惡見風寒自汗盜汗小便短少雖夏亦不去衣其脈浮緊此風寒客於太陽經用甘草附子湯一劑而瘥

一婦人善怒舌本強手臂痲余曰舌本屬土被木尅制故耳當用六君加柴胡芍藥治之

一膏粱之人素不慎起居忽失音不能語神思昏憒痰涎上壅余謂河間云夫瘖屬腎經虛寒其氣厥不至醫學綱目曰少陰氣至則嚼舌少陽氣至則嚼頰今失音腎氣不能上接清陽之氣也不信仍用風藥後嚼舌始信余言先用地黃飲子及六味地黃丸而愈

儀部袁補之患前證不信余言數服祛痰之劑後嚼舌而歿

靳閣老夫人先胃脘脹痛後四肢不收自汗如水小便自遺大便不實口緊目瞤飲食頗進十餘日或以爲中藏公甚憂余曰非也若風既中藏真氣既脫惡證既見禍在反掌焉能久延乃候其色面目俱赤而或青診其脈左三部洪數惟肝尤甚余曰胃乳脹痛肝經血虛肝氣否塞也四肢不收肝經血虛不能養筋也自汗不止肝經風熱津液妄泄也小便自遺肝經熱甚陰挺失職也大便不實肝木熾盛尅脾土也遂用犀角散四劑諸證頓退又用加味逍遙散調理而安後因鬱怒前證復作兼發熱嘔吐飲食少思月經不止此木盛尅土而脾不能攝血也用加味歸脾湯爲主佐以逍遙散調補肝脾之氣清和肝脾之血而愈後每遇怒或睡中手足搐搦復用前藥即愈

大參朱雲溪母於九月內忽仆地痰迷不省昏口喎斜左目緊小或用治痰調血之劑其勢稍緩至次年四月初其病復作仍進前藥勢亦漸緩至六月終病乃大作小便自遺或謂風中於藏以爲不治余診之左關弦洪而數此屬肝火血燥也遂用六味丸加五味麥門芎歸一劑而飲食頓進小便自調遂用補中益氣加茯苓山梔釣藤丹皮而安至十月復以傷食腹痛作瀉左目仍小兩關尺脈弦洪鼓指余以六君加木香吳茱萸升麻柴胡一劑而痛泄俱緩復以六君加肉果補骨脂一劑諸脈頓平痛泄俱止余謂左關弦洪由肝火血燥故左目緊小右關弦洪由肝邪乘脾故昏口歪斜腹痛作瀉二尺鼓指由元氣下陷設以目緊口喎誤作中風投以風藥以腹痛泄瀉誤作積滯投以峻劑復耗元氣爲害甚矣後臥火箱熱蒸太過遂致痰喘誤服寒涼之劑益甚後請診辭不治果歿

一婦人因怒仆地語言蹇澀口眼喎斜四肢拘急汗出遺尿六脈洪大肝脈尤甚皆因肝火熾盛肝主小便因熱甚而自遺也用加味逍遙散加釣藤及六味丸尋愈

一婦人素性急患肝風之證常服搜風順氣丸秦艽湯之類後大怒吐血昏口牽緊小便頻數或時自遺余以爲肝火旺而血妄行遂用小柴胡湯加山梔牡丹皮漸愈後大怒吐血誤服降火祛風化痰之劑大便頻數胃滿少食用清氣化痰之劑嘔而不食頭運口乾不時吐痰用導痰降火之類痰出如湧四肢常冷余曰嘔而不食頭運口乾胃氣不能升也痰出如湧脾氣不能攝痰也四肢逆冷脾氣不能運行也用補中益氣湯加茯苓半夏治之諸證漸愈又用加味歸脾湯兼服而安

舉人于尚之素腎虛積勞足痿不能步履後舌瘡不能言面色黧黑余謂腎氣虛寒不能運及所發用地黃飲治之而愈後不慎調攝而復作或用牛黃清心丸之類發熱痰甚誠似中風用祛風化痰之類小便祕澀口舌乾燥仍用前飲及加減八味丸漸愈又用補中益氣湯而痊

一婦人口眼歪斜四肢拘急痰涎不利而惡風寒其脉浮緊此風寒客於手足陽明二經先用省風湯二劑後用秦艽升麻湯而愈

一男子舌下牽强手大指次指不仁或大便祕結或皮膚赤暈余曰大腸之脈散舌下此大腸血虛風熱當用逍遙散加槐角秦艽治之

知州韓廷儀先患風證用疏風化痰養血之藥而瘥其腿膝骨肉發熱作痛服十味固本丸天麻丸益甚兩尺脈數而無力余以爲腎水虛不能生肝木虛火內動而作非風邪所致也不信又服羌活愈風丹之類四肢痿軟偏身痲木痰涎上湧神思不清余曰皆脾氣虧損不能榮養周身又不能攝涎歸源先用六君子加木香川芎數劑壯其脾氣以攝涎歸源又以

八珍湯數劑以助五臟生化之氣以榮養周身而諸證漸愈乃朝以補中益氣湯培養脾肺夕以六味地黃丸滋補肝腎如此三月餘而安

一婦人因怒患痰厥而蘇左手臂不能伸手指痲木口喎眼斜痰氣上攻兩腿骨熱或骨中痠痛服烏藥順氣散之類諸證益甚不時昏憒更加內熱晡熱余以爲肝經血虛內熱生風前藥復耗肝血虛火熾盛而然也先以柴胡梔子散調養肝經氣血數日後用八珍湯加鉤藤鉤散諸證稍愈又用加減八味丸料少加酒炒黃蘗知母黑色者數劑諸證頓退乃服八珍湯柴胡梔子散半載而痊後勞役卽有復作之意服柴胡梔子散遂安

一老婦兩臂不遂語言蹇澀服祛風之藥反致筋攣骨痛余謂此肝火血虛所致用八珍湯補氣血用地黃丸補腎水佐以排風湯年餘而愈

太宜人年七十五徧身作痛筋骨尤甚不能伸屈口乾目赤頭眩痰湧胷膈不利小便赤澀而短少夜間痰熱殊甚徧身作癢如蟲行此肝經氣燥而風動也用六味地黃丸料加山梔柴胡治之而愈

寓意草曰楊季蘅翁稟豐軀偉望七之齡神采不衰近得半身不遂之證已二年矣病發左半口往右喎昏厥遺溺初服參朮頗當爲黠醫簧以左半屬血不宜補氣之說幾致大壞雲間施笠澤以參附療之稍得向安然槩從溫補未盡病情也診得脈體軟滑中時帶勁疾蓋痰與風雜合之證痰爲主風爲標也又熱與寒雜合之證熱爲主寒爲標也平時手冷如冰故痰動易至於厥然厥已復甦甦已嘔去其痰眠食自若雖冬月亦能耐寒無取重裀複絮可知寒爲外顯之假寒而熱爲內蘊之眞熱既有內蘊之熱自蒸脾濕爲痰久久隔塞竅隧而衛氣不週外風易入加以房幃不節精氣內虛與風相召是以雜合而成是證耳及今大理右半脾胃之氣以運出左半之濕痰虛風此其間有細微曲折非只溫補一端所能盡者何也治雜合之病必須用雜合之藥而隨時令以盡無窮之變卽如冬月嚴寒用事身內之熱爲外寒所束不得從皮膚外泄勢必深入筋骨爲害矣故用薑附暫徹外寒而內熱反得宣洩若時令之熱與內蘊之熱相合復助以薑附三熱交煽有灼筋腐肉而已孰謂用藥之權衡可以一端盡耶或者曰左半風發而察脈辨證指爲兼痰兼熱似矣痰者脾濕所生寄居右畔是則先宜中右而何以反中左耶既已中左明係左半受病而何以反治右耶不知此正病機之最要者但爲丹溪等方書說病在左血多病在右氣多教人如此認證因而起後人之執著至內經則無此說也內經但言左右者陰陽之道路夫左右既爲陰陽往還之道路何嘗可偏執哉況左半雖血爲主非氣以統之則不流右半雖氣爲主非血以麗之則易散故肝膽居左其氣常行於右脾胃居右其氣常行於左往來灌注是以生生不息也肝木主風脾濕爲痰風與痰之中人原不分於左右但翁恃其體之健過損精血是以八八天癸已盡之後左半先虧而右半飲食所生之痰與皮毛所入之風以漸漬於空虛之府而驟發始覺耳風脈勁疾痰脈軟滑惟勁疾故病則大筋短縮卽舌筋亦短而蹇於言小筋弛張故從左而喎於右從左喎右卽可知左畔之小筋弛而不張也若左筋之張則左喎矣凡治一偏之病法宜從陰引陽從陽引陰從左引右從右引左盍觀樹木之偏枯者將溉其枯者乎抑溉其未枯者使榮茂而因以條暢其枯者乎治法以參朮爲君臣以附子乾薑爲佐使寒日可恃無恐以參朮爲君臣以羚羊角柴胡知母石膏爲佐使而春夏秋三時可無熱病之累然宜刺手足四末以泄榮血而通氣恐熱痰虛風久而成癘也

庚辰冬於鼎翁公祖園中識江冲寰先生面竊見身體重著行步艱難面色滯晦語言遲緩以爲有虛風卒中之候也因爲過慮辛巳秋召診間細察脾脈緩急不調肺脈勁大然肝木尚平陽氣尚旺是八風之邪未可易中而筋脈掣痛不能安寢者大率風而加之以濕交煽其虐所致以斯知尚可引年而施治也何也風者肝之病天之氣也濕者脾之病地之氣也天氣迅疾故發之暴益以地氣之紆緩反有所牽制而不能暴矣然氣別則病殊而氣交則病合有不可不明辨者病殊者在天氣則風爲百病之長其來微則隨相尅爲傳次必遍五臟而始烈其來甚則不繇傳次而直中唯體虛之人患始不測焉在地氣則濕爲下體之患其來微則足跗腫大然得所勝亦旋消其來甚則害及皮肉筋脈以漸而上攻亦惟陽虛之人勢始騰越焉兩者一本之天一本之地病各懸殊治亦異法者也病合者天之氣入於筋脈地之氣亦入於筋脈時乎天氣勝則筋脈張而勁焉時乎地氣勝則筋脈軃而緩焉兩者其源雖異其流則同交相

醒結蔓而難圖者也先生房中之風始雖不可知然而所感則微也至若濕之一字既以醇酒厚味而釀之於內又爲炙蒸嵐瘴而襲之於外是以足患日熾雖周身筋脈舒展亦不自如究竟不若足間晝夜掣痛瘡瘍腫潰浸淫無已也夫春時之風也夏時之濕與熱也秋時之燥也三時之氣皆爲先生一身之患者也而一身之患又惟一隅獨當之亦艮苦矣設內之風濕熱燥不攘足患其有寧宇乎所可嘉者惟冬月寒水司令勢稍末減而醫者不識此意每投壯筋骨之藥酒以驅其濕不知此乃治寒濕之法惟冬月病增者方宜豈以風濕熱濕而倒行逆施寧不重其困耶況乎先生肺脈勁大三四日始一大便雖冬月亦喜形寒飲冷而不嘗近火何所見其爲寒濕也哉所以孫眞人小竹瀝等方風濕熱燥寒五治之藥具備龍統龐雜後人全不知用若識此義爲去取則神而明之之事矣然則不辨證而用方者幾何而不悞人耶

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百四十六卷目錄

醫部彙考二百二十六

痹門一

黃帝素問 生氣通天論 金匱眞言論 五臟生成篇 移精變氣論 診要經終論 脈要精微論 玉機眞臟論 宣明五氣篇 逆調論 風論 痹論 皮部論 氣穴論 四時刺逆從論 氣交變大論 至眞要大論
靈樞經 邪氣臟腑病形篇 壽夭剛柔篇 厥病篇 五變篇 禁服篇 陰陽二十五人篇 邪客篇 論疾診尺篇 九鍼篇
張機金匱要略 痹證
華佗中藏經 五痹
嚴用和濟生方 五痹歷節
劉完素六書 諸痹
張從政儒門事親 論痹
李杲十書 痛風論
朱震亨心法 痛風
虞摶醫學正傳 痹
戴思恭證治要訣 痛痹
樓英醫學綱目 白虎飛尸歷節辨 痹分陰陽
李梴醫學入門 痛風 痹證

藝術典第二百四十六卷

醫部彙考二百二十六

痹門一

黃帝素問

生氣通天論

陽氣者精則養神柔則養筋開闔不得寒氣從之乃生大僂

註 背爲陽陽虛則寒邪痹閉於背而形體爲之俯僂金匱所謂痹俠背行是也

金匱眞言論

冬善病痹厥故冬不按蹻冬不痹厥飧泄而汗出也

註 四肢爲諸陽之本冬時陽氣下藏經氣外虛風入於經故手足痹厥按蹻者按摩導引冬氣伏藏故冬不按蹻復言人能藏養元眞之氣必不使邪傷經脈內爲飧泄亦不使邪傷陽氣外而汗出

五臟生成篇

人臥血歸於肝肝受血而能視足受血而能步掌受血而能握指受血而能攝臥出而風吹之血凝於膚者爲痹凝於脈者爲泣凝於足者爲厥此三者血行而不得反其空故爲痹厥也

註 痹者痹閉而不遂也泣者凝於絡脈泣濇而不能流行也厥者逆冷也血爲陰如血凝於下則上下陰陽不相順接而爲厥矣空骨空也骨空者節之交三百六十五穴會絡脈之滲灌諸節者也血行於皮膚不得反循於穴會故爲痹厥也

赤脈之至也喘而堅診曰有積氣在中時害於食名曰心痹得之外疾思慮而心虛故邪從之

註 赤當脈脈合心故曰赤脈之至也脈之喘急而牢堅主積氣於中當時害於食蓋食氣入胃濁氣歸心淫精於脈有積於中故害於食也名曰心痹積氣痹閉於心下也此得之外淫之邪因思慮而心虛故邪氣乘虛而留於內也

白脈之至也喘而浮上虛下實驚有積氣在胷中喘而虛名曰肺痹寒熱得之醉而使內也

註 肺主氣而虛故脈浮病氣而不病血病上而不病下故脈上虛而下實也陽氣虛則善爲驚駭胷中爲氣之海上注於肺以司呼吸邪積於上則膻中之正氣反虛故爲虛喘臟眞高於肺主行榮衛陰陽陰陽虛乘則爲往來之寒熱酒者熟穀之液其氣慓悍入於胃中則胃脹氣上逆則滿於胷中醉而使內則氣上逆故有積氣在胷中入房太過則傷腎腎爲本肺爲末本傷故肺虛也

青脈之至也長而左右彈有積氣在心下支胠名曰肝痹得之寒濕與疝同法腰痛足清頭痛

註 脈長而彈弦而急也弦則爲減諸急爲寒此得之寒濕而陽氣受傷故弦急邪在心下支胠間故脈左右彈清濕地氣之中人必從足始足厥陰之脈從足上膕入毛中過陰器抵小腹布脅肋故與疝相同而腰痛足冷厥陰與督脈會於巔故頭痛

黑脈之至也上堅而大有積氣在小腹與陰名曰腎痹得沐浴清水而臥

註 尺以候腎黑脈之至上堅而大者腎臟有積故腎脈堅大上堅者堅大在上而不沉與陰者小腹而兼於前陰也

移精變氣論

中古之治病至而治之湯液十日以去八風五痹之病十日不已治以草蘇草荄之枝本末爲助標本已得邪氣乃服

註病至而治之者言不能如恬憺虛無之世雖有賊邪不能爲害設有病至而即以湯藥治之八風者八方之風觸五臟邪氣發病五痹者五臟之痹也以春甲乙傷於風者爲肝痹以夏丙丁傷於風者爲心痹以秋庚辛傷於風者爲肺痹以冬壬癸傷於風者爲腎痹以至陰戊己遇此者爲脾痹草蘇之枝莖之旁枝草荄之枝根之旁枝也蘇荄爲本而旁枝爲末五痹以五臟爲本而經兪筋骨爲標五臟病以蘇荄治之經脈之外合病則以蘇荄之枝治之是以本治本而以末治標也

診要經終論

冬刺夏分病不愈氣上發爲諸痹

註冬主閉藏夏令浮長氣應藏而使之外泄故發爲諸痹

腰要精微論

按之至骨脈氣少者腰脊痛而身有痹也

註病在陰者名曰痹故當按之至骨

玉機真臟論

風者百病之長也今風寒客於人使人毫毛畢直皮膚閉而爲熱當是之時可汗而發也或痹不仁腫痛當是之時可湯熨及火灸刺而去之弗治病入舍於肺名曰肺痹發欬上氣

註氣主皮毛風寒之邪始傷陽氣故使人毫毛畢直太陽之氣主表而主開病則反閉而爲熱矣言風寒之邪始傷表陽之時可發汗而愈也痹不仁而腫痛者氣傷而病及於形也如在皮腠氣分者可用湯熨在經絡血分者可灸刺而去之皮毛者肺之合邪在皮毛弗以汗解則邪氣乃從其合矣病舍於肺名曰肺痹邪閉於肺故欬而上氣弗治肺即傳而行之肝病名曰肝痹一名曰厥脅痛出食當是之時可按若刺耳

註失而弗治肺即傳其所勝而行之肝病名曰肝痹脅乃肝之分厥者逆也逆於脅下而爲痛故一名厥脅痛蓋言痹乃厥逆之痛證也食氣入胃散精於肝肝氣逆故食反出也木鬱欲達故可按摩而導引之肝主血故若可刺耳

宣明五氣篇

五邪所亂邪入於陰則痹

註邪入於陰閉而不行則留著而爲痹痛之證故曰病在陽者名曰風病在陰者名曰痹

逆調論

帝曰人之肉苛者雖近衣絮猶苛也是謂何疾岐伯曰榮氣虛衛氣實也榮氣虛則不仁衛氣虛則不用榮衛俱虛則不仁且不用肉如故也人身與志不相有曰死

註此言榮氣不得衛氣之和則榮氣虛衛氣不與榮氣相和則衛氣實也不仁者不知痛痒不用者痿而不勝蓋言榮衛不和則兩者皆虛榮衛兩虛則不仁且不用而肉苛如故者不和而致虛也人身者榮衛之所循行也志者五臟之神志也本臟篇曰經脈者所以行氣血而榮陰陽濡筋骨利關節者也衛氣者所以溫分肉充皮膚肥腠理司開闔者也志意者所以御精神收魂魄適寒溫和喜怒者也如三者相失而不相有則氣血不行魂魄離散而死矣

帝曰人有身寒湯火不能熱厚衣不能溫然不凍慄是爲何病岐伯曰是人者素腎氣勝以水爲事太陽氣衰腎脂枯不長一水不能勝兩火腎者水也而生於骨腎不生則髓不能滿故寒甚至骨也所以不能凍慄者肝一陽也心二陽也腎孤臟也一水不能勝二火故不能凍慄病名曰骨痹是人當擘節也

註腎氣勝者腎水之氣勝也以水爲事者膀胱之水勝也言水寒之氣偏勝則太陽氣衰而孤陰不長矣腎臟之精枯不長而膀胱之一水不能勝二火矣腎脂不生則髓不能滿於骨是以寒至骨也肝者一陽初生之木火心者地二所生之君火也腎爲孤臟孤臟之陰藉太陽標本以合化太陽氣衰則孤陰不長矣膀胱之津液不能勝二火不能凍慄者二陽之火熱在內也病名曰骨痹病在髓枯而骨痛也故其人當骨節拘擘

風論

風氣與太陽俱入行諸脈兪散於分肉之間與衛氣相干其道不利故使肌肉憤脹而有痛衛氣有所凝而不行故其肉有不仁也

註此言風邪傷衛而爲腫癌不仁也

痹論

黃帝問曰痹之安生岐伯對曰風寒濕三氣雜至合

而爲痹也其風氣勝者爲行痹

註風者善行而數變故其痛流行而無定處

寒氣勝者爲痛痹

註寒爲陰邪痛者陰也是以寒氣勝者爲痛痹

濕氣勝者爲著痹也

註濕流關節故爲留著之痹

帝曰其有五者何也岐伯曰以冬遇此者爲骨痹以春遇此者爲筋痹以夏遇此者爲脈痹以至陰遇此者爲肌痹以秋遇此者爲皮痹

註皮肉筋骨五藏之外合也五藏之氣合於四時五行故各以其時而受病同氣相感也

帝曰內舍五藏六腑何氣使然岐伯曰五藏皆有合病久而不去者內舍於其合也

註肺合皮心合脈脾合肌肝合筋腎合骨邪之中人始傷皮肉筋骨久而不去則內舍於所合之藏而爲藏腑之痹矣

故骨痹不已復感於邪內舍於腎筋痹不已復感於邪內舍於肝脈痹不已復感於邪內舍於心肌痹不已復感於邪內舍於脾皮痹不已復感於邪內舍於肺所謂痹者各以其時重感於風寒濕之氣也

註舍者如館舍邪客留於其間者也邪薄於五藏之間干藏氣而不傷其藏真故曰舍曰客而止見其煩滿喘逆諸證如入藏者則死矣

凡痹之客五藏者肺痹者煩滿喘而嘔

註肺主氣而司呼吸其脈起於中焦還循胃口上膈屬肺故痹則煩喘而嘔

心痹者脈不通煩則心下鼓暴上氣而喘噎乾善噫厥氣上則恐

註心主脈故痹閉而令脈不通邪薄心下鼓動而上干心臟則煩而心下鼓心脈上通於肺故逆氣暴上則喘而噎乾心氣上逆則善噫水火之氣時交心氣逆於上則不能下交於腎腎氣虛故恐

肝痹者夜臥則驚多飲數小便上爲引如懷

註肝藏魂神魂不安故發驚駭肝脈入毛中過陰器循喉嚨入頏嗓肝氣痹閉則鬱熱在上則多飲在下則便數上引於中而有如懷妊之狀也

腎痹者善脹尻以代踵脊以代頭

註腎者胃之關關門不利則胃氣不轉故善脹骨痿不能行故尻以代踵陰病不能仰故脊以代頭

脾痹者四肢解墮發欬嘔汁上爲大塞

註脾氣不能行於四肢故四肢解墮脾脈上絡挾咽氣痹不行故發欬入胃之飲上輸於脾肺脾氣不能轉輸故嘔汁肺氣不能通調故上爲大塞

腸痹者數飲而出不得中氣喘爭時發飧泄

註腸兼大小腸而言小腸爲心之腑而主小便邪痹之則火熱鬱於上而爲數飲下爲小便不得出也大腸爲肺之腑而主大便邪痹之故上則爲中氣喘爭下爲飧泄

胞痹者少腹膀胱按之內痛若沃以湯溲於小便上爲清涕

註胞者膀胱之室居少腹邪閉之故少腹膀胱按之內痛水閉不行則蓄而爲熱故若沃以湯且溲於小便膀胱之脈從巔入腦腦滲則爲涕上爲清涕者太陽之氣痹閉於下不能循經而上升也

陰氣者靜則神藏躁則消亡

註陰氣者臟氣也神者五藏所藏之神也五藏爲陰陰者主靜故靜則神氣藏而邪不能侵躁則神氣消亡而痹聚於臟矣

飲食自倍腸胃乃傷

註居處失宜則風寒濕中其俞當節飲食勿使邪氣內入如飲食應之邪則循俞而入舍其腑矣

淫氣喘息痹聚在肺淫氣憂思痹聚在心淫氣遺溺痹聚在腎淫氣乏竭痹聚在肝淫氣肌絕痹聚在脾

註痹不已亦益內也其風氣勝者其人易已也

註淫氣者陰氣淫佚不靜藏也淫氣而至見於諸證則臟氣不藏而痹聚在臟是以在臟腑經俞諸痹留而不已亦進益於內而爲臟腑之痹夫寒濕者天之陰邪傷人經俞筋骨風者天之陽邪傷人皮膚氣分是以三邪中於臟腑之俞而風氣勝者其性善行可從皮腠而散故其人易已也

帝曰痹其時有死者或疼久者或易已者其故何也岐伯曰其入臟者死其留連筋骨者疼久其留皮膚間者易已

註夫風寒濕氣中其俞其臟氣實則邪不動臟若神氣消亡則痹聚在臟而死矣

帝曰其客於六腑者何也岐伯曰此亦其食飲居處爲其病本也

註夫居處失常則邪氣外客飲食不節則腸胃內傷故飲食居處爲六腑之病本

六腑亦各有俞風寒濕氣中其俞而食飲應之循俞而入各舍其腑也

註飲食入胃大小腸瀋泌糟粕膀胱決瀆水濁蒸化精液榮養經兪如居處失常而又食飲應之於內則經脈虛傷邪循兪而入舍其腑矣

帝曰以鍼治之奈何岐伯曰五藏有兪六腑有合循脈之分各有所發各隨其過則病痿矣

註營兪治經故痹在藏者當取之兪合治內腑故痹在腑者取於合又當循形身經脈之分所發各隨其有過之處而取之則其病自瘳

帝曰榮衞之氣亦令人痹乎岐伯曰榮者水穀之精氣也和調於五藏灑陳於六腑乃能入於脈也故循脈上下貫五藏絡六腑也

註言五藏六腑受穀精之氣營行於經脈經榮之氣復貫絡於藏腑互相資生而養育者也

衞者水穀之悍氣也其氣慓疾滑利不能入於脈也故循皮膚之中分肉之間熏於肓膜散於胸腹

註分肉者肌肉之腠理水穀之悍氣行於藏腑之募原募原者脂膜也絡小腸之脂膜謂之肓是以在中焦則熏蒸於肓膜行於胷腹則散於心肺之膜理行於腹中散於腸胃肝腎之募原是外內上下皮肉藏腑皆以受氣一日一夜五十而周於身逆其氣則病從其氣則愈不與風寒濕氣合故不爲痹

註榮行脈中衞行脈外營周不休五十而復大會陰陽相貫如環無端旋轉而不休息者也故逆其氣則病從其氣則愈不與風寒濕邪合而留連於皮膚脈絡之間故不爲痹也

帝曰善痹或痛或不痛或不仁或寒或熱或燥或濕其故何也

註不仁不知痛痒燥謂無汗濕者多汗而濡濕岐伯曰痛者寒氣多也有寒故痛也

註寒氣勝者爲痛痹故痛者寒氣多也

其不痛不仁者病久入深榮衞之行濇經絡時疎故不通皮膚不營故爲不仁

註通當作痛病久入深者久而不去將內舍於其合也邪病久則榮衞之道傷而行濇邪入深則不痹閉於形身而經絡時疎故不痛也榮衞行濇則不能榮養於皮膚故爲不仁

其寒者陽氣少陰氣多與病相益故寒也

註人之陽氣少而陰氣多則與病相益其陰寒矣邪屬陰故爲寒也

其熱者陽氣多陰氣少病氣勝陽遭陰故爲痹熱

註人之陽氣多而陰氣少邪得人之陽盛而病氣勝矣人之陽氣盛而遇天之陰邪則邪隨氣化而爲痹熱矣

其多汗而濡者此其逢濕甚也陽氣少陰氣盛兩氣相感故汗出而濡也

註濕者天之陰邪也感天地之陰寒而吾身陰氣又盛兩氣相感故汗出而濡也

帝曰夫痹之爲病不痛何也岐伯曰痹在於骨則重在於脈則血凝而不流在於筋則屈不伸在於肉則不仁在於皮則寒故具此五者則不痛也

註邪痹經脈骨肉之有形而不傷其氣者則不痛也夫骨有骨氣脈有脈氣筋有筋氣肌有肌氣皮有皮氣皆五藏之氣而外合於形身如病形而不傷其氣則止見骨痹之身重脈痹之血凝不行筋痹之屈而不伸肉痹之肌肉不仁皮痹之皮毛寒冷故具此五者之形證而不痛也

凡痹之類逢寒則蟲逢熱則縱帝曰善

註凡此五痹之類如逢吾身之陰寒則如蟲行皮膚之中逢吾身之陽熱則筋骨並皆放縱又非若病氣之有寒則痛陽氣多則爲痹熱

皮部論

陽明之陽名曰害蜚上下同法視其部中有浮絡者皆陽明之絡也其色多青則痛多黑則痹黃赤則熱多白則寒五色皆見則寒熱絡盛而不泄其邪則入客於經矣在陽明之部分則爲陽明之病在少陽之部分則爲少陽之病在三陰之部分則爲三陰之病故見於皮膚間者爲絡爲陽而主外絡於筋骨間者爲經爲陰而主內蓋在陽者可從外解在陰者則內入而舍於臟腑矣

氣穴論

積寒留舍榮衞不居卷肉縮筋肋肘不得伸內爲骨痹外爲不仁命曰不足大寒流於谿谷也

註積寒留舍致榮衞不能居其間寒邪凝滯又不得正氣以和之以致肉卷而筋縮也肋肘乃筋骨之機關故不得伸舒邪閉於外故內爲骨痹榮衞

內逆故外爲不仁命曰不足蓋熱邪淫溢是屬有餘寒性凝濇故爲不足此大寒之邪流於谿谷之間以致筋骨皆爲病也

四時刺逆從論

厥陰有餘病陰痹不足病生熱痹少陰有餘病皮痹隱軫不足病肺痹太陰有餘病肉痹寒中不足病脾痹陽明有餘病脈痹身時熱不足病心痹太陽有餘病骨痹身重不足病腎痹少陽有餘病筋痹胃滿不足病肝痹

註有餘者多氣少血不足者血氣皆少此三陰三陽所主之血氣各有太過不及之爲病也

氣交變大論

歲火不及寒乃大行痿痹足不任身

註痿痹足不任身皆寒濕之證

至眞要大論

太陰司天肘腫骨痛陰痹陰痹者按之不得

註太陰司天丑未歲也肘腫陰痹皆感寒濕之氣病在陰者名曰痹故按之不得也

少陰在泉主勝則厥氣上行心痛發熱嘔中衆痹皆作

註終之主氣乃陽寒水主勝則厥氣上行心痛發熱者乃寒水之主氣上乘於在泉之君火也五之主氣乃陽明燥金客氣乃厥陰風木衆痹者各在其處更發更止更居更起以右應左以左應右嘔中衆痹皆作

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

心脈微大爲心痹引背善泪出

註心氣微盛則逆於心下而爲心痹引背行於上則心精隨氣上湊於目而泪出矣

肺脈微大爲肺痹引胷背起惡日光

註肺氣微盛於上則爲肺痹引胷背蓋氣從下而上也陰血少故惡日光金畏火也

肝脈微大爲肝痹陰縮筋攣引小腹

註陰縮肝氣逆於下也肝脈抵少腹上注肺攣引小腹者經氣逆於上下也

壽夭剛柔篇

病在陽者名曰風病在陰者名曰痹陰陽俱病名曰風痹病有形而不痛者陽之類也無形而痛者陰之類也無形而痛者其陽完而陰傷之也急治其陰無攻其陽有形而不痛者其陰完而陽傷之也急治其陽無攻其陰陰陽俱動乍有形乍無形加以煩心命曰陰勝其陽此謂不表不裏其形不久

註風者天之陽氣痹者人之陰邪陰陽俱病名曰風痹外內之相合也皮肉筋骨乃有形臟腑之氣爲無形病有形而不痛者病在外之陽也病無形而痛者氣傷痛也陰完陽完乃臟腑陰陽之氣不傷陰陽俱動乍有形乍無形乃陰陽之不表不裏心爲陽而主火水爲陰而居下加以煩心此陰勝其陽矣陰陽外內不交水火上下相尅此天地陰陽之氣不調故其形不久形氣之相應也

厥病篇

風痹淫瘧病不可已者足如履冰肘如入湯中股脛淫濼煩心頭痛時嘔時悶眩已汗出久則目眩悲以喜恐短氣不樂不出三年死也

註風痹淫瘧乃痹逆之風邪淫濼於上下蓋風之善行而數變也風邪淫濼於上下故病不可已蓋寒之則傷心主之火熱之則傷腎臟之陰病不可治故不可已也淫濼於下故足如履冰感寒水之氣也時或淫濼於上則如入湯中感火熱之氣也股脛淫濼淫及於下之足脛煩心頭痛淫及於上之頭首也時嘔時悶有時而逆於中也諸脈皆會於目眩者淫於經脈之血分也毛腠疎則汗出者淫於毛腠之氣分也水之精爲志火之精爲神志與心精共腠於目故久則目眩也悲以喜恐者心之神志傷而悲泣也腎爲生氣之原短氣者傷其腎氣也不樂者傷其心氣也不出三年死者不過盡水火陰陽之數周而終也

五變篇

黃帝曰何以候人之善病痹少俞答曰粗理而肉不堅者善病痹黃帝曰痹之高下有處乎少俞答曰欲知其高下者各視其部

註各視其部則知痹之高下蓋心肺之痹在高肝腎脾之痹在下也

禁服篇

雷公曰小子聞風者百病之始也厥逆者寒濕之起也別之奈何黃帝曰常候閾中薄澤爲風冲濁爲痹在地爲厥此其常也各以其色言其病

註地即面之地閣風乃天氣故常候於閾庭寒濕者地氣故候在地部風乃陽邪故其色薄澤寒濕者陰邪故其色冲濁

陰陽二十五人篇

足陽明之下血少氣多則肉而善瘃善痿厥足痹

註瘃乃凍瘡血少則肉善瘃者血所以溫膚熱肉者也痿厥足痹者血氣少而不能榮養筋骨也

足少陽之上血氣皆少則無鬚感於寒濕則善痹骨痛爪枯也

註爪者筋之餘血氣皆少不能榮養筋骨以致寒濕之邪留痹而爲骨痛爪枯也

邪客篇

脈大以濇者爲痛痹

論疾診尺篇

尺膚濇者風痹也

註註病在陰者名曰痹如尺膚澁者此風痹於筋骨間也

診血脈者多黑爲久痹

註此以皮部之色而知血脈之爲痹也

九鍼篇

邪入於陰則爲血痹

註痹者閉也痛也邪入於陰閉而不行則留著而爲痹痛矣

漢張機金匱要略

痹證

問曰血痹病從何得之師曰夫尊榮人骨弱肌膚盛重因疲勞汗出臥不時動搖加被微風遂得之但以脈自微濇在寸口關上小緊宜鍼引陽氣令脈和緊去則愈

血痹陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證身體不仁如風痹狀黃芪桂枝五物湯主之

人年五六十其病脈大者痹俠背行若腸鳴馬刀俠癭者皆爲勞得之

寸口脈浮而緩浮則爲風緩則爲痹痹非中風四肢苦煩脾色黃瘈熱以行

太陽病關節疼痛而煩脈沉而細者此名濕痹濕痹之候其人小便不利大便反快但當利其小便

華佗中藏經

五痹

痹者風寒暑濕之氣中於臟腑之爲也入腑則病淺易治入臟則病深難治而有風痹寒痹濕痹熱痹氣痹又有筋骨血肉氣之五痹也大凡風寒暑濕之邪人於心則名血痹入於脾則名肉痹入於肝則名筋痹入於肺則名氣痹入於腎則名骨痹感病則一其治乃異痹者閉也五臟六腑感於邪氣亂於眞氣閉而不仁故曰閉也又痹病或痛痒或痲或急或緩而不能收持或拳而不能舒張或行立艱難或言語蹇澁或半身不遂或四肢拳縮或口眼偏斜或手足欹側或行步而不能言語或不能行步而左偏枯或右痿癖或上不通於下或下不通於上或大腑閉塞或左右手疼痛或卽病而卽死或感邪而未亡或噦滿而不寐或昏昧而不醒種種諸證出於痹也痹者風寒暑濕之氣中於人則使之然其於脈候形證治療之法亦各不同焉

氣痹者悉思喜怒過則氣結於上久而不消則傷肺傷氣則生氣漸衰而邪氣愈勝留於上則胷膈痹而不能食注於下則脚腫重而不能行攻於左則左不遂衝於右則右不仁貫於舌則不能言遺於腸則不能消塞而不散則痛留而不聚則痲眞經既損難以醫治邪氣不勝易爲疼愈其脈右手寸口沉而遲澁者是也宜節憂思以養氣愼怒以全眞最爲良矣

血痹者飲酒過多懷熱太盛或寒折於經絡或濕犯於榮衛因而血搏遂成其痹故使人血不能榮外氣不能養內內外已失漸漸消削左先枯則右不能舉右先枯則左不能伸上先枯則上不能制下下先枯則下不能尅上中先枯則下不能通疏百證千狀皆失血也其脈左寸口脈結而不流利或斷絕是也

肉痹者飲食不節膏粱肥美之所爲也痹者肉之本氣以食則肉不榮肌膚不澤則紋理疎凡風寒暑濕之邪易爲入故不卽治則爲肉痹也肉痹之狀其先能食而不能充悅四支緩而不收持者也其右關脈按舉皆無力而往來澁也宜節飲食以調其臟常起居以安其痹然後依經補瀉以求其愈也

筋痹者由怒叫無時行步奔急淫邪傷肝肝失其氣因而寒熱所客久而不去流入筋會則使人筋急而不能舒緩也故名曰筋痹宜活血以補肝溫氣以養腎然後服餌湯丸治得其理合自瘳已不然則害人矣其脈左關中弦急而數浮沉而有力是也

骨痹者乃嗜慾不節傷於腎也氣內消則不能關禁不能關禁則中上俱亂中上亂則三焦之氣痞而不通三焦痞則飲食不精粕飲食不精粕則精氣日衰精氣日衰則邪氣妄入邪氣妄入則上衝心舌上衝心舌則爲不語中犯脾胃則爲不充下流腰膝則爲不遂旁攻四支則爲不仁寒在中則脈遲熱在中則

脈數風在中則脈浮濕在中則脈濡虛在中則脈滑其證不一要在詳明

宋嚴用和濟生方

五痹歷節

風寒濕三氣雜至合而爲痹皆因體虛腠理空疎受風寒濕氣而成痹也痹之爲病寒多則痛風多則行濕多則著在骨則重而不舉在脈則血凝而不流在筋則屈而不伸在肉則不仁在皮則寒逢寒則急逢熱則縱此皆隨所受邪氣而生證也大率痹病總而言之凡有五種筋痹脈痹皮痹骨痹肌痹是也筋痹之爲病應乎肝其狀夜臥則驚飲食多小便數脈痹之爲病應乎心其狀血脈不流令人痿黃心下鼓氣卒然逆喘不通嗌乾善噫肌痹之爲病應乎脾其狀四支懈怠發欬嘔吐皮痹之爲病應乎肺其狀皮膚無所知覺氣奔喘滿骨痹之爲病應乎腎其狀骨重不可舉不遂而痛喜脹診其脈大而濇爲痹來急者亦爲痹濇而緊者亦爲痹又有風血痹陰邪入於血經故也外有支飲亦令人痹當隨證施治白虎歷節由體虛之人將理失宜受風寒濕毒之氣使筋脈凝滯血氣不流蘊於骨節之間或在四肢肉色不變其病晝輕夜劇其痛徹骨如虎之嚙故名白虎也痛如掣者爲寒多腫滿如脫者爲濕多汗出者爲風多巢氏云飲酒當風汗出入水遂成斯疾久而不愈令人骨節蹉跌爲癲病者誠有此理也

金劉完素六書

諸痹

身非衣寒中非受寒氣痹者血氣不行如從水中出不必寒傷而作也附子丸主之

身寒大衣不能熱腎脂枯涸不行髓少筋弱凍慄故攣急附子湯主之

近衣絮肉苛榮氣虛則不仁其痿重爲肉苛也以前胡散主之

風寒濕三氣合而爲痹風氣勝者爲行痹上下左右無常留隨所至而作防風湯主之

寒勝者爲痛痹大宜宣通陰寒爲痛宜通氣溫經而愈茯苓湯加減主之

濕氣勝者爲著痹濕地水氣甚重著而不去多汗而濡者茯苓川芎湯主之

周痹黃帝鍼經云在血脈之中隨上下本痹不痛今能上下周身故以名之大豆蘗散主之

胞痹者小腹膀胱按之內痛若沃以湯溫於小便上爲清涕太陽直行從巔入循於腦氣下灌於鼻時出清涕不止腎著湯主之

腸痹者雖多飲不得溲不成大便使糟粕不化故氣喘急而飧洩木香丸主之

熱痹者陽氣多陰氣少陽熱搏其陰寒故痹臟腑熱煸然而悶也升麻湯主之

風寒濕三氣合而爲痹當汗惡風目瞤脅痛或走注四支皮膚不仁屈伸不便升麻前胡湯主之

元張從政儒門事親

論痹

夫痹之爲狀痲木不仁以風寒濕三氣合而成之故內經曰風氣勝者爲行痹風則陽受之故其痹行旦劇而夜靜世俗莫知反呼爲走注疼痛虎咬之疾寒氣勝者爲痛痹寒則陰受之故其痹痛旦靜而夜劇世俗不知反呼爲鬼忤濕氣勝者爲著痹濕勝則筋脈皮肉受之故其痹著而不去肌肉削而著骨世俗不知反呼爲偏枯此疾之作多在四時陰雨之時及三月九月太陽寒水用事之月故草枯木寒爲甚或瀕水之地勞力之人辛苦失度觸冒風雨寢處津濕痹從外入況五方七地寒暑殊氣剛柔異稟飲食起居莫不相戾故所受之邪各有淺深或痛或不痛或仁或不仁或筋屈而不能伸或引而不縮寒則蟲行熱則縮緩不相亂也皮痹不已而成肉痹肉痹不已而成脈痹脈痹不已而成筋痹筋痹不已而成骨痹久而不已內舍其合若臟腑俱病雖有智者不能善圖也凡病痹之人其脈沉濇今人論方者見諸痹證遽作脚氣治之豈知內經中本無脚氣之說或曰諸方亦有脚氣統論又有脚氣方藥若止取素問則諸方皆非耶曰痹病以濕熱爲源風寒爲兼三氣合而爲痹奈何治此者不問經絡不分臟腑不辨表裏便作寒濕脚氣烏頭附子乳香沒藥種種燥熱攻之中脘臍下三里灸之蒸熨湯炕以治之以至便漩澀滯前後俱閟虛燥轉甚肌膚日削食飲不入邪氣外侵雖遇扁華亦難措手何哉胷膈間有寒痰故也痹病本不死死者皆醫之誤雖有用蒸之法必先涌去其寒痰然後諸法皆效經曰五臟有兪六腑有合循脈之本分各有所發之源以砭石補之則痹病瘳僕常用傷寒汗下吐三法治風痹愈者多矣

大人小兒風寒濕三氣合而爲痹及手足痲木不仁者可用鬱金散吐之吐訖以導水丸通經散泄之泄

訖以辛溫之劑發散汗出則可服當歸芍藥乳沒行經和血等藥如不愈則便不宜服此等藥

李杲十書

痛風論

氣行脈外血行脈內晝行陽二十五度夜行陰二十五度此平人之造化也得寒則行遲而不及得熱則行速而太過內傷於七情外傷於六氣則血氣之運或遲或速而病作矣彼痛風者大率因血受熱已自沸騰其後或涉冷水或立濕地或扇取涼或臥當風寒凉外搏熱血得寒汙濁凝澀所以作痛夜則痛甚行於陰也治法以辛熱之劑流散寒濕開發腠理其血得行與氣相和其病自安然亦有數種治法稍異治法見醫案中或曰比見鄰人用草藥研酒飲數貼亦有安者如子經久取效無乃太迂緩乎曰此劫病草藥石上采石緜爲之君過山龍等佐之皆性熱而燥者不能養陰却能燥濕病之淺者濕痰得燥則開熱血得熱則行亦取效彼病深血少者愈劫愈虛愈深也

臂痛有六道經絡以行本經藥行其氣血者以兩手伸直其臂貼身垂下大指居前小指居後而定則臂臑之前廉痛者屬陽明經以升麻白芷乾葛行之後廉痛者屬太陽經以葉本羌活行之外廉痛者屬少陽以柴胡行之內廉痛者屬厥陰以柴胡青皮行之內前廉痛者屬太陰以升麻白芷葱白行之內後廉痛者屬少陰以細辛獨活行之仍視何經而用針灸朱震亨心法

痛風

痛風者四肢百節走痛方書謂之白虎歷節風證是也大率有痰風熱風濕血虛因於風者小續命湯因於濕者蒼术白术之類佐以竹瀝因於痰者二陳湯加酒炒黃芩羌活蒼术因於血虛者用芎歸之類佐以紅花桃仁大法之方蒼术川芎白芷南星當歸酒黃芩在上者加羌活威靈仙桂枝在下者加牛膝防己木通黃蘗若血虛宜多用川芎當歸佐以桃仁紅花薄桂威靈仙凡治痛風取薄桂味淡者獨此能橫行手臂領南星蒼术等藥至痛處

遍身骨節疼痛晝靜夜劇如虎囓之狀名曰白虎歷節風並宜加減地仙丹或青龍丸乳香丸等服之又有痛風而痛有常處其痛處赤腫灼熱或渾身壯熱此欲成風毒宜敗毒散

凡治臂痛以二陳湯加酒炒黃芩蒼术羌活如肢節痛須用羌活去風濕亦宜用之如肥人肢節痛多是風濕與痰飲流注經絡而痛宜南星半夏如瘦人肢節痛是血虛宜四物加防風羌活如瘦人性急燥而肢節痛發熱宜四物湯加黃芩酒炒黃檗如肢節腫痛脈滑者當燥濕宜蒼术南星彙行氣藥木香枳殼檳榔在下者加防己若肢節腫痛脈澀數者此是瘀血宜桃仁紅花當歸川芎及大黃微利之如倦怠無力而肢節痛此是氣虛有痰飲流注宜參术星半有濕鬱而周身走痛或關節間痛遇陰寒即發當作濕鬱治或用白术一味酒煎服之其痛立愈

手足麻者屬氣虛手足木者有濕痰死血十指麻木是胃中有濕痰死血

明虞摶醫學正傳

痹

丹溪曰因濕痰鬱血流注爲病以其在下焦道路遠非烏附氣壯不能行故用爲引經若以爲主治非惟無益而有殺人之毒此病必行氣流濕舒風導滯血補新血降陽升陰治有先後須分腫與不腫可也不可食肉肉屬陽大能助火素有火氣盛者小水不能制若食肉厚味下有遺溺上有痞悶須將魚腥麪醬酒酢皆斷去之先以二陳湯加酒浸白芍藥少佐以黃連降心火看作何應又爲區處也

內經曰風寒濕三氣合而爲痹故寒氣勝者爲痛痹濕氣勝者爲著痹河間曰流著不去四肢痲木拘攣也經又曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者病久入深榮衛之行澀經絡時疎故不痛皮膚不榮故爲不仁夫所謂不仁者或周身或四肢頓頓然痲木不知痛痒如纏紮縛初解之狀古方名爲痲痹者是也丹溪曰痲是氣虛木是濕痰死血然則曰痲曰木者以不仁中而分爲二也雖然亦有氣血俱虛但痲而不木者亦有虛而感濕痲木兼作者又有因虛而風寒濕三氣乘之故周身拳痛痲木併作者古方謂之周痹治法宜先汗而後補也

戴思恭證治要訣

痛痹

傷濕兼風寒者汗出身重惡風喘滿骨節煩疼狀如歷節風腫下連脚冷痹不能屈伸所謂風寒濕合而成痹宜防己黃芪湯五痹湯詳五痹用藥於風濕最宜若因浴未解裙衫身上未乾忽爾熟睡致濕干腎經外腎腫痛腰背攣曲以五苓散一貼入眞坯少許下青木香丸三服臟腑纔通腫消腰直其痛自止

筋骨疼者俗呼爲痛風或痛而游走無定俗呼爲走注風並宜烏藥順氣散和煎復元通氣散嚥地仙丹或青龍丸未效用大防風湯或五積散調乳香末

徧身骨節疼痛晝靜夜劇如虎之嚙名曰白虎歷節風並宜加減地仙丹或青龍丸乳香丸等

有於窻牖間梳洗卒然如中風呼爲簷風五積散加防風一錢有痛風而痛有常處其痛處赤腫灼熱或渾身壯熱此欲成風毒宜敗毒散

樓英醫學綱目

白虎飛尸歷節辨

有附骨疽與白虎飛尸歷節皆相類歷節痛則走注不定白虎飛尸痛淺按之則便止附骨疽痛深按之亦無益又一說白虎飛尸亦能作膿著骨而生及其腐潰碎骨出盡方愈如是則附骨與白虎飛尸同是一病但淺深不同耳

痹分陰陽

病在陽者命曰風東垣云此病在陽因十二經各受風邪以高言之氣分也故身半以上風之中也用鍼當引而去之也又曰散而去之用藥以辛溫發散通因通用又熱因熱用是也

陰陽俱病命曰風痹尺膚濇者風痹也靈樞云風痹淫濼病不可已足如履冰時如入湯中股脛淫濼而煩心頭痛此傷腎也時嘔時悗眩已汗出此傷心也久則目眩此傷肝也悲以善恐短氣不樂此傷肺也不出三年死也

病在陰者命曰痹東垣云身半已下濕之中也命曰痹飲食自倍腸胃乃傷得之勞倦脾胃氣虛而下陷運氣營氣不得升浮經營心肺也

李梴醫學入門

痛風

形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其循歷遍身曰歷節風甚如虎咬曰白虎風痛必夜甚者血行於陰也

痛多痰火腫多風濕然痰火雖內因七情六慾或病後亡津血熱已自沸騰亦必略感外邪而後發動骨節痛極久則手足踡攣風濕雖外因涉冷坐濕當風取涼然亦必血熱而後凝滯汚濁所以作痛甚則身體塊瘰痰火風濕全者古龍虎丹主之

傷寒通身節痛乃風寒入肌骨雜病週身痛乃風痰壅滯二陳湯加南星羌活蒼朮白芷酒芩竹瀝薑汁挾瘀血者再加桃仁紅花濕痰瘀血週身兩脅走痛控涎丹加桃仁泥爲丸或小胃丹下之如半身不遂及左右手足踡攣者烏頭湯微汗之虛者地仙丹

上體痛者宜祛風熱豁痰二陳湯主之痰熱客太陽頸項强動則微痛者加酒芩羌活紅花濕痰鑽注肢節痛者加二朮威靈仙乾薑黃蘗羌活白芍結陽肢腫者倍加黃芩濕痰橫行手臂痛加南星蒼朮酒芩香附威靈仙臂重難舉者加二朮羌活桂枝威靈仙黃芩臂軟難舉者加南星枳實木香薑黃如臂痛不能舉或連指掌腫痛者舒經湯肩忽痛者小柴胡湯去半夏加防風當歸生地大黃黃連滑石肩背痛因食積者單龜板爲丸薑湯下肩腿痛者用龜板一兩側柏葉香附各五錢白芥子凌霄花各一錢五分爲末酒糊丸四物湯加甘草陳皮煎湯下背心常一片冰冷者導痰湯合蘇子降氣湯

下體痛者宜流濕行氣四物湯主之陰虛臀尖痛者膀胱有火加知母黃蘗及桂少許有痰合二陳湯加澤瀉前胡木香爲引痛甚加乳香沒藥熱者合大承氣湯下之兩腿痛者加牛膝陳皮吞加味三妙丸兩腿痛甚素虛性急或痢後血流經絡作痛者加桃仁牛膝陳皮甘草薑汁煎熟調潛行散如兩腿間忽一二點痛入骨不可忍者用芫花根爲末酢調敷痛處以帕緊紮產後有此疾者亦宜兩足痛當歸拈痛湯

凡痛風丸散佐使在上加羌活威靈仙在下加牛膝防己木通黃蘗在手臂加桂枝引至痛處如遍身痛者則問所起處加之

痛風百節痠痛無定處久則變成風毒痛入骨髓不移其處虎骨散麝香丸如赤腫灼熱者敗毒散肢節腫痛挾濕熱者麻黃赤芍湯主之

外因濕證腫滿身痛如脫者除濕湯寒濕者附子六物湯捉虎丸濕熱者五苓散加蒼朮防風羌活白芷黃蘗竹瀝薑汁走注者四妙散肢節腫脈滑者加南星木香檳榔蒼朮黃蘗防己

濕氣背傴僂足攣成廢者用甘遂一錢爲末入猪腰內煨食之上吐下瀉

風證黃汗出面微紅掣痛熱者防風通聖散或小續命湯去附子加羌活黃芩虛者烏藥順氣散獨活寄生湯上體金棗丹下體換腿丸

風中肩背太陽氣鬱不可回顧或肺氣鬱熱小便數而欠伸宜通氣防風湯羌活勝濕湯

風濕相搏痛者甜瓜子丸神仙飛步丹龍虎丹活絡

丹乳香黑虎丹活血應痛丸
風濕痛生痺者單蒼耳加羌活防風十分之二爲末蜜丸如梧子大每百丸酒下或單獨蒼丸一斤加四物湯料各五錢防風羌活各三錢川烏一錢五分爲末蜜丸空心茶酒任下
風寒濕熱成痿腎脾腰脚骨熱腫痛行步艱難者二妙蒼藥散等分加虎脛骨減半爲末水調服
暑濕相搏面赤尿赤者五苓散合敗毒散加當歸赤芍或復元通聖散
結陽肢腫熱毒流注大便閉者犀角湯
寒證肢節攣痛小筋急痹五積散合順元散加麝一錢鶴膝痛五積散加松節杉節骨髓痛虎骨散
內因七情肢節胃脘刺痛初必脫運自汗二陳湯加香附枳殼木香如腰背氣動發痛者枳甘散流氣飲子俱加葱白服後臥少時如思慮憂心痛從背起至胃脘者人參四分木通二分煎湯吞當歸龍膏丸
飲食積痛風初必胃滿嘔吐二陳湯加烏藥枳殼或單蒼耳丸因食厚味積痰脾胃脾櫃左右發痛一點延及膝骨腫大惡寒夜劇者潛行散爲主加甘草梢蒼术犀角川芎陳皮牛膝木通白芍入薑汁煎服病稍減去犀角加牛膝龜板歸身尾冬月加桂夏加黃芩又有遍身遊走痒痛狀如蟲囓遇痒而進飲食則蟲亦隨飲其間庶不致頻頻囓也宜麝香丸
留飲四肢歷節氣短脈沉久則令人骨節蹉跌恐爲顛痫宜導痰湯加減痰飲者古半硫丸氣短倦怠者六君子湯加南星
酒濕痛者用黃蓍威靈仙各五分蒼朮二錢陳皮芍藥各一錢甘草三分羌活二分水煎服
血虛四物湯加龜板秦艽有火者調潛行散有瘀血者加大黃桃仁紅花徹利之性急發熱者加酒炒黃蘗肢節腫痛脈濇者加桃仁歷年不愈者倍加木通出汗或發紅丹即愈若不愈者痛風丸二妙蒼蘗散三妙丸
虛氣歷節痛如錘鍛者四君子湯加桂附白芍
血氣俱虛挾痰火者八物湯加羌活防風黃蘗龜板
勞傷者趁痛散血風丸加勞散陰虛虎潛丸補陰丸
痛風因是風熱風濕得者初起與傷寒相似宜分表裏治之表證九味羌活湯氣虛表實骨節痛者六一散加香附黃芩水煎或薑汁糊丸散
裏證五積交加散加大黃痰濕熱者導水丸病愈後大便閉稍虛者麻子仁丸緊痛不可忍者用楓斛生焙乾浸酒常服微醉通用史國公浸酒方萬應膏
腦內因者宜清瘀血養新血兼理痰火則血活氣和痛無不止又不愈者間用升降之劑或專養血補脾如久病及亡血虛後病此者俱不宜用風藥燥血

痹證

痹者氣閉塞不通流也或痛痒或麻痹或手足緩弱與痿相類但痿屬內因血虛火盛肺焦而成痹屬風寒濕三氣侵入而成然外邪非氣血虛則不入此所以痹久亦能成痿又痹爲中風之一但純乎中風則陽受之痹兼風寒濕三氣則陰受之所以爲病更重
觀宋明醫錢仲陽自患周痹偏廢不能全愈可見
經言春爲筋痹夏爲脈痹仲夏爲肌肉痹秋爲皮痹冬爲骨痹言皮脈肌筋骨各以時而受風寒濕之邪也大槩風濕多侵乎上肩背痲木手腕硬痛寒濕多侵乎下脚腿木重若上下俱得身如板夾脚如石墜須分風寒濕多少治之風多痛走不定寒多掣痛遇身拘急手足冷痹與痛風同濕多浮腫重著一處不移風多烏藥順氣散三痹湯越婢湯單獨蒼丸寒多五積散加天麻附子或獨痹湯寒濕五積交加散濕多川芎茯苓湯當歸拈痛湯防己黃芪湯羌活勝濕湯續斷丸冷痹身寒不熱腰脚沉冷即寒痹之甚者三痹湯合三五七散或舒經附子理中湯熱痹或濕生熱或風寒鬱熱身上如鼠走骨口反縱肌肉變色宣明升麻湯風寒濕熱痹二妙蒼藥散等分加虎脛骨防風減半水煎服
風寒濕三邪交侵在皮則頑不自覺遇寒則急遇熱則緩應乎肺其證氣喘煩滿在脈則血滯六脈濇而緊面無色應乎心其證心煩上氣嗌乾善噫在肌肉則四肢不仁應乎脾其證怠惰嘔吐在筋則屈而不伸應乎肝其證夜臥多驚溺濇小腹痛在骨則重不能舉尻以代踵脊以代頭應乎腎其證心腹脹滿初入皮膚血脈邪輕易治留連筋骨久而不痛不仁者難治久久不愈五痹復感三邪漸入五臟臥不起牀瀉多食少亦如中風入臟者死
初起強硬作痛者宜疎風豁痰沉重者宜流濕行氣久病須分氣血虛實痰瘀多少治之氣虛痹者關節不充一身如從水中出陽虛陰盛也四君子湯加肉桂生附或川附丸血虛痹者皮膚不仁濟生防風湯或黃芪建中湯去飴加桂枝挾瘀血者四物湯加桃仁紅花竹瀝薑汁挾痰者手足痲痹多睡脘運濟生

茯苓湯或二陳湯加竹瀝薑汁腎脂枯涸不行髓少筋弱凍慄攣急者十全大補湯地仙丹通用五痹擦痹法初病驟用參芪歸地則氣血滯而邪變經絡不散虛者烏頭粥行濕流氣散主之

痲屬氣虛木屬痰凝此槩言耳有因虛而風寒濕三氣乘之痲木併作者有氣血俱虛但痲不木者蓋痲猶痹也雖不知痛痒尚覺氣微流行在手多兼風濕在足多兼寒濕木則非惟不知痛痒氣亦不覺流行常木爲血碍氣間木爲濕痰皆經絡凝滯血脈不貫謂之不仁或兼虛火則肌肉瞤動不可誤作風治

週身掣痛痲者謂之週痹乃肝氣不行也宜先汗後補黃芪湯開目痲木漸退閉目甚者升陽和中湯皮膚痲木者補氣湯手足痲氣虛者補中益氣湯去當歸陳皮加五味子白芍生甘草虛甚挾風者補中益氣湯正料加烏藥附子羌活天麻十指痲木胃有濕痰死血者二陳湯加二朮紅花桃仁少加附子以行經左手脚腿偏痲疼痛右口角併眼牽引側視者表有風也宜天麻黃芪湯兩腿痲者導氣湯兩脚痲木如火熱者三妙丸

凡味酸傷筋則緩味鹹傷骨則痿令人發熱變爲痛痹痲木等證慎疾者須戒魚腥麪醬酒酢肉房陽助火但可量喫若厚味過多下必遺滴上必痞悶先用二陳湯加芍藥黃連降火然後用本證藥

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百四十七卷目錄
醫部彙考二百二十七
痹門二
張三錫醫學準繩六要 痛風 著痹
李中梓醫宗必讀 諸痹
瑜昌醫門法律 痛風 風痹 腎著 即痹 律
張介賓景岳全書 論痹證 治法 歷節風痛
方一 附子八物湯 桂枝芍藥知母湯 導水
九 通經散 潛行散 蒼木復煎散
越婢湯 三妙丸 天麻薏苡湯 羌活冲和補
麻蒸熨法 按摩法 茯苓湯 冲和補
氣湯 活血應痛丸 神效黃芪湯 行濕流氣散 換腿丸
磨香丸 四君子湯 二陳湯 補中益氣湯 散牛
勞子散 十全大補湯 當歸拈痛湯 犀角湯 防風
芋丸 趙痛散 小續命湯 史國公浸酒方
加味二妙丸 三五七散 起死神應丹
愈風丹 經驗丸 藤酒
烏藥丸 芍藥補氣湯 木瓜虎骨丸 茶忘
湯 獨活寄生湯 桂枝附子湯 甘草附子
風濕方 黃芪湯 補氣升陽和中湯
白蘇散 血痹大易方 諸風方 附子酒
除風濕羌活湯 附子湯 附風湯 茯苓湯
丸 茯苓川芎湯 大豆煎散 腎著湯 木香
升麻湯 芍參丸 附子丸 前胡散
補氣湯 夏荊實家實丹 如神救苦散
又方 華蓋丸 臂痛方 八珍丸 四妙
散 加味四物湯 防風天麻散 乳香丸
手痹方 骨筋立安散 透骨青 八風丸 九州
湯 除濕獨痛湯 海桐皮散 攝風酒

明張三錫醫學準繩六要

痛風

痛風即內經痛痹上古多外感故云三氣合而爲痹今人多內傷氣血虧損濕痰陰火流滯經絡或在四肢或客腰背痛不可當一名白虎歷節風是也大抵濕多則腫熱多則痛陰虛則脈弦數而重在夜氣虛則脈虛大而重在日

著痹

四肢肌肉不爲我用似偏枯而多痛著與痛風相類者痹也分虛實標本治

俞子木曰痹者閉也五臟六腑正氣爲邪氣所閉則痹而不仁靈樞經曰病人一臂不遂時復移於一臂者痹也非風也要略曰風病半身不遂若但閉不遂者痹也經曰風寒濕三氣合而爲痹風多則行寒多則痛濕多則著故痹多重痛沉著

李中梓醫宗必讀

諸痹

筋痹即風痹也游行不定上下左右隨其虛邪與血氣相搏聚於關節或赤或腫筋脈弛縱古稱走注今名流火防風湯主之如意通聖散桂心散沒藥散虎骨丸十生丹一粒金丹乳香應痛丸

肌痹即著痹濕痹也留而不移汗多四肢緩弱皮膚不仁猜神昏塞今名痲木神效黃芪湯主之

醫門法律 匠嶠昌著

痛風

痛風一名白虎歷節風實即痛痹也經既言以寒氣勝者爲痛痹矣又言凡傷於寒者皆爲熱病則用藥自有一定之權衡觀金匱用附子烏頭必用於表散藥中合桂枝麻黃等藥同用即發表不遠熱之義至攻裏必遵內經不遠於寒可知矣諸家方中不達此義即攻裏渠不遠熱獨千金犀角湯一方深有合於經意特表之爲例

更有內熱因血虛熾盛始先表散藥中不能用辛熱者即當取夏月治溫熱病之表法爲例諸家復無其方獨本事方中有牛蒡子散先得我心亦并表出

風痹

中風四證其一曰風痹以諸痹類風狀故名之然雖相類實有不同風則陽先受之痹則陰先受之耳致痹之因乃風寒濕互相雜合匪可分屬但以風氣勝者爲行痹風性善行故也以寒氣勝者爲痛痹寒主收急故也以濕氣勝者爲著痹濕主重滯故也

邪之所中五淺五深不可不察在骨則重而不舉在經則屈而不伸在肉則不仁在脈則血凝而不流在皮則寒此五者在軀殼之間皆不痛也其痛者隨血脈上下寒凝汁沫排分肉而痛雖另名周痹亦隸於血脈之中也骨痹不已復感於邪內舍於腎筋痹不已復感於邪內舍於肝脈痹不已復感於邪內舍於心肌痹不已復感於邪內舍於脾皮痹不已復感於邪內舍於肺此五者亦非徑入五臟也五臟各有合病久而不去內舍於其合也蓋風寒濕三氣雜合率制非若風之善行易入故但類於中風也

經論諸痹至詳然有大闕且無方治金匱補之一曰血痹二曰胷痹三曰腎著四曰三焦痹

金匱論血痹謂尊榮人骨弱肌膚盛重因疲勞汗出臥不時動搖加被微風遂得之但以脈自微濇在寸口關上小緊宜鍼引陽氣令脈和緊去則愈血痹陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證身體不仁如風痹狀黃芪桂枝五物湯主之經但言在脈則血凝而不流金匱直發其所以不流之故言血既痹脈自微濇然或寸或關或尺其脈見小緊之處即風入處也故其鍼藥所施皆引風外出之法也

金匱論胷痹脈證并方治繹明入胷寒痹痛條下此不贅

金匱論腎著之病其人身體重腰中冷如坐水中形如水狀反不渴小便自利飲食如故病屬下焦身勞汗出衣裏冷濕久久得之腰以下冷痛腹重如帶五千錢甘薑苓朮湯主之經但言骨痹不已復感於邪內舍於腎仲景知濕邪不能傷腎臟之眞不過舍於所合故以身重腰冷等證爲言曰飲食如故曰病屬下焦意可知矣然濕土之邪賊傷寒水恐害兩腎所主生氣之原關係尤大故特舉腎著一證立方以開其痹著

金匱復有總治三痹之法今誤編歷節黃汗之下其曰諸肢節疼痛身體魁瘰（一作尪麤）脚腫如脫頭眩短氣遇濕（一作溫溫）欲吐桂枝芍藥知母湯主之是也蓋短氣中焦胷痹之候也屬連頭眩即爲上焦痹矣遇濕欲吐中焦痹也脚腫如脫下焦痹也肢節疼痛身體魁瘰筋骨痹也榮衛筋骨三焦俱病又立此法以治之合四法以觀精微之蘊仲景眞百世之師矣

腎著即痹

內經云濕勝爲著痹金匱獨以屬之腎名曰腎著云此證乃濕陰中腎之外廓與腎之中臟無預者也地濕之邪著寒臟外廓則陰氣凝聚故腰中冷如坐水中實非腎臟之精氣冷也若精氣冷則膀胱引之從夾脊逆於中上二焦榮衛上下之病不可勝言今邪止著下焦飲食如故不渴小便自利且與腸胃之腑無與況腎臟乎此不過身勞汗出衣裏冷濕久久得之但用甘草乾薑茯苓白朮甘溫從陽淡滲行濕足矣又何取煖胃壯陽爲哉

律一條

凡治痹證不明其理以風門諸通套藥施之者醫之罪也

痹證非不有風然風入在陰分與寒濕互結擾亂其血脈致身中之陽不通於陰故致痹也古方多有用麻黃白芷者以麻黃能通陽氣白芷能行榮衛然已入在四君四物等藥之內非顓發表明矣至於攻裏之法則從無有用之者以攻裏之藥皆屬苦寒用之則陽愈不通其痹轉入諸腑而成死證者多矣可無明辨而深戒歟

景岳全書　臣張介賓著

論痹證

風痹一證即今人所謂痛風也蓋痹者閉也以血氣爲邪所閉不得通行而病也如痹論曰風氣勝者爲行痹蓋風者善行數變故其爲痹則走注歷節無有定所是爲行痹此陽邪也曰寒氣勝者爲痛痹以血氣受寒則凝而留聚聚則爲痛是爲痛痹此陰邪也曰濕氣勝者爲著痹以血氣受濕則濡滯濡滯則肢體沉重而疼痛頑木留著不移是爲著痹亦陰邪也凡此三者即痹之大則也此外如五臟六腑之痹則雖以飲食居處皆能致之然必重感於邪而內連臟氣則合而爲痹矣若欲辨其輕重則在皮膚者輕在筋骨者甚在臟腑者更甚若欲辨其寒熱則多熱者方是陽證無熱者便是陰證然痹本陰邪故爲寒者多而熱者少此則不可不察

觀痹論曰風寒濕三氣雜至合而爲痹而壽夭剛柔篇又曰在陽者命曰風在陰者命曰痹何也蓋三氣之合乃專言痹證之所因也曰在陽爲風在陰爲痹又分言表裏之有殊也如風之與痹本皆由感邪所致但外有表證之見而見發熱頭疼等證或得汗即解者是皆有形之謂此以陽邪在陽分是即傷寒中風之屬也故病在陽者命曰風若既受寒邪而初無發熱頭疼又無變證或有汗或無汗而筋骨之痛如故及延綿久不能愈而外無表證之見者是皆無形之謂此以陰邪直走陰分即諸痹之屬也故病在陰者命曰痹其或既有表證而疼痛又不能愈此即半表半裏陰陽俱病之證故陰陽俱病者命曰風痹此所以風病在陽而痹病在陰也然則諸痹者皆在陰分亦總由眞陰衰弱精血虧損故三氣得以乘之而爲此諸證經曰邪入於陰則痹正謂此也是以治痹之法最宜峻補眞陰使血氣流行則寒邪隨去若過用風濕痰滯等藥而再傷陰氣必反增其病矣

治法

痹因外邪病本在經而深則連臟故其在上則有喘嘔有吐食在中則爲脹滿爲疼痛在下則爲飧泄爲祕結諸病此皆風痹之兼證也凡見此者當於各門權其緩急先後而隨證治之

痹證之風勝者治當從散宜敗毒散烏藥順氣散之類主之若以風勝而兼微火者宜大秦艽湯或九味羌活湯之類主之

痹證之寒勝者但察其表裏俱無熱證卽當從溫治之宜五積散或小續命湯甘草附子湯之類主之若寒甚氣盛者宜三因附子湯之類主之

痹證之濕勝者其體必重或多寒或多痰或多汗皆屬弱陰寒證也若羌活勝濕湯乃驅風散濕之劑五積散乃溫經散濕之劑眞武湯乃溫中除濕之劑三因附子湯乃補脾燥濕之劑調氣平胃散乃行氣行濕之劑五苓散乃利水導濕之劑二陳湯六君子湯乃化痰去濕之劑也大抵治濕者欲其燥欲燥者宜從覆盖脾土喜燥而惡濕喜煖而惡寒故溫脾卽所以治濕也然又有濕熱之爲病者必見內熱之證滑數之脈方可治以清凉宜二妙散及加味二妙丸當歸拈痛湯之類主之其有熱甚者如抽薪飲之類亦可暫用先清其火而後調其氣血

風痹之證大抵因虛者多因寒者多惟血氣不充故風寒得以入之惟陰邪留滯故經脈爲之不利此痛痹之大端也惟三氣飲及大防風湯之類方能奏效凡治痹之法惟此爲最其有宜酒者卽以三氣飲浸酒服之亦妙法見本方或用易老天麻丸亦可

歷節風痛

歷節風痛以其痛無定所卽行痹之屬也病源云歷節風痛是氣血本虛或因飲酒腠理開汗出當風所致或因勞倦調護不謹以致三氣之邪徧歷關節與氣血相搏而疼痛非常或如虎之咬故又有白虎歷節之名中藏經曰歷節疼痛者因醉犯房而得之此其候也大都痛痹之證多有晝輕而夜重者正陰邪之在陰分也其有遇風雨陰晦而甚者此正陰邪侮陽之證也或得煖遇熱而甚者此濕熱傷陰之火證也有火者宜從清凉有寒者宜從溫熱若筋脈拘滯伸縮不利者此血虛血燥證也非養血養氣不可凡諸治法總宜如前

凡諸痹作痛者俱宜用火龍膏貼之

方一

附子八物湯（醫學擇要）

治歷節風四肢疼痛如鎚鍛不可忍

附子炮去皮臍　乾薑炮　芍藥　茯苓　牛夏

桂心　人參各三兩　白朮四兩

右剉散每服四錢水二盞煎至七分去查食前服

桂枝芍藥知母湯（仲景）

治痛痹

桂枝　知母　防風各四兩　芍藥二兩　甘草

附子炮　麻黃各二兩　白朮　生薑各五兩

右水七升煮取二升溫服七合日三服

導水丸（子和下同）

治濕痹

滑石水飛　黑牽牛另取頭末各四兩　大黃

黃芩各二兩

右爲細末滴水丸梧桐子大每服五十丸或加至百丸臨臥溫水下

通經散

治濕痹

陳皮去白　當歸各一兩　甘遂麪包不令透水煮百餘滾取出用冷水浸過去麪焙乾

右爲細末每服三錢溫湯調下臨臥服

滑行散（丹溪）

治痛風

黃蘗不拘多少酒浸焙乾爲末

生薑汁和酒調服必兼四物等湯相間服妙

蒼朮復煎散（東垣）

治痛痹

蒼朮四兩水二椀煎至三大盞去查入下藥

羌活一錢　黃蘗三分　升麻　柴胡　藥本

澤瀉　白朮各五分　紅花少許

右爲粗末用蒼朮湯二盞煎至一盞去滓空心溫服微汗爲效忌酒麪

越婢湯（仲景）

治風痹脚弱

附子一錢五分　麻黃二錢　甘草一錢二分

石膏二錢　白朮三兩
右薑棗煎服
三妙丸
治三陰血虛足心如火熱漸烘腰膀及溫熱麻痹疼痛瘡軟等證皆效
蒼朮六兩　黃檗四兩　牛膝二兩
右爲末酒糊爲丸如梧桐子大每服七十九至一百丸空心薑湯或鹽湯送下
天麻黃芪湯
治手足痲木兼有風證
天麻　白芍藥　神麯　羌活　白茯苓各三分
人參　黃連各四分　當歸五分　黃芪　甘草
升麻　乾葛　黃檗　蒼朮各六分　澤瀉七分
柴胡九分
右水煎溫服
蜚蠊散丸
治中風口眼喎斜時吐痰涎語言蹇滯四肢緩弱骨節疼痛腰膝無力及諸風痹
稀薟端午七夕重陽收洗去土摘葉曬乾鋪甑中用好酒和蜜層層勻灑蒸之復曬如此九次
右爲末煉蜜丸梧子大每四十九空心酒下
蓖麻蒸痹法千金方
治風濕癱瘓手足不仁半身不遂周身痲木痠疼口眼歪斜皆效
蓖麻秋冬用葉春夏用子一二十斤
右入甑內蒸半熟取起先將綿布數尺雙摺浸入蒸湯內取出乘熱敷患處將前蒸熱葉鋪布上一層候溫再換熱葉一層如此換蒸以汗出爲度重者蒸五次輕者蒸三次即愈內服疏風活血之劑
擦痹法
治風溫諸痹
麝香一錢搗爛於磁器內勿泄氣　蓖麻子二兩去油　活地龍七條去土搗爛　甘草　甘遂各一兩俱爲末
臨用先將薑葱各一兩搗爛包患處次用薑汁化此藥一雞子黃大擦半時久一日三次二三年者皆效婦人尤神
茯苓湯濟生方
治停蓄支飲及筋痹脈痹
半夏湯泡　茯苓皮各一錢　甘草　桔梗枳實各五分
薑煎溫服
沖和補氣湯醫學正傳
治合眼則痲木開則不痲四肢無力痿厥酢心目昏頭眩神效
羌活七分　獨活　川歸　黃檗各三分　柴胡
神麯　木香　草豆蔻各二分　人參　蒼朮
白朮　芍藥　澤瀉　陳皮　猪苓各一錢
甘草　升麻各五分　黃芪製二錢　黃連
痲黃不去節各二分
右切分作二服每服用水一盞半煎至一盞溫服
活血應痛丸寶鑑
治痛痹
狗脊去毛六兩　香附炒十二兩　陳皮九兩　沒藥一兩二錢　草烏炮二兩半　威靈仙三兩
蒼朮米泔浸一宿十兩
右爲細末酒煮麪糊爲丸如桐子大每服十五九溫酒或熱湯送下不拘時候常服和血脈壯筋骨使氣脈宣通忌桃李雀鴿諸血物
行濕流氣散
治風寒濕痹身如板夾痲木不仁或手足痠軟
蒼朮　羌活　防風　川烏各一兩　薏苡二兩
白茯苓一兩五錢
右爲末每服二錢溫酒或葱湯下
換腿丸
治足三陰經爲風寒暑濕所乘發爲攣痹緩弱上攻胃背下注腰腿足心發熱行步艱難
木瓜四兩　薏苡仁　南星　石楠葉　石斛
檳榔　草薢　牛膝　羌活　防風　黃芪
當歸　天麻　續斷各一兩
右爲末酒糊丸梧子大每五十丸溫酒鹽湯下
麝香丸醫學綱目
治白虎歷節諸風疼痛遊走無定狀如蟲嚙晝靜夜劇及一切手足疼痛
川烏三枚　地龍五條　全蝎　黑豆二十一箇
右俱生爲細末入麝香半字研勻糯米糊爲丸如葉豆大每服七九甚者十九夜臥令腳空溫酒下微出冷汗一身便痊寸得此方凡是歷節及不測痰痛一二服便瘥
神效黃芪湯醫學正傳
治渾身痲木不仁或頭面手足跗背腿脚痲木並

皆治之及兩目羞明畏日隱澁難開視物昏花睛痛亦皆治之

蔓荊子二分　陳皮五分　人參八分　炙甘草白芍藥各一錢　黃芪二錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去柤臨臥熱服如痲木不仁雖有熱不加黃蘗只加黃芪一錢木通三錢

如痲木甚者加芍藥一錢木通二錢

如小便淋澁加澤瀉五分一服去則止

如有大熱證加酒洗黃蘗三分

二妙蒼蘗散

治一切風寒濕熱腳氣骨間作熱四肢痛令人痿躄用之神效

蒼术鹽炒　黃蘗酒炙各五錢

水煎服二物皆有雄壯之氣如氣實加酒少許氣虛加補氣藥血虛加補血藥痛甚加薑汁或爲末爲丸服尤妙

牛蒡子散本事方

治前證

牛蒡子　豆豉炒　羌活各三兩　生地二兩半　黃芪一兩半

右爲細末湯調二錢空心食前日三服

四君子湯

治氣虛痲痹

人參一錢　白术　茯苓各二錢　甘草六分　生薑三片　棗子二枚

右水煎不拘時溫服加半夏陳皮名六君子湯

二陳湯

治痰痹痲木

陳皮二錢　半夏一錢　茯苓八分　甘草四分

右加生薑三片水煎溫服

補中益氣湯

治濕熱鬱於脾土不能榮於四肢致痹痛痲木

黃芪　人參　甘草各一錢　當歸　白术　陳皮　柴胡　升麻各五分虛甚者升柴各一分汗多者全去

右水煎巳午未時溫服傷之重者連進二服如得微汗卽愈忌多言勞役靜養一二時辰久方進美膳以助之常服去升麻加黃蘗三分以滋腎水紅花二分入心養血多用則破血

十全大補湯

治元陽大虛不能榮於四肢故作痲木或疼痛

人參　白术　茯苓　甘草　當歸　川芎　熟地　芍藥　肉桂　黃芪各二分半

右薑棗煎服

當歸拈痛湯

治濕熱爲病肢節煩疼肩背沉重胃腸不利徧身疼痛足脛腫痛等證

白术一分五釐　當歸　防風　猪苓　澤瀉　茯苓　知母各三分　羌活　茵陳　甘草　黃芩各五分　升麻　乾葛　苦參　人參　蒼术各二分

水煎溫服

犀角湯千金方

治熱毒流入四肢歷節腫痛

犀角　鹿羊角　前胡　黃芩　梔子仁　射干　大黃　升麻各四兩　豉一升

右咬咀每服五錢水二盞煎服

茵芋丸本事方

治歷節腫滿疼痛

茵芋　硃砂　慈菇　牽牛一兩半　椰李仁半兩

右爲細末煉蜜杵丸如桐子大輕粉滾爲衣每服十九至十五丸五更溫水下到晚未利可二三服快利爲度白粥將息

趁痛散

治痛痹

乳香　沒藥　桃仁　紅花　當歸　羌活　地龍酒炒　牛膝　甘草生　五靈脂酒炒　香附童便浸

右爲末每服二錢酒調或加酒炒苯藥

小續命湯千金方

通治八風五痹瘧厥等疾以一歲爲總六經爲別

春夏加石膏知母黃芩秋冬加官桂附子芍藥又於六經別藥內隨證細分加減

麻黃去節　人參　黃芩　甘草炙　芍藥　川芎　杏仁去皮尖炒　防風　官桂各一兩　附子炮去皮臍半兩

右除附子杏仁外爲粗末後入二味和勻每服五錢水一盞半生薑五片煎一盞去滓稍熱服食前

史國公浸酒方

治左癱右瘓四肢頑痲骨節疼痛諸般寒濕風氣

虎脛骨酒浸一日焙乾酥炙　當歸　鼈甲炙
羌活　防風　萆薢　秦艽　牛膝　晚蠶沙
松節各二兩　乾茄根八兩蒸熟　枸杞子五兩
用無灰酒一斗絹袋盛藥入酒內封十日取飲時
不可面向罐口恐藥氣冲人頭面飲酒不可間斷
飲盡藥滓曬乾爲末米糊丸梧子大空心酒下五
十丸忌食發風動氣之物

加味二妙丸

治兩足濕痹疼痛或如火燎從足跗熱起漸至腰
胯或痲痹痿軟皆是濕爲病此藥主之
蒼朮四兩米泔浸　黃蘗二兩酒浸日乾　牛膝
當歸尾酒洗　萆薢　防己　龜板酒炙各一兩
右爲細末酒煮麪糊爲丸如梧桐子大每服一百
丸空心薑湯或鹽湯下

三五七散 濟生方

治風寒濕痹脚氣緩弱等疾
天雄炮去皮　細辛洗去土各三兩　乾薑炮
山茱萸去核各五兩　防風　山藥炒各七兩
右爲細末每服二錢食前溫酒調下

起死神應丹 子和下同

治癱瘓四肢不舉風痹等疾
麻黃去根節河水五升熬去滓可成膏子五斤
白芷　桑白皮　蒼朮　甘松　浮萍各二兩
川芎三兩　苦參三兩五錢
以上各爲細末用膏子和丸如彈子大每服一丸
溫酒一盞化下臨臥服之微汗出勿慮如未安隔
二三日再服手足即時軟快

愈風丹

治痹
甘草三錢　芍藥　川芎　白殭蠶炒　桔梗
細辛　羌活各五錢　白芷　麻黃去節　防風
天麻　全蠍炙各一兩　南星生薑製用五錢
硃砂爲衣五錢
右爲末蜜丸彈子大每服一丸細嚼茶酒吞下

經驗九藤酒

治遠年痛風及中風左癱右瘓筋脈拘急日夜作
痛叫呼不已等證其功甚速
鉤藤鉤　紅藤即理肖藤　丁公藤即風藤　桑絡藤
菟絲藤即無根藤　青藤　天仙藤即青木香　陰地蕨根各
四兩即地茶　五味子藤即紅內消　忍冬藤各二兩
右細切以無灰老酒一大斗用磁罐一箇盛酒其
藥用眞綿包裹放酒中浸之密封罐口不可泄氣
春秋七日冬十日夏五日每服一盞日三服病在
上食後及臥後服病在下空心食前服

木瓜虎骨丸 衛生寶鑑下同

治風寒濕合而成痹脚重不仁疼痛少力足下攣
痛不能踞地脚膝筋攣不能屈伸及項背拘急手
臂無力耳內蟬鳴頭眩目運諸證脚氣行步艱難
並皆服之
木瓜　血竭研　虎脛骨酒炙　沒藥研　乳香
自然銅酢淬各五錢　楓香脂　甜瓜子　木香
敗龜板酢炙去闌　骨碎補去毛　當歸焙　桂各
一兩　安息香重湯酒煮　地龍去土各二兩
右爲末入研藥和勻酒糊丸如桐子大每服三十
丸溫酒送下煎木瓜湯送下亦得漸加至五十丸
空心食前

蒼葱丸

治寒濕筋骨冷疼不能舉動
川烏去皮尖生　黑牽牛頭末　鹽豉各三錢
乳香研　沒藥研各一錢
右爲末入研藥勻用肥葱一握洗去土淡酢一升
不犯銅鐵文武火熬葱酢一半去柤慢火再熬成
膏滴水中不散爲度將前藥末和丸如桐子大每
服十丸加至二十丸溫酒送下大便微利則愈

烏靈丸

治久患風虛痲痛行步艱難
川烏炮去皮一兩　五靈脂二兩
右爲末酒糊丸如桐子大每服十丸加至五十丸
空心溫酒送下忌一切冷物

芍藥補氣湯 東垣

治著痹
黃芪一兩　白芍藥一兩半　陳皮留白一兩
澤瀉半兩　甘草一兩炙
右剉每服一兩用水二大盞煎至一盞去查溫服

黃芪桂枝五物湯 仲景

治著痹
黃芪　芍藥　桂枝各三錢　大棗十二枚
生薑六兩
水六升煮取二升溫服七合日三服一方有人參

獨活寄生湯 衛生寶鑑

治腎氣虛弱冷臥濕地腰背拘倦筋骨攣痛或當

風取凉風邪流入脚膝爲偏枯冷痹緩弱疼痛或腰痛牽引脚重行步艱辛

獨活　寄生　杜仲　牛膝　細辛　秦艽　桂心　茯苓　人參　甘草各一兩　當歸　熟地黃　芍藥各一兩

五錢

右㕮咀每服三錢水二盞生薑五片煎至一盞去滓稍熱服食前

桂枝附子湯（仲景下同）

治濕痹脈浮虛而濕者

桂枝去皮四兩　附子三枚炮去皮破八片　生薑切三兩　甘草炙二兩　大棗十二枚擘

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

甘草附子湯

治痹證風濕相搏骨節煩疼掣痛惡風不欲去衣

甘草炙　白朮各二兩　桂枝四兩　附子二枚炮去皮破八片

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服初服得微汗則解能食汗出復煩者服五合恐一升多者宜服六七合妙

風濕方（千金）

治風濕脈浮身重汗出惡風

甘草二兩　黃芪五兩　漢防己四兩　生薑白朮各三兩　大棗十二枚

右六味㕮咀以水六升煮取三升分三服服了坐被中欲解如蟲行皮中臥取汗

黃芪湯（千金方）

治血痹陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證身體不仁如風狀

黃芪　人參要略少芍藥　桂心各二兩　生薑六兩　大棗十二枚

右六味㕮咀以水六升煮取二升服七合日三服令盡

補氣升陽和中湯（東垣）

治氣虛著痹

黃芪五錢　人參　白芍藥各三錢　甘草炙　佛耳草各四錢　陳皮　白朮　當歸身各二錢　蒼朮　草豆蔻各一錢半　黃蘗酒洗　甘草根　升麻　白茯苓　澤瀉　柴胡各一錢

每服三錢水二大盞煎至一盞去查稍熱服早飯後午飯前服之

白蔻散（千金方下同）

治風痹腫筋急展轉易常處

白蔻五錢　附子六銖

右二味治下篩酒服半刀圭日三不知增至一刀圭身中熱行爲候十日便覺

血痹大易方

治風痹遊走無定處

蕲蘚　薯蕷　牛膝　澤瀉各二兩　地膚子　白朮各五錢　乾膝　蟾蜍　狗脊　車前子　天雄各十銖　茵芋六銖　山茱萸三十銖　乾地黃二兩五錢

右十四味爲末蜜和丸如梧桐子大酒下十丸日三後稍加

諸風方

治諸風痹

防風　甘草生　黃芩　桂心　當歸身　茯苓各一兩　秦艽　葛根各二兩　生薑五兩　大棗三十枚　杏仁五十枚

右十一味㕮咀以酒水各四升煮取三升分三服取汗

附子酒

治大風冷痰癖腹滿諸痹

大附子一枚重二兩者二枚（一作）

酒五升漬春五夏三秋七冬十日每服一合日再以瘥爲度

除風濕羌活湯（東垣）

治風濕著痹

羌活　防風各一兩　茯苓二錢　獨活五分　黃芪　蒼朮泔浸各一錢　澤瀉　豬苓各二分　柴胡　甘草炙各五分　藁本　川芎　陳皮　黃蘗各三分　升麻七分　黃連去鬚一分

每服三錢或五錢水二盞煎至一盞去查稍熱服

氣虛實施用如不盡證候依加減法用之

附子湯（宣明方下同）

治腎臟風寒濕骨痹腰脊疼不得俛仰兩脚冷受熱不遂頭昏耳聾音渾

附子炮　獨活　防風　川芎　丹參　菖蒲　石菖蒲　天麻　官桂　當歸各一兩　黃芪　細辛　山茱萸　白朮　甘菊花　牛膝酒浸　甘草炙　枳殼麩炒去穰各五錢

右爲末每服三錢水一大盞生薑五片煎至七分

去滓溫服不計時候日進三服

防風湯

治行痹行走無定

防風　甘草　當歸　赤茯苓去皮　桂心　杏仁去皮炒熟各一兩　麻黃去節五錢　黃芩　秦艽　葛根各三錢

右爲末每服五錢酒水合二盞棗三枚薑五片煎至一盞去滓溫服一方有羌活無麻黃一方有獨活赤芍無葛根麻黃

茯苓湯

治痛痹四肢疼痛拘倦浮腫

赤茯苓　桑白皮各二兩　防風　官桂　川芎　芍藥　麻黃去節各一兩五錢

右爲末每服五錢水一盞棗一枚煎至八分去滓溫服以薏粥投之汗泄爲度效矣

茯苓川芎湯

治著痹留注不去四肢麻木拘攣浮腫

赤茯苓　桑白皮　防風　官桂　川芎　麻黃　芍藥　當歸　甘草炙各等分

右爲末每服二錢水二盞棗三枚同煎至一盞去滓空心溫服如欲出汗以粥投之一方有蒼朮　大豆藁炒香熟一斤

右爲末每服五錢溫酒調下空心加至一兩日三

腎著湯

治胞痹小便不利鼻出清涕者

赤茯苓去皮　白朮各四兩　甘草炙三兩　乾薑炮二兩

右爲末每服五錢水一盞煎一盞去滓溫服日三

木香丸

治腸痹腹痛時發飧瀉氣不消化小便祕澀

乾薑三分　木香　白朮　官桂　蕪荑　良薑　訶子皮各一兩　附子炮去皮　厚朴生薑製　肉豆蔻各二兩　甘草五錢

右爲末麵糊爲丸如桐子大每服二十九薑湯空心下

升麻湯

治熱痹肌肉熱極體上如鼠走臂口反縱皮色變兼諸風皆治

升麻三兩　茯神去皮　人參　防風　犀角銼　羚羊角銼　羌活各一兩　官桂五錢

右爲末每服四錢水二盞生薑二塊碎竹瀝少許同煎至一盞溫服不拘時

苦參丸

治著痹

苦參二兩取粉　丹參炙　沙參　人參　防風五加皮　蒺藜炒去刺　烏蛇肉酒浸　蔓荊子　敗龜板酥炙黃　虎骨酥炙黃　元參各一兩

右爲細末用不蛀皂角一斤剉碎以水三升搥取汁去滓於無油鐵器內熬成膏用煉蜜四兩和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸食後良久夜臥共三服荊芥薄荷酒下

附子丸

治氣痹中寒陽虛陰盛一身如從水中出

附子炮　川烏頭炮二味通剉碎炒黃色入藥　官桂　川椒　菖蒲　甘草各四兩　骨碎補炒　天麻　白朮各二兩

右爲末煉蜜爲丸如梧子大每服三十丸溫酒下空心食前日三服

前胡散

治榮虛衛實肌肉不仁致令瘡重名曰肉苛

川椒去目閉口者生二錢　前胡　白芷　細辛　官桂　白朮　川芎各三兩　吳茱萸湯洗炒　附子炮　當歸各二兩

右剉搗以茶酒三升拌勻同蓄一宿以煉成豬脂膏五斤入藥微煎候白芷黃紫色漉出滓成膏於病處摩之至熱調此藥櫻桃大

補氣湯 出東垣

治皮膚間有痲木乃肝氣不行故也

白芍藥　橘皮不去白各一兩五錢　炙甘草　黃芪各一兩　澤瀉五錢

右㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞去柤溫服

蔓荊實丸 方見良方

治皮痹不仁

蔓荊實七錢半　桔梗炒　附子炮　枳殼麩炒　蔾藜子炒去刺　羌活　防風各半兩　皂角不蛀者半斤剉碎用新汲水浸一宿以熟絹濾去查入鰕少許同煎成膏

右爲細末以皂角膏和丸如梧桐子大每服二十

丸食後用熱酒送下 家寶丹丹溪下同

治一切風疾癱瘓瘂痹不仁口眼喎斜者邪入骨髓可服

川烏 南星 五靈脂薑汁製研 草烏各六兩 白附子 全蝎 沒藥 辰砂各二兩 羌活 天麻 乳香研 白殭蠶炒各三兩 片腦五錢 麝香二錢半 地龍四兩 雄黃 輕粉各一兩

右爲末作散調三分不覺半錢或蜜丸如桐子大含化茶酒皆可

如神救苦散

治癱瘓風濕痹走注疼痛不止此劫劑也非痛不可服痛止則已

米殼去頂膜蜜炒一兩 陳皮五錢 虎骨酥炙 乳香研 沒藥研 甘草各二錢五分

右爲末每服三錢水一盞煎連渣服病在上食後在下食前煎時須順攪之

文方

治上中下疼痛

南星薑製 蒼术泔浸 黃蘗酒炒各二兩

神麴炒 川芎各一兩 白芷 桃仁各五錢

威靈仙酒拌 桂枝 羌活各三錢 防己五錢

紅花酒洗一錢五分 草龍膽五分

右爲末麴糊丸梧子大每服一百丸空心白湯下

草藥丸

治血痹手足痛癱不仁遊走無定及風痹等證

草藥炮 山芋 牛膝酒浸 山萸炒 熟地焙 澤瀉各一兩 狗脊去毛 地膚子炒 白术各半兩 乾漆炒烟盡 天雄炮去皮臍 車前子炒 蟾蜍研各七錢五分 茵芋去皮莖二錢五分

右除蟾蜍生研外搗爲細末和令勻煉蜜爲丸如梧桐子大每服十九至十五九空心用溫酒送下日二夜一

臂痛方

治臂痛

蒼术一錢五分 半夏 南星 白术 香附 黃芩酒炒各一錢 陳皮 白茯苓各五分 威靈仙三錢 甘草少許

右㕮咀作一服入生薑二三片一本加羌活一錢

八珍丸

治痛風走注脚疾

乳香 沒藥 代赭石 穿山甲生用各三錢 羌活 草烏生用各五錢 全蝎炒二十一箇 川烏不去皮尖生用一兩

右爲末酢糊丸如梧子大每二十一丸溫酒送下

四妙散丹溪

治痛風走注

威靈仙酒浸五錢 羊角灰三錢 白芥子一錢 蒼耳一錢五分一作蒼术

右爲末每服一錢生薑一大片擂汁入湯調服又

二妙散同調服

麻黃赤芍湯醫學入門

治濕熱流注肢節腫痛

麻黃 赤芍各一錢 防風 荆芥 威靈仙 羌活 獨活 白芷 蒼术 片芩 枳實 桔梗 葛根 川芎各五分 甘草 歸尾 升麻各三分

下焦加酒炒黃蘗婦人加酒炒紅花腫多加檳榔 澤瀉痛加乳沒瘀血加桃仁大黃水煎服

又方丹溪

治痛風不能行

糯米一盞 黃藤根一握 黑豆半合

右用酒水各一椀煎徐徐服之大吐大瀉一服便能行動

痛風丸醫學入門

治上中下疼痛

紅花錢半 南星 蒼术 黃蘗各二兩 木瓜 神麴各一兩 白芷 桃仁各五錢 威靈仙 羌活 桂枝各三錢 防己 草龍膽各四錢

右爲末麴糊丸梧子大每百丸空心白湯下

乳香丸丹溪

治痛風

白附子炮 南星 白芷 沒藥 赤小豆 荆芥 藿香 骨碎補去毛 乳香另研各一兩 五靈脂 川烏炮去皮臍尖 糯米炒各二兩 草烏頭去皮尖 京墨煅各五兩 松脂研五錢

右爲末酒糊丸如梧子大每服十九至十五九冷酒吞下茶亦得不拘時忌熱物

加味四物湯醫學正傳

治白虎歷節風證

生地 當歸 川芎 白芍 加桃仁 牛膝

陳皮　茯苓　甘草　白芷　草龍膽
如痛在上者屬風加羌活桂枝威靈仙
在下者屬濕加牛膝防己木通黃蘗
氣虛者加人參白朮龜板
有痰者加南星半夏生薑
血虛者倍川歸川芎佐以桃仁紅花水煎服之

防風天麻散（醫學正傳）
治風濕痲痹肢節走注疼痛中風偏枯或暴瘖不語內外風熱壅滯昏眩
防風　天麻　川芎　羌活　白芷　草烏頭
白附子　荆芥穗　當歸　甘草炙各五錢
白滑石二兩
右爲細末每服五分加至一錢熱酒化蜜少許調下攪藥力運行微痲爲度或煉蜜爲丸如彈子大每服半丸至一丸熱酒化下白湯亦可此藥散鬱開結宣風通氣之妙劑也

神通飲（古今醫鑑下同）
治感風濕得白虎歷節風遍身抽掣疼痛足不能履地者二三年百方不效身體羸瘦服此神效
川木通二兩
右剉細長流水煎汁頓服服後一時許遍身發痒或發紅丹勿懼遍身上下出汗卽愈

兩手痹方
治兩手疼痛痲木
當歸　川芎　白芷　黃芩酒炒　黃連　南星
半夏各薑汁炒　蒼朮　羌活　防風　桔梗
桂枝　甘草各等分
右剉一劑生薑煎服

舒筋立安散
治四肢百節疼痛名曰白虎歷節風
防風　羌活　獨活　茯苓　川芎　生地黃
白芷　蒼朮　紅花　桃仁　陳皮　半夏
南星　白朮　威靈仙　牛膝　木瓜　防己
黃芩　連翹　木通　龍膽草酒浸　木香少許
大附子少許　甘草各等分
右剉一劑水煎入薑汁竹瀝服痛甚加乳香沒藥

調服透骨膏（奇效良方下同）
治一切風濕走注疼痛
生地　馬鞭草各半斤　吳茱萸　白芥子各三兩
骨碎補　敗龜板酒炙各四兩　鼈甲酒炙三箇
蒲黃二兩
右爲細末用米粉酢調似膏于火上溫熱攤於痛處用紙裹候冷再烘於避風處用之

八風九州湯
治男子婦人寒冷不自愛護當風解衣汗出臥冷濕地半身不遂或傾仰屈伸難遇身淫痹四肢不收狀如風狂飲食損少手足苦冷或不隨
麻黃去節四兩　甘草炙　乾薑　附子炮
防風　獨活各三兩　石膏綿裹搗碎　茯苓
白朮土炒　川芎　柴胡　當歸身　人參
細辛各二兩　杏仁去尖皮四十九粒
右㕮咀以水一斗清酒五升漬三夜裹取四升分覆當汗出微微去上衣汗解以粉撲之忌生菜菘菜酢桃李猪肉雀肉

除濕獨痛湯
治風濕痛痹
蒼朮米泔浸炒二錢　羌活　茯苓　澤瀉
白朮各一錢半　陳皮一錢　甘草四分
水二鍾煎八分入薑汁竹瀝各二三匙服在上痛者加桂枝威靈仙桔梗在下痛者加防己木通黃蘗牛膝

海桐皮散
治白虎歷節走注骨節疼痛
獨活　莧菜鹽水浸焙　川芎　當歸各三分
桃仁去皮焙　天麻　羚羊　桂　牛膝　麻黃去節
枳殼麩炒　海桐皮　白芍藥　川烏炮去皮臍
松節　防風　杜仲薑製　甘草各五錢
麝香一分　虎脛骨酒炙黃一兩
右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片棗二枚煎六分食前溫服

攝風酒（奇效良方）
治白虎歷節風及諸般風濕流注四肢大風癩膝一切風疾
萆薢風藤　三角尖石上生者　青藤根　石菖蒲
上生者各一兩　五加皮　生薑各一兩五錢
虎脛骨　石楠葉　青木香　威靈仙　川續斷
當歸　乳香　羌活　細辛　南木香各二錢半
烏藥　防風　甘草節　蘇木　蒼朮各五錢
骨碎補七錢五分　生川烏一枚四分之一

牛膝四錢

右剉碎用無灰酒一罎將藥盛於布袋內放酒罎中油紙封縛以鍋內盛水將酒罎坐於鍋內慢火自辰煮至午連罎取出放冷每日不拘時隨意溫服藥酒如夏恐停久作酸自作半料用小罎酒依上法煮服

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百四十八卷目錄

醫部彙考二百二十八

痹門三

方二兩足痹方　活血丹　虎骨丹　豨莶丸　投虎丸　乳香黑虎丹　神仙飛步丹　歷節風方　門物附子湯　通氣防風散　七聖散　乳香沒藥丸　上馬丸　三痺湯　蠲痛丸　蒲痛針筋丸　循絡丸　秘貫散　活絡飲　換骨丹　乳香宣經丸　蠲痛方　導滯湯　牛膝酒　五加皮酒　秘傳酒　羌活湯　羌活續斷湯　金刀如聖散　除濕化痰丸　痛風方　蒼朮酒方

烏藥順氣散　抽筋飲　三氣飲　豉指散　大龍膏　續斷丹　羌活散　當歸湯　黃芪丸　加味五痹湯　石楠散　防風丸　巴戟天湯　薏苡仁湯　草薢丸　芎朮湯　茯神湯　溫中法夠丸　五味子湯　紫蘇子湯　乳香應痛丸　風痹方　蒼朮散　和血散　痛風方　虎骨散　十生丹　龍虎丹　透骨丹　神效膏　神效萬全膏　摩風膏

單方

藝術典第二百四十八卷

醫部彙考二百二十八

痹門三

方二

兩足痹方　古今醫鑑

治兩足疼痛痲木

當歸　白芍　白朮　蒼朮　陳皮　半夏　茯苓　黃蘗酒炒　桃仁　紅花　威靈仙　川牛膝酒洗　甘草各等分

右剉生薑五片水煎入竹瀝同服

活血丹　醫學綱目下同

治遍身骨節疼痛如神

熟地黃三兩　當歸　白芍　續斷　人參各一兩

右爲細末酒糊丸如桐子大

虎骨丸

治經絡凝滯骨節疼痛筋脈攣急遇陰寒愈痛

乳香　沒藥各另研　赤芍藥　熟地黃　當歸　虎脛骨酥炙黃各一兩　血竭五錢

右爲末用木瓜一枚切破去子入乳香末在內以麻線纏定勿令透氣好酒六升煮酒盡取木瓜去皮研如泥更入熟蜜少許杵和爲丸如桐子大每服五十丸病在上食後在下食前溫酒下

甜瓜子丸　醫學入門下同

治風濕相搏腰腳疼痛

甜瓜子炒二兩　木瓜一兩五錢　威靈仙一兩　川烏五錢

右爲末酒糊丸梧子大每服三十丸酒下避風汗出忌熱及相反藥

捉虎丸

治一切痛風走注手足癱瘓痲木白虎歷節等證

麝香二錢五分　京墨煅一錢五分　乳香沒藥　當歸各七錢五分　白膠　草烏　地龍　木鼈子　五靈脂各一兩五錢

右爲末糯米丸芡實大每一丸酒化下

乳香黑虎丹

治男婦虛血氣衰敗筋寒骨冷及天感風濕傳於經絡手足痲木腰腿疼痛久則偏枯癱瘓口眼喎斜及諸中風不能行者

草烏　蒼朮　生薑各一斤　連鬚葱半斤同均勻

盒春五夏三秋七冬十日每日拌一次曬乾入

五靈脂　乳香　沒藥各五錢　穿山甲二兩

自然銅一兩

右爲末酢糊丸梧子大每三十丸空心熱酒下間日服尤妙忌生冷物但覺痲木爲效孕婦勿服

神仙飛步丹

治諸風濕痹癱瘓等證

草烏不去皮尖四兩　蒼朮半斤　川芎藭　白芷各一兩

右爲末用生薑連鬚葱各四兩和前藥搗爛以磁器築藥於內令實紙封瓶口勿令泄氣春三夏二秋五冬七日取出曬或焙乾與薑葱同爲末酢糊爲丸如梧子大每服十五丸空心溫酒茶任下忌發熱物孕婦勿服

歷節風方　奇效良方下同

治白虎歷節風痛者狀如虎咬骨節驚疼

白芥子　大戟　木鼈子　甘遂　乳香　川烏

右各等分爲細末米糊爲丸如梧桐子大每服七八十丸酒下

四物附子湯

治風濕相搏骨節煩疼四肢拘急不得屈伸

附子炮一錢五分　肉桂二錢　白朮三錢　甘草一錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

通氣防風散

治風濕注痹走痛

羌活　獨活　川芎　蔓荊子各一錢　防風

甘草炙　藥本各五分

右水鍾半煎七分熱服出汗

通痹散

治腰以下至足風寒濕三氣合而成痹兩足至膝冷如冰不能自舉或因酒熱立冷水中久成此疾

天麻　獨活　當歸　川芎　白朮　藥本各等分

右爲細末每服二錢食前熱酒調下

七聖散

治風濕流注經絡間肢節緩縱不隨或脚膝疼痛

續斷　獨活　防風　杜仲　萆薢　甘草

牛膝酒浸一宿

右等分焙乾爲細末每服二錢溫酒調下

乳香沒藥丸

治遠年近日風濕脚氣攻注脚膝腫疼筋攣不能屈伸脚不能踏地及一切疼痛往來不已

白牽牛麩炒三兩　乳香別研　沒藥別研

骨碎補去毛　縮砂仁　五靈脂　白附子

甜瓜子　當歸酒炒　牛膝酒浸一宿　木瓜

地龍去土　木鼈子各一兩

右爲細末酒煮麪糊爲丸如梧桐子大每服二十丸溫木瓜湯下或溫酒亦可不拘時服

上馬丸

治寒濕腎痛腿痹筋骨諸疾

川烏　木香不見火各五錢　虎骨酥炙　牛膝

杜仲　木瓜　當歸酒浸　敗龜板酥炙　白朮

自然銅酢淬　黃芪蜜炙各一兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三四十丸溫酒送下

三痹湯

治血氣澁滯手足拘攣風痹等疾並皆治之

杜仲薑炒　防風　桂心　續斷　人參　當歸

秦艽　川芎　白茯苓　黃芪　細辛　白芍藥

獨活　牛膝　生地黃　甘草炙各八分

右作一服用水二鍾生薑二三片紅棗一枚煎至一鍾去滓不拘時服

蠲痛丸

治諸風歷節疼痛腫滿

川烏生一枚　全蠍去毒二七箇　麝香研五分

黑豆生去皮七十粒　地龍去土五錢

右爲細末酒糊爲丸如菜豆大每服十五丸至二十九臨睡用冷酒送下微汗不妨

尋痛舒筋丸

治痹痛如神

兩頭尖　五靈脂各五錢　草烏　滴乳香

明沒藥各三分

右爲細末搗生葱和丸如梧桐子大每服三五丸臨睡時用溫酒送下鹽湯亦可忌熱物

循絡丸

治風痹氣滯血脈凝澁筋脈拘攣肢節腰膝强痛行步艱難

沒藥別研　乳香別研　虎骨酥炙　五靈脂

龜板酥炙　當歸各二兩　白附子炮　南星炮

天麻酒浸焙　全蠍去毒炒　附子炮去皮臍

川烏炮去皮臍　地龍炒　杜仲炒　威靈仙

牛膝酒浸一宿　烏蛇酒浸去皮骨焙　續斷

肉蓯蓉酒浸一夜焙　硃砂別研各一兩

右爲細末酒煮糊和丸如梧桐子大每服三十丸食前用溫酒送下

枳實散

治心痹胃中氣堅急心微痛氣短促欬唾亦痛不能飲食

枳實麩炒　桂心　細辛　桔梗各七錢半

青皮一兩

右㕮咀每服三錢水一鍾生薑一錢半煎六分不拘時服

活絡飲

治風濕痹痛諸藥不效

當歸　白朮　川芎　羌活　獨活各一錢

甘草五分

水一鍾半薑五分煎七分溫服

換骨丹

治痹痛與史國公浸酒方大同

虎骨酥炙　防風　牛膝　當歸　羌活　獨活

敗龜板　秦艽　萆薢　晚蠶沙　松節各一兩

枸杞二兩半　茄根洗淨二兩

酒糊丸服或酒浸或爲末服亦可

乳香宣經丸 奇效良方

治風寒濕痹四肢拘攣筋骨疼痛行步艱難
乳香別研　附子炮去皮臍　木香各八錢
五靈脂一兩　黑豆生用三合　草烏去皮尖炒
川楝子肉微炒　茴香炒各二兩　防風　烏藥
陳皮去白　黑牽牛生　威靈仙　草薢各四兩
右爲細末酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸漸加至五七十丸空心用溫酒送下

獨痛丸
治風寒濕痹筋骨重疼走注攻刺腰脚無力
草烏去皮尖鹽炒煙出四兩　南星　地龍炒
五靈脂炒　白膠香熬開潛淨石上冷研　破故紙
炒各二兩　沒藥別研一兩　乳香別研　京墨煅
各五錢
右爲細末酢煮糊爲丸如梧桐子大每服十丸溫酒送下漸加丸數服之

導痹湯
治脈痹導血華塞
半夏　官桂去皮各五兩　黃芪四兩　茯苓
當歸焙　遠志　龍齒　人參　甘草炙各三兩
茯神　枳實麩炒　桔梗炒各二兩
右㕮咀每服先以水二盞棗糯米半合米熟去米入藥五錢生薑五片棗二枚煎數沸去滓取一盞不拘時溫服

牛膝酒
治腎氣虛冷復感寒濕爲痹
火麻仁炒五錢　牛膝　秦艽　川芎　白茯苓
防風　官桂　獨活　丹參各二兩　薏苡一兩
五加皮五兩　麥冬　石斛　杜仲炒　地骨皮
附子炮去皮臍　乾薑炮各一兩五錢
右剉如麻豆大以生絹袋盛用酒一斗浸春夏三日秋冬五日每服半盞空心溫服日再

五加皮酒
治筋痹多悲思顏色蒼白四肢不營諸筋拘攣伸動縮急腹中轉痛
五加皮　枳刺炒　猪椒根皮　丹參各八兩
川芎藭　乾薑炮各五兩　白薇皮　木通
秦椒去目并合口者炒出汗　天雄炮去皮臍
甘草炙各四兩　薏苡仁八兩　火麻仁三升
右剉麻豆大絹袋盛用酒三斗浸之春夏三四日秋冬六七日初溫服二三合稍加之以知爲度

草豆蔻散
治腸痹風寒濕內攻腹疼飧泄
草豆蔻　陳皮去白焙各二兩　官桂去粗皮
白豆蔻仁　肉豆蔻　當歸切焙　木香　白朮
丁香　良薑各五錢
右爲細末每服一錢食前生薑棗湯調服

巴戟丸
治胞痹膀胱腹疼痛小水不利
巴戟一兩半　桑螵蛸麩炒　續斷　杜仲酥炙
生地黃焙　附子炮去皮臍　肉蓯蓉酒浸切焙
山芋各一兩　遠志三錢　石斛　鹿茸酥炙
菟絲子酒浸一宿搗　山茱萸　五味子　龍骨
官桂各三分
右爲細末入別搗藥研和令勻煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫酒送下日再服

獨痹湯
治周痹及手足冷痹脚腿沉重或身疼項强
當歸酒洗　赤芍藥煨　黃芪　蓋黃　羌活
甘草五分
水二鍾薑三片棗二枚不拘時服

人參丸
治脈痹通行血脈
人參　麥門冬去心焙　茯神去木　赤石脂
龍齒　石菖蒲　黃芪各一兩　熟地焙一兩
右爲細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三十丸食後良久以清粥飲送下

祕傳藥酒
治男子婦人風濕相搏腰脇疼痛或因坐臥濕地雨露所襲偏身骨節痛風濕脚氣並皆治之
麻黃　白芷　桔梗　芍藥　當歸　川芎
肉桂　半夏　防己　甘草各一兩　陳皮
厚朴　枳殼　烏藥　牛膝　杜仲製各二兩
蒼木　檳榔　川木瓜　獨活各兩半
右剉粗末以絹袋盛之用無灰酒三斗浸於罈內密封罈口鍋內重湯煮一時然後取出過三日開取酒飲之量飲一日三次查驅乾爲末酒糊丸梧桐子大每服七十丸空心酒下

羌活湯
治皮痹皮如蟲走腹脹滿大腸不利語不出聲
羌活　細辛　附子炮去皮臍　沙參　白朮

羚羊角鎊　五加皮　生地黃　官桂　白蒺藜
枳殼麩炒　麻黃去節　杏仁去皮尖各五錢
丹參　萆薢　五味子　石菖蒲　木通　檳榔
榔李仁炮去皮　赤茯苓各等分
右水盞半薑五片煎七分不拘時溫服

羌活續斷湯

治一切白虎歷節風手足肢節腫痛如錐
羌活　川續斷　牛膝酒洗　防風　當歸酒洗
川芎各一錢　薄桂三分　秦艽　川烏各五分
蒼朮米泔浸炒　麻黃　甘草節　枳殼麩炒
穿山甲各七分
右水二盞薑三片葱一根煎一盞不拘時服取汗

金刀如聖散

治三十六種一切口眼喎斜半身不遂徧體遊風
白虎歷節疼痛立效
川烏炮　草烏炮各二兩　防風　荊芥　麻黃
天麻　蒼朮　何首烏　當歸　川芎　細莘
石斛　人參　甘草各三錢　全蠍　硃砂
雄黃各二錢
右爲細末每服五分臥時溫茶下如久病者初服
三分隨加至五分看虛實加減

燥濕化痰丸

治歷節風濕痰壅滯晝夜疼痛無休者
羌活　獨活　防風　防己　川烏　全蠍
南星　半夏　殭蠶炒　天麻　陳皮去白
猪牙皂角炒　當歸酒洗　生地黃　木香
沉香各五錢　白朮土炒　蒼朮米泔水浸
杜仲薑汁炒各二兩　巴戟天炒　薏苡仁
牛膝酒洗　川芎　破故紙炒各一兩
右爲末酒糊丸梧桐子大每服一百丸空心食前
酒送下日二次食乾物壓之

諸風應效酒

治白虎歷節風一切諸風癱瘓寒濕痹肢節疼痛
當歸　川芎　白朮　五加皮　石楠藤　殭蠶
白芍藥各三兩　蒼朮五錢　白芷　苦參
何首烏　木瓜　牛膝　細莘　黃蘗　知母
大楓子　薏苡仁　生地黃各二錢　川烏
木香各一錢　穿山甲　紫荊皮　羌活　獨活
威靈仙　藁本　防風各錢半
右爲粗末好酒一罎將絹袋盛於罎內密封口文
武火重湯煑一時取出去火毒過三日飲之

煑酒方

治一切白虎歷節疼痛
當歸　五加皮　海風藤各五錢　川芎　牛膝
黃芩　木通　薏苡仁　木瓜各二錢　白朮
蒼朮　烏藥　茯苓　甘草　桑寄生各一兩
白芍藥　生地黃　陳皮　半夏　羌活　獨活
麻黃　金銀花　枳殼　防風各三錢　紫蘇葉
木香各一錢
右煑法同前

烏藥順氣散

治風氣攻注四肢骨節疼痛遍身頑痲及療癱瘓
步履艱難脚膝痿弱
麻黃去根節　陳皮　烏藥各二錢　乾薑炮
白殭蠶去絲嘴炒各五分　川芎　枳殼　桔梗
白芷　甘草炒各一錢
水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

抽薪飲（景岳全書下同）

治熱盛攣痹
黃芩　石斛　木通　梔子炒　黃蘗各一二錢
枳殼　澤瀉各錢半　細甘草三分
水一鍾煎七分食遠溫服內熱甚者冷服更佳

三氣飲

治血氣虧損風寒濕三氣乘虛內侵筋骨歷節痹
痛之極
當歸　枸杞　杜仲各二錢　熟地三五錢
牛膝　茯苓　芍藥酒炒　肉桂各一錢　白芷
細莘（或代以獨活）　炙甘草各一錢　附子隨宜一二錢
水二鍾加生薑三片煎服此飲亦可浸酒大約每
藥一斤用燒酒六七斤浸十餘日服

熨背散（奇效良方下同）

治胃痹心背疼痛氣悶
川芎一兩二錢　烏頭　細莘　附子　羌活
川椒　桂心各一兩
右爲末以少酢拌勻或炒熱或用帛裹微火炙令
煖以熨背上取差乃止忌生冷如常服
按此方當用氣惟諸辛香者佳附子似不必用

火龍膏

治風寒濕毒所襲筋骨攣痛及濕痰流注經絡壅
痛不能行步並治歷節風鶴膝風其效如神
生薑八兩取汁　乳香爲末　沒藥爲末各五錢

麝香一錢　眞牛皮膠二兩
右先將薑汁並廣膠鎔化方下乳香沒藥調勻待少溫下麝香成膏攤貼患處更服五積散

續斷丹

治中風寒濕筋攣骨痛
續斷　萆薢酒浸　牛膝酒浸　乾木瓜　杜仲炒各二兩
右爲末煉蜜和丸每兩作四丸每服一丸細嚼溫酒下不拘時

羌活散

治風痹手足不仁
荆芥一握　羌活　防己　防風　棗仁　當歸　川芎各一兩　附子炮去皮臍　麻黃去根節　天麻各一兩半　黃松節　薏苡仁各二兩
右爲細末每服二錢不拘時溫酒調下

當歸湯

治肺痹上氣閉塞胃中脅下支滿乍作乍止不得飲食脣乾舌燥手足冷痛
當歸　防風　黃芪各二兩　人參　細辛　黃芩各一兩　柴胡八兩　半夏湯泡五兩　麻黃去根節水煮二三沸掠去沫曬乾一兩　杏仁去皮尖炒五十箇　桂心三兩
右㕮咀每服五七錢水一鍾薑七片棗二枚煎七分不拘時溫服日三夜二

黃芪丸

治脾痹肌肉消瘦心腹脹滿水穀不化食卽欲嘔飲食無味四肢怠惰或時自利
黃芪　石斛　附子炮去皮臍　肉蓯蓉　益智仁　白朮　人參各一兩　訶梨勒煨二兩　桂心　厚朴薑汁炙各一兩半　五味子　當歸　沉香　白豆蔻去殼　枳實麩炒　良薑各七錢五分　吳茱萸湯泡　丁香各半兩
右爲細末煮棗肉和搗五百杵丸如梧子大每服三十丸食前用溫酒送下

加味五痹湯

治五臟痹證
細辛七分　人參　當歸酒洗　白芍煨　茯苓　川芎各一錢肝心腎痹倍之　五味子十五粒　甘草　白朮一錢脾痹倍之
水二鍾薑一片煎八分食遠服

脾痹加厚朴枳實砂仁神麴
肝痹加酸棗仁柴胡
心痹加遠志茯神麥門冬犀角
肺痹加半夏紫菀杏仁麻黃
腎痹加獨活官桂杜仲牛膝黃芪萆薢

石楠散

治熱痹肌肉熱極體上如鼠走脣口反壞皮膚色變兼治諸風
石楠葉酢炙　山芋　威靈仙　天雄炮去皮臍　石膏別研　升麻各一兩　黃芪剉　桃花生用　甘草　菊花未開者炒各五錢　山萸肉一兩半　珍珠別研　丹砂各二錢半別研
右爲細末入別研藥更研令勻每服一錢漸加至二錢空心用溫酒調服

防風丸

治熱痹
防風　羌活　桂心　茯神　人參　枳殼麩炒　牛膝酒浸　五加皮　麥門冬　元參　薏苡仁　生地黃焙　芍藥　丹參　檳榔二兩　大黃炒　松子仁　木香各半兩　磁石火煅酢淬七次
右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十丸漸加至四十丸空心溫酒下

巴戟天湯

治冷痹脚膝疼痛行履艱難
巴戟天三兩　附子炮去皮臍　五加皮各二兩　牛膝酒浸焙　石斛　甘草炙　萆薢各一兩半　白茯苓　防風各一兩七錢半
右剉如麻豆大每服五錢生薑三片水一盞半煎至一盞去滓空心溫服一方無生薑

補肝湯

治肝痹兩脅下滿筋急不得太息痂瘕四逆搶心腹痛日不明
烏頭四枚炮去皮臍　附子二枚炮去皮臍　山茱萸去核各七錢半　官桂七錢半　薏苡仁　甘草炙　獨活各半兩　白茯苓一兩二錢　柏子仁另研　防風　細辛各二兩
右剉如麻豆大入研藥拌勻每服五錢水一盞半大棗二枚去核同煎至八分去滓不拘時溫服

萆薢丸

治肝痹緩筋脈去邪毒調榮衛
萆薢　羌活　天麻酒浸焙各一兩　乳香別研

沒藥別研各二錢五分　附子炮去皮臍半兩
右爲細末入乳香沒藥同研勻煉蜜丸梧子大每服一丸空心溫酒化下日再服

犀角散
治心痹精神惚恍恐畏悶亂不得睡臥志氣不定語言錯誤
犀角屑　牛黃別研　麝香另研　羚羊角　白蘇皮　茯神去木　沙參　天竺黃別研　防風　天麻　獨活　人參　升麻　龍齒
遠志去心　甘草炙各二錢五分　麥門冬去心　丹砂別研　龍腦別研一錢二分
右爲細末入別研藥再研令極細每服二錢不拘時用麥門冬湯調下

茯神湯
治心痹神思昏塞四肢不利胷中煩悶時復恐悸
茯神　羌活　麻黃去根節　龍齒　麥門冬焙　遠志　犀角屑　薏苡仁　人參　蔓荆子　防風各七錢五分　赤芍藥　甘草炙半兩
右㕮咀每服三錢水一鍾生薑五片同煎至七分去滓不拘時溫服

溫中法麴丸
治脾痹發欬嘔汁
法麴炒　枳實麩炒　白茯苓　吳茱萸湯浸炒　厚朴薑汁炙　甘草炙各三兩　麥蘗微炒五合　細辛　乾薑炮　麥門冬焙　附子炮去皮臍　桔梗炒　人參各一兩
右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服七十丸食前熟水下日三服

五味子湯
治肺痹上氣發欬
五味子　半夏各三兩　麻黃去根節　細辛　紫菀　黃芩　甘草炙各二兩　當歸焙　人參　桂心各一兩　紫蘇子炒八兩
右㕮咀每服四錢水一盞生薑五片煎至六分去滓不拘時溫服上氣病亦單煮紫蘇子及生紫蘇葉冬月羹乾枝整葉服

紫蘇子湯
治肺痹胷心滿塞上氣不下
紫蘇子炒八兩　半夏湯洗五兩　陳皮去白　桂心各三兩　人參　白朮　甘草炙各二兩
右㕮咀每服四錢水一盞入生薑五片棗二枚煎至七分去滓不拘時溫服

乳香應痛丸 集驗
乳香另研　沒藥另研各半兩　五靈脂炒　赤石脂各一兩研　草烏頭一兩半炒
右爲細末酢糊爲丸如小豆大每服十五丸空心酒送下日進二服

風痹方
治走注疼痛不定
莞花　桑白皮　川椒各二兩　桂心一兩　柳蛀屑半兩　麥麩一升
右爲粗末用酢一升拌炒令熱以青布裹熨痛處冷卽更入酢再炒依前熨之以瘥爲度

薏苡仁散 本事
治風濕痛痹
薏苡仁一兩　當歸　小川芎　乾薑　茵芋　甘草　官桂　川烏　防風　人參　羌活　白朮　麻黃　獨活各半兩
右爲細末每服二錢空心臨臥酒調下日三服

和血散痛湯 東垣
治血留於經絡周身痹痛
羌活　升麻　麻黃去節各一錢半　桃仁十箇　柴胡二錢　防風六分　當歸身　紅花各一分　獨活　猪苓各五分　黃蘗酒炒　知母酒炒各一錢　黃連酒炒　甘草炙各二分
右分作四服每服水一大盞煎至一半去滓空心熱服

如意通聖散 聖惠下同
治走注風疼痛
當歸　陳皮去白　麻黃去節　甘草炙　川芎　御米殼去頂膈　丁香各等分
右用慢火炒令黃色每服五錢水二盞煎至一盞去查溫服如腰脚走注疼痛加虎骨沒藥乳香此治諸痛之仙藥也又可服一粒金丹

虎骨散
治風毒走注疼痛不定少得睡臥
虎脛骨　敗龜板酢炙各二兩　騏驎竭另研　沒藥　自然銅酢淬　赤芍藥　當歸　天麻　蒼耳子炒　骨碎補去毛　防風　牛膝酒浸　檳榔　五加皮　羌活去蘆各一兩　白附子炮

桂心　白芷各半兩
右爲細末每服二錢溫酒調下不拘時候

桂心散

治風走注疼痛
桂心　漏蘆　威靈仙　芎藭　白芷　木香
當歸去蘆　白殭蠶炒　地龍炒去土各半兩
右爲細末每服二錢溫酒調下不拘時候

仙靈脾散

治走注風往來不定
仙靈脾　威靈仙　芎藭　蒼耳子　桂心各一兩
右爲細末每服一錢溫酒調下不拘時服

沒藥散

治遍身百節風虛勞冷痲痹走注疼痛日夜不止
沒藥二兩另研　虎骨四兩酢炙
右爲細末每服五錢溫酒調下不拘時日進二服

虎骨丸

治男子婦人走注疼痛痲木困弱
虎骨酢炙四兩　五靈脂炒　殭蠶炒　威靈仙
地龍炒　白膠香各一兩　川烏二兩炮去皮臍
胡桃肉二兩半去隔皮搗研如泥
右爲細末同研令勻以酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服十丸至十五丸空心溫酒送下日進二服

十生丹

治風痹走注疼痛
天麻　防風　羌活　獨活　川烏　草烏
何首烏　當歸　海桐皮各等分並生
右爲細末以煉蜜爲丸每丸重一錢每服一丸細嚼冷茶清送下病在上食後服病在下空心服忌食熱物一日

定痛丸

治風虛走注疼痛
威靈仙　木鼈子去殼　川烏頭炮去皮臍
防風　香白芷　五靈脂　地龍去土炒各半兩
水蛭糯米炒熟　朱砂水飛各三錢
右搗研爲細末酒煮麪糊和丸如梧子大以硃砂爲衣每服十丸空心溫酒送下婦人紅花酒下常服輕身壯骨

八神丹

治風虛走注疼痛昏迷無力四肢痲木
地龍去土炒　五靈脂炒　威靈仙　防風
木鼈子去殼　草烏頭各一兩炒　白膠香另研
乳香另研各三錢
右爲細末酒煮麪糊丸如桐子大每服五七丸至十丸溫酒送下不拘時若汗出其瘰癧自散是其效也老幼加減服之

一粒金丹

治腰膝風痹走注疼痛
草烏頭剉炒　五靈脂各一兩　地龍去土炒
木鼈子去殼各半兩　白膠香研一兩　細墨煅
乳香研各半兩　沒藥另研　當歸各一兩
麝香另研一錢
右爲細末以糯米糊爲丸如桐子大每服二丸至三丸溫酒下服藥罷遍身微汗爲妙

痛風方 丹溪下同

黃蘗酒炒　蒼朮酒炒各二錢
右作一服煎就調酒威靈仙末麝羊角灰爲臣蒼朮爲佐芥子爲使用薑一片入藥末一錢擂碎以前藥再溫服

龍虎丹

治走注疼痛或痲木不遂或半身疼痛
草烏　蒼朮　白芷各一兩
右研爲末水拌發熱過再入乳香二錢當歸牛膝各半兩酒糊丸彈子大酒化下

透骨丹 集驗下同

治男婦一切走注疼痛不可忍
地骨皮　甜瓜子炒　芸薹子葱搗爲餅各三兩
乳香另研　沒藥另研　草烏頭各一兩剉炒
蒼朮　牛膝酒浸　赤芍　當歸　自然銅酢煅
川烏頭炮去皮臍　五靈脂各二兩
右爲末酢糊丸梧子大每服十丸加至十五丸溫酒送下不拘時先用甜瓜子一兩炒香研酒煎數沸量虛實調黑牽末五錢服之以利爲度後服此

神效膏

治風走注疼痛上下不定
牛皮膠水鎔成膏一錢　芸薹子　安息香
川椒生用　生附子各半兩
右爲細末入膠中和成膏紙攤隨痛處貼之

神效萬全膏

治風毒走注疼痛
牛膝二兩酒煮研爲膏　芸薹子　川椒生用
安息香酒熬爲膏　附子生用各半兩

右三味爲細末入牛膝安息膏中調勻紙攤隨患處貼之

摩風膏

治風毒攻注筋骨疼痛

蓖麻子一兩去殼幷皮研　草烏頭半兩生

乳香一錢另研

右以猪肚脂煉去沫成膏方入藥攪勻塗摩攻注之處以手心摩掌如火之熱却塗摩患處大妙

單方

歷節風痛獨活羌活松節等分用酒煮過每日空心飲一杯（外臺下同）

歷節諸風痠疼不可忍用松脂三十斤煉四五十徧以煉酥二升溫和松脂三升熟攪令極調勻每旦空腹以酒服方寸匕日二服數日食麪粥爲佳愼勿食血腥生冷鮮物果子百日瘥

歷節風四肢疼痛松節二十斤酒五斗漬三七日服一合日五六服

歷節風松葉三十斤酒二石五斗漬三七日服一合日服五六度（千金方）

白虎風痛日夜走注百節有如虎嚙炭灰五升蚯蚓屎一升紅花七捻和熬以酢拌之用故布包二包更互熨痛處取效（聖濟）

鼠壤土治中風筋骨不隨冷痹骨節手足拘急風掣痛偏枯死肌多收曝乾蒸熱袋盛更互熨之（藏器）

風濕冷痹葫蘿葉火燎厚鋪牀上趁熱眠於上冷復易之冬月取根舂碎熬熱用（外臺）

痲木疼痛萬靈膏用甘遂二兩蓖麻子四兩樟腦一兩搗作餅貼之內飲甘草湯（獨孤）

風寒濕痲木不仁或手足不遂生川烏頭末每以香白米煮粥一盌入末四錢慢熬得所下薑汁一匙蜜三大匙空腹啜之或入葱苗末二錢良驗（永事方）

濕氣痹痛腰膝痛用牛膝葉一斤切以米三合於豉汁中煮粥和鹽醬空腹食之（聖惠方下同）

風痹肢痛營衛不行川烏頭炮去皮以大豆同炒至汗出爲度去豆焙乾全蝎五分焙爲末醋煮稠丸菉豆大每溫酒下七丸日一服

腰脚冷痹疼痛有風川烏頭三箇生去皮臍爲散酢調塗甩上貼之須臾痛止

風濕身痛生葱擂爛入香油數點水煎調川芎藭末金末一錢服取吐（丹溪心法）

風毒痲痹芥菜子爲末酢調傅之（日華）

風痹走注疼痛芫花一斤黑豆五升生薑半斤切同炒旋入酢拌用青布裹熨痛處如冷更再炒熨以效爲度（集驗方下同）

風痹走注疼痛及四肢頑痹强硬屈伸不得皂莢一斤不蛀者煮鹽五升細剉皂莢和鹽炒熱以青布裹熨痛處立瘥

年久痲痹或歷節走氣疼痛不仁不拘男女神授散用草烏頭半斤去皮爲末以袋一箇盛豆腐半袋入烏末在內再將豆腐塡滿壓乾入鍋內煮一夜其藥卽堅如石取出曬乾爲末每服五分冷風濕氣以生薑湯痲木不仁以葱白湯下之（活人心統）

風濕痹木黑神丸草烏頭連皮生研五靈脂等分爲末六月六日滴水丸彈子大四十歲以下分六服病甚一丸作二服薄荷湯化下覺微痲爲度（本事方）

風濕走痛黑弩箭丸用兩頭尖五靈脂各一兩乳香沒藥當歸三錢爲末酢糊丸梧子大每服十丸至三十丸臨臥溫酒下忌油膩溫粥孕婦勿服（瑞竹堂方）

痛風走注黃藤膠根一把糯米一盞黑豆半盞酒水各一盌煮服大吐大泄一服便能動也（醫學集成）

風濕痹痛手足身體收攝不遂肢節疼痛言語蹇澀藤膠花酒拌蒸一炊久曬乾爲末每以牛乳一合酒二合調服五分（聖惠）

風痹筋急腫痛屈轉易常處白蘞二分熟附子一分爲末每酒服半刀圭日二服以身中熱行爲候十日便覺忌猪肉冷水（千金方）

手足痲痹時發疼痛或打撲傷損痛不可忍或癱瘓等證威靈仙炒五兩生川烏頭五靈脂各四兩爲末酢糊丸梧子大每服七丸用鹽湯下忌茶（普濟方）

心痹心煩內熱茜根煮汁服（傷寒類要）

筋骨痛攣馬寬兒子炒開口爲末酒服一錢日二服（集簡方）

風濕走注疼痛地龍一兩去土炒麝香二錢半另研共爲細末每服一錢以溫酒調下不拘時（集驗方）

風濕痹痛青藤根三兩防己一兩酒一瓶煮飲（普濟方）

風淫濕痹手足不舉筋節攣痛先與通關次以全蝎七箇瓦炒入麝香一字研勻酒三盞空心調服如覺已透則止未透再服如病未盡除自後專以菉蒿洗淨酒煎日二服（直指方）

風痹冷痛麻黃去根五兩桂心二兩爲末酒二升慢

火熬如餳每服一匙熱酒調下汗出爲度避風聖惠方

風瘴痒痹茱萸一升酒五升煑取一升半溫洗之立止孟詵食療

小麥麩酢蒸熨手足風濕痹痛寒濕脚氣互易至汗出良時珍

手足痛風冷痛如虎咬者用樟木一斗急流水一石煎極滾泡之盛大桶內乘熱安足於桶上熏之以草薦圍住勿令湯氣入目其功甚捷正傳

周痹緩急偏者薏苡仁十五兩大附子十枚炮爲末每服方寸匕日三仲景

風寒濕痹四肢攣急脚腫不可踐地用紫蘇二兩杵碎以水三升研取汁煑粳米二合作粥和葱椒薑豉食之聖惠方

白虎風毒以三年釅酢五升煎五沸切葱白三升煎一沸漉出以布染乘熱裹之痛止乃已外臺祕要

骨髓風毒痛不能動者取大麻子中仁炒香袋盛浸酒飲之本草下同

風緩頑痹諸節不隨腹內宿痛用原蠶沙炒黃袋盛浸酒飲

歷節腫痛風熱攻手指赤腫痲木甚則攻肩背兩膝遇暑熱則大便祕牛蒡子三兩新豆豉炒羌活各一兩爲末每服二錢白湯下本事方

歷節諸風骨節疼痛晝夜不止沒藥末五錢虎脛骨酥炙爲末三兩每服二錢溫酒調下圖經本草

白虎風痛走注兩膝熱腫用騏驎竭硫黃末各一兩每溫酒服一錢聖惠方下同

歷節風痛用精猪肉四兩切片裹安息香二兩以瓶盛灰大火上著一銅版片隔之安息香於上燒之以瓶口對痛處熏之勿令透氣

手足痲木不知痛痒霜降後桑葉煎湯頻洗救急方

一切風虛羸冷手足疼痹無論老幼輕重小天蓼浸酒及煑汁服之十許日覺皮膚間風出如蟲行藏器

積年痛風不可忍久治無效者楓柳皮細剉焙乾不限多少入腦麝浸酒常服以醉爲度斗門方

手足掣痛不仁不隨者用城東朽木煑湯熱漬痛處甚良時珍

風濕攣痹一切風氣蒼耳子三兩炒爲末以水一升半煎取七合去滓呷之食醫心鏡

偏身走注疼痛外貼方牛皮膠一兩水鎔成膏芸薹子安息香川椒附子各半兩爲細末入膠中和成膏塗紙上隨痛處貼之

黑雌雞肉作羹食治風寒濕痹五緩六急別錄

一切風痹脚氣於大松下掘坑置甕承取其津液一斤釀糯米五斗取酒飲之

風痹歷節作痛東向側柏葉煑汁同麴米釀酒飲

白虎風痛寒熱發渴骨節微腫用木牛肉脯一兩炙黃蕪窠土伏龍肝飛羅麪各二兩砒黃一錢爲末每以少許新汲水和作彈丸大於痛處摩之痛止即取藥拋於熱油鐺中聖惠方

風濕頑痹不仁筋骨攣縮冷風癱緩血脈斷絕六月取河砂烈日暴令極熱伏坐其中冷即易之取熱徹通汗隨病用藥切忌風冷勞役藏器

風虛濕痹醍醐二兩溫酒每服一匙效心鏡

白虎風痛走注兩股熱腫用虎脛骨塗酥炙黃黑附子炮去皮臍各一兩爲末每服二錢酒下日再經驗良方

風痹鐵砂四兩硇砂三錢黑脚白礬六錢研末熱酢或水拌濕油紙裹置袋內任意熱之冷再拌聖濟錄

百節皆痛不可忍用虎頭骨一具塗酥炙黃槌碎絹袋盛置二斗清酒中浸五宿隨性飲之聖惠方

偏身走注疼痛地龍一兩去土炒水蛭半兩糯米內炒熟麝香二錢半另研共爲細末每服一錢以溫酒調服不拘時候

手足風痹不隨筋脈五緩恍惚煩躁熊肉一斤切入豉汁中和葱薑椒鹽作醃脂空腹食之

風痹五緩筋急用熊肉半斤如上法食之

生薑搗汁和黃明膠熬貼風濕痛甚妙時珍

白虎歷節疼痛不已將雞子揩患處呪三徧願送糞堆頭行勿反顧蓋古云白虎是糞神愛吃雞子故也

白虎風痛鋪飯於患處以丹雄雞食之良久取熱糞封之將雞伏於患人牀下藏器

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百四十九卷目錄
醫部彙考二百二十九
痹門四
鍼灸
導引
醫案
寒門一
黃帝素問 生氣通天論 通評虛實論 逆調論 氣厥論 舉痛論 氣穴論 調經論 標本病傳論 氣交變大論 六元正紀大論 至眞要大論
靈樞經 經脈篇 師傳篇 五癃津液別篇 論疾診尺篇 九宮八風篇 五色篇
張機金匱要略 中寒
孫思邈千金方 痢冷
李杲十書 治寒以熱
朱震亨心法 中寒
戴思恭證治要訣 中寒
李梴醫學入門 中寒
龔信古今醫鑑 中寒

藝術典第二百四十九卷

醫部彙考二百二十九
痹門四
鍼灸

素問曰病在筋筋攣節痛不可以行名曰筋痹刺筋上爲故刺分肉間不可中骨也病起筋炅病已止

病在肌膚肌膚盡痛名曰肌痹傷於寒濕刺大分小分多發鍼而深之以熱爲故無傷筋骨傷筋骨癰發若變諸分盡熱病已止

病在骨骨重不可舉骨髓痠痛寒氣名曰骨痹深者刺無傷脈肉爲故其道大分小分骨熱病已止

凡痹往來行無常處者在分肉間而刺之以月生死爲數用鍼者隨氣盛衰以爲痏數鍼過其日數則脫氣不及日數則氣不瀉左刺右右刺左病已止不已復刺之如法月生一日一痏二日二痏漸多之十五日十五痏十六日十四痏漸少之

靈樞經曰病在陽者名曰風病在陰者名曰痹陰陽俱病命曰風痹病有形而不痛者陽之類也無形而痛者陰之類也無形而痛者其陽完而陰傷之也急治其陰無攻其陽病九日者三刺而已病一月者十刺而已多少遠近以此衰之久痹不去身者視其血絡盡出其血

黃帝曰余聞刺有三變何謂三變伯高答曰有刺營者有刺衛者有刺寒痹之留經者黃帝曰刺三變者奈何伯高答曰刺營者出血刺衛者出氣刺寒痹者內熱黃帝曰營衛寒痹之爲病奈何伯高答曰營之生病也寒熱少氣血上下行衛之生病也氣痛時來時去怫愾賁響風寒客於腸胃之中寒痹之爲病也留而不去時痛而皮不仁

黃帝曰刺寒痹內熱奈何伯高答曰刺布衣者以火焠之刺大人者以藥熨之黃帝曰藥熨奈何伯高答曰用淳酒二十斤蜀椒一斤乾薑一斤桂心一斤凡四種皆㕮咀清酒中用綿絮一斤細白布四丈幷內酒中置酒馬矢熅中蓋封塗勿使泄五日五夜出布綿絮曝乾之乾復漬以盡其汁每浸必焠其日乃出乾乾幷用滓與綿絮複布爲複巾長六七尺爲六七巾則用之生桑炭炙巾以熨寒痹所刺之處令熱入至於病所寒復炙巾以熨之三十徧而止汗出以巾拭身亦三十徧而止起步內中無見風每刺必熨如此病已矣此所謂內熱也

病在經絡痼痹者取以鋒鍼病痹氣暴發者取以圓利鍼病痹氣痛而不去者取以毫鍼瀉於井榮分輸取以四時

凡刺有十二節以應十二經一曰偶刺偶刺者以手直心若背直痛所一刺前一刺後以治心痹刺此者旁鍼之也二曰報刺報刺者刺痛無常處也上下行者直內無拔鍼以左手隨病所按之乃出鍼復刺之也三曰恢刺恢刺者直刺旁之舉之前後恢筋急以治筋痹也四曰齊刺齊刺者直入一旁入二以治寒氣小深者或曰三刺三刺者治痹氣小深者也五曰揚刺揚刺者正內一旁內四而浮之以治寒氣之博大者也六曰直鍼刺直鍼刺者引皮乃刺之以治寒氣之淺者也七曰輸刺輸刺者直入直出稀發鍼而深之以治氣盛而熱者也八曰短刺短刺者刺骨痹稍搖而深之致鍼骨所以上下摩骨也九曰浮刺浮刺者旁入而浮之以治肌急而寒者也十曰陰刺陰刺者左右率刺之以治寒厥中寒厥足踝後少陰也十一曰旁鍼刺旁鍼刺者直入旁刺各一以治留痹久居者也十二曰贊刺贊刺者直入直出數發鍼而淺之出血是謂治癰腫也

凡刺有五以應五臟一曰半刺半刺者淺內而疾發鍼無鍼傷肉如拔毛狀以取皮氣此肺之應也二曰豹文刺豹文刺者左右前後鍼之中脈爲故以取經

絡之血者此心之應也三日關刺關刺者直刺左右盡筋上以取筋痹慎無出血此肝之應也或曰渴刺一日豈刺四日合谷刺者左右雞足鍼於分肉之間以取肌痹此脾之應也五曰輸刺輸刺者直入直出深內之至骨以取骨痹此腎之應也

黃帝曰諸絡脈皆不能經大節之間必行絕道而出入復合於皮中其會皆見於外故諸刺絡脈者必刺其結上甚血者雖無結急取之以瀉其邪而出其血留之發爲痹也

著痹不去久寒不已卒取其三里

邪在腎則病骨痛陰痹陰痹者按之而不得腹脹腰痛大便難肩背頸項痛時眩取之涌泉崑崙視有血者盡取之

頭痛不可刺者大痹爲惡日作者可令少愈不可已

黃帝問於岐伯曰周痹之在身也上下移徙隨脈其上下左右相應間不容空願聞此痛在血脈之中耶將在分肉之間乎何以致是其痛之移也間不及下鍼其慘痛之時不及定治而痛已止矣何道使然願聞其故岐伯答曰此衆痹也黃帝曰願聞衆痹岐伯對曰此各在其處更發更止更居更起以右應左以左應右非能周也更發更休也黃帝曰善刺之奈何岐伯對曰刺此者痛雖已止必刺其處勿令復起帝曰善願聞周痹何如岐伯曰周痹者在於血脈之中隨脈以上隨脈以下不能左右各當其所黃帝曰刺之奈何岐伯對曰痛從上下者先刺其下以過之後刺其上以脫之痛從下上者先刺其上以過之後刺其下以脫之黃帝曰善此痛安生何因而得名岐伯對曰風寒濕氣客於外分肉之間迫切而爲沫沫得寒則聚聚則排分肉而分裂則痛痛則神歸之神歸之則熱熱則痛解痛解則厥厥則他痹發發則如是此內不在臟而外未發於皮獨居分肉之間眞氣不能周故命曰周痹故刺痹者必先切循其下之六經視其虛實及大絡之血結而不通及虛而脈陷空者而調之熨而通之其瘈堅轉引而行之黃帝曰善余已得其意矣亦得其事也九者經巽之理十二經脈陰陽之病也

陰陽相得而合爲痹者此爲內溢於經外注於絡如是者陰陽俱有餘雖多出血而弗能虛也

人迎緊則爲痛痹代則乍甚乍間盛則瀉之虛則補之緊痛則取之分肉代則取血絡且飲藥陷下則灸之不盛不虛以經取之名曰經刺

寸口緊則痛痹代則乍痛乍止盛則瀉之虛則補之緊則先刺而後灸之代則取血絡而後調之陷下則徒灸之陷下者脈血絡於中中有著血血寒故宜灸之不盛不虛以經取之名曰經刺

黃帝曰刺其諸陰陽奈何岐伯曰按其寸口人迎以調陰陽切循其經絡之凝濇結而不通者此於身皆有痛痹甚則不行故凝濇凝濇者致氣以溫之血和乃止其結絡者脈結血不行決之乃行故曰氣有餘於上者導而下之氣不足於上者推而休之其積留不至者因而迎之必明於經隧乃能持之寒與熱爭者導而行之其宛陳血不結者則而予之必先明知二十五人則血氣之所在左右上下刺約畢也

黃帝曰持鍼縱舍奈何岐伯曰必先明知十二經脈之本末皮膚之寒熱脈之盛衰滑濇其脈滑而盛者病日進盡而細者久以持之以濇者爲痛痹陰陽如一日者病難治其本末尚熱者病尚在其熱已衰者其病亦去矣持其尺察其肉之堅脆大小滑濇寒溫燥濕因視目之五色以知五臟而決死生視其血脈察其色以知其寒熱痛痹

圓利鍼取法於麤鍼徹大其末反小其身令可深內也長一寸六分主取癰痹者也毫鍼取法於毫毛長一寸六分主寒熱痛痹在絡者也長鍼取法於綦鍼長七寸主取深邪遠痹者也

甲乙經曰骨痹舉節不用而痛汗注煩心取三陰之經補之

厥痹者厥氣上及腹取陰陽之絡視主病者瀉陽補陰經也

風痹注病不可已者足如履冰時如入湯中肢脛淫泆煩心頭痛時嘔時悶眩已汗出久則目眩悲以喜怒短氣不樂不出二年死

足痹不可舉側而取之在樞合中以圓利鍼大鍼不可

風寒從足小指起脈痹上下帶胷脅痛無常處至陰主之

足下熱痛不能久坐濕痹不能行三陰交主之

骨痹煩滿商丘主之

膚痛蹇痹外丘主之

寒氣在分肉間上下痹不仁中瀆主之

千金方曰掖門主手臂痛

肩貞主手痿木不舉

陰交主手足拘攣
少商主手不仁
前腋主臂裏攣急手不上舉
尺澤主掣痛手不伸
曲池主手不可舉重腕急肘中痛難屈伸又云主手不仁
陽谿主臂重痛肘攣
臑會支溝曲池腕骨肘窌主肘節痹臂酸重腋急痛肘難屈伸
天井主肩痛痿痹不仁不可屈伸肉痲木
曲垣主肩胛周痹
陰陵泉主足痹痛
風府腰腧主足不仁
陽輔陽交陽陵泉主髀樞膝骨痹不仁
至陰主風寒從足小指起脈痹上下
內庭環跳主脛痛不可屈伸
陽間環跳承筋主脛痹不仁
涌泉然谷主五趾盡痛足不踐地
凡髀樞中痛不可舉以毫鍼寒而留之以月生死爲息數立已
太衝主膝內踝前痛
梁丘曲泉陽關主筋攣膝不得屈伸不可以行
犢鼻主膝中痛不仁又云主膝不仁難跪
髀關主膝寒不仁痿痹不得屈伸
風市主緩縱痿痹腨腸痛冷不仁
中瀆主寒氣在分肉間痛苦痹不仁
陽關主膝外廉痛不可屈伸脛痹不仁

懸鍾主濕痹流腫髀筋急瘈脛痛
曲泉主卒痹病引臏下節
陽陵泉主髀痹引膝股外廉痛不仁筋急
絕骨主髀樞痛脛膝骨搖酸痹不仁筋縮諸節酸折漏谷主久濕痹不能行
商丘主骨痹煩滿
臨泣主身痹洒淅振寒
凡身體不仁先取京骨後取中封絕骨皆瀉之
歷節疼痛但於痛處灸二七壯佳
醫學綱目曰白虎歷節風痛取兩踝尖在內外兩踝尖灸之
渾身疼痛往來上下無常取陽輔
渾身疼痛但於痛處鍼不拘經穴須避筋骨穴名天應穴
臂膊疼痛取肩髃手三里外關
臂膊疼痛并痲痹取肩髃肩井曲池
臂膊痲痹疼痛取肩髃曲池手上廉合谷不應再取肩井列缺
臂痛連腕取液門沿皮向後透陽池瀉之又取中渚沿皮透腕骨瀉之
臂內廉痛取經渠一分忌灸靈道一分臥鍼向前三分少海五分
臂痠攣取肘窌竅陰尺澤前谷後谿
腕痛取陽溪曲池
腕無力并痛取腕骨橫鍼入三分痛則瀉無力則補曲池補瀉仝上
五指拘攣取三間一分先瀉後補灸之前谷一分瀉之灸
五指皆痛取陽池外關合谷
胯痛腿支風取環跳在髀樞中側臥伸下足屈上足方可鍼可入三寸半補少瀉多留八吸居窌一寸二分留八吸瀉之委中出血
胯痛足蹙取環跳懸鍾（摘英作丘墟）鍼五分留三呼灸三壯
胯痛腿支風不能轉側舉動艱難取環跳三寸半灸七七壯風市灸二七壯居窌三寸半灸五七壯委中崑崙三里陽陵泉不已取五樞陽輔
腰脚痛取崑崙人中
側脚風取絕骨太衝
髀樞痛足脛寒熱足外廉皮骨痛取臨泣一分足三陰寸半陽輔
髀筋急脛痛縱緩痿痹腨疼膝冷外廉不可屈伸濕痹流腫取風市中瀆陽關懸鍾
腿痛取陽陵泉三里伏兔陰市
腿膝拘攣痛引脅或青或焦或黧或枯如腐木狀風市灸之又取陽陵泉曲泉崑崙
腿膝外廉痛股腫胻痠轉筋痿痹或膝脛熱不能行動取俠谿五分髀關光明各一寸
髀痹引膝股外廉急痛脛痠搖動有聲諸節痠不能行取陽陵泉絕骨中封
腿膝內廉痛引臏不可屈伸連腹引咽喉痛取太衝五分中封膝關
脛痠寒足下熱不能久立濕痹不仁取中都衝陽承山承筋

膕寒四肢重少氣難言不得臥取至陽三陰交
草鞋風取崑崙瀉之留六呼太谿瀉之留六呼申脈
五分補少瀉多留二吸忌灸
草鞋風足腕痛取崑崙透太谿丘墟商丘各寸半灸
瀉之
又法取崑崙丘墟商丘照海不已取太衝解谿
足腕不用痿躄坐不起髀脚痛取光明浴皮五分丘
墟直五分
外踝紅腫痛取申脈半寸瀉之
繞踝風取曲池如繞外踝痛兼刺孫絡足少陽小指
間三分如繞內踝痛兼刺大都三分如繞前廉痛刺
行間六分
大拇指本節前骨疼取太衝彈鍼出血
足五指盡痛不得踐地取湧泉二分然谷一分
百節痛實無所知取絕骨三稜鍼出血
醫學入門曰冷風濕痹鍼環跳陽陵三陽尻尾不知
痛痒者用艾炷灸大於鍼尾上燒三五壯知痛即止

導引

古今醫統曰以右踵拘左足拇指除風痹以左踵拘
右足拇指除欬痹以兩手更引足趺至膝上除體痹
又法踞坐伸腰兩手引兩踵鼻內氣自拯七息布兩
膝頭除痹
又法凡人常覺腰脊拘急手足鼻動不遂以左右手
朝拱迎面呵氣三口足立直蹬七數踞坐左右手抱
膝搖二七徧納氣七息愈周身之痹
保生祕要曰手足痲痹導引法將左足搭右膝上以
右手扳左脚左手托脚跟扳向右頭即轉左右亦如
之兼運功法氣脈自朝
運功氣血兩處之證起於歸元會意運法漸行患處
多旋百回以還原位行住坐臥得閒皆可運用或時
以指甲捻痲處捻之覺疼使血來朝之意
徧身痹痛外法用火推至尾閭令人以手跪指摩熱
至溫出如汗即愈
行痹須摩湧泉及崑崙相交又背膊處摩熱無論時
刻用此法漸解
手足風痹念膂行通關法或念背再推散四肢去於
骨節疼處想火燒之
濕痹於筋骨疼痛處行發汗法次行通關法
手足不仁目轉膀輪井氣海夜翻背水瀉崑崙徧身
汗出四肢痿要在勤行是妙功還宜兩足交相擦更
有三陰穴處同

醫案

史記倉公傳曰齊王故爲陽虛侯時病甚衆醫皆以
爲蹙臣意診脈以爲痹根在右脅下大如覆杯令人
喘逆氣不能食臣意即以火齊粥且飲六日氣下即
令更服九藥出入六日病已病得之內診之時不能
識其經解大識其病所在
唐書許引宗傳引宗仕陳爲新蔡王外兵參軍王太
后病風不能言脈沉難對醫家告術窮引宗曰餌液
不可進即以防風黃芪煮湯數十斛置牀下氣如霧
熏薄之是夜語
儒門事親曰鄜城梁賈人年六十餘忽曉起梳髮覺
左手指痲斯須半臂痲又一臂痲斯須頭一半痲比
及梳畢從脅至足皆痲大便二三日不通往問他醫
皆云風也或藥或鍼皆不解求治於戴人戴人曰左
手三部脈皆伏比右手小三倍此枯濕痹也不可純
歸之風亦有火燥相兼乃命一涌一泄一汗其痲立
已後以辛涼之劑調之濕燥之劑濡之惟小指次指
尚痲戴人曰病根已去此餘烈也方可鍼谿谷谿谷
者骨空也一日晴和往鍼之用靈樞中雞足法向上
臥鍼三進三引訖復卓鍼起向下臥鍼送入指間皆
然手熱如火其痲全去昔劉河間作原病式常以痲
與濕同歸燥門中眞知病機者也
常仲明病濕痹五七年戴人涌之後瀉五七次其藥
則舟車滾川通經神祐益腎自春及秋必十餘次方
能愈公之病不必鍼灸與令嗣皆宜涌但臘月非其
時也欲候春時恐亭東適今姑屏病之大勢至春和
時人氣在上可再涌之以去其根卒如所論矣
一稅官風寒濕痹腰腳沉重浮腫夜則痛甚兩足惡
寒經五六月間猶綿靴靴足膝皮膚少有跳露則冷
風襲入流入經絡其病轉劇走注上下往來無定其
痛極處便攣極而腫起肉色不變腠理如蟲行每遇
風冷病必轉增肌體瘦乏須人扶稍能行立所服者
烏附薑桂種種燥熱燔鍼著灸莫知其數前後三年
不愈一日余脈之其兩手皆沉滑有力先以導水丸
通經散各一服是夜瀉三十餘行痛減半漸服赤茯
苓湯防風湯此三方在宣明論中治痹方是也日三

服煎七八錢漐漐然汗出余又作玲瓏窗法熏蒸血熱必皆劇諸汗法古方多有之惟以吐發汗者世罕知之故余嘗曰吐法兼汗良以此夫

李杲十書曰杜彦達左手右腿痲木右手大指次指亦常痲木至腕已三四年矣諸醫不效求治明之明之遂製人參益氣湯服二日覺手心熱手指中間如氣滿服三日後覺兩手指中間皮肉如不敢觸似痒痛滿脹之意指上漐漐不敢用手觸之此眞氣漸至矣遂於兩手指甲旁各以三稜針一刺之微見血如黍米許則痹自息又爲處第二第三服之大效

朱宅閫內年近三十食味甚厚性躁急患痛風攣縮數月醫療不應予視之曰此挾痰與氣證當和血疎氣導痰病自安遂以潛行散入生甘草牛膝炒枳殼通草陳皮桃仁薑汁煎服半年而安

鄒鉤六年二十餘因患血痢用澁藥取效後患痛風叫號撼鄰予視之曰此惡血入經絡證血受濕熱久必疑濁所下未盡留滯隧道所以作痛經久不治恐成偏枯遂與四物湯加桃仁紅花牛膝黃芩陳皮生甘草煎入生蟲研潛行散入少酒飲之數十貼又與刺委中出黑血近三合而安

一男子年十四歲因感風濕得白虎歷節風證徧身抽掣疼痛足不能履地者三年百方不效身體羸瘦骨立自分於死一日夢以木通湯服愈遂以四物湯加木通服不效後以木通二兩剉細長流水煎汁頓服服後一時許徧身痒甚上體發紅丹如小豆大粒舉家驚惶隨手沒去出汗至腰而止上體不痛矣次日又以前煎服身體又發紅丹方出汗至足底汗乾後遍身舒暢而無痛矣一月後人壯氣復步履如初後以此法治數人皆驗故錄於此以示後學

李正臣夫人病診得六脈俱中得弦洪緩相合按之無力弦在上是風熱下陷入陰中陽道不行其證閉目則滫身痲木晝減而夜甚覺而開目則痲木漸退久則絕止常開其目則此證不作懼其痲木不敢合眼致不得眠身體皆重時有痰嗽覺胃中常似有痰而不利時煩躁氣短促而喘肌膚充盛飲食不減大小便如常惟畏其痲木不敢合眼爲最苦觀其色脈形病相應而不逆內經曰陽盛瞑目而動輕陰病閉目而動重又云諸脈皆屬於目靈樞經云開目則陽道行陽氣徧布周身閉目則陽道閉而不行如晝夜之分知其陽衰而陰旺也且痲木爲風三尺之童皆以爲然細校之則有區別耳久坐而起亦有痲木如爲繩縛之久釋之覺痲作而不敢動良久則自已以此驗之非有風邪乃氣不行治之當補其肺中之氣則痲木自去矣如經脈中陰火乘其陽分火動於中爲痲木也當兼去其陰火則愈矣時痰嗽者秋涼在外在上而作也當以溫劑實其皮毛身重脈緩者濕氣伏匿而作也時見躁作當升陽助氣益血微瀉其火與濕通行經脈調其陰陽則已矣非五臟六腑之本有邪也補氣升陽和中湯主之

衛生寶鑑曰中書左丞張仲謙年五十二歲至元戊辰春正月在大都患風證半身痲木一醫欲汗之未決可否命予決之予曰治風當通因通用汗之可也然北地此時雖交春令寒氣尤存汗之則虛其表必有惡風寒之證仲謙欲速差遂汗之身體輕快後數日再邀予視曰果如君言官事繁劇不敢出門當如之何予曰仲景云大法夏宜汗陽氣在外故也今時陽氣尚弱初出於地汗之則使氣虛奪衛氣失守不能肥實腠理表上無陽見風必大惡矣內經曰陽氣者衛外而爲固也又云陽氣者若天與日失其所則折壽而不彰當汗之時尤有過汗之戒況不當汗而汗者乎遂以黃芪建中湯加白朮服之滋養脾胃生發榮衛之氣又以溫粉撲其皮膚待春氣盛表氣漸實卽愈矣內經曰心不可伐時不可違此之謂也

醫學綱目曰王檢正患鼻額間痛或痲痹不仁如是數年忽一日連口脣頰車髮際皆痛不開口雖言語飲食亦妨在額與頰上常如糊手觸之則痛予作足陽明經絡受風毒傳入經絡血凝滯而不行故也或以排風小續命透髓丹之類與之皆不效予製犀角升痲湯贈之而愈夫足陽明胃也經云腸胃爲市又云陽明多血多氣胃之中腥羶五味無所不納如市廛無所不有六經中此爲血氣俱多者能腐熟飲食故其毒聚焉此方以犀角爲主解飲食之毒也陽明經絡環脣挾舌起於鼻合頞中循頰車上耳前過客主人循髮至額顱王公所患皆一經絡故以升痲佐之餘藥皆滌除風熱升痲黃芩專入胃

歙州一貴家婦病徧身走注疼痛夜則發如蟲嚙其肌多作鬼邪治曰此正歷節病也以麝香九三服愈薛己醫案曰大尹劉孟春素有痰兩臂頑痲兩目流淚服祛風化痰藥痰愈甚臂反痛不能伸手指俱攣余曰痲屬風虛誤服前藥肝火熾盛肝血乾涸筋無所養故虛攣耳當補脾肺滋腎水則風自息熱自退

痰自清遂用六味地黃丸補中益氣湯三月而痊

知州韓廷儀先患風證用疎風化痰養血之藥而痊其腿膝骨內發熱作痛服十味固本丸天麻丸益甚兩尺脈數而無力余以爲腎水虛不能生肝木虛火內動而作非風邪所致也不信又服羌活愈風丹之類四肢痿軟偏身麻木痰涎上湧神思不清余曰皆脾氣虧損不能營養周身又不能歸源先用六君子加芎歸木香數劑壯其脾氣以攝涎歸源又以八珍湯數劑以助五臟生化之氣以榮養周身而諸證漸愈乃朝以補中益氣湯培養脾肺夕以六味地黃丸滋補肝腎如此三月餘而安

一婦人肢節作痛不能轉側惡見風寒自汗盜汗小便短少雖夏亦不去衣其脈浮緊此風寒客於太陽經用甘草附子湯一劑而瘥

秀才劉允功形體魁梧素不愼酒色因勞怒氣頭運仆地痰涎上湧手足痲痹時或面赤口乾引飲大脈洪而無力甚數余曰肺主氣腎藏氣今腎虛不能納氣歸源陽獨居上故作頭運又不能攝水歸源飲停於中故化而爲痰陽氣虛熱而痲痹虛火上炎而作渴當滋化源用補中益氣合六味地黃丸料一服而愈後勞役或入房即作用前藥隨愈

一婦人元氣素虛勞則體痲發熱痰氣上攻或用烏藥順氣散祛風化痰丸之類肢體痿軟痰涎自出面色痿黃形體倦怠而脾肺二脈虛甚此虛而類風也朝用補中益氣湯夕用十全大補湯漸愈又用加味歸脾湯調理尋愈

一男子飲食勞倦而發寒熱右手麻木或誤以爲疔毒敷服皆寒凉敗毒腫脹重墜面色痿黃肢體倦怠六脈浮大按之如無此脾胃之氣虛也詢之果是銷銀匠因熱手入水梅銀寒凝隧道前藥益傷元氣故耳遂用補中益氣及溫和之藥煎湯漬手而愈

太宜人年七十五遍身作痛筋骨尤甚不能伸屈口乾目赤頭眩痰湧胃膈不利小便赤濇而短少夜間痰熱殊甚遍身作痒如蟲行此肝經氣燥而風動也用六味地黃丸料加山梔柴胡治之而愈

一男子時瘡愈後遍身作痛服愈風丹半身不遂痰涎上湧夜間痛甚此風客淫氣治以地黃丸而愈

一老婦兩臂不遂語言蹇澁服祛風之藥筋攣骨痛此因風藥虧損肝血用八珍湯補氣血用地黃丸補腎水乃佐以愈風丹而愈

州判蔣大用形體魁偉中滿吐痰勞則頭運指痲所服皆清痰理氣藥余曰中滿者脾氣虧損也痰盛者脾氣不能運也頭運者脾氣不能升也指痲者脾氣不能周也遂以補中益氣加茯苓半夏以補脾土用八味地黃以補土母而愈後惑於乾坤生意方云凡人手指痲軟三年後有中風之疾可服搜風天麻二丸以預防之乃朝餌暮服以致大便不禁飲食不進而歿

錦衣楊永興形體豐厚筋骨軟痛痰盛作渴喜飲冷水或用愈風湯天麻丸等藥痰熱益甚服牛黃清心丸更加肢體痲痹余以爲脾腎俱虛用補中益氣湯加減八味丸三月餘而瘥已後連生七子壽踰七旬

外科精要云凡人久服加減八味丸必肥健而多子信哉

一婦人善怒舌本强手痲痹余曰舌本屬土被木剋制故耳當用六君子加柴胡芍藥治之

醫宗必讀曰文學陸文湖兩足痲木自服活血藥不效改服攻痰劑又不效經半載後兩手亦痲左脅下有尺許不知痛癢余曰此經所謂著痹也六脈大而無力氣血皆損用神效黃芪湯加茯苓白朮當歸地黃十劑後小效更用十全大補五十餘劑始安

孝廉王春卿久患流火靡藥弗瘳病勢日迫商之余曰尚可療否余曰經年之病且痛傷元氣非大補血氣不可卿曰數月前曾服參少許痛勢大作故不敢用余曰病有新久之不同今大虛矣而日從事於散風清火清火則脾必敗散風則肺必傷言之甚力竟不能決遂致不起

鹽賈葉作舟遍體疼痛尻髀皆腫足膝攣急余曰此寒傷營血筋脈爲之引急內經所謂痛痹也用烏藥順氣散七劑而減更加白朮桂枝一月而愈

古今醫鑑曰一婦人患骨節疼痛嘔吐心痛脅脹遍身浮腫經年不愈以五積散全料加羌活獨活柴胡而愈

寒門一

黃帝素問

生氣通天論

陽氣者若天與日失其所則折壽而不彰故天運當以日光明是故陽因而上衛外者也因於寒欲如運樞起居如驚神氣乃浮

註人之陽氣如天與日然生於至陰由樞轉而外出風寒之邪皆始傷皮毛氣分是故因於寒而吾身之陽氣當如運樞以外應陽氣司表邪客在門故起居如驚而神氣乃浮出以應之神氣神臟之陽氣也

開闔不得寒氣從之乃生大僂陷脈爲瘻留連肉腠俞氣化薄傳爲善畏及爲驚駭榮氣不從逆於肉理乃生癰腫

註開者一日而主外闔者暮而收引也如失其開闔之機則寒氣從而內薄矣背爲陽陽虛則寒邪痹閉於背而形體爲之俯僂金匱所謂痹俠背行是也如陽虛不能爲榮血之衛邪陷於脈中而爲瘻留連於肉腠之間金匱所謂馬刀俠癭是也如經俞之氣化虛薄則傳入於內而干及臟神矣心主脈神傷則恐懼自失肝主血故其病發驚駭也如邪逆於肉理氣分而陰陽不和則生癰腫

冬傷於寒春必病溫

註冬傷於寒邪不即發寒氣伏藏春時陽氣外出邪隨氣而化熱發爲溫病

寒傷形

註陽化氣陰成形寒則陰甚故傷形

寒勝則浮

註寒氣傷陽故神氣乃浮也

通評虛實論

帝曰寒氣暴上脈滿而實何如岐伯曰實而滑則生實而逆則死

註腎臟主水在氣爲寒寒氣暴上者水寒之氣暴上而滿於脈也實而滑者得陽明之氣相和故生逆者少陰之生氣已絕故死

逆調論

帝曰人身非衣寒也中非有寒氣也寒從中生者何岐伯曰是人多痹氣也陽氣少陰氣多故身寒如從水中出

註身非衣寒表無寒也中非有寒氣裏無寒也寒從中生者謂寒從陰中而生也陽氣少而陰氣多者因是人多痹氣故也病在陰者名曰痹寒濕之氣閉於裏陽則火熱不得下交於陰而陰氣盛陰氣盛則陽氣少而陰寒之氣過多故身寒如從水中出蓋寒出於陰水故如從水中出

氣厥論

腎移寒於肝癰腫少氣（肝當作脾）

註脾主肌肉寒氣化熱則腐肉而爲癰膿脾統攝元眞之氣脾臟受邪故少氣也

脾移寒於肝癰腫筋攣

註肝主血寒則血凝泣經曰榮氣不行乃發爲癰肝主筋故筋攣也

肝移寒於心狂隔中

註肝爲陽臟而木火主氣陽并於陽故狂心居膈上肝處膈下母子之氣上下相通肝邪上移於心留於心下故爲膈中

心移寒於肺肺消肺消者飲一溲二死不治

註肺受心邪則不能通調水液而惟下洩矣肺爲金水之原寒隨心火消爍肺精是以飲一溲二者肺液并消故爲不治之死證

肺移寒於腎爲涌水涌水者按腹不堅水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裹漿水之病也

註腎爲水臟肺主生原是以肺之寒邪移於腎下則腎之水氣上涌於肺水氣客於大腸疾行則鳴濯濯有聲如以囊裹漿者水不沾濡流走腸間也

舉痛論

岐伯曰寒氣客於脈外則脈寒脈寒則縮蹙縮蹙則脈絀急則外引小絡故卒然而痛得炅則痛立止因重中於寒則痛久矣

註寒則血凝泣故脈縮蹙縮蹙則絀急而外引小絡外內引急故卒然而痛脈寒而得陽熱之氣則縮絀卽舒故其痛立止若復感於寒則陽氣受傷故痛久而不止

寒氣客於經脈之中與炅氣相薄則脈滿滿則痛而不可按也寒氣稽留炅氣從上則脈充太而氣血亂故痛甚不可按也

註寒邪在脈與陽氣相搏則血氣淖澤而脈滿矣脈滿故痛而不可按也寒氣稽留於脈中陽氣惟升而從上血氣不能相將而循行則亂矣

寒氣客於腸胃之間膜原之下血不得散小絡急引故痛按之則血氣散故按之痛止

註寒氣客於腸胃膜原之間則內引小絡故痛也夫痛者陰也氣爲陽經絡爲陰邪在膜原之氣分牽引小絡而痛故按之卽止

寒氣客於俠脊之脈則深按之不能及故按之無益也

註俠脊之脈伏衝之脈也伏衝之脈上循背裏邪客之則深按之不能及故按之無益也

寒氣客於衝脈衝脈起於關元隨腹直上寒氣客則脈不通脈不通則氣因之故喘動應手矣

註衝脈之循於背者注於經其浮而外循於腹者至胷中而散於脈外之氣分故脈不通則氣因之而喘動應手謂脈逆於胷之下而氣因病於胷之上喘動應手者人迎氣口喘急應手也

寒氣客於背俞之脈則脈濇脈濇則血虛血虛則痛其俞注於心故相引而痛按之則熱氣至熱氣至則痛止矣

註背俞之脈者足太陽之脈也臟腑之血氣皆注於俞故寒客之則脈濇而血虛血虛則痛矣夫心主血脈五臟六腑之俞皆注於心故相引心而痛心爲陽中之太陽蓋與太陽之氣標本相合是以按之則熱氣至而痛止矣

寒氣客於厥陰之脈厥陰之脈者絡陰器繫於肝寒氣客於脈中則血濇脈急故脅肋與少腹相引痛矣

註肝主血故寒客於厥陰之脈則血濇脈急肝脈布脅肋循陰氣則脅肋與少腹相引而痛

厥陰客於陰股寒氣上及少腹血濇在下相引故腹痛引陰股

註厥陰之脈上抵少腹下循陰股故腹痛引陰股蓋經氣上下相通故邪正相引而爲痛

寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血濇不得注於大經血氣稽留不得行故宿昔而成積矣

註邪在外內之絡脈者必轉入於大經而後乃代謝如血氣稽留於絡脈則宿昔而成積矣

寒氣客於五臟厥逆上泄陰氣竭陽氣未入故卒然痛死不知人氣復反則生矣

註寒氣客於五臟厥陰之氣厥逆於上而從上泄則陰氣內竭矣陽熱之氣未入於內則裏氣虛傷故卒然痛死得陰陽之氣復反於內則生矣

寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也

註寒氣客於腸胃之間從胃上出故痛而嘔

寒氣客於小腸小腸不得成聚故後泄腹痛矣

註寒氣客於小腸之間轉入於腸內故不成積聚而爲後泄腹痛也

氣穴論

積寒留舍榮衛不居踡肉縮筋肋肘不能伸內爲骨痹外爲不仁命曰不足大寒流於谿谷也

註積寒留舍致榮衛不能居其間寒邪凝滯又不得正氣以和之以致肉卷而筋縮也肋肘乃筋骨之機關故不得伸舒邪閉於外故內爲骨痹榮衛內逆故外爲不仁命曰不足蓋熱邪淫溢是屬有餘寒性凝滯故爲不足此大寒之邪流於谿谷之間以致筋骨皆爲病也

調經論

帝曰陰盛生內寒奈何岐伯曰厥氣上逆寒氣積於胷中而不瀉不瀉則溫氣去寒獨留則血凝泣凝則脈不通其脈甚大以濇故中寒

註厥氣上逆下焦之陰氣厥逆於上也陰寒之氣積於胷中而不瀉則中上二焦之陽氣消而寒氣獨留於上寒則血凝泣而脈不通矣陰盛則脈大血凝泣故脈濇也陽熱去而寒獨留故中寒也

標本病傳論

先寒而後生病者治其本先病而後生寒者治其本

註先寒者寒淫所勝也以吾身感之而生病者是當治其寒邪如先病而後生寒者當治其身之本病而寒氣自解矣

氣交變大論

歲水太過寒氣流行邪害心火民病身熱煩心躁悸陰厥上下中寒譫妄心痛寒氣早至

註六丙歲水運太過寒氣流行故邪害心火寒氣上乘迫其火氣外炎故身熱心煩心悸者水氣上凌於心也躁者火氣不交於陰也陰氣寒甚故厥逆於上上下中寒者三焦之火衰也心神不寧故譫妄也寒主冬令此歲氣流行故寒氣早至

歲火不及寒迺大行復則病驚瘧腹滿食飲不下寒中腸鳴泄注腹痛暴攣痿痹足不任身上應鎮星辰星

註六癸歲歲火不及水反勝之故寒乃大行驚瘧腹滿足不任身皆寒濕之證蓋水寒太甚而又濕土復之故爲此諸病也

六元正紀大論

太陽司天之政三之氣寒氣行民病寒反熱中瘧疽

注下心熱瞀悶不治者死

註 司天寒水之氣加臨於三氣而寒氣行夏時應熱而反爲寒氣加臨故民病寒而內反熱癰疽瞀悶皆火鬱之病不治將自焚矣

太陰司天之政終之氣寒大舉感於寒則病人關節禁固腰脽痛

註 終之主客乃在泉寒水之氣故寒大舉腎爲冬藏而主骨關節禁固骨節不利也

厥陰司天之政初之氣寒始肅民病寒於右之下

註 初之氣乃陽明清金司令故寒始肅民病寒於右之下謂陽明之間氣在在泉少陽之右也

水鬱之發陽氣乃辟陰氣暴舉大寒乃至民病寒客心痛腰脽痛大關節不利屈伸不便善厥逆痞堅腹滿

註 關節屈伸乃筋骨之病腎主骨而筋屬於節也厥逆痞堅腹滿者陽氣下藏中氣塞也

至眞要大論

太陽司天寒淫所勝則寒氣反至民病厥心痛嘔血血泄鼽衄善悲時眩仆胷腹滿手熱肘攣掖腫心澹澹大動胷脅胃脘不安面赤目黃善噫嗌乾甚則色炲渴而欲飲病本於心神門絕死不治

註 寒氣反至者謂太陽爲諸陽之首即君火之陽嘔血鼽衄腹滿乃陽熱中盛之證如心痛眩仆面赤目黃色炲善噫乃寒凌心火逼其火熱上炎水火寒熱交爭而神門脈絕心氣滅矣

太陽之勝凝凜且至痔瘧發寒厥入胃則內生心痛陰中乃瘍隱曲不利互引陰股筋肉拘苛血脈凝泣絡滿色變或爲血泄皮膚否腫腹滿食減熱反上行頭項囟頂腦戶中痛目如脫寒入下焦傳爲濡瀉

註 太陽寒水氣勝故凝凜且至痔瘧者太陽寒熱之邪也厥逆而入於胃者水侮土也胃絡上通於心故心痛也陰中乃瘍是以隱回不利而互引陰股足太陽主筋故筋肉拘苛也血脈凝泣絡滿色變或爲血泄邪入於經也皮膚否腫者太陽之氣主表也腹滿食減者水氣乘脾也熱反上行者太陽經脈起於目內眥故目如脫寒入下焦者太陽標陽而本寒是以陽熱上行而陰寒下行也

太陽司天客勝則胷中不利出清涕感寒則欬主勝則喉嗌中鳴

註 太陽之氣在表而肺主皮毛是以受司天之客氣即爲胷中不利出清涕而欬

諸病水液澄澈清冷皆屬於寒

註 此五臟之氣發見於形氣也

靈樞經

經脈篇

凡診絡脈脈色青則寒且痛胃中寒手魚之絡多青矣

註 凡診絡脈色青則寒蓋浮絡之血氣皆見於皮之部胃中寒手魚之絡多青蓋皮絡之氣血本於胃腑所生從手陽明少陽注於尺膚而上魚也

師傳篇

黃帝曰便病人奈何岐伯曰夫中熱消痹則便寒寒中之屬則便熱胃中熱則消穀令人懸心善饑臍已上皮熱腸中熱則出黃如糜臍以下皮寒胃中寒則腹脹腸中寒則腸鳴飧泄胃中寒腸中熱則脹而且泄胃中熱腸中寒則疾饑小腹痛脹

註 便者所以便人之逆也熱者更之寒寒者更之熱也熱中寒中者寒熱之氣皆由中而發內而外也臍以上皮熱者腸中熱臍以下皮寒者胃中寒寒熱外內之相應也

五癃津液別篇

天寒則腠理閉氣濕不行水下流於膀胱則爲溺與氣

註 天寒則腠理閉三焦之氣因濕而不行津水下流於膀胱則爲溺與氣氣化而出者爲溺

論疾診尺篇

掌中寒者腹中寒魚上白肉有青血脈者胃中有寒

註 掌中魚上乃手臂之正面背面爲陽故候形身之外正面主陰故候腰腹腸胃之內

九宮八風篇

風從北方來名曰大剛風其傷人也內舍於腎外在於骨與肩背之膂筋其氣主爲寒也

五色篇

青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒

註 青黑者風寒之色故爲痛黃赤者火土之色故爲熱白者清肅之色故爲寒

漢張機金匱要略

中寒

肺中寒吐濁涕肝中寒者兩臂不舉舌本燥喜太息胷中痛不得轉側食則吐而肝出也心中寒者其人苦病心如噉蒜狀劇者心痛徹背背痛徹心譬如蠱

注其脈浮者自吐乃愈
腹滿時減復如故此爲寒當與溫藥
夫中寒家喜欠其人清涕出發熱色和者善嚏
中寒其人下利以裏虛也欲嚏不能此人肚中寒云一
腹中寒氣雷鳴切痛胷脅逆滿嘔吐附子粳米湯主之
心胷中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上冲皮起出見有頭足上下痛而不可觸近大建中湯主之
脅下偏痛發熱其脈緊弦此寒也以溫藥下之宜大黃附子湯
寒氣厥逆赤圓主之
唐孫思邈千金方

痼冷

凡人中寒者喜欠其人清涕出發熱色和者善嚏凡覘病者未脈望之口燥清涕出善嚏欠此人中寒其人下利以裏虛故也欲嚏不能此人腹中痛畏寒脈沉弦脈雙弦者寒也弦脈狀如張弓弦按之不移脈數弦者當下其寒脈雙弦而遲者心下堅脈大而緊者陽中有陰可下之右手寸口脈弦者即脅下拘急而痛其人濇濇惡寒師曰遲者謂寒濇爲無血寸口脈微尺中緊而濇緊即爲寒微即爲虛澀即爲血不足故知發汗而復下之大露宿丸主寒冷百病
李呆十書

治寒以熱

治寒以熱凉而行之有三北方之人爲大寒所傷其足脛腫乃寒勝則浮也若火炙湯浴必脫毛見骨須先以新汲水浴之則時見完復更有大寒凍其面或耳若近火湯必脫毛成瘡須先於凉處浴之少時以溫水熨烙必能完復此凉而行之除其大寒之理一也大寒之氣必令母實乃地道左遷入肺逆行於天投以凉藥使天道右遷而順天令諸病得天令行而必愈二也況大寒在外其大熱伏於地中者乃三焦包絡天眞之氣所居之根蔕熱伏於中元氣必傷在人之身乃胃也和以凉藥則元氣充盛而不傷三也
朱震亨心法

中寒

中寒宜主乎溫散然有卒中天地之寒氣者有口得寒物者
從補中益氣湯中加發散藥屬內傷者十居八九其法邪之所湊其氣必虛只用前湯中從所見之證出入加減必先用參芪托住正氣氣虛甚者少加附子以行參芪之功如果氣虛者方可用此法
胃氣大虛必當溫散理中湯相宜甚者加附子
倉卒感受大寒之氣其病即發非若傷寒之邪循經以漸而深也已上治法宜用於南不宜北
正治溫散宜桂枝湯四逆湯輩甚者三建湯霹靂散
從治用熱藥加凉劑引之或熱藥須俟冷飲最妙經曰從而逆之此之謂也若反攻用烏頭煎之類
明戴思恭證治要訣

中寒

中寒之證身體强直口噤不語或四肢戰掉或洒洒惡寒或翕翕發熱或卒然眩運身無汗者此爲寒毒所中宜先用酒調蘇合香丸輕則五積散加香附一錢麝香少許重則薑附湯若人漸甦身體回暖稍能言語須問其別有何證挾氣攻刺薑附湯加木香半錢挾氣不仁加防風一錢挾濕腫滿者加白朮一錢筋脈牽急者加木瓜一錢肢節疼痛者加桂二錢
李梴醫學入門

中寒

傷寒循經漸入中寒不問冬夏或當風取凉或坐地受冷肅殺之氣自皮膚卒入臟腑昏倒四肢拘攣强直厥冷與中風相似牙緊四肢不動爲異耳急用葱餅熨臍并灸氣海手足溫煖則生如極冷臂青厥逆無脈舌卷囊縮者須臾死若倉卒難分經絡急煎薑附理中救之次審中脘疼痛中太陰者理中湯脈沉足冷中少陰者四逆湯加吳萸或腹疼痛五積散加吳萸小腹疼痛中厥陰者當歸四逆湯加吳萸或五味子如陰盛煩躁熱藥冷飲或加些凉藥爲引溫中散冷補煖下元陽氣復而寒自消矣切忌吐下
西北苦寒中傷者多東南溫和中傷者少尋常感冒表證見者九味羌活湯芎芷香蘇散寒入腸胃者霍亂轉筋洞泄下利乾嘔吐逆藿香正氣散或五積散挾食停痰者人參養胃湯夏秋暴寒折熱於裏者調中湯微下之凡帶漏遺精痰瘧疝瘕脚氣腰膝冷虛勞陰痿諸痛皆寒也挾痰眩運不仁挾濕四肢腫痛內傷勞役感寒困倦補中益氣湯加薑附如內傷生冷感寒腹痛脈脫附子理中湯如內傷房室感寒厥冷四逆湯脈脫三建湯煉臍法
龔信古今醫鑑

中寒

中寒者寒邪直中三陰也寒爲天地殺厲之氣多由氣體虛弱之人或調護失節衝斥道途一時爲寒氣所中則昏不知人口噤失音四肢强直拘急疼痛者先用熱酒薑汁各半盞灌服稍醒後用理中湯

如寒中太陰則中脘疼痛宜理中湯或加藿香正氣散同服寒甚脈沉細手足冷者附子理中湯

寒中少陰則臍腹疼痛宜五積散加吳茱萸寒甚脈沉細手足冷者四逆湯加吳茱萸

寒中厥陰則少腹疼痛宜當歸四逆湯加吳茱萸甚者倍附子此中寒比傷寒九甚若不急治死在旦夕

冷極臂青厥逆無脈陰囊縮者急用葱熨法或吳茱萸熨法并艾灸臍中與氣海關元二三十壯佳

中寒雖燥熱煩渴可煎理中湯水中頓冷服之此寒因寒用之法也若以寒凉治之立死

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百五十卷目錄
醫部彙考二百三十
寒門二
王肯堂證治準繩 中寒
喻昌醫門法律 傷寒論 律三條 包括大綱 證治
張介賓景岳全書 論寒病證治
方 麻黃湯 桂枝湯 葛根湯 白通湯 白通加人尿豬膽汁湯 通脈四逆湯 四逆湯 四逆加人尿豬膽汁湯 大建中湯 吳茱萸湯 赤石脂禹餘糧湯 桂附八物湯 附子湯 二氣丹 參附丹 金液丹 附子散 二氣湯 大已寒丸 正元飲 理中丸 參附湯 姜桂湯 不換金正氣散 藿香正氣散 胃苓湯 平胃散 五味異功散 六味回陽飲 十味溫肺湯
醫案

明王肯堂證治準繩

中寒

中寒之證身體强直口噤不語或四肢顫掉或洒洒惡寒或翕翕發熱或卒暴運身無汗者此寒毒所中也其異於傷寒何也曰傷寒發熱而中寒不發熱也仲景於傷寒詳之而中寒不成熱者未之及何也曰陽動陰靜動則變生靜則不變寒雖陰邪既鬱而成熱遂從乎陽動傳變不一靡有定方故極推其所之之病不得不詳也其不成熱者則是邪中於陰形之中一定而不移不變不變則止在所中寒處而生病是故略而不必詳也治之先用酒調蘇合香丸輕則五積散加香附一錢麝香少許重則用薑附湯若人漸甦身體回煖稍能言語須臾問其別有何證寒脈遲緊挾氣帶洪攻刺作痛附子理中湯加木香半錢挾風帶浮腫運不仁加防風一錢挾濕帶濡腫滿疼痛加白朮一錢筋脈牽急加木瓜一錢肢節疼痛加桂一錢亦可灸丹田穴以多爲妙大抵中在皮膚則爲浮中在肉則爲苛爲重爲聚液分裂而痛或痛在四肢或痛在胃脘或痛在腰背或痛在小腹引睾或經脈引注臟腑之腹原爲心腹痛或注連於臟腑則痛死不知人中於筋骨爲筋攣骨痛屈伸不利中入六腑五臟則仲景述在金匱要略中所以肺中寒者吐濁涕肝中寒者兩臂不能舉舌本燥喜太息胃中痛而不得轉側則吐而汗出也心中寒者其人苦心如噉蒜狀劇者心痛徹背背痛徹心譬如蟲注其脈浮者自吐乃愈不言脾腎二藏中寒者缺文也然所謂中臟者乃中五臟所居畔界之郭內阻隔其經臟氣不得出入故病若眞中臟則死矣

永類鈐方云肝中寒其脈入迎井右關緊而弦其證惡寒發熱面赤如有汗胃中爲下擊急足不得伸心中寒者其脈入迎井左寸緊而洪其證如噉蒜薑甚則心痛徹背惡寒四肢厥自吐昏塞不省脾中寒其脈入迎井右關緊而沉其證心腹脹四肢攣急噯噫不通臟氣不傳或祕或泄肺中寒其脈入迎井右寸緊而濇其證善吐濁氣短不能報息洒洒而寒吸吸而咳腎中寒其脈入迎井左尺緊而滑其證色黑氣弱吸吸少氣耳聾腰痛膝下拘疼昏不知人治當審微甚甚則以薑附湯爲主微則不換金正氣散加附子附子五積散腹痛四肢厥附子理中湯薑附湯入肝加木瓜入肺加桑皮入脾加木入心加茯苓

醫門法律 臣喻昌 著 井序

風寒暑濕燥火六氣分配手足六經百病之生莫不由之軒岐論列要在於此然原始上古經文先師僅季貸所傳每思洪荒初闢結繩紀事書從何來豈光音天化生世界早有天醫降下乎抑仰求大自在天而得之乎然而醫藥者上天之載也窮理盡性至命首推醫學矣去古漸遠無階可升日取內經讀之其端緒或有或無有者可求無者將何求耶君相二火及燥氣未曾深及即寒之一氣賴先聖張仲景推演傷寒中寒爲二論不知中寒論何以不入金匱之藏至晉初即無可搜求並其弟子衛沈四逆三部厥經亦亡從未有老醫宿學記載一語晉人之淺於譚醫豈待問哉設使晉代仙醫許旌陽爲推川之流仰遡丹臺紫府大自在天之藏得其原論亦未必爲當世之所好矣昌既常論傷寒論不揣凡駕癈欲擬議仲景傳世之文以窺見不傳之一班後及內經之風熱暑濕井燥火缺略百病傳訛綿力任重老而不休志非不苦但以從不見聞之說定爲率由坦道按劒而詫不祥在所不免然十百中豈無二三知己取其大關

略其小失乎見爲是者因其是暢發奧旨見爲非者因其非另堅偉議總不肯安上世至今相沿之黯汶而必欲耀之光明有仲景表章內經於前有諸君子表章內經金匱於後昌於後輩中如雜劇登場漫引其端要不謂非箇中人物也且昌數十載寤寐誠求纔脫凡身必承提命此番公案尚有待於再來云

陰病論

太極動而生陽靜而生陰陽動而不息陰靜而有常二氣交而人生二氣分而人死二氣偏而病起二氣乖而病爲聖神憂之設爲醫藥調其偏駁使歸和平而民壽已未覩於生氣通天論中論人身陽氣如天之與日失其所則折壽而不彰是雖不言陰病而陰病之槩宛然可識但三皇之世如春陽和司令陰靜不擾所以內經凡言陰病但啓其端弗竟其說厥後國政乖訛陽舒變爲陰慘天之陽氣閉塞地之陰氣冒明冒明者以陰濁而冒蔽陽明也百川沸騰山冢崒崩高岸爲谷深谷爲陵詩言之矣民病因之橫天宏多究其識其所以橫天之故漢末張仲景著傷寒論十卷治傳經陽病著卒病論六卷治暴卒陰病生民不幸卒病論當世卽已失傳豈非其時賢士大夫莫能深維其義金匱玉函置而弗收其流布民間者悉罹兵火之厄耶仲景已後英賢輩出從未有闡揚其烈者惟韓祇和於中寒一門微有發明海人以用附子乾薑爲急亦可謂仲景之徒矣然自有醫以來祇道其常仲景兼言其變陀而按劍勢所必至越千百年祇和草澤一家之言已不似仲景登高之呼兒有丹溪師心者緒紳先生多主貴陰賤陽立說曰陽道饒陰道乏曰陽常有餘陰常不足曰陰氣難成易虧故早衰製爲補陰等丸畸重乎陰畸非至理弟於此道依樣葫蘆未具隻眼然世醫莫不奉以爲宗卽使卒病論傳之至今亦與傷寒論同其悠悠汶汶也已陸乎化日舒長太平有象亂離愁慘殺運繁興救時者儻以貴陰賤陽爲政敎必國非其國治病者倘以貴陰賤陽爲藥石必治乖其治矣豈通論哉昌尚論仲景傷寒論於凡陰病見端嘗以回陽爲急者一一表之吾儕已駭駭知所先矣今欲幷庋金匱暢言底裏易曰通乎晝夜之道而知夫晝爲陽晷陰契不潛伏夜爲陰羣陰得以現形諸鬼爲之夜食一切山精水怪揚氛吐焰伎倆無窮比雞鳴則盡隱矣蓋雞鳴夜雖未央而時則爲天之陽也天之陽開故長夜不至漫漫而將旦也陰病之不可方物此見一斑而誰爲燃犀之照也哉佛說四百四病地水火風各居其一是則四百四病皆爲陰病矣夫水火木金土在天成象在地成形原不獨畸於陰然而五行皆附地而起水附於地而水中有火火中有風人所以假合成身身所以相因致病率禀四者金性堅剛不受抑合故四大惟金不與證無生者必修西方佛土有由然也世人但知地氣靜而不擾偶見地動便駭爲異不知地之小動則爲災眚大動則爲劫厄劫厄之來天地萬物凡屬有形同歸於壞然地氣有時大動而世界得不速壞者則以元天眞武坐鎮北方攝伏龍蛇不使起陸以故地動而水不動水不動而水中之火火中之風自不動也仲景於陰盛亡陽之證必用眞武湯以救逆者非以此爭至於戊亥混茫亦非天翻地覆互相混也天原不混於地乃地氣加天而混之耳蓋地水火風四輪同時轟轉雷霆冲射之威千百億道震盪於五天之中頃之攪毀太空混爲一區而父母所生血肉之軀其陰病之慘烈又當何如禪宗有白浪滔天劫火同然大千俱壞等語豈非四大解散之時實有此象乎究竟地氣之加於天者止加於欲界色界等天不能加於無色界天所以上八景中切利天宮萬聖朝眞兜率內院諸天聽法各各身除中陰頂現圓光由此直接非想非非想天而入佛界法界覩大千世界若掌中一珠矣更何劫運可加之耶劫運所加之天至于而閒陰氣下而高覆始露至丑而陰氣盡返於地而太空始廓兩儀分奠厥位日月星辰麗乎天華嶽河海附乎地五天之氣散布於列曜九地之氣會通乎山澤以清以寧曰大曰廣庶類以漸萌生而天界陳中所餘業惡濁陰動輒綿亘千萬丈排空直墜摧殘所生靡有孑遺天開地闢以後陰慘餘殃尚若此其可畏必至寅而駁劣悉返沖和天光下濟地德上乘名木嘉卉纍纍垂實光音天人下食其果不復升衆因得施生乃至繁衍而成天地人之三界也此義關係人身性命病機安危最宏最鉅儒者且置爲不論不議醫者更蔑聞矣昌每見病者陰邪橫發上干清道必顓畏寒腹痛下利上嘔自汗淋漓肉瞤筋惕等證卽忙把住關門行眞武坐鎮之法不使龍雷升騰霄漢一遵仲景已傳之祕其人獲安倘失此不治頃之濁陰從胃而上入者咽喉腫痺舌脹瞶窒濁陰從背而上入者頸筋粗大頭

項若冰轉盼渾身青紫而死謂非地氣加天之刼厄乎惟是陡進附子乾薑純陽之藥亟驅陰邪下從陰竅而出非與迅埽陰之氣還返地界同義乎然必盡驅陽際之陰不使少留乃得功收再造非與一洗天界徐氛俾返沖和同義乎會仲景意中之法行之三十年治經百人凡遇藥到莫不生全雖曰一時之權宜即擬爲經常之正法可也醫學缺此誠爲漏義謹立鄙論以開其端後有作者出其廣大精微之蘊是編或有可採云爾

卒中寒者陽微陰盛最危最急之候經曰陰盛生內寒因厥氣上逆寒氣積於胃中而不泄不泄則溫氣去寒獨留留則血凝血凝則脈不通其脈盛大以濇故中寒內經之言若此今欲會仲景表章內經之意敷陳一二敢辭饒舌乎

經既言陰盛生內寒矣又言外中寒者豈非內寒先生外寒後中之耶經既言血凝脈不通矣又言其脈盛大以濇者豈非以外寒中故脈盛大血脈閉故脈濇耶此中伏有大疑請先明之一者人身衛外之陽最固太陽衛身之前少陽衛身之兩側今不由三陽而直中少陰豈是從天而下蓋厥氣上逆積於胃中則胃寒胃寒則口食寒物鼻吸寒氣皆得入胃腎者胃之關也外寒斬關直入少陰腎臟故曰中寒也此內經所隱而未言者也一者其脈盛大以濇雖曰中寒尚非卒病卒病中寒其脈必微蓋內經統言傷寒中寒之脈故曰盛大以濇仲景以傷寒爲熱病中寒爲寒病分別言之傷寒之脈大要以大浮數動滑爲陽沉濇弱弦微爲陰陽病而見陰脈且主死況陰病卒急必無反見陽脈之理若只盛大以濇二暢一陰亦何卒急之有哉此亦內經所隱而難窺者也

再推仲景以沉濇弱弦微爲陰脈矣其傷寒傳入少陰經則曰脈微細今寒中少陰又必但言脈微不言細矣蓋微者陽之微也細者陰之細也寒邪傳腎其亡陽亡陰尚未可定至中寒則但有亡陽而無亡陰故知其脈必不細也若果見細脈則其陰先已內虧何由而反盛耶

在陽寒證惟少陰有微脈他經則無其太陽膀胱爲少陰之腑纔見脈微惡寒仲景早從少陰施治而用附子乾薑矣蓋脈微惡寒正陽微所至詩云彼月而微此日而微今此下民亦孔之哀在天象之陽且不可微然則人身之陽顧可微哉腎中既陰盛陽微寒自內生復加外寒斬關直中或沒其陽於內滅頂罹殃或逼其陽於外陳駒避舍其人頃刻云亡故仲景以爲卒病也

人身血肉之軀皆陰也父母搆精時一點眞陽先身而生藏於兩腎之中而一身之元氣由之以生故謂生氣之原而六淫之外邪毫不敢犯故謂守邪之神暗室一燈炯然達旦耳目賴之以聰明手足賴之以持行者矣昔人做雪凌寒尋詩訪友猶曰一時之興到至如立功異域嚙雪生還幾會內寒生而外寒中耶故以後天培養先天百年自可常享苟爲不然陽微必至陰盛陰盛愈益陽微一旦外寒卒中而以經常之法治之百中能有一活耶卒病之旨其在斯乎腎中眞陽得水以濟之留戀不脫得土以堤之蟄藏不露除施泄而外屹然不動而手足之陽爲之役使流走周身固護腠理而悍衛於外而脾中之陽法天之健消化飲食傳布津液而運行於內而胃中之陽法日之馭離照當空消陰除噎而宣布於上此三者豐亨有象腎中眞陽安享太寧故有八十而御女生子餘勇可賈者矣即或施泄無度陽痿不用尚可遷延歲月惟在外在上在中之陽衰微不振陰氣乃始有權或膚冷不溫漸至肌鞕不柔衛外之陽不用矣或飲食不化漸至嘔泄痞脹脾中之陽不用矣或當膺阻礙漸至窒塞不開胃中之陽不用矣乃取水土所封之陽出而任事頭面得陽而戴赤肌膚得陽而熠燥脾胃得陽而除中即不中寒其能久乎

寒中少陰行其嚴令埋沒微陽肌膚凍冽無汗而喪神守急用附子乾薑加葱白以散寒加豬膽汁引入陰分然恐藥力不勝凝葱灼艾外內協攻乃足破其堅凝少緩須臾必無及矣此一難也

若其人眞陽素優腠理素疎陰盛於內必逼其陽亡於外魄汗淋漓介項強硬用附子乾薑豬膽汁即不可加葱及炙灼恐助其散令氣隨汗脫而陽無由內返也宜撲止其汗陡進前藥隨加固護腠理不爾恐其陽復越此二難也

用附子乾薑以勝陰復陽者取飛騎突入重圍寒旗樹幟使既散之陽望幟爭趨項之復合耳不知此義者加增藥何和合成湯反牽制雄入之勢必至迂緩無功此三難也

其次前藥中即須首加當歸肉桂兼理其榮以寒邪中入先傷榮血故也不爾藥偏於衛弗及於榮眞病

即不相當邪不盡服必非勝筭此四難也

其次前藥中即須加入人參甘草調元轉餉收功帷幄不爾薑附之猛直將犯上無等矣此五難也

用前藥二三劑後覺其陽明在躬運動頗輕神情頗悅更加黃芪白朮五味白芍大隊陰陽平補不可歇手蓋重陰見眼浪子初歸斯時搖搖靡定怠緩不爲善後必墮前功此六難也

用羣隊之藥以培陰護陽其人即素有熱痰陽出早已從陰而變寒至此無形之陰寒雖散而有形之寒痰阻塞竅隧者無由遽轉爲熱薑附固可勿施其牛黃竹瀝一切寒凉斷不可用若因其素有熱痰妄投寒劑則陰復用事陽必躁擾必墮前功此七難也

前用平補後已示銷兵放馬偃武崇文之意茲後總有頑痰留積經絡但宜甘寒助氣開通不宜辛辣助熱壅塞蓋辛辣始先不得已而用其毒陽既安堵即宜休養其陰何得喜功生事徒令病去藥存轉生他患漫無寧宇此八難也

昌粗陳病槩明告八難良工苦心此道庶幾可明可行矣然鹵莽拘執之輩用法必無成功愚昧鮮識之人服藥必生疑畏謹合陰病論請正明哲祈互相闡發俾卒病之旨坦然率由非生民之厚幸乎

丹溪曰中寒者倉卒受寒其病即發而暴蓋中寒之人乘其腠理疎豁一身受邪難分經絡無熱可散溫補自解此胃之大虛不急治去生甚遠法當溫散理中湯甚者加附子其見解超出尋常矣然又曰有卒中天地之寒氣口傷生冷之物有外感無內傷用仲景法若挾內傷補中益氣湯加發散之藥必先用參芪托住正氣可見丹溪宗尚東垣在仲景宮牆之外未知其宗廟百官之富美也

戴元禮曰中寒是身受肅殺之氣口食冰水瓜果冷物病者必脈沉細手足冷息微身倦雖身熱亦不渴倦言語或遇熱病誤服凉藥輕者至重重者至死在脈數者或飲水者煩躁動搖者皆是熱病寒熱二證若水火也不可得而同治誤則殺人學者愼之按元禮國朝名醫中之翹楚也其於中寒略窺大意未識奧旨且不曰以熱病法治之則死反曰熱病用此藥即死殊失主客然二老外更無有言及中寒者昌又推其登壇建幟之功矣

律三條

凡治陰寒暴病忞用清凉藥者百無一活如此死者醫殺之也

凡治暴寒病胷中茫無眞見雖用辛熱或以漸投或行監制時不待久倏然而逝醫之罪也

凡醫起一陰病者即可免一刼厄天理人事必至之符也其不能起人卒病而求幸免刼厄自不可得世有藹藹吉人其擇術當何如耶

色脈六則

中寒之色必見青者以青乃肝之色也故仲景云鼻頭色青腹中痛苦冷者死謂厥陰挾少陰腎水爲寒寒極則陽亡陽亡則死耳

脣口青身冷爲入臟即死夫五臟治內屬陰主藏精宅神血氣并寒邪而入堵塞之臟眞之精氣不行神機化滅升降出入之道皆絕榮絕則脣口青靈樞曰足厥陰氣絕則脣青肝藏血氣絕則榮絕可知

脈脫入臟即死入腑即愈脫者去也經脈乃臟腑之隧道爲寒氣所逼故經氣脫去其脈而入於內之臟即死入於內之腑即愈也

經曰血氣并走於上則爲大厥暴死上者膻中三焦之腑也又不盡指入臟言矣又如邪客五絡狀若尸厥者以通血脈爲治此但於頭面絡脈所過通其血脈則愈又不盡指入腑言矣可見脈脫入臟入腑者脈之徵也血氣走痹於上者證之徵也參互考訂然後其死其愈可得詳耳

中寒脈散者死蓋脈脫內入脈散外出內入猶有臟腑之分外出則與陽俱亡而不返矣

尺脈遲滯沉細寒在下焦若溫經散寒其人可愈

景岳全書　臣張介賓著

論寒病證治

凡寒病之由於外者或由風寒以傷形或由生冷以傷臟其由於內者或由勞慾以敗陽或由禀賦之氣弱若寒自外入者必由淺及深多致嘔惡脹滿或爲疼痛泄瀉寒由內生者必由臟及表所以戰慄憎寒或由厥逆拘攣總之熱者多實寒者多虛故凡治寒證者當兼察其虛而仍察其臟此不易之法也

凡陰毒寒邪直中三陰者此即傷寒類所謂直中陰經之陰證其倉卒受寒以致身冷戰慄或四體拘攣或心腹疼痛或口噤失音昏迷厥逆或嘔吐蹉臥脈微細或沉緊無神者皆其證也切不可妄用風藥再散其氣但速宜溫中則寒邪自散輕則理中湯溫胃飲甚則四逆湯大溫中飲或附子理陰煎之類主之其有勢在危急脣青囊縮無脈者宜用華佗救陽脫

方急救之或仍灸氣海關元二三十壯但得手足漸溫脈微出者乃可生也一方以胡椒研碎用滾酒泡服外用葱鹽熨法一方用黑豆二合炒熟以酒烹入滾數沸去豆取酒服二椀即愈

寒中太陰則中脘疼痛宜理中湯溫胃飲

寒中少陰則臍腹疼痛宜歸氣飲或五積散加吳萸

寒中厥陰則少腹疼痛宜四逆湯歸氣飲煖肝煎

其有寒中三陰而寒滯不散因致脹滿痛甚者宜暫用排氣飲或韓氏溫中湯先散其滯然後調補之或用五味沉附湯或煖肝煎俱可擇用

生冷內傷以致臟腑多寒或爲疼痛或爲嘔吐或爲泄瀉等證治法隨見各門又或素稟陽臟每多恃强好食生冷茶水而變陽爲陰者治亦同前

稟賦素弱多爲陽衰陰勝者此先天之陽不足或斲喪太過以致命門火衰者此後天之陽失守其證則未冷先寒或手足清厥或身爲寒慄或脾胃不健或肚腹不實或小水頻數或陽道不壯或每多恐畏或眼耳少神是皆陽虛生寒也治宜溫補元氣其微者宜五君子煎理陰煎六氣煎溫胃飲壽脾煎之類擇而用之其甚者宜大補元煎右歸飲右歸丸四味回陽飲六味回陽飲海藏八味地黃丸之類主之

其有脾腎虛寒每多腹痛殞泄腎泄者宜九炁丹一炁丹并於泄瀉門求法治之

方

薑附湯（濟生方）

治五臟中寒口噤四肢强直失音不語或卒然運悶手足厥冷

乾薑炮　附子炮去皮臍各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去滓溫服食前

挾風不仁加防風半兩

兼濕腫滿加白朮半兩

筋脈攣急加木瓜半兩

肢節疼痛加桂心半兩

理中湯（仲景下同）

治太陰中寒

白朮土炒二兩　人參　乾薑炮　甘草炙各一兩

右剉每服五錢水煎服或糊丸桐子大每服八十丸米飲下食前名理中丸加附子各等分名附子理中湯爲丸名附子理中丸治沉寒痼冷

四逆湯

治三陰傷寒裏寒外熱

甘草炙二兩　乾薑一兩　附子一枚生用

右剉每服五錢水煎溫服

白通湯

復陽通脈

葱白四莖　生薑一兩　附子一枚生破八片去皮

右三味以水三升煑取一升去查分溫再服

白通加人尿猪膽汁湯

服白通湯後反厥逆無脈乾嘔而煩者

葱白四莖　乾薑一兩　附子一枚生去皮

人尿五合　猪膽汁一合

右以水三升煑取一升去查內膽汁人尿和令相得分溫再服若無猪膽羊膽亦可

通脈四逆湯

治中寒下利清穀厥逆脈微腹痛而外反熱不惡寒面赤乾嘔咽痛此陰陽相隔元陽欲散也以此主之

甘草炙　乾薑各三兩　附子大者一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煑取一升二合去查分溫再服其脈即出者愈

面色赤者加葱九莖

腹中痛者去葱加芍藥二兩

嘔者加生薑二兩

咽痛者去芍藥加桔梗一兩

利止脈不出者去桔梗加人參二兩

三建湯（丹溪心法下同）

治中寒

大川烏　附子　天雄並炮各等分

右剉每四錢水二盞薑十五片煎服

霹靂散

治中寒

附子一枚半兩者炮熟取出用冷灰培之細研

眞臘茶一大錢爲末

右同和分二服每服水一盞煎六分臨熟入蜜半匙放溫服之

厚朴七物湯 仲景下同

治中寒腹滿發熱脈浮而數飲食如故

厚朴半斤　甘草　大黃各二兩　大棗十枚

枳殼五枚　桂枝二兩　生薑五兩

右七味以水一斗煑取四升溫服八合日三服

嘔者加半夏五合

下利去大黃

寒多者加生薑至半斤

附子粳米湯

治中寒腹痛雷鳴胷脅逆滿嘔吐

附子一枚炮　半夏　粳米各半升　甘草一兩

大棗十枚

右五味以水八升煑米熟湯成去滓溫服一升日三服

大建中湯

治心胷大寒痛嘔不能食腹中寒上冲皮起出見有頭足上下痛而不可觸近

蜀椒二合炒去汗　乾薑四兩　人參二兩

右三味以水四升煑取二升去滓內膠飴一升微火煎取一升半分溫再服如一炊頃可飲粥二升後更服當一日食糜粥溫覆之

大黃附子湯

脅下偏痛發熱其脈緊弦此寒也以此治之

大黃三兩　附子三枚炮　細莘二兩

右三味以水五升煑取二升分溫三服若強人煑取二升半分溫三服服後如人行四五里進一服

赤丸

治中寒厥逆

茯苓　半夏洗各四兩　烏頭二兩炮　細莘一兩

右四味末之內眞朱爲色煉蜜丸如麻子大先食酒飲下二丸日再夜一服不知稍增之以知爲度一方以桂易半夏千金以人參易細莘治證並同

鐵刷湯 衛生寶鑑下同

治上焦寒痰嘔吐不止胷膈不快不下飲食

半夏四錢湯泡　草豆蔻　丁香　乾薑炮

訶子皮各三錢　生薑一兩

右六味㕮咀水五盞煎至二盞半去查分三服無時大吐不止加附子三錢生薑半兩

桂附丸

治冷氣入心卒然心痛或引背脊乍間乍甚經久不差

川烏　黑附子並炮去皮臍各三兩　乾薑炮

赤石脂　川椒去目微炒　桂各二兩

右六味爲末蜜丸如桐子大每服三十丸溫水送下竟至痛處即止若不止加至五十丸以知爲度若早服無所覺至午時再服二十丸若久心痛服盡一劑終身不發

胡椒理中丸

治肺胃虛寒欬嗽喘急嘔吐痰水

胡椒　甘草　萩冬花　蓽茇　良薑　細莘

陳皮　乾薑各四兩　白朮五兩

右九味爲末煉蜜丸如桐子大每服三十丸至五十丸溫湯或鹽酒米飲任下

附子散

治陰證傷寒脣青面黑身背強痛四肢厥冷及諸虛沉寒

附子炮　官桂　當歸　白朮炒各二錢半

乾薑炮　半夏麴各二錢

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾食前服

二氣湯

治一切虛寒痼冷助陽退陰

乾薑二錢　黑附子大者一箇去皮臍炮製半兩

硫黃　肉桂各一分

右研勻水麪糊爲丸如桐子大硃砂二錢爲衣每服三十丸空心煎艾鹽湯送下

二氣丹

治伏暑中寒或內傷冷食中脘痞結嘔瀉不止

硫黃　硝石等分

右爲末同炒黃色研細糯米糊丸梧子大每四十丸井水下

來復丹

治沉寒痼冷

硫黃　硝石各一兩入銚內微火溫炒用柳木不住手攪令陰陽氣相入再研細入　五靈脂　青皮

陳皮各二兩

右爲末次入元精石末一兩及硝黃末和勻酢糊丸豌豆大每三十丸空心米飲下甚者五十丸小兒三五丸或一丸

金液丹 入門

治虛寒吐利日久脾胃虛損手足厥冷精神昏睡

露睛口鼻氣冷身冷脈微自汗小便不禁等證
硫黃將鐵杓熬鎔傾入井水或麻油內後用桑柴灰淋鹼炆七八徧換水去紅暈
右爲末蒸餅丸梧子大每二十丸空心米飲下傷寒陰證不拘丸數

神珠丹 衛生寶鑑

一名離珠丹治下焦虛弱小腹疼痛皮膚燥澀小便自利病機云澄澈清冷皆屬於寒此之謂也
杜仲　萆薢　巴戟各二兩　訶子五箇　龍骨
硃砂另研各一兩　破故紙三兩炒　砂仁半兩
胡桃仁一百二十箇
右九味爲末酒糊丸桐子大硃砂爲衣每服三十丸空心溫酒或鹽湯送下

大已寒丸

治臟腑虛寒心腹疞痛泄瀉腸鳴自利自汗米穀不化手足厥冷
華茇　肉桂各六兩半　乾薑　良薑各十兩
右爲末糊丸如桐子大每服二十粒米飲下食前

附子溫中湯

治中寒腹痛自利米穀不化脾胃虛弱不喜飲食嬾言語困倦嗜臥
乾薑炮　黑附子炮去皮臍各七錢　人參
甘草炙　白芍藥　白茯苓　白朮各五錢
草豆蔻麪裹煨去皮　厚朴薑製　陳皮各三錢
右十味㕮咀每服五錢或一兩水二盞半生薑五片煎至一盞三分去查溫服食前

黑錫丹 入門下同

治脾腎俱虛冷氣刺痛止汗墜痰除濕破癖
黑錫鎔去查　硫黃鎔化水浸各二兩却將錫再鎔化漸入硫黃俟結成一片傾地上去火毒研至無聲爲度後入　附子　故紙　肉豆蔻　小茴香
川楝　陽起石　木香　沉香　胡盧巴各一兩
肉桂五錢
右爲末和勻酒糊丸梧子大陰乾入布袋內擦令光熟每三五十丸空心薑鹽湯或棗湯下婦人艾酢湯下一切冷痰鹽酒下年高有客熱者服之效或加蓯蓉牛膝白朮丁香名接氣丹治眞元虛憊

靈砂

治諸虛痼冷厥逆如神
水銀三兩　硫黃一兩煉成者
右研細糯米糊丸麻子大每五七丸至十五丸空心人參棗湯或鹽湯下

養正丹

升降水火助陽接眞治中寒吐瀉
黑錫丹頭二兩就火微鎔入水銀一兩攪勿令青烟起煙起便走水銀又入硃砂末一兩炒令十分勻和即放地候冷
右爲末糯米糊丸菉豆大每三十丸空心鹽湯下

回陽救急湯 醫鑑下同

治傷寒初起無頭疼無身熱便就惡寒四肢厥冷或過於肘膝或腹痛吐瀉或口吐白沫冷涎或戰慄面如刀刮引衣踡臥不渴脈來沉遲無力即是直中陰經眞寒證不從陽經傳來者
人參　白朮　茯苓　陳皮　半夏　乾薑
肉桂　附子　五味子　甘草
右剉一劑生薑三片水煎服
嘔吐涎沫或小腹痛加鹽炒吳茱萸
無脈者加猪膽汁一匙
泄瀉不止加黃芪升麻
嘔吐不止加生薑汁
倉卒無藥可用葱熨法或灸關元氣海二三十壯使熱氣通其內逼邪出於外以復陽氣稍得甦醒灌入生薑汁然後煎服此湯

熨法

治寒邪直入三陰無頭疼身熱而惡寒腹痛下利清白脣青面黑吐沫口噤或身疼如被杖四肢厥冷上過乎肘下過乎膝引衣踡臥不渴脈來沉遲無力及一切虛寒並能治之
葱細切　麥麩各三升　鹽一升
右用水和勻分作二處炒令極熱重絹包之乘熱熨臍冷更易一包其葱既冷再用水拌炒熱依前用之如大小便不通亦用此法

不換金正氣散 奇效良方下同

解散寒邪
蒼朮泔浸一宿　橘皮　半夏麴　厚朴薑製
藿香各二錢　甘草炙一錢
右作一服水二鍾生薑七片紅棗三箇煎一鍾食前服

薑桂散

溫中散寒
乾薑　良薑各錢半　梓桂　木香　半夏麴

甘草炙各一錢
右作一服水二鍾生薑五片紅棗二箇煎一鍾不拘時服

沉香桂附丸

治中寒心腹冷痛霍亂轉筋等證

附子炮去皮臍　乾薑炮　良薑炒　官桂去皮
茴香炒　川烏頭炮去皮臍剉作小塊子如豆大
吳茱萸湯浸洗炒　沉香
右各一兩爲細末用好酢煑麪糊爲丸如梧桐子大每服五七十丸熟米飲下空腹食前日進二服忌生冷硬物

四味回陽飲 景岳全書下同

治中寒或元陽虛脫危在頃刻者

人參一二兩　炮乾薑　製附子各二三錢
炙甘草一二錢
水二鍾武火煎七八分溫服徐徐飲之

六味回陽飲

治中寒虛陽將脫等證

人參一二兩或數錢　炙甘草一錢　製附子
炮乾薑各二三錢　熟地五錢或一兩　當歸身三錢 如泄瀉或血動者以冬术代之
水二鍾武火煎七八分溫服

理陰煎

此方通治三陰中寒脹滿嘔噦痰飲惡心吐瀉腹痛等證

熟地三五七錢或一二兩　炙甘草一二錢
當歸二三錢或五七錢　乾薑炒黃色一二三錢
或加肉桂一二錢
水二鍾煎七八分熱服此方加附子即名附子理陰煎再加人參即名六味回陽飲治命門火衰陰中無陽等證

單方

中寒腹痛桑椹絹包風乾過伏天爲末每服三錢熱酒下取汗 集簡方

心腹冷痛胡椒三七枚清酒吞之或云一歲一粒 孟詵食療

元臟傷冷用附子炮去皮臍爲末以水二盞入藥二錢鹽葱薑棗同煎取一盞空心服去積冷暖下元肥腸益氣酒食無礙 經驗方

心腹冷痛吳茱萸五合酒三升煑沸分三服 千金方

男婦冷氣香烏散用香附烏藥等分爲末每服一二錢飲食不進薑棗湯下婦人冷氣米飲下 乾坤秘韞

一切冷氣去風痰定遍身疼痛益元氣強力固精益髓令人少病川烏頭一斤用五升大甕鉢子盛以童子小便浸七日逐日添令溢出揀去壞者不用餘以竹刀切作四片新汲水淘七次仍浸之日日換水日足取出焙爲末酒煑麪糊丸菉豆大每服十丸空心鹽湯下少粥飯壓之 經驗方

心腹冷痛冷熱氣不和山梔子川烏頭等分生研爲末酒糊丸梧子大每服十五丸生薑湯下 博濟方

又方二虎丸去積冷補元臟進飲食壯筋骨用烏頭附子合四兩醶酢浸三宿切作片子掘一小坑炭火燒赤以酢三升同藥傾入坑內用盆合之一宿取出去砂土入青鹽四兩同炒赤黃色爲末酢打麪糊丸如梧子大空心冷酒下十五丸婦人亦宜

中寒洞泄生川烏頭一箇木香兩半爲末酢糊丸梧子大每陳皮湯下二十丸 本事方

諸冷極病醫所不治者馬藺子九升洗淨空腹服一合酒下日三服 千金方

心腹冷痛法酢浸至二三年蒜食至數顆其效如神 集簡方

腎邪冷氣力弱者用大茴香六兩分作三分用生附子一箇去皮分作三分第一度用附子一分茴香一分同炒黃出火毒一夜去附子研茴香爲末空心鹽酒下一錢第二度二味各一分同炒存性出火毒以附子去一半留一半同茴香爲末如前服第三度各一分同炒存性出火毒全研爲末如前服之 朱氏集驗方

風冷氣血閉手足身體疼痛冷痲五靈脂二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭一兩半炮去皮爲末滴水丸如彈子大每用一丸生薑酒磨服 本草衍義

脾胃虛冷腹滿刺痛肥狗肉半斤以水同鹽豉煑粥頻食一頓 心鏡

胃冷嘔逆氣厥不通母丁香三箇陳橘皮一塊去白焙水煎熱服 衛生易簡方

中寒腹痛吐利脣青面黑身背強四肢冷脈沉細咽喉不利用滄鹽一斤炒焦大熱布絹二重作囊包裹

盛之證陰勝間或作二包將一包熱熨臍上冷更熨一包尤妙良方

醫案

衛生寶鑑曰至元己巳六月予住夏於上都僉院董彥誠年踰四旬因勞役過甚煩渴不止極飲漳乳又傷冷物遂自利陽鳴腹痛四肢逆冷冷汗自出口鼻氣亦冷六脈如蛛絲時發昏憒衆太醫議之葱熨臍下又以四逆湯五兩生薑二十片連鬚葱白九莖水三升煮至一升去粗涼服至夜半氣溫身熱思粥飲至天明而愈玉機眞藏云脈細皮寒氣少泄利飲食不入此謂五虛粟粥入胃則虛者活信哉魯齋先生聞之嘆曰病有輕重方有大小治有緩急僉院之證非大方從權急治則不能愈也至眞要大論云補下治下制以急急則氣味厚此之謂也

眞定府武德卿年四十六歲至元丙子三月間因憂思勞役飲食失節得病肢體冷口鼻氣亦冷額上涼汗出時發昏憒六脈如蛛絲一醫作風證欲以宣風散下之予因思錢氏小兒論制宣風散謂小兒內傷脾胃或吐或瀉久則風邪陷入胃中而作殮泄散中有結忿傳慢驚以宣風散導去風邪內經云久風爲殮泄正此謂也今德卿形證乃陰盛陽虛苦寒之劑非所宜也內經曰陰氣有餘爲多汗身寒又陰陽應象論云陰盛則身寒汗出身常清數慄而寒寒則厥調經篇亦曰陰盛生內寒岐伯曰厥氣上逆寒氣積於胃中而不瀉不瀉則溫氣去寒獨留故寒中東垣解云此脾胃不足勞役形體中焦營氣受病末傳寒中惟宜補陽遂以理中湯加黑附子每服五錢多用葱白煎羊肉湯取清汁一大盞調服之至夕四肢漸溫汗出少夜深再服翼日精神出六脈生數服而愈嘗記李思順云證者証也病狀於中證形於外凡醫者不看內經不求病源妄意病證又執其方此皆背本趣末之務其誤多矣宜愼思之

泰政商公時年六旬有二元有胃虛之證至元己巳夏上都住時值六月霖雨大作連日不止因公務勞役過度致飲食失節每旦則臍腹作痛腸鳴自利須去一二行乃少定不喜飲食懶於言語身體困倦召予治之予診其脈沉緩而弦參政以年高氣弱脾胃宿有虛寒之證加之霖雨及勞役飲食失節重虛中氣難經云飲食勞倦則傷脾不足而往有餘隨之若歲火不及寒乃大行民病鶩溏今脾胃正氣不足況水必挾木勢反來侮土乃薄所不勝乘所勝也此疾非甘辛大熱之劑則不能瀉水補土雖夏暑之時有用熱遠熱之戒又云有假者反之是從權而治其急也內經云寒淫於內治以辛熱乾薑附子辛苦大熱以瀉寒水用以爲君脾不足者以甘補之人參白朮甘草陳皮苦甘溫以補脾土胃寒則不欲食以生薑草豆蔻辛溫治客寒犯胃厚朴辛溫厚腸胃白茯苓甘平助薑附以導寒濕白芍藥酸微寒補金瀉木以防熱傷肺氣爲佐也不數服效愈

薛己醫按曰大司馬王浚川嘔吐宿滯臍痛甚手足俱冷脈微細用附子理中九一服益甚脈浮大按之而細用參附湯一劑頓愈

陳湖陸佃母久患心腹疼痛每作必胃滿嘔吐厥逆面赤唇麻咽乾舌燥寒熱不時而脈洪大衆以痰火治之屢止屢作迎乙巳春忽熱頻甚用藥反劇有朱存默氏謂服寒凉藥所致欲用參朮等劑彼疑痛無補法乃延余診而歎曰此寒凉損眞之故內眞寒而外假熱也且脈息弦洪而有怪狀乃脾氣虧損肝脈乘之而然惟當溫補其胃遂與補中益氣加半夏茯苓吳茱萸木香一服而熱寐徹聽洪脈頓斂怪脈頓除諸證釋然矣

儒者沈尼文內停飲食外感風寒頭痛發熱惡心腹痛用人參養胃湯加苓芷麴蘗香附桔梗一劑諸證悉退次日腹痛甚可畏喜手按痛卽止此脾氣虛弱客寒乘之而作是內虛寒而外假熱也用香砂六君子加木香炮薑服之痛減六七又以前藥去二香一鍾而愈

府庠王以道元氣素弱丙午丁未二年以科場歲考積勞致疾至十二月間其病其作大熱淚出隨疑目赤面黯揚手露胃氣息沉沉幾絕脈洪大鼓指按之如無舌乾捫之如刺此內眞寒而外假熱也遂先服十全大補湯余曰旣服此湯其脈當收斂爲善少頃熟睡覺而惡寒增大脈頓微細如絲此眞寒之象也余以人參一兩加熟附三錢水煎頓服而安夜間脈

復脫余以參二兩熟附五錢仍愈後以大劑參朮歸身炙甘草等藥調理而安

上舍徐民則夏月入房及食冰果麪食而患腹痛余曰此陰寒之證也須用附子理中湯以回陽不信別用二陳枳實黃連香薷飲之頻而死

少宗伯顧東江停食患痢腹痛下墜或用疎導之劑兩足腫脹食少體倦煩熱作渴脈洪數按之微細余以六君子加薑桂各一錢吳茱萸五味各一錢煎熟冷服即睡覺而諸證頓退再劑而安此內眞寒而外假熱治以熱劑而冷飲東垣先生治假寒熱之證投以假寒熱之劑正此謂也

進士劉華甫夏月食冷果品患腹痛泄瀉等證余用附子理中湯一鍾頓安

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百五十一卷目錄

醫部彙考二百三十一

暑門一

黃帝素問 生氣通天論 五常政大論 六元正紀大論 至眞要大論
靈樞經 九鍼篇
扁鵲難經 暑爲心病屬正邪
張機傷寒論 中暑有三證
王叔和脈訣 暑得虛脈
朱肱活人書 中暑 暑濕合病爲濕溫 夏月調攝法
楊登父直指方 暑由口鼻入
嚴用和濟生方 中暑
劉完素六書 中暑
李杲十書 動靜不同 中暑中熱辨 暑傷胃氣論 治暑宜顧天時
朱震亨心法 中暑 中暍 注夏 夏月伏陰在內論
戴思恭證治要訣 中暑 傷暑
樓英醫學綱目 中暑
王綸明醫雜著 暑病證治
李梴醫學入門 辨虛實陰陽 辨中傷胃伏 辨風與脈 暑毒痰火 治法
龔信古今醫鑑 中暑 治法
陶華六書 中暑
王肯堂證治準繩 夏爲暑病 中暍與傷寒相似而異 脈虛身熱得之傷暑

藝術典第二百五十一卷

醫部彙考二百三十一

暑門一

黃帝素問

生氣通天論

因於暑汗煩則喘喝靜則多言體若燔炭汗出而散

註 天之陽邪傷人陽氣氣傷外弛故汗出也氣分之邪熱盛則迫及所生心主脈故心煩肺乃心之蓋故煩則喘喝如不煩而靜此邪仍在氣分而氣傷神氣虛故多言也天之陽邪傷人陽氣兩陽相搏故體若燔炭陽熱之邪得吾身之陰液而解故汗出乃散也

五常政大論

少陽司天火氣下臨肺氣上從大暑以行欬嚏鼽衄鼻窒口瘍寒熱胕腫

註 金平之紀其臟肺上從者因司天之氣下臨畏其勝制而從之也欬嚏鼽衄鼻窒皆肺病也口瘍寒熱胕腫火熱證也

少陰司天熱氣下臨肺氣上從白金起用草木眚喘嘔寒熱嚏鼽衄鼻窒大暑流行甚則瘡瘍燔灼金鑠石流

註 草木眚大暑流行熱甚於春夏也金鑠石流熱淫於秋冬也

六元正紀大論

少陰司天之政四之氣溽暑至大雨時行寒熱互至民病寒熱嗌乾黃癉鼽衄飲發

註 太過之歲四之主客乃濕土主氣濕熱氣交故溽暑至大雨時行寒熱互至也民病嗌乾黃癉諸證皆感濕熱之氣

少陽所至爲炎暑爲熱府爲行出

註 氣之所至謂四時有五運六氣之所至少陽炎暑主夏也行出者從中而出於外也

至眞要大論

少陰之勝炎暑至嘔逆躁煩腹滿痛溏泄傳爲赤沃

註 炎暑至者與少陽氣交之時嘔逆陰氣上逆也煩躁陰陽寒熱之徵也腹滿溏泄陰寒在下也傳爲赤沃君火不淫也

靈樞經

九鍼篇

四時八風之中人也故有寒暑寒則皮膚急而腠理閉暑則皮膚緩而腠理開

註 賊風邪氣之中人也蓋因人氣之虛實開闔而入有淺深不因寒暑之開閉也

扁鵲難經

暑爲心病屬正邪

何以知傷暑得之然當惡臭何以言之心主臭自入爲焦臭入脾爲香臭入肝爲臊臭入腎爲腐臭入肺爲辛臭故知心病傷暑得之當惡臭其病身熱而煩心痛其脈浮大而散

註 心主臭心傷而自病故惡臭而證狀脈診皆屬乎心也

傷暑得之爲正邪

註 正邪本經自病者也傷暑爲正邪火自病也

漢張機傷寒論

中暑有二證

太陽中熱者暍是也其人汗出惡寒身熱而渴也

註 汗出惡寒身熱而不渴者中風也汗出惡寒身熱而渴者中暍也金匱以白虎加人參湯主之

太陽中暍者發熱惡寒身重而疼痛其脈弦細芤遲小便已灑灑然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥若發汗則惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則淋甚

註 病有在表有在裏有表裏俱病者此則表裏俱病者也發熱惡寒身重疼痛者表中暍也脈弦細芤遲者中暑脈虛也小便已灑灑然毛聳手足逆冷者太陽經氣不足也小有勞身即熱者謂勞動其陽而暍即發也口開前板齒燥者重有熱也以喘喝不止故前板齒乾燥若發汗以去表邪則外虛陽氣故惡寒甚若以溫針助陽則火熱內攻故發熱甚若下之以除裏熱則內虛而膀胱燥故淋甚徐氏曰此條無治法東垣以清暑益氣湯主之所謂發千古之祕也

太陽中暍者身熱疼重而脈微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也

註 經曰脈虛身熱得之傷暑身熱脈微弱者暍也身體疼重者水也夏時暑熱以水灌漑而得之金匱以一物瓜蒂散主之或云五苓散

晉王叔和脈訣

暑得虛脈

脈虛身熱爲傷暑自汗怔忡驚悸多發熱陰虛須早治養榮益氣莫蹉跎

宋朱肱活人書

中暑

中暑伏熱深累取不差其人發渴不已酒蒸黃連丸主之

暑濕合病爲濕溫

其人骨傷於濕因而中暑濕熱相薄則發濕溫病苦兩脛逆冷腹滿又胃多汗頭目痛苦妄言其脈陽濡而弱陰小而急治在太陰不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在身青面色變名曰重暍如此死者醫殺之耳白虎加蒼朮湯主之

夏月調攝法

凡盛暑衝熱切不可以冷水洗手面大損人目

夏一季是人脫精神之時心旺腎衰腎化爲水至秋始疑及冬乃堅是故尤愼房室固養精神

楊登父直指方

暑由口鼻入

人之心包絡與胃口相應胃氣稍虛或因饑冒暑則暑毒自口鼻而入疑之於牙頰達之於心包如響應聲倘遇暑以還急漱水而勿嚥可也

嚴用和濟生方

中暑

夫中暑所以脈虛者蓋熱傷氣而不傷形也且暑者在天爲熱在地爲火在人臟爲心是以暑喜傷心令人身熱頭痛狀類傷寒但背寒面垢此爲異耳甚則昏倒不知人手足微冷煩渴口燥或吐或瀉或喘或滿此皆暑氣之所爲也大抵中暑悶亂切不可便與冷水及臥冷濕地得冷則死惟當溫養用布衣蘸熱湯熨臍中及氣海或掬熱土至臍心仍更溺之候漸甦醒以米湯徐徐灌之然後隨證調治近屢見江浙之間中暑多有搐搦不省人事者醫經所不載診其脈浮而虛蓋浮則爲風虛則爲暑此中暑而又傷風俗命名謂之暑風若作驚癎之治多致不救倉卒之際宜以溫熟水化蘇合香丸灌之俟其稍甦却以黃連香薷散加羌活煎服作效者多矣

金劉完素六書

中暑

中暑大汗自出脈虛弱頭痛目乾倦怠煩躁或時惡寒或畏日氣脈虛而弱無問表裏通宜白虎夏月感冒發熱煩渴五苓散桂苓甘露飲黃連香薷飲雙解散或裏熱甚脈滿而脈沉可下者大承氣湯下之或三一承氣湯尤妙

中暑自汗脈虛弱者熱傷氣而反自汗大出故脈不能自實而反虛弱

中暑之證身熱頭痛背寒面垢自汗煩躁大渴口乾倦怠而身不痛或時惡寒或畏日氣脈虛而弱無問表裏通宜白虎夏月感冒發熱煩渴五苓散桂苓甘露飲黃連香薷飲雙解散或裏熱甚脈滿而脈沉可下者大承氣湯下之或三一承氣湯尤妙半表半裏者小柴胡湯腸天水散

李杲十書

動靜不同

動而傷暑心火大盛肺氣全虧故身熱脈洪大動而火勝者熱傷氣也白虎加人參湯主之辛苦人多得之不可不知也

靜而傷暑火乘金位肺氣出表故惡寒脈沉疾靜而濕勝者身體重也白虎加蒼朮湯主之安樂之人多

受之不可不知也

中暑中熱辨

潔古云靜而得之爲中暑動而得之爲中熱中暑者陰證中熱者陽證如避暑熱於深堂大厦得之者名曰中暑其病必頭痛惡寒身形拘急肢節疼痛而煩心肌膚火熱無汗爲房室之陰寒所遏使周身陽氣不得伸越大順散主之若行人或農夫於日中勞役得之者名曰中熱其病必苦頭痛發躁熱惡熱捫之肌膚大熱必大渴引飲汗大泄無氣以動乃爲天熱外傷肺氣蒼朮白虎湯主之竊謂暑熱者夏之令也火行於天地之間人或勞動或饑餓元氣虧乏不足以禦天令亢極於是受傷而爲病名曰中暑亦名曰中熱其實一也今乃以動靜所得分之何哉夫中暑熱者固多在勞役之人勞役則虛虛則邪入邪入則病不虛則天令雖亢亦無由以傷之彼避暑於深堂大厦得頭疼惡寒等證者蓋傷寒之類耳不可以中暑名之其所以煩心與肌膚大熱者非暑邪也身中陽氣受陰寒所遏而作也既非暑邪其可以中暑名乎苟欲治之則辛溫輕揚之劑發散可也夫大順散一方甘草最多乾薑杏仁肉桂次之除肉桂外其三物皆炒者原其初意本爲冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕嘔吐水穀不分臟腑不調所立故甘草乾薑皆經火炒熟用肉桂而非桂枝蓋溫中藥也內有杏仁不過取其能下氣耳若以此藥治靜而得之之證吾恐不能解表反增內煩矣今之世俗往往不明類曰夏月陰氣在內大順散爲必用之藥吁其誤也不亦甚歟夫陰氣非寒氣也蓋夏月陽氣發散於外而陰氣則在內耳豈宜視陰氣爲寒氣而用溫熱之藥乎陰果爲寒何以夏則飲水乎其蒼朮白虎湯雖宜用然亦豈可視爲通行之藥必參之治暑諸方隨所見之證而用之然後合理若夫所謂靜而得之之證雖當暑月即非暑病宜分出之勿使後人有似同而異之惑

暑傷胃氣論

刺志論云氣虛身熱得之傷暑熱傷氣故也痿論云有所遠行勞倦逢大熱而渴則陽氣內伐內伐則熱舍於腎腎者水臟也今水不能勝火則骨枯而髓虛足不任身發爲骨痿故下經曰骨痿者生於大熱也此濕熱成痿令人骨乏無力故治痿獨取陽明時當長夏濕熱大勝蒸蒸而熾人感之多四肢困倦精神短少懶於動作胷滿氣促肢節沉重或氣高而喘身熱而煩心下膨痞小便黃而少大便溏而頻或利出黃糜或如泔色或渴或不渴不思飲食自汗體重或汗少者血先病而氣不病也其脈中得洪緩若濕氣相搏必加之以遲遲病雖互換少差其天暑濕令則一也宜以清燥之劑治之內經曰陽氣者衛外而爲固也炅則氣泄今暑邪干衛故身熱自汗以黃芪人參甘草補中益氣爲君橘皮當歸身甘辛微溫養胃氣和血脈爲臣蒼朮白朮澤瀉滲利除濕升麻葛根苦甘平善解肌熱又以濕勝則食不消而作痞滿故炒麴甘辛青皮甘溫消食快氣腎惡燥急食辛以潤之故以黃蘗苦辛寒借甘味瀉熱補水虛者滋其化源以五味子麥門冬酸甘微寒救天暑之傷庚金爲佐也名之曰清暑益氣湯

暑病皆因飲食失節勞倦所傷日漸因循損其脾胃乘暑天而作病也

治暑宜順天時

假令夏月大熱之時傷生冷硬物當用熱藥木香見睍丸治之須少加三黃丸謂天時不可伐故加寒藥以順時令若傷熱物只用三黃丸何謂此三黃時藥丸也

夫脾胃虛弱必上焦之氣不足遇夏天氣熱盛損傷元氣怠惰嗜臥四肢不收精神不足兩脚痿軟遇早晚寒厥日高之後陽氣將旺復熱如火乃陰陽氣血俱不足故或熱厥而陰虛或寒厥而氣虛口不知味目中溜火而視物䀮䀮無所見小便頻數大便難而結祕胃脘當心而痛兩脅痛或急縮臍下周圍如繩束之急甚則如刀刺腹難舒伸胷中閉塞時顯嘔噦或有痰嗽口沃白沫舌强腰背脾眼皆痛頭痛時作食不下或食入即飽全不思食自汗尤甚若陰氣覆在皮毛之上皆天氣之熱助本病也乃庚大腸辛肺金爲熱所乘而作當先助元氣理治庚辛之不足黃芪人參湯主之如心下痞悶加黃連二分或三分如胃脘當心痛減大寒藥加草豆蔻仁五分脅下痛或縮急加柴胡二分或三分如頭痛目中溜火加黃連二分或三分川芎三分如頭痛目不清利上壅上熱加蔓荊子川芎各三分藥本生地黃各二分細莘一分如氣短精神如夢寐之間困乏無力加五味子九箇如大便澀滯隔一二日不見者致食少食不下血少血中伏火而不得潤也加當歸身生地黃麻子仁泥各五分桃仁三枚去皮尖另研如大便通行所加

之藥勿再服如大便又不快利勿用別藥少加煨大黃五分如不利者非血結血秘而不通也是熱則生風其病人必顯風證單血藥不可復加之只常服黃芪人參湯藥只用羌活防風各五錢二味咬咀以水四盞煎至一盞去查空心服之其大便必大走也一服便止如胃中氣滯加青皮清香可愛者一分或二分陳橘皮倍之去其邪氣此病本元氣不足惟當補元氣不當瀉之如氣滯太甚或補藥太過病人心下有憂滯鬱結之事更加木香縮砂仁各二分或三分白豆蔻仁二分與正藥同煎如腹痛不惡寒者加白芍藥五分黃芩二分却減五味子

徐氏曰此謂暑熱證候則同冬月傷寒傳變爲證不一彼爲寒傷形此爲熱傷氣若元氣虛甚受病忽於一時不救者與傷寒陰毒頃刻害人實同故東垣啓是病倒大開後人之旨曠也宜與痎門互看

孫思邈云五月常服五味子是瀉丙火補庚大腸益五臟之元氣壬膀胱之寒已絕於巳腎水已絕於午今更逢濕旺助熱爲邪西方北方之寒清絕矣聖人立法夏月宜補者補天元之眞氣非補熱火也令人夏食寒是也爲熱傷元氣以人參麥門冬五味子生脈脈者元氣也人參之甘補元氣瀉熱火也麥門冬之苦寒補水之源而清肅燥金也五味子之酸以瀉火補庚大腸與肺金也當此之時無病之人亦或有二證或避暑熱納凉於深堂大厦得之者名曰中暑其病必頭痛惡寒身形拘急肢節疼痛而煩心肌膚大熱無汗爲房屋之陰寒所遇使周身陽氣不得伸越世多以大順散主之是也若行人或農夫於日中勞役得之者名曰中暍其病必苦頭痛發燥熱惡熱捫之肌膚大熱必大渴引飲汗大泄無氣以動乃爲天熱外傷肺氣蒼朮白虎湯主之潔古云動而得之爲中熱靜而得之爲中暑中暑者陰證當發散也中熱者陽證爲熱傷元氣非形體受病也若虛損脾胃有宿疾之人遇此天暑將理失所違時伐化必困乏無力懶語氣短氣弱氣促似喘非喘骨之無力其形如萎痲朦朦如烟霧中不知身所有也必大汗泄此津脫也急止之加五味子六枚炒黃檗五分炒知母三分不令妨其食當以意斟酌若妨食則止候食進則再服三里氣街以三稜針出血若汗不減不止者於三里穴下三寸上廉穴出血禁酒濕麵

清暑益氣湯所治之病皆由飲食勞倦損其脾胃乘天暑而病作也但藥中犯澤瀉豬苓茯苓煙心通草木通淡滲利小便之類皆從時令之旺氣以瀉脾胃之客邪而補金水之不及也此正方已是從權而立若於無時病濕熱脾旺之證或小便已數腎肝不受邪者誤用之必大瀉眞陰竭絕腎水先損其兩目也宜加減用

復有一證乘天氣大熱之時在於路途中勞役得之或在田野間勞形得之更或有身體薄弱食少勞役過甚又有修善常齋之人胃氣久虛而因勞役得之者皆與陽明中熱白虎湯證相似必肌體捫摸之壯熱必躁熱煩亂大惡熱渴而飲水以勞役過甚之故亦身疼痛始受病之時特與中熱外得有餘之證相似若誤與白虎湯旬日必死此證脾胃大虛元氣不足口鼻中氣皆短促而上喘至日轉以後是陽明得時之際病必少減若是外中熱之病必到日晡之際大作譫語其熱增加大渴飲水煩悶不止其勞役不足者皆無此證尤易爲分解若有難決疑似之證必當待一二日求醫治療必不致錯誤矣

朱震亨心法

中暑

暑證用黃連香薷飲痰加半夏南星盧加人參黃芪

暑病內傷者用清暑益氣湯著暑氣是痰用吐

暑乃夏月炎暑也盛熱之氣者火也有冒有傷有中三者有輕重之分虛實之辨或腹痛水瀉者胃與大腸受之惡心者胃口有痰飲也此二者冒暑也可用黃連香薷飲清暑益氣湯蓋黃連退暑熱香薷消蓄水或身熱頭疼躁亂不寧者或身如針刺者此爲熱傷在分肉也當以解毒湯白虎湯加柴胡氣如虛者加人參或咳嗽發寒熱盜汗出不止脈數者熱在肺經用清肺湯柴胡天水散之類急治則可遲則不救致成火乘金之危候也此爲中暑凡治病須要明白辨別愼勿混同施治春秋間亦或有之切莫執一隨病處方爲妙

戴思恭云暑風者夏月卒倒不省人事者是也有因火者有因痰者火者君相二火暑熱者天地二火也內外合而炎鑠所以卒倒痰者人身之痰飲也因暑氣入而鼓激痰飲塞碍心之竅隧則手足不知動躁而卒倒此二者皆可吐內經曰火鬱則發之吐卽發散也量其虛實而吐之吐醒後可用清劑調治之

中暍

中暍是陽證中暑是陰證脈沉弱者切不可用凉藥
清熱宜天水五苓又白虎湯皆可熱悶恍惚辰砂五
苓散脈弦實黃連香薷湯
熱甚自汗而渴便澁者五苓分利之或桂苓甘露飲
吐瀉脈沉微甚者可用附子大順散
伏熱傷冷縮脾飲冷香飲子皆可浸冷服之
或剉蒜肉入鼻中或研蒜水解灌之蓋蒜氣臭烈能
通諸竅故也

注夏

注夏屬陰虛元氣不足夏初春末頭疼腳軟食少體
熱者是宜補中益氣湯去柴胡升麻加炒黃檗白芍
藥挾痰者加南星半夏陳皮煎服又或用生脈湯
暑氣挾痰挾火實者可用吐法

夏月伏陰在內論

天地以一元之氣化生萬物根於中者曰神機根於
外者曰氣血萬物同此一氣人靈於物形與天地參
而爲三者以其得氣之正而通也故氣升亦升氣浮
亦浮氣降亦降氣沉亦沉人與天地同一橐籥子月
一陽生陽初動也寅月三陽生陽初出於地也此氣
之升也巳月六陽生陽盡出於上矣此氣之浮也人
之腹屬地氣於此時浮於肌表散於皮毛腹中虛矣
經曰夏月經滿地氣溢滿經絡受血皮膚充實長夏
氣在肌肉所以表實表實者裏必虛世言夏月伏陰
在內此陰字有虛之義若作陰冷看其誤甚矣或曰
以手捫腹明知其冷非冷而何前人治暑病有玉龍
丸大順散桂苓丸單煮良薑與縮脾飲用草果等皆
行溫熱之劑何吾子不思之甚也予曰春夏養陽王
太僕謂春食凉夏食寒所以養陽也其意可見矣若
夫凉臺水館大扇風車陰木寒泉瓜果冰雪傷之自
內及外不用溫熱病何由安詳玩其意實非爲內伏
陰而用之也前哲又謂升降浮沉則順之寒熱溫凉
則逆之若於夏月火令之時妄投溫熱寧免實實虛
虛之患乎或曰巳月純陽於理或通五月一陰六月
二陰非陰冷而何予曰此陰之初動於地下也四陽
浮於地上燔灼焚燎流金鑠石何陰冷之有孫眞人
製生脈散令人夏月服之非虛而何
戴思恭證治要訣

中暑

中暑爲證面垢悶倒昏不知人冷汗自出手足微冷
或吐瀉或喘滿切不可以冷水及用十分冷劑郤暑
散水調灌下亦得或以來復丹末同蘇合香丸用湯
調灌或以來復丹研末湯調灌之候其人稍甦則用
香薷飲煎熟去查入麝香少許服或剉蒜肉入鼻中
或研蒜水解灌之蓋中傷暑毒陽外陰內諸暑藥多
有煖劑如大順散之用薑桂枇杷葉散之用丁香香
薷飲之用香薷香薷味辛性暖又蒜氣臭烈能通諸竅大槩極臭極香之物皆能通竅故也
初覺中暑卽以日曬瓦或布蕉熱湯更易熨其心腹
臍下急以二氣丹末湯調灌下
脅有客人中暑逃悶四肢厥逆冷汗如雨舉形欲投
水中口吻涎沫流溢此中暑已深陰陽離絕難除
又有暑途一證似中而輕欲睡懶語實人香薷飲加
黃連一錢虛人星香飲加香薷一錢甦後冷汗不止
手足尚逆煩悶多渴者宜香薷飲甦後爲醫者過投
冷劑致吐利不止外熱內寒煩躁多渴甚欲舉形狀
如傷寒陰盛隔陽當用溫藥香薷飲加附子浸冷服
渴者縮脾飲加附子亦浸冷服

傷暑

傷暑必自汗背寒面垢或口熱煩悶或頭疼發熱神
思倦怠殊甚所謂暑傷氣而不傷形是也但身體不
痛與感風寒異宜香薷飲六和湯香薷湯
嘔而渴者浸冷香薷湯或五苓散兼吞消暑丸嘔不
止者枇杷葉散去芽根吞來復丹嘔而多痰郤暑散
吞消暑丸或小半夏茯苓湯或消暑飲
瀉而渴者生料平胃散和生料五苓散各半貼名胃
苓散間進來復丹此丹本非治瀉之藥惟施之暑瀉
則宜然瀉甚亦不可用瀉定仍渴春澤湯或縮脾飲
傷暑心頭痞悶人皆謂暑毒攻心不知有暑卽有痰
痞悶者痰爲之也
盛暑塗中倉卒無水渴甚急嚼葱頭二寸許抵飲水
二升
瀉而腹痛有積者生料五苓散藿香正氣飲勻各半
貼若瀉雖無積其腹痛甚生料五苓散加木香七分
或六和湯加木香半錢或不加木香止與二藥煎熟
去滓調下蘇合香丸
又有不渴而腹乾痛者六和湯煎熟調蘇合香丸尤
宜
瀉而發熱者胃苓飲瀉而發渴者胃苓飲兼進縮脾
飲瀉渴兼作未透者湯化蘇合香丸吞來復丹或研
來復丹作末白湯調下已透者香薷飲感冒外發熱
者六和湯香薷湯香薷飲身熱煩者五苓散或香薷

湯加黃連一錢熱而汗多畏風甚者生料五苓散熱而渴者五苓散兼進縮脾飲

暑氣攻裏熱不解心煩口乾辰砂五苓散或香薷飲加黃連一錢若大渴不止辰砂五苓散吞酒煑黃連丸

暑氣攻裏腹內刺痛小便不通生料五苓散加木香七分

冒暑飲酒引暑入腸內酒熱與暑氣相并發熱大渴小便不利其色如血生料五苓散去官桂加黃連一錢五苓散去桂吞酒煑黃連丸

暑氣入腸胃而小便艱澀不通者加味香薷飲仍佐以三黃丸

暑氣入心身煩熱而腫者宜辰砂五苓散或香薷飲加黃連一錢

傷暑而傷食者其人頭疼背寒自汗發熱畏食惡心噦酸臭氣胃脘痞滿六和湯倍砂仁

若因暑渴飲食冷物致內傷生冷外傷暑氣亦宜此藥暑先要入心者心屬南方離火暑氣所入各從其類小腸爲心之腑利心經暑毒使由小腸中出五苓散利小便爲治暑上劑也

有傷於暑因而露臥又爲冷氣所入其人感暑復感冷自汗怯風身疼頭痛去衣則凜著衣則煩或已發熱或未發熱並宜六和湯內加扁豆砂仁一方用藿香一方用紫蘇正治也已感於暑而復外感於風寒或內傷生冷以藿香紫蘇兼能解表砂仁扁豆兼能溫中然感暑又感冷亦有無汗者只宜前藥若加以感風則斷然多汗審是此證宜生料五苓散內用桂枝爲佳市井中多有此病往往日間冒熱經營夜間開牕眠臥欲取清凉失蓋不覺用藥所當詳審有此證而發潮熱似瘧猶未成瘧者六和湯養胃湯各半貼相和煎有此證而鼻流清涕或鼻孔熱氣時出六和湯加川芎半錢羌活黃芩各七分

有因傷暑遂極飲以冷水致暑毒留結心胃精神昏憒語音不出煎香薷湯化蘇合香丸服

有因傷暑用水沃面或入水洗浴暑濕相搏自汗發熱身重小便不利宜五苓散

傷暑而大汗不止甚則眞元耗散宜急收其汗生料五苓散倍官桂或加黃芪如白朮之數此亦古法也

傷暑自汗手足厥冷者煎六和湯調蘇合香丸

傷暑自汗手足時自搐搦者謂之暑風緣已傷於暑毛孔開而又邪風乘之宜香薷飲或香薷湯並可加羌活一錢痰盛者六和湯半貼和星香散半貼

暑月身痒如針刺間有赤腫處亦名暑風末子六和湯和消風散酒調服暑風而加以吐瀉兼作者六和湯藿香正氣散各半貼加全蠍三箇

有暑毒客於上焦胃脘痞塞湯藥至口即出不能過關或上氣喘急六和湯浸冷調入麝香少許

伏暑煩渴而多熱痰者於消暑丸中每兩入黃連末二錢名黃連消暑丸或二陳湯或小半夏茯苓湯並可加黃連一錢暑氣久而不解遂成伏暑內外俱熱煩躁自汗大渴喜冷宜香薷飲加黃連一錢繼進白虎湯若服藥不愈者暑毒深入結熱在裏譫語煩渴不欲近衣大便祕結小便赤澀當作熱病治可於傷寒陽明證求藥如調胃承氣湯三黃石膏湯之類

樓英醫學綱目

中暑

脈虛身熱自汗惡寒者中暑也白虎加桂湯主之若先飲冷後傷暑者五苓散主之此必心下痞懊生薑湯調服佳或四君子調中亦可中和後或小便不利或莖中痛宜用蒲黃三錢滑石五錢生甘草一錢或難子曰王彥龍病何名賊邪子曰難經云五邪有實邪虛邪正邪微邪賊邪從後來者爲虛邪從前來者爲實邪從所不勝來者爲賊邪從所勝來者爲微邪自病者爲正邪又曰假令心病中暑爲正邪中濕得之爲賊邪令心先受暑而濕邪勝之水尅火從所不勝斯謂之賊邪五邪之中最逆也難經曰濕溫之脈陽濡而弱陰小而急濡弱見於陽部濕氣搏於暑也小急見於陰部暑氣蒸濕也故經曰暑濕相搏名曰濕溫是謂賊邪也不特此也子素有停飲之疾每至暑月兩足有汗漐漐不乾服此藥二三盞即愈

濕溫汗少者白虎加蒼朮汁多者白虎加桂枝

王綸明醫雜著

暑病證治

夏至日後病熱爲暑暑者相火行令也夏月人感之自口齒而入傷心包絡之經其脈虛或浮大而散或弦細芤遲蓋熱傷氣則氣消而脈虛弱其爲證汗煩則喘喝靜則多言身熱而煩心痛大渴引飲頭疼自汗倦怠少氣或下血發黃生斑甚者火熱制金不能平木搐搦不省人事治暑之法清心利小便最好暑傷氣宜補眞氣爲要又有惡寒或四肢逆冷甚者迷悶不省而爲霍亂吐利痰滯嘔逆腹痛瀉痢此則非

暑傷人乃因暑而自致之病也以其因暑而得故亦謂之暑病治法不同

若行人或農夫於日中勞役得之者是動而得之陽證也其病必苦頭痛發躁惡熱捫之肌膚大熱必大渴引飲汗泄無氣以動乃天熱外傷元氣也宜清暑益氣用香薷黃連扁豆人參黃芪五味知母石膏之類

暑熱發渴脈虛宜用人參白虎湯人參一錢五分甘草知母各二錢石膏五錢竹葉石膏湯亦好石膏一兩半夏二錢五分甘草人參各二錢麥門冬五錢入竹葉水煎服

若暑熱之時無病之人或避暑熱納凉於深堂大廈凉臺冷館大扇風車得之者是靜而得之陰證也其病必頭痛惡寒身形拘急肢節疼痛而煩心肌膚大熱無汗此爲陰寒所遏使周身陽氣不得伸越宜用辛温之劑以解表散寒用厚朴紫蘇乾葛藿香羌活蒼朮之類若外既受寒內復傷冰水生冷瓜果之類前藥再加乾薑縮砂神麴之類此非治暑也治因暑而致之病也若外不受寒止是內傷冰水冷物腹痛泄瀉或霍亂吐逆宜縮脾飲砂仁草果甘草扁豆乾薑烏梅或理中湯加神麴麥芽縮砂蒼朮此專治內温中消食也若吐瀉脈沉微其者不可用凉藥可用附子大順散熟附子甘草乾薑杏仁桂或附子理中湯加芍藥

按丹溪云天地以五行更迭衰旺而成四時人之五臟六腑亦應之而衰旺四月屬巳五月屬午爲火太旺火爲肺金之夫火旺則金衰六月屬未土太旺土爲水之夫土旺則水衰況腎水嘗藉肺金爲母以補其不足古人於夏月必獨宿而淡味保養金水二臟經曰冬藏精者春不病温十月屬亥十一月屬子正火氣潛藏必善其本然之眞而爲來春發生之本若於此時不忘欲以自戕至春升之際根本壯實何病之可言哉

若夏月傷暑發熱汗大泄無氣力脈虛細而遲此暑傷元氣也方用人參黃芪甘草炙麥門冬去心白芍藥陳皮白茯苓各一錢黃連炒甘草炙各五分黃蘗三分白朮一錢五分香薷知母各七分薑水煎食前温服

按前證有熱傷元氣而汗出者有勞傷元氣而汗出者有因元氣素虛腠理不密而汗出者治法暑傷元氣者清暑益氣湯勞傷元氣者補中益氣湯元氣素虛而自汗者十全大補湯如兼盜汗佐以六味丸加五味子前云大汗無力脈虛細遲屬陽氣虛弱內黃蘗知母恐復傷陽氣芍藥茯苓恐導損陰氣也治者審之

若夏秋暑熱因過用冷物茶水傷其內又過取凉風傷其外以致惡寒發熱胃脘飽悶飲食不進或兼嘔吐泄瀉此內外俱傷寒冷也方用人參乾薑炒紫色厚朴薑水炒陳皮羌活枳實白茯苓各一錢白朮一錢五分甘草炙五分薑水煎食前温服

按前證宜用此方如未應宜用藿香正氣散若內外已解寒熱未退或飲食不進宜用六君子保命集云霍亂屬陽明證宜用和中平胃建中湯華或四君子湯脈浮自汗四君子加桂枝主之脈浮無汗四君子加麻黃吐利轉筋脅下痛脈弦者木尅土也用平胃散加木瓜或建中加柴胡木瓜吐利轉筋腹痛體重脈沉而細四君加白芍藥良薑吐利四肢拘急脈沉而遲屬少陰四君加薑附厚朴吐利四肢厥冷脈微緩屬厥陰建中加歸附吐利頭痛而身熱熱多欲飲水者五苓散寒多不欲水者理中丸主之元戎云太陰證霍亂者理中加橘紅吐下腹痛手足逆冷理中加熟附子吐利後轉筋者理中加火煆石膏一兩

若夏暑在途中常服以壯元氣清熱驅暑服之免中暑霍亂泄瀉痢疾等證方用人參一錢二分白朮一錢五分五味子十粒杵碎麥門冬去心白芍藥炒白茯苓各二錢知母炒陳皮香薷各七分黃芩炒三分甘草炙五分薑水煎食前温服

按前證若人元氣虛弱宜用補中益氣去柴胡升麻加麥門冬五味或少加炒黑黃蘗人參益氣湯亦可用

若遇勞倦辛苦用力過多即服後方二三服免生內傷發熱之病此方主於補氣方用黃芪一錢半蜜炙人參麥門冬去心陳皮各一錢白朮一錢甘草炙七分薑棗水煎食前温服勞倦甚加熟附子四五分

按前論閒世俗之瞷瞶濟無窮之天枉內用附子若素畏寒飲食者尤宜若素喜寒飲食者以肉桂或炮薑代之亦可若果因暑熱傷氣而四肢困倦或手足麻木者先用人參益氣湯後用補中益氣湯

若人過勞心思慮損傷精神頭眩目昏心虛氣短即

當補血爲主方用人參一錢五味子十五粒杵白芍藥炒酸棗仁炒茯神去心當歸酒洗各一錢甘草陳皮川芎生地黃酒洗山梔子炒麥門冬去心各五分水煎服

註按前證宜用此方不宜多服其麥門冬芍藥山梔生地苦寒恐復損脾氣若脾胃素虛熱而患前證但以補中益氣湯加麥門冬五味亦可若因饑渴勞役或因誤行攻伐以致氣高而喘身熱而煩或自汗此爲陽氣內傷宜用補中益氣湯若因饑飽勞役或因誤出汗以致肌熱大渴引飲目赤面紅脈洪大按之如無此爲血脫煩躁宜用當歸補血湯

傷暑發熱是火邪傷心元氣耗散而邪熱入客於中故發爲熱汗大泄無氣以動其脈虛遲而無力是外之熱邪傷榮也治主內

註按夏月陽氣浮於外陰氣伏於內法當調補陽氣爲主而佐以解暑此推內經捨時從證之良法也故前證當究其所因而治之不可泛用香薷飲之類走散陽氣導損眞陰而益其病也又有夏間用薄荷煎湯以代茶殊不知散人之眞氣卽久用川芎湯令人暴死之類是也

夏月傷暑之病雖屬外感却類內傷與傷寒大異蓋寒傷形寒邪客表有餘之證故宜汗之暑傷氣元氣爲熱所傷而耗散不足之證故宜補之東垣所謂清暑益氣者是也又有因時暑熱而過食冷物以傷其內或過取凉風以傷其外此則非暑傷人乃因暑而自致之之病治宜辛溫解表或辛溫理中之藥却與傷寒治法相類者也

夫夏月陽氣浮外陰氣伏內若飲食勞倦內傷中氣或酷暑勞役外傷陽氣者多患之法當調補元氣爲主而佐以解暑若中暍者乃陰寒之證法當補陽氣爲主少佐以解暑故先哲多用薑桂附子之類此推內經捨時從證之良法也今患暑證歿而手足指甲或肢體青黯此皆不究其因不溫補其內而泛用香薷飲之類所誤也夫香薷飲乃散陽氣導眞陰之劑若元氣素虛或犯勞過度而用之鮮不危矣

李梴醫學入門

辨虛實陰陽

暑病身熱自汗口渴面垢而已餘證皆後傳變或兼內傷必先問其人素虛胃弱或大病大勞後縱暑中傷者宜清暑益氣素強盛壯實無虛損病者宜祛暑和中

靜居高堂大厦得病似熱證屬心脾經者名中暑陰證動作田野道途得病以傷風證屬膀胱經者名中暍陽證其實一也但自襲暑氣而言曰中暑自被日逼而言曰中暍然暑初入自口鼻牙頰達手心主胞絡以火從火故古法暑還取冷水灌溉勿嚥之入肝則眩運頑麻入脾則昏睡不覺入肺則喘咳痿躄入腎則消渴非專入心主而無他傳也

辨中傷冒伏

中暑歸心神昏卒倒傷暑肉分周身煩躁或如針刺或有赤腫蓋天氣浮於地表故人氣亦浮於肌表也冒暑入腸胃腹痛惡心嘔瀉伏暑卽冒暑久而藏伏三焦腸胃之間熱傷氣而不傷形旬月莫覺變出寒熱不定霍亂吐瀉膨脹中滿瘧痢煩渴腹痛下血等證但暑病多無身痛間有痛者或爲澡浴水濕相搏耳

辨風與厥

卽中暍證但以手足搐搦爲風手足逆冷爲厥厥與傷寒熱厥義同黃連香薷散暑風乃勞役內動五臟之火與外火交熾則金衰木旺生風香薷散加羌活或六和湯合消風散素有痰飲因暑觸動痰熱生風者六和湯合星香散若道途卒倒湯藥不便恐氣脫難治急扶陰凉處不可臥濕冷地掬道上熱土放臍上撥開作竅令人尿於其中仍以生薑或蒜嚼爛以熱湯或童便送下外用布蘸熱湯熨氣海立醒後尤不可飲冷水以大劑滋補藥服之如心神恍惚用五苓散燈心同煎入硃砂末調服有汗加黃芪因酒引暑入腹尿血者去桂加黃連或神昏驚悸妄言用益元散量加硃砂新汲水調服二錢降胃火治煩熱利濕止渴之要藥

暑毒痰火

暑毒痰火窒塞胷中量體虛實吐之火鬱發之之義也如痰喘氣急痞塞入藥不得者急煎六和湯調麝二釐服

治法

夏月人多飲水食冷故宜利濕兼以消導汗多者忌滲利之祛暑宜香薷散黃連解毒湯清肺生脈散白虎湯加參柴寒熱不定小柴胡湯和中宜大小調中湯薷苓湯枇杷葉散胃苓湯桂苓甘露飲六和湯伏陰在內之時避暑貪凉外又襲陰冷之氣鬱遏周

身陽氣宜辛溫解散藿香湯之類若外既受寒內復傷冷加乾薑砂仁神麴若外觸暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽砂仁或大順散或二氣丹冷水下丹丸皆治因暑傷冷非溫散治暑之謂也誤服發黃發斑發斑血妄行而死

內傷勞役或素氣血虛弱病暑者一以滋補爲主慎用大熱大凉之劑暑重尿赤者清暑益氣湯暑輕力倦者補中益氣湯或萬丸中暍暫加香薷扁豆陰虛者滋陰降火湯腎氣丸

大熱傷氣養生家謂此時縱酒恣色令人內腎腐爛至秋方疑甚則化木而死時常禦暑體實者香薷散益元散虛者忌用蓋脾虛者不必因暑勞役及乘凉致病每遇春末夏初頭痛脚軟食少體熱名注夏宜補中益氣湯去升柴加黃蘗芍藥五味麥冬有痰加半夏薑汁實三伏却暑之聖藥也如氣衰精神不足煩渴懶食者生脈散誘行丸通用謝傳萬病無憂散襲信古今醫鑑

中暑

夫暑者相火行令也夏月人感之自口齒而入傷心胞絡之經其脈虛或浮大而散或弦細芤遲蓋熱傷氣則氣消而脈虛弱其外證頭疼身熱口乾煩渴面垢自汗倦怠少氣背寒惡熱甚者迷悶不省而爲霍亂吐利痰涎嘔逆發黃生斑皆是其證又甚者火盛制金不能平木肝邪獨旺以致搐搦不省人事其脈虛浮浮者風也虛者暑也俗曰暑風治宜黃連香薷飲加羌活或只雙解散加香薷

治法

大抵治暑之法宜清心利小便爲主若自汗甚者不可利其小便以白虎湯清解之次分表裏治之如在表頭痛惡寒者宜雙解散加香薷及二香散十味香薷飲之類在半表半裏泄瀉煩渴飲水吐逆五苓散主之熱甚煩渴益元散清之若表解裏熱甚宜解毒湯下神芎丸酒蒸黃連等丸或人平素虛弱及老人冒暑脈微下利渴而喜溫或厥逆不省人事宜竹葉石膏湯加附子半個冷服凡夏月暑證不可服諸熱燥劑若誤用之乃致斑毒發黃小便不通悶亂而死矣

傷暑與傷寒俱有發熱當明辨之蓋寒傷形暑傷氣傷寒則惡寒而脈浮緊傷暑則惡熱而脈虛微以此爲異經云脈盛身寒得之傷寒脈虛身熱得之傷暑治宜小柴胡湯加石膏知母或人參白虎湯主之天時淫雨濕冷井行蒼术白虎湯主之若元氣素弱而傷重者用清暑益氣湯

陶華六書

中暑

中暑脈虛而伏身熱背惡寒面垢自汗煩躁大渴毛聳惡寒昏昏倦怠而身不痛與傷寒諸證不同矣內外俱熱口燥煩渴四肢微冷而身不痛用白虎湯疾逆惡寒橘皮湯熱悶不惡寒竹葉石膏湯頭痛惡心煩躁心下不快小便不利五苓散下消暑丸中暑用小柴胡湯最良脈芤遲勝理開洒洒然毛聳口開板齒燥白虎加人參湯霍亂煩躁大渴腹痛四肢冷脚轉筋以黃連香薷湯

暑中三陽所患必熱脈來數加減續命湯去附子桂枝麻黃加黃芩黃蘗柴胡

若夏月大發熱頭疼躁渴背惡寒微汗脈虛無力口齒燥者名中暑用寒凉之劑清之

凡用暑證藥若有香薷先煎香薷一二沸後入餘藥同煎

王肯堂證治準繩

夏爲暑病

按中暍中暑中熱名雖不同實一病也若冬傷於寒至夏而變爲熱病者此則過時而發自內達表之病俗謂晚發是也又非暴中暑熱新病之可比或曰新中暑病脈虛晚發熱病脈盛

中暍與傷寒相似而異

張氏曰清邪中上濁邪中下其風寒濕者皆地之氣係濁邪所以俱中足經惟暑乃天之氣係清邪所以中手少陰心經也其證多與傷寒相似但暍與傷寒脈不同矣夫傷寒雖惡寒發熱初病未至於煩渴惟暑則不然初病即渴所以與傷寒爲異也且傷寒之脈必浮盛中暑之脈虛弱或弦細芤遲者有之經曰假如太陽病項背強几几反汗出惡風若當炎暑之時豈不與中暍相似惟其不渴故與桂枝加葛根湯主之凡居夏秋之令炎暑之時必當依經詳審則無差失之患矣

以證言之傷寒惡寒傷熱惡熱以脈言之傷寒脈盛傷暑脈虛且暑脈虛細與濕痙之脈有相似者而證則不同暑則自汗而渴濕則不渴痙則身疼也

脈虛身熱得之傷暑

劉純曰按許學士云傷暑其脈弦細芤遲何也內經曰寒傷形熱傷氣蓋傷氣而不傷形則氣消而脈虛弱所謂弦細芤遲皆虛脈也仲景以弦爲陰而朱肱亦曰中暑脈細弱則皆虛脈也可知矣傷暑與熱病外證相似但熱病脈盛中暑脈虛以此別之又有濕溫與中暑同但身凉不渴爲異耳

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百五十二卷目錄

醫部彙考二百三十二

暑門二

驗昌醫門法律　中暑　論金匱治暍用白虎加人參湯瓜蒂湯二方并陰陽律五條

張介賓景岳全書　論證　陰暑論治　湯液論治　夏月伏陰論治　湯液論　論香薷飲

方　清中而芳香飲子　五苓散　黃連解毒湯　猪皮湯　清暑飲　縮脾飲　香薷飲　甘露飲　竹葉石膏湯　生脈散　大順散　枳朮丸　水調丸　五物神麯丸　蠟梅丸　香連丸　一柴胡飲　二柴胡飲　三柴胡飲　柴胡白虎湯　柴胡人參湯　理中丸　益元散　白虎加人參湯　十味香薷飲　三黃石膏湯　黃芩湯　一物瓜蒂湯　參蘇飲　清暑益氣湯　二香散　王母遺糧　黃連香薷飲　清暑益氣湯　二香散　甘露飲　清暑益氣湯　二香散　甘露飲　清暑益氣湯　二香散　甘露

夏月卒倒不省人事名曰暑風乃心火暴甚暑熱乘之令人噎悶昏不知人然亦有他臟素虛暑得深中者但不似心臟之篤耳如入肝則眩運頑痹入脾則昏睡不覺入肺則喘滿痰壅入腎則消渴雖當補益與清解兼行然必審其屬於何臟用藥乃得相當也

日中勞役而觸冒其暑者此宜清凉解其暑毒如白虎湯益元散黃連香薷飲三黃石膏湯之類皆可取用也

深居廣廈襲風凉餐生冷遏抑其陽而病暑者一切治暑清凉之方即不得徑情直施如無汗仍須透表以宣其陽如吐利急須和解以安其中甚者少用溫藥以從治之故冒暑之霍亂吐瀉以治暑爲主避暑之霍亂吐瀉以和中温中爲主不可不辨也

元豐朝立和劑局萃集醫家經驗之方於中暑一門獨詳以夏月暑證五方歷試見聞廣耳其取用小半夏茯苓湯不治其暑顯治其濕又以半夏茯苓少加甘草名消暑丸見消暑在消其濕名正言順矣其香薷飲用香薷扁豆厚朴爲主方熱盛則去扁豆加黃連爲君治其心火濕盛則去黃連加茯苓甘草治其脾濕其縮脾飲則以脾爲濕所浸淫而重滯於扁豆葛根甘草中佐以烏梅砂仁草果以快脾而去脾所惡之濕甚則用大順散來復丹以治暑證之多瀉利者又即縮脾之意而推之也其枇杷葉散則以胃爲濕所窩據而濁穢故用香薷枇杷葉丁香白茅香之辛香以安胃而去胃所惡之臭甚則用冷香飲子以治暑證之多嘔吐者又即枇杷葉散而推之也醫者於熱濕虛寒淺深緩急間酌而用之其利溥矣而後來諸賢以益虛繼之河間之桂苓甘露飲五苓三石意在生津液以益胃之虛子和之桂苓甘露散用人參葛根甘草藿香木香益虛之中又兼去濁或用十味香薷飲於局方五味中增人參黃芪白朮陳皮木瓜益虛以去濕熱乃至東垣之清暑益氣湯人參黃芪湯又補中實衛以去其濕熱肥白內虛之人勿論中暑與否所宜頻服者也中暑必顯躁煩熱悶東垣倣仲景竹葉石膏湯之制方名清燥湯仍以去濕爲首務夫燥與濕相反者也而清燥亦務除濕非東垣具過人之識不及此矣又如益元散之去濕而加辰砂則并去熱五苓散之去濕而加辰砂滅桂則去熱白虎湯加人參則益虛加蒼朮則勝濕合之局方則大備矣然尚有未備焉昌觀暑風一證其卒倒類乎中風而不可從風門索治百一選方雖有大黃龍丸初不爲暑風立法管見從而贊之曰有中暍昏死灌之立甦則其方亦可得治暑風之一斑矣倘或其人陰血素虧暑毒深入血分進以此丸率不立至危殆乎良方復有地榆散治中暑昏迷不省人事而欲死者但用平常凉血之藥清解深入血分之暑風良莫良於此矣後有用之屢效而美其名爲滌火散者知言哉夫中天火運流金爍石而此能滌之益見暑風爲心火暴甚煎熬陰血舍清心凉血之外無可撲滅矣綜覈方而論列之以其詳故益加詳焉

論金匱治暍用白虎加人參湯瓜蒂湯二方

金匱治暍病止出二方一者白虎加人參湯顯治其熱以夏月之熱淫必僭而犯上傷其肺金耗其津液用之以救肺金存津液也孫思邈之生脈散李東垣之清暑益氣湯亦既祖之矣一者瓜蒂湯顯治其濕以夏月之濕淫上甚爲熱亦先傷其肺金故外漬之水得以聚於皮間皮者肺之合也用以嘔其胷中之水或吐或瀉而出則肺氣得以不壅而皮間之水得以下趨也何後人但宗仲景五苓散爲例如河間之通苓散子和之桂苓甘露飲非不得導濕消暑之意求其引伸瓜蒂湯之制以治上焦濕熱而清夫肺金則絕無一方矣故特舉二方合論其義見無形之熱傷其肺金則用白虎加人參湯救之有形之濕傷其肺金則用瓜蒂湯救之各有所主也二方傷寒痙濕暍篇中不載金匱痙濕暍篇中復出之金鍼堺度宜識之矣

白虎加人參湯本文云太陽中熱者暍是也其人汗出惡寒身熱而渴白虎加人參湯主之蓋夏月汗出惡寒者衛氣虛也身熱而渴者肺金受火剋而燥渴也內經曰心移熱於肺傳爲膈消消亦渴也心火適王肺金受制證屬太陽然與冬月感寒之治不同用此湯以救肺金是爲第一義矣

瓜蒂湯本文云太陽中暍身熱疼重而脈微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致一物瓜蒂湯主之變散爲湯而去赤小豆酸漿水獨用瓜蒂一味煎服嘔去胷中之水則皮中之水得以俱出也嘔中有宣泄之義汗如其故不復水漬皮間矣此即內經以水灌汗乃至不復汗之證仲景會其意言中暍者兼乎中濕有所祖也然水行皮中何以脈見微弱耶蓋中暍脈本虛弱而濕居皮膚內合於肺阻礙榮衛之運行其

脈更見微弱也瞞脈虛弱按之無力濕脈微弱舉之不利濕與瞞合之脈則舉按皆不利也喘去其水而榮衛通肺氣行皐指流利即濕去之徵按之有力即瞞解之徵一物之徵其功效之神且捷者有如此矣水行皮中乃夏月偶傷之水或過飲冷水或以冷水灌汗因致水漬皮中過鬱其外出之陽以故身熱疼重用瓜蒂一物驅逐其水則陽氣行而過鬱之病解矣凡形寒飲冷則傷肺乃積漸使然此偶傷之水不過傷肺所合之皮毛故一嗑即通并無藉赤小豆酸漿水之羣力也即是推之久傷取冷如風寒雨露從天氣而得之者皆足過鬱其上焦之陽又與地氣之濕從足先受宜利其小便者異治矣可無辨歟

辨脈

傷暑之脈內經曰脈虛身熱得之傷暑甲乙經曰熱傷氣而不傷形所以脈虛者是也若難經曰其脈浮大而散殊有未然夫浮大而散乃心之本脈非病脈也仲景不言但補其偏曰弦細芤遲芤即虛豁也弦細遲即熱傷氣之應也其水行皮中之脈則曰微弱見脈爲水濕所持陽氣不行也統而言之曰虛分而言之曰弦細芤遲微弱其不以浮大之脈混入虛脈之中稱爲病暑之脈虛何周耶

律五條

凡治中暑病不辨外感內傷動靜勞逸一概襲用成方者醫之罪也

傷寒夾陰誤用陽旦湯得之便厥傷寒夾陰誤用香薷飲入喉便暗後賢於香薷飲加人參黃芪白朮陳皮木瓜兼治內傷誠有見也而不辨證者之貽誤寧止此乎

凡治中暑病不兼治其濕者醫之過也

熱蒸其濕是爲暑無濕則但爲乾熱而已非暑也故肥人濕多即病暑者多瘦人火多即病熱者多

凡治中暑病遇無汗者必以得汗爲正若但清其內不解其外醫之罪也

中暑必至多汗反無汗者非因水濕所持即爲風寒所閉此宜先散外邪得汗已方清其內若不先從外解則清之不勝清究成瘧痢等患貽累無窮

凡治中暑病無故妄行溫補致令暑邪深入逼血妄行醫之罪也

暑傷氣纔中即厥厥短息有似乎虛故清暑益氣兼而行之不知者妄行溫補致令暑邪深入血分而成衄痢即遇隆冬大寒漫無解期故熱邪誤以溫治其害無窮也

濕溫即暑與濕交合之溫病素傷於濕名暑而入其中也兩膕逆冷腹滿濕得暑而彰其寒入胃頭目痛苦妄言暑得濕而彰其熱此但當分解熱濕之邪而息其焰寧可發汗令兩邪混合爲一邪發汗則口不能言耳不能聞心不知苦但身青面色變顯露於肌肉之外耳瞞病而至重瞞又非虛虛實實之比眞爲醫之所殺矣

景岳全書 臣張介賓著

論證

暑本夏月之熱病然有中暑而病者有因暑而致病者此其病有不同而總由於暑故其爲病則有陰陽二證曰陰暑曰陽暑治猶冰炭不可不辨也陰暑者因暑而受寒者也凡人之畏暑貪凉不避寒氣則或於深堂大廈或於風地樹陰或以乍熱乍寒之時不謹衣被以致寒邪襲於肌表而病爲發熱頭痛無汗惡寒身形拘急肢體痠疼等證此以暑月受寒故名陰暑即傷寒也惟宜溫散爲主當以傷寒法治之又有不慎口腹過食生冷以致寒凉傷臟而爲嘔吐瀉利腹痛等證此以因暑受寒但以寒邪在內治宜溫中爲主是亦陰暑之屬也

陽暑者乃因暑而受熱者也在仲景即謂之中暑凡以盛暑烈日之時或於長途或於田野不辭勞苦以致熱毒傷陰而病爲頭痛煩躁肌體大熱大渴大汗脈浮氣喘或無氣以動等證此以暑月受熱故名陽暑治宜察氣之虛實火之微甚或補或清以固其氣此與陰暑之治大有不同若或因暑之名而不分表裏不察陰陽則誤人不淺矣

陰暑證或在表或在裏惟富貴安逸之人多有之總由恣情任性不慎風寒所致陽暑證惟辛苦勞役之人多有之由乎觸冒暑熱有勢所不容已者然暑熱逼人者畏而可避可避則犯之者少陰寒襲人者快而莫知莫知則犯之者多故凡有病暑者陽暑不多見而陰暑居其八九今之人治暑但見發熱頭痛等證則必曰此中暑也而所用無非寒凉其不達也亦甚矣

傷寒之病雖同爲寒邪而名有不同也傷暑之名雖同爲暑邪而病有不同也傷寒之名有不同者在冬之寒即謂之正傷寒在春之溫即謂之溫病在夏之暑即謂之暑病是溫病暑病亦皆傷寒之別名耳經

日冬傷於寒春必病溫又曰凡病傷寒而成溫者先夏至日者爲病暑即此謂也傷暑之病有不同者其因暑而感寒者寒則傷形即傷寒也因暑而受熱者熱則傷氣即傷暑也是內傷外感但有暑病之不同耳經曰氣盛身寒得之傷寒氣盛身熱得之傷暑即此謂也蓋氣盛身寒者謂身受寒邪而氣無恙也故曰傷寒氣盛身熱者謂冒暑熱而熱傷氣也故曰傷暑此義人多不解而謂傷寒者必身寒則於理不通而大昧經旨矣

夏月盛暑之時必令身有微汗此養身之道最得時宜者也若必使快然無汗則未免陰盛於陽多致疾矣觀之經曰暑當與汗皆出勿止是言暑汗之勿宜止也又曰夏暑汗不出者秋成風瘧是言暑汗不出之爲病也此夏月之汗宜否蓋可知矣

暑有八證脈虛自汗身熱背寒面垢煩渴手足微冷體重是也凡治此者宜調理元氣爲主清利次之中暑死者不可使得冷得冷便死只宜以溫煖之物護其臍中徐徐治之

陰暑論治

凡暑月外感風寒以致陰邪抑遏陽氣而病爲發熱頭痛肢體拘急痠疼無汗惡寒脈緊等證此卽傷寒之屬治以解散爲主宜正柴胡飲小柴胡湯或一二三四柴胡飲之類酌其寒熱虛實隨宜用之若脈見微細氣體虛弱不可發汗者但宜補中氣使元氣漸充則寒邪自散不必攻邪也或用補中益氣湯主之若邪感於外而火盛於內或陽明熱甚者宜柴胡白虎煎之類主之若寒邪在表未解而六脈微細肯冷惡寒或嘔惡泄瀉內無熱證者此正伏陰在內而邪不易解雖在暑月亦速宜溫中如理陰煎理中湯大溫中飲麻桂飲之類皆宜速用不可疑亦不可遲若邪盛於外而中不甚虛者或以五積散以上諸證有不能盡者俱宜以傷寒門諸法察而治之

凡內傷生冷致損胃氣而病爲腹痛泄瀉嘔吐者宜治以溫中散寒爲主若初受寒邪停積未散而脾氣未虛者先宜以抑扶煎五德丸之類主之若胃氣微虛者宜佐關煎五德丸主之若胃氣甚虛者宜溫胃飲理中湯主之若吐瀉已甚脾腎兼傷而痛連小腹二陰或成痢者宜胃關煎理陰煎或九炁丹之類主之若表中寒邪內傷生冷表裏俱病者宜兼治之以和胃飲加柴胡或溫胃飲加柴胡或新方諸柴胡飲察虛實而用之若古方用大順散爲溫中之總治亦何足以盡之也

陽暑論治

酷熱傷人本爲熱證然陽中又有陰陽此不可不辨也凡暑熱中人者其氣必虛以火能尅金而熱傷氣也而熱者不可不清虛者不可不補但陽中之陽者宜兼乎清如身熱頭痛煩躁大渴大汗脈洪滑喜冷水大便乾結小水痛赤之類皆陽證也若氣不甚虛而但有火證者宜白虎湯或益元散主之或火盛之甚者惟玉泉散更妙若汗出脈虛浮煩渴有火而少氣者宜白虎湯加人參湯或仲景竹葉石膏湯宜明桂苓甘露飲之類主之若眩運少氣雖煩渴而火不甚者宜生脈散主之以上諸法用治陽中之陽皆古法之善者若雖壯熱口渴而脈虛無力或重按全無及神困氣促者此脾胃氣虛元陽不足假火之證若誤用白虎等劑其危立至

伏陰論治

凡中暑熱者人皆知爲陽證而不知陽中有陰也蓋外中熱邪而內亦熱者此表裏俱熱方是陽證治宜清補如前若內本無熱而因熱傷氣但氣虛於中者便有伏陰之象故凡治暑熱之證最當辨其陰陽虛實若脈虛無力或爲惡寒背寒或爲嘔惡或爲腹痛泄瀉或四肢鼻尖微冷或不喜涼茶冷水或息短氣促無力以動之類皆陽中之陰證也凡見此類但當專顧元氣惟宜獨參湯徐徐與之爲最妙若兼微嘔惡寒者宜加煨薑與人參等分主之再甚者宜養中煎理中湯五君子煎或五福飲理陰煎之類皆當隨宜用之若虛寒之甚則舍時從證桂附皆所必用切不可因暑熱之名而執用寒涼解暑等劑再伐陽氣則變有不可測也若夏月於盛暑中過於勞倦因而中暑者其勞倦既已傷脾暑熱又以傷氣此本內傷大虛之候當專以調補爲先然後察其有火無火或有邪無邪而兼治如前可也

夏月因暑致病而醫有不知伏陰誤投寒劑以致吐瀉腹痛或外熱內寒煩躁多渴狀若傷寒但察其脈微神困便是陰盛格陽之證速宜溫藥以救其內

夏月既傷暑熱復傷生冷外熱內寒者當專以內寒爲主有滯者清其滯無滯者益其氣但溫中理脾脾氣既復而暑無不退也

夏月伏陰續論

夏月伏陰在內此本天地間陰陽消長之正理顧丹

溪特爲此論而反乖其義因以致疑於人其謂何也觀其所論曰人與天地同一橐籥子月一陽生陽初動也寅月三陽生陽初出於地也此氣之升也巳月六陽生陽盡出於上矣此氣之浮也人之腹屬地氣於此時浮於肌表散於皮毛腹中虛矣世言夏月伏陰在內此陰字有虛之義若作陰凉看其誤甚矣且其時陽浮地上燔灼焚燎流金爍石何陰冷之有若於夏月火令之時妄投溫熱寧免實實虛虛之患乎此丹溪之言虛是固然矣若以陰冷二字爲誤而夏月禁用溫熱此則余所不服也何以見之夫天地之道惟此陰陽陰陽之變惟此消長故一來則一往一升則一降而造化之機正互藏爲用者也經曰陰主寒陽主熱又曰氣實者熱也氣虛者寒也此本陰陽之常性也今既云夏月之陽盡浮於外則陰伏於內矣陰盛則陽衰也非寒而何陽浮於外則氣虛於中矣氣虛卽陽虛也非寒而何此固不易之理也然而尤有顯然者則在井泉之水當三冬之寒冽而井泉則溫盛夏之炎蒸而泉源則冷此非外寒內熱外熱內寒之明驗乎此又歲歲皆然主氣之常候也至若主氣之外又有客氣而天以五周地以六備寒暄遞遷氣更應異如伏明之紀寒清數舉卑監之紀風寒並興堅成之紀陽氣隨陰治化流行之紀寒司物化天地嚴凝太陽司天寒氣下臨寒清時舉太陰司天地迺藏陰大寒且至等義是無論冬夏皆有非時之氣以動爲民病者也又豈因夏月之火令遂可謂之無寒而禁用溫熱乎且伏陰之義本以陰陽對待寒熱爲言若但以寒字爲虛則夏月伏陰宜多虛證冬月伏陽卽無虛矣豈其然乎又若夏月宜禁溫熱則冬月宜禁寒凉無待言也今見四時之病盛夏每多吐瀉深冬偏見瘡疹諸如此類豈非冬多內熱夏多中寒乎總之夏有熱證亦有寒證冬有實證亦有虛證雖從時從證貴乎因病制宜然夏月伏陰之義此實天人之同氣疾病之元機有必不可不察而忽之者也今若丹溪之論則於理反悖而何切於用卽無此論亦何不可近見徐東皐亦述丹溪之說云夏月無寒世人不察而用溫熱爲世通弊若謂夏伏陰宜服溫熱則冬月伏陽宜服寒凉然則孟子冬日飲湯夏日飲水亦不足信歟噫此公都子之言也不過借喻內外原非用析陰陽而徐氏曲引爲證獨不思經文易義儻相背乎內經曰陰中有陽陽中有陰曰寒極生熱熱極生寒曰重陰必陽重陽必陰曰相火之下水氣承之君火之下陰精承之曰此皆陰陽表裏內外雌雄相輸應也故以應天之陰陽也又如周易之兩儀有陰必有陽兩儀而四象陰陽之中復有陰陽也在泰之義則曰內陽而外陰君子道長小人道消也在否之義則曰內陰而外陽小人道長君子道消也由此觀之則丹溪之論東皐之引證皆吾之所不信也故復爲此續論

論香薷飲

香薷飲乃夏月通用之藥何常見富貴之家多有備此老少時常服之用以防暑而不知人之宜此者少不宜此者多也若誤用之必反致疾何也香薷一物氣香竄而性沉寒惟其氣竄所以能通達上下而去苑蒸之濕熱惟其性寒所以能解渴除煩而清搏結之大邪然必果屬陽臟果有火邪果脾胃氣强肥甘過度而宜寒畏熱者乃足以當之且賴其清凉未必無益若氣本不充而服之最能損氣火本非實而服之乃以敗陽凡素稟陰柔及年質將半飲食不健軀體素弱之輩不知利害而效尤妄用者未有不反助伏陰損傷胃氣而致爲吐瀉腹痛及陰寒危敗等證若加黃連其寒尤甚厚朴破氣均非所宜用者不可不審

方

清中湯 中藏經

治中暑口渴

甘草一兩蜜炙黃脆可折　乾薑半兩濕紙裹煨　陳皮二兩

右爲末每服二錢水一盞煎至八分溫冷喫湯點水調皆可

冷香飲子 濟生方

治老人虛人伏暑煩躁引飲無度惡心疲倦服凉藥不得者

草果仁三兩　附子炮去皮臍　橘紅各一兩　甘草半兩

右㕮咀每服一兩水二椀生薑十片煎至半椀去滓沉冷旋旋服不拘時候

五苓散 傷寒

治暑

白朮炒　猪苓　茯苓各一兩半　桂二兩　澤瀉二兩半

右加辰砂名辰砂五苓散

黃連解毒湯 丹溪心法

治中暍

黃連　黃蘗　黃芩　梔子等分

右㕮咀水煎

黃連香薷湯 衛生寶鑑

治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉

黃連四兩　香薷一斤　厚朴去皮薑汁炙熟

白扁豆微炒各半斤

右㕮咀每服五錢水二盞入酒少許煎至一盞沉冷不拘時服

橘皮湯 醫學綱目

治中暑痰逆惡寒

橘皮去白二兩　生薑一兩　棗子去核五枚

甘草炙半兩　人參一錢　竹茹半升

右分五服每服水一盞二分煑取八分去查熱服

消暑丸

治頭痛惡心煩躁消渴霍亂

菉豆粉　石膏各四兩　白礬枯　硫黃各一兩

水浸蒸餅爲丸彈子大辰砂爲衣用薑汁酢點新汲水化開服之

縮脾飲 和劑局方

消暑氣除煩渴

縮砂仁　烏梅肉　草果煨　甘草各四兩炙

乾葛　白扁豆去皮炒各二兩

每服四錢水一椀煎七分水沉冷服以解煩或欲熱欲溫任意服代熱水飲之極效

香薷剉飲 奇效良方下同

解暑毒止霍亂

香薷　厚朴薑製各二錢　白茯苓一錢半

甘草半錢　陳皮　良薑各一錢

右作一服水二鍾入鹽些少煎至一鍾不拘時服

竹葉石膏湯

治熱暑內外皆熱煩躁大渴

石膏半兩　麥門冬　人參各二錢　甘草半錢

半夏湯洗七次一錢半

右作一服水二鍾生薑五片青竹葉十四片粳米一撮煎至一鍾不拘時服

御愛薑蘇丸

治中暑惡心頭疼煩躁生津止渴

紫蘇葉一兩　烏梅肉炒二兩　甘草生三分

桂心去粗皮　香薷各半兩　生薑切焙乾一分

木瓜乾者二兩如生去皮穰切焙

右爲細末煉蜜爲丸如櫻桃大每服一丸細嚼熟水送下

水瓢丸

治冒暑解煩渴

烏梅肉四兩　甘草　青鹽　乾木瓜　白茯苓

檀香各一兩　麝香二錢半

右除麝香別研餘并爲細末煉蜜爲丸每兩作三十丸每服一丸含化或新汲水溫水嚼下不拘時候一方有人參

潑火散

一名地榆散治傷暑煩躁發渴口苦舌乾頭痛惡心不思飲食昏迷不省人事欲死者

青皮去白　赤芍藥　黃連去鬚　地榆各等分

右爲細末每服三錢冷水調下如蓄熱而氣血妄行加甘草等分一方漿水調服如無只以新汲水亦得若血痢水一盞煎服

大黃龍丸 百一選方

治中暑身熱頭痛狀如脾寒或煩渴嘔吐不食

舶上硫黃　硝石各一兩　白礬生　雄黃

滑石各半兩　白麪四兩

右五味研末入麪和勻滴水丸如梧子大每服三十丸新井水下管見云有中暍昏死灌之立甦

檀香丸

解暑毒

檀香一錢　杏仁去皮二錢半　烏梅肉三兩

紫蘇葉二兩　小茴香三錢半　百藥煎二錢

甘草一兩半

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大不時含化

五聖湯

治暑病嘔惡每遇夏月不進飲食疲倦少力見日色則頭目昏痛惡心多睡

貫衆　黃連去鬚　甘草炙　吳茱萸湯洗七次

白茯苓去皮

已上五味并生用各半兩㕮咀平分二服每服用水一椀半煎至一椀去滓放冷候日午時先取香熟甜瓜一枚切去皮作十二片先嚼瓜一片呷藥一二呷送下了再如前嚼瓜一片呷藥一二呷看喫得幾片以藥汁盡爲度不損脾胃不動臟腑須

是覺大煩時服之

蠟梅丸

解暑止渴生津

蠟梅花末　乾薑末　枇杷葉末　百藥煎末

烏梅肉末各一兩　蠟五兩

右先鎔蠟開投蜜二兩和上件藥末搗二三百下丸如雞頭實大夏月長途一日含化一丸妙

廣順散

治中暑煩渴

甘草三兩半炙　肉桂去粗皮　乾薑炮各一兩

紫蘇葉半兩　烏梅肉焙乾一兩半

右爲細末每服二錢冷水調下沸湯調服亦得

一柴胡飲（景岳全書下同）

二柴胡飲

二爲火數從溫散也治暑月外感風寒其人元氣充實腦氣素平無火不宜妄用凉藥以致寒滯不散則爲害非淺宜此主之

厚朴　陳皮留白各一錢半　北細莘一二錢

柴胡一錢半或二三錢　甘草八分　半夏二錢

生薑三五七片

水一鍾半煎七八分溫服

如多濕者加蒼朮

三柴胡飲

三爲木數從肝經血分也治暑月外感風寒其人素禀陰分不足或肝經血少可兼補而散之但血氣虛弱不能外達者宜此主之

柴胡二三錢　炙甘草　陳皮留白各一錢

芍藥一錢半　生薑三五片　當歸二錢（酷寒者易之熱地）

水一鍾半煎七八分溫服

四柴胡飲

四爲金數從氣分也凡人元氣不足或忍饑勞倦而暑月外感風寒或六脈緊數微細正不勝邪等證必須培助元氣兼之解散庶可保全宜此主之若但知散邪不顧根本未有不元氣先敗者

柴胡一二三錢　炙甘草一錢　生薑三五七片

當歸二三錢（寒者少用）　人參二三錢或五七錢

水二鍾煎七八分溫服

五柴胡飲

五爲土數從脾胃也脾土爲五臟之本凡中氣不足而外邪有不散者非此不可此與四柴胡飲相表裏但四柴胡飲專調氣分此則兼培血氣以逐寒邪尤切於時用也神效不可盡述

柴胡一二三錢　白朮炒　當歸各二三錢

熟地三五錢　芍藥錢半炒　炙甘草一錢

陳皮（酌用不用亦可）

水一鍾半煎七分食遠熱服

正柴胡飲

凡暑月外感風寒頭疼身痛等證但血氣平和宜從平散者此方主之

柴胡一二三錢　陳皮一錢半　芍藥二錢

防風　甘草各一錢　生薑三五片

水一鍾半煎七八分熱服

柴胡白虎煎

治暑月陽明溫熱表邪不解等證

柴胡　石膏　黃芩　麥冬各二錢　細甘草七分

水一鍾半加竹葉二十片煎服

玉泉散

一名六一甘露散治暑月陽明內熱煩渴頭痛二便閉結溫疫斑黃等證此益元散之變方也

石膏六兩生用　粉甘草一兩

右爲極細末每服一二三錢新汲水或熱湯或人參湯調下此方加硃砂三錢亦妙

理陰煎

此理中湯之變方也凡脾腎中虛等證宜剛燥者當用理中六君之類宜溫潤者當用理陰大營之類欲知調補當先察此此方通治暑月伏陰在內邪不易解一切熱證但脈見無力者悉假熱之證

若用寒凉攻之必死宜速用此湯

熟地三五七錢或一二兩　當歸二三五七錢
炙甘草一二錢　乾薑炒黃色一二三錢　或加肉桂一二錢

水二鍾煎七八分熱服此方加附子卽名附子理陰煎再加人參卽名六味回陽飲治命門火衰陰中無陽等證

人參益氣湯（東垣十書）

治暑熱傷氣四肢倦怠嗜臥手指痲木

人參一錢二分　黃芪二錢　白芍藥七分　甘草一錢　五味子三十粒　柴胡六分　升麻五分

右水煎服

通谷散（醫門法律）

治傷暑潮熱煩渴小便不利

麥門冬　淡竹葉　車前穗　燈心

右各等分水煎服

薷藿湯（醫學入門下同）

治夏月感冒暑邪

香薷一錢半　厚朴　扁豆　黃連各七分

藿香　紫蘇　白芷　大腹皮　茯苓各六分
白朮　陳皮　桔梗　半夏麴各四分　甘草二分

右㕮咀薑棗煎服

香葛湯

治前證

香薷一錢半　厚朴　扁豆　黃連各七分
升麻三分　葛根　芍藥各二錢　甘草炙一錢

右㕮咀加薑煎

誘行九

治夏月口渴免致飲冷水腹脹猝止吐瀉

百藥煎　麥門冬　烏梅　葛根　人參　甘草

右爲細末蜜丸噙化一丸

薑杜湯（集略）

治夏秋暑熱過食冷物茶水以傷其內過乘凉風以傷其外致惡寒發熱胸膈飽悶飲食不進或吐瀉此內外俱寒冷也

乾薑炮　厚朴　人參　白朮　白茯苓各一錢
陳皮　枳實　羌活　炙甘草各五分

右水二盞薑三片煎服

白虎加人參湯（仲景）

治中暑熱

知母六兩　石膏一斤　甘草二兩　粳米六合此白虎湯也　加人參六錢

以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三

白虎加蒼术湯

前方內去人參加蒼术二兩

右增水作四服

消暑丸（和劑）

治伏暑引飲脾胃不利

半夏一斤醋五升煮乾　甘草生　茯苓各半斤

右爲末薑汁煮糊丸無見生水如桐子大每服五十丸不拘熱湯送下中暑爲患藥下卽甦傷暑發熱頭痛服之尤妙夏月常服止渴利小便雖飲水多亦不爲害應是暑藥皆不及此若痰飲停節並用生薑湯下入夏之後不可缺此藥也

益元散

一名天水散治傷寒表裏俱熱煩渴口乾小便不通及霍亂吐瀉下利腸澼

桂府滑石腻白者六兩　粉草一兩研爛

右爲極細末每服三錢白湯調下新水亦得加辰砂三錢名辰砂益元散加薄荷少許名雞蘇散加青黛末少許名若玉散治療並同但以迴避世俗之輕侮耳

十味香薷飲（百一方下同）

消暑氣和脾胃

香薷一兩　人參　陳皮去白　白朮　白茯苓
白扁豆炒去殼　黃芪　木瓜　厚朴薑汁炒黑
炙甘草各半兩

右爲細末每服二錢不拘時熱湯或冷水調下

三黃石膏湯

治前證

黃連二錢　黃蘗　山梔　元參各一錢　黃芩
知母各一錢五分　石膏三錢　甘草七分

右水煎服

黃芪人參湯

治前證

黃芪一錢（白汗過多倍之）　陳皮　人參　白朮各五分
蒼术半錢（無汁倍之）　甘草炙　當歸身酒洗焙
麥門冬各二分　黃蘗酒洗　神麴炒各三分
升麻六分　五味子九粒

水二盞煎至一盞去查熱食遠或空心服之忌酒濕麵大料物之類及過食冷物

一物瓜蒂湯 金匱 要略
治太陽中暍身熱疼重而脈微弱者
瓜蒂二七箇
右剉以水一升煮取五合去滓頓服

清燥湯 東垣
治前證
黃芪炙一錢半　黃連　蒼朮　白朮炒各一錢
五味子九粒　人參　白茯苓　升麻各三分
當歸一錢二分　陳皮　澤瀉各五分　柴胡
麥門冬　生地黃　神麴炒　猪苓　黃蘗酒製
甘草炙各二分
每服半兩水二盞煎一盞去滓稍熱空心服

水壺蘆丸
治冒暑毒解煩渴
川百藥煎三兩　人參二錢　麥門冬　烏梅肉
白梅肉　乾葛　甘草各半兩
右爲細末麪糊爲丸如雞頭實大每服一丸夏月出行可度一日

香薷丸 和劑
治大人小兒傷暑伏熱煩渴昏悶頭目昏眩胃痛煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發霍亂吐利轉筋
香薷一兩　紫蘇　木瓜　藿香　茯神各五錢
甘草炙赤色　檀香剉　丁香各二錢半
右爲細末煉蜜和丸每兩作三十丸每服一丸至二丸細嚼溫湯下

生脈散 醫學入門
治前證
麥門冬二錢　人參　五味子各一錢
水煎夏月代茶飲之或加黃芪甘草各一錢或加黃蘗二分服之則令人氣力涌出生用

參歸益元湯 萬病回春
治注夏病其證頭眩眼花腿疼脚痿五心煩熱口苦舌乾精神困倦好睡飲食減少脈數無力
當歸　白芍　熟地　白茯苓　麥門冬各一錢
陳皮　知母　黃蘗鹽酒炒各七分　人參五分
甘草三分　五味子十粒
右剉作一貼入棗一枚米一撮水煎服

清氣飲 必用方
治暑傷元氣發熱汗大泄無氣力脈虛細而涇
白朮一錢二分　人參　黃芪　麥門冬　白芍
陳皮　白茯苓各一錢　知母　香薷各七分
黃連炒　甘草各五分　黃蘗三分
右剉入薑三片水煎服

參薷飲
一名却暑清健湯驅暑清熱壯元氣治霍亂吐利
白朮一錢半　人參一錢二分　麥冬　白芍藥
白茯苓各一錢　知母炒　陳皮　香薷各七分
甘草各五分　黃芩炒三分　五味子十粒
右剉入薑三片水煎服

黃芪湯 海藏
治暑渴脈虛弱
人參　白朮土炒　白茯苓　甘草　黃芪蜜炙
白芍藥各一錢
右剉入薑三片水煎服

清暑益氣湯 東垣 十書
治長夏濕熱蒸人四肢困倦精神短少懶於動作身熱煩渴小便黃而數大便溏而頻或泄或痢不思飲食氣促自汗
蒼朮一錢半　黃芪　升麻各一錢　人參
白朮　陳皮　神麴　澤瀉各五分　酒黃蘗
當歸　青皮　麥門冬　乾葛　甘草各三分
五味子九粒
右剉作一貼水煎服此藥參朮黃芪升麻甘草麥門冬當歸五味子黃蘗乾葛是清暑補氣也蒼朮神麴陳皮青皮澤瀉理脾也

二香散 古今醫鑑
治感冒暑風身熱頭痛或泄瀉嘔吐
香附子　香薷各二錢　紫蘇葉　陳皮醋白
蒼朮各一錢　厚朴　白扁豆　甘草各五分
右剉作一貼入薑三片木瓜二片葱白二莖水煎服凡暑月傷風傷寒悉以此藥解表發散

玉露散 丹溪心法下同
治暑渴
寒水石　滑石　石膏　花粉各一兩　甘草五錢
右爲細末每三錢井水調下

黃連香薷飲
治中暑熱渴
香薷三錢　厚朴一錢半　黃連七分半
右剉作一貼入酒少許水煎沉冷服

清肺生脈飲 醫學入門

治暑傷肺致喘煩渴氣促
黃芪二錢　當歸　生地　人參　麥冬各一錢
五味子十粒
右剉水煎服

通苓散 得效方

治傷暑煩渴泄瀉尿澀
木通　車前子　茵陳　瞿麥各一錢
右剉入燈心二十莖麥門冬各二十箇水煎服

桂苓甘露飲 醫學正傳

治伏暑煩渴引飲
滑石二兩　茯苓　澤瀉　石膏　寒水石
甘草各一兩　白朮　猪苓　肉桂各五錢
右爲末每二錢薑湯調下

醍醐湯 局方

解暑熱止煩渴
烏梅肉另焙研末一斤　草果一兩　縮砂仁
白檀香各五錢　煉蜜五斤
右細末入蜜微煎沸攪勻磁器盛冷水調服

春澤湯 得效方

治暑熱燥渴引飲無度或水入卽吐
卽五苓散去桂加人參也

濯熱散 醫學正傳

一名龍腦散治暑熱煩渴及霍亂後渴最妙
白礬　五倍子　烏梅肉　甘草各一兩
右爲末入白麪四兩拌勻每二錢新汲水調下

消暑十全飲 局方下同

治傷暑吐瀉
香薷一錢半　白扁豆　厚朴　紫蘇葉　白朮
赤茯苓　藿香葉　木瓜　白檀香各一錢
甘草五分
右剉作一貼水煎服
解暑三白散
治暑熱引飲過多致吐瀉
澤瀉　白茯苓　白朮各二錢
右剉作一貼入薑三片燈心二十莖水煎服

香薷湯 通俗

治暑病吐瀉
香薷三錢　白扁豆　厚朴　赤茯苓各一錢半
甘草五分
右剉作一貼水煎服或爲末湯點二錢服他暑藥
皆不及此一方無茯苓有茯神一方無茯苓甘草

香朴飲子 丹溪心法

治傷暑吐瀉煩亂
香薷一錢半　厚朴　白扁豆　澤瀉　赤茯苓
陳皮留白　木瓜　半夏　人參　紫蘇葉
烏梅肉各七分　甘草五分
右剉作一貼入薑三片棗二枚煎服一方無陳皮

大順散 局方下同

治暑月煩渴引飲過多脾胃停冷濕作吐瀉
甘草二兩剉長一寸　乾薑　杏仁　肉桂各四錢
先將甘草以白沙同炒黃熟次入薑同炒令熟次
入杏仁同炒黃用篩下去沙淨乃入桂爲末每二
錢水煎溫服如煩躁井華水調下

清暑和中散 右今醫鑑

治中暑傷暑諸證霜降後勿用
香薷二兩　猪苓　澤瀉　滑石　草果各兩半
黃連酒炒　厚朴　木通　車前子炒　枳殼
縮砂各一兩　白朮　赤茯苓　陳皮各七錢
茴香五錢　白扁豆四錢　木香　甘草各三錢
右爲細末每二錢冷水調下或剉一兩煎服亦佳

酒蒸黃連丸 得效方

一名小黃龍丸治伏暑嘔渴惡心及年深暑毒不差者
黃連四兩清酒七合浸之蒸乾以酒盡爲度
右爲末麪糊和丸梧子大每三十丸熟水吞下以
臍腦凉不渴爲驗

桂苓甘露散 儒門事親

治伏暑引飲泄利
滑石一兩　石膏　寒水石　澤瀉　乾葛
白朮　赤茯苓　甘草各五錢　人參　桂皮
藿香各二錢半　木香一錢二分半
右爲末每二錢白湯調下

却暑散 得效方

治傷暑
赤茯苓　甘草生各四兩　寒食麪　生薑各一斤
右爲細末每服一錢不拘時新汲水或白湯調服

枇杷葉散 和劑局方

治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩
香薷七錢半　枇杷葉去毛炙　陳皮焙　丁香
厚朴薑汁炙各半兩　白茅根　麥門冬去心
乾木瓜　甘草炙各一兩

右搗羅爲末每服二錢水一盞生薑三片煎七分溫服溫湯調服亦得如煩躁用井華水調下小兒三歲以下可服半錢更量大小加減

單方

凡暑月暍死以熱湯徐徐灌之小舉其頭令湯入腹即甦千金方下同

凡熱暍煩悶地漿一琖飲之霍亂及中暍卒死者飲一升妙

又方行人暍死車輪土五錢水調澄清服一椀即甦

中暑發昏小青葉井水浸去泥控乾入沙糖擣汁急灌之壽域方

夏月中暑渴死濃煮蓼汁二琖服之外臺秘要

中暑毒死救生散用新胡麻一升微炒令黑攤冷爲末新汲水調服三錢或丸彈子大水下經驗後方

中暍卒死井水和麪一大抄服之千金方

暑月解毒桂苓散肉桂去粗皮不見火茯苓等分爲細末煉蜜丸龍眼大每新汲水化服一丸和劑局方

桂漿止渴水夏月飲之解煩渴益氣消痰桂末一大兩白蜜一升以水二斗先煎取一斗入新瓷瓶中乃下二物打二三百轉先以油紙一重覆上加二重封之每日去紙一重七日開之氣香味美格韻絕高今人多作之義遠本草

中暑不省皂莢一兩燒存性甘草一兩微炒爲末溫水調一錢灌之潞泰方

中暍昏悶夏月人在途中熱死急移陰處就掬道上熱土擁臍上作窩令人溺滿暖氣透臍即甦乃服地漿蒜水等藥林億云此法出自張仲景其意殊絕非常情所能及實救急之大術也蓋臍乃命蒂暑暍傷氣溫臍所以接其元氣之意

凡中暍死不可使得冷得冷便死療之屈艸帶繞暍人臍使兩三人溺其中令溫亦可熱泥和屈艸亦可扣瓦椀底按及車缸以著暍人取令溺須得流去此謂道路窮卒無湯當令溺其中欲使多人溺取令溫若湯便可與之不可泥及車缸恐此物冷暍既在夏月得熱泥土煖車缸亦可用也金匱要略

熱暍昏沉地黃汁一盞服之

小兒中暑吐泄煩渴穀精草燒存性用器覆之放冷爲末每冷米飲服半錢保幼大全

太陽中暍身熱頭痛而脈微弱此夏月傷冷水水行皮中所致瓜蒂二七箇水一升煮五合頓服即吐金匱要略

伏暑水泄白龍丸滑石火煅過一兩硫黃四錢爲末麪糊丸菉豆大每用淡薑湯隨大小服普濟方

暑月吐瀉滑石炒二兩藿香二錢半丁香五分爲末每服一二錢淅米泔調服經驗方

中暑發昏以新汲水滴入鼻孔用扇扇之重者地漿水灌則醒若與冷水飲即死古今醫統

導引

保生祕要曰夏月調攝法呵以泄其火吸以和其心諸心切勿食穢氣觸我靈夏至夜半後地氣一陰生大熱勿食冷受寒霍亂侵更忌房中事元炁離命門大抵甚暑天善於養心則無秋患時當飲六一燈心湯豆蔻香薷水飽醉勿頂風前愼此則無患矣

中暑先飲熱茶或熱湯項要直舌捲托之上齶兩手作拳狀兩足指亦縮緊自然汗發而病愈

醫案

儒門事親曰小鄭年十五田中中暑頭痛困臥不起戴人以雙解散汗之又以米酢湯投之未解薄晚又以三花神祐丸大下之遂愈

張叟年七十一暑月田中因饑困傷暑食飲不進時時嘔吐口中常流痰水腹脅作痛醫者概用平胃散理中丸導氣丸不效又加鍼灸皆云胃冷乃問戴人戴人曰痰屬胃胃熱不收故流痰水以公年高不敢上涌乃使一筋探之不藥而吐去痰涎一升次用黃連清心散導引丸玉露散以調之飲食加進惟大便祕以生薑大棗煎調胃承氣湯一兩奪之遂愈

醫學綱目曰有人頭痛身熱心煩躁渴診其脈大而虛予授以白虎湯數服愈仲景云脈虛身熱得之傷暑又云其脈弦細芤遲何也素問曰寒傷形熱傷氣蓋傷氣不傷形則氣消而脈虛弱所謂弦細芤遲者皆虛脈也仲景以弦爲陰朱龐亦云中暑脈微弱則虛可知

癸丑年故人王彥龍作毘陵倉官季夏時病胷項多

汗兩足逆冷譫語醫者不曉雜進藥已經旬日予診之其脈關前濡關後數予曰當作濕溫治之蓋受暑後受濕暑濕相搏是名濕溫先以白虎加人參湯次以白虎加蒼木湯頭痛漸退足漸溫汗漸止三日愈此名賊邪慢用藥有死之理

保慶門外有酒家姓姜者善歌唱孫愛之忽數日不見使人問之則曰病久將命絕孫診之徧身皆潤兩足冷至膝下腹滿不省人事六脈皆小弱而急問其所服藥取而視之皆陰病藥也孫曰此非受病重藥能重病耳遂用五苓散白虎湯十餘貼病少甦更服全愈姜氏既安詣孫謝因請問曰某得病剌向蒙藥一治而甦願聞治法孫曰汝病傷暑也始則陽微厥而脈小無力衆醫謂陰病遂用陰藥其病愈厥予用五苓散大利小便則腹滿減白虎解利邪熱則病愈凡陰病脛冷則臂亦冷汝今脛冷臂不冷則非下厥上行所以知是陽微厥也

奇效良方曰崇寧二年自太府出爲發運夏及秋患痢兩月一日一夜三四十次然血多白少名醫皆曰此痢也聞青陽鎮李中和助教善醫即遣人召之中和至看脈即曰此非痢也始甚怒之徐叩之李曰血多白少小便澀少即非痢其言中余之病心已神之乃是舊因伏暑小便轉導入大腸由心經而過遂化爲血於大小便下故其狀似痢而非痢也但令大小便各歸本臟即安以通草散劑如大米粒或爲細末劑末即每服枓三錢水一盞煎至七分溫服細末即每服抄二錢依前法煎食後并夜臥各一服便住信知天下有如此妙醫余家一婢久痢服之皆安故記

傳之

薛己醫案曰文選姚海山中暑頭痛發熱氣高而喘肢體倦怠兩手麻木余謂熱傷元氣用人參益氣湯頓安又用補中益氣湯加麥門五味而痊

一男子元氣素弱或頭目眩運或肢體倦熱仲夏因勞役飲食不時兩手麻木肢體倦怠余以爲暑熱傷元氣用人參益氣湯而愈

一儒者每春夏口乾發熱勞則頭痛服清涼化痰藥瀉喘煩躁用香薷飲神思昏惰脈大而虛此因閉藏之際不遠幃幕爲患名曰注夏用補中益氣湯去柴胡升麻加五味麥門炮薑一劑脈益甚仍用前藥加肉桂五分服之即甦更用六味丸而痊

一男子盛暑發熱胃背作痛飲湯自汗用發表之藥昏憒譫語大便不實吐痰甚多用十全大補一劑頓退又用補中益氣加炮薑二劑全愈

趙氏醫貫曰一小兒患嘔吐瀉利煩躁搐搦或以爲驚或以爲風余見其口燥手指茶壺腹中鳴出對諸醫曰易治也借藥籠中三味藥足矣用人參黃連各五分甘草三分水煎冷服下咽頃刻即睡而安或問曰黃連甘草解毒善矣又加人參五分謂何余曰若不用參此兒當病氣弱數日得參明後日復如無病人矣次日果然

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百五十三卷目錄

醫部彙考二百三十三

濕門一

黃帝素問生氣通天論　陰陽應象大論　五藏生成篇　五藏別論　藏氣法時論　宣明五氣論　通評虛實論　太陰陽明篇　痺論　痿論　厥論　熱論　刺熱論　評熱病論　逆調論　氣交變大論　五常政大論　六元正紀大論
靈樞經邪氣藏府病形篇　五邪論　百病始生篇　九宮八風篇
扁鵲難經中篇
張機金匱要略濕
朱肱活人書中風　濕　溫濕
劉完素六書濕病
張從政儒門事親濕
李杲十書陰陽別論　勝口汗論　濕熱成痿論　秋傷於濕論　冬不藏精論
朱震亨心法中濕
戴思恭證治要訣濕痺中傷
李梴醫學入門濕方內外上下
趙獻可醫貫濕論
喻昌醫門法律濕門　痙濕論諸方　風濕論　濕論三條

藝術典第二百五十三卷

醫部彙考二百三十三

濕門一

黃帝素問

生氣通天論

因於濕首如裹濕熱不攘大筋緛短小筋弛長緛短爲拘弛長爲痿

註陽氣者若天與日因而上者也傷於濕者下先受之陰病者下行極而上陰濕之邪上干陽氣而冒明故首如裹濕傷陽氣則化熱矣陽氣者柔則養筋陽氣傷而不能榮養於筋大筋連於骨節之內故變熱而緛短小筋絡於骨肉之外故因濕而弛長短則縮急而爲拘攣長則放縱而爲痿弱

秋傷於濕上逆而欬發爲痿厥

註陰病者下行極而上故秋傷於濕上逆而欬

陰陽應象大論

濕勝則濡瀉

註濕淫所勝則脾土受傷而爲濡瀉之病矣

秋傷於濕冬生咳嗽

註秋時之陰也濕氣之陰也秋傷濕謂之重陰冬欬嗽者重陰而變陽也

中央生濕

註中央主土而灌溉四旁故生濕

地之濕氣感則害皮肉筋脈

註清濕地氣之中人也必從足始故感則害皮肉筋脈

五藏生成篇

青脈之至也長而左右彈有積氣在心下支肘名曰肝痺得之寒濕與痛同法腰痛足滿頭痛

註脈長而彈弦而急也此得之寒濕而陽氣受傷故弦急也邪在心下支肘間故脈左右彈清濕地氣之中人必從足始足厥陰之脈從足上腘入毛中過陰器抵小腹布脅肋故病發與痛病相同而腰痛足冷厥陰與督脈會於巔故頭痛也

脈要精微論

中盛藏滿氣勝傷恐者聲如從室中言是中氣之濕也

註腎爲水藏受五藏之精而藏之如腎不受藏則中盛藏滿不藏而反勝於中則傷動其腎志矣氣勝傷恐則精亦外溢故曰此中氣之濕也聲如從室中言者音不響亮而聲不外出也

藏氣法時論

脾苦濕急食苦以燥之禁濕地濡衣

註脾屬陰土喜燥惡濕苦乃火味故宜食土以燥之

宣明五氣論

脾惡濕

註惡卽苦之之意

通評虛實論

蹠跛寒風濕之病也

註蹠足也跛行不正而偏廢也風寒濕邪皆能爲之

太陰陽明篇

陽受風氣陰受濕氣

註手太陰主氣而主皮毛故風氣乘之身半以下足太陰陽明皆主之故感地之濕氣故傷於風者上先受之傷於濕者下先受之

註上先受之者言邪氣之中人也高故邪氣在上也下先受之者言清濕地氣之中人也必從足始故清氣在下也

痹論

濕氣勝者爲著痹也

註痹者閉也濕流關節故爲留著之痹其多汗而濡者此其逢濕甚也陽氣少陰氣盛兩氣相感故汗出而濡也

痿論

有漸於濕以水爲事若有所留居處相濕肌肉濡漬痹而不仁發爲肉痿故下經曰肉痿得之濕地也

註有漸於濕者清濕地氣之中於下也以水爲事者好飲水漿濕濁之留於中也若有濕濁之所留而居處又兼卑下內外相濕以致肌肉濡漬痹而不仁發爲肉痿也

調經論

寒濕之中人也皮膚不收肌肉堅緊榮血泣衛氣去故曰虛虛者譬辟氣不足按之則氣足以溫之故快然而不痛

註表陽之氣主於皮膚寒濕之陰邪傷人陽氣是以皮膚不收陽氣不能外禦故邪入於肌肉而堅緊也榮血泣而不行衛氣去於膚表故爲虛也言此虛者虛於外而辟積於內也此表氣不足故按摩之則裏氣出以溫之故快然而不痛

氣交變大論

歲土太過雨濕流行腎水受邪民病腹痛清厥意不樂體重煩寃

註太陰所至爲雲雨蓋濕土之氣上升而爲雲爲雨腹痛腎臟之病土勝而水傷也腎爲生氣之原腎氣受邪故手足厥冷腎藏志志不舒故意不樂腎乃血氣之生原水不能濟火故體重煩寃土運太過諸甲歲也

歲水不及濕迺大行民病腹滿身重濡瀉寒瘧流水腰股痛發腘腨股膝不便煩寃足痿清厥足下痛甚則跗腫

註水運不及土乃勝之故濕氣大行濕土太過傷及腎陰故爲腹滿身重諸病寒毒而無熱化故發爲寒瘧而無膿也寒氣上凌故煩寃也水運不及六癸歲也

五常政大論

備化之紀其令濕

註土氣平和是謂備化在天爲濕土之令也

敦阜之紀大雨時行濕氣乃用燥政乃辟其動濡積并稽其病腹滿四肢不舉大風迅至邪傷脾也

註土運太過是謂敦阜大雨時行乃濕氣上蒸夏秋之交濕土主令濕氣盛故秋之燥氣乃辟濕則濡滯而成積聚腹滿四肢不舉水濕之爲病也土氣太過風乃復之脾反受傷

太陽司天土乃潤水豐衍濕氣變物水飲內稽中滿不食皮痺肉苛筋脈不利甚則腫身後癰

註太陽司天則太陰濕土在泉故土乃潤水豐衍者土能制水也長夏之交水濕相合無火土之長化是以濕氣變物水飲中滿皮痺肉苛皆水濕之爲病身後癰者癰發於背也

六元正紀大論

太陽司天之政寒濕之氣持於氣交民病寒濕發肌肉萎足痿不收濡瀉血溢

註寒濕之氣持於氣交者上下交互也民病肉萎濡瀉諸溢皆寒濕之氣發而爲病也

四之氣風濕交爭民病大熱少氣肌肉萎足痿注下赤白

註加臨之氣乃厥陰風木四之主氣乃太陰濕土是以風濕交爭民病大熱少氣者風濕之病也肉萎足痿者濕土之氣也注下赤白者濕熱之交感也

終之氣地氣正濕令行陰凝太虛埃昏郊野民乃慘淒寒風以至反者孕乃死

註在泉之氣臨於終氣故地氣正而濕令行陰凝太虛者太陰之氣運於上也埃昏郊野者濕土之化布於下也民乃慘淒者陰濕之氣行於中也

少陽司天之政二之氣濕雨乃零民乃康其病熱鬱於上欬逆嘔吐痛發於中胃嗌不利頭痛身熱昏憒膿瘡

註二之客氣乃太陰濕土厥陰風氣雖上從少陽而亦不能勝其雨濕風火氣盛得陰濕以和之故民乃康其有災告則病熱鬱嘔吐昏憒膿瘡諸證皆陰濕凝於外火熱鬱於內也

太陰司天之政民病寒濕腹滿身膚憤腑腫痞逆寒

厥拘急濕寒合德黃黑埃昏流行氣交

註民病腹滿諸證皆感寒濕之氣而成寒濕合德是以黃黑埃昏流行氣交

初之氣民氣條舒風濕相薄雨乃後民病血溢筋絡拘強關節不利身重筋痿

註初之主客皆風氣所司是以歲前之地氣遷冬令之寒乃去而春氣正風乃來生榮萬物民氣條舒主客之氣與司天之氣相薄故雨乃後至也民病血溢筋痿諸喬皆感風濕之氣所致

三之氣感於寒濕則民病身重腑腫胃腹滿

註司天之氣臨於三氣寒濕之氣行於氣交也

四之氣濕化不流則白露陰布以成秋令民病勝理熱血暴溢瘧心腹滿熱膿脹甚則腑腫

註濕化不流於下則白露陰布以成秋令寒風太陽寒水之氣也民病滿脹等證乃寒濕熱三氣雜至合而為病也

終之氣寒大舉濕大化感於寒則病人關節禁固腰脽痛寒濕推於氣交而為疾也

註終之主客乃在泉寒水之氣故寒大舉寒濕之氣上下相交故濕大化腎為冬藏而主骨關節禁固骨節不利也寒濕推於氣交謂天地之氣上下相推人在氣交之中而為病也

厥陰司天之政四之氣溽暑濕熱相薄爭於左之上民病黃癉而為腑腫

註四之客氣乃少陰君火主氣乃太陰濕土是以溽暑濕熱相薄爭於左之上者謂少陰在司天厥陰之左也民病黃癉腑腫皆濕熱之為病

五之氣燥濕更勝沉陰乃布寒氣及體風雨乃行

註五之客氣乃太陰濕土主氣乃陽明燥金是以燥濕更勝沉陰布而寒及體者二氣并主清寒也太陰所至終為雨陽明所至為惨鳴故風雨乃行

太陰所至為濕生

註德化之常也

濕勝則濡泄甚則水閉腑腫

註濕氣在於四季各主七十二日有奇

太陰司天其化以濕以所臨藏位命其病者也

註臨藏位者天氣上臨而下合人之藏位隨六氣之所傷而命其病也

歲太陰在泉濕淫所勝民病飲積心痛耳聾渾渾焞焞嗌腫喉痹陰病見血少腹痛腫不得小便病衝頭痛目似脫項似拔腰似折脾不可以曲膕如結腨如別

註太陰在泉辰戌也飲積心痛寒濕上乘也耳聾至喉痹乃三焦經病白陰病至不得小便以邪濕下流為腎藏受病自衝頭痛至腨如別乃膀胱經病蓋三焦為決瀆之官膀胱乃水津之腑土氣淫勝而水藏水腑皆為病也

濕淫於內治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之

註濕乃陰土之氣故宜治以苦熱苦能勝濕熱以和陰也酸從木化故佐以酸淡以苦燥之者苦從火化也以淡泄之者淡味滲泄為陽也

太陰司天濕淫所勝腑腫骨痛陰痹陰痹者按之不得腰脊頭項痛時眩大便難陰氣不用儀不欲食欬唾則有血心如懸病本於腎太谿絕死不治

註太陰司天丑未歲也腑腫陰痹感寒濕之氣病在陰者名曰痹故按之不得也腎主骨而膀胱為之腑故腰脊頭項骨痛腎開竅於二陰故大便難陰氣不用者不能上交於心也上下不交則上焦之火熱留於胃胃熱則消穀故善饑胃氣上逆故不欲食也欬唾有血者心火在上而不得上下之相濟也此土淫勝水故病本於腎太谿腎之動脈在足內踝外踝骨上太谿脈不至則氣已絕故死不治

濕淫所勝平以苦熱佐以酸辛以苦燥之以淡泄之濕上甚而熱治以苦溫佐以甘辛以汗為故而止

註濕乃土之濕氣故上甚而熱者亦宜用辛溫發散以汗為故而止

濕化於天熱受勝之治以苦寒佐以苦酸

司天邪氣反勝宜以所勝之氣味平之

太陰之復濕變乃舉體重中滿飲食不化陰氣上厥胃中不便飲發於中欬喘有聲頭項痛重而掉瘈尤甚嘔而密默唾吐清液甚則入腎竅為無度太谿絕死不治

註氣極則變陰濕之氣盛是以體重中滿飲食不化陰氣上逆是以胃中不便欬喘有聲者飲乘於肺也頭項痛重而掉瘈尤甚者所謂因於濕首如裹濕熱不攘大筋緛短小筋弛長緛短為拘弛長為痿也濕乘陽明則嘔密默者欲閉戶牖而獨居也太陰者三陰也陰變而乘於陽則陽欲盡而陰盛是以唾吐清液甚則入腎下乘冬令之寒水也腎開竅於二陰故曰竅瀉

太陰在泉濕客下焦發而濡瀉及爲腫隱曲之疾

註濕客下焦發而濡瀉及爲腫者因客淫於下而太陰之主氣自病也隱曲者前陰也

濕氣大來土之勝也寒水受邪腎病生焉所謂感邪而生病也

註水運不及則濕氣勝之此歲運不及而四時之勝氣又乘而侮之也

諸濕腫滿皆屬於脾

註五藏內合五行五行內生六氣是以五藏之氣病於內而六氣之證見於外也

靈樞經

邪氣藏腑病形篇

身半以上者邪中之也身半以下者濕中之也故曰邪之中人也無有常中於陰則溜於腑中於陽則溜於經

註風雨寒暑天之邪也故中人也高濕乃水土之氣故中於身半以下

五邪篇

雷公曰小子聞風者百病之始也厥逆者寒濕之起也別之奈何黃帝曰常候闕中薄澤爲風冲濁爲痹在地爲厥此其常也各以其邑言其病

註地者地閫也風乃天氣故常候於闕庭寒濕者地氣故候在地部風乃陽邪故其色薄澤寒濕者陰邪故其色冲濁

百病始生篇

清濕襲虛則病起於下

註清濕地氣之中人也必從足始故清氣在下也

九宮八風篇

風從東方來名曰嬰兒風其傷人也內舍於肝外在於筋紐其氣主爲身濕兩實一虛病則爲淋露寒熱

註淋露寒熱者汁出而爲寒爲熱也犯其雨濕之地則風濕相搏而爲痿

扁鵲難經

中濕

何以知中濕得之然當喜汗出不可止何以言之腎主濕入肝爲泣入心爲汗入脾爲涎入肺爲涕自入爲唾故知腎邪入心爲汗出不可止也其病身熱而小腹痛足脛寒而逆其脈沉濡而大此五邪之發也腎主濕濕化五液腎爲心邪故汗出不可止身熱脈大心也小腹痛足脛寒脈沉濡腎也

中濕得之爲賊邪

漢張機金匱要略

濕

太陽病關節疼痛而煩脈沉而細（一作弦）者此名濕痹

濕痹之候小便不利大便反快但當利其小便

濕家之爲病一身盡疼（疼一作痛）發熱身色如熏黃也

濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則噦或胸滿小便不利（利一作舌）舌上如胎者以丹田有熱胸上有寒渴欲得飲而不能飲則口燥煩也

濕家下之額上汗出微喘小便利（一作不利）者死若下利不止者亦死

風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗之病不愈者何也蓋發其汗汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微似欲出汗者風濕俱去也

濕家病身疼發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中則愈

濕家身煩疼可與麻黃加朮湯發其汗爲宜慎不可以火攻之

病者一身盡疼發熱日晡所劇者名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也可與麻黃杏仁薏苡甘草湯

風濕脈浮身重汗出惡風者防己黃芪湯主之

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而濇者桂枝附子湯主之若大便堅小便自利者去桂加白朮湯主之

風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

風濕脈浮身重汗出惡風者防己黃芪湯主之

宋朱肱活人書

中濕

問一身盡痛發熱身黃小便不利大便反快者何曰此名中濕也風雨襲虛山澤蒸氣人多中濕濕流關節須身體煩痛其脈沉緩爲中濕主一身盡痛發熱身黃小便自利者不利大便反快當利其小便宜甘草附子湯五苓散主之

風濕

問支體痛重不可轉側額上微汗不欲去被或身微

腫者何曰此名風濕也脈浮爲風濕是風氣與濕氣相薄肢體痛重不可轉側額上微汗不欲去被或身微腫宜發汗但發發身潤則風濕俱去若大發其汗則風氣去濕氣在矣麻黃杏仁薏苡甘草湯桂枝加白朮湯甘草附子湯朮附湯杏仁湯敗毒散可選而用之身腫者甘草附子湯加防風

濕溫

問兩脛逆冷胃脘滿多汗頭目痛苦妄言者何曰此名濕溫也其人常傷於濕因而中暑濕熱相薄則發濕溫病苦兩脛逆冷腹滿又胃多汗頭目痛苦妄言其脈陽濡而弱陰小而急治在太陰不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在身青面色變名曰重暍如此死者醫殺之耳白虎加蒼朮湯主之

金劉完素六書

濕病

諸濕腫滿皆屬脾土地之體也土熱極盛則病塞腫滿物濕亦然故長夏屬土則庶物隆盛也

諸瘧强直積飲痞隔中滿霍亂吐下體重腑肉如泥按之不起皆屬於濕

諸瘧强直筋勁强直而不柔和也土主安靜故也陰瘧曰柔瘧陽瘧曰剛瘧亢則害承乃制故濕過極則反兼風化制之然兼化者虛象而實非風也

積飲留飲積蓄而不散也水得燥則消散得濕則不消以爲積飲也土濕主否故也

濕爲積飲痞隔而土主形體位在中央故中滿也

濕爲留飲痞隔而傳化失常故甚則霍亂吐瀉也

體重輕清爲天重濁爲地故土濕爲病體重宜也

腑腫肉如泥按之不起泥之象也土過濕則爲泥濕爲病也積飲痞隔中滿霍亂吐下體重故甚則腑腫矣

濕本土氣火熱能生土濕故夏熱則萬物濕潤秋涼則濕復燥乾也濕病本不自生因於火熱佛鬱水液不能宣行卽停滯而生水濕故凡病濕者多自熱生而熱氣尚多以爲兼證當云濕熱亦猶風熱義同雖病水寒不得宣行亦能爲濕雖有此異亦以鮮矣或腑腫體寒而有水者以爲蓄熱入裏極深本非病寒也及夫寒熱吐瀉因得濕而成也

諸瘧項强皆屬於濕寒濕同性水火同居故足太陽膀胱經屬水而位下所以濕可傷也其脈起目內眥上額交於巔上其直者從巔入絡於腦還出別下項故主項强太陽表中風加之以濕客於經中內挾寒濕則筋脈抽急故瘧强而不柔和也此太陽寒濕當詳有汗無汗治以流濕祛風微微發散而愈也

風勝濕濕自土生風爲水化土餘制之以風脾盛治之以燥故濕傷肉濕勝則濡泄甚則水閉腑腫土注曰濕爲水水盛則腫水下形肉已消又曰濕氣爲淫皆爲腫滿但除其濕腫滿自衰若濕氣在上以苦吐之濕氣在下以苦瀉之以淡滲之治濕之法不利小便非其治也故濕淫所勝平以苦熱佐以酸辛以苦燥之以淡泄之若濕上甚而熱治以苦溫佐以甘辛以汗爲故而止濕淫於內治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之脾苦濕急食苦以燥之又曰土氣之下木氣承之木草曰燥可去濕桑白皮赤小豆之屬王注曰身半已上濕氣有餘火氣復鬱所以明其熱能生濕經云風寒在下燥熱在上濕氣在中火遊行其間是以熱之用矣故土主濕黔雲雨而宏靜雨熱極甚則飄驟散落是反兼風木制其土也若脾甚土自燥去其濕以寒除熱脾土氣衰以甘緩之所以燥泄積飲痞隔腫滿濕熱乾涸消渴慎不可以溫藥補之故積溫成熱性之溫乃勝氣之藥也故此臟喜新而惡陳常令涎澤無使乾涸土平則備化太過則敦阜不及則卑監

元張從政儒門事親

濕

夫濕者爲太陰濕土之主也諸濕腫滿霍亂泄注腑腫骨痛及腰膝頭項痛痹痠厥唾有血心懸如饑熱痛始作三陽受之一日太陽二日陽明三日少陽可汗而已如四日太陰五日少陰六日厥陰可下而已或七日不愈再傳至十三日火邪皆去六經悉和則愈矣

凡男子婦人病水濕瀉注不止因服豆蔻烏梅薑附酸熱之劑經曰陽氣耗減於內陰精損削於外三焦閉溢水道不行水滿皮膚身體痞腫面黃腹大小便亦色兩足按之陷而不起內經曰諸濕腫滿皆屬脾土可用獨聖散吐之如時月涼寒宜於燠室不透風處用火一盆藉火力出汗次以導水禹功最病人虛實瘍十餘行濕去腫減則愈矣是汗下吐三法俱行三法行畢臟腑空虛先宜以淡漿粥養腸胃三兩日次服五苓益元同煎或燈心湯調下亦可如大勢未盡更服神功散可以流濕潤燥分陰陽利水道既平之後宜大將息慎忌油鹽酒果房室等事三年則不

復作矣

李杲十書

陽明病濕勝自汗論

或曰濕之與汗陰乎陽乎曰西南坤土也脾胃也人之汗猶天地之雨也陰滋其濕則爲霑露爲雨也陰濕寒下行之地氣也汗多則亡陽陽去則陰勝也甚爲寒中濕勝則音聲如從瓮中出濕若中水也相家有說土音如居深瓮中言其壅也遠也不出也其爲濕審矣又知此二者一爲陰寒也內經曰氣虛則外寒雖見熱中蒸蒸爲汗終傳大寒知始爲熱中表虛亡陽不任外寒終傳寒中多成痺寒矣色以候天脈以候地形者乃候地之陰陽也故以脈氣候之皆有形無形可見者也

濕熱成痿肺金受邪論

六七月之間濕令大行于能令毋實而熱壯濕熱相合而刑庚大腸故寒涼以救之燥金受濕熱之邪絕寒水生化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰以下痿弱癱瘓不能動行走不正兩足欹側以清燥湯主之

秋傷於濕冬生欬嗽

秋者清肅之氣收斂下行之體也爲濕所傷是長夏之氣不與秋令也秋令不及所勝妄行故火得以炙上而剋金心火既刑於肺故肺氣逆而爲欬所不勝者侮之故木氣上行與火同德動而不息也所生者受病而腎水虧也長夏已亢三焦之氣盛也命門者三焦之舍也故迫腎水上行與脾土濕熱相合爲痰因欬而動於脾之濕也是以欬嗽有聲有痰欬嗽不發於秋而發於冬者以其六陰之極肅殺始得其氣故肺不欬嗽於秋而欬嗽於冬也欬嗽者氣逆行上也氣上行而逆故面目發微腫極則身體皆腫變爲水氣故曰濁氣在上則膹脹又曰諸氣膹鬱皆屬肺金此之謂也春傷於風夏傷於暑冬傷於寒辭理皆順特字傷令字也獨秋傷於濕作令字傷時字讀者不疑也此四者皆無所亢而害其所乘之于也邪從後至言歲之主氣各差其分而爲病一定之法也若說秋字傷濕字其文與上三句相通其理與法不相通大抵理與法通不必拘於文也故說詩者不以文害辭不以辭害意以意逆志爲得之矣故曰春傷於風說作人爲風所傷非也若是則止當頭痛惡風自汗何以言夏爲飧泄哉今言春傷於風即是時傷令也明矣經云東方來爲嬰兒風其傷人也外在於筋內舍於肝又曰春甲乙所謂之肝風用此二句以較前文則辭理自通矣

朱震亨心法

中濕

本草云蒼术治濕土下部皆可用

二陳湯中加酒芩羌活蒼术散風行濕

脾氣受濕沉困無力怠惰嗜臥

去痰須用白术

上部濕蒼术功烈下部濕宜升麻提之外濕宜表散內濕宜滲滲

若燥濕以羌活勝濕湯平胃散之類

若風濕相搏一身盡痛以黃芪防己湯

若濕勝氣實者以神佑丸舟車丸服之氣虛者桑皮茯苓人參葶藶木香之類

凡肥人沉困怠惰是濕熱宜蒼术茯苓滑石

凡肥白之人沉困怠惰是氣虛宜二术人參半夏草果厚朴芍藥

凡黑瘦而沉困怠惰者是熱宜白术黃芩

凡飲食不節脾胃受傷不能遞送宜枳术丸

去上焦濕及熱須用黃芩瀉肺火故也又如肺有濕亦宜黃芩如肺有虛熱宜天門冬麥門冬知母用黃芩多則損脾

去中焦濕與痛熱用黃連瀉心火故也如中焦有實熱亦宜黃連若脾胃虛弱不能運轉而鬱悶宜黃芩白术乾葛若中焦濕熱積久而痛乃熱勢甚盛宜黃連用薑汁炒

去下焦濕腫及痛併膀胱有火邪者必須酒洗防己黃蘗知母草龍膽又云凡下焦有濕草龍膽防己爲君甘草黃蘗爲佐如下焦腫及痛者是濕熱宜酒防己草龍膽黃芩蒼术

若肥人氣虛之人腫痛宜二术南星滑石茯苓

黑瘦之人下焦腫痛宜當歸桃仁紅花牛膝檳榔黃蘗

戴思恭曰濕有自外入者有自內出者必審其方土之致病源東南地下多陰雨地濕凡受必從外入多自下起以腿腫腳氣者多治當汗散久者宜疎通滲泄西北地高人多食生冷濕麵濕酪或飲酒後寒氣怫鬱濕不能越以致腹皮脹痛甚則木鼓脹滿或通身浮腫按之如泥不起此皆自內而出也辨其元氣多少而通利其二便責其根在內也此方土內外亦

互相有之但多少不同須對證施治不可執一

明戴思恭證治要訣

濕辨中傷

風寒暑濕皆能中人惟濕氣積久留滯關節故能中非如風寒暑之有暴中也中濕之證關節痛重浮腫喘滿腹脹煩悶昏不知人宜白朮酒有破傷處因澡浴濕氣從瘡口中入其人昏迷沉重狀類中濕名曰破傷宜白朮酒

傷濕爲病發熱惡寒身重自汗骨節疼痛小便祕澀大便多泄腰脚痹冷皆坐臥卑濕或冒雨露或著濕衣所致宜滲濕參附湯并除濕湯

具前諸證而腰痛特甚不可轉側如繩五六貫重皆由濕氣入腎經腎屬水從其類也宜腎著湯或滲濕湯煎服

小便祕大便溏者左傳雨淫腹疾者是也五苓散吞戊己丸戊己屬土土能尅水因以得名五苓乃濕家之要藥經云治濕不利小便非其治也義蓋取此

傷濕而兼感風者既有前項證而又惡風不欲去衣被或額上微汗或身體微腫汗漬衣濕當風坐臥多有此證宜除濕湯桂枝湯各半貼和服合微發汗若大發其汗則風去濕在已得汗而發熱不去者敗毒散加蒼朮一錢防風半錢

傷濕又兼感寒有前諸證但無汗慘慘煩痛宜五積散和除濕湯各半貼微發汗已仍復熱而渴者除濕湯半貼和五苓散半貼

傷濕而兼感風寒者汗出身重惡風喘滿骨節煩疼狀如歷節風腫下連脚冷痹不能屈伸所謂風寒濕合成痹宜防己黃芪湯五痹湯詳五痹用藥於風濕最宜若因浴水未解裙衫身上未乾忽爾熱睡致及腎經外腎腫痛腰背攣曲只以五苓散一貼入眞坯少許下青木香丸如此二服臟腑纔通腫消腰直其痛自止

李梴醫學入門

濕分內外上下

風寒暑暴傷人便有濕氣熏蒸人多不覺有自外入者長夏鬱熱山澤熏氣冒雨行濕汗透沾衣多腰脚腫痛有自內得者生冷酒麪滯脾生濕鬱熱多肚腹腫脹西北人多內濕東南人多外濕

濕在上宜微汗在中下宜利二便或升提

初入身沉重多困倦或肢節痛或一身盡痛甚則濕聚爲痰昏不知人爲直視爲鄭聲

首位高氣清濕熏則如有物以蒙之也單蒼朮齊妙

上熏喘咳茯苓湯

著脾面浮黃腫脹滿或臍下硬退黃丸大便泄朮附湯三白湯滲濕湯

濕下先受之著腎故腰脚攣痛獨活寄生湯當歸拈痛湯腎著湯青娥丸

微汗防己黃芪湯或羌活勝濕無汗者五苓散加蒼朮遍經絡神仙飛步丹乳香黑虎丹

治宜滲小便利大便爲妙工滲劑五苓散面黃加茵陳一倍身痛加羌活一倍濕盛膨脹者又當以車前木通葶藶利水行氣爲君以參朮茯苓爲佐或以二朮爲君以利水藥爲佐濕鬱肢腹或遍身浮腫者皆自內而出也量虛實利之不敢利者退黃丸妙

更有四氣相兼須分兼中兼感若濕熱甚除濕湯兼風合桂枝湯或古防風湯敗毒散兼寒合五積散或古薑附湯兼暑合五苓散大抵百病兼風則必惡風有汗脫運兼寒則必惡寒無汗或攣痛兼暑則必面垢煩渴兼濕則必腫滿沉倦四氣互相兼併惟寒濕濕熱爲病而濕熱尤多以尿赤有渴爲濕熱多黑瘦膏粱之人以便清不渴爲寒濕多肥白淡食之人昔有專用五積治寒濕防風通聖散治濕熱宜哉

清熱燥濕兼補中此治濕熱法也凡內傷勞役七情飲食以致脾虧火動肺金受傷則木旺侵脾令飲食不化鬱爲痰積甚則腹脹浮腫實者下之虛者補脾利濕治導兼以清熱清燥湯是也濕勝筋痿熱勝筋縮者尤宜

通用內外熱濕燥脾并升散燥脾枳朮丸大安丸單蒼朮丸升陽除濕湯通用二陳湯或平胃散加桑白皮爲主濕在上焦加羌活蒼朮微汗有熱加黃芩中焦濕加豬苓澤瀉滲利熱加黃連下焦濕加升麻防風升提熱加防己黃蘗龍膽草肥人多濕加蒼朮滑石瘦人多熱加芩朮沉困加參朮又四製蒼蘗丸三精丸

元氣而濕熱甚者導水丸或除濕丹舟車丸

趙獻可醫貫

濕論

有在天之濕雨霧露是也在天者本乎氣故先中表之榮衛有在地之濕泥水是也在地者本乎形故先傷肌肉筋骨血脈有飲食之濕酒水乳酪是也胃爲水穀之海故傷於脾胃有汗液之濕謂汗出沾衣未

經解換者是也乃太陰脾土所化之濕不從外入者也陽盛則火勝化爲濕熱陰盛則水勝化爲寒濕其證發熱惡寒身重自汗筋骨疼痛小便祕澀大便溏泄腰痛不能轉側胕腫肉如泥按之不起

經曰因於濕首如裹濕氣蒸於上故頭重又曰濕傷筋故大筋緛短小筋弛長緛短爲拘弛長爲痿又曰濕勝則濡泄故大便溏泄大便泄故小便澀又曰濕從下受之故胕腫又曰諸濕腫滿皆屬脾土故腹脹肉如泥濕氣入腎腎主水水流濕各從其類故腰腎痛

治法在上者當微汗羌活勝濕湯在下者當利小便五苓散夫脾者五臟之至陰其性惡濕今濕氣內客於脾故不能腐熟水穀致清濁不分水入腸間虛莫能制故濡泄法當除濕利小便也

東垣曰治濕不利小便非其治也又曰在下者引而竭之聖人之言雖布在方策其不盡者可以意求耳夫濕淫從外而入裏若用滲淡之劑以除之是降之又降是復益其陰重竭其陽則陽氣愈削而精神愈短矣是陰重強陽重衰反助其邪之謂也故用升陽風藥卽瘥以羌活獨活柴胡升麻各一錢防風根半錢炙甘草半錢水煎熱服大法云濕淫所勝助風以平之又曰下者舉之得陽氣升騰而愈矣又曰客者除之是因曲而爲之直也夫聖人之法可以類推舉一而知百也

有脚氣類傷寒發熱惡寒必脚脛間腫痛俱從濕治千金方有陰陽之分陰脚氣脛處腫而不紅陽脚氣腫而紅者是也

有濕熱發黃者當從鬱治凡濕熱之物不鬱則不黃禁用茵陳五苓散凡見用五苓茵陳者十不一生當用逍遙散

凡傷寒必惡寒傷風必惡風傷濕必惡雨如傷濕而兼惡寒無汗骨節疼痛者仲景有甘草附子湯

醫門法律　臣鑒昌著

濕論

經曰傷於濕者下先受之言地濕之中人先中其履地之足然後漸及於上者也曰濕流關節言地濕之中人流入四肢百節猶未入於臟腑者也曰陰受濕氣言地濕之中人已入於太陰脾土未入於陽明胃土者也曰濕上甚爲熱此則下受之濕襲入三陽胷背頭面之間從上焦之陽而變爲濕熱者也濕至上焦而變熱其證夏月爲最多蓋夏月地之濕氣上合於天之濕氣日之暑氣結爲炎蒸人身應之頭面赤腫瘡癤叢生疫邪竊據其由來自非一日矣

諸家論濕但云濕流關節止耳至濕上甚爲熱之旨從未言及今悉論之濕上甚爲熱內經豎一義云汗出如故而止妙不容言蓋濕上甚爲熱卽所謂地氣上爲雲也汗出如故卽所謂天氣下爲雨也天氣下爲雨而地氣之上升者已解散不存矣治病之機豈不深可會哉

濕上甚爲熱其人小便必不利蓋膀胱之氣化先爲濕熱所壅而不行是以既上之濕難於下趨經又曰治濕不利小便非其治也可見治上甚之濕熱利其小便卽爲第二義矣然有陽實陽虛二候陽實者小便色赤而痛利其小便則上焦遏鬱之陽氣通其濕熱自從膀胱下注而出矣陽虛者小便色白不時淋漓而多汗一切利小水之藥卽不得施若誤施之卽犯虛虛之戒不可不辨也

金匱治上焦之濕本內經濕上甚爲熱之義而分輕重二證輕者但發熱面赤而喘頭痛鼻塞而煩邪在上焦裏無別病者但內藥鼻中嗃去濕熱所釀黃水而已以鼻竅爲腦之門戶故卽從鼻中行其宣利之法乃最神最捷之法也重者身熱足寒時頭熱面赤目赤皆濕上甚爲熱之明徵濕熱上甚故頭熱面赤目赤濕熱上甚故陽氣上壅不下通於陰而足寒自成無已謂是濕傷於下風傷於上仲景發明內經奧旨成土苴矣豈其不讀內經耶豈風始生熱濕不生熱耶在冬月傷寒已爲熱病豈夏月傷濕反不爲熱病耶詳仲景以上甚爲熱之重證發入痙病最重之條而不言其治昌欲於此微露一緘然而竿頭之步觀者得無望之却走乎內經原有上者下之之法邪從下而上必驅之使從下出一定之理也其證輕者裏無別病但嗃其黃水從清陽之鼻竅而下出則其重而裏多危證者必驅其黃水從前後二陰之竅而出所可會意也金匱於本文之下增若發其汗者二十四字垂戒初不以下爲戒又可意會也但下法之難不推其所以不可汗之故卽不得其所以用下之權仲景以其頭搖口噤背張幾幾陽之欲亡若更發其汗重虛衛外之陽惡寒必轉甚若發汗已其脈如蛇眞陽脫離頃刻死矣由是推之濕上甚爲熱之重者非用下法難以更生而下法必以溫藥下之庶幾濕去而陽不遂與之俱去耳此非無徵之言也仲景

卽於本篇申一義云下之額上汗出微喘小便利者死豈非因下而并奪其陽之大戒乎噫嘻此殆與性與天道同義矣

論治濕諸方

金匱云濕家身煩疼可與麻黃湯發其汗爲宜愼不可以火攻之此治濕熱兩停表裏兼治之方也身煩者熱也身疼者濕也用麻黃取微汗以散表熱用白朮健脾以行裏濕而麻黃得朮則雖發汗不至多汗朮得麻黃并可行表裏之濕下趨水道又兩相維持也傷寒失汗而發黃用麻黃連翹赤小豆湯分解濕熱亦是此意但傷寒無用朮之法金匱復出此法又可見雜證脾濕內淫必以朮爲主治矣

凡夏月之濕皆爲熱濕非如冬月之濕爲寒濕也而金匱取用附子之方不一而足者何耶宜乎據方推證者莫不指熱濕爲寒濕矣不思陽氣素虛之人至夏月必且益虛虛故陽氣不充於身而陰濕得以據之此而以治濕之常藥施之其虛陽必隨濕而俱去有死而已故陽虛濕盛舍助陽別無驅濕之法亦不得不用之法耳

金匱云傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而濇者桂枝附子湯主之若大便堅小便自利者去桂加白朮湯主之用桂枝附子溫經助陽固護表裏以驅其濕以其不嘔不渴津液本損故用之也若其人大便堅則津液不充矣小便自利則津液下走矣故去桂枝之走津液而加白朮以滋大便之乾也此連下條甘草附子湯俱傷寒論太陽篇中之文也傷寒痙濕暍篇中不載而金匱痙濕篇中載之可見治風濕與治熱濕其陽虛者之用本方不當彼此異同矣而傷寒論但云若大便堅小便自利者去桂加白朮湯主之金匱重立其方且於方下云一服覺身痹半日許再服三服都盡其人如蜎狀勿怪卽是朮附幷走皮中逐水氣未得除故耳成無己註傷寒於此條云以桂枝散表之風附子逐經中之濕總不言及陽虛而昌諺復言之得此一段始爲有據其一段覺身痹者藥力雖動其濕而陽氣尚未充不便運旋也三服都盡陽氣若可行矣徧身如攢針之刺其漠而難辛之狀尚若此金匱可謂善於形容矣不但此也人身藉有陽氣乎持足行輕矯無前何至不能自轉側乎此豈可誤咎於濕乎卽謂濕勝陽氣果安往乎兄其證不嘔不渴其脈浮虛而濇陽虛確然無疑無已輒以治風濕之外邪爲訓寧不貽誤後人耶

金匱云風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之此亦陽虛之證與前條大約相同風傷其衛而陽不固於外濕流關節而陽不充於經用此固衛溫經散濕也

金匱云風濕脈浮身重汗出惡風防己黃芪湯主之此治衛外之陽大虛而在裏之真陽無患者附子卽不可用但用黃芪實衛白朮健脾取甘溫從陽之義以緩圖而平治之方下云服後當如蟲行皮中從腰以下如水煖坐被上又以一被圍腰以下溫令微汗差可見汗出乃是陽虛自汗而腰以下屬陰之分則無汗也服此雖動其濕而衛外之陽尚不足以勝之故皮中如蟲行較前徧身如蜎之狀爲少殺矣姑以煖被圍腰以下接令微汗以漸取差亦從下受者從下出之之法也

閻清熱滲濕湯一方差合鄙意以夏月所受之濕爲熱濕暑濕而羣方所主之藥多在寒濕風濕殊不愜耳方後云如單滲濕去黃連黃蘗加橘皮乾薑仍是去寒增熱依樣葫蘆矣

二朮四苓湯方通治表裏濕邪從水道出兼清暑熱之氣所宜遵也

濕上甚而熱汗之則易下之則難故當變其常法而爲表散羌活勝濕湯得之

攻下之方多過於峻續隨子丸治肺經病以人參爲君海金砂散以白朮爲君差可耳

脾惡濕濕從下入而傷其脾是以身重足軟小便濇大便反利不溫其脾濕無由去當以除濕湯加清熱利水藥

白朮酒方專一理脾不分功於利小便蓋以脾能健運濕自不留而從水道出耳然則胃中津液不充不敢利其小便者得此非聖藥乎

風濕論

風也濕也二氣之無定體而隨時變易者也濕在冬爲寒濕在春爲風濕在夏爲熱濕在秋爲燥濕以濕土寄王於四季之末其氣每隨四時之氣而變遷昌言之矣惟風亦然風在冬爲嚴發之寒風在春爲調暢之溫風在夏爲南熏之熱風在秋爲凄其之凉風內經謂風者百病之長其變無常者是也其中人也風則上先受之濕則下先受之俱從太陽膀胱經而

入風傷其衛濕流關節風邪從陽而親上濕邪從陰而親下風邪無形而居外濕邪有形而居內上下內外之間邪相搏擊故顯汗出惡風短氣發熱頭痛骨節煩疼身重微腫等證此固宜從汗解第汗法不與常法相同用麻黃湯必加白术或加薏苡仁以去其濕用桂枝湯必去芍藥加白术甚者加附子以溫其經其取汗又貴徐不貴驟驟則風去濕存徐則風濕俱去也其有不可發汗者緣風濕相搏多夾陽虛陽虛即不可汗但可用辛熱氣壯之藥扶陽以逐濕而已凡見短氣雖爲邪阻其正當慮胃中陽虛凡見汗出微喘雖爲肺氣感邪當慮眞陽欲脫明眼辨之必蚤也傷寒論中風濕相搏以夏熱而例三時其曰病者一身盡痛發熱日晡所劇者名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致豈非夏月當風取涼過久而閉其汗乎日晡所劇其病在陽明然與痙病之齘齒熱甚入深陽明可下之證不同此但可汗而不可下也何以言之內經謂太陰陽明爲表裏外合肌肉故陽受風氣陰受濕氣所以風濕客於太陰陽明即爲半表半裏而一身之肌肉盡痛即爲在表之邪未除故可汗而不可下也況人身之氣晝日行陽二十五度平旦屬少陽日中屬太陽日西屬陽明日晡所劇邪在陽明而太陽少陽之氣猶未盡退故亦可汗不可下也觀金匱一則曰可與麻黃加术湯發其汗爲宜愼不可以火攻之再則曰可與麻黃杏子薏苡甘草湯雖未言及不可下而其可汗不可下之意比例具見矣若下之則虛其衛氣而風邪下陷濕邪上涌其變不可勝言矣其濕流關節之痛脈見沉細者則非有外風與之相搏祇名濕痹濕痹者濕邪痹其身中之陽氣也利其小便則陽氣通行無礙而關節之痹并解矣但小便利已而關節之痹不解必其人陽氣爲濕所持而不得外泄或但頭間有汗而身中無汗及欲得被蓋向火者又當微汗以通其陽也因風濕相搏之文錯見不一難與會通故并及之

暑濕論

體中多濕之人最易中暑兩相感召故也外暑蒸動內濕二氣相交因而中暑所以肥人濕多夏月百計避暑反爲暑所中者不能避身之濕即不能避天之暑也益元散驅濕從小便出夏月服之解暑有自來矣然體盛濕多則宜之清燥無濕之人津液爲時令所耗當用生脈散充其津液若用益元妄利小水竭其下泉枯槁立至況暑濕蒸動之濕即肥人多有內夾虛寒因致霍亂吐瀉冷汗四逆動關性命者徒恃益元解暑驅濕反促其臟腑氣絕者比比可不辨而輕用之歟不特此也凡見汗多之體即不可利其小便蓋胃中只此津液夫既外泄又復何行所謂立匱之術也仲景名曰無陽其脈見短促結代則去生遠矣

脾惡濕夏月濕熱相蒸多有發黃之候然與傷寒陽明瘀熱發黃微有不同彼屬熱多其色明亮此屬濕多其色黯晦

內經云濕勝爲著痹金匱獨以屬之腎名曰腎著云腎著之病其人身體重腰中冷如坐水中形如水狀反不渴小便自利飲食如故病屬下焦身勞汗出衣裏冷濕久久得之腰以下冷痛腹重如帶五千錢甘薑苓术湯主之此證乃濕陰中腎之外廓與腎之中臟無預者也地濕之邪著腎臟外廓則陰氣凝聚故腰中冷如坐水中實非腎臟之精氣冷也若精氣冷則膀胱引之從夾脊逆於中上二焦榮衛上下之病不可勝言今邪只著下焦飲食如故不渴小便自利且與腸胃之腑無預況腎臟乎此不過身勞汗出衣裏冷濕久久得之但用甘草乾薑茯苓白术甘溫從陽滲行濕足矣又何取煖胃壯陽爲哉

律三條

凡治濕病禁發其汗而陽鬱者不微汗之轉致傷人醫之過也

濕家不可發汗以身本多汗易致亡陽故濕溫之證誤發其寒名曰重喝此爲醫之所殺古律垂戒深矣其久冒風涼恣食生冷乃至以水灌汗遏抑其陽者不微汗之病無從解內經謂當暑汗不出者秋風成瘧亦其一也不當汗者反發其汗當微汗者全不取汗因噎廢食此之謂也

凡治濕病當利小便而陽虛者一概利之轉致殺人醫之罪也

濕家當利小便此大法也而眞陽素虛之人汗出小便滴瀝正泉竭而陽欲出亡之象若以爲濕熱恣膽利之眞陽無水維持頃刻脫離而死矣此法所不禁中之大禁也

凡治中濕危篤之候即當固護其陽若以風藥勝濕是爲操刃即以溫藥理脾亦爲待斃醫之罪也

人身陽盛則輕矯濕盛則重著乃至身重如山百

脈痛楚不能轉側此而不用附子回陽勝濕更欲何待在表之濕其有可汗者用附子合桂枝湯以驅之外出在裏之濕其有可下者用附子合細辛大黃以驅之下出在中之濕則用附子合白朮以溫中而燥其脾今之用白朮而雜入羌防枳朮梔橘等藥且無濟於事況用檳榔滑石舟車導水瀉川等法乎

景岳全書 臣張介賓著

論證

濕之爲病有出於天氣者雨霧之屬是也多傷人臟氣有出於地氣者泥水之屬是也多傷人皮肉筋脈有由於飲食者酒醪之屬是也多傷人六腑有由於汗液者以大汗沾衣不遍解換之屬是也多傷人膚腠有濕從內生者以水不化氣陰不從陽而然也悉由脾腎之虧敗其爲證也在肌表則爲發熱惡寒自汗在經絡則爲痹重筋骨疼痛腰痛不能轉側或四支痿弱痠痛在肌肉則爲痲木腑腫黃疸按肉如泥不起在臟腑則爲嘔惡脹滿小水祕澀或黃赤大便泄瀉腹痛後重脫肛癰疽等證凡肌表經絡之病濕由外入飲食血氣之病濕由內生此其在外者爲輕在內者爲甚是固然矣及其甚也則未有表濕而不連臟者裏濕而不連經者此其濕病之變不爲不多故凡治此者必當辨表裏察虛實而必求其本然濕證雖多而辨治之法其要惟二則一曰濕熱一曰寒濕而盡之矣蓋濕從土化而分王四季故土近東南則火土合氣而濕以化熱土在西北則水土合德而濕以化寒此土性之可以熱可以寒故病熱者謂之濕熱病寒者謂之寒濕濕熱之病宜清利熱去濕亦去也寒濕之病宜燥溫非溫不能燥也知斯二者則濕無餘義矣何今人動輒便言濕多成熱而未聞知有寒多生濕者其果何也豈寒熱之偏勝原當如是耶抑陰陽之顯晦察有易難也且陰陽之理本無軒輕猶權衡也此而不知烏云明慧掷一偏之說以遺患後人則金元諸公有不得辭其責者

論治

濕熱證必其證多煩渴小水赤澀大便祕結脈洪滑實數者方是熱證治宜清利熱甚者宜以清火爲主而佐以分利熱微者宜以分利爲主而佐以清火如四苓散小分清飲或大分清飲茵陳飲之類擇而用之如果濕熱之甚或元氣無損而兼祕結不通者方可或行推蕩若無實結等證則不宜妄行攻擊

寒濕證凡諸病濕而全無熱脈熱證者便多寒濕之屬蓋水之流濕本緣同氣惟濕中有火則濕熱熏蒸而停鬱爲熱濕中無火則濕氣不化而流聚爲寒故凡病內濕等證者多屬氣虛之人氣屬陽而虛則寒從中生寒生則濕氣留之然陰陽之性理由自然有不必外中於濕而後爲之濕也此之變病惟腫脹泄瀉痰飲嘔吐等證多有之病之微者宜溫宜利宜燥如五苓散平胃散滲濕湯六味地黃丸之類是也病之甚者必用溫補俟陽氣漸復則陰邪始退如八味丸理中湯聖朮煎或佐關煎薛氏加減金匱腎氣湯之類皆當隨證加減用若寒濕之氣中於外者此與內生之濕自有不同宜溫而兼散如五積散平胃散加味五苓散不換金正氣散之類主之寒濕之證凡氣令陰寒及陽氣不足之人多有其證而丹溪謂六氣之中濕熱爲病者十居八九亦言之過矣

治濕之病凡濕從外入者汗散之濕在上者亦宜微汗之濕在中下二焦宜疎利二便或單用淡滲以利小便

治濕之法古人云宜理脾清熱利小便爲上故曰治濕不利小便非其治也此固然矣然濕熱之證多宜清利寒濕之證多不宜利也何也蓋凡濕而兼寒者未有不由陽氣之虛而利多傷氣則陽必更虛能無害乎但微寒微虛者卽溫而利之自無不可若大寒大虛者則必不宜利此寒濕之證有所當忌者也再若濕熱之證亦有忌利者以濕熱傷陰陰氣既傷而復利之則邪濕未清而精血已耗如汗多而渴熱躁而煩小水乾赤中氣不足溲便如膏之類利之則重損津液害必甚矣故凡治陽虛者只宜補陽陽盛則燥而陰濕自退陰虛者只宜壯水眞水既行則邪濕無所容矣此陰陽二證俱有不宜利者不可不察

濕證之見凡黃疸脾脹泄瀉痰飲嘔吐痹痛淋祕之類皆有濕證當於各門詳察治之

陳無擇曰脾虛多病濕內因酒麵積多過飲湯液停滯賦物燒炙膏粱過度氣熱熏蒸濁液不行涌溢於中此濕從內作

外因坐臥濕地露露陰雨所客澡浴爲風所閉涉水爲濕所鬱鬱於表腠則發黃故經云地之濕氣感則害人皮肉筋脈此濕從外生可見內外所感皆由脾氣虛弱而濕邪乘而襲之故曰壯者氣行則愈怯者著而爲病

濕氣雖外邪之類但濕有陰陽濕從陰者爲寒濕濕從陽者爲濕熱熱則傷陰必連於臟寒則傷陽必連於經此所以熱有表裏必須辨明而治之

濕證之辨當辨表裏經曰因於濕首如裹又曰傷於濕者下先受之若道路衝風冒雨或動作辛苦之人汗濕沾衣此皆濕從外入者也若嗜好酒漿生冷以致泄瀉黃疸腫脹之類此濕從內出者也在上在外者宜微從汗解在下在裏者宜分利之濕熱者宜清宜利寒濕者宜補脾溫腎

酒濕傷陰熱而煩滿者濕熱爲病也清之泄之酒濕傷陽腹痛瀉利嘔惡者寒濕之病也溫之補之

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百五十四卷目錄
醫部彙考二百三十四
濕門二
方　神助散　桂苓白术丸　桂苓白术散　白术調中湯　導水丸　舟車丸　升陽除濕湯　防風通聖散　槟榔丸　除濕湯　白术酒　茯苓湯　除煩丸　無碍丸　除濕湯　赤茯苓湯　豬苓湯　豬苓湯　桂枝湯　薏苡仁湯　麻黄杏仁薏苡甘草湯　麻黄加术湯　甘草附子湯　羌活湯　除風湿羌活湯　和潤除濕湯　五積散　正氣散　理中湯　導痰丸　加味五積散　不換金正氣散　調中益氣湯　參附湯　羌活勝濕湯　白术湯　聖散子　消痞湯　木瓜虎骨丸　四物朮子湯　大橘皮湯　補肾脂丸　馬丸　天麻丸　七聖散　乳香没藥丸　白术木香散　三花神佑丸　琴連木香散　牽牛丸　梔子檗皮湯　芩連湯　枳朮丸　肉豆蔻丸　二朮四苓湯　胃苓湯　陳皮湯　枳朮湯　平胃散　桂枝附子湯　桂枝湯　桂枝湯　桂枝附子湯　桂枝湯　桂枝湯　桂枝

右爲末棗肉丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸煎桑白皮湯送下食前

聖靈丹

治脾肺有濕喘滿腫盛小便赤澀

人參去蘆　木香　漢防己　茯苓寒食麪煨　檳榔　木通各二錢炒　苦葶藶四兩炒

右七味爲末棗肉和丸梧桐子大每服三十丸煎桑白皮湯送下食前

赤茯苓丸

治脾濕太過四肢腫滿腹脹喘逆氣不宣通小便赤澀

赤茯苓　漢防己各二兩　苦葶藶四兩炒　木香半兩

右爲末棗肉丸如梧桐子大每服三十丸煎桑白皮湯送下食前一方赤茯苓一兩

除濕丹

治諸濕腫吝搏腰膝重痛足脛浮腫

乳香研　沒藥研各一兩　檳榔　威靈仙　赤芍　澤瀉　葶藶　甘遂各二兩　大戟三兩　陳皮去白四兩　牽牛頭末半兩

右爲末糊丸如梧桐子大每服五十丸至七八十丸溫水送下食前得更衣止後服如服藥前後忌酒二日濕痺二三日食後溫淡粥補胃九佳

無礙丸

治脾濕橫流四肢腫滿

木香半兩　蓬莪术炮　京三稜炮　檳榔　鄒李仁湯炮去皮各一兩　大腹皮二兩

右六味爲末炒麥蘗杵爲粉爲糊丸如梧桐子大每服二十丸生薑湯送下無時

除濕湯 百一選方

治寒濕所傷身體重著腰脚痠疼大便溏泄小便或澀或利

半夏麴炒　厚朴薑製　蒼术米泔製各二兩　藿香葉　陳皮去白　白茯苓去皮各一兩　甘草炙七錢　白术生用一兩

右㕮咀每服四錢水一盞薑七片棗一枚煎七分食前溫服得效無茯苓白术治同

白术酒 三因方

治中濕骨節疼痛

白术一兩

右酒三盞煎一盞頻服不能飲酒以水代之

腎著湯 仲景

治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便自利

乾薑炮　茯苓各四兩　甘草炙　白术各二兩

每服四錢水一盞煎七分空心溫服

滲濕湯 和劑局方

治寒濕所傷身體重著如坐水中小便赤澀大便溏泄

蒼术　白术　甘草炙各一兩　茯苓去皮　乾薑炮各二兩　橘紅　丁香各二錢半

每服四錢水一盞棗一枚薑三片煎七分食後去滓溫服丹溪用蒼术半夏麴各二錢厚朴藿香陳皮白术白茯苓各一錢甘草五分

勝濕湯 活生方

治坐臥濕地或雨露所襲身重脚弱大便泄瀉

白术三錢　人參　乾薑　白芍藥　附子炮　桂枝　白茯苓　甘草各七分半

右剉作一貼入薑五片棗二枚水煎服

桂枝湯 仲景

治風濕

桂枝　芍藥　生薑各三兩　甘草二兩炙　大棗十二枚擘

右㕮咀以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升服已須臾歠熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許遍身漐漐微似有汗者益佳不可令如水流漓病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑

清熱滲濕湯 東垣十書

治濕熱

黃蘗酒炒二錢　黃連　茯苓　澤瀉各一錢　蒼术　白术各一錢半　甘草五分

水二鍾煎八分服如單滲濕去黃連黃蘗加橘皮乾薑

术附湯 仲景 下同

治風濕相搏身體疼煩不能轉側不嘔不渴大便堅硬小便自利及風虛頭目眩重甚者不知食味此藥暖肌補中助陽氣止自汗

附子炮去皮臍一兩　白术四兩　甘草炙一兩

右爲粗末每三錢水一盞半薑五片棗一枚煎至一盞去滓溫服食前

加味术附湯

治中濕諸證

附子炮二錢　白朮　赤茯苓　甘草炒各一錢半

右剉作一貼入薑七片棗二枚水煎服日再纔見身痺三服後則當如蝟狀勿怪蓋朮附並行皮中逐水氣故爾

金匱腎氣丸

治脾腎陽虛不能行水小便不利腫脹將成臌證

熟地四兩酒拌蒸　山藥　山萸　牛膝　丹皮　澤瀉　車前　肉桂各一兩　白茯苓三兩　附子製五錢

右爲末煉蜜同地黃膏搗丸梧子大每服七八十丸空心米飲下

甘草附子湯

治風濕

桂枝四錢　甘草　附子炮　白朮各一錢

右剉作一貼水煎服微汗卽解

麻黃杏仁薏苡甘草湯

治風濕一身盡痛發熱日晡所劇

麻黃　薏苡仁各五錢　杏仁十枚去皮尖炒　甘草一兩炙

右剉麻豆大每服四錢水一盞半煎八分去滓溫服有微汗避風按入門用麻黃薏苡各二錢杏仁甘草各一錢作一貼服治證同而甚宜於今也

防己黃芪湯（金匱要略正傳）

治風濕身重痛自汗

防己　黃芪各三錢　白朮二錢　甘草一錢半

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

羌附湯（丹溪心法）

治風濕相搏肢體掣痛浮腫

羌活　附子炮　白朮　甘草各一錢半

右剉入薑五片水煎服

除風濕羌活湯（東垣十書）

治風濕相搏一身盡痛

蒼朮　藁本各二錢　羌活七分　防風　升麻　柴胡各五分

右剉作一貼水煎服

和劑除濕湯（直指方下同）

治傷濕身重腰痛四肢微冷嘔逆溏泄

赤茯苓　乾薑各二錢　蒼朮　白朮土炒　甘草各一錢　橘紅　桂皮　厚朴各五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

生附除濕湯

治寒濕

蒼朮二錢　附子生　白朮　厚朴　木瓜　甘草各一錢

右剉作一貼入薑十片水煎服

治濕中和湯（集要）

治寒濕

蒼朮炒二錢　白朮　陳皮　赤茯苓　厚朴　乾薑炮　甘草炙各一錢

右剉作一貼入薑三片燈心一撮水煎服

蒼朮復煎散（東垣十書）

治寒濕相合肢體皆痛行步無力

蒼朮四兩　羌活一錢　柴胡　藁本　白朮　澤瀉　升麻各五分　黃蘗三分　紅花一分

右剉先以水三盞煎蒼朮至二盞入諸藥復煎至一盞去滓空心熱服

單蒼朮丸（醫學入門）

常服除濕壯筋骨健步明目

蒼朮一斤米泔浸剉曬乾牛斤以童便浸一宿牛斤以酒浸一宿並焙乾

右爲末神麴糊和丸菉豆大白湯下七十丸或加白茯苓六兩尤好或爲末每二錢空心服鹽湯或酒調下亦得名蒼朮散

二妙丸（丹溪心法）

治濕熱

蒼朮　黃蘗等分

右爲末滴水爲丸服之

苓朮湯（得效方下同）

治冒暑遭雨暑濕鬱發四肢不仁半身不遂或入浴運倒口眼喎斜手足不仁皆濕溫類也

赤茯苓　白朮　乾薑　澤瀉　桂心各一錢

右剉作一貼水煎服

茯苓白朮湯

治濕溫

赤茯苓　蒼朮　白朮土炒　乾薑　桂心　甘草各一錢

右剉作一貼水煎服

蒼橘湯（醫學入門）

治酒濕

陳皮一錢半　赤芍藥　赤茯苓各一錢　黃蘗

威靈仙　羌活　甘草各五分　蒼朮二錢
右剉一貼水煎服

生附湯 [illegible]

治傷濕諸證又治寒濕
蒼朮　杜仲各一錢半　附子生　牛膝　厚朴
乾薑　白朮　赤茯苓　甘草各七分
右剉作一貼薑三片棗二枚水煎服

滲濕湯 [illegible]

治一切濕證
蒼朮　白朮　赤茯苓各一錢半　陳皮　澤瀉
猪苓各一錢　甘草三分　香附　川芎　縮砂
厚朴各七分
右剉作一貼入薑三片燈心一撮水煎服

五苓散 仲景 下同

治暑濕煩躁霍亂泄瀉小便不利而渴淋澀作痛
下部濕熱
白朮土炒　猪苓　茯苓各七錢　肉桂五錢
澤瀉一兩二錢半
古法爲細末每服二錢白湯調下日三服今法以
水煎服去肉桂名四苓散

麻黃加朮湯

治濕家身煩疼
麻黃　桂枝各三兩　甘草一兩　杏仁七十箇
白朮四兩
右五味以水九升先煑麻黃減二升去沫內諸藥
煑取二升半去柤溫服八合覆取微汗

平胃散 局方

治脾胃不和不思飲食心腹脅助脹滿刺痛嘔噦
惡心吞酸噫氣體重節痛自利霍亂噎膈反胃等
證
厚朴薑製炒　陳皮去白各五兩　炙甘草三兩
蒼朮去皮米泔浸炒八兩
右爲末每服二錢水一鍾薑三片棗二枚煎七分
去滓溫服

桂枝附子湯 仲景

治傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能轉側不
嘔不渴脈浮虛而澀者
桂枝四兩去皮　生薑切　甘草炙各三兩
附子三枚炮去皮破八片　大棗十二枚擘
右五味以水六升煑取二升去滓分溫三服

五積散 局方

治寒濕客於經絡腰脚骨髓酸痛等證
當歸　麻黃　蒼朮　陳皮各一錢　厚朴薑製
乾薑炮　芍藥　枳殼麩炒各八分　半夏泡
白芷各七分　桔梗　炙甘草　茯苓　肉桂
人參各五分　川芎四分
水二鍾薑三片葱白三莖煎八分不拘時服一方
無人參

理中湯 仲景

治太陰虛寒水泛濕證
人參　白朮炒　乾薑炒　炙甘草各三兩
右四味搗篩爲末蜜丸鷄黃大以沸湯數合和一
丸研碎溫服之日三四夜二服腹中未熱益至三
四丸然不及湯湯法以四物依數切用水八升煑
取三升去滓溫服一升日三服

尋痛丸

治走注流濕已後宜用襲經絡除疼痛
椶櫚燒存性一兩半　穿山甲酥炙　當歸去蘆
乳香別研　沒藥別研各一兩　木香半兩
麝香別研二錢　皂莢子仁二兩炒
右爲細末酒煑麪糊爲丸如梧桐子大每服五十
丸不拘時溫酒下或木瓜湯下

加味五苓散

治濕勝身痛小便不利體痛發渴等證
白朮　猪苓　茯苓各七錢半　肉桂五錢
澤瀉一兩二錢半　羌活三錢
右爲細末每服二錢白湯調下日三服

不換金正氣散

治脾氣虛弱寒濕相搏
厚朴薑製　藿香葉　半夏製　蒼朮米泔浸
陳皮各一錢　甘草炙五分
薑棗水煎服

調中益氣湯 東垣 下同

治濕熱所傷體重煩悶口失滋味或痰嗽稠粘寒
熱不調體倦少食等證
黃芪一錢　人參　炙甘草　蒼朮各五分
橘紅　木香　柴胡　升麻各二分
水煎空心服

濕鬱湯

治雨露所襲或嵐氣所侵或坐臥濕地或汗出衣
衫濕鬱其狀身重而痛倦怠嗜臥遇陰寒則發脈

沉而細緩者是也

蒼朮三錢　白朮　香附　橘紅　厚朴薑汁炒　半夏製　白茯苓　撫芎　羌活　獨活各一錢　甘草五分　生薑五片水煎服

敗毒散

治處卑濕腳氣痿弱等證此藥不可缺日三服以效爲度

人參　茯苓　枳殼　甘草　川芎　羌活　獨活　前胡　柴胡　桔梗各等分　水一鍾半薑三片煎服或爲細末沸湯點服

參附滲濕湯

治坐臥濕地市露所襲身重脚弱關節疼痛發熱惡寒小便不利大便洞泄

人參　白朮　茯苓　甘草　附子炮　乾薑炮　桂枝　芍藥等分　水二鍾薑三片棗一枚煎八分不拘時服

胃苓湯

治脾濕太過泄瀉不止

陳皮　厚朴　甘草　蒼朮　白朮　茯苓　澤瀉　豬苓　肉桂等分　每服五六錢薑五片棗二枚水煎服

羌活勝濕湯

治外傷濕氣一身盡痛者此乃通治濕證

羌活　獨活各一錢　蔞本　防風各錢半　蔓荊子　川芎　炙甘草各五分　水二鍾煎八分食後溫服

白朮湯

治風濕惡寒脈緩

白朮　防風　甘草　右㕮咀加生薑煎服

聖散子

治一切山嵐瘴氣時行瘟疫傷寒風濕等證

蒼朮製　防風　厚朴薑炒　猪苓　澤瀉根各二兩　白芷　川芎　赤芍　藿香　柴胡各半兩　麻黃　升麻　羌活　獨活　枳殼　吳茱萸泡　細辛　蔞本　茯苓各七錢　石菖蒲　草豆蔻　良薑各八錢　甘草二兩　大附子一枚　右爲粗末每服三錢水二鍾棗一枚煎八分稍熱服

清燥湯

六七月之間濕令大行子能令母實而熱肚濕熱相合而刑庚大腸故寒涼以救之燥金受濕熱之邪絕寒水生化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰以下痿軟癱瘓不能動行走不正兩足欹側以此藥主之

蒼朮米泔浸三錢半　五味子十一粒　黃芪　黃連　白朮　橘皮　白茯苓　當歸各一錢　人參　生地黃各七分　麥門冬去心　神麴炒　豬苓　黃檗酒炒　甘草　澤瀉各半錢　柴胡　升麻各三分　作一服水二鍾煎至一鍾食前服

木瓜虎骨丸

治寒濕合而成痹腳痛不仁疼痛少力足下隱痛不能踏地腰腿筋攣不能屈伸及項背拘急手臂無力耳內蟬鳴頭眩目旋腳氣行步艱難

木瓜　血竭另研　沒藥另研　虎脛骨酒炙　木香　自然銅醋淬七次　楓香　骨碎補去毛當歸　甜瓜仁　敗龜板炙　安息香酒熬　肉桂各一兩　乳香另研五錢　地龍去土二兩　右爲末酒糊丸如梧桐子大每服五六十丸食前溫酒下

四物附子湯

治風濕相搏骨節煩痛四肢拘急不能屈伸

附子炮一錢半　肉桂二錢　白朮土炒三錢　甘草一錢　作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

大橘皮湯

治濕熱內甚心腹脹滿水腫小便不利大便滑泄

橘皮二錢　滑石四錢　茯苓一錢半　木香　檳榔　猪苓　澤瀉　白朮各一錢　官桂半錢　甘草三分　作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

補骨脂丸

治濕傷內外衆疾俱作陽氣衰絕乳石補益之藥百端皆不應唐鄭相公爲海南節度七十有五越地卑濕服諸藥不應元和七年有訶陵國船主李摩獻此方經七八日而覺應驗自爾常服其功神效十年二月罷郡歸京錄方傳之

破故紙十兩洗淨爲末　胡桃肉去皮二十兩研泥　右胡桃肉泥入破故紙末更以好煉蜜和勻如飴

盛磁器中旦日以溫酒化藥一匙服之不飲酒者以溫熱水化下彌久則延年益氣悅容明目補添筋骨但禁食芸薹辛血

七聖散

治風濕流注經絡間肢節緩縱不隨或脚膝疼痛不能步履

續斷　獨活　防風　羗活　牛膝酒浸一宿　甘草　杜仲

右各焙乾半兩爲細末每服二錢溫酒調下

乳香沒藥丸

治遠年近日風濕脚氣攻注脚膝或腫或疼筋攣不能屈伸脚不能踏地及一切疼痛往來不已

乳香　沒藥俱別研　骨碎補去毛　縮砂仁　五靈脂去土　白附子　甜瓜子　當歸酒炒　牛膝酒浸　木瓜　地龍去土　木鼈子各一兩　白牽牛微炒三兩

右爲細末酒煮麪糊爲丸如梧桐子大每服二十丸溫木瓜湯下或溫酒亦可不拘時服

上馬丸

治寒濕骨痛腿疼筋骨諸疾

川烏炮　木香不見火各半兩　虎骨酥炙　牛膝　杜仲　木瓜　當歸酒浸　敗龜板酥炙　自然銅酢淬　黃芪蜜炙　白朮各一兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三四十丸溫酒下

天麻丸

治風濕疼痛黃腫

天麻　全蠍去毒各四錢　熟地黃　木瓜　烏頭　當歸各三錢　牛膝酒洗二錢　乳香　沒藥　穿山甲炮　川芎各一錢

右爲細末每服三錢空心用溫酒調下服

三花神祐丸（河間六書下同）

治中滿腹脹喘嗽淋閉一切水濕腫滿

甘遂　大戟　芫花醋拌炒各半兩　牽牛二兩　大黃一兩　輕粉一錢

右爲末滴水爲丸如小豆大初服五丸每服加五丸溫水下每日三服加至快利利後却常服病去爲度

葶藶木香散

治濕熱內外甚水腫腹脹小便赤澁大便滑瀉

葶藶　茯苓　豬苓　白朮　桂各一分　澤瀉　木通　甘草各半兩　滑石三兩　木香半錢

右爲末每服三錢白湯調下食前此藥下水濕消腫脹止洩瀉利小便若小便不得通利而反轉泄者此乃濕熱否悶極熱而攻之不開是以反爲注泄此正氣已衰而多難救也愼不可攻之

白朮木香散

治濕盛喘嗽腫滿欲變成水病者不能臥不敢食小便悶者

白朮　豬苓　赤茯苓　甘草　澤瀉各半兩　木香　檳榔各三錢　橘紅二兩　官桂二錢　滑石三兩

右爲末每服五錢水一盞生薑三片同煎至六分食後去滓溫服

牽牛丸

治一切濕熱腫滿等疾

黑牽牛　黃芩　大黃　大椒　滑石各等分

右爲細末酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服五九至七九生薑湯下食後虛實加減

梔子葉皮湯

治頭微汗小便利而微發黃者濕熱相搏微者

大梔子十五箇　黃蘗半兩　甘草一分

右剉如麻豆大水三盞煎至一盞緩緩分三次作一日服溫熨不計時候

苦葶藶丸

治一切水濕氣遍身腫滿不可當者

人參一兩　苦葶藶四兩隔紙炒黃色爲度

右二味同爲細末用棗肉和丸如梧桐子大每服十五丸煎桑白皮湯下日進三服空心食前

肉豆蔻丸

治水濕腹如鼓不食者病可下

肉豆蔻　檳榔　輕粉各一分　黑丑頭末一兩半

右爲末麪糊爲丸如菉豆大每服十丸至二十丸煎連蒻湯下食後日三服

二木四苓湯

治諸濕腫滿一身盡痛發熱煩悶二便不利

白朮　蒼朮　茯苓　豬苓　澤瀉　黃芩　羌活　芍藥　梔子仁　甘草各等分

水三盞薑三片燈心一撮煎服

茵陳飲（景岳全書下同）

治濕熱閉澀等證

茵陳　焦梔子　澤瀉　青皮各三錢　甘草一錢
甘菊花二錢
右水三四鍾煎兩鍾不時陸續飲之
胃關煎
治脾胃虛寒濕瀉或甚至久瀉腹痛不止冷痢等證
熟地三五錢或一兩　山藥炒　扁豆炒各二錢
炙甘草一二錢　焦乾薑　白朮炒各一二三錢
吳茱萸製五七分
水二鍾煎七分食遠溫服
佐關煎
治生冷傷脾瀉痢未久腎氣未損者宜用此湯以去寒濕
厚朴炒　陳皮炒各一錢　山藥炒　扁豆炒
豬苓　澤瀉各二錢　炙甘草七分　乾薑炒
肉桂各一二錢
水一鍾半煎服
聖朮煎
治飲食傷偶傷脅肋疼痛寒濕瀉痢嘔吐等證
冬朮味甘者五六七八錢炒或一二兩　乾薑炒
肉桂各一二錢　陳皮酌用或不用
水一鍾半煎七分溫服
大分清飲
治濕熱下利黃疸渴血腹痛淋閉等證
茯苓　澤瀉　木通各二錢　豬苓　梔子（或倍之）
枳殼　車前子各一錢
水一鍾半煎八分食遠溫服
小分清飲
治小水不利濕滯腫脹不能受補等證
茯苓　澤瀉　豬苓各二三錢　薏仁二錢
枳殼　厚朴各一錢
水一鍾半煎七八分食前服

單方

防己能治濕與木通同功對煎服之佳（本草下同）
蓼本治霉露之氣上部風濕最佳煎服之
龜肉除濕及瘴氣作羹常食之佳
濕痹鼈肉煮熟取肉和五味作羹食之
濕痹腰脚濕氣木瓜煎服丸服或生食並佳
猪肝勝濕可煮食之昔閎叔雷寓常食猪肝蓋爲濕疾也
薏苡去濕輕身勝瘴氣作米煮粥常服之
冷濕痹豺皮熱之以繼病上或裹軟脚良
濕病取土猪肉煮食又用皮坐臥其上最去濕痹
濕氣常服桑根茶最好又與赤小豆同煮作粥常食尤佳
濕氣作痛白朮切片煎汁熬膏白湯點服（衆簡方）
中濕骨痛朮一兩酒三盞煎一盞乘熱頓服不飲酒者以水煎之（三因良方）
濕氣身痛蒼朮泔浸切水煎取濃汁熬膏白湯點服（簡便方）
濕熱水病黃連末蜜丸梧子大每服二九至四五九米飲下日三四服（范汪方）
濕熱頭痛黑犛牛七粒砂仁一粒研末井華水調汁仰灌鼻中待涎出即愈（聖濟錄）
水濕腫脹白朮澤瀉各一兩爲末或爲丸每服三錢
茯苓湯下（保命集）
薏苡仁酒去風濕强筋骨壯腰膝健脾胃用絕好薏苡仁粉同麴米釀酒或袋盛煮酒飲（千金方）
濕家頭痛瓜蒂末一字嗤入鼻中口含冷水取出黃水愈（活人書）
脾虛濕腫大附子五枚去皮四破以赤小豆半升藏附子於中慢火煮熟去豆焙研末以薏苡仁粉打糊丸梧子大每服十九薤蔥湯下（朱氏集驗方）
濕熱虛泄山藥蒼朮等分飯丸米飲服大人小兒皆宜（經驗方）

鍼灸

素問曰病在肌膚盡痛名曰肌痹傷於寒濕刺大分小分多發鍼而深之以熱爲故無傷筋骨傷筋骨癰發若變諸分盡熱病已止
千金方曰曲池刻缺主身濕搖時時寒
懸鍾主濕痹流腫髀筋急痺膝痛
豐隆主身濕
漏谷主久濕痹不能行
中封主痿厥身體不仁少氣身濕重

導引

保生祕要曰中濕病色有黃黑用火燒丹田數圍幾遍次行通關法其汗自出而濕自消

濕氣筋骨疼痛行發汗法次行通關法傷水法同發汗法握兩手指如拳脚指亦要握固閉齒調息而臥自然汗出周身濕從汗散矣

通關法從北極定樞斗柄大旋三遍天地包羅行於臍下分開兩路旋下兩腿之前聯絡不絕雙行轉脚底向後過元海上至命門會合從右轉左大旋三遍從椎骨下分行兩肩經時從外關達掌心循內關過肩井由項後透泥丸行明堂漸落雙瞳自面部下胃膈會心腐從左轉下降大旋三遍如前臍下分開循環週體週流運用卯酉二辰行之或九度或二十一度而出愼勿執著若有若無此所謂煉其形和其氣也

醫案

儒門事親曰常仲明病濕痹五七年矣戴人令上涌之後可瀉五七次其藥則舟車滾川通經神祐益腎自春及秋必十餘次方能愈公之病不必鍼灸與令嗣皆宜涌但臘月非其時也欲候春時恐寸東適今姑屏病之大勢至春和時人氣在上可再涌之以去其根卒如所論矣

又一納子因陰雨臥濕地一半手足皆不隨若遇陰雨其病轉加諸醫皆作中風偏枯治之用當歸芍藥乳香沒藥自然銅之類久反大便澀風燥生經歲不已戴人以舟車丸下三十餘行去青黃沫水五升次以淡劑滲泄之數日手足皆舉戴人曰夫風濕寒之氣合而成痹得寒而蓄於皮膚之間久而不去內舍六腑宜用去水之藥可也水濕者人身中之寒物也寒去則血行血行則氣和氣和則愈矣

又息帥病腰股沉痛行步坐馬皆不便或作脚氣濕治之或作虛損治之烏附乳沒活血壯筋骨之藥無不用之至六十餘日目亦上熱大小便澀腰股之病如故戴人診其兩手脈皆沉遲沉者爲在裏也在裏者泄之以舟車丸滾川散各一服去積水二十餘行至早晨服薏苡粥一二頓與之馬已能耍鏁矣

又棠谿李十八郎病腰脚大不伸偃僂蹙蹙而行已數年矣服藥無效止藥却愈因秋暮涉水病復作醫氏使服四斤丸其父李仲安乃乞藥於戴人戴人曰近日服何藥仲安曰四斤丸公郎曰昏赤未其父驚曰目正暴發戴人曰宜速來不來則喪明既來則策杖而行目瞭無所見戴人先令涌之藥忽下走去二十行兩日頓明策已棄矣比再涌泄能讀官曆日謂至一月令服當歸丸健步而歸家

又息城邊校白公以隆暑時飲酒覺極熱於凉水池中漬足便其冷也爲濕所中股膝沉痛又因醉臥濕地其痛轉加意欲以酒解痛遂連朝而飲反成赤痛發間止且六七年往往斷其寒濕脚氣只辛熱治之不效或使服神芎丸數服痛微減他日復飲疾作如前睾囊痒濕且腫硬臍下似有物難於行以此免軍役令人代之來訪戴人戴人曰余亦斷爲寒濕但寒則陽火不行故爲痛濕則經隧有滯故腫先以苦劑涌之次以舟車丸百餘粒滾川散四五錢微行一兩次戴人曰如激劑尚不能攻何況於熱藥補之乎異日又用神祐丸百二十丸通經散三四錢是用僅得四行又來日以神祐丸八十丸投之續見一二行又次日服益腎散四錢舟車丸百餘粒約下七八行白公已覺膝睾寒者暖硬者軟重者輕也腫赤漸退飲食加進又涌之其病全瘳臨別又贈以疎風丸併以其方與之此公不肯妄服辛熱藥故可治也

東垣十書曰予病脾胃久衰覩聽半失此陰盛乘陽加之氣短精神不足此由弦脈令虛多言之過皆陽氣衰弱不得舒伸伏匿於陰中耳癸卯歲六七月間淫雨陰寒踰月不止時人多病泄利濕多成五泄故也一日予體重肢節疼痛大便泄者三而小便閉塞思其治法按內經標本論大小便不利無問標本先利大小便又云在下者引而竭之亦是先利小便又云諸泄利小便不利先分利之又云治濕不利小便非其治也皆當利其小便必用淡味滲泄之劑以利之是其法也噫聖人之法雖布在方冊其不盡者可以求責耳今客邪寒濕之淫從外而入裏以暴加之若從已上法度用淡滲之劑以除之病雖即已是降之又降是復益其陰而重竭其陽氣矣是陽氣愈削而精神愈短矣是陰重強而陽重衰矣反助其邪之謂也故必用升陽風藥即差以羌活獨活柴胡升麻各一錢防風根截半錢炙甘草根截半錢同㕮咀水四中盞煎至一盞去柤稍熱服大法云濕寒之勝助風以平之又曰下者舉之得陽氣升騰而去矣又法

云客者除之是因曲而爲之直也夫聖人之法可以類推舉一而知百病者也若不達升降浮沉之理而一概施治其愈者幸也

衛生寶鑑曰至元戊寅五月間霖淫積雨不止魯齋許平仲先生時年五十有八面目肢體浮腫大便溏多腹脹腸鳴時痛飲食減少命予治之脈得弦細而緩先生曰年壯時多曾服牽牛大黃藥面目四肢時有浮腫今因陰雨故大發予曰營運之氣出自中焦中焦者胃也胃氣弱不能布散水穀之氣榮養臟腑經絡皮毛氣行而濕故爲浮腫大便溏多而腹脹腸鳴皆濕氣勝也四時五臟皆以胃氣爲本五臟有胃氣則和平而身安若胃氣虛弱不能運動滋養五臟則五臟脈不平和本臟之氣盛者其脈獨見輕則病甚過則必死故經曰眞臟之脈弦無胃氣則死先生之疾幸而未至於甚尚可調補人知服牽牛大黃爲一時之快不知其爲終身之害也遂用平胃散加白术茯苓草豆蔻仁數服而腹脹溏瀉腸鳴時痛皆愈飲食進止行肢體浮腫以導滿通經湯主之良愈

薛氏醫案曰一男子善飲舌本強硬語言不清余曰此脾虛濕熱當用補中益氣加神麯麥芽乾葛澤瀉治之

大尹劉天錫內有濕熱大便滑利小便滴滯服淡滲之劑愈加滴瀝小腹腿膝皆腫兩眼脹痛此腎虛熱在下焦淡滲導損陽氣陰無以化遂用地黃滋腎二丸小便如故更以補中益氣加麥冬五味兼服而愈

趙獻可醫貫曰余一日患陰丸一箇腫如鴨卵發熱以濕熱證治之不效細思之數日前定海小船回有濕布風帆在座下比登舟始覺以意逆之此感寒濕在腎丸也乃用六味地黃加柴胡吳茱萸肉桂各一錢獨活五分一服而熱退再服而腫消後有患偏墜者此方多效

寓意艸曰庚辰冬識江冲寰先生半面竊見身體重著行步艱難而色滯晦語言遲緩以爲有虛風卒中之候也因爲過慮辛巳秋名診問細察脾脈緩怠不調肺脈勁大然肝木尚平陽氣尚旺是八風之邪未可易中而筋脈掣痛不能安寢者大率風而加之以濕交爍其虛所致以斯知尚可引年而施治也何也風者肝之病天之氣也濕者脾之病地之氣也天氣迅疾故發之暴益以地氣之迂緩反有所牽制而不能暴矣然氣別則病殊而氣交則病合有不可不明辨者病殊者在天氣則風爲百病之長其來微則隨相起爲傳次必遍五臟而始烈其來甚則不由傳次而直中唯體虛之人患始不測焉在地氣則濕爲下體之患其來微則足跗腫大然得所勝亦旋消其來甚則害及皮肉筋脈以漸而上攻亦唯陽虛之人勢始騰越焉兩者一本之天一本之地病各懸殊治亦異法者也病合者天之氣入於筋脈地之氣亦入於筋脈時乎天氣勝則筋脈張而勁焉時乎地氣勝則筋脈弛而緩焉兩者其源雖異其流則同交相體結蔓而難圖者也先生房中之風始雖不可知然而所感則微也至若濕之一字既以醇酒厚味而釀之於內又爲炎蒸嵐瘴而襲之於外是以足患日熾雖周身筋脈舒展亦不自知究竟何以足間晝夜掣痛瘡瘍腫潰浸淫無已也夫春時之風也夏時之濕與熱也秋時之燥也三時之氣皆爲先生一身之患者也而一身之患又惟一隅獨當之亦艮苦矣設內之風濕熱燥不攘足患其有寧乎所可嘉者惟冬月寒水司令勢稍未減而醫者不識此意每投壯筋骨之藥酒以驅其濕不知此治寒濕之法惟冬月病增者方宜豈以風濕熱濕而倒行逆施寧不重其困耶況乎先生肺脈勁大三四日始一大便雖冬月亦喜形寒飲冷而不嘗近火何所見其爲寒濕也哉所以孫眞人大小竹瀝等方風濕熱燥寒五治之藥具備籠統罷雜後人全不知用若識此義爲去取則神而明之之事矣然則不辨證而用方者幾何而不誤耶

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百五十五卷目錄

醫部彙考二百三十五

燥門

黃帝素問　陰陽應象大論　臟氣法時論　藏氣法時論　六節藏象論　五常政大論　六元正紀大論　至眞要大論

靈樞經　九宮八風篇

劉完素六書　論燥

朱震亨心法　論燥

虞搏醫學正傳　燥證論

李梴醫學入門　燥分內外

喻昌醫門法律　秋燥論　律五條　論清燥救肺湯

張介賓景岳全書　燥有表裏之不同

陳士鐸石室秘錄　燥證

方　導氣除燥湯　潤腸丸　大秦艽湯　六味地黃丸　清燥救肺湯　涇燥養榮湯　大補地黃丸　當歸承氣湯　瓊脂膏　天門冬膏　地黃煎　生血潤腸飲

單方

醫案

藝術典第二百五十五卷

醫部彙考二百三十五

燥門

黃帝素問

陰陽應象大論

陽明司天之政三之氣天政布涼乃行燥熱交合燥極而澤民病寒熱

註　司天之金氣加臨故天政布涼乃行三之主氣乃少陽相火故燥熱交合三氣終而變四氣之寒水濕土故燥極而澤燥濕水火相交故民病寒熱

註　西方主秋金之令故其氣生燥

臟氣法時論

腎苦燥急食辛以潤之開腠理致津液通氣也

註　腎者水臟喜潤而惡燥宜食辛以潤之謂辛能開腠理使津液行而能通氣故潤

氣交變大論

歲金太過燥氣流行肝木受邪民病兩脅下少腹痛目赤痛背瘡耳無所聞肅殺而甚則體重煩寃胃痛引背兩脅滿且痛引少腹

註　歲金太過燥氣流行則肝木受病兩脅下少腹痛肝病也肝開竅於目故目痛背瘡肝虛則耳無所聞體重者肅殺而甚無生動之氣煩寃者肝氣逆而不舒也

歲木不及燥迺大行

註　歲氣不及則己所不勝侮而乘之是以主歲之木運不及則金之燥氣大行

五常政大論

審平之紀其令燥

註　歲金平氣曰審平在天爲燥金之令也

堅成之紀燥行其政

註　歲金太過曰堅成秋主收成故燥行其政

六元正紀大論

陽明司天之政三之氣天政布涼乃行燥熱交合燥極而澤民病寒熱

註　司天之金氣加臨故天政布涼乃行三之主氣乃少陽相火故燥熱交合三氣終而變四氣之寒水濕土故燥極而澤燥濕水火相交故民病寒熱厥陰司天之政五之氣燥濕更勝沈陰乃布寒氣及體風雨乃行

註　五之客氣乃太陰濕土主氣乃陽明燥金是以燥濕更勝沈陰布而寒及體者二氣并主清寒也太陰所至終爲雨陽明所至爲悽鳴故風雨乃行

金鬱之發燥氣以行民病欬逆心脅滿引少腹善暴痛不可反側嘔乾面塵色惡

註　此金氣復而肝木爲病

陽明所至爲燥生

註　德化之常也

燥勝則乾

註　燥氣在秋主七十二日有奇

至眞要大論

陽明司天其化以燥以所臨藏位命其病者也

註　藏位者天氣上臨而下合人之藏位隨燥氣之所傷而命其病也

歲陽明在泉燥淫所勝民病喜嘔嘔有苦善太息心脅痛不能反側甚則嘔乾面塵身無膏澤足外反熱

註　陽明在泉子午歲也經脈篇云嘔苦善太息心脅痛不能轉側甚則面有微塵體無膏澤足外反熱乃足少陽病嘔乾面塵乃足厥陰病蓋金勝而肝膽病也

燥淫於內治以苦溫佐以甘辛以苦下之

註　燥乃清涼之金氣故當治以苦溫燥則氣結於內故當佐以甘辛發散以苦下之

陽明司天燥淫所勝民病左胠脅痛寒清於中感而寒大涼革候欬腹中鳴注泄鶩溏心脅暴痛不可反

側嗌乾面塵腰痛丈夫癩疝婦人少腹疼痛目眯眥瘍瘡痤癰病本於肝太衝絕死不治

註陽明司天卯酉歲也左胠脅痛肝經病也感寒清而成瘧者秋成痎瘧也大凉革候者夏秋之交變炎暑而爲清凉也腹中鳴注泄鶩溏寒清於中也心脅暴痛不可反側嗌乾面塵皆肝經之病蓋金淫於上故病本於肝

燥淫所勝平以苦溫佐以酸辛以苦下之

註苦溫能清金辛能潤燥燥必內結故以酸苦泄之

燥化於天熱反勝之治以辛寒佐以苦甘

註言六氣司天邪氣反勝宜以所勝之氣味平之

靈樞經

九宮八風篇

風從西方來名曰剛風其傷人也內舍於肺外在於皮膚其氣主爲燥

註如太乙居叶蟄之宮而出游之第五日風從西北二方而來數所在日而來不正之風皆謂之虛風也

金劉完素六書

論燥

諸澀枯涸乾勁皴揭皆屬於燥

陽明燥金乃肺與大腸之氣也

澀物濕則滑澤乾則澀滯燥濕相反故也如偏身中外澀滯皆屬燥金之化故秋脈澀也或痲者亦由澀也由水液衰少而燥澀氣行壅滯而不得滑澤通利氣强攻衝而爲痲也然六氣不必一氣獨爲病氣有相兼若亡液爲燥或痲無熱證即當用烏附衝開道路以得通利或風熱勝濕爲燥因而病痲則宜以退風散熱活血養液潤燥通氣之凉藥調之則痲自愈也治諸燥澀悉如此法

枯不榮王也涸無水液也乾不滋潤也勁不柔和也春秋相反燥濕不同故也大法身表熱爲熱在表渴飲水爲熱在裏身熱飲水表裏俱有熱身凉不渴表裏俱無熱經所以不取火化渴者謂渴非特爲熱如病寒吐利亡液過極則亦燥而渴也雖病風熱而液尚未衰則亦不渴豈可止言渴爲熱而不爲寒也夫燥渴之爲病也多兼於熱故易曰燥萬物者莫熯乎火今言渴爲燥則亦偏矣如大法身凉不渴爲表裏俱無熱故不言爲寒也謂表裏微熱則亦有身不熱而不渴者不亦宜乎

皴揭皮膚啓裂也乾爲天而爲燥金坤爲地而爲濕土天地相反燥濕異用故燥金主於緊斂所以秋脈緊細而微濕土主於縱緩所以六月其脈緩大而長也如地濕則縱緩滑澤乾則緊斂燥濇皴揭之理明可見焉俗云皴揭爲風者由風能勝濕而爲燥也經言厥陰所至爲風府爲學啓由風勝濕而爲燥也所謂寒月甚而暑月衰者由寒能收斂腠理閉密無汗而燥故病甚也熱則皮膚縱緩腠理疎通而汗潤故病衰也或以水濕皮膚而反喜皴揭者水濕自招風寒故也

熱勝燥燥自金生熱爲火化金餘則制之以火肺勝則治之以苦又曰金氣之下火氣承之燥淫於內治以苦溫佐以甘辛以苦下之若肺氣上逆急食苦以泄之王注曰制燥之勝必以苦溫故燥乾病生焉是以金主於秋而屬陰其氣凉凉極天氣清明而萬物反燥故燥若火是金極而反兼火化也故病血液衰也燥金之化極甚則煩熱氣鬱痿弱而手足無力不能收持也

諸澀枯涸乾勁皴揭皆屬於燥澀枯者水液氣衰少血不榮於皮肉氣不通利故皮膚皴揭而澀也及甚則痲痺不仁涸乾者水少火多繫辭云燥萬物者莫熯乎火故火極熱甚水液乾而不潤於身皮膚乃起裂手足有如斧傷而深二三分者冬月甚而夏月衰故法曰寒能收斂收斂則燥澀皴揭熱能縱緩縱緩則滋榮潤澤皆屬燥金之化也王注曰物之生滑利物之飛枯澀其爲治也宜開通道路養陰退陽凉藥調之榮血通流痲木不仁澀涸乾勁皴揭皆得其所愼無服烏附之藥經所謂金木水火土運行之數寒暑燥濕火風臨御之化則天道可見民病可調凡受諸病者皆歸於五行六氣勝復盛衰之道也王注曰人生有形不能無患既有其患亦常逃生化出陰陽者也故曰謹守病機各司其屬有者求之無者求之盛者責之虛者責之必先五勝疎其血氣令得調達而致和平此之謂也

燥乾者金肺之本肺藏氣以血液內損氣虛或風則皴揭風能勝濕熱能耗液皆能成燥故經云風熱火兼爲陽寒燥濕同爲陰又燥濕小異也然燥金雖屬秋陰而其性異於寒濕燥陰盛於風熱火也故風熱甚而寒濕同於燥也然中寒吐瀉亡液而成燥者亦以此矣故經云諸澀枯涸乾勁皴揭皆屬於燥也

燥乾者金肺之本燥金受熱化以成燥澀也兼火熱致金衰耗液而損血鬱而成燥者由風能勝濕熱能耗液故經云風熱火同陽也寒濕燥同陰也又燥濕小異也燥金雖屬秋陰而其性異於寒濕而反同於風熱火也又加大便乾澀乃大腸受熱化成燥澀經云諸澀枯涸又如癱瘓中風皆因火熱耗損血液元腑閉塞不能浸潤金受火鬱不能發聲

肢痛緩戾者風熱濕相攻而遂以偏枯語音澀手足不隨也然中寒吐瀉亡液而成燥亦以鮮矣亦有寒濕相鬱榮衛不能開發貫注多成偏枯經云諸澀枯涸乾勁皴揭屬於燥也

狂陽心火燥其三焦腸胃燥澀怫鬱而水液不能宣行也則周身不得潤澤故瘦悴黃黑也而燥熱消渴然雖多飲亦其水液不能浸潤於腸胃之外湯不能止而便注爲小便多出俗未明妄爲下焦虛冷誤人多矣

朱震亨心法

論燥

燥結血少不能潤澤理宜養陰

凡人五味之秀者養臟腑諸陽之渴者歸大腸大腸所以司出而不納也今停蓄蘊結獨不得疎導何哉抑有由矣邪入裏則胃有燥糞三焦伏熱則津液中乾此大腸挾熱然也虛人臟冷而血脈枯老人臟寒而氣道澀此大腸之挾冷然也亦有腸胃受風涸燥祕澀此證以風氣蓄而得之若夫氣不下降而穀道難噫逆泛滿必有其證矣

皮膚皴揭坼裂血出大痛或肌膚燥癢皆火爍肺金燥之甚也宜以四物湯去川芎加麥天門人參天花粉黃蘗五味子之類治之

明虞摶醫學正傳

燥證論

內經曰諸澀枯涸乾勁皴揭皆屬於燥原病式曰經云風熱火同陽也寒燥濕同陰也又燥濕小異也然燥金雖屬秋陰而異乎寒濕故反同於風熱也故火熱甚則金衰而風生緣風能勝濕熱能耗液而反寒陽實陰虛則風熱勝於水濕而爲燥也凡人風病多因熱甚而風燥者爲其兼化以熱爲其主也蓋肝主於筋而風氣自甚又燥熱加之則筋大燥也燥金主於收斂其脈緊澀故爲病筋強緊急而口噤也或病燥熱太甚而脾胃乾涸成消渴者或風熱燥甚怫鬱在表而裏氣平者或善伸數欠筋脈拘急或時惡寒筋惕而搐又或風熱燥并而鬱甚於裏故煩滿而或祕結也及風癇之發作者由熱甚而風燥爲其兼化涎溢胷膈燥爍而瘛瘲昏冒僵仆也凡此諸證皆由熱甚而生風燥病各有異者由風熱燥之微甚不等故也所謂中風筋緩者因其風熱勝濕而爲燥之甚也然筋緩不收而痿痹故諸臏鬱病痿皆屬於肺金乃燥之化也如秋深燥甚則草木萎落而不收病之象也是以掌得血而能持足得血而能步夫燥之爲病也血亦衰少不能榮養百骸故若是也

李梴醫學入門

燥分內外

外因時值陽明燥令久晴不雨黃埃蔽空令人狂惑皮膚乾枯屑起內因七情火燥或大便不利亡津或金石燥血或房勞竭精或飢飽勞逸損胃或炙煿酒漿厚味皆能偏助火邪消爍血液

六氣風熱火屬陽寒燥濕屬陰但燥雖屬秋陰而反同風熱火化蓋火盛則金被熱傷木無所制而生風風勝濕熱耗津入肝則筋脈勁強緊急口噤發爲風癇或手足癱瘓偏枯或十指反而莫能搔痒或爲雀目內瘴入心則昏冒僵仆語言蹇澀入脾則膈滿不食或善飢而瘦或傷積變爲水腫腹脹入肺則毛焦乾疥臏鬱咳嗽入腎則津液竭而煩渴及骨蒸祕結總皆肺金所主陽明與肺爲表裏也

表病皮膚皴揭四物湯去川芎合生脈散加知蘗天花粉或單天門冬膏如筋攣不能運動者大秦艽湯裏病消渴活血潤燥生津飲

燥結因肝木自旺或肺風入大腸者曰風燥搜風順氣丸因臟腑積熱或久病鬱熱者曰熱燥四順清涼飲當歸龍膏丸因脾胃伏火便閉不食者曰血燥四物湯加大黃桃仁或爲丸服大便偏祕者導滯通幽湯小便偏結者導氣除燥湯陰虛火燥者曰虛燥單黃蘗丸補陰丸腎氣丸勞役氣虛燥者補中益氣湯通用四物湯去芎爲君天麥冬爲臣苦蔞爲佐升麻紅花甘草爲使風加秦艽或牛膝熱加黃芩血倍生地渴加天花粉五味子閉結加大黃槨李仁麻仁氣虛量加參芪陰虛加知蘗大抵宜甘寒潤劑忌辛香動火及一切發汗之藥經曰燥者潤之養血之謂也蓋燥則血澀而氣液爲之凝滯潤則血旺而氣液爲之宣通由內神茂而後外色澤矣然積液固能生氣積氣亦能生液常因氣虛者瓊玉膏津虛者單五味

子膏血虛者地黃膏凡病遇天燥亦宜量加此等潤劑

醫門法律 臣奎昌著

秋燥論

燥之與濕有霄壤之殊燥者天之氣也濕者地之氣也水流濕火就燥各從其類此勝彼負兩不相侔春月地氣動而濕勝斯草木暢茂秋月天氣肅而燥勝斯草木黃落故春分以後之濕秋分以後之燥各司其政今指秋月之燥爲濕是必指夏月之熱爲寒然後可奈何內經病機一十九條獨遺燥氣他凡秋傷於燥皆謂秋傷於濕歷代諸賢隨文作解弗察其訛昌特正之大意謂春傷於風夏傷於暑長夏傷於濕秋傷於燥冬傷於寒覺六氣配四時之旨與五運不相背戾而千古之大疑始一抉也然則秋燥可無論乎夫秋不遽燥也大熱之後繼以涼生涼生而熱解漸至大涼而燥令乃行焉經謂陽明所至始爲燥終爲涼者亦誤文也豈有新秋月華露湛星潤淵澄天香徧野萬寶垂實歸之燥政迨至山空月小水落石出天降繁霜地凝白鹵一往堅急勁切之化反謂涼生不謂燥乎或者疑燥從火化故先燥而後涼此非理也深乎上古脈要曰春不沉夏不弦秋不數冬不濇是謂四塞謂脈之從四時者不循序漸進則四塞而不通也所以春夏秋冬孟月之脈仍循冬春夏秋季月之常不改其度俟二分二至已後始轉而從本令之王氣乃爲平人之脈也故天道春不分不溫夏不至不熱自然之運悠久無疆使在人之脈方春即以弦應方夏即以數應躁促所加不三時而歲度終矣其能長世乎即是推之秋月之所以忌數脈者以其新秋爲燥所勝故忌之也若不病之人新秋而脈帶微數乃天眞之脈何反忌之也且夫始爲燥終爲涼涼已即當寒矣何至十月而反溫邪涼已反溫失時之序天道不幾頓乎不知十月之溫不從涼轉正從燥生蓋金位之下火氣承之以故初冬常溫其脈之應仍從乎金之濇耳由濇而沉其濇也爲生水之金其沉也即爲水中之金矣珠輝玉潤傷燥云乎哉然新秋之涼方以却暑也而夏月所受暑邪即從涼發經云當暑汗不出者秋成風瘧舉一瘧而凡當風取涼以水灌汗乃至不復汗而傷其內者病發皆當如瘧之例治之矣其內傷生冷成滯下者并可從瘧而比例矣以其原來皆暑濕之邪外內所主雖不同同從秋風發之耳若夫深秋燥金主病則大異焉經曰燥勝則乾夫乾之爲害非遽赤地千里也有乾於外而皮膚皴揭者有乾於內而精血枯涸者有乾於津液而榮衛氣衰肉爍而皮著於骨者隨其大經小絡所屬上下中外前後各爲病所燥之所勝亦云熯矣至所傷則更厲燥金所傷本摧肝木甚則自戕肺金蓋肺金主氣而治節行焉此惟土生之金堅剛不撓故能生殺自由紀綱不紊若病起於秋而傷其燥金受火刑化剛爲柔方圓且隨型埴欲仍清肅之舊其可得耶經謂欬不止而出白血者死白血爲色淺紅而似肉似肺者非肺金自消何以有此試觀草木菁英可掬一乘金氣忽焉改容焦其上首而燥氣先傷上焦華蓋豈不明耶詳此則病機之諸氣膹鬱皆屬於肺諸痿喘嘔皆屬於上二條明指燥病言矣生氣通天論謂秋傷於燥上逆而欬發爲痿厥燥病之要一言而終與病機二條適相脗合祇以誤傳傷燥爲傷濕解者競指燥病爲濕病遂致經旨不明今一論之而燥病之機了無餘義矣其左胠脅痛不能轉側嗌乾面塵身無膏澤足外反熱腰痛驚駭筋攣丈夫癩疝婦人少腹痛目眛眥瘍則燥病之本於肝而散見不一者也內經燥淫所勝其主治必以苦寒者用火之氣味而制其勝也若佐以或酸或辛者臨病制宜宜補則佐酸宜瀉則佐辛也其下之亦以苦溫者如清甚生寒留而不去則不當用寒下宜以苦溫下之即氣有餘亦但以辛瀉之不以寒也要知金性畏熱燥復畏寒有宜用平寒而佐以苦甘者必以冷熱和平爲方制乃盡善也又六氣凡見下承之氣方制即宜少變如金位之下火氣承之則苦溫之屬宜減恐其以火濟火也即用下亦當變苦溫而從寒下也此內經治燥淫之旨可贊一辭者也至於肺氣膹鬱痿喘嘔欬皆傷燥之劇病又非制勝一法所能理也茲併入燥門細商良治學者精心求之罔不獲矣若但以潤治燥不求病情不通病所猶未免涉於粗疎耳

痹論云陰氣者靜則神藏躁則消亡下文但言飲食自倍腸胃乃傷曾不及於肺也其所以致躁而令陰氣消亡之故引而未發也至靈樞云形寒飲冷則傷肺始知傷肺關於寒冷矣可見肺氣外達皮毛內行水道形寒則外寒從皮毛內入飲冷則水冷從胷中上溢遏抑肺氣不令外揚下達其治節不行周身之氣無所稟仰而肺病矣究竟肺爲嬌臟寒冷所傷者

十之二三火熱所傷者十之七八寒冷所傷不過裏東其外火熱所傷則更消爍其中所以爲害倍烈也然火熱傷肺以致諸氣臏鬱諸痿喘嘔而成燥病百道方中率皆依樣壺蘆如烏藥香附紫蘇半夏茯苓厚朴丁沉訶蔻薑桂蓬稜檳榔益智之屬方方取足祇因內經脫遺燥證後之無識者競皆以燥治燥恬於操刃曾不顧陰氣之消亡耳

雖以東垣之大賢其治燥諸方但養榮血及補肝腎虧損二便閉結而已初不論及於肺也是非謂中下二焦有燥病而上焦獨無也不過缺經旨傷濕之疑遂因仍不察耳夫諸氣臏鬱之屬於肺者屬於肺之燥非屬於肺之實也苟肺氣不燥則諸氣稟清肅之令而周身四達亦胡致臏鬱耶諸痿喘嘔之屬於上者上亦指肺不指心也若統上焦心肺並言則心病不主痿喘及嘔惟肺燥甚則肺葉痿而不用肺氣逆而喘鳴食難過膈而嘔出三者皆燥證之極者也經文原有逆秋氣則太陰不收肺氣焦滿之文其可稱爲濕病乎更考東垣治肺消方中引用白豆蔻華澄茄及治諸氣方中雜用辛香行氣之藥覺於傷燥一途有未悉耳又如丹溪折衷祿證爲後代取宗亦無一方一論及於肺燥但於熱鬱湯下云有陰虛而得之者有胃虛食冷物抑遏陽氣於脾土中而得之者其治法皆見發熱條中此治非陰虛非陽陷亦不發熱而常自蒸蒸不解者夫蒸蒸不解非肺氣爲熱致內蒸而不能外達耶方用連翹薄荷黃芩山梔仁麥門冬甘草鬱金苦蔞皮穰八味竹葉爲引方後復設爲問答云何不用蒼朮香附攸芎曰火就燥燥藥皆能助火故不用也似此一方示不欲以燥助火之意於熱鬱之條其不敢以燥益燥重傷肺金隱然可會何爲不立燥病一門暢發其義耶又如繆仲醇治病所用者無非四君四物二冬二母沙參元參黃芪山藥蘇子橘紅桑葉枇杷葉杏仁棗仁扁豆蓮心苦蔞五味升葛柴前芩連梔蘗滑石石膏菊花枸杞牛膝續斷薏苡木瓜胡麻首烏豆豉霜梅膠飴之屬千方一律不過選擇於此增入對證一二味自成一家識者稱其不盡用方書所載投之輒效蓋獨開門戶者也又有稱其精於本草擇用五六十種無過之藥屢獲奇驗無以多爲者昌謂不然世之患燥病者多仲醇喜用潤劑於治燥似乎獨開門戶然亦聰明偶合未有發明可以治內傷之燥不可以治外感之燥何況風寒暑濕哉節取其長可矣

內經云心移熱於肺傳爲膈消肺燥之由來者遠矣苟其人腎水足以上升而交於心則心火下降而交於腎不傳於肺矣心火不傳於肺會何傷燥之厥哉即腎水或見不足其腸胃津血足以協濟上供肺亦不致過傷也若夫中下之澤盡竭而高源之水猶得措於不傾則必無之事矣所以經文又云二陽結謂之消手陽明大腸熱結而津不潤足陽明胃熱結而血不榮證成消渴舌上赤裂大渴引飲與心移熱於肺傳爲膈消文雖異而義則一也治膈消者用白虎加人參湯尚救其肺以施於諸氣臏鬱諸痿喘嘔罔不合矣學者可不知引伸觸類以求坐進此道耶

陰陽別論云二陽之病發心脾有不得隱曲男子少精女子不月其傳爲風消其傳爲息賁死不治此亦脾燥所由來而未經揭出者夫燥而令男子精液衰少女子津血枯閉亦云極矣然其始但不利於隱曲之事耳其既則胃之燥傳入於脾而爲風消風消者風熱熾而肌肉消削也大腸之燥傳入於肺而爲息賁息賁者息有音而上奔不下也是則腸胃合心脾以共成肺金之燥三臟二腑陰氣消亡殆盡尚可救療乎夫由心之肺已爲死陰之屬然脾氣散二陽之精上輸於肺猶得少甦迴斡今以燥之爲害令生我者盡轉而脫我之生故直斷爲死不治也從前憒憒特繹明之

病機十九條內云諸濇枯涸乾勁皴揭皆屬於燥燥金雖爲秋令雖屬陰經然異於寒濕同於火熱火熱勝則金衰火熱勝則風熾風能勝濕熱能耗液轉令腸實陰虛故風火熱之氣勝於水土而爲燥也

肝主於筋風氣自勝燥熱加之則液聚於胃腸不榮於筋脈而筋燥故勁強緊急而口噤或瘛瘲昏眛僵仆也

風熱燥甚怫鬱在表而裏氣平者善伸數欠筋脈拘急或時惡寒或筋惕而搐脈浮數而弦若風熱燥井鬱甚於裏則必爲煩滿必爲閉結故燥有表裏氣血之分也

至於筋緩不收痿痹不仁因其風熱勝濕爲燥日久乃燥病之甚者也至於諸氣臏鬱諸痿喘嘔皆屬於肺金從燥化金且自病而肺氣日見消亡又何論痿痹乎

五藏五志之火皆有眞液以養之故凝聚不動而眞液尤賴腎之陰精胃之津液交灌於不竭若腎胃之

水不繼則五臟之眞陰隨耗五志之火翕然內動而下上中三消之病作矣河間云燥太甚而脾胃乾涸則成消渴亦其一也

燥病必渴而渴之所屬各不同有心肺氣厥而渴有肝痹而渴有脾熱而渴有腎熱而渴有胃與大腸結熱而渴有因病瘧而渴有因素食肥甘而渴有因醉飽入房而渴有因遠行勞倦遇大熱而渴有因胃乾而渴有因風而渴五臟部分不同病之所遇各異其爲燥熱亡津則一也

治燥病者補腎水陰寒之虛而瀉心火陽熱之實除腸中燥熱之甚濟胃中津液之衰使道路散而不結津液生而不枯氣血利而不澀則病日已矣

腎惡燥急食辛以潤之故腎主五液津充則大便如常若饑飽勞逸損傷胃氣及食辛熱味厚之物而助火邪伏於血中耗散眞陰津液虧少故大便結燥仲景云小便利大便鞕不可攻下以脾約丸潤之戒輕下而重傷津液也然臟結復有陽結陰結之不同陽結者以辛凉潤之陰結者以辛溫潤之其辨又在微芒之間矣

律五條

凡秋月燥病誤以爲濕治者操刃之事也從前未明咎猶可諉今明知故犯傷人必多孽鏡當前悔之無及

凡治燥病燥在氣而治血燥在血而治氣燥在表而治裏燥在裏而治表藥不適病醫之罪也

凡治雜病有兼帶燥證者誤用燥藥轉成其燥因致危困者醫之罪也

凡治燥病須分肝肺二臟見證肝臟見證治其肺燥可也若肺臟見證反治其肝則坐誤矣醫之罪也肝臟見燥證固當急救肝葉勿令焦損然清其肺金除其燥本尤爲先務若肺金自病不及於肝即耑力救肺焦枯且恐立至尚可分功緩圖乎

凡治燥病不深達治燥之旨但用潤劑潤燥雖不重傷亦誤時日秖名粗工所當戒也

論清燥救肺湯

按諸氣臏鬱之屬於肺者屬於肺之燥也而古今治氣鬱之方用辛香行氣絕無一方治肺之燥者諸痿喘嘔之屬於上者亦屬於肺之燥也而古今治法以痿嘔屬陽明以喘屬肺是則嘔與痿屬之中下而惟喘屬之上矣所以千百方中亦無一方及於肺之燥也即喘之屬於肺者非表即下非行氣即瀉氣間有一二用潤劑者又不得其肯綮總之內經六氣脫誤秋傷於燥一氣指長夏之濕爲秋之燥後人不敢更端其說置此一氣於不理即或明知理燥而用藥夾雜如弋獲飛蟲茫無定法示人也今擬一方命名清燥救肺湯大約以胃氣爲主胃土爲肺金之母也其天門冬雖能保肺然味苦而氣滯恐反傷胃阻痰故不用也其知母能滋腎水清肺金亦以苦而不用至如苦寒降火正治之藥尤在所忌蓋肺金自至於燥所存陰氣不過一綫耳倘更以苦寒下其氣傷其胃其人尚有生理乎誠倣此增損以救肺燥變生諸證如沃焦救焚不厭其頻庶克有濟耳

景岳全書 臣弘今著

燥有表裏之不同

燥氣雖亦外邪之類然有陰陽從陽者因於火從陰者發於寒熱則傷陰必連於臟寒則傷陽必連於經此所以有表裏必須辯明而治之

燥證之辨有表裏經曰清氣大來燥之勝也風木受邪肝病生焉此中風之屬也蓋燥勝則陰虛陰虛則血少所以或爲牽引或爲拘急或爲皮膝風消或爲臟腑乾結此燥從陽化營氣不足而傷乎內者也治當以養營補陰爲主若秋令太過金氣勝而風從之則肺先受病此傷風之屬也蓋風寒外束氣應皮毛故或爲身熱無汗或爲欬嗽喘滿或鼻塞聲啞或咽喉乾燥此燥以陰生衛氣受邪而傷乎表者也治當以輕揚溫散之劑煖肺去寒爲主

石室祕錄 臣漢士銘著

燥證

燥熱之極已生臏鬱之證不可起牀者不治之證也臏鬱者兩脅脹滿不可左右臥而又不能起牀此肝經少血而胃氣乾枯久之腎氣亦竭骨中無髓漸成痿廢如何可治不知此證起於夏令之熱燥盡肺金之津不能下生腎水遂至腎水不能生肝木木不能生心火火不能生脾土而成臏鬱也然則止救肺腎而脾胃不治自舒矣方用金水兩資湯山茱萸五錢北五味二錢人參白芍麥冬熟地各一兩水煎服此方雖曰金水兩資實腎肝肺三經同治蓋補肺腎則金水有源燥證自潤若不平肝木則胃氣難生未易生津生液欲骨堅能步脅安能臥不易得矣所以補腎補肺之中不可無治肝之聖藥白芍最能平肝且能生血用之於補腎補肺之中更善調劑而奏功更

神也久服自有生機但不可責其近效耳

燥極一身無肉嗌乾面塵體無膏澤足心方熱者亦不治之證也此血乾而不能外養精涸而不能內潤耳吾有奇方實可救之名安潤湯當歸白芍麥冬各五錢熟地一兩川芎二錢牛膝人參各三錢桑葉三十片水煎服此四物湯而加味者也妙在加入參桑葉則四物更加大補一身之氣血無不潤又何至乾燥之苦哉

燥證善驚腰不能俯仰丈夫癲疝婦人小腹痛目盲胥突者不治之證也然予謂可治者以諸證皆腎病也腎虛可補補腎則心中有血可以止驚補腎則喉中有精可以俯仰補腎則任督有水男子可去疝而女子可去痛又何患目盲胥突之小證乎予今特傳一方名資本潤燥湯熟地二兩桑葉三十片山茱萸五錢沙參白朮各一兩甘菊花三錢水煎服此方純是補腎而少佐之健脾者何也蓋燥甚必口渴口渴必多飲水水多則腰必有水氣而不得散白朮最利腰膂又得熟地補腎之藥則白朮不燥轉得相助以成功此立方之妙也倘遇此等病即以此方投之未有不生者

燥病既除善後之計惟大補腎水水足則肺金有養方用六味湯加麥冬五味子治之可也

清治者不可用涼藥又不可用溫補乃改用清平之劑故曰清治此等病是肺氣之燥肺金之氣一燥即有意外之慮若不急治必變肺痿肺癰等證蓋燥極成火自宜用涼藥矣此不可涼藥者何肺居上流因涼藥以寒肺或藥不能遽入於肺中勢必趨於脾胃肺之熱未除而胃口反成虛寒之證必致下瀉瀉久而胃口無生氣矣胃既無生氣又何能生肺金而養肺氣哉故不若用清平之味平補胃口而上清肺金之氣之爲得也方用元參三錢麥冬五錢桔梗天門冬甘草紫菀款冬花貝母蘇子各一錢水煎服此方皆一派清平之品而專入肺金之妙劑也久服胃既不寒而肺金得養又何肺痿肺癰之生哉故人久欵不已即當敬服此方萬勿感於時師而用偏寒之藥也

方

導氣除燥湯（東垣十書下同）

治小便閉塞不通乃血澀致氣不通而竅澀也

知母酒製　澤瀉各三錢　黃蘗酒製四錢　茯苓　滑石末炒黃色各二錢

右和勻作一服水二鍾煎至一鍾空心稍熱服如急閉不拘時候服

潤腸丸

治脾胃伏火大便祕澁或乾燥閉塞不通全不思食乃風結祕塞也潤燥和血疎風自然通矣

麻仁　桃仁　羌活　當歸尾　大黃煨各半兩　皂角仁　秦艽各五錢

右除麻子仁桃仁另研外爲細末五上火煉蜜丸如桐子大每三五十丸食前白湯下又有潤燥丸一方本方加槲李仁防風治證同

大秦艽湯

治血弱陰虛不能養筋筋燥而手足不能運動指爪乾燥屬風熱甚者

秦艽　石膏各一錢　甘草　川芎　當歸　芍藥　羌活　獨活　防風　黃芩　白芷　生地　熟地　白朮　茯苓各七分　細辛五分　春夏加知母一錢

右水二盞煎如遇天陰加薑七片心下痞加枳實五分

大補丸（丹溪心法）

降陰火補腎水治陰虛燥熱

黃蘗炒褐色　知母酒炒各四兩　熟地黃酒蒸敗龜板酥炙黃各六兩

右爲末豬脊髓和煉蜜丸如桐子大每七十丸空心淡鹽湯送下

六味地黃丸

治下焦燥熱小便澀而數又治腎氣虛久新憔悴寢汗發熱五臟齊損瘦弱虛煩骨蒸下血自汗盜汗水泛爲痰咽燥口渴眼花耳聾等證功效不能盡述

熟地杵膏八兩　山茱萸肉　山藥四兩　丹皮　白茯苓　澤瀉各三兩

右各另爲末和地黃膏加煉蜜丸桐子大每服七八十九空心食前滾湯下

清燥救肺湯（醫門法律）

治諸氣臌膈諸痿喘嘔

桑葉經霜者去梗三錢　石膏煅二錢半　甘草　胡麻仁各一錢　麥門冬一錢二分　人參　杏仁泡去皮尖炒黃各七分　眞阿膠八分　枇杷葉一片刷去毛蜜炙黃

右一碗煎六分頻頻二三次滾熱服

痰多加貝母苦蔞

血枯加生地黃

熱甚加犀角羚羊角或加牛黃

滋燥養榮湯

治皮膚皴揭筋燥爪乾

當歸酒洗二錢　生地　熟地　白芍　秦艽

黃芩各一錢五分　防風一錢　甘草五分

右水煎服

大補地黃丸

治精血枯涸燥熱

黃蘗鹽酒炒　熟地黃酒蒸各四兩　當歸酒洗

山藥　枸杞子各三兩　知母鹽酒炒　山茱萸

白芍藥各二兩　生地黃二兩半　肉蓯蓉酒浸

元參各一兩半

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服七八十丸空

心淡鹽湯送下

當歸承氣湯 類聚

治燥之上藥也

當歸　大黃各二錢　芒硝七分　甘草五分

右剉作一貼水煎入芒硝攪化服之

瓊脂膏 醫學正傳下同

治燥病

生地黃二十斤搗汁去查　白蜜二斤煎沸去沫

鹿角膠　眞酥油各二十斤　生薑二兩搗取汁

右先以慢火熬地黃汁數沸綿濾取淨汁又煎二

十沸下鹿角膠次下酥油及蜜同煎候如餳磁器

收貯每服一二匙溫酒下

天門冬膏

治燥病

天門冬生去心搗絞取汁濾去滓

右砂鍋熬成膏酒服一二匙

地仙煎

治同上

山藥一斤杵細　杏仁一升研細　生牛乳一升

右同攪勻絞取汁盛磁瓶重湯煑一日酒服一二

匙

生血潤膚飲

治燥證皮膚圻裂手足爪甲枯燥搔之屑起血出

痛楚

天門冬一錢半　生地　熟地　當歸　黃芪

麥冬各一錢　酒片芩　萎仁　桃仁泥各五分

升麻二分　酒紅花一分　五味子九粒

右剉作一貼水煎服

單方

燥病牛酪作粥常服最妙 本草

天麥門冬俱治燥病煎湯服或作丸久服佳

生熟地黃皆生血潤燥作煎作丸久服爲妙

山藥生者治皮膚乾燥以此潤之蒸食之或研煑粥

服之

燥渴腸祕九月十月熟苦蔞實取瓤拌乾葛粉銀石

器中慢火炒熟爲末食後夜臥各以沸湯點服二錢

竈宗[illegible]衍義

大便燥澀大棗一枚去核入輕粉半錢縛定煨熟食

之仍以棗湯送下 直指

肺燥欬嗽蘇游鳳髓湯用松子仁一兩胡桃仁二兩

研膏和熟蜜半兩收之每服二錢食後沸湯點服 外臺

[illegible]

醫案

儒門事親曰戴人過曹南省親有姨表兄病大便燥

澀無他證常不敢飽食飽則大便極難結實如鐵石

或三五日一如圊目前星飛鼻中血出肛門連廣腸

痛痛極則發昏服藥則病轉劇烈巴豆芫花甘遂之

類皆用之過多則困瀉止則復燥如此數年遂畏藥

暴急不服但臥牀待盡戴人過診其兩手脈息俱滑

實有力以大承氣湯下之繼服神功丸麻仁丸等藥

使食菠薐葵菜及猪羊血作羹百餘日充壯親知見

駭之嗚呼粗工不知燥分四種燥於外則皮膚皴揭

燥於中則精血枯涸燥於上則咽鼻焦乾燥於下則

便溺閉結夫燥之爲病是陽明化也水液寒少故如

此然可下之當擇之藥如巴豆可以下寒甘遂芫花

可以下濕大黃朴硝可以下燥內經曰辛以潤之鹹

以耎之周禮曰以滑養竅

戴人過東杞一婦人病大便燥結小便淋澀半生不

娠惟常服疎導之藥則大便通利暫廢藥則結滯忽

得孕至四五月間醫者禁疎導之藥大便依常爲難

臨圖則力努爲之胎墜凡如此胎墜者三又孕已經三四月弦望前後漫溺結澀自分胎隕乃訪戴人戴人診其兩手脈俱滑大脈雖滑大以其且娠不敢陡攻遂以食療之用花鹼麥菠麥菜以車前子苗仍雜以猪羊血作羹食之半載居然生子其婦燥病方愈戴人曰余屢見孕婦利膿血下迫極努隕胎但用前法治之愈者莫知其數也爲醫拘常禁不能變通非醫也非學也識醫者鮮是難說也

醫學正傳曰予仲兄懷德處士年四十五平生體瘦弱血少值庚子年歲金太過至秋深燥金用事久晴不雨得燥證皮膚坼裂手足枯燥搔之屑起血出痛楚十指甲厚反而莫能搔痒予製一方名生血潤膚飲服數貼其病如脫後治十數人皆驗

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百五十六卷目錄

醫部彙考二百三十六

火門一

黃帝素問 陰陽應象大論 調經論 氣交變大論 五常政大論 六元正紀大論 至眞要大論
劉完素六書 火熱病機
李杲十書 飲食勞倦所傷始爲熱中論 安養心神調治脾胃論
朱震亨心法 火
格致餘論 相火論
李梴醫學入門 火分內外虛實 治法 積熱分虛實
趙獻可醫貫 論火 溢陰降火論 相火龍雷論
喩昌醫門法律 元哲格言論火
張介賓景岳全書 論君火相火 論病機火證 論虛火 論五志之火 論治火 論命門火 論河間 論丹溪 升陽散火辨

藝術典第二百五十六卷

醫部彙考二百三十六

火門一

黃帝素問

陰陽應象大論

壯火之氣衰少火之氣壯壯火食氣氣食少火壯火散氣少火生氣

註 壯火之氣衰少火之氣壯蓋陽亢則火壯而生氣反衰陽和則火平而氣壯盛矣如火壯於內則食氣氣盛於內則食火食猶入也言火壯則氣併於火氣盛則火歸於氣氣火之合一也如火壯於外則散氣火平於外則生氣

南方生熱熱生火

註 南方主夏令故生熱夫火生熱今以在天之熱而生火正陰陽不測之變化

調經論

帝曰陰虛生內熱奈何岐伯曰有所勞倦形氣衰少穀氣不勝上焦不行下脘不通胃氣熱熱氣熏胷中故內熱

註 飲食勞倦則傷脾脾主肌肉故形氣衰少水穀入胃由脾氣之轉輸脾不運行則穀氣不盛上焦不能宣五穀之味下焦不能受水穀之津胃爲陽熱之腑氣留而不行則熱氣熏於胷中而爲內熱矣

氣交變大論

歲火太過炎暑流行金肺受邪民病瘧少氣欬喘血溢血泄注下嗌燥耳聾中熱肩背熱

註 火盛則尅金故金肺受邪瘧暑熱病也壯火食氣故少氣肺受火邪故喘欬也肺朝百脈陽脈傷則血溢於上陰脈傷則血溢於下嗌燥者火熱鑠金也腎竅耳水竭則腎虛而耳聾也中熱者熱淫於內也肩背者肺之俞火運太過諸戊運也

歲金不及炎火迺行民病肩背瞀重鼽嚏血便注下

註 金運不及則所勝之火氣乃行肺俞在肩背故民病肩背鼽嚏肺病也血便注下火迫血液下注也

五常政大論

升明之紀正陽而治德施周普五化均衡其氣高其性速其用燔灼其化蕃茂其類火其政明曜其候炎暑其令熱其臟心

註 火位南方故正陽而治火主陽氣故德施周普陽和之氣四布五化俱以均平皆感火之化也火氣炎上故其氣高火性動急故性速燒炙曰燔灼火之用萬物蕃茂夏長之化也凡在地之火皆與之同類明曜火布之政炎暑乃夏之候在天爲熱火之令在臟爲心

赫曦之紀是謂蕃茂陰氣內化陽氣外榮炎暑施化物得以昌其化長其氣高其政動其令明顯其動炎灼妄擾其德暄暑鬱蒸其變炎烈沸騰

註 歲火太過是謂赫曦長氣盛故草木蕃茂少陰之上君火主之故陰氣內化陽氣外榮炎暑施化司夏令也物得以昌受長氣也夏主長故其化長火氣升故其氣高火性動故其政動火光明故其令明炎灼妄擾乃手足躁擾暄暑鬱蒸爲氣之和祥炎烈沸騰極則變易也

太陽司天火氣高明心熱煩嗌乾善渴鼽嚏喜悲數欠熱氣妄行寒迺復霜不時降善忘勝則心痛

註 火者其體明者火之用也心熱煩嗌乾善渴火炎於上也肺者心之蓋鼽嚏善悲火熱鑠金也火爲陽水爲陰數欠者陽引而上陰引而下也善忘者寒復而神氣傷也

六元正紀大論

火鬱之發炎火行大暑至民病少氣瘡瘍癰腫脅腹

胷背面目四肢膹憤臚脹瘍痱嘔逆瘛瘲骨痛節乃有動注下溫瘧腹中暴痛血溢流注精液乃少目赤心熱甚則瞀悶懊憹善暴死

註 民病癰腫諸證皆火熱盛而精血傷也少氣者火爲氣之賊也瞀悶肺氣病也火盛精傷故善暴死

少陰所至爲火府

註 司化之常也

少陽所至爲火主

註 德化之常也

至眞要大論

少陽司天其化以火

歲少陽在泉火淫所勝寒熱更至民病注泄赤白少腹痛溺赤甚則血便少陰同候

註 少陽在泉巳亥歲也寒熱更至熱傷血分則注赤熱傷氣分則注白熱在下焦故少腹痛而溺赤血便者甚則血出於小便也少陰之火出自水少陽之火生於地皆有陰陽寒熱之分故與少陰同候

火淫於內治以鹹冷佐以苦辛以酸收之以苦發之

火淫於內故宜治以鹹冷苦能泄辛能散故當佐以苦辛以酸收之以苦發之

少陰司天熱淫所勝怫熱至火行其政民病胷中煩熱嗌乾右胠滿皮膚痛寒熱欬喘唾血血泄鼽衄嚏嘔溺色變甚則瘡瘍胕腫肩背臂臑及缺盆中痛心痛肺膹腹大滿膨膨而喘咳病本於肺尺澤絕死不治

註 少陰司天子午歲也蓋少陰之火發於陰中故爲怫熱民病胷中煩熱嗌乾右胠滿皮膚痛肺受火熱而津液不生也唾血血泄熱淫而迫血妄行諸證皆肺經之病蓋火淫則金氣受傷故病本於肺

少陽司天火淫所勝則溫氣流行金政不平民病頭痛發熱惡寒而瘧熱上皮膚痛色變黃赤傳而爲水身面胕腫腹滿仰息泄注赤白瘡瘍欬唾血煩心胷中熱甚則鼽衄病本於肺天府絕死不治

註 少陽司天寅申歲也火淫所勝故金政不平少陽之火在天爲暑故民病頭痛寒熱而瘧熱上皮膚色變黃赤火上注於肺也傳爲水者逼其金水外溢故爲腫滿之水病仰息肺氣逆而不得偃息也泄注赤白瘡瘍唾血煩心火熱盛也鼽衄者甚而及於肺也此火淫勝金故病本於肺

熱淫所勝平以鹹寒佐以苦甘以酸收之

火淫所勝平以酸冷佐以甘苦以酸收之以苦發之以酸復之熱淫同

少陽之火乃地火也如平之而未平者淫於內也故當以苦發之此卽三焦之元氣宜復以酸收之勿使其過於發散也夫少陰之熱君主之火也淫甚則外內相合亦當以苦發之

火化於天寒反勝之治以甘熱佐以苦辛

註 此邪氣反勝宜以所勝之氣味平之

少陰之復燠熱內作煩躁鼽嚏少腹絞痛火見燔焫嗌燥分注時止氣動於左上行於右欬皮膚痛暴瘖心痛鬱冒不知人乃洒淅惡寒振慄譫妄寒已而熱渴而欲飲少氣骨痿隔腸不便外爲浮腫噦噫熱氣大行介蟲不復病痱疹瘡瘍癰疽痤痔甚則入肺欬而鼻淵天府絕死不治

註 煩躁火煩而陰躁也燠熱上乘於肺則鼽嚏少腹絞痛少陰之陰氣發於下也火見燔焫君火之氣發於上也嗌燥火熱鑠金也夫陰寒在腹則注泄得火熱之氣則注止少陰標本並發是以注泄分而時注時止也氣動於左者君火之氣發於左腎之水中上行於右者肺腎上下相交腎爲本而肺爲末也火淫肺金則欬而皮痛金主聲故暴瘖也心痛者火氣自傷也鬱冒不知人者寒熱之氣亂於上也洒淅振慄者陰陽相搏也寒已而熱者少陰之陰寒從火化而爲熱也是以渴而欲飲少氣骨痿蓋火盛則少氣熱盛則骨痿也噦者小腸之氣不通逆氣上走心而爲噫也流水不冰痱疹瘡瘍乃熱傷氣血火熱鑠金故天府絕

少陽之復大熱將至枯燥燔爇介蟲乃耗驚瘈欬衄心熱煩躁便數憎風厥氣上行面如浮埃目乃瞤瘛火氣內發上爲口糜嘔逆血溢血泄發而爲瘧惡寒鼓慄寒極反熱嗌絡焦槁渴飲水漿色變黃赤少氣脈萎化而爲水傳爲胕腫甚則入肺欬而血泄尺澤絕死不治

註 少陽之火復發於秋冬之時是以木枯草焦而甲蟲耗散驚瘛欬衄乃熱乘心肺便數憎風此表裏皆熱面如浮埃面微有塵也手足少陽之脈皆上系於目故目乃瞤瘛火氣內發乃陰火發於內發於上焦則口糜發於中焦則嘔逆發於下焦則

血溢血泄發而爲瘧者少陽主樞是以寒熱陰陽外內出入寒極反熱從火化也嗌絡焦槁肺金傷也渴飲水漿陽明胃金燥也太陰濕土主四之氣色變黃赤者火土相合也少氣脈萎者氣血皆傷也化而爲木傳爲胕腫者從四氣五氣而直至於終之氣也

少陽在泉主勝則熱反上行而客於心心痛發熱格中而嘔少陰同候

註 少陽在泉主勝則熱反上行而客於心心痛發熱者君相二火之客氣反上行而自病也格中而嘔者太陰之客氣自病也因主勝而客反自病故曰反曰客曰少陰同候謂火性炎上故二火皆有反逆之自病也

熱氣大來火之勝也金燥受邪肺病生焉寒氣大來水之勝也火熱受邪心病生焉所謂感邪而生病也重感於邪則病危矣有勝之氣其必來復也

註 重感於邪者乘年之虛失時之和遇月之空是謂三虛而感於邪則病危矣

諸熱瘛瞀皆屬於火

註 五臟內合五行五行內生六氣是以五臟之氣病於內而六氣之證見於外也

諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火諸逆衝上皆屬於火諸脹腹大皆屬於熱諸躁狂越皆屬於火

註 火者少陽包絡之相火熱者君火諸禁鼓慄乃熱極生寒如喪神守相火甚而心神不安也

金劉完素六書

火熱病機

諸病喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁腹脹大鼓之如鼓癰疽瘍疹癘氣結核吐下霍亂瞀鬱腫脹鼻塞鼽衄血溢血泄淋閟身熱惡寒戰慄驚惑悲笑譫妄衄衊血汗皆屬於熱

手少陰君火之熱乃眞心小腸之氣也

諸熱瞀瘛暴瘖目昧躁擾狂越罵詈驚駭胕腫疼酸氣逆衝上禁慄如喪神守嚏嘔瘡瘍喉痹耳鳴及聾嘔湧溢食不下目昧不明暴注瞤瘛暴病暴死皆屬於火

少陽相火之熱乃心包絡三焦之氣也

元李杲十書

飲食勞倦所傷始爲熱中論

古之至人窮於陰陽之化究乎死生之際所著內外經悉言人以胃氣爲本蓋人受水穀之氣以生所謂清氣榮氣運氣衛氣春升之氣皆胃氣之別稱也夫胃爲水穀之海飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五臟陰陽揆度以爲常也若飲食失節寒溫不適則脾胃乃傷喜怒憂恐損耗元氣致脾胃氣衰元氣不足而心火獨盛心火者陰火也起於下焦其系繫於心心不主令相火代之相火下焦包絡之火元氣之賊也火與元氣不兩立一勝則一負脾胃氣虛則下流於腎陰火得以乘其土位故脾證始得則氣高而喘身熱而煩其脈洪大而頭痛或渴不止其皮膚不任風寒而生寒蓋陰火上衝則氣高喘而煩熱爲頭痛爲渴而脈洪脾胃之氣下流使穀氣不得升浮是春生之令不行則無陽以護其榮衛則不任風寒乃生寒熱此皆脾胃之氣不足所致也然而與外感風寒所得之證頗同而實異內傷脾胃乃傷其氣外感風寒乃傷其形傷其外爲有餘有餘者瀉之傷其內爲不足不足者補之內傷不足之病苟誤認作外感有餘之病而反瀉之則虛其虛也實實虛虛如此死者醫殺之耳然則奈何惟當以辛甘溫之劑補其中而升其陽甘寒以瀉其火則愈矣經曰勞者溫之損者溫之又云溫能除大熱大忌苦寒之藥損其脾胃脾胃之證始得則熱中今立補中益氣湯以治始得之證

安養心神調治脾胃論

靈蘭祕典論云心者君主之官神明出焉凡怒忿悲思恐懼皆損元氣夫陰火之熾盛由心生凝滯七情不安故也心脈者神之舍心君不寧化而爲火火者七神之賊也故曰陰火太盛經營之氣不能頤養於神乃脈病也神無所養津液不行不能生血脈也心之神眞氣之別名也得血則生血生則脈旺脈者神之舍若心生凝滯七神離形而脈中唯有火矣善治斯疾者惟在調和脾胃使心無凝滯或生懽忻或逢喜事或天氣暄和居溫和之處或食滋味或眼前見欲愛事則慧然如無病矣蓋胃中元氣得舒伸故也夏月火熾之極金伏之際而寒水絕體於此時也故急救之以生脈散除其濕熱以制其火蓋肺欲收心苦緩用酸以收之心火盛用甘以瀉之故人參之甘佐以五味子之酸孫思邈云夏月常服五味子以補五臟氣是也麥門冬之微苦寒能滋水之源於金之位而清肅肺氣又能除火刑金之嗽而斂其痰邪微

加黃蘗之苦寒以爲守位滋水之流以鎮墜其浮氣而除兩足之痿弱也

朱震亨心法

火

陰虛火動難治火鬱當看發於何經輕者可降重者則從其性而升之實火可瀉黃連解毒之類虛火可補小便降火極速

凡氣有餘便是火不足者是氣虛

火急甚重者必緩之以生甘草兼瀉兼緩參朮亦可

人壯氣實火盛顯狂者可用正治或硝黃冰水之類

人虛火盛狂者以生薑湯與之若投冰水正治立死

有補陰火卽自降炒黃蘗生地黃之類

凡火盛者不可驟用凉藥必兼溫散

火可發有二風寒外束者可發鬱者可發

氣從左邊起者乃肝火也氣從臍下起者乃陰火也

氣從脚起入腹如火者乃虛之極也蓋相火起於九泉之下多死一法用附子末津調塗湧泉穴以四物湯加降火藥服之妙

陰虛證本難治用四物湯加炒黃蘗降火補陰

龜板補陰乃陰中之至陰也

四物加白馬脛骨降陰中之火可代黃連黃芩

黃連黃芩梔子大黃黃蘗降火非陰中之火不可用

生甘草緩火邪木通下行瀉小腸火

人中白瀉肝火須風露中二三年者

人中黃大凉治疫病須多年者佳中氣不足者味用甘寒

山梔子仁大能降火從小便泄去其性能屈曲下降人所不知治痞塊中火邪

格致餘論

相火論

太極動而生陽靜而生陰陽動而變陰靜而合而生水火木金土各一其性惟火有二曰君火人火也曰相火天火也火內陰而外陽主乎動者也故凡動皆屬火以名而言形氣相生配於五行故謂之君以位而言生於虛無守位稟命因其動而可見故謂之相天主生物故恆於動人有此生亦恆於動其所以恆於動皆相火爲之也見於天者出於龍雷則木之氣出於海則水之氣也具於人者具於肝腎二部肝屬木而腎屬水也膽者肝之腑膀胱者腎之腑心胞絡者腎之配三焦以焦言而下焦司肝腎之分皆陰而下者也天非此火不能生物人非此火不能有生天之火雖出於木而皆本乎地故雷非伏龍非蠆海非附於地則不能鳴不能飛不能波也鳴也飛也波也動而爲火者也肝腎之陰悉具相火人而同乎天也或曰相火天人之所同何東垣以爲元氣之賊又曰火與元氣不兩立一勝則一負然則如之何而可以使之無勝負也曰周子曰神發知矣五性感物而萬事出有知之後五者之性爲物所感不能不動謂之動者卽內經五火也相火易起五性厥陽之火相扇則妄動矣火起於妄變化莫測無時不有煎熬眞陰陰虛則病陰絕則死君火之氣經以暑與濕言之相火之氣經以火言之蓋表其暴悍酷烈有甚於君火者也故曰相火元氣之賊周子又曰聖人定之以中正仁義而主靜朱子曰必使道心常爲一身之主而又能主之以靜彼五火之動皆中節相火惟有裨補造化以爲生生不息之運用耳何賊之有或曰內經相火注曰少陰少陽矣未嘗言及厥陰太陽而吾子言之何耶曰足太陰少陰東垣嘗言之矣治以炒藥取其味辛能瀉水中之火是也戴人亦言膽與三焦尋火治肝和胞絡都無異此歷指龍雷之火也予亦備述天人之火皆生於動如上文所云者實推廣二公之意或曰內經言火不一往往於六氣見之言藏腑者未之見二公豈他有所據耶子能爲我言之乎

經曰百病之生於風寒暑濕燥火之動而爲變者岐伯歷舉病機一十九條而屬火者五此非相火之爲病之出於臟腑者乎考諸內經少陽病爲瘈瘲太陽病時眩仆少陰病昏瘈暴瘖鬱冒不知人非諸熱昏瘈之屬火乎少陽病惡寒鼓慄膽病振寒少陰病洒淅惡寒振慄厥陰病洒淅振寒非諸禁鼓慄如喪神守之屬火乎少陽病嘔逆厥氣上行膀胱病衝頭痛太陽病厥氣上衝胃小腹控睾引腰脊上衝心少陰病氣上衝胃嘔逆非諸逆衝上之屬火乎少陽病讝妄太陽病讝妄勝胱病狂顛非諸躁狂越之屬火乎少陽病腑腫善驚少陰病昏熱以酸腑腫不能久立非諸病腑腫疼酸驚駭之屬火乎又原病式曰諸風掉眩屬乎肝火之動也諸風膹鬱病瘈屬乎肺火之升也諸濕腫滿屬於脾火之勝也諸痛癢瘡瘍屬於心火之用也是皆火之爲病出於臟腑者然也注文未之發耳以陳無擇之通敏且以暖熱論君火日用之火言相火又不深及宜乎後人聾瞽也悲夫

李梴醫學入門

火分內外虛實

外因邪鬱經絡積熱臟腑此爲有餘之火內因飲食情欲氣盛似火此爲有餘中不足陰虛火動乃不足之火大要以脈弦數無力爲虛火實大有力爲實火火病死人甚暴變化無常一動便傷元氣偏勝移害他經內經病惱十九條而屬火者五劉河間推廣五運爲病屬肝者諸風之火屬脾胃者諸濕痰火屬心肺者諸熱實火屬腎者諸虛之火散於各經浮遊之火入氣分無根之火入血分消陰伏火故曰諸病尋痰火痰火生異證實火內外皆熱口渴日夜潮熱大小便閉虛火潮熱有間口燥不渴

治法

實火因外邪鬱在表者九味羌活湯半表裏小柴胡湯入棗大承氣湯燥渴白虎湯因金石炙煿者黃連解毒湯防風當歸飲三黃丸大金花丸狂者黑奴丸虛火氣虛火勝因勞倦傷胃無力身熱宜保元湯補中益氣湯加芍藥黃蘗或四君子湯滲之如大病及吐瀉後身熱如焚命門脈脫爲陽衰之病宜以辛熱溫養其火則熱自退附子理中湯霹靂散主之

血虛火動因傷邑慾午後發熱宜四物湯滋陰降火湯加味逍遙散腎氣丸入中白散若腎水受傷生地元麥煎胃主之相火旺甚氣從臍下起者正氣湯坎離丸如氣從湧泉穴起入腹者虛極難治四物湯加白馬脛骨降陰火以代黃連或入中黃亦好外用附子末津調塗足心亦有溫熱鬱者

飲食鬱火因內傷生冷及飲食不化抑遏陽氣於脾土四肢熱燎以升麻之劑發之升陽散火湯火鬱湯瀉陰火升陽湯

七情五志火起宜隨各經調之大怒火起於肝則手掉目眩清肝湯加龍膽草古茱連丸醉飽火起於胃則痞塞腫滿瀉黃散戊己丸單石膏丸悲哀火起於肺則氣逆膹鬱瀉白散加黃芩葶藶單黃芩丸單苦參丸房勞火起於腎則骨蒸潮熱大補陰丸滋腎丸單黃蘗丸心火輕則煩熱痛痒單瀉心湯重則自焚面青發躁脈絕暴死故曰五志之火動極不治

總論虛火可補實火可瀉輕者可降重者從其性而升之君火正治可以濕伏可以水滅可以直折相火反治不可以水濕折惟從其性而伏之即如實火發狂宜三黃硝黃正治虛火發狂先與蘆湯然後補陰其火自降凡火盛不可猛用凉藥必酒炒過或兼溫散甘緩又有可發汗者風寒生冷鬱也

五行惟火有二心爲君火一身之主腎爲相火遊行於身常寄肝膽胞絡三焦之間又膀胱爲民火亦屬於腎此皆天賦不可無者若五志之火則由於人是以內傷火多外感火少噫火不妄動動由於心靜之一字其心中之水乎

積熱分虛實

實熱因服金石炙煿夜臥熱炕或火烘衣被久則蘊積熱毒在上焦則咽乾口燥而臭舌糜脣瘡在中焦則胃滿乾嘔作渴在臟腑則大小便閉法當清心解毒上熱凉膈散中熱調胃承氣湯下熱八正散三焦俱熱三黃湯大金花丸虛熱因消鑠腎水相火炎上口燥煩渴精神短少心悸自汗懶於動作夜臥睡語法當降火滋水三補丸主之或只清之潤之而已氣分實熱白虎湯或敗毒散加荊芥青皮白朮血分實熱四順清凉飲氣血俱實熱洗心散甘露飲澤瀉湯心熱單瀉心湯肝熱瀉青丸脾熱瀉黃散肺熱瀉白散腎熱滋腎丸小腸熱導赤散胃熱瀉胃湯大腸熱瀉白湯膀胱熱加味石膏湯然諸熱皆屬於心熱甚則能傷陰宜珠砂安神丸以清鎮之

氣分虛熱清心蓮子飲甚者龍腦鵝蘇丸久者宜升陽以散之小柴胡湯合四君子湯升陽益胃湯補中益氣湯或疑補中益氣何以治熱不知熱因熱用溫能除大熱之理蓋大熱在上大寒必伏於內溫能退寒以助地氣地氣者在人乃胃之生氣使眞氣旺而邪熱自退血分虛熱四物湯加芩連山梔或爲丸服久則滋陰以降之泰艽扶羸湯或古歸芪湯滋陰降火湯蒸熱者加味逍遙散坎離丸氣血俱虛熱升陽滋陰兼用十全大補湯人參養榮湯俱加知母黃蘗然虛熱久必脾胃不和三白湯參苓白朮散調之

風甚生熱者風熱兼治或熱甚生風者治其熱而風自消凡頭目腫痛脏運眼昏目赤耳聾鼻塞口燥舌乾牙宣牙腫斑疹之類皆風熱炎上也初起上攻者川芎茶調散至寶丹四神丹上清丸久而下注血衰者腎氣丸加知母黃蘗或當歸龍荟丸四生散痰熱者因痰生熱或因熱生痰凡咽痛喉閉腦噎胃痞顛狂驚悸怔忡健忘之類皆痰火滯中之所爲也小調中湯大調中湯

濕熱者因濕生熱或因熱生濕凡泄瀉下痢水腫眼黃疸遺精白濁痾痛腹痛脚氣之類皆濕熱下流所爲丹溪治濕熱上焦黃芩虛者天麥門冬代之中焦

黃連盛者白朮茯苓葛根代之下焦龍膽防己黃蘗盛者肥人蒼朮南星滑石瘦人牛膝檳榔桃仁紅花經曰治病必求其本此風熱痰濕百病之本也

越獻可醫貫

論火

有陽火有陰火有木中之火有土中之火有金中之火有木中之火陽火者天上日月之火生於寅而死於酉陰火者燈燭之火生於酉而死於寅此對待之火也木中火者霹靂火也即龍雷之火無形而有聲能焚草木得雨而益熾見於季春而伏於季秋原夫龍雷之見者以五月一陰生水底冷而天上熱龍爲陽物故隨陽而上升至冬一陽來復故龍亦隨陽下伏雷亦收聲人身腎中相火亦猶是也平日不能節慾以致命門火衰腎中陰盛龍火無藏身之位故遊於土而不歸是以上焦煩熱咳嗽等證善治者以溫腎之藥從其性而引之歸原使行秋冬陽伏之令而龍歸大海此至理也奈何今之治陰虛火衰者以黃蘗知母爲君而愈寒其腎益速其斃良可悲哉若有陰虛火實旺者此腎水乾枯而火偏盛宜補水以配火亦不宜苦寒之品以滅火壯水之主以鎮陽光正謂此也如燈燭火亦陰火也須以膏油養之不得雜一滴寒水得水即滅矣獨有天上火入於人身如河間所論六氣暑熱之病及傷暑中暑之疾可以凉水渥之可以苦寒解之其餘爐中火者乃灰土中無焰之火得木則烟見濕則滅須以炭培實以溫爐人身脾土中火以甘溫養其火而火自退經曰勞者溫之損者溫之甘能除大熱溫能除大熱此之謂也

空中之火附於木中以常有坎水滋養故火不外見惟乾柴生火燎原不可止過力窮方止人身肝火內熾鬱悶煩躁須以辛凉之品發達之經曰木鬱則達之火鬱則發之使之得遂其炎上之性若以寒藥下之則愈鬱矣熱藥投之則愈熾矣

金中火者凡山中有金銀之鑛或五金埋瘞之處夜必有火光此金鬱土中而不得越故有光輝發見於外人身皮毛空竅中自覺針刺蚊咬及巔頂如火炎者此肺金氣虛火乘虛而現肺主皮毛故也經曰東方木實因西方金虛也補北方之水即所以瀉南方之火雖曰治金中之火而通治五行之火無餘蘊矣心火者有形之火也相火者無形之火也無形之火內燥熱而津液枯以五行有形之兌水制之者權也吾身自有上池眞水氣也無形者也以無形之水沃無形之火常而可久者也是爲眞水眞火升降既宜而成既濟矣

滋陰降火論

節齋云人之一身陰常不足陽常有餘況飾慾者少過慾者多精血既虧相火必旺火旺則陰愈消而癆瘵欬嗽咯血吐血等證作矣故宜常補其陰使陰與陽齊則水能制火而水升火降斯無病矣故丹溪先生發明補腎之說謂專補左尺腎水也古方滋補藥皆兼補右尺相火不知左尺原虛右尺原旺若左右平補依舊火勝於水只補其左制其右庶得左右相平也右尺相火固不可衰若果相火衰者方宜補火但世之人火旺致病者十之八九火衰成病者百無一二且少年腎水正旺似不必補然慾心正熾妄用太過至於中年慾心雖減然少年斲喪既多焉得復實及至老年天眞漸絕只有孤陽故補陰之藥自少至老不可缺也節齋先生發明先聖之旨以正千載之訛其功盛哉但水衰者固多火衰者亦不少先天稟賦若薄者雖童子尚有火衰之證焉可獨補水哉況補陰丸中以黃蘗知母爲君天麥門冬爲佐蓋黃蘗苦寒泄火天門寒冷損胃服之者不惟不能補水而且有損於胃故滋陰降火者乃謂滋其陰則火自降當串講不必降火也然二尺各有陰陽水火互相生化當於二臟中各分陰陽虛實求其所屬而平之若左尺脈虛弱而細數者是左腎眞陰不足也用六味丸右尺脈遲軟或細沉而數欲絕者是命門相火不足也用八味丸至於兩尺微弱是陰陽俱虛用十補丸皆滋其先天之化源實萬世無窮之利今補陰者率用黃蘗知母反戕脾胃多致不起不能無遺憾於世幸醫者病者加意於六味八味二方云

相火龍雷論

火有人火有相火人火者燈原之火也遇草而燃得木而燔可以濕伏可以水滅可以直折黃連之屬制之相火者龍火也雷火者得濕則焫遇水則燔不知其性而以水折之以濕攻之適足以光焰燭天物窮方止矣識其性者以火燭之則焰灼自消炎光撲滅古書瀉火之法意蓋如此今人率以黃蘗治相火殊不知此相火者寄於肝腎之間此乃水中之火龍雷之火也若用黃蘗苦寒之藥是以水滅濕伏龍雷之火愈發矣龍雷之火每當濃陰驟雨之時火焰愈熾或燒毀房屋或擊碎木石其勢誠不可抗惟太陽一

照火自消滅此得水則熾得火則滅之一驗也
問龍雷何以五六月而啓發九十月而歸藏蓋冬時陽氣在水土之下龍雷就其火氣而居於下夏時陰氣在下龍雷不能安其身而出於上故惟八味丸桂附與相火同氣直入腎中據其窟宅而招之同氣相求相火安得不引之而歸原耶人非此火不能有生世人皆曰降火而予獨以地黃滋養水中之火世人皆曰滅火而予獨以桂附溫補天真之火也
震本坤體陽自外來交之有動乎情慾之象是以聖人於卦中凡涉乎震體者取義猶嚴洊雷震君子以恐懼修省在復則曰先王以至日閉關欲其復之靜也在隨則曰向晦入晏息欲其居之安也在頤則曰慎言語節飲食欲其養之正也明乎此義而相火不藥自伏矣

醫門法律　臣　鑒　昌　著

先哲格言論火

天之六氣惟火有二君者上也相者下也陽在上者即君火也陽在下者即相火也上者應離陽在外也故君火以明下者應坎陽在內也故相火以位火一也而上下幽顯其象不同此其所以有辨也然以凡火觀之則其氣質上下亦自有君相明位之辨蓋明者光也火之氣也位者形也火之質也如一寸之燈光被滿室此氣之爲然也盈爐之炭有熱無燄此質之爲然也夫燄之與炭皆火也然燄明而質暗燄虛而質實燄動而質靜燄上而質下以此證之則其氣之與質固自有上下之分亦豈非君相之辨乎是以君火居上爲日之明以昭天道故於人也屬心而神明出焉相火居下爲原泉之溫以生養萬物故於人也屬腎而元陽蓄焉所以六氣之序君火在前相火在後前者擧物之生後者成物之實而三百六十日中前後二火所主者止四五六七月其一百二十日以成一歲化育之功此君相二火之爲用也
六氣之分屬陰者三燥濕寒是也屬陽者二風熱而已使火無君相之化則陰勝於陽而殺甚於生矣此二火之所以必不可無也若因惟火有二便謂陽常有餘而專意抑之則伐天之和伐天之本莫此爲甚此等大義學者最當詳察足相火屬膽配肝主血者也手相火屬三焦配腎之命門主精者也肝與命門皆屬風木木中有火則精血之中有熱氣也然精血體潤水也火與水相守故不發至發而爲熱則皆精血將枯之所致也譬木枯則火易焚耳故相火發者難治今虛勞骨蒸之病皆相火發熱之證也小水不能滅大火法當補陰則熱自退

景岳全書　臣　張　介　賓　著

論君火相火

經曰君火以明相火以位此就火德辨陰陽而悉其形氣之理也蓋火本陽也而陽之在上者爲陽中之陽故曰君火陽之在下者爲陰中之陽故曰相火此天地生成之道也其在於人則上爲君火故主於心下爲相火故出於腎主於心者爲神明之主故曰君火以明出於腎者爲發生之根故曰相火以位至其爲病則以明者其化虛故君火之氣有晦有明以位者其化實故相火之病能焚能燎何也蓋化處者無形者也故其或衰或旺惟見於神明神惟貴足衰則可畏也化實者有形者也故其爲熱爲寒必著於血氣確有證據方可言火也此其一清一濁有當辨者如此然清濁雖二而氣稟則一故君火衰則相火亦敗此以無形者虧及有形者也相火熾則君火亦炎此以有形者病及無形者也夫生以神全病惟形見故火之爲病必依於有位有形之相火所謂邪火者即所謂凡火也惟不得其正所以爲病故別以邪火名之而實非可以君相並言也故在內經則又謂之畏火正以此火有形故可畏也夫病以有形之火須治以有形之物故形而火盛者可瀉以苦寒之物形而火衰者可助以甘溫之物此以形治形而治火之道止於是矣至若無形之火則生生息息窈窈冥冥爲先天之化爲後天之神爲死生之母爲元牝之門又豈於形迹之間可能摹擬者哉故有形之火不可縱無形之火不可殘有能知火之邪正而握其盈虛伸縮之權者則神可全病可却而生道在我矣即吾有形吾又何患

余向釋內經於君火以明相火以位之義說固詳矣而似猶有未盡者及見東垣云相火者下焦包絡之火元氣之賊也丹溪亦述而證之予聞此說嘗掩口而笑而覺其不察之甚也由此興感因再繹之夫內經發明火義而以君相明位四字爲目此四字者箇箇著實是誠至道之綱領有不可不闡揚其精義者亦何以見之蓋君道惟神其用在虛相道惟力其用在實故君之能神者以其明也相之能力者以其位也明者明於上爲化育之元主位者位於下爲神明之洪基此君相相成之大道而有此天不可無此地

有此君不可無此相也明矣君相之義豈泛言哉至若五運之分各職其一惟於火字獨言君相而他則不及者何也蓋兩間生氣總曰元氣元氣惟陽爲主陽氣惟火而已第火之爲用其道最微請以火象證之如清輕而光焰於上者火之明也重實而蘊蓄於下者火之位也明卽位之神無明則神用無由以著位卽明之本無位則光焰何從以生故君火之變化於無窮總賴此相火之栽根於有地雖分之則一而二而總之則二而一者也此君火相火之辨凡其爲生化爲盛衰爲本末輕重攸係從可知矣人生所賴者唯此故內經特以爲言然在內經則但表其大義原無分屬之條惟刺禁論曰七節之旁中有小心此固隱然有相火所居之意故後世諸家咸謂相火寄在命門是固然矣然以予之見則見君相之義無職不有又何以辯之蓋總言大體則相火當在命門謂根荄在下爲枝葉之本也析言職守則臟腑各有君相謂志意所出無不從乎形質也故凡以心之神肺之氣脾胃之倉廩肝膽之謀勇兩腎之伎巧亦總皆發見之神奇使無其地何以生此使地有不厚何以蓄此此皆從位字發生而五臟各有其位則五臟亦各有相相強則君强此相道之關係從可知矣故聖人特命此名誠重之也而後人指之爲賊抑何異耶此萬世之疑竇故予不得不辯或曰是若謬矣第彼之指爲賊者亦有深意蓋謂之情欲多有妄動動則俱能起火火盛致傷元氣卽爲元氣之賊亦何不可予曰此固邪正之岐最當明辯者也夫情欲之動邪念也邪念之火爲邪氣君相之火正氣也正氣之薔爲元氣其在身家營之產業貲者能守之不肖者能蕩之罪與不罪在子孫之廢與不廢繇基何與焉相火之義亦猶此耳夫旣以相稱之而竟以賊名之其失聖人之意也遠矣且凡火之賊傷人者非君相之眞火無論在內在外皆邪火斗賊火可言賊相火不可言賊也劉六賊之中火惟居一何二子獨知畏火其甚如是而井昧邪正之大義亦何謂耶予聞其言固知其錯認而日矣不覺因而失笑

論病機火證

觀內經至眞要大論所列病機凡言火者五言熱者四似皆謂火也然諸病之見於諸篇者復有此言熱而彼言寒此言實而彼言虛者豈果本經之自爲矛盾耶蓋諸篇所言在專悉病情故必詳盡在本篇所言亦不過總言運氣之大約原非確指爲實火實熱也故於篇末復以有無虛實四字總結於後此軒岐之明見萬世正恐後人誤以火熱二字悉認爲眞因而曉示如此其火有虛實熱有眞假從可知矣余以劉河間原病式之謬故於類經惟引經釋經不敢杜譔一言冀在解人之惑以救將來之誤耳

論虛火

凡虛火證卽假熱證也其病源有二而外證有四何也一曰陰虛者能發熱此以眞陰虧損水不制火也二曰陽虛者亦能發熱此以元陽敗竭火不歸源也此病源之二也至若外證之四則一曰陽戴於上而見於頭面咽喉之間者此其上雖熱而下則寒所謂無根之火也二曰陽浮於外而發於皮膚肌肉之間者此其外雖熱而內則寒所謂陽格之火也三曰陽陷於下而見於便溺二陰之間者此其下雖熱而中則寒所謂失位之火也四曰陽亢乘陰而見於精血髓液之間者此其金水敗而鈐汞乾所謂陰虛之火也此外證之四也然證雖有四而本則惟二或在陰虛或在陽虛而盡之矣弟陰虛之火惟一曰金水敗者是也陽虛之火有二曰上中下者是也凡治此者若係陰虛火盛則治當壯水壯水之法只宜甘涼不宜辛熱若係陽虛發熱則治宜益火益火之法只宜溫熱大忌清涼弟溫熱之效速每於一二劑間便可奏功甘涼之力緩非多服不能見效也然清涼之藥終不宜多多則必損脾胃如不得已則易以甘平其應緩耳倘甘平未效則惟有甘溫一法斯堪實濟尚可望其成功否則生氣之機終非清涼所能致也此義最微不可不察

氣本屬陽陽氣不足則寒從中生寒從中生則陽無所存而浮散於外是卽虛火假熱之謂也而假寒之證其義亦然是以虛火實火亦總由中氣之虛實耳凡氣入於內而爲寒者有如嚴冬陽伏於下而陰凝於上故冰雪滿地而井泉溫暖也氣虛於內而爲熱者有如盛夏陰盛於中而陽浮於外故炎暑逼人而淵源清冷也天地間理原如此故不可見熱卽云熱見寒卽云寒而務察其寒熱之本

火有虛實故熱有假眞而察之之法總當以中氣爲之主而外證無足憑也故凡假熱之證本中寒也假寒之證本內熱也中寒者原是陰證內熱者原是陽證弟以惑者不明故妄以寒證爲眞熱熱證爲眞寒而不知內熱者當遠熱內寒者當遠寒內有可據本

皆眞病又何假之有

論五志之火

經曰天有四時五行以生長收藏以生寒暑燥濕氣人有五臟化五氣以生喜怒思憂恐是卽所謂五志也此五志之化由乎五臟而五臟之化由乎五行故在心爲喜心主火也在肝爲怒肝主木也在脾爲思脾主土也在肺爲憂肺主金也在腎爲恐腎主水也此五志各有分屬本不可以混言者也且人有此生卽有此志使無此志生亦何爲是生之與志本不能離亦不可離而人於食息之常就不以五志爲生亦就不以五志爲用而未聞以五志之動皆爲火也第或以用志失宜則未免有傷臟氣故在內經則但言五臟之傷各有所屬五氣之傷各有所病亦未聞以五志之傷皆云火也而五火之說乃始於劉河間矣五志所傷皆熱也丹溪述河間而衍之曰五志之動各有火起劉宗厚又述丹溪而衍之曰大怒則火起於肝醉飽則火起於胃房勞則火起於腎悲哀動中則火起於肺心爲主君白焚則死矣白二子之說行則似乎五行悉化而爲火理豈然乎余嘗察五志所傷之人但見其憔悴日增未見其俱爲熱病也卽因志動火者非日必無但傷氣者十之九動火者十之一又豈五志皆能動火乎而劉以怒動肝氣者最易傷脾脾傷者不可以言火也醉飽能助胃火胃强者固自無恙脾弱而致病者不可以言火也房勞不動腎火精去而陽亢者可以言火精去而氣亦去者不可以言火也外如五志之傷則無非傷氣敗陽之證尚可謂之火乎無火治火則無有不敗者矣

火爲熱病是固然矣然火得其正卽爲陽氣此火之不可無亦不可衰衰則陽氣之虛也火失其正是謂邪熱此火之不可有尤不可甚甚則眞陰傷敗也然陽以元氣言火以病氣言故凡病在元氣者不得以火論何也蓋人之元氣止於充足焉得有餘既非有餘則何以言火所謂無形者其化虛卽此是也惟病在形體者乃可以察火證蓋其不在氣卽在血所謂有形者其化實卽此是也故凡火之爲病其在外者必見於皮肉筋骨其在內者必見於臟腑九竅若於形質之間本無熱證可據而曰此火也此熱也則總屬莫須有之妄談也別如火邪悉具而猶有虛實之殊眞假之異其可不爲詳辯乎若果有火病則火性急烈然實火止隨形質余因謂之凡火又謂之邪火火之爲病病之標耳洗之滌之又何難哉惟虛火之病則本於元氣元氣既虛而再攻其火非梗卽刃矣是以諸病之殺人而惟火病爲最者正以凡火未必殺人而以虛作實則無不殺之矣不忍見也

凡五臟之火肺熱則鼻乾甚則鼻涕出肝熱則目腫濃心熱則言笑多脾熱則善饑善渴腎熱則小水熱痛凡此之類宜從清也

凡察火證必須察其虛實雖其元氣本虛然必虛中挾實者乃爲易治何以見之如或大便乾結或善饑多食或神氣精明或聲音强壯而脈見有力此皆虛中有實也俱可隨證清解之若或內外俱熱而反見溏泄或飲食少進或聲微氣短諸虛皆見而反不利溫補者此其胃氣已敗生意已窮非吉兆也

論治火

治實火諸法凡微熱之氣惟凉以和之宜徙薪飲四陰煎二陰煎或加減一陰煎黃芩芍藥湯黃芩清肺飲之類酌宜用之大熱之氣必寒以除之宜抽薪飲白虎湯太清飲黃連解毒湯玉泉散三補丸之類主之火甚而兼脹滿閉結實熱者宜凉膈散三黃丸大金花丸之類主之

凡火盛虛煩乾渴或有熱毒難解者宜用菜豆飲或雪梨漿間藥朝夕飲之退火解毒最速且無所傷誠妙法也鬱熱之火宜散而解之如外邪鬱伏而熱者宜正柴胡飲小柴胡湯或升陽散火湯之類主之若鬱熱在經而爲癮疹者宜連翹歸尾煎或芍藥葱薤煎或當歸葱薤煎之類主之或於本門求法治之此皆火鬱發之之謂也

虛火之與假熱其氣皆虛本若相類然陰陽偏勝亦有不同如陰虛生熱者此本不足以濟火也治當補陰其火乃息宜一陰煎左歸飲左歸丸六味地黃丸之類主之此所謂壯水之主也如寒極生熱而火不歸原卽陰盛隔陽假熱證也治宜溫補血氣其熱自退宜理陰煎右歸飲理中湯大補元煎六味回陽飲之類主之此所謂益火之源所謂溫能除大熱也

凡假熱之證以腎陰大虛則陽無所附而浮散於外故反多外熱此內眞寒外假熱也若非峻補眞陰何以復其元氣元氣不復則必由散而盡矣但外熱既甚多見口瘡舌裂喉乾咽痛煩渴喜冷等證而辛熱溫補之劑難以入口故薛立齋治韓州同之勞熱以加減八味丸料一斤內肉桂一兩煎五六椀用水浸冰冷與服此法最善余因效之嘗以崔氏八味丸料

或右歸飲用治陰虛假熱傷寒及勞熱煩渴等證服後頓退而虛寒悉見乃進溫補無不愈者此眞神妙法也實火宜瀉虛火宜補固其法也然虛中有實者治宜以補爲主而不得不兼乎清如加減一陰煎保陰煎天王補心丹升溪補陰丸之類是也若實中有虛者治宜以清爲主而酌兼乎補如清化飲徙薪飲大補陰丸之類是也凡此虛中之實實中之虛本無限則故不得謂熱者必無虛虛者必無熱但微虛者宜從微補若熱倍於虛而清之不及漸增無害也若虛倍於熱而清之太過則伐及元陽矣凡治火者不可不知此義

瀉火諸藥黃連梔子瀉心肝大腸之火山梔仁降火從小便出其性能屈曲下行石膏瀉腸胃之火陽明經有實熱者非此不可黃芩清脾肺大腸之火善除骨蒸夜熱生地麥門冬清肝肺凉血中之火天門冬瀉肺與大腸之火桑皮川貝母解上焦肺胃之火柴胡乾葛解肝脾諸經之鬱火龍膽草瀉肝腎膀胱之火槐花清肝腎大腸之火能解諸毒芍藥石斛清脾胃之火滑石利小腸膀胱之火天花粉清痰止渴解上焦之火連翹瀉諸經之浮火元參清上焦之浮火山豆根解咽喉之火膽星開心脾胃腑之痰火青黛蘆薈胡黃連瀉五臟之疳熱鬱火苦參瀉疳蝕之火木通下行瀉小腸之火澤瀉車前子利癰閉之火人中白清肝脾腎之陰火童便降陰中血分之浮火大黃朴硝瀉陽明諸經實熱之火人參黃芪白朮甘草除氣虛氣脫陽分散失之火熟地黃當歸枸杞山茱萸滋心腎不交陰分無根之火附子乾薑肉桂救元陽失位陰盛格陽之火凡此治火之法已若盡之然而不過言其筌蹄耳而神而通之原不可筆楮盡也

論命門火

水中之火乃先天眞一之氣藏於坎中此氣自下而上與後天胃氣相接而化此實生生之本也是以花萼之榮在根柢竈釜之用在柴薪使眞陽不發於淵源則總爲無根之火矣火而無根即病氣而非元氣也故易以雷在下而爲復可見火之標在上而火之本則在下且火知就燥性極畏寒若使命門陰勝則元陽畏避而龍火無藏身之地故致遊散不歸而爲煩熱格陽等病凡善治此者惟從其性但使陽和之氣直入坎中據其窟宅而招之誘之則同氣相求而虛陽無不歸原矣故曰甘溫除大熱正此之謂也奈何昧者不知此理多以陽虛作實熱不思溫養以火而但知寒凉可以滅火安望其尚留生意而不使之速斃耶此實醫家第一活人大義既從斯道不可不先明此理倘三焦有客熱邪火皆凡火耳固不得不除而除火何難是本非正氣火候之謂也學者於此當深明邪正二字則得治生之要矣

命門有陰虛以邪火之偏勝也邪火之偏勝緣眞水之不足也故其爲病則或爲煩渴或爲骨蒸或爲欬血吐血或爲淋濁遺泄世雖明是火證而本非邪熱實熱之比蓋實熱之火其來暴而必有感觸之故虛熱之火其來徐而必有積損之因此虛火實火之大有不同也凡治火者實熱之火可以寒勝可以水折所謂熱者寒之也虛熱之火不可以寒勝不可以水折所謂勞者溫之也蓋虛火因其無水只當補水以配火則陰陽得平而病自可愈若欲去火以復水則既虧之水未必可復而并火去之豈不陰陽兩敗乎且苦寒之物絕無升騰之生氣而欲其補虛無是理也故予之治此必以甘平之劑專補眞陰此雖未必即愈自可無害然後察其可乘或暫一清解或漸加溫潤必使生氣漸來庶乎脾可健則熱可退肺漸潤則嗽漸寧方是漸復之佳兆多有得生者若但知知藥爲補陰則愈敗其腎而致泄瀉食減必速其殆矣

論河間

劉河間原病式所列病機原出自內經至眞要大論蓋詳言五運六氣盛衰勝復之理而以病機一十九條總於篇末且曰有者求之無者求之盛者瀉之虛者補之令其調達而致和平是可見所言病機亦不過舉運氣之大綱而此中有無之求虛實之異最當深察總惟以和平爲貴也故五常政大論又詳言五運三氣之辯則火之平氣曰升明火之太過曰赫曦火之不及曰伏明此虛火實火之辯則有如冰炭之異而內經不偏不倚之道固已詳明若是奈河間不能通察本經全旨遂單採十九條中一百七十六字演爲二百七十七字不察虛實盛衰悉以實火言病著爲原病式以迄於今夫實火爲病固爲可畏以清凉去之本不難也虛火最忌寒凉若妄用之無不致死矧今人之虛火者多實火者少豈皆屬有餘之病顧可槩言爲火乎歷觀唐宋以前原未嘗偏僻若此繼自原病式出而丹溪得之定城遂目爲至寶因續著局方發揮及陽常有餘等論卽如東垣之明亦因之而曰火與元氣不兩立此後如王節齋戴原禮輩

則祖述相傳偏及海內凡今之醫流則無非劉朱之徒動輒言火莫可解救多致伐人生氣敗人元陽殺人於冥冥之中而莫之覺也誠可悲矣卽間有一二特達明知其非而惜人陽氣則必有引河間之說而羣吠之者矣何從辯哉玆病機爲後學之指南旣入其門則如夢不醒更可畏也醫道之壞莫此爲甚此誤謬之源不可不察

論丹溪

丹溪相火論曰五行各一其性惟火有二曰君火人火也曰相火天火也火內陰而外陽主乎動者也故凡動皆屬火天主生物故恆於動人有此生亦恆於動其所以恆於動者皆相火之所爲也故人自有知之後五志之火爲物所感不能不動謂之動者卽內經五火也相火易起五性厥陽之火相扇而妄動矣火起於妄變化莫測無時不有煎熬眞陰陰虛則病陰絕則死據丹溪此論則無非鬨揚火病而崇其補陰之說也第於此而淺視之則若或近理故易動人於此而深味之則意識皆幻大是誤人余請精繹其義用解後人之惑何如蓋自一元初肇兩儀繼之則動靜於斯乎見而陽主動陰主靜也自兩儀奠位而五行布之則氣質各有所主而火主熱水主寒也此兩儀動靜爲五行之先天先天者性道也五行寒熱爲五行之後天後天者變體也先後之理有可混言者有不可混言者如火本屬陽卽言火爲動若無不可也其不可混者以陽爲元氣之大主火爲病氣之變見而動乃陽之性道安得以性道爲病變而言凡動皆屬火也卽自天人論之則曰天行健豈天動卽火乎又曰君子以自彊不息豈人動卽火乎使天無此動則生機息人無此動則性命去又何可以火言動乎若謂之火則火必宜去而性亦可去乎若謂凡動皆屬火則豈必其不動而後可乎夫以陽作火詞若相似而理則大悖矣故在丹溪則曰陰虛則病陰絕則死余則曰陽虛則病陽脫則死此機微疑似中有毫釐千里之異臨岐者不可不詳察也或曰子言雖是第未達丹溪之意耳如曰五臟各有火五志激之其火隨起以致眞陰受傷陰絕則死者豈非因動生火乎予曰此或因情慾之思動火者止有一證如慾念不遂或縱慾太過致動相火而爲勞爲瘵者誠有之也此外如五志之動皆能生火則不然也夫所謂五志者喜怒憂思恐也經曰喜傷心怒傷肝思傷脾憂傷肺恐傷腎五臟旣受此傷則五火何由而起又曰喜則氣散怒則氣逆憂則氣閉思則氣結恐則氣下此五者之性爲物所感不能不動動則耗傷元氣元氣旣耗如此則火又何由而起故經曰五臟者主藏精者也不可傷傷則失守而陰虛陰虛則無氣無氣則死矣是可見臟不可傷氣亦不可傷未聞傷卽爲火也卽云爲火必有火證使無火證而但以動字敷衍其說其何異捉影爲形而天下事又何不可焉鹿其間乎且常見五志所傷之人傷極必生戰慄是蓋以元陽不固神氣失守而然倘遇河間爲之和則又必謂戰慄皆生於火矣孰是孰非其幾如此能不爲生民痛哉

丹溪局方發揮曰相火之外又有臟腑厥陽之火五志之動各有火起相火者此經所謂一水不勝二火之火出於天造厥陽者此經所謂一水不勝五火之火出於人欲氣之升也隨火炎上升而不降孰能禦之原經文五火之說乃解精微論中言厥病之目無所見也謂其陽井於上陰井於下陰陽不交所以爲厥厥者逆也由其陽逆於上則火不降陰逆於下則水不升水旣不升火又不降而目以一陰之精微不勝五臟之陽逆此單言厥逆之爲病也如此豈言火有五而水止一乎又按二火之說乃逆調論言有身寒之盛而反不戰慄者名爲骨痹謂其人腎氣素勝以水爲事則腎脂枯而髓不能滿故寒甚至骨也又以肝爲一陽心爲二陽二臟皆有伏火則一水不勝二火所以身雖寒而不凍慄此單言骨痹之爲病也如此又豈陽常有餘之謂乎若以五火二火盡可引爲火證則有如示從容論中有云二火不勝三水者又將何以解之而何獨不引爲言耶試以此問丹溪其將何以答乎

丹溪曰氣有餘便是火又曰五臟各有火五志激之其火隨起若諸寒爲病必須身犯寒氣口得寒物乃爲寒病非若諸火病自內作所以氣之病寒者十無一二予味丹溪此言不能不掩卷嘆息豈必氣之病寒者十無一二耶夫氣本屬陽陽實者固能熱陽虛者獨不能寒乎故經曰氣實者熱也氣虛者寒也又經曰血氣者喜溫而惡寒寒則泣不能流溫則消而去之則其義有可知矣且今人之氣實與氣虛者孰爲多寡則寒熱又可知矣然而何以證之如心氣虛則神有不明肺氣虛則節制有不行脾氣虛則食飲不能健肝氣虛則魂怯而不寧腎氣虛則陽道衰而

精少志屈胃氣虛則倉廩匱而病及諸經三焦虛則上中下俱失其職命門虛則精氣神總屬無根若此者莫非氣虛之類氣虛則陽虛陽虛則五內不煖而無寒生寒所以多陽衰羸敗之病若必待寒氣寒食而始爲寒證則將置此輩於何地夫病之所貴於醫者貴其能識生氣是誠醫家最大關係而丹溪全不之察故無怪其曰氣有餘便是火而余反之曰氣不足便是寒使其聞余之說尚不知以爲然否

升陽散火辯

凡治火之法有曰升陽散火者有曰滋陰降火者夫火一也而曰升曰降皆堪治火然升則從陽降則從陰而升降混用能無詩乎抑何者宜升何者宜降而有以辯乎此千古之疑竇亦千古之兩端而未聞有達之者夫火之爲病有發於陰者有發於陽者發於陰者火自內生者也發於陽者火自外致者也自內生者爲五內之火宜清宜降者也自外致者爲風熱之火宜散宜升者也今人凡是火證無分表裏必曰木火因氣動輒稱爲風熱多用升陽散火之法嗚呼此似近理孰得非之而不知至理所在無容混也夫風熱之義其說有二有因風而生熱者有因熱而生風者因風生熱者以風寒外閉而火鬱於中此外感陽分之火風爲本而火爲標也因熱生風者以熱極傷陰而火達於外此內傷陰分之火火爲本而風爲標也經曰治病必求其本可見外感之火當先治風風散而火自息宜升散不宜清降內生之火當先治火火滅而風自清宜清降不宜升散若反而爲之則外感之邪得清降而閉固愈甚內生之火得升散而燔燎何常此其內因外因自有脈證可詳辯也余閱方書所見頭目口齒咽喉臟腑陰火等證悉云風熱多以升降並用從逆兼施獨不思升者礙降降者礙升從者忌逆逆者忌從乎經曰高者抑之下者舉之寒者熱之熱者寒之又曰病生於內者先治其陰後治其陽反者益甚病生於陽者先治其外後治其內反者益甚此自不易之正理故余之立方處治宜抑者則直從乎降宜舉者則直從乎升所以見效速而絕無耽延之患亦不過見之眞而取之捷耳若今人之輕病致重重病致危而經年累月日深日甚以致不救者謂非兩端之誤之也明者於此最當辯之

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百五十七卷目錄

醫部彙考二百三十七

火門二

陳士鐸石室秘錄 火證治法　命門之火宜補不宜瀉　方　蔥赤散　安胃丸　千金地黃丸　門冬丸　清心丸　黃連清腦丸　麻砂涼腦丸　當歸龍膽瀉肝湯　四物湯　加減四物湯　加減逍遙散　加減小柴胡湯　加減補中益氣湯　加減八味丸　加減歸脾湯　加減六味丸　加減參苓白朮散　加減瀉心湯　加減大承氣湯　加減四君子湯　加減四物湯　加減平胃散　加減五苓散　加減天門冬飲子　加減龍膽瀉肝湯　加減地黃煎　加減大補陰丸　加減大黃䗪蟲丸　加減柴胡升麻湯　加減火鬱湯　本事方　神效丸　當歸龍膽瀉肝湯　瀉心湯　八正散　馮楽藥方　大金花丸　又方　碧雲丹　左歸飲　右歸飲　左歸丸　右歸丸　一陰煎　加減一陰煎　地黃飲子　加減補陰丸　清膈煎　玉女煎　安胃飲　太清飲　柴豉飲　玉泉散　瀉黃散　滋陰八味丸　化肝煎　清化飲

單方

鍼灸

導引

醫案

藝術典第二百五十七卷

醫部彙考二百三十七

火門二

石室秘錄 陳士鐸著

火證治法

瘦人多火人盡知之然而火之有餘水之不足也不補水以鎮陽光又安能去火以消其烈焰哉方用元參八兩生地四兩熟地天冬麥冬丹皮沙參各三兩地骨皮白芍各五兩陳皮五錢各爲末蜜爲丸加桑葉六兩亦爲末同搗爲丸每日白滾水送下五錢妙在元參去浮遊之火而又能調停五臟之陽各品之藥陰多於陽則陰氣勝於陽陽消又何必石膏知母之紛紛哉雖石膏知母原是去火神劑不可偏廢然而用之於火騰熱極之初可以救陰水之熬乾不可用之於火微熱退之後滅陽光之轉運此瘦人之治法如此

瘦人多火定一煎方用元參一兩麥冬天冬生地熟地白芍各三錢山茱萸白芥子各二錢丹皮二錢甘草北五味各五分水煎服此方皆滋陰之藥而又不凝滯於胃中瘦人常服必無火證之侵矣

引治者病在下而上引之病在上而下引之也如人虛火沸騰於咽喉口齒間用寒涼之藥入口稍快少頃又甚又用寒涼腹瀉肚痛而上熱益熾欲用熱藥凉飲而病人不信不肯輕治乃用外治之法引之而愈方用附子一箇爲末米醋調成膏藥貼在湧泉穴上少頃火氣衰又少頃而熱退變成冰凉世界然後六味地黃丸湯大劑與之則火不再沸騰矣蓋此火乃雷火也見水則愈酷烈也不見雷霆之震濃陰大雨之時愈加震動驚天轟地更作威勢一見太陽當空則雨歇聲消寂然不聞矣又不見冬令之天地耶嚴寒霜雪冰凍郊原雨雪霏霏陰風慘厲此天氣下行而地氣反上蓋下熱則上自寒也又不見夏日之天地乎酷日炎蒸暑隆火熱鑠木焚林燔湯沸水天氣上升地氣下降此上熱而下寒也人身虛火亦猶是也今既火騰於上則下身冰冷今以附子大熱之藥於湧泉引之者蓋湧泉雖是水穴水之中實有火氣存焉火性炎上而穴中正寒忽然得火則水自溫水溫則火自降同氣相求必歸於窮宅之中矣火既歸窮宅又何至沸騰於上哉此咽喉口齒之虛火忽然消亡有不知其然而然之妙此引法之巧者也

飽治者病在上焦則藥宜飽飯後食之也病在上焦者頭目上之病也用上清丸之類上清丸方世多不妥吾斟酌更定之凡治上焦之火俱可服蘇葉黃芩各二兩白芷蔓荊子各五錢桔梗麥冬天門冬各三兩半夏陳皮薄荷甘草柴胡各一兩各爲末水打成丸每服三錢飽食後服此方妙在清火而不傷中氣強弱人感中風邪上焦有風火者服之俱妙

抑治者抑之使不旺也或瀉其肺中之火或遏其心中之焰或止其胃中之氣或平其肝木之盛是也此四經最多火而最難治肺經之火散之則火愈甚抑之反勝於散之矣蓋肺金之氣實則成頑金頑金非火不煉然而肺乃嬌臟終不可以煉法治之故用抑之之法方用山豆根百部青黛黃芩桑白皮各一錢天花粉二錢水煎服此方專抑肺金之氣而又不傷氣則肺金有養自然安寧倘全以寒凉之藥降之則又不可蓋肺乃嬌臟可輕治而不可重施以輕清下降之味少抑其火則胃氣不升心火少斂肺金煅煉必成完器又何必用大散之藥哉

心中之焰非黃連不可遏徒用黃連而不用瀉木之品則火雖暫瀉而又旺方用黃連柴胡菖蒲半夏各一錢白芍三錢治之此方用瀉肝之藥多於瀉心母衰則子自弱必然之理設不用瀉木之藥而純用瀉心之黃連則黃連性燥轉動心火此所以心肝必須

同治也

胃中之氣有餘必且久變爲熱人以爲我能食令乃氣之有餘也我能消食乃胃之健旺也我能不畏天寒此腎之有餘也誰知胃氣之有餘本之腎水之不足一遇風寒襲之夏暑犯之非變爲消渴之證必成爲痿廢之人必須平日用大劑六味地黃丸吞服自然氣餒而火息胃平而熱除也無如世人不信自號曰强不肯多服又托言我不能吞丸藥下咽則吐不聽仁人之語因循不服及至大病則曰快與我用竹葉石膏湯晚矣今立一湯方用熟地五錢麥冬元參山茱萸山藥各三錢丹皮北五味各一錢天花粉八分水煎服此方乃平胃火之聖藥妙在補腎補肺補肝全不純去平胃中州安泰豈有阻滯抑鬱之理自然輓輸有路搬運無虞上不凌鑠肺金下不侵尅脾土旁不關害肝木一方之中衆美備臻又何患胃火之上騰哉至於胃火既旺或丸藥原有艱難之道世人不知予并發明之蓋人之胃雖是胃土主事其實必得腎水上滋則水道有路糧食搬運而無阻隔之虞今胃火既盛水僅可自救於腎宮又安能上升於咽喉口舌之間況丸藥又是硬物原非易得下咽此所以不肯服非天性不能服也如反胃之病食入反出非明驗歟無腎水之人無食以下喉猶然吐出蓋腎中無腎水以潤故耳彼無腎水冲上尚不能入於腎中況又有胃火之盛無腎水之潤者無怪乎到口難嚥也

肝木之盛抑之之法必須和解然和解之中而不用抑之之法則火愈甚木愈旺矣方用白芍五錢炒梔子三錢當歸二錢白芥柴胡甘草荊芥澤瀉各一錢水煎服此方用柴荊以散肝木之氣更妙用白芍梔子以清肝木之火火去而木衰此善於抑之者也

腎中之水有火則安無火則泛倘人過於入房則水去而火亦去久之水虛而火亦虛水無可藏之地則必上泛而爲痰矣治之法欲抑水之下降必先使火之下溫法當仍以補水之中而用大熱之藥使水足以制火而火足以生木則水火有相得之美也方用熟地三兩山茱萸茯苓各一兩北五味子一錢牛膝肉桂各三錢水煎服一劑而痰即下行二劑而痰消無跡矣蓋肉桂乃補腎中火之聖藥倘止用之以溫命門水亦可以下降然而不補其腎宮之水則腎宮匮乏水歸而房舍空虛難以存活仍然上泛故必用補水以補火也方中熟地山萸純是補水之藥而牛膝又是引下之絕品水有火之溫又有水之養又有引導之使然而無泛上之理也

火治者治火之有餘也火證甚多惟陽明一經最難治知治陽明之法則五臟之火各腑之火無難專治矣陽明本胃土也如何有火此火乃生於心包心包之火乃相火也君火失權則心包欺之以自逞其炎赫之勢是必以辛凉大寒之品大劑投之恐其快飲斯火得寒而少息熱得凉而略停然必添入健胃之藥始可奏功蓋胃火之沸騰終由於腎氣之不足去胃火必須補胃土然而徒補胃土而不去水溫之痰亦不得也方用石膏一兩或二兩或三兩看火勢之盛衰用石膏之多寡人參知母各三錢麥冬五錢甘草一錢糯米一合竹葉百片水煎服方則人參竹葉石膏湯也胃火之盛非此湯不能平還問其人必大渴飲水見其有汗如雨者始可放膽用之否則不可輕用蓋無汗而渴亦有似此證者不可不辯也此方純是降胃火之藥所以急救先天之腎水也此證一日不治即熬乾腎水而致不救故不得已用此霸道之藥也倘無汗而渴明是腎火有餘而腎水不足又烏可復用石膏湯以重傷其腎水乎然則又當何方以治之用熟地三兩山茱萸麥冬各二兩北五味三錢元參一兩此方乃治似白虎證而非胃火之熱者人更宜知之也其餘心火用黃連肝火用梔子肺火用黃芩前言悉之矣茲不再贅陽明之火雖起於心包實成於肝木之尅之也肝木旺則木中有火不特木來尅土而轉來助焰肝木之火半是雷火一發則震地轟天陽明得心包之火而沸騰又借肝木龍雷之火以震動如何可以止遏故輕則大渴重則發狂也予治此證往往白芍加至數兩先用石膏湯以去火隨加白芍以生木木平而火無以助焰自然胃火孤立無援又加麥冬以平肺金之氣則金有水潤不必取給於胃土而胃土可以自救況又有石膏知母之降火哉此狂之所以定而熱之所以除也方用石膏麥冬各一兩知母半夏各三錢甘草一錢竹葉一百片糯米一合先煎湯四椀又加白芍二兩同煎此方之妙不在石膏知母之降胃火妙在白芍之平肝木使木氣有養不來尅土并不使木鬱生火以助胃火也又妙在麥冬以清肺金使金中有水胃火難炎且去制肝無令尅土也

一方治各經之火梔子丹皮元參各三錢白芍五錢

甘草一錢水煎服心火加黃連一錢肺火加黃芩一錢胃火加石膏三錢腎火加知母黃檗各一錢大腸火加地楡一錢小腸火加麥冬天冬各三錢膀胱火加澤瀉三錢何以獨治肝經也蓋肝屬木木易生火故治火者首治肝肝火一散而諸經之火俱散所以加一味去火之藥即可去各經之火也

命門之火宜補不宜瀉

命門爲十二官之主內經已詳言之余再取而尚論者蓋命門之經雖彰而命門之旨尚晦也命門既爲十二經之主而所主者何主也人非火不能生活有此火而後十二經始得其生化之機命門者先天之火也此火無形而居於水之中天下有形之火水之所尅無形之火水之所生火尅於水者有形之水也火生於水者無形之水也然而無形之火偏能生無形之水故火不藏於火而轉藏於水也命門之火陽火也一陽陷於二陰之間者也人先生命門而後生心其可專重夫心乎心得命門而神明有主始可以應物肝得命門而謀慮膽得命門而決斷胃得命門而能受納脾得命門而能轉輸肺得命門而治節大腸得命門而傳導小腸得命門而布化腎得命門而作強三焦得命門而決瀆膀胱得命門而收藏無不借命門之火以溫養之也此火宜補而不宜瀉宜於水中以補火尤宜於火中以補水使火生於水而還以藏於水也倘日用寒涼以伐之則命門之火微又何能生養十二經耶此內經所謂主不明則十二官危非重言命門歟

方

導赤散錢氏

治小腸火熱

生地黃　木通　甘草各等分

右同爲末每服三錢水一盞入竹葉七片同煎至五分食後溫服一本用黃芩不用甘草

安神丸

治心肺火熱驚悸

麥冬焙　馬牙硝　白茯苓　山藥　寒水石研甘草各半兩　硃砂一兩研　龍腦一字研

右爲細末煉蜜爲丸如雞頭實大每服半丸沙糖水化下無時

千金地黃丸本事方

治心熱

黃連四兩爲末　生地黃半斤研取汁連查拌黃連末和勻曬乾用

右再爲細末煉蜜丸桐子大門冬湯下三十丸

門冬丸

治心經有熱

麥門冬去心一兩　黃連半兩

右爲細末煉蜜丸如桐子大食後熟水下三十丸

清心丸海藏方

治熱

黃蘗二兩生　麥冬　黃連各一兩　龍腦一錢

右爲末煉蜜丸如桐子大每服十九臨臥門冬湯下或薄荷湯亦得

黃連清腸丸東垣下同

治心肺間有熱及經中熱

麥門冬去心一兩　黃連去鬚五錢　黃芩三錢

右爲細末煉蜜丸如梧子大硃砂爲衣熟水送下無時

硃砂涼膈丸

治上焦虛熱肺脘咽膈有氣如烟搶上

黃連　山梔子各一兩　人參　茯苓各五錢

硃砂三錢另研　腦麝五分另研

右爲細末煉蜜丸如梧子大硃砂爲衣熟水送下五七丸日進三服食後

瀉黃散錢氏

治脾經火熱

藿香七錢　山梔一兩　石膏半兩　甘草二兩

防風四兩

右剉同蜜酒微炒香爲細末每服二錢水一盞煎清汁飲

調胃承氣湯仲景

泄實火

大黃去皮酒浸四兩　甘草炙二錢　芒硝半升

右三味㕮咀以水三升煮取一升去滓內芒硝更上火微煮令沸少少溫服

回金丸丹溪

一名左金丸伐肝經火亦審虛實用之

黃連六兩　吳茱萸一兩

右爲末粥丸

佐金丸

佐肺金以伐肝木之邪

片芩二兩　臭茉萸湯洗二次一兩
右爲末粥丸如桐子大每服二五十丸白术陳皮煎湯下
四順清凉飲子
一名清凉散治前證
大黃蒸　甘草炙　當歸酒洗　芍藥各等分
右㕮咀每服五錢用水一盞半薄荷十葉同煎至七分去滓溫服
桔梗湯 海藏
桔梗　連翹　山梔子　薄荷　黃芩　甘草各等分
右爲粗末竹葉白水煎溫服汗之熱服春倍加防風羌活夏倍加黃芩知母季夏淫雨倍加羌活秋加桂五錢冬加桂一兩亦可以意消息隨證加減而用之
人參瀉肺湯 東垣
治肺經積熱上喘欬嗽胃膈脹滿痰多大便澀
人參　黃芩　梔子仁　枳殼炒　薄荷　甘草
連翹　杏仁去皮尖　桑皮　大黃　桔梗各等分
爲末每服七錢水二盞煎八分食後通口服
龍腦飲子 和劑 下同
治蘊積邪熱咽喉腫痛眼赤口瘡心煩鼻衄上中二焦藥也
薑香葉二兩四錢　石膏四兩　甘草蜜炙六兩
梔子微炒十二兩　砂仁　苦蘆仁各三兩
右爲末每服二錢至三錢新汲水入蜜調下
龍腦鷄蘇丸
治上焦熱除煩解勞去肺熱咳衄血熱驚悸脾胃熱口乾吐血肝膽熱泣出口苦腎熱神志不定上而酒毒腸熱消渴下而血滯五淋血崩等疾
薄荷一斤　麥門冬去心二兩　甘草一兩半
生地六兩另末　黃連一兩　黃芪　新蒲黃炒
阿膠炒　人參各二兩　木通　銀柴胡各二兩剉同木通沸湯浸一日夜絞取汁
右爲細末好蜜二斤先煎一兩沸然後下生地黃末不住手攪時加木通柴胡汁慢火熬膏勿令火急膏成然後加前藥末和丸如豌豆大每服二十丸白湯下一方無黃連
盧勞虛煩梔子湯下
肺熱黃芩湯下
心熱悸動恍惚人參湯下
肝熱防風湯下
腎熱黃蘗湯下並食後臨臥服
洗心散
治心肺積熱風壅上攻頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼口苦脣焦咽喉腫痛痰涎壅滯涕唾稠粘小便赤澀大便祕滯
白术一兩半　麻黃　當歸　荊芥穗　芍藥
甘草　大黃各六兩
右爲細末每服二錢水一盞入生薑薄荷少許同煎至七分溫服
瀉心湯 錢氏
治實火
黃連一兩去鬚
右爲極細末每服一字至半錢一錢臨臥溫水調下海藏云易老單方瀉心湯出於此此乃實邪也實則瀉其子
升陽散火湯 東垣
治男子婦人四肢發熱肌熱筋痹熱骨髓中熱發困熱如燎捫之烙手此病多因血虛而得之或胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土久鬱則發之
生甘草二錢　防風二錢五分　炙甘草三錢
獨活　白芍　羌活　人參各五錢　柴胡八錢
右㕮咀每服秤半兩水三大盞煎至一盞去粗稍熱服忌寒凉之物及冷水月餘
地骨皮散
治渾身壯熱脈長而滑陽毒火熾發渴
地骨皮　茯苓各半兩　柴胡　黃芩　生地
知母各一兩　石膏二兩　羌活　麻黃各七錢半
右㕮咀每服一兩入薑煎有汗去羌活麻黃
天門冬散
治肺壅腦熱鼻乾大便祕澁
天門冬去心　桑皮　升麻　大黃　枳殼麩炒
甘草各八分　荊芥一錢
水二盞煎八分食後溫服
半夏湯
治膽熱精神不守熱泄
半夏麴　黃芩　軍薑炮　遠志去心　茯苓
生地黃　酸棗仁微炒研各八分　黍米一合
長流水二盞煎八分食後溫服
利膈散

治脾肺火熱盛煩上壅咽喉生瘡

鵝掌葉　荊芥穗　防風　桔梗　甘草　人參　牛蒡子各一兩

右爲末每服二錢不拘時沸湯點服咽痛口瘡甚加殭蠶一兩

地黃煎

治積熱

地黃汁四升三合　茯神　知母　葳蕤各四兩　苦蔓根　生薑汁　鮮地骨皮　生麥門冬汁　白蜜各二升　石膏八兩　竹瀝三合

右㕮咀以水一斗煮二升先煮諸藥取汁三升去滓下竹瀝地黃麥冬汁緩火煎四五沸下蜜薑汁微火煎至出六升初服四合日三服夜一服加至五七合四五月作散服之

三黃丸　東垣

治丈夫婦人三焦積熱上焦有熱攻衝眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡中焦有熱心膈煩躁飲食不美下焦有熱小便赤澁大便祕結五藏俱熱即生癰癤瘡瘍

黃連　黃芩　大黃各十兩

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服三十丸食後熟水吞下視藏腑虛實加減小兒積熱亦宜服一方用腦麝爲衣丸如豆大夜間噙化一二丸亦好

白虎湯　仲景

知母六兩　石膏一斤碎　甘草二兩　粳米六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

大黃散　河間

治上焦熱而煩不能睡臥

山梔仁　大黃　鬱金各半兩　甘草二錢半

右爲末每服五錢水煎溫服微利則已

柴胡升麻湯　東垣　下同

生甘草　炙甘草各二錢　柴胡　升麻　葛根　羌活　獨活　人參　白芍各半兩　防風二錢半

右㕮咀每服半兩水三大盞煎至一盞去滓稍熱服忌冷物冰水月餘

火鬱湯

升麻　葛根　白芍　柴胡根各一兩　炙甘草　防風各五錢

右咀咬每服三四錢水二大盞入連鬚葱白三寸煎去滓稍熱服

本事方

治大人小兒五藏積熱煩躁多渴唇裂喉閉目赤鼻頷結硬口舌生瘡

山梔仁　甘草　赤芍藥各一兩　大黃　升硝　連翹　薄荷葉　乾葛各二兩

右爲散每服二錢水一盞半竹葉七片蜜三匙同煎至七分去滓食後服

紫雪　和劑

療時氣毒遍內外煩熱不解口中生瘡狂易叫走瘴疫毒癘卒死溫瘧五尸五疰心腹諸疾疔刺切痛及解諸熱藥毒邪熱卒黃等并解蠱毒鬼魅野道熱毒又治小兒驚癇百病

黃金一百兩　石膏　寒水石　磁石　滑石

已上四味各三斤搗碎水一斛煮至四斗去滓入下項

犀角屑　羚羊角屑　青木香搗碎　沉香搗碎各五兩　元參洗焙搗碎　升麻各一斤　甘草剉炒八兩　丁香一兩搗碎

已上八味入前藥汁中再煮取一斗五升去滓入下項

硝石四升如鬭芒硝亦得每升重七兩七錢半

朴硝精者十斤

已上二味入前藥汁中微火上煎柳木篦攪不住手候有七升投在水盆中半日欲凝入下項

麝香當門子一兩二錢半研　硃砂飛研三兩

已上二味入前藥中攪調令勻寒之二日右件藥成霜雪紫色每服一錢或二錢用冷水調下大人小兒以意加減食後服

神芎丸　河間　下同

一名顯仁丸治一切火熱

大黃　黃芩各二兩　牽牛　滑石各四兩

右爲細末滴水爲丸如小豆大溫水下十丸每服加十丸以利爲度日三服冷水下亦得或煉蜜丸愈佳

當歸龍薈湯

治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸筋惕搖搐神志不寧榮衛壅滯頭目昏眩肌肉瞤瘈胃腸痞塞咽嗌不利腸胃燥澁小便澀閉筋脈拘急肢體痿弱暗風瘛病

當歸焙　龍膽草　大梔子　黃連　黃蘗

黃芩各一兩　大黃　蘆薈　青黛各半兩
木香一分　麝香半錢別研
右爲末煉蜜和丸如小豆大小兒如麻子大生薑
湯下每服二十丸忌發熱諸物兼服防風通聖散

瀉心湯

治風熱壅盛
大黃　當歸　白芍藥　荊芥穗　麻黃去節
甘草各一錢半　白朮三錢半
右作一服水二鍾生薑三片薄荷少許煎至一鍾
去滓不拘時溫服

八正散

治火熱壅盛小便祕塞
大黃　瞿麥　萹蓄　車前子　木通　山梔子
生甘草各一錢　滑石二錢
右作一服水二鍾燈心二十莖煎至一鍾不拘時
溫服加木香一錢尤佳

芍藥蘗皮丸

治火盛
芍藥　黃蘗　丹皮各一兩　當歸　黃連各半兩
右爲末滴水爲丸如梧桐子大每服三十丸熟水
下食前

大金花丸

治火熱壅盛
黃連　黃蘗　黃芩　大黃各等分
右爲末滴水爲丸如梧桐子大每服三十丸新水
下加梔子減大黃名梔子金花丸

又方

治心經蓄熱夏至則甚
黃連二兩　木通一兩半
右爲末用生薑汁煑糊爲丸如梧桐子大每服三
十丸食後用燈心湯下日三服

碧雪

治一切積熱咽喉口舌生瘡心中煩躁致咽閉壅
塞及天行時熱發強昏憒
芒硝　砂硝　硝石　馬牙硝　青黛　石膏
寒水石水研飛　甘草各等分
右將甘草煎湯二升去滓即入諸藥再煎用柳木
棍不住手攪令消鎔得所却入青黛和勻傾入砂
盆內候冷結凝成霜研爲細末每用少許噙化津
嚥不拘時候如覺喉壅閉塞不能吞物者即以小
竹筒吹藥入喉中即愈

妙功藏用丸

治熱甚嘔噦不食痿弱難運血溢血洩澀大小便
閟不通或泄利三焦壅滯傳化失常並宜服之
大黃　黃芩　黃連各半兩　川芎　黑牽牛各一
兩　官桂去皮三分　防風一分　滑石　木香各
二分
右爲末滴水爲丸如小豆大每服二十丸或三十
丸生薑湯下日三服溫水亦得

左歸飲（景岳全書下同）

此壯水之劑也凡命門之陰衰陽勝者宜此方加
減主之
熟地二三錢或至一二兩　炙甘草一錢　山藥
枸杞各二錢　茯苓錢半　山萸一二錢（畏瀉者勿用）
水二鍾煎七分食遠服
如肺熱而煩者加麥冬二錢
心熱而躁者加元參二錢
脾熱而饑者加芍藥二錢
腎熱骨蒸多汗者加地骨皮二錢
血熱妄動者加生地二三錢
陰虛不寧者加女貞子二錢上實下虛者加牛膝
二錢以導之

右歸飲

此益火之劑也凡命門之陽衰陰勝者宜此方加
減以主之治陰勝格陽眞寒假熱等證宜加澤瀉
二錢煎成用凉水浸冷服之尤妙
熟地（用法如前）　山藥炒　山茱萸各一錢　枸杞
杜仲薑製各二錢　炙甘草　肉桂各一二錢
製附子一二三錢
水二鍾煎七分食遠溫服

左歸丸

治眞陰腎水不足眼花耳聾口燥咽乾津液枯涸
等證
熟地八兩　山藥炒　枸杞　山萸　菟絲子製
鹿角膠敲碎炒珠　龜板膠敲碎炒珠各四兩
牛膝酒洗蒸熟三兩（楊濟名勿用）
右先將熟地蒸爛杵膏加煉蜜丸桐子大每食前
用滾湯或淡鹽湯送下百餘丸
如眞陰失守虛火炎上者宜用純陰至靜之劑於
本方去枸杞鹿膠加女貞子麥冬各三兩
如火鑠肺金乾枯多嗽者加百合三兩

如夜熱骨蒸加地骨皮三兩

一陰煎

此治水虧火虛之劑故曰一陰凡腎水眞陰虛損而脈證多陽火發熱及陰虛動血等證

甘草一錢　熟地三五錢　生地　芍藥　麥冬　丹參各二錢　牛膝一錢半

水二鍾煎七分食遠溫服

如火盛煩躁者入眞龜膠二三錢化服

如汗多煩躁者加五味子十粒

如見微火者加女貞子一二錢

如虛火上浮或吐血或衄血不止者加澤瀉一二錢茜根二錢或加川續斷以澀之亦妙

加減一陰煎

治證如前而火之甚者宜用此方

生地　芍藥　麥冬各二錢　熟地三五錢

炙甘草五七分　知母　地骨皮各一錢

水二鍾煎服

如煩躁熱甚便結者加石膏二三錢

如小水熱澀者加梔子一二錢

如火浮於上者加澤瀉一二錢或黃芩一錢

抽薪飲

治諸凡火熾盛而不宜補者

黃芩　石斛　木通　梔子炒　黃蘗各一二錢

枳殼　澤瀉各錢半　細甘草三分

水一鍾半煎七分食遠溫服內熱甚者冷服更佳

如熱在經絡肌膚者加連翹天花粉以解之

熱在血分大小腸者加槐蕊黃連以清之

熱在陽明頭面或煩躁便實者加生石膏以降之

熱在下焦小水痛澀者加草龍膽車前以利之

熱在陰分津液不足者加門冬生地芍藥之類以滋之

熱在腸胃便結者加大黃芒硝以通之

徙薪飲

治三焦火一切內熱漸覺而未甚者先宜清以此劑其甚者宜抽薪飲

陳皮八分　黃芩二錢　麥冬　芍藥　黃蘗　茯苓　丹皮各一錢半

水一鍾半煎七分食遠溫服

清膈煎

治痰因火動氣壅喘滿內熱煩渴等證

陳皮錢半　貝母酸破二三錢　膽星一二錢

海石　木通各二錢　白芥子五七分

水一鍾半煎七分溫服

如火盛痰不降者加童便一小鍾

如熱及下焦小水不利者加梔子一錢半

如熱在上焦頭面紅赤煩渴喜冷者加生石膏二三錢

如痰火上壅而小便不利者加澤瀉一二錢

如痰火閉結大便不通而氣脹滿者加大黃數錢或礬硝一二錢酌宜用之

玉女煎

治水虧火盛六脈浮洪滑大少陰不足陽明有餘煩熱乾渴頭痛牙疼失血等證如神若大便溏泄者乃非所宜

生石膏三五錢　熟地三五錢或一兩　知母　牛膝各錢半　麥冬二錢

水一鍾半煎七分或冷服

如火之極盛者加梔子地骨皮之屬亦可

安胃飲

治胃火上衝呃逆不止

陳皮　山楂　麥芽　木通　澤瀉　黃芩　石斛

水一鍾半煎七分食遠服脈滑實者加石膏

太清飲

治胃火煩熱發斑嘔吐等證可與白虎湯出入酌用

知母　石斛　木通各錢半　生石膏五七錢

水一鍾半煎七分溫服或冷服或加麥門冬

葉豆飲

凡熱毒勞熱諸火極熱不能退者用此最妙

葉豆不拘多寡覓湯煮糜爛

右入鹽少許或蜜亦可待冰冷或厚或稀或湯任意飲食之日或三四次不拘此物性非苦寒不傷脾胃且善於解毒除煩大利小水乃淺易中之最佳最捷者也若火盛口乾不宜厚味但略煮半熟清湯冷飲之尤善除煩清火

玉泉煎

一名一六甘露飲治陽明內熱煩渴頭痛二便祕結溫疫斑黃及熱痰喘嗽等證功倍益元散

生石膏六兩　粉甘草一兩

右爲極細末每服一二三錢新汲水或熱湯或人參湯調下加硃砂三錢亦妙

雪梨漿

解煩熱除陰火此生津止渴之妙劑也

雪梨用清香甘美而大者削去皮

別用大椀盛清冷甘泉將梨薄切浸於水中少頃

水必甘美但頻飲其水不食其查退陰火極速也

滋陰八味丸

治陰虛火盛下焦濕熱等證若變丸爲湯卽名滋陰八味丸

熟地八兩蒸搗　山藥　山萸肉各四兩　丹皮

茯苓　黃蘗鹽水炒　知母鹽水炒　澤瀉各三兩

右加煉蜜搗丸梧桐子大或空心或午前用滾白水或淡鹽湯送下百餘丸

化肝煎

治怒氣傷肝因而氣逆動火致爲煩熱脅痛脹滿動血等證

土貝母二錢　青皮　陳皮　芍藥各二錢

丹皮　梔子炒　澤瀉各錢半

水鍾半煎八分食遠溫服火盛加黃芩一二錢

清化飲

治血熱妄行陰虧諸火不清等證

芍藥　麥冬各二錢　丹皮　茯苓　黃芩

生地各二三錢　石斛一錢

水一鍾半煎七分食遠溫服

如覺骨蒸多汗者加地骨皮一錢半

熱甚而渴或頭痛者加石膏一二三錢

下熱便溫者加木通一二錢或黃蘗梔子皆可隨證治之

單方

虛熱作渴桃膠如彈丸大含之佳（外臺下同）

大熱心悶槐子燒末酒服方寸匕

煩躁熱渴久不止葛根半兩水煎服（聖惠方）

老人風熱內熱目赤頭痛視不見物石膏三兩竹葉五十片沙糖一兩粳米三合水三大盞煎石膏竹葉去查取二盞煮粥入糖食（摩老方）

風熱攻手指赤腫痛木甚則攻肩背兩膝遇暑熱則大便秘牛蒡子三兩新豆豉炒羌活各一兩爲末每服二錢白湯下（本事方）

膈上煩熱多渴宜利九竅滑石二兩搗水三大盞煎二盞去查入粳米煮粥食（聖惠方）

乳石發動煩熱躁渴滑石粉半兩水一盞絞白汁頻服（聖惠方）

三焦積熱元參黃連大黃各一兩爲末煉蜜丸梧子大每服三四十丸白湯下小兒丸藥米大（丹溪方）

鍼灸

素問曰肝熱病者小便先黃腹痛多臥身熱熱爭則狂言及驚脅滿痛手足躁不得安臥庚辛甚甲乙大汗氣逆則庚辛死刺足厥陰少陽其逆則頭痛員員脈引衝頭也

心熱病者先不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩悶善嘔頭痛面赤無汗壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死刺手少陰太陽

脾熱病者先頭重頰痛煩心顏青欲嘔身熱熱爭則腰痛不可用俛仰腹滿泄兩頷痛甲乙甚戊己大汗氣逆則甲乙死刺足太陰陽明

肺熱病者先渐然厥起毫毛惡風寒舌上黃身熱熱爭則喘欬痛走胷膺背不得太息頭痛不堪汗出而寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死刺手太陰陽明出血如大豆立已

腎熱病者先腰痛脈痠苦渴數飲身熱熱爭則項痛而強脈寒且疲足下熱不欲言其逆則項痛員員瀝瀝然戊己甚壬癸大汗氣逆則戊己死刺足少陰太陽諸汗者至其所勝日汗出也

肝熱病者左頰先赤心熱病者顏先赤脾熱病者鼻先赤肺熱病者右頰先赤腎熱病者頤先赤病雖未發見赤色者刺之名曰治未病熱病從部所起者至期而已其刺之反者三周而已事逆則死諸當汗者至其所勝日汗大出也

諸治熱病以飲之寒水乃刺之必寒衣之居止寒處身寒而止也

熱病先胃脅痛手足躁刺足少陽補足太陰病甚者爲五十九刺

熱病始於臂痛者刺手陽明太陰而汗出止

熱病始於頭首者刺項太陽而汗出止

熱病始於足脛者刺足陽明而汗出止

熱病身先重骨痛耳鳴好瞑刺足少陰病甚爲五十九刺

熱病先眩冒而熱胃脅滿刺足少陰少陽

太陽之脈色榮顴骨熱病也榮未交曰今且得汗待時而已與厥陰脈爭見者死期不過三日其熱內連

腎少陽之脈色也
少陽之脈色榮煩前熱病也榮未交曰今且得汗待時而已與少陰脈爭見者死期不過三日
熱病氣穴三椎下間主胃中熱四椎下間主高中熱五椎下間主肝熱六椎下間主脾熱七椎下間主腎熱
榮在骶也項上三椎陷者中也
頰下逆顴爲大骨下牙車爲腹滿顴後爲脅痛頰上者高上也
古今醫統曰兩手大熱爲骨厥如在火中灸涌泉穴五壯立愈

導引

保生祕要曰諸痛痒瘡皆屬心火常呵以洩其火吸以和其心諸心切勿食穢氣觸我靈夏至夜半後地氣一陰生大熱勿食冷受寒霍亂侵更忌房中事元炁離命門大抵甚暑天善於養心則無秋患時當飲六一澄心湯豆蔻香薷水飽醉勿頂風前愼此則無患矣
手足火燒患處推散想水洗之

醫案

儒門事親曰一叟年六十值徭役煩擾而暴發狂口鼻覺如蟲行兩手爬搔數年不已數人診其兩手脈皆洪大如絚繩斷之曰口爲飛門胃爲賁門曰口者胃之上源也鼻者足陽明經起於鼻交頞之中旁約太陽下循鼻柱交人中環脣下交承漿故其病如是夫徭役煩擾便爲火化火乘陽明經故發狂故經言陽明之病登高而歌棄衣而走罵詈不避親疎又況肝主謀膽主決徭役迫遽則財不能支則肝屢謀而膽屢不能決屈無所伸怒無所泄心火熾薄遂乘陽明經然胃本屬土而肝屬木賡爲相火火隨木氣而入胃故暴發狂乃命置燠室中涌而汗出如此三次內經曰木鬱則達之火鬱則發之是也又以調胃承氣湯半斤用水五升煎半沸分作三服大下二十行血水與粉水相雜而下數升取之乃康以通聖散調其後矣
麻先生婁當七月間病臟腑滑泄以去濕降火之藥治之稍愈後腹脹及乳痛狀如吹乳頭重壯熱面如渥丹寒熱往來咳乾嘔逆胃脘痛不能轉側耳鳴食不可下又復瀉余欲瀉其火臟腑已滑數日矣欲以溫劑止利又禁上焦已熱實不得其法使人就諸葛寺禮請戴人戴人未至因檢劉河間方惟益元散正對此證能降火解表止渴利小溲定利安神以青黛薄荷末調二升置之枕右使作數次服之夜半遍身出冷汗如洗元覺足冷如冰至此足大煖頭頓輕肌凉痛減嘔定痢止及戴人至余告之已解戴人曰益元固宜此是少陽證也能使人寒熱徧劇他經縱有寒熱亦不至甚既熱而有痢不欲再下何不以黃連解毒湯服之乃令診脈戴人曰娘子痛來心常欲慟哭爲快否婦曰實欲如此余亦不知所謂戴人曰少陽相火凌爍肺金金受屈制無所投告肺主悲但欲慟哭而爲快也麻先生曰余家諸親無不敬服脈初洪數有力自服益元散後已平又聞戴人之言始以當歸芍藥以解毒湯中數味服之大瘥矣
李民範目常赤至戊子年火運君火司天其年病目者往往暴盲遷火炎烈故也民範是年目大發遂遇戴人以瓜蒂散涌之赤立消不數日又大發其病之來也先以左目內眥赤發牽睛狀如鋪麻左之右次銳眥發亦左之右赤貫瞳子再涌之又退凡五次變亦五次皆涌又刺其手中出血及頭上鼻中皆出血上下中外皆奪方能戢退然不敢觀書及見日張云當候秋凉再攻則愈火方旺而在皮膚雖攻其裏無益秋凉則熱漸入裏方可攻也惟宜暗處閉目以養其神水暗與靜爲水明與動爲火所以不宜見日也蓋民範因初愈後貪冒暑出門故痛連發不愈如此涌泄之後不可常攻使服鼠黏子以退腎
戴人之次子自出妻之後日漸羸瘦語如聲中出此病在中也常撚第三指失笑此心火也約半載日飲冰雪更服凉劑戴人曰惡雪則愈矣其母懼其大寒戴人罵曰汝親也吾用藥如鼓之應俘尚惡凉藥宜乎世俗之誘我也至七月厭冰不飲病日解矣
趙平尚家一男子年二十餘歲病口中氣出臭如發爛雖親戚莫肯與對語戴人曰肺金主腥金爲火所煉火主焦臭故如是也久則成腐腐者腎也此熱極

則反衆水化也病在上宜涌之先以茶調散涌而去其七分夜用舟車九濟川散下五七行比旦而臭斷鳴呼人有病口臭而終其老者世訛以爲肺系偏而與胃相通故臭此妄論也

薛氏醫按曰余素性愛坐觀書久則倦怠必服補中益氣加麥冬五味酒炒黑黃蘗少許方覺精神清爽否則夜間少寐足內酸熱若再良久不寐腿內亦然且兼腿內筋似有抽縮意致兩腿左右頻移展轉不安必至倦極方寐此勞傷元氣陰火乘虛下注丁酉五十一歲齒縫中有如物塞作脹不安甚則口吞如有瘡然日晡益甚若睡良久或服前藥始安至辛丑時五十有五晝間齒縫中作脹服補中益氣一劑夜間得寐至壬寅有內艱之變日間雖服前藥夜間齒縫亦脹每至午前諸齒并牀體方得稍健午後仍脹觀此可知血氣日衰治法不同

大尹祝支山因怒頭運時或寒熱日晡熱甚此肝火筋攣氣虛頭運用八珍加柴胡山梔牡丹皮二十餘劑而愈

職坊王用之喘嗽作渴面赤鼻乾余以爲脾肺有熱用二陳加芩連山梔桔梗麥門而愈

尚寶劉毅齋怒則太陽作痛用小柴胡加茯苓山梔以清肝火更用六味丸以生腎水後不再發

大司馬許南谷在南銀台時因勞發熱小便自遺或時不利余作肝火陰挺不能約制午前用補中益氣加山藥黃蘗知母午後服地黃丸月餘諸證悉退

寓意草曰吳添官得腹痛之病徹夜叫喊不絕小水全無以茶連湯加元胡索投之始安又因傷食復反病至二十餘日肌肉瘦削眼胞下陷纔得略寧適遭家難證變壯熱目紅腮腫全似外感有餘之候余知其爲激動眞火上焚令服六味地黃加知蘗三十餘劑其火始退退後遍身瘡癤黃腫腹中急欲得食不能少耐片頃整日哭煩余爲勉慰其母曰旬日後腹稍充氣稍固卽不哭煩矣服二冬膏而全瘳此極難辯治之證竟得相保不失快哉

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百五十八卷目錄

醫部彙考二百三十八

痰門一

黃帝素問 至眞要大論 五常政大論 六元正紀大論 氣交變大論
靈樞經 論疾診尺篇
張機金匱要略 痰飲
孫思邈千金方 痰論
朱肱活人書 痰飲
嚴用和濟生方 痰飲
劉完素六書 痰飲
張從政儒門事親 飲當去水溫補轉劇論 痰病吐法
朱震亨心法 痰病
格致餘論 痰病似崇論
平治會萃 痰病吐法
虞搏醫學正傳 痰飲論
戴思恭證治要訣 停飲伏痰
樓英醫學綱目 痰飲
王綸明醫雜著 老痰
李梴醫學入門 痰分新久 百病兼痰 辨色 火熱爲因 食酒爲因 痰飲有五 虛證

藝術典第二百五十八卷

醫部彙考二百三十八

痰門一

黃帝素問

至眞要大論

太陰在泉濕淫所勝民病飲積心痛

註 太陰在泉辰戌歲飲積心痛寒濕上乘也

太陰之勝獨勝則濕氣內鬱飲發於中胕腫於上

太陰之復濕變乃舉飲發於中

註 此火土相合而淫於歲半以前獨勝者陰濕之氣復勝於歲半以後濕氣在中故內鬱而迫於下焦飲發於中胕腫於上者水邪之從下而中中而上也復者謂受所勝之氣勝制鬱極而復發

五常政大論

太陽司天濕氣變物水飲內稽

註 太陽司天則太陰濕土在泉故生水濕之病

六元正紀大論

太陰所至爲積飲否隔

註 此春病之常也

太陰所至爲稽滿

註 此夏病之常也

少陰司天之政四之氣民病飲發

註 感濕熱之氣故飲發

土鬱之發民病飲發注下

註 皆感濕土之氣而發

氣交變大論

歲土太過雨濕流行腎水受邪甚則飲發中滿食減

註 在地爲土在天爲濕故諸甲之歲土運太過雨濕流行飲者脾氣不能轉輸而爲痰飲水飲也中滿食減土虛而不能主化也此淫太甚則反虛其本位而自傷故於四季月之十八日土氣得位之時而反變生此病也

靈樞經

論疾診尺篇

尺膚粗如枯魚之鱗者水洗飲也

註 如枯魚之鱗者皮膚起寒粟也寒者水之氣此水邪洗飲於內故寒色見於外也

漢張機金匱要略

痰飲

問曰夫飲有四何謂也師曰有痰飲有懸飲有溢飲有支飲

問曰四飲何以爲異師曰其人素盛今瘦水走腸間瀝瀝有聲謂之痰飲飲後水流在脅下攻唾引痛謂之懸飲飲水流行歸於四肢當汗出而不汗出身體疼重謂之溢飲欬逆倚息氣短不得臥其形如腫謂之支飲

水在心心下堅築短氣惡水不欲飲水在肺吐涎沫欲飲水水在脾少氣身重水在肝脅下支滿嘔而痛水在腎心下悸

夫心下有留飲其人背寒冷如掌大

留飲者脅下痛引缺盆欬嗽則輒已

胷中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛脈沉者有留飲

膈上病痰滿喘咳吐發則寒熱背痛腰疼目泣自出

其人振振身瞤劇必有伏飲
夫病人飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣脈雙弦者寒也皆大下後苦虛脈偏弦者飲也
肺飲不弦但苦喘短氣
支飲亦喘而不能臥加短氣其脈平也
病痰飲者當以溫藥和之
心下有痰飲胷脅支滿目眩苓桂朮甘湯主之
夫短氣有微飲當從小便去之苓桂朮甘湯主之腎氣丸亦主之
病者脈伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此爲留飲欲去故也甘遂半夏湯主之
脈浮而細滑傷飲
脈弦數有寒飲冬夏難治
脈沉而弦者懸飲內痛
病懸飲者十棗湯主之
病溢飲者當發其汗大青龍湯主之小青龍湯亦主之
膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脈沉緊得之數十日醫吐下之不愈朮防己湯主之虛者卽愈實者三日復發復與不愈者宜朮防己湯去石膏加茯苓芒硝湯主之
心下有支飲其人苦冒眩澤瀉湯主之
支飲胷滿者厚朴大黃湯主之
支飲不得息葶藶大棗瀉肺湯主之
嘔家本渴渴者爲欲解今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之
腹滿口舌乾燥此腸間有水氣己椒藶黃圓主之
卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者半夏加茯苓湯主之
假令瘦人臍下有悸吐涎沫而癲眩此水也五苓散主之
欬家其脈弦爲有水十棗湯主之
夫有支飲家欬煩胷中痛者不卒死至一百日或一歲宜十棗湯
久欬數歲其脈弱者可治實大數者死其脈虛者必苦冒其人本有支飲在胷中故也治屬飲家
先嘔却渴者此爲欲解先渴却嘔者爲水停心下此屬飲家嘔家本渴今反不渴者以心下有支飲故也此屬支飲
胡桃不可多食令人動痰飲
唐孫思邈千金方

痰論

凡心下有水者築築而悸短氣而恐其人眩而癲先寒卽爲虛先熱卽爲實故水在於心其人心下堅築築短氣惡水而不欲飲水在於肺其人吐涎沫欲飲水水在於脾其人少氣身體盡重水在於肝脅支滿嚏而痛水在於腎心下悸
夫病人卒飲水多必暴喘凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣脈雙弦者寒也皆大下後苦虛耳脈偏弦者飲也肺飲不弦但苦喘短氣支飲亦喘而不能眠加短氣其脈平也留飲形不發作無熱脈微煩滿不能食脈沉滑者留飲病病有留飲者脅下痛引缺盆嗽轉甚其人欬而不得臥引項上痛欬者如小兒瘛瘲狀夫胷中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛其脈沉者有留飲者也心下有留飲其人背寒冷大如手病人肩息上引此皆有溢飲在胷中久者缺盆滿馬刀腫有劇時此爲氣飲所致也膈上之病滿喘欬吐發則寒熱背痛惡寒目泣自出其人振振身瞤劇必有伏飲病人一臂不隨時復轉移在一臂其脈沉細此非風也必有飲在上焦其脈虛者爲微勞榮衛氣不周故也冬自瘥
十棗湯治病懸飲者若下後不可與也凡上氣汗出而欬者此爲飲也
小青龍湯病溢飲者當發其汗范汪用大青龍湯
宋朱肱活人書

痰飲

中脘有痰亦令人增寒發熱惡風自汗胷膈痞塞有類傷寒但頭不痛項不强爲異耳余常見濕痰鬱於項背或麻或强脈浮滑但不浮緊耳
嚴用和濟生方

痰飲

飲凡有六卽懸飲溢飲支飲痰飲留飲伏飲巢氏載之詳矣龐安常云人身無倒上之痰天下無逆流之水誠哉斯言以此思之人之氣道貴乎順順則津液流通決無痰飲之患調攝失宜氣道閉塞水飲停於胷腑結而成痰其爲病也證狀非一爲喘爲欬爲嘔爲泄爲眩運心嘈怔忡爲悁懮寒熱疼痛爲腫滿攣躃爲癃閉痞隔未有不由痰飲之所致也診其脈偏弦爲飲浮而滑亦爲飲也觀夫治飲之法或下或汗或溫或利此固定法愚者之見溫利之差可以無害

汗下之錯爲病不淺矣不若順氣爲先分導次之氣順則津液流通痰飲運下自小便中出有病喜吐痰唾服八味丸而作效者亦有意焉王叔和云腎寒多唾益腎爲水之官腎能攝水腎氣温和則水液運下腎氣虛寒則邪水溢上其間用山茱萸山藥輩取其補附于肉桂取其温茯苓澤瀉取其利理亦當矣臨病之際又加詳審焉

金劉完素六書

積飲

積飲留飲積蓄而不散也水得燥則消散得濕則不消以爲積飲也土濕主否故也

酒性大熱而引飲冷冷與熱凝於胃中不散而成濕故痰作矣甚者宜吐之吐後服五苓甘露勝濕去痰之劑

元張從政儒門事親

飲當去水温補轉劇論

留飲止證也不過蓄水而已王氏脈經中派之爲四痰飲懸飲支飲溢飲千金方又派之爲五皆觀病之形狀而定名也今予皆不論此論飲之所得其來有五有憤懣而得之者有困乏而得之者有思慮而得之者有痛飲而得之者有熱時傷冷而得之者飲證雖多無出於此夫憤懣而不得伸則肝氣乘脾脾氣不化故爲留飲肝主慮久慮而不決則飲氣不行脾主思久思而不已則脾結故亦爲留飲人因勞役遠來乘困飲水脾胃力衰因而嗜臥不能布散於脈亦爲留飲人飲酒過多腸胃已滿又復增之脾經不及滲泄久久如斯亦爲留飲因隆暑津液焦涸喜飲寒水本欲止渴乘快過多逆而不動亦爲留飲人若病飲者豈能出此五者之外乎夫水者陰物也但積水則生濕停酒則生燥久則成痰在左脅者同肥氣在右脅者同息賁上入肺則多嗽下入大腸則爲瀉入腎則爲涌水濯濯如囊裹漿上下無所故在太陽則爲支飲皆由氣逆而得之故濕在上者目黃面浮在下者股膝腫厥在中者支滿痞隔痰逆在陽不去者久則化氣在陰不去者久則成形今之用方者例言飲爲寒積皆用温熱之劑以補之燥之夫寒飲在中反以熱藥從上投之爲寒所拒水濕未除反增心火火既不降水反下注其上焦枯其下寒慄內經曰出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危詎不信夫況乎留飲下無補法氣方隔塞補則轉增豈知內經所謂留者攻之何後人不師古之甚也且以白术參苓飲者服之尚加閉塞況燔鍼艾火其痞可知前人處五飲丸三十餘味其間有礬石巴豆附子烏頭雖是下攻終同燥熱雖亦有寒藥相參力孤無援故今代劉河間依仲景十棗湯製三花神祐丸而加大黃牽牛新得之疾下三五十丸氣流飲去昔有病此者數十年不愈予診之左手脈三部皆微而小右手脈三部皆滑而大微小爲寒滑大爲燥余以瓜蒂散湧其寒痰數升汗出如沃次以導水禹功去腸胃中燥垢亦數升其人半愈然後以淡劑流其餘蘊以降火之劑開其胃口不踰月而痊夫黃連黃藥可以清上燥濕黃芪茯苓可以補下滲濕二者可以收後不可以先驅復未盡者可以苦葶藶杏仁桑白皮椒目逐水之藥伏水皆去矣夫治病有先後不可亂投邪未去時愼不可補也大邪新去恐反增其氣轉甚於未治之時也昔河內有人病飲醫者斷爲脾濕以木香牽牛二味散之下十餘行因結病人復變散爲丸又下十餘行復變丸爲散又十餘行病者大困睡幾一晝夜既覺腸胃寬闊惟思粥食少許日漸愈雖同斷爲濕但補瀉不同其差至此內經曰歲土太過雨濕流行腎水受邪甚則飲發中滿太陽司天濕氣變物水飲內蓄中滿不食註云此年太陰在泉濕監於地病之原始地氣生焉少陰司天濕土爲四之氣民病胕腫飲發又土鬱之發民病飲發注下附腫身重又太陰所至爲積陰否隔又太陰所至稽滿又太陰之勝與太陰之復皆云飲發於中以此考之土主濕化不主寒水主寒化不主濕天多陰雨地有積潦皆以爲水在內經屬土冰霜凝沍風氣淒寒此水之化也故曰丑未太陰濕土辰戌太陽寒水二化本自不同其病亦異夫濕土太過則飲發於中今人以爲脾土不足則軒岐千古之書可從乎不可從乎

痰病

凡人病痰發者其證蓄有五焉一曰風痰二曰熱痰三曰濕痰四曰酒痰五曰沫痰諸痰在於膈上使頭目不能清利涕唾稠黏或欲吐噦滿或時發潮熱可用獨聖散吐之次服加減飲子或搜風丸凉膈散間而服之內經曰所謂流濕潤燥之義也

凡人病痰證有五一曰風痰二曰熱痰三曰濕痰四曰酒痰五曰食痰諸痰在胃口上焦毒熏於頭者諸陽之會於首也故令病人頭重目瞤涕唾稠黏或欲嘔噦滿時發寒熱可用赤小豆湯吐之吐後各隨其

證而治之可服消風去熱導濕化痰如通聖加半夏導氣之劑豈不妙哉如新暴風痰者形寒飲冷熱痰者火盛制金濕痰者停飲不散可服加減連翹飲子除濕丹無憂散亦有酒痰者解毒三聖丸主之五者食痰可用漢防己丸丹砂選而用之若依法服之決有神效

吐法

痰在胃膈之上大滿大實非吐安能得出仲景曰大法春宜吐蓋春時陽氣在上人氣與邪氣亦在上故宜吐也涌吐之藥或丸或散中病即止不必盡劑過則傷人然則四時有急吐者不必直待春時也但仲景言其大法耳今人不得此法遂廢而不行試以名方所記者略數之如仲景傷寒論中以葱白豆豉湯吐頭痛梔子厚朴湯吐懊憹瓜蒂散吐傷寒六七日因下後腹滿無汗而喘者本事方稀涎散吐膈實中滿痰嗽失音牙關緊閉如喪神守萬全方以鬱金散吐頭痛眩運頭風惡心普濟方以追風散吐口噤不開不省人事以皂角散吐涎潮總錄方以常山吐瘧孫尚方以三聖散吐狂神驗方吐舌不正內經曰高者越之王冰曰上盛不已奪而吐之仲景曰宿食在上脘者當吐之又如宿飲酒積在上脘者亦當吐之又曰病人手足厥冷兩手脈乍結以客氣在胃中心下滿而煩欲食不能食者知病在胃中當吐之予今用吐法皆是仲景方中瓜蒂散吐傷寒頭痛用葱白豆豉湯以吐雜病頭痛或單瓜蒂散名獨聖加茶末少許以吐痰飲加全蠍梢以吐兩脅肋刺痛濯濯有聲者內經所謂濕在上者以苦吐之其是之謂歟今人亦有用吐者然或中或否或涌而不能出或出而不能止豈知上涌之法名曰撩痰撩之一字自有擒縱卷舒近有醫工吐一婦人半月不止涎至數斗命懸須臾倉惶失計求予解之予煎麝香湯下咽立止或問麝香何以止吐予謂之曰瓜苗鬪麝即死今吐藥瓜蒂所以立解也如藜蘆吐不止者解以葱白湯石藥吐不止者解以甘草貫衆湯惟草木吐者解以麝香考之本草吐藥之苦寒者有豆豉瓜蒂茶葉梔子黃連苦參大黃辛苦而寒者有鬱金常山藜蘆甘苦而寒有地黃汁苦而溫者有木香遠志厚朴辛苦而溫者有薄荷芫花辛而溫者有穀精草葱根鬚辛而寒者有輕粉辛甘而溫者有烏頭附子尖酸而寒者有晉礬綠礬膽礬汁酸而平者有銅綠甘酸而平者有赤小豆酸而溫者有飯漿酸辛而寒者有膽礬酸而寒者有白米飯辛酸而溫者有皂角甚鹹而寒者有食鹽青鹽甘而寒者有牙硝甘而微溫者有參蘆甘辛而熱者有蠍梢凡此三十六味惟常山膽礬瓜蒂有小毒藜蘆芫花輕粉烏頭尖有毒外二十六味皆吐藥之無毒者各對證擇而用之此法宜先少服不涌漸次加之余之撩痰者以釵股鷄翎探引不出以薑汁投之投之不出再探之且投且探無不出者吐至昏眩頭痛者飲以冰水立解如無冰水新汲水亦可飲壯者一吐而安弱者可三四次吐之庶無損也有吐之次日頓快者有轉甚者蓋吐之傷而未平也俟數日再當涌之如覺渴者新水瓜梨及凉物皆不禁惟禁食飽厚饌乾脯難化之物心火既降中脘沖和陰道必强大禁房勞大憂大怒謹守禁忌不信浮言眞知病證決可吐者然後吐之庶萬全也

朱震亨心法

痰病

脈浮當吐久得脈濇卒難開也必費調理大凡治痰用利藥過多致脾氣虛則痰易生而多

濕痰用蒼朮白朮熱痰用青黛黃連黃芩食痰用神麴麥芽山楂風痰用南星老痰用海石半夏苦萋香附五倍子作丸服痰在膈上必用吐法瀉亦不能去風痰多見奇證濕痰多見倦怠軟弱若氣實痰熱結在上者吐難得出痰清者屬寒二陳湯之類膠固稠濁者必用吐熱痰挾風外證爲多熱者清之食積者必用攻之兼氣虛者用補氣藥送下痰因火盛逆上者以攻火爲先白朮黃芩軟石膏之類

內傷挾痰必用參芪白朮之屬多用薑汁傳送或加半夏虛甚加竹瀝中氣不足加參朮

痰之爲物隨氣升降無處不到脾虛者宜補脾氣清中氣以運痰降下二陳湯加白朮之類兼用升麻提起

中焦有痰與食積而生病者胃氣亦賴所養卒不可便攻若攻之盡則虛矣

痰成塊或吐咯不出兼氣鬱者氣濕痰熱者皆難治痰在腸胃間者可下而愈在經絡中非吐不可吐法中就有發散之義焉

假如癎病因驚而得驚則神出舍舍空則痰生也血氣入在舍而拒其神不能歸焉

血傷必用薑汁傳送黃芩治熱痰假其下火也竹瀝滑痰非薑汁不能行經絡五倍子能治老痰佐他藥

大治頑痰二陳湯一身之痰都治管如要下行加引下藥在上加引上藥

凡用吐藥宜升提其氣便吐也如防風山梔川芎桔梗芽茶生薑薑汁之類或用瓜蔕散

凡風痰病必用風痰藥如白附子天麻雄黃牛黃片芩殭蠶猪牙皂角之類

凡人身上中下有塊者多是痰問其平日好食何物吐下後方用藥

許學士用蒼朮治痰成窠囊一邊行極妙痰挾瘀血遂成窠囊

眩運嘈雜乃火動其痰用二陳湯加山梔子黃連黃芩之類噫氣吞酸此食鬱有熱火氣上動以黃芩爲君南星半夏爲臣橘紅爲使熱多加青黛

痰在脅下非白芥子不能達痰在皮裏膜外非薑汁竹瀝不可導痰在四肢非竹瀝不開痰結核在喉中燥不能出入用化痰藥加鹹藥軟堅之味苦蔞仁杏仁海石桔梗連翹少佐砂硝以薑汁蜜和丸噙服

海粉即海石熱痰能降濕痰能燥結痰能軟頑痰能消可入丸子末子不可入煎藥枳實瀉痰能衝牆倒壁小胃丹治膈上痰熱風痰濕痰肩膊諸痛能損胃氣食積痰實者用之不宜多參萸丸能消痰

喉中有物咯不出嚥不下此是老痰重者吐之輕者用苦蔞葷氣實必用荊瀝

天花粉大能降鬲上熱痰痰在膈間使人顛狂或健忘或風痰皆用竹瀝亦能養血與荊瀝同功治稍重能食者用此二味效速穩當二瀝治痰結在皮裏膜外及經絡中痰必佐以薑汁韭汁治血滯不行中焦有飲自然汁冷吃兩三銀盞必胷中煩躁不寧後愈

凡痰之爲患爲喘欬嘔利眩運嘈雜怔忡驚悸寒熱痛腫痞隔壅塞或胷脅間轆轆有聲或背心一片常爲冰冷四肢痲痺不仁皆痰飲所致善治痰者不治痰而治氣氣順則一身之津液亦隨氣而順矣古方治痰飲用汗吐下溫之法愚見不若以順氣爲先分導次之王隱君云痰清白者爲寒黃而濁者爲熱不知始則清白久則黃濁清白稀飲漬於上黃濁稠黏凝於下嗽而易出則清而白欬而不能出則黃濁結滯若咯唾日久濕熱所鬱上下凝結皆無清白者甚至帶血血敗則黑痰爲關格異病人所不識又清白者氣味淡日久者漸成惡味酸辣腥臊焦苦不一百病多有兼痰者世所不知人身中有結核不痛不紅不作膿痰注也治痰法實脾土燥脾濕是治其本格致餘論

痰病似祟論

血氣者身之神也神既衰乏邪因而入理或有之若血氣兩虧痰客中焦妨礙升降不得運用以致十二官各失其職視聽言動皆有虛妄以邪治之其人必死吁哉冤乎誰任其咎憲幕之子傅兄年十七八時暑月因大勞而渴恣飲梅漿又連得大驚三四次妄言妄見病似邪鬼診其脈兩手皆虛弦而帶沉數予曰數爲有熱虛弦是大驚又梅酸之漿鬱於中脘補虛清熱導去痰滯病乃可安遂與人參白朮陳皮茯苓芩連等濃煎湯入竹瀝薑汁與服旬日未效衆皆尤藥之不當余脈之知其虛未完與痰之未導也仍與前方入荊瀝又旬日而安外弟歲一日醉飽後亂言妄語妄見詢之係伊亡兄附體言生前事甚的乃叔在邊叱之曰非邪也乃食腥與酒太過痰所爲耳灌鹽湯一大碗吐痰一二升汗因大作困睡一宵而安又金氏婦壯年暑月赴筵歸乃姑詢其坐次失序遂赧然自愧因成此病言語失倫其中又多間一句曰奴奴不是脈皆數而弦余曰此非邪乃痰病也但與補脾清熱導痰數日當自安其家不信邀數巫者噴水而呪之旬餘而死或問曰病非邪而邪治之何遽至於死余曰暑月赴宴外境蒸熱辛辣適口內境鬱熱而況舊有積痰加之愧悶其痰與熱何可勝言今乃驚以法尺是驚其神而血不寧也噴以法水是實其體密其膚使汗不得泄也汗不泄則蒸熱內燔血不得寧則陰消而陽不能獨立也不死何俟或曰外臺祕要有禁呪一科庸可廢乎予曰移精變氣乃小術耳可治小病若內有虛邪外有實邪當用正大之法自有成式昭然可考然符水惟膈上熱痰一呷凉水胃熱得之豈不清快亦可取安若內傷而虛與冬令嚴寒符水下咽必冰胃而致害彼鬱熱在上熱邪在表須以汗解卒得清冷膚腠固密熱何由解必致內攻陰陽離散血氣乖爭去死爲近

平治會粹

痰病吐法

吐法兼用芽茶薑水薑汁酢少許苦蔞散少許加防風桔梗皆升動其氣便吐也

吐法用附子尖桔梗蘆人參蘆瓜蔕藜蘆艾葉芽茶等藥此皆自吐不用手探但藥但湯皆可吐

吐法先以布搭膊勒腰於不通風處行此法蘿蔔子

半升擂和以漿水一椀濾去粗入少油與蜜旋至半溫服後以鵝翎探吐凡用鵝翎須以桐油浸却以皂角水洗去肥臘乾用之

又法用蝦帶殼半斤入醬葱薑等料物煑汁先吃蝦後飲汁以翎勾引吐必須緊勒肚腹

明虞摶醫學正傳

痰飲論

內經曰諸氣膹鬱皆屬肺金蓋肺氣鬱則成熱熱盛則生痰丹溪曰自熱成積自積成痰痰挾瘀血遂成窠囊此爲痞痛噎膈翻胃之次第也王隱君曰痰證古今未詳方書雖有懸飲留飲支飲痰飲諸飲之異而莫知其爲病之源或頭風目昏眩運耳鳴或口眼蠕動眉稜耳輪搔痒或四肢遊風腫硬似痛非痛或爲齒頰痒痛牙牀浮腫而痛痒不一或噯氣吞酸嘈雜嘔噦或咽嗌不利咯之不出嚥之不下色似煤炲形如破絮桃膠蜆肉之類或心下如停冰雪心頭冷痛時作或夢寐奇怪鬼魅之狀或足腕痠軟腰背卒痛或四肢骨節煩疼並無常所乃至手麻臂痛狀若挫閃或脊中有掌大一塊如冰之寒痛者或渾身習習如蟲行者或眼浴澀痒口糜舌爛甚爲喉閉等證又或遶項結核似癧非癧或胷腹間如有二氣交紐噎塞煩悶有如煙氣上衝頭面烘熱或爲失志顛狂中風癱瘓或爲勞瘵風痺脚氣之候或心下怔忡驚悸如畏人將捕或喘嗽嘔吐或嘔冷涎綠水黑水甚爲肺癰腸毒便膿攣跛其爲內外疾病百端皆痰之所致也蓋津液既凝爲痰飲而洶湧上焦故口燥嗌乾流而之下則大小便閉塞面如枯骨毛髮焦乾婦人則經閉不通小兒則驚癇搐搦治法宜先逐去敗痰然後看虛實調理故製沉香滾痰丸爲通治三焦痰飲之要藥也愚竊以其論證固詳不問虛實而一概以峻藥攻之恐未中肯綮也蓋資稟有厚薄病邪有淺深一或失手何以收救故丹溪曰治痰用利藥過多致脾氣虛則痰反易生又曰中焦有食積與痰而生病者胃氣亦賴所養卒不可便攻攻盡則愈虛而病劇夫滾痰丸止可投之於形氣壯實痰積膠固者若體氣虛弱之人決不可輕用

戴思恭證治要訣

停飲伏痰

飲凡有六懸溢支痰留伏痰飲特六飲之一耳人病此而止曰痰飲者蓋停既久未有不爲痰多因氣道閉塞津液不通譬如溝渠壅遏積淹停滯則倒流逆上瘀濁臭穢無所不有若不疎決溝渠而欲澄治已壅之水而使之清無是理也

凡爲喘欬嘔泄眩運心嘈怔忡驚悸寒熱痛腫痞膈壅閉或胷脅間瀝瀝有聲或背心一片如水冷皆飲之所致如水之壅有瘀濁臭穢故善治痰者不治痰而治氣氣順則一身之津液亦隨氣而順矣並宜蘇子降氣湯導痰湯各半貼和煎或小半夏茯苓湯加枳實木香各半錢吞五套丸或以五套丸料依分兩作飲子煎服尤好平居皆無他事只有痰數口或清或堅宜二陳湯小半夏茯苓湯痰多間進青州白丸子和來復丹服來白丸如和以八神來復丹即名青神丸此非特治痰飲尤甚療喘嗽嘔吐呃逆翻胃若服藥未效者二生湯加木香半錢若頑涎隨氣逆上不爲藥解當自下部利之宜五膈寬中散加半夏半錢吞破飲丸仍佐以半硫丸恐大便復祕飲利不盡半硫丸當常服若大便先不因藥自利及老人虛人當利其小便宜小半夏茯苓湯改用赤苓而倍之或導痰湯加猪苓半錢

痰飲眩運及成飲厥者宜別加木香二生湯吞青州白丸子和靈砂丹名青金丹或吞養正丹半硫丸

痰飲流入四肢令人肩背痠疼兩手軟痺醫悞以爲風則非其治宜導痰湯加木香薑黃各半錢

病痰飲而變生諸證不當爲諸證牽掣妄言作名且以治飲爲先飲消則諸證自愈有卒然昏悶口眼喎斜似中而實非中四肢戰曳身如浮雲似虛而實非虛皆痰飲所爲也又有腎虛寒不能攝水致水邪溢上故作痰飲宜八味丸

其人素有痰飲流注肩背作痛宜星香散或導痰湯下五套丸

樓英醫學綱目

痰飲

凡有痰者眼皮及眼下必有烟灰黑色舉目便知不待切脈眼黑而頰赤者熱痰也面大黃色亦熱痰也外證必煩滿膈熱口乾思冷大便祕結小便赤熱久必生風或眩運耳鳴眼花多虛證治之而用熱藥服久必脈大實發大熱而中風可急下之眼黑而行走呻吟舉動艱難者入骨痰也其證徧體骨節疼痛眼黑而面帶土色四肢痿痺屈伸不便者風濕痰也眼黑而氣短促者驚風痰也左右關脈大者膈中有痰也可吐之怕吐者消息下之凡人背上一條如線而

寒起者宜吐下之

凡痰病百藥不效其關上脈伏而大者痰也用妙應丸加減法驚痰加硃砂二錢又加全蠍每用八九九常與之三五服去盡酒應加雄黃全蠍各二錢每服十丸熱痰加盆硝等分每服三兩丸寒痰加胡椒丁香蠍柱各等分每服二十五丸

痰之爲病或偏頭風或雷頭風或太陽頭痛眩運如坐舟車精神恍惚口眼瞤動胃棱耳輪俱痒頷腮四肢遊風腫硬似疫非疫渾身癢痒搔之則癮疹隨生皮毛烘熱色如錦斑齒頰似痒似痛而疼無定所滿口牙浮痛痒不一噯氣吞酸鼻聞焦臭喉間豆腥氣心煩鼻塞咽啞不利咯之不出咽之不下或因噴嚏而出或因舉動而唾其痰如黑墨破絮桃膠蜆肉或心下如停冰閉滯妨悶噯噫連聲狀如腸氣或寢夢刑戮刀兵劍戟或夢入人家四壁圍繞暫得一竇百計得出不知何所或夢在燒人地上四面煙火枯骨焦氣撲鼻無路可出或不因觸發忿怒悲啼雨淚而寤或時邪行忽見天邊兩月交輝或見金光數道回頭無有或足膝痠軟骨節腰臀疼痛呼吸難任或四肢肌骨間痛如擊戮乍起乍止並無常所不時手臂麻疼狀如風濕臥如芒刺不安或如毛蟲所螫或四肢不舉手足重滯眼如蒙翳膠粘痒澁開闔甚難或陰睛交變之時胃痞氣結閉而不發則齒痒咽痛口糜舌爛及其奮然而發則噴嚏連聲初則涕唾稠粘次則清水如注眼前黑暗腦後風聲耳內蟬鳴眼瞤肉惕治之者不曰勝理不密風府受邪則曰上盛下虛或曰虛寒或曰邪發惟洞虛子備此疾苦乃能治療病勢之來則胃腹間如有二氣交紐噎塞煩鬱有如烟火上衝頭面烘熱眼花耳鳴痰涎滯泊並從肺胃間湧起凜然毛竪噴嚏千百然後遍身煩躁則去衣涕體稍止片時或春秋乍凉之時多加衣衾亦得暫緩或頓飲冰水而定或痛飲一醉而寧終不能逐去病根乃得神祕沉香丸方屢獲大效愈人數萬但不欲輕傳匪人故以隱語括之詩曰甑裏翻身甲帶金於今頭戴草堂深相逢二八求斤正砧煅青蒙倍若沉十七兩中沉半兩水丸梧子意須斟除驅怪病安心志木瀉雙身却不任

王綸明醫雜著

老痰

痰者病名也人之一身氣血清順則津液流通何痰之有惟夫氣血濁逆則津液不清薰蒸成聚而變爲痰焉痰之本水也原於腎痰之動濕也主於脾古人用二陳湯爲治痰通用者所以實脾燥濕治其標也然以之而治濕痰寒痰痰飲痰涎則固是矣若夫痰因火上肺氣不清欬嗽時作及老痰鬱痰結成粘塊凝滯喉間吐咯難出此痰皆因火邪炎上熏於上焦肺氣被鬱故津液之隨氣而升者爲火熏蒸凝濁鬱結而成歲月積久根深帶固故名老名鬱而其原則火也病在上焦心肺之分咽喉之間非中焦脾胃濕痰冷痰痰飲痰涎之比故湯藥難治亦非半夏茯苓蒼术枳殼南星等藥所能治也惟在開鬱降火清潤肺金而消凝結之痰緩以治之庶可效耳今製化痰丸用天門冬黃芩酒炒海粉橘紅各一兩桔梗連翹香附杵碎淡鹽水浸炒五錢青黛另研芒硝另研各二錢苦葉肉另研一兩爲細末煉蜜人薑汁少許和如烟火上衝頭面烘熱眼花耳鳴痰涎滯泊並從肺胃間湧起凜然毛竪噴嚏千百然後遍身煩躁則去之或丸如黍米大淡薑湯送下五六十丸

按前方味屬甘苦鹹寒之劑雖能軟堅開鬱化痰降火而不無損胃之禍若脾土太過氣滯鬱熱而生痰者宜用若脾虛氣痞虛熱而生痰者用之必致中滿吞酸肚腹腫脹小便不利而殞

若老痰飲酒之人多有之氣上升爲火肺與胃脘皆受火邪故鬱結而成用天麥冬黃芩泄肺火也海粉芒硝鹹以軟堅也苦葉仁潤肺清痰香附米開鬱降氣連翹開結降火青黛降鬱火不用香燥之劑

按前證若飲食少思或胃脘不利者此中氣虛弱也宜用補中益氣湯爲主中氣既健其痰自運化若腎氣虧損津液難降敗濁爲痰者乃眞臟之證宜用六味地黃丸爲主腎氣既壯津液清化何痰之有亦有因脾胃虧損中焦氣虛不能消化飲食而爲痰者亦有因峻厲過度脾氣愈虛不能運化津液凝滯而爲痰者凡此皆當健脾胃爲主

李梴醫學入門

痰分新久

痰乃津血所成隨氣升降氣血調和則流行不聚內外感傷則壅逆爲患新而輕者形色青白稀薄氣味亦淡久而重者黃濁稠粘凝結咯之難出漸成惡味酸辛腥臊鹹苦但痰證初起頭痛發熱類外感表證久則潮熱夜重類內傷陰火又痰飲流注肢節疼痛類風證但痰證胃滿食減肌色如故脈滑不勻不定爲異耳

百病兼痰

人知氣血爲病而不知痰病尤多生於脾多四肢倦怠或腹痛腫脹泄瀉名曰濕痰若挾食積瘀血遂成窠囊痞塊又名食痰留於胃脘多嘔吐吞酸嘈雜上衝頭面烘熱名曰火痰若因飲酒乾嘔噯呃臂脅痛又名酒痰生於肺多毛焦面白如枯骨咽乾口燥欬嗽喘促名曰燥痰久爲老痰鬱痰又七情痰滯咽膈多胷脅痞滿名曰氣痰迷於心多怔忡顚狂夢寐奇怪名曰熱痰動於肝多眩運頭風眼目瞤動昏澀耳輪搔痒脅肋脹痛左癱右瘓痲木踡跛奇證名曰風痰積於腎多足膝酸軟腰背強痛肢節冷痹骨痛名曰寒痰又名虛痰凡渾身習習如蟲行或身中結核不紅不腫或頸項結核似癧非癧或走馬喉痹或胷腹間如有二氣交紐噎塞煩悶或背中常有一點如冰冷痛或心下冰冷時痛或四肢腫硬似痛非痛或骨節刺痛無常處或吐冷涎綠水黑汁或大小便膿或關格不通以至癆瘵荏苒婦人經閉小兒驚搐皆須先去敗痰然後調理他如鬬家胷骨撲傷刺痛不已散血之劑罔功續以自己小便飲之須臾吐痰其痛立止百病兼痰如此

辨色

風痰外感賊邪或腎枯木動或內風鬱熱色青而光風虛三生飲古龍虎丹風熱小省風湯搜風化痰丸四神丹竹瀝膏

寒痰因形寒飲冷色深青黑如灰善唾或喘輕者五積散藿香正氣散重者溫中化痰丸古半硫丸

濕痰或外感濕滯或停飲不散色白喘急者千緡湯心痛者單半夏丸或神朮丸濕熱色黃者中和丸清膈蒼莎丸在裏者青蒙石丸

火熱爲因

熱痰因厚味積熱或外感誤溫所致色黃甚則帶血或紫清氣化痰丸煎服大金花丸滾痰丸

火痰因飲食衣褥過厚火蒸津液成痰稠濁二陳湯加芩連山梔或抑上丸潤下丸

鬱痰即火痰鬱於心肺之久者凝滯胷膈稠粘難咯忌南星半夏燥藥宜開胃降火清金潤肺緩以治之節齋化痰丸謝傅清金丸單貝母丸霞天膏

氣痰七情鬱成咯之不出嚥之不下形如破絮或如梅核四七湯久者去蘇子加黃芩山梔海石三仙丸千金指迷丸

食酒爲因

食痰因飲食不化結成痞塊橘半枳朮丸痰壅喘急者苦蔞實丸山楂麥芽湯下陰虛者黃白丸傷水心中堅大如杯者名氣分枳朮丸煎服痰癖硬如杯時有水聲者神保丸酒痰小調中湯香附苦蔞青黛丸

痰飲有五

痰伏胞絡自肺竅嗽出涎伏脾元自口角流出飲生胃腑從食脘吐出五飲六證留飲伏飲合爲一也皆因飲水及茶酒停蓄不散再加外邪生冷七情相搏成痰即酒痰久而濕勝者與傷寒水證大同脈多弦滑或伏眼下皮如灰黑

痰飲水停腸胃腹響轆轆有聲令人暴肥暴瘦懸飲水流在脅欬唾則痛懸懸思水溢飲水流四肢身體重痛支飲水停膈上飽逆倚息短氣留飲水停心下背冷如手掌大或短氣而渴四肢歷節疼痛脅痛引缺盆欬嗽轉甚伏飲水停膈滿嘔吐喘欬發熱惡寒腰背痛淚出或身惕瞤仲景治諸飲在皮裏膜外表分者大小青龍湯汗之在胷膈者瓜蒂散吐之在四肢經絡脅肋者五苓散分利之在腸胃裏分者十棗湯下之此皆治標之霸道也從輕汗以參蘇飲吐以二陳湯加防風桔梗分利五飲湯下劑開結枳朮丸中間間以小半夏湯古葶藶散枳朮丸溫中化痰丸清氣化痰丸半夏溫肺湯隨虛實加減不必太泥

古法順氣爲先分導次之然氣升屬火因氣動者曰痰氣順氣導痰湯因火動者曰痰火清熱導痰湯因濕動者曰濕痰祛濕導痰湯主之通用二陳湯能使大便潤而小便長尤爲分導要藥風加南星皂角白附子竹瀝寒倍半夏加薑附薑汁火加石膏青黛濕加蒼朮白朮燥加苦蔞杏仁老鬱痰加海石芒硝苦蔞食積加山楂神麴麥芽停水加檳榔痰在脅下加白芥子以行之痰在四肢加竹瀝痰在經絡用此探吐痰在皮裏膜外加白芥子竹瀝薑汁氣實用荊瀝

虛證

痰原於腎動於脾客於肺水火升降脾胃調和痰從何生若陽虛腎寒不能收攝邪水冷痰溢上或昏運夜喘上氣者八味丸三味安腎丸黑錫丹以鎮墜之如痰壅發厥者蘇子降氣湯三生飲古硫汞丹脾虛不能運化者宜補中燥濕六君子湯加竹瀝薑汁勞役傷脾失升降者補中益氣湯加半夏竹瀝薑汁氣血虧乏痰客中焦閉塞清道者仍宜溫中燥脾二陳湯氣虛合四君子湯血虛合四物湯陰虛腎火炎上

肺燥者二陳湯合四物湯去川芎半夏加貝母麥門冬苦葶仁桔梗潤而降之或腎氣丸二一腎氣丸語云痰無補法且老痰凝滯膠固非暫用溫藥引導必有拒格之患風寒痰氣內鬱不用溫散亦何以開結滯此皆難拘於無補也凡痰喘聲高脈散汗出如油身冰冷者死

痰者津液所化風傷肺濕傷脾疑濁而生外證頭項皆和惟寒熱類傷寒耳初起便胃膈滿悶氣上衝咽寸浮爲異有熱者參蘇飲金沸草散柴胡半夏湯無熱者二陳湯溫膽湯通用導痰湯有痰結胸者鶴頂丹枳桔二陳湯有痰上攻非次頭疼者瓜蒂散吐之

李中梓醫宗必讀

痰飲

稠濁者爲痰清稀者爲飲按痰之爲病十嘗六七而內經叙痰飲四條皆因濕土爲害故先哲云脾爲生痰之源又曰治痰不理脾胃非其治也夫飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行何痰之有惟脾土虛濕清者難升濁者難降留中滯膈淤而成痰故治痰先補脾脾復健運之常而痰自化矣析而言之痰有五飲亦有五而治法因之而變在脾經者名曰濕痰脈緩面黃肢體沉重嗜臥不收腹脹食滯其痰滑而易出二陳湯白朮丸挾虛者六君子湯傷酒者白蔻乾葛挾食者保和丸挾暑者消暑丸驚者妙應丸在肺經者名曰燥痰又名氣痰脈濇面白氣上喘促漉淅寒熱悲愁不樂其痰澀而難出利金湯潤肺飲在肝經者名曰風痰脈弦面青四肢滿悶便溺祕澀時有躁怒其痰青而多泡水煮金花丸防風丸川芎丸在心經者名曰熱痰脈洪面赤煩熱心痛口乾唇燥時多喜笑其痰堅而成塊小黃丸天黃湯在腎經者名曰寒痰脈沉面黑小便急痛足寒而逆心多恐怖其痰有黑點而多稀薑桂丸八味丸胡椒理中丸其人素盛今瘦水走腸間轆轤有聲名曰痰飲心下冷極以溫藥和之桂苓甘朮湯主之飲後水流在脅下欬唾引痛名曰懸飲十棗湯下之飲水流於四肢當汗不汗身體疼重名曰溢飲大青龍湯汗之欬逆倚息短氣不得臥其形如腫名曰支飲五苓散澤瀉湯利之腸滿嘔吐喘欬寒熱腰背痛目淚出其人振振惡寒身瞤惕者名曰伏飲倍朮丸更有一種非痰非飲時吐白沫不甚稠粘此脾虛不能約束津液故凝沫自出宜用六君子湯加益智仁以攝之嗟乎五痰五飲證各不同治法迥別稍或不詳妄投藥劑非徒無益而又害之至如脾肺二家之痰尤不可混脾爲濕土喜溫燥而惡寒潤故二朮星夏爲要藥肺爲燥金喜凉潤而惡溫燥故二母二冬地黃桔梗爲要藥二者易治鮮不危困世俗惡半夏之燥喜貝母之潤一見有痰便用貝母若是脾痰則土氣益傷飲食忽減即使肺痰毋過於凉潤以傷中州稍用脾藥以生肺金方爲善治故曰治痰不理脾胃非其治也

趙獻可醫貫

痰論

王節齋云痰之本水也原於腎痰之動濕也主於脾古人用二陳湯爲治痰通用然以治濕痰寒痰則是矣若夫陰火炎上熏於上焦肺氣被鬱故其津液之隨氣而升者凝結而成痰腥穢濁甚則有帶血而出者此非中焦脾胃濕痰寒痰之所比亦非半夏枳殼南星之所治惟用清氣化痰須有效耳噫節齋論痰而首揭痰之本於腎可爲發前人所未發惜乎啓其端而未竟其說其所製之方皆治標之藥而其中寒凉之品甚多多致損胃惟仲景先生云氣虛有痰用腎氣丸補而逐之吳茭山諸證辨疑又云八味丸治痰之本也此二公者眞開後學之聾聵清無窮之天枉益痰者病名也原非人身之所有非水泛爲痰則水沸爲痰但當分有火無火之異耳腎虛不能制水則水不歸源如水逆行洪水泛濫而爲痰是無火者也故用八味丸以補腎水陰虛火動則水沸騰動於腎者猶龍火之於海龍興而水附動於肝者猶雷火之出於地疾風暴雨水隨波湧而爲痰是有火者也故用六味丸以配火此不治痰之標而治痰之本者也然有火無火之痰何以辨之曰無火者純是清水有火者中有重濁白沫爲別耳善用者若能於腎虛者先以六味八味壯水之主益火之原復以四君子或六君子補脾以制水於脾虛者既補中理中又能以六味八味制水以益母子母互相生財而於治痰之道其庶幾矣

龐安常有言有陰水不足陰火上升肺受火侮不得清肅下行由是津液凝濁生痰不生血者此當以潤劑如門冬地黃枸杞之屬滋其陰使上逆之火得返其宅而息焉則痰自清矣投以二陳立見其殆有腎虛不能納氣歸原原出而不納則積積而不散則痰生焉八味丸主之

蒙筌謂地黃泥腸生痰爲痰門禁藥以薑汁炒之嗟乎若以薑汁炒之則變爲辛燥地黃無用矣蓋地黃正取其濡潤之品能入腎經若雜於脾胃藥中土惡濕安得不泥膈生痰八味六味丸中諸品皆少陰經的藥羣隊相引直入下焦名曰水泛爲痰之聖藥空腹服之壓以美饌不留胃中此仲景製方立法之妙何必固疑

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百五十九卷目錄

醫部彙考二百三十九

痰門二

喻昌醫門法律 痰飲論 痰飲服藥 痰飲嘔吐 禁十二附 藥禁十 痰飲嘔吐 禁十二附 藥禁十 痰飲嘔吐 禁十二附 藥禁十

支飲上於胃膈喘而短氣其脈仍平有而若無纔有停積未至留伏故不見於脈也其謂脈浮而細滑者傷飲見浮而細滑非傷風傷寒之比亦飲之初鬱氣分而未深也醫者於此時審思昏墊之災亟與已溺之念而行因勢利導之法患斯解矣否則證成深錮未流愈分伏根之所愈不可識經年檢方問藥漫圖成功其可得乎故凡見脈轉沉弦一派即當按法求之其曰脈沉者胃中有留飲短氣而渴四肢歷節痛言肺之治節不行宗氣不布故短氣氣不布則津亦不化故膈燥而渴脾氣不運水飲流於肢節則作痛也似此一證肺脾交病所稱飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上輸於肺之常者且轉而藉寇兵賚盜糧矣欲求其安寧可得乎至論弦脈則曰狄者其脈弦爲有水曰雙弦者寒也皆大下後虛脈偏弦者飲也爲喘滿曰脈弦數有寒飲冬夏難治曰脈沉而弦者懸飲內痛此即沉潛水蓄支飲急弦而廣其說除大下後其脈雙弦者有虛寒之別其偏弦者俱爲水飲也冬夏難治亦因其用寒遠寒用熱遠熱之法不若春秋爲易施耳懸飲內痛謂懸飲結積於內其甚者則痛也更有沉緊之脈主心下痞堅面色黧黑之證謂水挾腎寒雜揉於心肺之分則心下堅而面色黑也有脈伏而爲留飲之證積飲把持其脈而不露較濇脈尤甚矣又曰脈伏便利心下續堅此爲留飲欲去故也又曰久欬數歲其脈弱者可治實大數者死其脈虛者必苦冒本有支飲在胃中故也凡此皆病深而脈變當一一遡其流而窮其源者夫天樞開發胃和則脈和今爲痰飲凝結其中則開闔之機關不利而脈因之轉爲沉弦急弦偏弦弦數弦緊或伏而不見非亟去其痰飲亦胡由脈復其常耶淺者淺治深者深治淺深之間者適其中而治留者可攻伏者可導堅者可削再一因循病深無氣麗脈時驚不可救藥矣

痰飲留伏論

痰飲之證留伏二義最爲難明前論留飲者留而不去伏飲者即留飲之伏於內者也留飲有去時伏飲終不去留伏之義已見一班而金匱奧義夫豈渺言能盡謹再陳之金匱論留飲者三伏飲者一曰心下有留飲其人背寒如掌大曰留飲者脅下痛引缺盆曰胃中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛言胃中留飲阻抑上焦心肺之陽而爲陰噎則其深入於背者有冷無熱幷阻督脈上升之陽而背寒如掌大無非陽火內鬱之象也脅下爲手足厥陰上下之脈而足少陽之脈則由缺盆過季肋故脅下引缺盆而痛爲留飲偏阻木火不伸之象飲留胃中短氣而渴四肢歷節痛爲肺不行氣脾不散精之象也合三條而觀之心肺肝脾痰飲皆可留而累之矣其義不更著耶至伏飲則曰膈上病痰滿喘欬吐發則寒熱背痛腰痛目泣自出其人振振身瞤劇必有伏飲言胃中乃陽氣所治留飲阻抑其陽則不能發動然重陰終難蔽覩有時陽伸陰無可容忽而吐發其留飲可以出矣若更伏留不出乃是三陽之氣伸而復屈太陽不伸作寒熱腰背痛目泣少陽不伸風火之化鬱而幷於陽明土中陽明主肌肉遂振振身瞤而劇也留飲之伏而不去其爲累更大若此然留飲伏飲仲景不言治法昌自其遏抑四藏三腑之陽而求之則所云宜用溫藥和之者豈不切於此證而急以之通其陽乎所云苓桂术甘湯者雖治支滿目眩豈不切於此證而可倣其意乎故必深知此例始可與言往法也後人不明金匱之理妄生五飲六證之說即以海藏之明於五飲湯方下云一留飲在心下二支飲在脅下三痰飲在胃中四溢飲在膈上五懸飲在腸間而統一方以治之何其淺耶

按痰飲總爲一證而因則有二痰因於火有熱無寒飲因於濕有熱有寒即有溫泉無寒火之理人身熱鬱於內氣血凝滯蒸其津液結而爲痰皆火之變現也水得於濕留戀不消積而成飲究竟陰證熱濕釀成者多寒濕釀成者少蓋濕無定體春曰風濕夏曰熱濕秋曰燥濕冬曰寒濕三時主熱一時主寒熱濕較寒濕三倍也內經濕土大過痰飲爲病治以諸熱非指痰飲爲寒後人不解妄用熱藥藉爲口實詎知凡治六淫之邪先從外解故治濕淫所勝亦不遠熱以散其表邪及攻裏自不遠於寒矣況始先即不可表而積陰阻遏身中之陽亦必藉溫熱以伸其陽陰邪乃得速去若遂指爲漫用常行之法豈不愚哉

小學有虛實分治之法謂疾病之生也皆因外感內傷生火生濕濕熱生痰四者而已審其少壯新病是濕則燥之是火則瀉之濕而生熱則燥濕而兼清熱火而生痰則瀉火而兼豁痰無餘蘊矣審其衰老久病又當攻補兼施如氣虛而有濕熱痰火則以四君子湯補氣而兼燥濕清熱豁痰瀉火如血虛而有痰火濕熱則以四物湯補血而兼瀉火豁痰清熱燥濕

如此則攻補合宜庶乎可也故曰少壯新病攻邪可審老衰久病補益爲先若夫陰虛火動脾胃衰弱眞陰者水也脾胃者土也土雖喜燥然太熱則草木枯槁木雖喜潤然太濕則草木濕爛是以補脾滋腎之劑務在燥濕得宜隨證加減焉耳

後世治痰飲有四法曰實脾燥濕降火行氣實脾燥濕二陳二术最爲相宜若陰虛則反忌之矣降火之法須分虛實實用苦寒庶乎可也若夫行氣之藥諸方漫然全無著落謹再明之風寒之邪從外入內裏其痰飲惟用小青龍湯則分其邪從外出而痰飲從下出也濁陰之氣從下入上裏其痰飲用茯苓厚朴湯則分其濁氣下出而痰飲上出也多怒則肝氣上逆而血亦隨之氣血痰飲互結成癖用柴胡鼈甲散以除之多憂則脾氣內鬱而食亦不化氣食痰飲亦互結成癖用滿痰丸以除之多慾則腎氣上逆直透膜原結聚萬千膜脹重墜不可以仰用桂苓丸引氣下趨痰飲始豁也

虛寒痰飲少壯十中間見一二老人小兒十中常見四五若果脾胃虛寒飲食不思陰氣痞塞嘔吐涎沫者宜溫其中眞陽虛者更補其下清上諸藥不可用也

小兒慢脾風痰飲阻塞竅隧星附六君湯以醒之

老人腎虛水汎痰飲上湧崔氏八味丸以攝之

痰在膈上大滿大實非吐不除然非定法也使爲定法人人能用之矣何必獨推子和哉子和必相其人可吐後乃吐之一吐不徹俟再俟三緩以開之據云湧痰之法自有擒縱卷舒其非浪用可知

再論金匱不言之意以明之傷寒論用汗吐下和溫之法矣至痰飲首當吐者仲景反不言之何耶其以吐發二字爲言者因喘滿而痰飲上溢從內而自發也其曰醫吐下之不愈亦非以吐下爲咎也其曰嘔家本渴渴者爲欲解又屬望於從吐得解也胡竟不出可吐一語耶仲景意中謂痰飲證內多夾衛氣眩冒等證吐之則殆故不煩辭說直不以吐立法開後世之過端所以爲立法之祖也自子和以吐法擅名無識者爭趨捷徑貽誤不可勝道必會仲景意以言吐然後吐罔不當也

吐禁十二則

眩冒昏運不可吐氣高氣淺不可吐積勞未息不可吐病後新虛不可吐脈道微弱不可吐病勢危急不可吐陽虛多汗不可吐素慣失血不可吐風雨晦暝不可吐冬氣閉藏不可吐多疑少決不可吐吐後犯戒不可吐

藥禁十則

孕虛枯燥妄用二陳陽虛多汗妄用青龍心虛神怯妄用辛散肺虛無氣妄用苦瀉肝虛氣刺妄用龍胥脾虛浮腫妄用滾痰胃虛津竭妄用香燥膽腑易動妄行湧泄本非堅積妄行峻攻血氣虛羸妄行鍼灸

律三條

凡熱痰乘風火上入目瞎耳鳴多似虛證誤行溫補轉錮其痰永無出路醫之罪也

凡痰飲隨食並出不開幽門徒溫其胃束手無策遷延誤人醫之罪也

凡遇腎虛水泛痰湧氣高喘急之證不補其下反清其上必致氣脫而死醫之罪也

論苓桂术甘湯

痰飲除衆阻抑其陽用此陽藥化氣以伸其陽此正法也玆所主乃在胃脘支滿目眩者何耶靈樞謂心包之脈是動則病胃脘支滿然則痰飲積於心包其病自必若是目眩者痰飲阻其胃中之陽不能布水精於上也茯苓治痰飲伐腎邪滲水道桂枝通陽氣和榮衛開經絡白术治風眩燥痰水除脹滿甘草得茯苓則不資滿而反泄滿本草亦曰甘草能下氣除煩滿故用之也

論苓桂术甘湯腎氣丸二方

金匱云夫短氣有微飲當從小便去之苓桂术甘湯主之腎氣丸亦主之並出二方其妙義愈益彰著仲景於短氣分呼吸各出一方呼氣之短用苓桂术甘湯以通其陽陽化氣則小便能出矣吸氣之短用腎氣丸以通其陰腎氣通則小便之關門利矣一言半句莫非精蘊其斯以爲聖人乎

論大小青龍湯

溢飲之證水飲溢出於表榮衛盡爲之不利必傷寒病榮衛兩傷之法發汗以散其水而榮衛通經脈行則四肢之水亦散矣究竟大青龍升天而行雲雨小青龍鼓浪而奔滄海治飲證必以小青龍爲第一義也

論十棗湯甘遂半夏湯二方

傷寒病兩脅痞滿而痛用十棗湯下其痰飲雜病雖非傷寒之比而懸飲內痛在脅則同況脈見沉弦非取尊其邪邪必不去脈必不返所以用十棗湯不嫌

其過峻也凡病之在脅而當用下者必做此爲例也至甘遂甘草湯之治留飲微妙元通非深入聖域莫能製之內經但曰留者攻之耳仲景於是析義以盡其變無形之氣熱結於胃則用調胃承氣攻之熱結於腸則用大小承氣攻之有形之飲痞結於胃則用陷胃湯攻之痞結於脅則用十棗湯攻之留結於腸胃之間則用甘遂半夏湯攻之法曰病者脈伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此爲留飲欲去故也甘遂半夏湯主之脈道爲留飲所隔伏而不行其證欲下利利反快似乎留飲欲去然雖欲去不能去也心下續堅滿可見留飲之未已及於腸留飲之根仍著於胃不剗其根飲必不去故立是方甘遂甘草大相反者合而用之俾其向留著之根儘力一剗得留者去而藥性已不存矣正內經有故無殞之義也又加白蜜同煎留戀其藥不致迸入無過之地其用半夏芍藥者由木入土中成其堅滿半夏益土芍藥伐木抑何神耶後世方書并甘草刪去神奇化爲腐朽製方立論皆中人以下之事矣竟何益哉

論木防己湯葶藶大棗瀉肺湯防己椒目葶藶大黃丸三方

三方皆治支飲上入腦中而有淺深次第之分首一方先治其肺中一方顧治其肺後一方兼治肺氣所傳之腑蓋支飲上入於腦逼近心肺奧援腎邪本文云其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脈沉緊得之數十日醫吐下之不愈木防己湯主之虛者即愈實者三日復發復與不愈者去石膏加茯苓芒硝蓋以支飲上入阻其氣則逆於肺間而爲喘滿阻其血脈雜揉心下而爲痞堅腎氣上應其色黑血凝之色亦黑故黧黑見於面部然且姑緩心腎之治先治其肺肺之氣行則飲不逆而俱解耳木防己味辛溫能散留飲結氣又主肺氣喘滿石膏辛甘微寒主心下逆氣清肺定喘人參甘溫治喘消腦飲補心肺不足桂枝辛熱通血脈開結氣宣導諸藥在氣分服之即愈若飲在血分深連下焦必愈而復發故去石膏氣分之藥加芒硝入陰分開痰結消血癖合之茯苓去心下堅且伐腎邪也葶藶大棗湯大瀉其肺氣亦以氣停故液聚耳防己椒目葶藶大黃丸治腹滿口舌乾燥腸間有水氣之證乃肺氣臌鬱於上以致水飲不行於下而燥熱之甚用此丸急通水道以救金氣之弸鬱不治上而治其下故用丸劑也

論小半夏湯小半夏加茯苓湯外臺茯苓飲三方

前一方治支飲嘔而不渴者支飲上入腦中而食於嘔從高而越其勢最便但嘔家本當渴渴則可徵支飲之全去若不渴其飲尚留去之未盡也不必加治但用半夏之辛溫生薑之辛散再引其欲出之勢則所留之邪自盡矣中一方亦治卒嘔吐者但多心下痞腦間有水眩悸故加茯苓以去水伐腎而安心也後一方加人參枳實橘皮尤爲緊要治積飲既去而虛氣塞滿其中不能進食此證最多金匱早附外臺一方起誘後人非大民之先覺而誰

論澤瀉湯厚朴大黃湯二方

二方之治支飲俱從下奪而有氣血之分前後之辨首一方爲支飲之在心下者阻其陽氣之升降心氣鬱極火動風生而作冒眩惟是不治其冒眩但利小便以泄其支飲則陽自升而風火自息仲景製方每多若此後一方治支飲之胷滿者夫支飲而至胷滿在仲景自用大小陷胷湯治之此方乃承氣之法止可施於傷寒無形氣分熱結乃以之治有質之痰飲非仲景絲絲畢貫之法矣其爲編書者誤入何疑

論五苓散方

本文云假令瘦人臍下有悸吐涎沫而癲眩此水也五苓散主之此尋常一方耳深維其義蓋如以手指月當下了然蓋瘦人木火之氣本盛今以水飲之故下鬱於陰中挾其陰邪鼓動於肺則爲悸上入於胃則吐涎沫及其鬱極乃發直上頭目爲癲爲眩巢氏病源云邪入之陰則癲夫陽鬱於陰其時不爲癲眩出歸陽位反爲癲眩者夾帶陰氣而上也故不治其癲眩但散其在上夾帶之陰邪則立愈矣散陰邪之法固當從表然不如五苓散之表法爲良以五苓散兼利其水耳今世之用五苓散者但知其爲分利前後水穀之方不知其爲分利表裏陰陽之方方下所云多飲暖水汗出愈之文總置不錄何其淺耶不但此也即如小青龍一方世但知爲發表之輕劑全不知爲利小水而設夫山澤小龍蜿成頭角乘雷雨而直奔滄海其不能奮鬐而昇天豈待問哉所以金匱治支飲五方總不出小青龍一方爲加減取其開通水道千里不留行耳

痰證問答

告門人曰治痰之一規則不見於方書如在上者用瓜蒂散梔豉湯等方在左者用龍膏丸在右者用滾痰

丸以及虛人用竹瀝達痰丸沉寒錮冷用三建湯之類全無奧義豈得心應手之妙未可傳之紙上耶吾今爲子輩傳之蓋五味入口而藏於胃胃爲水穀之海五臟六腑之總司人之食飲太過而結爲痰涎者每隨脾之健運而滲灌於經隧其間往返之機如海潮然脾氣行則潮去脾氣止則潮回所以治沉錮之法但取辛熱微動寒凝已後止而不用恐痰得熱而妄行爲害不淺也不但痰得熱而妄行卽脾得熱而亦過動不息如潮之有去無回其痰病之決裂可勝道哉從來服峻補之藥者深夜亦欲得食人皆不知其故反以能食爲慶曾不思愛惜脾氣令其晝運夜息乃可有常況人身之痰旣由胃以流於經隧則經隧之痰亦必返之於胃然後可從口而上越從腸而下達此惟脾氣靜息之時其痰可返故凡有痰證者早食午食而外但宜休養脾氣不動使經隧之痰得以返之於胃而從胃之氣上下不從脾之氣四迄乃爲善也試觀人痰病輕者夜間安臥天早卽能嘔出泄出痰病重者昏迷復醒不能嘔出泄出者豈非未曾得食脾氣靜息而予痰以出路耶世之喜用熱藥峻攻者能知此乎噫天下之服辛熱而轉能夜食者多矣肯因便言而三思否

景岳全書 臣張介賓著

論證

痰飲一證在內經止有積飲之說本無痰證之名此內經之不重痰證槩可知矣及考痰之爲名雖起自仲景後世相傳無論是痰非痰開口便言痰火有云怪病之爲痰者有云痰爲百病母者似乎痰之關係不爲不重而何內經之忽之也不知痰之爲病必有所以致之者如因風因火而生痰者但治其風火風火息而痰自清也因虛因實而生痰者但治其虛實虛實愈而痰自平未聞治其痰而風火可自散虛實可自調者此所以痰必因病而生非病之因痰而致也故內經之不言痰者正以痰非病之本乃病之標耳今舉世醫流但知百計攻痰便是治病竟不知所以爲痰及由何而起是何異引指以使臂灌葉以救根者乎標本誤認主見失眞欲求愈病難矣

痰之與飲雖曰同類而實有不同也蓋飲爲水液之屬凡嘔吐清水及胃腹膨滿吞酸噯腐渥渥有聲等證此皆水穀之餘停積不行是卽所謂飲也若痰有不同於飲者飲淸澈而痰稠濁飲惟停積腸胃而痰則無處不到水穀不化而停爲飲者其病全由脾胃無處不到而化爲痰者凡五臟之傷皆能致之故治此者當知所辨而不可不察其本也

痰卽人之津液無非水穀之所化此痰亦旣化之物而非不化之屬也但化得其正則形體强榮衛充而痰涎本皆血氣若化失其正則臟腑病津液敗而血氣卽成痰涎此亦猶亂世之盜賊何孰非治世之良民但盜賊之興必由國運之病而痰涎之作必由元氣之病嘗聞之立齋先生曰使血氣俱盛何痰之有余於初年頗疑此言而謂豈無實痰乎及今見定識多始信其然也何以見之蓋痰涎之化本因水穀使果脾强胃健如少壯者流則隨食隨化皆成血氣焉得留而爲痰惟其不能盡化而十留一二則一二爲痰矣十留三四則三四爲痰矣甚至留其七八則但見血氣日消而痰涎日多矣此其故正以元氣不能運化愈虛則痰愈盛也然則立齋之言豈非出常之見乎今見治痰者必曰痰之爲患不攻如何得去不知正氣不行而虛痰結聚則雖竭力攻之非惟痰不可去而且益增其虛故或有因攻而遽斃者或偶爾暫蘇而更甚於他日者皆誤攻也孰知痰之可攻者少而不可攻者多治痰者不可不先察虛實

痰有虛實不可不辨夫痰若有餘又何有虛實之異蓋虛實二字全以元氣爲言凡可攻者便是實痰不可攻者便是虛痰何爲可攻以其年力猶盛血氣未傷或以肥甘過度或以濕熱盛行或風寒外閉皮毛或運氣內逆肝膈皆能驟致痰飲但察其形氣病氣但屬有餘者則實痰也實痰者何謂其元氣猶實也此則宜行消伐但去其痰無不可也何爲不可攻則或以形羸氣弱年及中衰者卽虛痰也或以多病或以勞倦或以憂思酒色致成勞損非風卒厥者亦虛痰也或脈見細數臟無陽邪時爲嘔惡泄瀉氣短聲啞等證但察其形氣病氣本無有餘者皆虛痰也虛痰者何謂其元氣已虛也此則但宜調補若或攻之無不危矣且凡實痰本不多其來也驟其去亦速其病亦易治何也以病本不深也虛痰反多其來則漸其去則遲其病亦難治何也以病非一日也是以實痰無足慮而最可畏者虛痰耳總之治痰之法無他但能使元氣日强則痰必日少卽有微痰亦不能爲害而且以充助胃氣若元氣日衰則水穀津液無非痰耳隨去隨生有能攻之使盡而且保元氣無恙者吾不信也故善治痰者惟能使之不生方是補天之

手然則治此者可不辨其虛實而欲一槩攻之如王隱君所論內外百病皆生於痰悉用滾痰丸之類其亦但知目前而不知日後之害也五臟之病雖俱能生痰然無不由乎脾腎蓋脾主濕濕動則爲痰腎主水水泛亦爲痰故痰之化無不在脾而痰之本無不在腎所以凡是痰證非此則彼必與二臟有涉但脾家之痰則有虛有實如濕滯太過者脾之實也土衰不能制水者脾之虛也若腎家之痰則無非虛耳蓋火不能生土者卽火不制水陽不勝陰者必水反侵脾是皆陰中之火虛也若火盛燥金則精不守舍津枯液涸則金水相殘是皆陰中之水虛也此脾腎虛實之有不同者所當辨也又若古人所云濕痰鬱痰寒痰熱痰之類雖其在上在下或寒或熱各有不同然其化生之原又安能外此二臟如寒痰濕痰本脾家之病而寒濕之生果無干於腎乎木鬱生風本肝家之痰而木强制土能無涉於脾乎火盛尅金其痰在肺而火邪炎上有不從中下二焦者乎故凡欲治痰而不知所源者總惟猜摸而已耳

論治

脾胃之痰有虛有實凡脾土濕滕或食飲過度別無虛證而生痰者此乃脾家本病但去其濕滯而痰自清宜二陳湯爲主治或六安煎橘皮半夏湯平胃散調下丸滾痰丸之類皆可擇而用之若胃寒生痰而兼脹滿者宜和胃二陳煎或兼嘔吐而痛者宜神香散或爲飲食所致宜加麥芽神麴山楂枳實之類然脾胃不虛則雖生痰飲不過微有留滯亦必不多且無大害惟脾虛飲食不能消化而作痰者其變最多但當調理脾胃便其氣强則自無食積之患而痰飲卽皆血氣矣若脾氣微虛不能制濕或不能運化而爲痰者其證必食減神倦或兼痞悶等證宜六君子湯或五味異功散之類主之金水六君煎亦妙若微虛兼寒者宜苓术二陳煎主之若脾氣大虛或兼胃寒嘔惡而多痰者宜六味異功煎溫胃飲理中湯聖术煎之類主之又有勞倦本以傷脾而疲極又傷肝腎脾氣傷則飲食減少或見惡心肝腎傷則水液妄行或痰飲起自臍下直衝而上此脾腎俱傷命門土母之病也雖八味地黃丸乃其正治然無如理陰煎其效更如神也或加白术陳皮亦可

腎經之痰水泛爲痰者也無非虛證有以腫脹而生痰者此水入脾經謂之反尅臟平者宜六味地黃丸左歸飲之類主之臟寒者宜理陰煎加減金匱腎氣丸八味地黃丸之類主之其或但宜溫燥者則單助脾經亦能化濕惟六味異功煎及理中湯聖术煎俱可酌用有虛損而生痰者此水虧金凋精不化氣氣不化精而然使不養陰以濟陽則水氣不充痰終不化水不歸源痰終不寧宜以左歸右歸六味八味等九酌其寒熱而用之若陰火乘肺津液乾枯或喉痛或煩熱或喜冷或便實必察其真有火邪而痰嗽不已者宜四陰煎一陰煎之類加減主之若火本非真則但宜純補庶保萬全也

風寒之痰以邪自皮毛內襲於肺肺氣不清乃致生痰是卽傷寒之類但從辛散其痰自愈宜六安煎二陳湯甚者小青龍湯之類主之其有風寒外襲內兼火邪者亦可兼用黃芩若血氣兼虛者不得單用消耗宜金水六君煎主之若傷寒兒風而兼發熱嗽痰者宜柴陳煎主之或金水六君煎加柴胡亦可

中風之痰本非外感悉由脾腎虛敗所致治痰之法詳載非風門當於此互察之

治痰當分緩急凡非風等證其有痰涎壅盛閉塞上焦而藥食不能進者此不得不先治其痰以開清道若痰之甚者惟用吐法爲最妙若痰氣不甚食飲可進便當從緩求其本而治之不宜妄行攻擊或但以六安煎二陳湯潤下丸橘皮半夏湯之類調之爲宜若火盛生痰者宜清瘟煎抽薪飲之類主之若類風等證但察其上焦無滯或見其神昏困倦而胃喉之間氣清息平本不見痰者切不可疑其爲痰而妄用尅伐消痰等劑則無有不敗者若雜證勢已至劇而喉中痰聲漉漉隨息漸甚者此垂危之候不可治也治痰當知求本則痰無不清若但知治痰其證甚矣故凡痰因火動者宜治火爲先痰因寒生者宜溫中爲主風痰宜散之井辛溫不可也濕痰宜燥之非滲利不除也鬱痰有虛實實兼怒者宜抑肝邪鬱兼憂者宜培肝肺飲食之痰亦自不同有因寒者有因熱者有因肥甘過度者有因酒濕傷脾者此皆能生痰而其中各有虛實辨之不可不眞也又如脾虛不能制濕腎虛不能約水皆能爲痰此卽寒痰之屬也或以脾陰乾燥而液化爲痰或以金水偏枯而痰本乎血此卽熱痰之屬也凡此二者於痰證中十居八九是皆虛痰之不可攻者也又或有過用峻利以致痰反日甚者亦皆脾腎受傷之候治不求本而欲清者鮮矣諸家治痰法多有治其標者難不可執亦不可

鼻也詳列如左

痰因表者汗之裏者下之挾濕者分利之痰在膈上必用吐法瀉亦不去膠固稠濁之痰必用吐痰在經絡中非吐不可吐中就有發散之義痰在腸胃間可下而愈痰在四肢非竹瀝不能達痰在脅下非白芥子不能除痰在皮裏膜外非薑汁竹瀝不能達熱痰火痰宜青黛黃芩天花粉連翹石膏火炎上者用流金膏老痰宜海石苦蔞貝母兼火盛膠固者節齋化痰丸實痰火痰滾痰丸最效但不宜多用風痰用南星白附子濕痰用蒼朮白朮半夏茯苓澤瀉食積痰用神麴山楂麥芽酒痰用天花粉黃連白朮神麴或五苓散四苓散分利之痰結核在咽喉咯唾不出化痰藥中加鹹藥以耎其堅苦蔞仁杏仁海石砂硝海藻佐以薑汁竹瀝導痰非薑汁不能行經絡荊瀝治痰速效能食者用之二瀝佐以薑汁治經絡之痰最效痰中帶血者宜加韭汁海粉熱痰能清濕痰能燥堅痰能軟頑痰能消可入丸藥亦可入煎藥南星半夏治風痰濕痰石膏堅痰火極效黃芩治熱痰假其下行也枳實治痰有衝牆倒壁之功五倍子能治老痰佐以他藥大治頑痰人鮮知也天花粉治熱痰酒痰最效又云大治膈上熱痰元明粉治熱痰老痰速效能降火軟堅故也硝石蒙石大能消痰結降痰火研細末和白糖置手心中以舌餂服甚效蒼朮治痰飲成窠囊行痰極效又治痰挾瘀血成窠囊者即神朮丸之類潤下丸降痰最效可常服小胃丹治實痰積飲必用之藥不過二三服而已虛者不可用之中氣不足之痰須用參朮內傷挾痰必用參芪白朮之屬多用薑汁傳送或加半夏茯苓中焦有痰胃氣亦賴所養卒不可用峻攻攻盡則大虛矣

家傳吐法

先君壽峰公少壯時素稱善飲後年及四旬而酒病起遂得痰飲之疾多見嘔酸脹滿飲食日減眩運不支驚惕恍惚痎瘧等證相繼迭出百方治痰弗獲寸效因慕張子和吐法之妙遂遵而用之初用獨聖散茶調散及韭汁之類一吐而稍效再吐而再效自此屢用不止雖諸痰漸退而元氣弗復也如此年餘漸覺純熟忽悟其理遂全不用藥但於五鼓食消之後徐徐嚥氣因氣而提提不數口而清涎先至再提之則膠濁隨後自後凡遇諸疾無論表裏虛實雖變出百端絕不服藥但一行吐法無不即日盡却後至六旬之外則一月或半月必行一次全不憚煩而鶴髮童顏日增矍鑠斯時也賓將弱冠漸已有知恐其吐傷因微諫曰吐本出痰豈諸病皆可吐耶且吐傷元氣人所共知矧以衰年能無慮乎先君曰吐以治痰人所知也吐治百病爾知之乎吐能傷氣爾所知也吐能生氣爾亦知乎余當爲爾細談之夫先哲中之善治痰積者無如子和之三法及丹溪之倒倉在倒倉之法不易行亦未敢有用之者惟子和之法則爲人所常用而取效不爲不速亦不爲不多也今以余法言之則有不同者矣蓋子和之吐用藥而吐者也藥必苦劣吐必勇猛勢不由我不能無傷也余之吐不用藥而吐者也痰隨氣行氣因痰至徐疾自如有益無損者也子和之法其用在急故但攻有餘之實痰余之法其用在緩故可兼治不足之百病夫百病所因本自不一何以皆宜於吐如痰涎壅盛格塞胃脘而清道不通者不得不吐也積聚痛急不易行散者不得不吐也膠固稠濁非藥所能消者不得不吐也痰在經絡膜竅及隱伏難狀等痰其藏深其蓄遠藥所難及者不得不吐也此皆人所易知者也又若風寒外感者吐能散之食飲內傷者吐能清之火鬱者吐能發越熱邪實盛者吐能鼓動陽氣諸邪下陷者吐有升舉之功諸邪結聚者吐有解散之力且人之百病無非治節不行吐能達氣氣從則無所不從而何有於病故凡有奇怪難治之病醫家竭盡其技而不能取效者必用吐法方見神功此又人所罕知者也再如生氣之說則不惟人不知而且必不信茲余力行身受始悟其微蓋天地不息之機總爲升降二氣升本乎陽生長之道也降本乎陰消亡之道也余之用氣借此升提可疾可徐吐納自然之生意無殘無暴全收弗藥之神功故凡吐之後神氣必倍王爾之所見也陽道必勃然我之常驗也使非吐能生氣而能如是乎蓋道家用督余則用任所用不同所歸一也不惟却病而且延年余言非謬爾切識焉賓奉此教常習用之無不效如響應第不及先君之神妙耳憶自軒岐之後善用吐法者惟子和一人若以先君法較之則其難易優劣奚啻霄壤而所謂亙古一人者當不在子和矣倘智者見同則必有踵而行之而蒙惠將來者自應不少第恐百世之下泯此心傳妙道故詳錄語訓以爲之記並列其詳法於左

先君行吐之法每於五鼓睡醒之時仰臥用噯提氣氣有不充則嚥氣爲噯隨嚥隨提痰涎必隨氣而至

雖以最深之痰無不可取但最後出者其形色臭味甚有紫黑酸惡不堪言者所以每吐之後或至脣腫咽痛但以凉水一二口嗽嚥解之吐畢早膳悉屏五味但用淡粥一二椀以養胃中清氣自四旬之後絕不用酒行吐法者四十餘年所以愈老愈健壽至八旬之外猶能登山及燈下抄錄古書後以無病忽一旦含笑而辟穀時年八旬二矣

治痰之本

夫人之多痰悉由中虛而然蓋痰卽水也其本在腎其標在脾在腎者以水不歸原水泛爲痰也在脾者以食飲不化土不制水也不觀之强壯之人任其多飲多食則隨食隨化未見其爲痰也惟是不能食者反能生痰此以脾虛不能化食而食卽爲痰也故凡病虛勞者其痰必多而病至垂危其痰益甚正以脾氣愈虛則全不能化而水液盡爲痰也然則痰之與病病由痰乎痰由病乎豈非痰必由於虛乎可見天下之實痰無幾而痰之宜攻者亦無幾故治痰者必當温脾强腎以治痰之本使根本漸充則痰將不治而自去矣

論經絡痰邪

余嘗聞之俗傳云痰在周身爲病莫測凡雍瘓瘓瘡半身不遂等證皆伏痰留滯而然若此痰飲豈非邪類不去痰邪病何由愈余曰汝知痰之所自乎凡經絡之痰蓋卽津血之所化也使果營衛調和則津自津血自血何痰之有惟是元陽虧損神機耗散則水中無氣而津凝血敗皆化痰耳此果痰也果精血也豈以精血之外而別有所謂痰者耶若謂痰在經絡非攻不去則必并精血而盡去之庶乎可也否則安有獨攻其痰而精血自可無動乎津血復傷元氣愈竭隨去隨化痰必益甚此所以治痰者不能盡而所盡者惟元氣也矧復有本無痰氣而妄指爲痰以誤攻之者又何其昧之甚也故凡用治痰之藥而涎痰丸搜風順氣丸之類必其元氣無傷偶有壅滯而或見微痰之不清者乃可暫用分清豈云無效若病及元氣而但知治標則未有不日用而日敗者矣

論非風痰證

治痰之法凡非風初病而痰氣不甚者必不可猜其爲痰而妄用痰藥此大戒也若果痰涎壅盛填塞胃膈湯液俱不能入則不得不先開其痰以通藥食之道而開痰之法惟吐爲捷如古方之獨聖散茶調散稀涎散之屬皆吐痰之劑也但恐元氣大虛不能當此峻利之物或但用新方之吐法爲妥或用牛黃丸抱龍丸之類但使咽喉氣通能進湯飲卽止不可盡攻其痰致令危困則最所當慎以故治痰之法又必察其可攻與否然後用之斯無誤也若其眼直咬牙牀體拘急面赤强勁有力者雖見昏沉亦爲可治先用粗筋之類挖開其口隨以堅實筆幹攩住牙關乃用淡淡薑鹽湯徐徐灌之然後以中食二指探入喉中徐引其吐若指不能入則以鵝翎蘸湯代指探吐亦可如此數次得吐氣通必漸醒矣然後酌宜可以進藥此治實痰壅滯之法也若死證已具而痰聲漉漉於喉間者吐亦無益不必吐也若痰氣盛極而不能吐者亦不治之證又凡形氣大虛者忌用吐法是皆不可攻者若形證已定而痰氣不甚則萬勿治痰但當調理氣血自可漸愈如果痰涎未清則治痰之法當分虛實若氣不甚虛而或寒或熱生痰者宜六安煎二陳湯主之因火爲痰者宜清膈飲及竹瀝童便火甚者抽薪飲主之脾虛兼嘔而多痰者六君子湯或五味異攻散陰氣不足多痰兼燥而渴者金水六君煎陰虛水泛爲痰者六味丸八味丸酌而用之或爲湯亦妙脾腎虛寒不能運化而爲痰者不必兼治痰氣只宜温補根本若中氣虛者理中湯或温胃飲陰不足者理陰煎之類最佳

石室秘錄臣陳士鐸著

痰病

痰治者痰塞於咽喉之間雖是小病而大病實成於此古人所以另立門以治之然而所立之方皆是治痰之標不能治痰之本也故立二陳湯以治上中下新暫久之病然而無實效也今另立三方一治初起之痰一治已病之痰一治久病之痰痰病雖多要不能越吾之範圍也初起者傷風欬嗽吐痰是也用半夏陳皮天花粉茯苓甘草蘇子各一錢水煎服二劑則痰消此方去上焦之痰也上焦之痰原止在胃中而不在肺去其胃中之痰而肺金氣肅何致火之上升乎已病之痰痰在中焦也必觀其色之白與黃而辨之最宜分明黃者乃火已將退也白者火正熾也火熾者宜用寒凉之品火將退者宜加祛逐之品吾今立一方俱可治之白术白芥子各三錢茯苓五錢陳皮甘草梔子各一錢火痰加之枳殼五分水煎服此方係健脾之劑非祛痰之劑也然而痰之多者多由於脾氣之濕今健其脾氣則水濕之氣下行水濕

既不留於脾中又何從而上出兌又加之消痰之聖藥而痰有不安靜速亡者乎至於久病之痰切不可作脾濕生痰論蓋久病不愈未有不腎水虧損者非腎水泛上爲痰即腎火沸騰爲痰此久病之痰當補腎以祛逐之方用熟地薏仁芡實各五錢山茱萸麥冬茯苓山藥各三錢北五味車前子各一錢益智仁三分水煎服此治水泛爲痰之聖藥若火沸爲痰者內加肉桂一錢此方之妙絕是補腎之味而又兼祛濕之品化痰之味水入腎宮自變化爲眞精又安有升騰爲痰者乎此治下焦有痰之法也有此三方再看何證出入加減治痰無餘事矣

尚有二方治痰之久而成老痰者方用柴胡甘草各一錢白芥子薏仁各五錢茯苓白芍各三錢陳皮三分丹皮二錢天花粉八分水煎服此方妙在用白芥子爲君薏仁白芍爲臣柴胡花粉爲佐使老痰無處可藏自然漸漸消化此方可用八劑老痰無不消者方名消濁散又方治頑痰成塊而塞在咽喉者爲頑痰凿在胃腸而不化者爲老痰方用紫菀二錢半夏貝母茯苓桔梗白朮神麴各三錢白礬甘草各一錢水煎服此方妙在貝母與半夏同用一燥一濕使痰無處藏避又有白礬以消塊桔梗紫菀以去邪甘草調停中央有不奏功如響者乎

人患痰病久不愈用猪肺頭一箇蘿蔔子五錢研碎白芥子一兩研碎五味調和飯鍋蒸熟飯後頓食一箇即愈此方治上焦之痰湯藥不能愈者神驗蓋久留於肺上而盡消其膜膈之痰亦治之最巧者

中痰方用人參白朮茯苓各三錢附子天南星各一錢半夏二錢水煎服下噦即愈蓋痰之生也由於氣之虛而氣之虛也由於臟腑之冷故方中用參朮以補正氣用半夏南星茯苓以祛痰用附子以溫中所以一下喉而痰聲靜痰氣清也

如人上焦壅滯痰塊不上不下築在胃間氣喘欲嘔不能欲吐不能者法當用陰陽水探吐之或用瓜蒂藜蘆煎汁飲之即吐然必痰氣與火結住在胃間作痛者始可用此法吐之否則斷斷不可蓋人之元氣不可一傷吐一次則五藏反覆必損壽元故必問其人胃痛否氣塞否喉間有所礙否痰吐出黃否有此數種始可用前藥以吐之

吐不可輕用不知禁忌而妄吐之必致五藏反覆不寧必須看其痰吐在壁上如蝸牛之涎有光亮者放心吐之餘則皆忌但看其光亮者無論其痰在上中下此光亮之色必須俟其痰跡乾而分辨之不可據其濕痰時而即以爲光亮也已

中氣而又中痰雖若中之異而實中於氣之虛也氣虛自然多痰痰多必然耗氣雖分而實合耳方用人參一兩半夏茯苓南星各三錢附子甘草各一錢水煎服中氣中痰之證俱愈蓋人參原是氣分之神劑而亦消痰之妙藥半夏南星雖是逐痰之神品而亦扶氣之正神附子甘草一仁一勇相濟而成大敵用於三味之中扶正必致祛邪蕩痰必然益氣分合而無分合之形奇絕而有神化之妙又不可不知

氣治者氣病實多吾亦舉其大者言之如氣逆痰滯是也夫痰之滯非痰之故乃氣之滯也苟不利氣而惟治痰吾未見痰去而病消也方用白朮二錢茯苓二錢人參陳皮天花粉白芥子神麴蘇子各一錢豆蔻三粒水煎服此方之妙在治痰之中而先理氣氣順則痰活氣順則濕流通而痰且不生矣此氣治之宜知可即一方而悟滿氣之法

氣虛痰多之證痰多本是濕也而治痰之法又不可徒去其濕必須補氣爲先而佐以消痰之品方用人參半夏茯苓各三錢薏仁五錢神麴陳皮甘草各一錢水煎服此方雖有半夏陳皮消痰然不多用人參則痰不消有人參以助氣有薏仁茯苓之類自能健脾以去濕濕去而痰自除此氣治之一法也更有氣虛痰寒者即用前方加肉桂三錢乾薑五分足矣氣虛痰熱者不可用當用麥冬白芍當歸各三錢天花粉甘草陳皮白芥子各一錢茯苓二錢神麴三分水煎服此方之妙在不燥而又是補氣之劑潤以化痰痰去而氣自足也得此二方則治氣無難又有腎水上泛吐痰傾盆者亦宜用六味湯加附子肉桂煎湯數椀飲之而愈者凡腎水腎火之虛上焦雖見熱證而其舌終滑而不燥非若陽證之乾極而起刺也

肥人多痰乃氣虛也虛則氣不能運行故痰生則治痰必須補氣兼消其痰耳然補氣又不可純補脾胃之土當兼補其命門之火蓋火能生土而土自生氣氣足而痰自消不治痰正所以治痰也方用人參杜仲白芥子各二兩白朮薏仁芡實各五兩熟地八兩山萸四兩肉桂茯苓各二兩砂仁五錢益智仁橘紅五味各一兩爲末蜜丸每日白滾水送下五錢此方之佳全在肉桂補命門心包之火心包之火足自能開胃去痰命門之火足始能健脾去濕況方中純是

補心補腎之味肉桂於補藥之中行其地天之泰水自歸經痰從何積此肥人之治法有如此

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百六十卷目錄

醫部彙考二百四十

痰門三

方一　苓桂术甘湯　十棗湯　小青龍湯　木防己加茯苓芒硝湯　防己椒目葶藶大
　　防己加茯苓芒硝湯　椒目葶藶大
　　苓甘五味加薑辛夏杏仁湯　苓甘五味加薑辛
　　半夏杏仁湯　苓甘五味加薑辛杏大黃湯　小
　　水煮金花丸　導痰湯　搜風化痰丸　小
　　黃丸　白术丸　玉粉丸　薤根丸　桔梗湯
　青龍湯　澤瀉湯　倍术丸　大五飲丸　五
　飲湯　瀉痰丸　利痰丸　導痰丸　松花膏
　丁香五香丸　二陳湯　入神朱復丹　六
　君子湯　理中化痰丸　橘皮湯　前胡半夏
　湯　化痰順氣丸　半夏利膈丸
　破堅消飲丸　沉香墜痰丸
　茯苓丸　神仙醒脾丸　搜飲丸　又方　破
　飲丸　八珍丸　鵝梨煎丸　麝香丹砂丹
　金珠化痰丸　皂角化痰丸　法製清氣化痰
　丸　飛礬丸　黑矾丸　法製半夏舟車神
　祐丸　大聖滾川散　枳术湯　赤石脂散
　二生湯　黎石丸　木香丸　大人參半夏丸
　蝎皮半夏湯　星蠶湯　王粉丸　生半夏
　湯　半夏丸　白术湯　五飲丸　二賢散
　又方　駐痰湯　大半夏湯　白术湯　茯苓
　飲子　化痰丸　加味二陳湯　三仙丸　神
　朱丸　犀半丸　一水丸　小黃丸　潤下丸
　瓦粉丸　甘遂丸　竹瀝丸　流金丹　滾下丸
　苓二陳湯　清膈導痰湯　老痰丸　黃芩利
　膈丸　芫薑半夏丸　青黛丸　加味潤下丸

藝術典第二百六十卷

醫部彙考二百四十

痰門三

方一

苓桂术甘湯　仲景

苓桂术甘湯下同

治心下有痰飲胷脇支滿目眩

茯苓四兩　桂枝　白术各三兩　甘草二兩

右四味以水六升煮取三升分溫三服小便則利

十棗湯

治懸飲

芫花熬　甘遂　大戟各等分

右三味揭篩以水一升五合先煮肥大棗十枚取八合去滓內藥末强人服一錢匕羸人服半錢平旦溫服之不下者明日更加半錢得快之後糜粥自養

小青龍湯

治溢飲

芍藥　甘草炙　乾薑　桂枝去皮　細辛各三兩　半夏湯洗　五味子各半升

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升

木防己加茯苓芒硝湯

治支飲

木防己　桂枝各二兩　人參　芒硝三合　茯苓四兩

右五味以水六升煮取二升去滓內芒硝再微煎分溫再服微利即愈

防己椒目葶藶大黃丸

治腹滿口舌乾燥此腸間有水氣

防己　椒目　葶藶熬　大黃各一兩

右四味爲末蜜丸如梧子大先食飲服一丸日三服稍增口中有津液渴者加芒硝半兩

五苓散

瘦人臍下有悸吐涎沫而癲眩此水也此方主之

澤瀉一兩一分　猪苓　茯苓　白术各三分　桂去皮二分

右五味爲末白飲服方寸匕日三服多飲暖水汗出愈

外臺茯苓飲

治心胷中有停痰宿水自吐出水後心胷間虛氣滿不能食消痰氣令能食

茯苓　人參　白术各二兩　橘皮二兩半　枳實二兩　生薑四兩

右六味水六升煮取一升八合分溫三服如人行八九里進之

桂苓五味甘草湯

治飲家氣衝

桂枝去皮　茯苓各四兩　甘草炙三兩　五味子半升

右四味以水八升煮取三升去滓分溫三服

苓甘五味薑辛湯

治飲家欬滿

白茯苓四兩　甘草　乾薑　細辛各三兩　五味半升

右五味以水八升煮取三升去滓溫服半升日三

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯

治支飲水去嘔止形腫者

茯苓四兩　甘草　乾薑　細辛各三兩　杏仁去皮尖　半夏　五味各半升

右七味以水一斗煮取三升去滓溫服半升日三

苓甘五味加薑辛半杏大黃湯

治支飲胃熱上冲其面致面熱如醉者

茯苓四兩　甘草　乾薑　細辛　大黃各三兩

五味子　半夏　杏仁各半升
右八味以水一斗煑取三升去滓溫服半升日三
水煑金花丸 [illegible]
治一切痰
天南星　半夏各一兩俱生用　天麻五錢
雄黃二錢　白麪三錢
右爲細末滴水爲丸小豆大每服五十丸至百丸
先煎漿水沸下藥煑令浮爲度漉出淡漿水浸另
用生薑湯下一方有寒水石一兩煅存性
導痰湯 [illegible]
治痰涎壅盛胷膈留飲痞塞不通
半夏湯洗七次四兩　南星炮去皮　枳實麩炒
赤茯苓去皮　橘紅各一兩　甘草炙半兩
右㕮咀每服四錢水一盞薑十片煎八分食後溫
服
搜風化痰丸 [illegible]
治風痰
人參　殭蠶　槐角　白礬　天麻　陳皮去白
荊芥各一兩　半夏四兩湯浸　辰砂半兩
右爲末薑汁研蒸餅爲丸除辰砂爲衣每服四十
丸薑湯下
小黃丸 [illegible]
治熱痰欬嗽
南星湯洗　半夏湯洗　黃芩各一兩
右爲細末薑汁浸蒸餅爲丸桐子大每服五七十
丸生薑湯下食後
白朮丸

治濕痰欬嗽
南星　半夏各一兩俱湯洗　白朮一兩半
右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧子大每服五七十
丸食後生薑湯下
玉粉丸
治氣痰欬嗽
南星　半夏各一兩俱湯洗　橘皮去白二兩
右爲細末湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服五七十
丸人參生薑湯下食後
薑桂丸
治寒痰欬嗽
南星洗　半夏洗　官桂去粗皮各一兩
右爲細末蒸餅爲丸桐子大每服三五十丸生薑
湯送下食後
桔梗湯 [illegible]
除痰下氣治胷脅脹滿寒熱嘔噦心下堅痞短氣
煩悶痰逆惡心飲食不下
桔梗細剉微炒　半夏湯浸洗七次薑汁製
陳皮去白各十兩　枳殼麩炒赤黃色五兩
右爲粗末每服二錢水一中盞入薑五片同煎至
七分去滓不拘時溫服
小半夏加茯苓湯 [illegible]
治痰飲
半夏一升　茯苓三兩　生薑半斤
每服五錢水一盞半煎七分服無時
川芎丸 [illegible]
治膈上痰

川芎二兩細剉慢火熬熟　大黃二兩蒸令乾
右件焙乾爲末用不蛀皂角五七挺溫水揉汁絹
濾出查瓦罐中熬成膏和前二味爲丸如桐子大
每服十五丸小兒三丸薑湯下
小胃丹
治壯實人痰飲
芫花酢拌勻一宿瓦器內不住手攪炒黑不可焦
甘遂水調麪裹煨長流水中浸半日煑曬乾
大戟長流水煑一時再用水洗曬乾各半兩
大黃濕紙裹煨勿焦切焙乾酒潤炒熟焙乾兩半
黃蘗炒三兩
右爲末以白朮膏丸如蘿蔔子大臨臥津液吞下
或白湯送下取膈上濕痰熱積以意消息之欲利
空心服一方加木香檳榔各半兩
大青龍湯 [illegible]
治寒鬱痰水
麻黃六兩去節　桂枝二兩去皮　甘草二兩炙
杏仁四十粒去皮　石膏如雞子大碎如米
生薑三兩切　大棗十二枚擘
右七味以水九升先煎麻黃減二升去上沫內諸
藥煎取三升去查溫服一升
澤瀉湯
治脾虛水泛爲痰
澤瀉五兩　白朮二兩
水二升煎一升分溫再服
倍朮丸 [illegible]
治五飲一曰留飲停水在心下二曰澼飲水在兩

脅三日痰飲水在胃中四日溢飲水溢在膈五日流飲水在脅間瀝瀝有聲皆由飲水過多或飲冷酒所致

白朮二兩　桂心　乾薑各一兩

右爲末蜜丸每服二十丸溫米飲下加至三十丸食前服

大五飲丸 千金翼

治五飲

遠志　苦參　藜蘆　白朮　鷓鴣骨　甘遂

大黃　石膏　桔梗　五味子　半夏泡　紫菀

前胡　芒硝　苦蔞　桂心　肉蓯蓉　貝母

芫花　人參　當歸　茯苓　芍藥　大戟

葶藶　黃芩各一兩　常山　甘草　薯蕷

厚朴　細莘各七錢半　巴豆三十粒去皮心熬

右三十二味爲細末煉蜜丸桐子大酒下三丸日三服稍加之忌肉食生冷物餳飴冷水

五飲湯 海藏

治五飲最效

旋覆花　人參　陳皮去白　枳實　白朮

茯苓　厚朴製　澤瀉　猪苓　前胡　半夏製

桂心　白芍藥　甘草炙各等分

右每一兩分四服薑十片水二盞煎至七分去查溫服無時因酒成飲加葛根葛花砂仁

滾痰丸 養生主論

治一切痰病

大黃蒸少頃翻過再蒸少頃卽取出不可過

黃芩各八兩　青蒙石硝煅如金色　沉香

百藥煎各五錢

右爲末水丸如桐子大白湯食後空心服此用百藥煎乃得之方外祕傳蓋此丸得此藥乃能收斂周身頑涎聚於一處然後利下甚有奇功一切新舊失心喪志或癲或狂等證每服一百丸氣盛能食狂甚者加二十丸臨時加減消息之

利痰丸 元珠下同

治痰飲

南星　皂角　石膏　牽牛頭末　芫花各二兩

右爲細末用薑汁糊丸如桐子大每服一二十丸量人虛實用之薑湯下一方加青鹽五錢巴豆少許青蒙石硝煅如金色五錢若風痰壅塞此藥乃爲先鋒服之痰卽已如寒不宜用

導痰丸

治一切痰

大半夏六兩分作三分一分用白礬一兩爲末水浸一分用肥皂角炙爲末水浸一分用巴豆肉一百粒爲末水浸

右件餘藥在下以半夏在上浸至十日或半月要常動水用二藥相透次相合處揀去巴豆並皂角將餘水以慢火煑令水乾取出半夏切搗碎曬乾或陰乾亦佳後入

甘遂製　百藥煎各二兩　全蠍　殭蠶各一兩

右爲細末薄糊丸如桐子大每服十丸或十五丸亦量人虛實白湯下

松花膏

治三二十年勞嗽預九月間宣利一切痰涎肺積

喘嗽不利

防風　乾生薑　野菊花　芫花　枸杞子

甘草　蒼朮　黃精等分

右爲末取黃精根熬成膏子和藥末丸如彈子大每細嚼一丸冷水下臨臥不喫夜飯服藥一粒

丁香五套丸 和劑下同

治胃氣虛弱三焦痞澀不能宣行水穀故爲痰飲結聚胷膈嘔吐惡心脹滿不食常服溫脾順氣

南星每箇切作十數塊同半夏水浸三日每日易水次用白礬二兩碎研調水內再浸三日洗淨焙乾

半夏切破各二兩　乾薑炮　白朮　良薑

茯苓各一兩　丁香不見火　木香　陳皮去白

青皮各半兩

右爲末用神麴一兩大麥蘖二兩同研取末打糊丸如梧桐子大每服五十丸加至七十丸不拘時溫熟水送下

二陳湯

治痰飲爲患或嘔逆惡心或頭眩心悸或中脘不快或食生冷飲酒過度脾胃不和並宜服之

半夏湯洗七次　橘紅各五兩　白茯苓三兩

炙甘草一兩半

右㕮咀每服四錢水一盞薑七片烏梅一枚煎六分不拘時熱服

入神來復丹 濟生方

治陽虛氣逆多痰

硝石一兩同硫黃爲末磁器內以微火炒用柳篦攪不可火太過恐傷藥力再研極細名二氣末

五靈脂水澄清濾去砂石曬乾　青皮去白
陳皮去白各二兩　船上硫黃　沉香　木香
天南星　太陰元精石飛研各一兩
右爲末飛麵糊丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲送下

六君子湯

治脾胃虛弱生痰
人參　白朮　茯苓　陳皮　半夏製各一錢
炙甘草五分
水二盞薑五片煎至一鍾去滓不拘時溫服

理中化痰丸

治脾胃虛寒痰涎內停嘔吐少食或大便不實飲食難化欬唾痰涎此中氣虛弱不能統涎歸源也
人參　白朮炒　乾薑　甘草炙　白茯苓
半夏薑製
右爲末水丸桐子大每服四五十丸白湯下

橘皮湯

治胃膈停痰
橘皮　白茯苓　半夏各一錢五分　旋覆花
青皮　桔梗　枳殼薑製　細辛　人參各一錢
甘草半錢
右作　服用水二鍾薑五片煎一鍾食遠服

前胡半夏湯

治痰盛
前胡　半夏薑製　茯苓各二錢　陳皮　木香
紫蘇　枳殼　甘草各一錢
右水二鍾生薑三片烏梅一箇煎至一鍾食遠服

化涎散

治熱痰利胃膈止煩渴
凝水石煅研一兩　鉛白霜另研　馬牙硝另研
雄黃另研各一錢　白礬枯　甘草炙各二錢半
龍腦少許
右爲細末研勻每服一錢不拘時水調下小兒風熱痰涎用砂糖水調下半錢此藥太凉不可多服

辰砂化痰丸

治風痰安神志利咽膈清頭目
辰砂飛　白礬枯研各半兩　天南星炮一兩
半夏麴三兩
右爲細末薑汁煮麵糊和丸如桐子大用前辰砂爲衣每服三十丸食後生薑湯下

半夏利膈丸

治風痰壅盛頭疼目眩咽膈不利滯唾稠粘並治酒過停飲嘔逆惡心胃脘引痛腹內有聲
半夏湯洗三兩　白附子生用二兩　白礬生用
白茯苓　人參　白朮　滑石　貝母各一兩
天南星生用一兩半
右爲細末麵糊和丸如梧子大每服三十丸食後薑湯下

破痰消飲丸

治一切停痰留飲
陳皮去白　川薑炮　三稜炮搥碎　蓬朮炮
草果剉裹煨　良薑濕紙裹煨　青皮各一兩
半夏湯泡七次三兩
右爲細末水煮麵糊和丸桐子大陰乾每服五十丸食遠薑湯送下

化痰鐵刷丸

治男婦風痰酒痰茶痰食痰氣痰一切痰逆嘔吐頭疼目眩肺痿咯嗽聲如拽鋸並皆治之此藥堅痰止嗽定喘
白附子炮　南星炮　半夏洗　白礬生各半兩
寒水石　皂角去子弦各一兩　乾薑七錢半
硇砂　輕粉各一錢
右爲細末水煮麵糊和丸如梧子大每服二三十丸食後用淡薑湯下

沉香墜痰丸

治宿食不消咽膈不利欬嗽痰涎頭目昏運嘔逆惡心胃膈不快
沉香　木香各二錢　青皮去白二錢五分
檳榔大者二枚用麪裹煨熟　半夏麴二兩
右爲細末用生薑汁浸蒸餅和丸如小豆大每服二十丸不拘時薑湯下

茯苓丸

本治臂痛具指迷方中云有人臂痛不能主手足或左右時復轉移由伏痰在內中脘停滯脾氣不流行上與氣搏四肢屬脾脾滯而氣不下故上行攻臂其脈沉細者是後人爲此臂痛乃痰證也但治痰而臂痛自止
風化硇砂二錢五分如一時難成以仆硇撒在竹盤中少時盛木置當風處即乾如芒硝括取用亦可
半夏二兩　茯苓一兩　枳殼去瓤麩炒半兩
右爲細末生薑汁煮麵糊和爲丸如梧子大每服

三十九薑湯送下累有人爲痰所苦夜間兩臂如人抽牽兩手戰掉茶盞亦不能舉服此隨愈痰藥方多惟此立見功效

神仙墜痰丸

治痰飲胃膈痞塞此藥下痰

皂角無蟲蛀者去皮弦酥炙黃去子淨一兩六錢　白礬一兩二錢生用　黑牽牛一斤去頭末四兩

右爲細末滴水丸如梧子大每服三十丸漸加至百丸空心溫酒送下看病輕重輕者五日十日愈重者半月一月愈久服永無癰瘵之疾

搜飲丸

治前證

木瓜一枚切下頂去瓤　生白礬　半夏麴等分

右二味爲細末填入木瓜內却用原頂蓋定麻纏紮縛於飯甑上炊二次研爛以宿蒸餅和丸如梧子大每服三五十丸不拘時薑湯下

又方

治懸飲心腹氣滯兩脅多疼

皂角六兩三兩去黑皮酥炙令黃搗爲末二兩去皮子搗碎以酒一升揾取汁去滓煎成膏將半夏以膏和成餅以青蒿蓋出青衣如造麴法搗羅爲細末

旋覆花一兩　半夏三兩　木香　檳榔各二兩

右爲細末酒煮麪糊和丸如桐子大每服二十丸食前用薑湯下

破飲丸

治五飲停蓄胃膈呼吸之間痛引兩脅脹滿氣促胃腹結爲癥癖支滿胃膈旁及兩脅搶心疼痛飲食不下反胃吐逆九種心痛積年宿食不消久癆久痢遁尸疰忤顛癇厥逆心氣不足憂愁思慮婦人腹中諸病悉能治之

蕪荑　丁香不見火　縮砂仁　蠍梢　烏梅肉　木香不見火　青皮　胡椒　巴豆去皮膜各等分

右將青皮巴豆以漿水同浸一宿次日濾出同炒青皮焦去巴豆水淹烏梅肉蒸一炊久細研爲膏入藥末和丸菉豆大每五七丸臨臥生薑湯下

八珍丸

治膈痰結實滿悶喘逆

丹砂研半兩　犀角鎊　羚羊角鎊　牛黃研　龍腦研各二錢半　膽星　茯神　硼砂研各一兩

右爲細末研勻煉蜜和丸如雞頭實大每服一丸食後細嚼人參荊芥湯下

鵝梨煎丸

治熱痰凉心肺利胃膈解熱毒補元氣

大鵝梨二十枚去皮核取汁　白蜜半升　生地半斤取汁　不蛀皂角十挺去皮子水二升揾濃汁　薄荷生半斤研汁共上五味慢火熬膏和下藥

人參　白茯苓去皮　白蒺藜炒去刺　木香　蓯蓉酒浸切焙　牛膝酒浸　半夏湯泡各一兩　檳榔煨二兩　防風　桔梗炒　羌活　青橘皮　白朮　山藥各七錢半　甘草炙半兩

右爲細末同前膏拌勻杵令得所丸如梧子大每服十五丸加至二十五丸食後荊芥湯送下日二服

麝香丹砂丹

治痰熱咽膈不利頭目昏痛

丹砂另研一兩　麝香另研　木香　丁香　犀角　甘草炙各二錢半　龍腦另研一錢

人參　藿香去梗　牛膽南星　防風去叉　黃芪各半兩　麥門冬去心七錢半

右爲細末煉蜜和丸如雞頭實大每服一丸食後嚼破用荊芥湯下

金珠化痰丸

治痰熱安神志除頭疼眩運心忪恍惚胃膈煩悶涕唾稠黏咳嗽咽塞不利

半夏湯浸洗七次生薑二兩去皮搗作餅炙微黃　皂角仁炒　白礬枯另研　天竺黃另研各四兩　龍腦另研半兩　辰砂水飛研二兩

右將皂角仁半夏爲末與諸藥研勻生薑汁煮麪糊丸如梧子大金箔二十片爲衣每服十五丸加至二十五丸食後薑湯下

皂角化痰丸（東垣十書）

治勞風心脾壅滯痰涎盛多喉中不利涕唾稠黏嗌塞吐逆不思飲食或時昏憒

皂角木白皮酥炙　白附子炮　半夏湯洗七次　天南星炮　白礬枯　赤茯苓　人參各一兩　枳殼炒二兩

右爲細末生薑汁麪糊丸如梧子大每服三十丸溫水送下食後

法製清氣化痰丸

順氣快脾化痰消食

半夏　南星去皮臍　白礬　皂角　乾薑各四兩

右先將白礬皂角乾薑三味用水五椀煎取水三

椀却入半夏南星二味浸二日再煎至半夏南星無白點爲度曬乾入後藥

陳皮　青皮去穰　紫蘇子炒　蘿蔔子炒另研　杏仁去皮尖炒研　葛根　神麯炒　麥蘗炒　山楂　香附各二兩

右爲末蒸餅丸梧子大每服五七十丸臨臥食後茶湯下

飛礬丹

化痰神效

白礬二兩枯　白殭蠶一兩半用米醋浸一宿炒

南星切片用皂角一兩五錢去皮弦用水一小盞同熬水盡去皂角用南星　半夏湯洗七次各一兩

右爲末薑汁糊丸如梧子大水丸亦可每服十五丸至二十丸薑湯下

黑芥丸　出普濟方

治冷痰痞滿

黑芥子炒　白芥子炒　大戟　甘遂　胡椒

桂心各等分

右爲末糊丸梧子大每服十丸薑湯下

法製半夏　出衛生家寶方

消飲化痰壯脾順氣

大半夏湯洗泡七遍以濃米泔浸一日夜每半夏一兩用白礬一兩半研細溫水化浸半夏上常水兩指許頻攪冬月於煖處頓放浸五日夜取出焙乾用鉛白霜一錢溫水化又浸一日夜通七日盡取出再用衆水慢火煎勿令滾候藥水極熱取出焙乾

右以磁器收貯每服一二錢食後細嚼溫薑湯下

又一法依前製成半夏每一兩用白礬水少許漬半夏細飛硃砂末淹一宿斂乾焙用依前法亦可用生薑自然汁漬焙用

舟車神祐丸　出子和下同

治一切壯實痰飲

甘遂　芫花　大戟各一兩俱醋炒　大黃二兩　黑牽牛頭末四兩　青皮　陳皮　木香不見火檳榔各半兩　輕粉一錢

右爲末水丸空心服初服二丸每服加二丸至快利爲度以意消息小兒蘇子大隨强弱增損三四歲者三五丸依前法加減至取蟲加蕪荑半兩

大聖溶川散

治實痰

大黃煨　牽牛取頭末　椰李仁各一兩　木香　芒硝各三錢　甘遂半錢

右爲末量病輕重服

枳术湯　出衛生方下同

治飲癖氣分心下堅硬如杯水飲不下

枳實麩炒二分　肉桂去皮　桔梗炒　檳榔　甘草炙各三分　附子炮去皮臍　白术炒　細辛各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至七分去滓溫服不拘時候

赤石脂散

治引飲過多遂成痰飲吐水無時服諸痰藥不效者

赤石脂煅二兩

右爲細末每服二錢用薑湯或酒調服不拘時候

二生湯

專治痰

附子生去皮臍　半夏生等分

右㕮咀每服四錢水二盞生薑十片煎至七分去滓溫服空心入少木香煎尤佳

蒙石丸　出中藏

治停飲冷痰

礞砂一兩用米醋三升化開　巴豆霜二兩半二味同入醋煮兩食久　青蒙石半兩研　京三棱一兩醋浸一宿煨二味次入煮半食久入前醋中煮白礬二兩酒半升化次入煮半食久　大黃一兩半作三分一分生一分炒一分煨次入煮半食入

木香　以下爲細末　檳榔　肉豆蔻　肉桂　乾薑炮　猪牙皂去皮炙　丁香　蓬莪术　芫花醋浸一宿炒微令有烟各一兩　青皮　白豆蔻　好墨燒八分過各半兩　胡椒　粉霜研各一分

右次第煮了次入木香等十四味熬成膏丸如菉豆大每服三丸酒飲薑湯任下

木香丸　河間下同

和脾胃寬胷膈消痰逆止嘔吐進益美飲食

官桂　乾薑　大黃　蓬莪术　枳殼去穰　芫花醋拌濕炒乾　陳皮各半兩　木香一分　半夏二兩　牽牛半斤取頭末四兩　巴豆四箇　茴香一兩炒

右爲末滴水爲丸小豆大每服二三十丸溫水下大人參半夏丸

化痰墜涎止嗽定喘諸痰證不可盡述

人參　茯苓　南星　薄荷葉各半兩　白礬生　寒水石　半夏　乾薑　蛤粉各一兩　藿香一分

右爲末粥糊丸如小豆大生薑湯下二三十丸食後溫水亦得一法加黃連半兩黃蘗二兩水丸取效愈妙治酒病調和腑臟尤宜服之

橘皮半夏湯

治痰壅涎嗽久不已者常服養液潤燥解肌熱止欬嗽

橘皮半兩去白　半夏二錢半湯洗七次

右爲末分作二服每服水一盞半入生薑十片同煎至七分去滓溫服

星薑湯

治風痰

南星五錢一箇製　老生薑三錢半

右咀水三盞煎去半逐漸溫服

玉粉丸

治痰結咽喉不利語音不出

半夏洗五錢　草烏炒　桂各一字

右同爲末生薑汁浸蒸餅爲丸如雞頭大每服一丸至夜含化多歲不愈者亦效

生半夏湯

治濕痰

半夏不以多少洗七遍切作片子

右每服秤三錢水一盞半入生薑五大片同煎至一盞和滓食後服一日三二服服三日畢再服枳朮丸盡其痰爲度論曰先消胃中氣後去腸上痰再服枳朮丸謂首尾合盡消其氣令痰不復作也

半夏丸

治因傷風而痰作喘逆兀兀欲吐惡心欲倒已吐加橘椰三錢

半夏一兩湯洗切　雄黃研三錢

右同爲末生薑汁浸蒸餅爲丸桐子大每服三十丸生薑湯下小兒丸如黍米大

白朮湯

治痰潮上如湧泉久不可治者

白朮　白茯苓　半夏等分

右爲末每服半兩病久者一兩水二盞生薑七片煎至一盞取清調神麴末二錢頓服之病甚者下玉壺丸一百粒大效永除痰根

五飲丸 出方

治一切停痰留飲理脾順氣消食寬胃

青皮　陳皮　枳實炒　茯苓　白礬各一兩　半夏　南星　白朮炒　皂角　生薑搗各二兩　香附子　眞蘇子　山楂肉　神麴炒各半兩

右以南星半夏並製過同皂角白礬生薑煮南星無白點爲度以南星半夏焙乾同前藥爲末竹瀝薑汁作糊爲丸如梧桐子大每服五七十丸食後或臨臥白湯送下

二賢散 和劑下同

治一切痰飲

橘紅二斤　炙甘草　食鹽各四兩

右水五椀慢火煮焙乾搗爲細末白湯點服

又方

治痰極有效世人但知用南星半夏枳實茯苓之類何足語此有人腹滿堅痛服此利下物數塊如彈子臭惡不可近腹滿疾愈然頓愈

橘紅四兩　甘草一兩

右爲細末點服

豁痰湯 許君

治一切痰疾此方與滾痰丸相副蓋以小柴胡湯爲主合前胡半夏南星枳殼紫蘇陳朴之屬出入加減素抱痰疾及肺氣壅塞者以柴胡爲主餘者並去柴胡以前胡爲主

柴胡　半夏各二錢　人參 脈盛有力者不用　桔梗　甘草　紫蘇　陳皮　厚朴　南星　薄荷葉　枳殼　羌活各五分

右水二盞薑五片煎八分不拘時服中風者加獨活胃腸不利者加枳實內外無熱者去黃芩治一切痰氣最效

大半夏湯 御藥

治痰飲及脾胃不和

半夏　陳皮　白茯苓各二錢

右水二盞薑五片煎八分溫服有熱加甘草

白朮湯 救苦

治脾中虛損及吐痰者

半夏麴半兩　白朮　木香　甘草各一錢　茯苓二錢　檳椰二錢半

右爲細末每服一錢生薑湯調下食前服

茯苓飲子 濟生方

治痰飲蓄於心膈怔忡不已

赤茯苓　茯神　半夏　麥門冬　陳皮各一兩
沉香　檳榔　甘草各三錢
右咀每服八錢生薑五片煎八分食後溫服
化痰丸本事方
治停痰宿飲
半夏　茯苓　白朮　香附各一兩　桔梗薑製
人參各八錢　前胡　枳實炒　甘草各半兩
右爲末薑汁麪糊爲丸梧子大薑湯送下四十九
加味二陳湯直指方
治酒麪積熱成痰手臂痛並痰攻眼腫身麻痺
陳皮　半夏　茯苓　甘草　蒼朮　薑黃
枳殼炒各少許
右水二盞薑五片棗二枚煎八分食遠服
三仙丸百一選方
治一切濕痰痰飲胷膈煩滿痰涎不利頭目不清
南星製　半夏製　香附子製各五錢
右用南星半夏泡過爲末用生薑自然汁和不可
太軟用楮葉或荊葉包住以蒲包再包盦令發黃
色曬乾收之須是五六月內造如盦麴法每製丸
藥用星半二兩香附一兩同爲細末麪糊丸如菜
豆大每服四十丸食後薑湯下
神朮丸摩上
治痰飲
茅山蒼朮製一斤　生油麻半兩水二盞研取漿
大棗十五枚煮爛取肉
右三味和丸梧桐子大日乾每服七十丸空心溫
酒下
星半丸丹溪下同
治濕痰
南星　半夏各製一兩　蛤蚧三兩
右爲末薑湯泡蒸餅丸青黛爲衣每服五十九薑
湯送下
二朮丸
治濕痰
白朮六錢炒　蒼朮三錢炒　芍藥二錢半
香附子錢半
右爲末蒸餅丸服
小黃丸東垣下同
化痰涎除濕飲平胃氣利膈
黃芩一兩　半夏　白朮各兩半　乾薑五錢
澤瀉三錢　黃芪二錢
右爲細末蒸餅丸菜豆大每服五十九溫酒下
潤下丸
治膈痰降氣甚妙
陳皮去白一斤鹽水浸　甘草炙一兩
右爲末蒸餅丸菜豆大每服五十九白湯下
瓦粉苦蘆丸秘方下同
治一切頑痰結滯咯吐難出久嗽不已氣塞妨悶
痰火勞嗽並效
瓦壟子一名蚶子將殼火煅酢淬二次研極細末
苦蘆霜後黃熟時取瓤並子和瓦壟粉爛搗爲餅
廣陳皮去白各等分
右各精製曬乾爲末湯浸蒸餅爲丸菜豆大每服
八十九食後臨臥薑湯送下
法製竹瀝丸
清痰降火化痰利膈止嗽止嘔吐進食開胃治勞
嗽
陳皮去白　白朮炒　白茯苓　炙甘草　貝母
半夏麴　枳殼　神麴炒　桔梗　黃芩各三兩
元明粉　香附子製各一兩
右爲粗末用大磁盆以竹瀝一椀入薑汁酒半盞
和勻拌諸藥日中曬乾仍依法入竹瀝薑汁拌曬
七次爲度磨羅爲細末水滴丸如菜豆大食後或
臥時白湯送下八十九三日便見效驗久病者七
日效疲者一月全愈此方得之海上道人祕密不
傳予求以治痰火效如響應
流金膏經驗方
治一切痰欬逆等證
錦大黃不見鐵器搗如豆大酒浸半日九蒸九曬
石膏微煅研各二兩　黃芩酒洗　橘紅各半兩
連翹酒洗　桔梗　川芎　貝母各一兩　膽星
薄荷葉　香附子各半兩
右各精製爲極細末煉蜜爲丸彈子大午後或臨
臥細嚼一丸忌酒麪諸濕熱物
黃芩二陳湯
治熱痰
黃芩　陳皮　半夏　茯苓各一錢　甘草五分
右水盞半薑三片煎七分食遠服可隨證加減
清膈導痰湯
治胃火厚味膈上熱痰咯吐不出欬唾稠黏
花粉　苦葶仁　白朮　白茯苓各八分

石膏　砂硝各一錢半　黃芩　貝母各一錢
桔梗　陳皮　甘草各五分
右水二盞竹葉二十箇洗揉爛煎八分食遠服

老痰丸 [illegible]

潤燥開鬱降火消痰治老痰鬱痰結成黏塊凝滯喉間肺氣不清或吐咯難出皆因火邪炎上凝滯心肺之分宜開鬱降火消痰
天門冬　黃芩酒炒　海粉另研　苦蔞仁另研
橘紅去白各一兩　芒硝研二錢　連蘊　桔梗
香附子淡鹽水浸炒各半兩　青黛另研一錢
右爲細末煉蜜入薑汁少許和藥杵勻丸如龍眼大噙嚼一丸清湯送細嚥之或丸如菉豆大淡薑湯送五六十丸此等老痰大率飲酒之人多有之酒氣上蒸肺與胃脘皆受火邪故鬱結而成痰也此方天冬黃芩瀉肺火海粉芒硝鹹以耎堅苦蔞潤肺消痰香附連蘊開鬱降火青黛去鬱火故不用辛燥之藥

黃芩利膈丸 東垣十書

治利膈上熱及胷中痰
生黃芩　炒黃芩各一兩　半夏　南星　黃連
枳殼麩炒　白茯苓　陳皮各二錢　澤瀉半兩
白朮一錢
右爲細末滴水爲丸梧桐子大每服五十丸食遠白湯下

苦蔞半夏丸 嚴氏

治肺熱痰嗽
苦蔞仁另研　半夏製各一兩
右爲細末湯浸蒸餅爲丸梧子大每服五十丸薑湯下

青黛丸 丹溪

治熱痰欬咯不出
青黛　苦蔞瓤　黃芩　香附子　貝母各一兩
橘紅二兩
右爲末湯浸蒸餅丸梧子大每服五十丸白湯下

加味洞下丸 集成

治痰
橘紅半斤以食鹽一兩微以水拌半日　南星製
半夏製　黃芩　黃連　甘草各一兩
右爲末湯浸蒸餅丸梧子大每服五十丸白湯下

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百六十一卷目錄
醫部彙考二百四十一
痰門四
方二　省風湯　芎芩散　玉芝丸　玉壺丸　天南星丸　靈砂白丸子　丁香茯苓湯　御製紫宸湯　半夏湯　温中化痰丸　顧元散　硫砂丹　夏丁香丸　四七湯　香茹丸　滑痰丸　蜘蛛丸　中丸　四七湯　香茹丸　滑痰丸　蜘蛛丸　瓜蒂散　白龍丸　獨聖散　茶調散　楊梗散　三聖散　引金散　青皮散　勝金飛　控涎丹　三聖散　引涎丸　礬丸　礬飲把寶丸　瀉痰丸　開結把寶丸　烏已丸　沉香和中丸　青葉石丸　又方　中柳丸　又方　中柳丸　又方　萬通化痰丸　又方　導痰丸　又方　萬通化痰丸　白玉丸　黃芩丸　又方　又方　又方　又方　指痰丸　清痰化痰丸　又方　料胸化痰丸　清痰丸　小半夏湯　半夏湯　旋覆花湯　甘草湯　木防己湯　甘遂半夏湯　大棗湯　芫花湯　大半夏湯　半夏湯　又方　又方　薤白湯　瓜蒂湯　葶藶湯　葶藶湯　蜀椒湯　松蘿湯　杜蘅湯　蜀漆湯　瓜蒂湯　中軍坐後丸　白散　瓜蒂散　瓜蒂湯　瓜蒂散　瓜蒂湯　瓜蒂散　瓜蒂湯

解宿酒嘔噦惡心痰唾不進飲食

木香五錢　砂仁　芍藥　檀香　茯苓　官桂　藿香葉各一錢　陳皮　乾葛　高良薑　丁香　甘草炙各二錢

右作二服每服水盞半煎七分不拘時服

半夏丁香丸（和劑下同）

治脾胃宿冷胷膈停痰嘔吐惡心吞酸噫酢心腹痞滿不思飲食

半夏製二兩　肉豆蔻　丁香　木香　藿香　人參　陳皮去白各二錢

右爲細末生薑汁煮糊爲丸梧桐子大每服三十丸薑湯下

溫中化痰丸

治停痰留飲胷膈痞滿頭目眩運惡心欬嗽痰涎

陳皮　青皮　良薑　乾薑炮各二兩

右爲細末醋煮糊丸梧桐子大每服三十丸空心米飲送下

順元散（濟寧方下同）

治氣虛中氣痰厥虛寒厥冷不得睡臥

天南星製一兩　川烏頭製　附子製各半兩

木香二錢半

右咀每服三錢水一盞薑十片煎七分熱服

靈砂丹

治上盛下虛痰涎壅塞此藥最能鎮墜升降陰陽安和五臟扶助元氣

水銀一斤　硫黃四兩

右以硫黃新鐵杓化開次入水銀炒成砂子入固濟罐內以鐵燈盞封口煆泥赤石脂固定三釘在地上架住罐子四圍磚攔以文武火煉一日罐子通紅爲度冷定取下則成靈砂研極細末糯米糊丸麻子大每服二十粒空心米飲下此靈砂即鍊銀硃之罐口砂是也

強中丸（三因方）

治胃脘虛寒痰飲留滯痞塞不通氣不升降

高良薑　乾薑炮　陳皮留白　青皮各一兩

半夏製二兩

右爲細末生薑汁煮糊丸梧桐子大每服三十丸薑湯下

四七湯（和劑局方）

治七情氣鬱結聚痰涎狀如破絮梅核咯之不出嚥之不下併治中脘痞滿痰涎壅盛上氣喘急

半夏三錢　茯苓二錢四分　厚朴一錢六分

紫蘇葉一錢二分

右水二盞薑五片棗一枚煎七分服

香莎丸（丹溪下同）

調中氣散鬱痰

香附子　蒼朮各四兩　黃芩二兩

右爲末蒸餅丸如梧桐子大每服五十丸白湯下

清痰丸

專清中脘食積熱痰

南星製　半夏　神麴炒　山楂　香附子製　陳皮去白各一兩　青皮　枳實　蒼朮　黃芩　烏梅　枯礬　乾薑炮各半兩

右爲末湯浸蒸餅爲丸服

殭蠶丸

治鬱痰

白殭蠶　苦葶藶　杏仁　訶子煨　貝母五倍子各等分

右爲末粥糊丸梧桐子大每服五十丸白湯下

千緡湯（和劑）

治風痰壅盛喘促不能睡一服則安

半夏製　南星製各二錢　皂角一寸　甘草一錢

右水一盞薑三片棗一枚煎七分溫服

半夏湯（瑞竹堂方）

消酒痰宿飲痞滿

半夏製　橘紅　桔梗炒各一兩　枳實炒半兩

右咀每服五錢水盞半薑五片煎八分服一加黃連砂仁各一錢

白龍丸（集成）

治酒積有痰

半夏　白芥狀　白礬各等分

右爲末神麴糊丸如菉豆大薑湯下

瓜蒂散（仲景集）

吐一切有餘痰

瓜蒂　赤小豆各七十五枚

右爲細末每服一錢或錢半薑虛實加減空心溫薑汁調服

獨聖散（千金方下同）

治前證

瓜蒂不拘多少

右爲細末每服一錢或二錢薑汁調服膏痛加全

蠍頭痛加鬱金同服

茶調散

一名二仙散治前證

瓜蒂二錢　好茶一錢

右爲末每服二錢薑汁調服

稀涎散

治前證

猪牙皂角炙去皮弦一兩　藜蘆五錢

右爲細末每服五分或一二錢漿水調下牙關不開者灌之

三聖散

治前證

瓜蒂剉炒微黃研末滓再炒研　防風各一兩

藜蘆三錢去苗心

右爲粗末每服約半兩以薑汁三茶盞先用一盞煎三四沸去薑汁次入一盞煎至三沸却將原二盞同一處熬二三沸去滓澄清放溫徐徐服之不必盡劑以吐爲度

蔚金散

治前證此輕劑也

蔚金　滑石　川芎各半兩

右爲細末每服一二錢空心薑汁調下

青黛散

治前證

猪牙皂角一條　延胡索一粒　青黛少許

右爲細末鼻內吹之其涎自出

勝金丸 元戊

治前證

薄荷　瓜蒂各半斤　藜蘆末　牙皂角各一兩

硃砂半兩

右將皂角炙去皮弦搥碎水一升與薄荷一處揉取汁熬成膏另將藜蘆等研勻用膏子和丸龍眼大以餘硃砂爲衣溫酒化下一丸以吐爲度得吐知人事者愈不知者不救

控涎丹 三因方

人忽患胷背手足頭項腰胯隱痛不可忍筋骨牽引釣痛走易不定乃是痰涎在心膈上下也

甘遂製　大戟製　眞白芥子各等分

右爲末糊丸梧桐子大臨臥淡薑湯或溫水下五七丸至十丸痰甚者量加之

三花神祐丸 河間

治一切痰飲變生諸病

芫花　大戟　甘遂各半兩　黑丑取頭末二兩

大黃一兩　輕粉一錢

右爲細末滴水爲丸小豆大初服五丸每服加五丸溫水下日三服快利爲度痞滿甚者初多服頓攻不開反加痛悶則初止可服二三丸每服再加二丸快利則止

蠲飲枳實丸 拔萃方

逐飲消痰導滯清膈

枳實炒　半夏製　陳皮　黑牽牛取頭末各三兩

右爲末糊丸梧桐子大每服五十丸薑湯下

滌痰丸 御藥下同

治三焦滯氣胷膈痞滿欬唾稠粘面上赤熱肢體倦怠不思飲食此藥下痰飲消食快膈

木香二錢　檳榔　半夏　三稜各半兩　青皮

陳皮　枳殼各三錢　大黃一兩　黑丑二兩炒

右爲細末糊丸梧子大每服三十丸食遠薑湯下

開結枳實丸

宣導滯氣消化痰飲專治嘔逆惡心宿酲不醒宿食停滯兩脅膨脹咽嗌不利上氣欬嗽等疾

枳實去瓤麩炒　白朮炒　半夏製　南星製

白礬枯研　葶藶子炒　青皮　大黃各五錢

黑丑頭末二兩　木香三錢　大皂角炙去皮弦

旋覆花各一兩

右爲細末薑湯煑糊丸梧桐子大每服五十丸薑湯下婦人乾嘔膈氣滿悶或面目浮腫小便不利薑葱湯下

烏巴丸 醫林

治胷膈久爲頑痰所害積成痰氣面目青白色腫浮不思食遍身痛夜間氣壅不得睡往來寒熱手足冷痛不得轉側屢用南星半夏黑錫靈砂墜之不下取之不出此是頑痰堅滯宜此藥利下頑痰如魚腦則愈未利再服

烏梅肉二兩　巴豆五粒去油

右用水二椀沙銚內煑烏梅肉爛候水稍乾入巴豆將竹片攪候如稠糊取出爛搗丸梧子大每服七丸九丸十丸十一丸或十五丸薑湯下不拘時

透羅丹 玉機微義

治痰實欬嗽胷膈不利

皂角酥炙去皮弦　黑丑微炒　半夏湯泡七次

大黃各一兩　巴豆去油　杏仁去皮尖炒各一錢
右爲細末薑汁爲丸梧子大每服三十丸食後薑湯下

沉香和中丸 局方

治一切痰氣壅盛
陳皮　青皮　枳殼　黃芩　檳榔各一兩
滑石二兩　木香　蒙石製各半兩　大黃
黑丑頭末各一兩五錢　沉香二錢
右爲細末滴水丸梧子大每服五十丸臨臥茶清下

青蒙石丸 丹溪 下同

解食積去濕痰其功重在風化硝
南星二兩切作片用白礬末五錢水浸二日曬乾
半夏一兩湯泡切作片以牙皂角水浸一日曬乾
硝用萊菔水化綿濾令結入臘牛膽內風化五錢
蒙石二兩搥碎　焰硝二兩同蒙石入小砂罐內瓦蓋之鐵線縛定鹽泥固濟曬乾火煅紅候冷取出
黃芩薑汁炒　茯苓　枳實炒各一兩
右爲末神麴糊丸梧子大每服三五十丸白湯下
一方加蒼朮半兩滑石一兩看病冷熱虛實作湯使

又方

治前證
半夏二兩　白朮　黃芩　蒙石煅各一兩
茯苓七錢半　風化硝二錢
右爲末服法同前

中和丸

治濕痰氣熱
蒼朮　黃芩　半夏　香附等分
右爲末粥丸梧子大每服五七十丸薑湯下

厚朴大黃湯 仲景

厚朴一尺　大黃六兩　枳實四兩
右三味㕮咀以水五升煮取二升分爲二服溫服

又方 丹溪 下同

治酒痰
青黛　苦葶仁
右爲末薑蜜丸噙化救肺

又方

治鬱痰
白殭蠶　杏仁　苦葶仁　訶子　貝母　五倍子
右爲末糊丸梧子大每服五十丸白湯下

導痰丸

治一切痰
吳茱萸三錢製　黃連半兩　滑石七錢半
白茯苓　蒼朮泔浸各一兩
右爲末糊丸梧子大每服八九十丸薑湯下

又方

治陰虛內多食積痰
川芎七錢　黃連　苦葶仁　白朮　神麴
麥芽各一兩　青黛半兩　人中白三錢
右爲末薑汁浸蒸餅丸服

黃連化痰丸

治痰
半夏一兩半　黃連一兩　吳茱萸湯洗一錢半
桃仁二十四箇研　陳皮半兩
右爲末糊丸菉豆大每服一百丸薑湯送下

白玉丸

治痰
巴豆三十箇去油盡　南星　半夏　滑石
輕粉各三錢
右爲末皂角仁浸濃汁丸梧子大每服五七丸薑湯下

黃苦葶丸

治食積痰壅滯喘急
苦葶仁　半夏　山楂　神麴炒　黃芩各等分
右爲末苦葶水丸薑湯竹瀝送下二三十丸

又方

治前證
苦葶仁　半夏一兩　蒼朮二兩　香附二兩半
黃芩　黃連各半兩
右服法同上一方用苦葶黃連各半兩半夏一兩糊丸每服五十丸治同

抑痰丸

治前證
苦葶仁一兩　半夏二錢　貝母二錢
右爲末蒸餅丸如麻子大每服一百丸薑湯下

清膈化痰丸

治熱痰
黃連　黃芩各一兩　黃蘗　山梔各半兩

香附一兩半　蒼术二兩
右爲末蒸餅丸白湯下
墜痰丸
治痰飲
黑丑頭末二兩　枳實炒　枳殼炒各一兩半
白礬三錢半生半枯　砒硝風化　猪牙皂角酒炒各二錢
右爲末用蘿蔔汁丸每服五十丸雞鳴時服初則有糞次則有痰
又方
治濕痰
蒼术泔浸三錢　白术炒六錢　香附一錢半
白芍酒浸炒二錢半
右爲末蒸餅丸服
又方
治肥人濕痰
苦參　半夏各錢半　白术二錢半　陳皮一錢
右咀作一服薑三片竹瀝半盞水煎食遠各三補丸十五丸
又方
祛風痰行濁氣
赤脚蜈蚣　黃脚蜈蚣各一條　明礬　牙皂角　川芎　雄金各一兩　防風二兩
右爲末蒸餅丸梧子大每服三十丸食前茶湯下
又方
治上焦風痰
苦葉仁　黃連　半夏　牙皂各等分
薑汁浸炊餅丸
又方
治痰氣
片苓炒　半夏各半兩　白术　白芍各一兩　茯苓　陳皮各三錢
右爲末蒸餅泡薑汁丸服
利膈化痰丸
治鬱痰
天南星　蛤粉研細一兩　苦葉仁　貝母去心　香附半兩童便浸
右爲末用猪牙皂角十四挺敲碎水一椀半煮杏仁去皮尖一兩煮水將乾去皂角擂杏仁如泥入前藥搜和再入薑汁泡蒸餅丸如菉豆大青黛爲衣每服五十丸薑湯下
清痰丸
專清中脘熱痰積
烏梅　枯礬　黃芩　蒼术　陳皮　滑石炒　青皮　枳實各半兩　南星　半夏　神麴炒　山楂　乾生薑　香附各一兩
右爲末湯浸蒸餅丸服
小半夏湯（千金方下同）
治心腹虛冷痰氣上冒脹滿不下食嘔逆者
半夏一升　生薑一斤　橘皮四兩
右三味咬咀以水一斗煮取三升分三服若心中急痛內桂心四兩腹滿痛內當歸三兩羸弱及老人九宜一方無橘皮有桂心三兩甘草一兩治同
旋覆花湯
治胃脘痰結噎如膠不下食者
旋覆花　細辛　前胡　甘草　茯苓各二兩　生薑八兩　桂心四兩　半夏一升　烏頭五枚
右九味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服
甘草湯
治心下痰飲胃脘支滿目眩
甘草二兩　桂心　白术各一兩　茯苓四兩
右四味咬咀以水六升宿漬煮取三升去滓服一升日三小便當利
木防己湯
膈間有支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脈沉緊得之數十日醫吐下之不愈者
木防己三兩　桂心二兩　石膏雞子大十二枚　人參四兩
右四味咬咀以水六升煮取二升分二服盧者即愈實者三日復發發則復與若不愈去石膏加茯苓四兩芒硝三合以水六升煮取二升去滓下硝令烊分二服微下利即愈一方不加茯苓
甘遂半夏湯
病者脈伏其人欲自利利者反快雖利心下續堅滿此爲留飲欲去故也此方主之
甘遂大者三枚　半夏十二枚水一升煮取半升
芍藥五枚　甘草一枚如指大水一升煮取半升
右四味以蜜半升內二藥汁合得一升半煮取八合頓服之
大茯苓湯

主胃中結痰飲澼結於膈脘弦滿逆不得食亦主風水

細辛四兩　茯苓　白朮各三兩　當歸　橘皮　附子各二兩　生薑　半夏　桂心各四兩

右九味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服二三劑良一方無細辛有人參

茯苓湯

治胃膈痰滿

茯苓四兩　半夏一升　生薑一斤　桂心八兩

右四味㕮咀以水八升煮取二升半分四服冷極者加大附子四兩若氣滿者加檳榔三七枚

大半夏湯

治痰冷澼飲胃膈不寬

半夏一升　白朮三兩　生薑八兩　茯苓　人參　桂心　甘草　附子各三兩

右八味㕮咀以水八升煮取三升分二服

半夏湯

治痰飲澼氣吞酸

半夏　吳茱萸各三兩　生薑六兩　附子一枚

右四味以水五升煮取二升半分三服老少各半日三

乾棗湯

治腫及支滿澼飲

大棗十枚擘　大戟　大黃　黃芩　甘草　甘遂各二兩　芫花　蕘花各五錢

右八味㕮咀以水五升煮取一升六合分四服空心服以快下爲度

當歸湯

治畜飲宿食不消腹中積聚轉下

當歸　人參　桂心　黃芩　甘草　芍藥　芒硝各二兩　大黃四兩　生薑　澤瀉各三兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

又方

治痰飲飲食不消乾嘔

人參　旋覆花　橘皮　細辛各一兩　澤瀉　白朮　杏仁　枳實各二兩　白茯苓　柴胡　生薑　半夏　芍藥各三兩

右十三味㕮咀以水九升煮取二升七合分三服日三

又方

治胃中痰飲腸中水鳴食不消嘔吐水

檳榔十二枚　生薑　杏仁　白朮各四兩　半夏八兩　茯苓五兩　橘皮三兩

右七味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服

薑椒湯

治胃中積聚痰飲食減少胃氣不足厥逆嘔吐

薑汁七合　蜀椒三合　桂心　附子　甘草各一兩　橘皮　桔梗　茯苓各二兩　半夏三兩

右九味㕮咀以水九升煮取二升半去滓內薑汁煮取二升分三服服三劑住若欲服大散諸五石九必先服此湯及進黃芪丸住一方不用甘草

薑附湯

治痰冷澼氣胃滿短氣嘔沫頭痛飲食不消化生薑八兩　附子四兩生用四破

右二味㕮咀以水八升煮取二升分四服

撩膈散

治心上結痰飲積寒冷心悶

瓜丁二十八枚　赤小豆二七枚　人參　甘草各一分

右四味治下篩酒服方寸匕日一亦治諸黃

斷膈湯

治胃中痰澼

恆山三兩　甘草　松蘿各一兩　瓜蒂二十二枚

右四味㕮咀以水酒各一升半煮取一升半分三服後服漸減之得快吐後須服半夏湯

松蘿湯

治胃中痰積熱皆除

松蘿二兩　烏梅　梔子各十四枚　甘草　恆山各三兩

右五味㕮咀以酒三升浸一宿平旦以水三升煮取一升半去滓頓服或分二服一服得快吐卽止

杜蘅湯

主吐百病

杜蘅　松蘿各三兩　瓜丁三七枚

右三味㕮咀以酒一升二合漬一宿去滓分二服若一服卽吐者止未吐者如人行十里久令藥力盡更服一升吐不止者歠稀糜卽定老少用之佳

葱白湯

治冷熱痰遞發時頭痛悶亂欲吐不得者

葱白二七莖　桃葉一把　眞珠另研　恆山　烏頭　甘草各五錢

右六味㕮咀以水酒各四升和煮取三升去滓內珠末每服一作吐卽止一方無桃葉有枇杷葉

旋覆花丸

治停痰澼飲結在兩脅腹脹滿羸瘦不能食食不消化喜吐乾嘔大小便或澁或利腹中動搖作水聲內熱口乾好飲水欬卒起頭眩欲倒脅下痛

旋覆花　桂心　枳實　人參各五兩　吳茱萸　細辛　大黃　黃芩　葶藶　厚朴　芫花　橘皮各四分　乾薑　芍藥　白朮各六分　茯苓　狠毒　烏頭　礬石各八分　甘草三分

右二十味爲末蜜丸如梧子大酒服五丸日二後加以知爲度延年方無白朮狠毒烏頭礬石細辛黃芩厚朴吳茱萸芫花橘皮甘遂有皂莢附子各二分蜀椒防葵杏仁各三兩乾地黃四分

中軍黑侯丸

治澼飲停結滿悶目暗

芫花二兩　巴豆八分　杏仁五分　桂心　桔梗各四分

右五味爲末蜜丸如胡豆每服三丸稍增得快下止

順流紫丸

治心腹積聚兩脅脹滿常飲痰澼大小便不利小腹切痛腸上塞

石膏五分　代赭石　鮫鰤骨　半夏各三分　桂心四分　巴豆七枚

右六味爲末蜜丸如胡豆平旦服一丸加至二丸胡洽有藜蘆從蓉當歸各三分范汪方無石膏半夏有當歸一分茯苓三分從蓉二分藜蘆五分

又方

治停痰澼飲結在兩脅腹滿羸瘦不能飲食食不消喜唾乾嘔大小便或澁或利

旋覆花　大黃　附子　茯苓　椒目　桂心　芫花　狠毒　乾薑　芍藥　枳實　細辛各八分

右十二味爲末蜜丸如梧子飲下三丸日三服後漸增

左歸飲　景岳全書下同

此壯水之劑也凡痰病係命門之陰衰陽勝者宜此方加減主之此一陰煎四陰煎之主方也

熟地二三錢或至一二兩　山藥　枸杞各二錢　山萸一二錢　良酸者少用之　茯苓一錢半　炙甘草一錢

水二鍾煎七分食遠服

左歸丸

治眞陰腎水不足不能滋養營衛漸至衰弱多痰宜壯水之主以培左腎之元陰而精血自充矣宜此方主之

牛膝酒洗蒸三兩　精滑者不用　懷熟八兩　山藥炒　枸杞　山萸肉　龜膠炒珠　菟絲製　鹿膠敲碎炒珠各四兩

右先將熟地蒸爛杵膏加煉蜜丸桐子大每食前用滾湯或淡鹽湯送下百餘丸

右歸丸

治命門火衰不能生土而爲痰飲宜益火之原以培右腎之元陽此方主之

大懷熟八兩　山藥炒　枸杞微炒　菟絲子製　鹿膠炒珠　杜仲薑汁炒各四兩　山茱萸微炒　當歸各三兩　便溏勿用　製附子自二兩漸至五六兩　肉桂二兩漸加至四兩

右先將熟地杵膏加煉蜜丸如彈子大每嚼服二三丸以滾白湯送下或加人參其效尤速

六安煎

治非風初感痰滯氣逆等證

陳皮一錢半　半夏二三錢　杏仁去皮尖　甘草各一錢　白芥子五七分　老幼氣弱不用　茯苓二錢

水一鍾半加生薑三五七片煎七分食遠服

金水六君煎

治肺腎虛寒水泛爲痰或年邁陰虛血氣不足外受風寒欬嗽噁惡多痰喘急等證神效

當歸　半夏　茯苓各二錢　熟地三五錢　陳皮一錢半　炙甘草一錢

水二鍾生薑三五七片煎七八分食遠溫服

一陰煎

此治水虧火勝之劑故曰一陰凡腎水眞陰虛損而脈證多陽盛發熱及陰虛痰火等證皆宜用此

生地　芍藥　麥冬　丹參各二錢　甘草一錢　熟地三五錢　牛膝一錢半

水二鍾煎七分食遠溫服

和胃二陳煎

治胃寒生痰惡心嘔吐胃腸滿悶噯氣

乾薑炒一二錢　砂仁四五分　陳皮　半夏　茯苓各一錢半　甘草炙七分

水一鍾半煎七分不拘時溫服

苓朮二陳煎

治痰飲水氣停蓄心下嘔吐吞酸等證

猪苓　澤瀉　茯苓各一錢半　半夏二三錢

乾薑炒　白朮各一二錢　炙草八分　陳皮一錢

水一鍾半煎服

神香散

治痰飲膈噎諸藥不效者

丁香　白豆蔻或砂仁亦可

二味等分爲末清湯調下五七分甚者一錢日數服不拘

柴陳煎

治傷風兼寒欬嗽發熱痞滿多痰嘔吐等證

柴胡二三錢　陳皮一錢半　甘草一錢　半夏

茯苓各二錢　生薑三五七片

水一鍾半煎七分食遠溫服

抽薪飲

治諸凡痰病火熾盛而不宜補者

黃芩　石斛　木通　炒梔子　黃蘗各一二錢

枳殼　澤瀉各錢半　細甘草三分

水一鍾煎七分食遠溫服內熱甚者冷服更佳

清膈煎

治痰因火動氣壅喘滿內熱外渴等證

陳皮錢半　海石　木通各二錢　膽星一二錢

貝母二三錢微敲破　白芥子五七分

水一鍾半煎七分溫服如火盛痰不降者加童便一小鍾

理陰煎

此理中湯之變方也治脾胃中虛痰飲等證

熟地三五七錢或一二錢　炙甘草一二錢

當歸二三錢或五七錢　乾薑炒黃色一二三錢

或加肉桂一二錢

水二鍾煎七八分熱服此方加附子即名附子理陰煎再加人參即名六味回陽飲治命門火衰陰中無陽等證

溫胃飲

治中寒嘔吐痰水不思飲食

人參一二三錢或一兩　白朮炒一二錢或一兩

陳皮　炙甘草各一錢　當歸一二錢泄瀉者勿用

乾薑煨焦一二錢　扁豆二錢炒

水二鍾煎七分食遠溫服水泛爲痰胷腹痞滿者加茯苓一二錢

六味異功煎

治證同前而兼微滯者

人參二三錢　白朮　茯苓各二錢　炙甘草

陳皮各一錢　乾薑炒黃一二錢

水一鍾半煎服

聖朮煎

治痰飲嘔吐聖藥

冬朮炒五六錢至一二兩　乾薑炒　桂各一二錢

水一鍾半煎七分溫服或加陳皮亦可

單方

頑痰不化石青一兩石綠半兩並水飛麴糊丸菉豆大每服十丸溫水下吐去痰一二盌不損人瑞竹堂方

痰結胷中不散密陀僧一兩酢水各一盞煎乾爲末每服二錢以酒水各一小盞煎一盞溫服少頃當吐出痰涎爲妙聖惠方

痰飲頭痛往來寒熱雲母粉二兩鍊過恆山一兩爲末每服方寸匕湯服取吐忌生葱生菜深師方

痰氣結胷鶴頂丹不問陰陽虛實妙過陷胷瀉心等藥用銀硃半兩明礬一兩同碾以熨斗盛火瓦盞盛藥鎔化急刮搓丸每服一錢眞茶入薑汁少許服之心上隱隱有聲結胷自散不動臟腑不傷眞氣明礬化痰銀硃破積故也活幼全書

痰熱喘嗽痰涌如泉石膏寒水石各五錢爲末每人參湯服三錢保命集

食積痰火瀉肺胃火石膏火煅出火毒半斤爲末酢糊丸梧子大每服四五十丸白湯下丹溪

胷中痰澼頭痛不欲食礬石一兩水二升煑一升納蜜半合頻服須臾大吐未吐飲稍熱湯引之外臺秘要

化痰治嗽生明礬二兩人參末一兩酢二升熬膏以油紙包收旋丸豌豆大每用一丸放舌上其嗽立止痰即消

又定西侯方只用明礬末酢糊丸梧子大每服時茶下二三十丸

又方用明礬半生半燒山梔子炒黑等分爲末薑汁糊爲丸如上服撫要

又方用白明礬建茶等分爲末糊丸服雜興方

開胃化痰不思飲食不拘大人小兒人參焙二兩半夏薑汁浸焙五錢爲末飛羅麵作糊丸棗豆大食後薑湯下三五十丸日三服（經驗方）

化痰降氣止嗽解鬱消食除脹有奇效用貝母去心一兩薑製厚朴半兩蜜丸梧子大每白湯下五十丸（筆峯方）

痰氣膈脹砂仁搗碎以蘿蔔汁浸透焙乾爲末每服一二錢食遠沸湯服（簡便方）

冷痰惡心藁芨一兩爲末食前用米湯服半錢（聖惠方）

停痰宿飲風氣上攻胷膈不利香附皂莢水浸半夏各一兩白礬末半兩薑汁麵糊丸梧子大每服三四十丸薑湯隨時下（仁存方）

清上化痰利咽膈治風熱以薄荷末煉蜜丸芡子大每噙一丸白沙糖和之亦可（簡便方）

胷中痰飲恆山甘草各一兩水五升煎取一升去滓入蜜二合溫服七合取吐不吐更服（千金方）

諸風痰飲蒼朮十分鬱金一分爲末每以一字溫漿水一盞和服探吐（摘玄方）

消痰開胃去胷膈壅滯半夏洗泡焙乾爲末自然薑汁和作餅濕紙裹煨香以熱水二盞同餅二錢入鹽五分煎一盞服之大壓痰毒及酒食傷極驗（斗門方）

痰厥氣絕心頭尚溫者千年石灰一合水一盞煎滾去清水再用一盞煎極滾澄清灌之少頃痰下自省（集元方）

中焦痰涎利咽清頭目進飲食半夏泡七次四兩枯礬一兩爲末薑汁打糊或羹臛肉和丸梧子大每薑湯下十五丸寒痰加丁香五錢熱痰加寒水石煅四兩名玉液丸（和劑局方）

痰迷心竅壽星丸治心膽被驚神不守舍或恍惚健忘妄言妄見天南星一斤先掘土坑二尺以炭火三十斤燒赤入酒五升滲乾乃安南星在內盆覆密定上以灰塞之勿令走氣次日取出爲末琥珀一兩硃砂二兩爲末生薑汁打麵糊丸梧子大每服三十丸至五十丸煎人參石菖蒲湯下每日三服

化痰鎮心祛風利膈辰砂半夏丸用半夏一斤湯泡七次爲末篩過以水浸三日生絹濾去滓澄清去水曬乾一兩入辰砂一錢薑汁打糊丸梧子大每薑湯下七十丸此周府方也（袖珍）

卒頭痛如破非中冷又非中風是胷膈中痰厥氣上衝所致名爲厥頭痛吐之即瘥單煮茗作飲二三升許適冷暖飲二升須臾擲卻吐吐畢又飲如此數過劇者須吐膽汁乃止不損人而渴則瘥

風氣膈上痰飲不開口苦瓜湯煮三五沸物裹熨心膈上

飲酒痰澼兩脅脹滿時復嘔吐腹中如水聲苦葉實去殼焙一兩神麴炒半兩爲末每服二錢葱白湯下（聖惠方）

風痰蘿蔔子末溫水調一匙良久吐涎沫愈

消痰潤燥貝母爲末沙糖爲丸龍眼大噙下又止嗽

停痰宿飲喘欬嘔逆全不入食威靈仙焙半夏薑汁浸焙爲末用皂角水熬膏丸棗豆大每服七丸至十丸薑湯下一日三服一月爲驗忌茶麪

風痰白殭蠶七條細研以薑汁一匙溫水調灌（勝金方）

胷脅痰飲白芥子五錢白朮一兩爲末棗肉和搗丸梧子大每白湯服五十丸（袖珍方）

痰飲宿水桃花散收桃花陰乾爲末溫酒服一合取利覺虛食少粥不似轉下藥也（集要方）

化食消痰胷中熱氣用橘皮半兩微熬爲末水煎代茶細呷（心鏡）

痰涎爲害檳榔爲末白湯每服一錢（御藥院方）

上焦痰熱藕汁梨汁各半盞和服（簡便方）

痰壅嘔逆心胷滿悶不下飲食厚朴一兩薑汁炙黃爲末非時米飲調下二錢匕（聖惠方）

一切痰氣皂角燒存性蘿蔔子炒等分薑汁入煉蜜丸梧子大每服五七十丸白湯下（簡便方）

胷中痰結皂角三十挺去皮切水五升浸一夜搥取汁慢熬至可丸丸梧子大每食後鹽漿水下十丸

釣痰膏用半夏酢煮過以皂角膏和勻入明礬少許以柿餅搗膏丸如彈子噙之（聖惠方）

寒痰氣喘青橘皮一片展開入鯽子一箇麻紮定火上燒存性研末薑汁和酒一鍾呷服天台李翰林用此治莫秀才到戶便止神方也（張果醫說）

清氣化痰百藥煎細茶各一兩荊芥穗五錢海螵蛸一錢蜜丸芡子大每服噙一丸妙（筆峯集）

積聚痰涎結於胷膈之間心腹疼痛日夜不止或乾嘔噦食者炒粉丸主之用蛤粉一兩以巴豆七粒同炒赤去豆不用酢和粉丸梧子大每服二十丸薑酒下丈夫臍腹痛茴香湯下女人血氣痛童便和酒下（仁存方）

胷膈氣滯煩悶痰飲不利頭目不清生南星掐去皮半夏湯泡七次各五兩爲末以薑汁和爲餅以楮葉

蓋之令發黃色曬乾須五六月內做合時用香附子一兩製如常法以陳麴二錢共爲末水糊丸梧桐子大每服四十丸食後薑湯下（經驗方）

痰飲上氣不思飲食小便不利頭目昏眩吳茱萸泡焙乾白茯苓等分爲末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸食遠熟水下

風痰食不消化大便祕澀訶子三枚搗調酒服三五度良

化痰丸用天絡絲即絲瓜也通條燒存性爲細末棗肉爲丸彈子大每服一丸好酒化下立可化痰

風痰壅塞大便祕滯用蜣螂大者一枚小者一對新瓦上烙乾存性爲末好酒調下不能飲酒者以滾水各半服大便即通其效如神蜣螂即推糞蟲以其性能推糞下行通塞故也

痰飲奇效方瓦楞子殼即海蚶子不拘多少炭火煅研末候苦蔞黃熟時搗和瓦粉作餅子曬乾爲末用蜜湯調一錢或入諸藥爲丸其效過於海粉多矣

鍼灸

甲乙經曰溢飲脅下堅痛中脘主之

溢飲水道不通溺黃小腹痛裏急腫洞泄體痛引骨京門主之

飲渴身伏多唾隱白主之

千金方曰結積留飲澼囊胃滿飲食不消灸通谷五十壯

醫學綱目曰諸痰爲病頭風喘嗽一切痰飲取豐隆中脘

姊人年高風痰作楚脈沉實滑數痰在下則無力在中則胃膈閉悶在上則頭風喘嗽昏運則抽牽手足皆動風門沿皮二寸半巨闕三寸三分豐隆二寸半肩井五分

導引

保生祕要曰痰火導引法伸足坐定以雙手掐兒訣撐起用力低頭躬身而下扳足尖三次如訣用力而起咽津而降幽閉躬起二十四遍守後運功

運功取靜於晌用十六字提咽指臍存想念茲在茲次運尾閭八九度入靜自然痰火自降

痰疾氣病先依痛處念叉推開下大腸九曲向穀道去以順其氣

痰在胃膈以兩手按於兩乳下揉摩數次須定神養氣然後將胃前作意剝開兩邊想上焦氣降下焦則膈自通而痰自化

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百六十二卷目錄

醫部彙考二百四十二

痰門五

醫案

欬嗽門一

黃帝素問 欬論 氣交變大論 至眞要大論 六元正紀大論 陰陽別論 調經論 厥論 五臟生成篇 生氣通天論 脈解篇 標本病傳論 五常政大論 風論 診要經終論 玉機眞臟論 宣明五氣論 評熱病論 痹論

靈樞經 邪氣臟腑病形篇 本臟篇 王版篇 經脈篇 熱病篇 脈論 論疾診尺篇

藝術典第二百六十二卷

醫部彙考二百四十二

痰門五

醫案

儒門事親曰郭敬之病留飲四日浮腫不能食脚腫連腎囊痛先以苦劑涌之後以舟車丸濟川散瀉之病去如拾遺

棠谿張鳳村一田叟姓楊其病嘔酸水十餘年本留飲諸醫皆以燥劑燥之中脘臍胻以火艾燔針刺之瘡未常合戴人以苦劑越之其涎如膠乃出二三升談笑而愈

一婦從年少時因大哭罷痛飲冰水困臥水停心下漸發痛悶醫氏咸以爲冷積治之以溫熱劑及禁食冷物一聞茶氣病輒內作如此數年燔針燒艾瘡孔數十十餘年後小便赤黃大便祕悶兩目加昏積水轉甚流於兩脅世謂水癖或謂支飲硇漆稜朮攻磨之藥竟施之矣食日衰積日茂上至鳩尾旁至兩脅及臍下但發之時按之如水聲小腹結硬手不可近者月發五七次甚則欲死諸藥皆厭二十餘年求戴人發藥診其脈寸口獨沉而遲此胷中有痰先以瓜蔕散涌痰五七升不數日再越痰水及斗又數日上涌數升凡三涌三下汗如水者亦三其積皆去以流濕消飲之藥調之月餘大瘥

一婦人心下臍上結硬如斗按之如石人皆作病胎針灸毒藥禱祈無數如捕風然一日戴人見之曰此寒痰診其兩手寸脈皆沉非寒痰而何以瓜蔕散吐之連吐六七升其塊立消過半俟數日後再吐之其涎沫類雞黃腥臭特殊約二三升凡如此者三後以人參調中湯五苓散調之腹已平矣

常仲明之子自四歲得風痰疾至十五歲轉甚每月發一兩次發必頭痛痛則擊數百拳出黃綠涎一兩盞方已比年發益頻目見黑花發作昏不知人三四日方省諸醫皆用南星半夏化痰之藥終無一效偶遇戴人於瀝水之南鄉戴人以雙解散發汗次以苦劑吐痰病去八九續以分劑平調自春至秋如此數次方獲全瘥

涿郡周敬之自京師歸鹿邑道中渴飲水過多漸成腫滿或用三花神祐丸憚其太峻或用五苓散分利水道又太緩淹延數月終無一效蓋粗工之技止於此耳後手足與腎皆腫大小便皆祕澀常仲明求治於戴人戴人令仲明付藥比及至已歿矣戴人曰病水之人其勢如長川泛溢欲以杯勺取之難矣必以神禹決水之法斯愈矣

丹溪心法曰魯菴年七十餘膈間有痰不快飲食少思初無大害就醫京口投以越鞠丸清氣化痰丸胷次稍寬日日吞之遂不輟口年餘困頓不堪僦舟來就予診治則大肉已脫兩手脈如游絲太谿絕不至矣見予有難色因曰吾亦自分必死但膈間脹不可忍大便祕結不通誠爲寬須臾卽死瞑目矣固強予疏方以至親難辭敎用大劑人參白朮煎湯進之少頃如厠下積痰數升胷膈寬舒更數日而歿

醫學正傳曰予姪婦何氏在室時四月間因多食青梅得痰飲病日間胷膈中大痛如刀錐至晚胷中痛止而膝胻大痛蓋痰飲隨氣升降故也一醫作胃寒治用乾薑良薑官桂烏附丁沉輩及煑胡椒粥間與病日劇加口渴小水淋澀求予治診其六脈洪數而滑予作清痰處治令其急烹竹瀝服三日口不渴小水亦不淋澀但胷中與膝互痛如舊用蘿蔔子汁研與半椀吐痰半升許至夜痛尤甚丹溪所謂引動其猖狂之勢耳次日用人參蘆一兩逆流水煎服不吐又次日與苦參煎湯服又不吐又與附子尖桔梗蘆皆不吐一日清晨用藜蘆末一錢入麝香少許酸漿水調與始得大吐至次日天明吐方定前後得頑痰

及稠飲一小桶許其痛如脫後以軟粥將理而安

醫學綱目曰綵帛鋪劉員外患傷寒六七日晝夜不得眠方眠即起方起即倒未嘗少息看得厭倦召孫孫曰若言是氣必喘作今無此證非氣也時復身上冷汗出尺寸脈皆沉關中亦沉重診之鼓擊於指下此痰積塞聚於胷中也遂用陳皮半夏乾薑三物各一兩切片薑半兩搥碎以水兩椀煎七分去查分二服服藥經時遂腫經一晝夜不甦既覺下痰一塊如雞子大其痰遂愈凡痰證皆有冷汗其證明矣

醫宗必讀曰刑部主政徐凌如勞且怒後神氣昏倦汗出如浴語言錯亂危困之極迎余療之診其脈大而滑且軟此氣虛有痰也用補中益氣湯料併四貼爲一劑用參至一兩加熟附子一錢熟半夏三錢四日而稍甦更以六君子加薑汁一鍾服數日兼進八味丸調理兩月而康

翰林李集虛勞而無度醉而使內汗出多痰服寬膈化痰之藥轉覺滯悶診其脈沉而濇兩尺尤甚余謂其壻楊元潤曰痰得濇脈一時難愈況尺中濇甚精傷之象也在法不治元潤強之投劑勉用補中益氣加半夏茯苓兩劑有小效衆皆喜余曰濇象不減脈法無根死期近矣果十餘日而歿

文學朱文哉遍體如蟲螫口舌糜爛朝起必見二鬼執盤飧以獻向余慟哭曰余年未滿三十高堂有垂白之親二鬼旦暮相侵決無生理倘邀如天之力得以不死即今日之秦越人矣遂叩頭流血余診其寸脈乍大乍小意其爲鬼祟細察兩關弦滑且大遂斷定爲痰飲之疴投滾痰丸三錢雖微有所下而病患如舊更以小胃丹二錢與之復下痰積及水十餘椀遍體之痛減半至明早鬼亦不見矣更以人參三錢白朮二錢煎湯服小胃丹三錢大瀉十餘行約有二十椀病若失矣乃以六君子爲丸服四斤而痊

本草綱目曰洪邁云邁有痰疾因晚對上遣使諭令以胡桃肉三顆生薑三片臥時嚼服即飲湯兩三呷又再嚼桃薑如前數即靜臥必愈邁還玉堂如旨服之及旦而痰消嗽止

溧陽洪輯幼子病痰喘凡五晝夜不乳食醫以危告其妻夜夢觀音授人參胡桃湯輯急取新羅人參寸許胡桃肉一枚煎湯一蜆殼許灌之喘即定明日以湯剝去胡桃皮用之喘復作仍連皮用信宿而瘳此方不載書冊蓋人參定喘胡桃連皮能斂肺故也

中丞常子正苦痰飲每食飽或陰晴節變率同十日一發頭疼背寒嘔吐酸汁即數日伏枕不食服藥罔效宣和初爲順昌司祿於太守蔡達道席上得吳仙丹方服之遂不再作每遇飲食過多腹滿服五七十丸便已少頃小便作茱萸氣酒飲皆隨小水而去前後痰藥甚衆無及此者用吳茱萸湯泡七次茯苓等分爲末煉蜜丸梧子大每熟水下五十丸梅楊卿方只用茱萸酒浸三宿以茯苓末拌之日乾每吞百粒溫酒下

薛己醫按曰學士吳北川過飲痰壅舌本强硬服降火化痰藥痰氣益甚肢體不遂余作脾虛濕熱治之而愈

大參李北泉時吐痰涎內熱作渴肢體倦怠勞而足熱用清氣化痰藥益甚余曰此腎水泛而爲痰法當補腎不信仍進滾痰丸一服吐瀉不止飲食不入頭運眼閉始信余用六君子湯數劑胃氣漸平却用六味丸月餘諸證悉愈

閣老梁厚齋氣短有痰小便赤濇足跟作痛尺脈浮大按之則濇此腎虛而痰飲也用四物送六味丸不月而康仲景先生云氣虛有飲用腎氣丸補而逐之誠開後學之朦瞶濟無窮之夭枉腎氣丸即六味丸也

都憲孟有涯氣短痰運服辛香之劑痰盛遺尿兩尺浮大按之如無余以爲腎家不能納氣歸源香燥致甚耳用八味丸料三劑而愈

上舍顧桐石會飲於周上舍第問余曰向孟有涯陳東谷俱爲無嗣納寵已而得疾皆頭運吐痰並用蘇合香丸惟有涯得生何也余曰二證因腎虛不能納氣而爲頭運不能制水而爲痰涎東谷專主攻痰行氣有涯專於益火補氣故耳後余應杭人之請桐石房勞過度亦患前證或用清氣化痰愈甚顧曰我病是腎虛不能納氣歸源治者不悟而歿惜哉

一男子素厚味胷滿痰盛余曰膏粱之人內多積熱與法製清氣化痰丸而愈彼爲有驗修合餽送脾胃虛者無不受害

先兄體貌豐偉唾痰甚多脈洪有力殊不耐勞遇風頭運欲仆口舌破裂或至赤爛誤食薑蒜少許口瘡益甚服八味丸及補中益氣加附子錢許即愈停藥月餘諸證仍作此命門虛火不歸源也仍服前藥而愈

一儒者每勞役則食少胷痞發熱頭痛吐痰作渴脈

浮大余謂此脾胃氣虛而血病也不信服二陳四物黃芪知母之類腹痛作嘔脈洪數而無倫次先以六君子湯加炮薑痛嘔漸愈又用補中益氣湯而痊

舉士徐崦西口乾有痰欲服瓊玉膏予曰此沉陰降火之劑君面白口乾而有痰屬脾肺氣虛也當用溫補之劑不信仍服兩月餘大便不實飲食少思且兼陰痿始信予言先用補中益氣加茯苓半夏二味以溫補脾胃飲食漸加大便漸實乃去二味服月餘而痊更服六味丸三月餘陰道如常矧瓊玉膏固本丸坎離丸此輩俱是沉寒瀉火之劑非腸胃有燥熱者不宜服若足三陰經陰虛發熱者久而服之令人無子蓋謂損其陽氣則陰血無所生故也屢驗

陽山之內素善怒胃腦不利吐痰甚多吞酸噯腐飲食少思手足發熱所服非芩連枳實必檳蘇厚朴左關弦洪右關弦數余以爲肝火血燥木乘土位也朝用六味地黃丸以滋養肝木夕用六君子加當歸芍藥以調補脾土不月而愈後因恚怒前疾復作或用二陳加石膏服之吐涎如湧外熱如灼脈洪大按之如無余曰脾主涎乃脾損發熱而涎泛溢也用六君子加薑柱一服即睡覺而諸證頓失又數劑而康若服理氣化痰等藥必變腹脹喘促腿浮膝腫淋瀝等證急用濟生加減腎氣丸救之多有得生者

一男子食少胃滿手足逆冷飲食畏寒發熱吐痰時欲作嘔自用溫氣化痰之劑胃脘愈脹呼吸不利吐痰嘔食小便淋瀝又用五苓散之類小便不利諸病益甚余曰此脾土虛寒無火之證故食入不消而反出非氣膈所致遂用八味丸補中益氣加半夏茯苓薑桂旬日乃愈

一男子體肥善飲舌本強語濁痰壅口眼喎斜肢體不遂余謂脾虛濕熱痰涎所致用六君子加煨乾薑山梔神麴而愈

少司馬黎仰之因怒耳鳴吐痰作嘔不食寒熱脅痛用小柴胡合四物加山梔茯神陳皮而痊

一男子素不善調攝唾痰口乾飲食不美服化痰行氣之劑胃滿腹膨痰涎愈盛服導痰理脾之劑肚腹膨脹二便不利服分氣利水之劑腹大脅痛睡臥不得服破血消導之劑兩足背腫兩關脈浮大不及於寸口余以脾土虛而生痰朝用金匱加減腎氣丸夕用補中益氣湯煎送前丸月餘諸證漸退飲食漸進再用八味丸補中益氣湯月餘乃能轉側又兩月而能步履却服十全大補湯還少丹又半載而康後稍失調理其腹仍脹隨服前藥即愈

舊僚錢可久素善飲酒赤痰盛大使不實余以爲腸胃濕痰壅滯用二陳芩連山梔枳實乾葛澤瀉升麻一劑吐痰甚多大使始實此後日以黃連三錢泡湯飲之而安

橫金陳于復面帶赤色吐痰口乾或脘作瀉或用二陳黃連枳實之類不應予脈之左關弦急右關弦大此乃腎水挾肝木之勢而剋勝脾土也不信後交夏果患痢而亡

府庠沈文娘母食濕麵吞酸嘔吐絕食服芩連等劑加寒熱口乾流涎又食冬瓜一星而嘔吐愈甚予謂此脾氣虛寒也急用鹽艾附子炒熱熨臍腹又以其子口氣接其母氣神氣少甦以參朮附子陳皮爲末丸如粟米大津嚥五七粒次日加至十餘粒漸服煎劑一二匙乃思粥飲又以參朮等藥五十餘劑而愈

一儒者敖嘿痰盛胃腹不利飲食少思肢體倦怠脈浮大按之微弱服二陳枳殼等藥愈盛余曰脾肺腎虛也用補中益氣湯六味地黃丸而愈

一婦人脾胃虛弱飲食素少忽痰壅氣喘頭搖目斜手揚足擲難以候脈視其面色黃中兼青此肝木乘脾胃也用六君子加柴胡升麻治之而甦更以補中益氣加半夏調理而痊

一男子素吐痰遇怒其痰益甚胃腦宿滿此肝木制脾土也用六君加木香治之而痊

一婦人素鬱結胃腦不寬吐痰如膠用加味歸脾湯乃痊

一婦人吐痰頭運帶下青黃用四七湯送白丸子小柴胡加白朮茯苓治之而安

一婦人元氣素弱痰氣時作或咽間不利或胃脘等證予以爲鬱結傷脾用加味歸脾湯治之而愈後遇恚怒前證仍作惑於衆言以爲痰飲妄用祛痰之劑吐瀉數次變諸異證口噤不醒余以爲脾胃復傷日用六君子一劑米飲濃煎常服逾許至四日漸進粥食乃服前藥間以歸脾湯喜其善調養兩月餘諸證悉愈

錦衣楊永興筋骨軟痛氣粗痰盛作渴喜水或用愈風湯天麻丸更加痰甚體麻余以爲脾腎俱虛用補中益氣湯加減八味丸三月餘而痊

州判蔣大用年五十形體魁梧中滿吐痰勞則頭運所服皆清痰理氣余曰中滿者脾氣虛損也痰盛者

脾氣不能運也頭運者脾氣不能升也指麻者脾氣虛而不能周也遂以補中益氣加茯苓半夏以補脾土八味丸以補脾母而愈

一儒者脾腎素虛而有痰或用導痰之法痰甚作渴頭運煩熱余謂中氣虛弱而變證用補中益氣湯而愈後勞役發熱頭運此氣虛不能上升也用前湯加蔓荊子而愈後又勞神畏見風寒四肢逆冷口沃痰涎予以爲脾虛寒之眞病以六君子加炮薑肉桂而愈

一男子素腎虛而欬痰亦用導痰之法虛證悉具痰涎上湧小便頻數余謂足三陰虛而復損也朝用補養脾氣湯培養脾肺之氣夕用六味丸加五味子收斂耗散之精而愈

進士張禹功飲食停滯胷滿唾痰或用藥導之痰涎上湧眩運熱渴大便祕結喜冷飲食手足發熱余謂腎水虛弱津液難降敗液爲痰用六味丸而愈

太宜人年七十五遍身作痛筋骨尤甚不能伸屈口乾目赤頭眩痰湧胷膈不利小便赤濇而短少夜間痰熱殊甚遍身作痒如蟲行此肝經氣燥而風動也用六味地黃丸料加山梔柴胡治之而愈

儒者王錄之素痰甚導吐之後大便燥結頭運眼花等證尺脈浮大按之則濇此腎氣虛而兼血虛也四物送六味丸四劑諸證悉退仍用前丸月餘而康

僉憲高如齋素唾痰服下痰藥痰去甚多大便祕結小便頻數頭運眼花尺脈浮大按之如無余謂腎家不能納氣歸源前藥復耗金水而甚用加減八味丸料煎服而愈

儀制賀朝卿吞酸胷滿痰盛作瀉飲食少思用清氣化痰等藥前證益甚兩膝漸腫寒熱往來余謂脾胃虛濕熱下注用補中益氣湯倍參朮加茯苓半夏炮薑而愈

余甥范允迪欬嗽痰盛胷腹不利飲食少思肢體倦怠脈浮大按之微弱服二陳枳殼等藥愈盛余曰脾肺腎虛也用補中益氣六味丸而愈

侍御譚希曾喘欬吐痰或手足時冷此中氣虛寒用補中益氣炮薑而愈

考功楊朴菴嘔吐痰涎胷腹膨脹飲食少思左關脈弦長按之無力右關脈弦長按之微弱此木尅土用六君子加柴胡山梔木香而愈

一儒者體肥仲夏患痰喘用二陳芩連桔梗痰喘益甚加桑皮杏仁苦蔞盜汗氣促加貝母枳殼不時發熱飲食漸減脈大而無力予以爲脾肺虛寒用八味地黃丸以補土母用補中益氣湯以接中氣而愈

二守陳子忠飲食少思吐痰口乾常服二陳枳實黃連之類脾胃受傷乃問於余余述東垣先生云脾胃之證實則枳實黃連瀉之虛則白朮陳皮補之彼遂以二味等分爲丸常服由是多食而不傷過時而不饑

一儒者脾氣虛弱嘔吐痰涎因怒胷腹膨脹飲食少思左關脈弦長按之無力右關脈弦長按之微弱此木尅土也用六君子加柴胡山梔木香治之而愈

冢宰劉紫岩因勞下體軟痛發熱痰盛用清燥湯入竹瀝薑汁服之熱痛減半再劑而全愈

一婦人欬嗽吐痰胷膈作痛右寸關浮滑項下牽強此脾胃積熱成痰非肺癰也以二陳湯加山梔白朮桔梗治之而痊

古今醫統曰一婦人年二十身頗肥性急因氣惱後得痰欬嘔逆用二陳加順氣降火開鬱利痰之劑如水投石漸次欬逆怪聲哈哈日夜不絕昔人所謂欬逆連連五七十聲方已或三五十聲而已者此之謂欬逆也茲日夜連聲不息無乃死證歟脈浮而微洪沉按小滑復以滾痰丸下之亦如故予意痰鬱滯胃脘胷膈之間而氣不得宣通欬逆而後能出非吐之不可遂以瓜蔕散酸漿水調鵝翎探吐得痰椀許而欬逆遂止寂然無聲而其效若神也逾二日因食麵及肉汁又復欬逆與清痰順氣藥不效予意前日吐痰不多尚有未盡再吐之又得痰半椀許即愈

一丈夫年四十餘身肥素躭勞神有痰火一日先惡寒後發熱頭微痛眩多如不勝其重躁熱不退自用參蘇飲發汗不愈請予治診其脈沉洪而滑予謂痰火鬱積無疑矣以二陳加芩連天麻神麴之類復以滾痰丸下之三逾日反躁熱不退欬唾痰涎不止此正丹溪云痰在膈上非吐不可瀉之亦不去復用瓜蔕散探吐之得痰半椀許彼畏苦而止予意痰少不能效躁熱如舊但以人參白虎湯五苓散合服亦不愈予謂鬱滯重吐難得出分利亦不去宜以散鬱之劑仍用二陳加前胡柴胡葛根桔梗蒼朮川芎薑汁炒芩梔三劑遂愈

寓意草曰錢叔翁太老先生形體清瘦平素多火少痰邇年內蘊之熱蒸濕爲痰辛巳秋夏間濕熱交勝時忽患右足麻木冷如冰石蓋熱極似寒如暑月反

雨冰雹之類醫者以其足跗之冷也不細察其爲熱極似寒悞以牛膝木瓜防己加皮羌獨之屬溫之甚且認爲下元虛憊悞用桂附河車之屬補之以火濟火以熱益熱繇是腫潰出膿水浸淫數月踝骨已下足背指腫廢而不用總爲悞治而至此極耳其理甚明無難於辨若果寒痰下墜不過堅凝不散止耳甚者不過痿痹不仁止耳何至腫而且潰黃水淋漓腐肉穿筋耶太翁不知爲醫藥所悞乃委咎於方隅神殺所致豈其然哉此與傷寒壞證熱邪深入經絡而生流注無少異也所用參膏但專理元氣而無清解濕熱之藥以佐之是以未顯決效以元老之官不可以理煩劇設與竹瀝同事人參固其經竹瀝通其絡則甘寒氣味相得益彰矣徐太掖先生服人參以治虛風悞佐以附子之熱迄今筋脈短縮不便行持亦繇不識甘寒可通經絡也且太翁用參膏後脾氣亦既大旺健運有加矣此時儻能撙節飲食俾脾中所生之陽氣得耑力以驅痰驅熱則痰熱運行而足患並可結局乃日食而外加以夜食雖脾氣之旺不爲食所傷然以參力所生之脾氣不用之運痰運熱止用之以運食誠可惜也今者食入亦不易運以助長而反得衰迺至痰飲膠結於胷中爲飽爲悶爲頻欬而痰不行總爲脾失其健不爲胃行津液而飲食反以生痰漸漬充滿肺竅欬不易出雖以治痰爲急然治痰之藥大率耗氣動虛恐痰未出而風先入也唯是確以甘寒之藥杜風消熱潤躁補虛豁痰迺爲合法至於辛熱之藥斷斷不可再悞矣醫者明明見此輒用桂附無算想必因膿水易乾認爲辛熱之功而極力以催之結局耳可勝誅哉

卣翁老先生脈盛體堅神采百倍從無病邪敢犯但每早浴面必嘔痰水幾口胷前慣自摩揉乳下宗氣其動應衣若夜睡寧水道清則胷中爽然其候似病非病遍考方書廣詢明醫不得其解昌謂是痰飲結於胷膈小有窠囊緣其氣之壯盛隨聚隨嘔是以痰飲不致爲害而膻中之氣則因嘔而傷矣夫膻中者與上焦同位胷膈經云上焦如霧言其氣之氤氳如霧也又曰膻中者臣使之官言其能分布胷中之氣而下傳也今以嘔之故而數動其氣則氤氳變爲急迫上奔然稍定則仍下布亦不爲害也大率痰爲標氣爲本治標易而治本則難非治本之難以往哲從未言其治法而後人不知所治耳昌試論之治氣之源有三一曰肺氣肺氣清則週身之氣肅然下行先生之肺氣則素清也一曰胃氣胃氣和則胷中之氣亦易下行先生之胃氣則素和也一曰膀胱之氣膀胱之氣旺則能吸引胷中之氣下行先生青年善養膀胱之氣則素旺也其膻中之氣亂而即治擾而即恬者賴此三氣暗爲輸運是以不覺其累即謂之無病也可若三氣反干胷膈之人其爲緊爲脹可勝道哉故未形之病可以不言而屢動之氣不可不亟反於氤氳先生但覺爲痰飲所苦晝日嘗鼓呼吸之氣觸出胷膈之痰而未知痰不可出徒傷氣也蓋夜臥則痰聚於胃晨起自能嘔出日間胃之津液四達臟腑即激之亦不出耳然則痰消則氣自順是必以治痰爲急而體盛痰不易除又必以健脾爲先脾健則新痰不生其宿痰之在窠囊者漸漬於胃而上下分消於是無痰則不嘔不嘔則氣不亂氣不亂則日返於氤氳矣雖然尚有一喫緊關頭當並講也人身胷中空曠如太虛地氣上則爲雲必天氣降而爲雨地氣始收藏不動誠會上焦如霧中焦如漚下焦如瀆之意則知雲行雨施而後溝瀆皆盈水道通決乾坤有一番新景象矣此義首重膀胱一經經云膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣如人之飲酒無筭而不醉者皆從膀胱之氣化而出也膻中位於膈內膀胱位於腹內膀胱之氣化則空洞善容而膻中之氣得以下運若膀胱不化則腹已先脹膻中之氣安能下達耶然欲膀胱之氣化其權尤在於葆腎腎以膀胱爲腑者也腎氣動必先注於膀胱屢動不已膀胱滿脹勢必逆奔於胷膈其窒塞之狀不可名言腎氣不動則收藏愈固膀胱得以清淨無爲而膻中之氣注之不盈矣膻中之氣下走既捷則不爲牽引所亂而胷中曠若太空昌更曰順氣則痰不留即不治痰而痰自運矣卣臣先生問曰痰在膈中去喉不遠每早必痛嘔始出者何耶曰道不同也胷膈之間重重脂膜遮蔽渾無空隙痰從何出所出者胃中之痰耳曰然則膈中之痰不出耶曰安得不出但出之艱耳蓋膻中之氣四布於十二經布於手足六陽經則其氣從喉吻而上出布於手足六陰經則其氣從前後二陰而下出然從下出者無碍從上出者亦必先下注陽明始得上越是以難也曰若是則所論膀胱氣化一段淵乎微矣但吸引之機權從不見於經典豈有所自乎曰內經有巨陽引精之義緣無註解人不能會巨陽者太陽膀胱也謂膀胱能吸引胷中

之氣下行而胷中之脹自消此足證也曰胷中窠囊之說確然無疑但不知始於何因結於何處消於何時也曰人身之氣經盛則注於絡絡盛則注於經窠囊之來始於痰聚胃口嘔時數動胃氣胃氣動則半從上出於喉半從內入於絡胃之絡貫膈者也其氣奔入之急則冲透膈膜而痰得以居之痰入既久則阻礙氣道而氣之奔入者復結一囊如蜂子之營穴日增一日故治之甚難必先去胃中之痰而不嘔下觸俾胃經之氣不急奔於絡轉虛其胃以聽絡中之氣返還於胃逐漸以藥開導其囊而滌去其痰則自愈矣此昌獨得之見屢試之法也

黃我兼世兄尊夫人驚痰堵塞竅隧肝肺心包絡間無處不有三部脈虛軟無力邪盛正衰不易開散有欲用涌劑稍吐十分之三誠爲快事但細籌之此法殆不可行蓋涌法政如兵家劫營之法安危反掌原屬險道況痰迷不過片晌耳設以涌藥投之痰纔一動人即運去探之指不得入咽之氣不能下藥勢與病勢相扼轉致連日不甦將若之何無已如丹溪所云懼吐者宜消息下之乎不知竅隧之痰即導之下行萬不能導徒傷脾氣痰愈窒塞此法亦不可用也爲今之計確以理脾爲先脾氣者人身健運之陽氣如天之有日也陰凝四塞者日失其所痰迷不省者脾失其權耳理脾則如烈日當空片雲纖翳能掩之乎其次莫如清肺肺爲將帥之官氣清則嚴肅下行氣下行則痰之藉爲堅城固壘者方示以瑕而可用其攻擊之力所謂攻堅則瑕者亦堅攻瑕則堅者亦瑕是也今四末腫麻氣壅已甚尤不可不亟亟矣其理脾之法須藥餌與飲食相參白飯香蔬苦茗便爲佳珍不但滑膩當禁即粥亦不宜食以粥飲之結爲痰飲易易耳不但雜食當禁即飯食亦宜少減以脾氣不用以消穀轉用之消痰較藥力萬萬耳其辛辣酒脯及煎煿日曝之物俱能傷肺並不宜食至於用藥自有節次矩矱俟日漸輕安來春方奏全績也緣此病人不識治前賢亦未見高出手眼但思之累日竊以爲要領在是所以必欲持久者與金城方略同意且先除脅從後殲巨魁是勢所不易捷得之事蓋以驚痰之來始於肝膽冬月木氣歸根不敢攻治故但以理脾藥平調必至春月木旺纔用四君子湯加龍膽草蘆薈代赭石黃連青黛等藥爲丸服之痰迷之證果獲全瘳此後不發

欬嗽門一

黃帝素問

欬論

黃帝問曰肺之令人欬何也岐伯曰五臟六腑皆令人欬非獨肺也

註 肺主氣而朝百脈五臟六腑之邪皆能上歸於肺而爲欬

帝曰願聞其狀岐伯曰皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣亦從其合也其寒飲食入胃從肺脈上至於肺則肺寒肺寒則外內合邪因而客之則爲肺欬

註 皮毛者肺之合天之寒邪始傷皮毛則邪從其合而內傷肺矣寒飲入胃則冷飲之邪從肺脈而上至於肺外內之邪合併因而客之則爲肺欬矣

五臟各以其時受病非其時各傳以與之

註 乘春則肝先受邪乘夏則心先受邪乘秋則肺先受邪各以所主之時受病如非其秋時則五臟之邪各傳與之肺而爲欬也

人與天地相參故五臟各以治時感於寒則受病微則爲欬甚則爲泄爲痛

註 五臟之氣與四時五行之氣相合故受病微則上乘於肺而爲欬甚則上行極而下爲泄痛矣

乘秋則肺先受邪乘春則肝先受邪乘夏則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬則腎先受之

註 先受之者謂次即傳及於肺而爲欬也欬乃肺之本病故先言肺先受邪

帝曰何以異之岐伯曰肺欬之狀欬而喘息有音甚則唾血

註 肺司呼吸故欬則喘息有音肺主氣甚則隨氣上逆而唾血也

心欬之狀欬則心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痹

註 喉乃肺竅心火淫金故喉中介然如梗手少陰心脈起於心中出屬心系上挾咽故咽喉腫痛

肝欬之狀欬則兩脅下痛甚則不可以轉轉則兩胠下滿也

註 肝脈布脅肋上注肺故欬則兩脅下痛不可轉

者不可以俛仰也蓋肝邪上乘於肺則爲欬甚則下逆於經而不可以轉轉則胠下滿

脾欬之狀欬則右脅下痛陰陰引肩背甚則不可以動動則欬劇

註 脾臟居右故欬則右脅下痛脾氣上通於肺肺之俞在肩背故陰陰引於肩背蓋微則上乘於肺而爲欬甚則病及於本經

腎欬之狀欬則肩背相引而痛甚則欬涎

註 腎脈貫膈入肺中故欬則肺俞相引而痛肺腎皆積水也故甚則欬涎

帝曰六腑之病奈何安所受病岐伯曰五臟之久欬乃移於六腑

註 六腑之病從臟氣而轉移

脾欬不已則胃受之胃欬之狀欬而嘔嘔甚則長蟲出

註 脾與胃合脾病移於胃則胃氣逆故嘔嘔甚則穀氣消穀消則蟲上下作故甚則長蟲出

肝欬不已則膽受之膽欬之狀欬嘔膽汁

註 邪在膽則逆在胃胃氣逆則嘔苦

肺欬不已則大腸受之大腸欬狀欬而遺矢

註 大腸者肺之腑爲傳道之官是以上逆則欬下逆則遺矢

心欬不已則小腸受之小腸欬狀欬而失氣氣與欬俱失

註 失氣後氣也夫厥氣上逆則欬下逆則爲失爲遺氣與欬俱失者厥逆從上下散也

腎欬不已則膀胱受之膀胱欬狀欬而遺溺

註 膀胱者津液之腑水道出焉故欬而遺溺

久欬不已則三焦受之三焦欬狀欬而腹滿不欲食飲

註 三焦爲中瀆之腑故腹滿欬則上焦不能主納故不欲食飲也

此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也

註 欬則肺舉而液上溢故使人涕唾水氣上乘故面浮腫而氣逆也

帝曰治之奈何岐伯曰治臟者治其俞治腑者治其合浮腫者治其經

註 欬在五臟當治其俞欬在六腑者取之於合浮腫者取肺胃之經脈

氣交變大論

歲火太過炎暑流行金肺受邪民病瘧少氣欬喘

註 諸戊之歲火運太過火勝則尅金故肺受火熱而喘欬也

歲金太過燥氣流行肝木受邪甚則喘欬氣逆欬逆甚而血溢

註 喘欬逆氣肺病也肝脈貫肺中故欬逆甚肝主藏血故血溢也

歲水太過寒氣流行邪害心火甚則喘欬

註 諸丙之歲水運太過故甚則水氣上逆而爲喘欬

歲木不及燥乃大行復則炎暑流火上勝肺金欬而鼽

註 主歲之木運不及則金之燥氣大行而火因母鬱而復蓋不及之歲所勝之氣妄行而反自虛其位故復氣得以勝之肺開竅於鼻故欬而鼽

至眞要大論

少陰司天熱淫所勝民病寒熱欬喘甚則肺脹腹大滿膨膨而喘欬

註 子午之歲少陰之火發於陰中故肺受火熱而津液不生也

少陽司天火淫所勝金政不平民病欬

註 少陽司天寅申歲也火淫所勝故金政不平而欬

陽明司天燥淫所勝民病欬

註 陽明司天卯酉歲也燥金淫勝於上故大凉革候而欬

陽明之勝清發於中嗌塞而欬

註 金氣寒肅故清發於中嗌塞而欬者陽明燥金上及於肺同氣相感也

帝曰六氣之復何如岐伯曰少陰之復燠熱內作氣動於左上行於右欬皮膚痛

註 氣動於左者君火之氣發於左腎之水中上行於右者肺腎上下相交腎爲本而肺爲末也火淫肺金則欬而皮膚痛

太陰之復濕變乃舉飲發於中欬喘有聲

註 氣極則變欬喘有聲者飲來於肺也

少陽之復欬衄甚則入肺欬而血泄

註 少陽之火復發於秋冬之時是以熱乘心肺而爲欬甚則入肺欬而血泄氣血皆傷也

陽明之復清氣大舉嘔苦欬噦煩心病在膈中

註 陽明之復發於本位主令之時是以清氣大舉

欬嘔肺氣逆也欬嘔煩心者病在膈中陽明之氣上逆也陽明太陽之發輒復戚半以前之氣是以木火土之皆病也

厥陰司天客勝則耳鳴掉眩甚則欬

註風木之客氣勝甚則欬者上淫之氣入於經也

少陰司天客勝甚則欬喘

註少陰司天三之氣乃少陰君火欬喘君火之氣勝也蓋君火司歲故先火勝而甚則及於厥陰

少陽司天主勝則胃滿欬仰息甚而有血手熱

註少陽司天初氣三氣乃君相二火主勝則胃滿欬仰息者主氣之二火欲上炎而外出也

太陽司天客勝則胃中不利出清涕感寒則欬

註太陽之氣在表肺主皮毛故胃中不利出清涕而欬曰感寒者謂太陽與寒水之有別也

陽明司天清復內餘則欬衄嗌塞心膈中熱欬不止而白血出者死

註清復內餘者清霜之客氣入於內而有餘也欬衄嗌塞心膈中熱皆肺病也白血出於肺陽明司天天之氣也臟屬陰而血爲陰血出於肺則陽甚而陰絕矣

六元正紀大論

金鬱之發民病欬逆

註欬逆肺之病

少陽司天之政氣化運行先天初之氣寒乃去候乃大溫其病氣怫於上血溢目赤欬逆頭痛

註初之間氣乃少陰君火血溢目赤欬逆等證皆風火之爲病也

二之氣火反鬱其病甚於上欬逆喘吐

註二之客氣乃太陰濕土則病熱鬱嘔吐諸苦因陰濕凝於外而火熱鬱於內也

三之氣炎暑至民病欬嘔

註司天之氣上臨於三氣病欬嘔感風火之氣也

少陰司天之政氣化運行先天民病欬喘

註欬喘熱病生於上也

終之氣燥令行餘火內格腫於上欬喘

註終氣乃陽明燥金司令故燥令行氣交之餘熱內格而爲欬喘

陽明司天之政氣化運行後天民病欬嗌塞

註欬嗌塞皆感燥濕之氣而爲病也

陰陽別論

一陽發病少氣善欬善泄

註一陽者少陽之氣病則生氣少而火壯火爍金故善欬

調經論

氣有餘則喘欬上氣

註肺主氣而司呼吸故有餘則喘欬上逆

厥論

手太陰厥逆虛滿而欬

註肺主氣逆故虛滿而欬

陽明厥逆喘欬

註陽明氣厥則喘上逆則欬也

五藏生成篇

欬嗽上氣厥在胃中過在手陽明太陰

註邪傷皮毛氣分則欬嗽而氣上逆矣手太陰之脈起於中焦循胃上膈手陽明之脈入缺盆絡肺下膈屬大腸邪過在經是以胃中厥逆也

生氣通天論

秋傷於濕上逆而欬發爲瘧厥

註陰病者下行極而上是以秋傷於濕上逆而欬

脈解篇

少陰所謂嘔欬上氣喘者陰氣在下陽氣在上諸陽氣浮無所依從故嘔欬上氣喘也

註少陰寒水在下君火之氣在上上下水火不交則諸陽之氣上浮而無所依從矣是以陽熱上逆而爲嘔欬氣喘之病

少陽所謂欬則有血者陽脈傷也陽氣未盛於上而脈滿滿則欬故血見於鼻也

註陽氣未盛於上者言至九月而少陽始盛也夫血隨氣行氣未盛而脈先滿則血留而上逆矣

標本病傳論

肺病喘欬三日而脅支滿痛一日身重體痛五日而腹十日不已死冬日人夏日出

註日出氣始生日入氣收引肺主氣故終於氣之出入也

心病先心痛一日而欬三日脅支痛五日閉塞不通身痛體重三日不已死冬夜半夏日中

註心爲火藏冬之半夜者水勝而火滅也夏之日中者亢極而自焚矣

五常政大論

金不及曰從革從革之紀其發欬喘其藏肺其病嚏欬鼽衄

註 欬喘火刑肺也噫欬鼽衄金之病也
金太過曰堅成堅成之紀其病欬
註 病欬火傷肺也
少陽司天火氣下臨肺氣上從欬噫鼽衄鼻窒
註 上從者因司天之氣下臨長其勝制而從之也
欬噫鼽衄鼻窒皆肺病也

風論

以秋庚辛中於邪者爲肺風肺風之狀多汗惡風色
皏然白時欬短氣晝日則差暮則甚診在眉上其色
白
註 風爲陽邪開發腠理故多汗風氣傷陽邪正不
合故惡風肺屬金其色白肺主氣在變動爲欬風
邪迫之故時欬短氣晝則陽氣勝而能勝邪故差
暮則氣衰故病甚眉上乃闕庭間肺之候也

診要經終論

春刺秋分筋攣逆氣環爲欬嗽
註 藏眞高於肺主行榮衛陰陽者也榮衛氣血所
以濡筋骨利關節病在肝而反傷其肺是以筋攣
血氣環逆故令人氣逆而轉爲欬嗽

玉機眞藏論

秋脈不及則令人喘呼吸少氣而欬上氣見血下聞
病音
註 肺主周身之氣不及則令人氣虛而喘呼吸少
氣而欬氣虛上逆則血隨而上行氣虛下逆則聞
呻吟之病音

宣明五氣論

肺爲欬
註 陰陽應象論曰肺在變動爲欬

評熱病論

病腎風虛不當刺而刺後五日其氣必至至
必少氣時熱時熱從胃背上至頭汗出手熱口乾苦
渴小便黃目下腫腹中鳴身重難以行月事不來煩
而不能食不能正偃正偃則欬病名曰風水眞氣上
逆故口苦舌乾臥不得正偃正偃則欬出清水也諸
水病者故不得臥臥則驚驚則欬甚也
註 病名風水者因風而動其水也眞氣者藏眞之
心氣也心屬火而惡水邪水氣上乘則迫其心氣
上逆是以口苦舌乾腎爲本肺爲末金水子母之
藏皆積水也是以水氣上逆於肺則欬出清水水
邪乘胃故不得臥胃絡上通於心陽氣入陰陰陽
相薄故驚恐心氣上乘於肺金畏火熱故欬甚也

痹論

脾痹者四肢解墮發欬嘔汁上爲大塞
註 脾氣不能行於四肢故四肢解墮脾脈上鬲挾
咽氣痹不行故發欬入胃之飲上輸於脾肺脾氣
不能轉輸故嘔汁肺氣不能通調故上爲大塞

靈樞經

邪氣藏腑病形篇

肝脈微大爲欬引小腹
註 肝脈抵少腹上注肺欬引小腹者經氣逆也
肺脈微急爲肺寒熱急惕欬唾血引腰背胸
註 肺主氣急惕欬唾血引腰背胸皆肺氣虛寒也

本藏篇

肺高則上氣肩息欬
註 肺主氣故高則上氣息肩而欬

玉版篇

欬且漏血脫形其脈小勁逆也欬脫形身熱脈小以
疾逆也不過十五日而死矣
註 欬而漏血形脫其脈小勁逆傷肺也夫心主血
肺者心之蓋欬形脫身熱脈小以疾逆傷心也
欬漏血形肉脫脈搏逆也欬嘔腹脹且飧泄其脈絕
逆也不過一時而死矣
註 欬漏血形肉脫脈搏逆於肺絡也欬嘔腹脹且
飧泄其脈絕逆於肝脾之絡也

經脈篇

肺手太陰之脈是動則病肺脹滿膨膨而喘欬缺盆
中痛甚則交兩手而瞀此爲臂厥是主肺所生病者
欬上氣喘渴煩心胷滿臑臂內前廉痛厥掌中熱
註 是主肺所生之病故欬喘上氣渴而煩心肺主
氣而爲水之生原肺乃心之蓋也胷滿臑臂痛掌
中熱皆經脈所循之部而爲病也

熱病篇

欬而衄汗不出出不至足者死
註 欬者內熱上逆於肺也衄者表熱外迫於經也
夫肺主皮毛而朝百脈外內之熱咸從肺氣以汗
解汗不出者氣絕於上也出不至足者氣絕於下
也

脹論

肺脹者虛滿而喘欬
註 吳氏曰此衛氣逆於城郭之中而爲肺脹也

論疾診尺篇

視人之目窠上微癰如新臥起狀其頸脈動時欬按其手足上窅而不起者風水膚脹也

水隨氣而溢於皮膚之間故目窠微腫頸脈動而膚脹欬者水雷於皮毛而動其肺氣也風水者因外受於風風行而水漾也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百六十三卷目錄
醫部彙考二百四十三
欬嗽門二
扁鵲難經 欬
張機金匱要略 痰證爲欬
華佗中藏經 論臟腑虛實生死
王叔和脈經 欬脈
脈訣 欬脈
孫思邈千金方 欬論
朱肱活人書 欬嗽
劉完素六書 欬嗽論
張潔古活法機要 欬嗽證
張從政儒門事親 辨分六氣母病以及說
李杲十書 欬傷於邪冬夏欬嗽論 湯氣所傷用藥法
朱震亨心法 欬嗽
戴思恭證治要訣 欬嗽
樓英醫學綱目 治已 欬嗽
王綸明醫雜著 欬嗽門治
李梴醫學入門 外感總論 外感 內傷 分治分劑久

扁鵲難經

欬

假令得肺脈其外證面白善嚏悲愁不樂欲哭其內證齊右有動氣按之牢若痛其病喘欬洒洒寒熱有是者肺也無是者非也

何以知傷寒得之然當譫言妄語何以言之肺主聲入肝爲呼入心爲言入脾爲歌入腎爲呻自入爲哭故知肺邪入心爲譫言妄語也其病身熱洒洒惡寒甚則喘欬其脈浮大而濇肺之積名曰息賁在右脅下覆大如杯久不已令人洒淅寒熱喘欬發肺壅以春甲乙日得之何以言之心病傳肺肺當傳肝肝以春適王王者不受邪肺復欲還心心不肯受故留結爲積故知息賁以春甲乙日得之

漢張機金匱要略

雜證爲欬

熱在上焦者因欬爲肺痿寸口脈數其人欬口中反有濁唾涎沫者爲肺痿之病

問曰病欬逆脈之何以知此爲肺癰當有膿血吐之則死其脈何類師曰寸口脈微而數微則爲風數則爲熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吹而不出風傷皮毛熱傷血脈風舍於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多濁沫時時振寒熱之所過血爲之凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌可抹膿成則死

欬而上氣喉中水雞聲射干麻黃湯主之

欬逆上氣時時唾濁但坐不得眠皂莢丸主之

欬而脈浮者厚朴麻黃湯主之

欬而胷滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者爲肺癰桔梗湯主之

肺脈欬而上氣煩躁而喘脈浮者心下有水小青龍加石膏湯主之

胷痺之病喘息欬唾胷背痛短氣寸口脈沉而遲關上小緊數若雙雄白酒湯主之

欬逆倚息不得臥其形如腫謂之支飲

支飲者胷下痛引缺盆欬嗽則輒已一作轉甚

胷上病痰滿喘欬吐發則寒熱背痛腰疼目泣自出其人振振身瞤劇必有伏飲

欬家其脈弦爲有水十棗湯主之

夫有支飲家欬煩胷中滿者不卒死至一百日或一歲宜十棗湯

久欬數歲其脈弱者可治實大數者死其脈虛者必苦冒其人本有支飲在胷中故也治屬飲家

欬逆倚息不得臥小青龍湯主之青龍湯已下多唾口燥寸脈沉尺脈微手足厥逆氣從小腹上沖胷咽手足痹其面翕熱如醉狀因復下流陰股小便難時復冒者與茯苓桂枝五味甘草湯治其氣衝

氣衝即低而反更欬胷滿者用桂苓五味甘草湯去桂加乾薑細辛以治其欬滿

欬滿即止而更復渴衝氣復發者以細辛乾薑爲熱

藥也服之當送渴而渴反止者爲支飲也支飲者法當冒冒者必嘔嘔者復內半夏以去其水寸口脈沉滑者中有水氣面目腫大有熱名曰風水視人之目裏上微擁如蠶新臥起狀其頸脈動時時欬按其手足上陷而不起者風水

太陽病脈浮而緊痛在骨節欬而喘不渴者此爲脾脈其狀如腫發汗即愈然諸病此者渴而下利小便數者皆不可發汗

問曰病者苦水面目身體四肢皆腫小便不利脈之不言水反言胃中痛氣上冲咽狀如炙肉當微欬喘審如師言其脈何類師曰寸口脈沉而緊沉爲水緊爲寒沉緊相搏結在關元始時當微年盛不覺陽衰之後榮衛相干陽損陰盛結寒微動腎氣上冲喉咽塞噎脅下急痛醫以爲蓄飲而大下之氣擊不去其病不除後重吐之胃家虛煩咽燥欲飲水小便不利水穀不化面目手足浮腫又與葶藶丸下水當時如小差食飲過度腫復如前胃脘苦痛象若奔豚其水揚溢則浮欬喘逆當先攻擊衝氣令止乃治欬欬止其喘自差先治新病病當在後

夫吐血欬逆上氣其脈數而有熱不得臥者死

夫酒客欬者必致吐血此因極飲過度所致也

華佗中藏經

論藏腑虛實生死

心病則先心痛而欬不止膈不通身重不已三日死

小腸者受盛之腑也欬則氣欬一齊出也

肺脈來毛而微曰不及不及則令人喘呼而欬上氣見血下聞病音虛則寒生欬息利下少氣力多悲感又肺病久欬而見血身熱而短氣脈當澀今反浮大色當白今反赤者火尅金十死不治肺病喘欬身寒無熱脈遲微者可治虛則不能息耳重噬乾喘欬上氣肩背痛又欬而遺小便者上虛不能制下故也飲酒中風言則肺發欬嗽喘悶見血者不可治無血者可治又其人素聲清而雄烈暴不亮而拖氣用言語難出視不轉睛雖未爲病其人不久又肺病矣則上氣喘急欬嗽身熱脈大也虛則力乏之喘促右脅脹語言氣短者是也

腎病腹大體重滿欬嗽汗出憎風又喉鳴坐而喘欬血出亦爲腎虛寒氣欲絕也

膀胱者津液之腑也膀胱欬而不已則傳之三焦腹滿而不飲食

中焦實熱則上下不通腹脹喘欬下氣不上上氣不下關格而不通

暴欬嗽脈數身瘦者死暴欬嗽脈散者死暴欬形肥脈急甚者死病嗽而嘔便滑不禁脈弦微欲絕者死

諸病嗽喘脈沉而浮者死病欬嗽脈沉堅者死

晉王叔和脈經

欬脈

右手寸口氣口以前脈陽實者手陽明大腸經實也病苦腹滿善喘欬面赤身熱咽喉中如核狀

凡亡汗肺中寒飲冷水欬嗽下利胃中虛冷此等其脈並緊

浮短者其人肺傷諸氣微少不過一年死法當嗽也

欬嗽脈沉緊者死浮直者生浮軟者生小沉伏匿者死

欬嗽羸瘦脈形堅大者死

欬脫形發熱脈小堅急者死肌瘦下脫形熱不去者死

脈訣

欬脈

肺脈歌曰沉緊相兼滑仍聞欬嗽聲

滑脈歌曰寸滑膈痰生嘔吐吞酸舌強或欬嗽

促脈歌曰促脈惟將火病醫其因有五細推之時時喘欬皆痰積或發花斑與毒疵

唐孫思邈千金方

欬論

經云五藏六腑皆令人欬肺居外而近上合於皮毛皮毛喜受邪故肺獨易爲欬也邪客於肺則寒熱上氣喘汗出欬動肩背喉鳴甚則唾血時欬經久不已傳入大腸其狀欬則遺糞腎欬者其狀引腰背痛甚則欬遂腎欬經久不已傳入膀胱其狀欬則遺尿肝欬者其狀左脅痛甚不得轉側欬經久不已傳入膽其狀欬則嘔清苦汁出心欬者其狀引心痛喉中介介如梗甚者喉痹咽腫心欬經久不已傳入小腸其狀欬則失氣脾欬者其狀左脅痛陰陰引肩背甚者不得動動則欬劇經久不已傳入胃其狀欬而嘔嘔甚則長蟲出久欬不已三焦受之三焦欬之狀欬而腹滿不能飲食此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也或順時有風寒冷氣觸冒解脫傷皮毛間入腑藏爲欬上氣如此也有非時忽然暴寒傷皮膚中與肺合則欬嗽上氣或胃脘支痛欬唾有血

者是其熱得非時之寒暴搏之不得漸散伏結深喜肺癰也因欬服溫藥欬尤劇及壯熱吐膿血汗出惡寒是也天有非時寒者急看四時方也問曰欬病有十何謂也師曰有風欬有寒欬有支欬有肝欬有心欬有脾欬有肺欬有腎欬有膽欬有厥陰欬問曰十欬之證以何爲異師曰欲語因欬言不得竟謂之風欬飲冷食寒因之而欬謂之寒欬心下堅滿則支引痛其脈反遲謂之支欬欬則引脅下痛謂之肝欬欬而唾血引手少陰謂之心欬欬而涎出續續不止引小腹謂之脾欬欬引頸項而唾涎沫謂之肺欬欬則耳無所聞引喉井騰中謂之腎欬欬而引頭痛口苦謂之膽欬欬而引舌本謂之厥陰欬風欬者不可下寒欬肢欬肝欬刺手神門脾欬刺足太衝心欬刺手神門肺欬刺足太白肺欬刺手天泉腎欬刺足太谿膽欬刺足陽陵泉厥陰欬刺手太陵

夫久欬爲痰欬而時發熱脈在九菽者非虛也此爲胃中寒實所致也當吐之

夫欬家其脈弦欲行吐藥當相人強弱而無熱乃可吐耳欬家其人脈弦爲有水可與十棗湯下之不能臥出者陰不受邪故也留飲欬者其人欬不得臥引項上痛欬者如小兒癇瘲狀夫酒客欬者必致吐血此坐久極飲過度所致也其脈沉者不可發汗久欬數歲其脈弱者可治實大數者死其脈虛者必善胃其人本有支飲在胃中故也治屬飲家上氣汗出而欬屬飲家欬而小便利若失溺不可發汗汗出即厥逆冷

夫病吐血喘欬上氣其脈數有熱不得臥者死寒家欬而上氣其脈數者死謂其人形損故也脈大而散散者爲氣實而血虛名曰有表無裏上氣面腑腫胃息其脈浮大不治加痢尤甚上氣躁而喘者屬肺脹欲作風水發汗愈

凡上氣多有服吐藥得瘥亦有鍼灸得除者宜深體悟之

宋朱肱活人書

欬嗽

傷寒欬嗽有兩證有太陽證欬嗽小青龍小柴胡也有少陰證欬嗽真武湯四逆散猪苓散也大抵熱在上焦其人必飲水水停心下則肺爲之浮肺主於欬水氣乘之故欬而微喘仲景云傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬小青龍湯主之小便不利小腹滿者去麻黃加茯苓往來寒熱胷脅滿痛或欬者小柴胡湯主之小柴胡去人參大棗加五味子乾薑若少陰證欬嗽四肢沉重疼痛小便不利自下利而欬眞武湯主之眞武湯加五味子乾薑大抵傷寒水氣皆因飲水過多古人治水氣而欬者病在陽則青龍湯主之病在陰眞武湯主之四肢厥逆腹中痛或泄利而欬四逆散主之四逆散加五味子乾薑下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠猪苓湯主之

金劉完素六書

欬嗽論

欬謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽是無聲而有痰脾濕動而爲痰也欬嗽謂有痰而有聲蓋因傷於肺氣動於脾濕欬而且嗽也脾濕者秋傷於濕積於脾也故內經曰秋傷於濕冬必欬嗽大抵素秋之氣宜清若反動之氣必上衝而爲欬甚則動於脾濕發而爲痰焉是知脾無留濕雖傷肺氣而不爲痰也有痰寒少而熱多故欬嗽者非專主於肺肺主皮毛而司於外故風寒先能傷之也內經曰五藏六腑皆能令人欬非獨肺也各以其時主之而受病焉非其時各傳而與之也所病不等寒暑燥濕風火六氣皆令人欬惟濕病痰飲入胃留之而不行止入於肺則爲欬嗽假令濕在於心經謂之熱痰濕在脾經謂之風痰濕在肺經謂之氣痰濕在腎經謂之寒痰所治不同宜隨證而治之若欬而無痰者以辛甘潤其肺故欬嗽者治痰爲先治痰者下氣爲上是以南星半夏勝其痰而欬嗽自愈枳殼陳皮利其氣而痰自下痰而能食者大承氣湯微下之少利爲度痰而不能食者厚朴湯治之夏月嗽而發熱者謂之熱痰嗽小柴胡四兩加石膏一兩知母半兩用之冬月嗽而發寒熱謂之寒嗽小青龍加杏仁服之然此爲大例更當隨證隨時加減之量其虛實此治法之大體也

一陽發病少氣嗽洩三焦不利上欬下洩心火不寧其動若掣調中散主之

夫嗽者五藏皆有皆因內傷脾胃外感風邪皮毛屬肺風寒隨元府而入腠理開張內外相合先傳肺而入遂成欬嗽適肺熱也寒化熱熱則生痰故喘滿也經云喉中介介如梗狀甚則嗽血也胃滿氣喘痰盛稠黏皆肺氣熱也

張潔古活法機要

欬嗽證

欬謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有

痰脾濕動而爲痰也欬嗽是有痰而有聲蓋因傷於肺氣而欬動於脾濕因欬而爲嗽也治欬嗽者治痰爲先治痰者下氣爲上是以南星半夏勝其痰而能食者大承氣湯微下之痰而不能食者厚朴湯治之夏月嗽而發熱者謂之熱痰嗽小柴胡湯四兩加石膏一兩知母半兩用之冬月嗽而寒熱者謂之寒嗽小青龍加杏仁服之蜜煎生薑湯蜜煎橘皮湯燒生薑胡桃皆治無痰而嗽者此乃大例更當隨時隨證加減之

元張從政儒門事親

嗽分六氣毋拘以寒說

嗽與欬一證也後人或以嗽爲陽欬爲陰亦無考據且內經欬論一篇純說嗽也其中無欬字由是言之欬卽嗽也嗽卽欬也陰陽應象大論云秋傷於濕冬生欬嗽又五藏生成篇云欬嗽上氣又診要經終篇云春刺秋分環爲欬嗽又示從容篇云欬嗽煩寃者腎氣之逆也素問惟以四處連言欬嗽其餘篇中止言欬不言嗽乃知欬嗽一證也或言嗽爲別一證如傷寒書中說欬逆卽咽中作梯磴之聲者是也此一說非內經止以嗽爲欬生氣通天論云秋傷於濕上逆而欬與陰陽應象大論文義同而無嗽字乃知欬卽是嗽明矣余所以苦論此者孔子曰必也正名乎嗽之爲病自古歸之肺此言固不易也素問言肺病喘欬逆又曰欬嗽上氣厥在胷中過在手太陰陽明靈樞十二經惟太陰肺經云肺脹滿膨膨而喘欬他經則不言素問欬論雖言五藏六腑皆有欬要之止以肺爲主素問言皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣註云邪謂寒氣經又云邪氣以從其合也其寒飲食入胃從脾脈上至於肺則肺寒肺寒則內外合邪因而客之則爲肺欬後人見是言斷嗽爲寒更不參較他篇豈知六氣皆能嗽若謂欬止爲寒邪何以歲火太過炎暑流行金肺受邪民病欬嗽歲木不及心氣晚治上勝肺金欬而亂從革之紀金不及也其病嚏欬堅成之紀金太過也上徵正商同其病欬少陽司天火氣下臨肺金上從欬嚏鼽少陽司天火淫所勝欬唾血煩心少陽司天主降則胷滿欬少陽司天之氣熱鬱於上欬逆嘔吐三之氣炎暑至民病欬嘔終之氣陽氣不藏而欬少陽之復枯燥煩熱驚瘛欬鼽甚則欬逆而血泄少陰司天熱氣生於上清氣生於下寒熱凌犯而生於中民病欬喘三之氣天政布大火行餘火內格腫於上欬嗌甚則血溢少陰司天客勝則鼽嚏甚則欬喘少陰之復燠熱內作氣動於左上行於右欬皮膚痛則入肺欬而舁潮若此之類皆生於火與熱也豈可專於寒乎謂欬止於熱與火耶厥陰司天客勝則耳鳴掉眩甚則欬若此之類乃生於風豈可專於熱與火也謂欬專於風耶太陰司天濕淫所勝欬唾則有血太陰之復濕變乃舉飲發於中欬喘有聲若此之類乃生於濕豈可專於風也謂欬止於濕耶金鬱之發民病欬逆心痛歲金太過燥氣流行肝木受邪民病欬喘逆甚而嘔血陽明司天金火合德民病欬噎塞陽明司天燥淫所勝欬腹中鳴陽明司天清復內餘則欬鼽噎塞心膈中熱欬不止而白血出者死陽明之勝清發於中噎塞而欬陽明之復清氣大舉欬噦煩心若此之類皆生於燥豈可專於濕也謂欬止於燥耶太陽司天客氣

吾之方亦與之俱變然則枯巷乾薑烏梅罌粟殼其誤人也不爲少矣嗚呼有人自幼欬嗽至老不愈而亦不死者余見此等無限或少年欬嗽不計男女不數月而殞者亦無限矣寧神寧肺散此等之人豈有不曾服者其不愈而死者以非寒欬款冬花佛耳草至死不移故也曹魏時軍吏李成苦欬嗽晝夜不寐時吐膿血華佗以爲非從肺來以苦劑二錢匕吐膿血二升餘而癒若此之嗽人不可不知也

夫富貴之人一切涎嗽是飲食厚味熱痰之致然也先用獨聖散吐之吐訖可服人參散通聖散加半夏以此止嗽更服大人參半夏丸以之化痰也大忌酸鹹油膩生硬熱物也

夫貧難之人欬嗽內外感風冷寒濕之致然也內經曰秋傷於濕冬生欬嗽可服寧神散寧肺散加白朮之類則愈矣忌法同前

凡男子有病面黃身熱肌瘦寒熱往來如瘧狀更加涎嗽不止或喘滿面目浮腫者或身體俱熱或有自汗內經云病名傷寒夾勞之證也治之奈何病在上者其高者因而越之可用防己散吐之吐後切用通解丸一服次服人參黃芪散當歸飲子加減小柴胡湯擇而用之內經謂男女之證治法皆同依此調治無不取效矣

李杲十書

秋傷於濕冬必欬嗽論

秋者清肅之氣收斂下行之體也爲濕所傷是長夏之氣不與秋令也秋令不及所勝妄行故火得以炎上而尅金心火既刑於肺故肺氣逆而爲欬所不勝者侮之木氣上受病故腎水虧也長夏已亢三焦之氣盛也命門者三焦之合也故迫腎水上行與脾土濕熱相合爲痰因痰而動於脾之濕也是以欬嗽有聲有痰不發於秋而發於冬者以其六陰之極肅殺始得其氣故不欬嗽於秋而欬於冬也欬嗽者氣逆上行也氣上行而逆故面目發微腫極則身體皆腫夫爲水氣故曰濁氣在上則生膜脹又曰諸氣膹鬱皆屬肺金此之謂也春傷於風夏傷於暑冬傷於寒皆理皆順時字傷令字也獨秋傷於濕作令字傷時字讀者不疑也此四者皆無所亢而害其所乘之子也邪從後至言歲之主氣各差其分而爲病一定之法也若說秋字傷濕字其文與上三句相通其理與法不相通大抵理與法通不必拘於文也故說詩者不以文害辭不以辭害意以意逆志是爲得之矣故曰春傷於風說作人爲風所傷非也若是則止當頭痛惡風自汗何以言夏爲殘泄哉今言春傷於風即是時傷令也明矣經云東方來者爲嬰兒風其傷人也外在於筋內舍於肝又曰春甲乙所傷謂之肝風用此二句以較前文則辭理自通矣

濕氣所傷論

素問生氣通天論篇曰秋傷於濕上逆而欬發爲痿厥陰陽應象大論曰秋傷於濕冬生欬嗽秋濕既勝冬氷復旺水濕相得肺氣又衰故乘肺而爲欬嗽其發爲痿厥者蓋濕氣內攻於腦腑則欬逆外散於筋脈則痿弱也當秋之時濕氣大行秋傷於濕濕則干於肺肺以秋適旺濕雖入之不能發至冬肺衰然後濕始動也雨淫腹疾則當發爲下利冬以陽氣內固濕氣不能下行故上逆而爲欬嗽秋者清肅之氣收斂下行之體也爲濕所傷是長夏之氣不與秋令也秋令不及所勝妄行故火得以炎上而尅金心火既刑於肺故肺氣逆而爲欬所不勝者侮之木氣上行與火同德動而不息者也所生者受病故腎水虧也長夏已亢三焦之氣盛也命門者三焦之合也故迫腎水上行與脾土濕熱相合爲痰因欬而動於脾之濕是以欬嗽有聲有涎不發於秋而發於冬者以其六陰之極肅殺始得其氣故也但秋傷濕上逆爲欬嗽爲痿厥其因病之原則與春之風夏之暑冬之寒三者同其令行於時則與三者異夫三者皆是本時之令也濕乃長夏之令何於秋言之蓋春夏冬每一時各有三月故其令亦各就其本時而行也若長夏則寄旺於六月之一月耳秋雖亦有三月然長夏之濕令每侵過於秋而行故曰秋傷於濕若夫秋傷濕其令行於時之義上文已論之矣前篇所謂上逆而欬發爲痿厥不言過時似是當時即發者但既與風暑寒三者並言則此豈得獨爲即發者乎然經無明文終亦不敢比同後篇便斷然以爲冬發病也雖然濕本長夏之令侵過於秋耳縱使即發亦近於過時而發者矣此當只以秋發病者爲論濕從下受故干肺爲欬謂之上逆夫肺爲諸氣之主今既有病則氣不外遷又濕滯經絡故四肢痿弱無力而或厥冷也後篇所謂冬生欬嗽既言過時則與前篇之義頗不同矣夫濕氣久客不散至冬而寒氣大行肺惡寒而或受傷故濕氣得以乘虛上侵於肺發爲欬嗽也觀

者以此意求之經旨其或著乎

用藥法

難經云肺太過則外證面白善嚏悲愁不樂欲哭其內證喘欬上喝逆氣煩心胷滿煩熱夜則涕出多嚏鼻塞不通肺金大實以子助母也心脾肺皆受寒邪涎出口甘水反侮土寡於畏也腹中大寒病名曰寒中痰白作泡肺中氣虛而爲大寒子助母也當於肺中瀉腎水非辛熱之藥不退也口甘涎沫者胃中寒而不和以辛甘熱去之飲酒者多有此反化

素問欬論十一證肝欬小柴胡湯膽嘔膽汁黃芩加半夏生薑湯心欬桔梗湯小腸失氣芍藥甘草湯脾欬升麻湯胃吐長蟲烏梅丸肺欬麻黃湯大腸遺矢赤石脂禹餘糧湯桃仁湯不止猪苓湯分水腎欬附子細辛湯膀胱遺溺茯苓甘草湯久欬不已三焦受之其狀欬而腹滿不欲食飲此皆聚於胃關於肺使人多涕唾面浮腫氣逆也錢氏異功散

朱震亨心法

欬嗽

欬嗽有風寒痰飲火勞嗽肺脹之分

春作是春升之氣用清凉藥二陳加薄荊之類夏是火氣炎上最重用芩連秋是濕熱傷肺冬是風寒外來以藥發散之後用半夏逐痰必不再來

風寒行痰開腠理用二陳湯加麻黃桔梗杏仁逐痰飲降痰隨證加藥火主清金化痰降火勞嗽宜四物湯加竹瀝薑汁補陰爲主

乾欬嗽難治此係火鬱之證乃痰鬱其火邪在中用苦梗開之下用補陰降火之劑四物加炒蘗竹瀝之類不已則成勞此不得志者有之例者法好

肺虛嗽甚此好色腎虛者有之用參膏以陳皮生薑佐之大概有痰加痰藥

上半日多嗽者此屬胃中有火用貝母石膏降胃火午後嗽多者屬陰虛必用四物湯加炒蘗知母降火

黃昏嗽者是火氣浮於肺不宜用凉藥宜五味子五倍子斂而降之五更多嗽者此乃胃中有食積至此時火氣流入肺以知母地骨皮降之

肺脹而嗽或左或右不得眠此痰挾熱血凝氣而病宜養血以流氣降火疎肝以清痰四物湯加桃仁訶子青皮竹瀝薑汁之類

嗽而脅下痛宜疎肝氣以青皮兼痰藥實者白芥子之類在後以二陳湯加南星香附青黛青皮薑汁

血礙氣作嗽者桃仁去皮尖大黃酒炒薑汁丸服

治嗽多用生薑以其辛散故也

痰因火動逆上作嗽者先治火次治痰以知母止嗽清肺滋陰降火夜嗽用降陰分嗽也

治嗽多用粟殼不必疑但要先去病根此乃收後藥也治痢亦同

勞嗽即火鬱嗽用訶子能治肺氣因火傷極遂成鬱遏脹滿不得眠一邊取其味酸苦有收斂降火之功佐以海石童便浸香附苦蔞青黛杏仁半夏麴之類薑蜜調噙化必以補陰爲主

治嗽灸天突穴肺腧穴大瀉肺氣肺腧穴在三椎骨下兩旁各一寸五分

師云陰分嗽者多屬陰虛治之

有嗽而肺脹壅遏不得眠者難治

肺痿專主養肺氣養血清金

嗽而肺氣有餘者宜瀉之桑白皮爲主半夏茯苓佐之瀉其有餘補其不足

肺燥者當潤之屬熱者桔梗大力知母雞清

聲啞者屬寒宜細辛半夏生薑辛以散之肺虛者人參膏阿膠爲主陰不足者六味地黃丸爲要藥或知母茯苓湯爲妙陰虛氣喘四物湯加陳皮甘草些少以降其氣補其陰白芍藥須用酒浸曬乾

濕痰帶風喘嗽者不可一味苦寒折之如千緡湯墜痰丸更以皂角蘿蔔子杏仁百藥煎薑汁丸噙化

痰積嗽非青黛苦蔞不除有食積人面青白黃色不常面上有如蟹爪路一黃一白者是

欬逆嗽非蛤粉青黛苦蔞貝母不除

口燥咽乾有痰者不用半夏南星用苦蔞貝母飲水者不用苦蔞恐泥膈不鬆快

知母清肺止嗽滋陰降火

杏仁瀉肺氣氣虛久嗽者一二服刼止

治酒嗽青黛苦蔞薑蜜丸噙救肺

食積痰作嗽發熱者半夏南星爲君苦蔞蘿蔔子爲臣青黛石鹻爲使

明戴思恭證治要訣

欬嗽

古人云五臟六腑皆有欬嗽夫嗽屬肺何爲臟腑皆有之蓋欬嗽爲病有自外而入者有自內而發者風寒暑濕外也七情饑飽內也風寒暑濕先自皮毛而入皮毛者肺之合故雖外邪欲傳臟腑亦必先從其合而爲嗽此自外而入者也七情饑飽內有所傷則

邪氣上逆肺爲氣出入之道故五臟之邪上蒸於肺而爲嗽此自內而發者也然風寒暑濕有不爲嗽者蓋所感者重徑傷臟腑不留於皮毛七情亦有不爲嗽者蓋病尚淺止在本臟未即上攻所以傷寒以有嗽爲輕而七情饑飽之嗽久而復見凡諸嗽未審內外所感並宜二陳湯加杏仁五味人參各半錢重飲水一二口而暫止者熱嗽也呷熱湯而暫停者冷嗽也治熱嗽以小柴胡湯加五味冷嗽理中湯加五味皆已試之驗此出醫餘

諸嗽皆可佐以應夢觀音散而加喘者以此於食前吞下養正丹

壅嗽聲重痰稠或欬有血以薄荷生胡麻各一撮細嚼煎蘇子降氣湯送下

感風而嗽者惡風有汗或身體發熱或鼻流清涕桂枝湯加人參杏仁五味各半錢

欬嗽多汗體虛而又不勝熱藥者橘蘇散

感寒而嗽者惡風無汗或身體發熱或鼻流清涕宜杏子湯

若風寒俱感而嗽者或惡風無汗或惡風有汗頭痛身疼塞鼻熏眼涕淚稠黏者小青龍湯以上三藥傷寒太陽經有嗽者皆可用

感暑而嗽者自汗煩渴或帶寒面垢六和湯加五味子一錢

感濕而嗽者身體痛重或汗或小便不利此多乘熱入水或冒雨露或浴後不解濕衣致此宜白朮湯

熱嗽咽喉乾痛鼻出熱氣其痰嗽而難出色黃且濃或帶血縷或帶血腥臭或堅如蜆肉不若風寒之嗽痰清而白宜金沸草散仍以辰砂化痰丸或薄荷煎八風丹含化熱嗽宜金沸草散中加五味杏仁茯苓十味入棗子一箇同煎功效尤勝名旋覆湯

有熱嗽諸藥不效竹葉石膏湯去竹葉入粳米少加知母多加五味杏仁此必審是伏熱在上焦心肺間可用

有熱嗽失聲咽痛多進冷劑而聲愈不出者宜以生薑汁調消風散少少進之或只一味薑汁亦得冷熱嗽後失聲者尤宜嗽而失聲者非獨熱嗽有之宜審其證用藥佐以橄欖丸含化仍濃煎獨味枇杷葉散熱服

冷熱嗽因增減衣裳寒熱俱感遇乍寒亦嗽乍熱亦嗽飲熱亦嗽飲冷亦嗽宜金沸草散消風散各一貼和煎或應夢人參散或款冬花散二母散仍以辰砂化痰丸八風丹或四和丸含化七情饑飽嗽無非傷動臟腑正氣致邪上逆結成痰涎肺道不理宜順爲先四七湯半貼加桑白皮杏仁五味子人參阿膠各半錢

有嗽血痰與食俱出者此蓋飲食失節致肝氣不利而肺又有客邪肝濁道肺清道清濁相干宜二陳湯加木香杏仁細莘枳殼各半錢

有飲冷熱酒或飲冷水傷肺致嗽俗謂之湊肺宜紫菀飲

勞嗽有久嗽成勞者有因病勞久嗽者其證寒熱往來或獨熱無寒咽乾隘痛精神疲極其痰或濃或有血腥臭異常語音不出者補肺湯半貼加杏仁貝母款冬花阿膠百合各半錢煎去查調鍾乳粉咽痛者更加桔梗半錢熱甚者更加秦艽半錢嘔者去地黃加半夏如其數氣急者加靈砂丹或三炒丹

經年累月久嗽不已服藥不瘥餘無他證却與勞嗽不同宜三拗湯仍佐以清金丹

脾胃如常飲食不妨者加味人參清肺湯參粟湯有暴嗽服藥不效者或教之進生料鹿茸丸大菟絲子丸方愈此乃腎虛所致有本有標却不可以暴嗽而遽補之然所以易愈者亦覺之早故也

嗽而有血見嗽血證

時行嗽發熱惡寒頭痛鼻塞氣急狀如傷冷熱連欬不已初得病即伏枕一兩日即輕記壬午秋滿城有此病繼甲午年夏秋之交此病又自南而北得免者少並呼爲蝦蟆瘟用參蘇飲加細莘半錢

有欬嗽痰多者名曰勞嗽與風寒壅熱之嗽不同此乃有本有標本在腎而標在肺可於虛損諸藥求之選用加五味杏仁阿膠貝母款冬花之屬嗽而加以喘者於前藥更加磨沉香仍吞靈砂丹或三炒丹嗽而有血者詳見血門嗽血證

樓英醫學綱目

治法

夫欬之爲病有一欬即出痰者脾勝濕而痰滑也有連欬十數不能出痰者肺燥勝痰濕也滑者宜南星半夏皂角灰之屬燥其脾若利氣之劑所當忌也澀者宜枳殼紫蘇杏仁之屬利其肺若燥肺之劑所當忌也肺欬喘息而有音甚則吐血麻黃湯大腸欬而遺矢赤石脂禹餘糧湯桃仁湯不止用猪苓分水散心欬心痛喉中介介鯁狀甚則咽喉痹用桔梗湯小

暘欬欬而失氣氣與欬俱失芍藥甘草湯與夏脈不及病同蓋小陽爲心之腑故也肝欬兩脅下痛甚不可以轉轉則兩脅下滿小柴胡湯仲景云欬引胷痛爲惡飲宜十棗湯丹溪云欬引胷痛宜疎肝氣用青皮枳殼香附子等實者白芥子之屬膽欬嘔膽汁黃芩加半夏生薑湯脾欬右胷下痛陰陰痛引肩背甚則不可以動動則欬劇升麻湯胃欬嘔嘔甚則長蟲出烏梅丸腎欬腰背相引而痛甚則欬逆麻黃附子細辛湯膀胱欬遺溺茯苓甘草湯三焦欬腹滿不欲飲食此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆錢氏異功散

凡欬嗽面赤胷腹發熱惟手足乍有凉時其脈洪者熱痰在胷膈也宜小陷胷湯蒙石丸之類清膈降痰甚而不已者宜吐下其痰熱也面白悲噫或胷急脹痛或脈沉弦細遲而欬者寒飲在胷腹也宜辛熱去之

乾欬嗽

乾欬嗽者無痰有聲是也此證本於氣澹澹微者連欬十數聲方有痰出濇甚者雖欬數十聲亦無痰出是爲乾欬嗽也

王綸明醫雜著

欬嗽證治

欬謂有聲肺氣傷而不清嗽謂有痰脾濕動而生痰欬嗽者因傷肺氣而動脾濕也病本雖分六氣五藏之殊而其要皆主於肺蓋肺主氣而出聲也治法須分新久虛實新病風寒則散之火熱則清之濕熱則瀉之久病便屬虛屬鬱氣虛則補氣血虛則補血兼脾則開鬱滋之潤之斂之則治處之法也方用杏仁去皮尖白茯苓各一錢橘紅七分五味子桔梗甘草炙各五分春冬多上升之氣宜潤肺抑肝加川芎芍藥半夏各一錢麥門冬黃芩炒知母各五分春若傷風欬嗽鼻流清涕宜辛凉解散加防風蘇荷黃芩炒麥門冬各一錢

註按前證若因風寒所傷欬嗽聲重頭痛用金沸草散欬嗽聲重身熱頭痛用局方消風散蓋肺主皮毛肺氣虛則腠理不密風邪易入法當解表兼實肺氣肺有火則腠理不閉風邪外乘治宜解表兼清肺火邪退卽止若數行解散則重亡津液邪蘊而爲肺疽肺痿矣故凡肺受邪不能輸化而小便短少皮膚漸腫欬嗽日增者宜用六君子以補脾肺六味丸以滋腎水

夏多火熱炎上最重宜清金降火加桑白皮知母黃芩炒麥門冬石膏各一錢

註按王太僕云壯水之主以制陽光前證若喘急而嗽面赤潮熱其脈洪大者用黃連解毒湯熱燥而欬用梔子仁湯欬唾有血用麥門冬湯俱兼以六味丸夏月尤當用此壯腎水以保肺金

秋冬濕熱傷肺宜清熱瀉濕加蒼术桑白皮各一錢防風黃芩山梔炒各五分

註按前證若欬而身熱自汗口乾便赤脈虛而洪者用白虎湯身熱而煩氣高而短心下痞滿四肢困倦精神短少者香薷飲若病邪既去宜用補中益氣加乾山藥五味子以養元氣柴胡升麻各二分以升生氣

冬多風寒外感宜解表行痰加麻黃桂枝半夏乾薑防風各一錢肺金素有熱者再加酒炒黃芩知母各五分若發熱頭痛鼻塞聲重再加蒼本川芎前胡柴胡各一錢

註按前證果係風寒外感形氣病氣俱實者宜用麻黃之類所謂從表而入自表而出若形氣病氣俱虛者宜補其元氣而佐以解表之藥若專於解表則肺氣益虛腠理益疎外邪乘虛易入而其病愈難治矣若病日久或誤服表散之劑以致元氣虛而邪氣實者急宜補脾土爲主則肺金有所養而諸病自愈若人老弱或勞傷元氣而患前證誤用麻黃枳殼紫蘇之類而汗出亡陽者多患肺癰肺痿治失其宜多致不起

若有痰加半夏枳殼風痰再加南星薑汁炒濕痰脾困少食加白术蒼术有痰而口燥咽乾勿用半夏南星宜加知母蜜水拌炒貝母苦婁仁黃芩炒

註按前證若因脾氣虛而爲濕痰者宜用補中益氣湯若因腎經虛熱而口燥咽乾者宜用六味丸若夏月熱痰或素有熱痰加黃芩黃連知母石膏

註按前證若心火乘肺輕則用麥門冬湯重則用人參平肺散若上焦實熱用凉膈散虛熱用六君子湯中焦實熱用竹葉石膏湯虛熱用竹葉黃芪湯下焦虛熱用六味丸

上半日欬者胃中有火加貝母石膏黃連五更欬者同上

註按前證若胃中熱甚爲患者宜用本方泄之若胃中微熱爲患者當用竹葉石膏湯清之若胃中

虛熱所致者須用補中益氣湯補之俱少佐以治痰之劑其五更欬嗽者當作脾虛宿食爲痰治之

若欬嗽久肺虛滋氣補血加人參黃芪阿膠當歸生薑天門冬款冬花馬兜鈴芍藥酒炒之類肺熱喘嗽去人參加沙參此兼補血氣也

註按肺屬金生於脾土凡肺金受邪由脾土虛弱不能生肺乃所生受病治者審之

黃昏欬者火浮於肺不可正用寒涼藥宜加五味子五倍子訶子皮斂而降之

註按前證屬脾肺氣虛以致腎經陽虛陰弱而虛火上炎或房勞太過虧損眞陰爲患法當補脾肺生腎水不可專主於肺也

若午後嗽者屬陰虛卽勞嗽也宜補陰降火加川芎當歸芍藥熟地黃蘗知母竹瀝薑汁天門冬苦蔞仁貝母此專補陰血也

註按前證屬腎氣虧損火炎水涸或津液湧而爲痰者乃眞臟爲患也須用六味地黃丸壯腎水滋化源爲主以補中益氣湯養脾土生肺腎爲佐設用清氣化痰則誤矣

若火鬱嗽爲痰鬱火邪在中宜開鬱消痰用訶子皮香附童便浸苦蔞仁半夏麯海石青黛黃芩爲末蜜調爲丸噙化仍服前補陰降火藥失治則成勞

註按前證若因肺胃蘊熱痰氣不和宜用此若因脾肺不清氣鬱痰滯用二陳加山梔枳殼桔梗若因鬱結傷脾氣血虛損用濟生歸脾加山梔桔梗若因怒動肝火尅脾用四君子加山梔柴胡若勞役失宜傷損元氣用補中益氣加山梔桔梗

若痰積食積作欬嗽者用香附苦蔞貝母海石青黛半夏麴石膏山楂枳實黃連薑炒爲末蜜調噙化

註按前證若因飲食停滯胃口濕熱所化者宜用本方若因脾胃氣虛而痰積滯用六君子加枳殼木香若因脾胃氣虛而食積滯用六君子加神麴麥芽夫早間吐痰欬嗽屬食積喘促欬嗽屬肺氣虛火旺大抵當助胃壯氣爲主不可專攻其痰

若勞嗽見血加阿膠當歸芍藥天門冬知母貝母桑白皮亦於前肺虛陰虛二條擇用大抵欬嗽見血多是肺受熱邪氣得熱而變爲火火盛而陰血不寧從火上升故治宜瀉火滋陰忌用人參等甘溫之藥然亦有氣虛而欬血者則宜用人參黃芪款冬花等藥但此等證不多耳

註按前證亦有勞傷元氣內火妄動而傷肺者亦有勞傷腎水陰火上炎而傷肺者有因過服天門生地寒藥損傷脾胃不能生肺金而不愈者有因誤用黃蘗之類損傷陽氣不能生陰精而不愈者凡此皆脾肺虧損而腎水不足以致虛火上炎眞臟爲患也須用補中益氣湯補脾土而生肺金用六味地黃丸滋腎水而生陰精否則不救

因欬而有痰者欬爲重主治在肺因痰而致欬者痰爲重主治在脾但是食積成痰痰氣上升以致欬嗽只治其痰消其積而欬自止不必用肺藥以治欬也

註按前論治法最是仍分六淫七情及五臟相勝脾肺虛實以治之否則恐成肺癰之證

李梴醫學入門

欬嗽總論

欬嗽多屬肺火傷寒言太陽病者何也肺爲五臟華蓋內通膀胱外主皮毛而爲氣之主氣逆而不下則欬風寒乘之氣冷則滯熱邪乘之氣燥則鬱水飲乘之與氣相搏寒熱水氣皆能生痰又欬之所從始也以風寒言之太陽證身熱嘔喘者麻黃杏仁湯欬喘者三拗湯少陽證寒熱胷滿或挾瀉者小柴胡去參棗加五味子乾薑少陰證厥逆腹痛下利者四逆湯加五味子乾薑少陰欬而嘔渴心煩不得眠下利者猪苓湯春冬傷風寒夏秋傷濕冷鼻塞喉鳴氣不得下而欬者橘皮竹茹湯以熱欬言之金沸草散柴胡半夏湯瀉白散或欬膿血者小柴胡加黃芩黑豆欬嗽身熱臍腹滿痛者大柴胡湯下之中滿而嘔者大半夏湯解利以後胃寒不食者理中湯六君子湯俱加五味子細辛痰氣盛者大橘皮湯素有痰火者當於芩連二陳湯中消息又水欬者有三證青龍湯治太陽之表水有寒十棗湯治太陽之裏水有辟眞武湯治陰證之裏水有寒凡欬而小便利者忌汗久而入臟成勞膏之上肓之下不治

辨欬嗽

欬因氣動爲聲嗽乃血化爲痰肺氣動則欬脾濕動則嗽脾肺俱動則欬嗽俱作然以肺爲主故多言欬則包嗽在其中

分虛實

欬必先審肺脈虛實實者浮大有力若沉而滑則痰氣盛也虛者弦大無力若沉細帶數則火鬱極也

外感

風乘肺欬則鼻塞聲重口乾喉痒語未竟而欬參蘇

飲加桑白皮杏仁或柴胡半夏湯後用諸欬丸如久欬夜欬冬欬風入肺竅者宜熏之

寒乘肺欬則胃緊聲啞二陳湯加麻黃杏仁或蘇沉九寶飲華蓋散單生薑丸有寒熱者小柴胡湯又有一種遇寒則欬者謂之寒暄乃寒包熱也解表則除枳梗湯加麻黃防風杏仁陳皮紫蘇木通黃芩如風寒鬱熱夜欬者三物湯加知母黃芩

暑乘肺欬則口燥聲嘶吐沫六一散加辰砂見血者枇杷葉散

濕乘肺欬則身重骨節煩疼酒浙五苓散不換金正氣散

大槩春氣上升潤肺抑肝夏火上炎清金降火秋濕熱甚清熱瀉濕冬風寒重解表行痰

內傷

火欬聲多痰少五更欬多者食積濕熱火流肺中瀉白散加知母或古二母散上半午欬多者胃有實火單石膏丸加知貝便閉喘渴痰稠者涼膈散敗毒散古苓半丸下半午欬多者陰虛四物合二陳湯加知母黃檗麥門冬順而下之如陰虛火燥寒熱盜汗遺精見血者四物湯加竹瀝或滋陰降火湯加味二母丸黃昏欬多者火浮於肺潤肺丸以斂之不可純用涼藥通用二陳湯去半夏加貝母苦葉青黛山梔黃芩桑白皮

臂欬卽火欬久者乾欬無痰乃腎水焦枯邪火獨炎於肺瀉白散加苦梗爲君以開之久者訶黎丸虛者腎氣丸不得志者霞天膏如肺燥皮枯癢痒便閉者活血潤燥生津飲

勞欬五勞虛欬也疲極傷肝欬而左脅疼引小腹者二陳湯加芎歸芍藥青皮柴胡龍膽黃芩竹茹或黃芪建中湯勞神傷心欬而咽乾咯血者抑勞散憂授天王補心丹勞倦傷脾欬而短氣無力者調中益氣湯補中益氣湯叫呼傷肺欬而幅吐白沫口燥聲嘶者潤肺丸人參清肺飲房勞傷腎欬而腰背痛寒熱者二陳芎歸湯又有一種傳證勞欬卽乾欬勞久者宜蛤蚧天靈蓋雄黃硃砂之類須於痊瘥條叅治

食欬因食積生痰氣衝胃腹滿者二陳湯加厚朴山楂麥芽傷生冷致肺胃不清噯酸吐瀉惡風寒者五積散理中湯異功散傷煎炒熱物者葶藶散或三補丸加知母貝母傷酒食者香附苦葉青黛丸七情鬱氣不平則欬久不已則入六腑怒傷肝兩脅下滿入膽則嘔苦汁喜傷心心痛咽腫入小腸則欬與氣俱失思傷脾欬右脅引肩背痛甚則不可以動入胃則吐痰沫長蟲憂傷肺喘息唾血入大腸則遺糞恐傷腎唾涎腰背引痛入膀胱則遺尿入三焦則腹滿不欲食始則關於肺終則聚於胃也宜二陳湯加葉仁蘿蔔子加味瀉白散參蘇飲四七湯蘇子降氣湯團參飲子古橘甘散古橘葉丸加減三奇湯選用

痰水上干

痰欬痰出欬止胃腸多滿經曰秋傷於濕冬必欬嗽濕在心謂之熱痰濕在肝謂之風痰濕在肺謂之氣痰濕在腎謂之寒痰惟溫痰入胃上干於肺則必作欬宜千緡湯墜痰丸半苦丸選用痰癖肺經欬則涎多或結胷者二陳湯加枳梗苦葉黃芩貝母甚者鶴頂丹痰積流入肺脘久欬不得睡者兜鈴丸痰因火動者二陳湯加芩連或清氣化痰丸痰因宿食者化痰丸痰因酒濕者蜂蠆丸因酒者苦連丸如痰甚能食便閉者小承氣湯下之不能食便閉者厚朴湯或滾痰丸疎導之

水欬因飲茶水停蓄爲涎上湧身熱胷滿怔忡者小青龍湯身寒胷硬者眞武湯結胷者小半夏湯大便閉者十棗湯小便澀者五苓散詳傷寒水證中

瘀血內阻

瘀血欬則喉間常有腥氣輕者瀉白湯加生地山梔牡丹皮麥門冬桔梗重者桃仁大黃薑汁爲丸服或因打損勞力傷肺遇風寒則欬或見血紫黑色者四物湯去川芎加大黃蘇木爲末酒調服利去心肺間瘀血卽止後服人參養榮湯調理

肺脹滿卽痰與瘀血碍氣所以動則喘急或左或右一邊眠不得者是四物湯加桃仁訶子青皮竹瀝薑汁若虛脹喘者單人參膏古百花膏有水停蓄脹者飲水則逆轉不入三白湯加澤瀉桔梗五倍子若因火傷極無水以升而脹者必乾欬無痰訶黎丸含化以訶子有收斂降火之功然亦危哉

治分新久

新欬有痰者外感隨時解散無痰者便是火熱只宜清之久欬有痰者燥脾化痰無痰者清金降火蓋外感久則臂熱內傷久則火炎俱宜開臂潤燥其間有七情氣逆者則以枳殼香附順氣爲先停水宿食者則以南星檳榔分導爲要氣血虛者補之斂之苟不治本而浪用兜鈴蕤殼澀劑反致纏綿況肺爲嬌臟易寒易熱雖人參平藥惟氣虛最宜若肺有火及風

邪初盛者俱宜沙參或元參代之故欬不拘於寒也久欬曾經利下及勞倦饑飽以致肺胃寒而飲食少進者只理脾而欬自止然腎爲氣職欬嗽動引百骸自覺氣從臍下逆奔而上者乃腎虛氣不歸元宜所服藥中加補骨脂五味子或三味安腎丸陰虛者腎氣丸陽虛者黑錫丹以鎮之凡欬至肺脹及咽痛失音者必死

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百六十四卷目錄
醫部彙考二百四十四
欬嗽門三
李中梓醫宗必讀 欬嗽總論 分條治法 虛勞證 傷寒證 祇伏
龔信古今醫鑑 治法
張三錫醫學準繩六要 欬嗽總論
陶華六書 欬嗽
徐春甫古今醫統 欬嗽二字取義辨 病分三因 證主氣逆 治當順時 分虛實新久 禁先用溫藥 呷嗽
王肯堂證治準繩 欬嗽論
趙獻可醫貫 欬嗽論治
喻昌醫門法律 欬嗽論 續論 雜論 律六條
張介賓景岳全書 論證 外感證治 內傷證治 論河間治嗽先治痰說
陳士鐸石室祕錄 欬嗽治法

藝術典第二百六十四卷
醫部彙考二百四十四
欬嗽門三
明李中梓醫宗必讀
欬嗽總論
有聲無痰曰欬肺由火爍有痰無聲曰嗽脾受濕侵有痰有聲曰欬嗽
按欬雖肺病五臟六腑皆能致之析其條目經文尚有漏義總其綱領不過內傷外感而已風寒暑濕傷其外則先中於皮毛皮毛爲肺之合肺邪不解他經亦病此自肺而後傳於諸臟也勞慾情志傷其內則臟氣受傷先由陰分而病及上焦此自諸臟而後傳於肺也自表而入者病在陽宜辛溫以散邪則肺清而欬愈自內而生者病在陰宜甘以壯水潤以養金則肺寧而火欬愈大抵治表者藥不宜靜靜則留連不解變生他病故忌寒涼收斂如五臟生成篇所謂肺欲辛是也治內者藥不宜動動則虛火不寧燥痒愈甚故忌辛香燥熱如宣明五氣篇所謂辛走氣氣病無多食辛是也然治表者雖宜動以散邪若形病俱虛者又當補中氣而佐以和解倘專於發散恐肺氣益弱腠理益疎邪乘虛入病反增劇也治內者雖宜靜以養陰若命門火衰不能歸元則參芪桂附在所必用否則氣不化水終無補於陰也至夫因於火者宜清因於濕者宜利因痰者消之因氣者理之隨其所見之證而調治在老人虛人皆以溫養脾肺爲主稍稍治標可也若欲速愈而亟攻其邪因而危困者多矣可不謹諸

分條治法

肺欬麻黃湯心欬桔梗湯肝欬小柴胡湯脾欬升麻湯腎欬麻黃附子細莘湯胃欬烏梅丸膽欬黃芩加半夏生薑湯大腸欬赤石脂禹餘糧湯不止用猪苓分水散小腸欬芍藥甘草湯膀胱欬茯苓甘草湯三焦欬錢氏異攻散感風者惡風自汗鼻流清涕脈浮桂枝湯加防風杏仁前胡細莘感寒者惡寒無汗鼻流清涕脈緊二陳湯加紫蘇乾葛杏仁桔梗春月風寒所傷頭痛身重金沸草湯夏月喘嗽面赤脈洪黃連解毒湯秋月身熱自汗口乾便赤脈虛大白虎湯冬月風寒形氣病氣俱實者加減麻黃湯感濕者身體重痛白朮酒熱嗽咽喉乾痛鼻出熱氣痰稠腥臭金沸草散去麻黃半夏加薄荷枇杷葉五味杏仁桑白皮貝母茯苓桔梗乍寒亦嗽乍熱亦嗽金沸草散消風散並二方煎服七情饑飽邪氣上逆四七湯加杏仁五味子桑皮人參阿膠麥門冬枇杷葉飲冷致嗽紫菀飲嗽吐痰貪俱出二陳加杏仁木香細莘枳殼食積痰嗽二陳湯加苦蔞萊菔子山楂枳實麴蘖聲啞外感寒包熱者細莘半夏生薑辛以散之內傷火來尅金者爲壞證宜壯水清金經年久嗽服藥不瘥餘無他證與勞嗽異一味百部膏欬嗽煩冤八味丸安腎丸暴欬諸藥不效大菟絲子丸不可以其暴嗽而疑遽補之非欬而上氣喉中水雞聲射干麻黃湯酢搶而嗽甘草二兩去皮作二寸段中半劈開用猪膽汁五枚浸三日火炙爲末蜜丸茶清吞二錢臨臥時服之食鹹哮嗽白麪二錢砂糖二錢糖餅灰汁捻作餅子爐內煨熟剝出加輕粉四錢另炒將餅切作四掗入輕粉在內令患人吃盡吐出病根即愈肺脹欬而上氣鼻扇擡肩脈浮大者越婢加半夏湯主之無外邪而內虛之肺脹宜訶子海石香附苦蔞仁青黛半夏杏仁薑汁爲末蜜調噙化之肺脹躁喘脈浮心下有水小青龍湯加石膏肺脹而左右不得眠此痰夾瘀血碍氣而病四物湯加桃仁訶子青皮竹瀝韭汁

虛勞證

有聲無痰曰欬肺因火爍也新定清寧膏有痰有聲

曰嗽脾受濕侵也二陳湯脾虛倦怠者六君子湯勞嗽聲啞者死

傷寒證

太陽證罷表未解心下有水氣乾嘔發熱而欬太陽發熱欬嗽並宜小青龍湯

太陽發熱嘔噦而欬小柴胡湯少陽寒熱往來欬嗽胃脘滿或泄利小柴胡去參棗加五味子乾薑少陰欬嗽真武湯少陰腹痛小便不利四肢沉重欬嗽者水氣也眞武湯加五味子細辛乾薑

脈候

脈出魚際爲逆氣喘息欬而脈虛必苦冒浮直而虛者易治喘而氣逆脈數有熱不得臥難治上氣喘嗽而腫肩息脈浮大者死久嗽脈弱者生實大數者死上氣喘嗽低昂脈滑手足溫者生脈濇四肢寒者死欬而脫形身熱脈小堅急以疾爲逆不過十五日死欬嗽羸瘦脈形堅大者死欬嗽脈沉緊者死浮直者生浮軟者生小沉伏芤者死欬而嘔腹滿泄瀉弦急欲絕者死

醫宗古今醫鑑

治法

凡治嗽有用五味子者以收肺氣乃火熱必用之劑若有外邪而驟用之恐閉住邪氣必先發散然後可用阿子味酸苦有收斂降火之功杏仁散肺中風寒然性實有熱因於寒者爲宜桑白皮瀉肺氣然性不純良用之者當戒馬兜鈴去肺熱而補肺也生薑辛能發散也鴈粟殼不可驟用乃後收功藥也人參以其氣弱或新欬挾虛者可用若風寒邪盛或久嗽肺有欝火者不可用也苦夔仁甘能補肺潤能降氣胃中有痰者自降

張三錫醫學準繩六要

欬嗽總論

五臟六腑一有濁氣鬱而爲火炎上熏肺則令人欬是肺乃總司爾活人書曰肺爲五臟六腑之華蓋專主於氣氣之清濁既分則無嗽清氣不分濁氣上干於華蓋加以挾水停飲肺不得清則爲嗽抑考內經曰五臟六腑皆令人嗽非獨肺也大抵外邪鬱火痰飲上攻脈弦滑數有餘之證可治若失血家脈芤數潮熱面赤下午劇者初或可治日久羸瘦不可救

陶華六書

欬嗽

欬者謦欬俗謂之嗽肺主氣肺爲邪所乘氣逆而不下也故令欬嗽有肺寒而欬者有停飲而欬者有邪在半表半裏而欬者治各不同其水欬三證不可不辨小青龍太陽之表亦也十棗湯太陽之裏亦也真武湯水證之水氣也蓋水與表寒相合而欬則小青龍湯當汗之水與裏寒相合而欬則真武湯溫之裏癖合水動肺而嗽十棗湯所以下之也

太陽病身熱欬嗽乾嘔喘而利小青龍湯有加減法惡寒身痛只依本方身涼欬嗽乾嘔爲利心下痞滿引脅下痛十棗湯

四肢痛重腹痛下利欬嗽或嘔眞武湯有加減之法

少陽病寒熱往來胃脘硬滿而痛欬嗽小柴胡湯有加減之法

少陽欬嗽四逆湯腹痛下利欬嗽中滿而嘔大半夏湯

徐春甫古今醫統

欬嗽二字取義辯

內經有以欬言者有以欬嗽言者如秋傷濕一篇一篇只欬字一篇有嗽字予和謂以此則知欬即嗽也明矣玉機分爲陰陽氣血亦過鑒矣潔古機要云欬乃無痰有聲嗽乃有痰無聲欬兼嗽乃有聲有痰斯爲欬嗽之少別然則字義倒說爲戾耳

柏齋何氏曰機要所論欬嗽二證蓋倒說也肺爲氣主而聲出焉肺傷寒飲鬱而爲痰聲欲上出爲痰所隔故相攻而作聲痰出聲乃通利斯謂之欬外感風寒肺管爲寒氣所束聲出不利故亦相攻作聲然無物也斯謂之嗽欬字從亥亥者有形之物也故果核草荄皆從亥亥復有隔關之義嗽字從束從欠此古人製字之妙乃二證之所以分也觀此則機要之說誠倒置歟

病分三因

陳無擇云傷風嗽者憎寒壯熱自汗惡風口乾煩躁傷寒嗽者憎寒發熱無汗惡風煩躁不渴傷暑欬者節骨煩疼四肢重著灑淅此屬外因五臟欬而不已則六腑受之者此屬內因如欬而發作寒熱引腰背痛或喘滿此因房勞傷腎或中滿腹脹搶心痛不欲食此因饑飽傷脾或欬而左脅偏痛引小腹并膝腕疼此因疲極傷肝或吐白涎口燥聲嘶此因呼叫傷肺或欬而煩熱自汗咽乾咯血此因勞神傷心並屬不內外因也

證主氣逆

巢氏曰肺虛感微寒而成欬欬而氣還聚於肺肺則脹是爲欬逆也邪氣與正氣相搏正氣不得宣通但逆上咽喉之間邪伏則氣靜邪動則氣奔上煩悶欲絕故謂欬逆上氣也

治當順時

夏月嗽而熱者謂之熱嗽以小柴胡湯加石膏知母之屬是也冬月嗽而惡寒謂之寒嗽以小青龍湯加杏仁款冬花細莘乾薑之屬是也

凡嗽春是春升之氣雜著云宜潤肺抑肝二陳湯加杏仁知母五味子川芎白芍藥麥門冬炒黃芩夏嗽火炎於上用二陳去半夏加五味桔梗桑白皮地骨皮麥門冬黃芩石膏貝母之類秋嗽濕熱傷肺用清熱瀉濕二陳湯去半夏加杏仁天門冬防風桔梗蒼朮白朮桑白皮梔子仁黃芩之類冬嗽風寒外束用解散二陳湯加麻黃桂枝桔梗杏仁發熱頭痛加川芎藁本前胡柴胡之類

分虛實新久

凡欬嗽之人體氣虛弱者用瀉氣藥多不效間有效者必復作若此者並宜補益而嗽自愈體氣厚者或係外感俱宜發散邪氣破滯氣而嗽自寧新欬嗽者亦是從實者之治也久欬嗽者從補法之治也或用澀藥擊其惰歸九仙散之屬是也

禁先用澀藥

凡治欬嗽必先各因其病根伐去邪氣而後以烏梅訶子五味子鸎粟殼款冬花之類其性燥澀有收斂刼奪之功亦在所必用可一服而愈慎毋越其先後之權衡也

呷嗽

呷嗽者猶欬嗽也其胷膈痰飲多者嗽則氣動於痰上搏咽喉之間痰氣相搏隨嗽動息呼呷有聲謂之呷嗽仲景丹溪皆云喉中作水雞聲射干麻黃湯之屬是也其與欬嗽大抵相同至於投藥則應加消痰破飲之物以此爲異耳

王肯堂證治準繩

欬嗽論

欬謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾濕動而爲痰也欬嗽是有痰而有聲蓋因傷於肺氣而欬動於脾濕因欬而爲嗽也經言五臟六腑皆有欬嗽欬嗽屬肺何爲臟腑皆有之蓋欬嗽爲病有自外而入者有自內而發者風寒暑濕外也七情饑飽內也風寒暑濕先自皮毛而入皮毛者肺之合故雖外邪欲傳臟腑亦必先從其合而爲嗽此自外而入者也七情饑飽內有所傷則邪氣上逆肺爲氣出入之道故五臟之邪上蒸於肺而爲嗽此自內而發者也然風寒暑濕有不爲嗽者蓋所感者重徑傷臟腑不留於皮毛七情亦有不爲嗽者蓋病尚淺止在本臟未即上攻所以傷寒以有嗽爲輕而七情饑飽之嗽久而後見治法當審脈證三因若外因邪氣止當發散又須原其虛實冷熱若內因七情則隨其部經在與氣口脈相應當以順氣爲先下痰次之有停飲而欬又須消化之方不可用烏梅鸎粟酸澀之藥其寒邪未除亦不可便用補藥尤忌憂思過度房室勞傷遂成瘵疾宜養脾生肺也

仁齋直指云感風者鼻塞聲重傷冷者凄清怯寒挾熱爲焦煩受濕爲纏滯瘀血則膈間腥悶停水則心下怔忪或實或虛痰之黃白唾之稀稠從可知也治嗽大法肺脈浮爲風邪所客以發散取之肺脈實爲氣壅內熱以清利行之脈濡散爲肺虛以補肺安之其間久嗽之人曾經解利以致肺胃俱寒飲食不進則用溫中助胃加和平治嗽之藥至若酒色過度虛勞少血津液內耗心火自炎遂使燥熱乘肺咯唾膿血上氣涎潮其嗽連續而不已唯夫血不榮肌故邪在皮毛皆能入肺而自背得之尤速此則人參芎歸所不可無一種傳注病涉邪惡五臟反尅毒害尤深近世率用天靈蓋蛤蚧桃柳枝丹砂雄黃安息香蘇合香丸通神之劑然則欬嗽證治於此可以問津索途矣抑猶有說焉肺出氣也腎納氣也肺爲氣之主腎爲氣之本凡欬嗽暴重動引百骸自覺氣重臍下逆奔而上者此腎虛不能收氣歸元也當以破故紙安腎丸主之毋徒從事於寧肺

趙獻可醫貫

欬嗽論治

欬謂無痰而有聲嗽是有痰而有聲雖分六腑五臟之殊而其要皆主於肺蓋肺爲清虛之腑一物不容毫毛必欬又肺爲嬌臟畏熱畏寒火刑金故嗽水冷金寒亦嗽故欬嗽者必責之肺而治之之法不在於肺而在於脾不專在脾而反歸重於腎蓋脾者肺之母腎者金之子故虛則補其母實則瀉其子也

如外感風寒而欬嗽者今人率以麻黃枳殼紫蘇之類發散表邪謂從表而入者自表而出如果係形氣病氣俱實者一汗而愈若形氣病氣稍虛者宜以補

脾爲主而佐以解表之藥何以故蓋肺主皮毛惟其虛也故腠理不密風邪易以入之若肺不虛邪何從而入耶古人所以製參蘇飲中必有參桂枝湯中有芍藥甘草解表中兼實脾也脾實則肺金有養皮毛有衛已入之邪易以出後來之邪無自而入矣若專以解表則肺氣益虛腠理益疎外邪乘間而來者何時而已耶須以人參黃芪甘草以補脾兼桂枝以驅邪此予謂不治肺而治脾虛則補其母之義也

仁齋直指云肺主氣也腎納氣也肺爲氣之主腎爲氣之本凡欬嗽暴重動引百骸自覺氣從臍下逆奔而上者此腎虛不能氣收歸元當以地黃丸安腎丸主之母徒從事於肺此虛則補子之義也余又有說焉五行之間惟肺腎二藏母盛而子宮受邪何則肺主氣肺有熱則氣得熱而上蒸不能下生於腎而腎受邪矣腎既受邪則肺益病此又何也蓋母藏于宮子隱母胎凡人肺金之氣夜臥則歸藏於腎水之中今因肺受心火之邪欲下避水中而腎水乾枯有火無可容之地於是復上而病矣

有火燥肺金而欬嗽者宜清金降火今之醫書中論清金降火者以黃芩天麥冬桑白皮清肺金以黃連降心火石膏降胃火以四物黃蘗知母降陰火謂枳半滲泄傷陰易用貝母苦蘆竹瀝枇杷葉以潤肺而化痰以上治法豈不平正通達耶殊不知清金降火之理似是而實非補北方正所以瀉南方也滋其陰即所以降火也獨不觀啓元子壯水之主以制陽光乎予相火論及滋陰降火論中已詳言黃蘗知母之不宜用與夫寒凉諸藥之害矣予又有說焉王節齋云凡酒色過度損傷肺腎眞陰者不可服參芪服之過多則死蓋恐陽壯而陰消也自此說行而世之治陰虛欬嗽者視參芪如砒毒以黃蘗知母爲靈丹使患此證而服此藥者百無一生良可悲也有能寡慾而不服藥者反可綿延得活可見非病不可治乃治病之不如法也蓋病本起於房勞太過虧損眞陰陰虛而火上火上而刑金故欬欬則金不能不傷矣予先以壯水之藥主之如六味地黃之類補其眞陰使水升而火降隨即以參芪救肺之品以補腎之母使金水相生而病易愈矣世之用寒凉者膚淺庸工固不必論間有知用參芪者不知先壯水以鎮火而遽投參芪以補陽反使陽火愈旺而金益受傷豈藥之罪哉此所謂不識先後著者也有脾胃先虛土虛不能制水水泛爲痰子來乘母而嗽者矣又有初雖起於心火刑金因誤服寒凉以致脾土受傷肺益虛而嗽者乃火位之下水氣承之子來救母腎水復火之讎寒水挾木勢而上侵於肺胃水冷金寒故嗽前疾未除新病愈甚粗工不達此義尚謂痰火難除寒凉倍進豈不殆哉斯時也須用六君子湯加炮薑以補脾肺八味丸以補土母而引水歸源此等治欬嗽之法幸同志者加之意焉

金匱云欬而上氣喉中水雞聲射干麻黃湯主之此論外感

有嗽而聲啞者蓋金實不鳴金破亦不鳴實則清之破則補之皆治肺之法也又須知少陰之絡入肺中循喉嚨挾舌本肺爲之標本虛則標弱故聲亂咽嘶舌萎聲不能全出仲景傷寒書一男子年五十餘歲病傷寒欬嗽喉中聲如鉤與獨參湯一服而鉤聲除至二三服而欬嗽亦漸退服二三斤病始全愈

有一等乾欬嗽者丹溪云乾欬嗽極難治此係火鬱之證乃痰鬱其火邪在中用逍遙散以開之下用補陰之劑而愈

醫門法律 陳念祖昌著

欬嗽論

欬嗽一證求之內經博而寡要求之金匱惟附五方於痰飲之後亦無顯論不得已問津於後代諸賢所謂珪璧琳瑯非不焱然案頭究竟各鳴己得而鮮會歸昌不以漫然渺然之說傳信後人將何以爲言哉蓋嘗反覆內經之文黃帝問於岐伯曰肺之令人欬者何也岐伯對曰五臟六腑皆足令人欬非獨肺也此一語推開肺欬似涉太鑿設當日先陳肺欬以漸推詳則了無疑義後世有成法可遵矣非然也聖人立言不過隨文演義微啓其端苟必一一致詳即非片言居要之體所以讀內經貴在自得其要得其要則一言而終不得其要則流散無窮豈特論欬嗽一證爲然哉黃帝訓雷公之辭有曰不知比類足以自亂不足以自明固知比類之法不但足以被內經之義并足以被窮無窮極無極之義管可窺天籥可測海內經千萬年脫略之文一知比類直可合符一堂至於許病當前游刃恢恢不待言矣請申之岐伯雖言五臟六腑皆足令人欬其所重全在於肺觀其下文云皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也其寒飲食入胃從胃脈上至於肺則肺寒肺寒則內外合邪因而客之則爲肺欬此舉形寒飲冷傷

肺之一端以明欬始之因耳內外合邪四字扼要比類之法重在於此人身有外邪有內邪有外內合邪有外邪已去而內邪不解有內邪已除而外邪未盡纔一比類了然明白奈何不辨之於早聽其釀患日深耶夫形寒者外感風寒也飲冷者內傷飲食也風寒無形之邪入內與飲食有形之邪相合必留戀不舍治之外邪須從外出內邪須從下出然未可表裏並施也金匱五方總不出小青龍湯一方爲加減是內經有其論金匱有其方矣而內經金匱之所無者欲從比類得之果何從哉進而求之暑濕暑濕之邪皆足令人欬也蓋暑濕之外邪內入必與素醞之熱邪相合增其煩欬宜從辛涼解散又當變小青龍湯之例爲白虎而兼用天水五苓之屬矣進而求之於火則有君相之合無內外之合而其足以令人致欬者十常八九以心與肺同居膈上心火本易於尅制肺金然君火無爲而治恆不自動有時勞其心而致欬息其心欬亦自止尚不爲劍牀之災也惟相火從下而上挾君火之威而刑其肺上下合邪爲患最烈治之亦可從外內合邪之例比擬其或引或折以下其火俾不至於燎原耳於中欬嗽煩窕腎氣之逆亦爲上下合邪但濁陰之氣上干清陽爲鬲肓遮蔽任其煩窕不能透出亦惟下驅其濁陰而欬自止矣進而求之於燥內外上下初無定屬或因汗吐太過而津越於外或因瀉利太久而陰亡於下或營血衰少不養於筋或精髓耗竭不充於骨乃致肺金日就乾燥火入莫禦欬無止息此時亟生其津亟養其血亟補其精水循可爲也失此不治轉盼巍乾杯罄毛瘁色弊筋急爪枯欬引胃背弔脅疼痛諸氣臌鬱諸痿喘嘔嗌塞血泄種種危候相因而見更有何法可以沃其焦枯也耶經謂欬不止而出白血者死豈非肺受燥火煎熬而腐敗其血亦從金化而色白耶至於五藏六腑之欬內經言之不盡者要亦可比類而會通之耳昌一人知見有限由形寒飲冷傷肺一端比類以及暑濕火燥不過粗枝大葉啓發聰明之一助至從根本人理深譚是必待於後人矣

續論

昌著欬嗽論比類內經未盡底裏竊不自安再取金匱嘔噦噦終日不輟始得恍然有會始知金匱只欬嗽叙於痰飲之下有深意焉蓋以欬嗽必因之痰飲而五飲之中獨膈上支飲最爲欬嗽根底外邪入而合之固嗽卽無外邪而支飲潰入肺中自足令人欬嗽不已況支飲久蓄膈上其下焦之氣逆衝而上者尤易上下合邪也夫以支飲之故而令外邪可內下邪可上不去支飲其欬終無寧宇矣去支飲取用十棗湯不嫌其峻豈但受病之初卽病蓄已久亦不能舍此別求良法其曰欬家其脈弦爲有水十棗湯主之正謂急弦之脈必以去支飲爲亟也猶易知也其曰夫有支飲家欬煩胸中痛者不卒死至一百日一歲宜十棗湯此則可以死而不死者仍不外是方去其支飲不幾令人駭且疑乎凡人胸膈間孤無支飲其害何以若此之大其去害何必若此之力蓋膈上爲陽氣所治心肺所居支飲橫據其中動肺則欬動心則煩搏擊陽氣則痛逼處其中營衛不行神魂無依則卒死耳至一百日一年而不死陽氣未散神魂未離可知惟亟去其邪可安其正所以不嫌於峻攻也掃除陰濁俾清明在躬較彼姑待其死何得何失耶其曰久欬數歲其脈弱者可治實大數者死其脈虛者必苦冒其人本有支飲在胸中故也治屬飲家夫不治其欬而治其飲仲景意中之隱不覺一言逗出其實大數爲火刑金而無制故死其弱且虛爲邪正俱衰而易復故可愈也其曰欬逆倚息不得臥小青龍湯主之明外內合邪之證惟有小青龍的對一方耳然而用小青龍湯其中頗有精義須防衝氣自下而上重增濁亂也衝氣重增濁亂其欬不能堪矣傷寒證用大青龍湯無少陰證者可服脈微弱者不可服服之則皮瞤筋惕而亡陽雜證用小青龍湯亦恐少陰腎氣素虛衝任之火易於逆上衝任火上無欬且增煩欬況久欬不已顧可動其衝氣耶蓋衝任二脈與腎之大絡同起腎下出胞中腎虛不得固守於下則二脈相挾從少腹逆衝而上也於是用桂苓五味甘草湯先治其衝氣衝氣卽低而反更欬胃滿者因水在膈間不散其病再變前方去桂加乾薑細辛以治其欬滿欬滿卽止第三變而更復渴衝氣復發者以細辛乾薑爲熱藥也服之當遂渴而渴反止者爲支飲也支飲者法當冒冒者必嘔嘔者復內半夏以去其水水去嘔止第四變其人形腫者以水尚在表也加杏仁主之其證應內麻黃以其人遂痹故不內之若逆而內之者必厥所以然者以其人血虛麻黃發其陽故也第五變面熱如醉此爲胃熱上衝熏其面加大黃以利之嗟夫仲景治欬全不從欬起見去其支飲下其衝氣且及下衝氣法中之法游刃空

虛全牛劃然已解何其神耶向也不解作者之意祇覺無階可升何期比類而得外邪內入下邪上入之端因復參之金匱其精蘊始得洞矚豈非神先告之耶慰矣慰矣

雜論

內經秋傷於濕冬生欬嗽此脫文也訛傳千古今特正之曰夏傷於暑長夏傷於濕秋必痎瘧秋傷於燥冬生欬嗽六氣配四時之理燦然明矣蓋濕者水類也燥者火類也濕病必甚於春夏燥病必甚於秋冬痎瘧明是暑濕合邪然濕更多於暑何反遺而不言至於欬嗽全是火燥見病何反以爲傷濕邪所以春夏多濕者春分以後地氣上升天氣下降二氣交而濕蒸於中土膏木浮礎潤木津人身應之濕病見焉秋冬多燥病者秋分以後天氣不降地氣不升二氣分而燥呈其象草黃木落山巉木枯人身應之燥病見焉然則欬嗽之爲傷燥豈不明哉

六氣主病風火熱濕燥寒皆能乘肺皆足致欬其濕欬即分屬於風火熱燥寒五氣中也風乘肺欬汗出頭痛痰涎不利火乘肺欬喘急壅逆涕唾見血熱乘肺欬喘急面赤潮熱甚者熱甚於中四末反寒熱移於下便泄無度燥乘肺欬皮毛乾槁細瘡濕癢痰膠便祕寒乘肺欬惡寒無汗鼻塞身疼發熱躁煩至於濕痰內動爲欬又必因風因火因熱因燥因寒所扶各不相同至其乘肺則一也

風寒外束華蓋散參蘇飲如聲音不出風邪人參荊芥湯寒邪三拗湯遇冷欬發者橘皮半夏湯

火熱內燔加減瀉白散水煮金花丸加身熱如炙紫菀膏

傷暑之欬自汗脈虛發渴人參白虎湯清暑益氣湯

傷濕之渴身重脈細痰多五苓散白朮湯加喘滿浮腫款氣丸濕熱素蘊於中黃連解毒湯滾痰丸濕熱素蘊於上連聲迸氣不通者桑白皮散

傷燥之欬痰黏氣逆血腥杏仁蘿蔔子丸清金潤燥天門冬丸鳳髓湯加面目浮腫蜜酥煎

內傷之欬治各不同火盛壯水金虛崇土鬱甚舒肝氣逆理肺食積和中房勞補下用熱遠熱用寒遠寒內已先傷藥不宜峻至於上焦虛寒嘔唾涎沫則用溫沸湯上中二焦俱虛則用加味理中湯三焦俱虛則用加味三才湯

傷腎之欬氣逆煩冤牽引腰腹俛仰不利六味地黃湯加五味子水飲與裏寒合作腹痛下利眞武湯於中有燥欬熱移大腸亦主腹痛下利毫釐千里尤宜辨之

營衛兩虛之欬榮虛發熱衛虛自汗或惡寒寧肺湯

虛勞之欬五味黃芪散麥門冬飲

心火刑肺見血人參芎歸湯

乾欬無痰火熱內壅用四物桔梗湯開提之傷酒熱積用瓊玉膏滋潤之

色慾過度腎水不升用八味丸蒸動之

上半日欬多火在陽分宜白虎湯下半日欬多火在陰分宜四物芩連湯

久欬肺損肺痿痰中見血潮熱聲颯人參養肺湯血腥喘之鍾乳補肺湯久欬宜收濇者人參清肺湯如聲不出訶子散

膏粱致欬比濕熱內蘊例治之加色慾過度元氣虛損又不可盡攻其痰辛苦致欬比風寒外束例治之加外寒裏其內熱須分寒熱多少以消息而施表裏兼治之法

問秋傷於濕上逆而欬發爲痿厥與逆冬氣則傷腎春爲痿厥有別否曰此痿厥與春月之痿厥大異秋傷於濕吾已力辨其爲傷燥矣傷於燥則肺先病也欬者肺之本病其候不一上逆而欬燥之徵也至發而爲痿則肺金摧乎肝木發而爲厥則肺氣逆而不行燥之極矣此蓋燥火內燔金不寒水不冷秋冬不能收藏與春月不能發生之故相去不亦遠乎

欬嗽外感六淫鬱而成火必六淫相合內傷五臟相勝必五邪相迸有此不同而中間又有斂散二法斂者謂收斂肺氣也散者謂解散寒邪也宜散而斂則肺寒邪一時斂住爲害非輕宜斂而散則肺氣弱一時發散而走泄正氣害亦非小且如感風欬嗽已經散之後其表虛復感寒邪虛邪相乘又爲喘嗽若欲散風則愈重虛其肺若收斂則愈留滯其邪當先輕解漸次斂之肺不致虛邪不致滯喘欬自止矣

律六條

凡治欬不分外感內傷虛實新久襲用清涼藥少加疎散者因仍苟且貽患實深良醫所不爲也

凡治欬遇陰虛火盛乾燥少痰及痰咯難出者妄用二陳湯轉劫其陰而生大患者醫之罪也

凡欬而且利上下交征而不顧其人中氣者十無一起如此死者醫殺之也

此有肺熱腎寒兩證水火不同毋論用涼用溫總

以回護中氣爲主

凡邪盛欬頻斷不可用刼澀藥欬久邪衰其勢不銳方可澀之誤作傷肺必至欬無休止坐以待斃醫之罪也

凡屬肺痿肺癰之欬誤作虛勞妄補陰血轉滯其痰因致其人不救者醫之罪也

凡欬而漸致氣高汗漬宜不俟喘急痰鳴急補其下若仍治標亡本必致氣脫卒亡醫之罪也

景岳全書 臣張介賓著

論證

欬嗽一證竊見諸家立論太繁皆不得其要多致後人臨證莫知所從所以治難得效以余觀之則欬嗽之要止惟二證何爲二證一曰外感一曰內傷而盡之矣夫外感之欬必由皮毛而入蓋皮毛爲肺之合而凡外邪襲之則必先入於肺久而不愈則必自肺而傳於五臟也內傷之嗽必起於陰分蓋肺屬燥金爲水之母陰損於下則陽孤於上水涸金枯肺苦於燥肺燥則癢癢則欬不能已也總之欬證雖多無非肺病而肺之爲病亦無非此二者而已但於二者之中當辨陰陽當分虛實耳蓋外感之欬陽邪也陽邪自外而入故治宜辛溫邪得溫而自散也內傷之欬陰病也陰氣受傷於內故治宜甘平養陰陰氣復而欬自愈也然外感之邪多有餘若實中有虛則宜兼補以散之內傷之病多不足若虛中挾實亦當兼清以潤之大都欬嗽之因無出於此於此求之自得其本則治之無不應手又何有巢氏之十欬證陳氏之三因證徒致亂人心目而不得有濟也留心者其熟味此意

經云肺之令人欬又曰五臟六腑皆令人欬非獨肺也又曰皮毛先受邪氣邪氣以從其合也又曰五臟各以其時受病非其時各傳以與之然則五臟之欬由肺所傳則肺爲主臟而五臟其兼者也故五臟六腑各有其證正以辨其兼證耳既有兼證則亦當有兼治雖有兼治無非以肺爲主也是固然矣然愚則猶有說焉則謂外感之欬與內傷之欬其所本不同而所治亦異蓋外感之欬其來在肺故必由肺以及他臟此肺爲本而他臟爲標也內傷之欬先因傷他臟故必由他臟以及肺此他臟爲本而肺爲標也凡治內傷者使不知治他臟而單治肺則眞陰何由以復陰不復則欬終不愈治外感者使不知治陽而妄治陰則邪氣何由以解邪不解則嗽終不寧經曰治病必求其本何今人之不能察也

勞風證內經評熱病論曰勞風法在肺下其爲病使人强上冥視唾出若涕惡風而振寒此爲勞風之病巨陽引精者三日中年者五日不精者七日欬出青黃涕其狀如膿大如彈丸從口中若鼻中出不出則傷肺傷肺則死矣按勞風證即勞力傷風證也蓋人之勞者必毛竅開而汗液泄所以風邪易入凡今人之患傷風者多有此證故輕者惟三四日重者五七日必欬出濁痰如涕而愈者此即勞風之屬也但以外感之法治之自無不愈其有勞之甚者或內搖其精或外勞其形勞傷既甚精血必虧故邪不能散而痰不能出此即勞損乾嗽之類也所以多不可治

外感有嗽內傷亦有嗽此一實一虛治當有辨也蓋外感之嗽必因偶受風寒故或爲寒熱或爲氣急或爲鼻塞聲重頭痛吐痰邪輕者脈亦和緩邪甚者脈或弦洪微數但其素無積勞虛損等證而陡病欬嗽者即外感證也

若內傷之嗽則其病來有漸或因酒色或因勞傷必先有微嗽而日漸以甚其證則或爲夜熱潮熱或爲形容瘦減或兩顴常赤或氣短喉乾其脈輕者亦必微數重者必細數弦緊蓋外感之嗽其來暴內傷之嗽其來徐外感之嗽因於寒邪內傷之嗽因於陰虛外感之嗽可溫可散其治易內傷之嗽宜補宜和其治難此固其辨也然或脈證素弱而忽病外感者有之或形體素强而病致內傷者亦有之此中疑似但於病因脈色中細加權察自有聲應可證若或認之不眞而互謬其治則吉凶攸係不淺也最宜愼之

外感證治

外感欬嗽無論四時必皆因於寒邪蓋寒隨時氣入客肺中所以治嗽但治以辛溫其邪自散惟六安煎加生薑爲最妙凡屬外感悉宜先以此湯加減主之若肺脘燥澀痰氣不利或年老血衰欬嗽費力者於本方加當歸二三錢若寒氣太盛或中寒肺氣不溫邪不能解者於此方加北細莘七八分或一錢若冬月寒盛氣閉邪不易散者即麻黃桂枝俱可加用或用小青龍湯若傷風見寒或傷寒見風而往來寒熱欬嗽不止者宜柴陳煎主之若寒邪不甚痰氣不多者但以二陳湯加減主之則無有不愈

外感之嗽凡屬陰虛少血或脾肺虛寒之輩則最易感邪但察其脈體稍弱胷膈無滯或腎氣不足水泛

爲痰或心膈嘔惡饑不欲食或年及中衰血氣漸弱而欬嗽不能愈者悉宜金水六君煎加減主之足稱神劑若兼陽分氣虛而脈微神困懶言多汗者必加人參勿疑也若但以脾胃土虛不能生金而邪不能解宜六君子湯以補脾肺或脾虛不能制水泛而爲痰宜理中湯或理陰煎八味丸之類以補土母皆良法也

外感欬嗽而兼火者必有內熱喜冷脈滑等證亦但以二陳六安等湯酌加凉藥佐之熱微者可加黃芩一二錢熱甚者再加知母梔子之屬若火在陽明而兼頭痛熱渴者惟加石膏爲宜

外感之證春多升浮之氣治宜兼降如澤瀉前胡海石苦蔓之屬是也夏多炎熱之氣治宜兼凉如芩連知蘗之屬是也秋多陰濕之氣治宜兼燥如蒼术白术乾薑細辛之屬是也冬多風寒之氣治宜兼散如防風紫蘇桂枝麻黃之屬是也經言歲氣天和即此之類然時氣固不可不知而病氣尤不可不察若當其時非其病及時邪有不相合者又當舍時從證也至於各臟之氣證有兼見者又當隨宜兼治故不可任膠柱之見

欬嗽凡遇秋冬即發者此寒包熱也但解其寒而熱自散宜六安煎二陳湯金水六君煎三方察其虛實壯老用之如果熱甚者不妨佐以黃芩知母之類

內傷證治

凡內傷之嗽必皆本於陰分何爲陰分五臟之精氣是也然五臟皆有精氣而又惟腎爲元精之本肺爲元氣之主故五臟之氣分受傷則病必自上而下由肺由脾以極於腎五臟之精分受傷則病必自下而上由腎由脾以極於肺肺腎俱病則他臟不免矣所以勞損之嗽最爲難治正以其病在根本而不易爲力也病在根本尚堪治不求本乎故欲治上者不在乎上而在乎下欲治下者不在乎下而在乎上知氣中有精精中有氣斯可以言虛勞之嗽矣

肺屬金爲清虛之臟凡金被火刑則爲嗽金寒水冷亦爲嗽此欬嗽所當治肺也然內傷之嗽則不獨在肺蓋五臟之精皆藏於腎而少陰腎脈從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨挾舌本所以肺金之虛多由腎水之涸正以子令母虛也故凡治勞損欬嗽必當以壯水滋陰爲主庶肺氣得充嗽可漸愈宜一陰煎左歸丸六味地黃丸之類擇而用之其有元陽下虧生氣不布以致脾困於中肺困於上而爲喘促爲痞滿爲痰涎嘔惡爲泄瀉畏寒凡脈見細弱證見虛寒而欬嗽不已者此等證候皆不必治嗽但補其陽而嗽自止如右歸飲右歸丸八味地黃丸大補元煎六味回陽飲理中湯却勞散之類皆當隨宜選用不得因循以致侵淫無及也

內傷欬嗽凡水虧於下火炎於上以致火燥肺金而爲乾欬煩熱喉痛口瘡潮熱便結喜冷尺寸滑數等證則不得不兼清火以存其水宜四陰煎或加減一陰煎人參固本丸主之此當與欬血證參酌其治詳見血證門

欬嗽聲啞者以肺本屬金蓋金實則不鳴金破亦不鳴金實者以肺中有邪非寒邪即火邪也金破者以真陰受損非氣虛即精虛也寒邪者宜辛宜溫火邪者宜甘宜清氣虛者宜補陽精虛者宜補陰大都此證邪實者其來暴其治亦易虛損者其來徐其治亦難治損之法當與後乾欬證參酌用之

內傷虛損之嗽多不宜用燥藥及辛香動氣等劑如六安二陳之類皆不可輕用惟甘潤養陰如乳酥蜂蜜百合地黃阿膠麥冬去皮核桃肉之類皆所宜也

外邪證多誤認爲勞損而遂成真勞者此必其人氣體柔弱而醫家望之已有成心故見其發熱遂認爲火見其欬嗽遂認爲勞不明表裏率用滋陰降火等劑不知寒邪既已在表凉藥不宜妄投若外既有寒而內又得寒則表裏合邪必致邪鬱不解延綿日甚俗云傷風不愈變成勞大傷風豈能變勞特以庸醫誤治而日加侵削則柔弱之人能堪幾多清理久而不愈不至成勞不已也此實醫之所誤耳故醫於此證最當詳察在表在裏及新邪久病等因脈色形氣等辨辨得其眞則但以六安煎金水六君煎或柴陳煎之類不數劑而可愈矣醫之不精此其一也

乾欬嗽證在丹溪云火鬱之甚乃發鬱火邪在肺中用苦梗以開之下用補陰降火不已則成勞須用倒倉法此證多是不得志者有之愚謂丹溪此說殊不然夫既云不得志則其憂思內傷豈獨火病也又豈苦梗倒倉所宜攻也蓋乾欬嗽者以肺中津液不足枯涸而然此明係內傷虧損肺腎不交氣不生津精不化氣所以乾澀如此但其有火無火亦當辨治若臟平無火者止因肺虛故必先補氣自能生精宜五福飲之類主之若臟氣微寒者非辛不潤故補陽則陰生宜理陰煎或六君子湯之類若兼內熱有火者

須保眞陰故必先壯水自能制火宜一陰煎或加減一陰煎兼貝母丸之類若以此證而但知消痰開鬱將見氣愈耗水愈虧未免爲涸轍之鮒矣

論河間治嗽先治痰說

愚觀河間謂治嗽當先治痰因以南星半夏之屬爲主似得治嗽之法矣此其意謂嗽必因痰故務其痰而嗽自愈則理有不然也蓋外感之嗽必因風寒風寒在肺則肺氣不清所以動嗽動嗽然後動痰此風邪痰嗽之本本於外感非外感本於痰也又如內傷之嗽必因陰虛陰虛則水涸金枯所以動嗽脾虛肝敢所以化痰此陰虛痰嗽之本本於內傷非內傷本於痰也今曰治嗽當先治痰豈求本之道乎然治外感之嗽惟二陳之屬爲最效何也蓋南星半夏生薑陳皮枳殼之類其味皆辛辛能入肺辛能散寒寒邪散則痰嗽自愈此正所以治本而實非以治痰也若內傷陰虛之嗽則大忌辛燥此輩豈堪輕用哉經曰肺欲辛以辛瀉之此肺實者之宜辛也又曰辛走氣氣病無多食辛此肺虛者之忌辛也氣味互否之理內經妙用如此河間何以不察而謂南星半夏之屬但能治痰豈果治痰之標便能治嗽之本乎

石室秘錄 陳士鐸

欬嗽治法

肺嗽之證本是肺虛肺虛必宜補肺明矣奈何兼治腎也蓋肺金之氣夜臥必歸諸腎之中譬如母子之間母雖外遊夜間必返于家以安其身肺金爲心火所傷必求救於己子以禦火侮儻其子貧寒何以號多人以報母雖哉今有一方治之用熟地麥冬各一兩山茱萸四錢元參五錢蘇子天門冬甘草牛膝各一錢沙參三錢紫菀五分水煎服此方之妙全在蛟補腎水而少清肺金則子盛於母而母雖可報有祛邪之品用之得宜全不耗散肺金譬如子孝友明盡是同心之助豈言攻擊全不費老母之資則子之雖雖在未復而外侮闖塞退舍不敢重犯於母家此又肺腎同治之妙法也

燥證欬嗽已傷肺矣復加吐血吐膿爲得不死而必欲生之迂矣不知燥證以致欬嗽原是外感非比內傷雖吐膿血亦因欬嗽之傷而來救欬嗽而肺金有養嗽止而膿血亦消也方用養肺救燥丹麥冬金銀花元參各三兩甘草天門冬桔梗各三錢水煎服此方單入肺金以潤津液兼消浮火而止膿血內氣既潤外感又除何愁死證之難治哉

欬嗽法當用輕清之藥品少少散之無不立效如小柴胡湯是也然而小柴胡湯世人不知輕重之法守再酌定之可永爲式方用柴胡黃芩半夏甘草各一錢陳皮五分此小柴胡湯子更加人參五分茯苓二錢更爲奇妙蓋氣足則邪易出而汗易發世人見用人參便覺失色匪獨醫者不敢用即病者亦不敢服相沿而不可救藥者滔滔皆是安得布告天下醫人詳察其病源而善用之也

人病久嗽不已無不以爲邪之聚也日日用發散之劑而不效者何氣散故耳氣散矣而仍用散藥無怪乎經月而不效也法當用收斂之藥一二劑便見成功方用人參白芥子北五味子蘇子各一錢白芍三錢酸棗仁二錢麥冬五錢益智仁五分水煎服一劑輕二劑全愈後服六味地黃丸加麥冬三兩北五味子一兩服之不再發否則不能保其不發也蓋久服散藥耗盡眞陰雖暫用收斂之藥一時奏功而眞陰既虧腠理不密一經風邪最易感人此必然之勢也服地黃丸亦足斯肺金有養腠理密又何患重感風邪哉

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百六十五卷目錄
醫部彙考二百四十五
欬嗽門四
方一 厚朴麻黃湯 安腎丸 烏梅杏子湯 蘇子降氣湯 華蓋散 加減麻黃湯 小青龍湯 射干麻黃湯 白前湯 三生丸 甘桔湯 通聖散 百合湯 款冬花散 紫菀散 清金丸 保肺湯 五味子湯 青金丸 貝母散 治鼻塞聲重欬嗽不已 金沸草散 治肺感寒邪鼻塞聲重欬嗽不已 旋覆花 甘草炒 水一盞半生薑三片棗一枚煎八分不拘時溫服 梔子仁湯 治火鬱欬嗽 鬱金 枳殼麩炒 升麻 山梔子炒各等分

藝術典第二百六十五卷
醫部彙考二百四十五

欬嗽門四

方一

厚朴麻黃湯 仲景

治欬而脈浮者

厚朴五兩　麻黃四兩　石膏如雞子大　杏仁半夏　五味子各半升　乾薑　細辛各二兩　小麥一升

右以水一斗三升先煮小麥熟去滓內諸藥煮取三升溫服一升日三服

安腎丸 直指方

治腎經虛寒欬嗽痰唾面色黯黑小腹動氣作痛

肉桂去粗皮不見火　川烏炮去皮臍各十六兩　桃仁麩炒　巴戟　白蒺藜炒　山藥　茯苓　肉蓯蓉酒浸炙　石斛　草薢　白朮黃土炒　破故紙各四十八兩

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服三十丸溫酒或鹽湯送下空心食前

易簡杏子湯

治欬嗽不問外感風寒內傷生冷及虛勞咯血痰飲停積皆治療之

人參　半夏製　白茯苓　甘草　五味子　芍藥各等分　細辛　乾薑　桂枝各減半

右㕮咀每服四錢水一盞半杏仁去皮尖劉五枚生薑三片煎至六分去查溫服

若感冒得加麻黃等分

若脾胃素實者用御米殼去筋膜劉碎以酢淹炒等分加之每貼加烏梅一枚煎服尤妙嘔逆惡心者不可用此

若久年欬嗽氣虛喘急去杏仁人參倍加麻黃芍藥乾薑五味子各增一半一名小青龍湯

濟生橘蘇散

治傷風欬嗽身熱有汗惡風脈浮數有熱服杏子湯不得者

橘紅　紫蘇葉　杏仁去皮　五味子　製半夏　桑白皮炙　貝母　白朮各一兩　甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞生薑五片煎七分溫服無時

寧嗽化痰湯

治感冒風寒欬嗽鼻塞

桔梗　枳殼麩炒　半夏薑湯泡七次　陳皮　前胡　乾葛　茯苓各一錢　紫蘇一錢二分　麻黃一錢去節夏減　杏仁炒去皮尖　桑皮各一錢　甘草四分

水二鍾薑三片煎八分食遠熱服

金沸草散 局方

治肺感寒邪鼻塞聲重欬嗽不已

旋覆花　麻黃去節　前胡各七分　荊芥一錢　甘草炒　半夏湯洗七次薑汁浸　赤芍藥各五分

水一盞半生薑三片棗一枚煎八分不拘時溫服

梔子仁湯

治火鬱欬嗽

鬱金　枳殼麩炒　升麻　山梔子炒各等分

右每服五錢水煎

麥門冬湯

治火熱乘肺欬嗽有血胷膈脹滿五心煩熱

麥門冬　桑白皮炒　生地黃各一錢　淡竹葉

半夏　紫菀　桔梗　麻黃各七分　五味子

甘草各五分

右薑水煎服

華蓋散 [illegible]

治肺受風寒欬嗽聲重胷膈煩滿頭目昏眩

麻黃去根節　紫蘇子炒　杏仁炒去皮尖

桑白皮炒　赤茯苓　橘紅各一錢　甘草五分

水二鍾生薑五片紅棗一枚煎至一鍾去查不拘時服

加減麻黃湯

治肺感寒邪欬嗽

麻黃去節二錢　杏仁炒去皮尖　半夏薑製

陳皮各一錢　辣桂　甘草炙各半錢

水二鍾生薑四片紫蘇半錢同煎至一鍾去查不拘時服

小青龍湯

治肺寒積水欬嗽

麻黃去根節　芍藥　乾薑　炙甘草　細辛

桂枝各三兩　五味子　半夏各半升湯洗

右八味以水一斗先煎麻黃減去二升去上沫內諸藥煎取三升去查溫服一升

杏子湯 良方

治一切欬嗽不問外感風寒內傷生冷及痰飲停積悉皆治之

杏仁炒去皮尖雙仁　人參　白茯苓　細辛洗

半夏湯泡七次　官桂不見火　乾薑炮　白芍

五味子　甘草炙各一錢

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服此藥味多辛熱之劑若冷嗽則可服

應夢人參散 [illegible]

治久欬嗽

甘草炙六兩　人參　桔梗　青皮　白芷

乾葛　白朮各三兩　乾薑炮五錢半

每服三錢水一盞薑　片棗二枚煎七分不拘時熱服

觀音應夢散 [illegible]

治前證

人參一寸　胡桃去殼不去皮二枚

右以水二盞薑五片棗二枚臨臥煎服蓋人參定喘帶皮胡桃斂肺也

款冬花散 和劑 下同

治久欬嗽

知母　桑葉洗焙　款冬花各十兩　阿膠炒

麻黃去根節　貝母炒　杏仁去皮尖各四十兩

甘草炙　半夏湯洗製各二十兩

每服三錢水一盞薑三片煎七分食後溫服

二母散

治前證

知母　貝母各等分

每服五錢水二盞薑三片煎八分溫服無時

紫菀茸湯 [illegible]

治飲食過度或食煎煿邪熱傷肺欬嗽咽癢痰多唾血喘急脅痛不得睡臥

紫菀茸洗　款冬花　百合蒸焙　杏仁去皮尖

阿膠蛤粉炒　經霜桑葉　貝母去心　蒲黃炒

半夏製各一兩　犀角鎊　甘草炙　人參各半兩

右㕮咀每服四錢水盞半薑五片煎八分食後溫服

潤肺丸 [illegible] 下同

治前證

訶子　五味子　五倍子　甘草各等分

右爲末蜜丸噙化久嗽加鶯粟殼

清音丸

治欬嗽

桔梗　訶子各一兩　甘草五錢　冰片三分

硼砂　青黛各三錢

右爲細末煉蜜丸如龍眼大每服一丸噙化

橄欖丸 [illegible] 方

治久欬嗽

百藥煎　烏梅　甘草　石膏各等分

右爲末煉蜜丸如彈子大臨臥噙化一丸

清咽寧肺湯 [illegible]

治欬嗽

桔梗二錢　山梔炒　黃芩　桑皮　甘草

前胡　知母　貝母各一錢

水二鍾煎八分食後服

蛤蚧湯

治款嗽吐膿血及肺痿氣瘦涎沸稠粘
蛤蚧酒浸酥炙　知母焙　貝母焙　桑白皮炙
鹿角膠炙令燥　枇杷葉去毛炙　葛根　人參
甘草炙　杏仁湯浸去皮尖雙仁炒各一兩
每服三錢水一盞半煎八分去滓不拘時溫服

保和湯

治勞證久嗽肺燥成痰服之決效
知母　貝母　大冬　麥冬　款冬花各一錢
天花粉　薏苡仁炒　杏仁去皮尖炒各五分
五味子十二粒　紫菀　馬兜鈴　桔梗　百合
阿膠蛤粉炒　當歸　百部各六分　粉草炙
紫蘇　薄荷各四分
水二鍾煎七分入飴糖一匙食後服

吐血或痰帶血加炒蒲黃生地黃小薊

痰多加橘紅茯苓苦葶藶仁
喘去紫蘇薄荷加蘇子桑皮陳皮

五味子湯

治款嗽皮膚乾燥唾中有血胸脇疼痛
赤小豆一撮　五味子　桔梗　紫菀　甘草炒
續斷各五分　竹瀝一錢　生地　桑皮炒各二錢
右水煎服

本事醍甲丸

治勞嗽虛證及鼻流清涕耳作蟬鳴眼見黑花一切虛證丈夫女人皆可服
五味子一錢　醍甲　地骨皮各三兩
右爲末煉蜜丸如梧子大空心食前溫酒或鹽湯任意服三五十丸婦人酢湯下此方乃曲江人家秘方服效者衆且處方有理

三拗湯仲景

治寒燠不常暴嗽喘急鼻塞痰壅
麻黃不去節　杏仁不去尖　甘草不炙各等分
每服五錢水一鍾生薑五片煎服有汗即愈一本甘草減半

青金丸

治肺虛風壅款嗽喘滿咯痰血
杏仁去皮尖二兩用牡蠣煅成粉與杏仁同炒黃色去牡蠣粉不用　青黛一兩
右爲末研勻用黃蠟一兩鎔化搜和丸如彈子大壓扁如餅每用梨三箇或用軟柿餅一箇去核入藥在內濕紙裹煨約藥鎔方取出去火毒細嚼糯米飲下

甲乙餅

治款出血片兼痰內有血絲不問年深日近但只聲在一服取效
青黛一兩　牡蠣粉七錢　杏仁七粒去皮尖研
蠟丸湯使同上

人參養肺丸

治肺胃俱傷氣奪於上客熱熏肺款嗽喘急胃中煩悸涕唾稠粘吐血嘔血並皆治之
人參　黃芪蜜炙各一兩八錢　茯苓　苦葶藶根各六錢　半夏麴炒四兩　杏仁炒去皮二兩四錢
皂角子三十箇炒去皮
右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食後細嚼用紫蘇湯送下喘用桑白皮湯送下

寧肺湯

治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急款嗽痰涎
人參　當歸　白朮　熟地黃　川芎　白芍藥
五味子　麥冬　桑皮　茯苓　甘草炙各一錢
阿膠蛤粉炒各一錢半
右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

貝母散

治暴發款嗽冬日不愈
貝母　杏仁去皮尖　桑白皮各二錢　五味子
知母　甘草各一錢　款冬花一錢半
右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

奇效良方無款冬花

治嗽得效方

治諸嗽久不瘥
佛耳草　甘草　人參　款冬花　白蘞枯各二錢
右剉碎作一服水二盞生薑三片棗一枚烏梅半箇煎至七分食後服

治嗽補虛方

牛骨一副取髓　白砂蜜八兩　杏仁去皮尖研
山藥去皮研爲細末　胡桃各四兩去皮研
右將牛骨髓沙蜜砂鍋內煎熬沸以絹帛濾去滓盛在磁瓶內將山藥杏仁胡桃三味亦入瓶內以紙密封瓶口重湯內煎一日一夜取出每日早晨用白湯化一匙服

雌黃丸

治暴嗽久嗽勞嗽
葉子雌黃一兩研細紙筋泥固濟令乾勿令泥厚將

藥入盒子內水調赤石脂封盒子口更以泥封之候乾坐盒子於地上上面以未入窰瓦坯子擁盒子令作一尖子上用炭十斤簇定頂上著火一熨斗籠起令火從上漸熾候火銷三分去一看瓦坯通紅則去火候冷開盒子取藥當如鏡面光明紅色

右入乳鉢內細研湯浸蒸餅和丸如粟米大每服三丸五丸食後用甘草湯下服後睡良久妙

紫金散

治一切痰嗽日夜不得眠臥

南星去皮臍　白礬　甘草各半兩　烏梅肉二兩

右爲粗散用慢火於銀石器內炒令紫色放冷研爲細末每服二錢臨臥時身入被內用薑汁七分溫湯三分煖令稍熱調前藥末服之嚥下便仰臥低枕想藥入於肺中須臾得睡其嗽立止

蘇子煎

治上氣欬嗽

蘇子　生薑汁　生地汁　白蜜　杏仁各一升

右搗蘇子以地黃汁薑汁澆之以絹絞取汁更搗以汁澆之絞令味盡去滓熬令杏仁微黃黑如脂又以汁澆之絹絞往來六七度令味盡去滓內蜜合和置銅器中於湯上煎之令如飴每服方寸匕日三夜一一方無地黃汁

蜜酥煎

治肺感於寒成欬嗽上氣及多涕唾面目浮腫

杏仁三升去皮尖雙仁研　白蜜一升　牛酥二升

右將杏仁於磁盆中用水研取汁五升淨磨銅鐺勿令脂膩先傾三升汁於鐺中刻木記其深淺又傾汁二升火煎減至於所記處即內蜜酥等煎還至本記處藥乃成貯不津磁器中每日三度以煖酒服一大匙不能飲酒和粥服亦得服至一七日唾色變白二七日唾稀三七日欬斷

百合湯

治肺氣壅滯欬嗽喘悶膈脘不利氣否多渴腰膝浮腫小便淋澀

百合　赤茯苓　陳皮去白　紫蘇莖葉　人參

大腹皮　猪苓　桑皮　枳殼麩炒　麥冬去心

甘草炙各一兩　馬兜鈴七枚和皮

右粗搗篩每服四錢水一盞半入生薑一棗大同煎至八分去滓不拘時溫服

葶藶散

治欬嗽面目浮腫不得安臥涕唾稠黏

甜葶藶隔紙炒　槨李仁炒　桑白皮各一兩

大腹皮去土七錢半　紫菀　旋覆花　檳榔

木通各半錢

右爲散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

天門冬丸

治肺臟壅熱欬嗽痰唾稠黏

天冬一兩半焙　百合　前胡　貝母煨　桑皮

半夏　桔梗　防己　紫菀　赤茯苓　生地黃

杏仁湯洗去皮尖雙仁麩炒黃研如膏各七錢半

右爲細末煉蜜和搗二三百杵丸如桐子大每服二十丸不拘時生薑湯送下日三服

前胡散

治欬嗽涕唾稠黏心胷不利時有煩熱

前胡　桑皮　貝母煨各一兩　麥門冬一兩半

甘草炙二錢半　杏仁半兩湯浸去皮尖雙仁炒

右爲散每服四錢以水一中盞入薑半分煎至六分去滓溫服無時

枳殼湯 濕沾下同

治久嗽胷膈不利者多上焦發熱

枳殼炒三兩　桔梗二兩　黃芩一兩半

右爲細末每早取二兩半水三鍾煎至一鍾日作三服午時中時臥時各一服三日七兩半服盡又服半夏湯用半夏薑製切片每三錢半水盞半薑五片煎至一盞食後日二三服二三日服了再服枳殼丸盡其痰爲度

款氣丸

治久嗽痰喘肺氣浮腫

青皮　陳皮　檳榔　木香　杏仁　馬兜鈴炮

茯苓　槨李仁　當歸　莪朮　葶藶各三錢

人參　防己各四錢　牽牛頭末二兩半

右爲細末薑汁麪糊丸桐子大每服二十丸加至七十丸食後薑湯送下一方無莪朮有猪苓澤瀉

馬兜鈴丸

治多年喘嗽不止大有神功

馬兜鈴　半夏　杏仁去皮尖麩炒各一兩

巴豆二十一粒去皮油研

已上除巴豆杏仁另研外餘爲細末用皂角膏子爲丸如梧子大雄黃爲衣每十丸臨臥煎烏梅湯下以利爲度

貝母湯 本事方

治諸嗽久不瘥

貝母一兩去心薑製　黃芩半兩　乾薑生

五味子　陳皮各一兩　桑白皮半兩　半夏

柴胡　桂心各一兩　木香　甘草各二錢半

右爲粗末每服五錢水一盞半加杏仁七粒去皮尖生薑七片煎去滓溫服有蔣氏之妻積年嗽製此方授之一服瘥以治諸般嗽悉愈此方有寒有熱有收有散諸嗽通用也一方有杏仁

人參散

治諸欬嗽喘急語言不出年久者多服見效

人參　知母　貝母　馬兜鈴肉　麻黃去節

杏仁生　半夏各一錢半　天仙藤一錢

右作一服水二鍾烏梅一枚蜜一匙煎至一鍾臨睡服

人參清肺湯 和劑下同

治肺胃虛寒欬嗽喘急睡臥不安幷治年久勞嗽吐血腥臭

地骨皮　人參　炙甘草　阿膠麩炒　烏梅肉

杏仁去皮尖麩炒　桑白皮去粗皮　知母

鶯粟殼去蒂蓋蜜炙各等分

右㕮咀每三錢水盞半烏梅棗子各一枚煎一盞臨臥溫服

參粟湯

治久嗽

人參　款冬花　鶯粟殼酢炙各等分

每服四錢水一鍾阿膠一錢烏梅一箇煎七分臨臥溫服

久嗽丸子 丹溪

海蛤粉研細 君　膽星 臣　杏仁 臣　訶子 佐

青黛 佐　皂角 使

右爲末薑汁丸如桐子大薑湯下

香蠶散

凡久嗽乃積痰久留肺脘黏滯如膠氣不能升降或挾濕與酒而作

香附子童便浸　殭蠶炒　海蛤粉　苦蔞仁

蜂房　杏仁　薑汁　竹瀝　神麴各等分

右爲末煉蜜丸噙化

半蘇丸

治形實夏月無汗成久嗽痰火

半夏薑製　紫蘇葉各一兩

右二味入莎末蜆殼末神麴末以苦蔞瓤桃仁半兩和丸先服三拗湯三貼方服此丸子

祛痰丸

一男子五十歲舊年因暑月入冷水作勞患瘧後得痰嗽次年夏末得弦脈而左手虛叩之必汗少而有痰身時時發熱痰如稠黃膠與下項方藥仍灸大椎風門肺俞五處

半夏一兩　白朮七錢　茯苓六錢　黃芩

陳皮留白　桔梗　枳殼　石膏煅各半兩

殭蠶炒二錢半　五味子一錢半

右用神麴糊丸薑湯下三十丸先與三拗湯加黃芩白朮二貼夜與小胃丹十丸以攪其痰

大菟絲子丸 和劑

治腎氣虛損五勞七傷脚膝痠痛面色黧黑目眩耳鳴心忡氣短時有盜汗小便滑數

菟絲子淨洗酒浸　澤瀉　鹿茸去毛酥炙　石龍芮去土　肉桂去粗皮　附子炮去皮各一兩

石斛　山茱萸肉　熟乾地黃　白茯苓　續斷

牛膝酒浸一宿焙乾　防風　肉蓯蓉酒浸切焙

杜仲去粗皮炒去絲　沉香　補骨脂去毛酒炒

蓽澄茄　巴戟去心　茴香炒各三兩　五味子

桑螵蛸酒浸炒　覆盆子去枝葉萼　芎藭各半兩

右爲細末酒煑麵糊丸如梧子大每服二十丸空心溫酒鹽湯任下

甘桔湯

仲景云少陰咽痛藥也孫眞人治肺癰吐膿血用生甘草加減二十餘條

桔梗三兩　甘草一兩

右水煎服

欬逆氣者加陳皮

欬嗽者加貝母知母

欬發渴者加五味子

吐膿血者加紫菀

肺痿者加阿膠

面目腫者加茯苓

嘔者加生薑半夏

少氣者加人參麥門冬

膚痛者加黃芪

目赤者加梔子黃連

咽痛者加鼠黏子竹茹

聲不出者加半夏桂枝
痰毒頭腫者加鼠黏子大黃芒硝
胃痛腸不利者加枳殼
心胃痞者加枳實
不得眠者加梔子
發狂者加防風荊芥
酒毒者加葛根陳皮

射干麻黃湯 仲景

治喉中有聲

射干 細辛 紫菀 款冬花各三兩 麻黃 生薑各四兩 五味子 半夏各半升 大棗七枚

水一斗二升先煮麻黃兩沸去上沫納諸藥煮取三升分溫三服

白前湯 千金方

治欬逆上氣身體浮腫短氣腫滿旦夕倚壁不得臥喉中水雞聲

白前 紫菀 半夏 大戟各三兩

水一斗浸一宿明旦煮取三升分三服

清金湯

治丈夫女人遠年欬嗽上氣喘急喉中涎聲胃滿氣逆坐臥不寧飲食不下

陳皮去白 薏苡仁 五味子 阿膠炒 紫蘇 茯苓去皮 桑白皮 杏仁去皮尖炒 款冬花 貝母去心 半夏麴 百合各一錢 粟殼蜜炒 人參 甘草炙各半錢

右作一服水二鍾生薑三片棗二枚烏梅一枚煎一鍾食後服

杏仁煎

治欬嗽失音不出

杏仁去皮尖三兩研 紫菀 五味子各一兩 生薑汁 白蜜 飴糖各一兩半 桑皮 貝母 木通各一兩二錢半

右剉碎用水三升煮至半升去滓入前杏仁等四味再煮成膏每服一匕含化一方加款冬花知母各一兩

通聲煎

治欬嗽氣促胃中滿悶語聲不出

杏仁一升去皮尖雙仁炒另研如泥 五味子 木通 人參 桂心去粗皮 細辛 款冬花 石菖蒲 竹茹 酥各三兩 棗肉二升 白蜜 生薑汁各一升

右前八味剉如麻豆大以水五升微火煎五七沸去滓內薑汁酥蜜并棗肉再煮令稀稠得所每服一匙用溫酒一小盞化下一方無灰酒含嚥之

小陷胃湯 仲景

治熱痰欬嗽

黃連一兩 半夏半升洗 苦蘆實大者一枚

右以水六升先煮苦蘆取三升去滓內諸藥煮取二升去滓分溫三服

三生丸

治嗽

核桃仁 生薑去皮細切 杏仁各一兩

右二味同研爲泥就和作劑可得十三四丸臨臥爛嚼一丸可數服卽止

痰嗽化痰丸

白芥子 滑石各半兩 貝母 南星各一兩

風化硝二錢半 黃芩酒浸一兩半

右爲末湯浸蒸餅丸

人參半夏丸 衛生寶鑑

化痰墜涎止嗽定喘療風痰食痰一切痰逆嘔吐痰厥頭痛或風氣偏正頭痛或風壅頭目昏或耳鳴鼻塞咽乾胃膈不利

人參 茯苓 南星 薄荷各半兩 寒水石 白礬生 半夏 薑屑各一兩 蛤粉二兩 藿香二錢半

右爲末水糊爲丸如桐子大每服三十丸薑湯下食後日三服白湯亦得一方加黃連半兩黃檗二兩尤效又治酒病調和臟腑殊妙

人參清鎮丸

治熱止嗽消痰定喘

人參 柴胡各一兩 陳皮二錢 黃芩 半夏 甘草炙各七錢 麥門冬 青黛另研各三錢 五味子十三粒

右爲末麵糊丸如桐子大每服三十丸溫白湯送下食後

玉液丸

治風壅化痰涎利咽膈清頭目止款嗽除煩熱

寒水石煅赤出火毒水飛過三十兩 半夏洗研白礬枯研各十兩

右研細和勻麵糊丸如桐子大每服三十丸食後用淡生薑湯送下

半夏溫肺湯 其辛

治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜欬嗽常多涎唾口中淸水出脅肋急脹痛不欲食此胃氣虛冷所致其脈沉弦細遲

旋覆花　人參　細莘　桂心　甘草　陳皮

桔梗　芍藥　半夏製各半兩　赤茯苓七錢半

右㕮咀每服四錢生薑三片水煎食後服

星香丸

治諸氣嗽生痰

半夏用白礬一兩以水同浸一宿　南星各三錢

陳皮五錢泔浸去白　香附皂角水浸曬乾各三兩

右四味俱不見火研爲細末薑汁煑麵糊和丸如桐子大每服五十丸食後淡生薑湯送下

白朮湯

治受濕欬嗽痰多上氣喘急身體重痛脈濡細

白朮三錢　白茯苓去皮　半夏湯泡七次

橘紅各二錢　五味子　甘草炙各一錢

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時溫服一方無五味子

麻黃湯 仲景下同

治肺臟發欬欬而喘急有聲甚則唾血

麻黃三錢　桂枝二錢　甘草一錢　杏仁二十粒

右水煎服

桔梗湯

治心臟發欬欬而喉中如梗狀甚則咽腫喉痹

苦桔梗三錢　甘草六錢

右水煎服按此卽甘桔湯變其銖兩而成方者

升麻湯

治脾臟發欬欬而右脅下痛痛引肩背甚則不可以動

升麻　白芍藥　甘草各二錢　葛根三錢

右水煎服

麻黃附子細莘湯

治腎臟發欬欬則腰背相引而痛甚則欬涎

麻黃　細莘各二錢　附子一錢

右水煎服

烏梅丸

治胃腑發欬欬而嘔嘔甚則長蟲出

烏梅三十枚　細莘　附子　桂枝　人參

黃蘗各六錢　乾薑一兩　黃連一兩五錢

當歸　蜀椒各四錢

右爲末先用酒浸烏梅一宿去核蒸之和米飯搗如泥爲丸桐子大每服三十丸白湯下

黃芩半夏生薑湯

治膽腑發欬嘔苦水如膽汁

黃芩炒　生薑各三錢　甘草炙　半夏各二錢

右薑水煎服

赤石脂禹餘糧湯

治大腸腑發欬欬而遺矢

赤石脂　禹餘糧各二錢並打碎

右水煎服

芍藥甘草湯

治小腸腑發欬欬而失氣

芍藥　甘草炙各四錢

右水煎服

茯苓甘草湯

治膀胱腑發欬欬而遺溺

茯苓二錢　桂枝二錢五分　生薑五大片

炙甘草一錢

右水煎服

錢氏異功散

治久欬不已或腹痛少食而腫氣逆又治脾虛胃弱食飲少思等證

人參　茯苓　白朮　甘草　陳皮各等分

右每服三錢薑棗水煎服

桔梗湯 和劑

除痰止欬嗽又治心欬

桔梗　半夏製　陳皮去白各一兩　枳實三錢

右爲粗末每服三錢薑五片水煎服

二母散 入門

治諸般欬嗽兼治痰喘

知母　貝母各一兩　巴豆十粒作霜

右爲末每服一字與薑三片臨臥細嚼白湯下便合口睡其嗽卽定亦治久嗽不愈

神朮散 得效方

治傷風頭痛鼻塞聲重欬嗽

蒼朮米泔製二錢　羌活　川芎　白芷　細莘

甘草各一錢

右剉作一貼薑三片葱一寸煎服

金沸草散 正傳

治肺惡風寒欬嗽聲重痰涎黃濁壅盛

荊芥二錢　旋覆花　前胡各一錢半　赤茯苓
麻黃各一錢　半夏七分半　細辛　甘草各三分
右剉作一貼入薑三片棗二枚烏梅一箇水煎綿
濾去滓服

玉粉丸
治氣痰欬嗽
南星麴　半夏麴　陳橘皮各一兩
右爲末用自然薑汁打糊丸如梧子大每服四十
丸薑湯下寒痰去橘皮加官桂

溫肺湯良方下同
治肺虛感冷欬嗽嘔吐痰涎
乾薑　半夏湯泡去滑各一錢　杏仁　陳皮
甘草各一錢半　細辛　阿膠炒各半錢
右作一服用水二鍾生薑五片紅棗一箇煎至一
鍾去滓不拘時服

人參紫菀湯
治肺氣不調欬嗽喘急久不愈者
人參　紫菀茸　桂枝　五味子　杏仁去皮尖
甘草各一錢　縮砂　鴛粟殼薑製炒各二錢
右作一服用水二鍾生薑五片烏梅二箇煎一鍾
食遠服

五拗湯
治感寒欬嗽肺氣喘急
麻黃不去節　杏仁不去皮　甘草生　荊芥穗
桔梗各二錢
右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服
咽喉痛者煎熟後加矾硝少許一方去荊芥桔梗
用枳實半夏

玉芝丸
治風壅痰實頭目眩昏欬嗽聲重咽膈不利
人參　白茯苓去皮　白礬枯　天南星米泔浸
薄荷各三十兩　半夏麴六十兩
右爲細末生薑汁煮麴糊和丸如梧子大每服三
十丸食後生薑湯送下如痰盛燥熱薄荷湯送下

鍾乳補肺湯
治肺氣不足久年欬嗽以致皮毛焦枯吐血腥臭
喘乏不止
鍾乳粉碎如米　桑白皮各二錢　肉桂去粗皮
白石英碾末　五味子　款冬花去梗　紫菀洗
麥門冬去心　人參各一錢
右除鍾乳粉白石英同爲粗末拌勻右作一服用
水二鍾生薑五片棗一枚粳米三十粒煎至一鍾
食後服

人參潤肺丸
治肺氣不足欬嗽喘急久年不愈漸成虛勞及療
風壅痰實頭目眩運口舌乾燥涕唾稠黏
人參　款冬花　細辛去葉　杏仁炒去皮
甘草炙各四兩　官桂去皮　桔梗各五兩
知母六兩
右爲細末煉蜜爲丸如雞頭實大每服一丸食後
細嚼用淡生薑湯送下

八味款花散
治肺經寒熱不調痰涎不已
款冬花　紫菀茸　五味子　甘草炙各一錢半
桑皮炒　麻黃去節　杏仁湯浸去皮尖各一錢
右作一服水二鍾煎一鍾入黃蠟如皂角子大食
後服

人參丸
治遠年近日欬嗽諸藥不效者
人參　桔梗　甘草炙各一兩　北五味子
阿膠蛤粉炒珠各半兩　肉桂　杏仁泡去皮炒
烏梅肉各二錢半
右爲細末煉蜜和丸每兩作十五丸每服一丸用
新綿裹定於湯內濕過噙化嚥津

大降氣湯
治上盛下虛膈壅痰實喘嗽咽乾不利
紫蘇子微炒　川芎　細辛　當歸焙　白茯苓
桔梗　厚朴薑製　陳皮去白　半夏麴炒
前胡　肉桂去粗皮　甘草炙各一錢
右作一服用水二鍾生薑五片紫蘇五葉同煎至
一鍾去查食後服一方無肉桂

平肺湯
治肺氣上壅喘嗽痰實寒熱往來咽乾口燥
陳皮一錢半　半夏湯泡七次　苦梗炒　薄荷
紫蘇　烏梅去核　紫菀　杏仁炒　五味子
桑白皮蜜炒　鴈粟殼　甘草炙各一錢
右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

人參荊芥散
治肺感風邪上壅痰嗽頭目不清語言不出咽乾
項強鼻流清涕
人參　杏仁去皮尖　桔梗炒　細辛　陳皮

麻黃去根節各一錢　半夏湯泡洗一錢半
荊芥穗　通草　炙甘草各半錢
右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

杏仁煎

治老人久患喘嗽不已睡臥不得者服之立效
杏仁去皮尖　胡桃肉各等分
右共碾爲膏入煉蜜少許搜和得所丸如彈子大
每服一丸食後細嚼生薑湯送下

祛痰丸

治風痰喘嗽
人參　陳皮去白　青皮　茯苓　白朮土炒
木香　天麻各一兩　槐角子　半夏湯泡洗七次
各七錢半　猪牙皂角去皮弦酥炙五錢
右爲細末生薑汁煮麪糊爲丸如梧桐子大每服
五七十丸食後溫酒送下生薑湯亦可

紫蘇半夏湯

治喘嗽痰涎
紫蘇　半夏湯泡七次　紫菀茸　陳皮去白
五味子　杏仁去皮尖麩炒　桑白皮各二錢
右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾日三服

補肺湯

治肺虛氣乏久嗽
阿膠蛤粉炒　紫蘇子　桔梗　半夏湯泡七次
甘草炙各一錢　款冬花　砂仁　紫菀　細莘
杏仁炒去皮　五味子　草果　陳皮　桑皮炒
石菖蒲　青皮各半錢
右作一服用水二鍾生薑四片紫蘇五葉煎一鍾
食後服

人參飲

治欬嗽痰飲通用
人參　桔梗　半夏麴　五味子　細莘　枳殼
赤茯苓去皮　杏仁各一錢半　甘草炙半錢
右作一服用水二鍾生薑三片烏梅十箇煎至一
鍾食後服一方無杏仁不用烏梅煎服痰嗽加紫
菀添甘草

人參潤肺散

治欬嗽氣急痰壅鼻塞
人參二錢　麻黃去皮節　杏仁去皮尖炒
貝母去心各一錢半　橘紅五分　阿膠蛤粉炒
桔梗去蘆　甘草炙各一錢
右作一服用水二鍾紫蘇三五葉煎至一鍾食遠
服

人參款花散

治欬嗽久不已者
人參去蘆　款冬花　粟殼炒各二錢　知母
貝母　半夏各一錢半
右作一服用水二鍾烏梅一箇煎至一鍾臨臥服

星香丸

治諸氣嗽生痰
南星　半夏二味以白礬一兩研水浸一宿
香附皂角水浸一周時　陳皮泔浸去白各三兩
右四味俱不見火爲細末用生薑汁煮麪糊和丸
如梧子大每服五十丸食後用淡生薑湯送下

加減瀉白散

治陰氣在下陽氣在上欬嗽嘔吐痰喘
桑白皮　地骨皮各二錢　陳皮去白　人參
甘草生各一錢　白茯苓　青皮各一錢半
五味子半錢
右作一服加粳米一百粒水二鍾煎一鍾臨睡服

人參寧肺湯

治日久欬嗽不止者
人參　陳皮各二錢　粟殼　烏梅肉各一錢半
桑皮　甘草各一錢
右作一服用水二鍾煎至一鍾入蜜一匙臨睡服

紫蘇飲子

治脾肺虛寒痰涎欬嗽
紫蘇葉　五味子　青皮去白　杏仁　桑白皮
麻黃　陳皮　半夏　人參　甘草各一錢二分
右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

人參潤肺湯

治肺氣不足喘急欬嗽不已兼治傷寒壯熱頭疼
身痛
乾薑七分半　人參　桔梗　白芷　麻黃去節
乾葛　白朮各一錢半　甘草一錢
右作一服用水二鍾生薑三片葱白三根煎至一
鍾不拘時通口服

華蓋散

治肺氣喘滿痰嗽眠臥不安
苦葶藶焙　蛤粉各一錢　桑皮　山梔　人參
赤茯苓　杏仁去皮尖炒　荊芥　薄荷　陳皮
桔梗炒　甘草炙各一錢二分

右作二貼每貼用水一鍾生薑三片煎七分不拘時服

款花散

治寒熱交壅肺氣不利欬嗽喘滿痰實涎盛喉中呀呷宜服之

款冬花　桑根白皮　半夏　知母各七錢半　貝母去心炒　阿膠蛤粉炒　麻黃各三錢　杏仁炒去皮尖　甘草炙各二錢

右作二貼每貼用水二鍾生薑三片煎七分不拘時服

杏仁煎

治嗽失音不出

杏仁去皮尖三兩研　生薑汁　糖各一兩半　桑皮　貝母去心　木通各一兩一分　紫菀　五味各一兩

右剉碎用水三升煮至半升去滓入前杏仁等四味再煮成膏每服一匕含化一方加款冬花知母各一兩

治嗽方

半夏　杏仁　蛤粉　白礬　南星　白薑　薄荷　藿香各一錢半

右剉碎作一服用水二鍾生薑三片棗一枚同煎至七分食後服

含化止嗽丸

治肺氣不和欬嗽常服潤養心肺及治大人小兒一切欬嗽服之皆效

款冬花炒　杏仁去皮尖炒　貝母去心各一兩　白薑　炙甘草各一兩半

右爲細末煉蜜和丸每兩分作十五丸每服一丸或二丸不拘時噙化

訶黎勒散

治欬嗽

訶黎勒緊實者炮熟去核

爲末每用二錢猪腰一枚去脂膏劈開摻藥在內入打破烏梅一枚合定以芭蕉葉包之外用綿紙重裹煨令香熟去紙并蕉葉烏梅止將藥並猪腰慢慢嚼哭日三兩服

平胃湯

治痰嗽

猿猪精肉三兩起皮薄切作三片以皂角三寸將水浸後擦去水用腻粉二錢摻在肉內以濕紙裹煨至五更時爛嚼以淡生薑湯或桑白皮煎湯送下午時瀉下痰涎是病根也

法製半夏

治欬嗽

半夏二斤河水洗七遍　白礬一斤　草豆蔻升麻　縮砂仁　丁香皮　甘草各四兩　酒一瓶

生薑十五片

右除半夏洗去滑將別藥焙乾粗剉以大口瓶盛生薑片并諸藥及半夏以酒浸春夏三七日秋冬一月取出只將半夏用水洗焙乾其餘藥不用每服嚼二三枚不拘時

欬嗽方

白薑　炙甘草各一兩半

右爲細末煉蜜和丸每兩分作十五丸每服一丸或二丸不拘時噙化

訶黎勒散

治欬嗽

訶黎勒緊實者炮熟去核

爲末每用二錢猪腰一枚去脂膏劈開摻藥在內入打破烏梅一枚合定以芭蕉葉包之外用綿紙重裹煨令香熟去紙并蕉葉烏梅止將藥並猪腰慢慢嚼哭日三兩服

平胃湯

治痰嗽

猿猪精肉三兩起皮薄切作三片以皂角三寸將水浸後擦去水用腻粉二錢摻在肉內以濕紙裹煨至五更時爛嚼以淡生薑湯或桑白皮煎湯送下午時瀉下痰涎是病根也

法製半夏

治欬嗽

半夏二斤河水洗七遍　白礬一斤　草豆蔻升麻　縮砂仁　丁香皮　甘草各四兩　酒一瓶

生薑十五片

右除半夏洗去滑將別藥焙乾粗剉以大口瓶盛生薑片并諸藥及半夏以酒浸春夏三七日秋冬一月取出只將半夏用水洗焙乾其餘藥不用每服嚼二三枚不拘時

欬嗽方

歌曰一兩清油二兩蜜半夏生薑白礬汁紫菀麻黃及杏仁桔梗細辛再添入阿膠桔梗等二錢慢火煎熬如黑漆臨睡每服三兩匙明朝欬嗽無蹤跡

青州白丸子

治欬嗽

大半夏湯泡七次　白附子洗淨略炒　天麻　川烏略炮去皮尖　南星洗略炮　全蠍各等分

右爲細末用生薑自然汁煮麵糊和丸如梧桐子大每服十丸至二十丸食後用茶清或熟水送下如癱瘓風用溫酒下日進三服常服永無風痰腦痛之疾小兒驚風服二丸用薄荷湯化下

人參款花膏

歌曰多年欬嗽變爲瘧去節麻黃桔梗加粉草杏仁蘇子炒知母貝母款冬花人參烏梅各等分搗羅爲末莫教差煉蜜和丸如彈大含化一粒去根芽

鳳髓湯

治欬嗽能潤肺

松子仁一兩研　胡桃肉去皮二兩研　煉蜜四兩

右研和勻每服一錢食後用沸湯點服

滴油散

治痰嗽面浮

眞蛤粉新瓦炒令通赤地上出火毒　青黛少許

同淡薑水滴麻油數點服卽愈

黑金散

治久欬嗽喘息

猪蹄黑合子四十九枚水洗淨　南星大者一枚

款冬花帶藥者半兩研

右用瓶子一枚鋪猪蹄合子在內上以天南星勻蓋之合了鹽泥赤石脂固濟火煅白烟出爲度候冷取出入款冬花末并麝香一分龍腦少許同研每服一錢食後煎桑根白皮湯調下若年少即用生犀中年即用羚羊角末半兩代猪蹄合了

寧嗽膏

治久欬嗽上氣心胷煩熱唾膿血

鹿角膠搗碎炒　杏仁湯泡去皮尖雙仁炒微黃

蘇子微炒各三兩　生地黃汁　生薑汁各一兩

白蜜一中盞

右前三味都搗令熟入生薑汁地黃汁蜜相和以慢火熬成膏於不津器中密封之每服半匙許用溫粥飲調下一日三四服

天門冬丸

治肺寒外內合邪欬嗽語聲不出口中如含霜雪停飲寒痰咽喉妨悶狀如梅核噎塞不通膈氣噎氣皆可服之大效

天門冬去心焙　杏仁湯浸去皮尖雙仁炒

紫菀去土　百合　麥門冬去心焙　人參

貝母去心焙　半夏湯煑軟切片焙　桔梗炒

桂心去粗皮　阿膠炒至燥　橘皮湯浸去白

生乾地黃　炙甘草各三兩

右爲細末煑糯米粉汁黃蠟一兩成粥更入蜜再熬勻和前藥末丸如櫻桃大每服一丸同生薑細嚼下嗽時服欬嗽膿血者服之大效

羊肺湯

治欬晝夜無間息氣欲絕肺傷唾血

牡蠣煅　桂心　生薑各六兩　半夏　鍾乳粉

白石英各五兩　五味　百部根　貝母　橘皮

桃仁去皮尖　射干各三兩　厚朴　款冬花

甘草炙各二兩　羊肺一具切碎

右先以羊肺用水二斗三升煑至一斗去肺內諸藥再煑取三升分作四服日三夜一忌海藻菘菜

羊肉餳生葱

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百六十六卷目錄
醫部彙考二百四十六
欬嗽門五
方二
杏仁膏　蘇沃散
天門冬丸　苦蘆湯
秘方　安眠散
秘方　杏仁湯
秘方　安眠散
秘方　越婢加半夏湯
小青龍加石膏湯　三奇散
苦蘆湯　白白酒
瓊玉膏　調脾除嗽飲
九仙散　止嗽散
三才丸　清化丸
三分半飲
咽喉秘方　又方
又方　人參固本丸
又方　橘皮半夏湯
又方　人參固本丸
又方　橘皮半夏湯
又方　人參固本丸
又方　橘皮半夏湯

治上喘欬嗽久而不愈者

荻冬花　麥門冬　烏梅肉　佛耳草各二錢半

橘紅半兩　粟殼七錢半蜜炙　炙甘草三錢半

右爲細末每服三錢水一盞入黃蠟如棗核許同煎至八分去滓臨睡溫服

祕方烟筒兒

治遠年近日一切欬嗽婦人胎前產後嗽皆效

雄黃半兩　人參　艾葉各三錢　荻冬花

佛耳草各二錢半

右爲細末以厚蠟紙闊四寸長八寸捲一筒裝藥在內燒烟熏喉

荻花散

治年深日久欬嗽肺虛寒熱

荻冬花不以多少

右於密室中如香焚之烟起以筆管引入烟則嚥之或於坐臥處如香焚之不吸亦妙病重數日見功輕者便減一方咽乾口燥用茶清送下又歌曰連年欬嗽人難治休要胡醫枉使錢細搗荻冬花作末燒烟口吸奔喉咽

三奇散

治一切嗽不問新舊喘頓不止日夜無度

荻冬花二百文　佛耳草五十文　熟地黃二兩

右焙乾碾爲末每用二大錢裝猛火於香爐中燒之用紙作筒子一頭大一頭小如粽子樣安在爐上以口吸烟盡爲度即以清茶嚥下有涎吐之經驗方陳氏云予家一僕久苦此疾醫治如水澆石偶在曲江置得沅州一婢新製此藥兩服而愈

越婢加半夏湯 仲景下同

治欬而上氣其人喘目如脫狀脈浮大者此爲肺脹

麻黃六兩　石膏半斤　半夏半升　生薑三兩

大棗十五枚　甘草二兩

右六味以水六升先煑麻黃去沫內諸藥煑取三升分溫三服

小青龍加石膏湯

治肺脹欬而上氣煩躁而喘脈浮者心下有水

石膏二兩　麻黃　芍藥　桂枝　細莘　甘草

乾薑各三兩　五味子　半夏各半升

右九味以水一斗先煑麻黃去上沫內諸藥煑取三升強人服一升羸者減之日三服小兒服四合

苦蔞薤白白酒湯

治胷痹喘息欬唾

苦蔞實一枚搗　薤白半斤　白酒七升

右三味同煑取二升分溫再服

九仙散 良方下同

治痰嗽

九尖蓖麻子葉三錢　飛過白礬二錢

右用猪肉四兩薄批碁盤割開摻藥二味荷葉裹文武火煨熟細嚼白湯送下後用乾食壓之

止嗽散

治前證

半夏一兩半湯洗七次　枯白礬四兩

右二味爲末生薑打麪糊和丸桐子大每服三二十丸空心溫酒送下

三才丸

治嗽

人參　天門冬去心　熟乾地黃各等分

右爲細末煉蜜爲丸如櫻桃大含化服之

三分茶

治欬喘

茶二錢熟水泡　蜜二兩　蕎麥麪炒四兩

右以新汲水一大椀合前三味約打千餘數連飲之飲畢良久下氣不可停久喘自止

瓊玉膏 醫學正傳下同

治虛勞乾欬嗽

人參十二兩　茯苓十五兩　白蜜五斤熬去沫

生地黃十斤洗淨石器內杵爛取自然汁忌鐵器

沉香　琥珀各五錢

右以人參茯苓沉香琥珀俱爲細末先將地黃汁與白蜜攪勻絹濾去細查入藥末攪勻或好磁瓶或銀瓶內用棉紙十數層外加箭箬包封紮瓶口入砂鍋內或銅鍋內以長流水浸沒瓶頸用桑柴文武火煑三晝夜取出換蠟紙數重包紮瓶口浸沒井中半日以出火毒提起仍入前鍋內煑半日以出水氣然後收藏每日清晨及午前後取一二匙用溫酒一盞調服不飲酒人白湯亦可此法須用不聞雞犬聲處煅煉之及不許孝子婦人見之

潤肺除嗽飲

治遠年欬嗽如神

人參　杏仁　生甘草　薄荷各三分　荻冬花

枳殼麩炒　麻黃　橘紅　石膏　桔梗　半夏

桑皮蜜炒　紫菀茸　烏梅　粟殼蜜炙各五分
五味子九粒
右細切加生薑三片細茶一撮水一盞半煎至一盞服

清化丸

治肺鬱痰喘嗽睡不安寧
貝母　杏仁　青黛
右爲末沙糖入薑汁泡蒸餅和如彈大噙化

又方

治久嗽風入肺
鵝管石　雄黃　鬱金　款冬花
右爲末和艾中以生薑一片安舌上炙之以烟入喉中爲度

欬嗽刼藥

五味子五錢　甘草生二錢五分　五倍子
風化硝各四錢
右爲末蜜丸噙化

又方

治風熱痰嗽
南星　海粉各二兩　半夏一兩　青黛　黃連
苦蔞仁研　石鹼　蘿蔔子炒各半兩　皂角灰
防風各三錢
右爲細末神麴糊丸服

又方

治勞嗽吐紅
人參　白朮　茯苓　百合　紅花　細莘
五味　官桂　阿膠　黃芪　半夏　杏仁
甘草　白芍　天門冬
右剉水煎若熱去桂芪用桑白皮麻黃不去節杏仁不去皮同煎

橘皮半夏湯 仁齋

治寒嗽冷則發
橘皮　半夏製各三錢
右水盞半薑十片棗一枚煎八分熱服

痰嗽方

黃芩　蒙石煆各半兩　半夏二兩　白朮一兩
茯苓　陳皮各七錢半　風化硝二錢半
右爲末粥丸

又方

治欬嗽氣實無虛熱者可服汗多者亦用之
粟殼四兩蜜炒　人參　款冬花　桔梗各半兩
兜鈴　南星薑製　烏梅肉各一兩
右爲末蜜丸彈子大含化

人參清肺散

治痰嗽咽乾聲不出
人參　陳皮　貝母各一錢半　半夏　桔梗
茯苓　甘草　桑白皮　知母　地骨皮　枳殼
杏仁　黃連各一錢　麥冬半錢　五味子十箇
款冬花七分
右水煎生薑三片

烟筒方

治一切犯寒欬嗽遇冬便作
冬花蕊　鵝管石　雄黃　艾葉各等分
右爲末紙捲筒內用火點烟入口吞一分即吞水一口塞烟氣效

焚香透膈散 丹溪下同

治一切勞嗽久嗽
鵝管石　雄黃各一分半二味另爲末　款冬花
佛耳草各一分半二味另爲末
右用紙一張方四五寸以雞子清塗中央四旁各懸一寸許不塗然後入鵝管石雄黃末摻於雞子清上又以款冬佛耳草末摻其上覆之又用箭筋從不塗紙旁捲起爲一紙筒用糊黏牢抽出箭筋焙乾用時將紙筒含在口中一頭點火以口吸烟令滿嚥之嚥至烟盡爲度呷茶一二口壓之

萬山觀蘆吸散

治男婦一切風寒欬嗽喘急
款冬花去梗三錢　鵝管石　佛耳草各二錢
枯礬五分　甘草炙錢半　官桂一錢
右爲細末每服一錢竹筒吸入喉內日夜三服即嗽止

海藻湯 千金方下同

治欬而下利胷中痞而短氣心中時悸四肢不欲動手足煩不欲食肩背痛時惡寒
海藻四兩　五味子　半夏各半升　生薑一兩
細莘二兩　茯苓六兩　杏仁五十枚
右七味㕮咀以水一斗煑取三升去滓分三服日三一方無五味子生薑

白前湯

治水欬逆上氣身體浮腫短氣脹滿晝夜倚壁不得臥咽中作水雞鳴

白前　紫菀　半夏　大戟各二兩

右四味㕮咀以水一斗浸一宿明旦煑取三升分三服

百病方

治九種氣嗽欲死

乾薑　半夏　細莘　紫菀　吳茱萸　茯苓

蕘花一作芫花　甘草　甘遂　防葵　人參　烏頭

大黃　杏仁各五分　葶藶二分　巴豆去油　厚朴

白薇各三分　五味子　遠志　前胡　菖蒲

枳實　蜀椒　皂莢　當歸　大戟　桂心各半分

右二十八味爲末蜜丸如梧子大先食服二丸日二服以知爲度不知增之

百部根湯

治嗽不得臥兩眼突出

百部根　生薑各一斤　細莘　甘草各一兩

貝母　五味子　白朮各二兩　桂心四兩

麻黃六兩

右九味㕮咀以水一斗二升煑取三升去滓分三服

蜀椒圓

治上氣欬嗽甚良

蜀椒五分　烏頭　杏仁　菖蒲　礬石一作礬石

猪牙皂莢各一分　細莘　荻冬花　紫菀茸

乾薑各三分　吳茱萸　麻黃各四分

右十二味爲末蜜丸如梧子大暮臥吞二丸治二十年久欬不過二十丸

通氣圓

治久上氣欬嗽咽中腥臭氣攪心痛眼痛耳中嘈嘈邪毒疰時氣食不生肌胷中膈塞嘔逆多唾惡心心下堅滿飲多食少惡疰淋痛

飴糖三升　蜀椒二升　杏仁一升　蜈蚣五節

大附子五枚　乾薑　人參各四錢　桂心六分

烏頭七分　天門冬一錢

右十味爲末別治杏仁如脂稍稍內藥末千杵烊糖乃內藥末中令調和合如羊棗一枚日六七夜三四服以胷中溫爲度若夢與鬼交通及飲食者用全蜈蚣食不消加杏仁五合小腹急腰痛加天門冬杜仲有風加烏頭三枚附子一枚立夏後勿加也有留飲加葶藶三兩

欬嗽上氣方

蜀椒　桂心　海蛤各四兩　昆布　海藻

乾薑　細莘各六分　麥門冬一錢

右八味爲末蜜丸如梧子大飲服十丸加至二十丸日三服有人風虛中冷胷中滿上氣喉中如吹管聲吸吸氣上欲欬服此丸得瘥

又方

治欬嗽胷脅支滿多唾上氣

乾薑五分　礬石　烏頭　菖蒲各一分　細莘

黃環各二分　荻冬花　紫菀　杏仁各三分

吳茱萸四分　蜀椒五合

右十一味爲末蜜丸梧子大每服一丸著牙上嚥汁日五六服劇者常含不止一方無礬石烏頭有礬石

射干煎

治欬嗽上氣

生射干　荻冬花各三兩　紫菀　細莘　附子

桑皮　甘草各二分　飴糖五兩　白蜜　竹瀝

生薑汁各一升

右十一味以射干先內白蜜并竹瀝中煎五六沸去之㕮咀六物以水一分合浸一宿煎七上七下去滓乃合飴薑汁煎如餔服如酸棗一丸日三劇者夜二不止加之以止爲度一方無生薑汁有乾薑五兩

杏仁煎

治冷嗽上氣鼻中不利

杏仁五合　五味子　荻冬花各三合　紫菀

乾薑各二兩　桂心三兩　甘草四兩　麻黃一斤

右八味以水一斗煑取麻黃四升治諸藥爲末又內膠飴半斤白蜜一斤合內汁中攪令相得煎如飴先食服如半棗許日三服不知加之以知爲度

又方

治忽暴欬失聲語不出

杏仁另研　薑汁　砂糖　蜜各一升　五味子

紫菀各三兩　通草　貝母各四兩　桑白皮五兩

右五味㕮咀以水九升煑取三升去滓內杏仁脂薑汁蜜糖和攪微火煎取四升初服三合日再夜一後稍加

杏仁飲子

治暴熱欬

杏仁四十枚　蘇子一升　橘皮一兩　柴胡四兩

右四味以水一升煑取三升分三服常作飲服

芫花煎
治新久欬
芫花　乾薑各二兩　白蜜二升
右二味爲末內蜜中令相和微火煎令如糜每服如棗核大一枚日三夜一以知爲度欲利者多服深師以治冷飲嗽又治三十年久嗽者以水五升煮芫花取三升去滓內薑加蜜合煎如糜服之
款冬煎
治前證
款冬花　乾薑末　紫菀各三兩　五味子二兩
芫花一兩熬令赤
右五味㕮咀先以水一斗煮三味取三升半去滓內芫花乾薑末加蜜三升合投湯中令調於銅器中微火煎令如糖每服半棗許日三
又方
治三十年欬嗽或飲或欬寒氣嗽雖不同悉主之
細辛　款冬花　防風　紫菀茸各三兩　藜蘆
蜀椒各二兩
右六味㕮咀取藜蘆先著銅器中次紫菀次細辛次款冬花次椒以大棗百枚間著諸藥以水一斗二升微火煮令汁盡出棗曝令燥雞鳴時服半棗不知明旦服一枚以胃中溫溫爲度若强人欲嗽吐者可小增服之後吐膿糞裹結吐後勿冷飲食欬愈止藥藥勢靜乃食不爾令人吐不已
又方
治積年欬嗽喉中呀聲一發不得坐臥
紫菀茸　貝母　半夏　桑根白皮　五味子
射干　百部各五分　款冬花　皂莢　乾薑
陳皮去白　鬼督郵　細辛各四分　白石英
杏仁各八分　蜈蚣二枚
右十六味爲末蜜和丸如梧子大飲服十丸日再稍加至二十丸崔氏無半夏射干乾薑陳皮鬼督郵細辛白石英用麻黃二兩芫根白皮一兩半以煮棗湯送下
款冬圓
治三十年上氣欬嗽唾膿血喘息不得臥
款冬花　乾薑　蜀椒　吳茱萸　桂心　菖蒲各五分　人參　茯苓　細辛　薤花　紫菀
甘草　桔梗　防風　芫花　皂莢各三分
右十六味爲末如梧子大酒服三丸日三服
又方
治前證
獨活二兩　冬花　紫菀　細辛　石斛　防風
芎藭　人參　當歸　藁本　甘草　蜀椒
白朮　半夏　天雄　菖蒲　鍾乳粉　桂心
麻黃各三兩　烏頭　芫花　附子各一兩
桃仁二十枚　大棗二十五枚
右二十四味爲末蜜丸如梧子大酒服二十丸日二服不止加之酒漬服亦得
又方
治前證
款冬花　乾薑　桂心　紫菀各三分　杏仁
皂莢　礬石　菖蒲　烏頭各一分　細辛二分
蜀椒五合　吳茱萸六合
右十二味爲末蜜丸如梧子大酒服五丸日三夜一二十年嗽不過五十日愈患欬嗽喉鳴上氣服一劑末瘥一方無礬石有礬石
又方
治肺傷欬嗽膿血腸澼背氣不能食惡風目暗眩眩足脛寒冷
大麥三升　白膠　生薑各五兩　桂心　人參
紫菀各二兩　大棗三十枚　乾地黃切半升
桑白皮切二升　芎藭　大麻仁　飴糖各一升
右十二味㕮咀以水一斗五升煮大麥取一斗去麥下藥煮取三升分五服
竹皮湯
治欬逆下血不息
生竹皮二兩　紫菀二兩　生地切　飴糖各一升
右四味㕮咀以水六斗煮取二升去滓分三服
百部圓
治諸嗽不得氣息唾膿血
百部根三兩　升麻半兩　桂心　五味子
甘草　紫菀　乾薑各一兩
右七味爲末蜜和丸如梧子大每服三丸日三以止爲度
又方
治上氣欬嗽喘息喉中有物唾血
生薑汁　杏仁各二升　餳糖　白蜜各一升
猪膏二合
右五味先以猪膏煎杏仁色黃出之以紙拭令乾搗如膏合薑汁糖蜜等合煎令可丸每服如杏核

一枚日夜六七服漸漸增加

鍾乳七星散

一名吸散治寒冷欬嗽上氣胷滿唾膿血

鍾乳粉　礬石　款冬花　桂心各等分

右四味治下篩作如大豆七聚七星形以小筒吸取酒送下先食服日三不知加之數試大驗又云臨臥井吸服之

又方

治前證

鍾乳粉　細辛　款冬花　天雄　紫菀茸

石膏各等分

右六味治下篩取如大豆七聚如前法吸之日二只得食粥七日嗽愈乃止若大豆聚不知少益之勿太多

七星散

治三十年欬嗽

款冬花　紫菀茸　桑根白皮　代赭石　細辛

伏龍肝各一兩

右六味治下篩作七星聚聚如扁豆者以竹筒口當藥上一一吸咽之令藥入腹中先食日三服至四日復作七星聚以一臠肉炙令熟以展轉藥聚上令藥悉徧肉上仰臥咀嚼之細細嚥汁令藥力盡總咽却取瘥止未瘥復作如初羊牛鹿肉皆可用猪肉不可用

團參飲子　清生方　下同

治病因抑鬱憂思喜怒饑飽失宜致臟氣不平欬嗽膿血漸成肺癰胷膈壅塞壯熱羸瘦困頓將成勞瘵

人參　紫菀茸洗　阿膠蛤粉炒　百合蒸

細辛洗去葉土　款冬花　天門冬湯浸去心

杏仁去皮尖炒　半夏湯泡七次　經霜桑葉

五味子各一兩　甘草炙五錢

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五大片煎至七分去滓食後溫服

因氣而欬者宜加木香

欬而唾血有熱者加生地黃

欬而唾血有寒者加鍾乳粉

因疲極而欬嗽者加黃芪

因損欬而唾血者加沒藥藕節

欬而嘔逆腹滿不食加白朮仍倍加生薑

欬而小便多者加益智仁

欬而大便溏者去杏仁加鍾乳粉

欬而面浮氣逆者加沉香柑皮煎

半夏圓

治肺臟蘊熱痰嗽胷膈塞滿

苦葉子去殼別研　半夏湯泡七次焙末各一兩

右件和勻生薑自然汁打麪糊爲丸如梧桐子大每服五十丸食後用薑湯送下

訶子飲

治久嗽語聲不出

訶子去核　杏子泡去皮尖各一兩　通草二錢半

右㕮咀每服四錢水一盞半煨生薑切五片煎至八分去滓溫服食後

百花膏

治喘嗽不已或痰中有血

款冬花　百合蒸焙

右等分爲細末煉蜜爲丸如龍眼大每服一丸食後臨臥細嚼薑湯嚥下喰化尤佳

椒紅丸　中藏經　下同

治嗽不止及補中益氣進食

小蜀椒揀去目淨炒過出汗二兩　乾山藥

附子炮去皮臍各一兩

右同爲細末以好酒煮湯木瓜和之再入臼中杵三五百下丸如桐子大每服十五丸加至二十丸空心食前鹽湯溫酒任下泄瀉米飲下如喉中痰涎如水雞聲曉夕不止一兩服見效

澤漆湯　金匱要略

治肺欬上氣脈沉者

澤漆三升以東流水五斗煮取一斗五升　紫參

白前　生薑各五分　半夏半升　甘草　黃芩

人參　桂心各三兩

右九味㕮咀內澤漆汁中煮取五升溫服五合至夜盡

痰嗽方

白果二十一箇炒黃　麻黃去節三錢　款冬花

蘇子　製半夏　桑白皮蜜炙各二錢　黃芩炒

杏仁去皮尖各一錢半　甘草一錢

右水三鍾煎二鍾隨時分作二服不用薑

團魚丸　良方

治骨蒸欬嗽潮熱

團魚一箇　柴胡　前胡　貝母去心　知母

杏仁去皮尖各五錢

右共養待魚熟去骨甲裙再煮食肉飲汁將藥焙研爲末仍以骨甲裙煮汁和丸梧子大每空心黃芪湯下三十丸日二服服盡仍治參芪藥調之

橘皮半夏湯 方同下同

治痰壅涎嗽久不已者常服養液潤燥解肌熱止欬嗽

陳皮去白五錢　半夏湯洗七次二錢半

右爲末分作二服每服水一鍾半生薑十片同煎至七分去滓稍熱服

防己丸

治肺不足喘嗽久不已者調順氣血消化痰涎

防己　木香各二錢　杏仁三錢

右爲末煉蜜爲丸如小豆大每服二十丸煎桑白皮湯下如大便閉加葶藶一兩食後服

寧神散

治一切欬嗽不已世傳極驗

御米殼一斤酥炒　烏梅四兩

右爲末每服三錢沸湯點常服食後日三服

仙人肢丸

治遠年勞嗽不問寒熱痰涎喘滿先服松花膏下過多服此藥無不效

蛤蚧一對頭尾全用河水淨洗文武火酥炙黃色

人參　沙參　元參　紫團參　丹參　白朮

牡蠣　知母　甘草各二兩

右爲末用麻黃十五斤去根枸杞子三斤熬成膏丸如彈子大磁盒子盛臨臥煎生薑自然汁化下一丸小兒量數加減

石膏散

治熱嗽喘甚者

石膏一兩　甘草炙半兩

右爲末每服三錢新汲水下或生薑汁蜜調下

大百勞散

治一切勞嗽肌劣喘息不臥痰涎不食

蛤蚧一對蜜炙　鱉甲一箇去裙酥炙　甘草炙

人參　柴胡　乾薑　白茯苓　白朮　茴香

青皮　杏仁去皮尖　知母　貝母　陳皮去白

官桂　附子　半夏薑製　蒼朮湯浸各一兩

蘇木　龍腦草各五錢

右爲末每服二錢水一盞用生薑三片棗二枚烏梅二枚同煎空心稍熱服有汗加小麥二十粒不用鐵器

小百勞散

治勞喘嗽不已自汗者

御米殼不拘多少炒

右爲末每服二錢入烏梅同煎水一盞溫服食後有汗加小麥三十粒同煎溫服

蘆筒散

治男子婦人一切欬嗽喘急

款冬花　井泉石　鵝管石　鍾乳石　官桂

甘草　白礬　佛耳草各等分

右爲末每服一錢竹筒子吸喫日三服立效

黑粟神聖散

治男子婦人久新日夜欬嗽不止者

御米殼一兩蜜炒　烏梅肉　人參　訶子肉

葶藶　桑白皮各五錢

右爲細末每服二三錢百沸湯臨臥調下

水煮金花丸

治風痰熱欬嗽其脈弦面青四肢滿悶便溺澁心多驚怒

南星　半夏生用　寒水石燒存性各一兩

天麻五錢　雄黃二錢　白礬三兩

右爲細末滴水爲丸每服五七十丸至百丸煎漿水沸下藥煮令沸浮爲度漉出淡漿水浸另用生薑湯下或遍聖加半夏及局方中川芎丸防風丸皆可用也

小黃丸

治熱痰欬嗽脈洪面赤煩熱心痛唇口乾燥多笑

南星　半夏俱湯洗各一兩　黃芩一兩半

右爲細末生薑汁浸蒸餅爲丸如桐子大每服五十丸至七十丸食後薑湯下及小柴胡湯中加半夏亦可

白朮丸

治痰溫欬嗽脈緩面黃肢體沉重嗜臥津液不收腹脹而食不消化宜之

南星　半夏俱湯洗各一兩　白朮一兩半

右爲細末糊爲丸桐子大每服五七十丸生薑湯下及局方中防己丸亦可

玉粉丸

治氣痰欬嗽脈澀面白上喘氣促洒淅惡寒憂愁不樂宜服之

南星　陳橘皮　半夏俱洗各一兩

右爲細末薄糊爲丸如桐子大每服五七十丸生薑湯下食後及局中防己丸亦可玉粉丸加減在後

心下痞加枳實五錢

身熱甚加黃連五錢

體重加茯苓一兩

氣上逆加苦葶藶五錢

氣促加人參桔梗各五錢

浮腫加槲李仁杏仁各五錢

大便祕加大黃五錢

寒痰去橘皮加官桂

防風丸

治痰嗽胃中氣不清者枳朮丸亦妙

防風　枳殼去瓤麩炒各五錢　白朮一兩

右爲細末蒸餅爲丸每服五七十丸生薑湯下

五味黃芪散 [illegible]

治欬嗽咯血成勞眼睛疼痛四肢困倦脚膝無力

麥門冬　熟地黃各一錢　桔梗　黃芪各錢半

五味子　人參　芍藥　甘草各五分

右作一服水一盞煎八分食後溫服

三聖丹 [illegible]

治久嗽極效

天南星煨裂一兩　大半夏湯泡七次二兩

甘草生五錢

先以星夏二味研爲細末用生薑自然汁拌勻盦作麪春秋七日冬十日夏五日取出再同甘草共研爲細末別取淡竹瀝一椀將前藥末用竹瀝拌捏作餅子焙乾又將竹瀝沃濕又焙乾如此沃焙十數次待竹瀝盡爲度研爲細末用白沙蜜每臨臥抄一匙於口內噙化下再用竹瀝漱口嚥之

桑白皮散 [illegible]

治上焦熱壅血腥煩嗽連聲併氣不得透

桑白皮炒　桔梗　川芎　防風　薄荷　黃芩

前胡　柴胡　紫蘇葉　赤茯苓　枳殼麩炒

甘草各等分

右咀每服七錢薑三片棗一枚煎七分食遠

加味枳半夏湯

治上焦有熱欬嗽黃痰痞滿氣喘

枳殼　半夏　桔梗　茯苓　苦葶藶微炒

防己　薄荷　紫蘇　馬兜鈴　桑皮炒各一錢

甘草炙五分

右作二服水盞半薑三片煎八分食遠服

紫菀膏

治肺熱熱嗽久嗽身如炙將成勞

大黃半兩　枇杷葉去毛　木通　款冬花

紫菀　杏仁去皮尖炒　桑白皮炙各一兩

右爲細末煉蜜丸櫻桃大夜間噙化三五丸

平氣散 [illegible]

治一切欬嗽吐痰氣塞不利惡風不能食

人參　白朮　川芎　當歸　紫蘇葉　杏仁

木瓜　茯神各七分　五味子　肉桂各三分

烏藥　甘草　白芷各五分

右水二盞薑三片煎八分食後溫服

蘇子煎

治上氣欬嗽

蘇子　生薑汁　生地黃汁　白蜜　杏仁各一升

右將杏仁蘇子搗爛以二汁澆之絹絞取汁又搗又澆如此絞六七度則味盡去滓以蜜和合置銅器中於湯上煎之如飴每服二匙日三次夜一二次病愈即止

三奇湯 [illegible]

治欬嗽上氣喘促胷膈不利

陳皮去白　桔梗　青皮　紫蘇　人參　半夏

杏仁　五味子　桑白皮炒各一錢　甘草五分

右水二盞薑三片煎一盞食後服

杏仁膏 [illegible]

治欬嗽喘急喉中枯燥如物塞兼唾血不止

杏仁去皮尖炒研　真酥各三兩　阿膠炒研

生薑汁各一合　白蜜五合　蘇子二兩微炒研

右和於銀鍋內慢火熬成膏每服一匙不拘時米飲調下

阿膠散

治肺燥欬嗽不已及唾血

阿膠炒　白芨各二錢　天門冬　北五味子

生地黃　人參　茯苓各一錢

右作二服除白芨爲細末餘剉每服水盞半入蜜二匙秫米百粒生薑五片同煎熟入白芨末調食後溫服

鳳髓湯

治欬嗽大能潤肺

牛髓一斤取骱骨中者　杏仁去皮尖研如泥

山藥炒　胡桃仁去皮另研各四兩　白蜜半斤
右將骨髓白蜜沙鍋內熬沸以絹濾去滓盛磁瓶內將杏仁等三味入瓶內以紙密封瓶口重湯煮一日夜取出冷定每早晨以白湯化一二匙服

補肺湯（拔萃方）
治勞嗽
桑白皮　熟地黃各錢半　人參　紫菀　黃芪　五味子各七分半
右水二盞煎八分入蜜少許食後服

黃芪鼈甲散（醫林下同）
治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱口燥咽乾日晡潮熱夜出盜汗欬嗽痰涎時帶腥血
黃芪蜜炙　鼈甲酥炙各錢半　柴胡　地骨皮　生地黃　知母各一錢　秦艽　白茯苓　半夏　桑白皮　人參　紫菀茸　黃芩　甘草　桔梗　赤芍藥　天門冬各五分　肉桂三分
右作二服每服水二盞薑三片煎八分食後服

蛤蚧散
治虛勞欬嗽咯血潮熱盜汗不思飲食
蛤蚧一對淨洗酥炙　人參　百部　款冬花　紫菀各半錢　貝母　黃芪　阿膠炒　柴胡　鼈甲酥炙　半夏湯洗　杏仁去皮尖　肉桂　甘草炙各一兩
右咀每服五錢水二盞薑三片煎八分食遠溫服

溫金散（良方下同）
黃芩　甘草　人參　防風各一錢　桑白皮　杏仁三七粒去皮尖　茯苓各半兩　麥冬二錢半　右將黃芩甘草防風桑皮杏仁用米泔水浸一宿曬乾次入人參茯苓麥門冬共爲末每服二錢水一盞蠟一豆大煎七分食後服

大阿膠丸
治肺虛客熱欬嗽咯血嘔血
阿膠炒　地黃　白茯苓　五味　山藥各一兩　貝母　百部　柏子仁　茯神　人參　防風　麥冬　遠志肉　丹參各半兩　杜仲薑汁炒一錢
右爲細末煉蜜丸彈子大每服一丸食後臥時嚼服白湯下

四物桔梗湯（家抄）
治乾欬嗽乃火鬱痰嗽在肺必用苦梗以開提之兼補降火
當歸身　川芎　白芍藥　熟地黃　桔梗　黃蘗炒各一錢
右水二盞煎八分加竹瀝半盞薑汁一匙和勻服

人參紫菀湯（臞方）
治欬嗽痰喘
烏梅三枚　人參　紫菀　陳皮　半夏　桔梗　杏仁炒各七分　罌粟殼蜜炙二錢　五味子　桑白皮　紫蘇　薄荷　知母　甘草炙各五分
右水二盞煎八分食後溫服

九仙散（丹溪）
治一切欬嗽不已
人參　款冬花　桔梗　桑白皮　五味子　阿膠　貝母　烏梅各五分　御米殼二錢蜜炙
右水盞半薑一片棗一枚煎七分食後服

三妙湯（集成）
治久嗽
罌粟殼蜜炙四箇　烏梅　北棗各三枚
右水二盞煎八分

薑湯煎（良方）
治諸般欬嗽不已
粟殼　烏梅肉　陳皮　人參　木香　五味子　桔梗　杏仁　石膏　甘草炙各等分
右每服八錢薑水二盞煎服

五味子丸（集成）
劫欬嗽如神
五味子五錢　生甘草二錢五分　五倍子　風化硝各一錢
右爲末煉蜜丸芡實大噙化

百藥煎（丹溪）
劫嗽立止
百藥煎　訶子　荊芥穗各等分
右爲末蜜丸噙化

洪製杏仁湯（洞簡）
治一切氣嗽
杏仁半斤去皮尖
右童便浸一日一換夏一日三換浸半月控洗焙乾研極細末每服一棗大薄荷湯點蜜食後調服數劑全愈

敗毒散（局方）
治痰嗽身熱鼻塞
柴胡　前胡　羌活　獨活　人參　茯苓

枳殼　川芎　桔梗各八分　甘草四分
右水二盞葱一根棗一枚煎八分不拘時服
桑皮散（醫林）
治上焦熱壅欬嗽血腥連聲併氣不得透
桑皮炒　前胡　柴胡　紫蘇　薄荷　枳殼
桔梗　赤茯苓　黃芩　甘草炙各等分
右咀每服七錢水二盞煎七分食遠溫服
瀉白散（活人方）
治肺壅實煩熱欬嗽喘悶大便不利
桔梗　甘草　桑白皮　陳皮　半夏　杏仁
苦葶藶子　地骨皮各等分
右咀每服八錢水二盞薑五片煎八分食後服
雙玉散（易老）
治痰熱欬嗽喘湧痰涎
寒水石　石膏各等分
右爲細末每服三錢人參煎湯調下食後臨臥服
大補元煎（景岳全書下同）
治男婦血氣大虛精神失守欬嗽危劇等證
人參少則二三錢多則一二兩　枸杞二三錢
熟地少則二三錢多則二三兩　炙甘草一二錢
當歸二三錢（泄瀉勿用）　山茱萸一錢（喪酸吞酸勿用）　杜仲
山藥炒各二錢
水二鍾煎七分溫服
左歸飲
此壯水之劑也凡命門之陰衰陽勝而欬嗽者宜
此方加減主之
熟地二三錢或加至一二兩　炙甘草一錢
山茱萸一二錢（喪酸者少用）　茯苓一錢半　山藥
枸杞各二錢
水二鍾煎七分食遠服
右歸飲
此益火之劑也凡命門之陽衰陰勝而欬嗽者宜
此方加減主之
熟地如前　山藥炒　杜仲薑製　枸杞各二錢
山茱萸肉一錢　甘草炙　肉桂各一二錢
製附子一二三錢
水二鍾煎七分食遠溫服
左歸丸
治眞陰腎水不足不能滋養榮衛漸至衰弱欬嗽
宜壯水之主以培左腎之元陰而精血自充矣宜
此方主之
熟地八兩　山藥炒　枸杞　山萸　菟絲子製
鹿膠炒珠各四兩　牛膝好酒洗蒸三兩（精滑者勿用）
龜板膠切碎炒珠四兩（無火者不用）
右將熟地蒸爛杵膏加煉蜜丸桐子大每食前用
滾湯或淡鹽湯下百餘丸如火鑠肺加百合三兩
右歸丸
治元氣不足或先天稟衰或勞傷過度以致命門
火衰不能生土而爲脾胃虛寒神疲氣怯或心跳
不寧或四肢不收或眼見邪祟或陽衰無子欬嗽
等證俱速宜益火之原以培右腎之元陽而神氣
自強矣此方主之
熟地八兩　製附子二兩漸加至五六兩　肉桂二
兩漸加至四兩　當歸（便溏勿用）　山萸肉炒各三兩
山藥炒　枸杞微炒　菟絲子製　鹿角膠炒珠
杜仲薑汁炒各四兩
右丸法如前或丸如彈子大每嚼服二三丸以滾
白湯送下其效尤速
五福飲
凡五臟氣虛虧損欬嗽者此皆能治之
人參　熟地各隨宜　當歸三錢　炙甘草一錢
白朮炒一錢半
水二鍾煎七分食遠溫服或加生薑三五片
一陰煎
此治水虧火勝之劑故曰一陰凡腎水眞陰虛損
而脈證多陽虛火發熱及陰虛火疲欬嗽等證皆
宜用此加減主之
生地　芍藥　麥冬　丹參各二錢　甘草一錢
熟地三五錢　牛膝一錢半
水二鍾煎七分食遠溫服
加減一陰煎
治證如前而火之甚者宜用此方
生地　芍藥　麥冬各二錢　熟地三五錢
炙甘草五七分　知母　地骨皮各一錢
水二鍾煎服
四陰煎
此保肺清金之劑故曰四陰治陰虛勞損相火熾
盛津液枯竭欬嗽吐衄多熱等證
生地二三錢　生甘草一錢　茯苓一錢半
麥冬　白芍藥　百合　沙參各二錢
水二鍾煎七分食遠服金水不能相滋而乾燥喘

嗽者加熟地三五錢

金水六君煎

治肺腎虛寒水泛爲痰或年邁陰虛血氣不足外受風寒欬嗽嘔惡多痰喘急等證神效

當歸　半夏　茯苓各二錢　熟地三五錢

陳皮一錢半

水二鍾生薑三五七片煎七八分食遠溫服

六安煎

治風寒欬嗽及非風初感痰滯氣逆等證

陳皮錢半　半夏二三錢　杏仁　甘草各一錢

白芥子五七分老翁不用　茯苓二錢

水一鍾半加生薑三五七片煎七分食遠服

凡外感風邪欬嗽而寒氣盛者多不易散宜加北細莘七八分或一錢

若風邪欬嗽不止而兼肺胃之火者加黃芩一二錢甚者再加知母石膏所用生薑止用一片

凡寒邪欬嗽痰不利者加當歸二三錢老年者尤宜若氣血不足者當以金水六君煎與此參用

貝母丸

消痰清熱潤肺止欬

貝母一兩

右爲末用沙糖或蜜和丸龍眼大或噙化或嚼服之

若欲刼止久嗽每貝母一兩宜加百藥煎蓬砂天竺黃各一錢佐之尤妙如無百藥煎即酢炒文蛤一錢亦可或粟殼亦可酌用

柴陳煎

治傷風兼寒欬嗽發熱痞滿多痰等證

柴胡二三錢　陳皮一錢半　甘草一錢　半夏

茯苓各二錢　生薑三五七片

水一鍾半煎七分食遠溫服

氣逆多嗽者加杏仁一錢

六味回陽飲

治陰陽將脫欬喘等證

人參一二兩或數錢　熟地黃五錢或一兩

炮乾薑各二三錢　當歸身三錢[illegible]

炙甘草一錢

水二鍾武火煎七分溫服

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百六十七卷目錄
醫部彙考二百四十七
欬嗽門六
單方
鍼灸
導引
醫案
藝術典第二百六十七卷
醫部彙考二百四十七
欬嗽門六
單方



卒暴欬嗽用白堝土粉白礬一兩爲末薑汁糊丸梧子大臨臥薑湯服二十丸（普濟方）

老嗽不止故茅屋上塵年久蓄煙火者和石黃欬冬花婦人月經衣帶爲末水和塗茅上待乾入竹筒中燒煙吸噙無不瘥也（藏器）

卒然欬嗽爐中鉛屑桂心皂莢等分爲末蜜丸如梧子大每米飲下十五丸忌葱（備急方）

三十年咳嗽熏黃木香莨菪子等分爲末羊脂塗青紙上以末鋪之作筒燒烟吸也（崔氏方）

欬嗽熏法熏黃一兩以蠟紙調捲作筒十枚燒烟吸噙取吐止一日一熏惟食白粥七日後以羊肉羹補之（千金方）

水腫上氣欬嗽腹脹熏黃一兩款冬花一分熟艾一分以蠟紙鋪艾酒二未於上荻管捲成筒燒煨吸噙三十日則瘥三日盡一劑百日斷鹽醋（外臺）

肺勞欬嗽雌黃一兩入瓦盒內不固濟坐地上以火焙之厚二寸以炭一斤簇定頂火鍛三分去一退火出毒爲末糖酥和丸粟米大每日空心杏仁湯下三丸（斗門方）

欬嗽涎喘不問年深日久用經霜枇杷葉經霜桑葉御米殼蜜炒各一兩爲末蜜丸彈子大每服一丸白湯化下日一服名無憂丸

風痰欬嗽大天南星一枚炮裂研末每服一錢水一盞薑三片煎五分溫服每早午晚各一服（博濟方）

肺熱痰嗽梨半夏苦葶藶仁各一兩爲末薑汁打糊丸梧子大每服二三十丸白湯下或以苦葶藶煮熟丸（濟生方）

老小暴嗽石灰一兩蛤粉四錢爲末蒸餅丸豌豆大焙乾每服三十丸溫薑汁下（普濟方）

欬嗽不止浮石末湯服或蜜丸服（肘後方）

化痰治嗽明礬二兩生參末一兩苦酒二升熬爲膏子以油紙包收旋丸豌豆大每用一丸放舌下其嗽立止痰卽消

又方明礬末酒糊丸梧子大每睡時茶下二三十丸

又方用明礬半生半燒山梔子炒黑等分爲末薑汁糊爲丸如上服

又方用白明礬建茶等分爲末糊服

肺虛久嗽人參末二兩鹿角膠炙研一兩每服三錢用薄荷豉湯一盞葱少許入銚子煎一二沸傾入盞內遇欬時溫呷三五口甚妙（食療本草）

止嗽化痰人參末一兩明礬二兩以釀酢二升熬膏成膏入參末煉蜜和收每以豌豆大一丸放舌下其嗽卽止痰自消（簡便方）

肺熱欬嗽沙參半兩水煎服之（易簡方）

痰嗽喘急桔梗一兩半爲末用童子小便半升煎四合去滓溫服（濟衆方）

久近痰嗽自胃脘下塞停飲至於臟腑用知母貝母各一兩爲末巴豆三十枚去油研勻每服一字用薑三片二面醋藥細嚼嚥下便睡次早必瀉一行其嗽立止壯人乃用之一方不用巴豆（醫學集成）

久嗽氣急知母去毛切五錢隔紙炒杏仁薑水泡去皮尖焙五錢以水一鍾半煎一鍾食遠溫服次以蘿蔔子杏仁等分爲末米糊丸服五十丸薑湯下以絕病根（雜興方）

三焦欬嗽腹滿不飲食氣不順仙靈脾覆盆子五味子炒各一兩爲末煉蜜丸梧子大每薑茶下二十丸（聖濟錄）

老小欬嗽延胡索一兩枯礬二錢半爲末每服二錢軟餳一塊和含之

化痰降氣止欬解鬱消食除脹有奇效用貝母去心一兩薑製厚朴半兩蜜丸梧子大每白湯下五十丸（筆峰方）

久嗽唾血白前桔梗桑白皮三兩炒甘草一兩炙水六升煮一升分三服忌猪肉菘菜（外臺）

久患咳嗽喉中作聲不得眠取白前焙搗爲末每溫酒服二錢（深師方）

欬嗽短氣紫蘇二錢人參一錢水一鍾煎服（香盒方）

上氣欬逆紫蘇子入水研濾汁同粳米煮粥食（簡便方）

痰哮欬嗽苧根煅存性爲末生豆腐蘸三五錢食即效如未痊以肥猪肉二三斤蘸食甚妙醫學正傳

肺傷欬嗽紫菀五錢水一盞煎七分溫服日三易簡方

久嗽不止紫菀款冬花各一兩百部半兩搗羅爲末每服三錢薑三片烏梅一箇煎湯調下日二甚佳圖經

久嗽不止每旦取款冬花如雞子許少蜜拌花使潤納一升鐵鐺中又用一瓦盆鑽一孔孔內安一小筆管以麪泥封勿令漏氣鐺下著炭火少時煙從筒出以口含吸嚥之如胷中少悶須舉頭即將指頭按住筒口勿使漏至煙盡乃止如是五日一爲之待至六日飽食羊肉傅飥一頓末瘥

又方病嗽多日然款冬花三兩於無風處以筆管吸其煙滿口即嚥之數日效

痰嗽帶血款冬花百合蒸焙等分爲末蜜丸龍眼大每臥時嚼一丸薑湯下濟生方

痰飲欬嗽含奇丸用葶藶子紙襯炒令黑知母貝母各一兩爲末棗肉半兩沙糖一兩半和丸彈丸大每以新棉裹一丸含之嚥津甚者不過三丸篋中方

欬嗽上氣不得臥或遍體氣腫或單面腫足腫葶藶子三升微火熬研以絹袋盛浸清酒五升中冬七日夏三日初服如桃許大日三夜一冬月日二夜二量其氣力取微利一次爲度如患急者不待日滿亦可絞服普知方

上氣欬嗽呷呀氣息喉中作聲唾粘以藍葉水浸搗汁一升空腹頻服須臾以杏仁研汁煑粥食之一兩日將息依前法更服吐痰盡方瘥梅師方

久嗽不止有膿血莨菪子五錢淘去浮者煑令芽出炒研眞酥一雞子大大棗七枚同煎令酥盡取棗日食三枚

又方莨菪子三撮吞之日五六度光祿李丞服之神驗必效方

齁喘欬嗽蓖麻子去殼炒熟揀甜者食之須多服見效終身不可食炒豆易簡方

卒得欬嗽芫花一升水三升煑汁一升以棗十四枚煮汁乾日食五枚愈肘后方

卒嗽有痰芫花一兩炒水一升煑四五沸去滓白糖入半斤每服棗許勿食酸鹹物

喘嗽失音暴傷寒冷所致取芫花連根一虎口切暴乾令病人以薦自裹舂令灰飛揚入其七孔中當眼淚出口鼻皆粹待芫根盡乃止病即愈

久嗽肺脹五味二兩粟殼白餳炒過半兩爲末白餳丸彈子大每服一丸水煎服衛生家寶方

久嗽不止五味子一兩眞茶四錢曬研爲末以甘草五錢煎膏丸菉豆大每二十丸沸湯下數日即愈

痰嗽并喘五味子白礬等分爲末每服三錢以生猪肺炙蘸末細嚼白湯下漢陽庫兵黃六病此百藥不效於岳陽遇一道人傳此兩服病遂不發普濟方

肺虛久嗽木鼈子款冬花各一兩爲末每用三錢焚之吸煙良久吐涎以茶潤喉如此五六次後服補肺藥又方用木鼈子一箇雄黃一錢聖濟方

痰欬不止苦蔞仁一兩文蛤七分爲末以薑汁澄濃脚丸彈子大噙之

乾欬無痰熟苦蔞搗爛絞汁入蜜等分加白礬一錢熬膏頻含嚥汁簡便方

欬嗽有痰熟苦蔞十箇明礬二兩搗和餅陰乾研末糊丸梧子大每薑湯下五七十丸醫方摘要

熱欬不止用濃茶湯一鍾蜜一鍾大熟苦蔞一箇去皮將瓤入茶蜜湯洗去子盌盛於飯上蒸至飯熟取出時時挑三四匙嚥之摘元方

肺熱痰欬胷膈塞滿用苦蔞仁半夏湯泡七次焙研各一兩薑汁打麪糊丸梧子大每服五十丸食後薑湯下濟生方

酒痰欬嗽苦蔞仁青黛等分研末薑汁蜜丸芡子大每噙一丸丹溪

胷痹痰嗽胷痛徹背心腹痞滿氣不得通及治痰嗽大苦蔞去瓤取子炒熟和殼研末麪糊丸梧子大每米飲下二三十丸日二服杜壬方

清痰利膈治欬嗽用肥大苦蔞洗去子切焙半夏四十九箇湯洗十次搥焙等分爲末用洗苦蔞水并瓤同熬成膏和丸梧子大每薑湯下三五十丸良楊文蔚方

虛熱欬嗽天花粉一兩人參三錢爲末每服一錢米湯下集簡方

卒暴欬嗽用百部根漬酒每溫服一升日三服

又方用百部生薑各搗汁等分煎服二合

又方用百部藤根搗自然汁和蜜等分沸湯煎膏噙嚥

又方治卒欬不止用百部根懸火上炙乾每含嚥汁勿令人知

三十年嗽百部根二十斤搗取汁煎如飴服方寸匕日三服深師加蜜二斤外臺加飴一斤千金方

氣熱欬嗽石韋檳榔等分爲末薑湯服二錢聖濟錄

久嗽不止馬勃爲末蜜丸梧子大每服二十丸白湯下卽愈（普濟方）

欬嗽上氣薑麥粉四兩茶末二錢生蜜二兩水一椀順手攪千下飲之良久下氣不止卽愈（儒門事親）

久嗽衆設去筋蜜炙爲末每服五分蜜湯下（范氏方）

久欬虛嗽鬱粟殼二兩半去蒂膜酢炙取一兩烏梅半兩焙爲末每服二錢臥時蜜湯或白湯下（袁明方）

一切久近欬嗽百部根切炒袋盛浸酒頻頻飲之寒痰欬嗽燒酒四兩猪脂蜜香油茶末各四兩同浸酒內熬成一處每日挑食以茶下之取效

上氣痰嗽喘促睡臥血以菜服子一合研細煎湯食上服之（食醫心鏡）

肺痰欬嗽萊菔子半斤淘淨焙乾炒黃爲末以糖和丸芡子大綿裹含之嚥汁甚妙（勝金方）

久嗽痰喘蘿蔔子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅丸麻子大每服二五丸時時津嚥（醫學集成）

寒熱痰嗽初起者煨薑一塊含咽之（本草衍義）

欬嗽不止生薑五兩搗半升火煎熟食盡愈投侍御用之有效（必效方）

久患欬嗽生薑汁半合蜜一匙煎溫呷服三服愈（心鏡）

化痰止嗽絲瓜燒存性爲末棗肉和丸彈子大每服一丸溫酒化下

欬嗽寒熱日夕加重少喜多嘆面色不潤忽進忽退積漸少食脈弦緊者杏仁半斤去皮尖童子小便浸七日漉出溫水淘洗沙盆內研如泥以小便二升煎如膏每服一錢熟水下婦人室女服之尤妙（千金方下同）

欬逆上氣不拘大人小兒以杏仁三升去皮尖炒黃研膏入蜜一升杵熟每食前含之嚥汁

喉痹痰嗽喘熱生瘡或卒失音聲杏仁去皮熬黃三分和桂末一分研泥綿裹含之嚥汁

上氣欬嗽胷滿氣喘桃仁三兩去皮尖以水一大升研汁合粳米二合煮粥食之（心鏡）

卒得欬嗽桃仁三升去皮杵蒼器中密封蒸熟日乾絹袋浸盛二斗酒中七日可飲日飲四五合

急勞欬嗽煩熱用桃仁三兩去皮尖猪肝一枚童子小便五升同煮乾於木臼內搗爛入蒸餅和丸梧子大每溫水下二十丸（聖惠方）

上氣欬嗽用棗二十枚去核以酥四兩微火煎入椒肉中以酥盡取收之常含一枚微微嚥之取瘥

卒得欬嗽崔元亮海上方用好梨去核搗汁一椀人椒四十粒煎一沸去滓納黑餳一大兩消攪細細含嚥立定

又方用梨一顆刺五十孔每孔納椒一粒麵裹炭火煨熟停冷去椒食之

又方梨一顆去核納酥蜜麵裹燒熟冷食

又方梨一顆切片酥煎食之

又方梨搗汁一升入酥蜜各一兩地黃汁一升煎膏含嚥凡治欬有喘息定時冷食之若熱食反傷肺令嗽更劇不可救也若反可作羊肉湯餅飽食之佳

經年氣嗽橘皮神麴生薑焙乾等分爲末蒸餅和丸梧子大每服二五十丸食後夜臥各一服有人患此服之兼治患膀胱氣皆愈也（范氏家傳）

痰氣欬嗽用香橼去核切砂瓶內酒浸封固一夜爛爛蜜拌勻含食之

寒嗽痰喘白果七箇煨熟以熟艾作七丸每果入艾一丸紙包再煨香去艾嚼（時珍方）

哮喘痰嗽用銀杏五箇麻黃二錢半甘草炙二錢水一鍾半煎八分臥時服

欬嗽失音白果仁四兩白茯苓桑白皮各二兩烏豆半升沙蜜半斤煮熟日乾爲末以乳汁半椀拌濕九蒸九曬丸如菉豆大每服三五十丸白湯下（神效方）

痰喘欬嗽胡桃肉三顆生薑三片臥時嚼服（上方）

又方人參寸許胡桃肉三枚胡桃須連皮煎湯服之卽愈

久嗽不止杏桃仁五十箇煮熟去皮人參五兩杏仁三百五十箇麩炒湯浸去皮研勻入煉蜜丸梧子大每空心細嚼一丸人參湯臨臥再服

肺燥欬嗽用松子仁一兩胡桃仁二兩研膏和熟蜜半兩收之每服二錢食後沸湯點服（外臺秘要）

痰喘欬嗽不能睡臥好茶白礬等各一兩爲末放盌內蓋定傾沸湯一小盞臨臥再添湯點服（瑞竹堂方）

虛熱欬嗽口乾涕唾用甘蔗汁一升半青粱米四合煮粥日食二次極潤心肺（蘇氏方）

上氣喘嗽煩熱食卽吐逆用沙糖蘆汁等分相和慢煎二十沸每嚼半匙取效

肺痺痰滯上焦不利卒然欬嗽杉木屑一兩皂角去皮酥炙三兩爲末蜜丸梧子大每米飲下十丸一日四服（聖惠方）

上氣欬嗽腹滿羸瘦者楸葉二斗水三升煮三十沸

去滓煎至可丸丸如彈大以筒納下部中立愈（淨上方）

欬逆上氣唾濁不得臥用皂莢炙去皮子研末蜜丸梧子大每服一丸棗膏湯下日三夜一服（千金）

痰喘欬嗽長皂莢三條去皮子一莢入巴豆十粒一莢入半夏十粒一莢入杏仁十粒用薑汁製杏仁麻油製巴豆蜜製半夏一處火炙黃色爲末每用一字安手心臨臥以薑汁調之吹下神效（通考）

卒寒欬嗽皂莢燒研豉湯服二錢（千金方）

氣嗽日久生訶黎勒一枚含之嚥汁療後口爽不和食味却無檳榔湯一盌服之立便有味

久嗽欲死用厚榆皮削如指大長尺餘納喉中頻出入當吐膿血而愈

十年欬嗽或二十年醫不效者生龜二枚治如食法去腸以水五升煮取三升浸麴釀秫米四升如常飲之令盡永不發

又方用生龜一枚著坎中令人溺之浸至三日燒研以醇酒一升和末如乾飯頓服須臾大吐嗽囊出則愈小兒減半

痰飲欬嗽用眞蚌粉新瓦炒紅入青黛少許用淡薑水滴麻油數點調服二錢

上氣欬嗽豬肪四兩煮百沸以來切和醬酢食之（心鏡）

二十年嗽豬腦三具大棗百枚酒五升漬之秋冬七日春夏五日絞去查七日服盡忌鹽

卒得欬嗽豬腎二枚乾薑三兩水七升煮二升豬服取汗（張文仲方）

久嗽不瘥猪腎二枚入椒四七粒水煮啖之

喘嗽面浮并四肢浮者蛤蚧一雌一雄頭尾全者法酒和蜜塗之炙熟紫團人參似人形者半兩爲末化蠟和四兩作六餅每煮糯米薄粥一盞投入一餅攪化細細熱呷之（普濟方）

治嗽方甚多余得一方甚簡但用香橼去核薄切作細片以時酒同入砂瓶內煮令熟爛白岳至五更爲度用蜜拌勻當晚中喫起用甚挑眼甚效

又越州某學錄云少時苦嗽百藥不療或教用向南柔桑條一束每條寸折內鍋中大約用水五椀煎至一椀於盛暑中遇渴飲之服一月而愈（肘後方）

遠年欬嗽羊脆三具大棗百枚酒五升漬七日飲之

久勞欬嗽吐臭痰者蝦蟆不邊蛇吞青蠹未嚥者連蛇打死黃泥固濟煅研空心酒服一二錢至效忌生冷至七日永不發也（秘錄）

欬嗽氣喘用鯉魚一頭去鱗紙裹炮去刺研末同糯米煮粥空心食（心鏡）

欬嗽不止蝙蝠去翅足燒過爲末一錢食後白湯下（海藏方）

卒得欬嗽屋上白螺或白蜆殼揭爲末酒服方寸匕（肘後方）

鵂嘐痰欬貓屎燒灰砂糖湯服一錢（葉氏錄驗）

欬嗽上氣積年垂死用莨菪子炒熟羊肺洗曝等分爲末以七月七日酢拌每夜服二方寸匕粥飲下隔日一服（千金方）

欬嗽有血小兒胎髮灰入麝香少許乳汁下每箇作一服男用女女用男（集驗方）

欬嗽日久雞子白皮炒十四枚麻黃三兩焙爲末每服方寸匕飲下日二（必效方）

酒後欬嗽白殭蠶焙研末每茶服一錢（怪證奇方）

欬嗽肺脹皺肺丸用五靈脂二兩胡桃仁八箇柏子仁半兩研勻滴水和丸小豆大每服二十丸甘草湯下（普濟方）

久嗽經年阿膠炒入參各二兩爲末每用三錢豉湯一盞入葱白少許煎服日三夫（聖惠方）

欬嗽不止黃明膠炙研一錢人參末二錢薄荷豉湯二盞葱白少許煎服嗽時溫呷三五口即止（食療）

久嗽喘息猪蹄甲四十九箇以瓶子盛之安天南屋一枚蓋之鹽泥固濟煅烟出爲度取出入款冬花半兩麝香龍腦少許研勻每服一錢食後煎桑白皮湯下名黑金散（聖惠）

卒欬嗽烏雄雞一隻治如食法酒漬半日食之（肘後方）

肺虛欬嗽立效丸治肺虛膈熱欬嗽氣急煩滿減食喉音嘶不出咽乾燥渴欲飲冷水體倦肌瘦發熱黃蠟溶濾令淨漿水煮過八兩再化作一百二十丸以蛤粉四兩爲衣養藥每服一丸胡桃半箇細嚼溫水下卽臥閉口不語日二（普濟方）

斂肺劫嗽百藥煎訶黎勒荊芥穗等分爲末蜜汁入蜜和丸芡子大時時噙之（外臺）

定嗽化痰百藥煎片黃芩橘紅甘草各等分共爲細末蒸餅丸菉豆大時時乾嚥數丸佳（類證醫案）

欬嗽喘急生薑一斤半砂糖五兩同煎減半常服之（千金方）

治痰嗽利胷膈取苦蔞實肥大者割開取子淨洗搥破苦蔞細切焙乾半夏四十九粒湯洗十遍切焙爲

末用洗苦蕒水丼子瓤同熬成膏研細爲丸梧子大蘆湯下二十丸本草
痰嗽上氣乃形寒飲冷傷肺而欬半夏製生薑切各半兩煎服卽效易老
欬嗽喘促氣急坐息不得兜鈴二兩去殼只取裏面子童便拌炒甘草炙一兩爲末每一錢水煎溫呷或含末嚥汁亦得本草下同
肺氣喘滿欬嗽或吐血桑白皮四兩泔浸三宿剉細糯米一兩焙乾同爲末米飲調下一二錢
欬嗽上氣喉濁坐不得臥皂莢酥炙爲末蜜丸梧子大薑湯吞下三丸日三
欬嗽鯉魚肉燒爲灰橘末飲調下一二錢或取肉作膾以薑醋食之亦佳
欬嗽上氣橘紅四兩甘草炙一兩爲末每二錢白湯點服日三
欬嗽上氣喘急及哮嗽杏仁一兩去皮尖童便浸半月每日一換取出研丹服一銀子大薄荷葉蜜水少許煎服二劑永瘥肘
老人久欬嗽杏仁胡桃仁等分蜜丸彈子大薑湯嚼下同上
肺氣喘急欬嗽蘇子水取汁和粳米薯粥食之卽杏仁亦佳
一切久嗽勞嗽鬥米宿者去皮切焙乾研者泡去筋驗比各一兩蜜丸彈子大每嚼一丸名生熟煎丸
上氣欬嗽痛肉炙爲末每二錢溫酒和服日二
欬嗽膿血腥乾乃虛中有熱不可服涼藥只好黃芪四兩甘草一兩爲末每服二錢點湯服簡便方
年深欬嗽出膿血貫衆蘇方木等分每服三錢水一盞生薑三片煎服日二服
久嗽漸成勞瘵鳳尾草爲末用魚鮮蘸食之聖惠方
冷氣欬嗽結脹者乾薑末熱酒調服半錢或餳糖丸雞峯普濟方
欬嗽上氣用合州乾薑炮皂莢泡去皮子及蛀者桂心紫色者去皮並搗篩等分煉白蜜和搗三千杵丸梧子大每飲服三丸嗽發卽服日三五服禁食葱麪油膩其效如神馬湯在淮南與李亞同幕府李每治人而不出方或請其吝李曰凡人患嗽多進冷藥若見此方用藥熱燥必不肯服故但出藥卽多效也試之信然傳信方
結氣欬逆用梨木灰伏出雞卵殼中白皮紫菀麻黃去節等分爲末糊丸梧子大每服十丸酒下亦可爲末服方寸匕或煮湯服三十年者服之亦瘥
久嗽羸弱九尖拒霜葉爲末以魚鮮蒸食廣教
積年欬嗽呀呷作聲用鰿魚殼半兩貝母煨一兩桔梗一分牙皂一分去皮酥炙爲末煉蜜丸彈子大每含一丸嚥汁服三丸卽吐出惡涎而瘥聖惠方
卒嗽不止用白蜆殼搗爲細末以熟米飲調每服一錢日三服甚效
痰喘欬嗽用白蜆殼多年陳者燒過存性爲極細末以米飲調服一錢日三服
卒得欬嗽雄白雞一隻苦酒一斗煮取三升分三服
井淡食鏁方
上氣欬嗽煩滿用獾肉切作臊子豬脂煎熟食之心鏡
肺氣欬嗽猪腑一具苦酒煮食不過二服財后方
痰羸欬嗽猪臕和人溺薑汁橘皮訶黎勒皮同煮汁飲之拾遺方
上氣欬嗽多研貓骨酒服三合日二取瘥貓卽猪獾也孟詵
久嗽涕唾肺痿時時寒熱頰赤氣急用童便去頭尾少許五合取大粉甘草一寸四破浸之露一夜去甘草平旦頓服或入甘草末一錢同服亦可一日一劑童子忌食五辛熱物集驗
久嗽不瘥用兎尿四十九粒硇砂二分胡桐律一分三味爲末蜜丸如梧子大每服三丸以粥飲下日三吐冷物盡卽瘥千金方
欬嗽胃中支滿多唾上氣白糖五分皂莢末一方寸匕先微暖糖令消皂莢末和合相得丸如小豆先食服三丸
又方酒一升半浸肥皂莢兩挺經宿煮取半升分三服七日忌如服藥法若吐多以酢飯三四口止之
又方服芥子末七丸以酥油酒下之
三十年嗽紫菀二兩款冬花三兩二味治下篩先食飲服一方寸匕日三服七日瘥
一切肺病欬嗽臟血及唾血不止好酥三十斤三編煉停取疑當出醍醐服一合日三服瘥止一切藥皆不出此神方
又方三鍊酥如雞子黃適寒溫湛鼻中日再夜一
欬嗽熏法爛青布廣四寸布上鋪艾艾上鋪青葙末葙上鋪少熏黃末又鋪少鹽又鋪少豉末捲筒然之少令著急內燥罐中以紙蒙頭便作一小孔口吸取

烟細細嚥之以吐爲度若心胃悶時略歇烟盡止日一二度用三捲無不盡瘥三七日愼油膩

上氣欬嗽胃膈煩悶氣喘用鮮鯉魚一尾不論大小去鱗血洗淨切作膾鮮去血水以薑醋製而食之加蒜蓼亦得名鯉魚煎

卒然欬嗽釜月土一分豉七分搗丸梧桐子大每飲下四十丸附后方

熱盛喘嗽石膏二兩甘草炙半兩爲末每服三錢生薑蜜調下普濟方

痰熱喘嗽痰涌如泉石膏寒水石各五錢爲末每人參湯服三錢保命集

欬嗽不止浮石末湯服或蜜丸服附后方

針灸

素問曰肺病者喘欬逆氣肩背痛汗出尻陰股膝髀腨胻足皆痛

腎病者腹大脛腫喘欬身重寢汗出憎風

肺熱病者熱爭則喘欬痛走心膺背不得太息頭痛不堪汗出而寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死刺手太陰陽明血出如大豆立已

邪客於足少陽之絡令人脅痛不得息欬而汗出刺足小指次指爪甲上與肉交者各一痏不得息立已汗出立止欬者溫衣飲食一日已左刺右右刺左病立已不已復刺如法

刺中肺三日死其動爲欬

刺缺盆中內陷氣泄令人喘欬逆

刺掖下胸間內陷令人欬

靈樞曰邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出欬動肩背取之膺中外俞背二節五藏之旁以手疾按之快然乃刺之取之缺盆中以越之

黃帝曰其欬上氣窮詘胸痛者取之奈何岐伯曰取之廉泉黃帝曰取之有數乎岐伯曰取廉泉者血變而止帝曰善哉

甲乙經曰熱病振慄鼓頷腹滿陰痿欬引尻溺出虛也腑中虛食欲嘔身熱汗不出數唾血下肩背寒熱脫色目泣出皆虛也刺魚際補之

振寒痓瘛手不伸欬嗽唾涎氣腸善嘔鼓頷不得汗煩滿因爲瘛衄尺澤主之左窒刺右右窒刺左

熱中少氣厥陽寒灸之熱去煩心不嗜食欬而短氣善喘喉痹身熱脊脅相引忽忽善忘湧泉主之

脅痛欬逆不得息鼓陰主之及爪甲與肉交者左取右右取左立已不已復取

寒熱心痛循循然與背相引而痛胃中悒悒不得息欬唾血多涎煩中善饑食不下欬逆汗不出如瘧狀目眩眩淚出悲傷心俞主之

欬而嘔腸寒食不下寒熱皮肉膚痛少氣不得臥胃滿支兩脅腸上兢兢脅痛腹膜胃脘暴痛上氣肩背寒痛汗不出喉痹腹中痛積聚默默嗜臥怠惰不欲動身常濕濕心痛無可指者胛俞主之欬而脅滿急不得息不得反側腋脅下與臍相引筋急而痛反折目上視脏目中循循然肩項痛驚狂衄少腹滿目眩眩生白翳欬引胃痛筋寒熱唾血短氣舉酸肝俞主之

寒熱食多身羸瘦兩脅引痛心下賁痛心如懸下引臍少腹急痛熱面急目眩眩久喘欬少氣溺濁赤腎俞主之

寒熱癉目不明欬上氣唾血肩中俞主之

欬上氣喘暴瘖不能言及舌下挾繩青脈頸有大氣喉痹咽中乾急不得息喉中鳴翕翕寒熱項腫肩痛胃滿腹皮熱衄氣短哽心痛隱疹頭痛面皮赤熱身肉盡不仁天突主之

欬脅下積聚喘逆臥不安席時寒熱期門主之

寒濕燿舌煩手臂不仁唾沫脣乾引飲手腕攣指股痛肺脹上氣耳中生風欬喘逆痹臂痛嘔吐飲食不下膨膨然少商主之

寒熱胃背急喉痹欬上氣喘掌中熱數欠伸汗出善忘四逆厥善笑溺白列缺主之

寒熱欬嘔沫掌中熱虛則肩臂寒傷少氣不足以息寒厥交兩手而脅口沫出實則肩背熱背汗出四肢暴腫身濕搖時寒熱饑則煩飽則善面色變口噤不開惡風泣出列缺主之

煩心欬寒熱善噦勞宮主之

寒熱頸癘適欬呼吸難灸五里左取右右取左

心痛卒欬逆尺澤主之出血則已

欬逆上氣魄戶及氣舍主之

欬逆上氣謬譆主之

欬逆上氣咽喉鳴喝喘息扶突主之
欬逆上氣唾沫天容及行間主之
欬逆上氣咽喉癰腫呼吸短氣喘息不通水突主之
欬逆上氣喘不能言華蓋主之
欬逆上氣唾喘短氣不得息口不能言膻中主之
欬逆上氣喘不得息嘔吐胷滿不得飲食俞府主之
欬逆上氣漾出多唾呼吸哮坐臥不安彧中主之
胷滿欬逆喘不得嘔吐煩滿不得飲食神藏主之
胷脅支滿欬逆上氣呼吸多喘濁沫膿血庫房主之
欬喘不得坐臥呼吸氣索咽不得胷中熱雲門主之
胷脅支滿不得俛仰癢癰欬逆上氣咽喉喝有聲太谿主之
欬逆不止三焦有水氣不能食維道主之
欬逆煩悶不得臥胷中滿喘不得息背痛太淵主之
欬逆上氣舌乾脅痛心煩肩寒少氣不足以息腹脹喘尺澤主之
欬乾嘔滿俠白主之
欬上氣喘不得息暴痹內逆肝肺相傳鼻口出血身脹逆息不得臥天府主之
凄凄寒嗽吐血逆氣驚心痛手陰郄主之
欬而胷滿前谷主之
欬面赤熱支溝主之
欬喉中鳴欬唾血太鍾主之
腰清脊强四肢懈惰善怒欬少氣鬱然不得息厥逆肩不可舉馬刀瘻身瞤章門主之
脈經曰右手關前寸口陽絕者無大腸脈也苦少氣心下有水氣立秋節卽欬刺手太陰經治陰在魚際間卽太淵穴也
右手關前寸口陰絕者無肺脈也苦短氣欬逆喉中塞噫逆刺手陽明經治陽
千金方曰喉痹氣逆欬嗽口中涎唾灸肺俞七壯亦可隨年壯至百壯
嗽灸兩乳下黑白際各百壯卽瘥
又以蒲當乳頭周匝圍身令後前正平當脊骨解中灸十壯
又以繩橫量口中折繩從脊灸繩兩頭邊各八十壯三報三日畢兩邊者是口合度
灸從大椎數下行第五節下第六節上穴在中間隨年壯并主欬嗽上氣
又灸手屈臂中有橫文外骨捻頭得痛處十四壯良
上氣欬嗽短氣氣滿食不下灸肺募五十壯
上氣欬逆短氣風勞百病灸肩井二百壯
上氣短氣欬逆胷背痛灸風門熱府百壯
上氣欬逆胷滿短氣牽背痛灸巨闕期門各五十壯
上氣欬逆短氣胷滿多唾唾惡冷痰灸肺腧五十壯
上氣胷滿短氣欬逆灸雲門五十壯
上氣欬逆胷痹背痛灸胷堂百壯不針
上氣欬逆灸亶中五十壯
上氣氣閉欬逆咽冷聲破喉猜猜灸天衢五十壯一名天突
逆氣虛勞寒損憂恚筋骨攣痛心中欬逆泄注腹滿喉痹頸項強腸痔逆氣痔血陰急鼻衄骨痛大小便澀鼻中乾煩滿狂走易氣凡二十二病皆灸絕骨五十壯穴在內踝二三寸宛宛中
丹溪心法曰欬嗽有痰宜灸天突肺俞以泄火熱瀉肺氣
肺脹痰嗽不得臥但可一邊眠者可左側者灸右足三陰交可右側者灸左足三陰交立安
得效方曰欬嗽上氣於乳下一指許正與乳相直骨間陷中婦人卽屈乳頭向下度之乳頭齊處是穴艾炷如小豆大灸三壯男左女右火到肌卽差一云其穴當取乳下骨間動脈是也
資生方曰久患喘嗽夜不得臥夏月衣亦裌溫背心是膏肓病也灸之愈又曰久嗽宜灸膏肓次灸肺俞傷寒欬甚灸天突卽差
醫學綱目曰欬嗽取身柱三分瀉三吸至陽三分補三呼不已再取肺腧一寸一分沒皮向外一寸半瀉六吸寒痰紅痰俱是虛補實瀉
又法取風門一分沿皮向外一寸半
喘嗽不得臥取雲門太淵
欬嗽寒痰取列缺
古今醫鑑曰遠年欬嗽灸直骨穴卽愈如不愈其病不可治矣艾炷如小豆大灸三壯男左女右

導引

保生祕要曰欬嗽導引法伸足坐定雙掐兒訣用力撐起低頭躬身漸下以兩手按足尖三次隨原訣用力仰起大咽津下降幽關如此躬法二十四遍養靜半香效

運功此證有三種或感風寒而嗽或因心火妄動炎於肺竅但用歸元凝神一法封固火不上行肺竅不癢其嗽自止却寒嗽特守微用閉法却火嗽但止封固取靜後引腎水澆灌肺火週旋度數肺得水潤嗽自然止宜前推開以清肺經從肺經洗下大腸九曲向穀道去

風寒水濕嗽外法以手作拳狀在肩崖處交代摩至背心及腎臟自熱可去

食積致嗽外法摩臍輪使食漸次下去須寬性平胃膈而氣下降即愈

涉虛火動嗽須咽津液降下丹田省言語戒嗔怒即愈

醉後揚聲致嗽此種難治必入於瘵病

石室祕錄曰肺金固是嬌臟不可容物然未嘗不可容氣人有久嗽不已服諸補肺之藥不效者而不以氣入咽門則肺金終難速愈法當用女子十三歲者呵其氣而咽之每日五更時令女子以口喘口盡力將臍下之氣盡送病人口中病人咽下一口每日止可呵一口自比服藥有功但呵氣之時切戒不可少動慾心一動不特無益而又害矣止可一口二口恐女子有病也

醫案

儒門事親曰驗口瘕一男子年二十餘歲病勞嗽數年其聲欲出不出戴人問曰曾服藥否其人曰家貧未嘗服藥戴人曰年壯不妄服藥者易治先以苦劑涌之次以舟車瀉川大下之更服重劑果瘥

一田夫病勞嗽一涌一泄已減大半次服人參補肺湯臨臥更服檳榔丸以進食

東門高三郎病嗽一年半耳鳴三月嗽膿血面多黑點身表俱熱喉中不能發聲戴人曰嗽之源心火之勝也秋傷於濕冬生欬嗽冬木既旺水濕相接隔絕於心火不下降反而炎上肺金被爍發而爲嗽金殺既久聲反不發醫者補肺腎皆非也令備西瓜冰雪等物用涌泄之法又服去濕之藥病日已矣

楊壽之妻病嗽十餘年吐之一日不止以麝香湯止之夜半猶不定再止之明旦頓覺惡心更以人參湯止之二日稍寧自下藥凡三來問戴人謂樂景先曰病久嗽藥已擒病自然遲解涌後調理數日乃止又

常言涌後有頓快者有徐快者有反悶悶者病未盡也有反熱者不可不下也大抵三日後無不快者

趙君玉妻病嗽時已十月矣戴人用陳皮當歸甘草白朮枳殼桔梗君玉疑其不類嗽藥戴人笑曰君怪無烏梅罌粟囊乎夫冬嗽乃秋之濕也濕土逆而爲嗽此方皆散氣除濕解急和經三服帖然效矣

鄜城董德固病勞嗽戴人曰愈後當戒房事其病愈特其安觸禁而死死後妻生一子正當病瘥之日也

董初堅諱至此乃彰

一男子年四十病勞嗽唾吐粘臭不可聞秋冬少緩春夏則甚寒熱往來日晡發作狀如瘧瘧寢汗如水累服麻黃根敗蒲扇而汗自若又服寧神散寧肺散而嗽自如戴人先以獨聖散湯其痰狀如雞黃汁隨湧出昏潰三日不省時時飲以凉水精神稍開飲食加進又與人參半夏丸桂苓甘露散不數服乃愈

張板村鹿子春一小兒七八歲夏月病嗽羸甚戴人欲涌之子春以爲兒幼弱懼其不勝少難之一日因飲酒家人與之酒傷多乃大吐吐定而嗽止蓋酒味苦苦屬通劑子春乃大悟戴人之言也

丹溪心法曰一男子五十餘歲患欬嗽惡風寒口燥乾心微痛兩手脈浮緊胃脘痞滿而脈數左手大於右手大槩表盛裏虛問其人平日好嗜酒肉素有食積後因汗房勞又往來涉寒水且冒微雨又忍饑歸後繼以飽食酒肉而病先用人參每貼四錢麻黃根節一錢半與二三服欬嗽止惡風寒除後改用厚朴枳實陳皮青皮苦夔仁半夏爲丸與二十餘貼用人參湯送下痞滿亦散而愈

一男子五十歲舊年因暑月入冷水作勞思瘧後得痰嗽次年夏末得弦脈而左手虛卽之必汗少而有痰身時時發熱痰如稠黃膠與半夏一兩白朮七錢茯苓六錢黃芩陳皮桔梗枳殼石膏煅各半兩爐鼈炒二錢半五味子一錢半用神麴糊丸薑湯下三十丸先與三拗湯加黃芩白朮二貼夜與小胃丹十粒以攪其痰仍灸大椎風門肺俞五處而愈

本草綱目曰類編云徽宗時李防禦爲入內醫官時有寵妃病痰嗽終夕不寐面浮如盤徽宗呼李治之詔令供狀三日不效當誅李憂惶技窮與妻泣別忽

聞外叫賣欬嗽藥一文一貼嘆了即得睡李市一貼視之其色淺碧恐藥性獷悍併二服自試之無他乃取三貼爲一入內授妃服之是夕嗽止比曉面消內侍走報天顏大喜賜金帛直萬緡李恐索方乃尋訪前賣藥人飲以酒厚價求之方用眞蚌粉每服二錢搗生薑汁一盞再入米醋同調送下云自少時從軍見主帥有此方剽得以度餘年耳

趙潛養痾漫筆云趙州一學錄少年苦嗽百藥不效或令用南商柔桑條一束每條寸折納鍋中以水五盆煎至一盆盛以器中湯即飲之服一月而愈此亦桑枝煎婁法歟

醫學綱目曰一中年婦人乾欬寸脈滑動似豆狀餘皆散大不浮左大於右每五更心躁熱有汗但怒氣則甚與桔梗不開諸藥不效遂以石膏香附爲君苓連青黛門冬苦葶藶陳皮炒藥歸桔爲臣五味砂仁川芎紫菀佐之凡二十餘貼而安潔古蜜煎生薑窩煎陳皮湯與燒生薑胡桃方皆治無痰而嗽者以辛甘潤其肺也如但使青皮葉皆宜去白本草云陳皮味辛理上氣去痰氣滯塞青皮味苦治下氣二味俱用散三焦氣也故聖惠治法云陳皮去穰穰不除即生痰麻黃發汗節不去則止汗

一男子五十餘歲病傷寒欬嗽喉中聲如鉤與獨參湯一服而解發徐至二三貼欬嗽亦漸退凡服二三斤病始全愈

醫宗必讀曰文學金伯含欬而上氣凡清火潤肺化痰理氣之劑幾無遺用而病不少衰余診其腎脈大而軟此氣虛火不歸元用人參三錢煎湯送八味丸五錢一服而減後於補中益氣湯加桂一錢附子八分凡五十劑及八味丸二斤而瘥

太學史明齋經年欬嗽更醫數十人藥偏而病反劇自謂必成虛勞余曰不然脈不數虛惟右寸浮大而滑是風痰未解必多服酸收故久而彌甚用麻黃杏仁半夏前胡桔梗甘草橘紅蘇子五劑知十劑已

張遠公三年久嗽服藥無功委命待盡一日以他事造予居自謂必不可治姑乞診之余曰饑時胃中痛否遠公曰大痛視其上脣白點如粟者十餘處此蟲嚙其肺用百部膏一味加烏梅檳榔與服不十日而痛若失欬頓止矣令其家人從淨桶中覓之有寸白蟲四十餘條自此永不復發

侍御馮五玉令愛發熱欬嗽已及半載十月間吐鮮血甚多一日之內不過食粥一盞大肉消陷大便溏泄沉困著牀脈來七至余曰法在不救人所共知若能惟余是聽不爲旁撓可救十中之一每貼用人參五錢芪朮三錢歸芍二錢陳皮一錢日投三貼約進七十劑及壯水丸三斤而後起於牀又三月而飲食如舊若泥常法而棄之幽潛沉冤矣

薛己醫案曰一婦人不得於姑患欬胃脘不利飲食無味此脾肺俱傷痰鬱於中先用歸脾湯加山梔撫芎貝母桔梗諸證漸愈

一男子神勞冬月患欬嗽服解散之劑自以爲便余曰此因肺氣虛弱腠理不密而外邪所感也當急補其母是治本也不信服六君子湯內去參朮反加紫蘇枳殼之類以致元氣益虛生肺癰而歿

地官李北川每勞欬嗽余用補中益氣湯即愈一日復作自用參蘇飲益甚更服人參敗毒散項強口噤膜背反張余曰此誤汗亡津液而變痙矣仍以前湯加附子一錢四劑而痊感冒欬嗽若悞行發汗過多喘促呼吸不利吐痰不止必患癰矣

侍御譚希曾欬嗽吐痰手足時冷余以爲脾肺虛寒用補中益氣加炮薑而愈

僉憲阮君聘欬嗽面白鼻流清涕此脾肺虛而兼外邪用補中益氣加茯苓半夏五味治之而愈又用六君芎歸之類而安

司廳陳國華素陰虛患欬嗽自以知醫用發表化痰之劑不應用清熱化痰等藥其證愈甚余曰此脾肺虛也不信用牛黃清心丸更加胃腹作脹飲食少思足三陰虛證悉見朝用六君桔梗升麻麥門五味補脾土以生肺金夕用八味丸補命門火以生脾土諸證漸愈經云不能治其虛安問其餘此脾土虛不能生肺金復用前藥而反瀉其火吾不得而知也

中書鮑希伏素陰虛患欬嗽服清氣化痰丸及二陳芩連之類痰益甚用四物黃蘗知母元參之類腹脹聲啞右關脈浮弦左尺脈洪大余曰脾土既不能生肺金陰火又從而赴之當滋化源朝用補中益氣加山茱麥門五味夕用六味地黃加五味子三月餘喜其愈疾得愈

上舍史贊之每至春欬嗽用參蘇飲加芩連桑杏乃愈乙巳春患之用藥益甚更加喘瘡左尺洪數而無力余曰此是腎經陰火刑赴肺金當滋化源遂以六味丸料加麥門五味炒粳及補中益氣湯而愈

儒者張克明欬嗽用二陳芩連枳殼胃滿氣喘侵晨

吐痰加蘇子杏仁日出痰涎口乾作渴余曰侵晨吐痰脾虛不能消化飲食胃滿氣喘脾虛不能生肺金涎沫自出脾虛不能收攝口乾作渴脾虛不能生津液遂用六君加炮薑肉果溫補脾胃更用八味丸以補土母而愈

一男子夏月吐痰或嗽用胃火藥不應余以爲火乘肺金用麥門冬湯而愈後因勞復嗽用補中益氣加桔梗山梔片芩麥門五味而愈但口乾體倦小便赤澁日用生脈散而痊若欬而屬胃火有痰宜竹葉石膏湯胃氣虛宜補中益氣加貝母桔梗若陰火上衝宜生脈散送地黃丸以保肺氣生腎水此乃眞臟之患非滋化源決不能愈

一婦人患欬嗽脅痛發熱日晡益甚用加味逍遙散加熟地治之而愈年餘因怒氣勞役前證仍作又太陽痛或寒熱往來或欬嗽遺尿皆屬肝火血虛陰挺瘡痹用前散及地黃丸月餘而愈

表弟婦欬嗽發熱喔吐痰涎日夜約五六碗喘欬不寧胃痹躁渴飲食不進血崩如湧此命門火衰脾土虛寒用八味丸及附子理中湯加減治之而愈

一婦人欬嗽早間吐痰甚多夜間喘急不寐余謂早間多痰乃脾虛飲食所化夜間喘急乃肺虛陰火上衝遂用補中益氣加麥門五味而愈

上舍陳道復長子虧損腎經久患欬嗽午後益甚余曰當補脾土滋化源使金水自能相生時孟春不信乃服黃蘗知母之類至夏吐痰引飲小便頻數面目如緋余以白朮當歸茯苓陳皮麥冬五味丹皮澤瀉四劑乃以參芪熟地山萸爲丸俾服之諸證頓退復請視余以爲信遂用前藥如常與之彼仍泥不服卒致不起

古今醫統曰一婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成勞以桃杷葉木通款冬花紫菀杏仁桑白皮各等分大黃減半爲細末蜜丸櫻桃大食後夜臥各噙一丸未終一劑而愈

寓意草曰石開曉病傷寒欬嗽未嘗發熱自覺急迫欲死呼吸不能相續求余診之余見其頭面赤紅躁擾不歇脈亦豁大而空謂曰此證頗奇全似傷寒戴陽證何以傷風小恙亦有之急宜用人參附子等藥溫補下元收回陽氣不然子丑時一身大汗脫陽而死矣渠不以爲然及日落陽不用事愈慌亂不能少支忙服前藥服後稍寧片時又爲牀側添同寢一人逼出其汗如雨再用一劑汗止身安欬嗽俱不作詢其所由云連服麻黃藥四劑遂爾躁急欲死然後知傷風亦有戴陽證與傷寒無別總因其人平素下虛是以眞陽易於上越耳

陸令儀尊堂平日持齋腸胃素枯天癸已盡之後經血猶不止似有崩漏之意余鑑姜宜人交腸之流弊急爲治之久已痊可值今歲秋月燥金太過濕蟲不生無人不病欬嗽而尊堂血虛津枯之體受傷獨猛胃脘緊脹上氣喘急臥寐不寧欬動則大痛痰中帶血而腥食不易入聲不易出寒熱交作而申酉二時燥金用事諸苦倍增其脈時大時小時牢伏時弦緊服清肺藥如以勺水沃焦無裨緩急諸子徬徨無措知爲危候余亦明告以肺癰將成年高難任於是以葶藶大棗瀉肺湯先通其肺氣之壅即覺氣稍平食稍進痰稍易出身稍可側大有生機余曰未也吾見勢來太急不得已而取快於一時究竟暫開者易至復閉治復閉則前法不可再用矣今乘其暫開多方以圖必在六十日後交冬至節方愈蓋身中之燥與時令之燥膠結不解必俟燥金退氣而肺金迺得泰寧耳令儀昆季極懇尚力治之者六十日間屢危屢安大率皆用活法斡旋緣肺病不可用補也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百六十八卷目錄
醫部彙考二百四十八
嘔吐門一
黃帝素問 診要經終論 脈要精微論 玉機真藏論 平人氣象論 六節藏象論 五藏生成論 五藏別論 異法方宜論 移精變氣論 湯液醪醴論 金匱真言論 陰陽應象大論 陰陽離合論 陰陽別論 陽明脈解 熱論 刺熱 評熱病論 逆調論 厥論 病能論 奇病論 大奇論 脈解 刺禁論 刺志論 針解 長刺節論 皮部論 經絡論 氣穴論 氣府論 骨空論 水熱穴論 調經論 繆刺論 四時刺逆從論 標本病傳論 天元紀大論 五運行大論 六微旨大論 氣交變大論 五常政大論 六元正紀大論 至眞要大論 著至教論 示從容論 疏五過論 徵四失論 陰陽類論 方盛衰論 解精微論 八正神明論 離合眞邪論 通評虛實論 太陰陽明

註火熱爍肺也

六元正紀大論

太陽司天之政氣化運行先天初之氣地氣遷氣乃大溫身熱頭痛嘔吐

註地氣遷者謂上年在泉之終氣而交於今歲司天之初氣也歲前之終氣乃少陰君火今歲之初氣乃少陽相火二火相交故氣大溫而病身熱頭痛嘔吐

陽明司天之政氣化運行後天初之氣其病嚏欠嘔

註嚏欠嘔者風木之氣也

少陽司天之政氣化運行先天二之氣其病熱鬱於上狹逆嘔吐

註二之客氣乃太陰濕土病熱鬱嘔吐火熱鬱之於內也

三之氣天政布炎暑至少陽臨上民病狹嘔

註司天之氣上臨於三氣故天政布主時之氣亦屬少陽故炎暑至民病狹嘔感風火之氣也

土鬱之發甚則心痛胎膜嘔吐霍亂

註民病心痛諸證皆感土氣而發蓋五運之氣居其中上受司天之勝下受在泉之制無分太過不及咸受其鬱而復發也故其所發者即所鬱之本氣非子爲母復也

火鬱之發民病嘔逆

註民病嘔逆火熱盛也

少陽所至爲嚏嘔

註此春病之常也

少陽所至爲嘔涌

註此秋病之常也

至眞要大論

歲厥陰在泉風淫所勝民病飲食不下鬲咽不通食則嘔腹脹善噫則快然如衰身體皆重

註厥陰在泉寅申歲也脾氣病則飲食不下食則嘔諸證木淫而土病也

歲陽明在泉燥淫所勝民病喜嘔嘔有苦

註陽明在泉子午歲也喜嘔嘔苦足少陽病

厥陰司天風淫所勝民病食則嘔

註厥陰司天己亥歲也食則嘔脾經病也

少陰司天熱淫所勝民病嚏嘔

註少陰司天子午歲也嚏嘔火熱上炎也

厥陰之勝憒憒欲吐甚則嘔吐鬲咽不通

註憒憒欲吐甚則嘔吐鬲咽不通胃土病也

少陰之勝炎暑至嘔逆

註嘔逆陰氣上逆也

少陽之勝熱客於胃欲嘔嘔酸善饑

註少陽之氣合於三焦故熱客於胃而爲嘔饑蓋三焦之原皆出於胃間也

厥陰之復嘔吐飲食不入入而復出甚則入脾食痹而吐

註復者謂三陰三陽之氣受所勝之氣勝制鬱極而復發也嘔吐飲食不入木淫而土敗也痹者閉而痛也

太陰之復濕變乃舉飲食不化嘔而密默唾吐清液甚則入腎竅瀉無度

註氣極則變陰濕之氣盛是以飲食不化嘔者濕乘陽明也密默者欲閉戶臥而獨居陰陽相薄也

太陰者三陰也陰變而乘於陽則陽欲盡而陰盛是以唾吐清液甚則入腎下乘冬令之寒水腎開竅於二陰故曰竅瀉

少陽之復火氣內發上爲口糜嘔逆血溢血泄

註火氣內發者陰火發於內也發於上焦則口糜發於中焦則嘔逆發於下焦則血溢血泄

陽明之復清氣大舉甚則心痛否滿腹脹而泄嘔苦狹噦煩心病在鬲中

註陽明之復發於本位主令之時是以清氣大舉心痛否滿腹脹而泄乘火土也膿病者善太息嘔苦木受金刑腑亦病也狹噦煩心者病在鬲中陽明之氣上逆也

少陽司天客勝則嘔逆

註嘔逆太陰濕土之氣合於內也

少陽在泉主勝則熱反上行而客於心心痛發熱格中而嘔少陰同候

註主勝則熱反上行而客於心心痛發熱者君相二火之客氣反上行而自病也格而嘔者太陰之客氣自病也因主勝而客反自病故曰反曰客曰少陰同候謂火性炎上故二火皆有反逆之自病也

諸痿喘嘔皆屬於上

註諸痿喘嘔皆屬於上者從下而上也在下之水液上行則爲喘嘔亦猶天地陰陽之氣上下相乘而水隨氣之上下也

諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱

註熱者君火之氣也

示從容論

夫傷肺者脾氣不守胃氣不清經氣不爲使眞臟壞決經脈旁絕五臟漏泄不卽則嘔此二者不相類也

註脾氣不守土壞而不能制其水矣胃氣不清水邪之入於胃矣胃氣傷故經氣不爲使眞臟者脾腎之臟眞也壞決者土壞而水決也胃主經脈水入於胃是以經脈旁絕五臟主藏精者也土分王於四臟土氣不守是以五臟之津液皆爲之漏泄水在胃則嘔在肺則鼾此水邪直傷於胃肺

靈樞經

經脈篇

脾足太陰之脈是動則病舌本强食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重

註是動則病氣而及於經從經而及於臟腑故爲舌本强食則嘔胃脘痛腹脹諸證善噫者脾氣上走心爲噫得後與氣則快然如衰者厥逆從上下散也身體皆重太陰之氣逆也

肝足厥陰之脈是主肝所生病者胃滿嘔逆

註是主肝所生之病者胃滿嘔逆蓋食氣入胃散精於肝行氣於經肝所生病則肝氣厥逆不能行散穀精故胃滿嘔逆也

熱病篇

熱病汗不出嘔下血者死

註汗不出嘔下血者外熱不解而入於陰之經也

熱甚而正氣已絕刺之無益也

玉版篇

欬嘔腹脹且飧泄其脈絕是逆也如是者不過一時而死矣

註欬嘔腹脹且飧泄其脈絕逆於肝脾之絡也夫胃者水穀血氣之海也五臟之大絡海之所以行雲氣於天下之道路也水天之氣上下相通一晝一夜遶地環轉一周如逆而不行則開闔已息是以不過一周而死也

五味篇

黃帝曰苦走骨多食之令人變嘔何也少俞曰苦入於胃五穀之氣皆不能勝苦苦入下脘三焦之道皆閉而不通故變嘔齒者骨之所終也故苦入而走骨故入而復出知其走骨也

註任谷庵曰炎上作苦君主之味也故五穀之氣皆不能勝之苦性下泄故入於下脘三焦者少陽相火也苦性寒故三焦之道皆閉塞不通三焦不通則入胃之水穀不得通調布散故變而爲嘔夫腎主骨腎爲寒水之臟苦性寒故走骨同氣相感也然苦乃火味故入於下而復出於上以其性下泄而上涌也

扁鵲難經

吐脈

上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死上部無脈下部有脈雖困無能爲害所以然者譬如人之有尺樹之有根枝葉雖枯槁根本將自生脈有根本人有元氣故知不死

假令得心脈其外證面赤口乾喜笑其內證臍上有動氣按之牢若痛其病煩心心痛掌中熱而嘔有是者心也無是者非也

漢張機金匱要略

嘔吐

腹中寒氣雷鳴切痛胃脘逆滿嘔吐附子粳米湯主之

心胷中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起出見有頭足上下痛而不可觸近大建中湯主之

肝中寒者兩臂不舉舌本燥喜太息胃中痛不得轉側食則吐而汗出也

膈上病痰滿喘欬吐發則寒熱背痛腰疼目泣自出其人振振身瞤劇必有伏飲

嘔家本渴渴者爲欲解今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之

卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者半夏加茯苓湯主之

假令瘦人臍下有悸吐涎沫而癲眩此水也五苓散主之

支飲者法當冒冒者必嘔嘔者復內半夏以去其水先渴後嘔爲水停心下此屬飲家小半夏茯苓湯主之

心中懊憹而熱不能食時欲吐其名曰酒疸

酒黃疸者或無熱靖言了了腹滿欲吐鼻燥其脈浮者先吐之沉弦者先下之

酒疸心中熱欲吐者吐之愈

諸勞腹痛而嘔者宜柴胡湯（必小柴胡湯）

夫嘔家有癰膿不可治嘔膿盡自愈

先嘔却渴者此爲欲解先渴却嘔者爲水停心下此

屬飲家嘔家本渴今反不渴者以心下有支飲故也此屬支飲

問曰病人脈數數爲熱當消穀引食而反吐者何也師曰以發其汗令陽微膈氣虛脈乃數數爲客熱不能消穀胃中虛冷故也脈弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐變爲胃反寒在於上醫反下之今脈反弦故名曰虛

寸口脈微而數微則無氣無氣則榮虛榮虛則血不足血不足則胃中冷

趺陽脈浮而濇浮則爲虛虛則傷脾脾傷則不磨朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脈緊而濇其病難治

病人欲吐者不可下之

嘔而胃滿者茱萸湯主之

乾嘔吐涎沫頭痛茱萸湯主之

嘔而腸鳴心下痞者半夏瀉心湯主之

乾嘔而利者黃芩加半夏生薑湯主之

諸嘔吐穀不得下者小半夏湯主之

嘔吐而病在膈上後思水者解急與之思水者猪苓散主之

嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯主之

嘔而發熱者小柴胡湯主之

胃反嘔吐者大半夏湯主之

食已即吐者大黃甘草湯主之

胃反吐而渴欲飲水者茯苓澤瀉湯主之

吐後渴欲得水而貪飲者文蛤湯主之

乾嘔吐逆吐涎沫半夏乾薑散主之

病人胷中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心中憒憒然無奈者生薑半夏湯主之

乾嘔噦若手足厥者橘皮湯主之

噦逆者橘皮竹茹湯主之

吐蚘

蚘厥者當吐蚘今病者靜而復時煩此爲臟寒蚘上入膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者蚘聞食臭出當自吐蚘

蚘蟲之爲病令人吐涎心痛發作有時毒藥不止甘草粉蜜湯主之

華佗中藏經

論臟腑虛實寒熱

腸鳴氣走足冷手寒食不入胃吐逆無時皮毛憔悴肌肉皺皴耳目昏塞語聲破散行步喘促精神不收此五臟之虛也診其脈舉指而活按之而微看在何部以斷其臟也

肝脈緩甚嘔逆

肝脈不已傳邪入膽嘔清汁又膽病則口苦太息嘔宿汁心中澹澹恐人將捕之咽中介介然數唾其脈診在左關上浮而得之者是其部也

心氣實則小便不利腹滿身熱而重溫溫欲吐吐而不出喘息急不安臥其脈左寸口與人迎皆實大者是也

脾者土也其病則面色痿黃實則舌强直不嗜食嘔逆四肢緩夫脾病也色黃體重失便目直視脣反張爪甲青四逆吐食百節疼痛不能舉其脈當浮大而緩今反弦急其色反青此十死不可治也

胃者腑也實則中脹便難肢節疼痛不下食嘔吐不已寒則腹中痛不能食冷物痛甚則腹脅脹滿嘔吐不入食當心上下不通惡聞食臭嫌人語振寒喜伸欠

上焦寒則不入食吐酸水胃背引痛噫乾津不納也

病內外俱虛臥不得安身冷脈細微嘔而不入食者死

晉王叔和脈經

嘔吐之脈

右手寸口氣口以前脈陰實者手太陰經也病苦肺脹汗出若露上氣喘逆咽中塞如欲嘔狀

左手關上脈陰陽俱實者足厥陰與少陽經俱實也病苦胃脹嘔逆食不消

右手關上脈陰虛者足太陽經也病苦泄注腹滿氣逆霍亂嘔吐黃疸心煩不得臥腸鳴

寸口脈細發熱嘔吐宜服黃芩龍膽湯吐不止宜服橘皮枯梗湯灸中府關脈滑胃中有熱滑爲熱實以氣滿故不欲食食即吐逆宜服紫菀湯下之大平胃圓針胃管瀉之

關上脈浮而大風在胃中張口息肩心中澹澹食欲嘔緊而滑者吐逆

溫病四五日頭痛腰痛而吐脈來細疆十二日死

寸口數即吐

吐蚘之脈

關上脈微浮積熱在胃中嘔吐蚘蟲心健忘

脈訣

嘔吐之脈

數脈歌曰陽數即吐兼頭疼

脾脈歌曰三部俱緩脾家熱口臭胃翻長嘔逆

有緊脾家痛仍兼筋急拘欲吐即不吐衝衝未得疎

欲知疾患多爲冷指下尋之慢極遲吐逆不定經旬

日胃氣衝心得殺時

滑脈歌曰滑脈居寸多嘔逆

雜病生死歌曰內實腹脹痛滿盜心下牢强乾嘔頻

手足煩熱脈沉細大小便澀死非眞

外實內熱吐相連下清注殺轉難安忽然診得脈洪

大莫費神功定不痊

凡脈尺寸緊數形又似釵直吐轉增此患蠱毒急須

救速求神藥命難停

唐孫思邈千金方

嘔吐諸證

脾病其色黃體青失溲便利反張爪甲青飲食吐

逆體重節痛四肢不舉其脈當浮大而緩今反弦急

其色當黃而反青者此是木剋土爲大逆十死不治

少陰病飲食入口即吐心中懊憹然欲吐復不能吐

者宜吐之宿食在上脘宜吐之

心病煩悶少氣大熱熱上溢心嘔欬吐逆狂言汁出

如味身體厥冷其脈當浮今反沉濇而滑其色當赤

而反黑者此是水剋火爲大逆十死不治

下焦如滴若胃則大小便不通利氣逆不續嘔吐不

禁故曰走哺

黃疸之病發於陰部其人必嘔發於陽部其人振寒

而發熱

夫人病酒疸者或無熱靖言了了腹滿欲吐嘔者宜

吐之方用苦參散七味者是酒疸必小便不利其候

當心中熱足下熱是其證也

夫吐家脈來形狀如新臥起陽緊陰數其人食已即

吐陽浮而數亦爲吐寸口脈緊而芤緊即爲寒芤即

爲虛虛寒相搏脈爲陰結而遲其人即噫膈上數其

人則吐跌陽脈微而澀微即下利澀即吐逆發不得

入趺陽脈浮者胃氣虛寒氣在上憂氣在下二氣並

爭但出不入其人即嘔而不得食恐怖如死寬緩即

瘦嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥難治

凡服湯嘔逆不入腹者先以甘草三兩水三升煮取

二升服之得吐但服之不吐益佳消息定然後服餘

湯即流利便不吐也凡嘔者多食生薑此是嘔家聖

藥

宋朱肱活人書

嘔吐證

傷寒三四日胃脘痛而耳聾或口苦舌乾或往來寒

熱而嘔其尺寸脈俱弦此足少陽膽經受病也太陽

病不解轉入少陽脅下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱

尚未可吐下診其脈弦緊者小柴胡湯主之蓋脈弦

細頭疼發熱屬少陽少陽受病口苦咽乾目眩宜小

柴胡湯以解表不可發汗發汗則譫語譫語屬胃胃

和則愈不和則煩而躁宜調胃承氣湯此屬少陽陽

明也

嘔吐者不可下仲景云嘔多雖有陽明證不可下陽

明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而

喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濈然汗出者

此大便已硬大承氣湯主之若汗多胃中燥大便必

硬不可攻之但少與調胃承氣湯和之不可與之令

胃氣和則愈胃氣不和譫語不止若脈濇者有亡血

有津液亦不可攻之大便雖硬但小與調胃承氣湯

和之令小安

嘔而發熱者小柴胡湯主之

嘔而胸滿者小柴胡湯主之

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之

傷寒發熱嘔不止心下急鬱鬱微煩者與大柴胡湯

不止心下急鬱鬱微煩者與大柴胡湯也大便祕老

方加大黃大柴胡治嘔最妙爲內有枳實故也枳實

去機壓虛氣須是去大黃仲景云嘔多雖有陽明慎

不可下官局桔梗湯最良亦用枳實耳古人治嘔多

用半夏生薑孫眞人云生薑是嘔家聖藥仲景治嘔

皆用之太陽與陽明合病必下利若不利但嘔者葛

根加半夏生薑湯主之胃中有熱胃中有邪氣腹痛

欲嘔者黃連湯主之太陽與少陽合病而自利若嘔

者黃芩加半夏生薑湯主之金匱諸嘔吐敎不得下

者小半夏湯小半夏加茯苓湯小半夏加橘皮湯皆

可選用嘔而發熱者小柴胡湯主之嘔而發渴者猪

苓湯主之先嘔却渴者此爲欲解急與之先渴却嘔

者爲水停心下此屬飲家仲景云本渴飲水而嘔者

柴胡不中與也宜治膈間之水亦茯苓湯主之若少

陰證而嘔者眞武湯去附子加生薑若汗若吐若下

後虛煩不得眠若嘔者梔子生薑湯主之傷寒差後

嘔者有餘熱在胃宜竹葉湯加生薑主之

大凡嘔者飲食不下乾嘔者今人所謂惡也或因汗

出或因有水或因下利脾胃有熱故使乾嘔官局中

桔梗湯最佳仲景治法汗自出乾嘔者桂枝證也表

尿而解

無陽則厥無陰則嘔嘔者足陽明胃之經足陽明之

氣下行今厥而上行故爲氣逆氣逆則嘔仲景云嘔

多雖不大便不可下可與小柴胡湯上焦得通津液

得下胃氣因和汗出而解大抵嘔證不一各有

治法要之小柴胡湯尤相主當耳與小柴胡湯胃脘

滿而嘔日晡發潮熱者可小柴胡湯加芒硝也若嘔

不止心下急鬱鬱微煩者與大柴胡湯也大便祕老

方加大黃大柴胡治嘔最妙爲內有枳實故也枳實

去機壓虛氣須是去大黃仲景云嘔多雖有陽明慎

不可下官局桔梗湯最良亦用枳實耳古人治嘔多

用半夏生薑孫眞人云生薑是嘔家聖藥仲景治嘔

皆用之太陽與陽明合病必下利若不利但嘔者葛

根加半夏生薑湯主之胃中有熱胃中有邪氣腹痛

欲嘔者黃連湯主之太陽與少陽合病而自利若嘔

者黃芩加半夏生薑湯主之金匱諸嘔吐敎不得下

者小半夏湯小半夏加茯苓湯小半夏加橘皮湯皆

可選用嘔而發熱者小柴胡湯主之嘔而發渴者猪

苓湯主之先嘔却渴者此爲欲解急與之先渴却嘔

者爲水停心下此屬飲家仲景云本渴飲水而嘔者

柴胡不中與也宜治膈間之水亦茯苓湯主之若少

陰證而嘔者眞武湯去附子加生薑若汗若吐若下

後虛煩不得眠若嘔者梔子生薑湯主之傷寒差後

嘔者有餘熱在胃宜竹葉湯加生薑主之

大凡嘔者飲食不下乾嘔者今人所謂惡也或因汗

出或因有水或因下利脾胃有熱故使乾嘔官局中

桔梗湯最佳仲景治法汗自出乾嘔者桂枝證也表

不解心下有水氣乾嘔發熱者小青龍也身涼汗出兩脅痛或乾嘔者十棗湯也少陽下利脈微與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加猪膽汁湯也少陰下利裏寒外熱脈微欲絕或乾嘔者通脈四逆湯也乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯也傷寒論曰食穀欲嘔屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦也仲景無治法大抵吳茱萸湯治少陰證也穀入胃而嘔屬陽明宜與小柴胡湯

若病人直患嘔吐而復脚弱或疼乃是脚氣當作脚氣治之法在脚氣門

吐有冷熱二證寸口脈數手心熱煩渴而吐以有熱在胃脘五苓散主之傷寒有表證渴欲飲水也水入口即吐者名曰水逆由心經受熱而小腸不利故也宜服五苓散發汗後水藥不得入口爲逆若更發汗必吐下不止小半夏加茯苓湯大半夏加橘皮湯主之曾經汗下關脈遲胃中虛冷而吐乾薑黃芩黃連人參湯主之寒多不飲水而吐者理中湯去朮加生薑主之少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲者此胷中實不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當溫之宜四逆湯吐利手足逆冷煩躁甚者吳茱萸湯主之若傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐竹葉石膏湯主之身涼汗出兩脅疼痛或乾嘔此十棗湯證也

嚴用和濟生方

嘔吐論治

夫人受天地之中以生莫不以胃爲主蓋胃受水穀脾主運化生血生氣以統四體者也若脾胃無所傷則無嘔吐之患其或飲食失節溫涼不調或喜餐腥膾乳酪或貪食生冷肥膩露臥濕處當風取涼動擾於胃胃既病矣則脾氣停滯清濁不分中焦爲之痞塞遂成嘔吐之患焉然此特論飲食過傷風涼冷濕之所由致者又如憂思傷感寃寒在胃中脘伏痰胃受邪熱瘀血停蓄亦能令人嘔吐臨病宜審之

金劉完素六書

嘔吐

諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱流而不腐熟而不蠹故吐嘔酸者胃鬲熱甚則鬱滯於氣物不化而爲酸也酸者肝木之味或言吐酸爲寒者誤也

胃膈熱甚則爲嘔火氣炎上之象也

吐酸酸者肝木之味也由火盛制金不能平木則肝木自甚故爲酸也如飲食熱則易於酸矣或言吐酸爲寒者誤也又如酒之味苦而性熱能養心火故飲之則令人色赤氣粗脈洪大而數語澀譫妄歌唱悲笑喜怒如狂冒昧健忘煩渴嘔吐皆熱證也其吐必酸爲熱明矣況熱則五味皆厚經曰在地爲化化生五味皆屬土也然土旺勝水不能制火則火化自甚故五味熱食則味皆厚也是以肝熱則口酸心熱則口苦脾熱則口甘肺熱則口辛腎熱則口鹹或口淡者胃熱也胃屬土土爲萬物之母故胃爲一身之本淡爲五味之本然則吐酸豈爲寒者與所以妄言爲寒者但謂多傷生硬黏滑或傷冷物而喜噫酢吞酸故俗醫主於溫和脾胃豈知經言人之傷於寒也則爲病熱蓋寒傷皮毛則腠理閉密陽氣怫鬱不能通暢則爲熱也故傷寒身表熱者熱在表也宜以麻黃湯類甘辛熱藥發散以使腠理開通汗泄熱退而愈凡內傷冷物或即陰勝陽而爲病寒或寒熱相擊而致腸胃陽氣怫鬱而爲熱者亦有內傷冷物而反病熱得大汗熱泄身涼而愈也或微而不爲他病止爲中酸俗謂之酢心是也法宜溫藥散之亦猶解表之義以使腸胃徒滯開通怫熱而和也若久吞酸而不已則不宜溫之宜以寒藥下之後以涼藥調之結散熱去則氣和也所以中酸不宜食黏滑油膩者是謂能令陽氣壅塞鬱結不通暢如飲食在器覆蓋而自酸也宜餐糲食蔬菜能令氣之通利

吐利腥穢腸胃寒而傳化失常于能制鬼賊則已當自實故寒勝火衰金旺而吐利腥穢腥者金之臭由是熱則吐利酸臭寒則吐利腥穢亦猶飯漿熱則易酸寒則水腥也

凡嘔吐者火性上炎也無問表裏通宜涼膈散傷寒雜病一切嘔吐調胃承氣湯煩悶乾嘔黃連解毒湯嘔吐煩渴者桂苓甘露飲五苓散眩欬嘔者白虎加半夏橘皮湯寒嘔吐四肢厥逆清涼調胃散濕溫內甚惡心嘔吐者白虎解毒湯

成無己明理論

嘔吐論

傷寒嘔吐何以明之嘔者有聲者也俗謂之啘吐者吐出其物也故有乾嘔而無乾吐是以於嘔則曰食穀欲嘔及吐則曰飲食入口即吐則嘔吐之有輕重可知矣傷寒嘔有責於熱者有責於寒者至於吐家則悉言虛冷也經曰太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛又曰胃中虛冷故吐也嘔家則

不然嘔有熱者有寒者有停飲者有胃脘有膿者皆當明辨之嘔而發熱者柴胡湯證具與其嘔不止心下急鬱鬱微煩大柴胡湯主之者是邪熱而嘔者也膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當溫之與其乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之是寒邪爲嘔者也先嘔後渴者此爲欲解先渴後嘔者爲水停心下此屬飲家是停飲嘔者嘔家有癰膿不須治膿盡自愈是胃脘有膿而嘔也諸如此者雖有殊別大抵傷寒表邪欲傳裏裏氣上逆則爲嘔也是以半表半裏證多云嘔也傷寒三日三陽爲盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此爲三陰不受邪是知邪氣傳裏者必致嘔也至於乾薑附子湯證云不嘔不渴爲裏無熱十棗湯證云乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也即此觀之其嘔爲裏熱明矣嘔家之爲病氣逆者必散之痰飲者必下之千金曰嘔家多服生薑此是嘔家聖藥是要散其逆氣也金匱要略曰嘔家用半夏以去其水水去嘔則止是要下其痰飲也嘔多雖有陽明證不可攻者謂其氣逆而收斂爲實也其嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者俱爲難治蓋謂其虛寒之甚也醫者必審其邪氣之虛實疾證之逆順而施藥圖治則當矣

元李杲十書

用藥宜禁

吐多不得復吐如吐而大便虛輭者此上氣壅滯以薑橘之屬宣之吐而大便不通則利大便當歸桃仁麻仁槲李仁皂角仁則所當禁也

論證分經

嘔吐噦胃所主各有經乎答曰胃者總司也內有太陽陽明少陽三經之別以其氣血多少而與聲物有無之不同即吐屬太陽有物無聲乃血病也有食入即吐嘔食已則吐食久則吐之別

嘔屬陽明有物有聲氣血俱病也仲景云嘔多雖有陽明證不可下

朱震亨心法

嘔吐

凡有聲有物謂之嘔吐有聲無物謂之噦

胃中有熱膈上有痰者二陳湯加炒山梔黃連及生薑有久病嘔者胃虛不納穀也用人參生薑黃芪白朮香附之類大抵嘔吐以半夏橘皮生薑爲主劉河間謂嘔者火氣炎上此特一端耳有痰膈中焦食不得下者有氣逆者有寒氣鬱於胃口者有食滯心肺之分而新食不得下而反出者有胃中有火與痰而嘔者

嘔吐藥忌苦蔞杏仁桃仁蘿蔔子山梔皆要作吐丸藥帶香藥行散不妨

注船大吐渴飲水者即死童便飲之最妙

惡心有痰有熱有虛皆用生薑隨證佐藥載云惡心者有聲無物心中欲吐不吐欲嘔不嘔雖曰惡心實非心經病皆在胃口上宜用生薑蓋能開胃豁痰也惡心欲吐不吐心中兀兀如人畏舟船宜大半夏湯或理中湯加半夏亦可又胃中有熱惡心者以二陳加生薑汁炒黃連黃芩各一錢最妙

蚘厥者乃胃寒所生經曰蚘者長蟲也胃中冷即吐蚘蟲宜理中湯加炒川椒五粒檳榔半錢吞烏梅丸効蚘見椒則頭伏故也

局方發揮

吐酸

或曰吐酸素問以爲熱東垣又言爲寒何也予曰吐酸與吞酸不同吐酸是吐出酸水如酢平時津液隨上升之氣鬱積而成鬱積之久濕中生熱故從火化遂作酸味非熱而何其有積久不能自涌而出伏於肺胃之間咯不得上嚥不得下肌表得風寒則內熱愈鬱而酸味刺心肌表溫煖腠理開發或得香熱湯丸津液得行亦得暫解非寒而何素問言熱者言其本也東垣言寒者言其末也但東垣不言外得風寒而作收氣立說欲瀉肺金之實又謂寒藥不可治酸而用安胃湯加減二陳湯俱犯丁香且無治濕熱鬱積之法爲未合經意予嘗治吞酸用黃連茱萸各製炒隨時令迭爲佐使蒼朮茯苓爲主病湯浸炊餅爲小丸吞之仍教以粗食蔬菜自養則病易安

王履濂洞集

嘔吐乾嘔噦欬逆辨

嘗讀成無己傷寒明理論有曰嘔者有聲者也俗謂之啘吐者吐出其物也故有乾嘔而無乾吐是以於嘔則曰食穀欲嘔及吐則曰飲食入口即吐則嘔吐之有輕重可知矣又曰噦者俗謂之欬逆是也余竊疑之於是即仲景傷寒論以考其是非以訂其說夫傷寒論曰嘔曰吐曰乾嘔曰噦者至多曰欬逆者則二而止也因類聚而觀之夫嘔者東垣所謂聲物兼出者也吐者東垣所謂物出而無聲者也至若乾嘔與噦皆聲出而無物也東垣但以噦該之而無乾嘔

之論夫乾嘔與噦其所異者果何在哉微甚而已矣故仲景於乾嘔則皆平易言之於噦則曰太陽中風火劫發汗後久則譫語甚者至噦又曰陽明中風若不屎腹滿加噦者不治又曰大吐大下之極虛復極汗出者因得噦雖亦間有似平易言者然比之言乾嘔則徑庭矣竊又思之乾嘔與噦東垣視爲一仲景視爲二由爲一而觀之固皆聲之獨出者也出爲二而觀之則乾嘔乃噦之微噦乃乾嘔之甚乾嘔者其聲輕而短噦者其聲重大而長長者雖有微甚之分蓋一證也今成氏乃以嘔爲有聲與乾嘔混而無別又以噦爲欬逆若此者余未之能從也夫仲景以聲物兼出而名爲嘔以物獨出而名爲吐以聲獨出而名爲乾嘔惟其嘔兼聲物故無物而聲空鳴者乃謂之乾乾猶空也至於吐則是必有物矣其可謂之乾乎仲景於嘔字加一乾字所以別夫嘔爲聲物兼出者耳成氏乃以嘔爲獨有聲而同乎乾嘔得不有失仲景措辭之本意歟仲景曰嘔家有癰膿者不可治嘔膿盡自愈夫謂之嘔盡膿其可以嘔爲獨有聲乎至於曰得湯則嘔得食而嘔飲食則嘔食水者必嘔之類亦不可以嘔爲獨有聲矣又少陰病下利用通脉四逆湯一條其所敘諸證既有乾嘔之文何下文加減法中又曰嘔者加生薑乎設仲景果以嘔爲獨有聲則又不當立乾嘔之名矣觀其既曰嘔又曰乾嘔則其義之殊別也証不著明也哉且仲景嘗言欲嘔矣又言欲吐矣未嘗言欲乾嘔欲噦也夫欲之爲義將出未出而預有所覺之辭也夫將出未出而預覺者惟有形之物無形之聲則不然也有形之物將出乎胃脘之間則雖未出而亦可以前知若無形之聲則不能前知其將出必待夫既出而後可知也嘔與吐主有形之物言故可謂之欲乾嘔與噦主無形之聲言故不可謂之欲成氏引食穀欲嘔飲食入口即吐二句而謂嘔吐有輕重其意蓋以嘔言欲而爲輕吐言即而爲重安知言欲不言欲者本有形無形設不爲輕重設也果如其說則得湯則嘔得食而嘔心中溫溫欲吐氣逆欲吐之語不出於仲景乎又引俗謂之惡一句以證嘔夫惡與噦蓋字異而音義俱同者也以之證嘔亦疏矣雖然以嘔與吐較之吐輕於嘔以吐與乾嘔較之乾嘔輕於吐然三者亦各自有輕重必非三者之比矣故太素曰木陳者其葉落病深者其聲噦夫噦雖亦有輕而可治重而不可治者然病至於噦則其治也終不易矣

張潔古活法機要

吐證

吐證有三氣積寒也皆從三焦論之上焦在胃口上通於天氣主納而不出中焦在中脘上通天氣下通地氣主腐熟水穀下焦在臍下通於地氣主出而不納是故上焦吐者皆從於氣氣者天之陽也其脉浮而洪其證食已暴吐湯飲飲水大便結燥氣上衝而胃發痛其治當降氣和中中焦吐者皆從於積有陰有陽食與氣相假爲積而痛其脉浮而弦其證或先痛而後吐或先吐而後痛治法當以小毒藥去其積檳榔木香和其氣吐者皆從於寒地道也其脉沉而遲其證朝食暮吐暮食朝吐小便清利大便祕而不通治法當以大毒藥通其祕寒溫其寒氣大便漸通復以中焦藥和之不令大便祕結而自愈也

雞天益衛生寶鑑

嘔吐

吐多者理中丸去白朮加生薑氣上逆者則吐多朮甘而發非氣逆者之所宜千金曰嘔家多服生薑此是嘔家聖藥生薑辛散於是吐者多加之

傷寒吐而身熱或不熱者治用小半夏加茯苓湯或小半夏加橘皮湯或乾薑黃芩黃連人參湯治之吐而手足寒或煩躁治用四逆湯

臟寒蚘上入膈故吐蚘此乃胃氣虛寒非實寒也治用仲景理中湯

明戴思恭證治要訣

論嘔吐

嘔與吐之辨已於傷寒論之然證亦不一有寒嘔有熱嘔氣嘔痰嘔吐食嘔吐血吐蚘惡心乾嘔除熱嘔吐血外近世嘔吐二字皆通用然却無甚利害於理亦自不妨蓋小半夏茯苓湯或二陳湯多加生薑煎生薑嘔中之聖藥大痛色如青菜邪者死

寒嘔中脘停寒飲食喜辛熱物入口即吐出宜二陳湯加丁香十粒或理中湯加枳實半錢不效則溫中湯甚則附子理中湯或丁附湯並須冷服蓋冷遇冷則相入庶不吐出有痰飲粥藥到口即吐人皆謂其翻胃非也此乃痰氣結在咽膈之間宜先以蘇蘇湯下盡砂丹候藥可進則以順氣之藥繼之

外有吐瀉及痢疾或腹冷痛進熱劑太驟以致嘔逆宜二陳湯加砂仁白豆蔻各半錢甚則入沉香少許寒熱氣食痰血六嘔外有漏氣走哺漏氣者上焦熱

食必先吐而後下汗出身胃熱走哺者下焦熱氣逆不續大小便不通嘔吐不禁

凡進熱藥愈增者當於寒嘔中求熱嘔宜二陳湯加黃連一錢氣嘔胃滿膈脹關格不通不食常飽食則常氣逆而吐此因盛怒中飲食而然宜二陳湯加枳實木香各半錢或吳茱萸湯不效則丁沉透膈湯及五膈寬中湯

食嘔多因七情而得有外感邪氣並飲食不節而生大藥治以理中爲先二陳湯加枳實一錢或加南星七分沉香木香各四分亦好或只服枳南湯或導痰湯

又有中脘伏痰遇冷即發俗謂之冷痢或服新法半夏湯或抓脾湯外有熱痰而嘔者宜小半夏茯苓湯加竹茹如錢大若嘔痰而或致厥者乃寒痰逆悶謂之痰厥宜薑附湯以生附代熟附

惡心乾嘔欲吐不吐心下映漾如畏船人宜大半夏湯或小半夏茯苓湯或理中湯治中湯皆可用

嘔吐諸藥不效當借鎮重之藥以墜其逆氣宜薑蘇湯下靈砂丹須百粒作一服俟藥得效却以養正丹半硫圓導之嘔吐津液既去其口必渴不可因渴而遂以爲熱

又有嘔吐諸藥不效又別無前項痰氣等證乃蚘在胃膈作嘔見藥則動動則不納藥藥出而蚘不出雖非吐蚘之比亦宜用吐蚘藥或於治嘔藥中入炒川椒十粒蚘見椒則頭伏故也

曾有患人用附子理中湯四逆湯加丁香到口即吐後去乾薑只參附加丁木二香煎熟更磨入沉香藥立吐定蓋虛痰氣凝結丁附既溫佐以沉木則自通

乾薑白朮則泥耳

風寒嘔吐有寒熱二證無物爲嘔有物爲吐何以吐爲有物古語只聞有乾嘔不聞乾吐太陽與陽明合病身熱頭疼項强煩熱鼻乾目疼而嘔宜葛根湯加半夏一錢太陽與少陽合病頭疼腰疼往來寒熱胃脘疼痛而嘔宜黃芩湯加半夏一錢半入生薑五片煎若少陽證具不係合病嘔而熱者宜小柴胡湯若陽明證具雖顯然有可下之者兼之嘔多猶屬上焦未可遽下宜小柴胡湯若太陽不與少陽陽明合病而獨見太陽證或吐瀉者恐病人膈間素有痰飲停飲傷滯且以二陳湯定之候嘔吐定徐進解太陽經藥若先嘔却渴者宜猪苓湯先渴却嘔者爲膈間有水宜小半夏加茯苓湯渴欲飲水水入即吐吐已復渴名曰水逆由心經受熱而小腸不利也宜五苓散若少陰不渴而吐或乾嘔者理中湯去白朮加生薑嘔而吐涎沫者吳茱萸湯太陰厥陰間有嘔吐太陰宜理中湯厥陰宜四逆湯並加生薑煎已上陰證乃陰中之陰宜用熱劑陽入陰者能爲利而不嘔嘔屬上而近於外也陽之所入者深故利也又有陽證病新瘥後見嘔並無別因此飲熱在胃脘也宜竹葉石膏湯或橘皮竹茹湯

大凡得之太陽而嘔者必是合病嘔乃病漸入內非正太陽也曾記有人初得病太陽證大嘔吐不止藥投暖劑莫能治之知太陽已汗解固當用冷劑是太陽見嘔非合陽明則合少陽其嘔爲熱用暖劑非矣曾見太陽證大嘔不用嘔吐藥只解表自除

又記有人初病具太陽證而嘔一家少長患狀悉類進蕃胃湯八服無不立效此時行之氣適然如此是爲傷寒雜病又非可以正經傷寒律之

傷暑嘔而渴者沒冷香薷湯或五苓散兼吞消暑丸

嘔不止者枇杷葉散去茅根吞來復丹嘔而有痰却暑散吞消暑丸或小半夏茯苓湯或消暑飲

傷酒惡心嘔逆吐出宿酒昏冒眩運頭痛如破宜冲和湯半夏茯苓湯或理中湯加乾葛七分或用末子理中湯和縮脾飲傷食之證胃膈痞塞吐逆噦酸噫敗卵臭畏食頭痛發熱惡寒病似傷寒但身不痛耳治中湯加砂仁一錢或紅圓子小七香圓和服

食過多而傷停留中脘聞食氣則嘔二陳湯加砂仁一錢未愈更加丁香半錢或治中湯加砂仁一錢丁香十粒大嘔不止者大便去之枳實半夏湯加砂仁一錢白豆蔻仁半錢噤感應圓

王綸明醫雜著

吐酸呑酸

若素有痰火胃膈臂塞噦酸噎氣及素有呑酸吐酸之證或有酒積泄瀉結痛此皆濕熱也枳朮丸加黃連薑汁炒白芍藥酒炒陳皮各一兩石膏生甘草各五錢縮砂木香各一錢川芎四錢

按前證吐酸呑酸大略不同吐酸者濕中生熱呑酸者虛熱內爨皆屬脾胃虛寒中傳末證故內經以爲火者指其病形而言也東垣以爲胃寒者指其病本而言也凡患此者先當辨其呑吐而治以固本元爲主若服寒涼復傷胃氣則實實虛虛者矣復審其脾氣虛而飲食不能輸化濁氣不能

下降者須用六君子湯補養脾胃爲主少佐越鞠丸以清中故東垣先生云邪熱不殺穀若誤認爲實熱而妄用寒凉必變敗證

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百六十九卷目錄

醫部彙考二百四十九

嘔吐門二

李梴醫學入門 [illegible]

李中梓醫宗必讀 [illegible]

陶華六書 [illegible]

葛己醫按 [illegible]

徐春甫古今醫統 [illegible]

王肯堂證治準繩 [illegible]

張介賓景岳全書 [illegible]

陳士鐸石室祕籙 [illegible]

藝術典第二百六十九卷

醫部彙考二百四十九

嘔吐門二

明李梴醫學入門

嘔分乾濕

濕嘔有聲有物食已則嘔乾嘔空嘔無物總屬陽明氣血俱病故嘔比吐爲重熱嘔口苦煩渴脈數手心身熱寒嘔頭痛胷滿欬冷吐沫脈遲吐噦飼呃皆然濕嘔表邪傳裏裏氣上逆故半表裏證多嘔也三陽發熱者俱小柴胡加生薑主之胷滿目睛潮熱加芒硝嘔不止便閉者大柴胡湯嘔多雖有陽明證胃薄不可下者甘桔湯煩渴者先嘔後渴爲欲解猪苓湯先渴後嘔爲停水赤茯苓湯飲水即嘔者五苓散虛煩渴者竹葉石膏湯加薑汁或梔豉湯上熱下寒嘔者黃連湯胃寒下利厥冷不渴者理中湯去朮加薑汁或正氣湯加薑汁少陰三證膈上寒飲嘔吐涎沫或吐利而渴者四逆湯加生薑脈沉或欬或悸挾水氣者眞武湯去附子加薑汁手足寒心中溫溫欲吐不吐憒憒無奈何者生薑汁半夏湯經汗下虛者乾薑芩連人參湯汗後水藥及穀食不下者危小半夏湯救之又有溫毒嘔者心悶發斑水證嘔者先嘔怔忡嘔膿血者腥臊氣逆上衝嘔盡自愈

乾嘔胃熱與穀氣相併上熏心下痞塞故嘔則無所出食則不能納黃連解毒湯有太陽無汗乾嘔者風邪上壅也桂枝湯有太陽陽明合病不下利而但嘔或乾嘔者裏實氣逆上而不下也葛根湯胃寒津枯乾嘔渴者理中湯少陰三證乾嘔下利脈微者白通湯裏寒外熱脈微欲絕者通脈四逆湯利不止煩躁厥逆無脈者白通加猪膽汁湯厥陰頭痛乾嘔吐痰或自利厥冷煩躁者三味參萸湯胷中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦憒憒無奈何者生薑汁半夏湯大小橘皮湯

吐別腥酸

吐有物無聲食入即吐丹溪以屬太陽血病然胃實主之吐利腥臊者爲寒酸臭者爲熱治與嘔噦一同凡嘔吐脚軟痛者脚氣也嘔吐脈弱小便自利身微熱而厥者虛極難治

有冷熱氣食之殊

胃冷嘔清手足厥食久乃吐二陳湯加薑桂甚則加丁附或丁香半夏丸胃熱面紅手足熱食已即吐二陳湯加薑炒芩連山梔暴甚略加檳榔木香胃口痛加薑汁或葛根竹茹湯加味橘皮竹茹湯或小柴胡湯加竹茹如時常口吐清水冷涎自下湧上者此脾熱所致也二陳湯加白朮白芍升麻炒芩連山梔神麴麥芽乾生薑等分或丸或煎服

凡氣吐者氣衝胷痛食已暴吐而渴治當降氣和中六君子湯加木香藿香桔梗枇杷葉或七氣湯熱氣衝者古荊黃湯加人參甘草

中焦吐者食積與氣或先吐而後痛或先痛而後吐治當以木香檳榔等分爲末調服行氣紫沉丸消積尋常平胃散二陳湯加青皮砂仁白豆蔻山楂神麴調之

下焦寒

下焦吐者寒也朝食暮吐暮食朝吐久則小便清利大便不通乃陰氣偏結不與陽和治當溫其寒而通其祕復以中焦藥和之附子理中湯木香勻氣散合理中湯四逆湯丁胡三建湯古丁半湯養正丹古半硫丸

不可下

嘔家不可下者常也如喜冷煩渴胷滿腹痛甚大便閉者大小膀胱結也熱者大柴胡湯下之虛者潤之

濕痰火水

嘔吐痰火爲多二陳湯加薑炒芩連或小調中湯主

之肝火衝胃者單黃連丸或單人中白薑汁化服脾經濕痰鬱滯上中二焦時時惡心吐出清水或如豆汁者胃苓湯加半夏檳榔

水嘔心下怔忡先渴後嘔者赤茯苓湯先嘔後渴者豬苓湯水入即吐者五苓湯

膿血風暑

腥氣臊氣熏炙惡心嘔吐雜以涎血此膿血聚於經中所謂嘔家有癰膿不須治膿盡自愈四物倍赤茯苓牡丹皮虛者八珍湯加陳皮

風邪在胃翻翻不定或鬱酸水全不入食者不換金正氣散麥冬湯安脾丸不宜輕用參朮補住邪氣反甚惟久病脅痛者木尅土也方敢用六君子湯加青皮芍藥柴胡升麻川芎砂仁神麴治水熱者小柴胡湯加青黛薑汁蒸餅爲丸服

暑吐煩渴黃連香薷散六一散加砂仁或枇杷葉散錢氏白朮散

蚘蟲

久病胃氣虛弱全不納食聞食氣則嘔者四味藿葉湯或四君子湯去茯苓加香附參芪胃痞短氣者調中益氣湯胃虛寒痰作嘔者增半湯

蟲吐時常惡心胃口作痛口吐清水得食暫止饑則甚者胃中有蚘也二陳湯加苦楝根史君子白朮烏梅或用錫灰檳榔等分米飲調服亦可凡吐如青菜汁者死此是午然嘔吐非翻胃比也

李中梓醫宗必讀

嘔吐論

愚按古人以嘔屬陽明多氣多血故有聲有物血氣俱病也吐屬太陽多血少氣故有物無聲血病也噦屬少陽多氣少血故有聲無物氣病也東垣以嘔吐噦俱屬脾胃虛弱或寒氣所客或飲食所傷致上逆而食不得下也潔古老人從三焦分氣積寒因上焦在胃口上通天氣主納而不出中焦在中脘上通天氣下通地氣主熟腐水穀下焦在臍下下通地氣主出而不納故上焦吐者皆從於氣氣者天之陽也其脈浮而洪其證食已即吐渴欲飲水治當降氣和中中焦吐者皆從於積有陰有陽氣食相假其脈浮而弦其證或先痛後吐或先吐後痛法當去積和氣下焦吐者皆從於寒地道也其脈大而遲其證朝食暮吐暮食朝吐小便清利大便不通法當通其閉塞溫其寒氣後世更爲分別食利則吐謂之嘔利者填刻也食纔入口即便吐出用小半夏湯食入則吐謂之暴吐言食纔下咽即便吐出生薑橘皮湯食已則吐謂之嘔吐言食畢然後吐橘皮半夏湯食久則吐謂之反胃蓋食久則既入於胃矣胃中不能別清濁化精微則復反而出水煮金花丸再食則吐謂之翻胃言初食一次不吐也第二次食下則吐直從胃之下口翻胯上出易老紫泥丸旦食暮吐暮食朝吐乃積一日之食至六時之久然後吐此下焦病半夏生薑大黃湯以上諸證吐愈速則愈在上吐愈久則愈在下陰陽虛實之間未易黑白判也古方通以半夏生薑爲正劑獨東垣云生薑止嘔但治表實氣壅若胃虛穀氣不行惟當補胃推揚穀氣而已故服小半夏湯不愈者服大半夏湯立愈挾寒者喜熱惡寒肢冷脈小或二陳湯加丁香炮薑或理中湯加枳實並須冰冷與服冷則不吐諸藥不效者紅豆丸神效挾熱者喜冷惡熱躁渴脈洪二陳湯加黃連梔子竹茹枇杷葉乾葛生薑蘆根汁氣滯者脹滿不通二陳湯加枳實沉香木香痰飲者遇冷即發俗名冷涎泛先以薑蘇湯下靈砂丹繼以順氣之藥食積者消導乃安枳實厚朴蒼朮神麴麥芽山楂砂仁吐而諸藥不效必假鎮重以墜之靈砂丹養正丹吐而中氣久虛必借穀食以和之宜白米炒焦黑色陳皮茯苓半夏甘草陳倉米茯仁穀蘗時時呷陳米飲先吐後瀉身熱腹悶名曰漏氣此因上焦傷風邪氣內著麥門冬湯二便不通氣逆不續名曰走哺此下焦實熱人參湯主之乾嘔氣逆橘皮生薑等分惡心胃傷虛者人參橘紅茯苓甘草半夏生薑實者枳殼砂仁橘紅半夏白蔻藿香嘔苦邪在膽經黃連甘草生薑橘皮柴胡吐酸責之肝臟挾熱者左金丸加白蔻生薑竹茹梔子挾寒者左金丸加丁香乾薑白朮沉香嘔清水者多氣虛六君子湯加赤石脂吐蚘蟲者皆胃冷理中湯加川椒五粒檳榔五分吞烏梅詳別其因對證用藥不膠於一定之跡乃可應無窮之變耳

閻華六書

論乾嘔

乾嘔者空嘔而無物出也大抵熱在胃脘與穀氣併熱氣上熏心下痞結則有此證太陽汗出乾嘔桂枝湯主自汗也少陰下利乾嘔生薑湯主下利也厥陰吐涎沫乾嘔吳茱萸湯主涎沫也

邪去嘔自止又有水氣二證太陽表不解心下有水氣身熱乾嘔者微喘或自利小青龍湯不發熱只惡

寒脅痛欬而利乾嘔者亦水氣也十棗湯膈上有寒飲乾嘔者屬少陰四逆湯也

傷寒熱在胃口與穀氣併熱氣上熏無物名乾嘔分實熱水氣治之此與噦證不相類

三四日邪傳少陽膽胃脅痛而耳聾寒熱嘔而口苦按至半陰半陽及脈來弦數者是半表半裏也緣膽無出入之路用小柴胡其經有三禁汗下吐也蓋陽明與少陽三經不從乎中治也中者半表半裏而陽交中名曰少陽也

論嘔吐

嘔者聲物俱出者也吐者無聲而但出物者也故仲景復重言乾以別之則嘔爲有物明矣乾猶空也但空嘔而無所出耳然嘔吐俱有物出較之輕重則嘔甚於吐蓋表邪搏裏裏氣上逆故嘔吐而水穀不下也有胃熱脈弦數口舌煩渴有胃寒脈弦遲逆冷不食小便利有水氣先渴後嘔膈間怔忡有膿血喉中腥奔逆上衝不須治之嘔膿盡自愈是四者不可不辨大抵邪半在表半在裏則多嘔吐及其裏熱而致吐亦有之故經曰嘔多雖有陽明證不可攻之爲其氣逆未收斂爲實也設或嘔而脈弱小便復利身微熱而見厥者難治以其虛寒甚也

食穀欲嘔者屬陽明也因得湯反劇者屬上焦橘皮湯小柴胡湯似嘔似噦似喘心下憒憒大橘皮湯汗下後關脈遲緩而吐爲胃寒理中丸

瘥後虛煩嘔吐竹葉石膏湯加生薑汁屢經汗下食氣膈塞食入即吐乾薑黃芩黃連人參湯

汗後水藥不入口者曰逆半夏茯苓湯金匱曰諸嘔吐穀不下半夏湯嘔吐脈滑數或洪發熱茅根湯

薛己醫按

嘔吐

若脾胃氣虛嘔吐而胷膈不利者用六君子湯壯脾土生元氣若過服辛熱之劑而嘔吐噎膈者用四君子湯加芎歸益脾土以抑陰火若胃火內格而飲食不入者用六君子湯加芩連清熱養胃若病嘔吐食入而反出者用六君子加木香炮薑溫中補脾若服耗氣之劑血無所生而大便燥結者用四君子加芎歸補脾生血若火逆衝上食不得入者用四君子加山梔黃連清熱養血若痰飲阻滯而食不得入者用六君子加木香山梔補脾化痰若脾胃虛寒飲食不入或入而不化者用六君子加木香炮薑溫補脾胃不能慎房勞節厚味調飲食者不治年高無血者亦不治

徐春甫古今醫統

嘔吐之因不同

楊仁齋云胃氣不和而嘔吐人所共知然有胃寒有胃熱有痰飲有宿食有風邪入胃有氣逆衝上數種之異可不究其所自來哉

久病火鬱吐酸宜辛溫發散

經曰木鬱達之火鬱發之夫久病人脾胃虛弱屬鬱者多此吐酸宜從東垣安胃之治是則熱因熱用之法也或謂東垣以吐酸爲寒誠不知東垣者也予觀前人立論如局方以溫熱之劑治吐酸不能使人不致疑於寒是未審經旨專爲熱證也知此熱者惟劉河間一人耳

新病吐酸當從寒味

丹溪云凡吐酸吞酸皆屬於熱必用吳茱萸順其性而折之炒黃連炒梔子爲必用之藥此則火以病酸而出治也故只從寒味須用茱萸亦順其火而折之者也知東垣者其惟丹溪乎

王肯堂證治準繩

總論

東垣曰夫嘔吐噦者皆屬於胃胃者總司也以其氣血多少爲異耳且如嘔者陽明也陽明多血多氣故有聲有物氣血俱病也仲景云嘔多雖有陽明證慎不可下孫眞人曰嘔家多服生薑乃嘔吐之聖藥也氣逆者必散之故以生薑爲主吐者太陽也太陽多血少氣故有物無聲乃血病也有食入則吐有食已則吐以陳皮去白主之噦者少陽也少陽多氣少血故有聲無物乃氣病也以薑製半夏爲主故朱本議治嘔吐噦以生薑半夏陳皮之類是也究三者之源皆因脾氣虛弱或因寒氣客胃加之飲食所傷而致也宜以丁香藿香半夏茯苓陳皮生薑之類主之若素有內傷而兼此疾宜察其虛實使內消之痰飲者必下之當分其經對證用藥不可亂也

治法

金匱方諸嘔吐穀不得下者小半夏湯主之又云嘔家本渴渴者欲爲解今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之用半夏一斤生薑半斤水七升煑一升半分溫再服又云卒嘔吐心下痞有水眩悸者小半夏加茯苓湯主之即前方加茯苓四兩也則生薑半夏固通治嘔吐之正劑矣然東垣辛藥生薑之類治

嘔吐但治上焦氣壅表實之病若胃虛穀氣不行胃中閉塞而嘔者惟宜益胃推揚穀氣而已勿作表實用辛藥瀉之故服小半夏湯不愈者服大半夏湯立愈此仲景心法也

仲景云病人欲吐者不可下之又用大黃甘草治食已即吐何也曰欲吐者其病在上因而越之可也而逆之使下則必抑塞憒亂而益甚故禁之若既已吐而吐不已有升無降則當逆而折之引令下行無速於大黃故不禁也兵法曰避其銳擊其惰此之謂也丹溪泥之而曰凡病嘔吐切不可下固矣夫

景岳全書 臣弘介著

嘔吐論證

嘔吐一證最當詳辨虛實實者有邪去其邪則愈其虛者無邪則全由胃氣之虛也所謂邪者或暴傷寒涼或因胃火上衝或因肝氣內逆或以痰飲水氣聚於胃中或以表邪傳裏聚於少陽陽明之間皆有嘔證此皆嘔之實邪也

所謂虛者或其本無內傷又無外感而常爲嘔吐者此既無邪必胃虛也或遇微寒或遇微勞或遇飲食少有不調或肝氣微逆即爲嘔吐者總胃虛也凡嘔家虛實皆以胃氣爲主使果胃强脾健則凡遇飲食必皆運化何至嘔吐故雖以寒熱饑飽大有所傷亦不能動而茲略有所觸便不能勝使非胃氣虛弱何以若此此虛實之原所當先察庶不致誤治之害凡胃氣本虛而或停滯不行者是又虛中有實不得不暫從清理然後可以培補又或雖有停滯而中氣虛困不支者是又所急在虛不得不先顧元氣而略兼清理此中本末先後自有確然之理貴乎知權也

嘔家雖有火證詳列後條然凡病嘔吐者多以寒氣犯胃故胃寒者十居八九內熱者十止一二而外感之嘔則尤多寒邪不宜妄用寒涼等藥使非眞有火證而誤用之胃强者猶或可支胃弱者必遭其虐觀劉河間曰胃膈熱甚則爲嘔火氣炎上之象也此言過矣若執而用之其害不小又孫眞人曰嘔家聖藥是生薑此的確之見也勝於河間遠矣

仲景曰傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之此但以傷寒爲言也然以余之見則不但傷寒而諸證皆然何也蓋雜證嘔吐尤非傷寒之比其在傷寒則猶有熱邪但以熱在上焦未全入腑則下之爲逆故不可下也若雜證之嘔吐非胃寒不能化則脾虛不能運耳脾胃既虛其可攻乎且上下之病氣或無涉而上下之元氣實相依此嘔吐之所以不可攻者正恐病在上而攻其下下愈虛而上愈困耳

虛證

凡胃虛作嘔者其證不一當知所辨若胃脘不脹者非實邪也胃膈不痛者非氣逆也內無熱躁者非火證也外無寒熱者非表邪也無食無火而忽爲嘔吐者胃虛也嘔吐無常而時作時止者胃虛也食無所停而聞食則嘔者胃虛也氣無所逆而聞氣則逆者胃虛也或身背或食飲微寒即嘔者胃虛也或吞酸或噯腐時苦惡心兀兀然泛泛然冷嚥靡寧者胃虛也或因病誤治妄用尅伐寒涼本無嘔而致嘔者胃虛也或朝食暮吐暮食朝吐食入中焦而不化者胃虛也食入下焦而不化者土母無陽命門虛也凡此虛證必皆宜補是固然矣然胃本屬土非火不生非炎不化是土寒者即土虛也土虛者即火虛也故曰脾喜煖而惡寒土惡濕而喜燥所以東垣脾胃論特著溫補之法蓋特爲胃氣而設庸可忽哉第在河間則言嘔因胃火是火多實茲余言嘔因胃寒是寒多虛也一熱一寒若皆失中和之論不知嘔因火者非謂其必無但因火而嘔者少因寒而嘔者多因胃實而嘔者少因胃虛而嘔者多故不得不有此辨

虛嘔之治但當以溫胃補脾爲主宜人參理中湯爲正治或溫胃飲聖术煎參薑飲之類亦可酌用或黃芽丸尤爲最妙若胃口寒甚者宜附子理中湯或四味回陽飲或一炁丹主之若虛在陰分水泛爲痰而嘔吐者宜金水六君煎虛甚者宜理陰煎或六味回陽飲若久病胃虛不能納穀者但當以前法酌治之若胃氣微虛而兼痰者宜六君子湯主之凡中毒而吐者當察其所中者何物蓋中熱毒而吐者宜解以寒苦之劑中陰寒之毒而吐瀉不止者宜解以溫熱之劑若因吐瀉而脾胃致虛者非大加溫補不可此證有中寒毒吐瀉治按在後當并閱之

實證

凡實邪在胃而作嘔者必有所因必有見證若因寒滯者必多疼痛因食滯者必多脹滿因氣逆者必痛脹連於脇肋因火鬱者必煩熱燥渴脉洪而滑因外感者必頭身發熱脉數而緊如無實證實脉而見嘔吐者切不可以實邪論治

寒邪犯胃而作嘔者其證有三一以食飲寒涼或誤食性寒生冷等物致傷胃氣因而作嘔若果寒滯未

散而兼脹兼痛者宜溫中行滯以大小和中飲神香散或二陳湯加薑桂之類主之或和胃飲亦佳

一以陰寒氣令或雨水沙氣及水土寒濕之邪犯胃因而作嘔作泄若寒滯未散而或脹或痛者宜溫中散寒以平胃散神香散加減二陳湯除濕湯局方四七湯大七香丸之類主之

一以風寒外感或傷寒或痎瘧凡邪在少陽表邪未解而漸入裏所以外爲寒熱內作嘔吐蓋少陽之經下膈中貫膈而然此半表半裏證也治宜解表散寒以柴陳煎小柴胡湯正柴胡飲之類主之若微嘔微吐者邪在少陽若大嘔大吐者此又邪在陽明胃家病也宜二陳湯或不換金正氣散藿香正氣散之類主之若胃虛兼寒者惟理中湯溫胃飲之類爲宜

飲食傷胃而作嘔者如果留滯未消而兼脹痛等證宜大和中飲排氣飲神香散之類主之或啓脾丸亦可酌用如食已消而嘔未止者宜溫胃飲主之

火在中焦而作嘔者必有火證火脉或爲熱渴或爲煩躁脉必洪數吐必湧猛形氣聲色必皆壯麗若察其眞有火邪但降其火嘔必自止火微兼虛者宜外臺黃芩湯或半夏瀉心湯火甚者宜抽薪飲或大小分清飲若暑熱犯胃多渴多嘔氣虛煩躁而火有不清者竹葉石膏湯若熱甚嘔吐不止而火在陽明兼頭痛者白虎湯或太清飲或六一散若昌醫嘔吐而火不甚者宜香薷飲或五物香薷飲俱可

痰飲留於胃中或寒濕召胃水停中脘而作嘔吐者宜和胃二陳煎茶朮二陳煎或小半夏加茯苓湯橘皮半夏湯之類皆可酌用

氣逆作嘔者多因膏怒致動肝氣胃受肝邪所以作嘔然胃強者未必易動而易動者多因胃虛故凡致此者必當顧胃氣宜六君子湯或理中湯主之若逆氣未散或多脹滿者宜二陳湯或橘皮半夏湯之類主之或神香散亦佳

瘧痢作嘔者在瘧疾則以表邪內陷凡邪在少陽陽明太陰者皆能作嘔表解嘔必自止在痢疾之嘔則多因胃氣虛寒蓋表非寒邪無以成瘧裏非寒邪無以成痢病不知本尚何醫云云證方論具載本門

朝食午吐午食晚吐或朝食暮吐詳後反胃門方治嘔吐之極或反胃粥湯入胃即吐垂死者人參二兩水一升煮四合熱服日再進兼以人參煮粥食之即不吐

吐蚘

凡吐蚘者必因病而吐蚘非因蚘而致吐也故不必治其蚘而但治其所以吐則蚘自止矣

有因胃火而吐蚘者以內熱之甚蚘無所容而出也但清其火火清而蚘自靜輕者抽薪飲甚者萬應丸之屬是也

有因胃寒而吐蚘者以內寒之甚蚘不能存而出也但溫其胃胃煖而蚘自安仲景烏梅丸之屬是也

有因胃虛無食而吐蚘者以倉廩空虛蚘因求食而上出者此胃氣大虛之候速宜補胃溫中以防根本之敗如溫胃飲理中湯聖朮煎之屬是也

以上三者固皆治蚘之法然蚘有死者有活者若吐死蚘則但治嘔如前可也若活蚘上出不已則不得不有以逐之蓋蚘性畏酸苦但加烏梅爲佐使則蚘自伏也若胃實火盛者可加苦楝根或黃連亦善其有未盡者俱詳列諸蟲本門及後條吐蚘治按之中

治嘔氣味論

凡治胃虛嘔吐最須詳審氣味蓋邪實胃強者能勝毒藥故無論氣味優劣皆可容受惟胃虛氣弱者則有宜否之辨而胃虛之甚者則於氣味之間關係尤重蓋氣虛者最畏不堪之氣此不但腥羶耗散之氣不能受即微香微郁并飲食之氣亦不能受其他可知矣胃弱者最畏不堪之味此非惟至苦極劣之味不能受即微鹹微苦并五穀正味亦不能受而其他可知矣此胃虛之嘔所以最重氣味使或略有不投則入口便吐終無益也故凡治陽虛嘔吐等證則一切香散醎酸辛味不堪等物悉當以己意相測一有不妥切不可用但補其陽陽回則嘔必自止此最確之法不可忽也余嘗見一沈姓者素業醫極多勞碌且年及四旬因患癩疝下墜欲提使上升自用鹽湯叶法不知胃虛畏醎遂致吐不能止湯水皆嘔如此者一日一夜忽又大便下黑血一二碗而脉則微渺如毛幾如將絕此蓋吐傷胃氣脾虛之極兼以鹽湯走血故血不能攝從便而下余令速用人參薑附等劑以回垂絕之陽庶乎可療忽又一醫至曰諸逆衝上皆屬火也大便下血亦因火也尚堪用參附乎宜速飲童便則嘔可愈而血亦止矣其人以爲有理及童便下咽即嘔極不堪名狀嘔不止而命隨繼之矣嗚呼夫以胃强之人亦且聞尿欲嘔況嘔不能止而復可加以尿乎此不惟死者堪憐而妄用若此者尚敢稱醫誠可惡可恨也故筆之於此并以蚘氣味之

要

惡心證治

惡心證胃口泛逆兀兀不寧之病凡惡心欲吐口必流涎噦噦之不下愈噦愈惡而嘔吐總之亦有不嘔吐而時見惡心者然此雖曰惡心而實胃口之病非心病也此證之因則有寒有食有痰飲有穢氣有火邪有陰濕傷胃或傷寒瘧痢諸邪之在胃口者皆得有之若欲察之但當察其虛實寒熱則盡之矣然實邪惡心者邪去則止其來速其去亦速虛邪惡心者必得胃氣大復其病方愈且此證惟虛寒者十居八九即有實邪嘔惡者亦必其脾氣不健不能運化而然此所以凡治惡心者必當知其實中有虛勿得妄行攻擊而胃氣不可不顧也

虛寒惡心其證最多若非猝暴而常見或形氣不足之輩悉以胃氣弱也故凡治此者多宜以溫補爲主若脾胃微虛生痰或兼吞酸噯腐欬嗽惡心者宜六君子湯若脾胃虛寒痰滯而惡心者金水六君煎若脾胃虛寒或太陰自利腹痛嘔吐惡心者溫胃飲或理中湯聖术煎若脾腎虛寒上下不能運行或脹滿或嘔吐或傷寒陰證寒邪深入三陰而惡心嘔吐不止者理陰煎或溫胃飲

實邪惡心以一時邪滯犯胃得吐則滯去滯去則惡心自解若有餘邪如法治之若惡心多痰及風寒欬嗽或傷生冷或飲酒過多脾胃不和者二陳湯或橘皮半夏湯若脾胃多滯或寒濕傷脾惡心者平胃散若胃寒多滯或傷生冷或寒痰不清吞酸脹滿惡心者和胃飲或和胃二陳煎若受穢濁寒邪脹滿腹痛惡心者調氣平胃散若感胃暑熱火盛煩躁惡心者仲景竹葉石膏湯若中藥毒或諸毒而惡心者速宜於諸毒門求法治之

吐酸吞酸辨證

吐酸一證在河間言其爲熱在東垣言其爲寒夫理有一定奚容謬異若此豈理因二子可以易乎必二子於理有一悖者此余之不能無言以東垣爲是而以河間爲非也何以見之蓋河間之說實本內經經曰諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱故河間病機悉訓爲火而其以主寒者爲非不知內經此論乃以運氣所屬概言病應非以嘔吐注泄皆爲內熱病也如果言熱則何以又曰寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也又曰太陽之復心胃生寒胷中不和唾出清水及爲噦噫此言嘔吐之有寒也豈皆熱耶又曰太陽之勝寒入下焦傳爲濡泄此言泄瀉之有寒也豈亦熱耶由此觀之則其此處言熱而彼復言寒豈非自相矛盾能無謬乎不知內經之理圓通詳悉無不周備故有此言其常而彼言其變者有此言其順而彼言其逆者有此篇未盡而足之他論者有總言所屬而詳言所病者此內經之元奧所以不易窮也故凡善觀此者務宜悟其源流察其分合其博也必燭其爲千爲萬其約也必貫其總歸一理夫如是斯足稱明眼人矣倘不能會其巔末而但知管測一班又烏足以盡其妙哉矧復有不明宗旨悖理妄談謬借經文證己偏見者尚難枚舉無暇辨也茲因二子之論故并及之而再悉於左觀者其加政焉

辨河間吐酸之論爲非據河間曰酸者肝木之味也由火盛制金不能平木則肝木自甚故爲酸也如飲食熱則易於酸矣或言吐酸爲寒者誤也所以妄言爲寒者但謂多傷生硬粘滑或傷冷物而爲噫酸吞酸故俗醫主於溫和脾胃豈知經言人之傷於寒也則爲病熱故凡內傷冷物者或卽陰勝陽而爲病寒者或寒熱相擊而致腸胃陽氣怫鬱而爲熱者亦有內傷生冷而反病熱得大汗熱泄身涼而愈也若久喜酸而不已則不宜溫之宜以寒藥下之後以涼藥調之結散熱去則氣和也凡此皆河間之說余每見之未嘗不反復切嘆觀其所言病機則由火及金由金及木由木及脾所以爲酸若發微談理果可轉折如此則指鹿爲馬何患無辭惟其執以爲熱故不得不委曲若此若余言其爲寒則不然也夫酸本肝木之味何不曰火衰不能生土則脾氣虛而肝邪侮之故爲酸也豈不於理更爲明切而何以曲折強解有若是乎又若內經所言人之傷於寒也則爲病熱此言傷寒證寒邪在表則爲三陽之發熱及其傳裏則爲陽明之內熱豈以內傷冷物而亦云病熱者耶又豈有內傷冷物而可以汗解者耶卽以氣血强盛之人偶傷生冷久留不去而鬱爲熱者此以鬱久化熱或亦有之豈果因生冷而反熱耶矧內經本以外感言而河間引以證內傷謬亦甚矣此不惟大害軒岐之旨而致後人執以藉口其害又將何如也

辨東垣吐酸之論爲是據發明曰內經言諸嘔吐酸皆屬於熱此上焦受外來客邪也胃氣不受外邪故嘔仲景以生薑半夏治之以雜病論之嘔吐酸水者甚則酸水浸其心其次則吐出酸水令上下牙酸澀

不能相對以大辛熱藥療之必減也酸味者收氣也西方肺金旺也寒水乃金之子子能令母實故用大鹹熱之劑瀉其子以辛熱爲之佐而瀉肺之實病機作熱攻之誤矣蓋雜病酢心濁氣不降欲爲中滿寒藥豈能治之乎此東垣之說也余謂其最爲得理但其立言太諱如所云收氣及西方金旺水爲金子等義人有未達每多忽之即在丹溪亦曰東垣不言外得風寒而作收氣立說欲瀉肺金之實又謂寒藥不可治酸而用安胃湯加減二陳湯俱犯丁香且無治濕熱鬱積之法爲未合經意也因考丹溪治法則用茱連丸二陳湯且曰宜用炒吳茱萸順其性而折之乃反佐之法也必用黃連爲君以治之此丹溪之意亦主於熱止與東垣相反而欲以芩連治吐酸則不可不辨也故余以東垣之說請爲之疏焉夫所謂收氣者金氣也即秋氣也內經曰秋氣始於上蓋陰盛之漸必始於上以陽氣之將退也寒肅之漸必始於上以陽氣之日降也其云金旺者非云肺氣之充實正言寒氣之有餘也其云子令母實者以寒在上焦則收氣愈甚故治用鹹熱等劑以瀉其子亦無非扶陽抑陰之道最切當也丹溪未達其意而反以非之抑又何也即如丁香氣味辛爽無毒凡中焦寒滯氣有不順者最其所宜又何至以犯字相戒而使後人畏之如虎耶蓋丹溪但知丁香不可犯而不知黃連黃芩又豈吞酸證所宜輕犯者哉然說雖如此而說有未盡則云寒云熱猶不無疑謹再竟其說焉

吐酸證諸言爲熱者豈不各有其說在劉河間則曰如飲食熱則易酸矣在戴原禮則曰如穀肉在器濕熱則易爲酸也又有相傳者曰觀之造酒者凉作則甘過熱則酸豈非酸由熱乎諸說如此宛然可信而欲人不從不可得也凡諸似是而非者正以此類譬之射者但能不離於前後左右便云高手不知犯此四字尚足以言射乎而諸家之說亦猶是耳何以見之蓋察病者當察以理察理者當察以眞即如飲食之酸由乎熱似近理矣然食在釜中使能化而不酸者此以火力強而速化無留也若起置器中必久而後酸此停積而酸非因熱而酸也嘗見水漿冷積既久未有不酸者此言熱也因不行也又云造酒者熱作則酸亦似近理然必於二三日之後鬱熱不開然後成酸未有熱作及時而遂致酸者且人之胃氣原自大熱所以三餐入胃俱能頃刻消化此方是眞陽火候之應若如造酒者必待竟日而後成則日不再餐胃氣能無憊乎若必如冷作之不酸方云無火則飲食之化亦須旬日此其胃中陽氣不已竭乎是可見胃氣本宜煖稍凉不可也酒甕本宜疏鬱悶不可也故酒甕之化亦安能如胃氣之速而胃氣之健又安可同酒甕之遲乎此其性理相懸奚啻十倍有不待辨也明矣且人之餘食在胃以速化爲貴若胃中陽氣不衰而健運如常何酸之有使火力不到則其化必遲食化既遲則停積不行而爲酸爲腐此酸即敗之漸也故凡病吞酸者多見飲食不快自食有不快必漸至中滿痞隔泄瀉等證豈非脾氣不強胃脘陽虛之病而猶認爲火能無誤乎余向在燕都嘗有一縉紳患此而求治者余告以寒彼執爲熱堅持造酒之說以相問難莫能與辨竟爲芩連之屬所斃而終不能悟豈非前說之誤之也耶亦可哀矣余故曰人之察理貴察其眞若見理不眞而疑似固執以致釀成大害者無非此類此似是而非之談所以不可不辨也

吞酸之與吐酸證有三種凡喉間噯噫即有酸水如酢浸心饋雜不堪者是名吞酸即俗所謂作酸也此病在上脘最高之處不時見酸而泛泛不寧者是也其次則非如吞酸之近不在上脘而在中焦胃脘之間時多嘔惡所吐皆酸即名吐酸而渥渥不行者是也又其次者則本無吞酸吐酸等證惟或偶因嘔吐所出或酸或苦及諸不堪之味此皆腸胃中痰飲積聚所化氣味每有濁惡如此此又在中脘之下者也但其順而下行則人所不覺逆而上出則喉口難堪耳凡此三者其在上中二脘者則無非脾胃虛寒不能運化之病治此者非溫不可其在下脘偶出者則寒熱俱有但當因證以治其嘔吐嘔吐止則酸苦無從見矣雖然此亦余之論證故不得不曲進其說若以實理言之則凡胃強者何暇計及於酸苦其有酸苦者必其停積不行而然此宜隨證審察若無熱證熱脈可據而執言濕中生熱無分強弱惟用寒凉則未有不悞者矣

論治

治吞酸吐酸當辨虛實之微其年力之盛衰實者可治其標虛者必治其本

凡胃氣未衰年質壯盛或寒或食偶有所積而爲酸者宜用行滯溫平之劑以二陳湯平胃散和胃飲之類主之中氣微寒者宜加減二陳湯或橘皮湯甚者

宜溫胃飲氣微虛者宜藿香安胃散此皆治標之法也

脾胃氣虛及中年漸弱而飲食減少時見吞酸吐酸者惟宜溫補脾胃以理中湯溫胃飲聖术煎之類主之切不可用清凉消耗等藥若虛在陰分下焦不煖而水邪上泛爲酸者宜用理陰煎最妙

丹溪曰治酸必用吳茱萸順其性而折之乃反佐之法也不知此實正治非順性也蓋其性熱最能煖中下二焦其味辛苦最能勝酸澁之味謂之反佐見之過矣

用黃連爲君以治吐酸乃丹溪之法也觀其治案有一人酸塊自胷直上咽喉甚惡以黃連濃煎冷候酸塊欲上與數點飲之即下蓋味苦沉降故酸得苦而即下此亦揚湯止沸之法耳若年壯氣強偶有所積及酒濕不行而酸楚上泛者或用此法未必即傷胃氣而亦可暫引下行即權宜用亦無不可然終非治本之道也若氣體略有虛弱及內傷年衰之輩而患吐酸者必不可妄用苓連再殘陽氣雖暫得苦降之力而胃氣愈傷則病必日甚而無可爲矣

嘔吐清水古法以二朮二陳湯或六君子湯本皆正治之法然余嘗治水泛爲飲者覺自臍下上衝而吐水不竭以理陰煎治之其妙如神故此三方皆宜酌用

凡肌表暴受風寒則多有爲吞酸者此其由息而入則藏氣通於鼻由經而入則藏俞係於背故凡寒氣一入則胃中陽和之氣被抑不舒所以滯濁隨見而即刻見酸此明係寒邪犯胃也今以訛相傳者皆云肌表得風寒則內熱愈鬱而酸味刺心何其謬也夫因鬱成熱者必以漸久而成或一日或二日然後鬱而爲熱也今凡受寒吞酸者無不隨寒而酸見在即刻豈即刻便成鬱熱耶惟其非熱所以却之之法亦惟肌表宜溫煖藥劑宜香燥此自寒者熱之之正治而此者必欲執言爲熱故爾強解所謂道在邇而求諸遠凡屬謬妄者何非此類

石室秘錄 清陳士鐸著

嘔吐治法

吐嘔之證人以爲胃虛誰知由於腎虛無論食入即出是腎之衰凡有吐證無非腎虛之故故治吐不治腎未窺見病之根也方用人參三錢白朮薏仁芡實各五錢砂仁三粒吳茱萸五分水煎服此方似平治脾胃之藥不知皆治腎之法方中除人參救胃之外其餘藥品俱入腎經而不止留在脾也腎火生脾脾土始能生胃胃氣一轉吐嘔始平此治胃而用治腎之藥人知之乎

更有大吐之證舌如芒刺雙目紅腫人以爲熱也不知此乃腎水乾槁火不能藏水不能潤食入即出耳法當用六味地黃湯一料煎服恣其吞飲則餘火下息而飲食可入蓋胃爲腎之關胃中之火必得腎中之水以潤之腎水耗不能上潤脾胃則胃火沸騰湧而上出以致雙目紅腫舌如芒刺也但此證時躁時靜一時而欲飲水及至水到又不欲飲即強飲之又不十分寬快此乃上假熱而下眞寒也理宜六味湯內加附子肉桂煎冷與飲始合病源而今止用六味地黃湯者何蓋腎雖寒而胃正熱溫腎之藥必經過胃經熱性發作腎不及救而胃反助其邪火之焰則病熱轉添不若竟用六味地黃湯使其直趨腎宮雖經過胃中不致相犯假道滅虢不平胃而胃自平矣此亦逆治之法也

大吐之人治之不可緩也法當用人參五錢茯苓白朮各三錢甘草三分陳皮一錢豆蔻仁三粒水煎服此方純用健胃補脾之劑而人不知其中奧妙也大吐之後津液已乾如何又用健脾補胃以重燥之得毋傷之太甚耶不知脾胃之氣健而後津液能生苟以潤藥補之則脾胃惡濕反足傷其眞氣所以不用潤劑而反用燥藥也他臟腑惡燥惟脾胃臟腑反惡濕而喜燥以人參白朮投之正投其所好又安有燥烈之虞哉

大吐有寒邪直入腎宮將脾胃之水挾之盡出手足厥逆少腹痛不可忍以火熱之物熨之少快否則寒冷欲死方用附子一箇白朮四兩肉桂一錢乾薑三錢人參三兩救之下喉便覺吐定再進則安然如故蓋腎水養人何能尅心以殺人惟陰寒邪氣直入腎宮則腎火逃避而諸邪扶衆逆犯心君不寧矣所以必用附子肉桂乾薑一派辛辣大熱之物而又必多用人參以定變使諸藥逼剝分布無非春溫之氣自然寒邪散而吐止此方之所以簡而奇也

大吐之證明是虛寒亦有用參至數兩者然而吐不可一類同觀其勢不急不妨少用可以徐加倘寒未深而吐不甚亦以參數兩加之恐增飽滿之證矣

大吐之證虛寒居多然亦有熱而吐者不可不講熱吐者必隨痰而出不若寒吐之純是清水也熱吐不

可用參以二陳湯欲之得宜若寒吐必須加人參兩許而穫以辛熱之品始能止嘔而定吐第人參可以暫用而不可日日服之吐多則傷陰暫服人參止吐則可若日日服之必至陽有餘而陰不足胃中乾燥恐成閉結之證矣所以人參可暫而不可常也

嘔吐之證一時而來亦小證也然而傾胃而吐必傷胃氣胃氣一傷多致不救其證有火有寒火吐宜清火而不可降火寒吐宜歛寒而不可降寒蓋降火則火引入脾而流入於大腸必變爲便血之證降寒則寒引入腎而流入於膀胱必變爲遺溺之證矣我今酌定二方一治火吐名清火止吐湯茯苓一兩人參二錢砂仁三粒黃連二錢水煎服此方解火退熱則嘔吐自止妙在茯苓分消火勢引火緩行於下而非峻歛於下也尤妙人參以扶胃氣則胃土自能勝水不必止吐吐自定也況又有砂仁之止嘔乎所以一劑而吐止耳一治寒吐名散寒止嘔湯白朮二兩人參五錢附子乾薑各一錢丁香三分水煎服此方散寒而仍用補脾健土之藥則寒不能上越而亦不敢下行勢不得不從膀中而外通也一劑亦即奏功如響

胃吐由於脾虛脾氣不下行自必上反而吐補其脾氣則胃氣自安用人參茯苓各三錢白朮五錢甘草肉桂神麯半夏各一錢砂仁三粒水煎服此方乃治脾之藥居多何以用之於胃吐之病反宜也蓋胃爲脾之關關門之沸騰由於關中之潰亂然則欲關外安靜必先關內教寧方中全用補脾之藥則脾氣得令又何患胃口之吐哉況方中又有砂仁半夏神麯等類全是止吐之品有不奏功如神者乎此又脾胃雙治之妙法也

吞酸吐酸治法

吞酸火也泄瀉寒也似乎寒熱殊而治法宜變不知吞酸雖熱由於肝氣之鬱結泄瀉雖寒由於肝木之勝脾然必一方以治木鬱又一方以培脾土則土必大崩而木亦大彫矣不若於一方之中而兩治之方用柴胡車前子各一錢陳皮甘草神麯各五分白芍藥五錢茯苓三錢水煎服二證皆愈此方之絕奇在白芍之妙蓋白芍乃肝經之藥最善舒木氣之鬱木鬱一舒上不尅胃下不尅脾方中又有車前茯苓以分消水濕之氣水盡從小便出何有餘水以吞酸剩汁以泄瀉況又有半夏神麯之消痰化積哉此一治而有分治之功世人未盡知也

肝經之病兩脅脹滿吞酸吐酸等證乃肝木之鬱也正治之法方用白芍五錢柴胡二錢炒梔子茯苓各一錢半夏甘草各一錢神麯五分丹皮三錢水煎服此方之妙妙在用白芍丹皮柴胡也蓋三味乃肝木專經之藥而芍藥尤善平肝不去遠凌脾土上得安而木益舒木舒而氣痛自除吐漸止也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百七十卷目錄

醫部彙考二百五十

嘔吐門三

方一 碧霞丹 集驗方

治吐逆不止

北黃丹四兩用米酢半斤煎乾

右以炭火三秤就銚內煆紅令定爲末粟米飯丸梧子大每服七丸酢湯下

醫部彙考二百五十

嘔吐門三

方一

碧霞丹 集驗方

治吐逆不止

北黃丹四兩用米酢半斤煎乾

右以炭火三秤就銚內煆紅令定爲末粟米飯丸梧子大每服七丸酢湯下

陰陽九 鄧氏小兒方

治諸般吐逆

硫黃半兩 水銀一錢研畢

右薑汁糊丸小豆大三歲三丸冷水下大人三四十丸

赤石脂散 千金翼方

治痰飲吐水無時節者其原因冷飲過度遂令脾胃氣弱不能消化飲食飲食入胃皆變成冷水反吐不停

赤石脂一斤

右搗篩服方寸匕酒飲自任稍加至三匕服盡一斤則終身不吐痰水又不下利補五臟令人肥健

有人痰飲服諸藥不效用此遂愈

又方 救卒方

治胃寒嘔惡不能腐熟水穀食卽嘔吐

人參 丁香 藿香各二錢半 橘皮五錢

生薑三斤

右水二盞煎一盞溫服

人參半夏湯 仲景下同

治食入卽吐

人參一兩 半夏一兩五錢 生薑半斤

右水一斗以杓揚二百四十遍取三升入白蜜三合煮一升半分服

小半夏湯

一名生薑半夏湯治支飲作嘔似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦心下憒憒無奈者

半夏泡七次一升 生薑半斤

右水七升煮一升五合分服

吳茱萸湯

治嘔涎頭痛

吳茱萸一升 大棗二十枚 生薑 人參各一兩

右以水五升煎取三升每服七合日三服

清膈散 病先方 寶方

治胃熱吐食

蟬蛻五十個去泥 滑石一兩

右爲末每服二錢水一盞入蜜調服

半夏加茯苓湯 仲景

治嘔噦眩悸穀不得下

半夏一升 生薑半斤 茯苓三兩

右切以水七升煎一升半分溫服之

葱白湯 千金方 下同

治冷熱膈液發時頭痛悶亂欲吐不得者

葱白二七莖 桃葉一把 眞珠另研 恆山 烏頭 甘草各半兩

右六味㕮咀以水酒各四升和煮取三升去滓內珠末每服一升吐卽止桃葉一作枇杷葉

椒薑湯

治胃中積聚痰飲食減少胃氣不足欬逆嘔吐

蜀椒三合 桂心 附子 甘草各一兩 橘皮 桔梗 茯苓各二兩 半夏三兩 薑汁七合

右九味㕮咀以水九升煮取二升半去滓內薑汁煮取二升分三服服三劑住若欲服大散諸五石丸必先服此湯及進黃芪丸佳一方不用甘草

石膏湯

一名瀉肺湯治心熱實欲吐不出煩悶喘急頭痛
石膏一斤　淡竹葉　香豉各一升　小麥
地骨皮各五兩　茯苓二兩　梔子仁三七枚
右七味㕮咀先以水一斗五升煮小麥竹葉取八升澄清次下諸藥煮取二升去滓分三服

又方
治腹脹善噫食則欲嘔泄瀉溏下口乾四肢重好怒不欲聞人聲忘誤唉痹
黃連二兩　禹餘糧二兩　白朮　乾薑各三兩
大麻子五兩　桑白皮八兩　大棗二十枚
右七味㕮咀以水一斗二升煮取三升分四服

半夏湯
一名小茯苓湯治逆氣心中煩悶氣滿嘔吐氣上
半夏一升　生薑一斤　茯苓　桂心各五兩
右四味㕮咀以水八升煮取二升半分三服若少氣加甘草二兩

前胡湯
治寒熱嘔逆少氣心下堅聚彭亨滿不得食寒熱消渴補不足
前胡　生薑各三兩　甘草　升硝　大黃別浸各二兩　芍藥　茯苓　麥門冬　當歸　半夏
滑石　石膏　苦蘘根　黃芩　附子　人參
右十六味㕮咀以水一斗二升煮取六升分四服

又方
治嘔吐四肢痹冷短氣腹熱三焦不調
前胡　芎藭　甘草　當歸　石膏　人參
桂心　橘皮各二兩　芍藥三兩　半夏四兩
生薑五兩　大棗三十枚
右十二味㕮咀以水一斗二升下黃芩三兩合煮取三升分三服一方不用黃芩

小麥湯
治嘔吐不止
小麥一升　人參　厚朴各四兩　甘草一兩
青竹茹二兩半　生薑汁三合　茯苓三兩
右七味㕮咀以水八升煮取三升去滓分三服

猪苓散
治嘔而腸上寒
猪苓　茯苓　白朮各三兩
右三味治下篩以飲服方寸匕日三渴者多飲水

犀角人參飲子
治嘔逆胃氣虛邪風熱不下食並皆治之
犀角　人參各二兩　薤白五兩　粟米一合
右四味㕮咀以水四升半煮取一升七合下米煮令米熟分四服去相七里久進一服

又方
治春夏時行傷寒寒傷於胃胃冷變嘔
橘皮　桂心　葛根各二兩　白茅根一升
右四味㕮咀以水六升煮取三升分三服服盡更合有熱去桂心

又方
治嘔噦
人參一兩　胡麻仁八合　橘皮去白一兩
枇杷葉八兩
右四味㕮咀以水一斗煮枇杷葉取五升下藥煮取三升內麻仁稍飲之

又方
治氣厥嘔噦不得息
豉一升　半夏八兩　生薑二兩　人參　前胡
桂心　甘草各一兩
右七味㕮咀以水九升煮取三升分三服

又方
治前證
大棗十五枚　附子一枚　橘皮二兩　豉一升
生薑　甘草各一兩
右六味㕮咀以水九升煎取二升分三服日三

橘皮湯
治乾嘔噦若手足厥逆者
橘皮四兩　生薑半斤
右二味㕮咀以水七升煮取三升分三服不止更合服之

又方
治傷寒後噦乾嘔不下食
生蘆根　青竹茹各一升　粳米三合　生薑二兩
右四味㕮咀以水五升煮取二升分三服不止服三劑

又方
治前證
通草　橘皮各二兩　粳米三合　生蘆根一升
右四味㕮咀以水四升煮取一升半分三服

露宿圓
治遇冷氣心下結緊嘔逆寒食不消又主傷寒晨

夜觸寒冷惡氣

附子　烏頭　桂心　礬石各四兩

右四味爲末蜜丸如胡豆大以酒服三丸日二加至十丸藥耐寒冷忌熱食近火宜冷飲食

半夏湯

治肺勞虛寒心腹冷氣逆逆氣胃脘氣滿從胃達背痛噯氣往來嘔逆飲食卽吐虛乏不足

半夏一升　生薑一斤　桂心四兩　甘草

厚朴各二兩　人參　橘皮　麥冬各三兩

右八味咬咀以水一斗煮取四升分四服腹痛加當歸二兩

建中湯

治五勞七傷小腹急痛膀胱虛滿手足逆冷食飲苦吐酸痰吐泄少氣目眩耳聾口焦小便自利

膠飴半斤　黃芪　乾薑　當歸各三兩　人參

半夏　橘皮　芍藥　甘草各二兩　附子一兩

大棗十五枚

右十一味咬咀以水一斗煮取三升半湯成下膠飴烊沸分四服深師有桂心六兩生薑一斤無橘皮乾薑

厚朴湯

治上焦閉塞乾嘔嘔而不出熱少冷多好吐白沫清涎吞酸

厚朴　茯苓　芎藭　白朮　元參各四兩

桔梗　附子　人參　橘皮各三兩　生薑八兩

吳茱萸八合

右十一味咬咀以水二斗煮取五升分爲五服

止嘔人參湯

治下焦熱氣逆不續嘔吐不禁名曰走哺

人參　葳蕤　黃芩　知母　茯苓各三兩

生薑根　梔子仁　白朮炒　橘皮各四兩

石膏八兩

右十味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服

茱萸湯 仲景下同

治嘔而胃滿者

吳萸一升　人參三兩　生薑六兩　大棗十二枚

右四味以水五升煮取三升溫服七合日三服

四逆湯

治嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治

附子一枚生用　乾薑一兩五錢　甘草一兩炙

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服

強人可大附子一枚乾薑三兩

附子粳米湯

治腹中寒氣雷鳴切痛胃脘逆滿嘔吐

附子一枚炮　半夏　粳米各半升　甘草一兩

大棗十枚

右五味以水八升煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

五苓散

治瘦人臍下有悸吐涎沫而癲眩

澤瀉一兩一分　猪苓　茯苓　白朮各三分

桂二分去皮

右五味爲末白飲服方寸匕日三服多飲暖水汗出愈

桂苓五味甘草去桂加乾薑細辛半夏湯

治支飲胷而嘔者

茯苓四兩　甘草　細辛　乾薑各二兩　五味半夏各半升

右六味以水八升煮取三升去滓溫服半升日三

半夏瀉心湯

治嘔而腸鳴心下痞者

半夏半升洗　黃連一兩　黃芩　乾薑　人參甘草炙各三兩　大棗十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日三服

黃芩加半夏生薑湯

治乾嘔而利者

黃芩　生薑各三兩　甘草二兩炙　芍藥一兩

半夏半升　大棗十二枚

右六味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜一服

小柴胡湯

治嘔而發熱者

柴胡半斤　半夏半升　黃芩　人參　生薑甘草各三兩　大棗十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

大半夏湯

治胃反嘔吐者

半夏二升洗　人參三兩　白蜜一升

右三味以水一斗二升和蜜揚之二百四十遍煮

藥取二升半溫服一升餘分再服

大黃甘草湯

治食已卽吐者

大黃四兩　甘草一兩

右二味以水三升煑取一升分溫再服

茯苓澤瀉湯

治胃反吐而渴欲飲水者

茯苓半斤　白朮三兩　澤瀉　生薑各四兩

甘草　桂枝各二兩

右六味以水一斗煑取三升內澤瀉再煑取二升半溫服八合日三服

半夏乾薑散

治乾嘔吐逆吐涎沫

半夏　乾薑各等分

右二味杵爲散取方寸匕漿水一升半煎取七合頓服之

橘皮竹茹湯

治噦逆者

橘皮二斤　生薑半斤　竹茹二升　甘草五兩

大棗三十枚　人參一兩

右六味以水一斗煮取三升溫服一升日三服

甘草粉蜜湯

治吐蚘

甘草二兩　粉一兩　蜜四兩

右三味以水三升先煑甘草取二升去滓內粉蜜攪令和煎如薄粥溫服一升差卽止

烏梅圓

治蚘厥吐蚘

烏梅三百個　細莘　附子炮　桂枝　人參

黃蘗各六兩　乾薑十兩　黃連一斤　當歸

川椒去汗各四兩

右十味異搗篩合治之以苦酒浸烏梅一宿去核蒸之五升米作飯熟搗成泥和藥令相得內臼中與蜜杵二千下丸如梧子大先食飲服十丸日三服稍加至二十丸禁生冷滑臭等物

養胃丹 中藏經

治脾胃不和全不思食中脘停寒嘔逆惡心臟寒泄利腹痛腸鳴常服溫中養胃散卽思食

丁香一兩半　人參三分　甘草炙　白豆蔻仁

半夏麴各半兩　乾薑三兩炮 乾生薑尤佳

右同爲細末煉蜜爲丸每兩作十丸每服一丸溫湯化下空心食前服之或細嚼湯下亦可

丁香茱萸湯 東垣下同

治胃虛嘔噦吐逆膈咽不通

乾生薑　黃蘗各二分　丁香　炙甘草　柴胡

橘皮　半夏各五分　升麻七分　吳茱萸

草豆蔻　黃芪　人參各一錢　蒼朮二錢

當歸身一錢五分

右件剉如麻豆大每服半兩水二盞煎至一盞去柤稍熱服食前忌冷物

白朮湯

一名茯苓半夏湯治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐是風邪羈絆於脾胃之間當先實其脾胃

炒神麴二錢　陳皮　天麻各三錢　白朮

白茯苓　麥蘗麴炒黃色　半夏各五錢

右㕮咀每服五錢水二盞入生薑五片同煎至一盞去柤稍熱服之

補肝湯

一名柴胡半夏湯治素有風證不敢見風眼澀頭痛眼黑胷中有痰惡心兀兀欲吐遇風便覺皮肉緊手足難舉重物如居暖室少出微汗其證乃減再或遇風卽復

柴胡　升麻　藁本各五分　白茯苓七分

炒神麴　蒼朮各一錢　半夏二錢　生薑十片

右爲粗末都作一服水一大盞煎至半盞去柤稍熱服

皂角化痰丸

治勞風心脾壅滯痰涎盛多喉中不利涕唾稠黏嗌塞吐逆不思飲食或時昏憒

皂角木白皮酥炙　白附子炮　半夏湯洗七次

南星炮　白礬枯　赤茯苓去皮　人參各一兩

枳殼炒二兩

右爲細末生薑汁麪糊爲丸如梧桐子大每服三十丸溫水送下食後

上二黃丸

治傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不安

黃芩二兩　黃連酒浸一兩　甘草二錢　升麻

柴胡各三錢

右爲極細末湯浸蒸餅爲丸如菉豆大每服五七十丸白湯送下量所傷服之一方加枳實麩炒去穰五錢

丁香半夏丸 溯生方下同

治宿寒在胃嘔吐吞酸

丁香不見火一兩　乾薑炮　半夏湯泡七次　橘紅各二兩　白朮一兩半

右爲細末生薑自然汁打糊爲丸如梧桐子大每服五十丸淡薑湯送下食前

大藿香散

治憂愁思慮悲恐驚七情傷感氣鬱於中變成嘔吐或作寒熱眩運痞滿不進飲食

藿香葉　半夏麴　白朮　木香不見火各一兩　白茯苓　人參　梔子劑炒　枇杷葉拭去毛　官桂不見火　甘草炙各半兩

右爲細末每服三錢水一大盞生薑五片棗子一枚煎至七分去滓溫服不拘時候

旋覆花湯

治中脘伏痰吐逆眩運

旋覆花去梗　半夏湯泡七次　陳皮去白　乾薑炮各一兩　甘草炙　檳榔　白朮土炒　人參各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至七分去滓溫服不拘時候

竹茹湯

治胃受邪熱心煩喜冷嘔吐不止

葛根三兩　半夏湯泡七次二兩　甘草炙一兩

右㕮咀每服五錢水二盞入竹茹棗許大薑五片煎至七分去滓取清汁微冷細細服不拘時候

玉浮丸

治男子婦人脾胃虛弱一切嘔吐及久新翻胃不問得病之由皆可服之眞良方也

人參　白朮　乾薑炮　丁香　肉豆蔻麪裹煨　橘紅　白豆蔻仁　麥蘗炒　附子炮去皮臍　木香不見火　南星炮　檳榔　半夏湯泡七次　甘草炙

右等分爲細末每服二錢入生薑一錢和勻生薑白然汁搜和丸如梧桐子大人百沸湯煮令浮取出每用淡薑湯吞下不拘時候病甚者不過三服惡熱藥者去附子大便祕者去肉豆蔻

胃丹

治眞陽衰虛心火怯弱不養脾土沖和失布中州虛寒飲食不進胃脘痞塞或不食而脹滿或已食而不消痰逆惡心翻胃吐食臟氣虛寒米穀不化心腹絞痛泄利不止一切脾胃諸疾

硃砂大塊不夾石者五十兩　人參　縮砂仁　肉豆蔻麪裹煨　紅豆　葶藶炒　白豆蔻仁　高良薑劑炒　附子炮去皮臍　藿香葉　白朮　厚朴薑汁炒　丁香不見火　五味子　乾薑炮　胡椒　益智仁　橘紅　麥冬　草果仁各四兩

右將人參等二十味各如法修製劑如豆大以銀鍋一口用白沙蜜五斤將藥一半同蜜拌勻入銀鍋內以夾生絹袋盛貯硃砂懸胎入銀鍋內以桑柴火重湯煮四日四夜換蜜五斤入煎藥一半和勻再煮三日三夜取砂淘淨焙乾入乳鉢用玉鎚研直候十分細米粽爲丸如葉豆大陰乾每服十粒加至十五粒空心食前用人參湯送下棗湯亦得嘔吐用淡薑湯送下忌食猪羊血

大半夏湯

治嘔吐

半夏　陳皮　茯苓各二錢半

右㕮咀水二盞薑二錢半煎八分食後服

沉香降氣湯

治二焦痞滿滯氣不宣心腹痛滿嘔吐痰沫五噎五膈

沉香　木香　丁香　藿香葉　人參　甘草　白朮各一兩　肉豆蔻　桂花　檳榔　陳皮　砂仁　川薑炮　枳實炒　白檀各二兩　青皮　白茯苓　白豆蔻

右每服三錢水煎入鹽少許

鹽煎散

治男子婦人一切冷氣攻衝胃脘刺痛不已及脾胃虛冷嘔吐泄瀉膀胱小腸氣婦人血虛痛

羌活　砂仁　甘草炙　茯苓　草果　川芎　肉豆蔻煨　茴香　華澄茄　麥芽炒　檳榔　良薑油炒　枳殼炒　厚朴　陳皮　蒼术各等分

右用水煎加鹽少許

分氣紫蘇飲

治脾胃不和氣逆喘促心下脹滿嘔逆不食五味子　桑白皮　茯苓　甘草炙　草果　腹皮　陳皮　桔梗各一斤　紫蘇十五兩

右剉每服四錢水煎薑三片入鹽少許

勻氣散

治氣滯不勻胃腸虛痞宿食不消心腹刺痛脹滿

噎塞嘔吐惡心調脾胃進飲食
生薑　沉香　丁香　檀香　木香各一兩
藿香　甘草炙各四兩　砂仁　白果仁各二兩
右爲末每服二錢沸湯調下或水煎服
快氣散
治一切氣心腹脹痛胃脘噎塞噫氣吞酸胃中痰逆嘔吐及宿酒不解
砂仁　甘草炙　香附　生薑
右爲末鹽湯調下
化氣湯
治一切氣逆胃脘噎塞心脾卒痛嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣
沉香　胡椒各一兩　縮砂仁去殼　桂心
木香各二兩　陳皮炒　乾薑炮　莪朮炮
青皮去穰炒　茴香炒　甘草　丁香皮各四兩
右爲末每服二錢薑蘇鹽湯調下婦人淡醋湯下
參苓白朮散
治脾胃虛弱飲食不進或致嘔吐泄瀉及大病後調助脾胃
山藥　白茯苓　人參　白朮各二斤　蓮子
砂仁　白扁豆炒　桔梗　薏苡炒黃各一斤
甘草炙三斤
右爲末每服二錢煎棗湯調下
丁香煮散良方
治脾胃虛冷嘔吐不食
丁香　乾薑炮　川烏炮去臍　甘草炙各半錢
紅豆去皮　良薑炒　青皮　胡椒各一錢
陳皮二錢　益智去皮三錢
右作一服水二鍾生薑三片鹽一捻煎至一鍾不拘時服
藿香半夏散
治胃虛中寒停痰留飲嘔吐噦逆
藿香二錢　半夏湯泡七次炒黃色三錢半
丁香皮一錢半
右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾食前服
丁附治中湯
治胃寒停痰嘔吐不已
丁香　青皮炒　陳皮　白朮煨　人參各二錢
附子炮　甘草炙各一錢　乾薑炮半錢
右作一服水二盞生薑五片煎至一鍾空心服
沉香煎丸
治嘔吐除中滿痞氣痰逆惡心臟腑不調
沉香　硫黃別研水飛　檳榔麪裹煨　胡椒
沒藥別研　丹砂別研水飛　良薑　丁香
硇砂別研水飛熬　青皮去白炒　木香各一兩
縮砂去皮　巴豆去皮心膜新瓦上壓去油一分
阿魏醋浸開用白麪和作餅炙焦別研爲末
吳茱萸陳久者湯浸取沉者炒各半兩
右除別研藥外餘藥爲細末入別研藥研勻煉蜜和丸如菉豆大磁盒盛貯封每服二丸食前臨臥用溫生薑橘皮湯下量人虛實大小加減
丁香丸
治因食冷物凝滯胃間嘔吐不止
大丁香半兩　乾薑　肉桂各二錢　木香
胡椒　藿香　甘草炙各三錢
右爲細末湯浸蒸餅和丸如菉豆大焙乾時時乾嚼不必飲湯水入即愈吐如覺痰弱更加附子隨意
大養胃湯
治飲食傷脾宿食不化朝食暮吐暮食朝吐上氣復熱四肢冷瘧二焦不調及胃虛寒氣在下二氣並爭但出不入嘔不得食
厚朴去皮　生薑各二兩　白朮　山藥　人參
川芎　橘皮　當歸　五味子　藿香　黃芪
枇杷葉刷去毛炙薑汁炙　甘草炙各一兩
肥棗三兩同厚朴生薑三味炒
右㕮咀每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚煎七分去滓空心服或爲細末米湯調下亦可
十珍餅子
治大人小兒嘔吐痰涎粥藥難停無問久新皆治
丁香　沉香　官桂去粗皮　藿香　肉豆蔻
吳茱萸湯洗焙乾　木香各半兩　水銀結砂子
舶茴香各七錢　半夏湯洗七次焙乾薑汁製一兩
右爲細末煉蜜和丸如小豆大捏作餅子每服十餅不拘時生薑湯下或化服亦得量病加減
助胃膏
治嘔吐不食
人參　白朮　茯苓　橘皮　縮砂仁各一分
丁香　木香　肉豆蔻煨　草果仁各一錢半
白豆蔻仁一錢
右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸生薑煎

湯化下

炮附子丸

治胃脘有熱胃中有寒嘔吐不止

附子炮去皮臍

右爲細末以麪糊和丸如梧桐子大就濕以大黃末爲衣每服十丸加至二十丸薑湯送下

加味二陳湯

治胃熱嘔吐不已

半夏湯炮七次　陳皮各半兩　白茯苓三錢

甘草一錢半　刮筆竹青四錢

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至七分去滓不拘時啜服

麥門冬湯

療煩熱嘔逆食下則出

麥門冬　青竹茹各三兩　茅根　生薑各五兩

人參　甘草炙各一兩

右切以水七升煮取二升五合分溫三服如人行五里進一服不吐利忌海藻菘菜

加味七氣湯

治氣鬱嘔吐

半夏製二兩半　人參　厚朴製　肉桂各一兩

茯苓一兩半　甘草炙半兩

右㕮咀每服三錢半生薑七片棗一枚煎至七分去滓服加木香煎亦得

小丁沉丸

治乾嘔和調胃氣

丁香　檳香子炒各半兩　木香各半兩　沉香

縮砂仁　白芷炒　益智仁　甘草炙　橘紅焙

生薑一斤細切入青鹽四兩淹一宿焙乾各一兩

阿魏一分用酢半升熬成膏

右爲細末入阿魏膏拌勻用酢煮麪糊和丸如鷄頭實大研丹砂麝香細末各少許同爲衣每服一丸細嚼用薑鹽湯送下空心服

草豆蔻湯

治乾嘔和胃下氣

草豆蔻去皮　藿香　枳殼去瓤麩炒　白朮

橘紅焙　山芋各半兩　桂心　丁香各一分

右㕮咀每服三錢水一盞棗二枚擘破粟米少許同煎至七分去滓食前溫服

生薑丸

治乾嘔惡心益津液和胃氣

生薑二斤和皮切以青皮三兩同淹一宿焙乾

甘草炙　陳皮湯浸去白焙乾各四兩　香白芷

縮砂仁去皮　胡椒各一兩　蓬朮炮二兩

右爲細末以麪糊和丸如小彈子大用丹砂細末爲衣每服一丸細嚼溫酒送下食前服

溫中白朮丸

治胃寒嘔噦

白朮炒三兩半　半夏二兩製　乾薑一兩

丁香半兩

右爲細末生薑汁煮糊和丸如梧桐子大每服三十丸不拘時生薑湯送下

思食丸

助脾胃消飲食止嘔逆

烏梅肉五錢　神麯炒　麥蘗炒各六錢　人參

乾薑炮　甘草炙各二錢

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三五十丸食前用米飲湯送下

參香枳朮丸

開胃進食止嘔吐

人參　木香各三錢　枳實炒一兩　陳皮四錢

白朮一兩半　乾生薑二錢半

右爲細末用荷葉包米煨飯和丸如梧桐子大每服五七十丸不拘時用米湯送下

開胃丸

治乾嘔氣逆不止

半夏麴微炒二兩　人參一兩半　白豆蔻去皮

陳皮去白焙　白朮各一兩

右爲細末用生薑汁同棗肉和丸如梧桐子大每服二十丸加至二十丸不拘時用粥飲送下

參粟湯

治乾嘔不下食

人參一兩　陳粟米一兩半　生薑切碎五兩

半夏湯泡七次去滑四兩用生薑同搗碎焙乾

右同入銀石鍋中慢火焙令焦黃粗搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗二枚去核煎至七分去滓微熱空心服

三聖散

治噦逆不食

半夏七枚大者線穿於井華水內浸一日一換水七日取出焙乾　丁香四十九粒　胡椒四錢

右爲細末大人用生薑湯調一字小兒筯頭蘸生薑汁後點藥少許口中立愈至甚者不過三服

丁香附子散

治脾胃虛弱胷膈痞結吐逆不止

母丁香四十九箇　生薑半斤取自然汁半碗

附子一兩

右用附子鑽孔四十九以丁香刺上面塡內將生薑汁用文武火熬盡又用大蘿蔔一箇取一穴子入附子又塡內將蘿蔔蓋之又用文武桑柴火燒香熟爲度取出切附子作片子焙乾搗爲細末每服一錢米湯一盞調下日進三服

紫沉丸

治中焦吐食由食積爲寒氣相假故吐而痛宜服之

半夏麴　代赭石　縮砂仁各三錢　烏梅去核

丁香　檳榔各二錢　杏仁去皮尖　沉香

木香　白朮各一錢　陳皮五錢　白豆蔻

巴豆霜另研各半錢

右爲細末入巴豆霜令勻酢糊丸黍米大每服五十丸吐愈則止治小兒食積吐食大妙

五積丹

治心腹痞滿嘔吐不止破積聚者

皂莢一鋌一尺二寸燒留性盆合土壅勿令出烟

巴豆十二箇白麪一兩五錢同炒令黃色爲度

右爲末酢麪糊爲丸菉豆大每服十丸鹽湯下食後加減

桔梗湯

治上焦氣熱上衝食已暴吐脈浮而洪宜先和中

白朮一兩半　桔梗　橘紅　枳實麩炒　茯苓

厚朴薑製炒香各一兩　半夏麴二兩

右㕮咀每服一兩水一盞煎至七分取清溫服調木香散二錢隔夜空腹食前服之三服之後氣漸下吐漸止然後用木香散加芍藥二兩黃芪一兩半每料中抑算加上件分兩依前服之病愈則已如大便燥結食不盡下以大承氣湯去硝微下之少利爲度再服前藥補之如大便復結又依前再微下之

木香散

治氣逆嘔吐

木香　檳榔各等分

右爲細末煎服調服

荊黃湯

治暴吐者上焦氣熱所衝也經曰諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於火脈洪而浮

荊芥一兩　人參五錢　甘草二錢半　大黃三錢

右爲粗末都作一服水二盞煎至一盞去滓調檳榔散二錢空心服

檳榔散

治氣逆嘔吐

檳榔二錢　木香一錢半　輕粉少許

右爲細末用前藥調服如爲丸亦可用水浸蒸餅爲丸如小豆大每服二十丸食後服

青鎮丸

治上焦吐頭發痛有汗脈弦

柴胡二兩去苗　黃芩七錢半　甘草　人參

半夏湯洗各半兩　青黛二錢半

右爲細末薑汁浸蒸餅爲丸如桐子大每服五十丸生薑湯食後服

白朮湯

治胃中虛損有痰而吐

半夏麴半兩　白朮　木香　甘草各二錢

檳榔二錢半　茯苓二錢

右六味同爲細末每服二錢煎生薑湯調下食前吐而食脈弦者肝盛於脾而吐乃由脾胃之虛宜治風安胃之藥

金花丸

治痰食嘔吐

半夏湯洗一兩　檳榔二錢　雄黃一錢半

右爲細末薑汁浸蒸餅爲丸如桐子大小兒另丸生薑湯下從少至多漸次服之以吐爲度藕絆於脾故飲食自下

附子丸

治下焦吐食朝食暮吐暮食朝吐大便不通

附子炮五錢　巴豆霜一錢　砒一分

右同研極細鎔黃蠟爲丸桐子大每服二丸冷水送下利爲度後更服紫沉丸常服不令再閉

白朮散

治酒積嘔噦

白朮　茯苓去皮　人參　藿香葉各五錢

炙甘草一兩半　木香一分　葛根一兩

右爲末白湯調下二錢煩渴者加滑石二兩甚者

加薑汁攪勻飲之

乾薑芩連人參湯（人門下同）

治傷寒食入即吐

乾薑　黃芩　黃連　人參各三錢

水煎溫服

羌活附子湯

治陰證寒厥嘔逆

羌活一錢　大附子半枚炮　茴香　丁香

乾薑各一錢半

右水煎入鹽一撮熱服

大橘皮湯

治嘔逆胃滿虛煩不安

橘皮　甘草各二錢　人參五錢

右薑七片水煎服

小橘皮湯

治嘔而手足厥冷者

陳皮五錢　生薑一兩

右水煎溫服

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百七十一卷目錄

醫部彙考二百五十一

嘔吐門四

方二 藿香安胃散 藿香散 大七香丸 小七香丸 木香餅子 參朮調中湯 嗽

嗽湯 四味藿葉湯 古參黃湯 古丁夏湯 單人參湯 單白蔻散 金水六君煎 和胃二陳湯 苓朮二陳煎 和胃飲 排氣湯 大和中飲 小和中飲 大分清飲 小分清飲 神香散 正柴胡飲 柴陳煎 抽薪飲 太清飲 四味回陽飲 六味回陽飲 理陰煎 溫胃飲 參蘆飲 黃芽丸 一炁丹 溫臟丸 聖朮煎

單方

鍼灸

導引

醫案

藝術典第二百七十一卷

醫部彙考二百五十一

嘔吐門四

方二

藿香安胃散 寶鑑下同

治脾胃虛弱不進飲食嘔吐不得腐熟

人參　丁香各一錢　藿香七分半　陳皮二錢半

右爲末每服二錢水二盞生薑三片煎至一盞去查凉服

藿香散

溫脾胃化痰飲消宿冷止嘔吐治胷膈痞悶腹脅脹痛短氣噎悶欬嘔痰水噫酢吞酸噦逆惡心山嵐瘴氣

厚朴薑製　半夏炮　藿香葉　陳皮去白

炙甘草各等分

右五味㕮咀每服二錢水一盞薑三片棗子一箇煎至七分去滓溫服無時日三服

大七香丸

治脾胃虛冷心膈噎塞漸成膈氣脾泄瀉痢反胃嘔吐

香附子二兩　麥蘖一兩　丁香三兩半　藿香

縮砂仁　官桂　甘草　陳皮各二兩半　甘松

烏藥各六錢

右十味爲末蜜丸彈子大每服一丸鹽酒鹽湯任嚼下忌生冷肥膩物

小七香丸

溫中快膈化積和氣治中酒嘔逆氣膈食噎茶酒食積小兒疳氣

甘松八兩　益智仁六兩　香附子　丁香皮

甘草各十二兩　蓬朮　縮砂各二兩

右爲末蒸餅爲丸菉豆大每服二十丸溫酒薑湯熟水任下

木香餅子

快氣消食利胷膈化痰涎止宿酒痰嘔吐噦惡心

木香　官桂去皮　薑黃　香附炒去毛　川芎

香白芷　甘松　縮砂仁各二兩　甘草炙半兩

右九味爲末水和捏成餅子每服十數餅細嚼薑湯送下不拘時候

參朮調中湯

治內傷自利臍腹痛肢體倦不喜食食即嘔嗜臥懶言足胻冷頭目昏

人參　黃芪各五錢　當歸身　厚朴薑製

益智仁　草豆蔻　木香　白朮　甘草炙

神麴炒　麥蘖麴　橘皮各三錢

右十二味剉如麻豆大每服一兩水二盞薑三片煎至一盞去滓溫服食前

鐵刷湯

治積寒痰飲嘔吐不止胷膈不快不下飲食

半夏四錢湯泡　草豆蔻　丁香　乾薑炮

訶子皮各三錢　生薑一兩

右六味㕮咀水五盞煎至二盞半去柤分三服無時大吐不止加附子三錢生薑半兩

四味藿葉湯

治胃寒嘔吐粥藥不停

藿香　人參　橘皮　半夏各等分

右薑煎溫服

古參黃湯

治氣虛胃寒嘔吐冷涎陰證乾嘔通用

吳茱萸　人參各等分

右薑棗煎服

古丁夏湯

治脾中虛寒停痰留飲噦逆嘔吐

丁香　半夏各三錢

右薑煎溫服
單人參湯
治氣逆嘔吐
人參三兩
右用水三盞煎至八分熱服兼以參渣煮粥食若卒吐嘔逆粥飲入口即吐困弱者爲丸服之調胃亦宜
單白蔻散
治胃冷有積喫食欲吐者
白豆蔻五錢
右爲末好酒調服
金水六君煎（原缺全書下同）
治肺腎虛寒水泛爲痰嘔吐等證
當歸　半夏　茯苓各二錢　熟地三五錢
陳皮一錢半　炙甘草一錢
水二鍾生薑三五七片煎七八分食遠溫服
和胃二陳湯
治胃寒生痰惡心嘔吐胃膈滿悶噯氣
乾薑炒一二錢　砂仁四五分　陳皮　半夏
茯苓各一錢半　甘草炙七分
水一鍾半煎七分不拘時溫服
苓术二陳煎
治痰飲水氣停蓄心下嘔吐吞酸等證
猪苓　澤瀉　茯苓各一錢半　半夏二三錢
炙甘草八分　乾薑炒黃　白术各一二錢
陳皮一錢
水一鍾半煎服如肝腎兼寒者加肉桂一二錢

和胃飲
治寒濕傷脾霍亂吐瀉及痰飲水氣胃脘不清嘔惡脹滿腹痛等證此卽平胃散之變方也凡嘔吐等證多有胃氣虛者一聞蒼术之氣亦能動嘔故以乾薑代之
陳皮　厚朴薑汁製各一錢半　乾薑炮一二錢
炙甘草一錢
水一鍾半煎七分溫服此方凡藿香木香丁香茯苓半夏扁豆砂仁澤瀉之類皆可隨宜增用之若胃腹有滯而兼時氣寒熱者加柴胡
排氣湯
治氣逆食滯脹痛嘔吐等證
陳皮　藿香　枳殼各一錢五分　香附　澤瀉
烏藥各二錢　木香七分或一錢　厚朴一錢
水一鍾半煎七分熱服
大和中飲
治飲食酒滯積聚嘔吐等證
陳皮一二錢　枳實一錢　砂仁五分　山楂
麥芽各二錢　澤瀉　厚朴各一錢半
水一鍾半煎七八分食遠溫服
小和中飲
治胃腸脹悶嘔吐等證
陳皮　茯苓　厚朴各一錢五分　山楂肉
扁豆炒各二錢　甘草五分
水一鍾半加生薑三五片煎服
大分清飲
治積熱閉結小水不利嘔吐等證
茯苓　澤瀉　木通各二錢　猪苓　枳殼
梔子或倍之　車前子各一錢
水一鍾半煎八分食遠溫服
小分清飲
治小水不利濕滯嘔吐膨脹不能受補等證
茯苓　澤瀉　猪苓各二三錢　薏仁二錢
枳殼　厚朴各一錢
水一鍾半煎七八分食前服
神香散
治胃脘逆冷難解疼痛嘔噦脹滿痰飲腸癖諸藥不效者惟此最妙
丁香　白豆蔻或砂仁亦可
二味等分爲末清湯調下五七分甚者一錢日數服不拘
正柴胡飲
凡外感風寒發熱惡寒頭疼身痛嘔吐等證
柴胡一二三錢　防風　甘草各一錢　陳皮一錢半　芎藭二錢　生薑三五片
水一鍾半煎七八分熱服
柴陳煎
治傷風兼寒欬嗽發熱痞滿多痰嘔吐等證
柴胡二三錢　陳皮一錢半　甘草一錢　半夏
茯苓各二錢　生薑三五七片
水一鍾半煎七分食遠溫服
抽薪飲
治諸凡嘔吐火熾盛而不宜補者
黃芩　石斛　木通　梔子炒　黃檗各一二錢

細甘草三分　枳殼　澤瀉各錢半
水一鍾半煎七分食遠溫服內熱甚者令服更佳

太清飲

治胃火煩熱發斑嘔吐等證與白虎湯出入酌用
知母　石斛　木通各一錢半　石膏生用五七錢
水一鍾半煎七分溫服或冷服或加麥門冬

四味回陽飲

治嘔吐元陽虛脫危在頃刻者
人參一二兩　製附子　炮乾薑各二三錢
炙甘草一二錢
水二鍾武火煎七八分溫服徐徐飲之

六味回陽飲

治嘔吐陰陽將脫等證
人參一二兩或數錢　炙甘草一錢　製附子
炮乾薑各二三錢　熟地五錢或一兩　當歸身三錢（濕瀉或動血者只冬木代）
水二鍾武火煎七八分溫服

理陰煎

治真陰虛弱脹滿嘔噦痰飲惡心吐瀉腹痛等證
熟地三五七錢或一二兩　炙甘草一二錢
當歸二三錢或五七錢　乾薑炒黃色一二三錢
或加肉桂一二錢
水二鍾煎七八分熱服

溫胃飲

治中寒嘔吐吞酸泄瀉不思飲食及婦人臟寒嘔惡胎氣不安等證
人參一二三錢或一兩　白朮炒一二錢或一兩
扁豆炒二錢　陳皮一錢或不用　炙甘草一錢
乾薑炒焦一二三錢　當歸一二錢（滑泄者勿用）
水二鍾煎七分食遠溫服

參薑飲

治脾胃肺氣虛寒嘔吐欬嗽氣短小兒吐乳等證
乾薑炮五分或一二錢或用煨生薑三五片
人參三五錢或倍之　炙甘草三五分
水一鍾半煎七八分徐徐服之

黃芽丸

治脾胃虛寒或飲食不化或時多脹滿泄瀉吞酸嘔吐等證
人參二兩　焦乾薑三錢
煉白蜜爲丸芡實大常嚼服之

一炁丹

治脾胃虛寒嘔吐等證
人參　製附子各等分
煉白蜜丸如菉豆大每用滾白湯送下三五分或一錢凡藥餌不便之處或在途次隨帶此丹最妙

溫臟丸

治吐蚘
人參隨宜（無亦可）　白朮米泔浸炒　當歸各四兩
芍藥酒炒焦　茯苓　細榧肉　史君子煨取肉
川椒去合口者炒出汗　檳榔各二兩　乾薑炮
吳茱萸湯泡一宿炒各一兩
右爲末神麴糊爲丸梔子大每服五七十丸或百丸餵時白湯下

聖朮煎

治寒濕瀉利嘔吐尤爲聖藥
冬白朮五六七八錢炒或一二兩　乾薑炒
肉桂各一二錢　陳皮酌用（或不用）
水一鍾半煎七分溫熱服

單方

嘔吐陽厥卒死者飲新汲水三升佳（千金方）
心痛吐水不下飲食發止不定雌黃二兩酢二斤慢火煎成膏用乾蒸餅和丸梧子大每服七丸薑湯下（聖惠方）
暴得吐逆不下食生滑石末二錢匕溫水服仍以細麪半盞壓定（范氏衍義）
胃弱嘔逆不食用草豆蔻仁二枚高良薑半兩水一盞煮取汁入生薑汁半合白麪作撥刀以羊肉臛汁煮熟空心食之（普濟方）
口吐清水乾蘄艾煎湯啜之（怪證奇方）
食已即吐大黃四兩甘草二兩水三升煮一升半分再服（千金方）
嘔逆厥逆內有寒痰半夏一升洗滑焙研小麥麪一升水和作彈丸水煮熟初吞四五枚日三服稍增至十五枚旋煮旋吞覺病減再作忌羊肉餳糖此乃許仁則方也（外臺）
乾嘔不息葛根搗汁服一升瘥（肘後方）

嘔啘不止白脂麻一大合清油半斤煎取三合去麻溫服（近效方）

嘔逆不止麻仁杵熬水研取汁著少鹽喫立效李諫議常用極妙（外臺秘要）

中酒嘔逆赤小豆煑汁徐徐服之（食鑑本草）

嘔逆不止眞火酒一杯新汲井水一杯和服甚妙（頓潮）

乾嘔厥逆頻嚼生薑嘔家聖藥也

嘔吐不止生薑一兩酢醬二合銀器煎取四合連滓呷之又殺腹內長蟲（食醫心鏡）

頭運吐逆胃冷生痰也用川乾薑炮二錢半甘草炒一錢二分水一鍾半煎減半服累用有效（傳信適用方）

嘈雜吐水眞橘皮去口爲末五更安五分於掌心舐之卽睡三日必效皮不眞則不驗（怪證奇方）

嘔吐痰水白檳榔一顆煨熟橘皮二錢半炙爲末水一盞煎半盞溫服（千金方）

酢心吐水檳榔四兩橘皮一兩爲末每服方寸匕空心生蜜湯調下（梅師方）

嘔啘厥逆蘡薁藤煎汁呷之（肘後方）

乾嘔不息蔗汁溫服半升日三次入薑汁更佳（肘後方）

胃冷嘔逆氣厥不通母丁香三箇陳橘皮一塊去白焙水煎熱服（十便良方）

痰壅嘔逆心胷滿悶不下飲食厚朴一兩薑汁炙黃爲末非時米飲調下二錢匕（聖惠方）

嘔逆不食訶黎勒皮二兩炒研糊丸梧子大空心湯服二十丸日三服（廣濟方）

天行嘔逆食入卽吐雞子一枚水煑三五沸冷水浸少頃吞之（外臺）

吐逆不止不拘男女連日粥飲湯藥不能下者卽效五靈脂治淨爲末狗膽汁和丸芡子大每服一丸煎生薑酒磨化猛口熱吞不得漱口急將溫粥少許壓之（經驗）

脾虛吐食羊肉半斤作生以蒜薤醬豉五味和拌空腹食之（心鏡）

天行病後嘔逆食卽反出用青羊肝作生淡食不過三度食不出矣（外臺）

嘔逆酸水羊屎十枚酒二合煎一合頓服未定更服之（兵部千集）

食後喜嘔鹿角燒灰二兩人參一兩爲末薑湯服方寸匕日三（肘後方）

嘔吐酸漿水煎頭垢豆許服一杯效（普濟方）

虛寒嘔噦飲食不下細莘去葉半兩丁香二錢半爲末每服一錢柿蔕湯下

嘔噦不止厥逆者蘆根三斤切水煎濃汁頻飲二升必效若以童子小便煑服不過三升愈（肘後方）

嘔噦不止酢和麪作彈丸二三十枚以沸湯煑熟漉出投漿水中待溫吞三兩枚噦定卽不用再吞未定至晚再吞（兵部千集）

嘔噦心下痞堅生薑八兩水三升煑一升半夏五合洗水五升煑一升取汁同煑一升半分再服（千金方下同）

乾嘔吐逆涎水沫出半夏乾薑各等分二味㕮咀以漿水一升半煑取七合頓服之日三

病人乾嘔取羊乳汁飲一杯

乾嘔酒浸馬原一宿取汁服之

又方煑豉三升飲汁佳

又方空腹飲薑汁一升

惡心取苦瓠瓤幷子一升碎以酒水三升煑取一升頓服須臾吐幷下如蝦蟆衣三升

又方服小便一百日佳

又方麻子一升熬令香熟搗取酒三升熟研濾取一升飲盡日二服盡一石瘥一切病自能飲食不能酒任性多少

治食飲輒吐方頓服生熟湯三升卽止

上氣嘔吐芥子二升爲末蜜丸寅時以井華水服如梧子七丸日二亦可作散空腹服之及以酒浸服

鍼灸

素問曰心熱病者熱爭則卒心痛煩悶善嘔頭痛面赤無汗刺手少陰太陽

脾熱病者先頭重頰痛煩心顏青欲嘔身熱刺足太陰陽明

靈樞曰善嘔嘔有苦長太息心中澹澹恐人將捕之邪在膽逆在胃膽液泄則口苦胃氣逆則嘔苦故曰嘔膽取三里以下胃氣逆則刺少陽血絡以閉膽逆却調其虛實以去其邪

甲乙經曰熱病汗不出而苦嘔煩心承光主之
頭項惡風汗不出悽厥惡寒嘔吐目系急痛引頰頭重項痛玉枕主之
醉酒風熱發兩角脇痛不能飲食頻滿嘔吐率谷主之
傷寒熱盛煩嘔大椎主之
背痛惡寒脊強俛仰難食不下嘔吐多涎扃俞主之
胃脘脹滿背痛惡風寒飲食不下嘔吐不留住魂門主之
振寒瘈瘲手不伸欬嗽唾濁氣扃善嘔鼓頷不得汗煩滿因爲瘈衄尺澤主之左窒刺右窒刺左
熱病煩心而汗不止肘攣掖腫善笑不休心中痛目赤黃小便如血欲嘔胃中熱苦不樂太息喉痹嗌乾喘逆身熱如火頭痛如破短氣胃痛太陵主之
熱病煩心善嘔胃中懽懽善動而熱間使主之
熱病腹滿善嘔煩悶大都主之
熱病汗不出善嘔苦痓身反折口噤善鼓頷腰痛不可以顧顧而有似拔者善悲上下取之出血見血立已
瘧欬逆心悶不得臥嘔甚熱多寒少欲閉戶牖而處寒厥足熱太谿主之
陽厥棲棲而寒少腹堅頭痛脛股腹痛消中小便不利善嘔三里主之
欬而嘔扃寒食不下寒熱皮肉膚痛少氣不得臥胃滿支兩脅扃上兢兢脅痛腹臚胃脘暴痛上氣肩背寒痛汗不出喉痹腹中痛積聚默然嗜臥怠惰不欲動身常濕濕心痛無可搖者脾俞主之
肺系急胃中痛惡寒胃滿悒悒然善噫膽胃中熱喘逆氣相追逐多濁唾不得息肩背風汗出面腹腫扃中食饐不下食喉痹肩息肺脹皮膚骨痛寒熱煩滿中府主之
寒濯濯舌煩手臂不仁唾沫脅乾引飲手腕攣指肢痛肺脹上氣耳中生風欬喘逆痹臂痛嘔吐飲食不下膨膨然少商主之
寒熱欬嘔沫掌中熱虛則肩臂寒慄少氣不足以息寒欬交兩手而瞀時則寒熱饑則煩飽則善面色變口噤不開惡風泣出列缺主之
寒熱善嘔商丘主之
嘔厥寒時有微熱脅下支滿喉痛嗌乾膝外廉痛淫濼脛痠跛下腫馬刀癭肩腫吻傷痛太衝主之
氣疝噦嘔面腫奔脰天樞主之
胃脘背相引心下涸涸嘔吐多唾飲食不下幽門主之
欬逆上氣喘不得息嘔吐胃滿不得飲食俞府主之
胃滿欬逆喘不得嘔吐煩滿不得飲食神藏主之
胃滿嘔無所出口苦舌乾飲食不下膽俞主之
胃脘脹滿痹痛骨疼飲食不下嘔逆氣上煩心紫宮主之
胃脘脹滿扃寒飲食不下嘔吐食復出中庭主之
傷食脅下滿不能展轉反側目青而嘔期門主之
脅下脹滿嘔吐逆陽陵泉主之
胃中寒脹食多身體羸瘦腹中滿而鳴腹臚風厥胃脘脹滿嘔吐脅急痛筋攣食不下胃俞主之
頭痛食不下腸鳴臚脹欲嘔時泄三焦俞主之
食飲不化入腹還出下脘主之
腹中腸鳴盈盈然食不化脅痛不得臥煩熱中不嗜食胃脘脹滿喘息而衝扃嘔心痛及傷飽身黃疾骨羸瘦章門主之
溺難痛白濁卒疝少腹腫欬逆嘔吐卒陰跳腰痛不可以俛仰面黑熱腹中臚滿身熱厥痛行間主之
風眩善嘔煩滿神庭主之如顏青者上星主之取上星者先取懸顱後取天牖風池
頭身風善嘔怵寒中少氣窒中熱腑急腋腫間使主之
凡好太息不嗜食多寒熱汗出病至則善嘔嘔已乃衰即取公孫及井俞實則腸中切痛厥頭面腫起心狂多飲霍則鼓濁腹中氣大滯熱痛不嗜臥霍亂公孫主之
嘔吐煩滿魄戶主之
黃癉善欠脅下滿欲吐譩俞主之
食飲善嘔不能言通谷主之
寒熱頭痛如破目痛如脫喘逆煩滿嘔吐流汗難言兩維主之
肺氣熱呼吸不得臥上氣嘔沫喘氣相追逐胃滿脅膺急息難振慄脈鼓氣膈胃中有熱支滿不嗜食汗不出腰脊痛肺俞主之
氣痛癰小便黃氣滿塞則遺溺身時寒熱吐逆溺難腹滿石門主之
脈經曰左手關前寸口陰絕者無心脈也苦心下毒痛掌中熱時時善嘔口中傷爛刺手太陽經治陽
左手關上陰絕者無肝脈也苦癰遺溺難言脅下有

邪氣善吐刺足少陽經治陽

右手關上陰絕者無脾脈也苦少氣下利腹滿身重四肢不欲動善嘔刺足陽明經治陽

千金方曰期門主目青而嘔

膽輸章門主脅痛不得臥胃滿嘔無所出

章門主心痛而嘔

商丘幽門通谷主喜嘔又云商丘主脾虛冷人病寒不樂好太息多寒熱喜嘔

兪府靈墟神藏巨闕主嘔吐胃滿

率谷主煩滿嘔吐

天容主欬逆嘔沫

胃腧腎腧主嘔吐

曲澤主逆氣嘔涎

中庭中府主嘔逆吐食不還出

石門主嘔吐

陽陵泉主嘔宿汁心下憺憺

維道主嘔逆不止

少商勞宮主嘔吐

絕骨主病熱欲嘔

大鐘太谿主煩心滿嘔

魂門陽關主嘔吐不住多涎

隱白主腸中嘔吐不欲食

腸腧主吐食又灸章門胃腧

巨闕胃堂主吐食

頭維主喘逆煩滿嘔沫流汁

魄戶中府主肺寒熱呼吸不得臥欬逆上氣嘔沫喘氣相追逐

俠白主欬乾嘔煩滿

少海主氣逆呼吸噫噦嘔

巨闕主煩心喜嘔

百會主汗出而嘔痙

商丘主寒熱好嘔

大椎主傷寒熱盛煩嘔

腎腧主頭身熱赤振慄腰中四肢淫漾欲嘔

尺澤主氣隔喜嘔鼓頷不得汗煩心身痛

四肢寒熱腰痠不得俛仰身黃腹滿食嘔舌根直灸第十一椎上及左右各一寸五分三處各七壯

乾嘔灸心主尺澤亦佳

又方灸乳下一寸三十壯

又方乾嘔不止粥食湯藥皆吐不停灸手間使五十壯若四肢厥脈沉絕不止者灸之便通此起死人法

吐逆嘔不得食灸心腧百壯

吐嘔逆不得下食今日食明日吐者灸腸腧百壯

吐變不得下食灸胃堂百壯

吐逆不得食灸巨闕五十壯

吐逆食不住灸胃脘百壯三報

吐逆飲食却出灸脾募百壯三報（章門穴也）

吐嘔宿汁吞酸灸神光一名膽募百壯三報

吐逆霍亂吐血灸手心主五十壯

噫噦嘔逆灸石關百壯

肺脹脅滿嘔吐上氣等病灸上椎并兩乳上第三肋間各止七壯

胃中痛引腰背心下嘔逆面無滋潤灸幽門上隨年壯穴在俠巨闕兩邊相去各半寸一云一寸

脾中風者其人但踞坐而腹滿身通黃吐穢汁出者尚可治急灸脾腧百壯服續命湯若目下青手足青者不可復治

導引

古今醫統曰嘔吐導引法正坐兩手向後捉腕摩肋上下七息左右換手亦然除腹冷宿氣積胃口飲食進退吐逆不下

又法偃臥展脛兩手左跨兩足踵以鼻內氣自極七息除腹中食嘔

又法坐直舒兩脚以兩手攬兩足自極十二通愈腸胃不能受食吐逆以兩手直交兩足底脚痛舒以頭枕膝下自極十二通愈腸胃不能受食吐逆

保生祕要曰吐酸導引法先念背推開至腎其於腎處想木升上頂門滴下心頭以洗之

傷食嘔吐導引法按寅卯辰候空心披衣起牀正身直立雙手用力拿兩肘膊脚尖著地脚跟雙懸起倒力舂二九之數醉飽勿令恐傷臟腑

醫案

衛生寶鑑曰中書左丞相史公年六旬有七至元丁卯九月間因內傷自利數行覺肢體沉重不思飲食嗜臥懶言語舌不知味膈中疼痛頭亦痛而惡心醫以通聖散大作劑料服之覆以厚衣遂大汗出前證不除而反增劇易數醫四月餘不愈予被召至燕命予治之予診視得六脈沉細而微弦不欲食食即嘔吐中氣不調滯于升降口舌乾燥頭目昏眩肢體倦怠足脈冷臥不欲起丞相素不飲酒肢體本瘦又因內傷自利又復發汗是重竭津液脾胃愈虛不能滋榮周身百脈故使然也非甘辛大溫之劑則不能溫養其氣經云脾欲緩急食甘以緩之又脾不足者以甘補之黃芪人參之甘補脾緩中故以爲君形不足者溫之以氣當歸辛溫和血潤燥木香辛溫升降滯氣生薑益智草豆蔻仁辛甘大熱以蕩中寒理其正氣白朮炙甘草橘皮甘苦溫乃厚腸胃麥蘗寬腸胃而和中神麯辛熱導滯消食而爲佐使也右件㕮咀一兩水煎服之嘔吐止飲食進越三日前證悉去左右侍者曰前證雖去九日不大便如何予曰丞相年高氣弱既利且汗脾胃不足陽氣虧損津液不潤也豈敢以寒涼有毒之劑下之仲景曰大發汗後小便數大便堅不可用承氣湯如此雖內結宜以蜜煎導之須臾去燥屎二十餘塊遂覺腹中空快上下氣調又以前藥服之再飲食但有所傷則以橘皮枳朮丸消導之至月餘其病乃得平復丞相曰病既去矣當服何藥以防其復來予曰不然但慎言語節飲食不可服藥夫用藥如用刑民有罪則刑之身有疾則藥之無罪妄刑是謂虐民無病妄藥反傷正氣軍志曰允當則歸服而舍之可也丞相悅而然之

奇效良方曰政和中一人病傷寒得汗身涼數日忽嘔吐藥與飲食俱不下醫者皆進丁香藿香滑石等藥下咽即吐予曰此正汗後餘熱留胃孫兆竹茹湯正相當爾急治藥與之即時愈

醫學正傳曰在城黃氏婦年將三十產後因食傷致胃虛不納穀四十餘日矣聞穀氣則惡心而嘔聞藥氣亦嘔求予治予曰藥不能入口又將何法以治之乎懇求不已遂制一方用人參白朮茯苓各一錢甘草二分陳皮藿香砂仁各五分炒神麯一錢十年以上陳倉米一合順流水二大白盞煎沸泡伏龍肝研細攪渾放澄清取一盞加薑棗同煎前藥至七分稍冷服此藥遂納而不吐別以陳倉米頭湯時時與之日進前藥二三服漸能食粥而安後以此法治十餘人皆驗

醫宗必讀曰兵燹高元圃久患嘔吐閱醫頗衆病竟不減余診之曰氣口大而軟此穀氣少而藥氣多也且多犯辛劑可以治表實不可以治中虛可以理氣窒不可以理氣弱投以熟半夏五錢人參三錢陳倉米一兩白蜜五匙甘爛水煎服二劑減十劑安

屯院孫瀟湘夏月食瓜果過多得食輒嘔十日弗止舉家驚惶千里迎余比至署中已二十日矣困頓牀褥手足如冰余曰兩尺按之有神胃氣縷縷不絕祇因中氣本弱復爲寒冷所傷耳遂用紅豆丸連進三服至明日便能食粥兼與理中湯加丁香沉香旬日之間飲食如常矣

薛己醫按曰府庠沈文姬母食濕麵吞酸嘔吐絕食服芩連等劑加寒熱口乾流涎又食冬瓜一星而嘔吐愈甚余謂此脾氣虛寒也急用鹽艾附子炒熱熨臍腹又令其子口氣接其母氣神氣少甦以參朮附子陳皮爲丸如粟米大津嚥五七粒次日加至十餘粒漸服煎劑一二匙乃思粥飲又以參朮藥五十餘劑而愈

譚侍御每頭痛必吐清水不拘冬夏吃薑便止余作中氣虛寒用六君當歸黃芪木香炮薑而瘥

趙吏部文卿患吐不止吐出皆酸味氣口脈大於人迎二三倍速予投劑予曰此食鬱上宜吐不須用藥乃候其吐清水無酸氣寸脈漸減尺脈漸復翌早吐止至午脈俱平復勿藥自安

余母六十有五己卯春二月飲食後偶聞外言忤意嘔吐酸水內熱作渴飲食不進惟飲冷水氣口脈大而無倫面色青赤此胃中濕熱鬱水投之以藥入口即吐第三日吐酸物第七日吐酸黃水十一日吐苦水脈益洪大仍喜冷水以黃連一味煎湯冷飲少許至二十日加白朮白茯苓至二十五日加陳皮三十七日加當歸炙甘草至六十日始進清米飲半盞漸進薄粥飲調理得痊

一婦人吞酸噯腐嘔吐痰涎面色純白或用二陳黃連枳殼之類加發熱作渴肚腹脹滿余曰此脾胃虧損末傳寒中不信仍作火治肢體腫脹如蠱余以六君加附子木香治之胃氣漸醒飲食漸進虛火歸經又以補中益氣加炮薑木香茯苓半夏兼服全愈

陳湖陸伯母久患心腹疼痛每作必胃滿嘔吐厥逆

面赤脣麻咽乾舌燥寒熱不時而脈洪大衆以痰火治之屢止屢作迨乙巳春發熱頻甚用藥反劇有朱存默氏謂服寒凉藥所致欲用參朮等劑彼疑痛無補法乃延予以折中焉予診之曰此寒凉損眞之故內眞寒而外假熱也且脈息弦洪而有怪狀乃脾氣虧損肝脈乘之而然惟當溫補其胃遂與補中益氣加半夏茯苓吳茱萸木香一服而熟寐微曉洪脈頓斂怪脈頓除諸證釋然

醫門法律曰倪處雲病腸氣十四日粒米不入咽始吐清水次吐綠水次吐黑水次吐臭水呼吸將絕醫已散手余適診之許以可救渠家不信余曰儘今一晝夜先服理中湯六劑不令其絕來早轉方一劑全安渠家曰病已至此滴水不能入喉安能服藥六劑乎余曰但得此等甘溫入口必喜而再服不須過慮渠諸子或岸或弁亦知理折衷曰既有妙方何不即投見效必先與理中然後迺用此何意也余曰金匱有云病人噫氣不除者旋覆代赭石湯主之吾於此病分別用之者有二道一者以黑水爲胃底之水臭水爲腸中之水此水且出則胃中之津液久已不存不敢用半夏以燥其胃也一者以將絕之氣止存一系以代赭墜之恐其立斷必先以理中分理陰陽俾氣易於降下然後代赭得以建奇奏績一時之深心即同千古之已試何必更疑及簡仲景方見方中止用煨薑而不用乾薑又謂乾薑比半夏更燥而不敢用余曰聖人所噫者下焦之氣也所嘔者陽中之水也陰乘陽位加以日久不食諸多蛔蟲必上居腸間非乾薑之辣則蛔蟲不下轉而上氣亦必不下轉妙處正在此君曷可泥哉諸子私謂言有大而非誇者此公頗似姑進是藥觀其驗否進後果再索藥二劑後病者能言云內氣稍接但恐太急俟天明再服後日轉方爲妥至次早未及服藥復請前醫參酌衆醫交口極沮渠家并後三劑不肯服矣余持前藥一盞勉令服之曰吾即於衆醫前立地轉方頃刻見效再有何說乃用旋覆花一味煎湯調代赭石末二茶匙與之纔一入口病者曰好藥吾氣已轉入丹田矣但恐此藥難得余曰易耳病者十四日衣不解帶目不交睫慾甚因圖脫衣安寢冷氣一蠲復嘔與前藥立止思粥令食半盞渠饑甚竟食二盞少頃已食六盞復嘔與前藥立止又因動怒以物擊婢復嘔與前藥立止已後不復嘔但困憊之極服補藥二十劑丸藥一斤將息二月始能遠出方悔從前少服理中二劑耳

咕翁公祖偶因飽食當風忽然一吐傾囊而出胃氣大傷隨召診問體中微似發熱左關之脈甚大自云始先中院不舒今覺氣反攻左始用梨汁不投今用蔗漿稍定不知此何證也昌因斷曰此虛風之候也以胃中所受之水穀出盡無需空虛若谷而風自內生兼腸中久蓄之風乘機上入是以胃中不安然風入於胃必左投肝木而從其類是以氣反攻左而左脈即爲之大且勁內經云風淫於內治以甘寒梨汁蔗漿俱甘寒對證之物而一效一不效者又可知胃中氣虛已極不耐梨性之達下而喜蔗性之和中也於是以甘寒一派之藥定方人參竹瀝麥門冬生地黃之屬衆議除參不用服後腹中呱呱有聲嘔出黃痰少許胃中遂快次早大便亦通證似向安然有可怪者本是胃經受病而胃脈反不見其病祇是上下兩旁心腎肝肺之脈時時另起一頭不安其常因爲剖心爭論謂此非上下兩旁之見病端也乃中央氣弱不能四迄如母病而四子失乳故現饑餓之象耳觀祖翁自云口中之味極淡又云水到喉管即汪汪不肯下行明明是胃中之氣不轉宿水擋住喉間不能更吞新水耳宜急用四君子湯以理胃氣則中央之樞軸轉而四畔之機關盡利喉管之水氣不逆而口中之淡味亦除矣如不見信速請明者商之不便注此藉時悞事也然而言過激烈反怪爲故意驚駭改名二醫有謂中風者有謂傷寒者見各不同至於人參之可用則同聲和之謂證之輕而易療則同力攢之微用發表之藥即汗出沾濡又同口讚之曾不顧已塌之胃氣追之實難反鬧關而縱之去於是氣高神蕩吼逆不休矣再徵倖而投黃連一劑將絕之系加極苦以速其絕二醫措手不及復名昌至則脈已大亂如沸如羹頻轉頻歇神昏不醒身强莫移年齡間一團黑滯其氣出則順而入必噦通計晝夜一萬三千五百息即得一萬三千五百噦矣二醫卸禍謂昌前所議四君子湯今始可用吁嗟呼吸存亡尚圖雍容樽俎乎據理答之曰氣已出而不入再加參朮之膩阻立斷矣惟有仲景旋覆代赭石一方可收神功於百一進一劑而噦勢稍減二劑加代赭至五錢噦遂大減連連進粥神清色亮脈復體輕再用參苓麥冬木瓜甘草平調二日遂康復如初此蓋祖翁少時純樸不渴故松柏之姿老而彌勁非盡藥之功

能也卽論藥亦非參之力乃代赭墜參下行之力也
景岳全書曰凡胃寒者多爲嘔吐而中寒毒者又必吐而兼瀉余在燕都嘗治一吳參軍者因見鮮蘑菇肥嫩可愛令庖人貿而羹之以致大吐大瀉延彼鄉醫治之咸謂速宜解毒乃以黃連黑豆桔梗甘草枳實之屬連進之而病益甚遂至胃腹大脹氣喘水飲皆不能受危篤已甚延救於余投以人參白朮甘草乾薑附子茯苓之類彼疑不敢用曰腹脹氣急口乾如此安敢再服此藥乃停一日而病愈劇若朝露矣因而再懇與藥如前彼且疑且畏而決別於內閣曰必若如此則活我者此也殺我者亦此也余之生死在此一舉矣遂不得已含淚吞之一劑而嘔少止再劑而脹少殺遂大加熟地黃以兼救其瀉亡之陰前後凡二十餘劑復元如故彼因問曰余本中毒致病鄉人以解毒而反劇先生以不解毒而反愈者何也余曰毒有不同豈必如黃連甘桔之類乃可解耶卽如蘑菇一物必產於深坑枯井或沉寒極陰之處乃有之此其得陰氣之最盛故肥白最嫩也公中此陰寒之毒而復解以黃連之寒其謂之何茲用薑附非所以解寒毒乎用人參熟地非所以解毒補元氣乎然則彼所謂解毒者適所以助毒余所謂不解毒者正所以解毒也理本甚明而人弗能辨凡諸病之誤治者無非皆此類耳公頓首伏然嘆曰使非吾丈吾幾爲含冤之魄矣新壽諸梓以爲後人之鑑云

金宅少嬪宮門女也素任性每多鬱痛及嘔吐等證隨調隨愈後於秋盡時證復作而嘔吐更甚病及兩日甚至厥脫不省如垂絕者再後延予至見數醫環視僉云湯飲諸藥皆不能受入口卽嘔無策可施一醫云惟用獨參湯庶幾可望其生耳余因診之見其脈亂數甚而且煩熱躁擾莫堪名狀意非陽明之火何以急劇若此乃問其欲冷水否彼卽點首遂與以半鍾惟此不吐且猶有不足之狀乃復與一鍾稍覺安靜余因以太清飲投之而猶有謂此非傷寒又值秋盡豈堪此乎余不與辨及藥下咽卽甘睡半日不復嘔矣然後以滋陰輕清等藥調理而愈大都嘔吐多屬胃寒而復有火證若此者經曰諸逆衝上皆屬於火卽此是也自後凡見嘔吐其有聲勢湧猛脈見洪數證多煩熱者皆以此法愈之

胡宅小兒年甫三歲偶因飲食不調延幼科診治所用之藥無非清火化痞等劑因而更損胃氣反致嘔吐瀉泄復加清利遂致吐蚘初止數條漸至數十條細如燈草甚至成團攪結而出早晚不絕所下者亦如之羸困至極求治於余因與溫胃飲二三劑其蟲朝夕不止其多如故初不識其何所從來而神化之速一至如此乃翁切懇曰止此一兒生死在公矣萬望先逐此蟲蟲不盡則病日甚其能生乎予弗之聽但以前藥倍加人參仍加附子二三劑而嘔吐漸稀瀉亦隨止瀉止後乃以理陰煎溫胃飲出入間用十餘日而蟲漸少一月餘而飲食進肌肉生復元如故矣其翁積誠稱謝因問曰小豚之病誠然危矣今何以不治蟲不治嘔泄而三者俱愈可聞教乎予曰公之所畏者蟲也予之所畏者胃氣也且凡逐蟲之藥無有不傷胃氣者向使胃氣再傷非惟不能逐蟲而命必隨之矣其害孰甚故保全之權在知本末但使脾胃日强則拔去化蟲之源而三病同歸一得矣尚何蟲瀉之敢橫哉

王宅少婦年未二旬素喜瓜果生冷因常病心腹疼痛每發必數日不食後及二旬之外則每發必至吐蚘初吐尚少自後日甚日多每吐必一二十條每發必旬日不食所經諸醫但知攻蟲旋去旋生百藥不效予爲診視脈證井察病因知其傷於生冷以致脾胃虛寒陰濕氣聚故爲此證使不溫養脾胃以杜寒濕化生之源而但事攻蟲蟲去復生終無濟也因製溫臟丸與之藥未完而病隨愈矣後因病愈而少年任意仍犯生果舊病復作再製丸服乃得愈觀此二證如前之小兒乃因凉藥傷脾所以生蟲後之女人乃因生果傷胃所以生蟲可見陰濕內淫而脾胃虛寒是卽生蟲之由也故凡治蟲之法但察其別無疳熱等證者悉當以溫補脾胃爲主

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百七十二卷目錄

醫部彙考二百五十二

泄瀉門一

黃帝素問 四時調神大論 生氣通天論 金匱眞言論 陰陽應象大論 脈要精微論 平人氣象論 玉機眞臟論 太陰陽明篇 欬論 舉痛論 痹論 標本病傳論 藏氣法時論 宣明五氣論 調經論 陰陽別論 風論 厥論 刺熱論 五常政大論 氣交變大論 至眞要大論 六元正紀大論

靈樞經 肝氣臟腑病形篇 經脈篇 師傳篇 論疾診尺篇 腹論 玉版篇

扁鵲難經 五瀉 死候

張機金匱要略 下利病脈證治 因食致瀉 萬瀉

華佗中藏經 利屬脈附虛實寒熱 死候

王叔和脈經 泄利之脈

脈訣 瀉利之脈

朱肱活人書 傷寒下利

劉完素六書 泄瀉 寒熱水泄例 自利并悞下

成無己明理論 自利

張潔古活法機要 治法

張從政儒門事親 論五泄所宜氣味 金匱十全之法 金匱十全五泄法 後論 治法

藝術典第二百七十二卷

醫部彙考二百五十二

泄瀉門一

黃帝素問

四氣調神大論

秋三月此爲容平天氣以急地氣以明早臥早起與雞俱興使志安寧以緩秋刑收斂神氣使秋氣平無外其志使肺氣清此秋氣之應養收之道也逆之則傷肺冬爲飧泄奉藏者少

註 肺屬金王於秋逆秋收之氣則傷肺肺傷至冬爲飧泄之病因奉藏者少故也蓋秋收而後冬藏陽藏於陰而爲中焦釜底之然以腐化水穀秋失其收則奉藏者少至冬寒水用事陽氣下虛則水穀不化而爲飧泄矣

生氣通天論

凡陰陽之要陽密乃固兩者不和若春無秋若冬無夏因而和之是爲聖度故陽强不能密陰氣乃絕陰平陽祕精神乃治陰陽離決精氣乃絕因於露風乃生寒熱是以春傷於風邪氣留連乃爲洞泄

註 傷於風者上先受之傷於濕者下先受之陽病者上行極而下是以春傷於風乃爲洞泄

金匱眞言論

長夏善病洞泄寒中

註 夏時陽氣在外裏氣虛寒長夏濕土主氣風入於經俞卽內薄而爲洞泄風木乘虛而勝土也脾爲陰中之至陰不能化熱而爲寒中也

故冬不按蹻長夏不病洞泄寒中飧泄而汗出也

註 按蹻者按摩導引引陽氣之通暢於四支也冬時陽氣伏藏若導引其四出則無以奉春生夏長之氣是以有洞泄寒中之病人能藏養元眞之氣必不使邪傷經脈病在內而爲飧泄也亦不使邪傷陽氣病在外而汗出也

陰陽應象大論

寒氣生濁熱氣生清清氣在下則生飧泄濁氣在上則生䐜脹此陰陽反作病之從逆也

註 寒氣下凝故生濁陰熱氣上散故生清陽如清氣在下是上而下降故飧泄濁氣在上是下而上凝故䐜脹此身中陰陽反作氣之逆從爲病也

濕勝則濡瀉

註 濕淫所勝則脾土受傷而爲濡瀉之病

故重陰必陽重陽必陰春傷於風夏生飧泄

註 春傷風而夏傷暑謂之重陽春傷風而飧泄乃重陽而變陰病也

脈要精微論

胃脈實則脹虛則泄

註 經曰脾氣實則腹脹不足則爲溏泄蓋脾與胃以膜相連耳胃爲陽脾爲陰陽病者上行極而下是以脈見於胃而病見於脾也

久風爲飧泄

註 風乃木邪久則內干脾土而成飧泄故曰春傷於風邪氣留連乃爲洞泄

平人氣象論

尺寒脈細謂之後泄

註 夫陽氣生於陰中尺膚寒生陽之氣少矣陽氣

衰於下故主虛泄泄則亡陰故脈細也
泄而脫血脈實者皆難治命曰反四時也
註泄脫之病氣應虛散而脈反實此脈證之不相應正氣亂也故難治
玉機眞藏論
脈細皮寒氣少泄利前後飲食不入此謂五虛寒粥入胃泄注止胃氣復也
太陰陽明論
食飲不節起居不時則陰受之陰受之則入五臟入五臟則臟滿閉塞下爲飧泄久爲腸澼
註入五臟謂太陰爲之行氣於三陰太陰病則五臟之氣皆爲之病矣脾氣逆則脹滿太陰爲開開折則倉廩無所輸而爲飧泄久則爲腸澼矣
玆論
人與天地相參故五臟各以治時感於寒則受病微則爲玆甚則爲泄爲痛
註五臟之氣與四時五行之氣相合故五臟各以所主治之時而感於寒則受病微則上乘於肺而爲玆甚則上行悗而下爲泄痛矣
舉痛論
寒氣客於小腸小腸不得成聚故後洩腹痛矣
註寒氣客於小腸之間轉入於腸內故不成積聚而爲後洩腹痛也
怒則氣逆甚則嘔血及飧泄
註肝主怒而藏血怒則肝氣上逆故甚則嘔血木氣乘脾故爲飧泄
痺論
腸痺者數飲而出不得中氣喘爭時發飧泄
註腸痺者兼大小腸而言小腸爲心之腑而主小便邪痺於小腸則火熱鬱於上而爲數飲下爲小便不得出也大腸爲肺之腑而主大便邪痺於大腸故上則爲中氣喘爭而下爲飧泄也
標本病傳論
先病而後泄者治其本先泄而後生他病者治其本必且調之乃治其他病
註泄乃濕土之病他病如濕邪所勝民病心痛耳鼽之類故當先治其虛泄以調脾土而後治他病
藏氣法時論
脾病者虛則腹滿腸鳴飧泄食不化
註脾主運會五臟元眞之氣脾氣傷則不能化水穀而有飧泄之病
宣明五氣論
五氣所病大腸小腸爲泄
註大腸小腸受盛水穀變化糟粕病則不能化物而爲泄矣
調經論
志有餘則腹脹飧泄
註腎者胃之關關門不利則聚水而爲腹脹飧泄
陰陽別論
一陽發病少氣善玆善泄
註一陽者少陽之氣病也少陽主初生之氣病則生氣少矣足少陽相火主氣氣少則火壯矣火鑠金故善玆木火之邪賊傷中故土善泄也
風論
久風入中則爲腸風飧泄
註風邪久在肌腠而入於中則脾胃之氣受傷而爲腸風飧泄
胃風之狀頸多汗惡風食飲不下鬲塞不通腹善滿失衣則膜脹食寒則泄診形瘦而腹大
註頸有風池風府乃經脈之要會故頸多汗胃腑受邪故飲食不下鬲塞不通腹善滿也胃氣不足則身以前皆寒腹脹滿是以形寒則膜脹飲冷則泄者胃氣虛傷也胃者肉其應腹者胃之郛故主形瘦而腹大
厥論
少陰厥逆虛滿嘔變下泄清治主病者
註少陰之氣上與陽明相合而主化水穀少陰氣厥以致中焦虛滿而變爲嘔逆上下水火之氣不交故下泄清冷也
刺熱論
脾熱病者熱爭則腰痛不可用俛仰腹滿泄
註經云陽病者腰反折不能俛仰故腰痛不可用俛仰腹者脾土之郛郭故腹滿泄
五常政大論
土不及曰卑監卑監之紀是謂減化其病飧泄邪傷脾也

註土運不及則化氣迺減木反勝之是以脾氣傷而病殘泄也

氣交變大論

歲土太過臟氣伏化氣獨治之病腹滿溏泄腸鳴

註臟氣木氣化氣土氣也歲土太過則制水是以臟氣伏腹滿溏泄腸鳴脾土之虛證也

歲水太過濕氣變物病反腹滿腸鳴溏泄食不化

註歲水太過諸丙歲也民病腹滿腸鳴溏泄食不化者皆水泛土敗之證也

歲木太過風氣流行脾土受邪民病殘泄

註諸王之歲木運太過則制勝其土氣故民應之而爲脾病也殘泄脾土之病

歲水不及濕乃大行民病濡泄

註六癸之歲水運不及土乃勝之故濕氣大行濕土太過傷及腎陰故爲濡瀉之病

歲木不及燥乃大行民病中清腸鳴溏泄

註肝氣虛逆而更兼中清故腸鳴溏泄也

歲火不及寒乃大行病鶩溏寒中腸鳴泄注

註六癸之歲火運不及水反勝之故寒乃大行鶩溏諸病皆寒濕之證也

歲土不及風迺大行民病殘泄

註六己之歲土運不及木反勝之故風乃大行風木傷土民則有殘泄之病

至眞要大論

陽明司天燥淫所勝寒清於中腹中鳴注泄鶩溏

註陽明司天卯酉歲也腹中鳴注泄鶩溏寒清於中也

厥陰司天風淫所勝民病冷泄腹脹溏泄痕水閉

註厥陰司天巳亥歲也冷泄諸證皆脾經之病

太陰之勝濕氣內鬱善注泄太陰之復則濕變乃舉甚則入腎竅瀉無度

註濕氣內鬱而迫於下故注泄復者謂受所勝之氣勝制鬱極而復發甚則入腎下乘冬令之寒水也腎開竅於二陰故曰竅瀉

厥陰之勝腸鳴殘泄少腹痛注下赤白

註腸鳴殘泄諸證風氣淫於下也

少陰之勝腹滿痛溏泄傳爲赤沃

註腹滿溏泄陰寒在下也傳爲赤沃君火下淫也

陽明之勝清發於中左脇脊痛溏泄陽明之復則清氣大舉甚則心痛否滿腹脹而泄

註金氣寒肅故清發於中金勝則木虧故脊痛下爲溏泄也心痛否滿腹脹而泄者乘火土也陽明之復發於本位主令之時是以清氣大舉心痛否滿腹脹而泄乘火土也

諸厥固泄皆屬於下

註從上而下也蓋在上之陽氣下逆則爲厥冷在上之水液下行則爲固泄亦猶天地陰陽之氣上下相乘而水隨氣之上下也

諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱

註暴注者瀉水痛一陣瀉一陣張機謂之協熱自利熱者君火之氣也

太陽之勝凝澹且至寒入下焦傳爲濡瀉

註太陽寒水氣勝故凝澹且至寒入下焦者太陽標陽而本寒是以陽熱上行而陰寒下行也

太陰在泉客勝則便溲不時濕客下焦發而濡泄

註便溲不時者在泉之濕氣客於太陰之經而下及於內也濕客下焦發而濡瀉因客淫於下而太陰之主氣自病也

陽明在泉主勝則下爲鶩溏

註下爲鶩溏者水下泄也

六元正紀大論

太陽司天之政氣化運行先天寒濕之氣持於氣交民病寒濕發濡瀉血溢

註寒濕之氣持於氣交者上下交互也民病濡瀉乃寒濕之氣發也

三之氣天政布寒氣行雨乃降民病注下

註司天寒水之氣加臨於三氣故其時天政乃布而寒氣行雨乃降注下火鬱病也

少陽司天之政氣化運行先天民病寒中外發瘡瘍內爲泄滿

註風熱之氣在外則寒濕之氣在內是以外發瘡瘍內爲寒中泄滿

少陽所至爲暴注太陽所至爲流泄禁止

註此冬病之常也

火鬱之發民病注下

註火熱盛而精血傷也

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

肺脈小甚爲泄

註小則氣血皆虛而爲泄肺與大腸爲表裏也

腎脈小甚爲洞泄

註腎氣虛也

經脈篇

脾足太陰之脈是主脾所生病者溏瘕泄

註脾家實則爲瘕泄

肝足厥陰之脈是主肝所生病者胃滿嘔逆飧泄

註食氣入胃散精於肝行氣於經肝所生病則肝氣厥逆不能行散穀精故胃滿嘔逆也肝主疎泄肝氣虛則飧泄

師傳篇

腸中熱則出黃如糜膿以下皮寒腸中寒則腸鳴飧泄

註寒熱外內之相應也

論疾診尺篇

大便赤辨飧泄脈小者手足寒難已飧泄脈小手足溫泄易已

註大便赤辨謂黃赤相間乃中焦之血與糟粕并下也飧泄乃大腸虛而不能濟泌此腸胃虛泄於於下中焦之汁不能榮於脈中故脈小若手足溫者得下焦之生氣故泄易已

尺膚寒其脈小者泄少氣

註氣者所以溫膚熱肉從陰而生自內而外故知其泄於內而虛於外也

脈論

大腸脹者腸鳴而痛濯濯冬日重感於寒則飧泄不化

註此衛氣逆於城郭之中而爲病也

玉版篇

腹鳴而滿四肢清泄其脈大逆也

註腹鳴而滿四肢清泄其脈大者逆傷於腎也

其腹大脹四末清形脫泄甚逆也欬嘔腹脹且飧泄其脈絕逆也如是者不過一時而死矣

註夫皮膚分肉之氣血從胃腑而注於臟腑之大絡從大絡而出於孫絡從孫絡而外滲於皮膚如腹大脹四肢清形脫泄甚是逆於胃之大絡不得出於皮膚充於四體也欬嘔腹脹且飧泄其脈絕逆於肝脾之絡也夫胃者水穀血氣之海也如逆而不行則開閣已息是以不過一周而死矣

大泄之後奪也不可瀉

註形肉血氣已虛脫者雖有實邪皆不可瀉

病泄脈洪大逆也

註病泄者脈宜沉弱反洪大者陰泄於下陽盛於上陰陽上下之相離也

扁鵲難經

五瀉

泄凡有幾皆有名不然泄凡有五其名不同有胃泄有脾泄有大腸泄有小腸泄有大瘕泄名曰後重

註此五泄之目下文詳之

胃泄者飲食不化色黃

脾泄者腹脹滿泄注食即嘔吐逆

大腸泄者食已窘迫大便色白腸鳴切痛

小腸泄者溲而便膿血少腹痛

大瘕泄者裏急後重數至圊而不能便莖中痛此五泄之要法也

死候

病若腹大而泄者脈當微細而濇反緊大而滑者死

漢張機金匱要略

下利病脈證治

夫六腑氣絕於外者手足寒上氣脚縮五臟氣絕於內者利不禁下甚者手足不仁

下利脈沉弦者下重也脈大者爲未止脈微弱數者爲欲自止雖發熱不死

下利手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘者死少陰負趺陽者爲順也

下利有微熱而渴脈弱者今自愈

下利脈數有微熱汗出今自愈設脈緊爲未解

下利脈數而渴者今自愈設不差必清膿血以有熱故也

下利脈反弦發熱身汗者自愈

下利氣者當利其小便

下利寸脈反浮數尺中自濇者必清膿血

下利清穀不可攻其表汗出必脹滿

下利脈沉而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也

下利後脈絕手足厥冷晬時脈還手足溫者生脈不還者死

下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯

下利三部脈皆沉按之心下堅者急下之宜大承氣湯

下利脈遲而滑者實也利未欲止急下之宜大承氣

湯
下利脈反滑者當有所去下乃愈宜大承氣湯
下利已差至其年月日時復發者以病不盡故也當下之宜大承氣湯
下利讝語者有燥屎也小承氣湯主之
下利便膿血者桃花湯主之
熱利下重者白頭翁湯主之
下利後更煩按之心下濡者爲虛煩也梔子豉湯主之
下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之
下利肺痛紫參湯主之
氣利訶黎勒散主之
病者痿黃躁而不渴胃中寒實而利不止者死
中寒其人下利以裏虛也欲嘿不能此人肚中寒一云痛

因食致瀉
疫死牛肉食之令人洞下亦致堅積宜利藥下之

鶩溏
脈沉小遲名脫氣其人疾行則喘喝手足逆寒腹滿甚則溏泄食不消化也
熱在上焦者因欬爲肺痿熱在中焦者則爲堅熱在下焦者則尿血亦令淋秘不通大腸有寒者多鶩溏有熱者便腸垢小腸有寒者其人下重便血有熱者必痔
肺水者其身腫小便難時時鴨溏
師曰寸口脈沉而遲沉則爲水遲則爲寒寒水相搏趺陽脈伏水穀不化脾氣衰則鶩溏胃氣衰則身腫少陽脈卑少陰脈細男子則小便不利婦人則經水不通經爲血血不利則爲水名曰血分
黃家日晡所發熱而反惡寒此爲女勞得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時溏此女勞之病非水也腹滿者難治消石礬石散主之
華佗中藏經
利屬臟腑虛實寒熱
病熱人四肢厥脈弱不欲見人食不入利下不止者死食入四肢溫脈大語狂無睡者生
小腸實則傷熱熱則口瘡虛則傷寒寒則泄膿血或泄黑水其根在小腸虛則左寸口脈浮而微軟弱不禁按病鶩狂無所守下空空然不能語者是也
脾脈不及則令人中滿不食乏力手足緩弱不遂涎引口中四肢腫脹溏泄不時夢中飲食寒則吐涎沫而不食四肢痛滑泄不已手足厥甚則顏燥如瘧也
胃者腑也虛則腸鳴脹滿引出滑泄胃中風則溏泄不已
肺絕則十三日死其病足滿瀉利不覺出也面白日青此謂經亂也此雖天命亦不足治
肺病久則傳入大腸手陽明是其經也寒則泄熱則結絕則利下不止而死虛寒則滑泄不定又積冷脾痛不能久立痛已則泄何物
腎脈緩甚則折脊微緩則洞泄食不化入咽還出小
甚則洞泄微小則消癉脈來沉而大堅浮而緊手足腫厥陰痿腰背疼小腸心下有水氣時脹滿洞泄膀胱者津液之腑也寒則精神不守泄利不止語聲不出也
中焦寒則下利不止食飲不消中滿

死候
病嗽而嘔使滑不禁脈弦弦欲絕者死
病洞泄不下食脈急者死
病泄注脈浮大而滑者死
脾絕口冷足腫脹泄不覺者十二日死

晉王叔和脈經
泄利之脈
左手寸口人迎以前脈陰陽俱虛者手少陰與太陽經俱虛也病苦洞泄苦寒少氣四肢寒腸澼
右手關上脈陰虛者足太陰經也病苦泄注腹滿氣逆霍亂嘔吐黃疸心煩不得臥腸鳴
右手關上脈陰陽俱實者足太陰與陽明經俱實也病苦脾脹腹堅搶脅下痛胃氣不轉大便難時反泄利腹中痛上衝肺肝動五臟立喘鳴多驚身熱汗不出喉痹精少
右手關上脈陰陽俱虛者足太陰與陽明經俱虛也病苦胃中如空狀少氣不足以息四逆寒泄注不已
右手尺中神門以後脈陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也病苦心痛若下重不自收篡反出時時苦洞泄寒中泄腎心俱痛
關脈伏中焦有水氣溏泄宜服水銀圓鍼關元利小便溏泄便止
關上脈滑而大小不勻是爲病方欲進不出一二日復欲發動其人欲多飲飲即泄利如利止者生不止者死

尺脈細微溏泄下冷利
脈實緊胃中有寒苦不能食時時利者難治
病人大腸絕不治何以知之泄利無度利絕則死
溫病八九日頭不疼身不痛目不赤色不變而反利
脈來牒牒按之不彈手時大心下堅十七日死
洞泄食不化不得留下膿血脈微小遲者生緊急者
死
泄注脈緩時小結者生浮大數者死
中央直前者手少陰也動苦心痛微堅腹脅急實堅
者爲感忤純虛者爲下利腸鳴
關上伏有水氣泄溏
尺中滑下利少氣
脈訣

瀉利之脈

診脈入式歌曰陽數卽吐兼頭痛陰微卽瀉臍中吼
陽微浮弱定心寒陰滑食注脾家咎
脾臟歌曰濕多成五泄腸走若雷奔
雜病生死歌曰下利微小却爲生脈大浮洪無瘥日
外實內熱吐相連下淸注穀轉難安忽然診得脈洪
大莫費神功定不痊
脾臟察色歌曰臍趺腫滿面浮黃泄利不覺汚衣裳
肌肉粗澀兼脣反一日十二內災殃
宋朱肱活人書

傷寒下利

傷寒下利多種須薺識陰陽勿令差互三陽下利則
身熱太陰下利手足溫少陰厥陰下利身不熱以此
別之大抵下利挾太陽脈證便不得用溫藥俗醫但
見下利便作陰證用溫熱藥鮮不發黃生斑而死也
太陽陽明合病必下利葛根湯主之下利而頭疼腰
痛肌熱目疼鼻乾其脈浮大而長者是其證也太陽
少陽合病自下利黃芩湯主之若嘔者黃芩湯加半
夏生薑也下利而頭疼胷滿或口苦咽乾或往來寒
熱而嘔其脈浮大而弦者是其證也陽明少陽合病
必下利其脈不負者順也負者失也互相尅賊名爲
負也下利而身熱胷脅痛滿乾嘔或往來寒熱其脈
長大而弦者是其證也蓋陽明者土其脈長大少陽
者木其脈弦若合病土被木賊更下利爲胃已困若
脈不弦者順也爲土不負負者死自利不渴屬太陰
四逆湯理中湯主之自利而渴屬少陰白通湯白通
加猪膽湯通脈四逆湯猪苓湯眞武湯四逆加人參
湯可檢證而用之其餘下利皆因汗下後證也大抵
傷寒下利須看脈與外證下利而脈大者虛也脈微
弱者爲自止下利日十餘行脈反實者逆下利脈數
而滑者有宿食也下之愈脈遲而滑者實也其利未
得便止更宜下之下利三部脈皆平按其心下硬者
急下之協熱利者臍下必熱大便赤黃色及腸間津
汁垢膩謂之腸垢寒毒入胃則臍下必寒腹脹滿大
便或黃白或靑黑或下利淸穀濕毒氣盛則下利腹
痛大便如膿血或如爛肉汁也下利欲飲水者以有
熱也下利讝語者有燥屎也寒毒入胃者四逆湯理
中湯白通湯加附子四逆散加薤白主之協熱利者
黃芩湯白頭翁湯三黃熟艾湯薤白湯赤石脂圓濕
毒下膿血者桃花湯地榆散黃連阿膠散雖然自利
而渴屬少陰然三陽下利亦有飲水者乃有熱也三
陰下利宜溫之然少陰自利淸水心下痛口乾燥者
却宜下之此又不可不知也少陰泄利下重不可投
熱藥先濃煎薤白湯內四逆散緣四逆散用枳實芍
藥之類又尋常胃中不和腹中腸鳴下利生薑瀉心
湯最妙此二法不特傷寒證也
金劉完素六書

泄瀉

太陰脾經受濕水泄注下體微重微滿困弱無力不
欲飲食暴泄無數水穀不化先宜白朮芍藥湯和之
身重暴下是大勢來亦宜和之
厥陰動爲瀉利者寸脈沉而遲手足厥下部脈不至
咽喉不利或涕唾膿血瀉利不止者爲難治宜升麻
湯或小續命湯以發之法曰謂表邪縮於內故下利
不止當散表邪於四肢布於脈絡外無其邪則臟腑
自安矣
太陽爲協熱利凉膈散主之
陽明爲痼瘕進退大承氣湯主之
少陽風氣自動其脈弦大柴胡湯主之
太陰濕勝濡瀉不可利而可溫四逆湯主之
少陰蟄封不動禁固可澀赤石脂丸乾薑湯主之
厥陰風泄以風治風小續命湯消風散主之
四時以胃氣爲本久下血痢則脾虛損而血不流於
四肢入於胃中爲血宜滋養脾胃則愈
夫五瀉之病其治法各不同者外證各異也
胃泄者飲食不化多黃承氣湯下
脾泄者腹脹滿注下食卽嘔吐逆建中及理中湯
大腸泄者食已窘迫大便色白腸鳴切痛乾薑及附

子湯
小腸泄者溲便膿血少腹痛承氣湯
大瘕泄者裏急後重數至圊而不能便足少陰也莖中痛急利小便此五泄之病也
傷寒表熱未入於裏惧以寒藥下之太早其表熱卒未入因而裏寒下利不止或表熱裏寒自利不止者急以四逆湯溫裏脉浮不渴小便清白不溫完穀不化是也或辨便溺之色者須更審其飲食之色或下後協熱利不止者則喉乾煩渴此又不宜溫宜五苓散之類散其溫熱也惟裏寒者可以溫之止其寒瀉利止裏和表邪尚在者急以桂枝湯解其表
清氣在下則生飧泄清濁交錯食不化而清穀出矣白朮湯主之
腸癖證雖多飲不得溲不成大便使糟粕不化故氣喘急而飧泄木香丸主之
胃寒主收水穀不化泄瀉寒之氣在上熱之氣在下故脹而泄妙應丸主之
內經云濕勝則滿甲乙經云寒客生濡胃瀉如隨氣而下利豆蔻散主之
脾虛風冷陰盛糟粕不化大便黃黑如鴈溏此大腸有寒也吳茱萸丸主之

寒熱水泄例

泄者一也總包五法謂之六義曰六解難經有傷寒五泄叔和云濕多成五泄仲景解四經泄利有不可汗不可下者有可吐可灸者仲景隨經自言之假令渴引飲者是熱在膈上水多入則下扇入胃中胃經本無熱不勝其水名曰水态故使水穀一時下此證當灸大椎三五壯立已乃瀉督脈也如用藥乃使車前子擣丸白朮茯苓之類可選用之五苓散亦可
又有寒泄者大腹滿而泄又有鴈溏者是寒泄也鴨溏者大便如水少結糞者是也如此者當用天麻附子乾薑之類是也
泄有虛實寒熱虛則無力黏衣不便已泄出謂不能禁固也實則數至圊而不能便俗云虛坐努責是也
裏急後重皆依前法進退大承氣湯主之素問云春傷於風夏必飧泄又云久風爲飧泄者乃水穀不化而完出爾非水入胃而成此證非前水态也此一證不飲水而穀完出名曰飧泄治法於後先以宣風散導之出錢氏方中四味者是也後服蒼朮防風湯
五泄傷寒乃分三節初說暴次說中後說久此說在難經二十二難是三節內包十五法初以暴藥中以的對證藥候疾得中也末治久泄法仲景論厥陰經治法是也
治久泄法先進縮脾煎小續命湯是發其汗使邪氣不能以外侵於內然後治其利秋冬間下利風吐論中加減厚朴丸大效

自利并惧下

自利者不經下藥攻裏而自利也脈浮表不解自利或小便不利者五苓散一切瀉利間作桂苓甘露飲溫濕內甚而作利者黃連解毒湯或自利清水色純青心下痞痛口燥者皆濕熱相搏於腸胃之內而成下利者三一承氣湯當汗而反下及不成結胷而但下利清穀不化表證在表熱裏寒也急以四逆湯溫裏利止裏和急以桂枝解表或用巴豆熱藥下之而協熱利不止皆宜五苓散止利兼解表
暴注者注泄也乃腸胃熱而傳化失常經所謂清氣在下則生飧泄下迫者後重裏急窘迫急痛也火性急速而能造物俗云虛坐努責而痛
瀉白爲寒青黃紅赤黑皆爲熱也蓋瀉白者肺之色由寒水甚而制火不能平金則金肺自甚故色白如濁水凝冰則自然清瑩而白也青者肝木之色由火甚制金不能平木則肝木自甚故色青或言利色青爲寒者誤也仲景法曰少陰病下利清水色純青者熱在裏也大承氣湯下之及夫小兒熱甚急驚利色多青爲熱明矣利色黃者由火甚則水必衰而脾土自旺故色黃也利色紅爲熱者心火之色或赤者熱深甚也至若利色黑亦言爲熱者由火熱過極則反兼水化制之故色黑如傷寒陽明病熱極則日晡潮熱甚則不識人循衣摸牀獨語如見鬼狀法當大承氣湯下之大便不黑者易治黑者難治利同法然辨色以明寒熱者更當審其飲食藥物之色如小兒病熱吐利霍亂其乳未及消化而利尚白者不可便言爲寒當以脈證別之大法瀉利小便清白不澀爲寒赤色者爲熱又完穀不化而色不變吐利腥穢澄澈清冷小便清白不澀身涼不渴脈遲細而微者寒證也穀雖不化而色變非白煩渴小便赤黃而或澀者熱證也凡穀消化者無問色及他證便爲熱也未有寒泄而穀消化者由寒則不能消化穀也或火主疾速而熱甚則傳化失常穀不能化而飧泄者亦有之仲景曰邪熱不殺穀然熱得濕則飧泄或言下利白爲寒誤也若果爲寒則不能消穀何由反化爲膿

也所謂下利穀反爲膿血如世之穀肉果菜濕熱甚則自然腐爛潰發化爲濁水故食於腹中感人濕熱邪氣則自然潰發化爲膿血也其熱爲赤屬心火其濕爲黃屬脾土燥鬱爲白屬肺金也經曰諸氣膹鬱皆屬於肺謂燥金之化王水曰鬱而奔迫金氣之爲用也然諸瀉利皆兼於濕今反言氣燥者謂濕熱甚於腸胃之內而腸胃怫熱鬱結而又濕土乎庶以致氣液不得宣通因以成腸胃之燥使煩渴不止也假如下利赤白俗言寒熱相兼其說僭誤豈知水火陰陽寒熱者僭權衡也一高則必一下一盛則必一衰豈能寒熱俱甚於腸胃而同爲利乎如熱生瘡瘍而出白膿者豈可以白爲寒與由其在皮膚之分屬肺金故色白在血脈之分屬心火故爲血癰在肌肉屬脾土故作黃膿在筋部屬肝木故其膿色帶蒼深至骨屬腎水故紫黑血出各隨五臟之部而見五色是謂標也其本則一出於熱但分淺深而已大法下迫窘痛後重裏急小便赤澀皆屬燥熱而下利白者必多有之然則爲熱明矣或曰白利既爲熱病何故服辛熱之藥亦有愈者耶蓋辛熱之藥能開發腸胃鬱結使氣液宣通流濕潤燥氣和而已然病微者可愈甚者鬱結不開其病轉加而死凡治熱甚吐瀉亦然夫治諸利者莫若以辛苦寒藥治之或微加辛熱佐之則可蓋辛熱能發散開通鬱結苦能燥濕寒能勝熱使氣宣平而已如錢氏香連丸之類是也故治諸利者黃連黃蘗爲君以至苦大寒正主濕熱之病乃若世傳辛熱金石毒藥治諸叶瀉下利或有愈者以其善開鬱結故也然雖亦有驗者或不中牧反更加害凡用大毒之藥必是善藥不能取效不得已而用之可也幸有善藥雖不能取效但有益而無損者何必用大毒之藥而謾勞蠍蛤也經曰寧小與其大寧善與其毒此之謂也

成無己明理論

自利

傷寒自利何以明之自利者有不經攻下自然瀉泄者謂之自利也傷寒自利多種須知冷熱虛實消息投湯無致失差雜病自利多責爲寒傷寒下利多由協熱其與雜病有以異也表邪傳裏裏虛協熱則利不應下而便攻之內虛協熱遂利是皆協熱也又合病家皆作自利太陽與陽明合病必自下利葛根湯主之太陽與少陽合病必自下利黃芩湯主之陽明與少陽合病必自下利大承氣湯主之三者皆合病下利一者發表一者攻裏一者和解所以不同者蓋六經以太陽陽明爲表少陽太陰爲在半表半裏少陰厥陰爲在裏太陽陽明合病爲在表者也雖曰下利必發散經中邪氣而後已故與葛根湯以汗之太陽與少陽合病爲在半表半裏者也雖曰下利必和解表裏之邪而後已故與黃芩湯以散之陽明少陰合病爲少陽邪氣入腑者也雖曰下利必逐去胃中之實而後已故與承氣湯以下之是三者所以有異也下利家何以明其寒熱耶且自利不渴屬太陰以其臟寒故也下利欲飲水者以有熱也故大便溏小便白可者此爲有熱自利小便色白者少陰病形悉具此爲有寒惡寒脈微自利清穀此爲有寒發熱後重泄色黃赤此爲有熱皆可理其寒熱也凡腹中痛轉氣下趨少腹者此欲自利也自利家身涼脈小爲順身熱脈大爲逆少陰病脈緊下利脈暴微手足反溫脈緊反去者此爲欲解下利脈大者爲未止脈微弱數者爲欲自止雖發熱不死是知下利脈大爲逆而脈小爲順也自利宜若可溫理中白通諸四逆輩皆溫臟止利之劑又有腸胃有積結與下焦客邪投溫劑不能止之必也或攻泄之或分利之而後已經曰理中者理中焦此利在下焦宜赤石脂禹餘糧湯復不止當利其小便是泄在下焦滲泄而聚利者也少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥或下利三部脈皆平按之心下鞕或脈沉而滑或不欲食而讝語或差後至年月日復發此數者皆腸胃有積結而須攻泄者也內經有曰大熱內結注泄不止熱宜寒療結伏須除以寒下之結散利止大寒疑內久利泄瀉愈而復發綿歷歲年以熱下之寒去利止謂之通因通用下利雖有表證又不可發汗以下利爲邪氣內攻走津液而胃虛也故經曰下利不可攻其表汗出必脹滿者是已大抵下利脫氣至急五奪之中此爲甚者其或邪盛正虛邪擁正氣下脫多下利而死何以言之經曰下利日十餘行脈反實者死發熱下利至甚厥不止者死直視讝語下利者死下利手足厥冷無脈者灸之不溫脈不還者死少陰病自利復煩躁不得臥寐者死此數者皆邪擁正氣下脫而死者也金匱要略曰六腑氣絕於外者手足寒五臟氣絕於內者利下不禁嗚呼疾成而後藥雖神醫不可爲也氣既脫矣孰能治之

元張潔古活法機要

治法

五泄之病胃小腸大瘕三證皆以清凉飲子主之其泄自止厥陰證加甘草以緩之少陰證裏急後重故加大黃又有太陰陽明二證當進退大承氣湯主之少陰證不能食也當先補而後泄之乃進藥法也先煎厚朴半兩製水煎二三服後未已謂有宿食不消又加枳實二錢同煎二三服泄又未已如稍進飲食尚有熱毒又加大黃二錢推過泄止住藥如泄未止爲腸胃有久塵垢滑黏加芒硝半合宿垢去盡則愈也陽明證能食是也當先泄而後補謂退藥法也先用大承氣湯五錢水煎服如利過泄未止去芒硝後稍熱退減大黃一半再煎兩服如熱氣雖已其人必腹滿又減去大黃與枳實厚朴湯又煎三兩服如腹滿退泄亦自愈後服厚朴湯數服則已

張從政儒門事親

論五泄所宜氣味

胃泄者飲食不化完穀出色黃風乘胃也宜辛劑之類

脾泄者腹脹滿注食則生嘔逆三證宜和劑淡劑甘劑清劑之類

大腸泄者腸鳴切痛先宜寒劑奪之次甘劑分其陰陽

小腸泄者溲而便膿血小腹痛宜寒劑奪之淡劑甘劑分之

大瘕泄者裏急後重數至圊而不能便先宜清劑寒劑奪之後以淡劑甘劑分之或塞中痛亦然

金匱十全之法

飧泄春傷於風夏必飧泄暮食不化亦成飧泄風而飧泄者先宜發劑次宜淡劑甘劑分劑之類

洞泄春傷於風邪氣留連乃爲洞泄瀉下褐色治法同上又宜灸水分穴濕氣在下又宜以苦劑越之

洞泄寒中俗呼曰休息利洞泄屬甲乙風木可灸氣海水分三里慎勿服峻熱之藥小便澀則生足腫腹脹滿者死於庚辛之日如屍臭者不治

注下火氣太過宜凉劑又宜淡劑調冰水令頓服之則愈此爲暴下不止也

支滿鶩溏上滿而後泄下泄而後復上滿可服木香檳榔丸青皮陳皮久則反寒治法同寒中如鶩溏而腸寒者亦斯義風濕亦有支滿者

金匱十全五泄法後論

天之氣一也一之爲用風火燥濕寒暑故濕六氣之一也相乘而爲五變其化在天爲雨在地爲泥在人爲脾甚則爲泄故風而濕其泄也胃暑而濕其泄也脾燥而濕其泄也大腸熱而濕其泄也小腸寒而濕其泄也大瘕若胃泄不已變而爲飧泄飧泄不已變而爲洞泄洞泄不已變而爲脾泄寒中此風乘濕之變也若脾泄不已變而爲霍亂霍亂不已變而爲注下注下不已變而爲腫蠱此暑乘濕之變也若大腸泄不已變而爲臃腸臃腸不已變而爲腸鳴腸鳴不已變而爲支滿鶩溏此燥乘濕之變也若小腸泄不已變而爲腸澼腸澼不已變而爲臟毒臟毒不已變而爲前後便血此熱乘濕之變也若大瘕泄不已變而爲脫肛脫肛不已變而爲腸痛腸痛不已變而爲乳痔腸風此寒乘濕之變也凡此二十五變若無濕則終不成疾況脾胃二土其管中州胃好飲脾惡濕此泄之所由生也凡下利之脉微且小者生浮大者死水腫反是脉浮大者生沈細者死夫病在裏脉沈在表脉浮裏當下之表當汗之下利而脉浮滑水腫者脉沈細表裏俱受病故不治也凡臟血便血兩手脉俱弦者死絕俱滑大者生血溫身熱者死王太僕則曰若下血而身熱血溫是血去而外逸也血屬火故也七日而死者火之成數也夫飧泄得之於風亦汗可愈或伏驚怖則膽木受邪暴下綠水蓋謂戊己見伐於甲木也嬰兒泄綠水素問有嬰兒風理亦如之洞泄者飧泄之甚但飧泄近於洞泄洞泄久則寒中溫之可也治法曰和之則可汗之則不可蓋在腑則易治入臟則難攻洞泄寒中自腑而入臟宜和解而勿爭水腫之作未遽然也由濕遍於大腸小溲自澹水濕既渚腫滿日倍面黃腹大胕體如泥濕氣周身難專一法越其高而奪其下發其表而滲其中酸收而辛散淡滲而苦堅用攻劑以救其甚緩劑以平其餘如是則孤精得氣獨魄反陽亦可保形陳莝去而淨腑潔矣彼豆蔻烏梅鷺粟囊勿驟用也設病形一變必致大悞或通而窒或塞而通塞塞通通豈限一法世俗止知塞劑之能塞而不知通劑之能塞者拘於方也凡治濕皆可以利小溲爲主諸泄不已宜灸水分穴謂水穀之所別也腑之上一寸半灸五七壯腹鳴如雷水道行之候也凡濕勿鍼內經雖云繆刺其處莫若以張長沙治傷寒法治之蓋泄者亦四時傷寒之一也仲景曰上涌而下泄表汗而裏攻半在表半在裏則宜和解之表裏俱見隨證滲泄

此雖以治傷寒其於治濕也同仍察脈以視深淺問年壯以視虛實所投必如意矣諸厥固泄皆屬於下下謂下焦肝腎氣也夫守司於下腎之氣也門戶東要肝之氣也故諸厥固泄皆屬下也厥謂氣逆固謂禁固氣逆上行反固而不禁出入無度燥濕不恆皆由下焦失其主守也

治法

夫大人小兒暴注瀉水不已乃火運太過之病火主暴逆之故也急宜用水調桂苓甘露散五苓散益元散或以長流水煎過放冷服則愈慎不可聚用鴉粟殼乾薑豆蔻聖散子之類縱瀉止則腸胃不通轉生他疾止可以分陰陽利水道而已

凡泄瀉水穀不化日夜無度腹中雷鳴下利完穀可用導水丸禹攻散泄之或病人老弱氣虛可用無憂散泄之再觀病勢強弱候一二日可服胃風湯以治其風如不愈者更服桂枝麻黃湯汗之則愈內經曰夫風之中爲腸風飧泄胠元子云風入胃中上熏於胃故食不化而下泄又云暮食不化爲飧泄又經云春傷於風夏爲飧泄故風宜出汗腸中鳴者風以動之動而有聲慎不可用鴉粟豆蔻乾薑大燥之藥病微者燥之去其濕則愈病甚者攻之不動反能爲害經曰其減則漸其加則甚可用五苓散去豬苓加人參散服之

夫男子婦人病水濕瀉注不止因服豆蔻烏梅薑附峻熱之劑遂令三焦閉溢水道不行水滿皮膚身體否腫面黃腹大小便亦澀兩足按之陷而復起內經曰諸濕腫滿皆屬脾土可用獨聖散吐之如時月寒涼宜於暖室不透風處用火一盆以豬火力出汗大以導水禹功散量虛實瀉十餘行濕去腫減則愈矣是汗下吐三法齊行既汗下吐訖臟腑空虛宜以淡滲調養腸胃二三日次服五苓散益元散同煎燈心湯調下如勢未盡更宜服神助散舊名茯苓散可以流濕潤燥分陰陽利小便不利小便非其法也既平之後宜大將息忌魚鹽酒肉瓜果房室等事如此三年則可矣如或不然決死而不救也

瀉利之疾歲歲有之醫者不察便用聖散子之屬乾薑赤石脂烏梅鴉粟殼官桂石榴皮龍骨牡蠣之屬變生小便癃閉甚者爲脹又甚者水腫之疾間有愈者病有微者也甚則必不愈矣

大暑未上四之氣爲病多發暑氣頭痛身熱發渴不宜作熱病治宜以白虎湯得此病不傳染次發脾泄胃泄大腸泄小腸泄大瘕泄霍亂吐瀉下利及赤白相雜水穀不分清腸鳴切痛面浮足腫目黃口乾脹滿氣痞手足無力小兒亦如此四之氣病宜滲泄五苓散之類

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百七十三卷目錄

醫部彙考二百五十三

泄瀉門二

李杲十書 春傷於風夏爲飧泄論 春傷於風夏生飧泄
朱震亨心法 泄瀉
平治會粹 泄瀉從濕治有多少
局方發揮 泄利滯下治法不同
羅天益衛生寶鑑 濡泄 飧泄
戴思恭證治要訣 泄瀉
樓英醫學綱目 泄瀉 飧瀉
王綸明醫雜著 證治
李梴醫學入門 寒熱表裏證治 泄瀉證治 總論治法
李中梓醫宗必讀 治法有九 難經五泄 泄證有七 脈候

藝術典第二百七十三卷

醫部彙考二百五十三

泄瀉門二

元李杲十書

春傷於風夏爲飧泄論

素問生氣通天論曰春傷於風邪氣留連乃爲洞泄陰陽應象論曰春傷於風夏生飧泄王冰註曰風中於表則內應於肝肝氣乘脾故洞泄或飧泄成無己註云當春之時風氣大行春傷於風風氣通於肝肝以春適旺風雖入之不能卽發至夏肝衰然後始動風淫末疾則當發於四肢夏以陽氣外盛風不能外發故攻內而爲飧泄王海藏曰木在時爲春在人爲肝在天爲風當春之時發爲溫令反爲寒折是三春之月行三冬之令以是知水太過矣水既太過金肅愈嚴是所勝者乘之而妄行也所勝者乘之則木虛明矣木氣既虛火令不及是所生者受病故所不勝者侮之是以土來木之分變而爲飧泄也所以病發於夏者以木絕於夏而土旺於夏濕木有下行之體故也不病於春者以春時風雖有傷木實當權故也或謂春傷於風是人爲風所傷非也若是則止當頭痛惡風自汗何以言夏爲飧泄哉今言春傷於風卽是時傷令也明矣諸家註釋皆不得經旨者蓋由推求太過故耳夫風天地之氣也其傷於人人豈能於未發病之前預知其客於何經絡何臟腑何部分而成何病及其既發病然後可以診候始知其客於某經絡某臟腑某部分成某病耳註釋者苟悟因病始知病原之理則於此傷不勞餘力自迎刃而解矣夫洞泄是因其發動之時形診昭著乃逆推之而知其昔日致病之原爲傷風耳非是初受傷之時能預定其今日必爲此病也且夫傷於風也有當時發病者有過時發病者有久而後發病者有過時之久自消散而不成病者何哉蓋由邪氣之傳變聚散不常及正氣之虛實不等故也且以傷風言之其當時而發則爲惡風發熱頭疼自汗欬嗽喘促等病其過時與久而發則爲癘風熱中寒中偏枯五臟之風等病是則洞泄飧泄者乃過時而發之中之一病耳因洞泄飧泄之病生以形診推之則知其爲春傷於風藏蓄不散而致苟洞泄飧泄之病未生孰能知其已傷風於前將發病於後邪假如過時之久自消散而不成病者人亦能知乎夫風者春之令也春感之不卽發而至夏邪既不散則必爲疾其所以爲洞泄者以風乃天地浩蕩之氣飛揚鼓舞神速不恆人身有此腸胃之職其能從容傳化泌別而得其常乎故水穀不及分別而併趨下其爲飧泄亦類此義夫王冰之註雖未免泥於必字及未得經旨然却不至太遠也若成無己之說則似太遠矣然猶未至於甚也至王海藏立論則推求過極欲異於人殊不知反穿鑿綴緝乖悖經旨有不可勝言者此先儒所謂如大軍游騎出遠而無所歸矣姑摭成無己王海藏之說辨其甚者一二夫無己謂風淫末疾則當發於四肢雨淫腹疾則當發爲下利竊謂則當二字決然之辭也春傷風遇夏之陽氣外盛而不能外發故攻內爲飧泄此或若可通矣經曰木發無時倘風不傷於春而傷於他時不遇夏之陽氣外盛將外發乎將內攻乎況風屬陽與夏同氣果欲外出則當隨其散越之勢而出安有不能之理乎且風善行數變其爲病非一豈獨能爲四肢之疾乎所謂雨淫腹疾之義其不通亦如此乎乃若海藏則又以春傷風爲時傷令故於春傷風謂春行冬令而溫爲寒折又謂母亢而害所承之子吁何支離破碎徒費辭如此乎經曰亢則害承乃制其義謂己亢極則勝己者來制如火亢極則水來制之經所謂相火之下水氣承之水位之下土氣承之之類皆是勝己者爲承今以亢爲母承爲子將求

勝於經歟抑未達歟又如以制物者爲所勝受制者爲所不勝與經所謂氣有餘則制己所勝而侮所不勝及傳之於其所勝死於其所不勝之旨全反矣

春傷於風夏生飧泄 與前論異

木在時爲春在人爲肝在天爲風風者無形之清氣也當春之時發爲溫令反爲寒折是二春之月行三冬之令也以是知水爲太過矣水既太過金肅愈嚴是所勝者乘之而妄行也所勝者乘之則木虛明矣故經曰從後來者爲虛邪木氣既虛火令不及是所生者受病也故所不勝者侮之是以土來木之分變而爲飧泄也故經曰清氣在下則生飧泄以其濕令當權故飧泄之候發之於夏也若當春之時木不發生溫令未顯止行冬令是謂傷衛以其陽氣不出地上當以麻黃湯發之麻黃味苦味之薄者乃陰中之陽故從水中補木而瀉水發出津液爲汗若春木已生溫令已顯陽氣出於地上寒再至而復折之當以輕發之謂已得少陽之氣不必用麻黃也春傷於風夏生飧泄所以病發於夏者以其木絕於夏而土王於長夏濕本有下行之體故飧泄於夏不病於春者以其春時風雖有傷木實當權故飧泄不病於木之時而發於濕之分也經曰至而不至是爲不及所勝妄行所不勝者薄之所生者受病此之謂也

六脈沉緊按之不鼓膀胱小腸也或瀉利不止而腹脹或純便血赤血或雜膿血便雖多而不渴精神短少或面白脫色此失血之故或面黃而氣短此元氣損少之故且小腸者手太陽經丙火也膀胱者足太陽經壬水也是壬水來丙小腸之位小腸爲壬所尅而外走也諸手經短而足經長兼以五行相尅論之俱是足經此火投於水大寒之證宜溫之則愈其與難經一證寒熱相反亦名曰小腸瀉亦作洩海藏云此雜病火投於水變爲寒證又外傷足太陽膀胱經左脈俱浮爲表陽之候也忽變爲內寒亦旺火投盛水而屈內就壬化脈反不浮而微沉此內病與外病俱有此火投水例非精於診脈者孰能知之宜薑附赤石脂硃砂丹

如飧泄不禁以升陽除濕防風湯導其濕如飧泄及泄不止以風藥升陽蒼术益胃去濕脈實臚脹閉塞不通從權以苦多甘少藥泄之如得通復以升陽湯助其陽或便以升陽湯中加下泄藥

腸中寒則食已窘迫腸鳴切痛大便色白腸中寒胃中熱則疾饑小腹痛脹腸中熱胃中寒則脹而且泄非獨腸中熱則泄胃中寒傳化亦泄

朱震亨心法

泄瀉

泄瀉有濕火氣虛痰積濕用四苓散加蒼术甚者蒼白二术同炒用燥濕兼滲泄火用四苓散加木通黃芩伐火利小水痰積宜豁之用海粉青黛黃芩神麴糊丸服之在上者用吐提在下陷者宜升提之用升麻防風氣虛用人參白术炒芍藥升麻食積二陳湯和澤瀉蒼术白术山楂神麴川芎或吞保和丸

瀉水多者用五苓散久病大腸氣泄用熟地半兩炒白芍知母各二錢升麻乾薑各二錢炙甘草一錢爲末粥丸服之仍用艾炷如麥粒於百會穴灸三壯

脾瀉當補脾氣健運復常用炒白术四兩炒神麴三兩炒芍藥二兩半冬月及春初用肉蔻代之或散或湯作餅子尤佳

食積作瀉宜再下之神麴大黃作丸子服

脾瀉已久大腸不禁此脾氣已脫宜急澀之以赤石脂肉豆蔻乾薑之類

寒泄寒氣在腹攻刺作痛洞下清水腹內雷鳴米飲不化者理中湯或吞大已寒丸附子桂香丸畏食者八味湯

熱瀉糞色赤黃肛門焦痛糞出穀道猶如湯澆煩渴小便不利宜五苓散吞香連丸

濕瀉由坐臥濕處以致濕氣傷脾土不尅水梅雨久陰多有此病宜除濕湯吞戊己丸佐以胃苓湯重者术附湯

傷食瀉因飲食過多有傷脾氣遂成泄瀉必噫氣如敗卵臭宜治中湯加砂仁半錢或吞感應丸尤當

有脾氣久虛不受飲食者食畢卽腸鳴腹急盡下所食物方纔覺快不食則無事俗名錄食瀉經年不愈宜快脾丸三五粒

因傷於酒每晨起必瀉者宜理中湯加乾葛或吞酒煮黃連丸

因傷麵而瀉者養胃湯加蘿蔔子炒研破一錢痛者更加木香半錢瀉甚者去藿香加炮薑半錢

有每日五更初洞瀉服止瀉藥並無效米飲下五味丸或專以五味子煎飲亦治脾腎瀉惟省節飲食忌口但得日間上半夜無事近五更其瀉復作此病在腎俗呼爲脾腎瀉分水飲下二神丸及椒朴丸或平胃散下小茴香丸病久則重其人虛甚宜椒附湯

暑瀉因中暑熱者宜胃苓湯或五苓散加車前子末少許甚效

世俗類用澀藥治利與瀉若積久而虛者或可行之初得之者必變他疾爲禍不少殊不知多因於濕惟分利小水最爲上策

平治會粹

泄瀉從濕治有多少

泄瀉者水濕所爲也由濕本土土乃脾胃之氣也得此證者或因於內傷或感於外邪皆能動乎脾濕脾病則升舉之氣下陷濕熱下注并出大腸之道以胃與大腸同乎陽明一經也云濕可成泄垂教治濕大意而言後世方論泥云治濕不利小便非其治也故凡泄瀉之藥多用淡滲之劑利之下久不止不分所得之因遽以爲寒而用緊澀熱藥兜之夫泄有五殘泄者水穀不化而完出濕兼風也溏泄者漸下汙積黏垢濕兼熱也臭泄者所下澄澈清冷小便清白濕兼寒也濡泄者體重軟弱泄下多水濕自甚也滑泄者久下不能禁固濕勝氣脫也若此有寒熱虛實之不同舉治不可執一而言謹書數法於後夫泄有宜汗解者經言春傷於風夏必飧泄又云久風爲飧泄若保命集云用蒼术麻黃防風之屬是也有宜下而保安者若長沙言下利脈滑而數者有宿食也當下之下利已差至其時復發者此爲下未盡更下之安悉用大承氣湯加減之劑有宜化而得安者格致餘論夏月患泄百方不效視之久病而神亦瘁小便少而赤脈滑而顛弦腸鳴食減因悟此久積所爲積濕成痰留於肺中宜大腸之不固也清其源則流自清以茱萸等作湯溫服一椀許探喉中一吐痰半升如利減一半次早晨飲吐半升而利止有以補養而愈者若脾胃論言脈弦氣弱自汗四肢發熱大便泄瀉從黃芪建中湯有宜調和脾濕而得止者若潔古言曰四肢懶倦小便不利大便走泄沉困飲食減少以白朮芍藥茯苓加減治之有宜升舉而安者若試效方言胃中濕脾弱不能運行食下則爲泄助甲瞻風勝以赶之以升陽之藥羌活獨活升麻防風炙甘草之屬有宜燥濕而後除者若脾胃論言土濕有餘脈緩怠惰嗜臥四肢不收大便泄瀉從平胃散有宜寒凉而愈者若長沙言協熱自利者黃芩湯主之兼其濕熱之相宜者若長沙言下利脈遲緊痛未欲止當溫之下利心痛急當救裏下利清白水液澄澈可與理中四逆湯輩究其利小便之相宜者河間言濕勝則濡泄小便不利者可與五苓散從元散分導之以其收斂之相宜者東垣言寒滑氣泄不固製訶子散澀之以上諸法各有所主宜獨利小便而濕動也豈獨病因寒必待龍骨石脂緊重燥毒之屬澀之治者又當審擇其說一途取利約而不博可乎

局方發揮

泄利滯下治法不同

泄利一門其用鍾乳健脾丸朝眞丸駐車丸訶黎勒丸大溫脾丸黃連阿膠丸胡粉丸桃花丸訶黎勒散木香散七棗湯赤石脂散養臟湯御米湯金粟湯狗頭骨丸豆蔻丸肉豆蔻散三神丸丁香豆蔻散止瀉丸皆用熱藥爲主治以澀藥爲佐使當爲腸虛感寒而成滑利者設也彼瀉利者將無熱證耶將無積滯耶內經曰春傷於風夏爲飧泄多屬滯下夫瀉利證其類尤多先賢曰濕多成五瀉此確論也曰風曰濕固不可得而通治矣況風與濕之外又有雜合受邪似難倒用澀熱之劑今方中書證有兼治裏急者有兼治後重者有兼治裏急後重者此豈非滯下之病乎今瀉利與滯下哀同論治寶寶虛虛之患將不俟終日矣

或曰然則瀉利與滯下爲病不同治法亦別吾子其能通之乎曰經云暴注下迫皆屬於熱又曰暴注屬於火又下利清白屬於寒也熱者君火之氣火者相火之氣寒者寒水之氣屬火熱者二屬水寒者一瀉利一證似乎屬熱者多屬寒者少詳玩局方專以熱澀爲用若用之於下利清白而屬於寒者斯可矣經所謂下迫者即裏急後重之謂也其病屬火相火所爲其毒甚於熱也投以澀熱非殺之而何謹按仲景之法謂下利脈滑而數者有宿食當下之下利脈遲而滑者實也利爲未止急下之下利脈反滑當有所去下之安下利不欲食有宿食者當下之下利腹滿痛爲寒爲實當下之下利腹堅實當下之下利讝語有燥矢當下之下利三部脈皆平按之心下堅急下之下利已差至其時復發者此爲下未盡更下之安下利脈大浮弦下之當自愈風寒在者不可下下後心下堅痛脈遲此爲寒宜溫之脈浮大此爲虛强下之故也設脈浮革者因而腸鳴當溫之下利脈遲緊痛未欲止當溫之下利心痛急當救裏可與理中四逆附子輩下利大孔痛宜溫之觀仲景可下者十法可溫者五法謂之下者率用承氣加減何嘗以砒

丹巴硇決烈燥熱重毒之劑謂之溫者率用薑附爲主何嘗用鍾乳龍骨石脂粟殼緊澀燥毒之劑

或曰可下者豈非腸胃有積滯乎不用砒丹巴硇恐積滯未易行也吾子以爲未然幸發明承氣之意可乎予曰大黃之寒其性善走佐以厚朴之溫善行滯氣緩以甘草之甘飲以湯液灌滌腸胃滋潤輕快無所留滯積行即止砒丹巴硇毒熱類聚劑成丸藥其氣凶暴其體重滯積垢雖行毒氣所過譬如强暴貪賊手持兵刃其可使之徘徊顧瞻於堂奧間乎借使有愈病之功其腸胃清淳之氣能免旁損暗傷之患乎仲景治利可溫者溫可下者下或解表或利小便或待其自已區別易治難治不治之證至爲詳密然猶與滯下衰同立方命論其後劉河間分別在表在裏挾風挾濕挾熱挾寒挾虛明著經絡隄防傳變大槩發明滯下證治尤爲切要和血則便膿自愈調氣則後重自除此實旨者之日月聾者之雷霆也

或曰局方治法將終不能彷彿仲景之方耶予曰圓機活法內經具舉與經意合者仲景之書也仲景因病以治方局方製藥以俟病若之何其能彷彿也宋命近臣讎校方書近臣者衛業素異居養不同焉知醫之事哉雖知尊仲景矣亦未嘗不欲效之也徒以捧心效西施爾觀桃花丸一方可見矣即要略桃花湯也仲景以治便膿血用赤石脂丸者乾薑粳米同煮作湯一飲病安便止後藥意謂病屬下焦血虛且寒非乾薑之溫石脂之澀且重不能止血粳米味甘引入腸胃不使重澀之體少有凝滯故煮成湯液藥行易散餘毒亦無局方不知深意不造妙理但取易於應用喜其性味溫補借爲止瀉良方改爲丸藥劑以麪糊日與三服其果能與仲景之意合否乎

羅天益衛生寶鑑

濡泄

內經云濕勝則濡泄甲乙經云寒氣客於下焦傳爲濡泄夫脾爲五臟之至陰其性惡寒濕今寒濕之氣內客於脾故不能培助胃氣腐熟水穀致清濁不分水入腸間虛莫能制故洞泄如水隨氣而下爲之濡泄法當除濕利小便也

飧泄

內經云清氣在下則生飧泄又曰久風入胃中則爲腸風飧泄夫脾胃土也其氣沖和以化爲事今清氣下降而不升則風邪久而干胃是木賊土也故沖和之氣不能化而令物完出謂之飧泄或飲食太過腸胃所傷亦致米穀不化此俗呼水穀利也法當下者舉之而消尅之也以加減木香散主之

下多者還用白朮氣泄而不收則下多白朮甘壅補使正氣收而不下泄也或曰濕勝則濡泄朮專除濕於是下多者加之

明戴思恭證治要訣

泄瀉

冷泄不言而喻熱亦能瀉者蓋冷瀉臂之鹽見火熱則凝冷則復消熱瀉臂之水寒則凝結熱則復化爲水此外證狀不一疑似之間並用先見分水丸一二服惟傷熱瀉不可用

五虛者死脉細皮寒少氣前後泄痢飲食不入元是冷瀉因瀉而煩躁飲水轉飲轉瀉者參附湯理中湯加茯苓黃連名連理湯用之多有奇功且如今當暑月若的知暑瀉自合用暑藥的知冷瀉自合用熱藥中間有一等感暑又復內傷生冷非連理湯不可下泄無度泄後却彈過響肛門熱小便赤澀心下煩渴且又喜冷此藥爲宜若元是暑瀉經久下元虛甚日夜頻併暑毒之勢已然而瀉不已若用暑藥則決不能取效使用薑附輩又似難施疑似之間尤宜用此余生治傷寒協熱自利有用白薑黃對半名金銀湯者即此意也然不若連理湯爲穩如寒瀉服上藥未效宜木香湯或薑附湯六柱湯吞震靈丹養氣丹手足厥逆者兼進硃砂丹藥食方入口而即下者名曰直腸難治如瀉已愈而精神未復舊者宜十補湯寒瀉腹中大痛於服前藥外間進乳豆丸服諸熱藥以溫中並不見效登圃不迭穢物即出此屬下焦宜桃花丸二五粒同黎勒丸以澀之

暑瀉由冒感暑氣或飲啖日中之所曬物坐日中熱處證狀與熱瀉略同宜胃苓飲或五苓散加車前子少許兼進來復丹凡瀉津液既去口必渴小便多是亦澀未可便作熱論的知熱瀉方用冷劑不然勿妄投以致增劇瀉止渴自止小便亦能如常

氣瀉腸鳴氣走胷膈痞悶腹急而痛瀉則稍可須臾又急亦有腹急氣塞而不通者此由中脘停滯氣不流轉水穀不分所致宜大七香丸入米煎服久而不愈者寬中散吞震靈丹仍佐以米飲調香附末

濕瀉如其人本不甚瀉每日二三次鴨溏此脾家不燥常服平胃散自愈緣內有蒼朮可以燥脾

傷食瀉因飲食過多有傷脾氣遂成泄瀉俗呼爲傷

敗腹其人必噫氣如敗卵臭宜治中湯加砂仁半錢或七香丸紅丸子雜服

食積腹疼而瀉不可遽用治中兜住先用調脾飲吞感應丸或因食一物過傷而瀉後復食之即瀉者以脾爲其所傷未復而然宜健脾湯因食冷物停滯傷脾脾氣不暖所食之物不能消化瀉出而食物如故宜治中湯加乾薑吞酒煮黃連丸

或重而瀉泄類數者宜冲和湯

瀉已愈隔年及後期復瀉古論云病有期年而發者有積故也宜感應丸

風寒泄利下重其人四逆先以水盞半葱白二根煎一盞去葱煎四逆散至七分欵加北五味子乾薑各半錢悸加桂枝一錢小便不利加茯苓一錢腹痛加熟附子半錢

若審是不利清穀手足四逆其人面帶赤或腹痛或乾嘔或咽痛四逆湯倍乾薑面赤者加葱一根腹痛加芍藥一錢半嘔加生薑咽痛加桔梗一錢

若口中和而背惡寒宜正方四逆湯不必加減四逆散四逆湯俱治少陰下利四肢逆冷泄利下重者與下利清穀者一凉一溫又自有陰陽之別蓋四逆散是治四逆陽證四逆湯是治四逆陰證

若初得病便是少陰證其人發熱惡寒身疼頭不痛宜麻黃附子細辛湯微汗之或五積散加熟附半錢或五積散加順元散若煩悶厥逆或舌捲囊縮或下利清穀裏寒外熱此屬厥陰經陰中之陰宜進通脈四逆湯或當歸四逆湯加生薑茱萸舌捲囊縮不特陰中之陰有之陽明之熱陷入厥陰亦有之蓋陽明主宗筋宗筋爲熱毒風所致故弗榮而急引舌與卵是以舌捲囊縮當瀉陽以救陰宜大承氣湯

要知均自爲利身不熱手足自温者太陰身體四逆者少陰厥陰其餘身熱下利皆屬陽經然陰利有反發熱或初病無熱利後却熱或初得病即身熱繼而自利此陰利非陽傳陰經之利

若下利清穀身熱躁擾裏寒外熱仲景謂之反發熱此乃陰盛格陽宜四逆湯附子理中湯蓋陽氣傳陰經而下利者乃是熱利陽陷入裏外所以無熱陰氣入陰經而下利者乃是裏寒自利寒既在裏爲主則陽必客於外所以外反熱要知陰陽二證發熱自是不同發於陽而發熱者頭必疼發於陰而發熱者頭不痛此爲驗

有元是陽證因冷劑太驟遂見下利不止而諸陽證仍在略不少衰此當以暖藥固其下洞泄稍定又宜隨證治之不可用熱初病是陽經見頭疼以次陽傳入陰頭略不疼不可便謂不疼爲陰證須問其得病之初頭疼與否

瀉而腹痛有積者生料五苓散藿香正氣散均各半貼若瀉雖無積其腹痛甚生料五苓散加木香七分或六和湯加木香半錢或不加木香止與二藥煎熟去滓調下蘇合香丸

瀉而發熱者胃苓飲瀉而發渴者胃苓飲兼縮脾飲餘瀉渴兼作未透者湯化蘇合香丸吞來復丹或研來復丹作末白湯調下已透者香薷飲

傷濕小便祕大便溏者五苓散吞戊己丸戊己屬土土能尅水因以得名五苓乃濕家之要藥經云治濕不利小便非其治也意蓋取此

傷食瀉傷於生冷油膩停滯腸間脾氣不温食難消化或多餐糯食及一切難化之物並宜紅丸子金上牢丙消丸

樓英醫學綱目

泄瀉

五虛之證予嘗治數人在下則泄瀉不止在上則吐痰不已者皆死蓋氣脫無所管攝故也若用參朮膏救之於旱者十活二三

泄瀉身熱小便不利口渴者益元五苓若火多四苓加木通黃芩泄而困倦不便及脈數虛熱者宜參朮滑石苓通泄而脈滑堅者實熱宜大承氣湯

運氣泄瀉有六一曰土助脾濕盛而泄瀉經云歲土太過雨濕流行民病溏泄腸鳴又曰歲水不及濕乃下行民病身重濡泄又云歲火不及寒乃大行復則病發溏腹痛腸鳴泄注又云土鬱之發民病飲發注下又云濕勝則濡泄治以苦温是也

二曰風木攻脾虛而泄瀉經云厥陰司天風淫所勝民病冷泄溏泄又云春傷於風邪氣留連乃爲洞泄治以辛凉是也

三曰熱瀉經云少陽所至爲暴泄又云少陰之勝腹滿溏泄又云火鬱之發民病注下治以寒劑是也

四曰寒泄經云歲水太過寒氣流行民病腸鳴溏泄又云太陽所至爲流泄禁止又云太陽之勝寒入下焦傳爲濡泄治以熱劑是也

五曰熱中寒中泄經云太陽司天之政三之氣寒氣行民病寒反熱中注下者是外寒內熱泄也又云長

夏善病洞泄寒中者是外熱內寒泄也治以寒熱兼施是也

六曰燥泄經云歲木不及燥乃大行民病腸鳴溏泄又云陽明司天燥淫所勝民病腹中鳴注泄鶩溏又云陽明之勝清發於中溏泄又云陽明之復腹脹而泄治以溫劑是也

殘瀉

久風入中爲殘泄經云虛邪之中人也始於皮毛留而不去傳舍於絡脈留而不去傳舍於經留而不去傳舍於腸留而不去傳舍於伏衝之脈留而不去傳舍於腸胃在腸胃之時賁響腹脹多寒則腸鳴殘泄食不化此久風入中爲殘泄之義同也

運氣殘泄皆屬風木攻脾經云歲木太過風氣流行脾土受邪民病殘泄食減又云歲土不及風乃大行民病殘泄體重腹痛又云土不及曰卑監卑監之紀上角與正角同其病殘泄治以凉劑是也

王綸明醫雜著

證治

泄本屬濕然多因飲食不節致傷脾胃而作須看時令分寒熱新久而施治治法補脾消食利小便亦有升提下陷之氣用風藥以勝濕亦有久泄腸胃虛滑不禁者宜澀之用白术二錢茯苓芍藥炒各一錢五分已上三味乃泄瀉必用者陳皮一錢甘草炙五分若傷食瀉黃或食積加神麴麥芽山楂各一錢黃連炒七分若腹中窄狹再加厚朴枳實以消停滯

註按前證若飲食已消而泄瀉未止此脾胃之氣傷也宜五味異功散若泄瀉而腹中重墜此脾胃之氣下陷也宜補中益氣湯若服耗滯之劑而腹中窄狹此脾氣虛痞也宜六君子湯若脅脹少食善怒瀉青此脾虛爲肝所乘宜六君子加柴胡升麻木香若少食體倦善噫泄黃此脾虛下陷也宜六君子加升麻柴胡大凡諸證若脾脈沉弦者寒水侮脾土也當溫中補脾平肝若脾脈沉弦長者肝木乘脾土也當補脾平肝若脾脈沉弦者寒水侮脾土也當溫中補腎夫黃連枳實雖消停滯開痞悶若脾胃充實暴患實痞宜暫用若屢患屢服或脾胃虛痞者用之則脾胃反傷而諸證蜂起故東垣云脾胃實者用黃連枳實瀉之虛者用白术陳皮補之須分病之虛實人之南北而治之

若小便赤澀短少加猪苓澤瀉各一錢以分利之夏月加茵陳七分山梔仁炒四分

註按前證若津液偏滲於大腸大便瀉而小便少者宜用此藥分利若陰陽已分而小便短少者此脾肺氣虛而不能生水宜補中益氣湯加麥門五味陰火上炎而小便赤少者此肺氣受傷而不能生水六味地黃丸加麥門五味若腎經陰虛陽無所生而小便短少者滋腎丸若腎經陽虛陰無所化而小便短少者益氣湯六味丸若誤用滲泄分利復傷陽氣陰無所生而小便不利或目睛凸出腹脹如鼓或腿膝腫硬或皮膚斷裂者先用滋腎丸益氣湯每見元氣虛而復用澤瀉猪苓因損眞陰以致前證益盛者急投金匱加減腎氣丸多有復生者若反服牽牛大黃峻劑通之是速其危也

若口渴引飲加乾薑一錢五分人參麥冬各一錢升麻四分烏梅肉五箇

註按前證若胃氣傷而內亡津液者用七味白术散胃氣弱而津液少者用補中益氣湯氣血俱虛而津液少者用十全大補湯腎虛津液少者用六味地黃丸腎水不足而虛火上炎者用加減八味丸若腎水不足之人患泄瀉或服分利之劑過多而患口渴者若不用前藥以固其本源則肺腎復傷多變小便不利肚腹水腫等危證矣

若夏秋之間濕熱大行暴注水瀉加黃連蒼术澤瀉各一錢升麻木通各五分發熱作渴加乾薑石膏各一錢黃疸小便亦加茵陳一錢山梔木通各五分

註按東垣云若值秋燥令行濕熱少退體重節痛口舌乾燥飲食無味二便不調不欲飲食或食不化兼灑淅惡寒悽慘面惡此肺與脾胃虛而陽氣不伸也用升陽益胃湯治之前證若濕熱內作脾胃不能通調而致者宜用此藥分利之濕熱已去脾胃虛弱而致者宜用六君子當歸調補之濕熱已去脾氣下陷而致者宜用補中益氣湯升舉之

其黃疸若小便不利四肢沉重渴不欲飲此濕勝於熱用大茵陳湯大便自利茵陳梔子黃連湯若往來寒熱身黃者宜用小柴胡加梔子若因勞傷形體飲食失節而身黃者用小半夏湯蓋黃疸爲內傷不足之證宜調補脾胃元氣爲主若妄用驅逐復傷元氣多致不起

若久瀉脾胃虛弱飲食難化加黃芪炙人參各一錢神麴麥芽各一錢二分木香煨乾薑炙各五分

註按前證或作嘔或飲食少思屬脾胃虛弱用四君子加半夏木香或兼作嘔或腹作痛屬脾胃虛

寒用六君子加炮薑木香若麥芽善損腎神麴善化胎損神不宜輕用大抵此證多由泛用消食利水之劑損其眞陰元氣不能自主持遂成久泄若非補中益氣湯四神丸滋其本源後必胃痞腹脹小便淋瀝多致不起

若久瀉腸胃虛滑不禁加肉豆蔻訶子皮赤石脂各一錢木香煨乾薑炙各五分

註按東垣云中焦氣弱脾胃受寒冷大便滑瀉腹中雷鳴或因慢下未傳寒中復遇時寒四肢厥逆心胃絞痛冷汗不止此腎與脾胃虛也用沉香溫胃丸治之竊謂前證若脾胃虛寒下陷者用補中益氣湯加木香肉豆蔻補骨脂若脾氣虛寒不禁者用六君子湯加炮薑肉桂若命門火衰而脾土虛寒者用八味丸若脾腎氣血俱虛者用十全大補湯送四神丸若大便滑利小便閉塞或肢體漸腫喘嗽唾痰爲脾腎氣血俱虛宜用十全大補湯送四神丸若大便滑利小便閉澀或肢體漸腫喘嗽唾痰爲脾腎虧損宜用金匱加減腎氣丸

若飲酒便泄此酒積熱瀉也加黃連炒茵陳乾薑各一錢木香五分

註按前證若酒濕未散脾氣未虛宜用此藥分利濕熱若濕熱已去中氣被傷宜六君子調補中氣若誤服尅伐分利之劑胃脘漸滿小便短少或腿足與腹漸腫者急用加減金匱腎氣丸調補脾胃多有生者夫酒性大熱乃無形之物無形元氣受傷當用葛花解醒湯分消其濕往往反服大熱酒癉丸重瀉有形陰血使陽毒大旺元氣消亡折人長命金匱要略云酒疸下之久久爲黑疸每見善飲服酒癉丸者多患疸證不悟其因反服分利化痰以致變證而歿者多矣

若寒月溏泄清冷腹痛傷生冷飲食加神麴麥芽炒乾薑炙各一錢縮砂益智木香各七分

註按前證若脾腎虛寒宜用四神丸若脾腎虛脫用六君薑桂如不應急補命門火以生脾土

凡泄瀉病誤服參芪等甘溫之藥則病不能愈而或變爲黃疸蓋泄屬濕甘溫之藥能生濕熱故反助病邪久則濕熱甚而爲疸矣惟用苦寒瀉濕熱苦溫除濕寒則愈泄止後脾胃虛弱方可用參芪等藥以補之

若元氣素弱飲食難化食多即腹內不和疼痛泄瀉此虛寒也枳朮丸加人參白芍藥酒炒神麴炒大麥芽炒杵去皮各一兩

註按前方乃飲食所傷之治法也東垣云亦有六淫而致瀉者又有飲食所傷而致瀉者有因胃氣下流而致泄者有因風而成殘泄者有因痰積於上焦以致大腸不固而泄者有因脾胃氣虛而洩者治法外淫所傷當調六氣七情所傷當平五臟飲食所傷當消停滯胃氣下流當升舉之因風者解散之痰積於上焦去其痰脾胃氣虛者補益之丹溪謂飲食畢而腸鳴腹痛瀉盡食物者脾虛食泄用理中湯加炮薑攻刺腹痛洞下水穀名寒瀉用理中湯送大戟己丸寒甚者附子桂香九惡食者八物湯糞色青黃肛門痛煩躁作渴小便不利者名熱瀉用五苓散香連丸瀉而惡食氣噫腐臭名食瀉治中湯加砂仁或送感應丸

若傷冷食不消腹痛溏泄枳朮丸加半夏薑製一兩縮砂乾薑神麴各炒大麥芽各五錢

註按前證若傷性熱之物者二陳加黃連山楂傷濕麪之物者二陳加神麴麥芽傷米食者六君加穀蘗傷麪食者六君加麥蘗傷肉食者六君加山楂傷魚腥者六君倍加陳皮傷葷炊飯者六君倍加酒麴若物已消而瀉未愈者此脾胃受傷也宜六君子湯若飲食減少或食而難化者屬脾胃虛寒加炮薑木香肉果不應加五味吳茱萸補骨脂脾腎虛寒者須服八味丸否則多患脾虛中滿之證其神麴麥芽雖助戊土以腐熟水穀麥芽一味余嘗以治婦人喪子乳房脹痛欲成癰者用二兩炒熟煎服即消其破血散氣可知矣丹溪云麥芽消腎婦人良方云神麴善下胎皆尅伐之功多而補益之功少亦不宜輕用

李梴醫學入門

寒熱表裏證治

傷寒無汗寒熱相搏而有汗不能遍身惟在頭也背強者表不利也證與風濕相似渗濕湯主之帶表五積交加散裏寒理中湯加附子裏多浮腫术附湯妙陽證自利湯泄身熱腫下亦熱作渴尿赤後重泄下黃赤故曰腸垢陰證自利太陰手足溫少陰厥陰手足厥冷腫下亦冷不渴利下清白故曰鴨溏熱因表邪入裏挾風則所下必暴寒乃直中陰經大法熱宜和解或攻泄或利小便寒宜溫中或固下焦俱不宜發汗令胃氣虛而脹滿作但自利舊分陽證陰證又

分協熱協寒而治法相同然陽證自利亦必裏氣虛而表熱乘之乃能自利雖太陽初證下利亦然與表邪傳裏協熱下利無異至於陰證協寒其證尤顯所以云陽證下利誤溫則發黃斑出而死此等支離去處每爲合一庶不惑入大柴裏氣協熱下利黃赤者黃芩湯最妙帶表口渴下利者柴芩湯少陰熱證渴而下利者白虎湯少陰熱證欬而嘔渴心煩不得眠而下利者猪苓湯熱甚口燥心煩下利純清水者大承氣湯潮熱譫語脈滑有宿食者大柴胡湯或陶氏黃龍湯下利脈和者內實下利脈滑或浮大按之反澀不飲食者有宿食並宜下之又太陽初傷風下利不惡寒頭痛嘔心痞腹痛者桂枝湯加芫花或十棗湯胃不和腸鳴下利者生薑瀉心湯小便澀大便利者赤石脂丸下利頻而溺如常者自止橘皮竹茹湯調之合病自利及心痞下利見各條

裏氣協寒下利清白太陰不渴者理中湯四逆湯寒毒入胃者四逆湯加韭白少陰自利虛渴脈微者白通湯厥逆無脈者白通加猪膽汁湯通脈四逆湯少陰下利咽痛者甘桔湯厥陰下利先厥而後發熱者下利必自止若再厥者必復利也小建中湯當歸四逆湯利不止者赤石脂禹餘糧湯又下利身痛者先以四逆湯救裏利止但身痛者急服桂枝湯救表凡下利讝語直視及厥躁不得眠汗不止無脈及自利不禁身熱脈實者皆死

少壯人實熱下利不宜止澀止之則加熱悶而死名曰壯熱斷下

邪在表則能食邪在裏則不能食表裏之間者欲食而不能食今傷寒厥深下利脈遲當不能食而反能食者名曰除中中之胃氣既除豈可再復

泄瀉證治

濡瀉即濕瀉腸垢即熱瀉鴨溏即寒瀉虛瀉滑瀉大要熱者小便赤澀煩渴腹中熱穀或不化而色變青黃或黃赤黑身能動作聲響亮手足溫寒者小便清白不渴腹中冷完穀色亦不變變亦白色身懶動作目睛不了了飲食不下樣要云暴瀉非陽久瀉非陰正如傷寒始寒而終熱也

濕瀉如水傾下腸鳴身重腹不疼外濕者胃苓湯除濕湯木附湯加茯苓內濕者白朮芍藥湯白朮茯苓湯二白丸風濕相搏者麵苦丸痛甚者治痛瀉方

風濕惡風自汗或帶清血即太陰飧瀉反其所食原物出春傷風寒夏感冷濕發動故其瀉暴一方長幼相似不可溫澀以致變爲痢腹要知四季脾受風濕亦名飧瀉春宜古蒼防湯蒼芍湯夏宜二香散秋宜神朮散冬宜不換金正氣散微汗之稍久者三白湯麵苦丸帶血虛者胃風湯

寒瀉惡寒身痛腹脹切痛雷鳴鴨溏清冷完穀不化甚則脾敗肢冷理中倍加茯苓厚朴治中湯加砂仁或大巳寒丸又有一種臟冷以熱手按之則緩者四柱散古薑附湯

暑瀉如水煩渴尿赤暴瀉實者藿香湯加黃連車前子或桂苓甘露飲虛者六和湯清暑益氣湯有潮熱者柴苓湯升麻葛根湯日久香連丸黃連阿膠丸來復丹

食瀉食積痛甚瀉後痛減臭如抱壞鷄子噫氣作酸須先消尅所傷之物傷冷食者感應丸平胃散加香附砂仁草果山楂麥芽傷熱食及酒者二黃丸加神麯傷酒晨瀉者理中加生薑乾葛或香葛丸熱者酒蒸黃連丸傷麪者人參養胃湯加蘿蔔子傷水飲者五苓散溫六丸

七情瀉腹常虛痞欲去不去去不通泰藿香正氣散加丁香砂仁良薑或木香匀氣散七氣湯古黃連丸調其氣而瀉自止

痰瀉或瀉不瀉或多或少此因痰流肺中以致大腸不固二陳湯加白朮神麯貲者海青丸虛者六君子湯

火瀉實火口渴喜冷痛一陣瀉一陣肛門焦痛其來暴速稠粘五苓散去桂加黃連芍藥或黃芩湯加木連六一散兼嘔者加薑汁火性急米穀不化者薑汁炒黃連爲丸服虛火氣虛不能泌別水穀者衛生湯陰虛火動不能凝聚者三白湯飲之久者升陰丸

虛瀉困倦無力脾虛飲食所傷有遇飲食即瀉者四君子湯加木香砂仁蓮肉陳糯米爲末砂糖湯調服久者只加升麻白芍或平胃蒜肚丸有停蓄飲食數日乃瀉腹脹者名濕瀉枳朮丸沒石子丸煩渴或兼嘔者錢氏白朮散參苓白朮散食少腸鳴四肢困倦者升陽除濕湯日止夜瀉者磨脾丸又脾瀉久傳腎爲腸癖經年不愈者調中健脾丸又有人脾腎虛瀉者用吳茱萸鹽水浸透以豬豬膽頭一截洗去脂膜將茱萸入內紮兩頭蒸爛搗丸菉豆大每五十丸米飲下暖膀胱清水道固大腸進飲食

腎虛色慾所傷瀉多足冷久則肉消五鼓臍下絞痛

或只微響溏瀉一次者古味萸散二神丸四神丸陽虛者三味安腎丸金鎖正元丹養氣丹陰虛者腎氣丸

肝虛忿怒所傷木尅脾土門戶不束厥而面青當歸厚朴湯或熟料五積散去麻黃汗多者黃芪建中湯

凡瀉脈細皮寒前後瀉利飲食不入是謂五虛不治滑瀉久不止大孔如竹筒直出無禁氣陷者升陽補胃湯補中益氣湯加白芍有風者小白朮湯挾熱者訶子散沒石子丸或古萸連丸鬻粟殼煎湯下氣欲脫者眞人養臟湯加附子或四柱散大斷下丸古蔻附丸香茸丸婦人四製香附丸又有大腸滑瀉小便精出者萬全丸

交腸瀉者大小便易位而出此因氣不循故道清濁混淆所致當分利陰陽使氣順各安其位胃苓湯木香勻氣散腎氣丸

總論治法

凡瀉皆兼濕初宜分理中焦滲利下焦久則升提必滑脫不禁然後用藥澀之其間有風勝兼以解表寒勝兼以溫中滑脫澀住虛弱補益食積消導濕則淡滲陷則升舉隨證變用而不拘於次序與痢大同且補虛不可純用甘溫太甘則生濕清熱亦不可太苦太苦則傷脾每兼淡劑利竅爲妙

抑考難經云胃泄飲食不化色黃脾泄腹脹嘔逆言瀉也大腸泄食已窘迫色白腸鳴切痛小腸泄溲而便膿血小腹痛大瘕泄裏急後重數至圊而不能便莖中痛而溺澀言痢也觀此瀉與痢亦惟膿血與糞之異除傷寒三陽三陰傳變自利雜病濕熱食積之根皆責腸胃蓋泄瀉瘧痢同由暑月飲食所致輕者便作泄瀉重者停爲瘧痢痰衝胷脅則爲瘧積滯腸胃則爲痢局方分難經五瀉者不免失之牽強

李中梓醫宗必讀

治法有九

愚按內經之論泄瀉或言風或言濕或言熱或言寒此明四氣皆能爲泄也又言清氣在下則生飧泄此明脾虛下陷之泄也統而論之脾土強者自能勝濕無濕則不泄故曰濕多成五泄若土虛不能制濕則風寒與熱皆得干之而爲病治法有九

一曰淡滲使濕從小便而去如農人治澇導其下流雖處卑監不憂巨浸經曰治濕不利小便非其治也又云在下者引而竭之是也

一曰升提氣屬於陽性本上升胃氣注迫輒爾下陷升柴羌葛之類鼓舞胃氣上騰則注下自止又如地上淖澤風之卽乾故風藥多燥且濕爲土病風爲木藥木可勝土風亦勝濕所謂下者舉之是也

一曰清涼熱淫所注暴注下迫苦寒之劑用滌燔蒸猶當溽暑伊鬱之時而商飆颯然倏動則炎歊如失矣所謂熱者清之是也

一曰疎利痰凝氣滯食積水停皆令人瀉隨證祛逐勿使稽留經曰實者瀉之又云通因通用是也

一曰甘緩瀉利不已急而下趨愈趨愈下泄何由止甘能緩中善禁急速且稼穡作甘甘爲土味所謂急者緩之是也

一曰酸收瀉下日久則氣散而不收無能統攝注泄何時而已酸之一味能助收肅之權經云散者收之是也

一曰燥脾土德無慙水邪不濫故瀉皆成於土濕濕皆本於脾虛倉廩得職水穀善分虛而不培濕淫轉甚經云虛者補之是也

一曰溫腎腎主二便封藏之本然雖屬水眞陽寓焉少火生氣火爲土母此火一衰何以運行三焦熟腐五穀乎故積虛者必挾寒脾虛者必補母經云寒者溫之是也

一曰固澀注泄日久幽門道滑雖投溫補未克奏功須行澀劑則變化不愆揆度合節所謂滑者澀之是也

夫是九者治瀉之大法業無遺蘊至於先後緩急之權豈能豫設須臨證之頃圓機靈變可以胥天下於壽域矣

難經五泄

胃泄飲食不化色黃承氣湯脾泄腹脹滿泄注食卽嘔吐建中湯理中湯大腸泄食已窘迫大便色白腸鳴切痛乾薑附子湯小腸泄溲而便膿血少腹痛承氣湯大瘕泄裏急後重數至圊而不能便莖中痛承氣湯

泄證有七

腎泄者五更溏泄久而不愈是腎虛失閉藏之職也五味子散亦有食積者香砂枳朮丸寒積理中湯宜夜飯前進酒積葛花解酲湯

鶩泄者中寒糟粕不化色如鴨糞澄澈清冷小便清白附子理中湯

飧泄者水穀不化而完出也史記名迥風風邪干胃

木來賊土清氣在下升陽除濕湯
洞泄一名濡泄瀉下多水也胃苓湯水液去多甚而
轉筋血傷故筋急也升陽除濕湯
痰泄者痰留於肺大腸不固脈必弦滑以藥探吐其
人神必不爽色必不衰或二陳湯加蒼术木香
火泄者腹痛瀉水腸鳴痛一陣瀉一陣火也黃芩芍
藥湯張長沙謂之協熱自利
直腸泄者食方入口而即下極爲難治大斷下丸
脈候
胃脈虛則泄脈滑按之虛者必下利腎脈小甚爲洞
泄肺脈小甚爲泄泄脈洪大者逆下利日十餘行脈
反實者死腹鳴而滿四肢清泄其脈大者十五日死
腹大脹四末清脫形泄甚不及一時死下則泄瀉上
則吐痰皆不已爲上下俱脫死

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百七十四卷目錄
醫部彙考二百五十四
泄瀉門三
張三錫醫學準繩六要 論泄瀉
趙獻可醫貫 論泄瀉
喻昌醫門法律 論痢瀉
張介賓景岳全書 論證 分利治法 清瀉論治
陳士鐸石室秘錄 泄瀉治法
方 一香茸丸 大承氣湯 小承氣湯 梔子豉湯 通脈四逆湯 萬全湯 參胃丹 參附湯 黃芪建中湯 黃連阿膠湯 黃連烏梅丸 黃芩湯 調中益氣湯 升陽益胃湯 升陽除濕湯 沉香溫胃丸 薏附赤石脂 神砂丹 四神湯 加味五苓湯 火輪丸 白朮附子湯 茯苓飲 橘皮竹茹湯 加味治中湯 藿香正氣丸 又方 大已寒丸 八味湯 鵝黃丸 又方 清六丸 椒附丸 二神丸 參苓白朮散 玉粉散 對金飲子 加減木香散 雨白丸 膠香散 附子溫中湯 聖中丸 大陷胸丸 啓脾丸 平胃茯苓湯 調中健脾丸 大腹皮湯 下丸 調中湯 白蔻湯 內金蔻散 厚朴丸 四聖丸 豆附丸 消中湯 內金蔻散 予胃散 大醋香散

藝術典第二百七十四卷
醫部彙考二百五十四
泄瀉門三
明張三錫醫學準繩六要
論泄瀉

脾虛不能分別清濁則瀉或食物過度飲酒無節運化不及而然河間悉指爲濕熱恐未爲至論也夏月人多瀉者濕熱太盛泉水泛溢脾土受虧又餐瓜果肉麵清濁混淆甚則爲霍亂也老年病後瀉久必足趺眼胞及手作腫脾敗之象

河間辨別寒熱黑白分明可謂確論矣大都以脈之遲數口之渴否定寒熱日之新久腹中痛否定虛實猶爲切當

謹按泄瀉之病濕火痰虛暑積風冷八者之殊必以滲濕燥脾爲主而隨證加減濕則導之火則清之寒則溫之虛則補之痰則豁之暑則驅之積則消之風則解之是其大法也雖然八證之明三虛宜辨三虛者何脾虛肝虛腎虛是也脾虛者飲食所傷也肝虛者忿怒所傷也腎虛者色慾所傷也飲食傷脾不能運化色慾傷腎不能閉藏忿怒傷肝木邪尅土皆令泄瀉然腎瀉肝瀉間或有之惟脾瀉恒多耳蓋人終日飲食一或有傷便致泄瀉又常論之泄瀉痛痢同乎一源多由暑月傷脾所致飲食纔傷便作泄瀉爲輕停滯既久則痛痢爲重而瘧與痢又有分別飲食爲痰充乎胃聰則爲瘧飲食爲積膠乎腸胃則爲痢古云無痰不成瘧無積不成痢良有以也王節齋曰瀉本屬濕多因飲食不節致傷脾胃而作須看時令寒熱新久而治大法滲濕補脾消導分利爲主有宜升提下陷之氣者有用風藥以勝其濕者又有賜胃虛滑不禁宜收澀者不可不知久瀉不止加破故紙肉豆蔻山藥佳

趙獻可醫貫
論泄瀉

秦越人難經有五泄之分曰胃泄曰脾泄曰大腸泄曰小腸泄曰大瘕泄夫所謂大瘕泄者卽腎泄也註云裏急後重數至圊而不能便莖中痛世人不知此證悞爲滯下治之禍不旋踵卽今所謂痢疾也此是腎虛之證欲去不去似痢非痢似虛努而非虛努蓋痢疾後重爲因邪壓大腸墜下故大腸不能升舉而重治以大黃檳榔輩瀉其所壓之邪而愈又有久瀉大腸虛滑元氣下陷不能自收而重乃用粟殼等澀劑以固其脫升其墜而愈其虛坐努責此痢後積已去盡無便而但虛坐耳此爲亡血過多倍用歸芎以和之而愈惟腎虛後重者亦數至圊而不能便必莖中痛或大便不能得而小便先行而瀝或欲小便而大便反欲去而痛獨褚氏精血論中云精已耗而復竭之則大小便道牽痛愈痛則愈便愈便則愈痛須以補中益氣湯倍升麻送四神丸又以八味地黃丸料加五味吳茱萸補骨脂肉豆蔻多服乃效此等證候以痢藥致損元氣肢體腫脹而斃者不可枚舉腎既主大小便而司開闔故大小便失職者責之腎臟腑瀉利其證多端大抵皆因脾胃而作東垣先生製脾胃論一篇專以補中益氣湯升提清氣爲主其間治脾瀉之證庶無餘蘊矣特未及乎腎瀉也是故以其濕也利水以分之以其風也助風以平之以其實也下之以其虛也補之寒則溫之熱則清之有食者化之有積者祛之凡五行之相勝與六氣之加臨莫不以生尅制化之法治之然而經年經月不得一效者何耶仲景云下利不止醫以理中湯與之利益甚理中者理中焦此利在下焦當治以理下焦法則愈矣昔趙以德有云予聞先師言泄瀉之病其類多端得於六淫五邪飲食所傷之外復有雜合之邪似難執法而治乃見先師治氣暴脫而虛頓瀉不知人

口眼俱閉呼吸甚微幾欲絕者急灸氣海飲人參膏十餘斤而愈治積痰在肺致其所合大腸之氣不固者湧出上焦之痰則肺氣下降而大腸之虛自復矣治憂思太過脾氣結而不能升舉陷入下焦而成泄瀉者開其鬱結補其脾胃使穀氣升發也治陰虛而腎不能司禁固之權者峻補其腎而愈也凡此之類甚多因問先生治病何神也先生無他圓機活法內經熟之自得矣

經曰腎主大小便又曰腎司開闔又曰腎開竅於二陰可見腎不但主小便而大便之能開能閉者腎操權也今腎既虛衰則命門之火熄火熄則水獨治故令人多水瀉不止其瀉每在五更天將明時必洞瀉二三次何也蓋腎屬水其位在北於時爲亥子五更之時正亥子水旺之秋故特甚也惟八味丸以補眞陰則腎中之水火既濟而開闔之權得宜況命門之火旺火能生土而脾亦强故古方有椒附丸五味子散皆治腎瀉之神方也考之薛按云脾胃虛寒下陷者用補中益氣湯加木香肉果補骨脂若脾氣虛寒不禁者用六君子湯加炮薑肉桂若命門火衰脾土虛寒者用八味丸若脾腎氣血俱虛者用十全大補湯吞四神丸若大便滑利小便閉塞或肢體漸腫喘嗽唾痰爲脾腎虧損宜金匱加減腎氣丸

醫門法律 臣喻昌著

論飧泄

問逆秋氣則傷肺冬爲飧泄與春傷於風夏生飧泄有別否曰傷風而飧泄以風爲主風者東方木也傷肺而飧泄以肺爲主肺者西方金也其候各異安得比而同之風邪傷人必入空竅而空竅惟腸胃爲最風既居於腸胃其導引之機如順風揚帆不俟脾之運化食入即出以故飧已即泄也不知者以爲脾虛完穀不化如長夏洞泄寒中及冬月飧泄之泄反以補脾剛燥之藥助風性之勁有泄無已每至束手無策儻知從春令治之用桂枝領風從肌表而出一二劑而可愈也而秋月之傷肺傷於肺之燥也與秋傷於燥冬生欬嗽同是一病但在肺則爲欬嗽在大腸則爲飧泄所謂肺移熱於大腸久爲腸澼者即此病也但使肺熱不傳於大腸則飧泄自止不知者惟務止泄以燥益燥吾目中所見諸大老之誤歷歷可指也寃哉

逆秋氣則太陰不收肺氣焦滿冬爲飧泄蓋肺熱葉焦爲脹滿也肺傷則腎水失其所生故當冬令而爲腎虛飧泄飧泄者水穀不分而寒泄也

景岳全書 臣張介賓著

論證

凡內經有言飧泄者有言濡泄者皆泄瀉也有言腸澼者即下痢也然痢之初作必由於瀉此瀉之於痢本爲同類但瀉淺而痢深瀉輕而痢重瀉由水穀不分出於中焦痢以脂血傷敗病在下焦在中焦者濕由脾胃而分於小腸故可澄其源所以治宜分利在下焦者病在肝腎大腸分利已無所及故宜調理眞陰并助小腸之主以益氣化之源此瀉痢之證治有不同而門類亦當有辨然病實相關不可不兼察以爲治也

泄瀉之本無不由於脾胃蓋胃爲水穀之海而脾主運化使脾健胃和則水穀腐熟而化氣化血以行營衛若飲食失節起居不時以致脾胃受傷則水反爲濕穀反爲滯精華之氣不能輸乃致合污下降而瀉痢作矣脾强者滯去即愈此强者之宜清宜利可逐可攻也脾弱者因虛所以易瀉因瀉所以愈虛蓋關門不固則氣隨瀉去氣去則陽衰陽衰則寒從中生固不必外受風寒始謂之寒也且陰寒性降下必及腎故瀉多必亡陰謂亡其陰中之陽所以泄瀉不愈必自太陰傳於少陰而爲腸澼者豈非降瀉之甚而陽氣不升臟氣不固之病乎凡脾胃氣虛而有不升不固者若復寒之逐之則無有不致敗者此强弱之治大有不同故凡治此者有不可概言清利也

泄瀉之因惟水火土三氣爲最夫水者寒氣也火者熱氣也土者濕氣也此泄痢之本也雖曰木亦能瀉實以土之受傷也金亦能瀉實亦金水同氣因其清而失其燥也知斯三者若乎盡矣然而三者之中則又惟水火二氣足以盡之蓋五行之性不病於寒則病於熱大都熱者多實虛者多寒凡實熱之證必其脈盛形强聲音壯亮食飲裕如舉動輕捷者此多陽也虛寒之證必其脈息無力形氣少神言語輕微舉動疲倦者此多陰也故必察其因而於初瀉之時即當辨其有餘不足則治無不愈而亦不致有誤矣

分利治法

凡泄瀉之病多由水穀不分故以利水爲上策然利水之法不同如濕勝無寒而瀉者宜四苓散小分清飲之類主之但欲分其清濁也如濕挾微寒而瀉者宜五苓散胃苓湯之類主之此以微溫而利之也如

濕熱在脾熱渴喜冷而瀉者宜大分清飲茵陳飲益元散之類主之此去其濕熱而利之也

泄瀉之病多見小水不利水穀分則瀉自止故曰治瀉不利小水非其治也然小水不利其因非一而有可利者有不可利者宜詳辨之如濕勝作瀉而小水不利者以一時水土相亂併歸大腸而然有熱勝作瀉而小水不利者以火乘陰分水道閉澀而然有寒瀉而小水不利者以小腸之火受傷氣化無權而然有脾虛作瀉而小水不利者以土不制水清濁不分而然有命門火衰作瀉而小水不利者以眞陰虧損元精枯涸而然凡此皆小水不利之候然惟暴注新病者可利形氣強壯者可利酒濕過度口腹不慎者可利實熱閉塞者可利小腹脹滿水道痛急者可利又若病久者不可利陰不足者不可利脈證多寒者不可利形虛氣弱者不可利口乾非渴而不喜冷者不可利蓋虛寒之瀉本非水有餘實因火不足本非水不利實因氣不行夫病不因水而利則亡陰瀉以火虛而利復傷氣倘不察其所病之本則未有不愈利愈虛而速其危者矣

諸瀉論治

泄瀉之暴病者或爲飲食所傷或爲時氣所犯不由於口腹必各有所因宜察其所因而治之如因食生冷寒滯者宜柳扶煎和胃飲之屬以溫之因濕滯者宜平胃散胃苓湯或白朮芍藥散以燥之利之因食滯而脹痛有餘者宜大小和中飲之屬以平之因氣滯而痛瀉之甚者宜排氣飲或平胃散之屬以調之因食滯而固結不散或胃氣之强實者宜神祐丸赤金豆百順丸之屬以行之

凡初感者病氣未深藏氣未敗但略去其所病之滯則胃氣自安不難愈也

凡脾氣稍弱陽氣素不强者一有所傷未免即致泄瀉此雖爲初病便當調理元氣非强盛偶傷者之比如因瀉而神氣困倦者宜養中煎或溫胃飲或聖术煎或四君子湯或五君子湯如微寒兼滯而不虛者宜佐闢煎若脾虛而胃滯者宜五味異功散若脾虛而微寒微滯宜六味異功煎或溫胃飲若因飲食不調忽而溏瀉以漸而甚或見微痛但所下酸臭而頗色淡黃便是脾虛胃寒不化之證即宜用五德丸再甚者即宜用胃關煎切勿疑也

凡兼眞陰不足而爲泄瀉者則或多臍下之痛或於寅卯時爲甚或食入已久反多不化而爲嘔惡溏瀉或瀉不甚臭而多見完穀等證蓋因丹田不煖所以尾閭不固陰中火所以中焦易寒此其咎在下焦故曰眞陰不足也本與中焦無涉故非分利所及惟胃關煎爲最上一乘且人之患此者最多勿謂其爲新病而不可用也勿謂其爲年少而未宜用也覺有是證即宜是藥劑少功多攸利非小但知者見其先昧者見其後見之後恐見之遲矣所以貴先見也

腎泄者即前所謂眞陰不足證也每於五更初或天將明時即洞泄數次有經月連年弗止者或暫愈而復作者或有痛有不痛者何也蓋腎爲胃關開竅於二陰所以二便之開闔皆腎藏之所主今腎中陽氣不足則命門火衰而陰寒獨盛故於子丑五更之後當陽氣未復陰氣盛極之時即洞泄不止也古方有椒附丸五味子散皆治此之良方若必欲陽生於陰而腎氣充固則又惟八味地黃丸爲宜然余嘗用此則似猶未盡善故特製胃關煎一炁丹九炁丹復陽丹之屬斯得其濟者多也或五味子丸亦佳其有未甚者則如五德丸四神丸皆其最宜者

凡脾泄久泄暑大都與前治脾弱之法不相遠但新瀉者可治標久泄者不可治標且久瀉無火多因脾腎之虛寒也若止因脾虛者惟四君子湯參术湯參苓白术散之屬爲宜若脾胃兼寒者宜五君子煎黃芽丸五德丸若脾氣虛寒兼滯悶者宜六味異功煎溫胃飲聖术煎若脾氣虛寒之甚而飲食減少神疲氣倦宜參附湯术附湯十全大補湯若病在下焦腎氣虛而微熱者宜六味地黃丸微寒者宜八味地黃湯或胃關煎若脾虛溏泄久不能愈或小兒脾泄不止者止用敦阜糕黏米固腸糕亦易見效若脾胃寒濕而溏瀉不止者蒼术丸亦佳若久瀉元氣下陷大腸虛滑不收者須於補劑中加烏梅五味子粟殼之屬以固之

大瀉如傾元氣漸脫者宜速用四味回陽飲或六味回陽飲主之凡暴瀉用此無不即效若久瀉者猶恐無及蓋五奪之中惟瀉最急是不可見之不早也倘藥未及效仍宜速灸氣海以挽回下焦之陽氣仍須多服人參膏

酒泄證飲酒之人多有之但酒有陰陽二性人有陰陽二臟而人多不能辨夫酒性本熱酒質則寒人但知酒有濕熱而不知酒有寒濕也故凡飲酒而生濕熱者因其性也以糞汁不滋陰而悍氣生熱也因酒

而生寒濕者因其質也以性去質不去而水留爲寒何以辨之常見人有陽强氣充而善飲者每多泄瀉若一日不瀉反云熱悶蓋其隨飲隨瀉則雖瀉不致傷氣而得瀉反以去濕此其先天稟厚胃氣過人者也最不易得亦不多見此而病者是爲陽證不過宜清宜利如四苓散大分清飲或酒蒸黃連丸之類去其濕熱而病可愈也若陽虛之人則與此大異蓋脾虛不能勝濕而濕勝即能生寒陽氣因寒所以日敗胃氣因濕所以日虛其證則形容漸羸飲食漸減或脈見弦細或口體常見寒或臍腹常有隱痛或眩運常多困倦或不安於五鼓或加甚於秋冬但無熱證可據而常多殘泄者則總屬虛寒也凡若此者若不速培陽氣必致漸衰而日以危矣余於四旬之外亦嘗病此數年其勢已窘因遍求治法見朱丹溪曰因傷於酒每晨起必瀉者宜理中湯加葛根或吞酒蒸黃連丸王節齋曰飲酒便泄者此酒積熱瀉也宜加黃連茵陳乾薑木香之屬薛立齋曰若酒濕未散脾氣未虛宜用此藥分利濕熱若濕熱已去中氣被傷宜用六君調補中氣又曰酒性大熱乃無形之物無形則元氣受傷當用葛花解醒湯分消其濕凡此諸論若已盡之然朱王二家之說則不分寒熱皆用黃連是但知酒之有熱而不知酒之有寒烏足憑也惟薛氏之說雖亦云酒性大熱而所重在脾誠若善矣余因效之初服葛花解醒湯不效繼服六君子補中益氣湯又不效再服理中八味俱不效斯時也計窮力竭若無再生之望矣因潛思熟計料非峻補命門終無益也乃服自製胃關煎右歸丸一炁丹等方仍絕口不飲以杜其源調理年餘竟得全愈自後始明性質之理多得濟人向使已無確見執濕熱之說而妄用黃連乾葛清凉分利之劑焉望其有今日即或自用稍遲則既甚亦難挽矣矧今人之病此者最多而是陰是陽不可不辨凡陽盛者脾强胃健而氣不易奪者故治本無難而泄亦無慮陽衰者脾腎既傷則脫氣最易故宜防其無及不可不爲深慮也若必以酒爲熱則其爲古法所誤者誠不少矣

氣泄證凡遇怒氣便作泄瀉者必先以怒時挾食致傷脾胃故但有所犯即隨觸而發此肝脾二臟之病也蓋以肝木尅土脾氣受傷而然使脾氣本强即有肝邪未必能入今既易傷則脾氣非强可知矣故治此者當補脾之虛而順肝之氣此固大法也但虛實有微甚則治療宜分輕重也如稟壯氣實年少而因氣泄瀉者可先用平胃散或胃苓湯若肝氣未平而作脹滿者宜解肝煎先順其氣若脾氣稍弱者宜二术煎或黏米固腸糕或消食導氣飲若脾稍寒者宜抑扶煎吳茱萸散或蒼术丸若脾弱居多者宜溫胃飲聖术煎或六味異功煎此證必須切戒怒氣

風泄證亦當辨其風寒風熱而治之熱者如傷寒外感熱利之屬是也宜以傷寒門自利條諸法治之寒者以風寒在胃而脾土受傷如內經所云春傷於風夏爲飧泄之屬是也宜以前溫胃理中之法治之

石室秘錄臣陳士鐸著

泄瀉治法

脾經之病如水瀉乃脾氣不温用白术一兩車前五錢二味煎湯服之立效蓋水瀉者乃一時水氣侵脾故傾腹而出用白术以利腰臍之氣血用車前以分消其水勢白术車前利腰臍而消水勢是矣然而白术亦能健脾脾健水濕自然分原不必借重車前車前能通竅而安臟氣亦不止分消已也臟安則濕氣自消各有專能又能分助所以奏效如神耳

瀉證乃水瀉也寒瀉易治火瀉難醫往往有一日一夜瀉至數百遍者傾腸而出完穀不化糞門腫痛瀉下如火之熱此亦百千中之一見也然無方救之必致立亡我今酌定一方名截瀉方薏仁白芍各二兩黃連人參各三錢茯苓五錢甘草二錢山藥車前子各一兩肉桂三分水煎服一劑而瀉減半再劑而瀉止愈後用六君子湯調治此等證因火盛之極挾水穀之味一直下行不及傳道所以完穀而出也若認作脾氣之虛以止塞之則脾益壯而勢益急矣我乘其勢而利導之則水氣分消火勢自散所以奏功能神

大瀉之證往往用止瀉之藥至數兩者亦一時權宜之計而不可執之爲經久之法

大瀉濡之始能止瀉若過於酸收則大腸細小矣下不能出又返而上故止瀉之藥止可一時用之而不可經久用之也

大瀉方用白术茯苓各一兩肉桂五分澤瀉豬苓各三錢一劑即止瀉更有腎經作瀉五更時痛下七八次者亦用八味地黃湯一料煎湯二碗與服當日即減大半二服愈四服全愈

大瀉之後必多亡陰亡陰既多則元陽亦脫若不急爲收止則陰絕陽亡可立而待法當用止塞之品或

疑邪未去盡如何止住其水萬一邪居中州則腹心之患不可不慮其言則是其理則非吾言大瀉者乃是純下清水非言下痢也痢無止法豈瀉水亦無止法乎故人患水瀉者急宜止遏方用白朮五錢茯苓二錢車前子北五味酸棗仁各一錢吳茱萸五分水煎服此方止藥少於補藥健脾去濕水性分消不收而自收也若純以澀殼之類以澀止之而不分消其滔天之勢則阻滯一時勢必潰決反生大害矣

水瀉者人見其如瀑而下皆曰宜急止之以免亡陰之證用澀殼烏梅之類止之其論則是其治則非也水瀉雖不比痢疾之斷不可止然而水瀉之中亦有不可遽止之病如腹疼肛重皆是有火不比虛寒之瀉也當用通因通用之法治之方用人參白芍各三錢檳榔車前甘草各一錢治之此方之妙在車前以滑之而佐以檳榔之去積自然有滯皆行況車前性雖滑而能分消水穀則水氣自然分開第大瀉之後自然亡陰又用人參以補氣則氣足而陰自生又慮久瀉自然虛中又加甘草以和之雖是通因通用之法實乃扶正之方也

大瀉之後雖是火瀉畢竟宜溫補之以生其陰瀉一止即宜用四物湯加人參炮薑以溫補而不可謂水瀉忌滑而禁用歸熟也

陽證之火瀉也完穀不化飲食下喉即出一日或瀉十餘次或數十次或晝夜數百次人以爲熱也然而熱之生生於腎中之水衰不能制火使胃土關門不守於上下也論其勢之急迫奔騰似乎宜治其標然治其標不能使火之驟降必須急補腎中之水使火有可居之地而後不致於上騰方用熟地白芍各三兩山萸車前甘草茯苓各一兩肉桂三分水煎服此方乃補腎之湯非止瀉之藥也然而止瀉之妙捷如桴鼓蓋腎水一生腎火即降頃刻應驗非好爲奇談而不據實理也若止作胃虛有火治之未嘗無功終不若此之捷脾約丸亦佳安能及此方之神哉

凡人大便溏泄小便艱澀乃由氣虛身子羸弱飲食不進方用人參一兩茯苓三錢白朮五錢陳皮甘草澤瀉車前子各一錢水煎服此乃病欲下行隨其性而下補之也方用人參爲君者開其胃氣胃爲腎之關關門不開則上之飲食不能入下之糟粕不能出妙在用人參以生胃土而茯苓車前能分消水穀也且胃之性最喜溫和不喜過濕濕則必上壅而嘔下積而瀉矣今順土之性而溫補之則飲食自進而大小便各安其位矣此方生胃土以消水穀誰曰不然然而不止生胃土也且能健脾脾健則胃氣益開而脾氣益壯方中最妙用白朮也白朮上利胃而下健脾且能祛濕以生腎有此大功則大小便得脾腎之氣而能開能闔下既通達又何患飲食之不進乎吾見其飽餐而無礙也若服前方而不愈者兼服八味丸以補土母蓋八味丸最能實大腸利膀胱也

大瀉之後自多亡陰宜以補陰藥治之然而以補陰之藥治之反足增其水勢法當以溫藥補之用熟地白朮人參薏仁各五兩山藥山茱萸各四兩肉桂肉果北五味吳茱萸各一兩各爲末蜜丸如梧子大每日晚飯前吞五錢旬日即健矣此方之妙不用茯苓澤瀉猪苓之類去分消水氣而水氣自然分消蓋補腎正所以補脾而緩治勝於急治也

火瀉者乃火挾邪勢將膀胱脾中水穀盡驅而出必欲無留一絲而後快腹必大痛手不可按完穀不化飲食下喉即出捷如奔馬若稍稍遲延必死亡頃刻蓋其病得之下秋之暑熱一遇涼風便起波濤乘風拍浪薄日掀天直趨海口而下若不急用大劑治之而尚王道之遲遲鮮不敗乃事矣方當用大黃一兩人參二兩黃連車前子各五錢甘草一錢水煎服此方之奇全在用大黃既已火瀉何反助其威不知火瀉之證乃火留於腸胃之間若不因勢利導則火不去而水不流故必用大黃以利之也然徒用大黃而不多用人參有攻無補反致損傷真氣矣至方中又加甘草者恐大黃過於猛迅用此緩之也更用車前者分消其水勢也水不入於膀胱則大腸增勢而添流今得車前自然引水歸於故道又何至陸地爲水鄉哉此又霸治之妙法也

方一

香茸丸（普濟方）

治飲酒成泄骨立不能食但飲酒即泄

嫩鹿茸酥炙　肉蓯蓉煨各一兩　麝香五分另研

右爲末陳白米飯丸梧子大每米飲下五十丸

大承氣湯（仲景同下）

治下利心下堅而脈實者

大黃四兩酒洗　厚朴半斤炙去皮　芒硝三合

枳實五枚炙

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮取二升去滓內芒硝更上火微煎一二沸分溫再服得下止服

小承氣湯

治下利讝語此有燥屎也

大黃四兩　厚朴三兩炙　枳實大者三枚炙

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服得利則止

梔子豉湯

治下利後更煩按之心下濡者爲虛煩也

梔子十四枚　香豉四合綿裹

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐則止

通脈四逆湯

治下利清穀裏寒外熱汗出而厥者

附子大者一枚生用　乾薑三兩強人可四兩　甘草二兩炙

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服

黃芩湯

治乾嘔下利

黃芩　人參　乾薑各三兩　大棗十二枚

桂枝一兩　半夏半升

右六味以水七升煮取三升分溫三服

養胃丹（中藏經下同）

治脾胃不和全不思食中脘停寒嘔逆惡心臟寒泄痢腹痛腸鳴常服溫中養胃散飲思食

人參三分　丁香一兩半　甘草炙　白豆蔻仁　半夏麴各半兩　乾薑三兩炮用乾生薑尤佳

右同爲細末煉蜜爲丸每兩作十丸每服一丸溫湯化下空心食前服之或細嚼湯下亦可

炙肝散

治胃中風邪益脾進食凡人虛弱用補藥日久漸至瘦損食少倦怠大便頻數泄漏服此無不取效

白朮　白芍藥　白芷　桔梗各四兩

右各生爲細末用不入水猪肝五兩作小片子或塊子拌藥十五錢細切葱白二寸鹽一錢同拌肝令勻以竹簽子作串慢火炙香熟嚥之米飲送下空心食前各一服渴勿喫冷水半月必安

黃連丸（千金方下同）

治上焦冷下痢腹內不安食好注下

黃連　烏梅肉各八兩　桂心二兩　乾薑

附子　阿膠各四兩　樗皮　芍藥　黃蘗各三兩

右九味各爲末蜜丸如梧子大飲下二十丸加至三十丸

黃連煎

治中焦寒洞泄下利或因霍亂後瀉黃白無度腹中虛痛

黃連　酸石榴皮　地榆　阿膠各四兩　黃蘗當歸　厚朴　乾薑各二兩

右八味咬咀以水九升煮取三升去滓下阿膠更煎取烊分三服

紫參湯（仲景下同）

治下利腸痛

紫參半斤　甘草三兩

右二味以水五升先煮紫參取二升內甘草煮取一升半分溫三服

訶黎勒散

治氣利

訶黎勒十枚煨

右一味爲散粥飲和頓服

黃蘗止洩湯（千金方）

治下焦虛冷大小便洞泄不止

黃蘗　人參　地榆　阿膠各三兩　黃連五兩　茯苓　樗皮各四兩　艾葉一斤

右八味咬咀以水一斗煮取三升去滓下膠消分三服

調中益氣湯（東垣十書下同）

治夏月飧泄米穀不化

黃芪一錢　人參　甘草　蒼朮各五分　柴胡　橘皮　升麻各二分　木香一分或二分

右件剉麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去粗帶熱宿食消盡服之寧心絕思藥必神效蓋病在四肢血脈空腹在旦是也嗽者減人參

升陽除濕防風湯

治前證

蒼朮泔浸去皮淨四兩　防風二錢　白茯苓　白朮　白芍藥各一錢

右件咬咀除蒼朮另作片子水一椀半煮至二大盞內諸藥同煎至一大盞去粗稍熱服空心食前

又方

治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉

注下腹脅虛滿腸鳴疠痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度並宜服之

人參　白茯苓　芍藥　當歸　桂　白芍藥　白朮各等分

右爲麤散每二錢水一大盞入粟米數百粒同煎至七分去粗稍熱服空心食前小兒量力減之

扶脾丸

治脾胃虛寒腹中痛溏瀉無度飲食不化

大麥糵炒　神麴炒各四錢　乾薑　藿香

紅豆各一錢　白朮　茯苓　橘皮　半夏

訶子皮　炙甘草　烏梅肉各二錢　乾生薑

肉桂各五分

右爲細末荷葉燒飯爲丸如梧子大每服五十丸白湯送下食前

黃芪補胃湯

治一日大便三四次溏而不多有時作泄腹中鳴小便黃

黃芪　柴胡　當歸身　益智　橘皮各三分

升麻六分　炙甘草二錢　紅花少許

右㕮咀都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱食前服之

升陽除濕湯

治自下而上者引而去之

蒼朮一錢　柴胡　羌活　防風　升麻　神麴　澤瀉　猪苓各五分　炙甘草　陳皮留白

麥糵麴各三分

右作一服水二盞煎至一盞去粗空心服之

沉香溫胃丸

治中焦氣弱脾胃受寒飲食不美氣不調和臟腑積冷心腹疼痛大便滑泄腹中雷鳴霍亂吐瀉手足厥逆便利無度

附子炮去皮臍　巴戟酒浸去心　乾薑炮

茴香各一兩　官桂七錢　沉香　甘草炙

當歸　吳茱萸洗炒去苦　人參　白朮　良薑

白芍藥　白茯苓　木香各五錢　丁香三錢

右爲細末用好酢打麪糊丸如梧子大每服五七十丸飲下空心食前日進三服忌一切生冷物

薑附赤石脂硃砂丹

治虛寒泄利

生附子　生乾薑各半兩　硃砂一兩另研

赤石脂一兩半水飛

右爲細末酒糊丸如黑豆大每服十五丸至二三十丸米飲湯下茯苓煎湯下尤妙

胃風湯

治腸胃不足風冷乘之水穀不化泄瀉注下腹中虛滿及腸胃受濕下如豆汁或下瘀血日夜無度並宜服之

人參　白茯苓　芍藥　桂心不見火　當歸

白芍藥　白朮　甘草炙

右等分㕮咀每服四錢水一盞半入粟米百餘粒煎至七分去滓空心稍熱服

加味五苓湯（治生方下同）

治伏暑熱二氣及胃濕泄瀉注下或煩或渴或小便不利

赤茯苓　澤瀉　猪苓去皮　肉桂不見火

白朮各一兩　車前子半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓溫服不拘時候或進來復丹亦可

火輪丸

治腸胃虛寒心腹疼痛泄瀉不止

乾薑炮　附子炮去皮臍　肉豆蔻麪裹煨

右等分爲細末米糊爲丸如梧桐子大每服五十丸空心米飲送下

白朮附子湯

治腸胃虛濕腸鳴泄瀉或多自汗

白朮二兩　附子炮　茯苓各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑七片棗子一枚煎至七分去滓溫服不拘時候

禹餘糧丸

治腸胃虛寒滑泄不禁

禹餘糧石煅　赤石脂煅　龍骨　訶子麪裹煨　草芨　乾薑炮　肉豆蔻麪裹煨　附子炮去皮臍

右等分爲細末酢糊爲丸如梧桐子大每服七十丸米飲送下食前

加味治中湯

治脾胃不足飲食不節過食生冷腸鳴腹脹泄瀉注下

乾薑炮　白朮　青皮　橘紅　縮砂仁各一兩　人參　甘草炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片棗子一枚煎至七分去滓溫服不拘時候或兼進感應丸

薑麴九 升溪下同

止瀉

隔年陳麥麵作麴二兩炒二兩生　茴香五錢

生薑二兩煨一兩生

右爲末用前生麴打糊爲丸每服五七錢白湯下

又方

治前證

滑石水飛夏二兩半秋二兩春冬一兩二錢半

肉豆蔻五兩

右爲末飯丸或水調服

清六丸

去三焦濕熱治泄瀉多與清化丸同用並不單用兼治產後腹痛或自利者能補脾補血亦治血痢

六一散一料　紅麴炒半兩

右爲末飯丸梧子大每五七十丸白湯下一方紅麴二兩半

大巳寒丸

治脾胃虛寒泄瀉

葷茇　肉桂各四兩　乾薑炮　高良薑各六兩

右爲末水煮麪糊丸梧子大每三十丸空心米飲吞下

八味湯

治命門陽虛泄瀉

吳茱萸湯洗七次　乾薑炮各二兩　陳皮

木香　肉桂　丁香　人參　當歸洗焙各一兩

右剉每四錢水一盞煎七分溫服

朮附湯

治脾胃虛寒泄瀉

甘草二兩炙　白朮四兩　附子炮一兩半

右剉每服三錢薑五片棗一枚煎空心服

感應丸

治前證

巴豆七十箇去皮心膜出油　乾薑炮一兩

杏仁百四十箇湯浸去皮尖研　木香　肉豆蔻

丁香各一兩半

右前四味爲末外入百草霜二兩研與巴豆杏仁七味同和勻用好蠟六兩鎔化成汁以重絹濾去粗更以好酒一升於銀石器內煮蠟數沸傾出待酒冷其蠟自浮於上取蠟稱用春夏修合用清油一兩銚內熬令沫散香熟次下酒煮蠟四兩同化成汁就銚內乘熱拌和前項藥末秋冬修合用清油一兩半同煎煮熟成汁和勻藥末成劑分作小錠子油紙裹旋丸服之每三十丸空心薑湯下

椒附丸

治命門火衰泄瀉

椒紅炒　桑螵蛸炙　龍骨　山萸肉　附子炮

鹿茸酒蒸焙

右爲末酒糊丸每六十丸空心鹽湯下

二神丸

治前證

破故紙炒四兩　肉豆蔻二兩生

右爲末以大肥棗四十九箇生薑四兩切同煮棗爛去薑取棗肉研膏入藥和丸每五十丸鹽湯下

參苓白朮散

治脾胃虛弱飲食不進或致嘔吐泄瀉及大病後調助脾胃

白茯苓　山藥　人參　白朮各二斤　扁豆炒

蓮子　砂仁　薏苡仁　桔梗炒黃色各一斤

甘草炙三斤

右爲末每服二錢煎棗湯調下

對金飲子 寶鑑下同

治瀉利

草豆蔻麪裹煨　平胃散各五錢　五苓散二錢半

右相合作四服水一盞半薑三片棗二箇煎一盞去粗溫服食前

加減木香散

治瀉利

木香　高良薑　升麻　人參　檳榔各二錢半

神麴炒二錢　吳茱萸炮　肉果煨　縮砂仁

乾薑炮　陳皮各五分

右十一味爲粗末每服四錢水一盞半煎至一盞去粗溫服食前宜加白朮

南白膠香散

治脾胃虛寒滑腸久瀉臍腹疼痛無休止

米殼四兩酥炒　龍骨　南白膠香各三兩

甘草七錢炙　乾薑半兩炮

右五味爲粗末每服五錢水一盞半煎至一盞去粗溫服食前忌冷物傷胃

玉粉散

治冷極泄瀉久作滑瀉不禁不思飲食宜服神效

紅豆揀淨　大附子炮去皮臍　乾薑炮各半兩

船上硫黃另研二錢半
右四味爲末入研藥勻每服二錢空心半稀半稠粟米飲下至晚又一服重者十服必效輕者三五服安

附子溫中湯
治中寒腹痛自利水穀不化脾胃虛弱不喜飲食懶言語困倦嗜臥
乾薑炮　黑附子炮去皮臍各七錢　人參去蘆　炙甘草　白芍藥　白茯苓去皮　白朮各五錢　草豆蔻麵裹煨去皮　厚朴薑製　陳皮各三錢
右十味咬咀每服五錢貳一兩水二盞半生薑五片煎至一盞三分去粗溫服食前

堅中丸
治脾胃受濕滑泄注下
黃連　黃蘗　赤茯苓　澤瀉　白朮各一兩
陳皮酒白　肉豆蔻　人參　半夏麴　官桂
白芍藥各半兩
右十一味爲末湯浸蒸餅丸如桐子大每服五七十丸溫米飲送下食前

啓脾丸 入門 下同
治大人小兒脾積五更瀉消疳黃腫定腹痛常服生肌健脾益腎
人參　白朮　茯苓　山藥　蓮肉各一兩
陳皮　澤瀉　山楂　甘草各五錢
右爲末蜜丸彈子大每一丸空心米飲化下或爲散服亦好

平胃蒜肚丸
治脾瀉水瀉便紅下血等證久痢先行後以此補之神效
猪肚一具去脂膜以大蒜裝滿線縫用冷水熱水各七椀先將水燒滾入肚煮至水乾爲度取搗爛
蒼朮　陳皮　厚朴各五兩　川椒少許
右四味同肚再搗至肚無絲方可爲丸梧子大每服二錢白湯下

調中健脾丸
治脾腎氣虛早晚溏瀉及臟寒久瀉亦宜
白朮　破故紙　訶子　肉果各一兩　白茯苓
陳皮各八錢　黃連吳萸炒七錢　木香　厚朴
小茴　砂仁　山藥　蓮子各五錢　神麴六錢
右爲末粥丸梧子大每七十丸蓮子煎湯下大斷下丸
治脾胃虛耗及臟腑停寒腹痛下利滑數肌肉消瘦飲食不入氣弱時發虛熱
龍骨　附子　肉豆蔻　枯礬　牡蠣　訶子
酸石榴皮各二兩　細辛七錢半　高良薑
乾薑　赤石脂各一兩半
右爲末酢糊丸梧子大每服三十丸粟米飲下

訶子散
治瀉利久不止者
訶子肉一兩半生半熟　木香五錢　甘草
黃連各三錢
右爲末每二錢白朮芍藥煎湯下

古蔻附丸
治臟寒脾瀉及老人中氣不足久瀉不止
肉豆蔻二兩　附子一兩半
右爲末粥丸梧子大每八十丸蓮子煎湯下

衛生湯
治脾胃虛瀉
人參　白朮　茯苓　陳皮　甘草　山藥
澤瀉　薏苡仁　黃連各等分
右水煎服

理中湯 良方 下同
治腸胃虛弱瀝瀝有聲泄瀉頻併
人參　白朮　乾薑炒　甘草炒各二錢半
加茯苓　厚朴薑製各一錢
右作一服水二鍾生薑三片棗一枚煎至一鍾不拘時服

調中湯
治腸虛泄瀉止嘔進食
藿香葉　縮砂仁　蓬朮炮　乾薑炮　肉桂
茴香炒　草果各一錢　蒼朮　橘紅　麥芽炒
益智仁　神麴炒　枯梗　甘草炙各半錢
右作一服水二鍾生薑三片紅棗二個鹽少許煎至一鍾不拘時服

肉豆蔻散
治脾虛腸鳴泄瀉不食
肉豆蔻七枚每一枚劃一竅納丁香一粒在內以麪裹煨熟去麪不用
右碾爲末分作二服不拘時用米飲湯調下

平胃散
治寒濕泄瀉

蒼朮三錢炒　厚朴薑汁製　橘紅各三錢
甘草炙一錢
右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾不拘時服

厚朴丸
治泄瀉不止
白龍骨　乾薑炮　附子炮去皮臍　厚朴薑製　訶子炮去核　肉豆蔻麵裹煨　陳皮各一兩
右爲細末酒煮糊爲丸如梧桐子大每服五七十丸空心米飲下

補脾丸
治滑泄不禁
肉豆蔻剉裹煨　厚朴薑製　白薑炮　赤石脂　白朮黃土炒各一兩　神麯炒　附子炮去皮臍　麥蘗炒　蓽茇各五錢
右爲細末酢煮糊爲丸如梧桐子大每服五十丸空心用米飲送下

大藿香散
治一切脾胃虛寒心腹撮痛如泄瀉不已最效
藿香一兩　陳皮　厚朴薑製　木香　良薑炒　青皮炒　肉豆蔻麵裹煨　麥蘗炒　神麯炒　訶子肉煨　白豆蔻仁　人參　甘草炙各半兩　白乾薑炮二錢
右爲細末每服三錢空心米飲調服

四聖丸
治脾泄腎泄
肉豆蔻生二兩　破故紙炒四兩　木香不見火　茴香炒各一兩
右爲細末生薑煮棗肉爲丸如梧桐子大每八九十丸空心用鹽湯送下一方去茴香木香用神麯麥蘗各炒一兩爲丸

二豆附丸
治腸胃虛弱內受風寒水穀不化泄瀉注下
肉豆蔻剉煨　附子炮去皮臍　白茯苓各四兩　肉桂　木香　乾薑炮各二兩　丁香一兩
右爲細末薑汁煮麵糊爲丸如梧桐子大每服五七十丸或至一百丸用生薑湯送下粥飲亦可

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百七十五卷目錄
醫部彙考二百九十五
泄瀉門四

方二
肉豆蔻麵裹煨　乾薑炮　厚朴去皮薑製
橘紅　甘草炙各二兩　茴香　肉桂　訶子皮
川烏炮去皮臍各一兩　蒼术米泔浸炒四兩

右爲細末每二錢用生薑紅棗煎湯不拘時調服

金鎖正元丹

治腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺精一切虛冷之證並皆治之

五倍子　茯苓各四兩　補骨脂酒浸炒五兩
龍骨煅　硃砂另研各一兩半　肉蓯蓉洗焙
紫巴戟去心　胡蘆巴炒各八兩

右爲細末和勻酒煮糊爲丸如梧桐子大每服五七十九空心用温鹽酒送下

豆附丸

治臟腑久虛下寒泄瀉不止腸滑不禁日夜無度全不進食一切虛寒泄瀉困乏

肉豆蔻麵裹煨　附子炮去皮臍　訶子麵裹煨
良薑炒　乾薑炮　赤石脂煅　陽起石煅
白蒺藜　龍骨生用二各兩　白茯苓去皮
桂心不見火　細辛洗各一兩

右爲細末酒煮麵糊爲丸如梧桐子大每服七十九空心用米飲送下

燒胃丸

治脾胃虛冷疼痛泄瀉

乾薑　厚朴二味同搗炒　附子炮去皮臍
茯苓去皮　陳皮　桂心不見火　訶子皮
甘草炙各等分

右爲細末酢煮糊爲丸如梧桐子大每服三十九食前用米飲湯送下

訶黎勒丸

治大腸虛冷泄瀉不止腹脅引痛飲食不化

訶黎勒麵裹煨　青皮　陳皮　吳萸　龍骨生
白茯苓　細辛洗　桂心不見火　藿茭各一兩

右爲細末生薑汁煮麵糊爲丸如梧桐子大每服八九十九空心用米湯送下

九竇飲子

分利水穀止泄瀉

鴈粟殼蜜炙　赤茯苓　陳皮　木通各二錢
黃芪炙　厚朴薑製　青皮各一錢半　甘草炙
車前子微炒各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

實腸散

治泄瀉不止

蒼术二錢炒　訶子炮　縮砂　肉豆蔻　陳皮
茯苓各一錢半　木香不見火　甘草炙各半錢
厚朴薑汁製一錢

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二箇煎一鍾不拘時服

益胃湯

治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠惰燥熱短氣口乾不知味腸鳴大便微溏黃色身體昏悶並皆治之

當歸梢　陳皮　升麻各一錢　益智仁　白术
人參　柴胡　黃芩各九分　半夏　黃芪
甘草各六分　蒼术二錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾去滓食前通口服

升陽湯

治一日大便三四次溏而不多有時洩瀉腹中鳴小便黃

黃芪三錢　甘草二錢　橘皮一錢　升麻七分　柴胡　當歸身　益智各五分　紅花少許

右作一服水二鍾煎至一鍾食前溫服

止瀉祕方

人參　白朮　乾薑炮　訶子肉　茯苓　木香　藿香去土　甘草炙　肉豆蔻麪裹煨各一錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾去滓食前通口服

斂腸丸

治久瀉

木香　丁香　附子炮去皮臍　砂仁　訶子皮　鷰粟殼去瓤頂炒　川薑炮　沒石子　白龍骨　肉豆蔻麪裹煨　赤石脂煅　厚朴薑汁製

禹餘糧醋淬七次各一兩

右爲細末麪糊爲丸如梧桐子大每服七十丸食前用米飲湯送下

訶子四柱散

治臟腑虛怯元氣弱脾胃不快不進飲食時加洩利晝夜不息

附子炮裂去皮臍　白茯苓　人參各一兩

木香濕紙裹煨　訶子濕紙裹煨取皮各半兩

右件咬咀每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎至六分食前服一方加肉豆蔻一方有白朮眞陽耗散兩耳常鳴臍腹冷痛頭旋目運四肢怠倦脾胃不和日夜洩利小便滑數並宜服之

葦茭丸

治滑泄甚妙

附子炮去皮臍　葦茭　川薑炮　丁香不見火　吳茱萸炒　高良薑　胡椒各一兩　山茱萸肉　草豆蔻去皮各半兩

右爲細末棗肉爲丸如梧桐子大每服五十丸食前陳米飲下

縮砂丸

治大便泄瀉水穀不化腹中疼痛不思飲食

縮砂仁　黃連微炒　附子炮去皮臍　訶子皮　吳茱萸湯洗七次焙　肉豆蔻各二兩　乾薑炮　木香各半兩

右爲細末水煮麪糊爲丸如梧桐子大每服五七十丸食前用米飲送下

羊肉扶羸丸

治脾胃不和不進飲食臟腑虛滑老人虛人皆可服之

肉豆蔻煨　白薑炮　川椒去目並合口炒出汗　神麯炒　附子炮去皮臍各半兩　木香一分

精羊肉一斤半微斷血脈焙乾取末四兩

右爲細末棗栗米飯爲丸如梧桐子大每服五十丸食前用米飲送下

百粒丸

治澼近泄瀉大腸滑神效

紅椒　胡椒　附子炮　丁香　乾薑炮　麥蘗各等分

右爲細末醋煮大蒜爲丸如梧桐子大每服百粒食前用米飲送下

麴蘗丸

治脾胃中風濕臟腑滑泄不止

神麯　苧蘗　白朮　附子炮去皮臍各等分

右爲細末麪糊爲丸如梧桐子大每服三五十丸空心用米飲送下寻常加木附以製方治脾濕而泄者萬無不中亦治殮泄

棗肉丸

治脾腎虛寒或腸鳴泄瀉腹脅虛脹或胷膈不快食不消化

肉豆蔻二兩麪裹煨香去麪不用　木香一兩

破故紙四兩炒

右爲細末煉心煮棗肉爲丸如梧桐子大每服七十丸空心用生薑湯送下

香茸丸

治飲酒多遂成酒泄骨立不能食但再飲一二盞泄作不止

麝香別研一錢　嫩鹿茸草火燎去毛酥炙黃

肉豆蔻各一兩

右爲細末用白陳米飯爲丸如梧桐子大每服五十丸空心用米飲下熱者服酒蒸黃連丸

胃苓散

治傷暑泄瀉煩渴引飲所下如水

平胃散　五苓散各二錢

右用水一盞棗二枚生薑三片同煎至七分嚼薑棗和滓嚥服少刻又服辰砂五苓散亦可用來復丹亦可或寒濕水泄正胃散理中湯蘇梅米湯下一方入鹽煎

棗附丸

治臟腑寒滑泄

端正大附子一箇　乾棗半斤

右同於銀石器中用水於慢火煑上留水二指許水乾旋添湯煑兩三時取出切作半箇再煑候至晚棗爛壞將附子溫水洗剝去皮臍切作薄片焙乾搗爲末別煑棗肉和丸如梧桐子大每服三四十丸空心用米飲下患滑泄垂死者服之皆愈

實腸丸

治腸胃虛弱腹脹泄瀉時時刺痛

黃連一兩　肉豆蔻麪裹煨　乾薑炮　白茯苓

當歸焙　訶子煨去核　丁香各半兩　木香一分

右爲細末用猪臍汁並麪糊和丸如梧桐子大每服五十丸空心用米飲下

養臟丸

治腸胃虛寒泄瀉無度不進飲食

生硫黃四兩研粉　乾薑炮　附子炮去皮臍

鹿角霜　肉豆蔻麪裹煨　山藥各三兩

右爲細末麪糊爲丸如梧桐子大每服三十丸漸加至五十丸用溫米飲下空心食前服

黃連烏梅丸

治飲食不節榮衛不和風邪侵襲臟腑之間致腸胃虛弱泄瀉腸鳴腹脅膨脹裏急後重日夜頻併不思飲食

黃連　阿膠蛤粉炒成珠　當歸洗淨各二兩

人參　龍骨煅　赤石脂　乾薑炮　白茯苓

烏梅肉焙乾　陳皮去白　訶子去核　木香

肉豆蔻麪裹煨　罌粟殼蜜炙各一兩

右爲細末酢煑麪糊爲丸如梧桐子大每服五十丸食前米飲送下如腹痛當歸煎湯下下血地榆煎湯下

煨肝散

治臟腑久虛挾寒滑泄全不入食日生白瘡

川椒去目炒出汗　茴香炒　肉豆蔻麪裹煨

砂仁　丁香　木香各半兩　附子炮去皮臍

白朮各一兩入生薑四兩用酢煑十數沸焙乾

右爲細末每用二錢用豬猪肝或羊肝二兩切作片子批開摻藥末在內更用好紙三兩重裹於慢火煨候肝熟取出細嚼用溫酒送下不拘時候

換腸丸

治泄瀉不止及諸下痢之疾

木香　訶子皮　白芍藥　當歸去蘆炒　人參

白茯苓去皮　白朮土炒　甘草炒各一兩半

御米殼去隔蒂搥碎微炒淨秤二兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服七十丸用生白薑絲鹽各少許拌勻用紙裹水濕文武火煨熟却用生薑煑粥送下食前日進二服

又方

療二十種下利江夏太守用此法療盡愈

黃連　黃蘗　熟艾　附子炮　甘草炙各一兩

烏梅二十枚取肉煑　乾薑二兩

右七味搗末蜜丸如大豆服十丸漸至二十丸日三忌肥肉生冷一方無附子甘草黃蘗一方除甘草附子

豬臟丸

治元臟久冷滑泄不止飲食不進漸至危困

硫黃研　吳茱萸炒各二兩　厚朴一斤　乾薑炒

用豬臟一段洗淨入硫黃末在內綵縛兩頭用米酢五升同入罐瓶內鹽泥固濟用炭火一秤煅候酢乾爲度先研煅令細次入藥末一處同研勻丸如梧子大每服十丸空心鹽酒鹽湯送下

訶子皮散

治腸胃虛寒泄瀉水穀不化腸腹痛脫肛或作膿血日夜無度

訶子煨七分　乾薑炮六分　粟殼去蒂隔蜜炙

橘皮各半錢

右爲細末分作二服水二盞煎至一盞和滓熱服空心再服全愈

龍骨散

治水瀉腹痛不納飲食

龍骨　當歸炒　肉豆蔻麪裹煨　木香各半兩

厚朴二兩去粗皮薑汁炙

右爲細末每服二錢食前用粥飲調下

代赭丸

治水瀉腸鳴臍腹撮痛

附子炮去皮臍三分　代赭石煅　乾薑炮

龍骨各一兩

右爲細末研軟飯和丸如梧桐子大每服三十丸空心用米飲湯送下日午再服

如聖丸

治水瀉並赤白痢

萊豆　烏頭端正大者炮裂去皮臍各等分
右爲細末新水和丸如萊豆大丹砂爲衣每服五丸不拘時白痢乾薑湯下赤痢甘草湯下赤白痢乾薑甘草湯下水瀉新汲水下小兒服二丸

梅棗湯
治水瀉不止
烏梅　棗子各十箇並去核　鷰漿殼一箇去蒂臍
右剉細末每服二錢水一盞煎七分去滓不拘時溫服

紅豆丸
治臟腑泄瀉名爲飧泄
紅豆　藿香　糖毬　蓬木煨　鬱金　橘紅
半夏湯洗七次　縮砂仁各一兩半　高良薑　草菱各二兩　丁香不見火半兩　硇砂三錢酢化
右爲細末水煮麪糊爲丸如梧桐子大每服一百丸用米飲或隨物空心送下病甚者日進三服

高良薑湯
治腸胃受風久爲飧泄下利嘔逆腹內疠痛
高良薑　木香　檳榔　赤茯苓　人參各三分
肉豆蔻去殼　吳茱萸湯洗焙炒　陳皮去白焙
縮砂去皮各半兩　乾薑一分炮
右㕮咀每服四錢水一盞半煎至八分不拘時日三服

乾薑丸
治腸胃風冷飧泄注下腹痛不止
乾薑炮　厚朴去粗皮薑汁炙　當歸焙

治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水穀不分冷熱不調下痢膿血赤少白多或如魚腦腸滑腹痛遍數頻併心腹脹滿食減乏力並宜服此

肉豆蔻生　粟殼去帶蓋蜜炙各二兩　乾薑炮

甘草炙各二兩半　陳米炒十二兩　木香一兩

右爲細末每服二錢酒一盞生薑二片棗一枚煎至七分不拘時溫服如不飲酒水煎亦得忌酒麪魚腥等物

加味三建湯

治洞泄不止

大川烏　附子　天雄三味並炮鹽水浸去皮臍

木香　肉豆蔻煨　訶子麪裹煨去核各一兩

右剉散每服三錢水一盞生薑十片紅棗二枚鹽梅一箇陳米一撮煎六分空心熱服

張氏建中湯

治脾胃虛弱冒犯風冷腹痛腸鳴泄瀉經云食畢而下謂之洞泄手足厥冷面色青白下部虛寒中滿氣短常服寬中健脾養胃育眞

附子　川烏並炮去皮臍　胡椒　艾酢淬炮

桂心　乾薑炮　良薑炒　蓽茇各等分

右爲細末酢煮糊和丸如梧桐子大每服五十丸漸加至一百丸空心食前用米飲吞下

豬臟丸

治臟寒泄瀉飲食不進氣體倦怠

吳茱萸揀去枝梗不拘多少水浸透

右用豬豬臟頭一截去脂膜淨洗將茱萸入臟內兩頭用線紮定慢火煮令極爛用甑蒸熟尤好二味於臼內搗千下令極細丸如梧桐子大每服五十丸食前米湯下

大腹木香湯

治胃寒腸熱腹脹泄瀉

大腹子　製半夏焙　木香各二兩　枳殼麩炒

前胡　白芷　白朮　肉桂　橘紅焙各一兩

延胡索　當歸焙　旋覆花　柴胡　白芍藥

甘草炙各半兩　乾薑炮　人參各三分

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片紅棗三枚煎至六分去滓食前稍熱服

大橘皮湯 河間下同

治濕熱內甚心腹脹滿水腫小便不利大便滑洩

橘皮　茯苓各一兩　木香一分　滑石六兩

檳榔三錢　猪苓　澤瀉　白朮　官桂各半兩

甘草二錢

右爲末每五錢水一盞生薑五片煎至六分去滓溫服小便祕先服十棗湯二三日後再服此藥

桂苓白朮丸

治水腫腹脹泄瀉不能止者服之利止爲度隨證調之

肉桂　乾生薑各一分　茯苓　半夏各一兩

白朮　橘紅去白　澤瀉各半兩

右爲末麪糊爲丸如小豆大生薑湯下二三十丸日三服病在膈上食後在下食前在中不計時候一法更加黃連半兩黃蘗二兩水丸取效愈妙

防風芍藥湯

治泄利飧泄身熱脈弦腹痛而渴及頭痛微汗

防風　芍藥　黃芩各半兩

右㕮咀每半兩或一兩水三盞煎一盞濾清溫服

白朮芍藥湯

治泄瀉腹痛甚者

白朮　芍藥各一兩　甘草五錢

右剉每一兩水二盞煎至一盞濾清溫服

蒼朮芍藥湯

治泄瀉脈弦頭微痛者

蒼朮二兩　芍藥一兩　黃芩半兩

右剉每服一兩加淡味桂半錢水一盞半煎至一盞溫服

訶子散

治虛滑泄瀉

訶子去核一兩半生半熟　木香半兩　黃連

甘草各三錢

右爲細末每服二錢以白朮芍藥湯調下如止之不已宜訶子散加厚朴一兩以竭其邪氣虛滑久不愈者多傳變爲痢疾太陰傳少陰是爲鬼邪先以厚朴枳實湯防其傳變

漿水散

治暴瀉如水周身汗出一身盡冷脈微而弱氣少而不能語其甚者加吐此謂急病治之宜此

半夏二兩湯洗七次　附子炮　乾薑　桂枝

甘草炙各五錢　高良薑二錢半

右爲細末每三五錢漿水二盞煎至一盞和滓熱服甚者三四服微者三服太陽經動下利爲鶩溏大腸不能禁固卒然而下成小泊光色其中或有

鞕物欲起而又下欲了而不了小便多清此寒也宜溫之春夏枝柱湯秋冬白朮湯

白朮湯

治厥陰動爲瀉利者寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利或淖唾膿血瀉利不止者爲難治宜升麻湯或小續命湯以發之法曰開表邪縮於內故下利不止當散表邪於四肢布於絡脈外無其邪則臟腑自安矣

白朮　芍藥各三錢　乾薑半兩炮　甘草二錢炙

右剉爲粗末如前服之甚則去乾薑加附子三錢辛能發也

茯苓湯

治濕瀉

白朮一兩　茯苓去皮七錢半

右㕮咀水煎一兩食前服食入而瀉胃中有宿穀也當加枳實五錢酒入而瀉濕熱也加黃芩五錢

蒼朮湯

治瀉利久不止虛滑穀不化用此湯調桃花丸

蒼朮二兩　防風一兩

右剉爲細末用水一椀煎至一大盞絞清汁下桃花丸八十丸立愈如小便澀少以五苓散下桃花丸或亦白石脂丸小便利則愈矣

蒼朮防風湯

治風濕泄瀉

蒼朮　麻黃去根節各四兩　防風五錢

右爲粗末每服一兩生薑七片水二盞煎至一盞去滓溫服泄止後服椒朮丸

椒朮丸

蒼朮二兩　川椒一兩去目炒

右爲極細末酢糊爲丸如桐子大每服二十丸或三十丸食前溫水下一法慈痢久不愈者加桂如小兒病丸如粟米大

木香丸

治腸癖腹痛時發飧洩氣不消化小便祕澀

乾薑三分　木香　白朮　官桂　蕪荑　良薑　訶子皮各一兩　附子炮去皮　厚朴生薑製

肉豆蔻各二兩　甘草半兩

右爲末神麴糊爲丸如桐子大每服二十丸薑湯下空心

豆蔻散

治寒客於脾胃傷濕而腹痛滑利不止

肉豆蔻五箇　甘草炙　厚朴各等分

右爲末每服二錢米飲一盞調下食前白湯亦得

妙應丸

治胃寒腸熱水穀不化腹脹痞滿洞利不已

川烏頭去尖半兩　梔子仁　乾薑生各一分

右爲末生薑汁麵糊爲丸如桐子大每服五九丸溫酒下食前日進二服

白頭翁湯　方見景岳全書下同

治挾熱下利後重而渴

白頭翁　黃檗　秦艽　黃連各一錢

右水煎溫服

陶氏黃龍湯

治結熱利心下鞕滿下利純清水穀語發渴身熱

大黃二錢　芒硝一錢半　枳實　厚朴各一錢　甘草　人參　當歸各五分

年老氣血虛者去芒硝薑三片棗二枚桔梗二分水煎一沸熱服

桃花散

治少陰下利膿血腹痛小便不利脈沉

赤石脂五錢半生半炒　乾薑二錢　糯米一合

水煎去滓入生石脂末一半調服

赤石脂丸

治下利小便澀者

赤石脂　乾薑各一兩　黃連　當歸各二兩

右爲末蜜丸梧子大每服二十丸米飲下

右歸飲　景岳全書下同

此益火之劑也凡命門之陽衰陰勝而泄瀉者宜用此方加減主之

熟地二三錢或一二兩　山茱萸一錢　山藥炒　枸杞子　杜仲薑製去絲各二錢　甘草炙

肉桂各一二錢　製附子一二三錢

水二鍾煎七分食遠溫服

左歸丸

治眞陽腎水不足不能滋養榮衛漸至衰弱宜壯水之主以培左腎之元陰而精血自充矣宜此方主之

大熟地八兩　牛膝酒蒸二兩　精滑者不用　山藥炒

枸杞子　山萸肉　菟絲子製　鹿膠敲碎炒珠　龜膠切碎炒珠各四兩　俱火炒

右先將熟地蒸爛杵膏加煉蜜丸桐子大每食前

用滾湯或淡鹽湯送下百餘丸

排氣飲

治氣逆食滯脹痛嘔吐等證

陳皮　藿香　枳殼各一錢五分　香附　澤瀉　烏藥各二錢　厚朴一錢　木香七分或一錢

水一鍾半煎七分熱服

大和中飲

治飲食留滯泄瀉等證

陳皮一二錢　枳實一錢　砂仁五分　山楂　麥芽各二錢　厚朴　澤瀉各一錢半

水一鍾半煎七八分食遠溫服

小和中飲

治胃脘脹悶泄瀉嘔吐或婦人胎氣滯滿等證

陳皮　茯苓　厚朴各一錢五分　山楂肉　扁豆炒各二錢　甘草五分

水一鍾半加生薑三五片煎服

小分清飲

治小水不利濕滯嘔吐腫脹不能受補等證

茯苓　澤瀉　猪苓各二三錢　薏苡仁二錢　厚朴　枳殼各一錢

水一鍾半煎七分食前服

解肝煎

治暴怒傷肝氣逆脹滿陰滯泄瀉等證如兼肝火者宜用化肝煎

陳皮　半夏　厚朴　茯苓各一錢半　紫蘇葉　芍藥各一錢　砂仁七分

水一鍾半加生薑三五片煎服

二木煎

治肝強脾弱氣泄濕泄等證

白朮炒二錢或三錢　蒼朮米泔浸炒一二錢　芍藥炒黃二錢　陳皮炒　澤瀉炒各一錢五分　茯苓　乾薑炒黃各一二錢　厚朴薑汁浸炒　炙甘草各一錢　木香六七分

水一鍾半煎七分食遠服

蒼朮丸

治寒濕在脾泄瀉久不能愈者

茯苓　白芍炒各四兩　川椒去閉口者炒出汗　炙甘草　小茴香炒各一兩　厚朴薑汁炒三兩　破故紙酒浸二日曬乾炒香四兩　茅山蒼朮八兩

米泔浸一宿切炒（如無即以白朮代之）

右爲末糯米糊爲丸梧子大每食遠清湯送下七八十丸

赤金丸

治諸積泄瀉

巴霜去皮膜略去油一錢半　生附子切炒二錢　輕粉一錢　皂角炒微焦二錢　丁香　木香　天竺黃各三錢　硃砂二錢爲衣

右爲末醋浸蒸餅爲丸蘿蔔子大硃砂爲衣欲漸去者每服五七丸欲驟行者每服一二十丸用滾水或煎藥或薑醋茶蜜荷香史君煎湯爲引送下若利多不止可飲冷水一二口即止蓋此藥得熱則行得冷則止也

百順丸

治一切陽邪積滯泄瀉

大黃錦紋者一斤　牙皂角炒微黃一兩六錢

右爲末用湯浸蒸餅搗丸菜豆大每用五分或一錢或二三錢酌宜用引送下或用蜜爲丸亦可

大分清飲

治濕熱下利黃疸溺血邪熱畜血腹痛淋閉等證

茯苓　澤瀉　木通各二錢　猪苓　梔子（或倍之）　枳殼　車前子各一錢

水一鍾半煎八分食遠溫服

茵陳飲

治挾熱泄瀉熱痢口渴喜冷小水不利黃疸濕熱閉澀等證

茵陳　焦梔　澤瀉　青皮各三錢　甘草一錢　甘菊花二錢

用水三四鍾煎兩鍾不時陸續飲之治熱瀉者一服可愈

四味回陽飲

治泄瀉元陽虛脫危在頃刻者

人參一二兩　製附子　炮乾薑各二三錢　炙甘草一二錢

水二鍾武火煎七八分溫服徐徐飲之

六味回陽飲

治泄瀉陰陽將脫等證

人參一二兩或數錢　製附子　炮薑各二三錢　炙甘草一錢　熟地五錢或一兩　冬朮三錢

水二鍾烏梅二枚或五味二十粒武火煎七八分溫服

養中煎

治中氣虛寒爲嘔爲泄者

人參一二三錢　山藥炒　白茯苓各二錢

炙甘草一錢　扁豆炒二三錢　乾薑炒黃一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

溫胃飲

治中寒泄瀉不思飲食等證

人參一二三錢或一兩　白朮炒一二錢或一兩

陳皮留白一錢或不用　乾薑炒焦一二三錢

炙甘草一錢　扁豆炒二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

五君子煎

治脾胃虛寒泄瀉而兼濕者

人參二三錢　炙甘草一錢　乾薑炒黃一二錢

白朮　茯苓各二錢

水一鍾半煎服加陳皮一錢名六味異功煎治同

胃關煎

治脾腎虛寒作泄甚至久瀉腹痛不止冷痢等證

熟地三五錢或一兩　山藥炒　扁豆炒各二錢

炙甘草一二錢　焦乾薑　白朮炒各一二三錢

吳茱萸製五七分

水二鍾煎七分食遠溫服瀉甚者加肉豆蔻一二錢麪煨用或破故紙亦可滑脫不禁者加烏梅二箇或北五味子二十粒

左關煎

治生冷傷脾瀉利未久腎氣未損者宜用此湯以去寒濕安脾胃此胃關煎之佐者也

厚朴炒　陳皮炒各一錢　山藥炒　扁豆炒

猪苓　澤瀉各二錢　炙甘草七分　乾薑炒

肉桂各一二錢

水一鍾半煎服如瀉甚不止者加破故紙或肉豆蔻皆可

抑扶煎

治氣冷陰寒或暴傷生冷致成瀉利凡初起血氣未衰脾腎未敗或脹痛或嘔惡皆宜先用此湯此胃關煎表裏藥也宜察虛實用之其有寒濕傷臟霍亂邪實者最宜用此

炙甘草一錢　厚朴　陳皮　烏藥各一錢五分

猪苓　澤瀉各二錢　吳茱萸湯泡炒五七分

乾薑炮一二錢

水一鍾半煎七分食遠溫服寒濕甚者加蒼朮

五德丸

治脾腎虛寒飧泄鶩溏等證或暴傷生冷或受時氣寒濕或酒濕傷脾腹痛作泄或飲食失宜嘔惡痛泄無火等證

乾薑炒　補骨脂酒炒各四兩　吳茱萸製

木香各二兩　北五味二兩（或以肉豆蔻麪煨代之烏藥亦可）

湯浸蒸餅丸桐子大每服六七十丸甚者百餘丸滾白湯或人參湯或米湯俱可下

腹痛多嘔者加胡椒二兩更妙

復陽丹

治陰寒嘔吐泄瀉腹痛寒疝等證

附子製　乾薑炮　炙甘草　北五味子炒

胡椒各一兩　白麵二兩炒熟

右爲末和勻入溫湯搗丸桐子大每服一錢隨證用藥引送下

黃芽丸

治脾胃虛寒或飲食不化或時多脹滿泄瀉吞酸嘔吐等證此藥隨身常用甚妙

人參一兩　焦乾薑三兩

煉白蜜爲丸芡實大常嚼服之

一炁丹

治脾腎虛寒不時易瀉腹痛陽痿怯寒等證

人參　附子製各等分

煉白蜜丸如菉豆大每用滾白湯送下三五分或一錢凡藥餌不便之處或在途次隨帶此丹最妙

九炁丹

治脾腎虛寒如五德丸之甚者

熟地黃八兩　製附子四兩　肉豆蔻麪煨

吳茱萸　華茇炒　補骨脂酒炒　焦乾薑

五味子炒各二兩　粉甘草炒一兩

煉白蜜爲丸或山藥糊丸如桐子大每服六七十丸或百丸滾白湯下如氣虛者加人參或二兩或四兩尤妙甚

聖朮煎

治飲食偶傷或吐或瀉胷膈痞悶或脅肋疼痛或過用尅伐等藥致傷臟氣有同前證而脉息無力氣怯神倦者速宜用此不得因其虛痞虛脹而畏用白朮此中虛實之機貴乎神悟也若痛脹覺甚者即以此煎送神香散最妙若用治寒濕瀉利嘔吐尤爲聖藥

冬朮五六七八錢炒或至一二兩　乾薑炒

肉桂各一二錢　陳皮酌用或不用
水一鍾半煎七分溫熱服若治虛寒瀉利量加人參炙甘草之類

黏米固腸糕

治脾胃虛寒泄瀉久不止者多服自效
白糯米滾湯淘洗炒香熟爲粉一兩　白糖二錢
炒熟乾薑末二分半
右拌勻於餓時用滾水調服二兩如有微滯者加陳皮炒末二分或砂仁末一分俱妙一法用陳老米粉亦妙

敦阜糕

治日久瀉利腸滑不固妙方及婦人帶濁最佳
白麪炒黃二兩　白术炒黃一兩　破故紙炒五錢
右共爲末臨服時加白糖隨宜用清滾湯食前調服如糕法如胃寒者每一兩加乾薑炒末五分或一錢如滑泄不禁者每兩加粟殼末炒黃一錢若以作丸則宜三味等分用即名敦阜丸

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百七十六卷目錄
醫部彙考二百五十六
泄瀉門五
單方
鍼灸
導引
醫案

藝術典第二百七十六卷

醫部彙考二百五十六

泄瀉門五

單方

洩利冷熱赤白腹內熱毒絞結痛下血取乾黃土水煑三五沸絞去滓暖服一二升（本草）

暴作瀉利百草霜末米飲調下二錢（續千金方）

泄瀉無度諸藥不效用鍼砂酢煑炒乾猪苓生地龍各三錢爲末葱涎研和傅臍上約一寸厚縛之待小便多爲度日二易之（醫學正傳）

水瀉腹鳴如雷有火者石膏火煅倉米飯和丸梧子大黃丹爲衣米飲下二十丸不二服效（李樓奇方）

久瀉白石脂乾薑等分研白沸湯和麪爲稀糊丸梧子大每米飲下三十丸（十門方）

大腸寒滑小便精出赤石脂乾薑各一兩胡椒半兩爲末酢糊丸梧子大每空心米飲下五七十丸有人病此熱藥服至一斗二升不效或教服此終四劑而愈（寇氏衍義）

大腸滑冷不止鍾乳粉一兩肉豆蔻煨半兩爲末煑棗肉丸梧子大每服七十丸空心米飲下（濟生方）

冷勞腸泄不止禹餘糧四兩火煅酢淬烏頭一箇冷水浸一夜去皮臍焙爲末酢糊丸梧子大每食前溫水下五丸（聖惠方）

元臟冷泄腹痛虛極硫黃一兩黃蠟化丸梧子大每五丸新汲水下一加青鹽二錢蒸餅和丸酒下（普濟方）

氣虛暴泄日夜三四十行腹痛不止硫黃二兩枯礬半兩研細水浸蒸餅丸梧子大每服十五丸至二十丸溫水鹽湯任下夏月路行備急最妙（秘寶方）

下利虛寒硫黃半兩蓖麻仁七箇爲末填臍中以衣隔熱湯熨之利止乃已（[illegible]方）

老人冷瀉須暖元臟除積冷溫脾胃進飲食硫黃柳木槌研細半夏湯泡七次焙研等分生薑自然汁調蒸餅和杵百下丸梧子大每服十五丸至二十丸空心溫酒或薑湯下婦人酢湯下（和劑局方）

老人泄瀉不止枯白礬一兩訶藜勒煨七錢半爲末米飲服一錢取愈

冷勞泄利食少諸藥不效白礬三兩燒羊肝一具去脂讝酢三升煑爛擂泥和丸梧子大每服二十丸米飲下早夜各一服（普濟方）

冷利厥逆六脈沉細人參大附子各一兩半每服半兩生薑十片丁香十五粒粳米一撮水一盞煎七分空心溫服（[illegible]方）

脾虛洩瀉白朮車前子等分炒爲末白湯下二三錢（簡便方）

久瀉滑腸白朮炒茯苓各一兩糯米炒一兩爲末棗肉拌食或丸服之

老人常瀉白朮二兩黃土拌蒸焙乾去土蒼朮五錢泔浸炒茯苓一兩爲末米糊丸梧子大每米湯下七八十丸（簡便方）

脾濕水瀉注下困弱無力水穀不化腹痛甚者蒼朮芍藥各一兩黃芩半兩淡桂二錢每一兩水一盞半煎一盞溫服脈弦頭微痛去芍藥加防風二兩（保命集）

脾積食泄用黃連二兩爲末大蒜搗和丸梧子大每服五十丸白湯下

暴瀉引飲秦艽二兩甘草炙半兩每服三錢水煎服（聖惠方）

冷滑下利不禁虛羸用縮砂仁爲末以羊子肝薄切摻之瓦上焙乾爲末入乾薑末等分飯丸梧子大每服四十丸白湯下日二服

又方縮砂仁炮附子乾薑厚朴陳橘皮等分爲末飯丸梧子大每服四十丸米飲下日二服（藥性論）

腹脹忽泄日夜不止諸藥不效此氣脫也用益智子仁二兩濃煎飲之立愈（得效方）

久瀉不止肉豆蔻煨一兩木香二錢半爲末棗肉和丸米飲服四五十丸

又方肉豆蔻煨一兩熟附子七錢爲末糊丸米飲服四五十丸

又方肉豆蔻煨粟殼炙等分爲末酢糊丸米飲服四五十丸（百一[illegible]方）

老人虛瀉肉豆蔻一錢麪裹煨熟去麪炒研乳香一兩爲末陳米粉糊丸梧子大每服五七十丸米飲下此乃常州侯教授所傳方（[illegible]方）

水瀉久利破故紙炒一兩粟殼炙四兩爲末煉蜜丸彈子大每服一丸薑棗同煎服（百一選方）

暴瀉不止陳艾一把生薑一塊水煎服（牛生）

冷勞洩利漏蘆一兩艾葉炒四兩爲末米醋三升入藥末一半同熬成膏入後末和丸梧子大每溫水下三十丸（聖濟總錄下同）

驟然水瀉日夜不止或冷利白凍欲死不拘男婦用五月五日採麻葉陰乾爲末每服二錢冷水調下勿喫熱物令人悶倒只喫冷物小兒半錢

風寒泄瀉治風氣行於腸胃泄瀉太枚艸爲末醋糊丸梧子大每服三十丸白湯下

水瀉日久青州乾棗十箇去核入黃茗子填滿紮定燒存性每粟米飲服一錢（聖惠方）

老人虛泄不禁熟附子一兩赤石脂一兩爲末醋糊丸梧子大米飲下五十丸（楊氏家藏）

冷氣洞泄生川烏頭一兩木香半兩爲末醋糊丸梧子大每陳皮湯下二十丸（本事方）

臟寒脾泄及老人中氣不足久泄不止肉豆蔻二兩煨熟大附子去皮臍一兩五錢爲末粥丸梧子大每服八十丸薑肉煎湯下

水泄久利川烏頭二枚一生用一以黑豆半合同煮熟研丸菉豆大每服五丸黃連湯下（普濟方）

水泄寒利大艸烏一兩以一半生研一半燒灰醋糊丸菉豆大每服七丸井華水下忌生冷魚肉（十便良方）

凡人每五更即瀉泄一二次經年不止者名曰腎泄五味去梗二兩茱萸湯泡七次五錢同炒香爲末每旦陳米飲服二錢（本事方）

水瀉不止木鼈仁五箇母丁香五箇麝香一分研末米湯調作膏納臍中貼之卻以膏藥覆住（扶壽方）

腎虛久洩骨碎補水入猪腎中煨熟食之效

泄利不問白麪一斤炒焦黃每日空心溫水服一二匙（肘後）

久洩食減糯米一升水浸一宿漉乾慢火炒熟磨篩入慄慶山藥一兩每日清晨用半盞入砂糖二匙胡椒末少許以極滾湯調食其味極佳大有滋補久服令人精暖有子祕方也（祕錄方）

脾虛泄利青粱米半升神麴一合日日煮粥食即愈（養老書）

胃弱久泄黃米炒爲粉每用數匙砂糖拌食（簡便方）

久利不止鴉粟殼酥炙爲末蜜丸彈子大每服一丸水一盞薑三片煎八分溫服

又方粟殼十兩去膜分作三分一分酢炒一分蜜炒一分生用並爲末蜜丸芡子大每服三十丸米湯下

又方用粟殼蜜炙厚朴薑製各四兩爲細末每服一錢米飲下忌生冷

水泄不止鴉粟殼一枚去帶膜烏梅肉大棗肉各十枚水一盞煎七分溫服

水利不止大豆一升炒白术半兩爲末每服三錢米飲下（指南方）

一切泄利白扁豆花正開者擇淨勿洗以滾湯瀹過和小猪肝脇肉一條葱一根胡椒七粒醬汁拌勻就以瀹豆花汁和麪包作小餛飩炙熟食之愈

傷寒暴利以豉一升薤白一握水三升煮薤熟納豉更煮色黑去豉分爲二服（葉氏）

寒濕泄瀉小便清者以頭燒酒飲之即愈

泄瀉暴利大蒜搗貼兩足心亦可貼臍中（千金方）

濕熱虛瀉山藥蒼术等分飯丸米飲服大人小兒皆宜（經驗方）

積熱瀉利冬瓜葉嫩心拖麪煎餅食之（海上名方）

新久瀉利乾木耳一兩炒焦角膠二錢半炒爲末每服三錢溫酒調下日二服（御藥院方）

泄利口渴烏梅煎湯日飲代茶（扶壽方）

水利不止林檎半熟者十枚水二升煎一升並林檎食之（食醫心鏡）

久泄不止用酸石榴一箇煅烟盡出火毒一夜研末仍以酸石榴一塊煎湯服神效無比

久瀉陳石榴皮酸者焙研細末每二錢米飲下忌二三年或二三月百方不效者用之便止不可輕忽

夏月濕瀉川椒炒取紅肉豆蔻煨各一兩爲末粳米飯丸梧子大每米飲服百丸多寡量人

飧瀉不化及久利小椒二兩炒苍术二兩土炒碾末酢糊丸梧子大每米飲服五十丸（普濟方）

老小洩瀉用椒二兩酢二升煮酢盡慢火焙乾碾末磁器貯之每服二錢七酒及米飲下

夏月冷瀉及霍亂胡椒碾末飯丸梧子大每米飲下四十丸（易簡方）

多年脾瀉老年多此謂之水土同化臭朱黃三錢炮過入水煎汁入鹽少許通口服

臟寒泄瀉倦怠減食臭茱萸湯泡過炒豬臟半條去脂洗淨裝滿紮定文火煮熟搗丸梧子大每服五十丸米飲下日二服（普濟方）

久瀉虛利腹痛者欓子肉豆蔻各一兩陳米一兩半以米一分同二味炒黃爲末一分生碾爲末粟米粥丸梧子大每陳米飲下五十丸日三服

中滿洞瀉厚朴乾薑等分爲末蜜丸梧子大每服五十丸米飲下鮑氏方

下利水穀久不瘥者厚朴二兩黃連三兩水三升煎一升空心細服梅師方

水瀉下利訶黎勒炮二分肉豆蔻一分爲末米飲每服二錢聖惠方

水穀利下椶櫚皮燒研水服方寸匕近效方

積滯泄利腹痛裏急杏仁去皮尖巴豆去皮心各四十九箇同燒存性研泥鎔蠟和丸菉豆大每服二三丸煎大黃湯下間日一服一加百艸霜三錢宣明方下同

一切瀉利脈浮洪者多日難已巴豆皮楮葉同燒存性研化蠟丸菉豆大每甘艸湯下五丸

水洩多時殺羊角一枚白礬末塡滿燒存性爲末每新汲水服二錢聖惠方

泄瀉不止白龍骨白石脂等分爲末水丸梧子大紫蘇木瓜湯下量大人小兒用心鑑方

脾泄久痢五倍子炒半斤倉米炒一升白丁香細莘木香各三錢花椒五錢爲末每服一錢蜜湯下日二服忌生冷魚肉集靈方

脾虛滑泄烏骨母雞一隻治淨用豆蔻一兩草果二枚燒存性摻入雞腹內紮定煑熟空心食之

水泄不化日夜不止白堊煅乾薑炮各一兩楮葉生研二兩爲末糊丸菉豆大每米飲下二十丸普濟方

泄瀉下痢赤白用棗肉搗爛入黃丹白礬各皂子大粳米飯一團和丸彈子大鐵線穿於燈上燒過爲末米飲服之摘元方

暑毒泄利用雄黃水飛九度竹筒盛蒸七次研末蒸餅和丸梧子大每甘草湯下七丸日三服即愈

水泄不止風化石灰一兩白茯苓三兩爲末糊丸梧子大每服二三十丸空心米飲下絕妙集元方

脾虛洩瀉白朮五錢白芍藥一兩冬月用肉豆蔻煨爲末米飲丸梧子大每米飲下五十丸日二服丹溪

濕瀉暑瀉白朮車前子等分炒爲末白湯下二三錢簡便方

老小滑瀉白朮半斤黃土炒過山藥四兩炒爲末飯丸量人大小米湯服或加人參三錢潮湖集簡方

老人泄瀉乾糕一兩薑湯泡化代飲簡便方

中寒水瀉乾薑炮研末粥飲服二錢即效千金方

寒利青色乾薑切大豆大每米飲服六七枚日三夜一累用得效肘後方

暑月水瀉五倍子末飯丸黃豆大每服二十丸荷葉煎水下即時見效運奇方

熱瀉五倍子一兩枯礬五錢爲末糊丸梧子大每服五十丸米湯送下雜興方

治泄車前子不拘多少爲細末每服二錢米飲湯調下服之水穀分吐瀉止子和

脾泄多年老人腎虛謂之水土同化用吳茱萸揀淨不拘多少白水煑去滓盞內入鹽少許通口服蓋吳茱萸能暖膀胱水道既清大腸自固餘藥皆熱不能分解清濁也

瀉久不效者老人尤宜服一名護命方用大附子一箇炮去皮臍以韭菜根研爛絞取汁和丸如梧子大曬乾每服三十丸米飲湯下不乾恐麻人一方治一切冷瀉出後頻併面無顏色不思飲食杵爲末以一錢煑粥一椀空心服

久患脾瀉臟腑虛滑不進飲食用青州大棗擘破去核以木香如棗核大置棗中十數枚以水一盞煑候棗熟食前溫嚼喫就以煑棗湯送下甚者不過二劑

針灸

素問曰脾熱病者熱爭則腰痛不可用俛仰腹滿泄兩頷痛甲乙甚戊己大汗氣逆則甲乙死刺足太陰陽明

靈樞經曰脹取三陽飧泄取三陰

大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感於寒即泄當臍而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉

飧泄取三陰之上補陰陵泉皆久留之熱行乃止

甲乙經曰溢飲水道不通溺黃小腹痛裏急腫洞泄體痛引骨京門主之

痿厥癲疾洞泄然谷主之

奔豚寒氣入小腹時欲嘔傷中溺血小便數背臍痛引陰腹中窘急欲湊後泄不止關元主之

頭痛食不下腸鳴臚脹欲嘔時泄三焦俞主之

腹滿臚脹大便泄意舍主之

腹脹腸鳴氣上衝胷不能久立腹中痛濯濯冬日重感於寒則泄當臍而痛腸胃間遊氣切痛食不化不嗜食身腫俠臍急天樞主之

腸中寒脹滿善噫聞食臭胃氣不足腸鳴腹痛泄食不化心下脹三里主之

腰痛大便難殮泄腰尻中寒中窮主之

千金方曰治四肢不可舉動多汗洞利灸大橫隨年壯穴在俠臍兩邊各二寸五分

腹疾腰痛膀胱寒澁飲注下灸下極腧隨年壯

大都太白主暴泄心痛腹脹心痛尤甚

陽綱主大便不節小便赤黃腸鳴泄注

胆骨端主小便不利大便泄數并灸天樞

京門然谷陰陵泉主洞泄不化

長強主頭重洞泄

陰陵泉隱白主胃中熱暴泄

腎腧章門主寒中洞泄不化

會陽主腹中有寒泄注腸澼便血

三焦腧小腸腧下窮意舍章門主腸鳴臚脹泄注

中衝主腹脹殮泄

大腸腧主腸鳴腹臚腫暴泄

古今醫統曰百會一穴在前頂心中央旋毛中治久泄下陷脫滑者灸三壯

脾腧二穴在十一椎下兩旁各開寸半治泄瀉灸三壯

關元一穴在臍下三寸治瀉不止可灸七壯

腎腧二穴在十四椎下兩旁各開一寸半與臍平可灸五壯治洞泄不止

大腸俞二穴在十六椎兩旁各寸半可灸三壯治腸鳴腹脹暴瀉

天樞二穴在俠臍中兩旁各二寸陷中氣海一穴在臍下可灸三壯治瀉

醫學綱目曰治久泄瀉取天樞二寸半摘英五分留十呼灸百壯

自利不止取天樞中樞

又法取合谷三里陰陵泉不應取中脘關元天樞神闕

泄利不止小腹絞痛灸丹田百壯三報穴

渴飲水多水穀一時下者灸大椎三五壯立已

泄利不啫食灸長谷五十壯三報穴在脊臍旁相去五寸一名循元穴

刺灸殮泄有三法其一取脾經云脾虛則腹滿腸鳴泄食不化取其經足太陰陽明又云殮泄取三陰之上補陰陵泉皆久留之熱行乃止又云殮泄取三陰者是也三陰者太陰也

其二取腎經云腎藏志志有餘腹脹殮泄瀉然筋血者是也然筋謂然骨視血絡盛則瀉之

其三取肝經云肝足厥陰之脈所生病者胃滿嘔逆殮泄是也視盛虛寒熱陷下施法也

導引

保生秘要曰水瀉導引法撮緊穀道交雙足而立并目存神垂兩拳而直縮腹聳肩用意上提力吸三五少間督氣上升瀉利止矣

運功先用歸元聚氣次推大腸曲行瀉火收回復顧念臍取靜候瀉定服氣補之

止瀉法先念臍或以兩手心覆之臍上甚者將兩眼之神藏之臍中

歸元聚氣訣歸元者父母生人受氣之初剪斷臍帶一點落根元也有生之後情欲雕琢未免情耗氣散不能返本須要安土敦仁之法蓋土者主元也仁者人也以一點仁心敦養於土六根皆歸於元心有所注久久凝定便覺真種常在方可用意運行行之之法提氣出上幹旋造化從左而右先運臍輪收而放放而復收以還本位不離這個念自歸真矣

醫案

史記倉公傳曰陽虛侯相趙章病召臣意診視皆以爲寒中臣意診其脈曰迥風迥風者飲食下嗌而輒出不留法曰五日死而後十日乃死病得之酒所以知趙章之病者臣意切其脈脈來滑是內風氣也飲食下嗌而輒出不留者法五日死皆爲前分界法後十日乃死所以過期者其人嗜粥故中藏實中藏實故過期師言曰安穀者過期不安穀者不及期

齊淳于司馬病臣意切其脈告曰當病迥風迥風之狀飲食下嗌輒後之病得之飽食而疾走淳于司馬曰我之王家食馬肝食飽其見酒來即走去驅疾至舍即泄數十出臣意告曰爲火齊米汁飲之七八日而當愈時醫奉信在旁臣意去信謂左右閣都尉曰意以淳于司馬病爲何曰以爲迥風可治信即笑曰是不知也淳于司馬病法當後九日死即後九日不死其家復召臣意臣意往問之盡如意診臣即爲三火齊米汁使服之七八日病已所以知之者診其脈時切之盡如法其病順故不死

傷門事親曰趙明之水穀不消腹作雷鳴自五月至六月不愈諸醫以爲脾受大寒故併與聖散子豆蔻丸雖止一二日藥力盡而復作諸醫不知藥之非反責明之不忌口戴人至而笑曰春傷於風夏必飧泄飧泄者水穀不化而直過下出也又曰水穀不化熱氣在下久風入中中者脾胃也風屬甲乙脾胃爲戊己甲乙能尅戊己脾中有風故鳴經曰歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄診其兩手脈皆浮數爲病在表也可汗之直勿口風隨汗出以火二盆暗置牀之下不令病人見火恐增其熱給之入室使服通劑以麻黃投之乃閉其戶從外鎖之汗出如洗待一時許開戶滅火一半須臾汗止泄亦止

一講師勸德明切聞家遭兵革心氣不足又爲寇賊所驚得瘧癖不調後入京不伏水土又得心氣以至危篤前後三年八仙丸脆膏丸燒肝散皆服之不效乃求藥於戴人戴人曰此洞泄也以謀慮久不決而成肝木謀慮甚則水脾久思則脾濕下流乃上通痰牛益來後有血數點用藏血故也又以舟車丸落川散下數行仍使藻洛出汗自爾日勝一日常以胃風湯日水數碗與之一日而強食復故矣

李德卿妻因產後病泄一年餘四肢瘦乏諸醫皆斷爲死證戴人曰兩手脈皆微小乃利病之生脈見洞泄屬肝行肝木剋土而成此生亦是腸澼滑者脈中有積木也先以舟車丸四五十粒又以無憂散三四錢下四五行人皆驚之病氣如此尚可通耶然亦未敢諭其安看之候前舟車丸以通之渴則調以五苓散向晚使人倒之已足血積水前後約一四十行以胃風湯調之半月而能行一月而安健由此皆服德卿昆仲亦咸異之

劉德源病洞泄逾年食不化肌瘦力乏行步傾欹面色黧黑棄世治利之藥皆用無效適戴人至灤陽往問之戴人乃出示內經洞泄之說辭不見疑然畏其攻劑夜焚香禱神曰某以病久不甚欲求治於戴人戴人以爲宜下之欲不從戴人名醫也欲從之形羸如此恐不任藥再已老矣無人侍養來日不得已須服藥神其相之戴人先以舟車丸無憂散下十餘行殊不困頓喜食後以備椰丸磨化其滯待數日病已大減戴人以爲大未盡當再服前藥德源亦欣然又下五行後數日更以苦劑越之往問其家彼云已下村中收索去也忽一日入城面色枯白語言壯健但怪其跛足而立問何故如此曰足上患一瘡戴人曰此裏邪出而干外病痊之後凡病皆如此也

一婦年三十餘病滑泄經年皆云虛中有積以無憂散五七日一服至二十服不效又服纏積丹軟金丸諸藥皆不效其人服藥愈速病勢愈甚食飲日減人喊謂曰此休息痢也宜灸中脘及左右穴臍下氣海及脐脫穴以三里引之每年當冬至日夏至日灸之前後千萬餘壯或者曰此病我壓濕蓋大傷飲之故即日桃花正開候其落時以長棘針刺之得數十勞勿犯人手只日麵和作餅子文武火燒令熟嚼爛以米飲湯下之病人如其言服之不一　明瀉如前後瀉六七日至數百行昏困無所知覺惟索冷水徐徐而飲至六七日少省爾後食日進神日昌氣血日和不數月生二子此人本不知桃花勞有取積之神效亦偶得瀉法耳

昔有人病飧泄不止腹中雷鳴泄注水穀不分小便澀滯皆曰脾胃虛寒故耳豆蔻爲梅鹽藥殼乾薑附子曾無一效中脘臍下灸已數十躁熱轉甚小溲涸竭煩而無力飲食減少命予視之余謂應象論曰熱氣在下水穀不分化生飧泄寒氣在上則生膜脹而氣不散何也陰靜而陽動故也診其兩手脈息俱浮大而長身表微熱而用桂枝麻黃湯以薤葱煎大劑連進三服汗出終日至旦而愈次以胃風湯和平臟腑調養陰陽飲食進病愈

相寧監酒岳成之病虛滑泄日夜不止腸鳴而口痛倦吐爲心勞口瘡三年不愈余以長流水同薤葱煎五苓散五七錢空心使服之以治其下以宣黃連與白茯苓去皮一味各等分爲末以白麪糊爲丸食後溫水下三五十丸以治其上百日而愈

宮邁鳴胱邨中間有人呻吟氣息羸劣削瘁然無力余視之乃五虛也余急以聖散子一服作一服此證非三錢二錢可塞也續以胃風湯五苓散等藥各作大劑使頓服注瀉方止而粟粥入胃不數日而其人起矣

山東楊先生治府主洞泄不已楊初未對病人與衆人談日月星辰躔度及風雲雷雨之變自辰至未病者聽之而忘其倦楊嘗曰治洞泄不已之人先問其所好之事好琴者與之琴好棋者與之棋笛勿輟太康劉倉使病大便少而頻日七八十次常於兩股間懸牛枚壺盧如此十餘年戴人見而笑曰大便頻而少欲通而不得通也何不大下之此通因通用一

服藥之力也乃與藥大下三十餘行頓止

一男子病泄十餘年日食阿膠阿子龍骨烏梅枯礬皆用之矣中脘臍下三里歲歲灸之皮內皺槁神昏足腫泄如注水日夜無度戴人診其兩手脈沉且微曰生也病人忽曰羊肝生可食乎戴人應聲曰羊肝止泄尤宜服病人悅而食一小盞許以糜粥送之又食羊肝生一盞許次日泄幾七分如此月餘而安此皆已日太過之罪也戴人嘗曰胃爲水穀之海不可虛杜虛怯則百邪皆入矣或思葷茹雖與病相反亦令少食圖引漿粥此權變之道也若專以淡粥責之則病人不悅而食減久則病增損命世俗誤人也

維揚府判趙顯之病虛氣泄瀉褐色乃洞泄寒中證也每聞大黃氣味即注泄余診之兩手脈沉而爽令灸水分穴一百餘壯次服桂苓甘露散胃風湯白术丸等藥不數月而愈

麻先生妻當七月間病臟腑滑泄以去濕降火之藥治之少愈後腹脹及乳痛狀如吹乳頭重壯熱面如渥丹寒熱往來噫乾嘔逆胃脘痛不能轉側耳鳴食不可下又復瀉欲瀉其火臟腑已滑數日矣欲以溫劑止利又禁上焦已熱實不得其法使人就諸葛寺禮請戴人戴人未至因檢劉河間方惟益元散正對此證能降火解表止渴利小溲定利安神以青黛薄荷末調二升置之枕右使作數次服之夜半偏身出冷汗如洗元覺足冷如冰至此足大煖頭頓輕肌凉痛減嘔定利止及戴人至余告之已解戴人曰益元熱亦不至甚既熱而有利不欲再下何不以黃連解毒湯服之乃令診脈戴人曰娘子病來心常欲痛哭爲快否婦曰欲如此余亦不知所謂戴人曰少陽相火凌鑠肺金金受屈制無所投告肺主悲但欲痛哭而爲快也麻先生曰余家諸親無不敬服脈初洪數有力自服益元散後已平又聞戴人之言便以當歸芍藥加入解毒湯中服之大瘥矣

東門一男子病瀉利不止腹鳴如雷不敢令坐坐則下注如傾諸醫例斷爲寒證乾薑官桂丁香豆蔻之屬枯礬龍骨皆服之矣何針不燔何艾不灶遷延將二十載矣一日問於戴人戴人曰兩手寸脈皆滑非寒也其所以寒者水也以茶調散涌寒水五七升無憂散泄積水數十行乃通因通用之法也次以五苓散淡劑滲泄利之又以甘露散止渴不數日而冷食寒飲皆如故此法王啓元稔言之矣奈無人用之

古鄙一講僧病泄瀉數年丁香豆蔻乾薑附子官桂烏梅等燥藥燔針燒臍灸無有闕者一日發昏不省檀那贈紙者盈門戴人診兩手脈沉而有力脈訣云下利脈微小者生脈洪浮大者無瘥以瓜蒂散涌之出寒痰數升又以無憂散泄其虛中之積及燥糞盈斗次以白术調中湯五苓散益元散調理數日僧已起矣

殷輔之父年六十餘暑月病泄瀉日五六十行自建雄鎮來請戴人於陳州其父喜飲二家人輩爭止之戴人曰夫暑月年老津液衰少豈可禁水但勸之少飲比及用藥先令速歸以菉豆雞卵十餘枚同煮卵熟取出令豆軟下陳粳米作稀粥攪令寒食雞卵以下之一二頓病減大半蓋粳米雞卵皆能斷利然後以抑火流濕之藥調順而愈

格致餘論曰痢之有本猶草之有根也去葉不去根草猶在也治病猶去草病在臟而治腑病在表而攻裏非惟戕賊胃氣抑且資助病邪醫云乎哉族叔祖年七十稟甚壯形甚瘦夏末患泄利至深秋百方不應余視之曰病雖久而神不萎小便澀少而不赤兩手脈俱濡而頗弦自言嘗微悶食亦減因悟曰此必多年沉積僻在腸胃詢其平生喜食何物曰我喜食鯉魚三年無一日缺余曰積痰在肺肺爲大腸之臟宜大腸之本不固也當與澄其源而流自清以茱萸陳皮青葱蘆菔根生薑煎濃湯和以沙糖飲一椀許自以指探喉中至半時辰吐痰半升許如膠是夜減半次日又飲又吐半升而利止又與平胃散加白术黃連旬日而安

丹溪心法曰朱仲符年近七十右手風攣多年七月患泄瀉百藥不愈診其脈右手浮滑而洪數余曰此必太陰分有積痰肺氣壅鬱不能下降大腸虛而作泄當治上焦遂用蘿蔔子加漿水蜜探之而吐得痰一塊大如椀色如琥珀稠黏如膠泄利遂止不服他藥

衛生寶鑑曰中書左丞相史公年六旬有七至元丁卯九月間因內傷自利數行覺肢體沉重不思飲食嗜臥懶言語舌不知味腹中疼痛頭亦痛而惡心醫以通聖散作大劑料服之覆以厚衣遂大汗出前證不除而反增劇易數醫四月餘不愈余被召至燕命余治之余診視得六脈沉細而微弦不欲食食即嘔吐中氣不調滯於升降口舌乾燥頭目昏眩肢體倦

息足胕冷臥不欲起丞相素不飲酒肢體本瘦又因內傷自利又復獲汗是重竭津液脾胃愈虛不能滋榮周身百脈故使然也非甘辛大溫之劑則不能溫養其氣經云脾欲緩急食甘以緩之又脾不足者以甘補之黃芪人參之甘補脾緩中故以爲君形不足者溫之以辛當歸辛溫和血潤燥木香辛溫升降滯氣生薑益智草豆蔻仁辛甘大熱以蕩中寒理其正氣白朮炙甘草橘皮甘苦溫乃厚腸胃麥蘗麵寬腸胃而和中神麯辛溫導滯消食而爲佐使也右件咬咀一兩水煎服之嘔吐止飲食進越三日前證悉去左右侍者曰前證雖去九日不大便如何余曰丞相年高氣弱既利且汗脾胃不足陽氣虧損津液不潤也豈敢以寒凉有毒之劑下之仲景曰大發汗後小便數大便堅不可用承氣湯如此雖內結宜以蜜煎導之須臾去燥糞二十餘塊遂覺腹中空快上下氣調又以前藥服之喜飲食但有所傷則以橘皮枳朮丸消導之至月餘其病乃得平復丞相曰病既去矣當服何藥以防其復來余曰不然但慎言語節飲食不可服藥夫用藥如用刑民有罪則刑之身有疾則藥之無罪妄刑是謂虐民無病妄藥反傷正氣軍志有曰允當則歸服而舍之可也丞相悅而然之

丁巳予從軍至開州夏月有千戶高國用謂予曰父親年七十有三於去歲七月間因內傷飲食又值霖雨瀉利暴下數行醫以藥止之不數日又傷又瀉止而復傷傷而復瀉至十月間肢體瘦弱四肢倦怠飲食減少腹痛腸鳴又以李醫治之處以養臟湯治之數日瀉止後添嘔吐又易以王醫用丁香藿香人參去白橘皮甘草同爲細末加生薑煎數服而嘔吐止延至今正月間飲食不進扶而後起又數日不見大便乃問醫曰父親數日不見大便何以治之醫曰老官人年過七旬氣血衰弱又兇瀉利半載脾胃又虛津液耗少以麻仁丸潤之可也衆親商議一親知曰牛山人見證不疑有果決遂請治之診其脈問其病證曰此是風結也以搜風丸百餘丸服之利下數行而死予悔恨不已敢以爲問予曰未嘗親見將何以言高千戶退而去或者曰予親見之細說其證予曰人以水穀爲本今年高老人久瀉胃中津液耗少又重瀉之神將何依靈樞經云形氣不足病氣不足此陰陽俱不足也不可瀉之瀉之則重不足重不足則陰陽俱竭血氣皆盡五臟空虛筋骨髓枯老者絕滅少者不復矣又曰上工平氣中工亂脈下工絕氣危生絕氣危生其牛山人之謂歟

眞定鈔庫官李提舉年踰四旬體幹魁梧肌肉豐盛其僚友師君告之曰肥人多風證君今如此恐後致中風搜風丸推陳致新化痰宜服之李從其言遂合一料每日服之至夜下五行如是半月覺氣短而促至一月餘添怠惰嗜臥便白膿小便不禁足至膝冷腰背沉痛飲食無味仍不欲食心胃痞滿時有躁熱健忘恍惚不安凡三易醫皆無效請余治之余曰孫眞人曰藥勢有所偏助令人臟氣不平藥本攻疾無病不可餌平人穀入於胃脈道乃行水入於經其血乃成水去則榮散穀消則衛亡榮散衛亡神無所依君本身體康強五臟安泰妄以小毒之劑日下數行初服一日且推陳下行宿積已去又何推焉今飲食不生肌膚水穀不能運化精微灌溉五臟六腑週身百脈神將何依故氣短而促者眞氣損也怠惰嗜臥者脾氣衰也小便不禁者膀胱不藏也便下膿血者胃氣下脫也足胕寒而逆者陽氣微也時有躁熱心下虛痞者胃氣不能上榮也恍惚健忘者神明亂也金匱要略云不當下而強下之令人腸洞泄便溺不禁而死前證之來非天也君自取之治雖粗安促君命期矣李聞之驚恐汗澈於背起謂余曰妄下之過悔將何及雖然君當盡心救其失余以爲病勢過半命將難全固辭而退至秋疾甚作醫以奪命散下之躁熱喘滿而死內經曰誅罰無過是謂大惑如李君者蓋內經所謂大惑之人也衛生君子可不戒哉至元己巳六月余住夏於上都僉院董彥誠年踰四旬因勞役過甚煩渴不止極飲湩乳又傷冷物遂自利腸鳴腹痛四肢逆冷冷汗自出口鼻氣亦冷六脈如蛛絲時發昏憒衆太醫議之余以葱熨臍下又以四逆湯五兩生薑二十片連鬚葱白九莖水三升煮至一升去查凉服至夜半氣溫身熱思粥飲至天明而愈玉機眞臟論云脈細皮寒氣少泄利飲食不入此謂五虛粟粥入胃則虛者活信哉魯齋許先生聞之嘆曰病有輕重方有大小治有緩急僉院之證非大方從權急治則不能愈也至眞要大論云補下治下制以急急則氣味厚此之謂也

眞定總管史侯男十哥年四十有二肢體本瘦弱於至元辛巳因收秋租佃人致酒味酸不欲飲勉飲三兩盃少時腹痛次傳泄瀉無度日十餘行越十日便後見紅紫之類腸鳴腹痛求醫治之曰諸見血皆以

爲熱用芍藥藥皮丸治之不愈仍不欲食食則嘔酸形體愈瘦面色青黃不澤心下痞惡冷物口乾時有煩躁不得安臥請予治之具說其由診得脉弦細而微遲手足稍冷內經云結陰者便血一升再結二升三結三升經云邪在五臟則陰脉不和陰脉不和則血留之結陰之病陰氣內結不得外行無所禀滲入腸間故便血也宜以平胃地楡湯治之此藥溫中散寒除濕和胃服數服病減大半仍灸中脘三七壯及胃募穴引胃氣上升滋榮百脉復灸氣海百餘壯生發元氣灸後則進食生肉又以還少丹服之則喜飲食添肌肉至春再灸三里二七壯壯脾溫胃生發元氣此穴乃胃之合穴也改服芳香之劑戒以愼言語節飲食良愈

征南元帥不鄰吉歹年七旬丙辰春東征南廻至楚丘諸路迎迓多獻酒醴因而過飲遂腹痛腸鳴自利日夜約五十餘行咽嗌腫痛耳前後亦腫舌本强涎稠黏欲吐不能出以手曳之方出言語艱難反側悶亂夜不得臥診得脉浮數按之沉細而弦卽謂中書黏公曰仲景言下利清穀身體疼痛急當救裏後身疼痛清便自調急當救表救裏四逆湯救表桂枝湯總帥今胃氣不守下利清穀腹中疼痛宜急治之餘可少待公曰何謂也答曰內經云瘡發於咽嗌名曰猛疽此疾治遲則塞咽塞咽則氣不通氣不通則半日死故宜急治於是遂砭刺腫上紫黑血出頓時腫勢大消遂用桔梗甘草連翹鼠黏酒製黃芩升麻防風等分咬咀每服約五錢水煮濾清令熱漱冷吐去之噤之恐傷脾胃自利轉甚再服涎清腫散語言聲出後以神應丸辛熱之劑以散中寒解化宿食而燥脾濕丸者取其不卽施化則不犯其上熱至其病所而後化乃治主以緩也不數服利止痛定後胃中閉塞作陣而痛予思盡嘔有云上焦如霧宣五穀味熏膚充身澤毛若霧露之溉是爲氣也今相公年高氣弱自利無度致胃中生發之氣不能滋養於心肺故閉塞而痛經云上氣不足推而揚之脾不足者以甘補之再以異功散甘辛微溫之劑溫養脾胃加升麻人參上升以順正氣不數服而胃中快利而痛止內經云調氣之方必別陰陽內者內治外者外治微者調之其次平之脉者奪之隨其攸利萬舉萬全又曰病有遠近治有緩急無越其製度又曰急則治其標緩則治其本此之謂也

征南副元帥大忒木兒年七旬有八戊午秋征南予從之過揚州十里時仲冬病自利完穀不化臍腹冷疼足胕寒以手搔之不知痛痒嘗燒石以溫之亦不得煖予診之脉沉細而微予思之年高氣弱深入敵境軍事煩冗朝暮形寒飲食失節多飲乳酪履於卑濕陽不能外固由是清濕襲虛病起於下故胕寒而逆內經云感於寒而受病微則爲欬盛則爲泄爲痛此寒濕相合而爲病也法當急退寒濕之邪峻補其陽非灸病必不已先以大艾炷於氣海灸百壯補下焦虛陽次灸三里穴各三七壯治胕寒而逆且援引陽氣下行又灸三陰交二穴以散足受寒濕之邪遂處方云寒淫所勝治以辛溫濕淫於外平以苦熱以苦發之以附子大辛熱以助陽退陰溫經散寒故以爲君乾薑官桂大熱辛甘亦除寒濕白朮半夏苦辛溫而燥脾濕故以爲臣人參草豆蔻炙甘草甘辛大溫溫中益氣生薑大辛溫能散清濕之邪葱白辛溫以通上焦陽氣故以爲佐又云補下治下制以急急則氣味厚故大作劑服之不數服瀉止痛減足胕漸溫調其飲食逾十日平復明年秋過襄陽值霖雨閒旬餘前證復作再依前灸添陽輔各三七壯再以藥投之數服良愈

真定路總管劉仲美年踰六旬素有脾胃虛寒之證至元辛巳閏八月初天氣陰寒因官事勞役渴而飲冷夜半自利兩行平旦召予診視其脉弦細而微四肢冷手心寒唇舌皆有褐色腹中微痛氣短而不思飲食予思內經云色青者肝也肝屬木唇者脾也脾屬土木來剋土故青色見於脣也舌者心之官水挾木勢制火凌脾故色青見於舌也難經有云見肝之病則知肝當傳之脾故先實其脾氣今脾已受肝之邪矣潔古先師云假令五臟勝各刑己之不勝當重實其不勝微瀉其勝而以黃芪建中湯加芍藥附子主之且芍藥味酸瀉其肝木是微瀉其勝黃芪甘草甘溫補其脾土是重實其不勝桂附辛熱瀉其寒水助陽退陰飴糖甘溫補脾之不足肝苦急急食甘以緩之生薑大棗辛甘大溫生發脾胃升騰之氣行其榮衛而緩其急每一兩依法水煎再服而愈

叅政商公時年六旬有二元有胃氣之證至元己巳夏上都住時值六月霖雨大作連日不止因公務勞役過度致飲食失節每日則腐腹作痛腸鳴自利須去一二行乃少定不喜飲食懶於言語身體困倦召予治之予診其脉沉緩而弦叅政以年高氣弱脾胃

素有虛寒之證加之霖雨及勞役飲食失節重虛中氣難經云飲食勞倦則傷脾不足而往有餘隨之若歲火不及寒乃大行民病鶩溏今脾胃正氣不足腎水必挾木勢反來侮土乃薄所不勝乘所勝也此疾非甘辛大熱之劑則不能瀉水補土雖夏暑之時有用熱遠熱之戒又云有假者反之是從權而治其急也內經云寒淫於內治以辛熱乾薑附子辛甘大熱以瀉寒水用以爲君脾不足者以甘補之人參白朮甘草陳皮甘溫以補脾土胃寒則不欲食以生薑草豆蔻辛溫治客寒犯胃厚朴辛溫厚腸胃白茯苓甘草助薑附以導寒濕白芍藥酸微寒補金瀉木以防熱傷肺氣爲佐也不數服愈

醫宗必讀曰大宗伯董元宰夏初水泄完穀不化曾服胃苓湯及四君子湯不效予曰經云春傷於風夏生飧泄訓完穀也用升陽除濕湯加人參二錢三劑頓止

大司寇姚岱之吐痰泄瀉見食則惡面色痿黃神情困倦自秋及春無劑弗投經久不愈比予診之曰不能言巫以補中益氣去當歸加肉果半夏各二錢熟附炮薑各一錢人參四錢日進二劑四日而瀉止但痰不減耳余曰腎虛水泛爲痰非八味丸不可應與補中湯並進凡四十日服人參一斤飲食大進痰亦不吐又半月而酬對如常矣

奇效良方曰趙從簡通判甲辰年丁母憂食素之久苦瀉不止日七八行首尾歲年每服他藥不過一二日復作服茱萸斷下丸而愈後數年間遇瀉服之又效

醫學正傳曰一人泄瀉日夜無度諸藥不效偶得一方用針砂地龍豬苓三味共爲細末生葱搗汁調方寸匕貼臍上小便長而瀉止

薛己醫按曰光祿柴赫庵善飲泄瀉腹脹吐痰作嘔曰乾此脾胃之氣虛先用六君加神麴痰嘔已止再用補中益氣加茯苓半夏瀉脹亦愈此證若濕熱壅滯者加葛花縮酒湯分消其濕濕既去而瀉未已須用六君加神麴實脾土化酒杭然雖爲酒而作實因脾土虛弱不可專主濕熱

一羽士停食泄瀉自用四苓黃連枳實麴蘗益甚予曰此脾腎虛也當用六君加薑桂送四神丸不信又用沉香化氣丸一服臥牀不食欲則糞出幾至危殆終踐予言而愈蓋化氣之劑峻厲猛烈無經不傷無臟不損豈宜輕服

秀水卜封君善飲腹痛便泄服分利化痰等劑不應其脈滑數皮膚甲錯余謂此酒毒致瘍癰而潰敗也餌不治不信仍服前劑果便膿而愈

一儒者小腹急痛溏瀉清冷大便欲去不去予謂此命門火衰而脾土虛寒也用八味丸月餘而愈向後飲食失宜前證仍作小腹腫堅此脾氣下陷也用補中益氣湯而痊

李蒲汀庚寅冬濕熱泄瀉因未生子惑於人言淡滲之劑能瀉腎而服參苓等藥後變黃疸小便不利腹脹舁痞予曰有是病必用是藥須以淡滲疏導其濕熱遂用茵陳五苓散諸證頓退至辛卯冬生子

沈大尹每五更即泄予以爲腎泄用五味子散數服而愈後不慎起居不節飲食其泄復作日夜無度畏寒飲食且難消化肌體日瘦予曰乃變火衰之證也遂與八味丸瀉止食進

會憲高如齋飲食雖化腹痛泄瀉用六君子加砂仁木香治之而痊後復作完穀不化腹痛頭疼體重困倦予以爲脾受濕用芎藥防風湯而愈

光祿楊立之元氣素弱飲食雖化泄瀉不已小便短少漸漸怠寒體重節痛余以爲脾肺虛用升陽益胃湯而痊大凡泄瀉服分利調補等劑不應者此肝木賊於脾土必用升陽益胃之劑庶能保生

太守朱陽山因怒脫痛作泄或兩脅作脹或臍乳作痛或寒熱往來或小便不利或飲食不入嘔吐痰涎神思不清此肝木乘脾土用小柴胡加山梔炮薑茯苓陳皮製黃連一劑即愈

一儒者冬夏思泄瀉腹中作痛飲食無味肢體倦怠余用補中益氣湯八味地黃丸月餘而痊後彼云每秋間必患痢今則無恙何也余曰此閉藏之月不遠幃幕妄泄陽而然前藥豈能補真火火能生土脾氣牢而免患也

古今醫統曰滄洲翁治一人病下利完穀衆以洞泄中寒服理中四逆漸轉劇脈兩尺寸俱弦長右關浮於左關一倍日外背如草蒲如肝風傳脾因成飧泄非藏寒也以小續命湯損麻黃加白朮服三五升利止續命非止利之藥飲不終劑而利止者以從本治故也

一夫人病殘泄彌年醫以休息利治之以苦堅辛燥之劑弗效時秋半脈弦而浮曰夫人之病蓋病鶩風非飲食勞倦所致也肝主鶩故虛風自其因乘脾而

成泄令金風正隆至明春則病將益加法當平木之太過扶土之不及而瀉自止夫人口儂寓南閩時平章燕公以銅符密授因失心懼由是疾作公言信然以黃犉牛肝和以攻風健脾之藥愈

醫門法律曰吉長乃室新秋病瀉漸惡寒寒已發熱漸至欬嗽然病未甚也服表散藥不愈體日危羸延至初冬飲以參朮補劑轉覺懨懨欲絕食飲不思有欬無聲瀉利不止危在旦暮醫者議以人參五錢附子三錢加入薑桂白朮之屬作一劑服以止瀉補虛而收背水之捷吉長徬徨無措延僕診畢未及交語前醫自外亟至見僕在坐即令疏方僕瞿然而出蓋以渠見既訛難與語至理耳吉長辭去前醫堅請用藥僕因謂曰是病總由悞藥所致始先皮毛間瀝淅惡寒發熱肺金爲時令之燥所傷也用表散已爲非法至參朮補之則肺氣閉錮而欬嗽之聲不揚胃腹飽脹不思飲食肺中之熱無處可宣急奔大腸食入則不待運化而直出食不入則腸中之垢汚亦隨氣奔而出是以瀉利無休也今以潤肺之藥兼潤其腸則源流俱清寒熱欬嗽泄瀉一齊俱止矣但取藥四劑服之必安不足慮也方用黃芩地骨皮甘草杏仁阿膠初進一劑瀉即少止四劑畢而寒熱俱除再數劑而欬嗽全愈矣設當日與時輩商之彼方執參附爲是能從我乎

沈若茲乃郎因痘後食物不節病瀉瀉久脾虛病瘧遂劇腹痛脹大二年來服消導藥無算腹脹及瀉利總不愈去歲迎醫服參苓白朮稍效醫去仍復如故病本腹脹更兼腸澼者大腸之氣空洞易走胃中傳下之物總不停蓄澼出無度腎水不泉十中五死五生之論今則病勢轉深又加四逆矣暮熱朝涼一逆也大渴引湯救急二逆也氣喘不能仰臥三逆也多汗煩躁不寧四逆也無病人腹中之氣運轉收攝是以身體輕快大便省約今爲久瀉遂至氣散不收腹之脹腸之鳴便出之不自知皆此故也氣既散而不收又服行氣利水之藥不愈增其散乎無病人身中榮衛兩無偏勝故陽勝則發熱陰勝則惡寒病痩之時寒熱交作猶是陰陽互戰逆瀉久亡陰聲夜發熱一線之陰爲陽所乘求其相戰不可得矣肉水腸鳴燎原之火自焚不得不引外水以濟急然有形之水不足以制無形之火徒增脹瀉而重傷其陰氣耳鳴不清其源以香燥之藥助火劫陰如官桂肉豆蔻等類用之悞矣夫男子氣海在於臍下乃元氣之舍性命之根也久瀉則真氣亦散勢必上干清道而不下行鼻中鼾鼾有聲不能仰臥是其徵也夫此已散之氣必不能復歸其處但冀未散之氣不致盡散則可耳屢服木香檳榔蘇子腹皮厚朴等降氣之藥尤悞之悞矣至於汗出煩躁則陰氣虛盡孤陽亦不能久留之兆也總如歲運有溫熱無寒凉有生長無收藏人物其免天札疵癘乎於此而圖旋轉之功亦難之難矣若茲見案轉托戚友强懇用藥因以清燥潤肺爲主阿膠地黃門冬等類同蜜熬膏三斤渠男三年爲藥所苦得此甘味稱爲糖也日爭十餘次服之半月藥盡遂大效身凉氣平不渴不煩不瀉諸證俱退另制理脾藥未善後全愈

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百七十七卷目錄
醫部彙考二百五十七

霍亂門一
黃帝素問 氣交變大論
張機金匱要略 轉筋 因食成霍亂
傷寒論 辨霍亂病脈證治
王叔和脈經 脈法
脈訣 脈法
孫思邈千金方 總論
劉完素六書 總論
成無己明理論 總論
張從政儒門事親 吐瀉死生如反掌說
朱震亨心法 霍亂證治 絞腸沙證治
戴思恭證治要訣 霍亂
樓英醫學綱目 霍亂
王綸明醫雜著 霍亂
李梴醫學入門 霍亂證治
李中梓醫宗必讀 總論治法
王肯堂證治準繩 總論證治
喻昌醫門法律 病分冒暑避暑
張介賓景岳全書 論證 治法 調攝宜素 分別三四
陳士鐸石室祕錄 霍亂治法 乾霍亂治法

藝術典第二百七十七卷
醫部彙考二百五十七

霍亂門一

黃帝素問

氣交變大論

歲土不及風迺大行民病飧泄霍亂

註 土運不及六己歲也飧泄霍亂風木傷土之病

土鬱之發民病霍亂

註 感土氣而發

漢張機金匱要略

轉筋

轉筋之爲病其人脚臂直脈上下行微弦轉筋入腹者雞屎白散主之

因食成霍亂

驢馬肉合猪肉食之成霍亂

兔肉著乾薑食之成霍亂

傷寒論

辨霍亂病脈證治

問曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利是名霍亂

問曰病發熱頭痛身疼惡寒吐利者此屬何病答曰此名霍亂霍亂自吐下又利止復更發熱也

傷寒其脈微濇者本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉入陰必利本嘔下利者不可治也似欲大便而反失氣仍不利者此屬陽明也便去鞕十三日愈所以然者經盡故也

下利後當便鞕鞕則能食者愈今更不能食到後經中頗能食復過一經能食過之一日當愈不愈者不屬陽明也

霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散主之

寒多不用水者理中丸主之

惡寒脈微而復利利止亡血也四逆加人參湯主之

吐利止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯小和之

吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之

既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者四逆湯主之

吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四逆加猪膽汁湯主之

吐利發汗脈平小煩者以新虛不勝穀氣故也

發汗後水穀不得入口者爲逆若更發汗必吐下不止嘔吐而利者名曰霍亂

晉王叔和脈經

脈法

右手關上脈陰虛者足太陰經也病苦泄注腹滿氣逆霍亂嘔吐黃疸心煩不得臥

脈伏者霍亂

脈訣

脈法

雜病歌曰霍亂之候脈微遲氣少不語大難醫三部浮洪必救得古今課定更無疑

伏脈歌曰伏爲霍亂吐頻頻腹痛多緣宿食停蓄飲老痰成積聚散寒溫裏莫因循

唐孫思邈千金方

總論

原霍亂之爲病也皆因飲食非關鬼神夫飽食醒臍復餐乳酪海陸百品無所不啜眠臥冷席多飲寒漿胃中諸食結而不消陰陽二氣擁而反戾陽氣欲升陰氣欲降陰陽乖隔變成吐利頭痛似破百節如解遍體諸筋皆爲回轉論證雖小卒病之中最爲可畏雖臨深履危不足以論之養生者宜達其旨趣庶可免於夭橫矣

凡霍亂務在溫和將息若冷即遍體轉筋凡此病定一日不食爲佳乃須三日少少粥食三日以後可恣意食息七日勿雜食爲佳所以養脾氣也

大凡霍亂皆中食膾酪及飽食雜物過度不能自裁夜臥失覆不善將息所致隕命者衆人生稟命以五臟爲主夫五臟者即是五行內爲五行外爲五味五行五味更宜扶抑所以春夏秋冬逆調理之食啖不可過度凡飲食於五臟相尅者爲病相生者無他經曰春不食辛夏無食鹹季夏無食酸秋無食苦冬無食甘此不必全不食但愼其太甚耳諺曰百病從口生蓋不慮也四時皆食不得太飽皆能生病從夏至秋分忌食肥濃煎熬月人自好冷食更與肥濃兼食果菜無節極逐冷眠臥冷水洗浴五味更相尅賊雖欲無病不可得也所以病苦人自作之非關運也書曰非天夭人人自絕命此之謂也

凡諸霍亂忌與米飲胃中得米即吐不止但與厚朴葛根飲若冬瓜葉飲但沾漬咽喉而不可多與若服湯時隨服吐者候吐定乃與之診脈絕不通以桂合葛根爲飲吐下心煩內熱汗不出不轉筋脈急數者可與犀角合葛根爲飲吐下不止發熱心煩欲飲水可少飲米粉汁爲佳若不吐與葛根薑苡飲服之

霍亂吐多者必轉筋不渴即臍上築霍亂而臍上築者爲腎氣動當先治其築治中湯主之去术加桂心去术者以术補虛故也加桂者恐作貞疿也霍亂而臍上築吐多者若下多者霍亂而驚悸霍亂而渴霍亂而腹中痛嘔而吐利嘔而利欲得水者皆用治中湯主之

金劉完素六書

總論

醫之用藥如將帥之用兵本草曰良醫不能以無藥愈疾猶良將無兵不足以勝敵也故用藥如用兵轉筋霍亂者治法同用兵之急不可緩也故吐瀉不止者其本在於中焦或因渴大飲或因飲而過量或饑而飽甚或濕內甚故陰陽交而不和是爲吐瀉仲景曰邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在中焦則既吐且瀉此爲急病也然吐利爲急十死其一二如揮霍撩亂而不得吐瀉此名乾霍亂必死法曰既有其入必有所出今有其入而不得其出者否塞也故轉筋吐瀉者其氣有三一曰風二曰火三曰濕吐爲暍熱王注曰炎熱薄鑠心之氣也火能炎上故吐也瀉爲濕叔和云濕多成五泄內經曰濕勝則濡瀉又曰風勝則動筋屬肝而應於風木故脚轉筋而燥急內經曰諸筋反戾水液渾濁皆屬於熱故仲景治法曰熱多欲飲水者五苓散寒多不飲水者理中丸凡覺此證或先五苓益元桂苓甘露飲乃吐瀉之聖藥愼無與粟米粥湯穀入於胃則必死本草曰粟米味鹹微寒無毒主養胃氣去脾胃中熱而益氣霍亂者脾胃極損不能傳化加以粟米如人欲鑿更以利刀鋸其首豈有能生者耶如吐瀉多時欲住之後宜微以粥飲漸漸養之以遲爲妙

如吐泄不止身出冷汗無脈者可服泄利門中藥水飲兼桂枝湯白术湯皆可服痢門中藥亦可選用

吐下霍亂三焦爲水穀傳化之道路熱氣甚則傳化失常而吐瀉霍亂火性躁動故也或云熱無吐瀉止是停寒者誤也大法吐瀉煩渴爲熱不渴爲寒或熱吐瀉始得之亦有不渴者若不止則亡液而後必渴或寒本不渴若亡津液過多則亦燥而渴也但寒者脈當沉細而遲熱者脈當實大而數或損氣亡液過極則脈亦不能實數而反弱緩雖爾亦爲熱矣

霍亂吐下濕爲留飲痞隔而傳化失常故甚則霍亂吐瀉也

一切吐瀉霍亂通宜五苓散益元散白术散吐瀉煩渴并中外諸邪所傷而吐瀉腹滿痛悶者並皆桂苓甘露飲淡滲湯

成無己明理論

總論

傷寒霍亂何以明之上吐而下利揮霍而撩亂是也邪在上焦者但吐而不利邪在下焦者但利而不吐若邪在中焦胃氣不治爲邪所傷使陰陽乖隔遂上吐而下利若止嘔吐而利經止謂之吐利必也上吐下利躁擾煩亂乃謂之霍亂其與但稱吐利者有以異也傷寒吐利者邪氣所傷霍亂吐利者飲食所傷也其有兼傷寒之邪內外不和者加之頭痛發熱而

吐利也經曰病發熱頭痛身疼惡寒吐利者此屬何病答曰此名霍亂自吐下又利止復更發熱也是霍亂兼傷寒者也霍亂頭痛發熱熱多欲飲水者五苓散主之寒多不用水者理中丸主之以其中焦失治陰陽乖隔必有偏者偏陽則多熱偏陰則多寒許仁則曰病有乾霍亂有濕霍亂乾霍亂死者多濕霍亂死者少蓋吐利則所傷之物得以出泄雖甚則止於胃中水穀泄盡則止矣所以死者少其乾霍亂而死者多以其上不得吐下不得利則所傷之物不得出泄擁閉正氣關隔陰陽煩擾悶亂躁無所安喘脹而死嗚呼飲食有節起居有常者豈得致霍亂耶飲食自倍腸胃乃傷喪身之由實自致爾

元張從政儒門事親

吐瀉死生如反掌說

巢氏先賢也固不當非之然其說有誤者人命所係不可不辯也今之醫者家置本以爲繩墨嗚呼何今之人信巢氏而不信素問也此余不得不爲之說且巢氏論霍亂吐瀉皆由溫涼不調陰陽清濁二氣相干致腸胃之間變而爲霍亂寒氣客於脾則瀉寒氣客於胃則吐亦由飲酒食肉腥腑生冷過度或因居處坐臥濕地當風取涼風之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得令水穀不消皆成霍亂其名有三一曰胃反胃氣虛遞反吐飲食二曰霍亂言其病揮霍之間便致撩亂也三曰脯食變逆者也霍亂者脈必代又云七月間食蜜令人暴下霍亂此皆巢氏霍亂之論也予以爲不然大賢之治瘟猶書生之命題如秋傷於濕冬生欬欬是獨以濕爲主此猶書生之獨脚題也風濕腸三氣合而成霍亂吐瀉轉筋此猶書生之鼎足題也風者風木內應足厥陰肝木濕者雨化內應足太陰脾土腸者火熱內應手少陰心火此風濕腸三氣之所生也內經曰土氣之下木氣乘之是肝木乘脾土也又曰厥陰所至爲脅痛嘔泄少陽所至爲嘔涌注云食不下也太陰所至爲中滿霍亂吐下太陰所至爲濡化也注云濕化也又曰太陰所至爲濕生終爲注雨故轉筋者風主肝肝主筋風急其故轉筋也吐者腸也火主心心主炎上故嘔吐也泄注者土主濕濕主脾濕下注故泄注也此三者豈非風濕腸如書生鼎足題耶脾濕土氣爲風木所尅土化不行矣亢無雨火盛過極土怒發焉極則爲雷霆驟雨烈風益土氣在上木氣乘之故也是以大水橫流山崩岸落石迸沙飛豈非太陰濕土怒發之象耶故人病心腹滿脹腸鳴而爲數使甚則心痛脅脹嘔吐霍亂厥發則注下腑腫身重啓元子云巳上病證皆脾熱所生也乃知巢氏所論正與素問啓元子相違故內經治法病急則治其標緩則治其本先可用淡劑流其濕辛涼以退其風鹹苦以解其腸水水以救其內涸大忌食粟米粥飲者立死偉哉王氷之言脾熱一句可以爲方世俗止知取其頭巾而濯之以飲其水亦取黑豆皂礬頭垢寒涼然近似終不足以制其甚又有以寒水沃其手足者大非四肢已厥更以寒水沃之則益厥矣曷若以寒水沃其心之爲愈也

夫霍亂吐瀉不止者可用五苓散益元散各停冰水調下五七錢如無冰水可用新汲水調下桂苓甘露散玉露散清涼飲子調下五七錢亦可如無已上諸藥可服地漿三五盞亦可地漿者可於淨地掘一坑用新汲水一桶於內攪令渾候澄清連飲三五盞立愈大忌曰术湯薑桂烏附種種燥熱之藥若服之則必死矣

霍亂吐瀉水穀不化陰陽錯亂可服淡劑調以冰水令頓服之則愈

凡嘔吐而瀉病名曰何也內經熱論云此乃轉筋霍亂之證也何氣使然此乃邪氣在於中焦使陰陽二氣不能升降其證先心痛則吐先腹痛則瀉心腹俱痛則吐瀉並作致使揮霍之間自然撩亂此證喜寒冷之物可用冰水調五苓益元則愈矣大忌熱物轉筋之病治之奈何經曰勞者溫之溫者溫存之意也又一法生薑湯益元散白术散禹攻散加冰沉冷細細呷之渴未止者頻頻飲之如無冰新汲水亦得

朱震亨心法

霍亂證治

內有所積外有所感致成吐瀉仍用二陳湯加減作吐以提其氣此非鬼神皆屬飲食前人確論乃陽不升陰不降乖隔而成切莫與發食雞米飲一呷入口即吐必待吐瀉過一二時直至餓甚方可與稀粥食之脈多伏欲絕或吐瀉不徹還用吐提起其氣或用棹木煎湯吐之亦可大法生薑理中湯最好不渴者可用如渴者用五苓散有吐者以二陳湯探吐亦有可下者

轉筋不住男子以手挽其陰女子以手牽其乳近兩邊此千金妙法也

轉筋皆屬乎血熱四物湯加酒芩紅花蒼术南星前

服

乾霍亂者最難治死在須臾升降不通當以吐提其氣極是良法世多用鹽湯此係內有物所傷外有邪氣所遏有用吐者則兼發散之義有用溫藥解散者不可用凉藥宜二陳湯加解散藥

霍亂之候揮霍變亂起於倉卒多因夾食傷寒陰陽乖隔上吐下利而躁擾痛悶是其候也偏陽則多熱偏陰則多寒卒然而來危甚風燭其濕霍亂死者少乾霍亂死者多蓋以所傷之物或因吐利而盡泄出則止故死者少也夫上不得吐下不得利所傷之物擁閉正氣關格陰陽其死者多或有寒腹滿而痛四肢拘急轉筋下利者以理中湯加生附子官桂

中暑霍亂煩躁大渴心腹攪痛四肢冷冷汗出脚轉筋用藿香散千金云轉筋者用理中湯加火煅石膏若霍亂吐瀉心腹疼痛先以鹽湯探吐後服藿香正氣散加木香半錢若頻欲登圊不通者更加枳殼一錢人於夏月多食瓜果多飲冷乘風以致食留不化因食成痞隔絕上下遂成霍亂以六和湯倍加藿香煎服皆要藥也

絞腸沙證治

絞腸沙作痛以樟木煎湯大吐或白礬調湯吐之鹽湯亦可探吐宜刺委中出血

明戴思恭證治要訣

霍亂

霍亂之病揮霍變亂起於倉卒與中惡相似俗呼爲觸惡但有吐利爲異耳其證胷痞腹疼氣不升降甚則手足厥逆冷汗自出或吐而不瀉或瀉而不吐或兼作吐瀉或吐瀉不透宜蘇合香丸以通其痞塞攔進藿香正氣散加木香半錢仍以蘇合香丸調吞來復丹若果瀉已甚則不可用來復丹瀉而不吐胃腸痞滿先以陰陽湯或濃鹽湯頓服以導其吐已吐未吐並藿香正氣散間進蘇合香丸吐而不瀉心腹疼痛頻欲登圊苦於不通藿香正氣散加枳殼一錢多下來復丹欲捷則用生枳殼若不能見效逼迫已甚其勢不容不用神保丸但神保丸雖能通利人大腸有功若隔於上而不能下轉服轉祕須用來復丹研末湯調吞下養正丹百粒庶可引前藥到下吐瀉兼作心腹纏擾未安者藿香正氣散加官桂木香各半錢不愈則投四順湯

吐利不止元氣耗散病勢危篤或水粒不入或口渴喜冷或惡寒戰掉手足冷逆或發熱煩躁欲去衣被此蓋內虛陰盛却不可以其喜冷欲去衣被爲熱宜理中湯甚則附子理中湯不效則四逆湯並宜放十分冷服

欲吐不吐欲瀉不瀉心腹纏擾痛不可忍上下不通言語不定如見鬼神俗謂之乾霍亂先以濃鹽湯頓服次調蘇合香丸吞下來復丹仍進藿香正氣散加木香枳殼各半錢近世俗醫謂之捲腸沙人多信之殊不知卽是霍亂僥倖而愈者一遍之功耳

霍亂轉筋理中湯加凍膠剉炒一錢仍令其繫縛腿脛若筋入腹卽通身轉筋者不可治轉筋者以造麴蓼汁暖熱浸或用濃鹽湯浸

霍亂已透而餘吐餘瀉未止腹有餘痛宜一味糗秋豆葉煎服乾者尤佳

霍亂之後陽氣已脫或遺尿而不知或氣少而不語或冒汗如珠或大躁欲入水或四肢不收皆不可治

霍亂井諸吐瀉後胃腸高起痞塞欲絕理中湯加枳實半錢茯苓半錢名枳實理中湯吐瀉已愈而力怯精神未復者十補飲

夏天感暑吐瀉如霍亂者六和湯香薷湯皆是要藥

大吐瀉復厥逆躁擾審其因暑得者止宜香薷飲

人於夏月多食瓜果及飲冷乘風以致食留不化因食成痞隔絕上下遂成霍亂六和湯倍藿香煎熟調蘇合香丸

樓英醫學綱目

霍亂

霍亂證本自胃家或因寒飲或因飲水或傷水毒或感濕氣冷熱不調水火相干陰陽相搏轉筋攣痛經絡亂行暴作吐瀉中焦胃氣所主也察其色脈隨經標本此治霍亂吐瀉之法也

霍亂偏身轉筋肚痛四肢厥冷欲絕者其脉洪大易治脉微窈縮舌卷不治

吐瀉不止當渴而反不渴脉微細而弱者理中湯

吐瀉轉筋身熱脉長陽明本病也宜和中四君子湯平胃散建中湯每服一兩水三盞薑五片煎至一盞去查溫服或四君子湯脉浮自汗者四君子加桂主之脉浮無汗者四君子加麻黃主之

如吐瀉轉筋自汗脉浮者四君子加桂五錢主之

如吐瀉轉筋脉下痛脉弦者宜木瓜柴胡湯平胃散加木瓜五錢亦可也

如吐瀉後小便不通胃中實痛者四君子湯加大黃

一兩主之
如吐瀉轉筋腹中痛體重脉沉而細者宜四君子湯加芍藥高良薑四君子湯四味各一兩芍藥良薑各五錢同煎服
如吐瀉霍亂四肢拘急脉沉而遲者此少陰也宜四君子湯加薑附厚朴四君子四味各一兩生薑附子厚朴炮製各三錢同煎服
如吐瀉轉筋四肢厥冷脉微緩者屬厥陰宜建中湯加附子當歸湯
香薷飲治非時霍亂大渴煩躁汗出轉筋疼痛不可忍者
霍亂轉筋香薷煮汁飲之無不瘥者
霍亂腹痛心煩短氣未得吐下若轉筋燒桃子二十枚研末熱水調下
霍亂轉筋吐瀉不止宜半夏湯爲末渴者凉水下不渴者溫水下無時如吐瀉不止身無汗者可與瀉利門漿水散兼桂枝湯又可與白术湯
霍亂轉筋者用理中湯去术加附子一枚生用
霍亂之證輕則上吐下瀉兩脚轉筋甚則徧體轉筋腹肚疼痛手足厥冷若欲絕者倉卒之際宜於臍中灼艾及用葱一把煎湯泡洗次投以薑附理中湯之類其脉洪大者易治脉微腎縮舌卷者不治
素問土鬱之發民病嘔吐霍亂注下又太陰所至爲中滿霍亂吐下此濕土霍亂即仲景五苓散理中丸之類是也
歲土不及風乃大行民病霍亂飧泄此土虛風勝霍亂即羅謙甫柱苓白术散之類是也

熱至則身熱霍亂吐下此熱霍亂即活人書香薷散之類是也
王綸明醫雜著

霍亂

暑熱之時外無寒邪內傷冰冷物腹痛泄瀉或霍亂吐逆宜縮脾飲砂仁草果甘草扁豆乾薑烏梅或理中湯加神麴麥芽縮砂蒼术此專治內溫中消食也若吐瀉脉沉微甚者不可用凉藥可用附子大順散熱附子甘草乾薑杏仁桂或附子理中湯加芍藥夏月多食冷物及過飲茶水致傷脾胃吐瀉霍亂故治暑藥多用溫脾消食治濕利小便醫者要識此意若既傷暑熱復傷生冷外熱內寒宜先治其內溫中消食次治其外清暑補氣而以理脾爲主於前陰陽二條內相參取用東垣清暑益氣湯已兼此意其用黃芪升麻人參白术甘草麥門冬當歸五味黃檗蒼根是清暑補氣也蒼术神麴陳皮澤瀉青皮是治內補脾也

註　按前證又當分別中暑中暍脉虛脉沉無汗有汗發熱不熱作渴不渴或瀉不瀉飲寒飲熱辨其陰陽虛實不可泛投寒凉之劑蓋爲夏月伏陰在內古人用附子大順散之類溫補陽氣厥有旨哉何今之老弱至夏月患食少體倦發熱作渴或吐瀉腹痛頭痛諸證反服香蘇飲復傷元氣無不招引暑邪以致不起至若清暑益氣湯內用猪苓澤瀉之類必審其果有濕熱壅滯方可用之否則虧損其陰而傷其目矣用當審察
若夏秋暑熱因過用冷物茶水傷其內又過取凉風傷其外以致惡寒發熱胃脘飽悶飲食不進或兼嘔吐泄瀉此內外俱傷寒冷也人參乾薑炒至紫色厚朴薑水炒陳皮羌活枳實白茯苓各一錢白术一錢五分甘草炙五分薑水煎食前溫服

註　按前證宜用此方如未應宜用藿香正氣散若內外已解寒熱未退或飲食不進宜用六君子保命集云霍亂屬陽明證宜用和中平胃建中湯輩或四君子湯脉浮自汗四君子加桂枝主之脉浮無汗四君子加麻黃吐利轉筋發下痛脉弦者木尅土也用平胃散加木瓜或建中加柴胡木瓜吐利轉筋腹痛體重脉沉而細四君子加白芍藥良薑吐利四肢拘急脉沉而遲屬少陰四君子加薑附厚朴吐利四肢厥冷脉微緩屬厥陰建中加藿附吐利頭痛而身熱熱多欲飲水者五苓散寒多不欲水者理中丸主之元戎云太陰證霍亂者理中加橘紅吐下腹痛手足逆冷理中加熟附子吐利後轉筋者理中加火煅石膏一兩
若夏暑在途中常服只壯元氣清熱驅暑服之免中暑霍亂泄瀉痢疾等證方用人參一錢二分白术一錢五分五味子十粒杵碎麥門冬去心白芍藥炒白茯苓各一錢知母炒陳皮香薷各七分黃芩炒三分甘草炙五分薑水煎食溫服

註　按前證若人元氣虛弱宜用補中益氣去柴胡升麻加麥冬五味或少加炒黑黃檗人參益氣湯亦可用
若遇勞倦辛苦用力過多即服後方二三服免生內傷發熱之病此方主於補氣黃芪一錢半蜜炙人參

麥門冬去心陳皮白朮各一錢甘草炙七分薑棗水煎食前溫服勞倦甚加熟附子四五分

按前論開世俗之朦瞶濟無窮之夭枉若素畏寒飲食者附子尤宜若素喜寒飲食者去肉桂或以炮薑代之若果因暑熱傷氣而四肢困倦或手足麻木者先用人參益氣湯後用補中益氣湯

李梴醫學入門

霍亂證治

一種暑霍亂即濕霍亂但此疾夏秋爲甚縱寒月亦多由伏暑故名一種濕霍亂有聲有物一種乾霍亂有聲無物其標因外感四氣或日間感熱夜間受冷或內素鬱熱外又感寒一時陰陽錯亂然病本因飲食失節或酥酪酒漿生冷以致濕熱內甚中焦脾土失運當升不升當降不降是以上吐下瀉脈多伏絕又有挾七情鬱氣痰涎聚膈痞塞不通者外感痰喘眩運亦必由傷飲食爲之根也

又有本伏暑而成者蓋伏暑即冒暑久而藏伏三焦腸胃之間熱傷氣而不傷形旬月莫覺變出寒熱不定霍亂吐瀉膨脹中滿瘧痢煩渴腹痛下血等證但暑病多無身痛間有痛者或爲澡浴水濕相搏耳偏陽分則多熱而渴偏陰分則多寒而不渴

痰喘二陳湯加味半硫丸虛煩不眠既濟湯煩渴九君子湯桂苓甘露飲大渴大躁大汗遺尿者死回生散養正丹救之

陽明胃與大腸以養宗筋暴吐暴瀉津液驟亡筋失所養故輕者兩脚轉筋而已重者遍體轉筋手足厥冷欲絕者倉卒之際宜以鹽填臍中灼艾不計壯數雖已死而胃有暖氣者立甦急用茱萸散加小茴甘草蘇葉煎服再研生蒜塗脚心雖昏危入腹者亦效如血熱轉筋不已四物湯加黃芩紅花或蒼朮南星水藥不入古椒豆散轉筋不住男子以手挽其陰女子以手牽乳近兩邊如舌卷囊縮轉筋入腹者死

絞腸沙腹痛不可忍或連心痛展轉在地手足亦有冷者乃腸絞縮在腹須臾能死急用熱湯調鹽一兩灌入即安或再用陳艾陳樟木陳壁土各等分水煎連進三四服仍刺血陰沙腹痛而手足冷看其身上有紅點以油燈心點火燎之即愈陽沙腹痛而手足煖以針刺其十指背近爪甲半分許即捋爪甲而指背皮肉捋處血出即安仍先自兩臂捋下其惡血令聚指頭血出爲好

霍亂乃濕熱兼風木爲害治宜散風寒利濕降火故四時通用藿香正氣散爲散風寒濕之要藥寒月厥冷脉沉不渴者五積散理中湯古薑附湯暑月煩渴者黃連香薷飲冷服俱宜合五苓散以分上下或更合益元散降火尤妙此皆分利法也又當引清氣上升使濁氣自然下降吐瀉未徹者宜用二陳湯加芎芷蒼朮防風探吐以提其氣如吐湧不止宜所服藥中加木瓜檳榔以降其氣又有可下者俱不可純用凉藥挾七情者七氣湯古參萸湯傷飲食者紅丸子保和丸俱薑湯送下通用四君子湯有汗加桂枝無汗加麻黃吐利轉筋腹痛體重脉沉細加白芍良薑四肢拘急脉沉遲屬少陰加薑附厚朴吐利轉筋脅痛脈弦者木尅土也平胃散加木瓜或小建中湯加柴胡木瓜四肢厥冷脈微緩屬厥陰者小建中湯加當歸附子

三焦爲水穀道路邪在上焦吐而不利邪在下焦利而不吐邪在中焦上吐下利病因飲食不節清濁相干陰陽乖隔輕者止曰吐利重者揷霍擾亂乃曰霍亂外證必發熱惡寒頭疼身痛本傷寒病也因邪入脾胃故發爲吐利然中焦爲寒熱之半邪偏高居陽分者則多熱而渴五苓散分利之邪偏下居陰分者則多寒不渴理中湯分利之風寒濕勝者藿香正氣散除濕湯五積散主之暑勝大渴者二香黃連散益元散柴苓散選用傷食甚者平胃散治中湯主之轉筋者氣不和也俱加木瓜或單用鷄屎白略炒爲末溫湯化下方寸匕凡霍亂多責於熱故夏秋爲盛或熱伏於內手足如冰六脈沉伏食即飽逆此火氣上奔而然不可誤爲陰證若吐利小便亦自利而大汗出下利清穀寒熱四肢拘急厥逆脉微欲絕乃爲陰證四逆湯或加吳萸生薑救之少陰吐利煩躁欲死者三味參萸湯吐利止自汗厥逆不渴脉微欲絕者通脉四逆湯加猪膽汁吐利止身痛不休者桂枝加人參湯吐利止發熱者隨證微汗之吐利止亾津而渴者竹葉石膏湯白虎加參湯吐利不止者靈砂丹木香乾薑煎湯下凡霍亂不可遽與米飲粥飯等食以助邪氣必所傷物盡然後淡食少少養之傷寒心痞發熱吐利者大柴胡證也不可誤爲霍亂

乾霍亂者氣痞於中欲吐不得吐欲泄不得泄所傷之物壅閉正氣關格陰陽煩躁喘脹者必死急以鹽湯一盞入童便薑汁頓服探吐令透未吐再服外用鹽炒吳茱萸熨臍下即以理中湯加陳皮調之或藿

香正氣散加官桂倍枳殼茯苓木瓜吞蘇合香丸如發熱頭腹痛者桂枝加大黃湯

李中梓醫宗必讀

總論治法

按霍亂者揮霍變亂起於倉卒心腹大痛嘔吐瀉利憎寒壯熱頭痛眩運先心痛則先吐先腹痛則先瀉心腹俱痛吐瀉並作甚者轉筋入腹則斃陰陽反戾清濁相干陰陽痞膈上下奔迫須遵內經分濕熱風暑虛實而爲施治乾霍亂者心腹脹滿攪痛欲吐不吐欲瀉不瀉躁亂昏憒俗名攪腸沙此繇脾土鬱極不得發越以致火熱內擾不可過於攻過攻則脾愈虛不可過於熱過熱則火愈熾不可過於寒過寒則火必捍格須反佐以治然後鬱可開火可散古方用鹽熬湯調以童便不獨降火兼能行血極爲穩妥霍亂多起於夏秋之間皆外受暑熱內傷飲食所致縱冬月患之亦由夏月伏暑也轉筋者兼風木建中加木瓜柴胡湯厥冷脣青兼寒氣建中加附子乾薑湯身熱煩渴氣粗兼暑熱柱谷白朮散或香薷散體重骨節煩疼兼濕化除濕湯風暑合病石膏理中湯暑濕相搏二香散多食寒冷六和湯倍藿香煎熟調蘇合香丸情志鬱結七氣湯轉筋逆冷吳茱萸湯或通脈四逆湯邪在上者宜吐雖已自吐利仍當吐之以提其氣用極鹹鹽湯三椀熱飲一椀指探令吐不吐再服一椀吐訖仍飲一椀三吐乃止此法極良吐利不止元氣耗散病勢危篤或口渴喜冷或發熱煩躁欲去衣被此陰盛格陽不可以其喜冷欲去衣被爲熱理中湯甚者附子理中湯不效四逆湯並宜冰冷與服霍亂已透餘吐餘瀉未止腹有餘痛宜一味報秋豆葉煎服乾者尤佳保命集云有從標而得者有從本而得者有從標本而得者六經之變治各不同細察色脈知犯何經隨經標本活法施治此大法也

王肯堂證治準繩

總論證治

靈樞有足太陰之別名曰公孫去本節後一寸別走陽明其別者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂實則腸中切痛虛則蠱脹取之所別有清氣在陰濁氣在陽營氣順脈衛氣逆行清濁相干亂於腸胃則爲霍亂取之足太陰陽明不下取之三里巢氏因此　條乃云霍亂者由陰陽清濁二氣相干亂於腸胃間因遇飲食而變發則心腹絞痛挾風而實者身發熱頭痛體疼虛者但心腹痛而已亦有因飲酒食肉腥膾生冷過度居處不節或露臥濕地或當風取涼風冷之氣歸於三焦傳於脾胃水穀不化皆成霍亂自巢氏之說行後世守之以爲法無復知內經諸條者矣至劉河間乃云吐下霍亂三焦爲水穀傳化之道路熱氣甚則傳化失常而吐瀉霍亂火性躁動故也世俗止謂是停食者誤也轉筋者亦是脾胃土衰肝木自甚熱氣燥爍於筋則筋攣而痛亦非寒也張戴人謂以風濕暍三氣合而爲邪蓋脾濕土爲風木所尅鬱則熱乃發發則心火炎上故嘔吐嘔吐者暍也脾濕下注故注泄注泄者濕也風急甚故筋轉筋轉者風也可謂善推病情者乎王海藏亦謂風濕熱外至生冷物內加內外合病者此條殆似之矣凡治病當從內經隨宜施治安可執一端而已哉然則此病當以何爲要曰脾胃之濕爲本諸邪感動者爲病之由然其間脾胃有虛邪有實邪有陰陽相干之邪孰微孰甚皆宜消息處治至若明理論謂傷寒吐利者由邪氣所傷霍亂吐利者由飲食所傷其有兼傷寒之邪內外不和者加之頭痛發熱而吐利者是霍亂傷寒也原仲景之意豈必在飲食始爲是病彼於寒邪傳入中焦胃氣因之不和陰陽痞隔者安得不有以致之乎不然何以用理中四逆等湯治之

醫門法律　臣喻昌著

病分冒暑避暑

深居廣廈納風涼餐生冷遏抑其陽而病暑者一切治暑清涼之方即不得徑情直施如無汗仍須透表以宣其陽如吐利急須和解以安其中甚者少用溫藥以從治之故冒暑之霍亂吐瀉以治暑爲主避暑之霍亂吐瀉以和中溫中爲主不可不辨也

景岳全書　臣張介賓著

論證

霍亂一證以其上吐下瀉反覆不寧而揮霍撩亂故曰霍亂此寒邪傷臟之病也有外受風寒寒氣入臟而病者有不慎口腹內傷食飲而病者有傷飢失飽飢時胃氣已傷過飽食不能化而病者有水土氣令寒濕傷脾而病者有旱潦暴雨清濁相混誤中沙氣陰毒而病者總之皆寒濕傷脾之證邪在脾胃則中焦不能容受故從上而出則爲吐從下而出則爲瀉且凡邪之易受者必其脾氣本柔而既吐既瀉則脾氣更虛故凡治霍亂者必宜以和胃健脾爲主健者培補之謂因邪氣已去而胃氣受傷故非培補不可

和者調和之謂以胃氣雖傷而邪猶未盡故非察其邪正而酌爲調和不可若寒少滯多則但以溫平之劑調之若滯因於寒則非溫熱之劑不能而諸家有言爲火者謂霍亂之病多在夏秋之間豈得謂之傷寒乎吁謬亦甚矣夫夏秋之交正多臟寒之病蓋一以盛暑將殺新涼初起天人易氣寒之由也一以酷暑當令生冷不節疾病因時寒之動也人以夏秋之外熱易見而臟腑之內寒難見故但知用熱遠熱而不知用寒遠寒見之淺陋如此所以多誤也

轉筋霍亂證以其足腹之筋拘攣急痛甚至牽縮陰丸痛迫小腹最爲急候此足陽明厥陰氣血俱傷之候也觀河間曰轉筋經云反戾也熱氣燥鑠於筋則攣瘛而痛火主燔鑠燥動故也或以爲寒客於筋者誤也蓋寒雖主於收引然止爲厥逆禁固屈伸不便安得爲轉筋也所謂轉者動也陽動陰靜熱證明矣丹溪亦曰轉筋屬血熱余謂此二子之言總屬一偏之見不可從也試以內經質之不有曰經筋之病寒則反折筋急熱則筋弛縱不收此轉筋者謂非反折筋急之病者乎而何以謂之熱也夫所謂轉者以其堅强急痛有如扭轉之狀是謂轉筋今西北方以轉字作去聲者卽其義也而河間曰轉者動也則不爲强矣且凡患轉筋者必於大吐大瀉之後乃有此證未聞於吐瀉之前而先見轉筋者也若轉於吐瀉之前而謂之火猶可云因火而病也既轉於吐瀉之後則上下皆已火去豈因吐瀉反生火耶又何以吐瀉之前火不轉耶河間其何以解之蓋陽明爲五臟六腑之海主潤宗筋此證以陽明血氣驟損筋急而然本非火也觀無擇陳氏曰轉筋者以陽明養宗筋屬胃與大腸今暴吐下津液頓亡外感四氣內傷七情攻閉諸脈枯削於筋宗筋失養必至攣縮甚則卵縮舌卷爲難治此證始爲切當若從河間而作火治能無誤乎余故曰不可從也

乾霍亂證最爲危候其證則上欲吐而不能出下欲瀉而不能行胷腹攪痛脹急悶亂此必內有飲食停阻外有寒邪閉遏蓋邪淺者易於行動故卽見吐利邪深者陰陽格拒氣道不通故爲此證若不速治多致暴死宜先用鹽湯探而吐之一以去其滯隔一以通其清氣但使清氣得升然後濁氣得降從瀉而出斯不致害藥以溫中散滯破氣等劑庶乎胃氣可舒而邪隨以散宜排氣飲加減主之或神香散或局方七氣湯亦可酌用

治法

霍亂初起當陰陽擾亂邪正不分之時惟宜以薑鹽淡湯徐徐與之令其徐飲徐吐或以二陳湯探吐之則吐中自有發散之意必俟滯濁大出胃氣稍定乃察其有無泄瀉有無脹滿有無嘔惡以辨邪正虛實然後隨其證而調理之自無不愈者但於吐瀉攪亂之後胃氣未清邪氣未淨之時凡一切食飲之類寧使稍遲切不可急與粥湯以致邪滯復聚則爲害不小也不可不愼亦不可妄用凉藥

初起胃口不清邪氣未淨或脹痛嘔惡不止察其邪甚於上者宜和胃飲神香散平胃散擇而用之邪甚於下者宜五苓散胃苓湯或苓朮二陳煎之類主之無脹無痛而但嘔惡不寧者此脾胃受傷虛寒證也若胃氣微虛兼滯者宜六君子湯或溫胃飲主之若但虛無滯者宜理中湯或五君子煎主之若虛而無寒者止用四君子湯或五味異功散亦可若虛在陰分水中無火因瀉而嘔惡不已胷腹膨膨者必用理陰煎或去當歸加人參主之若吐利四肢拘急脉沉而遲此脾腎證也宜四君子加薑附厚朴或理陰煎主之

凡霍亂後身熱不退脉數無汗者宜酌其虛實於前治法中加柴胡主之寒邪甚者宜用麻黃吐利脉浮自汗者宜四君子加桂枝主之吐利頭痛身熱而渴者宜五苓散吐利因於過食或瓜果生冷以致食留不化遂成痞隔霍亂者宜大小和中飲或六和湯主之若生冷寒勝者宜加炮薑肉桂吳茱萸之類

元戎曰太陰證霍亂者理中加橘紅名治中湯若吐下心腹作痛手足逆冷理中去白朮加熟附子名四順湯若吐利後轉筋者理中加火煅石膏一兩

轉筋腹痛者因胃氣暴傷以致陽明厥陰血燥筋攣而然法當養血溫經乃爲正治若邪滯未清者或先宜和胃飲加肉桂木瓜主之若氣虛者宜四君子湯加當歸肉桂厚朴木瓜之類陰虛少血者宜理陰煎加肉桂木瓜主之又治轉筋法男子以手挽其陰女子以手揪乳近兩邊此千金法也

霍亂之後多有煩渴者此以吐利亡津腎水乾涸故渴欲飲水但宜溫煖調脾以止吐瀉脾氣得和渴將自止或以獨參湯徐徐與之最妙法也其有本以陽臟而因瀉亡陰或見火盛喜冷內熱脈洪者宜益元散或竹葉石膏湯之類甘凉以濟之亦無不可

調攝宜素

夏秋新凉之交或疾風暴雨或乍寒乍煖之時此皆陰陽相駁之際善養生者最於此時宜愼凡外而衣被內而口腹宜增則增宜節則節略爲加意則却疾亦自不難其或少有不調而爲微寒所侵則霍亂吐瀉攪腸腹痛瘧痢之類頃刻可至此其所忽者微而所害者大也且膏粱與黎藿不同薄弱與強壯迥異矧強者猶不可恃强而弱者顧可以忘弱耶此自珍者之不可忽也

分別三因

陳無擇曰霍亂者心腹卒痛嘔吐下利憎寒壯熱頭痛脏運先心痛則先吐先腹痛則先瀉心腹俱痛則吐利並作甚至轉筋入腹霍亂惡證無越於斯蓋陰陽反戾清濁相干陽氣暴升陰氣頓墜陰陽痞隔上下奔迫治之惟宜溫煖更詳別三因以調之外因中風則惡風有汗傷寒則惡寒無汗冒濕則重著傷暑則熱煩內因九氣所致鬱聚痰澼痞隔不通遂致滿悶隨其勝復必作吐利不內外因或諸飽食膾炙恣飲乳酪冰雹寒漿旨酒胃既臌脹脾臟停凝內鬱必發遂成吐利當從不內外因也

石室秘錄　臣陳士鐸著

霍亂治法

霍亂之證一時而來少頃即定切不可與之食當令忍飢一日以陳皮香薷木瓜各一錢白术二錢山楂五粒藿香甘草各五分白芍茯苓各三錢治之則痛不再發蓋霍亂乃暑之熱氣也暑熱得食復聚而不可解所以必使之餓則暑邪盡散名爲定亂湯

夏令火熱鑠石流金人有一時感犯暑邪上吐下瀉立刻死者最可懼之證切勿輕用香薷飲亦莫妄用白虎湯我有一方名曰解熱消暑散青蒿茯苓各一兩乾葛香薷陳皮各一錢白术三錢白扁豆二錢治之即安此方妙在用青蒿茯苓爲君青蒿最能解暑而去熱一物而兩用之引其暑熱盡從膀胱而出而乾葛香薷之類不過佐青蒿以去暑也尤妙少用白术以健脾胃之氣則暑熱退而胃氣不傷勝於香薷飲多矣

乾霍亂治法

夏月感暑致生霍亂欲吐不能欲泄不可最急之病也用香薷飲亦可得生然有用之而不納隨飲即吐尤爲至凶法當從治之方名轉治湯白术茯苓各三錢芍藥五錢藿香天花粉各一錢紫蘇陳皮肉桂香薷各五分白豆蔻一粒水煎冷服下喉即納霍亂即定矣此方之妙妙在芍藥爲君而佐之白术茯苓則肝氣自平不來下尅脾土則霍亂自定況又有解暑之藥乎尤妙在用肉桂藿香溫熱之藥順暑熱之氣引邪下行而暗解紛紜此實有鬼神不測之機而用之乃圭之內也

霍亂腹痛欲吐不能欲瀉不得四肢厥逆身青囊縮必死之證也然而其人一刻不亡豈可聽之而不救乎此證乃下虛寒而上感暑熱之氣陰陽拂亂上下不接最危最急之候法當用陰陽水吐之若不應急以救亂湯治之人參五錢香薷吳茱萸茯苓白术木瓜各三錢附子五分藿香一錢水煎服下喉而氣即回矣此治乾霍亂之神方也若濕霍亂又不可用此方用白术青蒿茯苓各五錢香薷陳皮各一錢砂仁三粒一劑即回春矣

腹痛之最急者絞腸沙也世人懼用官料藥殊不知藥能去病何畏官料哉吾有一方最妙不用官料之藥而功力十倍勝之方用馬糞一兩炒黑入黃土一撮微炒用黃酒乘熱服五錢一劑即痛去如失蓋馬糞最善止痛而治腹痛尤神用黃土者因馬糞過行之迅速得土而少遲且黃土與脾土同性相親引之入於病處使馬糞易於奏功也況又有黃酒佐之則無微不達非吐則瀉氣一通而痛輒定矣

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百七十八卷目錄

醫部彙考二百五十八

霍亂門二

方

四逆湯　四順湯　當歸四逆加吳萸生薑湯　通脈四逆湯　竹葉湯　附子粳米湯　大柴胡湯　縮砂丸　香附丸　又方　沉香溫脾湯　理中湯　香蘇散　建中加附子當歸湯　建中加木瓜柴胡湯　厚朴湯　冬葵子湯　人參散　人參白朮散　木瓜煎　回生散　丁香散　椒豆散　加減藿香湯　參朮三白湯　既濟湯　木瓜湯　半夏湯　十華散　藿香正氣散　乾薑湯　丁香散

香蘇丸　四君子湯　四君子加芍藥高良薑湯　四君子加藿附厚朴湯　丁香散　正胃湯　良薑飲　訶黎勒散　正氣丹　人參散　吳茱萸湯　附子散　固陽散　胡椒湯　活命散　振聖散　木香散　白豆蔻丸　白豆蔻丸　十香丸　桃枝湯　丹砂丸　吳茱萸飲子　人參散　竹瀝飲　木香湯　藿香散　豆蔻丸　橘皮湯　附子湯　六和湯　半夏湯　薤白湯　橘皮湯　漿水散　玉露散　細辛湯　附子湯　茯苓木二陳湯　排氣飲　煎　小和中飲　五君子煎　大和中飲　理陰煎　溫胃飲　神香散

單方

鍼灸

醫案

藝術典第二百七十八卷

醫部彙考二百五十八

霍亂門二

方

四逆湯　仲景

治霍亂吐瀉陰證脈沉身痛者

甘草炙二兩　附子一枝生用去皮臍破八片　乾薑一兩

右三味㕮咀以水三升煮取一升二合去滓分溫再服強人可用大附子一枚乾薑三兩涼服

四順湯　千金方

治霍亂轉筋內冷汗出嘔惡者

附子一兩　人參　乾薑　甘草各三兩

右四味㕮咀以水六升煮取二升分三服一方無人參

當歸四逆加吳萸生薑湯　仲景　下同

治霍亂多寒手足厥冷脈絕

生薑一兩　當歸　芍藥　細辛　桂心各三兩　通草　甘草各二兩　吳萸二升　大棗二十五枚

右九味㕮咀以水六升酒六升合煮取五升分五服得汗用棗三十枚今以霍亂病法多痞故除之如退棗入葛根二兩佳霍亂四逆加半夏一合附子小者一枚忽寒乃與大附子

通脈四逆湯

治吐利已斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕

大附子一枚　甘草一兩半　乾薑三兩強者四兩

右三味㕮咀以水三升煮取一升二合分二服脈出即愈

若面色赤者加葱白九莖

腹中痛者去葱白加芍藥二兩

嘔逆加生薑三兩

咽痛去芍藥加桔梗一兩

利止脈不出者去桔梗加人參二兩皆與方相應乃服之

竹葉湯

治霍亂吐利已服理中四順等湯熱不解者

竹葉一握　小麥一升　生薑十藥　甘草　人參　附子　芍藥各一兩　橘皮　當歸　桂心各二兩　白朮三兩

右十一味㕮咀以水一斗半先煮竹葉小麥取八升去滓下藥煮取三升分三服上氣者加吳茱萸半升即癒理中四順湯皆大熱若有熱宜竹葉湯

附子粳米湯

治霍亂四逆吐少嘔多者

附子一枚　粳米五合　半夏半升　大棗十枚　乾薑　甘草各一兩

右六味㕮咀以水八升煮取米熟去滓分三服

杜若圓　千金方　下同

治霍亂人將遠行預備方

杜若　藿香　白朮　橘皮　吳茱萸　乾薑　人參　厚朴　木香　鷄舌香　罌粟　桂心　荔荷　女萎　茴香

右十五味等分爲末蜜丸如梧子大酒下二十九日三又方

治霍亂永不令發

虎掌　薇御各二兩　枳實　附子　人參　檳榔　乾薑各三兩　厚朴六兩　皂莢三寸　白朮五兩

右十味爲末蜜丸如梧子大每酒下二十丸日三

大柴胡湯　傷寒

治傷寒汗出不解心下痞鞕吐利者

柴胡半斤　黃芩　芍藥各三兩　生薑五兩切　半夏半升洗　枳實四枚炙　大棗十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一升日三服一方用大黃三兩若不加大黃恐不爲大柴胡湯也

縮砂丸 中藏 經

消積溫中順氣治風痰利胃腸尤治傷生冷嘔逆泄瀉

天南星湯泡洗七徧切焙乾枠　良薑各四兩

縮砂仁二兩

右爲細末生薑自然汁煮麵糊丸如梧桐子大每服十五丸或二十丸搗生薑浸湯下不計時服

沉香溫胃丸 東垣 十書

治中焦氣弱脾胃受寒飲食不美氣不調和吐瀉等證

附子炮去皮臍　巴戟酒浸去心　乾薑炮

茴香各一兩　官桂七錢　沉香　甘艸炙

當歸　吳黃洗炒去苦　人參　白朮　白芍藥

良薑　白茯苓去皮　木香各五錢　丁香三錢

右爲細末用好醋打麵糊爲丸如梧桐子大每服五七十丸熱米飲送下空心食前日進三服忌一切生冷物

沉香溫脾湯 喬生 類證

治脾胃虛冷心腹疼痛嘔吐惡心腹脹脹滿不思飲食四肢倦怠或泄瀉如神

沉香　木香　丁香　附子炮去皮臍　官桂

人參　縮砂仁　川薑炮　白豆蔻　甘艸炙

白朮各等分

右十一味爲末每服三錢水一盞薑五片棗一箇煎至七分去滓熱服空心食前作粗末亦可

理中湯 仲景

人參　乾薑　白朮各三錢　甘草炙一錢

水二鍾煎一鍾不拘時服爲丸即名理中丸

若爲寒濕氣所中者加附子一錢名附子理中湯

若霍亂吐瀉者加橘紅青皮各一錢半名治中湯

若乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頻服候吐出令透即進此藥

若嘔吐者於治中湯內加丁香皮半夏各一錢生薑十片煎

若泄瀉者加橘紅茯苓各一錢名補中湯

若瀉不已者於補中湯內加附子二錢不喜飲食水穀不化者再加砂仁二錢

若霍亂嘔吐心腹作痛手足厥冷於本方內去白朮加熟附子名四順湯

若傷寒結胸先加桔梗枳殼等分不愈者及諸吐利後胃痞欲絕心胃高起急痛手不可近者加枳實白茯苓各一錢名枳實理中湯

若渴者再於枳實理中湯內加苦蔞根一錢

若霍亂後轉筋者理中湯內加火煅石膏一錢

若腎虛築者腎氣動也去朮加官桂一錢半腎惡燥去朮恐作奔豚故加官桂

若悸多者加茯苓一錢

若渴欲飲水者加白朮半錢

若寒者加乾薑半錢

若腹滿者去白朮加附子一錢

若飲酒多及啖炙煿熱食發爲鼻衄加川芎一錢

若傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血脈只用本方

二香散 良方

治暑濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂

大腹皮　甘草各半錢　藿香　白朮　厚朴

陳皮　茯苓　半夏　紫蘇　桔梗　白芷

香薷　黃連　扁豆各一錢

水二鍾薑五片葱白三根煎至一鍾不拘時服

香薷散 活人

治陰陽不順清濁相干氣鬱中焦名爲霍亂此皆飽食多飲復睡冷蓐外邪內積結而不散陰陽二氣壅而不反陽氣欲降陰氣欲升陰陽交錯變成吐利百脈混亂菜衛俱虛冷搏筋轉皆宜服此

厚朴去皮薑汁炒　黃連去鬚薑汁炒各二兩

香薷四兩　甘草半兩

右爲末每服四錢水煎不犯鐵器慢火煎之兼治不時吐利霍亂腹撮痛大渴煩躁四肢逆冷冷汗自出兩脚轉筋痛不可忍者須井中沉令極冷頓服之乃效

吳茱萸湯 仲景 方

一名百沸湯治霍亂吐瀉因飲冷自寒或忍饑或大怒或乘舟車傷動胃氣令人上吐下瀉頭旋眼運手脚轉筋四肢逆冷用藥須慢須臾不救

吳茱萸　木瓜　食鹽各半兩

右同炒令焦先用磁瓶盛水二升煮令百沸入藥煎至二升已下頓一盞冷熱隨病人服之卒無前藥用枯白礬爲末每服一大錢沸湯調服更無前

藥用鹽一撮酢一盞同煎至八分溫服鹽梅喊酸等物皆可服

建中加木瓜柴胡湯

治前證

桂枝二兩半 芍藥二兩 生薑一兩半 木瓜 柴胡各五錢 膠飴半斤 甘草一兩 大棗六枚

每服一兩水三盞煎一盞半去查下膠飴兩匙服

建中加附子當歸湯

治前證

桂枝一兩 芍藥二兩 甘草半兩 膠飴半斤 附子炮 當歸各三錢 生薑一兩半 大棗六枚

同前法煎

止渴湯

治霍亂煩渴

人參 麥門冬 茯苓 桔梗 苦蔞根 葛根 澤瀉 甘草炙各五錢

右爲細末每服二錢不拘時蜜湯調下

厚朴湯

治乾霍亂

厚朴去皮生薑汁塗炙令香 枳殼去瓤麩炒 高良薑 檳榔 砂硝各七錢半 大黃炒二兩

右揭篩每服三錢水一盞半煎一盞溫服

冬葵子湯

治乾霍亂大小便不通手足俱熱悶亂

冬葵子 滑石研 香薷各二兩 木瓜去瓤一枚

右揭篩每服五錢水二鍾煎一鍾溫服日四五服

人參散

治脾胃虛弱寒霍亂吐瀉心煩腹痛飲食不入

人參 厚朴薑汁製 橘紅各一錢 當歸乾薑炮 甘草炙各五分

右用粟水煎服

人參白朮散

治脾胃虛弱吐瀉作渴不食

白朮炒 白茯苓 人參 甘草炒 木香 藿香各五分 乾葛一錢

右用水煎服吐甚加生薑汁頻飲之

木瓜煎

治吐瀉轉筋悶亂

吳茱萸湯泡七次 生薑各二錢半 木瓜一兩半

每服二三錢水煎服

回生散

治霍亂吐瀉過多但一點胃氣存者服之回生

藿香 陳皮各五錢

右剉作一貼水煎溫服

丁香散

治霍亂嘔吐不止

丁香五分 藿香 枇杷葉拭去毛各一錢

右咀水一鍾半薑一片煎六分熱服

椒豆散（一名胡椒湯治霍亂吐瀉後煩渴不能服藥或水藥不入口者）

胡椒 葉豆各四十九粒

右研爲末新汲水調下或水煎服一方用胡椒七粒葉豆二十一粒爲末木瓜湯調下

加減藿香湯（一名藿香正氣湯）

治霍亂熱渴

花粉二錢 赤茯苓一錢 猪苓 澤瀉 香薷 乾葛各七分 黃連 白朮 甘草各五分

右剉作一貼入薑三片水煎服

參胡三白湯（一名四春湯）

治霍亂後煩熱口乾脈數或頭身痛

柴胡 白朮 白茯苓 白芍藥 當歸 陳皮 麥門冬 梔子仁 甘草各八分 人參五分 五味子十粒

右剉作一貼入棗二枚烏梅一枚燈心一團煎服

治霍亂後虛煩不得眠（既濟湯）

麥門冬二錢 人參 竹葉 半夏 附子炮 甘草炙各一錢

右剉作一貼入薑五片粳米百粒水煎服

木瓜湯（一名木瓜煎）

治霍亂吐瀉轉筋擾悶

木瓜 吳萸各二錢 茴香二分半 甘草二分 生薑 紫蘇各少許

右水煎入鹽一撮溫服

半夏湯（一名半夏煎）

治霍亂轉筋吐瀉不止

半夏麴 白茯苓 白朮各半兩 甘草炙 淡桂二錢半

右爲細末渴者凉水調下不渴者溫水調下不拘時候服

十華散（出生寶鑑下同）

治霍亂吐利神效

附子炮去皮臍　桂心　乾薑炮　白朮炒　人參　黃芪　青皮炒　羌活各一錢　五加皮一兩以吳茱萸一兩水同煮水盡爲度去吳萸不用取五加皮切焙　甘草半兩炙

右十味爲粗末每服二大錢水一中盞薑三片棗二枚煎六分去粗溫服不拘時

藿香正氣散

治四時不正之氣一切氣逆之證並能調治

藿香二錢　紫蘇一錢五分　陳皮　厚朴薑製　半夏薑製　白朮炒　茯苓　大腹皮　桔梗　白芷　甘草炙各一錢

右剉一劑生薑三片棗二枚水煎熱服

霍亂轉筋加木瓜

腹痛加炒白芍藥寒痛加桂冷甚加乾薑

飲食不化加香附砂仁水穀不消加神麴麥芽

心下痞滿加枳梗枳殼枳實

肉食不化加山楂濕麵停積加蘿蔔子

中暑冒風加香薷扁豆

時氣憎寒發熱加柴胡乾葛

口乾加麥門冬

小便不利合五苓散

暑濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂合黃連香薷飲

心腹絞痛加木香

若頻欲登圊不通利者加檳榔枳殼

丁香散（良方下同）

治霍亂吐利不止

丁香　桂心　白朮各半兩　訶黎勒煨去核　厚朴薑汁製　附子炮去皮臍　良薑各三分

陳橘皮湯浸去白焙　木瓜乾者各一兩

右爲細末每服二錢不拘時粥飲調下

乾薑湯

治霍亂吐利心腹疼痛氣逆手足冷

乾薑炮　桂心　附子炮去皮臍　草豆蔻去皮　木香　高良薑炒　肉豆蔻去殼麪煨　乾木瓜　甘草炙各五錢

右㕮咀每服三錢水一盞煎至十分去滓不拘時溫服

香薷丸

治冷熱不調霍亂吐瀉

香薷一兩五錢　白扁豆炒　零陵香　藿香　木香各一兩　丁香皮二兩　益智仁一分

右爲細末用麪糊和丸如梧桐子大每服二十丸食前用溫紫蘇湯下

四君子湯

人參　白朮　茯苓　黃芪各一兩

右剉如麻豆大每服一兩水三盞生薑五片煎至一盞去滓不拘時服如吐瀉轉筋頭痛自汗脈虛者加柱五錢（按四君子湯方諸書皆無桂惟此方有之蓋取桂甘草而和陰陽之義也）

四君子加芍藥尚良薑湯

四君子湯各一兩　芍藥　良薑各五錢

同前法煎服

四君子加薑附厚朴湯

治吐瀉霍亂四肢拘急脈沉而遲者

四君子湯各一兩　生薑　附子炮　厚朴薑製各二錢

同前法煎服

丁香散

治霍亂不止

丁香　肉豆蔻　木香各等分

右爲細末每服二錢用白粥飲調熱服不拘時

正胃湯

治霍亂吐利不止

枇杷葉拭去毛炙　厚朴去粗皮薑汁製　橘紅　桂心去粗皮各五錢

右爲粗末每服二錢匕水一盞入生薑二片煎至六分去滓不拘時熱服

良薑飲

治霍亂神效

良薑　藿香　陳皮各一兩　甘草炙三分

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分不拘時服

訶黎勒散

治霍亂嘔吐脾胃虛冷氣隔不思飲食

訶黎勒皮三分　桂心　澤瀉　赤芍　乾薑炮　人參各五錢　白朮炒　陳皮湯浸去白焙　厚朴薑汁炙令香熟各一兩　甘草炙微赤一分

右㕮咀每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

正氣丹

治下虛陰陽錯逆霍亂吐利粥食不下
半夏末生薑汁搜和作餅曝乾　藿香葉各一兩
硫黃三分盡內鉢汁入水銀一分於內結成砂子
附子炮裂去皮臍五錢
右爲細末酒煮麵糊和丸如梧桐子大以丹砂末
爲衣每服二十丸加至三十丸不拘時米飲送下
人參散
治霍亂身體疼痛四肢逆冷服理中四逆不效者
人參　白芍藥　當歸剉碎炒　高良薑各一兩
附子炮去皮臍　橘紅　桂心　白朮各二兩
右搗篩每服四錢用水一中盞紅棗三枚煎至六
分去滓不拘時熱服
吳茱萸湯
治霍亂多寒手足厥冷脉絕
吳茱萸半升洗焙　當歸切焙　桂心去粗皮
芍藥各三分　木通　細辛　甘草炙各五錢
右剉如麻豆大每服五錢匕用水二盞入生薑一
棗大切碎紅棗二枚煎至一盞去滓不拘時溫服
如氣痞去棗加葛根五錢一方無木通有木香
附子散
治霍亂腹滿虛鳴氣逆手足俱冷
附子炮裂去皮臍　草豆蔻　陳皮湯浸去白
高良薑剉　桂心各五錢　甘草炙一分
右㕮咀每服三錢用水一中盞入生薑半分煎至
六分去滓不拘時熱服
回陽散
治吐瀉不止或筋轉四肢發厥虛風不省人事服
此藥四肢漸煖神識便省
天南星不拘多少
右爲末每服三錢入生薑五錢紅棗三枚同煎至
八分溫服未省再服
胡椒湯
治霍亂煩悶欲死
胡椒三十粒　陳皮　高良薑　桂心各五錢
麥門冬去心焙　木瓜乾者各一兩
右搗篩每服三錢水一中盞煎六分去滓不拘時
溫服
活命散
治男子婦人小兒上吐下瀉霍亂不止面色青黑
命欲臨死者宜服此藥
防風　羌活　獨活　乾薑　細辛各一兩
草豆蔻　肉豆蔻　川芎各五錢　吳茱萸
乾木瓜各一兩　官桂去粗皮半分
右爲細末每服三錢濃煎木瓜湯空心調連滓服
抵聖散
治霍亂宿食不消心腹疼痛
白朮二兩　良薑五錢　白茯苓　吳茱萸泡焙
人參　木香　枳殼麩炒　草豆蔻仁　橘紅焙
甘草炙各一兩　厚朴去粗皮薑汁塗炙四兩
右爲細末每服二錢匕不拘時用沸湯調服
木香散
治霍亂下利氣脹飲食不消
木香　丁香　白朮炒　山楂子　人參　橘紅
桂心去粗皮　石菖蒲　吳茱萸湯泡炒　良薑
草豆蔻去皮　白豆蔻仁　肉豆蔻去殼煨
甘草炙各等分
右爲細末每服二錢匕不拘時木瓜煎湯調下
白豆蔻丸
治霍亂及脾胃氣虛腹脹妨悶不思飲食
白豆蔻去皮　訶黎勒去核　人參去蘆各三分
乾薑炮　甘草炙微赤　桂心各五錢　白朮
橘紅　厚朴去粗皮生薑汁塗令黃香熟各一兩
右爲細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每
服二十丸不拘時生薑棗湯送下日進四五服
吳茱萸餅
治霍亂昏塞不利
吳茱萸湯泡焙炒　厚朴去粗皮薑汁製　橘紅
人參　良薑　胡椒各一分　藿香　木瓜各一兩
右爲細末用生薑汁半斤和藥捻作餅子曝乾臨
用時炙燥再碾爲細末每服二錢匕水一盞煎至
七分溫服
十香丸
治霍亂中惡不識人心痛腹脹不思飲食
丁香　蘇合香　白檀香　香附炒去毛　沉香
安息香研　木香　薰陸香研　麝香研　良薑
龍腦研　白朮剉炒　丹砂研各五錢　華茇炒
訶黎勒煨取皮　犀角屑　厚朴薑汁製各一兩
右除別研藥外碾爲細末入別研藥同研令勻煉
蜜和丸如梧桐子大每服五九不拘時用溫酒送
下老少加減服甚者溫酒研下日四五服以瘥爲
度此藥以磁盒貯之

桃枝湯
治中惡霍亂心痛胃脘疼痛喘急
東行桃枝白皮切一握　官桂　當歸焙各三兩
丹砂細研　附子炮裂去皮臍　吳茱萸湯泡
豆豉各一兩　梔子仁十四枚
右剉如麻豆大每服四錢七甲水二鍾生薑三片煎至一鍾去滓不拘時溫服日三夜一
丹砂丸
治中惡霍亂垂死
丹砂半分　附子炮裂去皮臍一分　雄黃三豆許
右別研細末用巴豆七粒去皮心出油後入丹砂附子雄黃末同研令勻煉蜜和丸如麻子大每服三丸不拘時米飲下若下利未止加三丸至五丸與少冷粥食之即定
白豆蔻丸
治霍亂後脾胃尚虛穀氣未實津液內燥令人煩躁睡臥不安
白豆蔻仁　橘紅　草豆蔻仁　厚朴薑汁炙
官桂　乾木瓜　白术炒　半夏湯泡七次
人參各二兩　高良薑炒　縮砂仁　神麯炒
麥蘗炒　白茯苓　乾薑炮　木香　甘草炙
桃仁去皮尖雙仁炒各四兩
右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸至四十丸空心用米飲送下
人參散
治霍亂吐利汗出心煩
人參去蘆　麥門冬去心　茯神各三兩　白术　黃芪　乾薑炮　桂心　甘草炙各五錢
右揭篩每服四錢用水一中盞生薑半分煎至六分去滓頓頓溫服
竹瀝飲
治霍亂狂悶煩渴吐瀉無度氣欲絕者
竹瀝一合　粳米一合炒以水二盞同研去滓取汁
右二味和勻頓服之
木香湯
治霍亂煩躁懊憹不得安臥
木香　木瓜　紫蘇各一兩　草豆蔻仁一兩五錢
右揭篩每服三錢七水一盞入黑豆半合許生薑三片煎至八分去滓溫服日二
藿香散
治霍亂逆滿閉口
藿香葉一兩焙　訶黎勒煨十枚　糯米三百粒
石蓮心二百箇去皮以白蓮代　甘草炙一分　人參
丁香各十兩
右爲細末每服一錢用和皮燥薑一塊棗二枚去核煎湯調下早晚食前服
薤白湯
治霍亂乾嘔不止
薤白切細一握　生薑切細五錢　陳皮去白三錢
右用水二大盞煎至七分去滓分溫二服
橘皮湯
治霍亂嘔噦不止
橘紅　甘草炙各一兩　枇杷葉去毛炙黃二兩
右揭篩每服三錢七水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服如人行五七里再服
附子湯
治霍亂轉筋淋足
附子一枚去皮臍　生椒綿裹　生薑切各一兩
右以水一斗煎三兩沸入磁盆中濾去滓以鹽漿解之冷熱得所淋洗立瘥
六和半夏湯
治霍亂吐瀉
白术　甘草　縮砂仁　杏仁去皮尖　人參
半夏製各五分　赤茯苓　藿香　扁豆薑汁炒
木瓜各一錢　香薷　厚朴薑製各二錢
右作一服挼三片棗一枚水二盞煎一盞溫服
藿香湯
治外感風寒內傷飲食霍亂轉筋嘔吐泄瀉
肉桂二分　藿香　白术　猪苓　澤瀉　厚朴
白茯苓各一錢　紫蘇　大腹皮　白芷　桔梗
半夏製　陳皮各八分　甘草炙五分
右作一服水二盞薑五片煎八分食遠服
玉露散
治夏月傷暑霍亂吐瀉
石膏　寒水石　生甘草各等分
右爲末每服　井白湯調下
通脈四逆湯
治霍亂多寒肉冷脈絕
附子製　桂心　當歸　甘草炙各一錢　木通
白芍藥　細辛各五分　吳茱萸三錢

右作一服水二鍾薑七片棗一枚煎八分無時服

藿香散（出局方）

治暴吐如水周身汗出盡冷脈弱不能言語甚者吐逆不止

半夏製　一錢　附子炮　乾生薑　炙甘草　桂心各五分　良薑二分半

右作一服藿水煎服之

藿附湯（出人）

治霍亂吐瀉轉筋手足厥冷多汗

乾薑炮　附子製各二錢

右作一服水一鍾半煎七分熱服

蒼术二陳煎（出局方下同）

治痰飲水氣停蓄心下嘔吐吞酸等證

猪苓　澤瀉　茯苓各一錢五分　陳皮一錢　半夏二錢　白术　乾薑炒黃各一二錢　炙甘草八分

水一鍾半煎服

和胃飲

治寒濕傷脾霍亂吐瀉及痰飲水氣胃脘不清嘔惡脹滿腹痛等證此即平胃散之變方也凡嘔吐等證多有胃氣虛者一聞蒼术之氣亦能動嘔故以乾薑代之

陳皮　厚朴各一錢五分　乾薑炮一二錢　炙甘草一錢

水一鍾半煎七分溫服

此方凡藿香木香丁香茯苓半夏扁豆砂仁澤瀉之類皆可隨宜增用之若胃腹有滯而兼時氣寒熱者加柴胡

排氣飲

治霍亂氣逆食滯脹痛等證

陳皮　藿香　枳殼各一錢五分　香附　澤瀉　烏藥各二錢　木香七分或一錢　厚朴一錢

水一鍾半煎七分熱服

養中煎

治中氣虛寒胃嘔爲泄者

人參一二錢　山藥炒　白茯苓各一錢　扁豆炒二錢　炙甘草一錢　乾薑炒黃二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

大和中飲

治飲食留滯霍亂等證

陳皮一二錢　枳實一錢　砂仁五分　山楂　麥芽各二錢　厚朴　澤瀉各一錢五分

水一鍾半煎七八分食遠溫服

小和中飲

治霍亂胃脘脹悶

陳皮　茯苓　厚朴各一錢五分　山楂肉　扁豆各二錢　甘草五分

水一鍾半加生薑三五片煎服

五君子煎

治脾胃虛寒嘔吐泄瀉而兼濕者

人參二三錢　白术　茯苓各二錢　炙草一錢　乾薑炒黃一二錢

水一鍾半煎服

神香散

治霍亂胃脘脹悶嘔吐泄瀉（原本脫此三字）

（原本脫此二字）

丁香　白豆蔻

二味等分爲末清湯調下五七分甚者一日一錢

日數服不拘

理陰煎

此理中湯之變方也通治頭陰虛寒胃氣滿嘔噦痰飲惡心吐瀉腹痛婦人經遠胞滯等證

熟地　五錢或一兩　當歸二錢或五七錢　乾薑炮黃色一錢　炙甘草一二錢

水二鍾煎七分熱服或加肉桂一二錢

溫胃飲

治中寒嘔吐吞酸泄瀉不思飲食及婦人臟寒嘔惡胎氣不安等證

人參一二錢或一兩　白术炒一二錢或一兩　陳皮一錢或不用　扁豆炒二錢　炙甘草一錢　乾薑炒焦一二三錢　當歸一二錢（原書者加此）

水二鍾煎七分食遠溫服

單方

霍亂吐瀉勿食熱物飲冷水一盞新汲水更佳仍以水一盆浸兩足立止（良方）

霍亂及中暍卒死者飲地漿一升妙乾霍亂病不吐不利脹痛欲死地漿三五盞服即愈大忌米湯地漿者掘黃土地作坎深三尺以新汲水沃入攪濁少頃取清用之（千金方）

霍亂轉筋以器盛百沸湯熨之仍令蹋器使足底熱微冷則易（嘉祐本草）

凡霍亂及嘔吐不能納食及藥危甚者先飲陰陽水數口即定

痰瘧及宿食毒惡之物臚脹欲作霍亂者即以鹽投陰陽水中進一二升令吐盡痰食便愈蓋上焦主納中焦腐化下焦主出三焦通利陰陽調和升降周流則臟腑暢達一失其道二氣清亂濁陰不降清陽不升故發爲霍亂嘔吐之病飲此湯輒定者分陰陽使得其平也

霍亂吐下用鍋底煤半錢竈額上墨半錢百沸湯一盞急攪數千下以碗覆之通口服一二口立止

乾霍亂病心腹脹痛蘆蓬芽一把水煎濃汁頓服二升

霍亂吐利屋上倒掛塵淡湯泡澄清服即止

霍亂轉筋用青銅錢四十九枚木瓜一兩烏梅炒五枚水二碗煎八分溫服

霍亂轉筋腎堂及臍下痠痛銅熨器炙熱隔衣熨其臍腹腎堂

霍亂轉筋身冷心下微溫者鉢砂研二兩蠟三兩和丸著火籠中熏之周圍厚覆勿令烟洩兼牀下著火令腹微暖良久當汗出而甦

暴得吐逆不止生滑石末二錢溫水服仍以細麵半瓷押定

霍亂煩滿氣逆腹脹手足厥冷不灰木陽起石煅阿魏半兩巴豆去心杏仁去皮各二十五箇爲末棗肉飯丸櫻桃大穿一孔每服一丸燈上燒烟盡研末蘆湯下以利爲度

乾霍亂病千年石灰沙糖水調服二錢或淡酢湯亦可名落盡湯

乾霍亂病上不得吐下不得瀉用鹽一大匙熬令黃童子小便一升合和溫服少頃吐下即愈

霍亂腹痛炮鹽一包熨其心腹令氣透又以一包熨其背

霍亂轉筋欲死氣絕腹有暖氣者以鹽填臍中灸鹽上七壯即甦

冷熱霍亂分利陰陽元精石半夏各一兩硫黃三錢爲末麵糊丸梧桐子大每服三十九

二氣丹治伏暑傷冷二氣交錯中脘痞結或泄或嘔或霍亂厥逆硫黃硝石等分研末石器炒成沙再研糯米糊丸梧桐子大每服四十九新井水下

霍亂吐瀉硫黃一兩胡椒五錢爲末黃蠟一兩化丸皂子大每凉水下一丸

霍亂吐瀉枯白礬末一錢百沸湯調下

霍亂嘔惡人參一兩水一碗半煎汁一碗入鷄子白一枚再煎溫服一加丁香

霍亂煩悶人參五錢桂心五分水二盞煎服

霍亂吐瀉煩躁不止人參二兩橘皮三兩生薑一兩水六升煮三升分三服

霍亂轉筋腹痛木香末一錢木瓜汁一盞熱酒調服

霍亂吐利高良薑火炙令焦香每用五兩以酒一升煮三四沸頓服亦治腹痛中惡名冰壺散

霍亂腹痛高良薑一兩剉以水三大盞煎二盞半去滓入粳米一合棗粥食之便止

霍亂嘔甚不止用高良薑生剉二錢大棗一枚水煎冷服立定名冰壺湯

霍亂煩渴草豆蔻黃連各一錢半烏豆五十粒生薑三片水煎服之

霍亂吐利肉豆蔻爲末蘆湯服一錢

霍亂吐瀉垂死者服之同生藿香葉陳皮各半兩水二盞煎一盞溫服

霍亂脹滿未得吐下用生紫蘇搗汁飲之佳乾蘇葉汁亦可

霍亂困篤鷄蘇三兩水二升煮一升分三服

霍亂吐下不止以艾一把水三升煮一升頓服

霍亂煩悶蘆根三錢麥門冬一錢水煎服

霍亂脹痛蘆根一升生薑一片橘皮五兩水一升煎三升分服

霍亂煩渴腹脹蘆葉一握水煎服

又方蘆葉五錢糯米一錢半竹茹一錢水煎入薑汁蜜各半合煎兩沸時時呷之

霍亂煩渴萋子一兩香薷二兩每二錢水煎服

肝虛轉筋吐瀉赤萋莖葉切一合水一碗酒二合煎至四合分二服

霍亂轉筋萋葉一升水三升煮取汁二升入香豉一升更煮一升半分三服

霍亂吐利扁竹入豉汁中下五味煮羹食

熱霍亂大黃人參各半兩水二碗煎一碗熱服可安

霍亂腹脹半夏桂等分爲末水服方寸匕

霍亂吐利山豆根末橘皮湯下一錢

霍亂吐利防己白芷等分爲末新汲水服二錢

霍亂脹痛生菖蒲剉四兩水和搗汁分溫四服

霍亂心煩薤根炙一兩半水萍焙人參枇杷葉炙各一兩每服五錢入薤白四寸水煎溫服

霍亂煩渴不止糯米三合水五升蜜一合研汁分服或煮汁服 產乳方

霍亂吐瀉煩渴欲絕用粳米二合研粉入水二盞研汁和淡竹瀝一合頓服 普濟方

霍亂煩躁黃粱米粉半升水升半和絞如白粉頓服 外臺 濟要

霍亂大渴不止多飲則殺人黃粱米五升水一斗煮清三升稍稍飲之 肘後方

霍亂脹痛大豆生研水服方寸匕 普濟方

霍亂吐利菉豆粉白糖各二兩新汲水調服 生生編

霍亂吐利豌豆三合香薷二兩爲末水三盞煎一盞分二服 聖惠方

又方扁豆香薷各一升水六升煮二升分服 千金方

霍亂轉筋白扁豆爲末酢和服 普濟方

霍亂吐利鹽酢煎服甚良 如宜方

霍亂煩脹未得吐下以好苦酒三升飲之 千金方

霍亂乾嘔不止者取薤一虎口以水三升煮取一半頓服不過三作即已 草雷獨行方

霍亂脹滿不得吐下名乾霍亂小蒜一升水三升煮一升頓服 肘後方

霍亂轉筋入腹殺人以小蒜鹽各一兩搗傳臍中灸七壯立止 聖濟總錄

乾濕霍亂轉筋用大蒜搗塗足心立愈 永類鈐方

霍亂吐瀉芥子搗細水和傅臍上 聖濟總錄

霍亂脹痛蕪荑子水煮汁飲之 集簡方

霍亂欲死生薑五兩牛屎一升水四升煎二升分再服即止 梅師方

霍亂轉筋入腹欲死生薑三兩搗酒一升煮沸分三服仍以薑搗貼痛處 外臺 秘要

霍亂腹脹不得吐下用生薑一斤水七升煮二升分二服 肘後方

霍亂轉筋柏葉搗爛裹脚上及煎汁淋之 聖惠方

霍亂吐利鹽梅煎湯細細飲之 如宜方

霍亂腹痛桃葉三斤切秋冬用枝水五升煮一升分二服 外臺 秘要

霍亂吐利梨枝葉煮汁飲 聖惠方

霍亂腹痛木瓜五錢桑葉三片棗一枚水煎服 聖惠方

霍亂吐瀉不拘男女但有一點胃氣存者服之再生 廣陳皮去白五錢眞藿香五錢水二盞煎一盞時時溫服 百一選方

又方用陳橘皮末二錢湯點服不省者灌之仍燒磚沃醋布裹磚安心下熨之便活 聖惠方

乾霍亂病心腹脹痛不吐不利煩悶欲死用檳榔末五錢童子小便半盞水一盞煎服 聖濟總錄

霍亂吐利用胡椒三十粒以飲吞之 千金方

又方用胡椒四十九粒菉豆一百四十九粒研勻木瓜湯服一錢一方以新汲水服亦效 直指方

霍亂乾嘔不止果菜莫泡炒乾薑炮等分水煎服之 聖濟總錄下同

霍亂煩悶茶末一錢煎水調乾薑末一錢服之即安

霍亂煩渴藕汁一鍾薑汁半鍾和勻飲

霍亂吐利生藕搗汁服 聖惠方

乾霍亂病不吐不下丁香十四枚研末以沸湯一升和之頓服不瘥更作之 千金方

霍亂及乾霍亂須吐者以樟木屑煎濃汁吐之甚良 本草

又方用厚朴葳汁炙研末新汲水服二錢如神 聖惠方

中惡霍亂海桐皮煮汁服之 聖濟總錄

霍亂煩悶槐葉桑葉各一錢炙甘草二分水煎服之 聖惠方

霍亂轉筋皂角末吹豆許入鼻取嚏即安 梅師方

風痰霍亂食不消大便滯悶黎勒三枚取皮爲末和酒頓服二五次妙 外臺 秘要

伏暑霍亂傷冷吐利煩渴名水沒丹巴豆二十五箇去皮心及油黃丹炒研一兩二錢半化黃蠟和丸菉豆大每服五七丸水浸少頃別以新汲水送下 局方

乾霍亂病心腹脹痛不吐不利欲死巴豆一枚去皮心熱水研服得吐利即定也

霍亂轉筋入腹桑葉一握煎飲一二服立定 聖惠方

霍亂腹痛吐下桑葉搗汁一盞服冬月乾者煎汁服

霍亂轉筋心腹脹滿未得吐下梔子二七枚燒研熱酒服之立愈 肘後方

霍亂轉筋入腹無可奈何者以醋煮青布搽之冷則易 千金方

霍亂轉筋腹痛以苦酒煮絮裹之 聖惠方

霍亂吐利偷本人頭髮以百沸湯泡汁服一呷勿令知之 集元方

霍亂轉筋故麻鞋底燒赤投酒中煮取汁服 蒙筌下同

霍亂吐下不止取舊鞋底洗淨煮汁服

吐瀉不止四肢逆冷不省人事南星爲末每三錢入大棗三枚同煎服四肢漸煖神識便省神妙

乾霍亂鹽湯一椀入皂角末少許調服探吐即效

霍亂煩渴烏梅水漬和蜜飲之妙

林檎青色者治霍亂吐瀉甚妙煑取汁飲或嚼食之

霍亂吐瀉出路在家應急方用路旁破草鞋去兩頭洗三四次水煎湯一盌滾服之即愈事海文山

霍亂轉筋入腹痛敗木梳一枚燒灰酒服永瘥千金方

霍亂轉筋垂死者敗蒲席一握切漿水一盞煑汁溫服聖惠方

霍亂轉筋入腹痛車轂中脂塗足心千金方

霍亂吐利蠟一彈丸熱酒一升化服即止肘后方

乾霍亂病脹滿煩躁亂髮一團燒灰鹽湯二升和服取吐十便良方

霍亂不通脹悶欲死因傷飽取涼者用雄雀糞二十一粒研末溫酒服未效再服聖濟總錄

霍亂厥逆服烏牛尿二升千金方

霍亂吐下不止四肢逆冷用黃牛屎半升水二升煑三沸服半升止外臺秘要

又方用烏牛屎絞汁一合以百日兒乳汁一合和溫服聖惠方

霍亂吐利不止用烏牛齡草一團人參生薑各三兩甜漿水一升半煑汁五合服魏遺方

霍亂困篤童女月經衣和血燒灰酒服方寸匕百方不瘥用之千金方

霍亂用黃牛犢子臍尿一升和酒三升煑汁服肘后方

攪腸沙痛欲死者用馬糞研汁飲之立愈經驗方

霍亂轉筋筋粗大如桃李攣搖不可忍取秫蒭葉濃煎湯飲之種香

霍亂煩渴粟米泔飲數升立瘥又治轉筋入腹蘇恭

絞腸沙痛蕎麥麵炒焦熱水衝服本草

霍亂煩悶嘔吐腹空轉筋恐入腹宜多服山巖泉水名曰洗腸勿令腹空空則更服人皆懼此然嘗試有效但身冷力弱者防致臟寒當以意消息之藏器

攪腸沙痛陰陽腹痛手足冷但身上有紅點以燈草蘸油點火焠於點上濟急方

霍亂煩悶向陽壁土煑汁服聖濟總錄

絞腸沙痛馬蘭根葉細嚼嚥汁立安齊城神方

霍亂成痢劉寄奴草煎汁飲聖濟總錄

霍亂吐下菜豆葉絞汁和酢少許溫服開寶

吐利後轉筋扁豆葉一把生搗入少酢絞汁服立瘥蘇恭

霍亂扁豆藤蘆蓉人參倉米等分煎服時珍下同

霍亂煩躁坐臥不安葱白二十莖大棗二十枚水三升煎二升分服

霍亂吐瀉不止轉筋腹痛取棠梨枝葉一握同木瓜二兩煎汁細呷之聖惠方下同

霍亂轉筋木瓜一兩酒一升煎服不飲酒者煎湯服仍煎湯浸青布裹其足

霍亂煩躁氣急以木瓜核每嚼七粒溫水嚥之

霍亂轉筋楯子又名木桃煑汁飲功與木瓜相近孟洗

又方取木梨煑汁服

霍亂轉筋以煖物裹脚後以柏木片煑湯淋之經驗方

霍亂杉木煎湯服大明

霍亂用釣樟木磨服蕭炳

攪腸沙痛用母猪生兒時拋下糞日乾爲末以白湯調服

又方童子小便服之即止聖惠方下同

中惡霍亂麝香一錢酢半盞調服

霍亂吐利兔骨煑汁服立止外臺秘要

霍亂轉筋入腹編薦索燒研酒服二指撮藏器

乾霍亂不吐不利煩脹欲死或轉筋入腹取屠兒几垢一鷄子大溫酒調服得吐即愈

霍亂吐利取尿桶舊板煎水服山村宜之如宜方

霍亂吐瀉取蜣螂轉丸燒存性酒調服藏器

一氣散一名青金散治霍亂吐逆不問虛實冷熱用水銀硫黃等分研不見星每服一字至半錢生薑湯調下錢氏小兒方

霍亂筋脈攣急不得屈伸者薏苡仁生爲末每服二錢米飲調下無時日進三服勿令間斷爲妙

絞腸沙病發用水紅花根去苗洗淨剉水一椀新磁瓶內煎至半椀服用新苧蔴作頭繩縛髻每年換一次不須藥永不發

針灸

素問曰霍亂刺少陰俞旁五足陽明及上旁三

靈樞曰足太陰之別名曰公孫去本節之後一寸別走陽明其別者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂賁則腸中切痛虛則鼓脹取之所別也

清氣在陰濁氣在陽榮氣順脈衛氣逆行清濁相干亂於胃中是謂大惋故氣亂於腸胃則爲霍亂取之足太陰陽明不下者取之三里

甲乙經曰霍亂泄出不知先取大谿後取太谿之源

霍亂巨缺關衝支溝解谿主之

霍亂泄利期門主之

厥逆霍亂府舍主之

霍亂逆氣魚際太白主之

霍亂遺尿失氣三里主之

霍亂頸痛不仁承筋主之

霍亂轉筋金門僕參承山承筋主之

千金方曰凡霍亂灸之雖未能立瘥終無死人可逆灸或但先下後吐當隨病狀灸之

霍亂陰陵泉主之

東垣十書曰靈樞五亂篇言氣亂於腸胃取足太陰陽明不下取足三里蓋因足太陰虛者於募穴導引之於血中有一說腑輸去腑病也胃虛而致太陰無所禀者於足陽明胃之募穴中導引之如氣逆上而霍亂者取三里氣下乃止不下復始

醫學正傳曰霍亂吐瀉不止垂死灸天樞氣海中脘四穴立愈天樞二穴在臍心兩旁各開二寸氣海一穴在臍下半寸中脘一穴在臍上四寸

醫學綱目曰霍亂以竹杖兩手反抱拄於脊骨就杖兒上下各點一穴如先吐先灸上穴先瀉先灸下穴各三百壯百發百中

霍亂吐瀉取中脘天樞三里委中

又法取上脘三里

吐利上下俱出臟腑曚曚血頭重臂痛取太白地機風府各五分長强尺澤各一寸

霍亂手足厥冷灸二陰交七壯

霍亂病人面正臥兩手著身以繩橫亙兩肘尖頭依趾下挾脊兩邊相去各一寸灸三七壯無不驗

霍亂已死但有煖氣者灸承筋七壯立甦取穴法以繩從足拇指圍至後跟一迴捻斷等折一半爲度以此度從足跟貼地量上至腨度極頭處是穴

霍亂轉筋灸承山二十七壯神效

霍亂轉筋在兩臂及胷堂中者筋拘不及動搖置中中府巨闕胃脘尺澤太陰灸七壯

奇效良方曰霍亂吐瀉令患人仰臥揉艾鋪臍上如碟子大一指厚炷斗盛火熨之如無熨斗以鍬子盛湯盪之亦可

景岳全書曰乾霍亂刺委中穴出血或刺十指頭出血皆是良法今西北人凡病傷寒熱入血分而不解者悉刺兩手腕中出血謂之打寒蓋寒隨血去亦即紅汗之類也故凡病受寒霍亂者亦宜以此法治之今東南人有刮沙之法以治心腹急痛蓋使寒隨血聚則邪達於外而藏氣始安此亦出血之意也

轉筋十指拘攣不能屈伸灸足外踝骨尖上七壯

霍亂危急將死用鹽填臍中灸二七壯立愈

醫案

千金方曰武德中有德行尼名淨明患霍亂已久或月一發或一月再發發即垂死時在朝太醫蔣許甘棗之徒亦不能識余以霍亂治之處虎掌一方得念永不再發故疏而記之

衛生寶鑑曰提學侍其公年七十九歲六月中暑毒霍亂吐利昏悶終日不省人事時夜方半請予治之診其脈洪大而有力一息七八至頭熱如火足寒如冰半身不遂牙關緊急予思內經五亂篇中云清氣在陰濁氣在陽營氣順脈衛氣逆行亂於胃中是謂大惋霍亂之名自此而生蓋因年高氣弱不任暑氣陽不維陰則瀉陰不維陽則吐陰陽不相維則既吐且瀉矣前賢見寒多以理中丸熱多以五苓散爲定法治之今暑氣極盛陽明得時況因動而得之中暍明矣非甘辛大寒之劑則不能瀉其暑熱墮浮溜之火而安神明也遂以甘露散甘辛大寒瀉熱補氣加白茯苓以分陰陽約重一兩冰水調灌漸漸省事而諸證悉去後慎言語節飲食三日以參朮調中湯之劑加減服之理止氣逾十日後方平復

戊午春攻襄陽回住夏曹州界有蒙古百戶昔良海因食酒肉欲漏乳得霍亂吐瀉從朝至午精神昏憒以困急來求予視之脈得浮數按之無力所傷之物已出矣即以新汲水半椀調桂苓白朮散徐徐服之稍安又於牆陰掘一地穴約二尺許貯以新汲水在內攪動待一時澄清名曰地漿用清者一盞再調服之漸漸氣調吐利遂止至夜方眠翌日徹暴渴却以錢氏白朮散時時服之良愈

薛己醫按曰儀部李北川仲夏患腹痛吐泄兩手足捫之則熱按之則冷其脈輕診則浮大重診則微細余曰此陰寒之證也急服附子理中湯不應仍服至四劑而愈

上舍徐民則夏月入房及食冰果麪食而患腹痛此陰寒證也急用附子理中湯以回陽而愈有同患此者不信別用二陳枳實黃連香薷飲之頓而死

進士劉華甫夏月食生冷果品患前證余用附子理中湯一鍾頓安