中國歷代醫學典



廣陵書社

中國歷代醫學典

七



廣陵書社

圖書在版編目(CIP)數據

中國歷代醫學典 / 廣陵書社編. —揚州:廣陵書社,2008.8
ISBN 978-7-80694-286-4

Ⅰ.中… Ⅱ.廣… Ⅲ.中國醫藥學—古籍—選集 Ⅳ.R2-52

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2008)第 115790 號



書　　名　中國歷代醫學典
編　　者　廣陵書社
責任編輯　王志娟
出版發行　廣陵書社
揚州市文昌西路雙博館附二樓　郵編 225012
http://www.yzglpub.com　E-mail:yzglss@163.com
印　　刷　揚州市文津閣古籍印務有限公司
版　　次　2008 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
規　　格　開本 /787 × 1092 毫米　1/16
印　　張　344.375
標準書號　ISBN 978-7-80694-286-4/K·154
定　　價　1500.00 圓(全八册)

第三百八十一卷至第三百八十三卷
婦人經脉門 四〇二二
第三百八十四卷
婦人子嗣門 四〇五八
第三百八十五卷至第三百八十六卷
婦人胎前門 四〇七二
第七册
第三百八十七卷
婦人胎前門 四一〇一
第三百八十八卷至第三百八十九卷
婦人臨産門 四一一八
第三百九十卷至第三百九十四卷
婦人産後門 四一三九
第三百九十五卷至第三百九十六卷
婦人崩漏門 四二〇五
第三百九十七卷至第三百九十八卷
婦人帶下門 四二二九
第三百九十九卷
婦人諸乳疾門 四二五二
第四百卷
婦人前陰諸疾門 四二六五
第四百卷
婦人夢與鬼交門 四二七六
第四百卷
婦人交腸門 四二七八
第四百一卷
小兒未生胎養門 四二八〇
第四百二卷
小兒初生護養門 四二八八
第四百三卷至第四百五卷
小兒診視門 四三〇二
第四百六卷
小兒臟腑形證門 四三三七
第四百七卷至第四百十卷
小兒初生諸疾門 四三四九

第四百十一卷至第四百十四卷
小兒頭面耳目鼻病門 四三九四
第四百十五卷至第四百十六卷
小兒唇口齒舌喉病門 四四三四
第四百十六卷
小兒胸背手足病門 四四五二
第四百十七卷至第四百十八卷
小兒風寒門 四四五八
第四百十九卷至第四百二十一卷
小兒諸熱門 四四七七
第四百二十二卷至第四百二十三卷
小兒嗽喘門 四五〇九
第四百二十四卷
小兒諸卒中門 四五三五
第四百二十五卷至第四百三十三卷
小兒驚癇門 四五四六
第四百三十四卷至第四百三十七卷
小兒吐瀉門 四六三六
第四百三十八卷
小兒二便門 四六六九
第四百三十九卷
小兒心腹痛門 四六八二
第四百四十卷
小兒腫脹門 四六九一
第四百四十一卷至第四百四十二卷
小兒食癖門 四七〇二
第四百四十三卷至第四百四十七卷
小兒諸疳門 四七二五
第四百四十八卷
小兒痢門 四七七六

第八册

第四百四十九卷
小兒痢門 四七八九
第四百五十卷
小兒癗門 四七九九

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百七卷目錄
醫部彙考三百八十七
婦人胎前門三
方二
木香丸 白术散 鄭氏勝金散 生犀
角散 白殭蠶散 赤箭丸 白术酒
羚羊角散 毛詩酒 太聖散 麥門冬湯
麥門冬散 人參散 一母丸 人參黃芪散
人參散 紫胡飲 又方 大
馬兜鈴散 紫菀湯 平安散 紫胡飲
加味理中湯 猪苓散 茯子湯 又方 大
腹皮湯 丹溪方 獨聖散 獨聖湯 地膚
大黃湯 又方 又方 安榮散 桑螵蛸散
續斷湯 甘草小麥大棗湯 竹茹湯
杜仲丸 四製香附丸 安胎
白术散 黃芪散 人參丸 枳實橘皮丸
知母丸 雄黃丸 復元湯 紫蘇和氣飲
于朮散 加減白术散 加減當歸散 加減安胎飲 加減
散 加減倉公下氣湯 加減當歸散 加減通氣
牛膝湯 加減紫菀湯 加減紫蘇湯 加減
秦艽散 加減梔子五物湯 加減白术散
新鬼丹 泰山磐石散 二陳湯 加味小柴胡湯
人參養胃湯 歸脾湯 加味
四七湯 芎歸膠艾湯 安胎飲 胡連丸 天
門冬飲 鴉黃散 鴨子煎 河水散 螺青
胎教 艾葉湯 參橘散 保生湯 半夏丹
茶湯 芎歸元散 竹茹湯 忘憂
艾回物湯 茶連半夏湯 歸元散 地膚子湯
散 溫胃飲 保陰煎 凉胎飲 右歸
飲 五福飲 藏元煎 紫蘇飲 五
小和中飲 解肝煎 化肝煎
味異功散 五君子 清化飲 四聖散 和胃飲 七福飲
金匱地黃湯 鹹鹽湯 五物煎 決津煎
固胎飲 赤金丸
單方
鍼灸
醫案

方二

木香丸 準證下同

治婦人有孕傷食

木香二錢 三稜 人參 白茯苓各三錢

右爲細末麪糊丸如菜豆大熟水吞三四十丸

白术散

治妊娠氣不調和飲食易傷

白术炒 紫蘇各一兩 人參 白芷各七錢半
川芎 訶子皮 青皮各半兩 甘草二錢半

右爲末每服二錢水一盞薑三片煎至七分溫服

鄭氏勝金散

治妊婦因食傷胎傳於脾胃氣虛冷逼小腹腰痛或腰重大便祕

吳茱萸酒浸 陳皮 乾薑炮 生薑切焙
川芎各一錢半 炙甘草 厚朴薑製各三錢

右爲細末每服三錢陳米飲下入鹽煎尤妙濟生

方加砂仁

生犀角散

治妊娠卒中風不語四肢強直心神昏憒

生犀角屑 麻黃去節各一兩 防風 赤箭
羌活 當歸 人參 葛根 赤芍藥各七錢半
甘草炙 秦艽各半兩 石膏一兩半

右㕮咀每服八錢煎服法如前

白殭蠶散

治妊娠中風口噤心膈痰涎壅滯言語不得四肢強直

白殭蠶炒 天麻 獨活各一兩 龍腦二錢半
麻黃去節一兩半 犀角屑七錢半 白附子炮
半夏湯洗七次薑製 天南星炮 藿香各半兩

右爲細末入研藥令勻每服一錢生薑薄荷湯調下不拘時日三服

赤箭丸

治妊娠中風手足不隨筋脈緩急言語謇澁皮膚不仁

赤箭 草薢酒浸 麻黃去節 獨活 鼠黏子
熟地黃 羚羊角屑各一兩 當歸炒 阿膠炒
防風 芎藭 丹參 蔥白仁 五加皮 秦艽
漢防己 柏子仁 酸棗仁炒各七錢半

右爲細末煉蜜和搗三五百下丸如梧子大每服三十九豆淋酒送下食前

白术酒

治妊娠中風口噤語言不得

白术一兩半 獨活一兩 黑豆一合炒

右細剉以酒三升煎取一升半去滓溫分四服口噤者拗口灌之得汗卽愈

羚羊角散

治妊娠冒悶角弓反張名曰子癇風痙

羚羊角鎊 獨活 酸棗仁炒 五加皮 防風
蔥白仁炒 當歸酒浸 川芎 杏仁去皮尖
茯苓各五分 木香 甘草炙各二分

右㕮咀水煎服

羌活酒

治妊娠中風痙口噤四肢強直角弓反張

羌活一兩半　防風一兩　黑豆一合炒去皮

右三味爲㕮咀好酒五升浸一宿每服用黑豆一合炒令熟投入藥酒一大盞候沸卽住去滓分二服灌之

大聖散

治妊娠怔悸睡裏多驚腹脅膨脹坐臥不寧

白茯苓　麥門冬　黃芪蜜炙　當歸酒浸

川芎各一錢半　木香　人參　甘草炙各一錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾服無時

麥門冬湯

治妊娠心驚膽怯煩悶名曰子煩

麥門冬　白茯苓　防風各三錢　人參一錢半

右作一服水二鍾生薑五片淡竹葉十葉煎至一鍾去滓不拘時服

麥門冬散

治妊娠心煩憒悶虛躁吐逆惡聞食氣頭眩四肢沉重百節疼痛坐臥少起

麥門冬　子芩　赤茯苓各一兩　生地七錢半

人參　茯神　赤芍藥　陳皮　苦梗　桑寄生

甘草　旋覆花各半兩

右爲粗末每服四錢水一盞薑一錢煎至七分不拘時溫服

人參散

治妊娠熱氣乘於心脾津液枯少煩躁壅熱乾渴

人參　麥門冬　赤茯苓　地骨皮　家乾葛

黃芩　犀角屑各七錢半　甘草半兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服

一母丸

治妊娠因服藥致胎氣不安有似虛煩不得臥卽巢氏所謂子煩也

知母二兩

右爲細末以棗肉爲丸如彈子大每服一丸煎入參湯送下

人參黃芪散

治妊娠身熱煩躁口乾食少

人參　黃芪　家葛根　麥門冬　赤茯苓

秦艽各一兩　知母七錢半　甘草半兩

右每服四錢薑水竹葉煎服

馬兜鈴散

治妊娠胎氣壅滯欬嗽喘急

馬兜鈴　桔梗　人參　甘草　貝母各半兩

陳皮去白　大腹皮　桑白皮　紫蘇各一兩

五味子二錢半

右㕮咀每服四錢薑三片水煎

紫菀湯

治妊娠欬嗽不止胎不安

桔梗半兩　甘草　杏仁　桑白皮各二錢半

天門冬　紫菀各一兩

右㕮咀每服三錢竹茹一團水煎去滓入蜜半匙再煎一二沸溫服

平安散

治妊娠上氣喘急大便不通嘔吐不食腹脅脹痛

川芎　木香各一錢半　陳皮　熟地黃　生薑

乾薑炮　厚朴去粗皮製　甘草各一錢

右作一服水二鍾入燒鹽一捻煎至一鍾不拘時服

柴胡飲

治妊娠瘧疾

柴胡　生大黃各二錢　生黃芩一錢五分

甘草一錢

右㕮咀作一服水煎臨發日五更溫服必取利爲愈忌油麪辛熱等物

如胎上逼心可服枳殼散

加味理中湯

治虛寒泄瀉

人參　白朮　白芍藥　白茯苓　乾薑　黃連

茱香葉　木香　訶子肉　肉果　甘草各一錢

水二鍾生薑三片大棗二枚煎一鍾餞時服

豬苓散

療妊娠小便澀痛兼治胎水

豬苓五兩去皮

右爲末白湯調方寸匕加至二匕日三夜二不瘥宜轉下之服前藥

葵子湯

治妊娠得病六七日以上身熱入臟大小便不利安胎除熱

葵子二升　滑石四兩碎

右以水五升煑取一升去滓盡服須臾當下便愈

又方

治妊娠大小便不通心腹脹滿妨悶不欲飲食手足煩熱

檳榔　赤茯苓　大腹皮　木通　郁李仁去皮　北五味各一兩　桑寄生　甘草　苦梗各半兩

右爲粗末每服三錢水一盞煎至六分溫服

大腹皮湯

治妊娠大小便不通或赤澀

枳殼　大腹皮　赤茯苓各一兩　甘草二錢

右爲末葱白湯調下二錢

丹溪方

治懷胎四箇月大小便閉因與通利冬葵子等藥已通但氣未順此由性急血耗氣亂須和其氣滋其血乃安

陳皮　青皮　芍藥各一錢　人參　當歸　川芎　生地黃　白朮半兩　茯苓　木通　甘草各二分

右水煎服

獨聖散

治妊娠小便不通

葵荊子

右爲末每服二錢食前濃煎葱白湯調下

獨聖湯

治婦人產後腹痛

當歸三錢

右爲末水煎服

地膚大黃湯 外臺

療妊娠子淋宜下

川大黃　地膚草各二兩　知母　黃芩　猪苓　赤芍藥　通草　川升麻　枳實　甘草各二兩

右㕮咀每服四錢水一盞煎七分去滓溫服

又方 準聖 下同

療妊娠患淋小便澀不利小腹水道熱痛

冬葵子一升　芍藥二兩　黃芩　赤茯苓　車前子各二兩

右㕮咀以水七升煎至二升溫分三服

又方

療妊娠數月小便淋瀝疼痛心煩悶亂不思飲食

瞿麥穗　赤茯苓　桑皮　木通　葵子各一兩　黃芩　芍藥　枳殼　車前子各半兩

右爲粗末每服四錢水一盞煎至六分溫服

安榮散

治妊娠小便澀少遂成淋瀝

麥門冬　通草　滑石　人參　細莘各二錢　當歸酒浸　燈心　甘草各半兩

右爲細末每服二錢不拘時麥門冬煎湯調服

桑螵蛸散

治妊娠小便不禁

桑螵蛸二十枚酒炙黃

右爲細末每服二錢空心米飲調下或薑湯調下亦可

續斷湯

治妊娠下血及尿血

當歸　生地各一兩　續斷半兩　赤芍藥二錢半

右爲末空心葱白煎湯調下二錢

甘草小麥大棗湯 金匱

治婦人臟燥喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸

甘草三兩　小麥一升　大棗十枚

右三味以水六升煮取三升溫分三服亦補脾氣一方云產前產後皆可

淡竹茹湯 準聖

治妊娠心虛驚悸臟燥悲傷不止又治虛煩甚效

麥門冬去心　小麥　半夏湯泡各二兩半　人參　白茯苓各一兩半　甘草一兩

右剉散每服四錢薑五片棗一枚淡竹茹一團如指大同煎溫服

芎藭補中湯 方廣生

治懷妊血氣虛弱不能衞養以致胎漏每四五月而墮名曰半產

芎藭　五味子　阿膠蛤粉炒　乾薑炮各一錢　黃芪炙　當歸酒浸　白芍藥　白朮各一錢半　杜仲炒去絲　人參　木香　甘草炙各五分

右水二鍾煎至一鍾不拘時服一方無木香　杜仲丸

一名杜續丸治妊娠三兩箇月胎動不安腰痛防其欲墮宜預服之

杜仲薑製炒去絲　續斷酒浸各二兩

右爲末棗肉杵丸梧子大每服七十丸米飲下

四製香附丸

治婦人數墮胎由氣不升降所以胎氣不固宜服此

香附杵去毛淨一斤分四分一分酒浸一分醋浸一

分童便浸一分鹽水浸各浸七日取出焙乾
右爲細末酢煮糊和丸梧子大每服七十丸空心溫酒下如肥人只依本方瘦人加澤蘭葉赤茯苓各二兩一方用香附子一斤艾葉四兩當歸一兩俱用酢煮

安胎白朮散
治妊娠宿有冷胎瘕不長或失於將理傷胎多墮此藥補榮衛養胎氣
白朮炒　川芎各一兩　吳茱萸湯泡半兩
甘草炙一兩半
右爲細末每服二錢食前溫酒調下忌生冷果實黃芪散
主妊娠胎不長安胎和氣思食利四肢
黃芪　白朮　陳皮　麥門冬　白茯苓　前胡
人參各七錢半　川芎　甘草各半兩
右㕮咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎至七分去滓溫服

人參丸
妊娠胎不長宜服此養胎
人參　白茯苓　當歸　柴胡　刺蒴　厚朴
桑寄生各一兩　枳殼七錢半　甘草半兩
右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服二十丸食前溫水吞下

枳實檳榔丸
安胎養氣調和經候癥瘕痞塊有似孕婦可以久服血氣通和
枳實生用　檳榔　黃連　黃藥　黃芩　當歸　木香　阿膠炒灰研各半兩
右爲細末水和丸如小豆大每服三十丸不拘時用溫米湯送下

知母丸　出聖濟
治日月未足而痛如欲產者兼治產難及子煩
知母不拘多少
右爲細末煉蜜丸如雞頭大溫酒嚼下日三服一方丸如梧子大粥飲下二十丸或三五十丸

雄黃丸
治妊娠是鬼胎致腹中黑血散下腹痛
雄黃細研　鬼臼去毛　莽草　丹砂細研
巴豆去皮心油　鼈肝各半兩　蜥蜴一枚
蜈蚣一條並炙黃
右爲細末蜜丸如梧子大空心溫酒下二丸日兩服後當利如不利加至三丸初下清水次下蟲如馬尾狀無數病極者下蛇蟲或如蝦蟆卵雞子或如白膏或如豆汁其病即除

復元湯　出聖濟
治妊婦嘔吐不止或頭痛全不思食左脉弱
當歸　川芎　白芍　人參　甘草炙各五錢
白朮　茯苓　陳皮各一兩半　丁香三錢
半夏薑湯泡一兩　桔梗　枳殼各二錢
右㕮咀作十劑薑棗煎服

紫蘇和氣飲
治胎氣攻心或臨產驚恐氣結不下及胎前一切諸疾
蘇梗　當歸　川芎　白芍　人參　陳皮　甘草　大腹皮
右剉生薑一二片葱白七根水煎服
若腹痛加香附木香
若欬嗽加枳殼桑白皮
若熱甚加黃芩
若嘔吐加砂仁
若泄瀉加白朮茯苓
若難產加枳殼香附車前子
一方無川芎名七寶散

子淋散
治妊娠小便澀痛頻數
麥門冬去心　大腹皮洗去沙薑汁拌炒　木通
赤茯苓　甘草　淡竹葉各味分兩隨宜
右剉水煎服

白朮散
定痛安胎
川芎　紫蘇葉　香附便製各一錢　甘草四分
歸身　白芍酒炒　前胡　烏藥　陳皮各八分
白朮土炒　竹茹　木香各五分
右剉水煎食遠服如兼腹痛加砂仁澤瀉

加減當歸散
治妊娠中惡
川芎　當歸　陳皮　吳茱萸　木香　香附
烏藥　甘草　前胡　葱白　砂仁　紫蘇葉
右剉一劑生薑五片煎服

加減通氣散
治妊娠腰腹背痛

當歸身　葱白　阿膠　茴香　杜仲　甘草
破故紙　陳皮　山藥　川芎　萆薢　獨活
川續斷　香附　橘核　白芍各味分兩隨宜
右剉水煎空心服如小腹痛加艾木香烏藥紫蘇
去橘核山藥茴香續斷萆薢獨活破故紙
加減倉公下氣湯
治妊娠心腹脹滿
白芍藥　陳皮　白茯苓　大腹皮　川芎
當歸　香附　前胡　厚朴　紫蘇梗　烏藥
木香各味分兩隨宜
右剉一劑空心服
加減安胎飲
治妊娠數墮胎
黃芪　甘草　人參　白朮　艾葉　當歸
川芎　熟地　續斷　茯苓　白芍　香附
陳皮　杜仲
右剉水煎空心服
加減牛膝湯
治妊娠羸弱不能養胎者用此下之
桂心　苦蔞　牛膝　瞿麥　川芎　歸稍
枳殼　甘草　童便　麥蘖各味分兩隨宜
右煎服
加減紫菀湯
止嗽安胎
黃芩　紫蘇　陳皮　五味　知母　杏仁
赤茯　當歸　麻黃　白朮　桑皮　甘草
貝母　前胡　紫菀

水煎服如喘加兜鈴腹皮荻冬花
加減柴胡湯
治妊娠傷寒
柴胡　黃芩　乾葛　川芎　當歸　紫蘇
陳皮　葱白
水煎服
加減秦艽散
治妊娠時疫
秦艽　前胡　黃芩　枳殼　桔梗　山梔
柴胡　葛根　紫蘇　葱白　陳皮
水煎服
加減梔子五物湯
安胎清熱
葛根　柴胡　香薷　石膏　梔子　前胡
黃芩　葱白　麥冬　陳皮　知母　甘草
水煎服
加減白朮散
治妊娠霍亂
香薷　陳皮　厚朴　蒼朮　烏藥　藿香
砂仁　乾薑　竹茹　木瓜　人參　白朮
茯苓　甘草　猪苓　澤瀉
水煎服如心胷煩悶加炒黃連升麻
斬鬼丹
治鬼胎
吳茱萸　川烏　秦艽　柴胡　白殭蠶
水煎服
泰山磐石散景岳全書

治婦人血氣兩虛或肥而不實或瘦而血熱或脾
肝素虛倦怠少食屢有墮胎之患
人參　黃芪　當歸　續斷　黃芩各一錢
川芎　白芍藥　熟地各八分　白朮二錢
炙甘草　砂仁各五分　糯米一撮
水一鍾半煎七分食遠服但覺有孕三五日常用
一服四月之後方無慮也
二陳湯薛氏
治中脘停痰妊娠惡阻等證
陳皮去白　茯苓　半夏各一錢　甘草炙五錢
右水煎服
半夏茯苓湯
治妊娠脾胃虛弱飲食不化嘔吐不止
半夏泡炒黃　陳皮去白　縮砂仁炒各一錢
白茯苓二錢　甘草炙五分
右用薑棗烏梅水煎服
人參養胃湯
治外感風寒內傷飲食寒熱頭疼或作瘧疾并妊
娠惡阻
半夏　厚朴製　橘紅各八分　藿香葉　草果
茯苓　人參各五分　甘草炙三分　蒼朮一錢
右薑七片烏梅一箇水煎服
歸脾湯
治妊娠鬱結傷脾亦治發熱盜汗健忘怔忡驚悸
少寐
人參　白朮　白茯　黃芪炒　當歸　龍眼肉
遠志　酸棗仁炒各一錢　木香　炙甘草各五分

右薑棗水煎服本方加柴胡山梔名加味歸脾湯

加味小柴胡湯

治妊娠怒動肝火

柴胡二錢　黃芩一錢五分　人參一錢二分

半夏一錢　甘草炙五分　生地黃多少隨宜

右薑棗水煎服一方加山梔牡丹皮名柴胡山梔散

四七湯

治妊娠鬱結成痰

半夏薑汁製一錢五分　紫蘇葉　厚朴薑製　茯苓各一錢

右薑棗水煎

逍遙散

治肝脾血虛有熱少食多臥

甘草炙　當歸炒　芍藥酒炒　茯苓　柴胡　白朮炒各一錢

右水煎服

安胎飲

治妊娠五七箇月用數服可保全產

白朮　人參　當歸　川芎　熟地　白芍　陳皮　甘草　紫蘇　炙黃芩各一錢

右用薑水煎服

胡連丸

安胎聖藥

條芩沉水者四兩　砂仁微炒　甘草炙各一兩

白朮無油者　蓮肉去心各二兩

右共爲末外用山藥五兩作糊爲丸米飲下

天門冬飲正傳

治子嗽

天門冬　紫菀茸　知母　桑白皮各一錢半

五味子　桔梗各一錢

右剉作一貼水煎服

雞黃散本事方下同

治子痫赤白絞刺疼痛

烏鷄卵一箇傾出清留黃　黃丹一錢

右入鷄子殼內攪勻厚紙糊口鹽泥固濟火煅研爲末每取一錢米飲調下一服愈者是男二服愈者是女

鴨子煎

治胎前產後赤白痢

生薑年少者百錢年老者二百錢搗取自然汁

鴨子一箇打破入薑汁內攪勻

右同煎至八分入蒲黃二錢再煎五七沸空心溫服立效

訶朮散正傳下同

治妊娠泄瀉由食生冷當風取凉所致

訶子皮　白朮各一錢半　陳皮　良薑　木香

白芍藥酒炒　肉豆蔻煨　甘草炙各一錢

右剉作一貼薑五片水煎服

醒脾飲子

治子癇寒癇

厚朴　草豆蔻研各五錢　乾薑二分　甘草二分

右剉作一貼入薑五片棗二枚同煎空心服

濟生石膏湯丹溪

治妊娠熱癇湯飲無度

石膏二錢　生地黃一錢　半夏　黃芩　人參　麥門冬　知母　乾葛各一錢　甘草五分

右剉作一貼入烏梅一箇同煎服

梔子大青湯續日

治妊婦熱病發狂變黑

黃芩　升麻　梔子各一錢　大青　杏仁各五分

右剉作一貼葱白三莖同煎服

神方驗胎散海藏方

驗胎如神

眞雀腦川芎一兩　當歸全用重一兩者只用七錢

右二味細末分作二服濃煎好艾湯一盞調下二三時間覺腹臍微動仍頻即有胎也動罷即愈如不是胎即不動如不覺效再煎紅花湯調下必有神效

艾醋湯胥鑑下同

驗胎有無如見

好醋　艾葉

右二味煮汁服半盞腹中大痛是孕不痛無孕

參橘散

一名人參橘皮湯治惡阻病嘔吐痰水口不入食

橘皮　赤茯苓各一錢半　麥門冬　白朮

厚朴　人參　甘草各一錢

右剉作一貼入薑十片青竹茹鷄子大同煎服一方用白茯苓橘紅無赤茯橘皮

保生湯良方下同

治婦人月經不行身無病似病精神如故惡聞食

氣或但嗜一物或大吐或時吐清水此名惡阻宜服此

白朮　香附子　烏藥　橘紅各二錢　人參　甘草各一錢

右剉作一貼薑三片煎服

半夏茯苓湯

治惡阻病嘔吐心煩頭目眩運惡聞食氣飲食不進多臥少起百節煩疼羸瘦痰盛

半夏一錢半　赤茯苓　熟地各一錢　旋覆花　人參　白芍　川芎　桔梗　橘紅　甘草各七分

右剉作一貼入薑七片水煎服

茯連半夏湯（寶鑑）

治惡阻病一身煩痛

黃芩一錢二分半　白朮　半夏各一錢　黃連　陳皮　當歸　梔子　枳殼　香附　人參　蒼朮　砂仁　甘草各五分　赤茯苓七分半

右剉作一貼入薑七片水煎服

歸元散（醫鑑）

一名保元湯治惡阻口不入食

白朮　白茯苓　陳皮各一錢半　人參　砂仁　當歸　白芍　丁香　甘草各五分　半夏一錢　桔梗　枳殼各二分半

右剉作一貼入薑五片棗二枚水煎服

竹茹湯（丹溪）

治惡阻

青竹茹　麥冬各二錢　前胡二錢　橘皮一錢　蘆根十條

右剉作一貼水煎服

膠艾四物湯（胎產）

治胎漏腹痛

熟地黃　當歸　川芎　白芍藥　阿膠炒珠　條芩　白朮　砂仁　艾葉　香附炒各一錢

右剉作一貼入糯米一撮水煎空心服

當歸寄生湯（得效方）

治胎漏下血

人參　桑寄生　熟地黃　續斷各一錢半　當歸　川芎　白朮　艾葉各七分半

右剉作一貼水煎服

地膚子湯（正傳下同）

治子淋

地膚子　車前子各一錢半　知母　白芍藥　赤茯苓　黃芩　枳殼各一錢　升麻　通草　甘草各七分

右剉作一貼水煎服

忘憂散

治子淋

琥珀爲末

右每半錢取萱草根一握煎湯調下

溫胃飲（第五卷書下同）

治婦人臟寒惡嘔胎氣不安亦治產後脾氣虛寒嘔吐食少腹痛

人參　白朮炒各一二錢或二兩　扁豆炒二錢　陳皮（或不用）　炙甘草各一錢　當歸一二錢（消瘀勿用）　乾薑炒焦一二三錢

水二鍾煎七分食遠溫服

理陰煎

治同上亦治產後陽虛中寒或外感寒邪以致心腹痛嘔吐賊逆

熟地三五七錢或一二兩　炙甘草二錢　當歸二三錢或五七錢　乾薑二三錢炒黃色

水二鍾煎七分熱服或加肉桂一二錢

保陰煎

治胎氣熱而不安亦治產後血熱淋瀝不止

生地　熟地　芍藥各二錢　山藥　川續斷　黃芩　黃藥　生甘草各一錢

水二鍾煎七分食遠溫服

涼胎飲

治同上

生地　芍藥各二錢　黃芩　當歸各一二錢　白朮七分生　枳殼　石斛各一錢　茯苓錢半

水一鍾半煎七分食遠溫服如熱甚者加黃藥一二錢

枳殼湯

治胎漏或因事下血亦治惡阻進食和中及熱而血虛胎動不安

枳殼炒　黃芩炙各半兩　白朮炒一兩

右爲末每服一錢白湯調下亦可

胎元飲

治婦人衝任失守胎元不安不固者隨證加減用之或間日或三日服一二劑

人參隨宜　當歸　杜仲　白芍藥各二錢

熟地二三錢　白朮一錢半　炙甘草一錢
陳皮七分（無滯者不用）
水二鍾煎七分食遠服

壽脾煎

一名攝營煎治妊娠心脾氣虛胎動不安
白朮二三錢　當歸　山藥各二錢　棗仁錢半
炙甘草一錢　遠志製三五分　乾薑炮一二錢
蓮肉去心炒二十粒　人參一二錢急者用一兩
水二鍾煎服

左歸飲

治肝腎不足胎動不安
熟地二三錢或一二兩　山藥　枸杞各二錢
炙甘草一錢　茯苓一錢半　山萸一二錢（喘急者少用）
水二鍾煎七分食遠服

右歸飲

治同上亦治產婦虛火不歸元而發熱者
熟地用如前　枸杞　杜仲薑製各二錢　肉桂
甘草炙各一二錢　製附子一二三錢　山藥一錢
水二鍾煎七分食遠溫服

固陰煎

治同上亦治產後勞役受傷惡露不止
人參隨宜　熟地三五錢　山茱萸一錢半
遠志炒七分　山藥炒二錢　甘草炙一二錢
五味子十四粒　菟絲子炒香二三錢
水二鍾煎七分食遠溫服

五福飲

治氣血俱虛胎動不安
人參　熟地各隨宜　當歸二三錢　炙草一錢
白朮炒一錢半
右水二鍾煎七分食遠溫服

祕元煎

治脾腎氣虛胎動不安兼帶濁亦治衝任氣虛而胎漏者
人參　金櫻子各一二錢　五味子十四粒
甘草炙一錢　遠志炒八分　山藥炒　芡實炒
棗仁炒搗碎各二錢　白朮炒　茯苓各錢半
水二鍾煎七分食遠服

菟絲煎

治同上
人參二三錢　山藥炒二錢　菟絲子炒四五錢
當歸　棗仁炒　茯苓各錢半　遠志肉製四分
炙甘草一錢或五分　鹿角霜爲末四五匙
右用水一鍾半煎成加鹿角霜末調勻食前服

小和中飲

治妊娠食滯脹滿
白扁豆炒　山楂肉各二錢　白茯苓　陳皮
厚朴各一錢五分　甘草五分
水一鍾半加生薑三五片煎服

解肝煎

治妊娠肝氣滯逆脹滿不安
陳皮　半夏　厚朴　茯苓各錢半　砂仁七分
蘇葉　芍藥各一錢
水一鍾半加生薑三五片煎服

化肝煎

治妊娠怒動肝氣兼火胎氣不安
青皮　陳皮　芍藥各二錢　梔子炒　丹皮
澤瀉各錢半　土貝母二三錢
水一鍾半煎七八分食遠溫服如血見下部者以甘草代澤瀉

紫蘇飲

治妊娠失調胎氣不安上攻作痛名曰子懸或臨產氣結不下等證
人參　甘草各半兩　大腹皮　川芎　白芍
陳皮　蘇葉　當歸各一兩
右每服一兩薑葱水煎服一方有香附無人參一方無川芎名七寶散若肝脾氣血虛而有火不安者宜兼逍遙散若脾氣虛弱而不安者宜用四君芎歸湯

五味異功散

治妊娠脾胃氣虛而惡阻者
人參　白朮炒　茯苓　炙甘草　陳皮各一錢
右加薑棗水煎服

六味異功散

治妊娠胃虛兼寒多嘔
人參二錢　白朮　茯苓各一錢　陳皮
炙甘草各一錢　乾薑炒一二錢
水一鍾半煎服

和胃飲

治妊娠胃寒氣實胎氣上逼者
陳皮　厚朴薑製各一錢半　乾薑炮一錢
五甘草一錢

水鍾半煎七分溫服

五君子煎

治妊娠脾虛兼寒胎氣上逼

人參隨宜　白朮　茯苓各二錢　炙甘草一錢

乾薑炒黃一二錢

水一鍾半煎服

清化飲

治婦人產後因火發熱及血熱妄行陰虧者火不清等證亦治妊娠血熱血漏

芍藥　麥冬各二錢　丹皮　茯苓　黃芩　生地各二三錢　石斛一錢

水一鍾半煎七分食遠溫服

四聖散

治漏胎下血

條芩　白朮　砂仁　阿膠各等分

右爲細末每服二錢艾湯調下一方有芍藥無阿膠按此方若改爲湯砂仁當減半

五陰煎

治妊娠脾腎兼虛而漏血者亦治產後陰虛

熟地五七錢或一兩　山藥炒　芍藥炒各二錢　扁豆炒二三錢　茯苓一錢半　五味子二十粒　人參隨宜　白朮炒　炙甘草各一二錢

水二鍾加蓮肉去心二十粒煎服

七福飲

治妊娠胎漏三焦氣血俱虛

人參　熟地各隨宜　當歸二三錢　炙甘草　棗仁各一錢　白朮炒一錢半　遠志製三五分

水二鍾煎七分食遠溫服

益母地黃湯

治從高墜下傷胎下血

生地　益母草各二錢　當歸　黃芪炒各一錢

右藕水煎服

續斷湯

治妊娠血虛微熱漏血尿血

當歸　生地黃各一兩　續斷　赤芍藥各半兩

右爲末每服二錢空心用葱白煎湯調下

五物煎

治產難及胎氣已動勢有難留

當歸三五七錢　熟地三四錢　芍藥二錢酒炒　川芎一錢　肉桂一二三錢

水一鍾半煎服

決津煎

治同上

當歸三五錢或一兩　澤瀉一錢半　牛膝二錢　肉桂一二錢　烏藥一錢　熟地二三錢或五七錢

水二鍾煎七分食前服如氣血虛不必用烏藥

固胎煎

治肝脾多火多滯而屢墮胎者

黃芩二錢　白朮一二錢　陳皮一錢　當歸　芍藥　阿膠各錢半　砂仁五分

水一鍾半煎服

赤金豆

一名八仙丹治鬼胎

巴霜去皮膜略去油一錢半　皂角炒微焦二錢　生附子切略炒燥　硃砂各二錢　輕粉一錢　丁香　木香　天竺黃各三錢

右爲末酢浸蒸餅爲丸蘿蔔子大以前硃砂爲衣欲漸去者每服五七丸欲驟行者每服一二十丸用滾水或煎藥或薑酢茶蜜荊香史君煎湯爲引送下若下多不止可飲冷水一二口即止蓋此藥得熱則行得冷則止也

單方

安胎順氣香附子炒爲末濃煎紫蘇湯服一二錢或加砂仁（單）

妊婦胎動硃砂末一錢和雞子白三枚攪勻頓服胎死即出未死即安

胎氣不安氣不升降噁血酸水香附藿香甘草各一錢爲末每服二錢入鹽少許沸湯服之（聖惠）

胎動不安或腰痛胎轉搶心下血不止或日月未足而欲產並以菖蒲根搗汁一二升服之（千金下同）

妊娠胎動或腰痛或搶心或下血不止或倒產子死腹中艾葉一雞子大酒四升煮二升分二服（肘後方）

胎動迫心作痛艾葉雞子大以頭醋四升煎二升分溫服（子母秘錄）

妊娠疾病胎不能安可下之取七月七日法麴四兩水二大盞煎取一盞三分絞濾去滓分溫三服立下

又方用大麴五升清酒一斗煮二沸去查分五服隔宿勿食但再服即下如糜母無疾苦

胎痛欲產日月未足者以全蛇蛻一條絹袋盛遶腰

繫之千金下同

胎動不安腰痛或胎上搶心煩悶或下血葱白大者二十莖濃煑汁飲之胎未死即安已死即出神效

妊娠胎動豉絞汁溫服華佗方也本草

又方生麴餅研末水和絞汁溫服三升肘後方下同

妊婦胎動欲墮腹痛不可忍苧根二兩剉銀石器酒水相半煎服妙

又方乾荷蒂一枚炙研糯米泔一鍾調服即安經驗方

妊婦腹痛燒車缸脂末納酒中隨意飲千金下同

胎動腹痛或下黃汁如漆如豆汁者野苧根金銀花根各五錢水酒相半煎服入門下同

又方鹿角膠炒成珠作末以米飲調下二錢

又方用好銀煑取水著葱油食之佳

又方用苧根如足指大者一尺㕮咀以水五升煑取三升去查服或加生薑五片亦可丹溪云苧根大能補陰而行滯血

妊娠胎動晝夜叫呼口噤脅奉及下重痢不息用艾葉五兩以好酒五升同煑取四升去查更煎取一升口閉者開口灌之藥下即瘥

妊娠無故下血不止阿膠三兩炙搗末酒一升半煎令消一服愈

又方阿膠二兩搗末生地半斤搗取汁以清酒二升絞汁分三服

閃顛胎動欲漏砂仁皮炒令熱透爲末一錢或酒或鹽湯下

胎漏下血不止用桃樹上乾不落桃子燒灰和水服瘥本草云桃奴破血又治伏梁積氣

妊娠心痛用青竹茹一升酒二升煑取一升去渣分溫頓服

又方用破雞子一枚酒調服之

妊娠胎動欲落腹中痛不可忍用上等銀一斤茅根二兩去黑皮以水九升煑銀五升入清酒一升同煎茅根取三升分三服立安

妊娠腰背痛反覆不得用鹿角長六寸燒令赤酒中淬再燒再淬以角碎爲度取所淬酒飲之

孕婦腹內鐘鳴用鼠窟前後土爲細末研麝香酒調下二錢立愈或不用酒亦可

妊娠中惡心腹絞急切痛如鬼擊之狀不可按摩或吐血或衄血者用熟艾如拳大煑汁頻服

又方用鹽一盞水二鍾調和以冷水噀之吐出即安

又方用竈心土爲末每二錢井水調服白湯調亦可

又方用男子貼體久染汗衣燒灰存性百沸湯調服

妊娠鼻衄用白茅花濃煎汁服

妊娠卒不得小便用杏仁一味去皮尖搗丸如菉豆大燈心湯吞七丸立利

子淋小便數出少或熱疼及子煩用地膚子三兩細切水四升煑取二升半去滓分三服日三次食盡

妊娠遺尿用益智仁爲末米飲下亦效

妊娠臟燥自悲自哭自笑用紅棗燒存性米飲調下

妊娠下血不止疼痛用家雞翎燒灰細研溫酒調下二錢如人行五里再服以效爲度亦治小便不禁

又方用香附子爲末米飲調下

婦人懷胎不長用鯉魚長一尺者去腸肚鱗以水浸沒內鹽及棗煑熟取汁稍稍飲之

妊娠月數未足腹痛如欲產用梁上塵竈突煤同爲末空心溫酒服方寸匕

臨產下痢梔子燒研空心熱酒服一匙甚者不過五服勝金方

妊娠溺澀蕪菁子末水服方寸匕日二服

病欲去胎雞子一枚入鹽三四撮服仲景

妊娠子淋不得小便滑石末水和貼臍下二寸斗參

孕婦熱淋車前子五兩葵根切一升以水五升煎取一升半分三服以利爲度梅師方

子痢昏冒縮砂和皮炒黑熱酒調下二錢不飲酒者米飲下安胎止痛其效不可盡述

孕婦欬嗽貝母去心麩炒黃爲末沙糖和丸芡子大每含嚥二十丸神效

跌撲舉重損胎不安腹中疼痛腰重或子死腹中不出者芎藭爲末酒服方寸匕須臾一二服立愈千金

六七月後孕動困篤難救者葱白一大握水三升煎一升去查頓服本草下同

胎動不安墮在須臾者用川芎二兩葱白五兩水三椀煑二椀半分三服

胎損腹痛冬麻子一升杵熬香水二升煑汁分服心鏡

漏胎下血蓮房燒研麪糊丸梧子大每服百丸湯酒任下日二集驗方

子死腹中月數未足母欲昏絕者用大黑豆三升以酢煑濃汁頓服立出本草

妊娠吐衄不止馬錢末濃米飲服半錢聖惠

桑寄生能安胎令胎牢固或煎服或爲末服並佳本草

胎動不安木賊去節川芎等分爲末每服三錢水一

琖入金銀一錢煎服（總錄）

姙娠尿血豆醬一大盞熬乾生地黃二兩爲末每服一錢米飲下（普濟方）

胎動下血或胎已死百草霜二錢椶灰一錢伏龍肝五錢爲末每服一二錢白湯入酒及童尿調下（雞興方）

頻慣墮胎或三四月即墮者於兩月前以杜仲八兩糯米煎湯浸透炒去絲續斷二兩酒浸焙乾爲末以山藥五六兩爲末作糊丸梧子大每服五十丸空心米飲下（本草）

又方用杜仲焙研棗肉爲丸糯米飲下（簡便方）

姙娠風寒卒中不省人事狀如中風用熟艾三兩米酢炒極熱以絹包熨臍下良久即甦（婦人良方）

姙娠浮腫羌活蘿蔔子同炒香只取羌活爲末每服三錢溫酒調下一日一服二日二服三日三服（本事方）

孕婦漏胎五倍子末酒服二錢神效（集驗方）

妊婦尿血取夫爪甲燒灰酒服（千金）

婦人血崩鯽魚一箇長五寸者去腸入血竭乳香在內綿包燒存性研末每服二錢熱酒調下（摘元方）

婦人胎動姙娠因夫所動困絕以竹瀝飲一升立愈

頻頻飲之大治子煩（產寶）

妊娠漏胎下血不止用生地黃汁一升漬酒四合煑三合五沸服之不止又服亦治子煩（外臺下同）

又方用生地黃爲末酒服方寸匕日一夜一或加乾薑亦妙

又方用生地熟地等分爲末每服半兩白朮枳殼煎湯空心調下日二服

又方用雞子黃十四枚以好酒二升煑如餳服之未瘥再作以瘥爲度（普濟方）

又方鹿角屑當歸各半兩水三盞煎減半頓服不過二服

姙娠腰痛鹿角截五寸長燒赤投一升酒中又燒又浸如此數次細研空心酒服方寸匕（產寶）

孕婦子上衝心取蒲萄或根亦可濃煑汁飲之即下而其胎亦安（本草）

姙娠尿血阿膠炒黃爲末食前粥飲下二錢（[illegible]）

姙娠血痢阿膠二兩酒一升半煑一升頓服（[illegible]）

妊娠胎動用阿膠炒熟艾葉各二兩葱白一升水四升煑一升分服

妊娠下血黃明膠二兩酒煑化頓服之（[illegible]）

妊娠下痢中衣帶三寸燒研水服（千金）

妊娠去胎麥糵一升蜜一升服之即下

轉胞尿閉用葱白細切和鹽炒熱熨臍下立通（入門）

轉胞尿閉脹急令產婆香油塗手自產門入扎起其胞則尿出如注脹急即解（[illegible]）

又方將孕婦倒豎起則尿自出亦妙

姙娠心腹絞痛大紅棗十四枚燒焦爲末以小便服之（梅師方）

姙娠吐酸水心腹痛不能飲食人參乾薑炮等分爲末以生地黃汁和丸梧子大每服五十丸米飲下（方）

婦人虛羸有鬼胎癥瘕經候不通芫花根三兩剉炒黃爲末每服一錢桃仁煎湯調下當利惡物而愈（[illegible]）

孕癰用洪州烏藥輭白香幹者五錢水一盞牛皮膠一片同煎至七分溫服（[illegible]）

又方薏苡仁煑汁飲之

腹中兒哭黃連煎濃汁母常呷之（[illegible]）

因驚胎動出血取黃連末酒服方寸匕日三服（[illegible]）

姙娠子煩口乾不得臥黃連末每服一錢粥飲下或酒蒸黃連丸亦妙（本草）

病篤去胎蟲蟲十枚炙搗爲末酒服胎即下（[illegible]）

溫養胎氣胎至九月用豬肚一枚如常著五味煑食至盡（[illegible]）

轉女爲男取弓弩弦一枚絳囊盛帶婦人左臂

又方取雄黃一兩絳囊盛帶之要女者帶雌黃

又方以斧一柄於產婦臥牀下置之仍繫刃向下勿令人知

又方婦人始覺有孕用原蠶屎一錢井華水服之日三（本草）

鍼灸

金匱要略曰婦人傷胎懷身腹滿不得小便從腰以下重如有水氣狀懷身七月太陰當養不養此心氣實當刺瀉勞宮及關元二穴小便微利則愈

甲乙經曰乳子下赤白帶腰俞主之

婦人乳餘疾肓門主之

千金方曰姙娠二月胎欲墮灸膝下一寸七壯

姙娠一月足厥陰脉養二月足少陽脉養三月手心主脉養四月手少陽脉養五月足太陰脉養六月足

陽明脈養七月手太陰脈養八月手陽明脈養九月足少陰脈養凡逐月養胎之脈當其時俱不可針灸醫學入門曰孕婦不宜針合谷三陰交

婦人將產預先胎破惡水長流坐草早無血可養枯竭刺獨陰五分在足小指第三節間承陰一寸五分丹溪心法曰婦孕寒熱往來欬嗽血痰或嘔吐不食無力或喘滿乳介相應痛或口中唾如霜雪出語無聲或耳鳴或痰涎日夜數椀誤用熱藥之故也刺風門魄戶各五分支溝間使各透如其熱未解有飾癒癒昏憒再取絕骨五分太谿三分如脈氣未平瀉太淵太白各二分熱府分數已上穴實瀉虛補治產前病立效此病妊後半年必有一變四肢消瘦單腹腫脹即取陰交一穴去其惡物也

附案

儒門事親曰戴人過東杷一婦人病大便燥結小便淋瀝半生不娠惟常服疎導之藥則大便通利暫癒藥則結滯忽得孕至四五月間醫者禁疎導之藥大便依常爲難臨閉則力努爲之胎墜凡如此胎墜者三又孕已經三四月弦墜前後漫嚼結瀝甘分胎胞乃訪戴人戴人診其兩手脈俱滑大以其且妊不敢陡攻遂以食療之用花蘸煮菠薐菜食之則胎前手前作婦雖羊血作羹食之半載居然生子

其婦燥病方愈

劉先生妻有娠半年因傷胎下血乞藥於戴人戴人診之以三和湯一名主燭散承氣湯四物湯對停加砂硝煎之下數行痛如手拈下血亦止

一婦人年四十餘得孕自以爲年衰多病故復作以告醫氏醫者不察加燔針於臍兩旁又以毒藥攻磨轉覺腹痛食減形羸已在牀枕來問戴人戴人診其脈曰六脈皆平惟右尺洪大有力此孕脈也宜擇食爲孕無疑左右皆笑之不數月生一女子兩目下各有燔針瘢痍壞其明凡治病婦當先問娠不可倉卒

鄯王之妻病臍下積塊嘔食面黃肌瘦而不月或謂之乾血氣治之無效戴人見之曰孕也其人不信再三求治於戴人與之平藥以應其意終不肯下毒藥後月到果胎也人問何以別之戴人曰尺脈洪大也

素問陰陽別論所謂陰搏陽別之脈

朱震亨心法曰一婦人孕三月吐痰水并飲食每日寅卯作作時覺少腹有氣衝上然後腸滿而吐面赤微腫頭眩臥不起牀四肢疼微渴此肝火挾衝脈之火衝上也一日甚一日輕脈和右寸脈洪大百藥不效者將二月偶用沉香磨水化抱龍丸一服腸寬氣不上衝二三服吐止痞減食進而安

應氏婦得胎七月嘈雜吐食胎壅心下滿塞氣攻背兩肘皆痛要人不住手以熱物摩熨得吐稍疎脈洪大用黃芩二錢半炒黃連一錢炒白术半夏各二錢炙甘草砂仁各五分陳皮當歸山梔炒枳殼香附人參荅术各一錢茯苓一錢半生薑七片服二貼後嘈雜吐止心滿寒退但於夜間背肘痛用摩熨遂與抱龍丸化服其疾如失

一婦人年近二十懷孕兩個月病嘔吐頭眩自覺不可禁持以人參白术川芎陳皮茯苓等藥服五七日愈覺沉重各子脈之兩手皆左爲甚而且弱子曰此是超胞病必怒氣所激問之果然肝氣既逆又挾胎氣蓐术之補大非所宜教以時用茯苓湯下抑青丸二十四粒五貼自覺稍安診其脈略有數狀曰二日乾苦稍食粥則口酸子意其爲腸間滯氣未盡行教仝以川芎陳皮山梔茯苓生薑煎湯下抑青丸二十五粒十餘貼餘證皆平但食及常時之半食後覺口酸不食覺易饑子謂肝熱未平則以白湯下抑青丸二十粒二十日而安子又脈之見其兩手脈雖和平而右手弱甚此胎必墜此時肝氣既平參术可用矣遂用始初參术等藥補之預防墜胎已後之虛服之一月胎自隕却得平穩無事抑青丸一味黃連爲丸是也

一婦人懷妊六月發癎手足拘直面紫黑色合眼涎出昏憒不省人事半時而醒醫與定癎丹五十餘貼其疾時作時止無減退至臨產方自愈產一女孩中子母皆安次年其夫疑月壻必作求治之診其脈浮取弦重取濇按至骨則沉實帶數時正二月因未見其癎發之狀不敢與藥意其舊年癎發時乃五月欲待其時度此疾必作當常調治至五月半其疾果作皆是已年兩時遂教以自製防風通聖散用生甘草加桃仁多紅花少或服或吐至四五劑疾漸疎而輕後參爲末而愈

朱宅婦人三十餘歲懷胎四箇月大小便閉因與通利冬葵子等藥已通但氣未順此由性急血耗氣亂用和氣滋血之藥乃安

一婦人四十一歲妊孕九箇月轉胞小便不出三日矣下急脚腫不堪存活來告急予往視之見其形瘁脉之右濇而左稍和此傷食而氣傷胎系弱不能自舉而下墜壓著膀胱偏在一邊氣急爲其所閉所以水竅不能出也轉胞之病大率如此予遂製一方補血養氣血氣既正胎系自舉則不下墜方有安之理遂用人參當歸身尾白芍藥白朮帶白陳皮炙甘草半夏生薑煎濃湯與四貼任其頻啜至次早又與四貼藥查作一貼煎令頓飲之探喉令吐出此藥湯小便立通皆黑水後就此方加大腹皮枳殼青葱葉縮砂仁二十貼與之以防產前後之虛果得就蓐平安產後亦健

一婦人妊娠七八箇月患小便不通百醫不能利轉加急脹診其脉細弱予意其血氣虛弱不能承載其胎故胎重墜下壓住膀胱下口因此溺不得出若服補藥升扶胎起則自下藥力未至愈加急滿遂令一老婦用香油塗手自產門入托起其胎溺出如注脹急頓解一面却以人參黃芪升麻大劑煮服或少有急滿仍用手托放取溺如此三日後胎漸起小便如故

一婦人有孕至三月必墮予教以濃煎白朮湯調黃芩末二錢服三四十貼遂得保全蓋孕至三月正屬相火所以易墮不然何以黃芩白朮爲安胎妙藥耶

一婦年三十餘或經住或成形未見其胎必墮察其性急多怒色黑氣實此相火太盛不能生氣化胎反食氣傷胎故也因令住經第二月用黃芩白朮當歸甘草服至三月盡止藥後生一子

明醫雜著曰吾妻嘗胎漏忽一日血大崩遂連去服童便而醒少頃復連急煎服荊芥隨醒隨連服止血止運之藥不效忽然嘔吐予以童便藥汁滿於胃脘也復以手探吐之少頃吐出米飯及蘆菜椀許詢問其故適方午飯後著惱故即崩而不止予悟曰因方飽食胃氣不行故崩甚血既大崩胃氣益虛而不能運化宜乎服藥無效也急宜調理脾胃遂用白朮五錢陳皮麥芽各二錢煎服之服未半而運止再服而崩止遂專理脾胃服十數劑胃氣始還然後加血藥服之而安若不審知食滯而專用血崩血運之藥豈不誤哉大凡醫者治諸病證須時常察其有無飲食傷積否但見其胃膈飽悶嘔吐噫氣嘛酸腹痛腸泄惡食少食便問曾何飲食審知傷積即便先調其脾胃消導飲食然後用本病藥治之或於本病藥內加入消導飲食藥若不審知此則用藥雖對證而不獲效蓋人以脾胃爲主胃氣自傷則不能運化藥味以成功也亦有飲食之後即藥或服藥之後即睡或有服藥太多謂之傷藥要須識此

薛己醫按曰一妊婦嘔吐惡食體倦嗜臥此胃氣虛而惡阻也用人參橘皮湯二劑漸愈又用六君加紫蘇一劑而安

一妊婦吞酸惡心時欲作嘔此因脾胃虛而飲食停滯用六君加枳殼香附治之而愈

一妊婦嘔吐脅脹或寒熱往來面色青黃此木旺而乘土脾土用六君子加柴胡桔梗枳殼而安

一妊婦嘔吐酸水胃滿不食此脾土虛而肝木所侮用六君子加芍藥而愈又用四君子加枳殼桔梗而安

一妊婦胃寒膨脹吐痰不食此脾胃虛而飲食爲痰用半夏茯苓湯漸愈又用六君子加枳殼蘇梗桔梗而飲食如常後因怒脅脹不食吐痰惡心用半夏茯苓湯加柴胡山梔而愈

一妊婦內熱脯熱或兼寒熱飲食少思其胎或下墜或上攻此肝經血虛而火動耳先用加味逍遙散數劑次用六君子加柴胡枳殼各數劑而愈

一婦人胎及六月形體倦怠飲食少思勞役便血若動不安用六君生熟地升麻柴胡而愈

一妊婦下血服涼血之藥下血益甚食少體倦此脾氣虛而不能攝血余用補中益氣湯而愈後因怒而寒熱其血仍下此肝火旺而血沸騰用加味逍遙散血止用補中益氣湯而安

妊婦下血發熱作渴食少體倦屬脾氣虛而爲肝火所侮用四君子加柴胡山梔血止因怒復作用六君子加柴胡山梔升麻而安

一妊娠三月其經月來三五次但不多飲食精神如故此血盛有餘兒大能飲自不來矣果然

一妊娠六月每怒下血甚至寒熱頭痛脅脹腹疼作嘔少食余謂寒熱頭痛乃肝火上衝脅脹腹疼乃肝氣不行作嘔少食乃肝侮脾胃小便下血乃肝火血熱用小柴胡加芍藥炒黑山梔荻苓白朮而愈

一妊娠六月體倦食少勞役下血用六君子加當歸

熟地升麻柴胡而愈

一妊婦每因恚怒其胎上逼左關脉弦洪乃肝火內動用小柴胡加茯苓枳殼山梔而愈但體倦不食用六君子調養脾土加柴胡枳殼調和肝氣乃瘥

一妊婦胎上逼胷滿噯氣飲食少思此脾氣鬱滯用紫蘇飲頓安又用四君子加枳殼柴胡山梔而瘥

一妊婦因怒胷膈不利飲食少思服消導順氣之劑脾胃愈弱飲食愈少大便不實且無度久而便黃水或帶白視其面色黃中隱白余曰黃色脾虛也白色肺虛也朝以補中益氣湯升補胃氣夕以六君子培補脾氣而愈

一妊婦因怒寒熱往來內熱晡熱脅痛嘔吐胎至八月而不長此因肝脾鬱怒所致用六君子加柴胡山梔枳殼紫蘇桔梗病愈而胎亦長矣

鴻臚張淑人痢疾後胎動心神不安肢體殊倦用八珍散二十餘劑漸愈因勞加煩熱頭痛以大劑補中益氣湯加蔓荊子治之熱痛頓止仍用前散又五十餘劑而安其後生產甚易

一婦人每胎三四箇月作痛欲墮余以爲痛胎用當歸二錢熟地黃三錢而愈

一妊婦八月胎欲墜如產臥久少安日晡益甚此氣血虛弱朝用補中益氣湯加茯苓半夏隨愈更以八珍湯調理而安

一妊娠氣喘痰甚諸藥不效素有帶下始於目下浮腫兩月餘其面亦然此氣虛而有痰飲也用六味丸數劑而愈

一妊婦嗽則便自出此肺腎之氣不足不能司攝用補中益氣以培土金六味丸加五味以生腎氣愈

一妊婦小腹作痛其胎不安氣攻左右或時逆上小便不利用小柴胡湯加青皮山梔清肝火而愈後因怒小腹脹滿小便不利水道重墜胎仍不安此亦肝木熾盛所致用龍膽瀉肝湯一劑諸證頓愈乃以四君子加柴胡升麻以培脾土而安

一妊婦飲食停滯心腹脹滿或用人參養胃湯加青皮山梔枳殼其脹益甚其胎上攻惡心不食右關脉浮大按之則弦此脾土不足爲肝木所侮余用六君子加柴胡升麻而愈後小腹痞悶用補中益氣湯升舉脾氣乃瘥

一姙娠因怒吐血塊四日不止兩脅脹痛小便淋漓此怒而血畜於上隨火出也脅脹腹痛小便淋漓旺經本病也用小柴胡合四物四劑血止用六君子安胎飲調理而安

一姙婦胎六月體倦懶食面黃晡熱而胎不長因怒欲墜此脾氣不足也用八珍湯倍加參朮茯苓二[illegible]餘劑脾胃漸健而長矣

一姙婦四肢不能伸服祛風燥濕之劑遺尿痰甚[illegible]肢抽搐余謂肝火血燥用八珍湯加炒黑黃芩爲[illegible]佐以釣藤湯而安後因怒前證復作小便下血寒熱少寐飲食少思用釣藤散加山梔柴胡而血止用[illegible]味逍遙散寒熱退而得寐用六君子湯加芍藥釣藤飲食進而漸安

一婦人素勤苦月經不調或寒熱姙娠五月兩臂[illegible]拘急或緩縱此肝火傷血所致也用四物加柴胡山梔丹皮釣藤鉤治之而愈

一姙娠三月飲食後因怒患瘧連吐三次用藿香正氣散二劑隨用安胎飲一劑而愈後因怒痰甚狂言發熱胷脹手按少得此肝脾氣滯用加味逍遙散加川芎二劑頓退四劑而安

一姙婦霍亂已止但不進飲食口內味酸泛行消導寬中余曰此胃氣傷而虛熱也當用四君子湯彼不信乃用人參養胃湯嘔吐酸水其胎不安是藥復傷也仍與四君子湯俾煎熟令患者先嗅藥氣不作嘔則呷少許恐復嘔則胎爲釣動也如是旬餘而愈

邊太常側室姙娠泄瀉自用枳朮黃連之類腹悶吐痰發熱惡寒飲食到口即欲作嘔強匙許即吞酸不快欲用祛痰理氣之藥余曰此因脾胃傷而痰滯中脘若治痰氣復傷脾胃矣遂以參朮炮薑爲末丸如黍粒不時噙嚥三五丸漸加至三日後日進六君子湯而尋愈

進士王繳徵之內懷妊泄瀉惡食作嘔余曰脾氣傷也其君憂之強進米飲余謂飲亦能傷胃且不必強俟脾胃醒宿滯自化飲食自進不信別用人參養胃湯飲之吐水酸苦又欲投降火寒藥余曰若然則胃氣益傷也經云損其脾胃者調其飲食適其寒溫後不藥果愈

地官胡成甫之內妊娠久痢自用消導理氣之劑腹內重墜胎氣不安又用阿膠艾葉之類不應余曰腹重墜下元氣虛也胎動不安內熱盛也遂用補中益氣湯而安又用六君子湯全愈

主政王天成之內妊娠痢疾愈後二便不通其家世醫自用清熱之劑未效余診其脉浮大而濇此氣血

虛也朝用八珍湯加桃仁杏仁夕用加味逍遙散加車前子而瘥

司徒李杏岡仲子室孕五月小便不利諸藥不應余曰非八味丸不能救不信別用分利之藥肚腹腫脹以致不起

儒者王文遠室妊娠小便不利小腹腫脹幾至於殆用八味丸一服小便滴瀝再以前丸之料加車前子一劑即利肚腹腫脹頓消而安

一婦人每怒發熱脅脹小便淋瀝如遇經行旬餘未已受胎三月因怒前證復作朝用加味逍遙散夕用安胎飲各二劑而安五月又怒復下血如經行四日未止仍用前藥而愈

一妊婦遺尿內熱肝脈洪數按之微弱或兩太陽作痛脅肋作脹余以爲肝火血虛用加味逍遙散六味地黃丸尋愈後又寒熱或發熱或恚怒前證仍作用八珍散逍遙散兼服以清肝火養肝血而瘥

一妊婦因怒尿血內熱作渴寒熱往來胃乳間作脹飲食少思肝脈弦弱此肝經血虛而熱也用加味逍遙散六味地黃丸兼服漸愈又用八珍湯加柴胡丹皮山梔而瘥

一妊婦每胎至五月肢體倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍身後及頭面此是脾肺氣虛朝用補中益氣夕用六君子加蘇梗而愈凡治妊娠毋泥月數但見某經證即用本藥爲善

一妊婦因停食服枳朮丸胃脘不利飲食益少更服消導寬中之劑其胎下墜亨謂此脾氣虛而不能承載也用補中益氣及六君子湯中氣漸健其胎漸安又用八珍湯加柴胡升麻調理而瘥

一妊婦無故自悲用大棗湯二劑而愈後復患又用前湯佐以四君子加山梔而安

一妊婦悲哀煩躁其夫詢之云我無故但自欲悲耳用淡竹茹湯爲主佐以八珍湯而安

一妊婦發熱作渴遍身骨節作痛用仙方活命飲二劑諸證稍愈至十一日出痘百餘顆形氣甚倦用紫草木香散又出少許但口乾作渴用人參白朮散而渴止用八珍湯加柴胡丹皮而貫膿後去丹皮柴胡倍加參芪數劑而痘靨

一婦八月胎下墜或動面黃體倦飲食少思此脾氣虛弱用補中益氣湯倍以白朮加蘇梗三十餘劑而安產後胞運胃滿欬嗽用四物湯加茯苓半夏桔梗而愈

證治準繩曰湯總戎夫人妊娠病痢不止壺仙翁診其脈虛而滑兩關若滴此由胎氣不和相火炎上而有熱似痢實非也乃用黃芩白朮以安胎四物生地黃以調血數劑而安

博陵醫之神者曰郝翁士人陳堯遵妻病衆醫以爲勞傷郝曰亟屏藥是爲妊證且賀君得男子已而果然

又二婦人妊一喑嘿不能言郝曰兒胎大經壅兒生經行則言矣不可毒以藥一極壯健郝診其脈曰母氣已死所以生者反恃兒氣耳如期子生母死

一婦暴渴惟飲五味汁名醫耿隅診其脈曰此血欲凝非疾也已而果孕古方有血欲凝而渴飲五味之證不可不知也

潘壖診庶部員外郎張咸之妻孕五歲南陵尉冨昌齡妻孕二歲團使劉尊孫妾乃十有四月皆未育溫叟視之曰疾也凡醫妄以爲有孕耳於是與破血攻毒大劑飲之庶部妻下肉塊百餘有骨曰狀昌齡妻產二童子色漆黑倉卒怖悸疾走而去尊孫妾墮大蛇腐蛻蜒未死三婦皆無恙

葉南洲妻經閉五月下白或赤午後發熱欬嗽嘔吐醫謂勞瘵陳十品視曰兩尺脈皆實此必有孕外受風邪搏激故耳飲清和之劑而安半年生二子

一妊婦四五箇月臟燥悲傷遇畫則慘感淚下數欠伸象若神靈如有所憑醫與巫者皆無益管先生與仲景大棗湯一投而愈

一孕婦病醫言胎且墮錢仲陽曰妊者五臟傳養率六旬乃更候其月偏補之何必墮已而母子皆全

一婦人阻病愈治愈逆因思金匱如吐下者絕之之言逐停藥月餘自安

一孕婦七箇月胃脘飽悶氣喘忽吐出一物如小腸寸許舉家驚疑其胎爛穫文彬至診得寸口脈洪滑知其氣盛血少胎氣湊上中焦畜有濕熱生痰知所吐之物乃痰結聚病名子懸以紫蘇飲加芩連貝母十劑獲痊

王祠部安人孕三月腰腹遇痛痛下不止氣湧脹悶延江應宿診視六脈弦數平昔脈極沉細此必怒動肝火挾相火而生內熱喜脈不滑未至離經猶可保也以條芩白朮枳殼香附茯苓阿膠白芍當歸陳皮煎調鹿角煅酒淬細末一錢更進抑青丸一服痛已數劑平復

給事游讓溪夫人經事不行嘔噦眩運飲食艱進醫以爲二陽之病發心脾女子不月法在不治江璀診之尺脉雖小按之滑而不絕此妊而惡阻非凶候也用六君子加砂仁數服而安

一婦懷妊八月忽病腰痛不能轉側大便燥結醫用人參等補劑痛益甚加用硝黃通利之藥燥結雖行而痛如故汪石山診之脉稍洪近駛曰血熱血滯也宜用四物加木香乳沒黃蘗火麻仁煎服四五貼痛稍減燥結潤復加發熱面赤或時惡寒仍用前方去乳香沒藥加柴胡黃芩服二貼而寒熱除又背心覺寒腰痛復作汪曰血已利矣可於前方加人參一錢服之而安

一婦妊娠三箇月因閃挫傷胎腰痛小腹痛下血內有熱江篁南用當歸白朮黃芩熟地川芎防風砂仁中艾葉上香附下用水煎服血止小腹不痛去砂仁又用雞子黃三箇以酒攪化煮熟食之即痊

一婦常患橫生倒產七八胎矣子皆不育汪石山診其脉皆細澀頗弦曰此氣血兩虛兼熱也或曰氣血有餘方成妊娠氣血既虧能胎耶觀其形長而脉細澀屬於氣血兩虛色青脉弦屬於肝火時熾而兩尺浮滑似血虛爲輕而氣虛爲重也宜以補陰丸除陳皮倍加香附參芪蜜丸服之常令接續踰年臨產果順而育一子

一婦長瘦色黃白性躁急年三十餘常患墮胎已七八見矣汪石山診其脉皆柔軟無力兩尺雖浮而弱不任尋按曰此因胎墮太多氣血耗甚胎無滋養故頻墮譬之水涸而禾枯土削而木倒也況三月五月正屬少陽火動之時加以性躁而急發之故墮多在三五七月也宜大補陰湯去桂加黃蘗黃芩煎服仍用研末蜜丸服之庶可保生服半年胎固而生二子

一婦形質瘦小面色近紫產後年餘經水不通首夏忽病嘔吐手指痲痹拳不能伸展聲音啞小嗽不出醫者皆視爲風病危之汪石山診之脉皆細微近滑曰此妊娠惡阻病也衆謂經水不通安有妊理汪曰天下之事有常有變此乃事之變也脉雖細微似近於滑又尺脉不絕乃妊娠也遂以四君子加二陳治之諸證俱減尚畏粥湯惟食乾糕香燥之物而有生意

一婦年近三十形色瘦白素時或欬嗽一兩聲月水或前或後夏月取涼逐欬甚不能伏枕者月餘嗽痰中或帶血或兼膿瞰急則吐食醫用芩連二陳不效復用參芪等補藥病轉增汪石山診之左脉浮滑右脉稍弱而滑幼傷手腕掌不能伸右脉似難憑矣乃以左脉驗之恐妊兼肺癰也遂以清肺泄肺之劑進之三服而能著枕痰不吐膿不咯惟時或惡阻汪曰此妊之常病也教用慈芪仁白朮茯苓麥冬黃芩阿膠煎服病減月餘復爲診脉皆稍緩而浮曰熱已滅矣但吐紅太多未免傷胃教用四君子加陳皮黃芩枳殼煎服調理妊至六月食雖病作却雖而愈至九月病又復作聲啞令服童便獲安汪曰產後病除乃是佳兆病若復作非吾所知月足而產脾胃病作加泄竟不救

中丞許少微向令金壇時夫人胎漏療治不止時迎於上公欲因其勢遂下之謀於余余但令服佛手散以爲可安即安不可安即下順其自然而已既數服公憂疑不決女科醫者檢方以進乃用牛膝一兩酒煎服謂牛膝固補下部藥耳用之何害公遂信而服之而胎果下余時有從母之戚未及知比知而馳至則閨盈庭皆桂麝氣益因牛膝既下許醫又進香桂散矣血遂暴下如河決泛行不止亟煎獨參湯未成而卒公哀傷甫定而過余舍且謝余曰牛膝補藥而能墮胎何也余對曰生則下而熟則補故破血之與填精如箭鋒相拄豈獨牛膝哉鹿茸亦墮胎破血而煎爲白膠則安胎止血因其熟而昧其生此之謂粗工公嘆恨無已余故特著之以爲世戒

一妊婦六七箇月患瘧先寒後熱六脉浮緊醫用柴胡桂枝無效余曰此非常山不愈衆醫難之越數日疾甚乃從余治以七寶散一服產黃帝問婦人重身毒之奈何岐伯曰有故無殞帝曰何謂也岐伯曰大積大聚其可犯也衰其大半而止誠審藥物之性明治療之方何疑攻治哉

醫貫曰一孕婦瘧痢垂發醫治兩月餘瘧止而痢愈甚又加腹痛飲食少進延余視之余曰虛寒也以補中益氣加薏苡一服痢止大半再一服而反加瘧病大作主人驚恐余曰此吉兆也向者瘧之止乃陰盛之極陽不敢與之爭今服補陽之劑陽氣有權敢與陰戰再能助陽之力陰自退聽方中加附子五分瘧痢齊愈大服補劑越三月產一子產後甚健

龔嗣紀要曰羅田典史熊鏡妻有娠先於五月病熱請女醫朱廷和治之愛瘧又請萬元獻王子舉人治之加痢至八月瘧痢並作請師調治診其脉左手沉

實有力右脈浮大而虛此乃男娠內傷病也用補中益氣加條芩白朮連進十餘服瘧痢俱止後以胡連丸調理而安次年春果生一男

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百八卷目錄

醫部彙考三百八十八

婦人臨產門一

黃帝素問　腹中論

王叔和脈經　[illegible]

孫思邈千金方　[illegible]

陳自明婦人良方　將護孕婦論　月空方位倒　逐月安產藏衣忌向方位

安產藏衣十二[illegible]

[illegible]

嚴用和濟生方　[illegible]

劉完素六書　[illegible]

張從政儒門事親　難產

朱震亨心法　[illegible]

洛致餘論　[illegible]

樓英醫學綱目　[illegible]

虞摶醫學正傳　[illegible]

李梴醫學入門　總論　脈法

龔信古今醫鑑　催生符式

戴思恭證治要訣　將產調治法

薛己醫按　入月預備藥物　臨盆法

王肯堂證治準繩　催生法　下死胎法　胞衣

萬全婦人祕科　[illegible]

張介賓景岳全書　[illegible]

藝術典第四百八卷

醫部彙考三百八十八

臨產門一

黃帝素問

腹中論

帝曰何以知懷子之且生也岐伯曰身有病而無邪脈也

註夫氣主生物血主成物懷子者血氣之相和也且生者謂血氣之所以成胎者虛繫於腹中而無經脈之牽帶故至十月之期可虛脫而出當知月事懷妊之血在氣分而不在經脈也身有病者月事不來也無邪脈者血氣和平也

晉王叔和脈經

離經脈

懷妊離經其脈浮設腹痛引腰脊爲今欲生也但離經者不病也又法婦人欲生其脈離經夜半覺目中則生也

唐孫思邈千金方

產難論

產婦雖是穢惡然將痛之時及未產已產並不得令死喪污穢家人來視之則生難若已產者則傷兒也凡欲產時特忌多人瞻視惟得二三人在旁待產訖乃可告語人也若人衆看視無不難產

凡產婦第一不得匆匆忙怕旁人極須穩審皆不得預穢預急及憂悒憂悒則難產若腹痛眼中火生此兒迴轉未即生也兒出訖一切人及母皆忌問是男是女勿令母看視穢污

宋陳自明婦人良方

將護孕婦論

凡妊娠至臨月當安神定慮時常步履不可多睡飽食過飲酒醴雜藥宜先貼產圖依位密鋪牀帳預請老練穩婆備辦湯藥器物欲產時不可多人喧鬧恰惶但用老婦二人扶行及凭物站立若兒漿水破腹痛甚是胎離其經令產母仰臥令兒轉身頭向產門用藥催生坐草若心煩用水調服白蜜一匙覺饑喫糜粥少許勿令饑渴恐乏其力不可强服催藥早於坐草慎之

月空方位倒

正月三月五月七月九月十一月在丙壬

二月四月六月八月十月十二月在甲庚

逐月安產藏衣忌向方位

凡安產藏衣方位並於臥閣內分布太平聖惠方云凡妊婦初入月便寫產圖一本以朱書某月某日空貼在某位如正月在丙壬可於壬位安產婦牀帳內位藏衣之類貼產房北壁若值閏月只看節氣用之又云每月產圖有雷公招搖逆鬼力士天狗軒轅大時咸池豐隆吳時白虎大夫天侯狂虎凡此十三神並從月建易其位所謂月空者按內經云月窮空無寫王冰注云論月輪中空日也即此十三神之數今太平聖惠方以六陽月在丙壬以六陰月在甲庚止如外臺所言正月在丙壬十二月在甲庚之類其理一也但外臺言之詳聖惠言之簡今人多從其簡或云凡逐月安產藏衣並向月德月空方位所有十三神煞並從節氣更換若交大月節便作次日用書

產圖者非也假如正月十四日立春若姙婦十三日乳臥豈可作去年十二月用必依月分用之乃是若依節氣使換則天德月德所在差矣然月空與任謂之中天空頗相類議者以爲天空者非十干神之數蓋課中有天乙貴人其位無可與對者故此空是謂天空值此神百事不宜止宜安產婦牀帳藏衣之類耳集聖曆云天德正月在丁二月在坤三月在壬四月在辛五月在乾六月在甲七月在癸八月在艮九月在丙十月在乙十一月在巽十二月在天又堪輿曆有遊年白虎殺神在太歲後一辰如太歲卯則白虎在寅餘倣此推之若產及藏衣犯之則子母皆不利

王子亨云難產逆生論稱犯一切神殺固有是理然亦有自然難產兒自逆生者及有產暈俱下者產已則復如故此非疾病所致氣血所主天下之理蓋有不可窮詰者亦宜知之

安產藏衣十二神吉凶方位

歲安福吉招搖傳送天狂天大凶

太陰龍公路獄地隔虎伏大虎

吉吉力　大　是

方方上　時　時

正月　壬丙艮寅寅卯辰午午申酉戌

坤坤乾亥卯子丑未巳酉巳戌亥

二月　丙壬坤申辰酉戌戌午子寅亥子

三月　甲庚巽巳巳午未丑未酉亥子丑

四月　丙壬艮寅午卯辰辰申子申丑寅

五月　庚甲乾亥未子丑未酉卯巳寅卯

六月　丙壬坤申申子酉戌戌子寅卯辰

七月　甲庚巽巳酉酉戌丑亥卯亥辰巳

八月　庚甲乾亥亥子丑未丑卯巳午未

九月　丙壬艮寅戌卯辰辰子午申巳午

十月　庚甲乾亥亥子丑未丑卯巳午未

十一月　丙坤申子酉戌戌寅午寅未申

十二月庚甲巽巳巳丑午未丑卯酉亥申酉

推婦人行年法

生氣方　產婦宜向之坐臥及產帳向之開門大吉

反支月　遇此月即鋪衣上用牛皮或馬驢皮或鋪草勿令惡血汚地吉

禍害月　不得於其上產又不得向之二便避之大吉

絕命方　不得於其上產又不得向之大小便避之大吉

懸尸日　遇此日產不得羣繩宜懸馬鞦縶之大吉

閉肚方　臨月至滿月並不得向之大小便及棄不淨之水潑之吉

八方方　產帳不得開之開門忘之大吉

十二支將命所屬八卦吸宮

子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

方方方方方方方方方方方方

十三歲行年在庚申坤乾兌離巽震

在正西偏北辛　在正東偏北申　黃色衣西南

首　西南方黃衣師看產

十四歲行年在己未離坤巽兌震

在正北偏西壬　在正北偏東癸　赤色衣正南

首　正南方赤衣師看產

十五歲行年在戊午坎離坤乾艮

在正東偏北甲　在正北偏西壬　黑色衣正北

首　正北方黑衣師看產

十六歲行年在丁巳震坎離巽艮乾

在正東偏北甲　在正西偏北辛　青色衣正東

首　正東方青衣師看產

十七歲行年在丙辰艮土坤震坎離

在正東偏南己　在正南偏南庚　黃色衣東北

首　東北方黃衣師看產

十八歲行年在乙卯乾六十坎震巽坤

在正南偏東丙　在正南偏西丁　白色衣西北

首　西北方白衣師看產

十九歲行年在甲寅兌正七巽離震艮

在正南偏西丁　在正南偏東丙　白色衣正西

首　正西方白衣師看產

二十歲行年在癸丑巽二八兌坤乾兌

在正西偏南庚　在正東偏南乙　青色衣東南
首　東南方青衣師看產
二十一歲行年在壬子坤三九月離巽寅申日
在正西偏北辛　在正東偏北甲　黃色衣西南
首　西南方黃衣師看產
二十二歲行年在辛亥離四十月坤兌丑未日
在正北偏西壬　在正北偏東癸　赤色衣正南
首　正南方赤衣師看產
二十三歲行年在庚戌坎五十一月乾艮子午日
在正北偏東癸　在正北偏西壬　黑色衣正北
首　正北方黑衣師看產
二十四歲行年在己酉震六十二月艮乾巳亥日
在正東偏北甲　在正西偏北辛　青色衣正東
首　正東方青衣師看產
二十五歲行年在戊申艮五十一月震坎辰戌日
在正東偏南乙　在正西偏南庚　黃色衣東北
首　東北方黃衣師看產
二十六歲行年在丁未乾二八月坎震卯酉日
在正南偏東丙　在正南偏西丁　白色衣西北
首　西北方白衣師看產
二十七歲行年在丙午兌一九月巽離寅申日
在正南偏西丁　在正南偏東丙　白色衣正西
首　正西方白衣師看產
二十八歲行年在乙巳巽四十一月兌坤丑未日
在正西偏南庚　在正東偏北乙　青色衣東南
首　東南方青衣師看產
二十九歲行年在甲辰坤五十一月離巽子午日

在正西偏北辛　在正東偏南甲　黃色衣西南
首　西南方黃衣師看產
三十歲行年在癸卯離六十二月坤兌巳亥日
在正北偏西壬　在正北偏東癸　赤色衣正南
首　正南方赤衣師看產
三十一歲行年在壬寅坎正七月乾艮辰戌日
在正北偏東癸　在正北偏西壬　黑色衣正北
首　正北方黑衣師看產
三十二歲行年在辛丑震八月艮乾卯酉日
在正東偏北甲　在正西偏北辛　青色衣正東
首　正東方青衣師看產
三十三歲行年在庚子艮一九月震坎寅申日
在正東偏南乙　在正西偏南庚　黃色衣東北
首　東北方黃衣師看產
三十四歲行年在己亥乾四十一月坎震丑未日
在正南偏東丙　在正南偏西丁　白色衣西北
首　西北方白衣師看產
三十五歲行年在戊戌兌五十一月巽離子午日
在正南偏西丁　在正南偏東丙　白色衣正西
首　正西方白衣師看產
三十六歲行年在丁酉巽六十二月兌坤巳亥日
在正西偏南庚　在正東偏南乙　青色衣東南
首　東南方青衣師看產
三十七歲行年在丙申坤正七月離巽辰戌日
在正西偏北辛　在正東偏東甲　黃色衣西南
首　西南方黃衣師看產
三十八歲行年在乙未離八月坤兌卯酉日

在正北偏西壬　在正北偏東癸　赤色衣正南
首　正南方赤衣師看產
三十九歲行年在甲午坎二九月乾艮寅丑日
在西北偏東癸　在正北偏西壬　黑色衣正北
首　正北方黑衣師看產
四十歲行年在癸巳震四十月艮乾辰戌日
在正東偏北甲　在正西偏北辛　青色衣正東
首　正東方青衣師看產
四十一歲行年在壬辰艮五十一月震坎子午日
在正東偏南乙　在正西偏南庚　黃色衣東北
首　東北方黃衣師看產
四十二歲行年在辛卯乾六十二月坎震巳亥日
在正南偏東丙　在正南偏西丁　白色衣西北
首　西北方白衣師看產
四十三歲行年在庚寅兌正十月巽離辰戌日
在正南偏西丁　在正南偏東丙　白色衣正西
首　正西方白衣師看產
四十四歲行年在己丑巽二八月兌坤卯酉日
在正西偏南庚　在正東偏南乙　青色衣東南
首　東南方青衣師看產
四十五歲行年在戊子坤三九月離巽寅申日
在正西偏北辛　在正東偏北甲　黃色衣西南
首　西南方黃衣師看產
四十六歲行年在丁亥離四十月坤兌丑未日
在正北偏西壬　在正北偏東癸　赤色衣正南
首　正南方赤衣師看產
四十七歲行年在丙戌坎五十一月乾艮子午日

在正北偏東癸　在正北偏西壬　黑色衣正北首　正北方黑衣師看產
四十八歲行年在乙酉寅二月艮乾巳亥日
在正東偏北甲　在正西偏北辛　青色衣正東首　正東方青衣師看產
四十九歲行年在甲申艮卯七月震坎辰戌日
在正東偏南乙　在正西偏南庚　黃色衣東北首　東北方黃衣師看產　坐產時更用後法

體元子借地法

東借十步　西借十步　南借十步　北借十步
上借十步　下借十步
壁方之中四十餘步安產借地或有穢汚或有東海神王或有西海神王或有南海神王或有北海神王或有日遊將軍白虎夫人遠去十丈軒轅招搖舉高十丈天符地軸入地十丈令地空閒產婦某氏安居無所妨礙無所畏忌諸神擁護百邪速去急急如律令敕

前項借地法於入月一日朱書一本貼產婦房內牆壁上更不須避忌神殺也

禁草法

鋪草及氈褥訖即呪曰鐵鐵湯湯非公所當是王一言得之銅一言得之鐵母子相生俱護鐵急急如律令

禁水法

欲產時貯水呪曰南無三寶水水在井中爲井水水在河中爲河水水在器中爲淨水水在法中爲眞水自知非眞莫當眞水

以淨持濁以正治邪日遊月殺五土將軍青龍白虎朱雀元武招搖天狗軒轅女妓天吞地吞懸尸閉肚六甲禁諱十二神王土符伏神各安所在不得動靜不得忌干若有動靜若有忌干施以神呪當攝汝形阿佉尼阿毘離莫多梨娑地梨娑訶

治產難橫生逆產胞衣不下靈符

靈符宜以水飛朱砂書之貼於房內北壁上至坐蓐之時將符以針劄就盞內化之溫水調服











按前所著方論圖向符訣一帙自夫人泛觀之以爲迂遠然艱於得子者恆相質問則惟此書爲要屢試有明驗也余每觀其護孕之方極爲曲當易產之藥悉有根據至於圖向之趨避吉凶所關符訣之元微神妙顯用其誠有得於諸先哲者乎不然王太僕諸公深於奧理者也豈謬論耶則是書也誠所當珍藏考究者使舍此而施治於婦鮮有不誤矣觀者勿以爲迂遠云

產難論

婦人以血爲主惟氣順則血和胎安則產順今富貴之家過於安逸以致氣滯而胎不轉動或爲交合使精血聚於胞中皆致產難若腹或痛或止名曰弄胎穩婆不悟入手試水致胞破漿乾兒難轉身亦難生矣凡產值候痛極兒過產門方可坐草時當盛暑倘或血運血溢當飲清水解之冬末春初產室用火和煖下部衣服尤當溫厚方免胎寒血結若臨月洗頭濯足亦致產難

若胎胞破早血水先乾或難產勞傷氣血者熏八珍湯或十全大補湯加益母草不時與服以協濟之或以黃芪數斤芎歸四五斤許大釜水煎藥氣氤氳滿室使產婦口鼻俱受其氣臍帶以油紙撚燒斷補接其陽氣穩婆須擇老練者當先施惠預說與知倘有生息不順只說是未產或是雙胎只說胎衣未下恐驚則氣散愈難生息

郭稽中產難論

產難者因兒轉身將兒枕血塊破碎與胞中敗血壅滯兒身不能便利是以難產急服勝金散消散其血

使兒自易生陳無擇云多因兒未轉順坐草太早或努力太過以致胞衣破而血水乾產路澀而兒難下宜先服催生如神散以固其血設或逆生橫產當依法針刺之

楊子建十產論

凡生產先知此十證庶免子母之命折於無辜也世之收生者少有精良妙手多致傾命余因傷痛而備言之

一曰正產婦人懷胎十月陰陽氣足忽腰腹作陣疼痛相次胎氣頓陷至於臍腹痛極乃至腰間重痛數道挺迸繼之漿破血出兒子遂生名曰正產

二曰傷產蓋一人之生陰注陽定各有時日不可改移今有未產一月已前忽然臍腹疼痛有如欲產仍却無事是名試月非正產也但一切產母未有正產之候即不可令人抱腰產母亦不可妄亂用力蓋欲產之婦臍腹疼痛兒身未順收生之婦却教產母虛亂用力兒身纔方轉動却被產母用力一逼使兒錯路忽橫忽倒不能正生皆緣產母用力未當之所致也凡產母用力須待兒子順身臨逼門戶方始用力一送令兒下生此方是產母之用力當也若未有正產之候而用力太早并妄服藥餌或有所傷動令兒下生譬如揠苗而助長無益而有害矣此名傷產

三曰催產言婦人欲產漿破血下臍腹作陣疼痛極甚腰重穀道挺迸頭至產門已見是正產之候但兒却未生即可服藥以催之或有經及數日產母困苦已分明見得是正產之候但兒子難生亦可服藥以助產母之正氣令兒速得下生此名催產

四曰凍產冬月天冷產母經血得冷則凝以致兒子不能生下此害最深若冬月產者下部不可脫去綿衣并不可坐臥寒處當滿房著火常有煖氣令產母背身向火令臍下腿縢間常煖血得熱則流散使兒易生此名凍產

五曰熱產盛夏之月產婦要溫涼得所不可恣意取涼傷損胎氣亦不可人多熱氣逼襲產母使產母血沸而有發熱頭痛面赤昏運如醉乃至不知人事此名熱產若夏月風涼陰雨亦不可任意取涼恐生大病

六曰橫產兒先露手或先露臂此由產母未當用力而用之過也兒身未順用力一逼逐至身橫不能生下當令產母安然仰臥後令看生之人先推其手令入直上頭順產門漸漸逼身以中指摩其肩不令臍帶纏扳推上而正之或以指攀其斗而正之須是產母仰臥然後推兒直上徐徐正之候其身正煎催生藥一盞喫了方可用力令兒下生此名橫產

七曰倒產產母胎氣不足關鍵不牢用力太早致令兒子不能迴轉便直下先露其足當令產母仰臥令看生之人推其足入不可令產母用分毫力亦不可驚恐使兒自順

八曰偏產兒身未正產母用力一逼致令兒頭偏拄左腿或偏拄右腿故頭難露偏拄一畔不能生下當令產母仰臥次令看生之人輕輕推兒近上以手正其頭令兒頭頂端正然後令產母用力一送即便生下若是小兒頭後骨偏拄穀道只露其額當令看生之人以綿衣炙溫裹手於穀道外力輕輕推兒頭令正便令產母用力送兒生也此名偏產

九曰碰產兒身已順而露正頂不能生下蓋因兒身回轉肚帶攀其肩以此露正頂而不能生當令產母仰臥令看生之人輕推兒近上徐徐引手以中指按兒肩下撥其肚帶仍須候兒身正順方令產母用力一送使兒生下此名碰產

十曰坐產兒將欲生其母疲倦久坐倚膝抵其生路急於高處繫一手巾令產母以手攀之輕輕屈足坐身令兒生下非坐在物上也此名坐產

十一曰盤腸產每產則母大腸先出然後兒生其腸不收以酢半盞新汲水半盞調停噀產母面每噀一縮三噀收盡此良法也

註　按前證古法以葦麻子仁四十九粒研塗產母頭頂腸收上急洗去其腸若乾以磨刀水少許火上微溫潤之內用磁石煎湯飲之即收上磁石須陰陽家用有驗者若以木噀母面恐驚則氣散

交骨不開產門不閉

竊謂交骨不開產門不閉皆由元氣素弱胎前失於調攝以致氣血不能運達而然也交骨不開陰氣虛也用加味芎歸湯補中益氣湯產門不閉氣血虛也用十全大補湯

產難子死腹中

產難子死腹中多因驚動太早或觸犯禁忌其血先下胎乾涸而然也須驗產母舌若青黑其胎死矣當下之故產室卑臥須順四時方向并遵五行避忌則吉

註　夫子死腹中者多因驚動太早或觸犯禁忌或

抱屢太重或頻探試水胞衣先破血水先盡而胎乾澁故耳其候產母脣舌皆黑者子母俱死若舌青或脹悶甚者其子已死矣先以平胃散一兩酒水各半煎却投砂硝半兩即熱皮硝服或用硝一兩以童便調下亦妙

熱病胎死腹中

註按陳無擇先生云前證當視產母若面赤舌青知其子死面青舌亦知其母死子生脣青吐沫母子俱死若雙胎或一死一活用黑神散竊謂前證宜補助產母使其胎自下黑神散恐其太熱不宜輕用果一胎已死者用平胃散砂硝水銀下之最爲穩當庶不併傷生者又郭氏曰因母患熱病至六七日以後臟腑熱極熏蒸其胎是以致死緣兒死身冷不能自出但服黑神散煖其胎須臾溫煖即自出矣

胞衣不出

郭稽中曰胎衣不下者因氣力疲憊不能努出或血入衣中脹大而不能下以致心胃脹痛喘急速服奪命丹血散脹消其衣自下牛膝散亦效

註若腸出而氣虛不能入用補中益氣湯或蓖麻子仁一兩研塗母頭頂心即上若胎衣不下用蓖麻子仁塗右脚心胎衣下急洗之緩則胎衣仍入益母丸亦效若胎衣未下欲斷臍帶須先以少物繫墜然後斷之否則胞上搶心而死其惡露流衣中者腹中脹痛用奪命丹或失笑散以消瘀血緩則不救其元氣不能送者腹中不脹痛用保生無憂散以補固元氣蓖麻子肉塗母右脚心衣下即洗去緩則腸亦出如腸不上仍用此膏塗腦頂則腸自入

按郭氏云亦有胎初下後產婦力氣不能更用氣力產胞經停遇風冷乘之血道閉澁故胎衣不下取黑豆一合炒令熟入醋一大盞煎三五沸去滓分三服溫服

產難脈訣

欲產之婦脈離經

註難經云一呼三至曰離經此是陽加於陰一倍也一呼一至亦曰離經此是陰加於陽四倍也注云經者常也胃脈離其經常之度也平人一呼脈再至一吸脈再至曰平和之脈故一呼脈行三寸一吸脈行三寸呼吸定息脈行六寸一日一夜一萬三千五百息脈行八百一十丈乃爲一周復從始之經再行今一呼脈三至一吸脈三至呼吸定息脈行九寸一日一夜脈行通計一千二百一十五丈過於平脈之數不在所起之經再起故曰離經若一呼一至脈行寸半一吸一至脈行寸半呼吸定息脈行三寸一日一夜通計脈行得四百單五丈乃謂一周是不及平脈之數周而復始亦不在所起之經再起亦曰離經也

沉細而滑也同名

註臨產之婦脈見沉細而滑者乃腎臟本脈之形然腎緊胞胎見此脈者亦與離經之脈同名也

夜半覺痛應分誕來日日午定知生

註若妊婦夜半時覺腹痛定知來日午時當分娩也聖惠方云夜半子時覺腹痛來日午時必定生產謂子午相半止半日觀數也

身重體熱寒又煩舌下之脈黑復青及舌上冷子當死腹中須遣母歸冥

註凡妊婦身有沉重者胃氣絕也又體熱寒慄頭運者正氣衰陰氣盛也若舌捲下脈青黑色及舌反捲上冰冷不溫者子母俱死之候

面赤舌青細尋看母活子死定應難

註凡妊婦面色赤是榮氣流通母活之候舌上青色是妊脈絡絕胎死之候

舒口俱青沫又出子母俱死總高捧

註若妊婦舒口俱青色者榮衛氣絕也又口中吐出青沫者脾胃之氣俱絕此是子母俱死之候

面青舌青沫出頻母死子活是知真不信若能有應驗尋之賢哲不虛陳

註凡妊婦面與舌皆青色又吐痰沫者是產婦榮衛俱絕胎氣衝上之候此是子活母死之候產下子母必死也按前論與脈訣相謬所言不同觀者審之

嚴用和濟生方

滑胎論

懷妊十月形體成就入月合進瘦胎易產之藥今世多用枳殼散非爲不是若胎氣肥實可以服之況枳殼大腹皮能瘦胎胎氣本怯豈宜又瘦之也不若進救生散安胎益氣令子緊小無病易產多少穩當

橫生倒產

凡橫生倒產皆因平日不能忌口恣情多食五臟氣

滯六腑不和胎氣既肥或用力太早胎受驚觸急用瘦胎金液圓其兒身自順生矣

欲產運悶

欲產忽然氣血運悶不省人事蓋因用力太過脉理衰微精神困倦心胷痞悶眼運口噤面青髮直命在須臾急用來甦散

胞肥難產

胞肥難產者何身居富貴口厭甘肥聚樂不常食物無度既飽便臥致令胞胎肥厚根蔕堅固行動氣急蓋緣不曾預服瘦胎之藥致於臨產必是難生入月可服無憂散則易生矣

坐草

坐草驀然氣痿目翻口噤者何蓋因恣意喜怒遂致衛竭榮枯胎轉難動坐草時用性過多腹痛又不能熟忍目翻口噤面黑脣青沫出口中子母俱殞若兩臉微紅子死母活用霹靂奪命丹急救之

金劉完素六書

總論

子死腹中及血暴下胞乾而不能產者宜服半夏湯胎死不下宜三一承氣湯蓋風熱燥澀緊斂則產戶不得自然開通其證逆脉弦數而濇面赤或青或變五色腹滿急痛喘悶胎已不動者是也手足溫而脉滑者只爲難產但宜滑胎催生慎不可下也

胎死不下者前三一承氣湯一服調下益元散五錢須臾更頻用油漿調益元散溫服前後俱下而胎下可活產母也夫難產或死胎不下皆由風熱燥澀緊斂結滯而不能舒緩故產戶不得自然開通此藥力至則結滯頻開而產矣後慎不可溫補而反生燥熱也

元張從政儒門事親

難產

凡婦人難產者皆因燥澀緊斂故產戶不得開通宜先於降誕之月自入月之日用長流水調益元散日三服產必易產後亦無一切虛熱氣血不和之疾如未入月則不宜服之以滑石滑胎故也

朱震亨心法

治法

難產氣血虛故也此蓋九月十月之際不謹守者有之亦有氣血凝滯而不能轉運者臨月時用野天麻熬膏白湯調下油蜜小便和極勻

切脉法

凡妊婦脉細勻易產大浮緩火氣散難產

驗死胎法

胎死腹中則產母面青指甲青脣舌青口臭如兩臉微紅則母活子死

格致餘論

難產論

世之難產者往往見於鬱悶安佚之人富貴奉養之家若貧賤辛苦者無有也方書止有瘦胎飲一論而其方爲湖陽公主作也實非極至之言何者每見有用此方者其難自若余族妹苦於難產後遇胎孕則觸而去之余甚憫焉視其形肥而勤於針指構思旬日忽自悟曰此正與湖陽公主相反彼奉養之人其氣必實耗其氣使和平故易產今形肥知其氣虛久坐知其不運而其氣愈弱其胞胎因母氣弱不能自運耳當補其母之氣則身健而易產今其有孕至五六箇月遂於大全方紫蘇飲加補氣藥與十數貼因得男而甚快後遂以此方隨母之形色性稟參以時令加減與之無不應者因名其方曰大達生散

明樓英醫學綱目

論楊子建傷產法

楊子建十產論中有傷產一法最爲切要慎勿輕忽也凡十月未足腹痛或作或止或痛不甚者名曰弄痛非正產之候或腹雖痛甚而腰不甚者非正產之候胎高未陷下者非正產之候穀道未挺迸者非正產之候水漿未破血未出者非正產之候漿血雖出而腹不痛者非正產之候凡未有正產候且令扶行熟忍如行不得或凭物坐之或安臥之或服安胎藥一二服即止慎勿妄服催生藥餌愴惶致令產婦憂恐而挫其志務要產婦寬心存養調停亦令坐婆先說解論之如覺心中煩悶可依方取白蜜一匙新汲水調下切勿妄亂用力先困其母直待子逼門戶腰重痛極眼中如火穀道挺迸時是正產候方可用力并服催生藥也余男婦於未產一月已前腰腹俱痛全似將產其痛至甚但遇巳牌稍止如此者將十餘日計無所出因閱此條遂與安胎藥加參朮數服間與肉味養之由是平復不痛又二十餘日始產一男是時若妄動亂用力并服催生等藥立見危亡矣

論楊子建橫產偏產礙產倒產四法

楊子建十產論中有橫產偏產礙產倒產四法若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以傷

人命按倒產者今世往往隨其倒足生下並無後患子母雙全不必依推足上之法亦可又礙產往往肚帶有纏在兒頂上而兒頭自出在產門外看生之人以手撥其肚帶從兒頭頂過而下之者又有肚帶纏在頂上一匝而兒與胞衣自然同下者皆無妨不必以此礙產法入產門撥下也

虞摶醫學正傳

難產論

內經曰一息不運則機緘窮一毫不續則穹壤判所謂氣血周流循環無端少有不續則身危矣若夫妊娠之婦子在腹中母子一氣流通全賴漿水滋養十月數足血氣完全形神俱備忽如夢覺自能用手坼胞求路而出既出胞外母子分體呼吸殊息其可久羈於內而使其氣化不運不續哉夫胎元壯健者胞既坼即隨漿而下故易產也其困弱者轉頭遲慢胞漿既乾汙血來塞道路凝滯是以橫生逆產子死腹中而產母之命死在須臾可不畏乎凡見將生之際胞漿既下踰時尚未分娩便當徬惶設計用藥逐去惡血使子路通暢而無難產之患豈可袖手以待斃哉是故催生之藥即芎歸益母草冬葵子之類皆使之逐去汚血者也若腰腹未甚痛漿水少淋瀝而下名爲試漿非胞內眞漿也且宜寬心守待切不可輕易便令穩婆接取產母用力逼胎太早多致橫逆不順切須謹愼其或先手足不順者額偏露者但當以手輕輕撥正以待其自下可也

難產之婦皆是產前恣慾所致非獨難產產後諸疾皆由是而生

或問丹溪所謂難產之婦皆是八九箇月內不能謹其故何歟曰情慾一動氣血隨耗蓋胎孕全仗氣血培養氣血既虧胎孕羸弱漿破之後不能翻身隨漿而下所以難產

李梴醫學入門

總論

十月氣足胎元壯健忽然腹痛或只腰痛須臾產下何俟於催此易生天然之妙宜服單益母膏免產後之患中間有體弱性急者腹痛或作或止名弄痛漿水淋瀝來少名試水雖臍腹俱痛發動露頂而腰不痛者切莫倉皇切禁洗母動手於腹上揣摩直待日子已到腹痛陣密破水已後并腰痛眼中如火方可坐草須待兒頭直順且正逼近產門方可用力一送如坐草太早用力太過產母困倦及至遲滯乃用催生之藥

凡難產皆孕後縱慾及驕恣全不運動又食生冷鞕物凝滯或矮石女子交骨不開或腹大甚胎水未盡或臨產閒雜之人驚恐產婦則精怯精怯則上焦閉閉則氣還下焦脹而不行紫蘇飲最妙氣實者瘦胎枳甘散氣弱者達生散

如腹痛漿水未破止宜用古芎歸湯以活其血或漿水已破而少痛或痛而不密宜安胎飲或達生散以固胎元切不可輕用峻藥徒滲水道反傷胎氣而產愈難產母亦聽其眠食自如但不可過睡過飽耳

破水多則血乾澀必用古黑神散血虛者古芎歸湯下名芎歸黑神散氣弱者四君子湯下名四君黑神散橫逆側產每加麝一釐此時如舟坐砂上須湧水而後可通服此藥後外用葱二斤搗爛鋪於小腹上用急水灘頭砂一斗炒熱將布袱於葱上輕輕略揉有露頂順正而生猶遲滯者恐外感風冷寒暑所阻故夏月熱產則氣散血沸宜五苓散加葵子或三退六一散冬月凍產則血凝滯宜催生五積散

有水道乾澀不能下及服黑神澀藥又多者用清油白蜜等分豬肝煮汁調服或六一散七錢加葵子五錢爲末每二錢熱服

有難產日久水乾及觸犯惡氣心煩躁悶者免腦丸腰痛心煩者用人參乳香各二錢辰砂五分爲末雞子清調薑汁化開冷服

橫產宜服芎歸黑神散固血生血須待兒身正直且順臨門服阿膠滑石葵子爲末溫酒入蜜攪勻服之然後方用力送下

逆產宜安然仰臥洗母徐推足入內服芎歸黑神散固血活血候兒自順若經久不生却令洗母輕緩用手推足令就一邊直上令兒頭一邊漸漸順下多服芎歸等藥直待兒身轉門路正當然後用三退散調服方可用力送下

坐產當服固血藥

盤腸者小腸先出急用熱水浸輭舊布蓋住其腸不可包托外用酢半盞新汲水七分調停噀產母面收盡爲度又以如聖膏貼產母頭頂中心腸上即拭去內兼服芎歸參芪大補之藥加升麻防風以提之未有不收者

礙產須服固血藥

側產宜多服芎歸黑神散

當產誤用熱生峻藥傷母氣血急用安胎過日而產有種一日二日至四日五日而產者盡皆倉皇用力太早之故或因子欲生時兒枕先破敗血裹住宜鹽豉一兩以青布包了燒存性入麝香一錢爲末用秤錘燒紅淬酒調服一盞倉卒只以新汲水磨京墨服之黑水裹兒身出或芎歸益母草葵心皆能逐瘀以開產路

有矮石女子交骨不開難產者龜殼散或古芎歸湯通治產難用無憂散來甦散免腦丸

胎死腹中外證指甲青黑脹悶不食口中極臭用平胃散加朴硝五錢水酒煎服其胎化成血水而下便閉脉實者大黃備急丸或單鹿角爲末葱豉煎湯調服昏沉脉微者養正丹濃煎乳香湯下一百二十丸血乾或有寒者四物湯下古桂香丸氣弱者催生五積散加麝一釐

雙胎一死一生者用蟹爪一盞甘草二兩東流水十盞煎至一盞去滓入阿膠三兩分二三次頓服能令生者安死者出

通下死胎用霹靂丹奪命丸外用如聖膏貼足心仍服催生藥及通關散吹鼻即下

脉法

臨產六至脉號離經或沉細滑若無即生浮大難產寒熱又頻此足因候急於色微面頰唇舌忌黑與青面赤母活子命必傾若胎在腹子母歸冥

一呼六至或一呼一至曰離經經常也人一日一夜脉有周而復始從初之經再起今因胎墜胃脉已離常路之處不從所起之經再起故曰離經脉沉細而滑乃腎臟本脉已形或脉沉如無者即產浮大者難產若身重體熱寒熱頻作此凶證也急看面舌氣色逐胎救母蓋面乃心之華舌乃心之苗青則肝虛不能藏血破漿早而胎胞乾澀不能動轉黑則腎水尅火是以子母俱死惟面赤舌青者乃心血流通母活子死若死胎不出母命亦危

龔信古今醫鑑

催生符式

生九天大力魔軍速降威靈攝天生急急如律令敕

右用朱砂研細以新汲水濃調勻將新筆蘸朱砂於侵晨未食時至誠念九天大力魔軍速降威靈攝天生急急如律令敕至生字急寫生字却於生字下面一畫下左遶匝心想胎元被筆推轉令急急如律令敕氣一筆推下須是隨筆一句念令筆呪俱盡候乾剪下摺作一丸用黃蠟丸之朱砂爲衣濃煎木香湯送下待痛頻時服乳香湯亦可

戴思恭證治要訣

將產調治法

將產當順氣瘦胎使臨期易產宜瘦胎飲加砂仁少許

薛己醫按

入月預備藥物

入月所宜預備佛手保氣枳殼榆皮黑神大聖花蕊石七散神寢保生理中三丸催生黑虎二丹及催生神符又葵子生地黃羌活竹茹烏梅雌雄石燕甘草海馬銜鐵大棗陳皮薑錢黑豆白蜜無灰酒童便酸酢白米湯瓶鍋銚斷臍線剪之類內花蕊石散爲血入胞衣脹大不能下或惡露上攻不能甦醒佛手散治血虛危證加味芎歸湯治交骨不開蓖麻子治胎衣不能上下失笑散治惡露腹痛不省人事蜡油調滑石塗入產門爲滑胎之藥清魂散治血運等證平胃散朴硝水銀爲腐化死胎之劑八珍湯補血氣虛損已上諸方皆爲緊要之藥必不可缺其斷臍帶先用線近臍紮緊帛裹咬斷如天氣風寒或難產母子勞傷元氣者先紮臍帶以油紙撚燒斷此爲廻生起死之要法也故治者當審其宜不可槩信而用之

臨盆法

妊娠欲產之時但覺腹內轉動即當正身仰臥待兒轉身向下時作痛試捏產母手中指中節或木節跳動方與臨盆即產矣

王肯堂證治準繩

催生法

滑以流通澀滯苦以驅逐閉塞香以開竅逐血氣滯者行氣胞漿先破疲困者固血

下死胎法

寒者熱以行之熱者涼以行之燥者滑以潤之危急者毒以下之

脉法辨訛

欲產之婦脉離經沉細而滑也同名夜半覺痛應分誕來日日午定知生此四句往往誤解按脉經曰離經其脉浮腹痛引腰脊爲欲生也但離經者不產也又云其脉離經夜半覺日中則生也經者常也謂離其常處爲離經假如孕婦昨日見左沉實爲男之脉今日或脉浮是離其尋常之脉而異於昨日又且腹

痛知是將誕也通真子引難經一呼三至曰離經為解李晴范又引難經一呼一至曰離經以解沉細而滑皆非也難經言損至二至雖同名離經其脈與理則不同且脈經明言離經其脈浮也不曾引援難經之文合脈訣因其言脈浮又添沉細而滑同名離經蓋以前所論男女脈或云浮大為女若只脈浮為離經若平常見浮大為女之脈安辨離經故又增沉細而滑以見難為浮大之常經為常滑也聖惠方云夜半子時覺腹痛來日午時必定生產謂子午相衝正午日時數也通真子曰夜半痛日午生此言恐未為的又曰腹痛而腰不痛未產也若腹痛連腰痛甚者即產所以然者腎繫於腰胞繫於腎故也論其尺脈轉急如切繩轉珠者即產也生產有難易痛來有緊慢安可定以半日當只活法

萬全婦人祕科

催生法

凡臨產一二日間艱難者只以加減五苓散主之如過二三日人事困頓食不能進者此胞漿乾澀也加味四物湯調益元散主之如過二三日人事困頓飲食少者此中氣不足不能運動其胎也加味四君子湯主之如三四五日不產或胎死腹中者奪命丹主之

救逆產

凡兒逆生切不可使針刺足心及鹽塗之決兒痛上奔母命難存

救險產

凡險產宜令產母仰臥穩婆用證審視看將帶詳著兒之何處仔細只手法輕輕取脫不可造次

盤腸產

當產之時母腸先出盤露於外宇隨後生生後而物不即收蓋由平日氣虛不能斂束血熱易於流動下元不固調攝不牢故也欲免此苦者宜於此後無孕時多服地黃丸加五味子一兩杜一兩以固下元之關鍵及有孕時多服前連丸加人參一兩以補氣又服三補丸以涼血如滑胎瘦胎之藥不可輕服於入月之時再服八物湯加阿膠糯炙甘草各一錢水煎食服十餘劑應可免矣

景岳全書 張介賓著

催生法

臨盆將產服補已甚凡催生之藥無如脫花煎少用肉桂五七分為最穩最妙若氣虛無力者加人參一二錢虛甚者任意加用之

凡妊娠胎元完足痛月而產熟落有期且可催也所謂催生者亦不過助其血氣而利導之耳直待臨期乃可用於產或滑胎煎隨證加減主之或經日久產母困倦難下俱宜服滑胎煎以助其氣血令兒速生其有氣虛無力艱於傳送者必用獨參湯隨多隨少接濟其力皆為催下要決若期未至而妄用行氣導血等劑以為催生亦猶揭方苞之夢攫宋人之苗耳

將產占卜問神

姙娠將產不可占卜問神如巫覡之徒哄嚇謀利妄言因陰禍神祈保產婦閨之致生疑懼夫愛慮則氣結滯而不順多至難產所宜戒也

妊娠調補氣血

胎前清氣產後補血此亦不可拘泥若脾胃不健氣血不充必當預為調補不然臨產必多患難

論滑胎

妊娠滑胎之法推欲其生產之期易而日速而難易之由則在血之多虛不在藥之滑利蓋血多則潤而產必易血虛則澁而產必難故於未產之前但宜以培養氣血為主而預為之地如四物湯滑胎煎五福飲小營煎八珍湯之類即皆滑胎之要藥若不知此而過用滑利等物或產期未近無火無滯而妄用清火行氣沉降苦寒等藥必能暗耗營氣走泄真陰多致血虛氣陷反為臨期大害若果肥盛氣實者則紫蘇飲保生無憂散滑胎枳殼散之類皆可擇用

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百九卷目錄
醫部彙考三百八十九
婦人臨產門二
方
單方
鍼灸
醫案

藝術典第四百九卷
醫部彙考三百八十九
婦人臨產門二
方
一退散 方
治產難
蛇退全者一條　蠶退紙方圓一尺
右燒存性爲末溫酒調下
三退散 人

一名催生散一名蛇退散治難產及橫逆產或子死腹中
蛇退一條　蟬退十四枚俱全者　男頭髮雞子大
右俱燒存性爲末作二服溫酒調下一方用胎髮
一方仍以小針刺兒足心三七下擦鹽少許即生
三退六一散 丹
一名滑胎散催生神效
益元散一兩　男子頭髮雞子大香油熬化
蛇退全者一條　蟬退全者五枚　穿山甲一片
右各燒存性爲末用麝水煎二沸入髮灰調服立下
蛻蛇散 方
催生祕傳
蟬退一頭　天蛇蛇一條並燒存性　滑石
冬葵子微炒各一兩
右爲末每一錢順流水微溫調服不可使熱湯
黑龍丹 方
治產難及死胎不下胎衣不下產後兒枕痛血迷
血運一切危急垂死者灌藥得下無不活神驗不可言
五靈脂　當歸　川芎　良薑　熟地黃各一兩
右判爲細末入麝香一錢研勻用好醋打麵糊和丸彈子大每一丸
入薑汁童便溫酒中細研服之
催生散 傳
治產難

白芷炒黑　百草霜　滑石各等分
右爲末芎歸湯煎水調下二三錢
霹靂丹 人
一名霹靂奪命丹治臨產橫逆氣喘口噤面黑脣青口中沫出子母俱死雨驗微紅子死母活急用此救之
蛇蛻一條　蠶蛻紙並燒存性二錢　乳香五分
男子頭髮燒灰　路上左腳草鞋底存性各一錢
水銀七分半二物入銚中火上鍊化鉛砂子研細
黑鉛二錢半
右爲末以豬心血和丸梧子大金箔爲衣每取二三丸倒流水送下如不下化開灌之
如神丹 正傳
治難產不下
巴豆三枚　蓖麻子七粒並去殼　麝香少許
右三味搥作餅子貼臍中分產即以溫湯洗去歌曰巴三蓖七脫衣裳細研如泥入麝香搥作彈丸
臍下貼須臾子母便分張
如聖散 人
治難產及死胎不下十分危急者
巴豆十六枚去殼　蓖麻子四十九粒去殼
麝香二錢
右同搗如泥攤絹帛上貼臍上一時產下即洗去
下死胎方 良方
一名千金神速湯雙胎一死一生用此則死者出生者安
蟹介一升　大甘草五錢半生半炒

右東流水十盞煎至三盞去滓入阿膠一兩半生牛炒令消化分二三次頓服藥宜東向用葦爲薪

香桂散 正傳

下死胎

桂心三錢　麝香半錢

右爲末作一貼溫酒調下須臾即下一方當門子一枚桂枝末二錢

桂香丸 入門

下死胎

肉桂一兩　麝香一錢

右爲末飯丸菜豆大白湯下十五丸

奪命丹 丹溪

治產後血入胞衣脹滿冲心日久不下危急者

附子炮五錢　牡丹皮　乾漆炒各一兩

右爲末以醋一升入大黃末一兩熬成膏和丸梧子大酒下五十丸

牛膝湯 局方

治產後胞衣不下腹滿即殺人服此即爛下

滑石末二錢　冬葵子二錢　木通　當歸　牛膝　瞿麥各一錢半

右剉作一貼水煎服

三蛻飲 正傳 下同

治胞衣不下神效

蛇蛻一條全者　蠶蛻紙一方　蟬蛻四十九箇

右并燒存性爲末順流水調下立出

奪命丸

治婦人小產下血多子死腹中其人憎寒手指臂口爪甲青白面色黃黑胎上搶心則悶絕欲死冷汗自出喘滿不食或食毒物或誤服草藥傷動胎氣下血不止胎尚未損服之可安已死服之可下若胎腐爛腹中危甚者立可取出此方的係異人傳授至妙

桂枝　赤茯苓　丹皮　赤芍藥　桃仁各等分

右爲末蜜丸芡實大空心服三丸或丸如彈子大淡酢湯化下一丸此即仲景桂枝茯苓丸但用淡酢湯下不同耳

催生神妙佛手散

一名立效散治婦人妊娠五七月因事築磕著胎或子死腹中惡露下疼痛不已口噤欲絕用此藥探之若不損則痛止子母俱安若胎損立便逐下本出徐文仲神驗胎動方云治血上衝心腹滿悶者如湯沃雪又治產前產後體熱敗血腹痛

當歸六兩　川芎四兩或等分亦可

右爲粗末每服三錢水一大盞煎令泣泣欲乾投酒一大盞止煎一沸去滓溫服口噤灌之如人行五里再服不過三四服便生

死胎不下方

用之極驗

紫金藤　葵根各七錢　桂二兩　土牛膝三兩

上當歸四錢　麝香三分

右爲末米糊丸梧子大朱砂爲衣每服五十丸乳香湯下

如意丹

治婦人難產

母丁香三十六粒　滴乳香三錢六分

右爲末同兔腦和杵千下丸作三十六丸每服一丸好酒化下立驗

蟹爪散

下胎極效妊娠有病欲去胎者宜此

蟹爪二合　桂心　瞿麥各一兩　牛膝二兩

右爲末空心溫酒服一錢

飛生丸

治難產

飛生一枚　槐子　故箜篌羽各十四枚

右合搗丸梧子大酒服二丸

達生散 入門 下同

孕婦臨月服至二十餘貼易產無病

大腹皮酒洗二錢　甘草炙一錢半　白芍藥

白朮　當歸各一錢　人參　陳皮　紫蘇葉

枳殼　砂仁研末各五分

右剉作一貼入青蔥五葉水煎服或煎水吞下益母丸尤佳

瘦胎枳甘散

一名滑胎枳殼散一名枳殼六一散孕婦八九月內陰氣壅塞宜常服之滑胎易產

枳殼五兩　甘草一兩

右爲末每二錢白湯煎服或加香附一兩尤妙若胎氣素弱者恐致胎寒腹痛胎弱多鬱當佐以縮地木香爲丸用之則陰陽調和有益胎孕

縮胎丸 月候

孕婦八九箇月用之縮胎易產

黃芩夏一兩春秋七錢冬五錢炒　白朮二兩

赤茯苓七錢半　陳皮三兩

右爲末粥丸梧子大白湯下五七十丸

束胎丸 河間

縮胎易產

白朮　枳殼各等分

右爲末以水浸蒸餅和丸梧子大每食前服五十丸白湯下

神寢丸 得效方

一名寤生丸能瘦胎易產

枳殼二兩　乳香一兩

右爲末以煉蜜丸梧子大酒下二十丸

滑胎煎

胎氣臨月宜常服數劑以便易生亦治胞衣不出

當歸三五錢　熟地三錢　杜仲　山藥各二錢

川芎　枳殼各七分

水二鍾煎八分食前溫服

如氣弱體虛者加人參白朮隨宜用之

又方

滑胎易產

阿膠八兩　滑石三兩　車前子一升

右三味爲末飲服方寸匕日再服至生月乃服此藥大利九竅不可先服

催生如聖散 普濟

治難產及漏血胎乾者立效

黃蜀葵子小半合

右研爛以酒濾去滓溫服神效如漏血胎乾難產痛極者幷進三服良久腹中氣寬胎滑卽產須見正產候方可服之歌曰黃葵子炒七十粒細研酒調濟君急若遇臨危難產時免得全家俱哭泣

又方 準繩下同

治橫倒生者

明阿膠炒　滑石末各一兩　葵子二兩

右水一盞半煎至一盞去滓分二服

催生柞木飲子

治難產或橫或倒死胎爛服腹中此方屢用神效

大柞木枝一大握長一尺水洗淨寸剉生用

甘草大者五寸剉作五段

右用新汲水三升半同入新磁瓶內以紙三重封緊文武火煎至一升半令香候產婦腰重痛欲坐草時溫服一小盞便覺心下開豁卽生腰未重痛勿服如覺渴再飲一盞至三四盞覺下重便生此方最驗

乳珠丹

一名開骨膏催生神效又治子死腹中

通明乳香細研

右以猪心血爲丸梧子大朱砂爲衣日乾而束服每服一粒催生冷酒化下良久未下再服一粒若大投難產以蓮葉心帶七箇水二盞煎至一盞放溫化下一粒良久未下再服其驗如神如胎下胞衣不下服此便下合藥時要五月五日午時妙或七月七日三月三日及初上辰日及歲除夜亦可

一方滴水丸

又方

治同上

乳香　朱砂各等分

右爲細末麝香酒調下

催生丹 良方

治產婦生理不順產育艱難或橫或逆

十二月兔腦髓去皮膜研如泥　母丁香一錢研

乳香二錢半另研　麝香另研一字

右三味拌勻以兔腦髓和丸雞頭實大陰乾油紙裹每服一丸溫湯下卽產兒握藥出男左女右須臘月合妙一方每服一分半

如意散 準繩下同

臨產腰痛方可服之

人參爲末　乳香各一錢　朱砂二錢

右同研臨產急用雞子清一箇調藥末再用生薑自然汁調開冷服橫產倒產卽時端順子母無恙

勝金散

治人弱產難或因兒轉身將兒枕血塊破碎與胞中敗血壅滯兒身不能便利是以難產急服此散消散其血使兒易生

麝香一錢研　鹽豉一兩以青布裹了燒紅急研細

右取稱鍾燒赤焠酒中以酒調服一錢

行氣催生湯

治妊娠欲產痛陣尚疎難產經三兩日不生胎死腹中或產母氣乏委頓產道乾澀纔覺痛密破水後便可服

蒼朮二兩米泔浸炒　厚枳殼去穰麩炒　桔梗

陳皮去白　芍藥　白芷　川芎　歸尾各一兩
半夏洗　桂去粗皮不見火　粉草　麻黃去節
軍薑去皮　厚朴去粗皮制薑汁炒　白茯苓
南木香不見火　杏仁去皮尖另研各五錢
右爲末每服二錢順流水溫暖調下若熱悶白蜜
湯下或剉散入眞米醋一合煎方內用芍藥肉桂
能開通子宮其餘藥皆助氣之盛關竅自通麻黃
內通陽氣陽氣盛則血行血行即產矣外却寒邪
去積聚皆得其宜寒月用之甚確隆暑不宜輕服
但以五苓散用葵子燈心煎湯調下却暑清魂滑
胎易產胞漿先破則胎乾難產用白蜜清油浸以
熱酒令得所頓服胎氣既潤即分娩矣

又方

治難產

縮砂仁　香附酢炒　枳殼　甘草　滑石
右爲末白湯調服

如聖散

專治孕婦難產

紫蘇葉　當歸各等分
右㕮咀每服三五錢用長流水煎服如無長流水
以水順攪動煎服即下

益元散

治難產

滑石六兩　甘草一錢
右用紫蘇煎湯調下即產

無憂散

一名保產無憂散一名保生無憂散治胎肥氣逆
臨蓐難產

當歸去蘆酒浸　川芎　木香不見火　白芍藥
枳殼去白鹽炒　甘草炙各一錢半　乳香另研
血餘燒存性另研各半錢
右作一服水二鍾煎至一鍾入乳香血餘和勻不
拘時服

催生如聖散良方

一名神應黑散一名催生如神散治逆產橫生瘦
胎凡坐草日久漿水多下則其血必乾子道艱澀
如急水灘須湧水而後可通服此藥再因其血則
如魚得水決自轉生

百草霜　香白芷不見火爲末各等分
右二味研末調勻每服二錢於臨產時以童便井
水半盞入麝香少許同煎上藥一方服此藥後外用
葱二斤研爛鋪於小腹上取急水灘頭沙一斗炒
熱布裹於葱上輕輕略採即產

半夏湯　單方　下同

治胎乾而不能產

半夏麴一兩半　大黃五錢　肉桂七錢半
桃仁三十枚微炒
右爲細末先服四物湯一二服次服半夏湯量三
片水煎

七聖散

臨產腰痛方服

延胡索　沒藥　白礬　白芷　薑黃　當歸
桂心各等分
右爲末臨產陣疼時燒鐸刃鐵即斧令通赤淬酒
調下三錢服一二盃立產

勝金散

治難產逐瘀血即白生若橫逆則轉正子死腹中
則胎轉膨脹即產

王不留行　酸漿草　白芨蔡去刺淨
菟蓈子　五靈脂生各等分
右爲散每服二錢取利方水一盞半入白花劉寄
奴子一撮同煎溫服大效

萬金不傳遇仙丹

治難產

蓖麻子十四粒去殼　硃砂研　雄黃研各錢半
蛇蛻一尺燒存性
右爲末漿水飯和丸如彈子大臨產時先用椒湯
淋漉臍下次安藥一丸於臍中用蠟紙數重覆上
闊帛束之頭生下急取去藥一丸可用三次一方
用蓖麻子三粒一方用蓖麻子三粒巴豆四粒去
殼入麝香研細貼臍中歌曰三麻四粒脫衣裳研
碎將來入麝香若有婦人遭產難貼在臍中兩分
張

加味芎歸湯

一名龜殼散主交骨不開不能生產及產難日久
垂死者
川芎　當歸各一兩　自死龜板一枚酥炙
婦人頭髮生男女多者一握燒存性
右爲散每服五錢水煎服約人行五里即生如胎

死亦下灼過龜板亦可

烏金散

治難產熱病胎死腹中或因顛仆或從高墜下或房室驚擾或臨產驚動太早觸犯禁忌或產時未到經血先下惡露已盡致胎乾子死身冷不能自出但視產婦面赤舌青是其候也面青舌赤母死子活唇青吐沫子母俱斃又有雙胎或一死一活其候難知臨時觀變可也

熟地黃洗切焙乾酒炒　眞蒲黃　大當歸　炙甘草　桂　楊芍藥　軍薑去皮　粉草各一兩

小黑豆四兩　百草霜五錢

右爲末每服二錢米酢半合許沸湯六七分溫服如疑貳之際且進佛手散酒水合煎二三服探之若未死子母俱安若胎已死立便逐下的知其胎死進此藥後更進香桂散須臾如手推下常用催生更加好滑石末半兩葵子五十粒搥碎黃柞葉七八片葱白二寸順流水煎湯調下蓋滑石能利小便柞葉行氣逐血葱白內通陽氣氣盛血行即產矣

下死胎方

治妊娠三五箇月胎死在腹內不出

大腹子　赤芍　榆白皮各三兩　當歸一兩炒

滑石末七錢半　薏苡　葵子炒　茯苓　粉草子苓各半兩

右爲粗末每服四錢水一盞煎至七分去滓不拘時溫服

又方

治子死腹中或半生不下或半著脊骨在草不產血氣上盪母心面無顏色氣欲絕

猪脂一斤　白蜜一升　淳酒二升

右三味合煎取二升分溫二服不能飲隨所能服之

一字神散

治子死胎不下胞破不生此方屢效救人無量

鬼臼黃色者不拘多少去毛研爲末極細如粉不用羅以手指撚之

右每服三錢用無灰酒一盞同煎至八分通口服立效如神

又方

治生產不順胎死腹中胞衣不下臨產危急妙

蛇蛻一條全者香油燈上燒研　麝香少許

右爲末童便酒各半盞調一服即生效

兎腦丸（八門）

治產難日久血乾用此滑之

臘月兎腦髓　雄鼠內腎各一部　母丁香

益母草各一錢　乳香二錢半　麝香二分半

右爲末兎腦和丸芡實大朱砂爲衣油紙裹陰乾每一丸酒湯下即產男左手女右手拳藥出

小營煎（景岳全書下同）

治胞衣不出臨月服之易生

當歸　白芍藥炒　山藥　枸杞子各一錢

炙甘草一錢　熟地二三錢

水二鍾煎七分食遠溫服

胞花煎

凡臨盆將產者宜先服此藥催生最佳并治難產經日或死胎不下俱妙

當歸七八錢或一兩　肉桂一二三錢　川芎

牛膝各二錢　車前子錢半　紅花一錢（催生不用亦可）

水二鍾煎八分熱服或服後飲酒數盃亦妙若胎死腹中或堅滯不下者加朴硝三五錢即下

單方

難產日久漿水下多胞乾兒不得下香油白蜜各一椀火上煎微沸調滑石末一兩攪服之外以油蜜塗母臍腹上即驗（醫鑑）

死胎著脊不下氣欲死猪脂白蜜各一升醇酒二升合煎取二升分溫兩服即下（良方）

死胎不下用黃牯牛糞熱塗母腹上即出（正傳）

胞衣不下用童尿一升生薑葱白各三錢煎數沸熱服之（本草）

又方以葱白濃煎湯熏洗下部即下（俗方）

妊娠熱病胎死腹中用鹿茸屑一兩水一盞葱白五莖豆豉半合同煎至六分去滓分溫二服（葬經）

婦人橫逆難產子死腹中先用黑豆一大合炒熟水與童便合煎服神效

逆生兒脚先出取其父名書兒足下即順生

橫生用蒯絲子爲末酒調服一錢七米飲調亦得又方加車前子等分

難產用香油白蜜小便和勻各半盞調益母草末服

即下本草下同

難產五六日不得分娩疲困虛乏用光明水膠二兩微火焙好酒一斤半煎滾入膠候烊再入新雞子一枚鹽一錢七攪勻放溫令產母坐椅上伸腰大口作二次服覺小腹重即生

又方取本夫裩帶五寸燒存性酒調服下

難產及胞衣不下鷄子三枚破入酢攪服立產

催生落胞并產後惡血不下兔頭骨和毛髓燒爲灰作末酒下一錢妙

難產催生猫頭骨兔頭骨各一箇火煅研爲末每二錢苧藍湯煎水調下即產狸頭骨尤妙傳正

又方清油白蜜等分以猪肝煮水調服即效入門

又方柑橘瓤陰乾燒存性研末溫酒服二錢集效方

又方鴈布袋一張蛇蜕一條入新瓦中以鹽泥固煅爲末以榆白皮湯調服集成方

又方眞珠末一兩酒服立出千金下同

胞衣不下眞珠一兩研末苦酒服

子死腹中眞珠末二兩酒服立出外臺

難產催生用龜甲燒末酒服方寸匕本草

又方柱末加麝香少許酒下比之水銀等藥不損人何氏方

臨產之初先脫產婦尋常所穿衣以籠竈頭及竈口則易產勿令產母知孕婦方下同

又方取赤馬皮鋪之令產母坐其上則催生易產

又方取驢皮毛即飛生也產母手持之即產

又方海馬兩手各把一枚即驗本草

橫生逆產胞衣不下用蛇蜕炒焦爲末向東酒服一刀圭即順

又方用鹽泥將蛇蜕固煅研二錢榆白湯服博救方

婦人難產蛇蜕泡水浴產門自易寶鑑

胞衣不下取本婦手足爪甲燒灰酒服即令有力婦人抱起將竹筒於臍前趕下聖惠

產難魚膠五寸燒存性研末酒服方寸匕立出海上方

又方蜂蜜眞麻油各半椀煎減半服立下海上方

又方路旁破草鞋鼻子燒灰酒服集元方

胎死不下斛硝細末半兩童便調服即效焰硝亦可

難產孕婦臨產兩手各把石燕一枚立驗本草下同

產前產後百病難產及死胎胎衣不下搗莞蔚汁一小盞和酒一合溫服

婦人胎衣不下取宅中柱下土研末雞子清和服之

姊人難產取土蜂兒窠水泡湯飲之取時逢單是男逢雙是女婦人良方

死胎在腹及胎衣不下取蟻封土炒三升囊盛搦心下自出藏器

婦人難產取猪槽上垢土一合和麪半升烏豆二十粒煮汁服之本草下同

婦人將產井華水服半升不作運千金

婦人盤腸生產腸乾不上者以磨刀水潤腸煎好磁石湯一盃溫服自然收上肘後方

婦人難產墨一寸末之水服立瘥肘後方

盤腸生產產時子腸先出產後不收者名盤腸產以半夏末頻搐鼻中則上也婦人良方

橫生逆產用夫陰毛二七莖燒研猪膏和丸大豆大吞之千金

婦人難產牛屎中大豆一粒劈作兩片一書父一書子仍合住水吞之立產產寶

又方鍾馗左脚燒灰水服簡便方

又方用箭幹三寸弓弦三寸燒灰酒服小品方

胎動上逼心痛用弩弦繫帶之立下集要

胎滑易產弓弩弦燒末酒服二錢續十全方

胞衣不出水煮弓弩弦飲汁五合或燒灰酒服千金

姙娠胎死不出及胞衣不下產後諸疾狠狽者刺羊血熱飲一小盞極效聖惠方

橫生逆產及子死腹中母氣欲絕伏龍肝末三錢水調下博救方

又方用竈中心對鍋底土研細每服一錢酒調下仍搽母臍中本草

又方眞丹塗兒足下

又方用雜草燒錢鐳白芷等分爲末每服三錢童尿米酢各半和服見效救急方

婦人難產及胞衣不下或用鐵杵或鐵秤錘或鐵斧燒赤淬酒服之自下本草下同

又方或取鐵銃燒紅淋酒入內空中流出乘熱飲之即產

又方取大刀環燒赤淬酒一盃服之

橫生逆產取布鍼二七枚燒赤淬酒七遍服之

又方鹽摩產婦腹并塗兒足底急爪搔之千金

又方芒硝末二錢童子小便溫服無不效者信效方

婦人難產臨時取馬銜持之併煮汁服一瑒開寶

又方經日不生雲母粉半兩溫酒調服入口即產不順者即順萬不失一陸氏云此是何德陽方也已救三五十人（積德堂方）

橫生倒產人參末乳香末各一錢丹砂末五分研勻雞子白一枚入生薑自然汁三匙和勻冷服即母子俱安神效（本草）

倒產子死不出及胎乾不能產當歸末酒服方寸匕或紫蘇湯調服亦可（子母秘錄）

產難胎死橫生倒生用當歸三兩芎藭一兩爲末先以大黑豆炒焦入流水一琖童便一琖煎至一琖分爲二服未效再服（本草下同）

又方用彈丸土熱酒服一錢（本草綱目）

產難催生鳳仙子二錢研末水服勿近牙外以蓖麻子隨年數搗塗足心下（集簡方）

又方益母草搗汁七大合煎減半頓服立產無新者以乾者一大握水七合煎服（獨行方下同）

難產胎在腹中并胞衣不下及胎死者蒺藜子貝母各四兩爲末米湯服三錢少頃不下再服（梅師方）

婦人逆產以手中指取釜下墨交畫兒足下即順（千金）

產婦催生蒲黃地龍洗焙陳橘皮等分爲末另收臨時各抄一錢新汲水調服立產此常用甚妙（唐愼微方）

胞衣不下蒲黃二錢井水調服之（集驗方）

婦人產難雙頭蓮一名催生草左手把之即生

胎死腹中清麻油蜜等分入湯頓服（普濟方）

漏胎難產因血乾澀也用清麻油半兩好蜜一兩同煎數十沸溫服胎滑即下他藥無益以此助血爲效（胎產須知）

催生去胎芫花根剝皮以綿裹點麝香套入陰穴三寸即下（攝生妙用方）

又方馬錢子研膏納入牝戶三四寸（集簡方）

臨月滑胎牽牛子一兩赤土少許研末覺胎轉痛時白榆皮煎湯下一錢

胞衣不下苦蔞實一箇取子研末以酒與童子小便各半錢煎七分溫服無實用根亦可（婦人良方）

婦人難產白芷五錢水煎服之（經驗方）

催生令易產用大麻根以水濃煎取汁頓服立產胞衣不下亦妙

又方取麥蘖一兩水煎服即下

又方人溺一升入葱薑各一分煎二三沸熱飲之便下（日華）

橫生倒產葵花爲末酒服方寸匕（千金）

胎臟乾澀難產用黃葵花焙研末熱湯調服二錢

臨產催生以黃蜀葵子四十九粒研爛溫酒服之良久即產

又方用子焙三錢井華水服無子用根煎汁服

胎死不下黃葵花焙研末紅花酒下二錢

產難用臘月兔血以蒸餅染之紙裹陰乾爲末每服二錢乳香湯下（指迷方）

催生用臘月兔腦髓一箇攤紙上夾勻陰乾剪作符字於面上書生字一箇候母痛極時用釵股夾定燈上燒灰煎丁香酒調下（博濟方）

又方臘月取兔腦髓一箇塗紙上陰乾入通明乳香末二兩同研令勻於臘日前夜安桌子上露星月下設茶果齋戒焚香望北拜告曰奉道弟子某修合救世上難生婦人藥願降威靈佑助此藥速令生產禱畢以紙包藥露一夜天未明時以猪肉搗和丸芡子大紙袋盛懸透風處每服一丸溫酢湯下良久未下更用冷酒下一丸即瘥乃神仙方也（經驗方）

易產取鼠燒末井華水服方寸匕日三

婦人難產三日不出車軸脂吞大豆許二丸

婦人逆產車缸膏畫兒脚底即正（開寶）

滑胎易產車前子爲末酒服方寸匕不飲酒者水調服（婦人良方）

橫產不出車前子爲末酒服三錢（子母秘錄）

橫生難產重陽日取高粱根名五爪龍陰乾燒存性研末酒服二錢即下（本草）

又方臨時細嚼滇南馬檳榔數枚井華水送下須臾立產再以四枚去殼兩手各握二枚惡水自下也欲斷產者常嚼二枚水下久則子宮冷自不孕矣

蕓薹菜子治產難歌云黃金花結粟米實細研酒下十五粒靈丹功效妙如神難產之時能救急

又方用乳香以五月五日午時令一人在壁內捧乳鉢一童子在壁外以筆管自壁縫中逐粒遞過入鉢內研細水丸芡子大每服一丸無灰酒下（經驗方）

又方用明乳香一豆大爲末新汲水一盞入酢少許令產婦兩手捉石燕念慮藥三遍乃飲之略行數步即下（聖惠）

難產催生蓮花一葉書人字吞之即易產（肘後方）

臨產催生羚羊角一枚刮尖末酒服方寸匕（產寶）

臨月易產榆皮焙爲末臨月日三服方寸匕令產極易（本草別說）

婦人難產用赤小豆生吞七枚佳

又方治難產累日氣乏不能生兼惡露出盡胞乾終不產者用赤小豆一升以水九升煮取汁入炙過黃阿膠一兩同煎少時一服五合不過三四服即生

又方取槐樹東引枝令孕婦手抱之即易生（子母秘錄）

婦人難產皂角子二枚吞之（千金方）

又方桃仁一箇劈開一片書可字一片書出字吞之即生（婦人良方）

催生下胎不拘生胎死胎蓖麻二箇巴豆一箇麝香一分研貼臍中井足心（集簡方下同）

又方下生胎一月一粒溫酒吞下

子死腹中不出朱砂一兩水煮數沸爲末酒服立出（博濟方）

子死腹中雞子黃一枚薑汁一合和服當下（本草）

子死腹中以夫尿二升煮沸飲之（千金）

子死腹中雌雞糞二十一枚水二升五合煮之下米作粥食（產寶）

子死腹中雄鼠糞二七枚水三升煮一升取汁作粥食胎即下

胎死腹中或母病欲下胎榆白皮煮汁服二升（子母秘錄）

子死腹中或產經數日不下瞿麥煮濃汁服之（千金）

胎衣不下惡血衝心用五靈脂半生半炒研末每一服二錢溫酒下（產寶方）

胎死腹中新汲水磨金墨服之（普濟方）

妊娠胎死蟹螯一枚燒研水服即下（廣利方）

熱病胎死紅花酒煮汁飲二三盞（熊氏補遺）

子死腹中及胎衣不下水牛屎塗腹上良（產寶）

又方烏雞一隻去毛以水三升煮二升去雞用煎汁摩臍下自出（婦人良方下同）

生胎欲去牛膝一握搗以無灰酒一瓦煎七分空心服仍以獨根土牛膝塗磨香插入牝戶中

胎死腹中不出其母氣已絕取水銀二兩吞之立出（本草）

子死腹中及胞衣不下用三家雞卵各一枚三家鹽各二撮三家水各一升同煮令婦東向飲之仍探口令嘔即下（千金方）

子死腹中及胎衣不下取本婦鞋底炙熱熨腹上下二七次即下（集元方）

下胎生附子爲末醇酒和塗石足心胎下去之

胎衣不下亂頭髮燎結口中（眞人方）

又方好墨溫酒服二錢（附後方）

又方荷葉炒香爲末每服方寸匕沸湯或童便調下或燒灰或煎汁皆可

又方生地黃汁一升苦酒三合相和煖服（必效方）

又方鹿角屑三分爲末薑湯調下（產乳）

胞衣不下腹滿則殺人猪脂一兩水一盞煎五七沸服之當下（聖惠）

又方取洗兒湯一瓦服之即下勿令知之（本草下同）

又方用篦下土一寸酢調納臍中續服甘草湯三四合（產寶）

又方用赤小豆男七枚女二七枚東流水吞服之（救急方）

胞衣不下及產後卒有別病欲狠須以水入酢少許噀面神效（本草）

又方用胡麻生搗笮取油飲之即下（正傳下同）

又方大豆半升醇酒三升煮一升半分三服（產書）

又方螻蛄一枚水煮二十沸灌入喉即出（延年方下同）

又方牛膝八兩葵子一合水九升煎三升分三服

又方取井底泥雞子大井華水服即下（集元方）

又方以雞子一枚取清吞之

又方以本婦襆覆井上或以所著衣籠蓋上俱勿令產母知之立下（千金方）

下鬼胎取神麴末二錢和水服或濃煎取汁服

鍼灸

千金方曰難產針兩肩井入一寸瀉之須臾即分娩

催生難產及死胎刺太衝八分百息合谷並補之

三陰交五分瀉立時分解又灸足小指節三壯

產子上衝逼心針巨闕令正坐用抱頭抱腰微偃針入六分當七呼得氣即瀉立甦如子掬母心生下手心有針痕子頂母心人中有痕向後枕骨有痕是其驗也神效或合谷三分留三呼補之三陰交五分瀉十呼

橫產難產右脚小指尖頭灸三壯立產

又法獨陰同上法取灸七壯禁刺合谷補之三陰交瀉之

小腹大宇難盬乾嗜飲俠臍痂刺中封入四分灸三壯穴在踝前一寸半伸足取之

宇難若胞衣不出泄風從頭至足刺崑崙入五分灸三壯穴在足外踝後跟骨上

乳難子上搶心若胞不出衆氣盡亂腹中絞痛不得反息正仰臥屈一膝伸一膝並氣衝針上入三寸氣

至瀉之穴在歸來下二寸動脈應手
乳難子上衝心陰痂刺衝門入七分灸五壯穴在府舍下上去大橫五寸
醫學入門曰通經催生俱瀉合谷三里至陰三穴處者補合谷瀉至陰
死胎不下瀉三陰交
胞衣不下瀉照海內關
難産及胞衣不下於右脚小指頭上卽至陰穴灸之
灶如小麥大三五壯立下
古今醫統曰産婦用力努出肛門灸百會穴自愈

醫案

史記倉公傳曰菑川王美人懷子而不乳來召臣意臣意往飲以莨菪藥一撮以酒飲之旋乳臣意復診其脈而脈躁躁者有餘病卽飲以消石一劑出血血如豆比五六枚
舜堅志云政和中蔡魯公之孫婦有孕及期而病國醫皆以爲陽證傷寒懼胎墮不敢投以凉劑張銳至視之曰兒處胎十月將産矣何藥之能敢卽以常法與藥且使倍服之半日而兒生病亦失去明日其婦大泄而喉閉不入食衆醫復指其疵且曰二疾如冰炭又産蓐甫近難司命無如之何矣張曰無庸憂也將使卽日愈乃取藥數十粒使吞之咽喉卽通下泄亦止及滿月魯公酌酒爲壽曰君術通神吾不敢知敢問一藥而愈二疾何也張曰此於經無所載特以意處之向者所用藥乃附子理中丸裹以紫雪爾方喉閉不通非至寒藥不爲用既以下嚥則消釋無餘其得至腹中者附子力也故一服而兩疾愈公大加嘆異
儒門事親曰武安胡産祥之妻臨難月病喘以凉膈散二兩四物湯二兩砒硝一兩分作二服煎令令服之一服病減大半次服病痊矣産之後第六日血迷又用凉膈散二兩四物湯二兩砒硝一兩都作一服大下紫黑水其人至今肥健戴人常曰孕婦有病當十月九月內砒硝無碍八月者當忌之七月卽無妨謂陽月也十月者已成形矣
一孕婦年二十餘臨産召穩婆三人其二婆極拽婦之臂其一婆頭抵婦之腹更以兩手扳其腰極力爲之胎死於腹良久乃下兒亦如血乃穩婆殺之也豈知瓜熟自落何必如此乎其婦因茲繇脈斷閉腹如刀劍大渴不止小溲閉絕主病者禁水不與飲口舌枯燥牙齒黧黑臭不可聞食飲不下昏憒欲死戴人先以冰雪水恣意飲之約二升許痛緩渴止次以舟車丸通經散前後五六服下數十行食大進仍以柞苓甘露散六一散柴胡飲子等調之半月獲安
一婦人臨産召村媼數人侍焉先産一臂出媼不識輕重拽之臂爲之斷子死於腹其母面青身冷汗襲黎不絕時微喘鳴呼病家甘於死忽有人曰張戴人有奇見試問之戴人曰命在須臾針藥無及急取杵鉤續以壯繩以膏塗其鉤令其母分兩足向外偃坐左右各一人脚上立足次以鉤鉤其死胎命一壯力婦倒身拽出死胎下敗血五七升其母昏困不省待少頃以冰水灌之漸咽二口大醒食進次日以四物湯調血數日方愈戴人常曰産後無他事因侍媼非其人轉爲害耳
醫學綱目曰陳良甫治一婦人有孕七箇月遠歸忽然胎上衝心而痛坐臥不安兩醫治之無效遂說胎已死矣用蓖麻子研爛加麝香調貼臍上以下之命在垂亡召陳診視兩尺脈絕他脈平和陳問二醫作何證治之答曰死胎也陳曰何以知之曰兩尺脈沉絕以此知之陳曰此說出何經二醫無答陳曰此子懸也若是胎死却有辨處面赤舌青子死母活面青舌赤唾沫母死子活唇口俱青母子俱死今面不赤口不青其子未死是胎上逼心宜以紫蘇飲子治之至十服而胎遂下矣
薛己醫按曰一妊婦腹脹小便不利吐逆諸醫雜進溫胃寬氣等藥服之反吐轉加脹滿湊心驗之胎死已久服下死胎藥不能通因得鯉魚湯其論曰妊婦通身腫滿或心胃急脹名曰胎水遂去妊婦胃前看之胃脘不分急以鯉魚湯三五服大小便皆下慈水腫消脹去方得分娩死胎此證蓋因懷妊腹大不自知覺人人皆謂妊娠孕如此終不知胎水之患也
一姬婦五月服剪紅丸而胎墮及腹脹痛乃服破血之劑痛益甚手不敢近余曰此峻藥重傷脾胃也用

八珍倍加參芪半夏乳香沒藥二劑而痛止數劑而安

荊婦孟冬分娩艱難勞傷元氣產子已死用油紙撚燒斷臍帶藉其氣以煖之俄頃忽作聲此兒後無傷食作瀉之證可見前法之功不誣世用刀器斷臍帶子母致危者竟不知其由矣且穩婆又喜平日常施小惠得其用心衆以安慰母懷故無虞耳一穩婆云我止有一女正分娩時適當巡街侍御行牌取我親其室分娩女因驚駭未產而死後見侍御更以威顏分付迨親產母胎難順而頭偏在一邊以致難產因畏其威不敢施手由是其子母俱不能救

地官李孟卿娶三十五歲女爲繼室妊娠慮其難產索加味歸芎湯四劑備用果產門不開止服一劑頓然分娩

上舍費懷德之室產門不開兩日未生服前藥一劑即時而產懷德傳服此方用者無有不驗

一婦人分娩最難至四十妊娠下血甚多產門不開與前湯一劑又以無憂散斤許煎熟時時飲之以助其血而產

一穩婆之女勤苦負重妊娠腹中陰冷重墜口中甚穢余意其胎已死令親其舌青黑與矾硝半兩許服之化下穢水而安

一婦人胎死服矾硝下穢水敗體倦怠氣息奄奄用四君子爲主佐以四物薑桂調補而愈

一婦人胞衣不出胃腹脹痛手不敢近用滾酒下失笑散一劑惡露胎衣並下

一產婦胎衣不出腹作痛手按痛稍緩此氣虛而不能送出也用無憂散而下前證常詢諸穩婆云宜服益母草丸或就以產婦頭髮入口作嘔胎衣自出其胎衣不出必死授與前法甚效

證治準繩曰經歷哈散侍人病喘不得臥衆作肺氣受風邪治之呂滄洲診之氣口盛於人迎一倍厥陰弦動而疾兩尺俱短而離經因告之曰病蓋得之毒藥動血以致胎死不下奔迫而上衝非風寒作喘也乃用催生湯加芎歸煑二三升服之夜半果下一死胎喘即止哈散密囑曰病妾誠有懷以室人見嫉故藥去之衆所不知也衆慚而去

一婦產七日而子不下百治不效龐安常視之令其家人以湯溫其腰腹自爲上下拊摩孕者覺腸胃徹痛呻吟間生一男其家驚喜而不知所以龐曰兒已出胞但一手誤執母腸不能脫非符藥所能爲吾隔腹捫兒手所在針其虎口痛即縮手所以遂生無他術也取兒視之右手虎口針痕存焉

一婦產累日不下服催生藥不效龐安常曰此必坐草太早心下懊憹氣結而不行非不順也素問云恐則氣下蓋恐則精神怯怯則上焦閉閉則氣逆逆則下焦脹氣乃不行矣以紫蘇飲一服便產又治婦人子懸證

一婦難產七日而不乳且食甚少滑伯仁視之以凉粥一盂搗楓葉煎湯調啖之旋乳或詰其理滑曰此婦食甚少未有無穀氣而生者夫楓葉先生先落後生後落故以作湯飲之

一婦難產三日不下服破血行經之藥俱罔效吳茭山因製一方以車前子爲君冬葵子爲臣白芷枳殼爲佐使已服午產衆醫異之吳曰本草謂催生以此爲君毛詩註云采采芣苢以防產難是也

一府判女產不利已斂劉復其令取紅花濃煎扶女於凳上以綿帛蘸湯盒之連以澆帛上以器盛水又煖又淋久而甦醒遂生男子蓋遇嚴冬血冷凝滯不行溫即產見亦神矣哉

一醫宿客店值店婦產數日不下下體已冷無藥甚窘以椒橙茱萸等煎湯可下手則和臍腹入門處皆淋洗之氣溫血行遂產

一婦將臨月忽然兩目失明不見燈火頭痛肚邊項腮腫滿不能轉頸諸治不瘥反加危困偶得消風散服之病減七八獲安分娩其服弔起人物不辨乃以四物湯加荊芥防風更服眼科天門冬飲子二方間服目漸稍明大忌酒麪煎炙鷄羊鵝鴨豆腐辛辣熱物幷房勞此證因懷妊多居火間衣著太煖伏熱在內或酒麪炙煿太過以致胎熱也

一婦有胎四月墮下逾旬腹腫發熱氣喘脉洪盛面赤口鼻舌青黑陳斗嵓診之曰脉洪盛者胎未墮也面赤心火盛而血乾也舌青口鼻黑肝既絕而胎死矣內外皆曰胎墮久矣復診色脉如前以蛇蛻煎湯下平胃散加芒硝歸尾一倍服之須臾腹鳴如雷腰腹陣痛下一死胎病亦尋愈

廣嗣紀要曰師在鄭陽值鄖縣知縣一婢臨月患口眼喎斜腰背反張手足攣曲不省人事請師治之用黃連解毒湯加朱砂末幹開口灌之少定其夜生一男產後病九昏迷不省以七珍湯與之即安

寓意草曰顧季掖乃室仲夏時孕已五月偶爾下血

醫以人參阿膠勉固其胎又經一月身腫氣脹血逆上奔結聚於會厭胃膈間食飲纖入觸之痛楚轉下甚艱稍急即連粒嘔出全如噎證醫更數手咸以爲胎氣上逼脾虛作腫而成膈噎也用人參之補五味之收爲治延至白露節計孕期已八月而病造極中之極呼吸將絕始請余診毫不洩露病狀其脉尺部微濇難推獨肺部脉洪大無倫其喘聲如曳鋸其手臂青紫腫亮似毆傷色余駭曰似此凶證何不早商季掖曰昨聞黃咫旭乃室有孕而膈噎得遇良治而愈是以請救但內子身腫氣急不識亦可療否余曰此證吾視若懸鑑不必明言以滋驚恐姑以善藥一二劑投之通其下閉上壅可也季掖必求病名余曰上壅者以肺脉之洪大合於會厭之結塞知其肺當生癰也下閉者以尺脉之微濇合於肉色之青腫知其胎已久壞也善藥者瀉白散加芩桔之苦以開之不用硝黃等藥也服一大劑腹即努痛如欲產狀季掖曰產乎余曰肺氣開而下行數時閉拒惡穢得出可也癸產之云再進一劑身腫稍退上氣稍平下白污如膿者數斗裹朽胎而出旬餘尚去白污並無點血相間可知胎朽腹中已近百日蔭胎之血和胎俱化爲膿也病者當時胃膈即開連連進粥神思清爽然朽胎雖去而穢氣充斥周身爲青腫者未去也胃膈雖寬而肺氣壅遏爲寒熱欬嗽者未除也余認眞一以清肺爲主旬餘果獲全痊

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百十卷目錄
醫部彙考三百九十
婦人產後門一
張機金匱要略 產後總論
王叔和脈經 產後傷寒
脈訣 產後傷寒
孫思邈千金方 產後虛損 漏血 飲食所宜 中風
朱肱活人書 產後暴病藥方法
陳自明婦人良方 調理法 血逆 產後雜治 子淋 產後中風 心痛
產後虛煩 產後下利 產後口瘡 產後口乾 產後咽痛 產後目病 產後耳病 產後鼻病 產後齒病 產後舌病 產後咽喉病 產後頭痛 產後身痛 產後手足痛 產後腰痛 產後小腹痛 產後陰戶痛 產後大便難 產後小便難 產後小便不通 產後小便出血 產後下血 產後血崩 產後血暈 產後血痛 產後血閉 產後血淋 產後血塊 產後血風勞 產後心煩悶 產後風虛冷勞 產後寒熱 產後咳嗽 產後喘急 產後痰飲 產後嘔吐 產後噦 產後惡心 產後不食 產後不眠 產後多睡 產後驚悸 產後健忘 產後發狂 產後鬼祟 產後蓐勞 產後腹痛 產後腹脹滿 產後腹冷痛 產後腹堅痛 產後腹中有塊 產後腹中有物 產後腹中有蟲 產後腹中有水 產後腹中有氣 產後腹中有血 產後腹中有痰 產後腹中有宿食 產後腹中有寒 產後腹中有熱 產後腹中有虛 產後腹中有實 產後腹中有風 產後腹中有病 產後腹中有痛 產後腹中有脹滿 產後腹中有堅痛 產後腹中有塊痛 產後腹中有物痛 產後腹中有蟲痛 產後腹中有水痛 產後腹中有氣痛 產後腹中有血痛 產後腹中有痰痛 產後腹中有宿食痛 產後腹中有寒痛 產後腹中有熱痛 產後腹中有虛痛 產後腹中有實痛 產後腹中有風痛 產後腹中有病痛 產後腹中有痛痛 產後腹中有脹滿痛 產後腹中有堅痛痛 產後腹中有塊痛痛 產後腹中有物痛痛 產後腹中有蟲痛痛 產後腹中有水痛痛 產後腹中有氣痛痛 產後腹中有血痛痛 產後腹中有痰痛痛 產後腹中有宿食痛痛 產後腹中有寒痛痛 產後腹中有熱痛痛 產後腹中有虛痛痛 產後腹中有實痛痛 產後腹中有風痛痛 產後腹中有病痛痛 產後腹中有痛痛痛 產後腹中有脹滿痛痛 產後腹中有堅痛痛痛 產後腹中有塊痛痛痛 產後腹中有物痛痛痛 產後腹中有蟲痛痛痛 產後腹中有水痛痛痛 產後腹中有氣痛痛痛 產後腹中有血痛痛痛 產後腹中有痰痛痛痛 產後腹中有宿食痛痛痛 產後腹中有寒痛痛痛 產後腹中有熱痛痛痛 產後腹中有虛痛痛痛 產後腹中有實痛痛痛 產後腹中有風痛痛痛 產後腹中有病痛痛痛 產後腹中有痛痛痛痛 產後腹中有脹滿痛痛痛 產後腹中有堅痛痛痛痛 產後腹中有塊痛痛痛痛 產後腹中有物痛痛痛痛 產後腹中有蟲痛痛痛痛 產後腹中有水痛痛痛痛 產後腹中有氣痛痛痛痛 產後腹中有血痛痛痛痛 產後腹中有痰痛痛痛痛 產後腹中有宿食痛痛痛痛 產後腹中有寒痛痛痛痛 產後腹中有熱痛痛痛痛 產後腹中有虛痛痛痛痛 產後腹中有實痛痛痛痛 產後腹中有風痛痛痛痛 產後腹中有病痛痛痛痛 產後腹中有痛痛痛痛痛 產後腹中有脹滿痛痛痛痛痛 產後腹中有堅痛痛痛痛痛 產後腹中有塊痛痛痛痛痛 產後腹中有物痛痛痛痛痛 產後腹中有蟲痛痛痛痛痛 產後腹中有水痛痛痛痛痛 產後腹中有氣痛痛痛痛痛 產後腹中有血痛痛痛痛痛 產後腹中有痰痛痛痛痛痛 產後腹中有宿食痛痛痛痛痛 產後腹中有寒痛痛痛痛痛 產後腹中有熱痛痛痛痛痛 產後腹中有虛痛痛痛痛痛 產後腹中有實痛痛痛痛痛 產後腹中有風痛痛痛痛痛 產後腹中有病痛痛痛痛痛 產後腹中有痛痛痛痛痛痛 產後腹中有脹滿痛痛痛痛痛痛 產後腹中有堅痛痛痛痛痛痛 產後腹中有塊痛痛痛痛痛痛 產後腹中有物痛痛痛痛痛痛 產後腹中有蟲痛痛痛痛痛痛 產後腹中有水痛痛痛痛痛痛 產後腹中有氣痛痛痛痛痛痛 產後腹中有血痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痰痛痛痛痛痛痛 產後腹中有宿食痛痛痛痛痛痛 產後腹中有寒痛痛痛痛痛痛 產後腹中有熱痛痛痛痛痛痛 產後腹中有虛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有實痛痛痛痛痛痛 產後腹中有風痛痛痛痛痛痛 產後腹中有病痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有脹滿痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有堅痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有塊痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有物痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有蟲痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有水痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有氣痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有血痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痰痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有宿食痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有寒痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有熱痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有虛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有實痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有風痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有病痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有脹滿痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有堅痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有塊痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有物痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有蟲痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有水痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有氣痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有血痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痰痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有宿食痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有寒痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有熱痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有虛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有實痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有風痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有病痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有脹滿痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有堅痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有塊痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有物痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有蟲痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有水痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有氣痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有血痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痰痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有宿食痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有寒痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有熱痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有虛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有實痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有風痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有病痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有脹滿痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有堅痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有塊痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有物痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有蟲痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有水痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有氣痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有血痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痰痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有宿食痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有寒痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有熱痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有虛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有實痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有風痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有病痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有脹滿痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有堅痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有塊痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有物痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有蟲痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有水痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有氣痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有血痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痰痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有宿食痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有寒痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有熱痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有虛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有實痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有風痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有病痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有脹滿痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有堅痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有塊痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有物痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有蟲痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有水痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有氣痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有血痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痰痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有宿食痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有寒痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有熱痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有虛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有實痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有風痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有病痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有脹滿痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有堅痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有塊痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有物痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有蟲痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有水痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有氣痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有血痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痰痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有宿食痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有寒痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有熱痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有虛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有實痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有風痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有病痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有脹滿痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有堅痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有塊痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有物痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有蟲痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有水痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有氣痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有血痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痰痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有宿食痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有寒痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有熱痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有虛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有實痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有風痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有病痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有脹滿痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有堅痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有塊痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有物痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有蟲痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有水痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有氣痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有血痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痰痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有宿食痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有寒痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有熱痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有虛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有實痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有風痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有病痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有脹滿痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有堅痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有塊痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有物痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有蟲痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有水痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有氣痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有血痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痰痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有宿食痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有寒痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有熱痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有虛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有實痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有風痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有病痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有脹滿痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有堅痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有塊痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有物痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有蟲痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有水痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有氣痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有血痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痰痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有宿食痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有寒痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有熱痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有虛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有實痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有風痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有病痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有脹滿痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有堅痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有塊痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有物痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有蟲痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有水痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有氣痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有血痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痰痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有宿食痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有寒痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有熱痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有虛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有實痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有風痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有病痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有脹滿痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有堅痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有塊痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有物痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有蟲痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有水痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有氣痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有血痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痰痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有宿食痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有寒痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有熱痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有虛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有實痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有風痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有病痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有脹滿痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有堅痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有塊痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有物痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有蟲痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有水痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有氣痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有血痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痰痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有宿食痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有寒痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有熱痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有虛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有實痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有風痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有病痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有脹滿痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有堅痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有塊痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有物痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有蟲痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有水痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有氣痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有血痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有痰痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有宿食痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有寒痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛 產後腹中有熱痛

弓反張名曰蓐風則是其犯候也若有角弓命同轉燭凡百女人宜素思之苟或在微不愼戲笑作病一朝困臥控告無所縱多出財寶遍處求醫醫者未必解此縱多醫來大命已去何處追尋學者於此一方大須精熟不可同於常方耳特忌上厠便利宜室中盆上佳

凡產後滿百日乃可合會不爾至死虛羸百病滋長愼之

凡婦人背患風氣臍下虛冷由產後行房太早故也

凡產後七日內惡血未盡不可服羊肉湯候臍下塊散乃進羊肉湯有痛甚切者不在此例後三兩日消息可服澤蘭丸比至月滿丸盡爲佳不爾虛損不可平復全極消瘦不可救者服五石澤蘭丸凡在蓐必須服澤蘭丸補之服法必七日外不得早服也

凡婦人因暑月產乳取涼太多得風冷腹中積聚百病競起迄至於老百方治不能瘥桃仁煎主之出蓐後服之婦人縱令無病每至秋冬須服一兩劑以至年內將常服之佳

漏血

治漏血不止或新傷胎及產後餘血不消作堅使胞門不閉淋瀝去血經歸日月不止者未可與諸斷血湯且宜與牡丹丸散等待堅血消便停也堅血消者所去淋瀝便自止亦漸變少也此後有餘傷毀不復處此乃可作諸主治耳

飲食所宜

凡產婦愼食熱藥熱麪食常識此飲食當如人肌溫溫也

中風

凡產後角弓反張及諸風病不得用毒藥惟宜單行一兩味亦不得大發汗特忌轉瀉吐利必死無疑大豆紫湯產後大喜

宋朱肱活人書

產後用藥方法

婦人產後寒熱往來心胷煩滿骨節疼痛及頭疼壯熱日晡加甚又如瘧狀宜蜀漆湯

婦人草蓐中傷風四肢苦煩熱頭疼與小柴胡湯頭不疼但煩宜三物黃芩湯

婦人產後頭疼身體發熱腹內拘急疼痛宜桂心牡蠣湯

婦人產後虛羸發寒熱飲食少腹脹等疾宜增損柴胡湯

陳自明婦人良方

將護法

婦人產畢飲熱童便一盞閉目少坐上牀倚高立膝仰臥不時喚醒及以酢塗鼻或用酢炭及燒漆器更以手從心擀至臍下使惡露不滯如此三日以防血運血逆酒雖行血亦不可多恐引血入四肢且能昏運宜頻食白粥少許一月之後宜食羊肉猪蹄少許仍愼言語七情寒暑梳頭洗足以百日爲度若氣血素弱者不計日月舌則患手足腰腿酸痛等證名曰蓐勞最難治療初產時不可問是男是女恐因言語而泄氣或以愛憎而動氣皆能治病不可獨宿恐致虛驚不可刮舌恐傷心氣不可刷齒恐致血逆須血氣平復方可治事犯時微若秋毫成病重如山嶽可不戒哉

註按大全凡生產畢不得便臥且宜閉目而坐須臾上牀宜仰臥不宜側臥宜豎膝未可伸足高倚牀頭厚鋪裀褥遮圍四壁使無孔隙免致賊風不問腹痛不痛有病無病以童便和酒半盞溫服五七服妙但酒雖行血亦不可多

調理法

產後將息如法臟腑調和庶無諸疾苦須先服黑神散四物湯四順理中丸七寶散若壯熱頭痛此乳脉將行用玉露散頭目不清是血運用清魂散粥食不美是胃氣虛用四順理中丸

註按丹溪先生云四順理中丸雖滋補但乾薑僭熱臟腑無寒何處消受其黑神散產婦無病者余亦不用

血運

產後血運乃血入肝經甚至眼花昏悶用黑神散主之下血過多用清魂散補之或以酢湯細飲或預燒秤錘以酢沃之或釅酢塗口鼻或燒漆器熏之使產母鼻吸其氣庶無此患

註產後元氣虧損惡露乘虛上攻眼花頭運或心下滿悶神昏口噤或痰壅盛者急用失笑散主之若血下多而運或神昏煩亂者大劑芎歸湯補之或芸薹子散或童子小便有痰加二陳湯若因勞心力而致者宜補中益氣加香附若因氣血虛極不省人事用清魂散繼以芎歸湯及大補氣血之劑凡產可用半夏末冷水和丸入鼻孔中並無前患丹溪先生云因氣血俱虛痰火泛上宜以二陳

導痰或加減硃砂安神丸以麥門冬湯下亦可若脾胃虛而不能固者用六君子湯總之妊娠至五七箇月宜服安胎飲至八九箇月再加大腹皮黃楊腦元氣虛弱八珍湯臨產時更宜服保生無憂散則無前患

按大全產後血運者由敗血流入肝經眼中黑花頭目旋運不能起坐甚致昏悶不省人事謂之血運細酒調黑神散最佳庸醫或作暗風中風治之凡運血熱乘虛逆上湊心故昏迷不省氣閉欲絕然其由有三有用心使力過多而運有下血多而運有下血少而運其運雖同治之則異當詳審之下血多而運者但昏悶煩亂而已當以補血清心藥下血少而運者乃惡露不下上搶於心心下滿急神昏口噤絕不知人當以破血行血藥古法有云產婦繩纏分娩訖預燒黃石子硬炭燒令通赤置器中急於牀前以醋沃之得醋氣可除血運產後一月時作爲妙崔氏云凡運者皆是虛熱血氣奔逆腹中空所致欲分娩者第一須先取釅醋以塗口鼻仍置醋於旁使聞其氣兼細細飲之此爲上法如覺運即以醋噀面甦來即飲醋仍少與解之

一云仍少與木解之

按郭稽中曰產後氣血暴虛未得安靜血隨氣上迷亂心神故眼前生花極甚者令人悶絕不知人口噤神昏氣冷皆者不識呼爲暗風若作此治之病必難愈但服清魂散即省

顚狂

產後顚狂乃敗血上衝用大聖澤蘭散加砂仁末三分煎酸棗仁湯調下或硃砂二錢研細以乳汁調和入紫項活地龍一條滾二三沸去之入酒再用童湯煮溫分三服

註前證乃血虛神不守舍非補養元氣不可仍參後各證互用

按大全產後因驚敗血衝心昏悶發狂如有鬼祟宜用大聖澤蘭散自合者方有效或煎酸棗仁湯調好辰砂細末一服可安

狂言讝語

產後狂言讝語乃心血虛也用硃砂末酒調下龍虎丹參丸琥珀地黃丸亦可

註前證當固胃氣爲主而佐以見證之藥爲善若一於攻疾則誤矣

按大全產後語言顚倒或狂言讝語如見鬼神者其源不一須辨證用藥治療產後驚風言語亂道如見鬼神精神不定者研好硃砂酒調下龍虎丹參丸三九作一服兼琥珀地黃丸服之產後心虛敗血停積上干於心而狂言獨語者當在艮方乍見鬼神條求之產後臟虛心神驚悸志意不安語言錯亂不自覺知神思不安者當在艮方驚悸條求之宿有風毒因產心虛氣弱腰背強直或歌哭嘆笑言語亂道當作風證治療當在艮方中風心驚條求之產後心虛中風心神恍惚言語錯亂當在艮方中風恍惚條求之產後多因敗血迷亂心經而顚狂言語錯亂無常或運悶者當於艮方血運類中求之產後感冒風寒惡露斬然不行憎寒發熱如瘧晝日明了暮則讝語如見鬼狀當作熱入血室治之宜琥珀地黃丸及四物湯只用生乾地黃加北柴胡等分煎服如不退者以小柴胡湯加生乾地黃如黃芩分兩煎服自愈雖然已上諸證大抵胎前產後自有專門一定之法毫髮不同如產後首當逐敗生新然後仔細詳辯疾證不可妄立名色自生新意加減方藥大宜對證依古法施治未有不安者也

不語

產後不語因心氣虛而不能通於舌則舌強不能言語者宜服七珍散餘當推其所因而治之可也

註經云大腸之脈散舌下又云脾之脈是動則病舌本強不能言又云腎之別脈上入於心繫舌本虛則不能言猶謂前證若心腎氣虛用七珍散腎虛風熱地黃飲大腸風熱加味逍遙散加防風白芷脾經風熱秦艽升麻湯肝經風熱柴胡清肝散加防風白芷脾氣鬱結加味歸脾湯加升麻肝木太過小柴胡加釣藤鉤脾土受侮六君加升麻白芷釣藤鉤肝脾血虛用佛手散脾氣虛用四君子氣血俱虛八珍湯如不應用獨參湯更不應急加附子補其氣而生其血若竟用血藥則誤矣

按大全人心有七孔三毛產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語

乍見鬼神

產後如見鬼神或言語讝妄皆由血氣損虧陰虛發熱或瘀血停滯以致心神煩躁而然也宜以調經散治之

註前證若敗血停滯用調經散若血虛發熱用八珍加炮薑若心血虛損用柏子仁散大抵此證皆心脾血少所致但調補胃氣則痰清而神自安矣若果係鬼祟所附卽灸鬼哭穴可愈其或不起者多因豁痰降火攻伐之過也

按大全心主身之血脈因產傷耗血脈心氣虛則敗血停積上干於心心不受觸遂致心中煩躁臥起不安乍見鬼神言語顛倒錯妄醫人不識呼爲風邪如此治之必不得愈但服調經散每服加龍腦一捻得睡卽安

按郭氏云肝藏血心主血因產走耗其血勞動肝心敗血奔衝邪淫於心所以乍見鬼神言語顛倒非風邪也但服調經散加生龍腦一捻煎服得睡卽安黑龍丹亦能治療

驚悸

產後心神驚悸恐懼或目睛不轉口不能言乃心氣虛而六淫內侵診其脈動而弱者驚悸也動則爲驚弱則爲悸矣

註人之所主者心心之所主者血心血一虛神氣不守此驚悸所由作也當補血氣爲主

按大全產後臟虛心神驚悸者由體虛心氣不足心之經爲風邪所乘也或恐懼憂迫令心氣受於風邪邪搏於心則驚不自安若驚不已則悸動不定其狀目睛不轉而不能動

心神恍惚

產後恍惚因元氣俱虛心經血少或外邪所侵以致心神恍惚怔忡不寧

註前證當大補血氣爲主而佐以諸方爲善蓋風爲虛極之假象也固其本源諸病自退若專治風則速其危矣

按大全心主血血氣通於榮衛臟腑徧循經絡產則血氣俱傷五臟皆虛榮衛不足卽爲風邪所乘則令心神恍惚不定也

虛極生風

產後生風因去血過多氣無所主以致脣青肉冷汗出目眩神昏命在須臾此但虛極生風也急服濟危上丹若投以風藥則誤甚矣

註前證若心脾血氣俱虛用十全大補湯如不應加附子釣藤鉤若肝經血虛用逍遙散加釣藤經云脾之榮在脣心之液爲汗若心脾二臟虛極急用參附湯救之

虛汗不止

產後汗不止者皆由陽氣頓虛腠理不密而津液妄泄也若遇風則變痙縱不成痙亦虛乏短氣身體消瘦脣口乾燥久則經水斷絕由津液竭故也

註前證屬血氣俱虛急用十全大補湯如不應用參附芪附等湯若汗多亡陽發痙尤當用前藥王海藏先生云頭汗出至頸而還額上偏多益額爲六陽之所會也由虛熱熏蒸而出竊謂前證當以部位分之額左屬肝額右屬肺鼻屬脾頤屬腎額屬心治者審之

按大全虛汗不止者由陰氣虛而陽氣加之裏虛表實陽氣獨發於外故汗出也血爲陰產則傷血是爲陰氣虛也氣爲陽其氣實者陽加於陰故令汗出而陰氣虛弱不復者則汗出不止也凡產後血氣皆虛故多汗

冒悶汗出

產後忽冒悶汗出者因陰血虧損陽氣鬱暴故也急吞雞子三枚未醒飲童便或時復發宜服竹瀝五合

註前證屬大虛宜固元氣爲主其汗不止必變柔痙東垣先生云婦人分娩及半產漏下昏冒目瞑益因血暴亡而火上熾但補其血則神自昌若常時血下當補而升舉其氣陽得血而神安則目明矣今立一方以補手足厥陰之血兼益陽氣名曰全生活血湯

汗多變痙

產後汗多變痙因氣血虧損肉理不密風邪所乘其形口噤背強如癲或搖頭馬斷身反折不時舉發氣息如絕宜速灌小續命湯若汗出如雨手拭不及者不治

註前證因去血過多元氣虧極或外邪相搏以致牙關緊急四肢痙強或陰火內動或腰背反張肢體抽搐若有汗而不惡寒者名柔痙若無汗而惡寒者曰剛痙由亡血過多筋無所養故傷寒汗下過多潰瘍膿血大泄多患之乃敗證也急以十全大補湯治之如不應急加附子多有復甦者亦有六淫七情所致者

按大全產後發痙汗出如雨手摸空者不可治也按郭氏曰產後血虛肉理不密故多汗因遇風邪搏之則變痙也

中風

產後中風或血氣未復風寒所感以致筋攣拘急口眼喎斜或肢體緩弱入臟則恍惚驚悸郭稽中云產後強力下牀或誤入房或憂怒內傷臟腑陳無擇曰當以脉辯而治之若努力下牀月內入房憂怒著急非中風類乃尊勞火邪之證也

註前證果外邪所屬形氣不足病氣有餘當補元氣爲主稍佐以治病之藥若強力下牀月內入房屬形氣病氣俱不足當純補元氣多有復甦者若誤投風藥乃促其危也

按大全產時傷動血氣勞損臟腑未曾平復起早勞動致使氣虛而風邪乘虛入之故中風風邪令氣客於皮膚經絡但疼痹羸乏不任少氣大凡筋脉挾寒則攣急喎僻挾溫則縱緩虛弱若入諸臟恍惚驚悸隨其所傷臟腑經絡而生病焉

按郭稽中曰產後五七日內強力下牀或一月之內傷於房室或懷憂怒擾盪沖和或因食生硬傷動臟腑得病之初眼濈口噤肌肉瞤搐漸至腰脊筋急強直者不可治此乃人作非偶爾中風所得也

口噤腰背反張

產後口噤由血氣虛而風邪乘於手三陽經也蓋手三陽之筋循結於頷得風冷則筋急故致口噤腰背攣急角弓反張者是風邪入於諸陽之經也

註前證因氣血耗損腠理不密汗出過多而患之者乃虛象也宜固氣血爲主佐以本方丹溪云產後當大補氣血爲先雖有他證以末治之如惡寒發熱等證乃氣血虛損之極也宜大劑參芪歸朮肉桂以培養之如不應急用炮附子再不應用人參一兩炮附子二三錢名參附湯設脉未應乃藥力未能及也宜多用之

產後眼張口噤肢體強直腰背反僂言語錯亂如癎者此氣虛風邪所傷而成瘛也

註按仲景先生云有汗爲柔瘛用桂枝湯無汗爲剛瘛用麻黃湯然產後得此血氣俱虛之敗證也不可與傷寒例看丹溪先生云產後當大補氣血爲主可用十全大補湯以補元氣如不應急加附子更不應是藥力弗逮也仍用參附湯多服余嘗治大虛之證參芪數斤附子數枚方應

按大全宿有風毒因產心氣虛弱發成風瘛心悶氣絕

筋攣

產後中風筋脉攣急乃血氣俱虛或風邪客於皮膚則頭痹羸乏若入於筋脉則四肢攣急皆由大經空虛風寒乘虛而漸入也

註肝屬木而主筋前證若肝經風熱血燥用加味逍遙散如不應當用六味地黃丸以補腎水經云風客淫氣精乃亡邪傷肝也仍參雜證諸血風方論治之

瘛瘲

蓋謂瘛者筋脉拘急也瘲者筋脉張縱也經云肝主筋而藏血蓋肝氣爲陽爲火肝血爲陰爲水前證因產後陰血去多陽火熾盛筋無所養而然耳故癎疳膿水過多全瘡出血過甚則陽隨陰散亦多致此治法當用八珍散加丹皮釣藤以生陰血則陽火自退諸證自愈如不應當用四君芎歸丹皮釣藤以補脾土蓋血生於至陰至陰者脾土也故小兒吐瀉之後脾胃虧損亦多患之乃虛象也無風可逐無痰可消若屬陽氣脫陷者用補中益氣加薑桂陰氣虛敗者用十全大補加桂附亦有復生者此等證候若肢體惡寒脉微細者此爲眞狀若脉浮大發熱煩渴此爲假象惟當固本爲善若無力抽搐戴眼反折汗出如珠流者皆不治

腳氣

產後腳氣因元氣內虛六淫外侵所致其狀發熱脅悶搐掣驚悸心煩嘔吐氣上用小續命湯治之若以爲敗血攻之則誤矣

註前證當補氣血爲主佐以小續命湯寄生湯如不應用大防風湯仍參腳氣方論主之

按大全產後熱悶氣上轉爲腳氣者何答曰產後血虛生熱復因春夏取凉過多地之蒸濕因足履之所以著爲腳氣可服小續命湯二三劑必愈若醫者誤以敗血藥攻之則血去而病益增矣

按郭氏云惡附子者宜服獨活寄生湯若嘔者去地黃倍加生薑

遍身疼痛

產後遍身疼痛者由氣虛百節開張血流骨節以致敗體沉重不利筋脉引急發熱頭痛宜用趁痛散治之陳無擇云若兼感寒傷食宜用五積散若誤作傷寒發汗則筋脉抽搐手足厥冷則變爲痙當大補氣血爲主

註前證若以手按而痛益甚是血瘀滯也用四物

炮薑紅花桃仁澤蘭補而散之若按而痛稍緩此是血虛也用四物炮薑人參白朮補而養之

按大全產後氣弱經絡肉分之間血多留滯累日不散則骨節不利筋脉急引故腰背不得轉側手足不能動搖身熱頭痛也若醫以爲傷寒治之則汗出而筋脉動惕手足厥冷變生他病但服趁痛散除之

按郭氏云因產走動血氣升降失其常度留滯關節筋脉引急是以遍身疼痛甚則腰背強硬不能俛仰手足拘攣不能伸屈或身熱頭痛不可作他病治但服趁痛散循流血氣使筋脉舒暢疼痛自止

腰痛

腎主腰脚產後腰痛者蓋腎爲胞胎所繫此因產勞傷腎氣以致風冷客之若連背脊痛久未已後遇有娠必致損動

註前證眞氣虛邪來乘之若用當歸黃芪湯或十全大補爲主佐以奇生湯如不應用十全大補加附子

惡露不絕

產後惡露不絕因傷經血或內有冷氣而臟腑不調故也

註前證若肝氣熱而不能生血用六味地黃丸若肝氣虛而不能藏血用逍遙散若脾氣虛而不能攝血用六君子湯胃氣下陷而不能統血用補中益氣湯若脾經鬱熱而血不歸源用加味歸脾湯若肝經怒火而血妄行用加味四物湯若氣血俱虛用十全大補湯若肝經風邪而血沸騰用一味防風丸

按大全產後惡露不絕者由產後傷於經血虛損不足或分解之時惡血不盡在於腹中而臟腑挾於宿冷致氣血不調故令惡露淋瀝不絕也

惡露不下

產後惡露不下因臟腑勞傷氣血虛損或風冷相搏所致

註前證若惡露不下用失笑散若氣滯血凝用花蕊石散若因去血過多而煩熱不止宜參產後兒枕腹痛方論主治

按大全惡露不下者由產後臟腑勞傷氣血虛損或胞絡挾於宿冷或產後當風取凉風冷乘虛而搏於血血則壅滯不宣積畜在內故令惡露不下也

惡露上攻心痛

產後心痛爲陰血虧損陽火上衝心絡名曰心胞絡痛宜大巖蜜湯治之若寒傷心經名曰眞心痛朝發夕死夕發朝死無藥可救

註前證若陽氣虛寒用巖蜜湯溫之瘀血上衝用失笑散散之血既散而痛仍作用八珍湯補之大凡肝腹作痛以手按之則不痛此血虛也須用補養之劑

腹痛

產後腹痛或因外感五邪內傷六淫或瘀血壅滯所致當審其因而治之

註前證若瘀血內停用失笑散風寒外感用五積散

兒枕腹痛

產後兒枕者乃母胎中宿血也或因風冷凝滯於小腹而作痛

註前證若宿血作痛失笑散行之既散而仍痛四神散調之若惡心作嘔此屬氣虛用六君子健其胃氣若發熱頭痛或腹痛按而不痛此屬血虛用四物炮薑參朮補其脾氣

按大全兒枕者由母胎中宿有血塊因產時其血破散與兒俱下則無患也若產婦臟腑冷使血凝滯在於小腹不能流通則令結聚疼痛名之曰兒枕也

小腹痛

產後小腹作痛由惡露凝結或外寒相搏若久而不散必成血瘕而月水不調

註前證若因氣滯用延胡索散若因外寒用五積散若因怒氣用四物加木香柴胡若因血虛用四物參朮炮薑若因陽氣虛弱用四君當歸炮薑若因脾虛血弱用六君當歸炮薑治之

寒疝腹痛

產後臍腹作痛乃冷氣乘虛也用當歸建中湯治之陳無擇云若產當寒月人門臍下腹痛手不可近者用羊肉湯治之

註前證若脾胃虛弱寒邪所侵用蟠葱散若肝經濕熱小便不利用龍膽瀉肝湯仍參前論思有瘀血爲患

兩脅腰痛

產後兩脇脹痛因惡露不盡或肝經血虛或肝經氣滯當分而治之

前證若肝經血瘀用延胡索散若肝經氣滯用四君青皮柴胡若肝經血虛用四物參术柴胡氣血俱虛用八珍柴胡若腎水不足不能生肝用六味丸若肺金勢盛剋制肝木用瀉白散仍參照前各論主之

按大全產後兩脅脹滿氣喘由痰飲宿有停水因產後惡露不下盡水與痰與氣相搏積在脇脘故令脅肋脹滿氣與水相激故令痛也

積聚癥塊

夫積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六腑所成然積爲陰陰性沉伏故痛不離其部聚爲陽陽性浮動故痛無常處皆由飲食不節起居失宜產後血氣虛弱風冷所乘搏於臟腑耳

前證乃真氣虧損邪氣乘之況產後得之尤當固元氣爲主若求其夕之效而攻其邪則速其危矣當參痃癖諸論治之

按大全風冷所乘搏於臟腑與血氣相結故成積聚癥塊

血瘕

產後瘀血與氣相搏名曰瘕謂其痛而無定處此因風有風冷而成輕則痞塞重則不通

前證乃寒邪乘客氣血壅結此因氣病而血病也當補養胃氣調和月經寬緩靜養爲善難經云任脉之病男子爲七疝女子爲瘕聚當參前後各論治之

按大全瘕之言假也謂其痛浮假無定處也此由素有風冷血氣不治至產血下則少故致此病也不急治則多成積結妨害月水轉則痞塞重則不通也

餘血奔心煩悶

產後餘血奔心蓋因分娩後不飲童便以致肺火上炎所致宜用金黃散或炒蒲黃三錢水煎服失笑散亦佳

前證當與產後惡露上攻心痛同治

按大全此證蓋是分解了不即飲童子小便并辦心及臥太速兼食不相宜之物所致但能依方療之無不痊可

口乾痞悶

產後口乾痞悶因食米麪乾飯太早脾胃不能消化熱鬱所致愼不可下但服見眼丸則愈無擇云若內積憂煩外傷燥熱宜四物湯去地黃加人參烏梅可愈

前證若宿食停滯用六君枳實神麯若因肉食所致更加山楂若因魚鱉之類再加陳皮其物既消而仍痞或反作痛作嘔此脾胃受傷用六君子湯或嚥酸噯腐加炮薑作瀉更加升麻如不應佐以四神丸或間用補中益氣湯

按郭氏曰產後榮衛大傷血氣未定食麪太早胃不能消化麪毒結聚於胃脘上熏胃中是以口乾燥渴心下痞悶醫者不識認爲胃腦壅滯以藥下之萬不得一

按無擇云產後口乾痞悶未必止因食麪或產母內積憂煩外傷燥熱飲食甘肥使口乾痞悶當隨其所因調之可也心煩宜四物湯去地黃加人參烏梅煎若外傷燥熱石膏爲何經當隨經爲治難以備舉飲食所傷見眼丸即能作效

按郭氏又云或有產後勞傷虛竭因事觸忤怒氣上逆以致胃腦痞塞口乾煩悶者亦宜服見眼丸蓋其間藥味皆是順氣快膈之劑紫蘇飲亦可服

寒熱

產後發熱頭痛身疼雖如傷寒時氣雖當用麻黃亦不可輕易如早起勞動爲寒所傷則浙浙惡寒翕翕發熱頭項肩背骨節皆痛至七八日乃差若大便堅作嘔不能食用小柴胡湯加生薑地黃主之

按病機云治胎產之病從厥陰經論之無犯胃氣及上中二焦謂之三禁不可汗不可下不可利小便發汗者同傷寒下之早證利大便則脉數而已動於脾利小便則內亡津液胃中枯燥製藥之法能不犯三禁則榮衛自和而寒熱止矣

產後午寒午熱由血氣虛損陰陽不和若陰盛則午寒陽盛則午熱宜用增損四物湯若因敗血不散腹內作痛宜用奪命丹後用增損四物湯隨病加減無擇云敗血流閉諸陰則寒流閉諸陽則熱用大調經散五積散

前證若因陽氣不足陰氣上入於陽中而惡寒者用補中益氣湯若因陰氣不足陽氣下陷於陰中而發熱者用六味地黃丸若血氣不足而惡寒發熱者用八珍湯若病後寒熱倦怠宜用補中益氣湯若肌熱大渴目赤面紅者用當歸補血湯

按郭氏曰陰勝則乍寒陽勝則乍熱陰陽相乘則乍寒乍熱若因產勞傷臟腑血氣不得宣越故令敗血不散入於肺則熱入於脾則寒陰陽不和敗血不散何以別之時有刺痛者敗血也但寒熱無他證者陰陽不和也

按郭氏又云血屬陰氣屬陽血氣一傷陰陽互相乘尅所以乍寒乍熱此特論陰陽不和之所由致者亦有因產惡露下少留滯胞絡亦令人寒熱但小腹痛急爲異耳陰陽不和宜服增損四物湯敗血停留宜服奪命丹或黑龍丹增損四物湯亦可兼進

瘧疾

郭稽中云產後乍寒乍熱者多是敗血爲害或陰陽不和若概作瘧疾治之誤矣陳無擇云產後寒熱或一二日或二三日一發或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少或純寒純熱者皆是瘧疾最難治療可用草果飲生熟飲四獸飲選用之

註前證當與瘧疾論參看用藥以補胃氣爲主佐以草果飲之類若胃氣稍充以草果飲爲主佐以補胃之劑大抵產後瘧疾因脾胃虛弱飲食停滯或外邪所感或鬱怒傷脾或暑邪所伏審係飲食用六君加桔梗蒼朮藿香如外邪多而飲食少用藿香正氣散如外邪少而飲食多用人參養胃湯勞役所傷用補中益氣湯氣血虛弱用十全大補加炮薑中氣虛寒用六君加薑桂元氣脫陷急加附子蓋氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒胃氣下陷則寒熱交作或吐瀉不食臭痛煩渴發熱譫語或手足逆冷寒戰如慄雖見百證但溫補脾胃其病自退若誤用清脾飲則中氣傷而變證多矣大凡產後久瘧多屬元氣虛寒

蓐勞

夫產後蓐勞者此由生產日淺血氣虛弱飲食未平復不滿日月氣血虛羸將養失所而風冷客之風冷搏於氣血則不能溫於肌膚使人虛乏勞倦乍臥乍起容顏憔悴食飲不消風冷邪氣而感於肺肺受微寒故欬嗽口乾遂覺頭昏百節疼痛榮衛受於風邪流注臟腑須臾頻發時有盜汗寒熱如瘧背膊煩悶四肢不舉沉重著牀此則蓐勞之候也

婦人因產裏不順疲極筋力憂勞心慮致令虛羸喘乏寒熱如瘧頭痛自汗肢體倦怠欬嗽痰逆腹中絞刺名曰蓐勞

註前證當扶養正氣爲主用六君子湯加當歸若脾肺氣虛而欬嗽口乾用補中益氣加麥冬五味子若因中氣虛而口乾頭運用補中益氣加蔓荊子若肝經血虛而肢體作痛用四物參朮若因肝腎虛弱而自汗盜汗寒熱往來者用六味丸加五味子若因脾虛血弱肚腹作痛月經不調用八珍湯倍加白朮若因脾虛血燥皮膚瘙痒用加味逍遙散大抵此證多因脾胃虛弱飲食減少以致諸經疲憊而作當補脾胃飲食一進精氣生化諸臟有所倚賴其病自愈矣仍照虛煩發熱方論主治

虛羸

產寶云產後虛羸者皆因產後虧損血氣所致當慎起居節飲食六淫七情調養百日庶保無疾若中年及難產者無論日期必須調養平復方可治事否則氣血復傷虛羸之證作矣

註前證產傷氣血者用八珍湯飲食傷胃者用四君子湯停食傷脾者用六君子湯勞傷元氣者用補中益氣湯若噯氣覺有藥味者此藥復傷胃也但用四君子湯徐徐少飲以調脾胃若胃氣一健血氣自生諸證自愈矣

風虛冷勞

產後氣血勞傷臟腑虛弱若風冷乘之血氣愈虛形氣羸損風冷入臟令人無子謂之風虛冷勞也

註前證若血氣虛弱用八珍湯血氣虛寒用十全大補湯胃氣虛弱用補中益氣湯脾氣虛弱用六君子湯命門火衰用八味丸肝脾血虛用加味逍遙散肝脾鬱怒用加味歸脾湯

按大全風冷搏於血氣血氣不能溫於肌膚使人虛乏疲頓致羸損不平復若久不平復風冷入於子臟則胞臟冷使人無子

腹脹嘔吐

產後腹脹滿悶嘔吐者因敗血散於脾胃不能運化而致宜用抵聖湯治之

註前證若敗血散於脾胃宜用前方若飲食停於脾宜用六君厚朴若飲食傷於胃宜用六君子湯大凡損其脾者當節其飲食爲善

按郭氏曰敗血散於脾胃脾受之則不能運化精微而成腹脹胃受之則不能受納水穀而生吐逆醫者不識若以尋常治脹止吐藥治之病與藥不相干轉更傷動正氣疾愈難治但服抵聖湯則愈

嘔逆不食

經云胃爲水穀之海以養臟腑因產後胃氣虛弱飲食所傷必致嘔逆故不食也

註前證若因飲食過時用四君子湯飲食過多用六君子湯飲食過時而衆勞役用補中益氣若因飲食停滯用人參養胃湯脾胃氣虛用六君子湯胃氣虛寒加炮薑木香寒水侮土用益黃散肝木侮脾土用六君升麻柴胡命門火衰不能生土用八味丸嘔吐泄瀉手足俱冷或肚腹作痛乃陽氣虛寒急用附子理中湯多有生者

按大全胃輸水穀之精以爲血氣榮潤臟腑因產則臟腑傷動有時血氣猶盛者則氣乘腸胃腸胃燥澁其氣則逆故嘔吐不下食也

霍亂

產後霍亂因臟腑虛損飲食不消觸胃風冷所致若熱而飲水者五苓散寒而不飲水者理中丸虛冷者加附子來復丹尤妙

註前證當與後產後腹痛瀉利方論互相主治

按大全陰陽不順清濁相干氣亂於腸胃之間真邪相搏冷熱不調上吐下利故曰霍亂也

頭痛

夫頭者諸陽之會也產後胃氣虛弱飲食少思陽氣微弱不能上升故頭痛若因敗血黑龍丹言之甚詳

註前證若中氣虛用補中益氣湯加蔓荊子若血虛用四物加參朮血氣俱虛用八珍湯若因風寒所傷用補中益氣湯加川芎

按大全產後五臟皆虛胃氣虧弱飲食不充穀氣尚乏則令虛熱陽氣不守上湊於頭陽實陰虛則令頭痛也又有產後敗血頭痛不可不知

欬嗽

夫肺主於氣產後肺氣虛故外邪感而欬嗽所由作也若食鹽醯之類而致者難治若因痰積濕而致者服黑神散五積散可愈

註前證若陰血虛四物湯加參朮陳皮桔梗肺氣虛四君加芎歸桔梗紫蘇若血大虛八味風寒所感補中益氣湯加桔梗紫蘇若痰盛六味地黃丸加參朮

若陰陽氣虛使榮衛氣厥逆則致生斯病也經云咽噫者胃寒所生急灸期門三壯必愈

血崩

產後血崩因經脉未復而勞傷或食酸鹹之味若小腹滿痛肝經已傷最爲難治急服固經丸主之

證前證若血滯小腹脹滿用失笑散血少小腹虛痞芎歸湯肝火攻血妄行加味逍遙散脾鬱不統血加味歸脾湯脾氣虛不攝血補中益氣湯厚味積熱傷血濇胃散加槐花風熱相搏傷血四君子加防風枳殼

按陳無擇曰血崩不是輕病況產後有此是謂重傷恐不止鹹酸不節而能救之多因驚憂悲怒臟氣不平或產後服斷血藥早致惡血不消鬱滿作堅亦成崩中固經丸自難真效不若大料煮芎歸湯加芍藥候定續須隨證諸藥治之爲得

月水不調

產後月水不調由血氣虛損風邪所客邪正相搏以致經候失期或多或少而不得其平也

證前證若過期而作痛者氣血俱虛也八珍加柴胡丹皮不及期而來血熱也四物加山梔柴胡將來而作痛者血實也四物加桃仁紅花過期而來者血虛也四物加參木紫黑成塊者血熱也四物加炒梔炒連丹皮作痛而色淡者黃芩也四物合二陳治當臨證制宜

按大全產後風寒冷熱之氣客於經絡乍冷乍熱胡丹皮不及期而來血熱也四物加山梔柴胡將來而作痛者血實也四物加桃仁紅花過期而來者血虛也四物加參木紫黑成塊者血熱也四物加炒梔炒連丹皮作痛而色淡者黃芩也四物合二陳治當臨證制宜

按大全產後風寒冷熱之氣客於經絡乍冷乍熱冷則血結熱則血消故令血或多或少或在月前或在月後故名不調也

月水不通

產後乳子周歲而經不行是其常也若半歲而經行此血有餘也若二歲不行而無疾不必服藥若肢體倦怠食少內熱是血少也宜健脾胃若以藥通之則誤矣

證前證若脾胃虛弱用六君子湯若兼鬱火傷脾用歸脾湯加丹皮山梔若怒火傷血宜用四物合小柴胡氣血俱虛用八珍湯加牡丹皮仍參前論主之

按大全夫產傷動於血氣其後虛損未復而爲風冷所傷血之爲性得冷則凝結故風冷傷於經血結於胞絡之間故令月水不通也凡血結月水不通則成血瘕水血相併復遇脾胃衰弱肌肉虛者則爲水腫也

按婦人衝任之脉爲經絡之海皆起於胞內而手太陽小腸之經手少陰心之經此二經上爲乳汁下爲月水若產後月水不通者蓋新產之後勞傷氣血或去血過多乳汁通行自是不通若乳子歲半或一歲之內而月經不行此是常候即非病也何必通之諺云妳假經也若半歲而行者或四五箇月便經行者皆是少壯血盛之人注受極易產乳必衆其子失乳必四肢疵疵羸肚大青筋頭大髮焦好咳泥土病名無辜若經血有餘者不可以藥止之若產後一二歲月經不通而無疾苦何必服藥或著傷氣血衝任脉虛氣血衰少而不能行者但服健脾胃養氣血之藥自然通行若用牛膝紅花蘇木乾漆蝦蟆水蛭等藥以通之則爲害濕大經水枯竭則無以滋養其能行乎初虞世所謂譬猶索萬金於乞丐之手雖捶楚並下而不可得也醫者宜詳審而療之

四肢浮腫

產後四肢浮腫者乃敗血乘虛流注宜用小調經散陳無擇云若風邪所乘於氣分皮膚腫而浮虛乃氣也若皮膚腫如熟李乃水也蓋氣腫者宜發汗水腫者宜利小便

證前證若寒水侮土宜養脾肺若氣虛浮腫宜益脾胃若水氣浮腫宜補中氣當參婦人血分水分腫滿方論主治

按郭氏曰產後敗血乘虛停積循經流入四肢浸淫日深却還不得壞如水故令面黃四肢浮腫醫人不識便作水氣治之凡治水多用甘遂大戟等導水藥極能虛人夫產後既虛又以藥虛之是謂重虛往往多致夭枉但服小調經散血行腫消則愈

按陳無擇曰產後浮腫多端有自懷妊腫至產後不退者亦有產後失於將理外感寒暑風濕內則喜怒憂驚血與氣搏留滯經絡氣分血分不可不辨要當隨所因脉證治之宜得其情小調經散治血分固效但力淺難憑不若異茱萸湯枳朮湯奪魂散大調經散皆要藥也

按郭氏云黑龍丹亦治產後浮腫血滯所致不可不知

腹痛瀉利

產後腹痛瀉利因腸胃虛怯寒邪乘襲或水穀不化

洞泄腸鳴或手足逆冷用中湯治之陳無擇云若六淫七情面致者宜隨所感而治之

『前證若有脇脹服藥覺食不消酸此飲食停滯用六君枳實山楂以消導若食已消而口痛更或頭痛熱渴惡食欲嘔此中氣被傷因而中益氣不足扶苓以健脾胃

按郭氏曰產後風冷乘虛流入大腸水穀不化洞泄腸鳴或下赤白若腎虛或痛止不足宜調中湯立愈若醫者見爲積滯取之謂不知理之誰之

按陳無擇曰產後下痢非此一端既云飲冷當風何所不至熱氣濕本屬外因喜怒憂思還從內性況孕婦產後皆非攻病若其洞泄可服調中湯赤白滯下非此而愈各隨證治之

赤白痢

產後痢疾因飲食六淫七情傷於脾胃或血滲大腸皆爲難治若飲食不進謂之虛痢氣道不順謂之氣痢治法熱則凉之冷則溫之冷熱相搏則溫凉調之滯者澀之虛者補之水穀不分者分利之性情執滯者和順之未有不安者也

『前證白屬氣分而赤屬血分也若米食所傷用六君加穀蘗若麵食所傷用六君加麥蘗若肉食所傷用六君加山楂神麯凡兼嘔吐俱加藿香若兼噦酸或嘔吐用前藥送越鞘丸若胃木剋脾土用六君加柴胡炮薑若寒水反來侮土用錢氏益黃散若久瀉或元氣下陷兼補中益氣湯以升發陽氣若瀉痢色黃乃脾土真氣宜加木香肉豆蔻若屬脾土虛寒用六君加木香益佳若腎虛宜用補中益氣及四神丸若屬命門火衰而脾土虛寒用八味丸以補土母若小便濇滯收體潮熱或兼喘欬用金匱腎氣丸以補脾腎利水道若胃氣虛弱而四肢浮腫須補胃爲主若久而不愈或非飲食所傷而後重屬腎虛虧損益脂胞主於任而藏於腎況九月十月乃腎連膀胱所藏必用四神六味八味三藥以補腎若用分利導水之劑是虛其虛也

按大全產後痢疾者由產勞傷藏腑不足日月未滿虛乏未復或勞動太早或誤食生冷若行起太早卻外傷風冷乘虛入於腸胃若誤食生冷難化之物傷於脾胃皆令洞泄水瀉其者變爲痢也若血滲入大腸則爲血痢難治世謂之產子痢也得冷則白或如魚腦得熱則赤黃或爲膿血若冷熱相搏則下痢赤白或膿血相雜若下痢青色則極冷也若飲食不進便利無常日夜無度產後本虛更加久痢不止無力瘦乏愈見羸弱謂之虛羸下痢又有產後氣宇不順而下痢赤白謂之氣痢

產後下痢作渴者乃內亡津液或胃氣虛不能生津液但止其渴痢自差

『前證若渴而不喜冷飲屬胃氣虛不能生津液宜用七味白朮散夜間發熱口渴屬腎水弱而不能潤宜用六味丸兼位以益氣湯以滋化源

按大全朮穀之精化爲血氣津液以養臟腑臟腑虛燥故痢而渴若引飲則難止反溢水氣脾胃既虛不能健水水自流溼浸漬皮膚則令人腫但止其渴痢則自差

大便祕澀

產後大便祕澀因腸胃虛弱津液不足若小腹悶脹宜服麻仁丸潤之若用寒藥則促其危矣

『前證若計其日期飲食數多即用藥通之禍在反掌之間必待腹滿覺脹欲大不能者乃結在直腸宜用豬膽汁潤之若服苦寒疏通反傷中焦元氣或愈加難通或通而瀉不能止或成痞證若去血過多用十全大補血虛火燥用加味四物氣血俱虛用八珍湯雖數日不通飲食如常腹內如故仍用八珍加桃仁杏仁治之若況其日期飲食數多而通之則誤矣

按郭氏曰產後水血俱下腸胃虛竭津液不足是以大便祕澀不通也若過五六日腹中悶脹者此乃燥屎在臟腑以其乾澀未能出耳宜服麻仁丸以津潤之若誤以爲有熱投之寒藥則陽消陰長變證百出性命危矣

津液者血之餘因產傷耗胃氣津液暴竭氣少不能運掉是以大便祕澀不通也輕者且進橘杏圓以潤滑之滑則通矣若過六七日腹中滿痛尚且不通此必有燥糞在內乾澀未能得出雖却服麻仁圓以通利之下燥糞則愈若以爲有熱用重涼之劑以攻之轉更傷動胃氣變證多端

大小便不通

產後大小便不通因腸胃虛弱津液燥竭故也

『前論當參前後論及雜證泄痢祕結方論主治

按大全腸胃本挾於熱因產血水俱下津液燥竭

腸胃痞澀熱氣結於腸胃故令大小便不通也

遺糞

產後遺糞取故燕窠中草燒爲末或枯礬牡蠣或白薇芍藥各等分爲末俱用酒調服或用固腸丸亦可

註前證若脾腎虛弱用還少丹仍以補中益氣湯爲主虛寒加肉豆蔻補骨脂或四神丸若脾腎虛寒用八味丸兼四神丸仍佐以前二方

諸淋

產後諸淋因熱客於脬虛則頻數熱則澀痛氣虛兼熱血入胞中則血隨小便出而爲血淋也

註前證若膀胱虛熱用六味丸若陰虛而陽無以化用滋陰腎氣丸蓋土生金金生水當滋化源仍參小便淋瀝頻數類治之

按大全因產有熱氣客於脬中小便澀痛故謂之淋又有因產損氣虛則挾熱熱則搏於血血即流滲於脬中故血隨小便出而爲血淋淋者淋瀝之謂也

按三因論曰治產後淋祕當去血爲主如其冷熱膏石氣淋等爲治量其虛實而用方瞿麥蒲黃最是產後要藥惟尋究其所因則不失機要矣

小便頻數

產後小便數者乃氣虛不能制故也

註前證若因穩婆不慎以致脬損而小便淋瀝者用八珍湯以補氣血若因膀胱氣虛而小便頻數當補脾肺若膀胱陰虛而小便淋瀝須補肺腎仍參婦人小便頻數諸類治之

小便不禁

廣濟治產後小便不禁用雞尾燒灰千金翼用白薇芍藥爲末俱用溫酒下日二服或桑螵蛸半兩龍骨一兩爲末每服二錢粥飲調下

註前證若脾肺陽虛用補中益氣湯若肝腎陰虛用六味地黃丸若肝腎之氣虛寒用八味地黃丸

按陳氏曰婦人產蓐產理不順致傷膀胱遺尿無時

小便出血

產後小便出血者因虛熱血滲於脬也以亂髮洗淨燒爲末米飲調服或滑石末一錢生地黃汁調下

註前證若膏粱積熱用加味清胃散醇酒濕毒葛根解酲湯怒動肝火加味小柴胡湯鬱結傷脾加味歸脾湯思慮傷心妙香散大腸風熱四物側柏槐花大腸血熱四物炒連槐花腸胃虛弱六君升麻柴胡元氣下陷補中益氣茯苓半夏胃氣虛弱六君升麻血虛四物升麻氣血俱虛八珍柴胡升麻大凡病久或元氣虛弱見病百端而發熱者皆脾胃虧損內眞寒而外假熱但用六君或補中益氣加炮薑溫補脾氣諸證悉退若四肢畏冷屬陽氣虛寒急加附子

按大全血氣虛而熱乘之血得熱則流散滲於胞內故血隨小便出

墮胎下血

墮胎後復損經脈而下血不止甚則煩悶至死皆以調補胃氣爲主

註前證若肝經血熱用四物參朮山梔肝經風熱用防風黃芩丸肝經怒火用加味逍遙散脾經氣虛用四君歸地脾經鬱滯用加味歸脾湯氣味不和用紫蘇飲胃氣下陷用補中益氣湯

按薛己云產後便血或飲食起居或六淫七情以致元氣虧損陽絡外傷治法若因大腸風熱四物加側柏荊防枳殼槐花怒動肝火六君加柴芍芎歸腸胃虛寒六君加肉豆蔻木香大腸血熱四物加芩連餘與小便出血諸治法相同

陰脫玉門不閉

產後陰脫玉門不閉因坐產努力舉動房勞所致或脫肛陰挺逼迫腫痛清水續續小便淋瀝

註玉門不閉氣血虛弱也用十全大補湯腫脹焮痛肝經虛熱加味逍遙散若因憂怒肝脾氣血傷也加味歸脾湯若因暴怒肝火血傷也龍膽瀉肝湯

按三因論曰婦人因產勞力努嚥太過致陰下脫若脫肛狀及陰下挺出逼迫腫痛舉重房勞皆能發作

斷產論

易曰天地之大德曰生然婦人有臨產艱難或生育不已而欲斷之故錄驗方以備所用若服水銀蟲蟲水蛭之數不惟孕不復懷且禍在反掌

註前云用蠶故紙尺許燒灰爲末產後酒服之血虛者終不復孕大抵斷產之劑多用峻厲往往有不起者是則產之害未若斷產之害也

脈法

新產之脈緩滑吉實大弦急死來侵

註凡婦人新產之後其脈來緩滑者爲氣血通利

調和是安吉之兆也若見實大弦急之脉則凶必死之脉也

若得沉重小者吉忽若堅牢命不停

註若產婦診得沉重微小者此是形脉相應故云吉兆之脉忽然診得堅硬牢實之脉是脉盛形衰相反性命不可留停必死也

寸口澀疾不調死

註若產後寸口脉澀疾大小不調勻者此是血氣衰絕之脉故云死也

沉細附骨不絕生

註若重手按之乃得其脉沉細附著於骨不斷絕有力者此生活之兆也

審看此後分明記長須念此向心經

註凡爲醫者宜詳審脉證分明記於心胷也

按前論與脉訣刊誤所云不同觀者審之

嚴用和濟生方

產後服黑神散及芎藭湯論

母生子訖例服黑神散及芎藭湯者取其逐瘀血以生新血也倘惡露不盡停留胞絡生病多端輕者爲脹爲痛爲寒爲熱甚者月水不調閉斷不通久成血瘕以致尪羸

腹痛瀉痢

產後腹痛瀉痢蓋因產血氣勞傷外則腠理空疎內則腸胃虛怯若未滿月飲冷當風邪毒乘虛進襲留於分肉之間布於腸胃之內遂致腹脅疞痛痛如刀刺流入大腸腸鳴洞泄洞泄不已痢下赤白宜服調中湯又有食肉太早強食過多停積不化臍腹疼痛而成泄痢者誠有之矣法當消化停滯則愈但不可用牽牛巴豆峻劑以虛血氣見眼圓最佳倉卒未能辦此用局方中治中湯加砂仁煎服

血崩

產婦下血過多血氣暴虛未得平復或因勞役或因驚怒致血暴崩又有榮衛兩傷氣衰血弱亦變崩中若小腹滿痛此爲肝經已壞爲難治俱宜投固經圓止之若小腹滿脹此爲內有瘀血則未可止之止之非特淋瀝不止小腹轉加脹滿若小腹脹滿且服芎藭湯及黑龍丹若小腹不滿急是內無瘀血可服固經圓止之惡熱藥者進十灰圓亦得

腹脹悶滿嘔吐

胃受水穀脾主運化生血生氣內濡臟腑者也因產臟腑暴虛惡露下少敗血乘虛散於脾胃脾受之而爲腹脹胃受之則成吐逆亦有惡露過多氣無所主聚於脾胃脾受之則爲腹脹胃受之則爲吐逆宜抵聖湯然治惡露過多者於抵聖湯中去澤蘭赤芍藥倍加生薑橘皮更妙

中風

產後中風或身體緩急或頑痹不仁或口目不正或奄奄忽忽神情悶亂乃中風候宜服小續命湯

心痛

心者血之主人有伏宿寒因產大虛寒搏於血血凝不得消散其氣遂上衝擊於心之絡脉故心痛但以大巖蜜湯治之寒去則血脉溫而經絡通心痛自止若誤以爲所傷治之則虛極寒益甚矣心包絡寒甚傳心之正經則變爲眞心痛朝發夕死夕發朝死若因七情傷感血與氣併而心痛者宜服延胡索湯則痛自止

金劉完素六書

證治總論

產後經水適斷感於異證手足牽搐咬牙昏冒宜增損柴胡湯前證已去次服秦艽湯去其風邪

產後風氣在表面目四肢浮腫宜七聖丸主之以利爲度如浮腫喘嗽加木香檳榔倍之謂氣多也如浮腫又頭目昏冒加羌活川芎謂多風也

產後日久虛勞雖日久而脉浮疾者宜服三元湯日久虛勞微有寒熱脉沉而浮宜柴胡四物湯日久虛勞鍼灸小藥俱不效者宜服三分散日久虛勞不能食宜十全散

產後諸積不可攻當養陰去熱其病自退宜服芍藥湯

產後衝脹胷中有物狀是噎氣不降紫金丹主之

產後頭痛血虛痰癖寒厥皆令頭痛加減四物湯如有汗者是氣弱頭痛也加芍藥三兩桂一兩半生薑煎如痰癖頭痛加半夏三兩茯苓一兩半生薑煎如熱厥頭痛又加白芷三兩石膏三兩知母一兩半寒厥頭痛加天麻三兩附子一兩半生薑煎

產後血運血結血聚於胷中或偏於少腹或連於肋脅四物湯四兩倍當歸川芎加鬼箭紅花延胡各一兩同爲末煎取清調沒藥散服之

婦人產後諸病但以雙解散服之週身中外氣血宣通病皆除愈然雙解乃通仙之藥但除孕婦及產後月經過多并泄瀉者勿與服之

俗未知產後亡液損血疼痛怖懼以致神狂氣亂則陰氣損虛邪熱太甚而爲諸熱證由不讀素問不知造化故不識證候陰陽反妄以爲產後諸虛百損便爲虛冷而無熱也誤以熱藥溫補或見煩渴者不令飲水本雖善心爲害多矣豈治病之道但以臨時審其臟腑六氣虛實明其標本如法治之而已矣

孕婦臨月可服益元散凉胎產後仍服如血不盡則以凉膈與四物合煎調理經血甚者大承氣合四物乃瀉中有補也

胎產論

婦人童幼天癸未行之間皆屬少陰天癸既行皆從厥陰論之天癸已絕乃屬太陰經也治胎產之病從厥陰經者是祖生化之源也厥陰與少陽相爲表裏故治法無犯胃氣及上二焦爲三禁不可汗不可下不可利小便發汗者同傷寒下早之證利大便則脉數而已動於脾利小便則內亡津液胃中枯燥製藥之法能不犯三禁則榮衛自和榮衛和而寒熱止矣外則和於榮衛內則調於清便先將此法爲之初治次後詳而論之見證消息同壞證傷寒爲之緩治或小便不利或大便祕結或積熱於腸胃之間或已成瘕或散血氣而爲浮腫蓋產理多門故同傷寒壞證如發渴而用白虎氣弱而用黃芪血刺痛而用當歸腹中痛而加芍藥已上倒論不犯三禁皆產後之久病也若產後暴病禁犯又不可拘也如產後熱入血室者桃仁承氣抵當湯之類是也胃堅燥者大承氣不可以泄藥言之產後世人多用烏金四物是不知四時之寒熱不明血氣之虛與實盲然一概用藥如此而愈加增劇是醫人誤之耳大抵產病天行從增損柴胡雜證從加添四物然春夏雖從柴胡秋冬約同四物藥性寒熱病證虛實不可不察也四物湯常病服餌四時各有增損今具增損於後

春倍川芎一日春二日脉弦三日頭痛夏倍芍藥一日夏二日脉洪三日泄秋倍地黃一日秋二日脉濇三日血虛冬倍當歸一日冬二日脉沉三日寒而不食此常服順四時之氣而有對證不必者謂失其輔也春防風四物加防風倍川芎夏黃芩四物加黃芩倍芍藥秋天門冬四物加天門冬倍地黃冬桂枝四物加桂枝倍當歸此四時常服隨證用之也如血虛而腹痛微汗而惡風四物加肉桂謂之腹痛六合如風虛眩運加秦艽羌活謂之風六合如氣虛弱起則無力疽然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合如發熱而煩不能安臥者加黃連梔子謂之熱六合如虛寒脉微氣難布息不渴清便自調加乾薑附子謂之寒六合如中濕身沉重無力身凉微汗加白朮茯苓謂之濕六合此婦人常病及產後病通用之藥也治婦人虛勞局方中謂之首尾六合者如大聖散下熟乾地黃丸是治無熱虛勞專其養也中道藥也牡丹煎丸空心食前人參荊芥散臨臥食後是治有熱虛勞藥也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百十一卷目錄

醫部彙考三百九十一

婦人產後門二

張從政儒門事親產後忌用溫熱之劑　產後脹悶不宜用備急丸　腰痛　心風　產後熱

李杲十書　調用寒涼之藥論　浮腫

朱震亨心法　鬱論

平治會粹　總論

格致餘論　瘧痢沐浴論

局方發揮　初產禁服黑神散五積散論

戴思恭證治要訣　皮膚作痒　牡蠣　腹痛　大腸秘結　發熱速問　惡露不盡　漏月傷食

樓英醫學綱目　大便祕　虛勞　痛疾　惡露不下　針灸頭痛身疼　類冷湯　大豆紫湯　車螯　古月散三方論中風　瘧病　遺尿　嘔吐　產後發熱　調理法

虞摶醫學正傳　禁用芍藥湯　腫大不下

王綸明醫雜著　浴熱

李梴醫學入門　溏瀉血論　血運　心腹痛　小腹痛　腰痛下痛　虛熱　痙勢　吐血　腹病　咳嗽　清痰　痰喘　自汗　水腫　神　痢　風　汗　嘔　不語　不食　不寐　不欲　不能　不可　見性與我痛不可　調理法

薛己醫按　寫病　熱　瘧　證治　虛痛　發熱　血證　王肯堂證治準繩　調理　氣　痛　發熱　痰　產後　小便　不利　不寐　不食　不語　不可　不能　不欲　不寐　不食　不利　不可　不能　不欲

誤用寒凉之藥論

婦人分娩及半產漏下昏冒不省瞑目無所知覺蓋因血暴亡有形血去則心神無所養心與包絡者君火相火也得血則安亡血則危火上熾故令人昏冒火勝其肺瞑目不省人事是陰血暴去不能鎮攝也血已虧損往往用滑石甘草石膏之類乃辛甘大寒之藥能瀉氣中之熱是血虧瀉氣乃陰虧瀉陽使二者俱傷反爲不足虛勞之病昏迷不省者上焦心肺之熱也此無形之熱用寒凉之藥驟令下行豈不知上焦之病悉屬於表乃陰證也汗之則愈今反下之幸而不死暴虧氣血生豈能久又不知內經有說病氣不足宜補不宜瀉但瞑目之病悉屬於陰宜汗不宜下又不知傷寒證昏得汗則愈是禁用寒凉藥也分娩半產本氣不病是暴去其血亡血補血又何疑焉補其血則神昏常時血下降亡今當補而升舉之心得血而養神不昏矣血若暴下是秋冬之令大壯今舉而升之以助其陽則目張神不昏迷矣今立冬生活血湯補血養血生血益陽以補手足厥陰之不足

浮腫

產後浮腫宜中滿分消丸四物湯吞之

朱震亨心法

總論

產後無問今婦當大補氣血爲先雖有雜證以末治之一切病多見虛症不可發汗

產後不可用芳藥以其酸寒伐生發之氣故也

產後血逆內虛去載加上行酒煎運來方用庶何曉

灰出火毒研極細末好酒同童便灌下一呷即醒行血極快

產後中風切不可作風治必大補氣血爲主然後治痰當以左右手之脉分其氣血多少而治

產後中風口眼㖞斜切不可服小續命湯

產後水腫必用大補氣血爲主少佐蒼朮茯苓使水自利

產後水腫大劑白朮補脾若壅滿用半夏陳皮香附監之

產後大發熱必用乾薑輕者用茯苓淡滲其熱一應苦寒并發表之藥皆不可用

產後發熱惡寒皆屬血虛

產後發熱乳汁不通及膨脹者無子當歸用麥蘗二兩炒研細末滿湯調下作四服有子者用木通通草猪蹄煎服

凡產後有病先固正氣

前條云產後大熱必用乾薑或曰用黑者何也曰此熱非有餘之熱乃陰虛生內熱耳故以補陰藥大劑服之且乾薑能入肺和肺氣入肝分引血藥生血然不可獨用必與補陰藥同用此造化自然之妙非大下之至神孰能與於此乎

產後泄瀉惡露不行此餘血流入大腸爲瀉洞泄不禁下青白黑色用荊芥大者四五棵於盞內燒灰不得犯油火入麝香研湯調下此藥雖微能治大病方名的奇散

婦人產後浮腫小便少口渴惡寒無力脉皆沉此體虛而有濕熱之證必上焦滿悶宜補中導水行氣可也

平治會萃

總論

產後當清熱補血氣

產後纔見身熱便不可發表發熱惡寒皆是氣血虛左手脉不足補血藥多於補氣藥右手脉不足補氣藥多於補血藥

惡寒發熱腹痛者當去惡血腹滿者不是腹痛者是格致餘論

胞損淋瀝論

常見尿胞因收生者不謹以致破損而得淋瀝病遂爲廢疾一日有徐姓婦壯年得此因思肌肉破傷屬在外者日可補完胞難在收恐亦可治遂詮其脉虛其因難產之由多是氣虛難產之後血氣尤虛試與峻補因以參朮爲君芎歸爲臣桃仁陳皮黃芪茯苓爲佐而煎以猪羊胞湯極餒時飲之其劑率用一兩至一月而安蓋是氣血虛長其胞自完恐稍遲緩亦難成功

局方發揮

初產禁服黑神散五積散論

或曰初產之婦好血已虧褥血尚留黑神散其要藥歟余曰至哉坤元萬物資生理之常也初產之婦好血未必虧污血未必積臟腑未必寒何以藥爲飲食起居勤加調護何病之有誠有污血體怯而寒真之散貼亦自簡便或有他病當求病起何因病在何經氣病治氣血病治血寒者溫之熱者清之羸者行之虛者補之血多者止之何用妄製藥方致令無病生

病俱黑神散者用乾薑當歸之溫熱黑豆之甘熟地黃之微寒以補血之虛佐以炒蒲黃之苦以防出血之多芍藥之酸寒有收有散以爲四藥之助官桂之大辛熱以行滯氣推凝血和以甘草之緩其爲取用似乎精密然驅逐與補益似難同方施治設有性急者形瘦者本有怒火者夏月坐蓐者時屬火令薑桂皆爲禁藥論語未達之戒不知誰執其咎至於將護之法尤爲悖理肉汁發陰經之火易成內傷之病先哲具有訓戒胡爲以羊雞濃汁作糜而又常服當歸丸當歸建中湯四順理中丸雖是滋補悉犯桂附乾薑僭熱之劑臟腑無寒何處消受若夫兒之初生母腹頓寬便啖雞子且喫火鹽不思雞子難化火鹽發熱展轉爲病醫者不識每指他證率爾用藥寧不悞人余每見產婦之無疾者必教以却去黑神散與夫雞子火鹽諸般肉食且與白粥將理間以些少石首鯗羹令甘淡食之至半月以後方與少肉若雞子亦須劃開淡煑大能養胃却疾彼富貴之家驕恣之婦卒有白帶頭風氣痛膈滿痰逆口乾經水不調髮脫體熱皆是陽勝陰虛之病天生血氣本自和平曰勝曰虛又焉知非此等謬妄啓之耶

若五積散之治產後餘血作痛以蒼朮爲君麻黃爲臣厚朴枳殼爲佐雖有芍藥當歸之補血僅及蒼朮三分之一且其方中言婦人血氣不調心腹撮痛閉而不行並宜服之何不思產後之婦有何寒耶血氣未充似難發汗借曰推陳致新藥性溫和豈可妄用麻黃之散附以蒼朮枳殼虛而又虛禍不旋踵率爾用藥不思之甚

明戴思恭證治要訣

皮膚作癢

婦人或通身癢或頭面癢如蟲行皮中緣月水來時爲風所吹不然則是產蓐中食動風物致之宜四物湯調消風散

發熱

產後諸病有作寒作熱而亦有獨熱然獨熱亦有三惡血未下者腹痛而發熱感外邪者必有頭痛惡風而發熱惟血虛者但發熱而無餘證名曰蓐勞宜同血虛證用藥

腹痛

產後腹疼惡血不止諸藥不效宜芎歸湯加五味靈脂延胡索煎

面黑發喘

產後血入肺面黑發喘宜參蘇飲

大便祕結

產後去血大便不潤而祕宜橘杏圓麻仁圓因失血祕結者皆可用

發熱迷悶

產後發熱迷悶俗謂之發熱血溫熱水調獨行散一錢或豆淋酒太熱用童便調尤宜若剉散便煎亦得

惡露不盡

婦人懷子服固胎藥太多或正產或半產胎雖下而惡血不即去或經二三月而惡露猶滴此非敗血之比正緣向來有固經藥在內致血滯而不化藥宜順血通氣不宜畜血閉氣

彌月傷食

彌月俗名滿肚多有恣意食物致傷食發熱有類傷寒食復之證宜先用紅圓子一二服却進小柴胡湯此論蓋有所本

樓英醫學綱目

大便祕

婦人產後有三種疾鬱冒則多汗汗多則大便祕故難於用藥惟麻子粥最爲穩當

虛腫

產後虛腫喘促利小便則愈奪魂散主之

惡露不下

產後惡露方行忽然漸少斷絕不來腹中重痛此由血滯宜桃仁湯如有大痛處必作癰疽當以癰疽法治之

汗出不識人

產後忽冒悶汗出不識人者暴虛故也

瘧疾

產後瘧疾多由污血挾寒熱而作大法宜柴胡四物湯調之熱多者宜服草果飲子寒多者宜服生熟飲子

發熱

產後發熱多屬虛寒惟乾薑加入補藥中神效此丹溪妙法也

發熱頭痛身疼

凡產後發熱頭痛身疼不可便作感冒治之此等多是血虛或敗血作梗宜以平和之劑與服必效如玉露散或四物加北柴胡等分煎服若便以小柴胡湯及竹葉石膏之類竟不救者多矣

續命湯大豆紫湯舉鄉古拜散三方論

續命湯大豆紫湯舉鄉古拜散太陽厥陰藥也邪實脉浮弦有力者固宜但產後血氣太虛之人不宜輕發其表但用防風當歸散治之爲妙

中風

產後中風用續命湯及羌活發散之藥必詳氣血以四物四君子相與各半停對分兩服之可也

痙病

凡產後痙病皆因虛遇風挾痰而作宜服人參竹瀝之類

遺尿

婦人產後尿不禁面微浮略發熱於午後此膀胱爲坐婆所傷宜用黃芪當歸芍藥各一錢半白朮一錢人參陳皮五分甘草炙二分煎熟飲之

喘

婦人產後喘極危多死也

虞摶醫學正傳

禁用芍藥論

或問婦人產後諸疾古方多用四物湯加減調治我丹溪先生獨謂芍藥酸寒能伐發生之氣禁而不用何歟曰新產之婦血氣俱虛之甚如天地不交之否有降無升但存秋冬肅殺之令而春夏生發之氣未復故產後諸證多不利乎寒涼之藥大宜溫熱之劑以助其資始資生之化源也蓋先哲制四物湯方以川芎當歸之溫佐以芍藥地黃之寒是以寒溫適中爲婦人諸疾之妙劑也若或用於產後必取白芍藥以酒重復製炒去其酸寒之毒但存生血活血之能胡爲其不可也後人傳寫既久脫去製炒計文丹溪虞夫俗醫鹵莽不製而用之特舉其爲害之由以戒之耳若能依法製爲用何害之有哉

胞衣不下

胞衣不下大爲可懼宜多方用藥逐下甚不可令粗率之婦摘取盲見有擠破尿胞致終身之害者有取下肝葉而產母隨時殞命者可不謹歟

王綸明醫雜著

發熱

凡婦人產後陰血虛陽無所依而浮散於外故多發熱治法用四物湯補陰血而以炙乾薑之苦溫從治收其浮散使歸依於陰然產後脾胃虛多有過於飲食傷滯而發熱者誤作血虛則不效矣但遇產後發熱若胷膈飽悶噯氣惡食泄瀉等證只作傷食治之若發熱而飲食自調者方用補血正法

新產陰血暴傷陽無所附而外熱宜用四物炮薑補陰以配陽若因誤服寒涼尅伐之劑而外熱此爲寒氣隔陽於外宜用四君子加薑桂如不應急加附子若或肌膚發熱面目赤色煩渴引飲此血脫發躁宜用當歸補血湯若胷膈飽悶噯腐惡食或吞酸吐瀉發熱此爲飲食停滯宜用四君子加厚朴山楂若胷膈滿悶食少發熱或食而難化此爲脾氣虛弱宜用六君子加炮薑若用峻厲之劑致腹痛熱渴寒熱嘔吐等證此爲中氣復傷急用六君子加炮薑若認爲熱投以他劑則誤矣

李梴醫學入門

消瘀血論

正產體實無病不藥可也但難產氣衰瘀血停留非藥不行古法一產後用古芎歸湯加童便一半服之如無童便以淡酢磨墨一小盞入前湯藥亦好

產後百病皆血虛火盛瘀血妄行而已矣間有內傷飲食外感風寒然亦必先逐瘀補虛爲主

產後瘀消方可行補如左脉弱加補血藥右脉弱加補氣藥如不逐瘀遽服參芪甘美停滯之劑有瘀血攻心即死者食肉太早亦然

血運

產後去血過多眼花頭眩昏悶煩躁或見頭汗者古芎歸湯入童便甚者加炒黑乾薑人參汗多加黃芪或八味黑神散單五靈脂散返魂丹胃弱血虛發厥倉公散白薇湯臨產用力勞心氣虛而運者用人參一兩蘇木五錢水煎入童便調服氣血俱虛痰火泛上作運者八物湯合二陳湯去白芍火載血上昏運或挾風邪者清魂散被驚者抱膽丸朱砂安神丸

心腹痛

產後腹心疼痛全是瘀血八味黑神散四味散失笑散有寒熱者當歸鬚散食滯寒熱心腹痛者熟料五積散加莪朮

心痛

產後感寒心痛者理中湯七情心痛者木檳湯虛寒心痛者桂心湯

小腹痛

產後小腹痛者名兒枕痛單五靈脂散或加桃仁酢糊爲丸氣虛四君子湯下血虛四物湯下

臍下痛

生產後產門腫下虛痛者大溫經湯羊肉湯

寒熱

產後血虛發熱氣虛惡寒氣血俱虛發熱惡寒切不可發表陰虛血弱者四物湯小熱加茯苓爲君熱甚加炒乾薑爲佐去血過多外熱內煩短氣悶亂者人參當歸散蒸乳發熱者四物湯加參芪白朮天花粉發熱晝靜夜劇者四物湯去芍藥量加柴胡氣血俱虛寒熱者補虛湯產後慎不宜凉也

厥勞

產後勞役過度名曰厥勞其證虛羸午起午臥飲食不消時有欬嗽頭目昏痛發渴盜汗寒熱如瘧腎臍拘急宜十全大補湯去芎加續斷牛膝鼈甲桑寄生桃仁爲末猪腎一對去脂膜蘆一片棗三枚水二盞煎至一盞入前末二錢葱三寸烏梅半箇荊芥五穗同水煎空心服身痛寒熱者當歸羊肉湯腰子湯

吐瀉腹痛或脹

產後食肉太早瘀滯者熟料五積散痛甚加我朮嘔加砂仁瀉加薑附人參泄瀉不止臍腹痛者理中丸加肉豆蔻挾寒腹痛腸鳴小便清白不渴者四君子湯合五苓散加肉豆蔻炒白芍挾熱腸垢便澀痛一陣瀉一陣口渴者四君子湯合四苓散加酒炒黃連及木通少許或益元散挾濕身重腹脹者胃苓湯因敗血乘虛入胃嘔吐脹滿者六君子湯加澤蘭葉赤芍乾生薑腹脹胃氣不和者桔梗半夏陳皮等分薑煎服脾脉弦者三白湯加乾薑陳皮黃芪滑石甘草飲食成積痞者內炙散脫皖丸

霍亂

產後霍亂吐瀉煩渴肢冷者理中湯加陳皮麥門冬薑煎厥冷者加附子渴者五苓散轉筋者木瓜散

痓病

產後者[illegible]無力者胠風丸或煎服

煩渴

產後煩渴氣虛者生脉散血虛者四物湯加天花粉麥門冬氣血俱虛作渴頭眩脚弱飲食無味者用人參二錢麥門冬一錢半熟地七分天花粉三錢甘草五分糯米薑棗煎服心虛驚悸者亦宜

自汗

產後發熱自汗者古歸芪湯汗甚加白朮防風牡蠣麥門冬熱地茯苓甘草或黃芪建中湯自汗兼腫滿者大調經散白汗肢體疼痛者當歸羊肉湯

不語

產後敗血停畜上干於心心氣閉澀舌强不能言語者七珍散四味散有臨產服湯藥過多胃濕便然者熟料五積散六君子湯痰熱迷心不語者導痰湯或痰氣鬱滯閉目不語者用生白礬末一錢水調服

怔忡

產後血少怔忡睡臥不寧者十味溫膽湯或寧神膏定志丸

淋

產後五淋白茅湯敗血淋瀝不斷者烏金散淋久不止四肢乏力沉困者牡蠣散

浮腫

產後敗血停畜化水循經流入四肢浮腫者小調經湯血氣虛者四君子加蒼朮或女金丹血虛者補虛湯少加蒼朮茯苓使水自利忌峻劑攻利

痢疾

產後痢疾惡露未盡者多瘀凝滯腸胃與經後血滯作痢一同四物湯加桃仁黃連木香主之裹急甚者通元二八丹

欬嗽

產後欬嗽多是瘀血入肺古二母散加桃仁杏仁人參茯苓水煎其餘以意會之可也

口鼻黑鼻衄

產後氣血散亂入於諸經不得還元故口鼻黑起乃變鼻衄皆因產後虛熱所致胃絕肺敗犀角地黃湯救之

陰門突出

婦人因產用力過多陰門突出者四物湯加龍骨末少許連進二服外用蓖麻子搗爛貼頂少收即去蓖麻

暫服卽調補之

傷寒

產後傷寒發熱宜四物湯倍芎歸加輭柴胡炒乾薑人參佐之如惡露未去者柴胡破瘀湯凡藥必加四物湯爲主乃養血之源也六經見證同胎前用藥

雜病治法

產後雜病與男子一同但當兼補兼逐瘀則病無不愈丹溪云大補榮衛爲主雖有雜病以末治之是也

調理乳母法

凡乳母但覺小水短少卽是病生便須服藥調理脾胃肝腎如不愈者必氣滯且逆也蓋婦人凡事不得專行多憂思忿怒憂思過則氣結而血亦結忿怒過則氣逆而血亦逆甚則乳鞕脅痛煩熱要之女病皆因氣血鬱結所以古方多用香附砂仁木香檳榔青皮枳殼者行氣故也

薛己醫按

發痓

產後發痓大補血氣多保無虞若攻風邪死無疑矣

寒熱

產後寒熱因氣血虛弱或脾胃虧損乃不足之證經云陰虛則發熱陽虛則惡寒若兼大便不通尤屬氣血虛弱切不可用發表降火若寸口脈微名陽氣不足陰氣上入於陽中則惡寒用補中益氣湯尺部脈弱名陰氣不足陽氣下陷於陰中則發熱用六味地黃丸大抵陰不足陽往從之則陽內陷而發熱陽不足陰往從之則陰上入而惡寒此陰陽不歸其分以致寒熱交爭故惡寒而發熱也當用八珍湯若病後四肢發熱或形體倦怠此元氣未復濕熱乘之故耳宜補中益氣湯若肌熱大渴引飲目赤面紅此血虛發熱用當歸補血湯若認爲寒則誤矣

瀉痢

產後瀉痢或因飲食傷損脾土或脾土虛不能消食當審而治之

薏苡仁方論

腹痛發熱或脹滿不食水道滯澀產後多有此證薏苡仁湯藥品和平其功且速

脫肛

婦人產育用力多致脫肛治之必須溫肺腑腸胃久則自然收矣

雜證

婦人性情執著不能寬解多被七情所傷遂致徧身作痛或肢節腫痛或氣塡胷滿或如梅核塞喉嚥吐不出或延疾壅盛上氣喘急或嘔逆惡心甚者渴悶欲絕產婦多成此證宜服四七湯先調滯氣更以養血之藥若因思憂致小便白濁者用此藥吞青州白丸子屢效

虛煩發熱

竊謂前證乃陽隨陰散氣血俱虛若惡寒發熱煩躁作渴急用十全大補湯若熱愈甚急加桂附若作渴面赤宜用當歸補血湯若誤認爲火證投以凉劑禍在反掌王太僕先生云如大寒而甚熱之不熱是無火也熱來復去晝見夜伏夜發晝止不時而熱是無火也當治其心如大熱而甚寒之不寒是無水也熱動復止倏忽往來時動時止是無水也當助其腎故心盛則生熱腎盛則生寒腎虛則寒動於中心虛則熱收於內又熱不勝寒是無火也寒不勝熱是無水也治法前證無水者六味丸無火者八味丸氣血俱虛者八珍湯與十全大補湯

血渴

竊謂前證若出血過多虛火上炎用童子小便或四物白朮麥門丹皮若胃氣虛而有熱用竹葉歸芪湯若血虛發熱用八珍加麥門五味若血脫發熱煩躁用當歸補血湯若胃氣虛弱用補中益氣湯或七味白朮散

血過多者恆病焉其爲病睛珠痛不能視羞明癮澀眼睫無力骨太陽因爲酸痛當作當歸養榮湯當歸補血湯除風益損湯滋陰地黃丸隨宜用之有熱者加黃芩脾胃不和惡心不進食者加生薑若婦人產漏者加阿膠復其血使有所養則愈然要忌鹹物宣明五氣篇曰鹹走血血病無多食鹹

王肯堂證治準繩

調理法

凡婦人患風氣臍下虛冷皆產後未滿百日會合之故也愼之

產後七日內惡血未盡不可服湯候其血塊散乃進羊肉湯有痛甚切者不在此例候兩日視消息可服澤蘭丸此至滿月丸藥盡爲佳不爾虛損不可平復至極消瘦不可救者服五石澤蘭丸補之服法必七日之外不宜太早

虛煩

尋常治諸虛煩熱者以竹葉石膏湯溫膽湯殊不知

產後與尋常不同如石膏等藥不宜輕用用之必死

午熱午寒辨

產後午寒午熱榮衛不和難以輕試若其敗血不散豈止入脾肺二藏耶大抵一陰閉一陽即作寒熱陰勝故寒陽勝故熱只可云敗血循經流入閉諸陰則寒閉諸陽則熱血氣與衛氣解則休遇再會而復作大調經散五積散入酥煎佳

脚氣用小續命湯論

陳無擇曰脚氣固是常病未聞產後能轉爲者往往讀千金見產婦多有此疾之語使出是證文辭害意蓋可見矣設是熱悶氣上如何便服續命湯此藥本主少陽經中風非均治諸經脚氣要須依脚氣方論陰陽經絡調之陳無擇雖有此論然小續命湯加減與之用無不效故百問云寒中三陽所患必冷小續命湯主之加生薑汁更快暑中三陰所患必熱小續命湯去附子減桂一半大煩躁者紫雪最良如無紫雪用真蒲荷煎冷水嚥下但產方必與四物湯各半服之方妙

大便祕澀

產後不得利利者百無一生去血過多臟燥大便祕澀則固當滑之大黃似難輕用惟葱涎調臘茶爲丸復以臘茶下之必通余嘗用局方四物湯以生地黃易熟地黃加青皮去白煎服甚效

發痙

陳臨川云凡產後口噤腰背強直角弓反張皆名曰痙又名曰痓古人必察有汗無汗以分剛柔陰陽而治今產寶諸書有中風口噤一門角弓反張一門其實一也如憎寒發熱有類傷寒皆不論及豈可以一二藥治之

臨川又云陳無擇曰產後汗出多變痙亦令服續命湯此言難信既汗多如何更服麻黃官桂防己黃芩葛不若大豆紫湯爲佳局方大聖散亦良藥也愚觀朱奉議云凡剛柔二痙小續命湯並可加減與之若柔痙自汗者去麻黃加葛根之說朱奉議必有所據雖大豆紫湯大聖散良亦不可偏見曲說有妨古人之意

遺尿

產後遺尿乃腎氣不固宜五味子丸主之

兒枕與腹痛不同

母胎中宿有血塊產後不與兒俱下而仍在腹作痛謂之兒枕其惡露下不快而作疼痛者胎中原無積聚不爲兒枕也若惡露已盡或由他故腹痛如仲景枳實芍藥散證或由血虛作痛如仲景當歸生薑羊肉湯證自當別論若服枳實芍藥散不愈仍當求責瘀血若遇血虛之證而補虛諸方亦當隨宜用之

目病

產後目不赤不痛若無別病只是時常流出冷淚甚則視而昏眇也非止迎風冷淚因虛引邪病尚輕者蓋精液傷耗肝膽氣弱胥瀝腎水不足久而失治則有內障青盲視瞻昏眇之患產後悲泣太過者每多此疾且爲患又緩人不爲慮往往罹其害而禍成也悔已遲矣

產則百脈皆動氣血俱傷大虛不足邪易以乘肝部發生之氣甚弱血少而膽失滋精汁不盛則目中精宿氣液皆失化源所以目病者多然輕重內外不同有勞瞻易視悲傷哭泣而爲無時冷熱淚內障昏眇等證有敗不察引入風邪爲濕爛頭風者有因虛沐髮濕氣歸腦而爲內障諸病者有因虛勞役交接嗜熱及患熱病而傷目血爲外障者皆內不足所致善知愛護者疾微而不變不知保養反縱斲喪則變重不一大抵產後病宜早治莫待其久久則氣足血定而病深治亦不易其外證易知者人皆知害而早治其內證害緩者人多忽之此其成也爲無及之悔者多矣

景岳全書 明張介賓著

產後當大補氣血論

嘗見丹溪云產後當大補氣血即有雜證以末治之一切病多是血虛皆不可發表此其意謂血氣隨胎而去必屬大虛故無論諸證皆當以大補爲先其他皆屬可緩余於初年誠然佩服及執而用之則每爲所困經者數次始悟其言雖有理而未免言之過也即今產科所宗無非此法余曰視其誤及親爲解救者蓋不少矣故敢剖析於後實有所見不得不言非存心自衒故毀先賢也

產後氣血俱去誠多虛證然有虛者有不虛者有全實者凡此三者但當隨證隨人辨其虛實以常法治療不得有成心概行大補以致助邪此辨之不可不真也

產後虛證無非隨人元氣必素弱之人多有之或於產後血氣俱去而更弱者亦有之此當因人察脈因脈察證若脈氣形氣病氣俱不足此當以全虛治之

若形氣不足病氣有餘或兼火邪或兼外邪或以飲食停滯是亦虛中有實不得不詳審而治此中委曲未能言盡惟明者悟之

產後不虛證蓋或其素日無病或以年少當時或以素耐辛苦貧勞之質此輩本無不足及其一旦受孕乃於無病腹中參入此物故致血氣壅塞爲脹爲喘是皆添設有餘之病及其既產始見通快所留得去仍復故吾常人之產此類極多果何虛之有然或以內傷或以外感產後之病難保必無倘有所犯去之即愈若概行大補果能堪否即臨盆帶去血氣未免暫見耗損然以壅滯之餘不過皆護胎隨從之物去者當去生者旋生不出數日必已來復此生化自然之理何至是產皆虛也凡治此類但當因證用治若執云產後必當大補氣血則實實之病必所不免而輕者必甚甚者必危矣由此觀之則立言者固不易而用言者又豈易哉

產後全實證有如外感風寒頭痛身熱便實中滿脈緊數洪大有力者此表邪之實證也又火之盛者必熱渴躁煩或便結腹痛口臭舌焦黑酷喜冷飲脈駛尿管痛赤脈見洪滑此內熱之實證也又鬱怒動肝胃脅脹痛大便不利脈弦而滑此氣逆之實證也又惡露未盡挾血上衝心腹脹滿疼痛拒按大便難而小便利此血逆之實證也又凡富貴之家保護太過或過用人參芪朮以致氣壅或過用糖酒炭火以致內熱或產本不虛而妄用大補之藥以致增病此調攝之實證也又或因產過食惡其勞困固令勉強以致停畜不散此內傷之實證也夫既有表邪則不得不解既有火邪則不得不清既有內傷停滯則不得不開通消導丹溪之言豈可偏執

論三禁

觀病機機要云治胎產之病當從厥陰證論之宜無犯胃氣及上二焦是爲三禁謂不可汗不可下不可利小便但使不犯三禁則營衛自和而寒熱自止矣凡用治之法如發汗則白虎氣弱則黃芪血痛則當歸腹痛則芍藥大抵產病天行從加減柴胡雜證從增損四物宜察脈證而用之詳此說雖爲產育之大法然病變不同倘有是證則不得不用是藥所謂有病則病受之也但此經常之法固不可不知而應變之權亦不可執一也

腹痛

產後腹痛最當辨察虛實血有留瘀而痛者實痛也無血而痛者虛痛也大都痛而且脹或上衝胷脅或拒按而手不可近者皆實痛也宜行之散之若無脹滿或喜揉按或喜熱熨或得食稍緩者皆屬虛痛不可妄用推逐等劑

凡新產之後多有兒枕腹痛者摸之亦有塊按之亦微拒手故古方謂之兒枕皆指爲胞中之宿血此大不然夫胞胎俱去血亦豈能獨留蓋子宮畜于既久忽爾相離血海陡虛所以作痛胞門受傷必致壅腫所以亦若有塊而實非眞塊腫既未消所以亦頗拒按治此者但宜安養其臟不久即愈惟厥胞煎爲最妙其次則四神散五物煎皆極佳者若誤認爲瘀而妄用桃仁紅花延胡青皮之屬反損臟氣必增虛病有母體本虛而血少者即於產時亦無多血此輩尤非血滯若有疼痛只宜治以前法或以大小營煎黃雌雞湯主之

凡新產之後其有陽氣虛弱而寒從中生或寒由外入以致心腹作痛嘔吐不食四肢厥冷者宜九蜜煎大巖蜜湯或理陰煎主之

產後惡露不盡蓄滯作痛者亦常有之然此與虛痛者不同必其由漸而甚或大小便不行或小便鞕實作脹痛極不可近手或自下上衝心腹或痛極牙關緊急有此實證當速去其血近上者宜失笑散近下者宜通瘀煎奪命丹廻生丹如或未效當用決津煎爲善

產後有脾虛腎虛而爲腹痛者此不由產而由臟氣之不足若脾氣虛寒爲嘔吐爲食少而兼腹痛者宜五君子煎六君子湯溫胃飲之類主之若腎氣虛寒爲瀉爲痢而兼腹痛者宜胃關煎理陰煎之類主之

產後有飲食停滯及氣逆作痛亦當因其類而消去之如排氣飲大和中飲之類皆可酌用

發熱

產後發熱有風寒外感而熱者有邪火內盛而熱者有水虧陰虛而熱者有因產勞倦虛煩而熱者有去血過多頭運悶亂煩熱者諸證不同治當詳察

產後有外感發熱者蓋臨盆之際多有露體用力無暇他顧此時或遇寒邪則乘虛而入感之最易若見頭疼身痛憎寒發熱或腰背拘急脈見緊數即產後外感證也然此等外感不過隨感隨病自與生傷寒宿感者不同故略加解散即自瘳可謂新產之後不宜表散但當酌虛實而用得其宜耳

凡產後感邪氣不甚虛者宜三柴胡飲若氣虛脾弱而感者宜四柴胡五柴胡飲若肝脾腎三陰不足而感者宜補陰益氣煎若虛寒之甚者宜理陰煎若產婦強壯氣實而感者宜正柴胡飲若兼內火盛而外邪不解者宜一柴胡飲若風寒俱感表裏俱滯者宜五積散

產後有火證發熱者但外感之熱多在表火證之熱多在裏此必以調攝太過或時令熱甚或強以酒或誤用參朮薑桂大補之藥或過用炭火或窻牖太密人氣太盛或氣體本實而過於動作凡屬太過皆能生火火盛於內多見潮熱內熱煩渴喜冷或頭痛多汗便實尿赤及血熱妄行但無表證脈見緩滑不緊而發熱者便是火證宜清化飲保陰煎之類主之若本元不虛或火之甚而勢之急者即徙薪飲抽薪飲亦所常用不必疑也

產後有陰虛發熱者必素稟脾腎不足及產後氣血俱虛故多有之其證則倏忽往來時作時止或晝或夜進退不常或精神困倦怔忡恍惚但察其外無表證而脈見弦數或浮弦豁大或微細無力其來也漸非若他證之暴至者是即陰虛之候治當專補眞陰宜小營煎三陰煎五陰煎之類隨宜主之若陰虛兼火而微熱者宜一陰煎若陰虛兼火之甚而大熱者宜加減一陰煎若陰虛火盛熱而多汗者宜當歸六黃湯

若陰中之陽虛火不歸源而熱者宜大營煎理陰煎右歸飲之類主之若血虛陽不附陰煩熱作渴者宜人參當歸湯若氣血俱虛發熱煩躁面赤作渴宜八珍湯十全大補湯若熱甚而脈微者宜急加桂附或認爲火則禍在反掌

產後有去血過多發熱者其證必煩渴短氣頭痛頭運悶亂內熱是亦陰虛之屬宜人參當歸湯主之

產後蓐勞困倦惟猪腰湯爲妙或用黃雌雞湯白茯苓散若虛汗不止宜母雞湯若兼臟寒者宜羊肉湯若氣血俱虛者宜五福飲十全大補湯若兼外邪發熱者宜補陰益氣煎補中益氣湯若兼外邪發熱而中寒背惡寒者宜理陰煎加減治之若兼陽虛內寒者宜五君子煎或理陰煎若陽盛陰虛兼內熱者宜五福飲加芍藥黃芩地骨皮之類隨宜用之

喘促

產後喘急有二一以陰虛之極一以寒邪在肺蓋產後既已大虛焉得氣實而喘若肺無寒邪而見喘促者此以血去陰虛孤陽無主故氣窮短促而浮脫於上此實肝腎不接無根將脫之兆最爲危候經曰肝苦急急食甘以緩之正此類也惟貞元飲爲治此之神劑若氣虛兼寒者宜大補元煎或理陰煎若風寒外感邪氣入肺而喘急者此必氣粗胷脹或多欬嗽自與氣短似喘上下不接者不同治當以疎散兼補爲主宜金水六君煎或六君子湯若單以寒邪入肺氣實氣壅而本無虛者宜六安煎或二陳湯加蘇葉之類主之

惡露

產後惡露不止若因血熱者宜保陰煎清化飲有傷衝任之絡而不止者宜固陰煎加減用之若肝脾氣虛不能收攝而血不止者宜壽脾煎或補中益氣湯若氣血俱虛而淡血津津不已者宜大補元煎或十全大補湯若怒火傷肝而血不藏者宜加味四物湯

發痙

產後發痙乃陰火大虧證也其證則腰背反張戴眼直視或四肢強勁身體抽搐在傷寒家雖有剛痙柔痙之辨然總之則無非血燥血枯之病而實惟足太陽與少陰主之蓋膀胱與腎爲表裏腎主精血而太陽之脈絡於頭目項背所以爲病若此若其所致之由則凡如傷寒誤爲大汗以亡液大下以亡陰或潰瘍膿血大泄之後乃有此證故在產後亦惟去血過多或大汗大瀉而然其爲元氣虧極血液枯敗也可知凡遇此證速當察其陰陽大補氣血用大補元煎或理陰煎及十全大補湯之類庶保其生若誤爲風痰而用發散消導等劑死無疑矣

胞衣不出

氣血疲弱不能傳送而停閣不出者其證但見無力而別無痛脹治當補氣助血宜速用決津煎或滑胎煎保生無憂散局方黑神散之類主之

惡露流入胞中脹滿不出者蓋兒既脫胞帶必下墜故胞在腹中形如仰葉仰則盛聚血水而脹碍難出老成穩婆多有識者但以手指頂胞底以使血散或以指摸上口攀開一角使惡露傾瀉則腹空自落矣血滲胞中停畜既久而爲脹爲痛或喘或急則非逐血破血不可也宜速用奪命丹或用失笑散以熱酒調服使血散脹消其衣自下若氣血兼虛者亦惟決津煎爲善

血運

胎胞既下氣血俱去忽爾眼黑頭眩神昏口噤昏不知人古人多云惡露乘虛上攻故致血運不知此證有二曰血運曰氣脫也若以氣脫作血運而用辛香逐血化痰等劑則立刻斃矣不可不慎也

血脫之證產時血既大行則血去氣亦去多致昏運不省微虛者少頃即甦大虛者脫竭即死但察其面白眼閉口開手冷六脉細微之甚即是氣脫證也速用人參一二兩急煎濃湯徐徐灌之但得下咽即可救活若少遲延則無及矣嘗見有禁參而斃者云新產後不可用參用參則補住惡血必致爲害即勸之亦不肯用直待斃而後悔者數人矣又有云產後必過七日方可用參此等愚昧訛傳不知始自何人誤人不淺萬萬不可信也

血運之證本由氣虛所以一時昏運然血壅痰盛者亦或有之如果形氣脉氣俱有餘胷腹脹痛上衝此血逆證也宜失笑散若痰盛氣粗宜二陳湯如無脹痛氣粗之類悉屬氣虛宜大劑芎歸湯八珍湯之類主之

倉猝昏運藥有未及或以酢沃燒秤錘或以酢塗口鼻或燒舊漆器及乾漆等法惟輕而暴運者所宜若氣虛之甚而昏厥者非用大補之劑終無益也

按薛立齋云凡產母分娩艱難勞傷胎氣多有兒難脫胞而乏力垂危或已死者切不可便斷臍帶當急用大紙燃蘸香油於臍帶上往來燒斷之取其陽氣以續胎元俄頃兒得啼聲即已活矣且可免胃寒泄瀉之病凡見此者若以刀斷臍帶則子母皆多難保此論極善但燒帶之法惟素多陽虛及產時氣脫者最宜用之以助陽氣若母氣陽強或兒聲洪亮者皆不宜用恐火從臍入日後致生熱毒則反爲害不少

石室祕錄 臣陳士鐸著

產後宜補論

產後之病不可枚舉終以補氣補血爲主余未嘗不可定方而概治之也產後往往血運頭痛身熱腹疼或手足逆而轉筋或心脅滿而嘔吐風邪入而變爲陰寒或涼氣侵而直爲厥逆皆死亡定於旦夕而危急亂於須臾也此時若作外證治之藥下喉即死可不慎歟方用人參五錢白朮五錢熟地一兩當歸二兩川芎一兩荊芥末炒黑二錢此方爲主有風感之加柴胡六分有寒入之加附子一錢肉桂一錢其餘諸證俱不可亂加以此方服之無不神效但可減分兩而不可去取藥味蓋產婦一身之血盡行崩下皮毛腠理如紙之薄邪原易入然亦易出也故以大劑補正之中略加祛邪之藥少粘氣味邪則走出於軀殼之外烏可照平常無病之人慮其邪之難散而重用逐邪之方也方中妙在純是補氣補血之品全不顧邪盡於輔正正氣既多邪氣自遯況方中原有荊芥之妙劑不特引氣血各歸經絡亦引邪氣各出皮毛此方之所以奇而妙妙而神也唯有兒枕作痛手按之少痛者加入山楂十粒桃仁五箇可也一劑即去之餘藥萬不可輕用增入也問熟地三日內可服否曰一日何嘗不可服也

產後諸證以補氣血爲主方用人參三錢當歸一兩川芎五錢荊芥炒黑一錢益母草一錢水煎服有風加柴胡五分有寒加肉桂一錢血不淨加山楂十粒血運加炒黑薑片五分鼻中衄血加麥冬二錢夜熱加地骨皮五分有食加山楂五粒穀芽一錢有痰少加白芥子五分餘斷斷不可輕入此方純補氣血而不治表所以爲妙余親治產後無不神效

血運

產後血燥而運不省人事此呼吸危亡時也蓋因亡血過多舊血既出新血不能驟生陰陽不能接續以致如此方用救運至聖丹人參一兩當歸二兩川芎一兩白朮一兩熟地一兩炒黑乾薑一錢水煎服人參以救脫歸芎以逐瘀生新熟地白朮利腰臍而補脾腎黑薑引血歸經以止運一劑便可獲效奪死爲生真返魂之妙方也

感受風寒

產後感太陽風邪大喘大吐大嘔不治之證也喘則元陽將絕況大喘乎吐則胃氣將亡況大吐乎嘔則脾氣將脫況大嘔乎產後血氣大弱如何禁此三者自是死證無疑吾欲於死裏求生將用何方以救之仍然大補氣血而少加止吐止嘔止喘之藥而太陽風邪反作末治而已矣方用轉氣救產湯人參三兩麥冬三兩白朮一兩當歸一兩川芎二錢荊芥一錢桂枝三分水煎服一劑而喘轉嘔吐止便有生機否則仍死也人參奪元氣於欲絕未絕之間麥冬安肺氣於將亡未亡之候白朮救脾胃之氣於將崩未崩之時當歸川芎不過生血而已荊芥仍引血歸經而兼散邪助桂枝祛風而同入膀胱下行而不上逆也方中酌量實有深意非漫然或多或少而輕用之大約此方救此證七八人生者總不可惜人參而少用

之耳

產後感冒風邪是太陽之證口吐膿血頭痛欲破心煩不止腹痛如死或作結胸者皆在不救以產後氣血大虧不可祛邪而病又犯甚拙不能直治其傷故耳如口吐膿血者血不下行而上行也頭痛欲破者血不能養陽而陽欲與陰絕也心煩不止者心血已盡腎水不上滋也腹痛如死者腹中寒極腎有寒侵命門火欲外遁也或作結胸胃中停食不化胃氣將絕也諸證少見一證已是難救況一齊共見乎必死無疑矣余欲以一方救之何也蓋產後感邪原不必深計惟補其正而邪自退余用佛手散多加人參而佐之肉桂荊芥不去治諸證而諸證自必皆去當歸二兩川芎一兩人參三兩荊芥二錢肉桂一錢一劑即見功再劑而全愈蓋佛手散原是治產後聖方加之人參則功力更大生新去舊散邪歸經止痛安心開胃消食所以奏效皆神也

產後感少陽風邪讖語不止煩躁不已更加驚悸者死蓋少陽膽經也膽中無汁則不能潤心心中無血則不能養心是以心中恍惚讖語生矣而煩躁驚悸相因而至總皆無血之故無血補血如何即是死證不知膽木受邪不發表則血無以生然徒發表則血更耗散顧此失彼所以難救然而非真不可救也吾用佛手散加減治之便可生全方用當歸二兩川芎一兩人參一兩炒棗仁一兩麥冬三錢竹茹一團丹砂一錢熟地五錢水煎服此方歸芎生血以養心又加人參棗仁麥冬竹茹丹砂無非安心之藥而熟地又是補腎之妙劑上下相需心腎兩濟又何煩躁之不除驚悸之不定而讖語之不止者乎

產後感中陽明之風邪大喘大汗者亦不治蓋風邪入於陽明寒變爲熱故大喘大汗平人得此病原該用白虎湯而產婦血氣虧損如何可用乎雖然大補產婦之血氣而兼治陽明之邪火未必不降而大喘大汗未必不除也方用補虛降火湯麥冬一兩人參五錢元參五錢桑葉十四片蘇子五分煎服此方人參麥冬補氣元參降火桑葉止汗蘇子定喘助正而不攻邪退邪而不損正實有奇功也

產後感陽明之邪發狂亡陽者不救之證也狂證多是實熱產後發狂又是虛熱矣實熱可瀉火而狂定虛熱豈可瀉火以定狂哉然吾以爲可救者正以其亡陽也亡陽多是氣虛雖實熱而氣仍虛也故瀉實熱之火不可不兼用人參況產後原是虛證乎大約亡陽之證用藥一止汗便有生機吾今不去定狂先去止汗方用收陽湯人參三兩桑葉三十片麥冬二兩元參一兩青蒿五錢水煎服一劑而汗止再劑而狂定不可用三劑也二劑後即單用人參麥門冬北五味當歸川芎調理自然安也此方止可救亡陽之急證而不可據之爲治產之神方蓋青蒿雖補未免散多於補不過借其散中有補以祛胃中之火一時權宜之計倘多服又恐損產婦氣血矣所以二劑後必須改用他方

產婦臨月忽感少陰證者急以人參白朮大劑溫之不應則死此仲景之文也似乎舍人參白朮無可救之藥矣吾以爲單用人參白朮尚非萬全苟用人參白朮不應急加入附子肉桂乾薑未必不應如響吾今酌定一方名全生救難湯人參一兩白朮一兩附子一錢甘草五分水煎服可治凡感少陰經之邪者神效

產婦三四日至六七日忽然手足蹉臥息高氣喘惡心腹痛者不救此證蓋感少陰之寒邪而在內之真陽逼越於上焦上假熱而下眞寒也倘治之不得法有死而已急用平喘祛寒散人參二兩麥冬五錢肉桂二錢白朮三兩吳茱萸五分水煎服一劑喘止二劑痛止此方亦補氣反逆之聖藥祛寒定喘之神方但服之不如法往往僨事必須將藥煎好候其微寒而頓服之蓋藥性熱而病大寒所謂宜順其性也

產婦半月後將至滿月亦患前證又不可用前方矣當改用護產湯人參五錢茯苓五錢附子一錢白朮五錢當歸一兩熟地一兩山茱萸五錢麥冬五錢牛膝一錢水煎服蓋產婦已產至半月以後與將滿月不比新產血氣之大虧也故參可少用而補陽之中又可用補陰之劑有附子以祛寒何患陰滿而不行哉

產婦產後手足青一身黑不救此陰寒之最重而毒氣之最酷者也原無方法可以回生然見其未死而不救毋寧備一方救之而不生吾今酌定一方名開青散黑湯人參四兩白朮四兩附子一錢當歸一兩肉桂三錢水煎服此方服下手足之青少退身不黑便有生機否則仍死也蓋毒深而不可解寒結而不可開耳

產婦足純青心下痛雖較上證少輕而寒毒之攻心則一故亦主死以前方投之往往多效不比一身盡

黑者之難救也蓋此證由下而上一散其下寒而上寒即解所以易於奏效

產後少陰感邪腎水上泛嘔吐下利眞陽飛越者亦死證也蓋產婦腎水原枯如何上泛而至嘔吐不知腎水之汎濫因腎火之衰微也火爲寒所祛水亦隨寒而趨此證犯在平人尚然難救況產婦乎而吾以爲可救者有腎水之存耳急用補陽之藥入於補陰之中引火歸原水自然下行而不致上泛方用補火引水湯人參五錢白朮一兩熟地山茱萸五錢茯苓一兩附子一錢肉桂二錢車前子一錢水煎服一劑而腎水不泛濫矣此方大補命門之火仍於水中補之故水得火而有歸途火得水而有生氣兩相合而兩相成也

產後四五日忽感風邪發厥者死證也厥證多是熱而產後發厥豈有熱之理是熱亦虛熱也欲治厥而身虛不可散邪欲清熱而身虛不可用涼所以往往難治謂是死證而實非盡是死證也我今定一方名轉厥安產方當歸人參各一兩附子一錢水煎服一劑即厥定而人生矣蓋產後發厥乃陽氣既虛而陰血又札復感寒邪以成之者也我用人參以回元氣於無何有之鄉用當歸以生血於敗瘀未復之後用附子以祛除外來之邪故正回而邪散血生而厥除也

產後患厥陰證嘔吐兩脅脹滿者必便血不治之證也蓋傷肝而血乃下行本無血而又傷血豈有不死之理而吾必欲救之將恃何法乎正因其便血耳倘肝受風邪而不下行則邪留兩脅反是腹心之病今血盡趨大便而出是肝中之邪散吾清其大腸之火似可奏功矣但產婦宜溫補不宜清理用涼藥以消其火非所以救產後之婦也不知火之有餘乃水之不足大補其水則火自消歸無有矣方用平肝救血湯當歸一兩川芎五錢麥冬一兩三七根末一錢水煎服一劑而血止兩脅之脹滿亦除矣又何至上嘔食而下便血哉

產後下利厥逆躁不得臥或厥不得止俱是死證蓋下利則亡陰厥逆則亡陽已是難救況躁不得臥是血無以養心矣而厥更不止則汗出又無已也欲不死得乎我欲於死中求生舍人參當歸無別藥也方名參歸湯人參當歸各二兩荊芥一錢水煎服用參歸補氣血以生新則舊血可止舊血止而新血益生自然有血以養心厥可定而心可安躁可釋也

感中風邪皆作末治

產婦感中風邪皆作末治者產婦舊血盡去新血未生大虛驅殼原易中邪風寒襲之一散邪必有厥逆寒證之變死亡頃刻矣方用當歸人參各一兩川芎五錢荊芥肉桂益母草各一錢治之此方妙在用參歸各一兩參以固氣歸以生血氣血既生而風邪易去大虛之人略帶祛邪之藥則邪原易出乃勝理實竦關門不鎖故耳方中荊芥一品最妙不特易於祛邪而且引舊血以歸經仍新血以復正故兩用之而成功也益母草更是產科最利之品安有他虞哉此又固氣血爲先散邪爲末又一法也

中暑

產後忽感中暑霍亂吐瀉法在不救然而亦有用藥救之而能生者總不可用香藿也方用消暑活產丹

人參一兩當歸二兩川芎一兩肉桂二錢青蒿一錢水煎服一劑即愈蓋產婦止補氣血氣血既回暑氣自散況方中又有祛寒解暑之味乎所以奏功獨神或疑感暑是熱胡爲反用肉桂不知產婦氣血大虛遍身是寒一感暑氣便覺相拂非有大熱之氣深入腹中也不過略聞暑氣與本身之寒兩相攻擊以致霍亂今仍用肉桂以溫其虛寒以青蒿而解其微暑用之於大劑補氣補血之中是以駕御而不敢有變亂之形此立方之妙而建功之神也又何必疑焉

水腫

產婦感水腫以致面浮手足浮心脹者不治之證也然而此浮非水氣也乃虛氣作浮耳若作水濕治之必死矣吾今不治水濕單去健脾反有生意方用助氣分水湯白朮二兩人參三兩茯苓五錢薏仁一兩陳皮五分蘿蔔子三分水煎服此方佐茯苓薏仁人參白朮皆健脾之聖藥陳皮蘿蔔子些微以治其脹脾氣健而水濕自行水濕行而脹自去脹去而浮亦漸消矣但此方須多食見效不可一劑而即責其迅功也

痢疾

產後痢疾而加之嘔逆者必死之證也蓋痢疾亡陰十六尚非所宜何況產婦氣血之大虛乎今又加嘔逆則胃中有火遏抑拂亂而氣血更虛必至胃氣之絕不死何待乎然而胃氣有一線未絕即可救援吾有一方不必服藥止須將田螺一箇搗碎入麝香一豶果茱萸一分爲細末掩在臍上即不嘔吐便慶再

生蓋田螺最利水去火痢疾本是熱證而又加濕也產婦痢疾因氣血之虛不可竟用祛熱散火之藥以虛其虛今用田螺外治法至巧也嘔逆一回速以當歸一兩白芍三錢甘草一錢枳殼三分檳榔三分水煎服三劑而痢自除後用獨參湯調理可也

發黃

產婦一身發黃者濕熱壅滯而不散欲治黃而血氣更消欲補虛而濕黃更甚此方法之窮而醫人束手亦聽其死亡而已矣雖然濕熱之成原本於虛補虛以治黃病未爲不可但宜兼治之爲得法耳吾有一方治因虛而發黃者神效不獨治產婦也方名補虛散黃湯白朮一兩蔥仁二兩車前子五錢茯苓五錢荊芥一錢茵陳五分水煎服常人非產婦者茵陳用三錢此方之妙健脾以利水而不耗氣既補虛又去濕濕去而黃不退者未之有也

受濕陰腫小便不通

產婦濕氣感中胞絡下陰腫脹小水點滴不出死證也蓋水入腹中必趨膀胱而出之小便今不由膀胱而盡入於胞胎之絡是相反不相順也如何不死乎然則余將何法以救之亦仍利膀胱而已夫膀胱之能化水者得腎以化之也產婦氣血大虛則腎氣亦虛腎氣虛則膀胱之氣亦虛膀胱氣虛故不化水而水乃入於胞胎而不散故初急而後腫腫極而水點滴不出也吾今不獨治膀胱而先治腎腎氣足而膀胱之氣自行水道自順也方用通水散白朮薏仁人參熟地各一兩茯苓車前子各三錢山茱萸五錢肉桂五分水煎服此方補腎而兼補心蓋胞胎上連心下連腎吾補其心腎則胞胎之氣通自不受水而轉輸於膀胱矣況膀胱又因腎氣之通自能化水而分消於大小腸下趨於便門而出此實有妙用非泛然以立方也

喘促

產婦水氣凌肺作喘不已者亦是死證然治之得法正不死也產婦因虛以受水氣原不可全治夫水也雖作喘不已似爲水氣所犯然徒治其水則喘且益甚而治之之法將若何亦助其脾氣之昇使之無畏乎水則水自不能凌脾脾不受凌喘將何生乎方用補土寧喘丹人參一兩白朮二兩麥冬一兩茯苓三錢蘇子一錢水煎服此方人參補氣以健脾白朮利腰以健脾麥冬養肺以健脾茯苓蘇子不過借其佐使以行水止喘而已然而治喘實有神功也脾健則土旺土旺則水不敢泛濫何至有脹喘之生哉

大汗煩渴

產婦產半月忽然大汗如雨口渴舌乾發熱而躁有似傷寒證者死證也若作傷寒治之無不死矣此乃內水乾枯無血以養心陽氣無陰不化乃發汗亡陽而身熱耳故口雖渴而不欲飲水舌雖乾而胎又滑甚則心跳而不至發狂此所以異於傷寒也此時急用人參當歸黃芪各二兩桑葉三十片北五味一錢麥冬五錢水煎服方名收汗丹參歸黃芪大補其氣血麥冬五味清中有澀佐桑葉止汗實有神功蓋此等虛汗非補不止而非澀亦不收也故一劑而汗止二劑而汗收起死回生非此方之謂乎

吐蚘

產後吐蚘蟲者不治之證也以胃氣將絕蟲不能安身耳夫蚘蟲在人之胃中大寒不居大熱亦不居今產後吐蚘必在發厥之後其吐蚘也必然煩情吐出非嘔然吐一條也更有成團逐塊而吐出者眞是惡毒吾欲生之何也正因其吐蚘而尚可生也蓋人臟既絕蟲亦寂然今紛然上吐是胃中尚有氣以逼迫之吾安其胃氣則蟲自定而人可生方用安蚘教產湯大參白朮炮干薑各一兩白薇三錢肉桂一錢神麯五分水煎服一劑而蚘定矣此方參朮以生胃氣炮干白薇肉桂以殺蟲所以奏功獨神耳

吐衄血發斑

產後口吐衄血又復發斑此千人中偶一有之本是不救然治之得法亦有不死者此證蓋因夏月感受暑熱之氣未及發出一至生產而火毒大發又內身虛而火勢猶不能一時盡發故口吐衄血以妄行而身生斑點以拂亂也論理產後不宜用涼藥化斑然此等證又不得不用涼藥爲補宜之計吾今酌定一方名爲化火救產湯當歸五錢各一兩川芎人參麥冬五錢荊芥三錢升麻一錢水煎服一劑而衄血止再劑而斑稀二劑而斑化矣不可用四劑也三劑後當改用佛手散大劑多飲自無後患若則恐有變寒之患吾方原不大寒即製寒而可救倘前一見斑即用黃連解毒之藥以救一時之急及至熱退寒生仍有寒戰而死者涼藥可輕用乎故寧可服吾方以漸退斑而緩降血不可用猛藥以取快於一時也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百十二卷目錄

醫部彙考三百九十二

婦人產後門三

方一

大承氣湯　小安胎飲　四物湯　理血飲　當歸散　白薇湯　羊肉湯　羊肉湯　羊肉

小柴胡湯

治產後數月便難嘔不能食汗多病瘧及草蓐露風四肢煩熱頭痛等證

黃芩 人參 甘草 生薑各三兩 柴胡半斤 半夏半升 大棗十二枚

右以水一斗一升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

竹葉湯 出千金方

一名竹葉防風湯治產後中風發熱頭疼喘而面赤

竹葉一把 葛根三兩 防風 桔梗 桂枝 人參 甘草各一兩 大棗十五枚 生薑五兩

右㕮咀以水一斗煮取二升半分溫三服溫覆使汗出

若頸項強者用附子一枚破之如豆大煎藥揚去沫

若嘔者加半夏半升一方用桂心不用桂枝

白頭翁加甘草阿膠湯

治產後下痢虛極

白頭翁 甘草 阿膠各二兩 秦皮 黃連 藥皮各二兩

右六味以水七升煮取二升半內膠令消盡分溫三服

大黃甘遂湯

治產後水與血結在血室

大黃四兩 甘遂 阿膠各二兩

右三味以水三升煮取一升頓服之其血當下

陽旦湯 活人書下同

治產婦傷風發熱惡寒汗出乾嘔心下堅頭微疼十數日不解

桂心 芍藥各三兩 甘草 黃芩各二兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半棗子一枚生薑三片煎至一盞取八分清汁溫服

如自汗甚者去桂心加炮附子一枚

如渴者去桂心加栝蔞三兩

如自利者去芍藥桂心加乾薑二兩

如心下悸者去芍藥加茯苓四兩

如虛勞裏急者正陽旦湯主之煎時入膠飴為佳

若脈浮緊無汗發熱者不可與也

羊肉湯 千金方下同

治產後虛羸喘乏自汗出腹中絞痛

肥羊肉去脂三斤 當歸 桂心 甘草各二兩 芍藥三兩 芍藥 生薑各四兩 乾地黃五兩

右㕮咀以水一斗半先煮肉取七升去肉內餘藥煮取三升去滓分三服不瘥重作一方有葱白一斤一方胷中微熱加黃芩麥門冬各一兩大便不和加大黃一兩小便難加葵子一兩上氣欬逆加五味子一兩一方不用當歸用葱白一方不用芍藥用葱白一方不用芍藥用豉一升

羊肉黃芪湯

治產後虛乏

羊肉二斤 黃芪三兩 大棗三十枚 乾地黃 甘草 當歸 桂心 麥冬 茯苓 芍藥各二兩

右㕮咀以水二斗煮羊肉取一斗去肉內諸藥煎取二升去滓分三服一日三服盡

鹿肉湯

治產後虛羸勞損

鹿肉四斤 乾地黃 甘草 芍藥 黃芪 芍藥 麥冬 茯苓各二兩 人參 當歸 生薑各一兩 半夏一升 大棗二十枚

右以水二斗五升煮肉取一斗二升去肉內藥煎取五升去滓分四服日三夜一一方去麥冬加獨活秦艽黃芩桂心阿膠治產後風虛頭痛壯熱言語邪僻

麋骨膏

治產後虛乏五勞七傷虛損不足藏腑冷熱不調

麋骨一具 遠志 黃芪 芍藥 乾薑 防風 茯苓 厚朴各三兩 當歸 橘皮 甘草 獨活 川芎各二兩 桂心 生薑各四兩

右以水三斗煮麋骨取二斗去骨內藥煎取五升去滓分五服

當歸芍藥湯

治產後虛損逆害飲食

當歸一兩半 芍藥 人參 桂心 生薑 乾地黃 甘草各一兩 大棗二十枚

右㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服一日三次服盡

杏仁湯

治產後虛氣

杏仁 橘皮 白前 人參各二兩 生薑十兩 蘇葉 半夏各一升 麥冬二兩 桂心四兩

右以水一斗二升煮取二升半去滓分五服
乳蜜湯
治產後七傷虛損少氣不足并腎勞寒冷
牛乳七升慈則用羊乳　白蜜一升半　當歸
人參　獨活各三兩　大棗二十枚　甘草
桂心各二兩
右㕮咀諸藥投乳蜜中煮取三升去滓分四服
五石湯
治產後虛冷七傷肘寒熱體痛乏力補腎治百病
紫石英　鍾乳　白石英　赤石脂　石膏
茯苓　白朮　桂心　川芎　甘草各二兩
薤白六兩　人參　當歸各一兩　生薑八兩
大棗二十枚
右五石並爲末諸藥各㕮咀以水一斗二升煮取
三升六合去滓分六服
若中風加葛根獨活各二兩
若下痢加龍骨一兩
三石湯
治證同前
紫石英　生薑　當歸　人參　甘草各二兩
白石英　鍾乳各二兩半　茯苓　乾地黃
桂心各二兩　半夏五兩　大棗十五枚
右三石爲末諸藥以水一斗五升煮取三升去滓
分四服
若中風加葛根四兩
竹葉湯
治產後心中煩悶不解
生淡竹葉　麥門冬各一升　甘草二兩　生薑
茯苓各三兩　大棗十四枚　小麥三合
右以水一斗先煮竹葉小麥取八升內諸藥煮取
三升去滓分三服
若心中虛悸者加人參二兩
若其人食少無穀氣者加粳米五合
若氣逆者加半夏二兩
淡竹茹湯
治產後虛煩頭痛短氣欲絕心中悶亂不解
淡竹茹一升　麥冬　小麥各五合　甘草一兩
生薑三兩　大棗十四枚
右以水一斗煮竹茹小麥取八升去滓乃內諸藥
煮取二升去滓分二服竟人分作三服
若有人參人二兩無人參內茯苓一兩半亦佳人
參茯苓皆治心煩悶及心虛驚悸安定精神有則
爲良甚白朮方服一劑不差更作
若氣逆者加半夏二兩一方不用生薑用乾葛一
方不用大棗用石膏三兩
蜀漆湯
治產後虛熱往來心胸煩滿骨節疼痛及頭痛壯
熱晡時甄甚又如微瘧
蜀漆葉　桂心　甘草　黃芩各一兩　知母
芍藥各二兩　黃芪五兩　生地黃一斤
右以水一斗煮取三升分三服
芍藥湯
治產後虛熱頭痛及腹中拘急
白芍藥　乾地黃　牡蠣各五兩　桂心三兩
右以水一斗煮取二升半去滓分三服一日三次
服盡
若通身發熱加黃芩二兩
甘草湯
治在蓐中風背強不得轉動名曰風痙
甘草　乾地黃　麥門冬　麻黃各十兩　川芎
苦蔄根　黃芩各三兩　杏仁五十枚　葛根半斤
右九味㕮咀以水一斗五升酒五升合煮葛根取
八升去滓內諸藥煮取三升去滓分再服一方有
前胡三兩
獨活湯
治產後中風口噤不能言
獨活　生薑各五兩　防風　秦艽　桂心
白朮　甘草　當歸　附子　葛根各二兩
防己一兩
右以水一斗二升煮取三升去滓分三服
獨活酒
治產後中風
獨活一斤　桂心三兩　秦艽五兩
右以酒一斗半漬三日飲五合稍加至一升不能
多飲隨性服
小獨活湯
治產後百日中風痙口噤不開并治產後氣喘勞傷
腎虛
獨活半斤　葛根　生薑各六兩　甘草二兩
右以水九升煮取三升去滓分四服微汗佳
五石湯

治產後卒中風發疾口噤倒悶吐沫瘛瘲脫肩不知人及溫痹緩弱身體痙妊娠百病

鍾乳　赤石脂　石膏　白石英　牡蠣　人參　黃芩　白朮　甘草　苦蘘根　川芎　桂心　防己　當歸　乾薑各一兩　葛根四兩　獨活　紫石英各三兩

右末五石咬咀諸藥以水一斗四升煮取三升半分五服日三服夜二服一方有滑石寒水石各二兩棗二十枚

四石湯

治產後卒中風發疾口噤瘛瘲悶滿不知人并緩急諸風毒痹身體痙強及挾胎中風婦人百病

紫石英　白石英　石膏　赤石脂各三兩　獨活　生薑各六兩　葛根四兩　桂心　川芎　甘草　芍藥　黃芩各二兩

右咬咀以水一斗二升煮取三升半去滓分五服三物黃芩湯

治婦人在蓐得風四肢煩熱頭不痛

黃芩　苦參各二兩　乾地黃四兩

右以水八升煮取二升去滓適寒溫服一升日二服多吐下蟲

防風酒

治產後中風

防風　獨活各二斤　石斛五兩　女萎　桂心　茵芋各一兩

右以酒三斗漬三宿初服一合稍加至四合日二服

茯神湯

治產後忽苦心中衝悸或志意不定恍恍惚惚言語錯謬心慮所致

茯神四兩　人參　茯苓　芍藥　甘草　當歸　桂心各三兩　生薑八兩　大棗三十枚

右以水一斗煮取三升去滓分三服日二服夜一服

遠志湯

治產後忽苦心中衝悸不定志意不安言語錯誤惚惚憒憒情不自覺

芍藥一兩　遠志　麥冬　人參　甘草　當歸　桂各二兩　茯苓五兩　生薑六兩　大棗二十枚

右以水一斗煮取三升去滓分三服一日三次服盡麤者作四服

產後得此止是心慮所致無當歸用苦酒

若其人心胷逆氣用半夏三兩

茯苓湯

治產後暴苦心悸不定言語錯謬恍恍惚惚心中憒憒此皆心慮所致

茯苓五兩　甘草　芍藥　桂心　當歸各二兩　生薑六兩　麥門冬一升　大棗三十枚

右以水一斗煮取三升去滓分三服一日三次服盡

若無當歸可用苦酒

若苦心志不定加人參二兩遠志二兩

若苦煩悶短氣加生竹葉一升以水一斗三升煮竹葉取一斗內藥

若有微風加獨活三兩麻黃桂心各二兩用水一十五升

若頸項苦急背膊強者加獨活葛根各三兩麻黃桂心各二兩生薑八兩用水一斗半

安心湯

治產後心衝悸不定恍恍惚惚不自知覺言語錯謬慮煩短氣志意不定心慮所致

遠志　甘草各二兩　人參　茯神　當歸　芍藥各三兩　麥門冬一升　大棗三十枚

右以水一斗煮取三升去滓分三服一日三次服盡

若苦慮煩短氣者加淡竹葉二升水一斗二升煮竹葉取一斗內藥

若胃中少氣者益甘草爲三兩

甘草圓

治產後心慮不足慮悸心神不安呼吸乏氣或若恍恍惚惚不自知覺者

甘草　遠志　菖蒲各三兩　人參　麥門冬　乾薑　茯苓各二兩　澤瀉　桂心各一兩

大棗五十枚

右爲細末蜜和丸如豆大酒服二十丸日四五服夜再服不知稍加

若無澤瀉以白朮代之

若胃中冷增乾薑

人參圓

治產後大虛心悸志意不安不自覺恍惚恐畏夜不得眠虛煩少氣

人參　甘草　茯苓各三兩　麥冬　菖蒲
澤瀉　薯蕷　乾薑各二兩　大棗五十枚
桂心一兩
右爲細末以蜜棗膏和丸如梧子大食前酒服二十丸日三服夜一服不知稍增
若有遠志內二兩爲善
若風氣內當歸獨活各三兩

大遠志圓

治產後心虛不足心下驚悸志意不安恍恍惚惚腹中拘急痛夜臥不安胷中吸吸少氣內補傷損益氣安定心神亦治虛損
乾薑四兩　遠志　甘草　桂心　茯苓　麥冬
人參　當歸　白朮　澤瀉　獨活　乾地黃
菖蒲各三兩　薯蕷　阿膠各二兩
右爲末蜜和丸如豆大未食溫酒服三十丸日三服不知稍增
若大虛身體冷少津液加鍾乳三兩

乾地黃湯

治產後兩脅滿痛兼除百病
乾地黃　芍藥各三兩　當歸　蒲黃各二兩
生薑五兩　桂心六兩　甘草一兩　大棗二十枚
右以水一斗煑取一升半去滓分作三服一日三次服盡

芍藥湯

治產後苦腹痛
芍藥六兩　桂心　生薑各三兩　甘草二兩
膠飴八兩　大棗十二枚
右以水七升煑取四升去滓內膠飴令烊分三服一日三次服盡

當歸湯

治產後大虛心腹絞痛厥逆
當歸　芍藥各二兩　生薑五兩　羊肉一斤
右以水八升煑羊肉熟取汁煎藥得三升適寒溫服七合日三次服一方有甘草一方不用芍藥名

小羊肉湯

羊肉湯

治產後及傷寒大虛上氣腹痛兼微風
肥羊肉二斤　茯苓　黃芪　乾薑各二兩
甘草　獨活　桂心　人參各二兩　麥冬七合
生地黃五兩　大棗十二枚
右㕮咀以水二斗煑肉取一斗去肉煑藥取二升半作四服日三服夜一服一方無羊肉可用麞鹿肉一方無乾薑

羊肉當歸湯

治產後腹中心下切痛不能食往來寒熱若中風乏氣力
羊肉三斤　當歸　黃芩　川芎　防風　甘草
芍藥各三兩　生薑四兩
右以水一斗二升先煮肉熟減半內餘藥取三升去滓分三服一日三次服盡一方以黃芪代黃芩白朮代芍藥名大羊肉湯一方以桂心代防風加大棗十七枚一方以黃芪代黃芩人參代防風

羊肉杜仲湯

治產後腰痛欬喘
羊肉四斤　杜仲炒　紫菀茸　當歸　白朮
桂心各三兩　生薑八兩　細莘　荻冬花
人參　厚朴　川芎　五味　附子　萆薢
甘草　黃芪各二兩　大棗三十枚
右以水一斗半煑肉取汁一斗去肉內藥煎取三升半去滓分五服日三服夜二服

羊肉生地湯

治產後三日腹痛補中益臟强氣力消瘀血
羊肉三斤　生地黃切二升　當歸　甘草
川芎　人參　桂心各二兩　芍藥三兩
右以水二斗煑肉取一斗去肉內藥煎取三升分四服日三服夜一服

內補芎藭湯

治婦人產後虛羸
川芎　乾地黃各四兩　芍藥五兩　桂心二兩
甘草　乾薑各三兩　大棗四十枚
右以水一斗二升煑取三升去滓分三服一日三次服盡若服至三劑有寒苦微下加附子三兩

大補當歸湯

治產後虛損不足腹中拘急或溺血少腹苦痛或從高墮下犯內
當歸　續斷　桂　芎藭　乾薑　麥冬各三兩
甘草　白芷各二兩　芍藥四兩　吳茱萸一升
乾地黃六兩　大棗四十枚
右以酒一斗漬藥一宿明旦以水一斗合煑取五升去滓分五服日三服夜二服若入黃芪二兩益佳

吳茱萸湯

治婦人先有寒冷胃滿痛或心腹刺痛或嘔吐食少或腫或寒或下痢氣息綿惙欲絕產後益劇

吳茱萸二兩　防風　桔梗　乾薑　甘草　細辛　當歸各十二銖　乾地黃十八兩

右以水四升煮取一升半去滓分再服

蒲黃湯

治產後餘疾胃中少氣腹痛頭疼餘血未盡腹中脹滿

蒲黃　地黃　生薑各五兩　芒硝二兩　芍藥　桂心各一兩　桃仁二十枚　大棗十五枚

右以水九升煮取二升半去滓內芒硝分三服一日三次服盡

敗醬湯

治產後腹痛引腰腹中如錐刀所刺

敗醬二兩　桂心　川芎各一兩半　當歸一兩

右以清酒二升水四升微火煮取二升去滓適寒溫七合日三食前服之

芍藥湯

治產後腹痛

芍藥　甘草各二兩　蒲黃　女萎各一兩半

芍藥　大黃各三銖　當歸十八兩　桂心

桃仁　黃芪　薤白各一兩　生地黃一升

右以水一斗酒二升合煮取三升去滓分四服日三服夜一服一方用黃芩不用黃芪

乾地黃湯

治產後惡露不盡除諸疾補不足

乾地黃　川芎　桂心　黃芪　當歸各二兩　人參　防風　茯苓　細辛　芍藥　甘草各一兩

右以水一斗煮取三升去滓分三服日再服夜一服

桃仁湯

治產後往來寒熱惡露不盡

桃仁五兩　黃芪　當歸　芍藥各二兩　生薑　醍醐百錬酥　柴胡各八兩　吳茱萸二升

右以酒二斗水二升合煮取三升去滓適寒溫先食服一升日三服

澤蘭湯

治產後惡露不盡腹痛不除小腹急痛痛引腰背少氣

澤蘭　當歸　地黃　生薑各三兩　芍藥一兩　甘草一兩半　大棗十枚

右以水九升煮取三升去滓分三服一日三次服盡

甘草湯

治產乳餘血不盡逆搶心胃手足逆冷胎乾腹脹短氣

甘草　芍藥　桂心　阿膠各三兩　大黃四兩

右以東流水一斗煮取三升去滓內阿膠令烊分三服一服入腹中面即有顏色一日一夜盡此三升即下腹中惡血二升立瘥當養之如新產者

大黃湯

治產後惡露不盡

吳茱萸一升　大黃　當歸　甘草　生薑　丹皮　芍藥各三兩

右以水一斗煮四升去滓分四服一日令盡一方加人參二兩名人參大黃湯

柴胡湯

治產後往來寒熱惡露不盡

柴胡　生薑各八兩　桃仁五十枚　當歸　黃芪　芍藥各二兩　吳茱萸二升

右以水一斗三升煮取三升去滓先食服一升日三服

蒲黃湯

治產後餘疾有積血不去腹大短氣不得飲食上衝心胸時時煩憒逆滿手足悄疼胃中結熱

蒲黃十兩　大黃　芒硝　甘草　黃芩各一兩　大棗三十枚

右以水五升煮取一升清朝服至日中下若不止進冷粥半盞即止不下與少熱飲自下人羸者半之

銅鏡鼻湯

治產後餘疾積血不去作病血氣結搏心腹疼痛

銅鏡鼻十八銖燒末　芍藥　芍藥　生地黃　乾漆　芒硝各二兩　大黃二兩半　亂髮雞子大燒存性　大棗三十枚

右以水七升煮取一升二合去滓內髮灰鏡鼻末分三服

小銅鏡鼻湯

治如前狀

銅鏡鼻十銖燒末　大黃　甘草　黃芩　芒硝

乾地黃各二兩　桃仁五十枚
右以酒六升煑取三升去滓內鏡鼻末分三服

梔子湯
治產後兒生處空流血不盡小腹絞痛
梔子三十枚　當歸　芍藥各二兩　蜜五合
生薑五兩　羊脂一兩
右以水一斗煑梔子取六升內當歸芍藥生薑蜜羊脂於梔子汁中煎取二升一日作三次服盡

生地黃湯
治產後三日至七日腹中餘血未盡絞痛強滿氣息不通
生地黃五兩　生薑三兩　大黃　芍藥　茯苓
細辛　桂心　當歸　甘草　黃芩各一兩半
大棗二十枚
右以水八升煑取二升半去滓分三服一日三次服盡

大黃乾漆湯
治新產後有血腹中切痛
大黃　乾漆　乾地黃　桂心　乾薑各二兩
右以水三升清酒五升煑取三升去滓溫服一升血當下不瘥明旦服一升滿三服病無不瘥

膠蠟湯
治產後三日內下諸雜五色痢
阿膠　黃蘗各一兩　當歸一兩半　黃連二兩
陳廩米一升　蠟如棊子三箇
右以水八升煑米蟹目沸去米內藥煑取二升去滓內膠蠟令烊分四服一日令盡

澤蘭湯
治產後餘疾寒下凍膿裏急胷脅滿痛欬嗽嘔血寒熱小便赤黃大便不利
澤蘭　石膏各二十四銖　遠志二十銖　當歸
甘草　厚朴各十八銖　藁本　芎藭各十五銖
乾薑　人參　桔梗　乾地黃各十二銖　桑皮
麻子仁各半斤　白朮　蜀椒　白芷　柏子仁
防風　山茱萸　細辛各八銖
右以水一斗五升先內桑白皮煑取七升半去之內諸藥煑取三升五合去滓分三服

苦蔞湯
治產後小便數兼渴
苦蔞根　麥門冬　甘草　黃連各二兩　人參
生薑各二兩　大棗十五枚　桑螵蛸二十枚
右以水七升煑取二升半分三服

雞膍胵湯
治產後小便難
雞膍胵二三具　雞腸三具洗　厚朴　當歸
甘草　乾地黃　人參各二兩　生薑五兩
麻黃四兩　大棗二十枚
右以水一斗煑膍胵及腸大棗取七升去滓內諸藥煎取三升分三服

石葦湯
治產後卒淋氣淋血淋石淋
葵子二升　石葦　黃芩　通草　甘草　白朮
生薑各二兩　榆皮五兩　大棗三十枚
右以水八升煑取一升半分三服一方用芍藥不用白朮一方無甘草生薑一方不用薑棗

葵根湯
治產後淋瀝
葵根二兩　車前子一升　亂髮燒灰　大黃
桂心　滑石各一兩　通草三兩　生薑六兩
冬瓜練七合
右以水七升煑取二升半分三服一方不用冬瓜練

茅根湯
治產後淋
白茅根一斤　瞿麥　茯苓各四兩　地脈
人參各二兩　生薑三兩　桃膠　甘草各一兩
鯉魚齒一百枚
右以水一斗煮取二升半分三服

滑石散
治產後淋
滑石五兩　通草　車前子　葵子各四錢
右四味治下篩酢漿水服方寸匕稍加至二匕

五加酒
治產後癖瘦玉門冷
五加皮一斤　蛇牀子　杜仲各一兩　枸杞子
乾地黃　丹參各二兩　乾薑三兩　乳牀半斤
天門冬四兩
右以絹袋子盛酒三升漬三宿一服五合日再服稍加至十合

當歸湯
治產後臟中風陰腫痛

當歸　獨活　白芷　地榆各三兩　敗醬
礬石各二兩
右以水一斗半煑取五升適冷暖稍稍洗陰日三次

增損澤蘭圓
治產後百病理血氣補虛勞
澤蘭　甘草　當歸　川芎各四十二銖　厚朴
藁本　蕪荑各半兩　附子　乾薑　白朮
白芷　桂心　細莘　麥冬各一兩　防風
人參　牛膝各三十銖　柏子仁　乾地黃
石斛各三十六銖
右爲末蜜和丸如梧子大空腹酒下十五至二十丸

大補益當歸圓
治產後虛羸不足胷中少氣腹中拘急疼痛或引腰背痛或所下過多血不止虛竭乏氣晝夜不得眠
桂　芍藥各二兩　當歸　芎藭　續斷　乾薑
阿膠　甘草各四兩　白朮　吳茱萸　附子
白芷各三兩　乾地黃十兩
右爲末蜜和丸如梧子大酒服二十丸日三服夜一服不知加至五十丸一方加眞蒲黃一升絕妙

澤蘭散
治產後風虛
澤蘭九分　乾地黃　石膏　赤石脂　肉蓯蓉
鹿茸　白芷　芎藭各八分　藁本　蜀椒
柏子仁　白朮各五分　桂　甘草　當歸
乾薑各七分　蕪荑　細莘　厚朴各四分
人參三分　禹餘糧　防風各十分
右二十二味治下篩酒服方寸匕日三服以意增之

小澤蘭圓
治產後虛羸勞冷身體尫瘦
澤蘭二兩六銖　當歸　甘草各一兩十八銖
川芎　柏子仁　防風　茯苓各一兩　白芷
蜀椒　藁本　細莘　白朮　桂心　蕪荑
人參　食茱萸　厚朴各十八銖　石膏二兩
右爲細末蜜和丸如梧子大酒服二十丸日三服稍加至四十丸一方無茯苓石膏有芍藥乾薑

牡丹圓
婦人新產後瘀血不消服諸湯利血後餘疾未平宜服此方
牡丹皮三兩　芍藥　元參　桃仁研　當歸
桂心各二兩　蝱蟲　水蛭各五十枚　蠐螬
瞿麥　川芎　海藻各一兩
右爲末蜜丸如梧子大酒下十五丸加至二十丸若血盛者作散服方寸匕腹中當轉如沸血自化成水去
若小便赤少除桂心用地膚子一兩

禹餘糧圓
治婦人產後積冷堅癖
禹餘糧　鶴鰂骨　吳茱萸　桂心　䗪蟲一兩
蜀椒各二兩半　當歸　白朮　細莘　乾地黃
人參　芍藥　川芎　前胡各一兩六銖　白薇
紫菀　黃芩各十八銖　乾薑三兩　礬石六銖
右爲末蜜和丸如梧子大空心酒服二十丸或飲下日二服不知則加之

牡蒙圓
一名紫藍丸治婦人產後十二瘕病帶下無子皆風冷或產後未滿百日胞絡惡血未盡便利於懸圊上及久坐濕寒入胞裏結在小腹牢痛爲之積聚小如鷄子大者如拳按之跳或如蟲嚙或如針刺氣時搶心兩脅支滿不能食飲食不消化上下通流或守胃管痛連玉門背薄嘔逆短氣汗出小腹苦寒胞中創欬引陰痛小便自出子門不正令人無子腰胯疼痛四肢沈重淫躍一身盡腫乍來乍去大便不利小便淋瀝或月經不通或下如腐肉青黃赤白黑等如豆汁夢想不祥
牡蒙　厚朴　硝石　乾薑　䗪蟲　牡丹皮
蜀椒　黃芩　前胡　桔梗　白茯苓　細莘
芎藭　人參　吳茱萸　葶藶　桂心各十八銖
大黃二兩半　附子一兩六銖　當歸十兩
右爲細末蜜和丸如梧子大空心酒服三丸日三服不知則加之至五六丸下青白黃赤物如魚子者病根出矣

桂枝附子湯
治產後風虛汗出不止小便難四肢微急難以屈伸
桂枝　芍藥　生薑各三兩　甘草一兩半
附子一枚　大棗三十枚
右以水七升煑取三升分爲三服

阿膠圓

治產後虛冷洞下心腹絞痛兼泄瀉不止

阿膠四兩　人參　甘草　龍骨　桂心　白朮

乾地黃　黃連　當歸　附子各二兩

右爲末蜜丸如梧子大溫酒服二十丸日三服

桂心牡蠣湯 活人

治婦人產後頭疼身熱兼治腹內拘急疼痛

桂心三兩　牡蠣煅　白芍藥　乾地黃各五兩

黃芩二兩

右剉如豆大每服五錢以水一盞半煎至一盞去滓溫服

生地黃湯

治姙娠胎氣損動氣血不調或顛蹼閃墜以致胎墮墮後惡滯不盡腹中疼痛

生乾地黃焙一兩　大黃暴煨　芍藥　白茯苓

當歸切炒　細莘　甘草炙　黃芩　桂心各十兩

右㕮咀每服五錢匕水一盞半入生薑大棗拍碎同煎至一盞去滓不拘時溫服

人參湯

治半產後血下過多心驚體顫頭目運轉或寒或熱臍腹虛脹疼痛

人參　麥門冬焙　生乾地黃焙　芍藥　黃芪

當歸洗焙　白茯苓　甘草炙各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓食前溫服

人參黃芪湯

治小產氣虛血下不止

人參　黃芪炒　當歸　白朮炒　白芍藥炒

艾葉各一錢　阿膠炒二錢

右作一劑水煎服

當歸酒

治姙娠墮胎後血下不出

當歸炙令香　芍藥炒各二兩

右㕮咀每服三錢匕無灰酒一盞入生地黃汁一合銀器內慢火煎至七分去滓溫服以惡血下爲度

烏金散

治姙娠墮胎後惡血不下兼治諸疾血病

好墨折二寸挺子燒通赤用好酢蘸七遍又燒通赤放冷別研二兩　沒藥研　麒麟竭各二錢半

麝香一錢

右爲細末每服溫酒調下一錢匕如血迷心用童便加酒調下二錢匕

紅藍花散

治墮胎後血不出奔心悶絕不識人

紅藍微熬過　男子髮燒存性　京墨燒紅

血竭研　蒲黃隔紙炒各等分

右爲細末以童便小半盞調二錢服之立效

白蜜湯

治墮胎後惡血不出

白蜜二兩　生地黃取汁一盞　酒半盞

右汁與酒共入銅器中煎五七沸入蜜攪勻分兩服服三劑百病可愈

猪膏飲

治墮胎血不出上搶心疼痛煩憒

豬膏七合　白蜜三合　生地黃切二兩

右先將豬膏地黃相和煎令赤色去地黃納蜜攪分溫二服相次再服

當歸湯

治姙娠墮胎胞衣不出

當歸切炒　牛膝酒浸切焙各一兩半　木通剉

[illegible]石研各　兩　冬葵子炒二合　瞿麥穗一兩

右㕮咀每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服未下再服以下爲度

地黃湯

治同上

蒲黃炒　生薑切炒各二錢半　地黃半兩切炒

右以無灰酒三盞於銀器內同煎至二盞去滓分三服未下再作服

蒲黃酒

治同上

蒲黃炒一合　槐子十四枚爲末

右以酒三盞煎至二盞去滓分溫二服未下更作服

當歸川芎湯 [illegible]

治小產後瘀血心腹痛或發熱惡寒

當歸　川芎　熟地黃自製　白芍藥炒　紅花

延胡索　香附　青皮炒　澤蘭　牡丹皮

桃仁各等分

右水煎入童便酒各小半盞服

若以手按腹愈痛此瘀血爲患宜此藥或失笑散

消之
若按之不痛此是血虛宜四物參苓白朮
若痛而作嘔此是胃虛宜六君子湯
若痛而作瀉此是脾虛宜六君子送二神丸

芎藭湯
治墮胎心腹疼痛
芎藭　芍藥　白朮　阿膠炒燥　甘草炙各一兩
右㕮咀每服三錢水一盞入艾葉糯米生薑同煎至六分食前服一方無白朮有人參

聖愈湯
治血虛心煩睡臥不寧或五心煩熱
熟地黃酒拌蒸半日　生地黃酒拌　川芎
人參各七錢五分　當歸酒拌　黃芪炒各五錢
右水煎服

當歸補血湯
治肌熱燥熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不息脈洪大而虛重按全無此脈虛血虛也若誤服白虎湯必死
當歸三錢　黃芪一兩
右水煎服

四物二連湯
治血虛發熱或口舌生瘡或晝安夜熱
當歸身　川芎　熟地黃　芍藥　胡黃連
宣黃連各一錢
右作一劑水煎服

全生活血湯
治產後血暴下又能補血養血生血益陽並治自汗盜汗四肢無力口乾頭運發熱
紅花三分　蓼荊子　細辛各五分　熟地黃
生地黃各一錢　藁本　川芎各一錢半
防風　羌活　獨活　甘草炙　當歸身酒洗
柴胡　葛根各二錢　白芍　升麻各三錢
右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓食前稍溫服

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百十三卷目錄
醫部彙考三百九十三
婦人產後門四
方二 清魂散 來甦散 獨行散 奪命散 紅花散 花藥石散 荷葉散 沒藥丸 七氣手拈散 大蘇飲 蒲黃湯 牡蠣散 烟水散 蜀椒湯 黑神散 黑逍遙散 人參當歸湯 失笑散 白散 定志丸 寧志膏 五補丸 味子丸 固腎飲 芎歸湯 也黃散 當歸養血湯 血竭丸 烏龍丸 荷散 枳殼丸 當歸黃芪湯 川芎散 瑪瑙寄生湯 加減四物湯 趙痛方 瑪瑙湯 川芎散 葛根湯 經效 防風湯 薏苡上方 伏苓湯 華佗愈風散 乾葛湯 天麻散 當歸散 伏龍肝散 一物秘法湯 一物白 交加散 羚羊角散 大豆紫湯 大豆湯 增損 千金鶴虱醴 防風湯 當歸散 防己黃 芪湯 七珍 又方 葛花散 防己黃 芪湯 七珍 又方 烏金散 伏神散 茯苓丸 白茯苓丸 人參散 琥珀地黃散 琥珀地黃散 茯苓散 又方 抱 心湯 附子散 又方 抱 心湯 附子散 又方 抱 心湯 附子

沒藥研各二錢半　當歸一兩　蟲蟲去足翅炒
水蛭炒焦各三十枚
右爲末酢糊丸如豌豆大酢湯下三錢

獨聖湯

治產後亡血過多心腹徹痛然後下血久而不止亦治赤白帶下年深諸藥不能效者良驗
貫衆一箇全用只揉去毛花蔓用之不剉斷
右用好酢蘸濕慢火炙令香熟候冷爲細末用米飲調下二錢空心食前服

牡蠣散

治產後惡露淋漓不絕心悶短氣四肢乏弱頭目昏重煩熱不思飲食面黃體瘦
牡蠣煅　川芎　熟地　白茯苓　龍骨各一錢
續斷　當歸　艾葉酒炒　人參　五味子
地榆各半兩　甘草三錢半
右爲末每服二錢水一中盞生薑三片棗一枚煎至六分去查食前服

七氣手拈散

治產後心氣攻痛
延胡　小蘹香　芍藥　乾漆炒　枳殼各二錢
黃連　石菖蒲　香附　蘇葉各一錢半　沒藥
乳香各一兩　甘草六分
右剉散分作二服每服用水一盞半生薑三片煎至七分空心服

大巖蜜湯

治同上
生乾地黃　當歸　獨活　吳茱萸　芍藥
乾薑　甘草　桂心　小草各一兩　細莘半兩
右爲散每服半兩水三盞煎至一盞去查稍熱服
評曰產後心痛未必便是血痛設是巖蜜湯豈可用熟地黃熟地黃泥血安能去痛此方本出千金用生乾地黃耳茱萸一升合準五兩乾薑三兩細莘治停寒在下焦方本一兩却減半兩制奇制耦量病淺深自有品數不可妄意加減然以巖蜜湯治血病不若失笑散更捷

失笑散

治產後兒枕餘血衝心煩悶心腹痛欲死百藥不效服此頓愈
五靈脂　蒲黃各等分
右爲末先用醋酢調二錢熬膏入水一盞煎至七分食前熱服良驗

經水錄蜀椒湯

療產後心痛大寒所爲
蜀椒二合　芍藥三兩　半夏　當歸　桂心
人參　甘草　茯苓各二兩　生薑汁五合
蜜一升
右切以水九升煑椒令沸下諸藥煑取三升半去查下薑汁及蜜更煎取三升服五合至六合

黑神散

治產後血塊痛經脉行後腹疼幷經脉不調
熟地黃一斤　陳生薑半斤
右二味同和炒乾爲末每服二錢用烏梅調下常服酒調經脉不通烏梅荊芥酒調下

黑白散

治產後兒枕大痛
烏金石酢煅七次另研　寒水石煅存性爲末
右各收之痛時各抄一錢半米飲調下痛止勿服未止再服

定志丸

治產後怔忡
人參　茯苓各一兩五錢　菖蒲　遠志各一兩
右爲末蜜丸如梧子大每服六七十丸白湯下

寧志膏

一名寧神膏治產後失血過多心神不安昏悶語澀不得臥
辰砂研　棗仁炒　人參　茯神去木　琥珀研
酒乳香研各一錢
右爲末和停每服一錢濃煎燈心棗湯空心調下一方無茯神琥珀蜜丸如彈子大薄荷湯化下一丸一方有赤茯苓無茯神

犀角地黃湯

治產後鼻衄
芍藥七錢半　生地黃半斤　犀角屑一兩
牡丹皮淨一兩
右㕮咀每服五錢水煎服如無犀角屑以升麻代若有熱如狂者加黃芩二兩

五味子丸

治產後遺屎
人參　白朮炒　五味子炒　破故紙炒各三兩
山藥炒　白茯苓炒各兩半　吳茱萸湯泡炒
巴戟去心炒　肉果麪煨各一兩　龍骨少許

右爲末酒糊丸桐子大每服百餘丸食前白湯或米湯任下

固脬飲

治產婦脬損小便淋瀝不斷

黃絲絹三尺自然黃者染黃者不用以炭灰淋汁煮至極爛清水洗去灰令淨　黃蠟半兩　蜜一兩

茅根　馬勃末各二錢

右水二升再煎一盞空心頓服服時勿作聲作聲即不效

補脬飲

治同上

生絲絹黃色者一尺　牡丹皮　白芨末各一錢

右水二盞煮至絹爛如糊服之不宜作聲

地黃散

治產後惡血不盡腹中疼痛

生地黃炒　當歸各二錢　生薑半兩切焙焦黑

右爲細末每服二錢空心薑酒調下

當歸血竭丸

治婦人產後惡露不下結聚成塊心胃痞悶及臍下堅痛

當歸　血竭另研　芍藥　蓬朮炮各二兩

五靈脂四兩

右爲細末醋糊和丸如梧桐子大每服五十丸食前溫酒送下

卷荷散

治產後血上衝心血刺血運血氣腹痛惡露不快

卷荷初出水者　紅花　當歸各一兩　牡丹皮　蒲黃隔紙炒各半兩

右爲細末每服二錢空心鹽酒調下一七內童子小便調服

根質芍藥散

治產後腹痛煩滿不得臥

根質燒令黑勿太過　芍藥各等分

右二味杵爲散服方寸匕日三服并主癰腫以麥粥下之

當歸黃芪湯

治產後腰痛不可轉側自汗壯熱身體強氣短

黃芪　芍藥各二兩　當歸三兩

右剉每服四錢薑四片水煎溫服

川芎散

治產後頭痛

眞天台烏藥皮　大川芎等分

右爲細末每服三錢燒紅杆錘淬酒調服

芎附散

治產後敗血作梗頭痛諸藥不效者

大附子一枚醞酢一椀用火四畔炙透蘸酢令盡去皮臍　川芎一兩

右並爲末每服一錢茶清調下

獨活寄生湯

治肝腎虛弱或久履濕冷之地或洗足當風濕毒內攻兩脛緩縱攣痛痹弱或皮肉紫破足膝攣重又專治產後腳氣

獨活三兩　桑寄生（如無以續斷代）　杜仲炒　白茯苓　牛膝酒浸　官桂不見火　細辛　防風　川芎　當歸　人參　熟地酒洗　芍藥　秦艽各二兩　甘草炙一兩

右㕮咀每服四錢薑五片水煎溫服

加減四物湯（保命集）

治產後頭痛血虛痰癖寒厥皆令頭痛

蒼朮一兩六錢　羌活　川芎　防風　香附炒　白芷　當歸　甘草各一兩　石膏二兩半　細辛一兩半

右爲粗末每用一兩水煎不拘時熱服

如有汗者知氣虛頭痛也方中加芍藥三兩桂一兩半生薑煎

如痰癖頭痛加半夏三兩茯苓一兩生薑煎

如熱厥頭痛加白芷三兩石膏二兩知母一兩

如寒厥頭痛加天麻三兩附子一兩半生薑三片煎服

趁痛方（準前下同）

治產後氣弱血滯遍身疼痛及身熱頭疼

牛膝　當歸　桂心　白朮　黃芪　獨活　生薑各半兩　甘草　薤白各二錢半

右㕮咀每服半兩水二盞煎至一盞半去渣食前服

防風湯

治產後中風項背強急臂滿短氣

防風　獨活　葛根各五兩　當歸　人參　白芍藥　甘草炙各二兩

右爲㕮咀每服八錢水一盞半棗子二枚擘破同煎至一盞去渣溫服不拘時一方有乾薑

川芎散

治產後中風身背拘急有如繩束

川芎　羌活　棗仁　羚羊角屑　芍藥各四兩

桑白皮一兩半　防風一兩二錢

右㕮咀每服一兩水二大盞煎至一盞半去查不拘時服日進三服

經效茯苓湯

治產後風虛頭痛語言寒澀

茯苓　防風　乾葛各八錢　麥冬一兩　芍藥

黃芩各六錢　犀角屑四錢　甘草炙二兩

右㕮咀每服一兩水一大盞半煎至一盞去查溫服不拘時

華佗愈風散

治婦人產後中風口噤手足瘛瘲如角弓或產後血運不省人事四肢強直或心眼倒築吐瀉欲死

荊芥穗微焙

右爲末每服三錢豆淋酒調服或童便服之口噤則挑齒灌之斷噤則灌入鼻中其效如神大抵產後大脫則汗出而腠理疎故易於中風也時珍曰此方諸書盛稱其妙姚僧坦集驗方以酒服名如聖散云藥下可立待應效陳氏方名舉鄉古拜散蕭存敬方用古老錢煎湯服名一捻金王貺指迷方加當歸等分水煎服許叔微本事方云此藥委有奇效神聖之功一產婦睡久及醒則昏昏如醉不省人事醫用此藥及交加散云服後當睡必以左手搔頭用之果然斧股產寶方云此病多因怒氣傷肝或憂氣鬱或坐草受風而成急宜服此藥也戴氏證治要訣名獨行散買似道悅之隨抄呼爲再生丹

濟危上丹

治產後虛極生風

乳香　五靈脂　硫黃　元精石同研極細

阿膠炒珠　卷柏生　桑寄生　陳皮去白各等分

右將上四味同研停於金石器內微炒勿令焦再研極細復入餘藥爲末拌勻生地黃汁和丸如梧子大每服二十丸溫酒或當歸酒送下食前服

葛根湯

治產後中風口噤仆地頭目眩運痰盛氣急及治產後諸疾

葛根　生薑各六兩　獨活四兩　當歸三兩

甘草炙　桂心　白茯苓　石膏　人參　白朮

防風　川芎各二兩

右爲㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞半去查溫服無時日進二服

乾葛湯

療產後中風口噤不能言

獨活二兩　乾葛一兩半　生薑一兩二錢半

甘草半兩炙

右爲㕮咀每服一兩水二大盞煎至一大盞去查溫服無時

天麻散

治產後中風口噤

天麻七錢半　白附子炮　天南星炮　乾蠍炒半夏湯洗七遍各半兩

右爲細末每服一錢生薑薄荷酒調勻斡開口灌之不拘時

當歸散

一名交加散治婦人產後中風牙關緊急不省人事口吐涎沫手足瘛瘲

當歸去蘆　荊芥穗各等分

右爲細末每服二錢水一盞酒半盞煎至一盞去查灌之牙關緊急斡開微微灌之但下咽即生屢用救人大有神功

伏龍肝散

治產後中風口噤不能語言腰背疼痛

伏龍肝一兩半　乾薑半兩炮

右爲細末每服二錢溫酒調下不拘時日進二服

交加散（入門）

治產前後百病婦人榮衛不調經脈不調腹中撮痛氣多血少結聚爲瘕產後疼及中風脅痛等證並宜服之

生地黃一升取白然汁　生薑十二兩取自然汁

右先將地黃汁炒生薑查生薑汁炒地黃查各稍乾焙爲細末每服三錢溫酒調下尋常腹痛亦宜服產後尤不可離

羚羊角散（準繩下同）

治產後中風身體反張

羚羊角屑　當歸各七錢半　獨活　防風

蘇黃去節各一兩　人參　赤芍藥　細辛

桂心各半兩

右爲㕮咀每服八錢水一大盞半生薑五片煎至

一大盞去查溫服不拘時
一物獨活湯
療產後中風虛人不可服他藥者
川獨活三兩細切
右水三升煮取一升分服飲酒者亦可酒水煮
一物白薛湯
治同上
白薛皮三兩細切
右煎服同獨活法
千金鵝矢釀
療產後百疾及產後中風口噤拘攣腰背強直時時反折
烏鵝矢三升　大豆二升
右先炒豆令聲絕次炒鵝矢令黃以酒一升先淋鵝矢取汁淋大豆每服一升重者凡四五服極妙
大豆紫湯
治中風頭眩惡風自汗吐冷水及產後百病或中風痱瘁背強口噤直視煩熱脉緊大者不治小品方云主產後中風困篤背強口噤或但煩躁或頭身皆重或身重痒發嘔吐直視並宜服之
獨活去蘆一兩半　大豆半升　酒三升
右先用酒浸獨活煎一二沸別炒大豆極焦煙出急投酒中密封候冷去豆每服一二合許得少汗則愈日進十服此藥能去風消血結如妊娠折傷胎死腹中服此得差
大豆湯
治產後中風發則仆地不省人事及妊娠挾風兼治尊草之間諸般病證
大豆五升炒黃　獨活　葛根各八兩　防己六兩
右㕮咀每服五錢酒二盞煎至一盞半去查溫服不拘時日三服
麋羊角飲子
治產後氣實腹中堅硬痞脹滿心中煩熱渴欲飲水欲成剛痙中風之疾
麋羊角鎊半兩　防風　羌活　桔梗　敗醬各八錢　柱心　柴胡　大黃浸過慢各一兩二錢
右爲㕮咀每服五錢水一大盞半同煎至一盞去查溫服不拘時候更服地黃酒用地黃切一升炒令黑瓦瓶中下熱酒三升密封口煮令減半任意服之
防風當歸散
治產後痓
防風　當歸　川芎　地黃各一兩
右判每服一兩水三盞煎至二盞溫服
防風湯
治風虛發熱項背拘急肢節不隨恍惚狂言來去無時不自覺悟亦治腳氣緩弱甚效此藥溫和不虛人
秦艽　獨活　麻黃去節　半夏湯洗七次切片　防風各二兩　升麻　防己　白朮　石膏煅　白芍　黃芩　甘草　當歸　遠志　人參各一兩
右爲粗末入半夏片令勻每服四錢水二中盞生薑七八片煎至一盞去查取滿汁六分入麝香末少許食後臨臥帶熱服
增損柴胡湯
治產後感異證手足牽搐涎潮昏悶
柴胡三錢　黃芩一錢二分　人參　甘草炙半夏湯泡各一錢半　知母一錢　石膏二錢　黃芪二錢半
右㕮咀分二服水二盞薑三片棗二枚煎八分不拘時服
秦艽湯
前病已去次服此藥去其風邪
秦艽　白芍藥　柴胡各一錢七分　黃芩　防風各一錢二分　甘草炙一錢三分　人參半夏各一錢
右爲㕮咀分二貼每貼水二盞薑三片煎八分食遠服
芍藥散
治產後中風四肢筋脉攣急疼痛背項強急
防風　牛蒡子炒各一兩　芍藥　酸棗仁炒　羌活　當歸　羚羊角屑各七錢半　柱心
赤芍藥各半兩
右爲㕮咀每服八錢水一大盞半煎至一大盞去查不拘時溫服
防己膏
治產後中風四肢筋脉攣急身體麻痹並宜用之
漢防己去皮半斤　茵芋五兩
右㕮咀用酒五升浸藥一宿取豬肪脂一斤文武火熬三上三下成膏攤在紙花上貼病人患處以熱手不住摩膏上

七珍散
治產後不語
人參　石菖蒲　生地黃　川芎各一兩　防風
辰砂別研各半兩　細辛一錢
右爲極細末每服一錢薄荷湯調下無時加甘草
一錢名八珍散
胡氏孤鳳散
治產後閉口不語
生白礬一錢
右爲末用熱水調下一方是白並
又方
治產後不語
人參　石蓮肉不去心　石菖蒲各等分
右每服五錢水煎
逐血補心湯
治產後失音不語
紅花　赤芍藥　生地黃　桔梗　蘇葉　前胡
茯苓　防風　牛膝南星　黃連　粉葛各二錢
當歸三錢　薄荷　人參　升麻各一錢五分
半夏二錢五分　甘草一錢
右剉爲散分作二服每服水一鍾半薑三片煎至
七分空心服查再煎服
大聖澤蘭散
治婦人血海虛冷久無子息及產後敗血衝心中
風口噤子死腹中壁開口灌藥須臾生下便得無
恙又治墮胎腹中攻刺疼痛橫生逆產胎衣不下
血運血癖血滯血崩血入四肢一應血臟有患及
諸種風氣或傷寒吐逆欬嗽寒熱往來遍身生瘡
頭痛惡心經脉不調赤白帶下乳生惡氣胎臟虛
冷數曾墮胎崩中不定因此成疾室女經脉不通
並宜服之常服煖子宮和血氣悅顏色退風冷治
除萬病
澤蘭葉　石膏研各二兩　卷柏去根　白茯苓
防風　厚朴去粗皮薑炙　細辛　柏子仁微炒
桔梗　吳茱萸湯洗七次焙各一兩　五味子
人參　藁本　白並　川椒去目閉口微炒出汗
白朮　黃芪　乾薑炮　川烏頭炮去皮臍
丹參各七錢半　蕪荑微炒赤　甘草炙　川芎
芍藥　當歸各一兩七錢半　肉桂一兩二錢半
白薇　阿膠碎炒燥各半兩　生乾地黃一兩半
右爲細末每服二錢空心熱酒調下臨臥服若急
疾不拘時日三服
產後發狂方
治產後敗血衝心發熱狂言奔走脉虛大者
乾荷葉　生乾地黃　牡丹皮等分
右三味濃煎湯調生蒲黃末二錢七一服卽定
妙香散
治產後心神顛倒語言錯亂如見鬼神
生乾地黃　當歸各等分
右二味煎湯調服立效
烏金散
治產後三五日或半月之間忽狂言亂語目見神
鬼等證
當歸　遠志肉　川芎　棗仁　白朮　赤芍藥
香附子　辰砂另研　熟地黃　羌活　防風
茯神各二錢　半夏三錢　全蠍　麥冬　人參
牛膝　天麻各一錢　陳皮　白並各一錢五分
甘草九分
右剉散作二服水一鍾半薑三片葱三枝入金銀
同煎一椀不拘時溫服
四物補心湯
治產後言語恍惚顛倒錯亂
當歸五錢　川芎　生地　白芍　茯神　半夏
桔梗　白朮各四錢　陳皮三錢　甘草一錢
右剉爲散分爲六服每服水一鍾薑三片煎至七
分空心溫服查再煎服
如有熱加酒炒黃連二錢無熱不用
調經散
一名小調經散治產後浮腫
沒藥　琥珀並細研　桂心各一錢　芍藥
當歸各二錢半　麝香研　細辛各五分
右爲末每服五分生薑汁溫酒各少許調服一方
有甘草二錢
茯神散
治產後血邪心神恍惚言語失度睡臥不安
茯神一兩去皮木　人參　龍齒研　琥珀研
赤芍藥　黃芪　牛膝各七錢半　生地一兩半
桂心半兩
右爲末每服三錢水一盞煎至七分不拘時去查
溫服
柏子仁散

治產後狂言亂語皆因內虛敗血挾邪氣攻心
柏子仁　遠志去心　人參　桑寄生　防風
琥珀別研　當歸焙　生地黃焙　甘草各等分
右爲粗末先用白羊心一箇切片以水一大盞半
先煮至九分去羊心入藥末五錢煎至六分去查
無時服

白茯苓散

治產後心中驚悸言語失常神氣昏憒
白茯苓　熟地黃　人參各一兩半　遠志
麥門冬各一兩　石菖蒲　桑寄生各七錢半
右爲咬咀每服八錢水一大盞半生薑五片棗三
枚竹葉五七片煎至一大盞去查溫服無時

熟乾地黃散

治產後心虛驚悸神思不安
熟乾地黃二兩　黃芪　白薇　龍齒研各一兩
人參　茯神去木　羌活　遠志肉各七錢半
桂心　防風　甘草炙各半兩
右咬咀每五錢水一大盞半生薑五片棗三枚煎
至一大盞去查溫服不拘時一方無黃芪有荊芥

產乳七寶散

初產後服之調和血氣補虛安心神鎮驚悸
硃砂飛　桂心　當歸　川芎　人參　白茯苓
羚羊角燒存性各二錢　乾薑一錢
右爲細末每服一錢用羌活豆淋酒調下二錢將
護產婦用之不飲酒者用清米飲調下
如覺心煩熱悶以麥門冬去心煎湯調下
若覺心下煩悶而痛用童便調下
若覺心胷煩熱減薑桂
若覺心胷寒加薑桂
若覺腹痛加當歸
若覺心悶加羚羊角
若覺心氣虛怯加桂心
若不思飲食或惡心加人參
若虛煩加茯苓以意斟酌日三夜一服之

海藏大效牡丹散

治血臟虛風頭目不利不思飲食手足煩熱肢節
拘急疼痛胷膈不利大腸不調陰陽相干心驚怯
悸或時旋運
丹皮　川芎　枳殼麩炒各一兩　陳皮　延胡
甘草　羌活　半夏湯洗各半兩　芍藥　木香
訶子肉各七錢半　當歸一兩半　三稜炒
乾薑炮　桂心各五錢　白朮炒三錢
右爲細末每服二錢水一盞半煎五七沸食前溫
服益血海退血風消寒瘀實脾胃理血氣攻刺及
氣虛惡寒潮熱證至妙

遠志丸

治產後臟虛不足心神驚悸志意不安腹中急痛
或時怕怖夜臥不安
遠志　麥門冬　黃芪　當歸炒　人參　白朮
獨活　白茯苓　柏子仁　石菖蒲　熟乾地黃
山茱萸　桂心　鍾乳粉　阿膠碎炒各一兩
右爲細末煉蜜和搗五七百下丸如梧桐子大每
服三十丸溫酒送下不拘時候日進二服

白茯苓丸

治產後心虛驚悸神志不安
白茯苓　熟地黃各一兩　人參　桂心　遠志
石菖蒲　柏子仁　琥珀各半兩另研細
右爲細末煉蜜和搗二二百下丸如梧子大每服
三十丸不拘時粥飲送下
右數方俱用桂中無熱而脈遲且微者宜之

人參散

治產後臟腑虛心怔驚悸言語錯亂
人參　麥門冬各八錢　牛黃研　白薇各二錢
茯神　獨活　防風　甘草炙　遠志　生地黃
朱砂飛　天竺黃研　龍齒研各四錢　龍腦研
麝香細研各一錢
右爲細末每服二錢薄荷酒調下不拘時

琥珀地黃散

治血虛冬驚及產後敗血諸疾
辰砂　琥珀　沒藥並細研　當歸各等分
右爲細末每服二錢空心白湯調下日三服

茯苓散

療產後狂語志意不定精神昏亂心氣虛風邪所
致
白茯苓（茯神亦可）　生地黃各三兩　遠志　白薇
龍齒各二兩五錢　防風　人參　獨活各二兩
右共爲末以銀一大斤水一斗五升煮取七升下
諸藥煮取三升溫分三服忌菘菜豬肉生冷一方
治產後風邪干心神恍惚志意不定加荊芥二
兩甘草一兩二錢半

又方

產後虛羸若大汗利皆至於死重虛故也若中風譫謬昏悶不知人者宜服此

人參　茯苓　羌活　大棗　遠志各二兩

竹瀝一升

右用水六升煮取三升下竹瀝更煎取二升半分三服

抱膽丸

治產後血虛驚氣入心及癲痫風狂或室女經脉通行驚邪蘊結

水銀二兩　黑鉛一兩半　朱砂一兩另細研

乳香一兩另細研

右將黑鉛入銚子內鎔化下水銀結成砂子次下朱砂滴乳末乘熱用柳木搥研勻丸如芡實大每服一丸空心金銀薄荷湯化下得睡切莫驚動覺來即安

琥珀散

治產後中風恍惚語澀心神煩悶四肢不隨

琥珀研　茯神各一兩　遠志　石菖蒲　黃芪　防風　獨活　人參　麥門冬　芎藭　桑寄生　赤芍藥　羚羊角屑各半兩　甘草炙二錢半

右爲㕮咀每服五錢水一中盞半煎至一大盞去查溫服不拘時

遠志散

治產後中風心神恍惚言語錯亂煩悶睡臥不安

遠志　防風各一兩　麥門冬　桂心　棗仁炒　桑寄生　當歸炒　茯神去木　羚羊角屑　獨活各七錢半　甘草炙半兩

右爲㕮咀每服五錢煎服法同前

天麻丸

療產後中風恍惚語澀四肢不隨

天麻　硃砂飛　防風　羌活各一兩　乾蠍炒　白附子炮　五靈脂炒各半兩　殭蠶炒七錢半　雄雀糞炒　牛黃另研各二錢半

右爲細末糯米飯爲丸如梧子大每二三十丸薄荷酒送下日二服

辰砂遠志丸

主產後中風消風化痰安神鎮心

石菖蒲　遠志肉甘草煮　人參　茯神去木　辰砂各五錢　川芎　山藥　鐵粉　麥門冬

細辛　天麻　半夏湯泡　南星　白附子各一兩

右爲末薑汁煮糊丸如菉豆大別以硃砂爲衣每服三十丸夜臥生薑湯吞下

心煩腹痛方

療產後餘血不盡奔衝心煩悶腹痛

川芎　生乾地黃　枳殼　芍藥各等分

右爲末酒服方寸匕日二服

經效方

治產後氣虛冷搏於血血氣結滯上衝心腹脹滿

芍藥二兩　當歸　桂心　川芎　吳萸　橘皮　生薑各一兩

右㕮咀以水三升煮取一升去查空心服

金黃散

治產後惡血衝心時發煩躁

延胡索　蒲黃各半兩　桂心二錢半

右爲細末烏梅煎湯冷調下二錢

沒藥丸

治產後心胃煩躁惡血不快

沒藥研　蠐螬　延胡索　乾漆炒　當歸　桂心　牛膝　牡丹皮　乾薑各等分

右爲細末酢煮麪糊丸如梧桐子大煎麪湯下十丸至十五丸

竹葉湯

治產後氣短欲絕心中煩悶

竹葉細切　麥門冬　小麥各一升　甘草一兩　生薑二兩　大棗十二枚

右切以水一斗煮竹葉小麥至八升去查納餘藥煮取三升去查溫服

若虛悸加人參二兩

若少氣力加糯米五合

甘竹茹湯

治產後內虛煩熱短氣

甘竹茹一升　人參　茯苓　甘草各一兩

黃芩三兩

右㕮咀以水六升煮取二升去查分三服日三

薤白湯

治產後胃中煩熱逆氣

薤白　半夏　甘草　人參各一兩　麥冬半斤　苦蔞根二兩

右㕮咀以水一斗三升煮取四升去查分五服日三夜二若熱甚加知母一兩一方熱甚加知母石

膏各一兩

芍藥梔豉湯

治產後虛煩不得臥

芍藥　當歸　梔子各五錢　香豉半合

右如梔子豉湯修服產後傷寒便同下後變證此方雖雲岐法不若仲景酸棗仁湯穩當

熟地黃湯

治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩飲食無味

熟地黃酒洗淨蒸焙一錢半　人參　麥門冬

苦蔞根各二錢　甘草炙半錢

右作一服水二鍾糯米一撮生薑三片紅棗一枚同煎至一鍾不拘時服

又方

療產後大渴不止

麥冬四兩　蘆根切一升　苦蔞　人參　甘草　茯苓各三兩　大棗二十枚

右以水八升煮取三升分三服頓服四劑即痊忌菘菜

楊氏黃芩散

治產後血渴飲水不止

黃芩　麥門冬各等分

右㕮咀每服三錢水一盞半煎至八分去查溫服無時

集驗苦蔞根湯

療產後血渴

苦蔞根四兩　麥門冬　土瓜根　人參各三兩　生地黃　甘草各二兩　大棗二十枚

右㕮咀以水八升煮取二升半分三服產實無地黃麥門冬有牡蠣粉等分

延胡索散

治產後失血渴不止

鬱金　乾葛　桂心　青皮　枳殼　延胡索

右各等分以好酢浸一宿焙乾末之每服二錢陳皮湯調下日三夜一

麻黃根散

治產後虛汗不止

當歸　黃芪　麻黃根　牡蠣煅爲粉　人參粉草各等分

右㕮咀每服四錢水一盞煎至七分去查溫服經效方

療產後汗出不止

黃芪一錢二分　白朮　牡蠣煅　茯苓　防風　麥門冬去心　生地黃各八分　大棗七枚

右㕮咀水二升煮取七合去查空心分溫兩服

止汗散

治產後盜汗不止一應汗多不止者皆可服

牡蠣煅研粉　小麥麩炒令黃色碾爲粉各等分

右和勻煮生猪肉汁調下二錢無時

人參湯

治產後諸虛不足發熱盜汗

人參　當歸各等分

右爲末以猪腰子一箇去脂膜切小片子以水三升糯米半合葱白兩條煮米熟取清汁一盞入藥二錢煎至八分溫服不拘時

當歸六黃湯

治氣血虛熱盜汗不止

當歸　熟地黃自製　黃芪炒各二錢　生地黃　黃蘗炒黑　黃芩炒黑　黃連炒黑各一錢

右水煎服

若不應加人參白朮

若心血不足加酸棗仁

參附湯

治陽氣虛寒自汗惡寒或手足逆冷大便自利或臍腹疼痛呃逆不食或汗多發痙等證

人參一兩　附子炮五錢

右作一服薑棗水煎徐徐服

芪附湯

治陽氣虛脫惡寒自汗或口噤痰湧四肢逆冷或吐瀉腹痛飲食不入及一切虛寒等證

黃芪一兩　附子炮五錢

右作一劑薑棗水煎服如不應倍加附子方得全濟

黃疸方

治婦人四月內產被黃四肢倦怠食少經事不來時發熱脈弦

白朮一兩　人參　柴胡　芍藥　牡丹皮　生地黃　木通　柴胡　芍藥各半兩　川芎　黃芩　乾葛各一錢　甘草五分

右分十二貼水煎食前熱服

羅氏犀角飲子

治產後亡津液虛損時自汗出發熱困倦唇口乾

燥

犀角　麥冬　白朮各半兩　柴胡一兩　人參　枳殼麩炒　地骨皮　生地黃　甘草炒　當歸　茯苓　黃芩　黃芪各七錢

右㕮咀每服四錢薑三片浮麥七十粒水煎服三之一湯

治產後虛勞發熱日久不安

柴胡　黃芩　人參　半夏　川芎　當歸　芍藥　熟地黃　甘草各一錢半

右作一服水二鍾薑三片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

三分散

治產後日久虛勞發熱

川芎　當歸　芍藥　熟地黃　白朮　白茯苓　黃芪各一錢　柴胡　人參各一錢半　黃芩　半夏　甘草各五分

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾食前服

加味逍遙散

治產後發熱口乾作渴唇裂生瘡

當歸　白芍藥　乾葛各二錢　生地黃　川芎　黃芩各錢半　柴胡一錢　人參　麥冬各九分　烏梅二箇　甘草六分

右剉散分作二服水二鍾煎至七分空心服

人參當歸湯

一名人參當歸散治產後去血過多血虛則陰虛陰虛則內熱心胃煩滿呼吸短氣頭痛悶亂喘時轉甚與大病後虛煩相類

熟地　人參　當歸　肉桂　麥冬各二錢　白芍藥炒一錢

右水二鍾粳米一合竹葉十片煎一鍾食遠服

如血熱甚者加生地黃二錢

如煩悶不安者加豉一方用桂心不用肉桂

柴胡四物湯

一名三元湯治產後日久虛勞發熱或微有寒熱脈沉而數及熱入血室等證

川芎　當歸　赤芍藥　熟地黃各一錢半　柴胡八分　人參　黃芩　甘草　半夏各三錢

右爲末水煎服一方用生地入薑三片水煎服

小柴胡加生地黃湯

治產後往來寒熱脈弦

柴胡二兩　黃芩五錢　人參三錢　半夏一兩　大棗三枚　生地黃　梔子　枳殼麩炒各五錢

右如前煎服

大調經散良方

治產後血虛惡露未消氣爲敗血壅滯榮衛不調陰陽相乘憎寒發熱或自汗或腫滿喘急尿澀

大黑豆炒去殼　茯神各一兩　眞琥珀三錢

右爲細末濃煎烏豆紫蘇湯調下二錢一方黑豆一兩茯神五錢琥珀一錢

加減烏金散準繩下同

治產後寒熱似瘧

厚朴　柴胡　黃芩　麻黃各二錢半　陳皮　當歸　川芎　桔梗　茯苓各一錢五分　半夏　蒼朮　白芷　桂枝　羌活　草果　枳殼　甘草各九分　白芍藥　熟地黃各一錢五分

右剉爲散分作二服每服用水一鍾半生薑三片葱三莖煎至一鍾不拘時服

如有汗多當歸川芎白芍藥熟地黃

如有脹多厚朴陳皮

如有熱多柴胡黃芩

如有寒多蒼朮草果桂枝

如有痰多半夏桔梗茯苓

如有頭痛多川芎白芷羌活

如有瀉去枳殼甘草不用

如有餘血塊在腹作潮熱疼痛加三稜莪朮多用

延胡索八角茴香

如遍身痛加羌活獨活

如寒熱往來加黃芩柴胡

產寶方

療產後惡寒壯熱一夜三五度發惡語口中生瘡時時乾嘔困乏悶絕

人參　獨活　白薜皮　葛根　防風　青竹茹　遠志各一兩半　茯神二兩　白薇二兩半　元參三兩　竹瀝二升半

右取銀一斤水一斗五升煮取七升下諸藥重煮取三升分溫三服忌魚酒濕麪等

知母湯

治產後乍寒乍熱心胃煩悶

知母三兩　白芍藥　黃芩各二兩　桂心　甘草各一兩

右㕮咀水五升煮取二升半分三服一方不用桂心用生地黃

草果飲子

治婦人產後瘧疾寒熱相半者或多熱者宜此

半夏湯泡　赤茯苓　甘草炙　草果炮去皮

川芎　陳皮　白芷各二錢　青皮去白　良薑

紫蘇各二錢半　乾葛四錢

右㕮咀每服三錢水一大盞生薑三片棗二枚同煎至七分去查當發日侵早連進三服無有不安

生熟飲子

治產後瘧疾多寒者

肉豆蔻　草果仁　厚朴生去粗皮　半夏

陳皮　甘草　大棗去核　生薑各等分

右八味細剉和勻一半生一半用濕綿紙裹煨令香熟去紙與一半生者和勻每服秤五錢水二盞煎至七分食前一服食後一服

石子湯

療產後虛羸喘乏乍寒乍熱如瘧四肢疼痛面色痿黃名曰薤勞

葱白切　粳米　當歸　香豉　芍藥各二兩

猪腰子一雙去脂膜四破

右㕮咀分兩劑用水三升煮取一小椀去查分三服廣濟無芍藥有人參一方無香豉有知母

猪腰子粥本草

治薤勞發熱骨節痛頭痛

猪腰子一枚　粳米一合

右猪腰子去白膜切作柳葉片以鹽酒拌先用粳米入葱椒煮粥鹽醋和將腰子鋪盌底以熱粥蓋之如作盦生狀空心服

人參鼈甲散得效方

治薤勞皆由在產內未滿百日體中虛損血氣尚弱失於將理或勞動作傷致成薤勞其狀虛羸乍起乍臥飲食不消時有欬嗽頭目昏痛發歇無常夜有盜汗寒熱如瘧背膊拘急沉困在牀服此大效

人參　桂心　當歸　桑寄生　白茯苓　麥冬

白芍藥　桃仁　熟地黃　甘草各半兩　鼈甲

黃芪各一兩　續斷二錢半　牛膝七錢半

右爲細末每服先以猪腎一對去筋膜以水兩大盞生薑半分棗三枚煎至一盞去猪腎薑棗然後入藥末二錢葱白三寸烏梅一箇荊芥五穗煎至七分去查空心晚食前溫服此藥神效一方無猪腎薑棗葱白烏梅荊芥空心水煎服

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百十四卷目錄

醫部彙考三百九十四

婦人產後門五

方三 許仁則方 白茯苓散 胡氏牡丹散 黃芪建中湯 黃芪麥散 令散 當歸羊肉湯 十全大補湯 補益方 益實方 又方 白朮湯 奪魂散 撲防己散 加味八物湯 起枕散 四味湯 補氣養血湯 小參蘇飲 母散 加味芎藭化湯 柴胡破瘀湯 柴胡防歸湯 竹葉防風湯 當歸黃芪飲 薤菊湯 魚魁湯 小香連翹湯 桃柱當歸丸 養血佐明丸 推氣養血丸 香靈丸 參木膏 芎根湯 桑螵蛸散 黃芪芍藥湯 的奇散 滋腎五仁丸 五味白朮散 補虛湯 保安丸 當歸散 熟附五積散 理中湯 木犀湯 柱心湯 四君子湯 白術生脈散 黃鸝鳴湯 九味煎 胃關煎 加味四物湯 三柴胡飲 四柴胡飲 五柴胡飲 太沖飲 芎歸湯 通瘀煎 地榆飲 加減一陰煎 三陰煎 大營煎 補陰益氣煎 固陰煎 白茯苓散 導赤散 真元飲 大補元煎 金水六君煎 六安煎 逍遙散 生脈散 大黃膏法 脈方方

單方

鍼灸

醫案

藝術典第四百十四卷

醫部彙考三百九十四

婦人產後門五

方三

許仁則方 準繩 下同

療產後日淺久坐視聽言語多或運用氣力遂覺項膊肢節皮肉痛乍熱乍寒此爲虛勞

桂心 葱白切各一兩 猪腎一雙去脂膜四破

當歸 芍藥 生薑各二兩

右水八升煮腎取六升下藥煮至二升分溫二服

白茯苓散

治虛勞緣生產日淺久坐多語運動用力致頭目四肢疼痛寒熱如瘧狀宜此

白茯苓一兩 當歸 川芎 桂心 白芍藥 黃芪 人參各半兩 乾熟地黃一兩

右㕮咀先以水二鍾入猪腎一雙去脂膜切薑三片棗三枚煎至一鍾去三物入藥半兩煎七分去查食前分溫三服

胡氏牡丹散

治產後虛羸發熱自汗欲變虛勞或血氣所搏經候不調或寒熱羸瘦

白芍 當歸 五加皮 地骨皮 人參各半兩 沒藥 桂心各二錢 牡丹皮三錢

右爲細末每服二錢水酒各半盞不飲酒者只用水一盞開元錢一枚麻油蘸之同煎七分去查通口服煎不得攪喫不得吹

黃芪煮散

治產後虛勞肌膚黃瘦面無顏色或憎寒壯熱四肢痠疼心煩頭痛

鼈甲酢炙 黃芪各一兩 桂心 當歸炒 桑寄生 白茯苓 白芍藥 人參 熟地黃 麥門冬去心 甘草炙各半兩 牛膝七錢半

右爲細末每服用猪腰子一對去脂膜切破先以水一盞入藥半分棗三枚煎至七分去腰子薑棗却下藥五錢煎至四分去查空心晚食前溫服二查併煎

黃芪建中湯

治產後諸虛不足發熱或惡寒腹痛

黃芪炒 桂心各一兩 白芍炒二兩 甘草炒七錢

每服五錢薑棗水煎服日二服

如虛甚者加附子

虛羸方

產後補虛

人參 白朮各一錢 黃芩 歸身尾各五分 川芎半兩 陳皮三分

右水煎服

如有寒加乾薑三分茯苓一錢

三合散

治產後日久虛勞鍼灸不效者

白朮 當歸 白芍藥 黃芪 白茯苓 川芎 熟地黃各一兩 柴胡 人參各二兩半 黃芩半夏 甘草各六錢

右爲粗末每服一兩水一鍾半煎服日二

當歸羊肉湯 良

治產後虛弱衆心腹痛

肥羊肉一斤去脂水一斗煮取六升 當歸五兩 黃芪四兩 生薑六兩

右以肉汁煮三味取二升五合分爲四服入門以猪腎一雙代羊肉一方有人參七錢

若覺惡露不盡加桂心三兩

如惡露下多加川芎三兩

如有氣加細辛二兩

如有熱加生地黃汁二合

十全大補湯（準繩下同）
一名十全散治產後諸臟虛損氣血俱虛惡寒發熱自汗盜汗便血吐血或大便不實飲食少思或胃腹作痛口舌生瘡或耳目不明牙齒不固
人參　白朮　白茯苓　黃芪　當歸　白芍炒　熟地黃酒洗蒸焙　川芎各一錢　肉桂去皮　甘草炙各五分
右薑棗水煎服
補益方
療產後大虛血氣上搶心腹急痛氣息短乏
黃芪　白朮　當歸　人參　甘草各二兩
薑四兩
右先以白羊肉三斤去膜水一斗九升煮肉取汁五升下諸藥煮三升分三服
產寶方
療產後風虛羸瘦勞弱不生肌肉
黃芪　當歸　芎藭　人參各三分　桂心
甘草　川芎　生薑各四分　大棗十二枚
右九味水七升煮三升分溫三服
又方
療產後虛勞骨節疼痛頭痛汗不出
當歸　人參　生薑各二兩　黃芪三兩　粳米
雞白　淡豉三合　豬腎二枚
右水一斗五升先煮豬腎取六升下諸藥煮至二升分爲三服
白朮湯
治心腹堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰氣分
枳實一兩半　白朮三兩
右㕮咀每服四錢水一盞半煎至七分去查溫服
腹中爽即當散也
奪魂散
治產後虛腫喘促利小便則愈
生薑取汁　白蜜各三兩　大半夏七枚
右以生薑汁搜麪裹半夏爲七餅子煨焦熟爲末水調一餅小便利爲效
滑防己散
此藥逐水行氣虛人戒服
漢防己　豬苓　枳殼　桑白皮各一兩　商陸
甘草各七錢半
右爲粗末每服四錢水一盞半薑三片煎至七分去查空心溫服
加味八物湯
治產後遍身浮腫氣急潮熱
人參　白茯苓　熟地黃　小茴香各三錢
白朮　川芎各四錢　當歸　白芍藥　香附子各五錢　甘草　黃芩　柴胡各一錢
右判散分作六七服每服水鍾半薑三片煎至七分空心熱服盡此藥方服調經丸
若肚痛加延胡索乾漆枳殼各三錢
若嘔吐惡心加良薑砂仁各二錢
若手足痲痹加肉桂一錢半
若欬嗽加五味子款冬花杏仁
起枕散（普濟）
治兒枕痛
當歸　白芍藥各二錢　川芎一錢半　白芷
杜心　蒲黃　牡丹皮　延胡索　五靈脂
沒藥各七分
右判作一貼水煎入好醋空心服
四味物（名醫）
治產後血運
當歸　延胡索　血竭　沒藥各一錢
右粗末童便煎服入門作細末每一錢童便調下
名曰四味散
補氣養血湯（普濟）
治小產後下血不止
人參　黃芪　當歸　白朮　白芍藥酒炒
艾葉　阿膠　川芎　青皮　香附炒　砂仁研
甘草炙各一錢
右判作一貼水煎服
二母散（普濟）
治產後惡露流入肺經欬嗽
知母　貝母　白茯苓　人參各一錢　桃仁
杏仁各二錢
右判作一貼水煎服
小參蘇飲（方彙）
治產後敗血入肺面黑發喘欲死者
蘇木　人參
右蘇木二兩水二椀煎至一椀調入參細末二錢服之
旋覆花湯（二因方）
治產後感冒風寒欬喘庚盛

旋覆花　赤芍藥　荊芥穗　半夏麴　五味子
麻黃　赤茯苓　杏仁　前胡　甘草各一錢
右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

柴胡破瘀湯（入門下同）

治產後因傷寒熱病熱入血室或惡露不下者
柴胡　黃芩　半夏　甘草　赤芍藥　當歸
生地黃各一錢　桃仁　五靈脂各五分
右剉作一貼水煎服

柴胡防歸湯

治產後發熱風寒表證
當歸三錢　川芎一錢半　柴胡　人參各一錢
半夏　陳皮　防風各八分　甘草五分
右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

竹葉防風湯

治產後傷寒頭痛發熱
青竹葉二十四片　防風　人參　桂枝　桔梗
前胡　陳皮　赤茯苓各一錢
右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

當歸黃芪飲（丹溪）

治產後陰脫
黃芪酒炒三錢　人參　當歸　升麻各二錢
甘草一錢
右剉作一貼水煎服日三

硫黃湯（正傳）

治產後玉門不斂
硫黃四兩　吳萸　菟絲各一兩半　蛇牀子一兩
右研每五錢水一椀煎湯乘溫頻熏洗患處自斂

血風湯（丹溪）

治產後諸風擧急或痿弱
川芎　當歸　熟地黃　白朮　白茯苓各一兩
白芍藥　秦艽　羌活　白芷各七錢　防風五錢
右以一半爲細末溫酒調下二錢以一半爲末蜜
丸梧子大溫酒吞下五七十九

桃仁湯（良方下同）

治產後惡露方行忽然斷絕腰腹重痛或流注腿
股作痛
桃仁去皮尖研泥　蘇木　生地黃各五錢
蟲蟻去足翅　水蛭並炒各三十枚
右爲粗末每三錢水一盞煎至六分去滓溫服惡
血下卽止
如有大痛處必作癰疽宜取五香連翹湯去大黃
水煎入竹瀝服之

五香連翹湯

治惡露作癰疽
木香　沉香　丁香　乳香　升麻　獨活
麝香　連翹　木通　桑寄生各二兩
右㕮咀水二盞煮取一盞去滓入竹瀝少許溫服
一方有大黃一兩

桃柱當歸丸

治產後惡露方行忽然斷絕驟作寒熱臍腹百脈
皆痛狀如錐刺
桂心　赤芍藥各五錢　當歸　桃仁去皮尖
沒藥各二錢半　蝱蟲　水蛭並炒各三十枚
右爲細末酢麪糊和丸豌豆大酢湯下二十丸

養血佐肝丸（醫鑑下同）

治產後左脅脹悶有一塊痛臥不著席
香附酢炒一兩　當歸　川芎　白芍藥酒炒
陳皮　半夏油炒　白朮土炒　丹皮　神麯炒
蘿蔔子炒　青皮油炒　紅花　茯苓各一兩
柴胡酒炒　桃仁炒各八錢　草龍膽酒洗六錢
三稜　蓬朮並酢炒各五錢
右爲末酒糊和丸梧子大空心白湯下百丸

推氣養血丸

治產後右脅膨脹有塊如堅弦一條著冷便疼
便製香附二兩　當歸　川芎　白芍藥酒炒
白朮土炒　青皮油炒　陳皮　枳實　烏藥
厚朴　神麯　乾薑炒黑　白芥子炒各一兩
三稜酢炒　蓬莪朮酢炒各八錢　麥芽炒
肉桂各六錢　木香三錢
右爲末酢糊和丸梧子大空心以米飲吞下百丸

香靈丸（本事方）

治產後嘔不止
丁香　辰砂另研各六分　五靈脂一錢
右研極細用豬膽或猪膽和丸炭火以生薑陳
皮煎湯磨化一丸服之

參朮膏（丹溪）

治產後脬損成淋
人參二錢半　白朮二錢　黃芪一錢半　陳皮
桃仁　白茯苓各一錢　甘草五分
右剉作一貼水煎猪羊脬後入藥再煎去滓空心
溫服

茅根湯（三四方）

治產後淋

白茅根四兩　石首魚頭中石十六箇　瞿麥　葵子　人參各一兩　蒲黃　桃膠　滑石　甘草各五錢　白茯苓二兩　紫貝五箇

右爲末每二錢木通湯調下或爲粗末三錢燈心同煎服亦可

桑螵蛸散（雲奥）

治產後淋及遺尿

桑螵蛸十五箇炒　鹿茸酥炙　黃芪各一兩半　牡蠣粉　人參　赤石脂　厚朴各一兩

右爲末空心以米飲調下二錢

黃芪芍藥湯（三四方）

治產後遺尿不禁

黃芪　當歸尾　白芍藥各一錢半　白朮一錢　人參　陳皮各五分　甘草炙三分

右剉作一貼水煎空心服

的奇散（得效方）

治產後泄瀉惡露不行此餘血滲入大腸爲瀉下青黑色物是驗

大荊芥穗於盞內然火燒存性不得犯油火　麝香少許

右研爲末每取一錢沸湯一二呷調服神效

滋腸五仁丸（經）

治產後陰血虛耗大便閉澁

橘紅四兩　杏仁　桃仁各一兩　柏子仁五錢　松子仁二錢半　郁李仁一錢

右各另研爲膏橘紅爲末蜜和丸梧子大米飲下五六十丸

五味白朮散（并要）

治產後腫宜補中導水行氣

白朮三錢　陳皮去白一錢半　木通　川芎　赤茯苓各一錢

右剉作一貼水煎吞下與點丸二十五丸

補虛湯（人門）

胎前產後虛熱用此加減

人參　白朮各一錢半　當歸　川芎　黃芪　陳皮各一錢　甘草七分

右剉作一貼入薑三片水煎服

如熱輕倍加茯苓

如熱重加酒芩

如熱甚加乾薑炒黑引諸藥入肝經生血

保安丸（局方）

治產前產後諸疾

生乾地黃另爲末　蠶退紙炙各一兩　赤茯苓　丹皮　白芍藥各七錢半　川芎　細辛　人參　肉桂　當歸　牛膝　寒水石煅　白芷　木香　附子炮　藁本　麻黃　澤蘭　甘草炙　防風　桔梗　蟬蛻各五錢　吳茱萸　沉香各二錢半

右爲末蜜丸彈子大酒下一丸

當歸湯散（入門）

治產後瘀血心腹作痛兼有寒熱

紅花　桃仁各八分　甘草五分　桂六分　赤芍　烏藥　香附　蘇木各一錢

水酒煎服

熟料五積散

治產後食滯寒熱心腹作痛

枳殼五分　白芷　川芎　甘草　茯苓　芍藥　當歸　桂各三分　陳皮六分　烏藥一錢酢炒　厚朴　乾薑各四分　桔梗一分半　半夏二分　蒼朮七分半

右除白芷桂二味外餘十二味用慢火炒令色變攤冷入桂芷烏藥和勻煎服

理中湯

治產後感寒心痛

人參　白朮　乾薑各二錢　甘草一錢半

水煎溫服

木檳湯

治產後七情感傷血與氣併心痛

木香　檳榔　延胡索　金鈴子　三稜　莪朮　厚朴　桔梗　川芎　當歸　白芍藥　黃芩　甘草各等分

水煎服

桂心湯

治素有宿寒因產大虛寒搏於血血凝不散上衝心之絡脈故作心痛

桂心　小草　吳茱萸　乾薑　獨活　熟地　當歸　白芍各一錢　甘草　細辛各三分

水煎服

四君子湯

產後挾寒腸鳴腹痛用此加減

人參　茯苓　甘草　白朮
薑棗煎服

三白湯（醫鑑下同）

治產後脾脉弦腹脹
白砂糖一兩　雞子清一箇　燒酒一鍾半
煎八分溫服

生脉散

治產後氣虛煩渴
人參　五味子　麥門冬各味分兩隨宜右爲末

黃雌雞湯（景岳全書下同）

治產後虛羸腹痛
當歸　白朮炒　熟地　黃芪炒　桂心各半兩
小黃雌雞一隻去頭足腸翅細切
右先用水七椀煑雞至三椀每用汁一椀藥四錢
煎日三服

九蜜煎

治產後陽氣虛寒或陰邪入臟心腹疼痛嘔吐不
食四肢厥冷
當歸　熟地各三錢　芍藥酒炒　茯苓各錢半
炙甘草　乾薑炒黑　肉桂　北細莘各一錢
吳茱萸製五分
水二鍾煎服

胃關煎

治產後腎氣虛寒瀉痢腹痛
熟地三五錢或一兩　炙甘草一二錢　山藥炒
白扁豆炒各二錢　焦乾薑一二錢或三錢
吳茱萸製五七分　白朮炒一二三錢
水二鍾煎七分食遠溫服

排氣飲

治產後氣逆食滯脹痛等證
陳皮　藿香　枳殼各一錢五分　厚朴一錢
澤瀉　烏藥　香附各二錢　木香七分或一錢
水一鍾半煎七分熱服

大和中飲

治同上
陳皮一二錢　山梔　麥芽各二錢　枳實一錢
砂仁五分　厚朴　澤瀉各一錢五分
水一鍾半煎七分食遠溫服

三柴胡飲

治產後感邪氣不甚虛者
柴胡二三錢　芍藥一錢半　生薑三五片
炙甘草　陳皮各一錢　當歸二錢（潛溪代以生地）
水一鍾半煎七分溫服

四柴胡飲

治產後氣虛脾弱而感邪者
柴胡一二錢　當歸二三錢（瀉者少用）　炙甘草一錢
人參二三錢或五七錢　生薑三五七片
水二鍾煎七分溫服

五柴胡飲

治產後氣虛脾弱而感寒者
柴胡一二三錢　當歸　白朮炒各二三錢
熟地三五錢　芍藥錢半炒　炙甘草一錢
陳皮酌用（或不用）
水一鍾半煎七分食遠熱服

正柴胡飲

治產婦強壯氣實而感寒者
柴胡一二錢　防風　甘草各一錢　芍藥二錢
陳皮一錢半　生薑三五片
水一鍾半煎七分熱服

補陰益氣煎

治產後三陰不足而感寒者
人參一二三錢　當歸　山藥酒炒各二三錢
陳皮　炙甘草各一錢　熟地三五錢或一二兩
升麻三五分（火旁於上者去之）　柴胡一二錢
水二鍾加生薑三五七片煎八分食遠溫服如無
外邪者不必用柴胡

徙薪飲

治產婦體實火甚便實尿赤無表證而發熱者亦
治妊娠火盛迫血妄行
陳皮八分　黃芩二錢　麥冬　芍藥　黃蘗
茯苓　牡丹皮各一錢半
水一鍾半煎七分食遠溫服

抽薪飲

治同上
黃芩　石斛　木通　梔子炒　黃蘗各一二錢
枳殼　澤瀉各一錢半　細甘草三分
水一鍾半煎七分食遠溫服

一陰煎

治同上
生地　芍藥　麥冬　丹參各二錢　甘草一錢
熟地三五錢　牛膝一錢半

水二鍾煎七分食遠溫服
加減一陰煎
治陰虛兼火甚而大熱者
生地　芍藥　麥冬各二錢　熟地三五錢
知母　地骨皮各一錢　炙甘草五七分
水二鍾煎服
二陰煎
治產後陰虛發熱怔忡恍惚
當歸二三錢　熟地三五錢　炙甘草一錢
芍藥酒炒　棗仁各二錢　人參隨宜
水二鍾煎七分食遠服
大營煎
治產後虛火不歸源而發熱者
當歸二三錢或五錢　炙甘草　肉桂各一二錢
枸杞　杜仲各二錢　牛膝一錢半　熟地隨宜
水二鍾煎七分食遠溫服
豬腰湯
治產後蓐勞寒熱如瘧自汗無力欬嗽頭痛
豬腰一對　當歸　白芍藥酒炒各一兩
右以藥二味用水三椀煎至二椀去滓將豬腰切
如骰子塊同晚米一合香豉一錢加葱椒鹽煮稀
粥空心日服一次神效或加人參更妙
白茯苓散
治產後蓐勞頭目眩體疼痛寒熱如瘧
白茯苓一兩　人參　當歸　黃芪　川芎
白芍藥　熟地　柱心各半兩　豬腰一對
水三盞入豬腰并藥煎各三事煎二盞去柤入前
藥半兩煎一盞服
母雞湯
治產後蓐勞虛汗不止
人參　黃芪炙　白朮炒　白茯苓　麻黃根
牡蠣煅各三錢
右用母雞一隻去毛雜淨水六七椀同藥煮至三
椀任意服之
貞元飲
治產後虛喘
熟地黃七八錢甚者一二兩　當歸二三錢
炙甘草一二三錢
水二鍾煎八分溫服
大補元煎
治產後發痙及氣虛兼寒或氣血俱虛淡血津津
不已
人參少則一二錢多則一二兩　炙甘草一二錢
熟地少則二三錢多則二三兩　山茱萸一錢
山藥炒　杜仲各二錢　當歸　枸杞各二三錢
水二鍾煎七分食遠溫服
金水六君煎
治產後外感作喘
當歸　茯苓　半夏各二錢　熟地二五錢
陳皮一錢半　炙甘草一錢
水二鍾生薑三五七片煎七分食遠溫服
六安煎
治產後寒邪入脉氣實氣壅而本無虛者
陳皮一錢半　杏仁去皮尖切　甘草各一錢
半夏二三錢　白芥子五七分老者不用　茯苓二錢
水一鍾半加生薑二五七片煎七分食遠服
通瘀煎
治產後瘀血實痛
歸尾三五錢　山梔　香附　紅花炒黃各二錢
烏藥二錢　澤瀉　青皮各錢半　木香七分
水二鍾煎七分加酒一二小鍾食前服
迴生丹
治婦人產後諸疾污穢未淨及一切實邪疼痛死
胎瘀血衝逆等證
人參　白朮　青皮　木瓜各二錢　延胡索
當歸　川芎　蒼朮　香附童便炒　赤茯苓
猪黃　桃仁泥　熟地各一兩　牛膝　山茱萸
三稜　五靈脂　地榆　甘草　羌活　陳皮
白芍各五錢　良薑四錢　烏藥二兩半　木香
乳香　沒藥各一錢
右爲末用大黃膏爲丸彈子大金箔爲衣不拘時
隨證擇用湯引送下一丸
大黃膏法
蘇木三兩河水五椀煎去柤　紅花三兩炒黃色用
好酒一大壺煮十餘滾去柤　黑豆三升煮熟存汁
三椀去豆皮曬乾爲末　大黃一斤
爲末用好酢八椀熬成膏次下紅花酒蘇木湯黑
豆汁攪勻又熬成膏盆內收盛候用將鍋焦焙乾
爲末同豆皮末俱入之
斷產方
神效不傷人

四物湯五錢　蕓薹子二錢

右於經行後空心溫服

單方

產後血運風痓身強直口目喎斜不知人雞子三箇取清調荊芥末二錢日二服或一枚亦可

產後惡血冲心或胎衣不下腹中成塊大黃一兩爲末酢半升同熬成膏丸如梧子大以溫酢化五丸服之良久血下即愈

產後血運用松烟墨二錢燒通紅箸滅爲末酢湯或溫酒調服半匕（準繩下同）

產後血運全不省人事極危殆者用韭菜入有嘴磁瓶內煎熱酢沃之便密紮瓶口以瓶嘴向產婦鼻孔令酢氣透入妙

又方用半夏爲末丸如大豆內鼻中即甦亦療五絕

又方惡血服少許良

惡露不下用好墨酢淬末以童便酒下妙

產後泄血不止及腹痛胷膈悶以薑黃爲末酒服方寸匕日三四服

產後血塊痛用山楂濃煎汁入沙糖少許再煎熱服

兒枕痛用眞蒲黃研細酒調服二錢如燥渴者新汲水調下

又方用隔年蟹殼燒灰酒調下

產後惡露不盡腹脹痛用亂髮如雞子大灰水洗垢淨燒存性末之酒調服二錢

又方用鐵秤錘燒赤投五升酒中用此酒煑當歸三兩取二升去查分溫再服

產後腸中痒不可忍以針線袋安所臥褥下勿令人知

又方取箭幹及鏃安所臥席下勿令產婦知

產後餘血衝心煩悶腹痛用蒲黃不拘多少隔紙炒每服一錢東流水煎湯調下

又方用陳白梅搥碎煎湯飲

產後中風煩渴用蓮心生爲細末米飲調下二錢效

產後血氣暴虛汗出淡竹葉煎湯服之一服三合須臾再服

又方用馬齒莧研取汁三大合煮一沸投蜜匙許冷停頓服無新者用乾煑汁入蜜服

產後發熱煩渴生藕汁一升合生地汁妙（本草）

又方竹瀝飲一盃甚妙（丹溪）

又方婦人月經水飲之甚妙（俗方）

婦人產後腹痛取戶限下土熱酒服一錢（本草）

產後忽昏悶不省人事者暴虛故也生雞卵三枚吞之若未醒童便一升飲之又不醒竹瀝五合日三五次即甦因以半夏末或皂角末吹鼻中令嚏（良方）

產後衄血血崩取木耳一斤或半斤燒灰存性爲末入麝香末一錢煨枳殼末二錢和勻每取一錢以烏梅煎湯調下即止（丹溪）

又方急取緋線一條並產母頂心髮兩條緊繫產母手中指節即止（良方）

產腸不收以大紙撚蘸香油點燈吹滅以烟熏產母鼻中腸即上矣

又方腸出盛以潔淨漆器濃煎黃芪湯浸之腸即上

產腸不收用油五斤煉熟盆盛令婦坐盆中約一食時先用皂角炙去皮研末吹少許入鼻作嚏立上（斗門方）

又方五靈脂燒烟熏之先以鹽湯洗淨（危氏方）

產後血衝心胷滿喘命在須臾用血竭沒藥各一錢研細末童便和酒調服（集要）

產後腸出不收枳殼煎湯浸之良久即入也（袖珍方）

產腸脫出羌活二兩煎酒服（子母祕錄）

又方樗枝取皮焙乾一握水五升連根葱五莖漢椒一撮同煎至三升去查傾盆內乘熱熏洗冷則再熱一服可作五次用洗後睡少時忌鹽酢醬麵發風毒物及用心勞力等事年深者亦治之（婦人良方）

又方用石蒜（四聲通草）一把以水三椀煎一椀半去查熏洗神效（得效方）

又方用皂角樹皮半斤皂角核一合川楝樹皮半斤石蓮子炒去心一合爲粗末以水煎湯乘熱以物圍之坐熏洗之挹乾便喫補氣丸藥一服仰睡（本草）

又方五倍子末摻之或以五倍子白礬煎湯熏洗（婦人良方）

又方全蠍炒研末口噙水鼻中嚏之立效（衛生寶鑑）

子宮脫下蓖麻子仁枯礬等分爲末安紙上托入仍以蓖麻子仁十四枚研膏塗頂心即入盤腸生產方

同摘九方

子宮不收名瘣疾痛不可忍用慈石酒浸煅研末米糊丸梧子大每臥時滑石湯下四十丸次早用慈石散米湯服二錢散用慈石酒浸半兩鐵粉二錢半當歸五錢爲末概要

產後瘀血不盡麻子仁五升酒一升浸一夜明旦去滓溫服一升不瘥再服一升不吐不下不得與男子通一月將養如初千金

墜胎下血不止榆白皮當歸焙各半兩入生薑水煎服之普濟方

又方炙桑白皮煑水飲之肘後方下同

血露不絕鋸截桑根取屑五指撮以醇酒服之日三服

產後血運悶絕紅花一兩酒二盞煎至一盞分二服如口噤斡開灌之立效十三方

又方用紅花新者三兩無灰酒童便各半升煑取一盞服

產後血運及惡血衝心或兒枕痛欲絕用延胡索爲末酒服一錢立止得效方

墮胎下血不止當歸焙一兩葱白一握每服五錢酒一盞半煎八分溫服總錄

下胎或產後血氣上冲心痛欲死鬱金燒存性爲末二錢米酢一呷調灌即甦

產後血運狂言失志用紫緋一兩爲末酒服二錢匕家傳方

墮胎下血不止代赭石末一錢生地黃汁半琖調服日三五次以瘥爲度本草

產後血運及惡露不下痛悶欲死蘇木一兩剉酒水煎服

一方如無蘇木取緋衣煑汁飲之亦得

產後血瘕痛取鯉魚鱗燒灰研酒服一錢能破滯血

小產下血過多而心痛者取鮑鯽魚腹內墨炒爲末酢湯調下婦人良方

產後血結腹痛或因產瘦瘠血氣積聚可煮淡菜久食之

產後血悶攻心欲死產難胞衣不出搗慈姑汁服一升又下石淋

產後血不下鍋底墨烟熱酒服之生生編

產後尿血川牛膝水煎頓服補遺

產後下血紫菀末水服五錢聖惠

產後崩中下血不止菖蒲一兩半酒二琖煎取一琖去查分三服食前溫服之

墮胎腹痛血出不止羚羊角燒灰三錢豆淋酒下普濟

又方鹿角燒研豉汁服方寸匕日二服子母秘錄

又方烏雞子三枚酢半升酒二升和攪煑取一升分四服拾遺

產後瀉血不止乾艾葉半兩炙熟老生薑半兩濃煎湯一服立效本草

產後下血不止羸瘦迫死並血風等證蒲黃二兩水二升煎八合頓服產寶方

產後血崩蓮蓬殼五箇香附二兩各燒存性爲末每服二錢米飲下日二服婦人良方

墮胎下血不止桑木中蠹蟲燒末酒服方寸匕日二服蟲屎亦可普濟

又方地黃搗末每食前熱酒服一錢連進三服瑞竹堂方

落胎下血丹參十二兩酒五升煮取三升溫酒一升一日三服亦可水煑之千金

產後血多山漆研末米湯下集簡方

產後血運心悶氣絕以丈夫小便研濃墨一升服秘錄

產後狂言血運煩渴不止生薑香附子去毛爲末每服二錢薑棗水煎服集驗方

產後血運心氣欲絕益母草研汁服一琖絕妙子母秘錄

產後血閉不下者益母草汁一小琖入酒一合煎服聖惠下同

又方攪勻溫服

產後崩中血運卒下血酢磨松烟古墨服之本草

墮胎血溢不止墨三兩火燒酢淬三次出火毒沒藥一兩爲末每服二錢酢湯下普濟

產後血運鰾膠燒存性酒和童子小便調服三五錢良藥林

又方案紙三十張燒灰清酒半升和服頓定冬月用煖酒服立效濟信方

又方取釅酢和產婦血如棗大服之聖惠

產後血運不知人及狂語用麒麟竭一兩研末每服二錢溫酒調下聖惠

又方人參一兩紫蘇半兩以童尿酒水二合煎服摘要

又方用荷葉紅花薑黃等分炒研末童子小便調服二錢經驗方

產後血運築心眼倒風縮欲死者取乾荊芥穗搗篩末每用二錢匕童子小便一琖調勻熱服立效口噤

老挑齒灌口閉者灌鼻中皆效本草

產後鼻衄荊芥穗研末童子小便服二錢海上方也婦人良方

產後血病菴蕳子一兩水一升童子小便二琖煎飲集簡方

產後血運心悶煩熱用接骨草即蒴藋如算子一握水一升煎半升分二服或小便出血者服之亦瘥易簡方

產後惡露不除續骨木二十兩剉水一斗煮三升分三服即下即蒴藋也

又方以升麻三兩清酒五升煑取二升分半再服當吐下惡物極良千金翼方

產後穢汚不盡腹滿心頭硬或寒熱不禁或心悶手足煩熱氣力欲絕諸病並用延胡索炒研酒服二錢甚效聖惠下同

產後血運蕓薹子生地黃等分爲末每服三錢薑七片酒水各半琖童便半琖煎七分溫服即甦

又方鹿角一段燒存性出火毒爲末酒調灌下即甦摘要

產後血運不知人及狂語用血竭一兩研末每服二錢溫酒調下本草

血氣逆煩羚羊角燒爲末水服方寸匕肘後方

產後血亂奔入四肢厥逆以狗頭骨鍛灰酒服二錢甚效經驗方

產後虛羸腹痛冷氣不調及腦中風汗自出白羊肉一斤切治如常調和食之心鏡

產後血運神麴炒爲末水服方寸匕千金

產後諸疾血運心悶煩熱厭厭氣欲絕心頭硬乍寒乍熱續斷皮一握水三升煎二升分三服如人行三里再服無所忌此藥救產後垂死子母秘錄

產後心腹痛悶或單心痛惡血不盡也荷葉炒香爲末每服方寸匕沸湯或童子小便調下或燒灰或煎汁皆可救急方

產後心痛惡血攻心氣悶欲絕桂心爲末狗膽汁丸芡子大每熱酒服一丸聖惠

產後瘕痛桂末服方寸匕取效肘後方

產後腹痛如絞當歸末五錢白蜜一合水一琖煎一琖分爲二服未效再服

產後血痛白雞冠花酒煎服之李樓奇方

產後腹痛欲死因感寒起者陳蘄艾二斤焙乾搗鋪臍上以絹覆住熨斗熨之待口中艾氣出則痛自止矣經驗方

又方羌活二兩煎酒服必效方

產後心痛雞子煑酒食之備急方

產後腹痛如錐刺者敗醬草五兩水四升煑二升每服二合日三服良

兒枕痛百藥不效者用螃蟹一箇燒存性研爲末空心溫酒一盞調服立止生男用尖臍蟹生女用團臍蟹本草下同

又方用螃蟹搗爛和酒服

產後煩渴血氣上衝也紫葛三兩水二升煎一升去查呷之

產後腹痛兒枕痛也天仙藤五兩炒焦爲末每服生薑汁童子小便和細酒服經驗方

產後兒枕血瘕腹痛喉痹熱塞鐵秤錘或鐵斧鐵杵燒赤淬酒飲之

產後欬逆嘔吐心忡目運石蓮子一兩半白茯苓一兩丁香五錢爲末每米飲服二錢補遺

產後悶亂血氣上衝口乾腹痛用生藕汁三升飲之

又方用藕汁生地黃汁童子小便等分煎服

婦人產後血氣攻心痛惡物不下用竈中心土研末酒服二錢瀉出惡物立效急救方

產後浮腫用柑皮酒煎服之雷公云產後肌浮柑皮酒服是也本草下同

產後風虛獨活白蘚皮各三兩水三升煑一升分三服耐酒者入酒同煑

產後血滲入大小腸車前草汁一升入蜜一合和煎一沸分二服崔氏方

產後瀉痢小龍牙根一握濃煎服之甚效即蛇含草是也斗門方

墮胎血瘀不下狂悶寒熱用鹿角屑一兩爲末豉湯服一錢日三須臾血下聖惠

又方蒲黃三兩水三升煎一升頓服梅師方下同

兒枕血瘕蒲黃三錢米飲服或白湯下

產後陰脫愼火草一斤陰乾酒五升煑汁一升分四服子母秘錄

產後諸痢蒼耳葉搗絞汁溫服半酒琖日三四服聖惠

產後血脹搗芭蕉根絞汁溫服二三合本草

產後搐搦强直者不可便作中風治乃風入子臟與破傷風同用鰾膠一兩以螺粉炒焦去粉爲末分三服煎蟬蛻湯下產寶

產後目閉心悶赤小豆生研東流水服方寸匕不瘥

更服附方
產後悶滿不能食用赤小豆二七枚燒研冷水頓服佳本草
墮胎血下煩悶用豉一升水三升煮三沸調鹿角末方寸匕千金翼秘錄
產後中風血熱煩渴以紅藍子五合熬搗旦日取半大匙以水一升煎取七合去查細細嚥之聖惠方
墮胎下血小薊根葉益母草五兩水三大椀煮取一椀再煎至一升分二服一日服盡聖惠方
婦人產後百病及腹中積聚用桃仁一千二百枚去皮尖雙仁熬搗細末以清酒一斗半研如麥粥入磁缸中密封口湯煮一伏時取出溫酒和服一匙日再名曰桃仁煎正傳下同
產後諸虛發熱自汗人參當歸等分爲末用豬腰子一個去膜切小片以水三升糯米半合葱白二莖煮米熟取汁一盞入藥煎至八分食前溫服即愈千金方
產後祕塞出血多以人參麻子仁枳殼熟炒爲末煉蜜丸梧子大每服五十丸米飲下濟生方
產後口乾舌縮用雞子一枚打破水一盞攪服聖惠方
產後煩憑不食者白犬骨燒研水服方寸匕千金翼
產後腹脹不通轉氣急坐臥不安以麥蘗一合爲末和酒服良久通轉神驗
產後青腫疼痛及血氣水疾乾漆大麥蘗等分爲末新瓦中鋪漆一層藥一層重重令滿鹽泥固濟煅赤研末熱酒調服二錢產後諸疾並宜經驗方
產後祕塞五七日不通不宜妄服藥丸宜用大麥芽炒黃爲末每服三錢沸湯調下與粥間服錦囊秘錄

產後諸痢多煮雞白食仍以羊腎脂同炒食之范汪方
產後虛汗豬膏薑汁白蜜各一升酒五合煎五上五下每服方寸匕千金翼
產後煩悶汗出不識人千金用羚羊角燒末東流水服方寸匕未愈再服
又方加芍藥枳實等分炒研末湯服
產後咽逆白豆蔻丁香各半兩研細桃仁湯服一錢少頃再服乾坤生意
產後陰脫鐵爐中紫烟羊脂二味和勻布裹炙熱熨推內之胎產方
產後下痢日五六十行用桑木裏蠹蟲糞炒黃急以水沃之稀稠得所服之以瘥爲度此獨孤訥祭酒方也必效方
產後煩悶乃血氣上衝生地黃汁漬酒各一升相和煎沸分二服集驗方
產後百病地黃汁漬麴二升淨秫米二斗令發如常釀之至熟封七日取清常食令相接忌生冷鮮蒜雞猪肉一切毒物未產先一月釀成夏月不可造千金翼
產後陰脫以溫水洗軟用雄鼠糞燒烟熏之即入熊氏
產後遺尿雞窠草燒末酒服一錢聖惠
產後祕塞以葱涎調臘茶末丸百丸茶服自通不可用大黃利藥用之必死本草
產後壯熱頭痛煩赤口乾唇焦煩渴昏悶用松花蒲黃川芎當歸石膏等分爲末每服二錢水二合紅花二捻同煎七分細呷初產後寒熱心悶腹脹百病羚羊角燒末酒服方寸匕千金翼秘錄

產後口渴用煉過蜜不計多少熟水調服即止產書
產後盜汗嘗嘗惡寒茱萸一雞子大酒三升漬半日煮服千金翼
產後遺尿豬脬豬肚各一箇糯米半升入脬內更以脬入肚內同五味煮食集要
產後虛羸令人肥白健壯羊脂二斤生地黃汁一斗薑汁五升白蜜三升煎如飴溫酒服一盃日三小品
產後血攻或下血不止心悶面青身冷欲絕者新羊血一盞飲之三兩服妙梅師方
產後遺尿不禁雞尿燒灰酒服方寸匕產寶
產婦面黑或面如雀卵色以羊膽豬胰細莘等分煎三沸夜塗旦以漿水洗之錦囊方
產後虛羸瘦弱無力羊腎一雙炮熟細切和五味作羹或作粥食良本草
產後諸疾及胎臟不安杜仲去皮炙上焙乾木臼搗末煮棗肉和丸彈子大每服一丸糯米飲下日二服勝金方
產後虛汗淡竹瀝三合煖服須臾再服產寶
產後陰脫燒車缸頭脂納酒中服千金翼秘錄下同
產後下痢煞石子一箇燒存性研末酒服熱即用飲下日二
產後風邪心虛驚悸用猪心一枚豆豉汁煮食之心鏡
產後陰脫龜頭五枚燒研井華水服方寸匕日三千金
又方加葛根二兩酒服方張涯
產婦尿閉風婦七枚熬研末酒服千金
產後虛汗發熱骨髓疼痛亦名蓐勞用猪腎葱豉和成作臛食之本草

產後中風口噤身直面青手足反張竹瀝飲一二升即甦梅師方

產後氣喘胡桃肉人參各二錢水一盞煎七分頓服本草

產後虛羸黃母雞一隻去毛背上開破入生百合三枚白粳米半升縫合入五味汁中煑熟開腹取百合并飯和汁作羹食之并食肉聖惠

產後氣逆青橘皮爲末葱白童子小便煎二錢服經驗後方

產後尿閉不通者陳皮一兩去白爲末每空心溫酒服二錢一服即通本草

產後身熱如火皮如粟粒者桃仁研泥同臘猪脂敷之日一易之千金

產後血閉桃仁二十枚去皮尖藕一塊水煎服之良經驗方

產後下痢赤白裏急後重用桃膠焙乾沉香蒲黃炒各等分爲末每服二錢食前米飲下婦人良方

產後血滯衝心不下生薑五兩水八升煑取三升分三服

產後垂出肉線長三四尺觸之痛引心腹欲絕老薑連皮三斤搗爛入麻油二斤拌勻炒乾先以熟絹五尺折作方結令人輕輕盛起肉線使之屈曲作三團納入產戶乃以絹袋盛薑就近熏之冷則更換經一日夜縮入大半二日盡入但不可使線斷斷則不可治矣

產後下痢赤白者用紫莧菜一握切煑汁入粳米三合煑粥食之瘥本草

產後虛汗馬齒莧研汁三合服如無以乾者煑汁

產後痢渴久病津液枯竭四肢浮腫口舌乾燥用冬瓜一枚外以黃土泥厚五寸煨熟絞汁飲亦治傷寒痢渴錄驗

產後血疼欲死者槐耳半兩爲末酒濃煎飲之立愈婦人良方下同

產後敗血邪氣入心如見祟物顛狂用大辰砂一二錢研細飛過用飲兒乳汁三四茶匙調濕以紫項地龍一條入藥滾三滾刮淨去地龍不用入無灰酒一琖分作三四次服何氏方

婦人斷產白玉簪花白鳳仙子各一錢半紫葳二錢半辰砂一錢搗末蜜和丸梧子大產內三十丸日以酒半琖服之不可著牙齒能損牙齒也摘元方下同

產後嘔水因怒哭傷肝嘔青綠水用韭葉一斤取汁入薑汁少許和飲即愈

治腹中及產後瘀血紅麴浸酒煑服本草

治產後百病或血熱覺有餘血水氣或中風困篤或背強口噤或但煩熱瘛瘲五緩六急口渴或身頭皆腫或身痒嘔逆直視或手足頑痹頭旋眼眩此皆虛熱中風也用大豆三升熬熟至微烟出入瓶中以酒五升沃口經一日以上服酒一升溫覆令少汗出身潤即愈口噤者加獨活半斤微微搥破同沃之產後宜常服以防風氣又消結血蓋此酒治污血又能發表也

又方以豆五升酒一斗焠之

產後中寒遍身冷直口噤不識人白朮一兩澤瀉一兩生薑五錢水一升煎服

產後嘔逆別無他疾者白朮一兩二錢生薑一兩五錢酒水各二升煎一升分三服本草

產後煩躁禹餘糧一枚狀如酸棗者入地埋一半緊築用炭一斤煅之濕土罨一宿打破去外面石取裏面細者研水淘五七度日乾再研萬遍用甘草湯服二錢一服立效經驗方

產後舌出不收丹砂敷之暗擲盆碎墮地作聲驚之自收集簡方

產後中風身如角弓反張口噤不語川烏頭五兩剉塊黑大豆半升同炒半黑以酒三升傾鍋內急攪以絹濾取酒微溫服一小琖取汗若口不開拗開灌之未效加烏雞糞一合炒納酒中服以瘥爲度小品方下同

產後陰腫痛用桃仁細研塗之

又方五倍子枯白礬爲末研桃仁爲膏塗之

產後陰脫人屎炒赤爲末酒服方寸匕日二服千金

婦人斷產零陵香爲末酒服二錢每服至一兩即一年絕孕蓋血聞香即散也集要

產後陰翻產後燥熱遂成翻花澤蘭四兩煎湯熏洗二三次再入枯礬煎洗之即安集簡方

婦人斷產蠶子故紙方圓一尺燒爲末酒服終身不產千金

又方剪印紙有印處燒灰水服一錢匕效藏器

又方用白麪麴一升無灰酒五升打作糊煮二升半用絹帛濾去查作三服候月經將來前日晚下喫一服次日五更喫一服天明喫一服月經即行終身絕子

又方用油煎水銀一日方息空心服棗核大一丸永

斷孕不損人

產後遺尿或尿數桑螵蛸炙半兩龍骨一兩爲末每米飲服二錢胎產方

婦人胎前產後遺尿白薇芍藥各一兩爲末酒服方寸匕日三服千金

產後腹痛用五靈脂末神麯糊丸白朮陳皮湯下丹溪方

兒枕作痛五靈脂慢炒研末酒服二錢產寶方

鍼灸

甲乙經曰婦人產後餘疾食飲不下胷脅搘滿目眩足寒心切痛善噫聞酸臭脹痹腹滿少腹尤大期門主之

千金方曰墮胎後漏下五色疼痛灸胞門穴在關門左邊二寸是也右邊二寸名子戶

斷產灸右踝上一寸二壯卽斷

朱震亨心法曰婦人四旬因小產成病百節痛無常處臥牀不起刺八字五分環跳四寸半五樞三寸半曲池液門各寸半絕骨二寸半如脊背痛者刺人中大椎節下各五分委中七分見血立效

婦人五旬經斷後再行或多或少或瘀或紅並下腹中氣滿如胎孕刺天樞中脘氣海三穴各五分立愈

婦人得子多變成水淋漓而下經久身面虛腫刺陰谷二寸半絕骨二寸半如喘滿刺魚際透大淵左右共四十九呼治肺經水氣極妙

產後血塊痛三陰交氣海宜灸之

婦人產後忽小腹脹如蠱大小便不通氣海三里關元三陰交陰谷各主之

醫學綱目曰產後手足逆冷刺肩井立愈

產後血運不省人事取三里支溝三陰交心術無此一穴

又法取神門內關不應取關元灸之

胞衣不下取三陰交中極各瀉之

產後噫呃服藥無效灸期門必愈

醫學入門曰神門治產後腹脹小便不通

醫學準繩六要曰產後呃逆急灸期門乳頭向下盡處是穴乳小者以一指爲率

產後欬逆灸期門極效男左女右乳下黑盡處一韭葉灸三壯甚者二七壯

證治準繩曰產後小便不通腹脹如鼓悶亂不醒緣未產之前內積冷氣遂致產時尿胞運動不順用鹽於產臍中塡可與臍平却用葱白剝去粗皮十餘根作一縛切作一指厚安鹽上用大艾炷滿葱餅子灸之覺熱氣直入腹內卽時便通神驗不可具述

陰脫產門不閉灸臍下橫紋五七壯

產後血運不省人事灸陽別

醫案

瘡瘍全書曰一少婦產兒後忽玉戶垂尺許狀如腸少不知事私以手摘斷至晚腹痛號泣而絕此腸卽生腸又曰胞戶子宮切不可損損則傷生蓋氣血衰敗未能收入宜多進活血之劑三二日間自然收入不足憂恐也予治三四人皆以此藥得力

朱震亨心法曰一婦人產子後陰戶中下一物如合鉢狀有二岐其夫來求治予思之此子宮也必氣血弱而下墜遂用升麻當歸黃芪大料二貼與之半日後其夫復來曰服二次後覺響一聲視之已收入陰戶但因經宿乾著席上破一片如掌心大落在席某妻在家哭泣恐腸破不可復生予思之此非腸胃乃糟粕也肌肉破尚可復完若氣血充盛必可生滿遂用四物湯加人參與一百貼三年後有子

一婦人面白素多慾產後血運不知人事急於氣海灼艾五十五壯遂蘇連進人參黃芪當歸等補藥二月安

一婦人三十餘歲生女二日後產戶一物如手帕下有帕尖約重一斤予思之此因胎前勞乏傷氣成肝痿所致却喜血不甚虛其時歲暮天寒恐冷乾壞了急與炙黃芪半錢人參一錢白朮五分當歸一錢半升麻五分三貼連服之卽收上得汗通身乃安但下面沾席處乾者落一片約五六兩重蓋脂膜也食進得眠診其脉皆濇左略弦視其形却實與白朮芍藥各錢半陳皮一錢生薑一片煎二三貼以養之

醫學綱目曰一婦人產當寒月氣寒入產門臍下脹滿手不得犯此寒疝也醫將治之以抵當湯謂其有瘀血也予教之曰非其治也可服張仲景羊肉湯少減作二服遂愈

浦江吳輝妻孕時足腫產後二日洗浴卽氣喘但坐不得臥者五箇月惡風得煖稍寬兩關脉動尺寸皆虛百藥不效用牡丹皮桃仁桂枝茯苓乾薑枳實厚朴桑白皮紫蘇五味苦蔞仁煎湯服之卽寬二三服得臥其痰如失蓋作汚血感寒治之也

郭茂恂嫂金華君產七日不食始言頭痛頭痛已又心痛作既而目睛痛如割如刺更作更止相去無瞬

息間每頭痛甚欲取大石壓良久漸定心痛作則以十指抓壁血流滿掌痛定目復痛又以兩手自剜取之如是十日不已衆醫無計進黑龍丹半粒疾少間中夜再服服後瞑目寢如平昔至平旦下一行約三升許如蝗蟲子其疾減半已刻又行如前則頓愈矣薛己醫按曰一妊婦墮胎昏憒不時吐痰自用養血化痰之劑昏憒不省自汗發搐痰涎湧出彼以爲中風欲用祛風化痰予曰此屬脾氣虛寒所致用十全大補湯加炮薑二十餘劑尋愈

一產婦陰門不閉發熱惡寒用十全大補湯加五味子數劑而寒熱退又用補中益氣加五味子數劑而陰戶斂若初產腫脹或痛而不閉者用加味逍遙散若腫既消而不閉者用補中益氣湯切忌寒涼之劑

一妊婦因產飲酒惡露甚多患血運口出酒氣此血得酒熱而妄行虛而作運也以佛手散加煨乾葛二錢一劑而痊酒性慓悍入月及產後不宜飲恐致前證遂室人衆氣熱喧嚷亦致此證

一婦人產後顛狂或用大澤蘭湯而愈後又怔忡妄言其痰甚多用茯苓散補其心虛頓愈又用八珍散加遠志茯神養其氣血而痊

一產婦亦患此證用化痰安神等藥病益甚神思消沮余以爲心脾血虛不足用大劑參朮芎歸茯神酸棗仁四斤餘而安乃以歸脾湯五十餘劑而愈

一產婦形體甚倦時發讝語用柏子仁散稍愈又用加味歸脾湯而愈又因怒仍狂言骨痛小便下血用加味逍遙散以清肝火養肝血頓瘥又佐以加味歸脾湯而安

一產婦不語用七珍散而愈後復不語內熱脯熱肢體倦怠飲食不進用加味歸脾湯爲主佐以七珍散而愈後因怒不語口噤腰背反張手足發搐或小便見血面赤或青或黃或時兼赤余曰面青肝之本色也黃者脾氣虛也亦者心血虛也用八珍湯加釣藤鉤茯苓遠志漸愈又用加味歸脾湯而痊

一產婦產後乍見鬼神或用調經散愈而復作仍服前散益甚痰涎上湧朝寒暮熱余朝用八珍散夕用加味歸脾湯各五十餘劑而愈

一婦人產後心神驚悸初度服琥珀地黃丸局方妙香散隨效再患服之其證益甚而脈浮大按之如無發熱惡寒此血氣俱空虛余用十全大補加味歸脾二湯各百餘劑而愈後遇驚恐勞怒復作仍服前藥而安

一婦人產後中風心散不省人事言語妄甚惡風寒喜熱飲形氣俱怠脈虛浮無力余謂血氣虛寒用十全大補湯二十餘劑不應又二十餘劑稍緩乃漸加附子至一錢服數劑諸證減一二又二十餘劑十退三四乃去附子五分數劑諸證頓退而安後又發仍服前藥加附子三五分而愈

一婦人產後中風恍惚盜汗自汗發熱脯熱面色黃白四肢畏冷此氣血俱虛用八珍湯不應更用十全大補加味歸脾二湯始應後因勞怒發厥昏憒左目牽緊兩臂抽動小便自遺余以爲肝火熾盛用十全大補加釣藤山梔而安再用十全大補湯辰砂遠志丸而愈

一婦人產後虛極生風或用諸補劑四肢逆冷自汗泄瀉腸鳴腹痛余以陽氣虛寒用六君子黃附各加至五錢不應以參附各一兩始應良久不服仍腸鳴腹痛後灸關元穴百餘壯及服十全大補湯方效

一產婦略聞音響其汗如水而昏憒諸藥到口即嘔余以爲脾氣虛散用參附末爲細丸時衝三五粒隨液嚥下乃漸加之至錢許却服參附湯而痊

一產婦盜汗不止遂致廢寐神思疲甚口乾引飲余謂血虛有熱用當歸補血湯以代茶又以當歸六黃湯黃芩連蘗炒黑倍加人參五味子二劑而愈

一產婦牙關緊急腰背反張四肢抽搐兩目連劄此去血過多元氣虧損陰火熾盛用十全大補加炮薑一劑而甦數劑而安

余在吳江史萬湖第時將入更聞喧嚷詢云家人婦產後出直廚忽仆而死余意其勞傷氣血而發痙也急用十全大補加附子煎湯令人正其面而開其口灌之久不能下令側其面而出之換以熱藥如此五次方得下嚥遂甦

一產婦勤於女工忽仆地牙關緊急痰喘氣粗四肢不遂此氣血虛而發痙朝用補中益氣湯加茯苓半夏夕用八珍湯加半夏各三十餘劑不應此氣血之未復藥之未及也仍用前二湯又五十餘劑而愈

一產婦筋攣臂軟肌肉掣動此氣血俱虛而自熱也用十全大補湯而安

一產婦兩手痲木服愈風丹天麻丸遍身皆痲神思倦怠脯熱作渴自汗盜汗余謂氣血俱虛用十全大補湯數劑諸證悉退又數劑而全愈但內熱用加味

逍遙散而痊

一產婦因勞而臂不能屈服蘇合香丸肢體痿軟汗出如水余謂前藥辛香耗散眞氣腠理虛而津液妄泄也先用十全大補湯加五味子補實腠理收斂眞氣汗頓止又佐以四君子調補元氣漸愈用逍遙散大補湯調理而痊

一產婦先胃脘乳內脹痛後因怒口噤吐痰臂不能伸小便自遺左三部脉弦余謂此肝經血虛而風火所致不能養筋先用加味逍遙散治之臂能屈伸又以補肝散六味丸諸證悉愈

一婦人發瘧遺尿自汗面赤或時面青飲食如故肝脉弦緊余曰此肝經血燥風熱名瘧也肝主小便其色青入心則赤法當滋陰血清肝火遂用加味逍遙散不數劑諸證悉退而安

一產婦患脚氣或用獨活寄生湯而痊後復作服之其汗如水更加口噤吐痰余用十全大補湯培養血氣漸愈後飲食日少肌體日瘦吐痰如湧此命門火衰脾土虛寒用八味丸及加味歸脾湯諸證漸退肌肉漸生

一產婦身腹作痛發熱不食煩躁不寐盜汗脊痛服解散祛血之藥不時昏憒六脉洪大如無用補中益氣加炮薑半夏一劑頓退二三又一劑寢食甘美但背強而痛用八珍散大補湯調理而安

一產婦遍身頭項作痛惡寒拘急脉浮緊此風寒之證也用五積散一劑汗出而愈但倦怠發熱此邪氣去而眞氣虛也用八珍湯調補而痊

一產婦腰痛腹脹善噫諸藥皆嘔余以爲脾虛血弱用白朮一味炒黃每劑一兩水泔煎時飲匙許四劑後漸安百餘劑而愈

一產婦惡露淋瀝體倦面黃食少惡寒晝夜不寐驚悸汗出此脾經虛熱用加味歸脾湯而痊後因怒脊脹作嘔少食用六君子加柴胡治之而痊

一產婦惡露不下服峻厲之劑惡露隨下久而昏憒以手護其腹余曰此脾氣復傷作痛故用手護也以人參理中湯加肉桂二劑補之而愈

一產婦惡露上攻心痛昏憒口噤冷汗不止手足厥逆用六君子加附子一錢以廻其陽二劑頓甦又以十全大補湯養其血氣而安

一產婦患前證手不敢近腹用失笑散一服下瘀血而愈次日復痛亦用前藥而安

一產婦患前證用大黃等藥其血雖下復患頭痛發熱惡寒次日昏憒自以兩手堅護其腹不得診脉視其面色青白知爲脾氣虛寒而痛也用六君子湯加薑桂而痛止又用八珍湯加薑桂調理而安

一婦產後小腹痛甚牙關緊急此瘀血內停灌以失笑散下血而甦又用四物加炮薑白朮陳皮而愈

一婦人經水來比常度過多不止遂服濇藥止之致腹作痛此乃氣血凝滯也用失笑散二服而愈

一產婦兒枕腹痛或用驅逐之劑昏憒口噤手足發搐此血氣虛極之變證也用八珍湯加炮薑二錢四劑未應又以十全大補湯加炮薑一錢二劑而甦

一產婦小腹疼痛小便不利用薏苡仁湯二劑痛止更以四物加紅花桃仁下瘀血而愈大抵此證皆因榮衛不調或瘀血停滯所致若脉洪數已有膿脉但數微有膿脉遲緊乃瘀血下之即愈若腹脹大轉側作水聲或膿從臍出或從大便出宜用蠟礬丸太乙膏及托裏藥

一產婦惡露停滯小腹患痛服瓜子仁湯下瘀血而痊凡瘀血停滯宜急治之緩則腐化爲膿最難治療若流注關節則患骨疽失治多爲敗證

一產婦惡露停滯小腹作痛有塊脉芤而濇以四物加延胡紅花桃仁牛膝木香治之而愈

王肯堂室產後腰間腫痛兩腿尤甚此由瘀血滯於經絡而然也不早治必作骨疽遂與桃仁湯二劑稍愈更以沒藥丸數服而痊

汪中翰側室產後小腹作痛諸藥不應其脉洪滑且數此瘀血內潰爲膿也以瓜子仁湯痛止更以太乙膏下膿而愈今人產後多有此病縱非癰患用之更效有人臍出膿水久而不愈亦以前膏及蠟礬丸治之亦愈

一產婦腹中似有一塊或時作痛而轉動按之不痛面色痿黃痛則皎白脉浮而濇余謂此肝氣虛而血弱也不信乃用破血行氣之藥痛益甚轉動無常又認以爲血體專用破血祛逐之藥痛攻兩脅肚腹尤甚益信爲龜確服下蟲等藥去血甚多形氣愈虛肢節間各結小核隱於肉裏以爲龜子畏藥而走於外余云肝藏血而養諸筋此因肝血復損筋涸而攣結耳蓋肢節脅項皆屬肝膽部分養其肝土補金水以滋肝血則筋自舒遂用八珍湯逍遙散歸脾湯加減調治而愈

一婦人寒月中產後腹大痛覺有塊百方不治一人

教以羊肉四兩熟地黃二兩生薑一兩水煎服之二三次愈

一產婦小腹作痛小便不利內熱補熱形體倦怠余用加味逍遙散以清肝火生肝血用補中益氣湯補脾胃升陽氣而痊

一產婦小腹痛或作嘔或昏憒此脾氣虛寒用人參理中湯漸愈又以補中益氣湯培補脾肺而癒

一產婦患腹脹或用抵當湯敗血已下前證益甚小腹重墜似欲去後余謂此脾氣虛而下陷用補中益氣湯加炮薑溫補脾氣重墜如失又用六君子湯而安

一產婦因怒兩脅脹痛吐血甚多發熱惡寒胃腹脹痛余以爲氣血俱虛用八珍加柴胡丹皮炮薑而血頓止又用十全大補湯而寒熱漸退此證苟非用薑桂辛溫助脾肺以行藥勢不惟無以施其功而反助其脹耳

一產婦惡寒發熱余以爲血氣虛寒用十全大補加炮薑而寒熱愈但飲食不甘肢體倦怠用補中益氣而肢體安又食後犯惡惡寒發熱抽搐咬牙面色青中隱黃欲按其腹以手護之此肝木侮脾土飲食停滯用六君子加木香一劑而安

一產婦惡寒發熱余以爲氣血俱虛欲用八珍加炮薑治之其家知醫以爲風寒用小柴胡湯致汗出譫語煩熱作渴肢體抽搐余曰寒熱不時乃氣血虛用十全大補二劑益甚脈洪大重按如無此藥力不能及乃加附子四劑稍緩數劑而安

一產婦朝寒暮熱或不時寒熱久不愈用六君子補中益氣兼服百餘劑而尋愈

大尹余君之內產後發熱脯熱吐血便血兼盜汗小便頻數胃脘脹痛肚腹痞悶余曰此諸藏虛損也證當固本爲善自恃知醫用降火之劑更加瀉利腸鳴嘔吐不食腹痛足冷始信余言診其脈或浮洪或沉細或如無其面或青黃或赤白此虛寒假熱之狀時雖仲夏當捨時從證先用六君子加炮薑肉桂數劑胃氣漸復諸證漸退更佐以十全大補湯半載而全愈

儒者楊敬之內人所患同前但吐痰涎或用溫補化痰之劑不應面色黧黑兩尺浮大按之微細此因命門火虛不能生脾土脾土不能生諸藏而爲患也用八味丸補土之母而痊

一產婦食肉桑煩渴痞悶腹痛大便欲去不去服消導等藥不應飲食日減肌體日瘦半月矣余謂此食積爲患用大酒麴炒爲末溫酒調服二錢俄間腹鳴良久仍下粽而愈

一產婦食魚鮮腹痛患痢諸藥不應用陳皮白朮等分爲末陳皮湯送下數服而愈

一產婦患血渴朝寒暮熱肚腹作痛以手按之不痛余以爲血氣俱虛用八珍之類治之彼反行逐血更加發熱煩躁余用當歸補血湯熱躁漸止用八珍湯門五味氣血漸復

一婦人每產後齒齦皆動踰日乃止此氣血虛而火動也後復懷妊臨月付十全大補湯二劑令產後煎服其齒不動如故

一婦人產後喉痛服清熱等劑痛益甚此膀胱經血虛也蓋膀胱之經脈上行至喉而還用八珍湯加牡丹皮柴胡酒炒黑黃檗二劑而愈

一婦人性善怒產後臂腫內熱或用清熱敗毒散臂口腫脹日晡熱甚月水不調再用降火化痰遂令食少作嘔大便不實臂出血水又用理氣消導胃腑痞滿頭目不清臂腫經閉又用清胃行血肢體倦怠發熱煩躁涎水湧出又欲用通經之劑余曰病本七情肝經虧損又數行攻伐故元氣益虛也法當補陰益陽遂以濟生歸脾湯加味逍遙散補中益氣湯調治元氣漸復諸證悉愈後因怒寒熱耳痛胃腑脹悶臂瘍腫甚此是怒動肝火所傷遂用四物合小柴胡加山梔頓愈後又怒脅乳作脹肚腹作痛嘔吐酸涎飲食不入小水不利此是怒動肝木尅脾土乃用補脾氣養脾血而愈又因勞役怒氣飲食失時發熱喘渴體倦不食去血如崩臂腫熾甚此是肝經有火脾經氣虛遂用補中益氣加炒黑山梔芍藥丹皮而愈此證每見但治其瘡不固其本而死者多矣

一膏粱之婦產後月經不調臂裂瘍腫內熱殊甚服寒涼之劑後不時出水余用加味清胃散而愈後值春令衆怒臂口腫脹寒熱作嘔痰甚少用小柴胡加山梔茯苓桔梗諸證頓愈但內熱仍作乃以加味逍遙散調理而安

一產婦朝吐痰夜發熱晝夜無寐或用清痰降火肌體日瘦飲食日少前證愈甚余曰早間吐痰脾氣虛也夜間發熱肝血虛也晝夜無寐脾血耗也遂用六君子湯加味逍遙散加味歸脾湯以次調補而痊

一產婦停食霍亂用藿香正氣散之類已愈胃腹膨脹飲食稍過即嘔吐或作泄瀉余謂此脾胃俱虛用六君子湯加木香治之漸愈後因飲食失調兼恚怒患霍亂胃腹大痛手足逆冷用附子散又用八味丸以補土母而康設泥痛無補法而用辛散或用平補之劑必致不起

一產婦吐瀉嘔酸面目浮腫此脾氣虛寒先用六君子加炮薑爲主佐以越鞠丸而嘔酸愈又用補中益氣加茯苓半夏而脾胃康

一產婦患頭痛日用補中益氣湯不缺已三年矣稍勞則惡寒內熱爲陽氣虛以前湯加附子一錢數劑不發

一婦人產後頭痛面青二年矣日服四物等藥余謂腎水不能生肝木而血虛用六味丸加五味子兩月而痊

一產婦欬嗽聲重鼻塞流涕此風寒所感余用參蘇飲一鍾頓愈與補中益氣加桔梗茯苓半夏一劑而痊又與六君子黃芪以實腠理全愈

一產婦欬嗽痰盛面赤口乾內熱晡熱徹作無時此陰火上炎余用補中益氣湯六味地黃丸而愈

一產婦欬而腹滿不食涕唾面腫氣逆此病在胃而關於肺用異功散而愈

一產婦泄瀉四肢面目浮腫喘促惡寒余謂脾肺虛寒用六君子加薑桂而泄瀉愈又用補中益氣而脾胃健

一產婦腹痛發熱惡食氣口脈大余以爲飲食傷脾彼反服破血之劑加寒熱頭痛嘔吐涎沫用化痰降火理氣四肢逆冷泄瀉下墜余曰此脾胃虛之變證也法當溫補用六君子加炮薑肉桂木香再用補中益氣湯而愈

一產婦飲食少思服消導之劑四肢浮腫余謂此乃中氣不足所致朝用補中益氣湯夕用六君子湯而愈後因怒致腹脹誤服沉香化氣丸吐瀉不止飲食不進小便不利肚腹四肢浮腫用金匱加減腎氣丸而愈

一婦產後痢未至月滿因食冷物及酒冷熱與血攻擊滯下純血纏墜極痛其脉大無力口乾用黃芩芍藥湯三服而安

一產婦泄痢腹痛年餘形體骨立內熱晡熱自汗盜汗口舌糜爛日吐痰三椀許脉洪大重按全無此命門火衰而假熱脾土虛寒不能攝痰歸源用八味丸補火以生土用補中益氣湯兼補肺金而痊

一產婦食鷄子腹中作痛面色青黃服平胃二陳更下痢腹脹用流氣飲子又小腹一塊不時上攻飲食愈少此脾胃虛寒肝木尅侮所致用補中益氣加木香吳茱萸漸愈又用八珍大補兼服調理尋愈

一產婦瀉痢發熱作渴吐痰肌體消瘦飲食少思或胃脘痞滿或小腹脹墜年餘矣余以爲脾腎之瀉朝用二神丸夕用六君子三月餘而痊

一產婦腹痛後重去痢無度形體倦怠飲食不進與死爲鄰此脾胃俱虛也用四神丸十全大補湯而愈但飲食難化肢體倦怠用補中益氣湯調理而康

一產婦患瘧久不愈百病蜂起其脉或洪大或微細或弦緊或沉伏難以名狀用六君子加炮薑二十餘劑脉證稍得又用參朮煎膏佐以歸脾湯百餘劑而痊

陳氏婦張素怯弱生女自乳因病疥年餘遂致羸困復因執喪禮勞頓敷欲脫仆一日感氣忽患心脾高腫作疼手不可按嘔吐不止六脉微細之極陳翁自以脉雖虛而病形則實誤以諸痛不可補氣乃用青皮香附吳萸等藥而愈繼復患瘧且墮胎又自投理氣行血之藥病去元氣轉脫再投參芪補劑不應矣六脉如絲欲絕思非附子不能起因亟請余診之余知此由理氣損真之誤也連投參芪歸朮附子薑桂六劑間用八味丸五日眠食漸甘六脉全復余諭之云向使心脾疼時即服此藥瘧亦不作矣

一產婦大便七日不通飲食如常腹中如故此腹未滿也用八珍加桃杏二仁至二十一日腹滿欲去用豬膽汁潤去而安

一產婦大便八日不通或用通利之藥中脘脹痛飲食甚少又用蜜導之大便不禁呃逆不食余以爲脾腎復傷用六君子加茱萸肉果補骨脂五味數劑喜其年壯而愈不然多致不起

一產婦大便祕結小腹脹痛用大黃等藥致吐瀉不食腹痛胃痞余用六君子加木香炮薑治之而愈

一產婦大小便不通諸藥不應將危矣令飲牛乳一日稍通三日而痊人乳尤善

一產婦大便不實飲食少思五更或侵晨遺屎此中氣虛寒脾腎不足用補中益氣兼四神丸而痊

一產婦小便出糞名大小腸交乃氣血俱虛失行常道先用六君子湯二劑又用五苓散二劑而痊尋常

腸交亦可用

一產婦小水淋瀝或時自出用分利降火之劑二年不愈余以爲肺腎之氣虛用補中益氣湯六味地黃丸而痊

一產婦小便頻數時忽寒戰乃屬脾肺虛弱用補中益氣加山茱山藥爲主佐以桑螵蛸散而愈後患發熱補熱盜汗自汗月水不調用加味逍遙散而安

一產婦患前證吐痰發熱日晡作渴此膀胱陰虛用補中益氣湯佐以六味丸而愈又患痢後小便頻數手足俱冷屬陽氣虛寒用前湯及八味丸而瘳

一產婦小便不禁三年不愈面色或青赤或黃白此肝脾氣血虛熱用加味逍遙散爲主漸愈佐以六味丸而痊後因怒小便自遺大便不實左目頓緊面色頓赤仍用前散佐以六君子湯以清肝火生肝血培脾土而瘳

一產婦尿血面黃脅脹少食此肝乘脾也用加味逍遙補中益氣兼服而愈後爲懷抱不樂食少體倦驚悸無寐血仍作用加味歸脾湯二十餘劑將愈惑於衆論服犀角地黃湯諸證復作仍服前湯而愈

一產婦糞後下血食少體倦此脾氣虛熱用補中益氣加吳茱萸炒黃連五分四劑頓愈但怔忡少寐盜汗未止用歸脾湯而痊

一婦人久下血在糞前屬脾胃虛寒元氣下陷用補中益氣加黃連炒吳茱萸一錢數劑稍緩乃加生吳茱萸五分數劑而愈

一產婦大便後血口乾飲湯胃脘脹滿小腹悶墜內熱晡熱食少體倦面色痿黃日晡則赤酒漸惡寒此脾肺氣虛先用六君子加乾薑木香漸愈用補中益氣將愈用歸脾湯全愈後飲食失節勞役兼怒發熱血崩夜間譫語此熱入血室用加味小柴胡二劑而熱退用補中益氣一劑而血止用逍遙散歸脾湯調理而安

一婦人脾胃素弱兼有肝火產後玉門腫痛寒熱作渴嘔吐不食外敷大黃等藥內用驅利之劑腫及於臂諸證蜂起此眞氣虛而邪氣盛也先用六君子以固腸胃次用補中益氣以升陽氣不數劑而全愈

一產婦患此失治腫潰不已形體消瘦飲食少思朝寒暮熱自汗盜汗半年矣用補中益氣加茯苓半夏膿水漸少飲食漸進用歸脾湯共五十餘劑而愈

一產婦玉門不閉小便淋瀝腹內一塊攻走脅下或脹或痛用加味逍遙散加車前子而愈

一婦人子宮腫大二日方入損落一片殊類豬肝面黃體倦飲食無味內熱晡熱自汗盜汗用十全大補湯二十餘劑諸證悉愈仍復生育

古今醫統曰一婦產後因子死經斷不行半年一日小腹忽痛陰戶內有物如石硬塞之而痛不禁羣醫不識青林曰石瘕也用四物湯加桃仁大黃三稜槟榔延胡索附子澤瀉血竭爲湯三劑而愈

證治準繩曰一婦年近四旬稟氣素弱自去其胎五月內漸漸腹脹如鼓至心前上吐不能食只叫脹死用補藥不效程仁甫診之曰六脉微弱乃損傷脾氣而作脹然急則治其標若泥丹溪法恐緩不及事矣用桃仁承氣加枳實厚朴倍硝黃煎服四分吐去其一大半仍不通事急又服琥珀丸三錢至申時大通脹減但體倦四肢無力口不知味發熱再用參芪歸芍檀木陳皮八劑而安

吳承妻孕而驚遂病悸醫以爲病在中神越焉無可爲沈宗常以爲膽傷耳俾服抱胎丸而愈

汪鎬妻三十五歲厥產誤服打胎藥下血如崩旬餘腹痛一陣即行或時鼻衄口乾心躁舌黑蓋因瘀血上升汪石山遂用益母丸二丸童便化下鼻衄漸止下血而瘀漸退

新昌徐氏婦病產後暴死但胷膈微熱陸嚴診之曰此血閉也用紅花數十斤以大鍋煮之候湯沸以木桶盛之將病者寢其上熏之湯氣微復加之有頃婦人指動半日遂甦此與許引宗治王太后之意同

彝堅志云郝質子婦產四日癒癡戴眼角弓反張杜壬以爲痙病與大豆紫湯獨活湯而愈政和間余妻方分娩猶在蓐中忽作此證頭足反接相去幾二尺家人驚駭以數婢強拘之不直適記所云而藥草有獨活乃急爲之名醫未至連進三劑遂能直臥至即愈矣更不須用大豆紫湯古人處方神驗屢矣

一婦六月產後多汗人倦不敢袒被故汗出被裏冷則浸漬得風濕疼痛遂以羌活獨斷湯數服而愈

一婦產後三日起早血氣未定遂感身熱目暗如風狀即以清魂散二服得微汗而愈

一產婦惡露不行臍腹痛頭疼寒熱衆皆以爲感寒溫以薑附益大熱手足搐搦譫語目瞤滑伯仁診其

脉弦而洪數面赤目閉語喃喃不可辨舌黑如炲燥無津潤胃腹按之不勝手蓋燥劑搏其血內熱而生風血畜而爲痛也曰此產後熱入血室因而生風卽先爲清熱降火治風凉血兩服頗爽繼以琥珀牛黃等稍解人事後以張從政三和散行血破瘀三四服惡露大下如初時產已十日矣於是諸證悉平

一婦盛暑月中產三日發熱其脉虛疾而大惡露不行敗惡攻心狂言叫呼奔走拏捉不住以乾荷葉生地黃牡丹皮濃煎湯調下生蒲黃二錢一服卽定惡露旋下而安

一婦產後時發昏瞀身熱汗多脉運口渴或時頭痛惡心醫用四物凉血之劑病不減又用小柴胡病益甚汪石山至診其脉得浮洪搏指曰產後而得是診又且汗多而脉不爲汗衰法在不治所幸者不喘不泄耳其脉如是蓋凉藥所激也用人參三錢甘草當歸各七分白朮門冬各一錢黃芪二錢乾薑陳皮黃芩各五分煎服五劑脉斂而病漸安

王僉憲宜人產後因沐浴發熱嘔惡渴欲引冷水瓜果譫語若狂飲食不進體素豐厚不受補醫用清凉熱增劇診得六脉浮大洪數汪曰產後暴損血氣孤陽外浮內眞寒而外假熱宜大補氣血與八珍湯加炮薑八分熱減大半病人自以素不宜參芪不肯再服過一日復大熱如故復與前劑潛加參芪炮薑連進二三服熱退身凉而愈

一婦人產後去血過多食後著惱頭疼身痛寒熱如瘧吳茭山診之左手弦大微有寒邪右手弦滑不勻食傷痰火也二者因虛而得宜養正祛邪遂以茯苓補心湯去地黃加羌活青皮葱煎三服汗出身凉其患漸差後以八物湯調理半月後全愈

一婦產後惡露未盡瘀血入絡又感寒邪身熱如瘧卽以生料五積散五貼惡露自下而寒熱除

一婦產後惡露未盡因起抹身寒氣客於經絡乍寒乍熱脉緊而怯以葱白散二貼安

一少婦初產四日冷物傷脾胃但覺身分不快嘔逆飲食少思心腹滿悶時或腹脅刺痛晨惡寒晚潮熱夜則恍惚譫語晝則抽搐頗類風狀變異多端諸醫莫測或作虛風或云血凝實熱用甘溫以行瘀血用寒凉以治實熱如此半月不效汪至見醫滿座亦蹋縮診其脉弦而緊遂令按之小腹急痛知瘀血未盡也思患者大勢惡露已下未必還有餘血偶因寒凉所傷瘀血停滯下焦日久客於經絡所以變生諸證須得大調經散倍入琥珀化諸惡血成水其患方愈遂合前藥服之五日後行惡水斗許臭不可近患人覺倦病勢漸減然後以人參養榮湯數十貼月餘如初

張宣徽侍寵產後半月忽患浮腫急召產科醫治經半月不差病勢轉劇召杜欽治之杜至曰諸醫作何病張曰皆云水氣浮腫杜曰非也且水氣發欬嗽小便澀是也今愛寵小便不澀不作欬嗽手足寒乃血臟虛氣塞不通流而生浮腫遂用益血和氣藥治之旬日病去七八半月全愈所用之藥乃靈苑方牡丹散也其方云治血臟風虛冷今產科家多用此藥治產後諸病如神更名損金湯者是也

一婦產後四肢浮腫寒熱往來蓋因敗血流入經絡滲入四肢氣喘欬嗽胃腸不利口吐酸水兩脅疼痛遂用旋覆花湯微汗漸解煩服小調經用澤蘭梗煎湯調下腫氣漸消

一婦產未滿月因怒氣血流如水三日方止體又勞苦四肢無力睡而出汗日晡潮熱口乾五心如炙諸醫皆用柴芩薄荷之類其勢愈熾汪模診其脉弦大無力曰此虛勞也以四物湯一兩入胡黃連秦艽青蒿各五分數服熱退身凉後以黃連八珍丸一料而安

一婦產後滑泄勺水粒米弗容時卽泄下如此半月餘衆皆危之或用五苓散平胃散病益甚汪石山診之脉皆濡緩而弱曰此產中勞力以致傷胃若用藥愈滋胃濕非所宜也令以參苓白朮散除砂仁加陳皮肉豆蔻煎盡飲調服旬餘而安

一親戚婦人產後胞衣不下血腹迷悶不省人事告之曰死矣余曰此血腹也可用花蕊石散救之因以一錢童便調灌下卽甦其胎衣與惡水旋卽下而無恙

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百十五卷目錄
醫部彙考三百九十五
婦人崩漏門一
黃帝素問 陰陽別論 六元正紀大論
張機金匱要略 論下
王叔和脈經 崩漏脈法
陳自明婦人良方 崩漏下血
嚴用和濟生方 總論崩漏
張從政儒門事親 血崩
李杲十書 崩漏子血之二 治法
朱震亨心法 總論崩漏
戴思恭證治要訣 血崩證治
李梴醫學入門 總論崩漏治 附治
薛己醫按 血崩治法
徐春甫古今醫統 崩漏總治
王肯堂證治準繩 經驗簡要 論崩中法 產後分陰陽 黑藥通腎 論血升陽湯 治血崩專劑 並出黃芩

黃帝素問

陰陽別論

陰虛陽搏謂之崩

□陰虛陽盛則迫血妄行

六元正紀大論

少陽司天之政初之氣風勝乃搖候乃大溫其病血崩

漢張機金匱要略

漏下

寸口脈弦而大弦則爲減大則爲芤減則爲寒芤則爲虛寒虛相搏此名曰革婦人則半產漏下旋覆花湯主之

晉王叔和脈經

崩漏脈法

師曰婦人有漏下者有中生後因續下血都不絕者有妊娠下血者假令妊娠腹中痛爲胞漏一云腰痛胎動下血者名曰漏胎一云腰痛小便難

丸 風兵齊散 注 易簡芎歸湯 芎歸膠艾湯 百子黃連解毒湯 附附丸 四製香附丸 單附丸 內炙散 補陰丸 大烏雞丸 小烏雞丸 芩心丸 四物坑經丸 固經丸 升陽調經湯 升陽五積散 不換金正氣散 升陽除濕湯 補中益氣湯 黑神散 女金丹 二貴丸 平補調心丹 白芷散 寧神 滋陰寧神湯 大溫經湯 烏藥湯 桂枝湯 理中湯 益母膏 聖湯 溫胎丸

故東垣云凡下血證須用四君子以收功厥有旨哉若大吐血毋以脉論當急用獨參湯救之若潮熱欬嗽脉數乃元氣虛弱假熱之脉尤當用人參溫補此等證候無不由脾胃先損故脉洪大察其有胃氣能受補則可救苟用寒凉止血之藥復傷脾胃反不能攝血歸源是速其危也

婦人崩中漏下之證按其寸口脉弦而大弦則爲緊大則爲芤緊則爲寒芤則爲虛虛寒相搏其名爲革婦人半產漏下赤白不止脉小虛滑者生脉大緊實數者死又脉急疾者死遲者生又云尺寸脉虛者漏血脉浮者俱不治

註前證闡內經微旨濟無窮夭札須固胃爲善蓋胃爲五臟之本源人身之根蔕也

婦人血崩而心痛甚名曰殺血心痛由心脾血虛也若小產去血過多而心痛甚者亦然用鮎鯽魚骨炒爲末酢湯調下失笑散亦效

註前證若陰血耗散用鮎鯽丸收斂之若瘀血不散用失笑散行散之若心血虛弱用芎歸湯補養之若鬱結傷血用歸脾湯調補之

嚴用和濟生方

總論證治

崩漏之疾本乎一證輕者謂之漏下甚者謂之崩中且平居婦人經脉調適衝任二脉互相滋養陰陽二氣不相偏勝則月事以時下儻若將理失宜喜怒不節疲極過度大傷於肝蓋肝爲血之府庫喜怒勞役一或傷之肝不能藏血於宮宮不能傳血於海所以崩中漏下漏下者淋瀝不斷是也崩中者忽然暴下乃漏證之甚者也其狀或如猪肝或成五色與血俱下又或如泔如涕如爛瓜汁又或如豆羹汁如藍靛色至有黑如乾血相雜亦有純下瘀血者此皆衝任虛損喜怒勞役之過致傷於肝而然也又久不止面黃肌瘦虛煩口乾臍腹冷痛吐逆不食四肢虛困甚則爲脹爲腫診其脉寸口脉弦而大弦則爲減大則爲芤減則爲寒芤則爲虛寒虛相搏其名爲革婦人則主半產漏下又尺寸脉虛者漏血漏血脉浮者不可治治之之法調養衝任鎮注血海血海溫和歸於有用內養百脉外爲月事自無崩中漏下之患矣

元張從政儒門事親

血崩

婦人年及四十以上或悲哀太甚內經曰悲哀太甚則心系急心系急則肺布葉舉而上焦不通熱氣在中故經血崩下心系者血山也如久不愈則面黃肌瘦慎不可與燥熱之藥治之豈不聞血得熱而流散先以黃連解毒湯次以凉膈散四物湯等藥治之而愈四物湯是凉血者乃婦人之仙藥也量虛實加減以意消息用之

李杲十書

經漏不止有三

陰陽別論云陰虛陽搏謂之崩婦人脾胃虛損致命門脉沉細而數疾或沉弦而洪大有力寸關脉亦然皆由脾胃有虧下陷於腎與相火相合濕熱下迫經漏不止其色紫黑如夏月腐肉之臭中有白帶者脉必弦細寒作於中中有赤帶者其脉洪數疾其熱明矣必腰痛或臍下痛臨經欲行先見寒熱往來兩脅急縮兼脾胃證出見或四肢困熱心煩不得眠臥心下急宜大補脾胃而升舉血氣可一服而愈或人故貴脫勢人事疎少或先富後貧心氣不足其火大熾旺於血脉之中又致脾胃飲食失節火乘其中形質肌肉容顏似不病者此心病者不形於診故脾胃飲食不調其證顯矣而經水不時而下或適來適斷暴下不止治當先勸諭令心不動而以大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰瀉陽經自止矣痿論云悲哀太甚則胞絡絕陽氣內動發則心下崩數溲血也故本病篇曰大經空虛發則肌痹傳爲脉痿此之謂也

治法

女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水漿之物皆由飲食不節或勞傷形體或素有心氣不足因飲食勞倦致令心火乘脾其人必怠惰嗜臥四肢不收困倦乏力無氣以動氣短上氣逆急上衝其脉緩而弦急按之洪大皆中之下得之脾土受邪也脾主滋榮周身者也心主血血主脉二者受邪病皆在脉脉者血之府也脉者人之神也心不主令包絡代之故曰心之脉主屬心系心系者包絡命門之脉也主月事因脾胃虛而心包乘之故漏下月事不調況脾胃爲血氣陰陽之根蔕當除濕去熱益風氣上伸以勝其濕用升陽除濕湯即內經火鬱則發之之義也然此藥乃從權之法用風勝濕爲胃下陷而氣迫於下以救其血之暴崩也若血惡住後必須黃芪人參炙甘草當歸之類數服以補之於補氣升陽湯中加以和血便是若經血惡物下之不絕尤宜究其根源

治其本經只益脾胃退心火之亢乃治其根蒂若遇夏月白帶下脫漏不止宜用此湯一服立止

婦人血崩是腎水陰虛不能鎮守包絡相火故血走而崩也凉血地黃湯主之

崩漏太多昏冒不省人事瞑目無所知覺蓋因血暴亡也血去則精神無所養暴損氣血豈能久活今當補而升舉之以助其陽則目張神不昏迷矣今立一方補血養血生血益陽以補手足厥陰之不足曰全生補血湯

朱震亨心法

總論證治

血崩東垣有治法但不言熱其主在寒學者宜尋思之急則治其標用白芷湯調百草霜末甚者用棯櫚灰後用四物湯加炒乾薑調理因勞者用參芪帶升補藥因寒者用乾薑因熱者用黃芩崩過多者先用五靈脂末一服當分寒熱蓋五靈脂能行能止紫色成塊者熱也以四物湯加黃連之類

婦人血崩用香附白芷丸服氣虛血虛者皆以四物湯加參芪若漏下乃熱而虛四物加黃連

夫婦人崩中者由藏腑傷損衝任二脈血氣俱虛故也二脈爲經脈之海血氣之行外循經絡內榮藏腑若氣血調適經下依時若勞動過極藏腑俱傷衝任之氣虛不能約制其經血故忽然而下謂之崩中暴下治宜當大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰瀉陽經自止矣東垣之言洵不容易

明戴思恭證治要訣

血崩證治

崩有血熱而成者有氣虛而成者血大至曰崩中或清或濁或純下瘀血或腐勢不可止證狀非一所感亦異甚則頭目昏運四肢厥冷並宜膠艾湯嘯震靈丹佐以三灰散或以童子小便煎理中湯或以沉香降氣湯加入百草霜米飲調下血崩甚而腹痛人多疑惡血未盡又見血色瘀黑愈信惡血之說不敢止截大凡血之爲患欲出未出之際停在腹內即成瘀色難盡以瘀爲惡又焉知瘀之不爲虛冷乎若必待見瘀血爲虛冷而後截之恐併與人無之矣此腹痛更有說血積而腹痛血通而痛止崩而腹痛血住則止止宜芎歸湯加乾薑熟附一錢止其血而痛自定仍以毛蟹殼燒存性米飲下亦有以早黃麻根燒灰爲末米飲下

李梴醫學入門

總論證治

凡非時血行淋瀝不已謂之漏下忽然暴下若山崩然謂之崩中有五色以應五臟二者之由虛與熱而已蓋血虛則滯血熱則流故也治法多端隨證制宜詳列於左

經行犯房勞役過度損傷衝任氣血俱虛不能制約經血忽然暴下者宜大補氣血大溫經湯氣虛者四物湯加參芪血虛者四物湯加膠艾炒乾薑久不止者百子附歸丸墨附丸虛寒臍腹冷痛者伏龍肝散一切虛證內炙散虛火凉血地黃湯生地芩連湯補陰丸久者當歸部骨丸大小烏雞丸

膏粱厚味以致脾濕下流於腎與相火合爲濕熱迫經下漏其色紫黑腐臭宜解毒四物湯凉血地黃湯膠艾四物湯加黃芩或單芩心丸四物坎離丸固經丸

飲食失節火乘脾胃下陷容顏似無病者外見脾氣困倦煩熱不臥等證經水不時暴至或適來適斷只宜東養脾胃加以鎮墜心火之藥補陰瀉陽自止升陽調經湯升陽舉經湯

子宮爲四氣相搏則血亦難停大勞風冷搏動者五積散去麻黃入酢煎服或不換金正氣散加川芎官桂或四物湯加荊芥寒冷所乘及年老久崩者伏龍肝散加附子鹿茸阿膠蒲黃糯米糊丸服暑月單芩心丸或益元散加百草霜濕者升陽除濕湯

悲哀甚則包絡絕包絡絕則陽氣內陷發則心下崩數溲血也宜備金散四製香附丸烏藥湯古橘歸丸

憂鬱因先富後貧先順後逆心事不足鬱火旺於血脈之中宜四物湯加香附白朮各一錢地榆黃芪人參各五分升麻二分甚者加棯櫚灰酒調服

經曰陰虛陽搏謂之崩言屬熱者多也崩乃經血錯亂不循故道淳溢妄行遽止便有積瘀凝成窠臼不止又恐昏運必先服五靈脂末一錢其性能行能止然後分虛熱用調和氣血之藥一二貼後再服單五靈脂散去故生新如更不止烏紗帽散十灰散古黑神散單夏枯草膏有火者固經丸虛者女金丹

血崩止後宜四物湯加炒乾薑調之氣弱加參芪有鬱加香附挾火加芩連少許更服二宜丸四物湯以還舊血免致孤陽防其再發如脾胃氣弱者補中益氣湯心神不安者寧神膏滋陰寧神湯此疾有心血

不足者有心火亢甚者若不早治變爲白濁白淫血枯發熱不可治矣

日夜流津如清米泔或如膠者謂之白崩與白淫大同多憂思過度所致誠難治療宜平補鎮心丹

凡崩中或用升提如升陽調經湯或用收澁如伏龍肝散白芷散然暫止而終不止者蓋衝司開闔而爲榮血之主脾胃爲血海水液之會衝氣與胃氣俱虛則血液無所約制是以古方有用桂枝湯加附子以固衛氣者有用四君子湯加草果丁香木香以燥水健脾者或用理中湯加陳皮半夏或單半夏丸用芎歸煎湯下或補中益氣湯平胃散皆補衝厚脾使氣血自循故道而不專於收澁以劫奪之也

脈法

脈微弱爲少氣女子主崩中漏下致面色焦枯心脈獨沉主氣鬱下流崩漏去紅

腎脈浮芤腎虛也女人則經漏

後部彈手陰蹻脈也主裏急陰疝崩漏

薛己醫按

血崩治法

崩之爲患或因脾胃虛損不能攝血歸源或因肝經有火血得熱而下行或因肝經有風血得風而妄行或因怒動肝火血熱而沸騰或因脾經鬱結血傷而不歸經或因悲哀太過胞絡傷而下崩治療之法脾胃虛陷者補中益氣湯

徐春甫古今醫統

崩漏證治

婦人崩漏最爲大病年少之人火熾血熱房事過多經行時而有交感俱致斯疾大都凉血固澁升氣益榮而可愈也中年已上人及高年嫠婦多是憂慮過度氣血俱虛此爲難治必須大補氣血養脾升胃固血庶保十之二三斯疾若不早治則如頹圮之厦斜倒傾欹勢難支撐而使之正又如苗槁而後灌溉何可使之秀耶

一血崩證有因虛有因熱虛則下陷熱則流通視其緩急分標本而治之緩用四物湯加條芩附子急以立效散神效丸之屬

一血藏虛冷崩中下血宜四物湯加阿膠黃芩參芪東垣謂崩帶下久有屬於寒不可一途而論

王肯堂證治準繩

經驗簡要治崩中法

冷者脈緊細手足寒紅而淡黑或五色當歸建中加白龍骨血竭附子下紫石英丸震靈丹灸火

熱者脈洪四肢溫心煩口苦燥血沸而成用黃芩湯荊芥散或清心蓮子飲加竹瀝生地黃汁甚者生地黃汁磨京墨百草霜冷服

虛者腰艾湯加麥門冬鹿茸龍骨酸棗仁或養榮湯加龍骨血竭送震靈丹

實者腹中痛煞附丸四物湯加香附子

心虛者恍惚多夢健忘舌強小便多面紅盜汗柏子仁湯酸棗仁湯加龍骨京墨百草霜吞靈砂丹又靈砂當歸蓮肉龍骨棗肉丸參湯送下

崩中作麝香當歸香者心氣已散急服靈砂龍骨等

產寶分陰陽

受熱而赤謂之陽崩受冷而白謂之陰崩

黑藥通腎

凡治崩中多用燒灰黑藥經云北方黑色入通於腎皆通腎經之藥也夫血者心之色也血見黑即止者由腎水制心火故也

論益胃升陽湯

血脫益氣古人之法也先補胃氣以助生長故曰陽生陰長諸甘藥爲之先務舉世皆以爲補氣殊不知甘能生血此陽生陰長之理也

治用升舉

凡血崩脈沉弦而洪或沉細而數或崩而又兼久瀉者皆胃氣下陷也故舉之升之其病自愈

治用黃芩

崩中藥多是用止血藥及補血藥惟黃芩爲末用露露酒下一法乃是治陽乘陰所謂治天暑地熱經水沸溢者

萬全婦人祕科

崩漏論

女子未及二七天癸之期而男子強與之合或於月事適來未斷之時而男子縱慾不已衝任內傷血海不固由斯二者爲崩爲漏

婦人崩中之病皆因中氣虛不能收斂其血加以積熱在裏迫血妄行故令經血暴下而成崩崩久不止遂成下漏

治有三法

初止血次清熱後補其虛未有不愈者也

凡婦人女子初得崩中暴下之病者宜用止血之劑乃急則治其標也四物湯調十灰散治之以血止爲

度血止卽服清熱之劑用凉血地黃湯主之如血未盡再吞十灰丸血已盡止裏熱已除宜用補中之劑加味補中益氣湯主之更宜早服地黃丸夕服參朮大補丸以平爲期

景岳全書 臣張介賓著

論證

崩漏不止經亂之甚者也蓋亂則或前或後漏則不時妄行由漏而淋由淋而崩總因血病而但以其微甚耳陰陽別論曰陰虛陽搏謂之崩百病始生篇曰陽絡傷則血外溢陰絡傷則血內溢故凡陽搏必屬陰虛絡傷必致血溢知斯二者而崩淋之義及治療之法思過半矣惟是陰虛之說則但傷營氣無非陰虛而五臟之陰皆能受病故神傷則血無所主病在心也氣傷則血無所從病在肺也意傷則不能統血攝血病在脾也魄傷則不能畜血藏血病在肝也志傷則不能固閉眞陰病在腎也所以五臟皆有陰虛五臟皆有陽搏故病陰虛者單以臟氣受傷血因之而失守也病陽搏者兼以火居陰分血得熱而妄行也凡治此之法宜審臟氣宜察陰陽無火者求其臟而培之補之有火者察其經而清之養之此不易之良法也然有火者不得不清但元氣既虛極多假熱設或不明眞假而誤用寒凉必復傷脾胃生氣日見殆矣先賢有云凡下血證須用四君子輩以收功又云若大吐血後毋以脉診當急用獨參湯救之厥旨深矣故凡見血脫等證必當用甘藥先補脾胃以益發生之氣蓋甘能生血甘能養營但使脾胃氣强則陽生陰長而血自歸經矣故曰脾統血

論治

治崩淋經漏之法若陰虛血熱妄行者宜保陰煎加減一陰煎若火盛迫血妄行而無虛證者宜徙薪飲黃芩散加續斷丹參若血熱兼滑者宜保陰煎槐榆散生地黃湯若肝經怒火動血者加味四物湯若肝經怒火動血逆氣未散者化肝煎或保陰煎加減主之若血有滯逆而妄行者四物湯丹參散若營氣不足血不能調而妄行者五福飲四物湯四君子湯八珍湯擇宜用之若脾氣虛陷不能收攝而脫血者壽脾煎歸脾湯四君子加芎歸再甚者舉元煎若脾腎虛寒兼嘔兼溏泄而畏寒者理陰煎五君子煎理中湯若陽氣大虛脫陷者四維散若脾腎陰氣不固者固陰煎五陰煎祕元煎若肝膽氣虛不能藏血者必多驚恐畏怯宜五福飲七福飲八珍湯兼陽虛者仍加薑桂若去血過多血脫氣竭者當速用獨參湯提握其氣以防脫絕或用當歸補血湯若崩淋既久血滑不禁宜澀宜固者龍骨散如聖散七灰散之類同人參兼用之

凡血淋治法大約如前但其穢臭脉滑者多火宜從清凉若腥臭清寒脉細者多寒必須溫補其或久病則精去無窮尾閭易竭非大加培補不可惟固陰煎及十全大補湯之類爲宜

崩淋之病有暴崩者有久崩者其來驟其治亦易久崩者其患深其治亦難且凡血因崩去勢必漸少少而不止病則爲淋此等證候未有不由憂思鬱怒先損脾胃次及衝任而然者崩淋既久眞陰日虧多致寒熱欬嗽脉見弦數或豁大等證此乃元氣虧損陰虛假熱之脉尤當用參地歸朮甘溫之屬以峻培本源庶可望生但得胃氣未敗受補可救若不能受補而日事清凉以苟延目前則終非吉兆也

崩淋病治有五臟之分然有可分者有不可分者可分者如心肺居於膈上二陽臟也肝脾腎居於膈下三陰臟也治陽者宜治其氣治陰者宜治其精此可分之謂也然五臟相移精氣相錯此又其不可分者也卽如病本於心君火受傷必移困於脾土故治脾卽所以治心也病本於肺治節失職必殘及於腎水故治腎卽所以治肺也脾爲中州之官水穀所司餉道不資必五路俱病不究其母則必非治脾良策肝爲將軍之官鬱怒是病勝則伐脾敗則自困不知强弱則攻補不無倒施不獨此也且五臟五氣無不相涉故五臟中皆有神氣皆有肺氣皆有胃氣皆有肝氣皆有腎氣而其中之或此或彼爲利爲害各有互相倚伏之妙故必悟臟氣之大本其强弱何在死生之大權其緩急何在精氣之大要其消長何在攻補之大法其先後何在斯足稱慧然之明哲若謂心以棗仁遠志肺以桔梗麥冬脾以白朮甘草肝以青皮芍藥腎以獨活元參之類是不過膚毛之見又安知性命之道也諸證皆然不止崩淋者若此

婦人於四旬外經期先斷之年多有漸見阻隔經期不至者當此之際最宜防察若果氣血和平素無他疾此固漸止而然無足慮也若素多憂鬱不調之患而見此過期阻隔便有崩決之兆若隔之淺者其崩尚輕隔之久者其崩必甚此因隔而崩者也當預服四物八珍之類以調之否則恐其鬱久而決則爲患

滋大也

若其既崩之後則當辨其有火無火有火者因火逼血宜保陰煎主之無火者因陽而決或其有滯當去其故而養其新宜調經飲先以理之然後各因其宜可養則養用小營煎可固則固用固陰煎之類主之

石室秘錄 臣陳士鐸著

血崩治法

血崩之後口舌燥裂不能飲食者死蓋亡血自然無血以生精精涸則津亦涸必然之勢也欲使口舌之乾者重潤必須使精血之竭者重生補精之方六味丸最妙然而六味丸單補腎中之精而不能上補口舌之津也雖補腎於下亦能通津於上然終覺淺不濟急今定一方上下兼補名上下相資湯熟地麥冬各一兩山茱萸牛膝沙參當歸蔴黃各五錢人參三元參各三錢北五味二錢車前子一錢水煎服此方補腎爲君而兼用補肺之藥千母相資上下兼潤精生而液亦生血生而津亦生矣安在垂死之證不可慶再生耶

血崩不止一時昏運或有不知人而死者此病多起於貪慾若治之不得法日用止澀之藥未有不輕變重而重變死者方用安崩湯治之人參黃芪白朮各一兩三七根末三錢水煎調三七根末服之一劑即止崩可返危爲安也蓋崩血之後惟氣獨存不補氣而單補血緩不濟事今氷固其欲絕之氣佐之三七以澀其血氣固而血自不脫也

方一

小牛角鰓散 千金方 下同

治帶下五崩一曰熱病下血二曰寒熱下血三曰經脉未斷爲房事則血漏四曰經來棄重傷任脉下血五曰產後臟開經利五實之病外實內虛

牛角鰓一枚燒令赤　鹿茸　禹餘糧　當歸　乾薑　續斷各二兩　阿膠三兩　赤小豆二升　鮫鰧骨　龍骨各一兩

右十味治下篩空腹以酒服方寸匕日三一方無

鹿茸鮫鰧骨　雲母芎藭散

治五崩身瘦欬逆煩滿少氣心下痛面生瘡腰痛不可俛仰陰中腫如有瘡狀毛中癢時痛與子臟相通小便不利常拘急頭眩頸項急痛手足熱氣逆衝急心煩不得臥腹中急痛食不下吞酸噫苦上下腸鳴漏下赤白青黃黑汁大臭如膠汚衣狀皆是內傷所致中寒即下白中熱即下赤多飲即下黑多食即下黃多藥即下青或喜或怒心中常恐或憂勞便發動大惡風寒

雲母　芎藭　代赭　東門邊木燒各一兩　白殭蠶　鮫鰧骨　白堊　蝟皮各六銖　鼈甲

桂心　伏龍肝　生鯉魚頭各十八銖

右十二味治下篩酒服方寸匕日三夜一一方有龍骨乾薑一方有龜甲無鼈甲

禹餘糧圓

治崩中赤白不絕困篤

禹餘糧五兩　白馬蹄十兩　龍骨三兩　鹿茸二兩　鮫鰧魚骨一兩

右五味爲末蜜丸梧子大以酒服二十丸日再以知爲度

慎火草散

治崩中漏下赤白青黑腐臭不可近令人面黑無顏色皮骨相連月經失度往來無常小腹弦急或苦絞痛上至心兩脅腫脹食不生肌膚令人偏枯氣息乏少腰脊痛連脅不能久立每嗜臥困懶

慎火草　白石脂　禹餘糧　鼈甲　乾薑

細辛　當歸　川芎藭　金釵石斛　白芍藥

牡蠣燒各二兩　熟艾　桂心各一兩　黃連　薔薇根皮　熟地各四兩

右十六味治下篩空腹酒服方寸匕日三稍加至二匕

若寒多者加附子椒各一兩

若熱多者加知母黃芩各一兩

若白多者加乾薑白石脂各二兩

若赤多者加桂心代赭各二兩

增損禹餘糧圓

治女人勞損因成崩中狀如月經來去多不可禁止積日不斷五臟空虛失色黃瘦崩竭暫止少日復發不耐動搖小勞輒劇治法且宜與湯未宜與此丸也發時服湯減退即與此丸若是疾久可以長與此圓

禹餘糧　龍骨　人參　桂心　紫石英　烏頭　桑寄生　杜仲　五味子　遠志各二兩　澤瀉　當歸　石斛　菟絲　乾薑各三兩　牡蠣鰕

甘草　蜀椒各一兩
右爲末蜜丸梧子大空心酒下十丸漸加至二十丸日三服

又方

治女人白崩及痔漏
槐耳　白薇　艾葉　蒲黃　白芷各二兩
黃芪　人參　續斷　當歸　禹餘糧　乾地黃
橘皮　茯苓　蝟皮各三兩　牛角鰓四兩
豬後懸蹄二十個　白馬蹄四兩酒浸一宿熬
右十七味爲末蜜丸每日空心酒下二十九日二加之

又方

治女人忽暴崩中去血不斷或如鵝鴨肝
小薊根六兩　當歸　阿膠　續斷　青竹茹
芎藭各三兩　生地黃八兩　釜月下土絹裹裹
地榆各四兩　馬通一升
右十味咬咀以水八升和馬通汁煮取三升分三服不止頻服三四劑未全止續服後丸
如赤帶用赤馬通
如白帶用白馬通

丸方

服前藥未全止即服此丸
乾地黃一兩半　續斷　甘草　地榆　鹿茸
小薊根　丹參各三十銖　芎藭　阿膠炒珠
當歸　赤石脂各一兩半　柏子仁一兩　龜甲
奉牛角鰓各三兩剉熬令黑
右爲末蜜丸梧子大空心以酒服十丸日再服增加至二十九

又方

治女人崩中去赤白
白馬蹄五兩　蒲黃　鹿茸　禹餘糧　小薊根
白馬莶毛　白芷　續斷各四兩　人參　黃芪
地黃　柏子仁　鮫鯽骨　茯苓　當歸各三兩
艾葉　茯蓉　伏龍肝各一兩
右十八味爲末蜜丸如梧子大空心飲服二十丸日再加至四十九

當歸湯

治崩中去血虛羸
當歸　芎藭　黃芩　芍藥　甘草各二兩
生竹茹二升
右咬咀以水一斗煮竹茹取六升去滓內諸藥煎取三升半分三服忌勞動嗔怒禁百日房事

又方

治崩中下血極多或月經來過多及過期不來
吳茱萸　當歸各三兩　芎藭　人參　芍藥
牡丹　桂心　阿膠　生薑　甘草各一兩
半夏八兩　麥門冬一升
右咬咀以水一斗煮取三升分爲三服

又方

治女人白崩
芎藭　桂心　阿膠　赤石脂　小薊根各二兩
乾地黃四兩　伏龍肝如雞子大七枚
右咬咀以酒六升水四升合煮取三升去滓內膠令烊盡分三服日三一方無伏龍肝

伏龍肝散

治崩中去赤白或如豆汁
伏龍肝如鴈子七枚　生薑五兩　生地四升
甘草　艾葉　赤石脂　桂心各二兩
右七味咬咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一一方生地黃五兩

大牛角中仁散

治積冷崩中去血不止腰背痛四肢沉重虛極
牛角仁一枚燒　續斷　乾地黃　桑耳　白朮
赤石脂　礬石　乾薑　附子炮去皮臍　龍骨
當歸各三兩　蒲黃　防風　禹餘糧各二兩
人參一兩
右十五味治下篩以溫酒未食服方寸匕日三不知稍加

又方

治崩中去血積時不止大有起死之力
肥羊肉二斤　乾薑　當歸各三兩　生地二升
右咬咀以水二斗煮羊肉取一斗三升下地黃汁及諸藥煮取三升分四服卽斷尤宜羸瘦人服之

生地黃湯

治崩中漏下日去數升
生地黃一斤　細辛三兩
右二味咬咀以水一斗煮取六升服七合久服佳

又方

治崩中下血羸瘦少氣胸中補虛止血
澤蘭　蜀椒各二兩六銖　藥木　柏子仁
山茱萸　厚朴各十八銖　蕪荑半兩　乾地黃

牡蠣各一兩半　代赭　桂心　防風　細辛　乾薑各一兩　甘草　當歸　芎藭各一兩十八銖　右十七味治下篩空心溫酒服方寸匕日三一方　加白芷龍骨各十八銖人參一兩十八銖爲二十味　丹參酒　治崩中去血及產餘疾　丹參　艾葉　地黃　忍冬　地榆各九斤　右剉熬春以水漬三宿出滓煮取汁以黍米一斛炊飯釀酒酒熟榨之初服四合後稍稍添之　牡丹皮湯　治崩中血盛　牡丹皮　乾地黃　斛脉各三兩　禹餘糧　艾葉　柏葉　龍骨　厚朴　白芷　伏龍肝　青竹茹　芎藭　地榆各二兩　阿膠一兩　芍藥四兩　右㕮咀以水一十五升煮取五升分五服相去如人行十里久再服　白堊圓　治女人三十六疾胞中病漏下不絕　禹餘糧　白芷　白石脂　乾薑　鰕鯉骨各十八銖　右爲末蜜丸梧子大空心酒服五丸日再服不知加至十九　又方　治女人漏下或瘥或劇常漏不止身體瘦飲食減少或赤或白或黃使人無子　牡蠣　伏龍肝　赤石脂　白龍骨　桂心　鰕鯉骨　禹餘糧各等分　右治下篩空心酒服方寸匕日二服一方無白龍骨以粥飲服　如白帶者加牡蠣龍骨鰕鯉骨　如赤多者加赤石脂禹餘糧　如黃多者加伏龍肝桂心　又方　治婦人漏下不止　鹿茸　阿膠各三兩　鰕鯉骨　當歸各二兩　蒲黃一兩　右治下篩空心酒服方寸匕日三夜再　芎藭湯　治帶下漏血不止　川芎　乾地黃　黃芪炙　白芍藥　吳茱萸　甘草各二兩　當歸　乾薑各三兩　右㕮咀以水一斗煮取三升分三服　若月經後因有赤白不止者除地黃吳茱萸加杜仲人參各二兩　又方　治漏下去黑　乾漆　麻黃　細辛　桂心各一兩　甘草半兩　右治下篩以指撮菩米飲中服之　又方　治漏下去黃　黃連　大黃　桂心各半兩　黃芩　乾地黃　廯蟲各六銖　右治下篩空心酒服方寸匕日三　又方　治漏下去赤　白朮二兩　白薇半兩　黃蘗二兩半　右治下篩空心酒服方寸匕日三　又方　治漏下去青　大黃　黃芩　白薇各半兩　桂心　牡蠣各六銖　右治下篩空心酒服方寸匕日三　又方　治漏下去白　鹿茸一兩　白薇十八銖　狗脊半兩　右爲末空心米飲服方寸匕日三　馬通湯　治漏下血積月不止　赤馬通汁一升取新馬屎絞取乾者水浸絞取生艾葉　阿膠各二兩　當歸　乾薑各二兩　好墨半兩　右㕮咀以水八升酒二升煮取三升去滓內馬通汁及膠微火煎取二升分再服相去如人行十里久　馬蹄屑湯　治白漏不絕　白馬蹄　赤石脂各五兩　禹餘糧　鰕鯉骨

龍骨　牡蠣各四兩　白殭蠶一兩　附子
乾地黃　當歸各三錢　甘草二兩
右㕮咀以水二斗煮取九升分六服日三

馬蹄圓

治白濁不絕
白馬蹄　禹餘糧各四兩　龍骨三兩　鮫鯽骨
白殭蠶　赤石脂各二兩
右爲末蜜丸梧子大酒服十丸不知加至三十丸

愼火草散

治女人漏下
愼火草十兩熬黃　當歸　鹿茸　阿膠各四兩
龍骨半兩
右爲末先食用酒服方寸匕日三

蒲黃散

治漏下不止
蒲黃半升　鹿茸　當歸各二兩
右治下篩酒服五分匕日三不知稍加至方寸匕

獨聖散（婦人良方下同）

治肝經有風血崩

防風去蘆

右爲末每服二錢空心食前酒煮白麪清飲調下更以麪作糊酒投之極驗

四君子湯

氣血俱虛之證用此加減
人參　白朮　茯苓各一錢　甘草炙一錢
右薑棗水煎服

六君子湯

治同上
人參　白朮　茯苓各二錢　甘草炙八分
陳皮　半夏各一錢
右薑棗水煎服

八珍湯

治氣血俱虛
人參　白朮　茯苓各二錢　甘草炙　芍藥炒
川芎　當歸酒拌各一錢　熟地三錢自製
右水煎服

加味逍遙散

治婦人肝脾虛血崩用此加減
甘草炙　當歸炒　白芍藥酒炒　白朮土炒
茯苓各一錢　柴胡　丹皮　山梔炒各五分
右水煎服

歸脾湯

治脾經失血少寐發熱盜汗或思慮傷脾不能攝血以致妄行或憂思傷脾血虛發熱或肢體作痛大便不調或經候不准晡熱內熱
人參　白朮炒　黃芪炒　白茯苓　酸棗仁炒
龍眼肉　當歸身　遠志各一錢　甘草炙
木香各五分
右薑棗水煎服

小柴胡湯

治肝膽經證寒熱往來潮熱晡熱身熱默默不欲飲食或怒火口苦耳聾欬嗽發熱脅下作痛甚者轉側不便兩脅痞悶或瀉痢欬嗽或吐酸食苦水皆用此藥主之
柴胡二錢　黃芩炒一錢　人參　半夏各七分
甘草炙五分
右薑水煎服

附子理中湯

治陽氣大虛血崩諸證
人參　白朮土炒　乾薑炮　甘草炙各等分
附子炮隨宜
右每服五七錢或一兩水煎服

補中益氣湯

治元氣虛損或因剋伐惡寒發熱倦怠少食或不能消散生肌或傷飲食勞倦煩熱作渴
黃芪炒　人參　白朮炒　炙草　當歸各一錢
陳皮五分　柴胡　升麻各三分
右薑棗水煎空心午前服

十全大補湯

治氣血大虛
人參　白朮　茯苓各一錢　甘草炙　芍藥炒
川芎　當歸各一錢　熟地三錢　黃芪炙
肉桂各隨宜
右煎服

八味丸

治命門火衰不能生土致成崩中
熟地黃自製八兩　山茱萸肉　山藥各四兩
茯苓　牡丹皮　澤瀉各三兩　大附子童便製
肉桂用三分厚者
右爲末蜜丸梧子大每服七八十九滾湯下

獨參湯

治元氣虛弱惡寒發熱等證
人參二兩或三四兩　炮薑五錢
右作一劑水煎徐徐服蓋人參性滯故薑佐之
如不應急加炮附子

黃芪當歸人參湯（東垣下同）

治經水暴崩不止掌中寒脈沉細而緩間而沉數九竅有不利四肢無力上喘氣短促口鼻氣皆不調皆由平日心氣不足飲食不節得之
黃連一分　生地黃三分　炒神麯　橘皮
桂枝各五分　草豆蔻仁六分　麻黃不去節
黃芪炒　人參各一錢　杏仁五箇另研如泥
當歸身一錢五分
右㕮咀作二服水二大盞半煎麻黃令沸去沫煎至二盞入諸藥同煎至一盞於巳午之間食消盡服之一服立止

龍腦雞蘇丸

治血帶五淋血崩等疾
薄荷一斤　麥門冬去心一兩　甘草一兩半
生乾地黃六兩　黃芪　新蒲黃　阿膠炒
黃連　人參　木通各一兩　柴胡二兩同木通沸湯浸一日夜絞取汁
右爲細末好蜜二斤先煉一二沸然後下生地黃末不住手攪時加木通柴胡汁浸熬成膏勿令火緊焦了然後將衆藥末和丸如豌豆大每服二十丸白湯下一方以車前子湯下更妙

黃芪膏子煎丸

治同上
人參　白朮各一兩半　柴胡　黃芩各一兩
白芷　知母　甘草炙各半兩　鼈甲一箇半手大者酥炙
右爲細末用黃芪膏子丸桐子大每服三五十丸百沸湯下空心服

黃芪膏熬法

黃芪半斤
右爲粗末水二斗熬一斗去滓再熬令不住攪成膏至半斤入白蜜一兩餙一兩再熬令蜜餙熟得膏十兩放冷丸藥

易簡芎歸湯

一名古芎歸湯治崩中去血
芎藭　當歸各等分
右㕮咀水煎熱服
若崩中漏下失血不止加香附子炒每兩入甘草一錢沸湯點服
若有白帶者加芍藥半兩乾薑等分米飲調下

凉膈散

治血熱暴崩
連翹四兩　大黃　甘草　黃芩　薄荷　朴硝
山梔各一兩
右粗末每服三五錢水一盞入蜜竹葉煎三五沸去滓温服無時

黃連解毒湯

治同上
黃連　黃檗　黃芩　大梔子各等分
右剉爲麻豆大每服五錢水二盞煎至八分去滓温服
酢附丸

治崩漏帶下積聚癥瘕腸腹疼痛
香附子不拘多少擦去毛用好酢煮出焙乾
右酢煮糊爲丸如桐子大每服三十丸米飲送下
一方用香附子白芷爲丸

芎歸膠艾湯

一名膠艾四物湯治婦人陷經漏下
川芎　阿膠　甘草各二兩　芍藥四兩　艾葉
當歸各三兩　熟地隨宜
右七味以水五升清酒三升合煮取三升去滓內膠令消盡温服一升日三服不差更作一方加乾薑一兩

百子附歸丸（入門下同）

養血順氣調經安胎崩漏日久不止胎前產後及月事參差有餘不足諸證悉治
四製香附十二兩　阿膠　艾葉　四物湯各二兩
右爲末用石榴陳久者一枚連皮搗碎煎水打糊丸梧子大每百丸空心淡酢湯下

四製香附丸

治悲哀成崩
香附一斤分四分用酒酢鹽水童便各浸七日焙乾
右爲末酢糊丸梧子大每七十丸空心温酒下

墨附丸

治血虛崩久不止
四製香附一斤　白茯苓　當歸　人參　川芎
熟地　徽墨火煅紅酢焠各一兩　木香五錢

淨縣艾四兩用醋一碗煮香附與艾二味至乾石臼搗爛捏成餅子新瓦焙乾

右爲末醋糊丸梧子大每七八十丸酒下

內炙散

治血崩虛憊腹脅疼痛氣逆嘔吐冷氣凝積塊硬刺痛等證

藿香葉　丁香皮　茴香　肉桂　熟地各兩半

甘草　當歸　白朮　山藥　白芷各八兩

陳皮四兩　藁本　乾薑　川芎　黃芪　白芍

木香各一兩

右爲末溫酒調服三錢或薑艾煎服亦可

補陰丸

治虛火血崩

熟地五兩　黃藥　知母　龜板各三兩　瑣陽

天門冬　枸杞子　白芍各二兩　五味子一兩

炒黑乾薑三錢寒月加五錢

右爲末豬脊髓和蜜丸梧子大每七八十丸空心鹽湯下寒月溫酒下一方以肉桂易黑薑引諸藥入腎爲從治法也

大烏雞丸

治血崩久虛不能成胎

四製香附一兩　熟地四兩　生地　當歸

白芍　人參各三兩　川芎　鼈甲各三兩半

白朮　黃芪　牛膝　柴胡　牡丹皮　知母

貝母各二兩　茯苓二兩半　秦艽一兩半

川黃連　地骨皮　乾薑　延胡索各一兩

白毛烏骨雄雞一隻閉死去毛腸淨用艾葉青蒿各四兩裝一半在雞腹內將雞并餘艾蒿同入罐內以童便和水浸過雞二寸許煮爛取出去骨焙乾

右爲末和勻雞汁打糊丸梧子大每五六十丸溫酒或米飲下忌煎炒葷菜

如有筋骨疼痛去肉用骨

如月水後期加參朮黃芪

如白帶加二朮香附升麻白芷柴胡

其雞如得白絲毛烏骨崇冠者尤妙須另於一處以黃芪炒末爲丸喂之不可近雌雞

小烏雞丸

治同上

吳萸　艮薑　白薑　當歸　芍藥　延胡索

破故紙　川椒　陳皮　青皮　劉寄奴　生地

莪朮　川芎各一兩　荷葉灰四兩　北艾二兩

烏雞肉

右爲末用烏雞肉煮爛爲丸梧子大豆淋酒調綿灰下五十丸

如腹痛血黑色者加炒黃連

如有痰濕加南星蒼朮香附

如赤帶茶清下

如腸風陳米飲調百草霜下

如心痛菖蒲酒下

如漏胎下血烏梅酒下

如耳聾臘茶清下

如腰脚痛當歸酒下

如頭風薄荷煎湯下

如血風眼黑甘草煎湯下

如生瘡生地黃煎湯下

如身體疼痛黃芪末調酒下

如氣塊血塊作痛與葱白湯調服

如胎前產後白痢乾薑煎湯下赤痢甘草煎湯下

一切百病醋湯下

芩心丸

治脾濕下流於腎與相火合爲濕熱迫經下漏紫黑腐臭

條芩二兩用醋浸七日炙乾又浸又炙如此者七次

右爲末醋糊丸梧子大每七十丸溫酒下

四物坎離丸

治同上

生地一兩半　熟地同酒浸搗膏　當歸二兩

芍藥一兩半酒炒　知母　黃藥各一兩酒浸炒

側柏葉　槐子各一兩同炒　連翹六錢

右爲末蜜丸梧子大用磁盤盛之以綿紙糊口凉地下放七日去火毒曬乾收之每三四十丸至五六十丸白湯或酒下

固經丸

治同上

黃芩　白芍　龜板各一兩　椿根皮七錢

黃藥三錢　香附二錢半

右爲末酒糊丸梧子大每五十丸酒下

升陽調經湯

治飲食勞倦暴崩不止或下水漿忿惰嗜臥四肢困倦及夏月帶下脫漏等證

獨活五分　蔓荊子七分　當歸　防風　甘草
升麻　藁本各一錢　柴胡　羌活　蒼术
黃芪各錢半
右空心水煎服以飯壓之

升陽舉經湯

治同上

肉桂　白芍　紅花各五分　細辛六分　人參
乾熟地黃　川芎各一錢　獨活　黑附子
甘草各錢半　羌活　藁本　防風各二錢
白术　當歸　黃芪　柴胡各三錢　桃仁十枚
右分作四貼空心水煎服
如夏月不用肉桂

五積散

風冷血崩加減用之

白芷　川芎　芍藥　甘草　茯苓　當歸
肉桂各三分　陳皮　麻黃各六分　厚朴
乾薑各四分　桔梗一分半　枳殼炒五分
半夏二分　蒼术七分半
右煎服

不換金正氣散

治風冷血崩

厚朴　陳皮　藿香　半夏　蒼术各一錢
甘草五分
右薑三片棗二枚水煎溫服

升陽除濕湯

治濕盛血崩

蒼术一分　升麻　柴胡　防風　神麴　澤瀉
猪苓各五分　陳皮　甘草　麥芽各三分
右薑棗煎服

橘歸丸

治血崩不止

橘皮四兩　當歸三兩
右爲末蜜丸梧子大每五十丸溫酒下一方加延胡索

黑神散

治婦人崩漏

百草霜　白芷各等分
右爲末每二錢水煎入童便米醋少許調服

女金丹

治崩中淋瀝及赤白帶下

白芍　當歸　川芎　人參　白术　茯苓
藁本　白芷　白薇　桂心　延胡索　牡丹皮
赤石脂各一兩俱用酒浸三日夜曬乾　沒藥
甘草各五錢　香附一斤醋浸
右爲末蜜丸梧子大每五十丸溫酒下

二宜丸

血崩後調養用此加減

當歸　生地黃各等分用酒蒸七次
右和煉蜜搗丸梧子大每七十丸空心酒下

補中益氣湯

治崩漏後脾胃虛弱

羌活一錢　防風　藁本各七分　甘草五分
黃連　黃芩各三分　人參五分　黃芪七分
右煎服
平補鎮心丹

治婦人白崩

茯苓　茯神去木　五味子　車前子　肉桂
麥門冬各一兩二錢半　遠志　山藥　天門冬
熟地各一兩半　酸棗仁二錢半　龍齒二兩半
人參　朱砂各五錢
右爲末蜜丸梧子大每三十丸米飲下

白芷散

治崩中帶下

白芷一兩　海螵蛸煅二箇　胎髮燒灰一箇
右爲末每二錢酒調服一方用白芷六兩以石灰半斤淹三宿洗去灰將白芷炒焦入椒目四兩或加茜根少許爲末粥丸服治崩中白帶

寧神膏

治血崩後心神不安

乳香　辰砂水飛各五錢　酸棗仁　人參
茯苓各一兩　琥珀七錢半
右爲末燈心棗子煎湯調服一錢或蜜丸彈子大

薄荷煎湯化服一丸

滋陰寧神湯

治同前

當歸　川芎　白芍　熟地　人參　茯神
白术　遠志各一錢　酸棗仁　甘草各五分
黃連酒炒四分
右煎服

如有痰加南星一錢

大溫經湯

治崩中去血過多及月事不調

阿膠　芍藥　川芎　當歸　人參　牡丹皮
肉桂　吳茱　甘草各二分　半夏二分半
麥門冬五分

右薑煎服

烏藥湯

治陽氣內動發則心下崩數溲血

烏藥一錢半　香附二錢　當歸一錢　木香
甘草各五分

右空心水煎服

桂枝湯

古方治血崩間用此加減以固衛氣

桂枝三錢　甘草一錢　白芍三錢

右薑棗煎服

理中湯

古方治血崩間用此加減以燥水健脾

甘草一錢半　人參　白朮　乾薑各二錢

右薑棗煎服

益母膏

治漏血

益母草端午日採紫花方莖者連根洗淨
右於石臼內搗爛以布濾取濃汁入砂鍋內文武
火熬成膏如砂糖色爲度磁罐收貯每服一匙棗
湯調下一方用益母草陰乾忌鐵爲末蜜丸彈子
大每服一丸棗湯下

二聖湯　醫鑑下同

治血崩如神

何首烏切五錢　甘草三錢

右用黃酒一椀煎至八分取出入刺刺芽汁一盞
同服立效

黑龍丸

專治血崩及經水過多不止者尤效

黑鹽棄燒存性

右爲末用麪糊爲丸每服七十丸空心黃酒送下

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百十六卷目錄

醫部彙考三百九十六

婦人崩漏門二

方二 斷源散 荊芥四物湯 子芩丸 當歸 龍骨丸 獨行散 白礬丸 又方 震靈丹 三灰散 全生活血湯 七灰散 加減十全大補湯 五灰散 解毒四物湯 楊氏家藏黑金散 萬靈膏藥 鹹黃散 固經丸 旋覆花湯 半夏丸 備金散 縮砂散 涼血地黃湯 當歸芍藥湯 柏子仁湯 益胃升陽湯 柴胡調經湯 調經升陽除濕湯 加減四物湯 地黃丸 小薊湯 芎藭酒 奇效四物湯 金華散 又方 立效散 牡蠣散 柏黃散 丁香膠艾湯 又方 芎藭湯 斷下湯 又方 熟附丸 神應散 鹿茸丸 赤龍丹 紫金散 白芷煖宮丸 琥珀散 荊芥散 開鬱四物湯 烏金散 又方 無比散 伏龍肝散 地榆散 鹿茸散 柏葉散 補宮丸 鎮宮丸 梅飲子 又方 十灰丸 十灰散 又方 香礬散 加聖散

單方

鍼灸

醫案

功救生丹 退腫散 氣方 分氣飲 補脾飲 塌氣丸 參苓散 除濕湯

單方

鍼灸

醫案

藝術典第四百十六卷

醫部彙考三百九十六

婦人崩漏門二

方二

斷源散 醫鑑下同

治血崩如泉流不止

棉花子銅器炒盡烟

右爲末每服二錢空心黃酒調下

荊芥四物湯

治崩漏初起不問虛實服之立止

荊芥　條芩　當歸　川芎　白芍　生地　香附

右剉水煎溫服如不止加防風升麻蒲黃炒白朮一方加地榆良驗一方加艾葉炒阿膠炒去香附

荊芥

子芩丸

治婦人四十九歲已後天癸當住每月却行或過多不止漸成崩漏

條芩四兩酢浸紙裹煨七次　當歸二兩酒洗

右爲末酢糊爲丸如梧桐子大每服五七十丸空心霹靂酒下日進三服一方加香附酢製二兩尤妙

當歸龍骨丸

治月事失常經水過多不止及帶下淋漓無問新久赤白諸證并產後惡物不止

龍骨　黃蘗各一兩　當歸　白芍　白茯苓

槐子　艾葉炒　黃連各五錢　木香二錢半

右爲末水丸梧子大每七八十丸米湯送下一方加黃芩白朮各五錢累效

獨行散

一名五靈脂散一名抽刀散治腹痛經漏不止

五靈脂半生半炒

右爲末童便下二錢

白礬丸

治久崩不止用此澀之

白礬　黃狗頭骨燒灰各四兩　香附二兩

右爲末粥丸桐子大每服三十丸空心白湯下

又方

治暴崩下血

蠶沙炒　阿膠各一兩　伏龍肝半兩

右爲末溫酒調下空心二三錢以止爲度

震靈丹

一名紫金丹治婦人氣血不足崩漏虛損帶下虛冷胎臟無子

硃砂飛一兩　滴乳香另研　五靈脂去沙石

沒藥去沙石各二兩　紫石英　禹餘糧火煅酢淬不計遍數手撚得碎爲度　代赭石炮製同上

赤石脂以上四味各四兩並作小塊小鍋內鹽泥固濟候乾用炭十斤煅通紅火盡爲度入地埋出火毒二宿

右共爲細末以糯米粉煮糊爲丸如雞頭實大曬乾出火每一丸空心酢湯下如有孕不可服

三灰散

治血崩

乾側柏略焙五錢　桐子炭再燒作灰二錢

椶櫚燒存性勿令化作白灰三錢
右爲末分作二服空心糯米飲調下

全生活血湯 東垣

治血崩太多昏冒瞑目無所知覺
白芍藥　升麻各一錢　防風　羌活　獨活
柴胡　歸身　葛根　甘草各七分　蔓荊子
細辛各三分　紅花一分　藁本　川芎各五分
生地黃　熟地黃各四分
右剉作一貼水煎服

七灰散 新書

治血崩不止
蓮蓬殼　益母草　旱蓮草　鸎粟殼　醃蟹
椶毛葉　藕節各等分燒存性
右爲末酢點湯調下三錢

加減十全大補湯

治血崩氣血虛者
十全大補去桂　炮黑乾薑　阿膠珠分兩隨宜
右煎服

五灰散 回春

治一切失血及血崩
蓮蓬殼　黃絹　亂髮　百草霜　椶櫚皮各燒存
性等分　梔子炒黑　蒲黃炒　松煙墨　血竭
右共爲細末每三錢以生藕汁生蘿蔔汁調服之
或蜜丸米飲下五十丸亦可

解毒四物湯 入門

一名溫清飲治崩漏面黃腹痛
黃芩　黃連　黃蘗　梔子　生乾地黃　當歸
白芍藥　川芎各一錢
右剉作一貼水煎服此方乃黃連解毒湯與四物
湯合劑也

楊氏家藏黑金散

治婦人血氣虛損經候不調崩中漏下
鯉魚皮一兩　黃牛角鰓　椶櫚皮　破故紙
亂髮各一兩　鰞鰂魚骨　乾薑炮　熟地黃
當歸洗焙　木賊各半兩
右剉拌入磁瓶內鹽泥固濟候乾炭火五斤煅通
赤煙盡埋土內令冷取研細每三錢入麝香少許
米飲空心調下

萬靈膏藥 醫貫

治元氣虛弱女人赤白帶下子宮虛冷血山崩等
證貼丹田熨一百二十手
香油四斤　白芷　赤芍　大黃　黃連　白芍
兩頭尖　草烏　元參　川芎　生地　川椒
胎髮頭生男者　穿山甲　熟地　杏仁　槐角
黃蘗去粗皮各一兩　木鼈子五十箇去殼
歸尾二兩　黃香十二兩化開傾米泔內九次
黃丹二斤飛過焙乾　蓖麻子一百二十粒去殼
巴豆一百二十箇去殼
右各咀片入油內浸春五日夏三日秋七日冬十
日取傾鍋內熬枯黑色濾去查將淨油入鍋文武
火熬滴水成珠方細退火徐徐下黃丹以槐柳桃
杏楮各二枝不住手攪再下黃香去火少冷又下
細藥攪勻將好瓶貯之放水內浸一七出火氣用
時放滾水內頓化攤開細藥列後
珍珠五錢　阿魏　丁香　沉香各一兩　麝香
血竭　兒茶　乳香　沒藥各三兩　琥珀三錢
右各爲末入前膏內

繭黃散

治婦人血崩
繭黃　蠶蛻紙並燒存性　晚蠶沙　白殭蠶並炒
各等分　麝香少許
右爲末每服二錢用米飲送下日三服甚效

固經丸 準繩

治陰崩不止
艾葉酢炒　鹿角霜　伏龍肝　乾薑各等分
右爲末鎔鹿角膠和藥乘熱丸食後淡酢湯下五
十丸

旋覆花湯 仲景

治半產漏下脉弦而大
旋覆花三兩　葱十四莖　新絳少許
右三味以水三升煑取一升頓服之

半夏丸 直指方

治下血吐血崩中帶下痰喘急滿虛腫亦消宿瘀
百病
圓白半夏刮淨搥匾薑汁調飛白麪作餅包炙黃色
去麪取半夏
右作末米糊爲丸菉豆大每服十丸溫熱水下又
云芎歸湯沉香降氣湯各半煎送下止血之要藥

備金散 準繩下同

治婦人血崩不止
香附四兩炒　當歸尾一兩二錢　五靈脂一兩炒

在正西偏南庚　在正東偏南乙　青色衣東南首　東南方青衣師看産

二十一歲行年在壬子坤三九月離巽寅申日　在正西偏北辛　在正東偏北甲　黃色衣西南首　西南方黃衣師看産

二十二歲行年在辛亥離四十月坤兌丑未日　在正北偏西壬　在正北偏東癸　赤色衣正南首　正南方赤衣師看産

二十三歲行年在庚戌坎五十一月乾艮子午日　在正北偏東癸　在正北偏西壬　黑色衣正北首　正北方黑衣師看産

二十四歲行年在己酉震六十二月艮乾巳亥日　在正東偏北甲　在正西偏北辛　青色衣正東首　正東方青衣師看産

二十五歲行年在戊申艮正七月震坎辰戌日　在正東偏南乙　在正西偏南庚　黃色衣東北首　東北方黃衣師看産

二十六歲行年在丁未乾二八月坎震卯酉日　在正南偏東丙　在正南偏西丁　白色衣西北首　西北方白衣師看産

二十七歲行年在丙午兌一九月巽離寅申日　在正南偏西丁　在正南偏東丙　白色衣正西首　正西方白衣師看産

二十八歲行年在乙巳巽四十月兌坤丑未日　在正西偏南庚　在正東偏北乙　青色衣東南首　東南方青衣師看産

二十九歲行年在甲辰坤五十一月離巽子午日

在正西偏北辛　在正東偏南甲　黃色衣西南首　西南方黃衣師看産

二十歲行年在癸卯離六十二月坤兌巳亥日　在正北偏西壬　在正北偏東癸　赤色衣正南首　正南方赤衣師看産

三十一歲行年在壬寅坎正七月乾艮辰戌日　在正北偏東癸　在正北偏西壬　黑色衣正北首　正北方黑衣師看産

三十二歲行年在辛丑震八月艮乾卯酉日　在正東偏北甲　在正西偏北辛　青色衣正東首　正東方青衣師看産

三十三歲行年在庚子艮一九月震坎寅申日　在正東偏南乙　在正西偏南庚　黃色衣東北首　東北方黃衣師看産

三十四歲行年在己亥乾四十月坎震丑未日　在正南偏東丙　在正南偏西丁　白色衣西北首　西北方白衣師看産

三十五歲行年在戊戌兌五十一月巽離子午日　在正南偏西丁　在正南偏東丙　白色衣正西首　正西方白衣師看産

三十六歲行年在丁酉巽六十二月兌坤巳亥日　在正西偏南庚　在正東偏南乙　青色衣東南首　東南方青衣師看産

三十七歲行年在丙申坤正七月離巽辰戌日　在正西偏北辛　在正東偏東甲　黃色衣西南首　西南方黃衣師看産

三十八歲行年在乙未離八月坤兌卯酉日

在正北偏西壬　在正北偏東癸　赤色衣正南首　正南方赤衣師看産

三十九歲行年在甲午坎一九月乾艮寅丑日　在西北偏東癸　在正北偏西壬　黑色衣正北首　正北方黑衣師看産

四十歲行年在癸巳震四十月艮乾辰戌日　在正東偏北甲　在正西偏北辛　青色衣正東首　正東方青衣師看産

四十一歲行年在壬辰艮二九月震坎丑未日　在正東偏南乙　在正西偏南庚　黃色衣東北首　東北方黃衣師看産

四十二歲行年在辛卯乾六十二月坎震子午日　在正南偏東丙　在正南偏西丁　白色衣西北首　西北方白衣師看産

四十三歲行年在庚寅兌正七月巽離巳亥日　在正南偏西丁　在正南偏東丙　白色衣正西首　正西方白衣師看産

四十四歲行年在己丑巽八月兌坤卯酉日　在正西偏南庚　在正東偏南乙　青色衣東南首　東南方青衣師看産

四十五歲行年在戊子坤三九月離巽寅申日　在正西偏北辛　在正東偏北甲　黃色衣西南首　西南方黃衣師看産

四十六歲行年在丁亥離四十月坤兌辰戌日　在正北偏西壬　在正北偏東癸　赤色衣正南首　正南方赤衣師看産

四十七歲行年在丙戌坎正十一月乾艮丑未日

陰令人下血當補其陰脈數疾小者順大者逆

小薊莖葉研取汁　生地黃研取汁各一盞

白朮半兩剉

右三件入水一盞煎減一半去滓溫服

芎藭酒

治崩中晝夜不止醫者不能治

芎藭一兩　生地黃汁一盞

右用酒五盞煮芎藭一盞去滓下地黃汁再煎二三沸分爲三服

奇效四物湯

治有熱久患血崩

全當歸　白芍藥　川芎　熟地黃洗焙　艾葉

阿膠蛤粉炒珠　黃芩去黑者各半兩

右剉碎每服四錢水一盞半生薑五片煎七分空心溫服

金華散

治血室有熱崩下不止服溫藥不效者

延胡索　瞿麥穗　當歸　乾薑　丹皮各一兩

石膏二兩　桂心　威靈仙各七錢半　蒲黃半兩

右爲細末每服三錢水一盞半空心溫服日二

又方

治崩中下血不止小腹痛

芎藥一兩炒黃　柏葉六兩微炒

右用水一升煮取六合入酒五合煎取七合空心分爲二服一方爲細末酒調二錢一方有鹿角膠等分酒調治白帶臍腹痛

立效散東垣

治血崩

當歸　蓮花蘂　白緜子　紅花各一兩

右剉紙包鹽泥固濟火煅有性爲末入麝香少許每二錢溫酒調下空心

牡蠣散準繩下同

治月水不止衆藥不愈者

牡蠣火煅研細用酢調成丸再煅過通紅候冷研細出火毒

右用酢調艾末熬成膏和丸如梧子大每服五十丸酢艾湯下

柏黃散

療經血不止

黃芩一兩二錢半　側柏葉　蒲黃各一兩

伏龍肝二兩

右㕮咀水二升煮取八合分爲二服

丁香膠艾湯

治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲食不節所得經脉少時其脉兩尺俱弦緊而洪按之無力其證自覺臍下如冰求厚衣被以禦其寒白帶白滑之物雖多間下如屋漏水下時有鮮血不多右尺脉時微洪屋漏水多暴下者是急弦脉爲寒多而洪脉時見乃熱少合而言之急弦者北方寒水多也洪脉時出者命門包絡之火也黑物多赤物少合成屋漏水之狀也

川芎　丁香各四分　熟地黃　白芍藥各三分

阿膠炒六分　當歸身一錢二分　生艾葉一錢

右爲細末作一服水二盞煎至五沸去滓入膠艾再上火煎至一大盞空心宿食消盡帶熱服三服效

又方

治血崩

熟艾如雞子大　阿膠半兩　乾薑一錢

右爲粗末用水五盞先煎艾葉薑至二盞半入膠消溫分二服空心服

芎藭湯

一名芎藭溫中湯治帶下漏血不止及風虛冷熱勞損衝任月水不調崩中暴下腰重裏急淋漓不斷及產後失血過多虛羸腹痛或妊娠胎動不安下血連日小便頻數肢體煩倦頭運目暗不欲飲食

芎藭　黃芪炙　白芍藥　乾地黃　吳茱萸

甘草各二兩　當歸　乾薑各一兩

右㕮咀以水一斗煑取三升分三服若月經後因有赤白不止者除地黃茱萸加杜仲人參各二兩

斷下湯

治衝任氣虛崩中漏下經脉不調每遇月候將來臍腹腰脚先痛漸減飲食四肢乏力及帶下三十六疾悉能療之

人參去蘆　熟地黃洗焙　艾葉酢炒各一兩

鰞鯽骨燒灰　當歸酒洗各二兩　乾薑炮半兩

川芎七錢　阿膠蛤粉炒成珠七錢半

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至七分去查食前溫服

又方

治崩漏
四物湯一兩　人參二錢　吳茱萸一錢
右剉碎每服半兩薑棗煎服食前五六服寒熱腹痛皆退崩漏未止續服後熟附丸

熟附丸
治崩漏
熟附子　木賊　龍骨煅　赤石脂煅各半兩
川芎　當歸各一兩
右爲細末醋糊爲丸如梧子大每服五六十丸食前米飲下

神應散
治血崩不止
桂心不拘多少炒極焦存性
右爲末每服一二錢米飲調下

鹿茸丸
治經後過多其色瘀黑甚者崩下吸吸少氣臍腹冷極則汗出如雨尺脈微小由衝任虛寒爲風冷客乘胞中氣不能固史宜灸關元穴
鹿茸去毛酥炙　赤石脂製　禹餘糧製各一兩
艾葉　柏葉　附子炮各半兩　熟地黃　當歸
續斷各二兩
右爲細末酒糊和丸梧子大每服三十丸空心溫酒下一方煉蜜丸亦可一方無艾葉

赤龍丹
治崩中不止
禹餘糧炒　鰕鯽骨　鹿茸　龍骨　石燕煅
阿膠　當歸　乾薑各等分
右爲末酒糊和丸每服五十丸溫酒下

紫金散
治月水過多崩漏帶下淋瀝不斷腰腹重痛一切五色帶疾
禹餘糧煅赤醋淬七次細研水飛把乾秤二兩
白芍藥　川芎　熟地　附子　當歸　赤石脂
龍骨並煅各一兩別研　乾薑炮　肉桂各半兩
右爲細末每服二錢入麝香少許米飲空心調下

白芷煖宮丸
煖血海實衝任治子宮虛弱風寒客滯斷緒不成孕有及數墮胎或帶下赤白漏下五色虛弦少氣臍腹滿痛心下煩悸自汗下血過多
禹餘糧製一兩　乾薑炮　芍藥　川椒製
白芷　阿膠蛤粉炒　艾葉製　川芎各七錢半
右爲細末蜜和丸梧子大每服四十丸米飲溫酒醋湯任下

琥珀散
一名烏紗帽散治暴崩不止
烏紗帽燒灰存性　赤芍藥　香附子　枯荷葉
男子髮皂莢水洗　當歸　棬櫚燒焦存性各等分
右除棬櫚外其餘並用粗片新瓦上煅成黑灰存性共爲細末每服五錢空心童便調下如人行十里再一服七八服即止若產後血去多加米醋京墨麝香少許

荊芥散
治婦人崩中不止
好麻油點燈多著燈心就上燒荊芥焦色
右爲細末每服三錢童便調下

開鬱四物湯
治崩漏多因心氣所使而下故貴奪勢先富後貧皆是也
香附米炒　當歸身　白芍藥酒炒　熟地黃
白术各一錢　川芎　黃芪　蒲黃炒　地榆
人參各五錢　升麻三分
右剉作一貼煎服

烏金散
治血崩不止
棕櫚燒存性一兩　龍骨煅過二錢
右爲細末研勻每三錢空心好酒調服二服立止

又方
治患崩中不止結作血片如雞肝色碎爛
芍藥十二分　阿膠　青竹茹各八分　續斷
地榆　小薊根各三分　當歸六分　生地黃
伏龍肝各十一分
右用水九盞煮取三盞去查分三服

無比散
治婦人血崩
蠶砂一兩炒　伏龍肝半兩
右同爲末溫酒調空心服二三錢以止爲度

一方有阿膠一兩

伏龍肝散
治氣血勞傷衝任脈虛經云非時忽然崩下或如豆汁或成血片或五色相雜或赤白相兼臍腹冷痛經久不止令人黃瘦口乾飲食減少四肢無力

虛煩驚悸

伏龍肝　赤石脂各一兩　芎藭三兩　甘草

肉桂各半兩　熟地　艾葉微炒各二兩　當歸

乾薑各七錢半　麥門冬去心一兩半

右爲粗末每服四錢㕮一枚水煎服

地榆散

治婦人崩中漏下不止

地榆剉　蒲黃　白芍藥　白茯苓　柏葉微炒

蟹爪微炒　熟地黃　鹿角膠搗碎炒令黃燥

漏蘆各一兩　芎藭　當歸剉炒各七錢半

伏龍肝一兩半　乾薑炮　桂心　甘草剉炙赤各半兩

右剉碎每服三錢水一中盞入竹茹一分煎至七分去查食前溫服以上五方俱用伏龍肝蓋燥可去濕也但前三方去濕熱後二方去寒濕

按龍肝爲去濕止血之聖藥先賢治崩用旋覆花半夏治膈間濕痰而崩止者亦此意

鹿茸散

治崩中漏下不止虛損羸瘦

鹿茸二兩去毛塗酥炙微黃　白龍骨　熟地黃

鼈甲酥炙令黃去裙　鮸鯽魚骨炙黃　白芍藥

白石脂　續斷各一兩　肉蓯蓉一兩半酒浸一宿刮去皺皮炙乾

右爲細末每服二錢食前粥飲調下

柏葉散

治婦人崩中漏下不問年月遠近漸至黃瘦四肢無力腹內疼痛不思飲食

柏葉　續斷　川芎　生地黃　當歸　龜甲

鼈甲各一兩半　禹餘糧二兩半　阿膠　牡蠣

地榆　赤石脂　艾葉　鹿茸各一兩

右爲細末每服二錢食前粥飲調下一方有丹參加鹿茸煉蜜和丸如梧子大每服三四十丸空心用溫酒送下或酢湯亦可

補宮丸

治婦人諸虛不足久不雌娠骨熱形瘦崩中帶下

白薇　牡蠣　白芍藥　鹿角霜　山藥　茯苓

白朮　鮸鯽魚骨　白芷各等分

右爲細末麪糊和丸如梧子大每服五十丸空心用米飲送下

鎮宮丸

治婦人崩漏不止或下五色或赤白不定或如豆汁或狀如豚肝或下瘀血腰腹脹痛頭運眼花久而不止令人黃瘦口乾胃煩不食

代赭石火煅醋淬　紫石英　禹餘糧製並同上

香附醋煮各二兩　陽起石火煅細研　蒲黃炒

鹿茸燎去毛酥炙焙　阿膠剉碎蛤粉炒成珠

茯神　當歸酒浸　芎藭各一兩　血竭半兩研

右爲細末用艾煎醋汁麥糯米粉糊丸如梧子大每服七十丸空心米飲下

梅飲子

治婦人血崩

鹽白梅燒灰存性

右爲末空心米飲調下

又方

治崩不定淋瀝經年者

白礬鎔汁一兩　沒藥一錢　硇砂　黃丹各五分

右件將白礬鎔開成汁下餘藥細末一處攪勻就成丸如彈子大每用一丸新綿裹內陰中立效

十灰丸

治崩中下血不止

錦　黃絹　馬尾　艾葉　藕節　蓮房　油髮

赤松皮　櫰櫚　蒲黃並煅成灰存性各等分

右研勻用酢煮糯米糊和丸如梧子大每服七十丸加至一百丸空心米飲送下

十灰散

治下血不止

錦片　木賊　櫰櫚　柏葉　鯉魚鱗　鯽魚鱗

艾葉　乾漆　血餘　當歸並火煅存性各等分

麝香少許

右研勻每服二錢空心溫酒調服

又方

治血崩屢效

當歸　白芍藥　乾薑　櫰櫚各等分

右各煅存性研爲細末酢調以有節朱筋去攪四十九轉食前服

香礬散

治血崩

香附子不拘多少極酸酢浸一宿炒焦爲灰存性

右每一兩入白礬末二錢米飲調服空心神效一方用荷葉湯尤妙

如聖散

治血山崩

椶櫚　烏梅肉各一兩　乾薑一兩五錢並燒存性

右爲細末每服三錢烏梅酒調下空心食前服久患不過三服愈

單方

崩中漏下青黃赤白使人無子好墨一錢水服日二服肘後方

又方治崩中卒下血好墨磨酢服之本草

又方百草霜二錢狗膽汁攪勻分作二服當歸酒下經驗方

又方青礬二兩輕粉一錢爲末水丸梧子大每服三四十丸食後薑湯下本草下同

赤白漏下礬石火煉服之良

婦人血崩代赭石火煅酢淬七次爲末白湯服普濟方

又方用貫衆半兩煎酒服之立止集簡方

婦人漏下赤白不止令人黃瘦地榆三兩米酢一升煑十餘沸去滓食前稍熱服一合聖惠

婦人血崩三七研末同淡白酒調一二錢服三服可愈加五分入四物湯亦可普濟方

又方黃芩爲細末每服一錢薑霍酒下以秤錘燒赤淬酒中許學士云崩中多用止血及補血藥此方乃治陽乘於陰所謂入暑地熱經水沸溢者也本事方

又方金絲草海桐皮砂仁花椒蠶退紙舊錦灰等分爲末煑酒空心服本草

婦人漏下絕子當歸煑汁飲之本經

崩中下血晝夜不止芎藭一兩爲末清酒一大琖煎取五分徐徐進之千金

又方香附子赤芍藥等分爲末每服二錢鹽一捻水一琖煎七分溫服日二服十服見效良方

又方益智子炒碾細米飲入鹽服一錢產寶方

下血血崩或五色漏帶香附子去毛炒焦爲末極熱酒服二錢立愈昏迷甚者三錢米飲下亦可加椶灰本事方

漏血欲死雞蘇煑汁一升服之梅師方

血崩不止夏枯草爲末每服方寸匕米飲調下聖惠

又方大小薊根一升酒一斗漬五宿任飲亦可酒煎服或生搗汁溫服本草

又方大薊根絞汁服半升立瘥

又方木莓根四兩酒一椀煎七分空心溫服乾坤生意

崩中及痢下日夜數十起欲死者懸鉤根薔薇根柿根菝葜各一斛剉入釜中水淹上四五寸煑減三之一去滓取汁煎至可丸丸梧子大每溫酒下十丸日三服千金

崩中漏下用石葦爲末每服三錢溫酒服甚效

婦人血崩草血竭嫩者蒸熟以油鹽薑淹食之飲酒一二盃送下或陰乾爲末薑酒調服一二錢一服即止生於傳縫井砌間少在地上也得效方

又方石花細茶焙爲末舊漆碟燒存性各一匙以碗盛酒放鍋內煑一滾乃入藥末露一宿侵晨連藥再煑一滾溫服

崩中不止者麻根水煮服之良本草下同

崩中赤白帶下用墓頭回草一把酒水各半琖童便半碗新紅花一捻煎七分臥時溫服日近者一服久則三服愈其效如神

血崩不止白扁豆花焙乾爲末每服二錢空心炒米煑飲入鹽少許調下即效良方

又方陳年蒸餅燒存性米飲服三錢本草下同

又方以鐵器燒赤浸酒飲之即霹靂酒也

又方用湖雞腿根一兩搗碎酒二盞煎一盞服集簡方

傷中崩赤醍醐菜杵汁拌酒煎沸空心服一盞千金

崩中漏下木耳半斤炒見烟爲末每服二錢一分頭髮三分共二錢四分以應二十四氣好酒調服出汗集效方

又方桑耳炒黑爲末酒服方寸匕日三服取效千金方

血崩不止老絲瓜燒灰椶櫚燒灰等分鹽酒或鹽湯下良方

崩中下血不問年月遠近用槐米燒存性爲末每服方寸匕溫酒下產寶方

崩中不止諸藥不效用憨杏仁上黃皮燒存性爲末每服三錢空心熱酒服保壽堂方

血崩不止烏梅肉七枚燒存性研末米飲服之日二本草

崩中漏下不止者核桃燒存性研細酒服方寸匕日三千金

又方核桃肉十五枚燈上燒存性研作一服空心溫酒調下神效本草

崩中帶下椒目炒研細每溫酒服一錢（鈐九）

血崩不止不拘冷熱用蓮蓬殼荊芥穗各燒灰存性等分爲末每服二錢米飲下

又方荷葉燒研半兩蒲黃黃芩各一兩爲末每空心酒服三錢（本草）

又方孝婦一歲一箇燒存性研末酒服之（李氏方）

婦人漏血不止槐花燒存性研每服二三錢食前溫酒下（聖惠）

血崩不止槐花三兩黃芩二兩爲末每服半兩酒一盞銅秤錘一枚桑柴火燒紅淬入酒內調服忌口（乾坤秘韞）

下血血崩槐花一兩椶灰五錢鹽一錢煎減半服（摘元方）

婦人崩中晝夜不止丁香二兩酒二升煎一升分服（梅師方）

崩中赤白不問遠近取槐枝燒灰食前酒下方寸匕日三服（本草下阿）

崩中帶下訶黎勒和蠟燒烟熏之及煎湯熏洗

婦人血崩唐棣皮（即扶移也）半斤牡丹皮四兩升麻牡蠣煅各一兩每用一兩酒二鍾煎一鍾食前服（葉簡方）

又方蠶沙爲末酒服三五錢（事親）

崩中漏下常炙猪腎食之（張文仲方）

女人漏血亂髮洗淨燒研空心溫酒服一錢（婦人良方）

赤白崩中魚鰾膠三尺焙黃研末同雞子煎餅好酒食（本草）

又方舊敗蒲席燒灰酒服二錢（膳金方）

血崩不止漆器灰椶灰各一錢柏葉煎湯下（本草下月）

婦人漏下甄權曰鼈甲酢炙研末清酒服方寸匕日二

又方用乾薑鼈甲訶黎勒皮等分爲末糊丸空心下三十丸日再

又方好綿及婦人頭髮共燒存性百草霜等分爲末每服三錢溫酒下或加椶灰

又方用舊綿絮去灰土一斤新蠶絲一斤陳蓮房十箇舊炊箪一枚各燒存性各取一錢空心熱酒下日三服不過五日愈（乾坤秘韞）

又方老母猪屎燒灰酒服二錢（李楼方）

崩中漏下赤白不止氣虛竭用龜甲牡蠣各三兩爲末酒服方寸匕日三（千金下阿）

又方桑耳一兩牛鹿茸十八銖酢五升浸炙燥再浸酢盡爲度治下篩服方寸匕日三

又方地榆知母等分各指大長一寸者㕮咀以酢一升東向竈中治極濃去滓服之

婦人血崩不止凌霄花爲末每酒服二錢後服四物湯（外臺）

又方椶櫚皮燒存性空心淡酒服三錢

又方椶櫚皮燒存性白礬煅各等分淡酒服三錢

又方水麥麻子根服之效

崩中漏下五色使人無子露蜂房末三指撮溫酒服之神效（梁文仲方）

崩中下血不止用白褐蠶衣中白魚等分爲末井華水服之日二（千金）

婦人血崩蠶繭煮汁飲

崩中不止蠶故紙一張煎炒焦槐子炒黃各等分爲末酒服立愈

又方用蠶沙四兩砂鍋炒半黃色入無灰酒一壺煮沸澄去沙每溫服一盞即愈（本草）

漏血不止木蛭炒爲末酒服一錢日二服惡血消即愈（千金）

赤白崩中舊壺盧瓢炒存性蓮房煅存性等分研末每服二錢熱水調服三服有汙爲度即止甚者五服止最妙忌房事發物生冷（廣上方）

鍼灸

甲乙經曰崩中腹上下痛鄧中主之

婦人漏下若血閉不通逆氣脹刺血海入五分灸五壯穴

女子漏血太衝主之

婦人漏血腹脹滿不得息小便黃陰谷主之

千金方曰漏血小腹脹滿如阻體寒熱腹偏腫刺陰谷入四分灸三壯穴在膝內輔骨後大筋之下小筋之上屈膝乃得之

漏下若血閉不通逆氣脹刺血海入五分灸五壯穴在膝膕上內廉曰肉際二寸中

女子不字陰暴出經漏刺然谷入三分灸三壯穴在足內踝前起大骨下陷中

女子不字陰暴出淋漏月水不來而多悶心下痛水原照海二穴主之

女人胞後下血不可禁止灸關元兩旁相去三寸

女人漏下赤白月經不調灸交信三十壯穴在內踝上五寸

女人漏下赤白及血灸足太陰五十壯穴在足太陰

經內踝上三寸名三陰交
女人漏下赤白灸營池四穴三十壯穴在內踝前後兩邊池中脈上一名陰陽
女人漏下赤白四肢酸悶灸漏陰三十壯穴在內踝下五分微動脚脉上
女人漏下赤白泄注灸陰陽隨年壯三報穴在足拇趾下屈裏表頭白肉際
女人疝及小腹腫漏泄癃遺尿陰痛面塵黑目下皆痛漏血刺太衝入三分灸三壯穴在足大趾本節後二寸中動脉
李杲十書曰胞門不閉漏下惡血不禁刺氣門入五分穴在關元旁三寸
醫學綱目曰婦人經脉妄行崩血取中極三分補之又取三陰交五分
證治準繩曰經血過多不止併崩中取三陰交行間二穴各針訖灸之又取通理刺二分灸二七壯穴在足小指上二寸
又法血崩併漏下刺中極補之取子宮二寸半
又法敗血不止取三陰交百勞風門中極腎俞膏肓曲池經骨
女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水漿之物灸足太陰脾經中血海穴二七壯或三七壯立已經水過多其色瘀黑其者崩下吸吸少氣臍腹冷極則汗出如雨尺脉微小灸關元百壯穴在臍下正中三寸

醫案

儒門事親曰孟官人母年五十餘歲血崩一載食曰澤蘭丸黑神散保安丸白薇散補之不效戴人見之曰天癸已盡本不當下血蓋血得熱而流散非寒也夫女子血崩多因大悲哭悲甚則肺葉布心系爲之急血不禁而下崩內經曰陰虛陽搏謂之崩陰脉不足陽脉有餘數則內崩血乃下流舉世以虛損治之莫有知其非者可服大劑大劑者黃連解毒湯是也次以香附子二兩炒白芍藥二兩焙當歸一兩焙三味同爲細末水調下又服槐榔丸不數日而安
西園公治一婦人年六十二歲血崩不止投黃連解毒湯四貼後服京腳散合四物六貼卽愈此婦因悲哀太過則心系急肺布葉舉而上焦不通熱氣在中血走而崩故效
李杲十書曰丁未仲冬郭大方來說其妻經水暴崩不止先曾損身失血自後一次縮一二日而始來今次則不止其人心窄性急多驚以余料之必因心氣不足飲食不節得之大方曰無也乃到彼診得掌中寒脉沉細而緩間而沉數九竅微有不利四肢無力上喘氣短促口鼻氣皆不調果有心氣不足脾胃虛弱之證胃脘當心而痛左脅下縮急有積當臍有動氣腹中鳴下氣大便難虛證極多不能盡錄宜先治其本餘證可以皆去安心定志鎮墜其經調和脾胃大益元氣補其血脉令春其神以大熱之劑去其冬寒疑在皮膚內少加去命門相火之藥不令四肢痿弱黃連一分生地三分炒神麯橘皮柱枝各五分草豆蔻仁六分黃芪人參麻黃不去節各一錢當歸身一錢五分杏仁五箇另研如泥共咬咀作一服水二大盞半煎麻黃令沸去沫煎至二盞入諸藥同煎至一大盞於巳午之間食消盡服之一服立止其胃脘痛乃胃上有客寒與大熱藥草豆蔻丸一十五丸白湯送下其痛立止再與肝之積藥除其積之根源而愈
一婦人經候凝結黑血成塊左脇有血瘕水泄不止穀有時不化後血塊暴下并水俱作是前後二陰有形血脫竭於下既久經候猶不調水泄日見三兩行食罷煩心飲食減少甚至瘦弱東垣老人曰夫聖人治病必本四時升降浮沉之理權變之宜必先歲氣無伐天和無勝無虛虛實實天殃邪無失正絕人長命故仲景云陽盛陰虛下之則愈汗之則死陰盛陽虛汗之卽愈下之則死大抵聖人立法且如升陽或發散之劑是助春夏之陽氣令其上升乃瀉秋冬收藏殞殺寒凉之氣此病是也當用此法治之升降浮沉之至理也天地之氣以升降浮沉乃從四時如始病不可逆之故經云順天則昌逆天則亡可不畏哉夫人之身亦有四時天地之氣不可止認在外人體亦同天地也今經漏不止是前陰之氣血已脫下矣水泄又數年是後陰之氣血下陷以脫矣後陰者主有形之物也前陰者精氣之戶下竭是病人周身之氣血常行秋冬之令陰主殺此等收藏之病是也陽生陰長春夏是也在人之身令氣升浮者穀氣上行是也既病人周身血氣皆不生長穀氣又不降其肌肉消少是兩儀之氣俱將絕矣既下元二陰俱脫氣血將竭假令當時熱證今下焦久脫化爲寒矣此

病久沉久降寒濕大勝當急救之湯寒以熱除濕以燥太升大舉以助生長補養氣血不致偏竭聖人立治之法既濕氣大勝以所勝治之助甲風木上升是也故經云風勝濕是以所勝平之也當先調和胃氣大用白朮之類以燥其濕而滋元氣如其不止後用風藥以勝濕此便是大升大舉以助春夏二濕之久陷下之至治也

宣德侯經歷家人病崩漏醫莫能效切脉之後且以紙疏其證至四十餘種爲製調經升陽除濕湯療之明日而十減其八前後五六日良愈

醫學正傳曰一老婦人年五十三歲血崩久不止諸藥不效余以椽斗蒼耳草根二物燒存性用四物湯加白芷茅花乾薑煎湯調服

薛氏醫按曰大尹王天成之內久患崩白服四物凉血之劑或作或輟因怒發熱其血不止服前藥不應乃主降火更加脅腹大痛手足俱冷余曰此脾胃虛寒所致先用附子理中湯體熱痛止又用濟生歸脾補中益氣二湯血崩頓愈若泥痛無補法則誤矣

錦衣楊永興之內患崩證過服寒凉之劑其證益甚更加肚腹痞悶飲食不入發熱煩躁脉洪大而虛余曰此脾經氣血虛而發躁也當急用八珍湯加炮薑以補溫之緩則不救不信乃服止血降火之劑虛證蜂起始信余言後不及治矣

一婦人面黃或赤覺腰間或臍下作痛四肢困倦煩熱不安經行先發寒熱兩肋如束血湧如崩此脾胃虧損元氣下陷與相火濕熱所致用補中益氣加防風芍藥炒黑黃藥間以歸脾湯調補而血始歸經

一婦人因怒崩血久不已面青黃而或赤此肝木制脾土而血虛用小柴胡合四物清肝火生肝血又用歸脾補中二湯益脾氣生肝血而療此證若因肝經風熱而血不寧者防風爲九以兼證之藥煎送或肝經火動而血不寧者炒條芩爲丸以兼證之藥煎送若挾血爲患用五靈脂爲末燒鐵器焯酒調服無不效者

一婦人飲食後因怒忽患血崩四肢逆冷抽搐口噤如發痙然吐痰如湧灌以二陳柴胡山梔枳殼吐出酸味神思稍醒藥止次日進薄粥少許但乳脅漲痛寒熱欲嘔四肢倦怠余以爲悉屬肝火熾盛致脾氣不能運化先用六君柴胡山梔釣藤鉤諸證頓退惟四肢不遂血崩如初或又以爲肝火未息欲投清肝凉血之劑余以爲肝脾氣血俱弱先用補中益氣湯培其脾土而血氣歸經又用四物琴术柴胡養肝和筋而四肢使利

一婦人久患血崩肢體清瘦飲食到口則閒腥臊口出清液每食少許腹中作脹此血枯之證肺肝脾胃虧損之患用八珍湯鱉甲骨丸兼服兩月而經行百餘劑而安

一婦人血崩兼心痛二年矣諸藥不應每痛甚虛證悉具而色痿黃余曰心主血蓋因去血過多心無所養以致作痛宜用十全大補湯參朮倍之三十餘劑稍愈百餘劑全愈

一婦人年六十有四久鬱怒頭痛寒熱春間乳內時痛服流氣飲之類益甚不時有血如經行又因大驚恐飲食不進夜寐不寧此因高年去血過多至春無以生發肝木血虛火燥所以至晚陰旺則發經云肝藏魂魂無附故不能寐先以逍遙散加酒炒黑龍膽草一錢山梔一錢五分二劑腫痛頓退又二劑而全消再用歸脾湯加炒梔貝母諸證悉愈

表弟方健甫內五十歲辛丑患血崩諸藥罔效壬寅八月身熱體痛頭運涕出吐痰少食衆作火治展轉發熱絕粒數日余診之曰脾胃久虛過服寒藥中病未已寒病復起遂用八味丸料一服翌早隨索粥數匙再服食倍熱減痛止乃服八味丸而愈癸卯秋因勞役憂怒甲辰夏病復作胃飽發熱春痛腰疼神氣怫鬱或作內傷或作中暑崩血便血煩渴引飲粒米不進昏憒時作脉洪大按之微弱此無根之火內虛寒而外假熱也以十全大補加附子一劑隨食粥三四匙崩血漸減日服八味丸始得全愈

一婦人性急每怒非太陽耳項喉齒胃乳作痛則胃滿吞酸吐清少食經漏不止此皆肝火之證肝自病則外證見土受尅則內證作若自病見用四物加白朮茯苓柴胡炒梔炒龍膽若內證作用四君子加柴胡芍藥神麯吳茱萸炒過黃連諸證漸愈惟月經漏下不止是血分有熱脾氣尚虛以逍遙散倍用白朮茯苓陳皮又以補中益氣加酒炒芍藥兼服而調

證治準繩曰一婦人年逾四十形色蒼紫忽病血崩醫用凉血或用止澀俱罔效汪石山診之六脉皆沉濡而緩按之無力曰此氣病非血病也當用甘溫之劑健脾理胃使胃氣上騰血循經絡則無復崩矣遂用補中益氣湯多加參芪兼服參苓白朮散果愈

一老婦人血崩不止流漓不絕滿牀皆血起牀不得

者三月矣腹滿如孕余作虛挾痰積污血治之用四物四兩參朮各一兩甘草半兩以治虛香附三兩半夏一兩半茯苓陳皮枳實縮砂延胡各一兩以破痰積污血分二十貼每貼煎加乾荷葉側柏葉湯再煎服之服盡良愈今再不發神效

一婦人年五十以上經斷七年忽然經行遂成崩漏發熱腹痛兩月不差余診其脉虛細疾數余曰此乃陰虛所致宜服熟附丸後果愈

王御醫迫夜有一宮女血如山崩其時暑月藥劑中只有大順散兩貼以冷水調服旋即奏效以此知醫者要在權變也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百十七卷目錄

醫部彙考三百九十七

婦人帶下門一

黃帝素問 骨空論

張機金匱要略 帶下病脈證

王叔和脈經 脈證

孫思邈千金方 赤白帶下扁中漏下

陳自明婦人良方 帶下有五

嚴用和濟生方 論治

劉完素六書 論證

張從政儒門事親 赤白錯分寒熱解

李杲十書 酒煮當歸丸論 固真丸論 補經

朱震亨心法 總論證治

戴思恭證治要訣 總論證治

李梴醫學入門 總論證治 脈法

薛己醫按 論證

王肯堂證治準繩 論證 論脈古治法 雜證法 帖調宜劑 補虛法

吳崑醫方考 用白芷黃荊實瓦壟子論 用茯苓論 用白芷論 用仁金白馬毛散論 帶下皆身中之血

萬全廣嗣紀要 帶下皆身中之血 必用之藥 白帶與白淫白濁不同

張介賓景岳全書 論證 治法

方一 白石脂圓 小牛角腮散 龍骨散 又方 白馬蹄圓 又方 白馬莖 又方 伏龍肝湯 禹餘糧圓 又方 雲母苓蠣散 艾火草散 禹餘糧圓 又方 伏龍肝湯 小柴胡湯 猬中益氣湯 六君子湯 歸脾湯 八珍湯 龍膽瀉肝湯 妙香散 四七湯 丁香柿艾湯 延胡苦楝湯 神聖復氣湯 攝鼻香 又方 衛生湯 十棗湯 瓦壟散 瓦壟子散 瓦壟子湯 瓦壟子丸 禹餘糧丸 禹功散 葱白散 五苓散 導水丸 玉燭散 平胃散 小胃丹 五膈散 三花神佑丸 大延胡索散 蠲飲二陳湯 茵陳建中湯 控涎丹 控涎芎芩丸 茯苓橘皮丸 茯苓橘皮丸 茯苓橘皮

言帶下皆如師言其脉何類何以別之師曰寸口脉濡而緊濡則陽氣微緊則榮中寒陽微衛氣虛血竭凝寒陰陽不和邪氣舍於榮衛疾一作侠　起年少時經水來以合房室移時過度精感命門開經下血虛百脉皆張中極感陽動微風激成寒因虛舍榮衛冷積於丹田發動上衝奔在胃腸津液掩口入涎唾涌溢出眩冒狀如厥氣衝髀裏熱粗醫名爲癲灸之因大劇

診婦人漏血下赤白日下血數升脉急疾者死遲者生

診婦人漏下赤白不止脉小虛滑者生大緊實數者死

婦人帶下脉浮惡寒漏下者不治

唐孫思邈千金方

赤白帶下崩中漏下

諸方說三十六疾者十二癥九痛七害五傷三痼不通是也何謂十二癥是所下之物一曰狀如膏二曰如黑血三曰如紫汁四曰如赤肉五曰如膿痂六曰如豆汁七曰如葵羹八曰如凝血九曰如清血血似水十曰如米泔十一曰如月浣乍前乍却十二曰經度不應期也何謂九痛一曰陰中傷痛二曰陰中淋瀝痛三曰小便即痛四曰寒冷痛五曰經來即腹中痛六曰氣滿痛七曰汗出陰中如有蟲嚙痛八曰脅下分痛九曰腰胯痛何謂七害一曰竅孔痛不利二曰中寒熱痛三曰小腹急堅痛四曰臟不仁五曰子門不端引背痛六曰月浣乍多乍少七曰害吐何謂五傷一曰兩脅支滿痛二曰心痛引脅三曰氣結不通四曰邪思洩利五曰前後痼寒何謂三痼一曰羸瘦不生肌膚二曰絕產乳三曰經水閉塞病有異同方亦不一

按產寶方云帶下三十六疾者是十二癥九痛七害五傷三固謂之三十六疾也十二癥者是所下之物一者如膏二者如青血三如紫汁四如赤皮五如膿痂六如豆汁七如葵羹八如凝血九如清血十如米泔十一如月浣十二如經度不應期也九痛者一陰中痛二陰中淋痛三小便痛四寒冷痛五月來時腹痛六氣滿來時足痛七汗出陰中如蟲嚙痛八脅下皮痛九腰痛七害者一害食二害氣三害冷四害勞五害房六害妊七害腫五傷者一竅孔痛二寒冷痛三小腹痛四臟不仁五子門不正引背痛三固者月水閉塞不通其餘二者文缺不載而千金所說三十六種疾皆由子臟冷熱勞損而下起於陰內也

宋陳自明婦人良方

帶下有五

婦人帶下其名有五因經行產後風邪入胞門傳於臟腑而致之若傷足厥陰肝經色如青泥傷手少陰心經色如紅津傷手太陰肺經形如鼻涕傷足太陰脾經黃如爛瓜傷足少陰腎經黑如鼠血人有帶脉橫於腰間如束帶之狀病生於此故名爲帶

註　按徐用誠先生云前證白屬氣而赤屬血東垣先生云血崩久則亡陽故白滑之物下流未必全拘於帶脉亦有濕痰流注下焦或腎肝陰淫之濕勝或因驚恐而木乘土位濁液下流或思慕爲筋痿戴人以六脉滑大有力用宣導之法此瀉其實也東垣以脉微細沉緊或洪大而虛用補陽調經乃兼責其虛也丹溪用海石南星椿根皮之類乃治其濕痰也竊謂前證皆當壯脾胃升陽氣爲主佐以各經見證之藥色青者屬肝用小柴胡加山梔防風濕熱壅滯小便赤澁用龍膽瀉肝湯肝血不足或燥熱風熱用六味丸色赤者屬心用小柴胡加黃連山梔當歸思慮過傷用妙香散等藥色白者屬肺用補中益氣加山梔色黃者屬脾用六君子加山梔柴胡不應用歸脾湯色黑者屬腎用六味丸氣血俱虛八珍湯陽氣下陷補中益氣湯濕痰下注前湯加茯苓半夏蒼朮黃蘗氣虛痰飲下注四七湯送六味丸不可拘肥人多痰瘦人多火而以燥濕瀉火之藥輕治之也嚴用和濟生方

論治

巢氏病源論婦人有三十六疾所論三十六疾者七癥八瘕十二帶下是也然所謂十二帶下者亦不顯其證狀今人所患惟赤白二帶而已推其所自勞傷過度衝任虛損風冷據於胞絡此病所由生也且婦人平居之時血欲常多氣欲常少方謂主氣有原百疾不生儻或氣倍於血氣倍生寒血不化赤遂成白帶氣平血少血少生熱血不化紅遂成赤帶寒熱交併則赤白俱下有室女或室後虛損而有此疾者皆令孕育不成以致絕嗣凡有是證速宜治之久而不治令人面黯黯色肌肉瘦瘠腹脅脹滿攻刺疼痛甚至足脛枯細多苦逆冷飲食矣診其脉右手

尺脉浮浮爲陽陽絕者無子苦足冷帶下也

金劉完素六書

論證

赤者熱入小腸白者熱入大腸原其本皆濕熱結於脉故津液溢是爲赤白帶下本不痛結緣五經脉虛結熱屈滯於帶故女子臍下痛而綿綿陰器中時下也故經曰任脉爲病男子內結七疝女子帶下瘕聚王注曰任脉自胞上過帶脉貫於臍上故男子內結七疝女子帶下帶脉起於季脇章門如束帶狀今濕熱鬱結不散故爲病也經曰脾傳之腎病名曰瘕疝小腹鬱熱而痛出白一名曰蠱所以爲帶下鬱結也鬱屈也屈滯而病熱不散先以十棗湯下之後服苦楝丸大延胡散調下之熱去濕除病自愈也

元張從政儒門事親

赤白錯分寒熱解

精選聖惠方二十三卷論婦人赤白帶下云婦人帶下者由勞神過度損動經血致令身虛受於風冷風冷入於脬絡傳其血之所成也巢氏內篇四十四卷論任脉爲經之海其任之爲病女子則爲帶下手太陽爲小腸之經也手少陰爲心之經也心爲臟主於裏小腸爲腑主於表二經之血在於婦人上爲乳汁下爲月水衝任之所統也衝任之脉既起於胞內陰陽過度則傷脬絡故風邪乘虛而入於脬中損衝任之經傷太陽少陽之血致令脬絡之間穢與血相兼帶而下冷則多白熱則多赤二家之說皆非也夫治病當先識經絡鑒樞十二經中有是動之病有所生之病大經有十二奇經有八脉言十二經之外復有此八道經脉也十二經與八道經脉遍身往來經絡共二十道上下流走相貫周環晝夜不息與天同度自手太陰肺經起行陽二十五度行陰亦二十五度復會於手太陰肺經也然此二十道經絡上下周流者止一十九道耳惟帶脉起少腹側季脇之端乃章門穴是也環身一周無上下之源絡脬而過如束帶之於身難經曰帶之爲病溶溶如坐水中衝任者是經脉之海也循腹脅夾臍旁傳流於氣衝屬於帶脉絡於督脉督脉者起於關元穴任脉者女子主養胎孕之所督脉乃是督領婦人經脉之海也衝任督三脉同起而異行一源而三岐皆絡帶脉衝任督三脉皆統於篡戶巡陰器行廷孔溺孔之端衝任督三脉以帶脉束之因餘經上下往來遺熱於帶脉之間熱者血也血積多日不流火則從金之化金曰從革而爲白乘少腹間宛熱白物滑溢隨溲而下綿綿不絕多不痛也或有痛者則壅礙因壅而成痛也內經曰少腹宛熱溲出白液宛者屈滯也病非本經爲他經宛抑而成此疾也宛一作客客猶寄也遺客熱於少腹久不去從金化而爲白設若赤白痢赤者新積也從心火白者舊積也從肺金故赤白痢不可曲分寒熱止可分新舊而治之假如難產始赤血次漬白膿又豈爲寒者敲而病者未爲信也此金之劄河間常言之矣皆云寒多則白以乾薑赤石脂桃花丸治痢雖愈後必生血疾如白帶下病徑以白芍藥乾薑白帶雖愈則小溲必不利治瀉痢與治帶下皆不可孰用峻熱之藥燥之燥之則內水涸內水涸則必煩渴煩渴則小便不利小便不利則足腫面浮漸至不治

內經曰思想無窮所願不得意淫於外入房太甚發爲筋痿淫衍白物如精之狀男子因溲而下女子綿綿而下左傳曰少男惑長女風落山之象是爲惑蠱之疾其文三蟲同皿曰蠱乃是思慕色慾內生侵蝕蝕甚不可便用燥熱之藥攻之漸至形削羸瘦脉大者必死而不救且赤白痢者是邪熱傳於大腸下廣腸出赤白也帶下者傳於小腸入脬經下赤白也據此二證皆可同治灑法治之先以導水丸禹功散瀉訖次以淡劑降心火益腎水下小溲分水道則自愈矣頃頓丘一婦人病帶下連緜不絕白物或來已三載矣命予脉之診其兩手脉俱滑大而有力得六七至常上熱口乾眩運時嘔酸水余知其實有寒痰在胃中以瓜蒂散吐訖冷痰二三升皆酸水也問如黃涎狀如爛膠次以漿粥養其胃氣又次用導水禹功二方以瀉其下然後以淡劑滲洩之藥利其水道不數日而愈余嘗悟內經中所云上有病下取之下有病上取之又上者下之下者上之然有此法亦不可偏執更宜詳其虛實而用之故知精選聖惠方帶下風寒之言與巢氏論中赤熱白寒之說正與難素相違乎非敢妄論先賢恐後學不明未免從之而行也如其寡學之人不察病人脉息不究病人經脉妄斷寒熱信用羣方暴熱之藥一旦有失雖悔何追嗚呼人命一失其復能生乎赤白痢與赤白帶下皆不死人內經惟腸澼便血血溫身熱者死赤白帶下曰液白物蠱病腎消皆不能死人有死者藥之誤也

夫婦人赤白帶下或出白物如脂可服導水丸禹功散或單用無憂散量虛實加減瀉訖次用桂苓丸五

芩散葶藶木香散同治濕法治瀉法治之或用獨聖散上涌亦可也室女同

李杲十書

酒煮當歸丸論

婦人白帶下注癃疝脚氣腰已下如在冰雪中以火焙炕重重厚綿衣蓋其上猶寒冷不任寒之極也面白如枯魚之象肌肉如刀割削瘦峻之速也小便不止與白帶長流而不禁固自不知覺面白目青藍如菜色眩眩無所見身重如山行步欹側不能安地腿膝枯細大便難祕口不能言無力之極食不下心下痞煩懊憹不任其苦面停垢背惡寒小便遺而不知此上中下三陽眞氣俱虛欲竭噦噫不止胃虛之極也脉沉厥緊而澀按之空虛若脉洪大而濡按之無力猶爲中寒之證況按之空虛者乎按之不鼓是爲陰寒乃氣血俱虛之極也宜酒煮當歸丸大補大溫

固眞丸論

婦人白帶久下不止臍腹冷痛陰中亦然目中溜火視物眩眩然無所見齒皆惡熱飲且痛須得黃連細末擦之乃止惟喜乾食大惡湯飲此病皆寒濕乘其胞內故喜乾而惡濕肝經陰火上溢走於標故上壅而目中溜火腎水侵肝而上溢致目眩眩而無所見齒惡熱飲者是陽明經中伏火也治法當大瀉寒濕以丸藥治之故曰寒在下焦治宜緩大忌湯散以酒製白石脂白龍骨以枯其濕炮乾薑大熱辛瀉寒水以黃蘗之大寒爲因用又爲鄉導故云古者雖有重罪不絕人之後又爲之伏其所主先其所因之意又瀉齒中惡熱飲也以柴胡爲本經之使以芍藥五分導之恐辛熱之藥太甚損其肝經故微瀉之以當歸身之辛溫大和其血脉名曰固眞丸用藥之法備矣

補經固眞湯論

婦人心胞尺脉微其白帶下流不止者何按叔和云崩中日久爲白帶漏下多時骨髓枯蓋血崩久則血少復亡其陽故白滑之物下流不止是本經血海將枯津液復亡枯乾不能滋養筋骨以本部行經藥爲引用爲使以大辛甘油膩之藥潤其枯燥而滋益津液以大辛熱之氣味藥補其陽道生其血脉以苦寒之藥泄其肺而救上熱傷氣以人參補之以微苦溫之藥爲佐而益元氣名曰補經固眞湯此證之要藥也

朱震亨心法

總論證治

帶下赤屬血白屬氣

主治燥濕爲先

漏與帶俱是胃中痰積流下滲入膀胱無人知此只宜升提甚者上必用吐以提其氣下用二陳湯加蒼术白术仍用丸子一本作瓦葉子

赤白帶下皆屬血出於大腸小腸之分

肥人多是濕痰以海石半夏南星炒蘗蒼术芍藥椿皮青黛之類

瘦人白帶少如有者多熱以炒黃蘗滑石椿皮川芎海石青黛之類作丸子服無海石蛤粉亦可

赤白帶下或十棗湯或神佑丸或玉燭散皆可服實者可行虛者不可峻攻此羅先生法也

血虛者加減四物湯

氣虛者參朮陳皮間與之

濕勝者用固腸丸

相火動者於諸藥中少加黃蘗

滑者加龍骨赤石脂

滯者加葵花白帶用白葵花赤帶用赤葵花

性躁者加黃連

痰氣帶下者蒼朮香附滑石蛤粉半夏茯苓丸服寒月少加乾薑臨機應變必須斷厚味

治結痰白帶心下悶先以小胃丹半饑半飽津液下

數丸候鬱積開却宜服補藥

赤白帶者皆因七情內傷或下元虛憊感非一端叔和云崩中日久爲白帶

漏下多時骨髓枯蓋崩久血少亡陽故白滑之物下流不止東垣言之詳矣不可不知

帶下與夢遺同法治之

明戴思恭證治要訣

總論證治

赤白帶下皆因七情內傷或下元虛冷感非一端大率下白帶多間有下赤者並宜順氣散吞震靈丹仍佐艾附圓或米飲調沙參末

帶下不止成危羸者四物湯加煅牡蠣粉半錢吞固眞圓多服取效

有帶疾愈後一二月或再發半年一發先血而後下帶來不可遏停畜未幾又復傾瀉此名漏帶最難治者也

下截之血小腹主之有因血虛而虛熱陷入小腸致小便澀痛色白如泔或成沙粒不可作淋治用冷劑

宜以四物湯五苓散各半貼和煎

李梴醫學入門

總論證治

經曰小腹窘熱漫出白液窈者濕熱疑滯結於五藏自胞上而過帶脈出於大小腸之分淋瀝以下故曰帶下赤屬血白屬氣其證頭昏目眩口苦舌乾咽嗌腫燥大便或閉或溏小便澀皆熱證也如赤白痢濁一般但不痛耳間有痛者濕熱拂鬱甚則肚腹引痛婦人服食燥熱性行乖戾以致肝旺脾虧而生濕熱熱則流通古人有用導水丸下之繼以淡劑滲之或苦楝丸大元胡索散調之如臍腹痛者暫以辛溫開導如大溫經湯補經固真湯龜鹿甚梔丸是也

瘦人多熱脈數外證潮煩乃陰虛火盛也芩藥樗皮丸帶不止者用地骨皮一兩生地五兩酒十盞煎至三盞分三次服或白芷散單益母丸白帶兼痛風者二陳湯加蒼葉南星牛膝川芎兼頭風身沸者蒼葉辛芎散兼七情者側葉樗皮丸

肥人多濕身黃脈緩陰戶如冰或痛白帶升陽燥濕湯四炒固真丹

濕痰流下滲入膀胱宜二陳湯加二术升麻柴胡或蒼葉樗皮丸如結痰白帶淋瀝不已者先以小胃丹半饑半飽津液下數丸候鬱積開服芩术芍藥丸

通用五苓散合四物湯或單樗白皮炒爲末酒糊丸

血虛加四物湯氣虛加參术陳皮火動加黃蘗滑久加龍骨赤石脂性燥加黃連腹痛加乾薑

因月水淋瀝不已或崩中暴下或產後去血過多以致陰虧陽竭榮氣不升經脈凝泣衛氣下陷精氣累滯於下焦蘊積而成白滑如涕下流腥臭者黃芪建中湯去桂加當歸水煎吞苦楝丸久不止膀胱引陰冷痛者東垣固真丸虛中有火者補經固真湯大烏雞丸常用氣虛四君子湯血虛四物湯有火加黃蘗有寒加桂附

始因亡血復亡其陽陽氣虛極帶下腥臭多悲不樂附桂湯腹痛陰冷者四物湯加桂附常用酒煮當歸丸小烏雞丸蠶斯丸琥珀調經丸

風邪入於胞門或中經脈流傳臟腑若傷肝經青如泥色傷心經赤如紅津傷肺經形如白涕傷脾經黃如爛瓜傷腎經黑如鮒血宜胃風湯或五積散去麻黃主之通用單地榆散

室女經水初下一時驚悸或浴以冷水或當風取涼故經水止而即患帶下宜琥珀珠砂丸

孕婦帶下全是濕熱宜芩术樗皮丸

平時陰陽過多及產後亡血下虛風邪乘虛入於胞絡宜煖宮丸加減附巢莫茂黃芪建中湯去桂加當歸水煎吞苦楝丸

凡帶下或用升提如升陽調經湯或用收澀如伏龍肝散白芷散然暫止而終不止者蓋衛司開闔而爲榮血之主脾胃爲血海水液之會衛氣與胃氣俱虛則血液無所約制故古方有用桂枝湯加附子以固衛氣者四君子湯加草果丁香木香以燥水健脾者或用理中湯加陳皮半夏或單半夏丸用苓歸煎湯下或補中益氣湯半胃散皆補衛厚脾使氣血自循故帶而不專於收澀以劫奪之也

又有白淫一證如白精之狀不可誤作白帶過服熱藥

脈法

帶下崩中脈多浮動虛遲者生實數者重

腎脈浮遲主患帶濁

薛己醫按

論證

婦人帶下或因六淫七情或因醉飽房勞或因膏粱厚味或服燥劑所致脾胃虧損陽氣下陷或濕痰下注蘊積而成故言帶也凡此皆當壯脾胃升陽氣爲主佐以各經見證之藥

王肯堂證治準繩

論證

婦人有白帶者乃是第一等病令人不能產育宜急治之此扁鵲之過邯鄲聞貴婦人所以專爲帶下醫也

帶下之證有三未嫁之女月經初下止而即浴之以冷水或熱而扇或當風此室女病帶下之由也有家之婦陰陽過多即傷胞絡風邪乘虛而入胞經觸冷遂使穢液與血水相連而下產後帶下由亡血失氣傷動胞絡門開而外風襲肌體虛而冷風入風與熱氣相連故成液而下冷則多白熱則多赤冷熱相交則赤白俱下

論潔古治法

帶下少腹窘結而痛者先以十棗湯下之次服苦楝丸大元胡散調之是先攻後補之法也不可不知

結痰白帶以小胃丹半饑半飽津液下數丸候鬱積行却服白术二兩蒼术半兩紅白葵花一錢半白芍

藥七錢半蒸餅爲丸空心煎四物湯下二十丸以補之

燥濕法

有濕痰而弱不禁攻者燥之熱濕宜凉燥寒濕宜溫燥

枯涸宜潤

帶下久而枯涸者濡之凡大補氣血皆可以濡之如以四物湯爲末煉蜜丸梧子大空心米飲下三四十丸以療年高婦人白帶良驗皆潤劑也

補虛法

凡脉微食少及久病曾經攻下者俱作虛治有熱用凉補無熱用溫補

酸漿草辨

千金治赤白帶下用三葉酸漿草陰乾爲末酒服按此草葉細如萍叢生莖端有三葉俗名布谷飯布谷者鳩也蓋鳩常食之故又名鳩漿草衍義悞入苦菪條其子大如金柑味酸可食故亦名酸漿非三葉也酸漿小草布地而生葉皆三瓣性喜黃花其莖葉皆酸者

敗膿所致

帶下并腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂至臍腹更增冷痛此蓋敗膿血所致卒無已期治須排膿爲先白芷一兩單葉紅蜀葵根二兩白芍藥白蘞各半兩碁燒枯另研餘同爲末以蠟爲丸如桐子大空肚及飯前米飲下十丸或十五丸候膿盡仍別以補藥佐之

吳崑醫方考

用白芷黃荆實瓦鬰子論

白帶者胃中濕熱下注而成豬之溺注於器而生溺底淖耳前古名醫有單用焦白芷而主者有單用焦荆實而主者有單用瓦鬰粉而主者蓋以白芷之性香而升舉荆實之性辛而利氣瓦鬰之性燥而勝濕炒而焦之則火可以生土土可以防水煉而粉之則燥可以勝濕勝濕則無以下注而白帶止矣此用三物之意也

用葵花論

凡人腰臍之間有帶脉奇經八脉之一也迴身一週如束帶焉下焦虛損督任有虧則中焦氣血乘虛而襲之陷於帶脉之下氣病爲白血病爲赤名曰赤白帶下也東垣曰白葵花治白帶紅葵花治赤帶赤治血燥白治氣燥此何言哉崑謂葵花者朝陽之葅也稟草木之陰涵天地之陽故能潤燥而升陽使營衛上行不復陷於帶脉之下而爲帶下也或問帶下一疾耳此言氣血陷於帶脉之下爲帶下前言胃中濕熱下注爲帶下何相悖也余曰婦人無病容單下白者責之濕熱下注婦人久病赤白並下責之氣血下陷多成瘵也又曰有言白者屬寒赤者屬熱其說何如余曰曾見寒者因有赤帶熱者益多白帶此白寒赤熱之言不足徵矣必若所言則赤白並下者是寒熱竝有耶見道之言不如此

用于金白馬毛散論

氣陷於下焦則白帶血陷於下焦則赤帶以澀藥止之則未盡之帶留而不出以利藥下之則既損其中又傷其下皆非治也白馬得乾之剛毛得血之餘血餘可以固血乾剛可以利氣固血則赤止利氣則白愈此用馬毛之意也龜鼈牡蠣外剛而內柔離之象也去其柔而用其剛故可以化癥可以固氣化癥則赤白之成帶者無復中留固氣則營衛之行不復陷下營不陷則無赤衛不陷則無白矣

萬全廣嗣紀要

帶下皆身中之血

女子之血謂之七損上爲乳汁下爲月經交合浸淫之水與夫漏濁崩中帶下之物皆身之血也

婦人祕科

論治

帶下之病婦女多有之赤者屬熱兼虛兼火治之白者屬濕兼虛兼痰治之年久不止者以補脾胃爲主兼升提大抵瘦人多火肥人多痰

必用之藥

赤帶用四物湯加芩連再加升麻丹皮主之兼服三補丸

白帶用加味六君子湯主之兼服蒼莎導痰丸

帶久不止者宜服十全大補湯去地黃加陳皮半夏炒乾薑更服參朮大補丸以補脾胃之虛及服補宮丸以固下元之脫

白帶與白淫白濁不同

婦人白帶與白淫白濁之病證既不同治亦有別蓋白帶時常流出清冷稠粘此下元虛損證也用上帶久不止之法治之非如白濁隨小解而來渾濁如泔者比也

景岳全書　臣張介賓著

論證

凡婦人淋帶雖分微甚而實爲同類蓋帶其微而淋其甚者也總由命門不固而不固之病其因有六蓋一以心旌之搖之也心旌搖則命門應命門應則失其所守此由於不遂者也一以多慾之滑之也情慾無度縱肆不節則精道滑而命門不禁此由於太遂者也一以房室之逆之也凡男女相臨遲速有異此際權由男子而婦人情興多致中道而止止則逆逆則爲濁爲淋此由於遂而不遂乃女子之最多而最不肯言者也以上三證凡帶濁之由乎此者十居八九而三者之治必得各清其源庶可取效然源未必清而且旋觸旋發藥餌之功必不能與情竇爭勝此帶濁之所以不易治也此三者之外則尚有濕熱下流者有虛寒不固者有脾腎虧陷而不能收攝者當各因其證而治之

治法

一心旌搖心火不靜而帶下者先當清火宜硃砂安神丸清心蓮子飲直指固精丸之類主之

一無邪火而但見心虛帶下者宜祕元煎人參丸心虛白濁飲茯菟丸之類

一慾事過度滑泄不固而帶下者宜祕元煎壽脾煎固陰煎芩术菟絲丸濟生固精丸鎖精丸金鎖思仙丹之類主之

一人事不暢精道逆而爲濁爲帶者初宜六味地黃湯或威喜丸之屬以利之久不止者宜固陰煎芩术菟絲丸之屬以固之

一濕熱下流而爲帶濁脉必滑數色見紅赤證有煩渴而多熱者宜保陰煎加味逍遙散或經驗猪肚丸亦佳若熱甚兼淋而赤者宜龍膽瀉肝湯

一元氣虛弱而帶下者宜壽脾煎固陰煎菟絲煎七福飲十全大補湯九龍丸之屬

一陽氣虛寒脉見微濇色白清冷腹痛多寒者宜加薑附或用家韭子丸

一脾腎氣虛下陷而多帶者宜用壽脾煎固陰煎歸脾湯補中益氣湯之屬

方一

白石脂圓 十全方 小同

治婦人胞中痛漏下赤白

白石脂　鰕鯽骨　禹餘糧　牡蠣各十八銖

赤石脂　乾地黃　乾薑　龍骨　桂心　石葦

白薇　細辛　芍藥　黃連　附子　當歸

黃芩　蜀椒　鍾乳　白芷　芎藭　甘草各半兩

右爲末蜜丸梧子大每日空心酒下十五丸日再服一方有黃蘗半兩

小牛角鰓散

治帶下五賁一曰熱病下血二曰寒熱下血三曰經脉未斷爲房事則血漏四曰經來舉重傷任脉下血五曰產後臟開經利五賁之病外實內虛

牛角鰓一枚燒令赤　鹿茸　禹餘糧　當歸

乾薑　續斷各二兩　阿膠三兩　鰕鯽骨

龍骨各一兩　赤小豆二升

右治下篩空腹以酒服方寸匕日三一方無鹿茸鰕鯽骨

龍骨散

治赤白帶下

龍骨三兩　黃蘗　半夏　竈中黃土　桂心

乾薑各二兩　石葦　滑石各一兩　鰕鯽骨

代赭各四兩　白殭蠶五枚

右治下篩酒服方寸匕

如白多者加鰕鯽骨殭蠶各二兩

如赤多者加代赭五兩

又方

治女人赤白帶下

大黃蒸三斗米下　附子　茯苓　牡蒙　牡丹

桔梗　葶藶各三兩　厚朴　芎藭　人參

當歸　蘞蠃　蜀椒　吳茱萸　柴胡　乾薑

桂心各半兩　細辛二兩半

右十八味爲末蜜和丸如梧子大每日空心酒服二丸不知加之以腹中溫爲度一方有麻子三兩澤蘭十兩無蜀椒葶藶

又方

治帶下百病

大黃破如豆粒熬令黑色　柴胡　矾石各一斤

川芎五兩　乾薑　蜀椒各一升　茯苓如鷄子大一枚

右爲末蜜丸梧子大先食米飲服七丸不止加至十丸以知爲度

又方

治婦人及女子赤白帶下

禹餘糧　當歸　川芎各一兩半　赤石脂

白石脂　阿膠　龍骨　石葦各一兩六銖
鰞鰂骨　黃蘗　白蘞　黃芩　續斷　桑耳
牡蠣各一兩
右爲末蜜丸梧子大空心米飲下十五丸日再加至三十丸爲度一本有黃連無黃芩

白馬蹄圓
治女人下焦寒冷成帶下赤白濁
白馬蹄　鼈甲　鯉魚甲　龜甲　蜀椒各一兩
慈石　甘草　杜仲　萆薢　當歸　續斷
川芎　禹餘糧　桑耳　附子各二兩
右十五味爲末蜜丸梧子大以酒服十丸加至三十丸日三服一本無鼈甲

白馬駞散
治婦人帶下
白馬駞二兩　龜甲四兩　牡蠣一兩十八銖
鼈甲十八銖
右治下篩空心酒下方寸匕日三服加至一匕半
如下白取白馬者
如下赤取赤馬者

雲母芎藭散
治五崩身瘦欬逆煩滿少氣心下痛面生瘡腰痛不可俛仰陰中腫如有瘡狀毛中癢時痛與子臟相通小便不利常拘急頭眩頸項急痛手足熱氣逆衝急心煩不得臥腹中急痛食不下吞酸噫苦上下腸鳴漏下赤白青黃黑汁大臭如膠汚衣狀皆是內傷所致中寒即下白中熱即下赤多飲即下黑多食即下黃多藥即下青或喜或怒心中常恐或憂勞便發動大惡風寒
雲母　芎藭　代赭　東門邊木燒各一兩
白殭蠶　鰞鰂骨　白堊　蝟皮各六銖　鼈甲
桂心　伏龍肝　生鯉魚頭各十八銖
右治下篩酒服方寸匕日三夜一一方有龍骨乾薑一方用龜甲不用鼈甲

慎火草散
治崩中漏下赤白青黑腐臭不可近令人面黑無顏色皮骨相連月經失度往來無常小腹弦急或苦絞痛上至心兩脅腫脹食不生肌膚令人偏枯氣息乏少腰背痛連脅不能久立每嗜臥困懶
慎火草　白石脂　鼈甲　乾薑　細辛　當歸
芎藭　石斛　芍藥　禹餘糧　牡蠣各二錢　黃連　乾地黃　薔薇根皮各四兩　熟艾　桂心各一兩
右治下篩空心酒服方寸匕日三稍加至二匕
若寒多者加附子椒各一兩
若熱多者加知母黃芩各一兩
若白多者加乾薑白石脂各二兩
若赤多者加桂心代赭各二兩

禹餘糧圓
治崩中赤白不絕困篤
禹餘糧五兩　白馬蹄十兩　鰞鰂魚骨一兩
龍骨三兩　鹿茸二兩
右爲末蜜丸梧子大以酒服二十丸日再以知爲度

又方
治女人崩中去赤白
白馬蹄五兩　蒲黃　鹿茸　禹餘糧　白芷
白馬鬐毛　小薊根　續斷各五兩　人參
乾地黃　柏子仁　鰞鰂骨　黃芪　茯苓
當歸各三兩　艾葉　蓯蓉　伏龍肝各二兩
右爲末蜜丸如梧子大空心飲服二十丸日再加至四十丸

伏龍肝湯
治崩中去赤白或如豆汁
伏龍肝如彈子七枚　生薑五兩　生地黃四升
甘草　艾葉　赤石脂　桂心各二兩
右㕮咀以水一斗煑取三升分四服日三夜一

又方
治崩中漏下赤白不止氣虛竭
龜甲　牡蠣各三兩
右二味治下篩酒服方寸匕日三

又方
治同上
桑耳一兩半　鹿茸十八銖
右二味以酢五斗漬炙燥再漬酢盡爲度治下篩服方寸匕日三

又方
治同上
地榆　知母各等分
右二味用各指大長一尺者㕮咀以酢一升東向竈中治極濃去滓服之

芎藭湯

治帶下漏血不止

芎藭　乾地黃　黃芪炙　白芍藥　吳茱萸

甘草各二兩　當歸　乾薑各三兩

右㕮咀以水一斗煑取三升分三服

若月經後因有赤白不止者除地黃吳茱萸加杜仲人參各二兩

小柴胡湯

治肝膽經證寒熱往來晡熱潮熱默默不欲飲食或怒火口苦耳聾欬嗽發熱脅下作痛甚者轉側不便兩脅痞悶或瀉利欬嗽或吐酸食苦水皆用此藥主之治帶下亦間用此加減

柴胡二錢　黃芩炒一錢　人參　半夏各七分

甘草炙五分

右薑水煎服

補中益氣湯 醫按下同

治元氣虛損或因尅伐惡寒發熱倦怠少食或不能消散生肌或兼飲食勞倦煩熱作渴亦用此加減治女人帶下

黃芪炒　人參　白朮炒　甘草　當歸各一錢

陳皮五分　柴胡　升麻各三分

右薑棗煎空心午後服

六君子湯

治氣虛有痰補脾健胃并治帶下虛者用此加減

人參　白朮　茯苓各二錢　甘草炙一錢

陳皮　半夏

右薑棗水煎服

歸脾湯

治脾經失血少寐發熱盜汗或思慮傷脾不能攝血以致妄行或憂思傷脾血虛發熱或肢體作痛大便不調或經候不准帶下晡熱內熱

人參　白朮炒　黃芪炙　白茯苓　龍眼肉

當歸　遠志去心　酸棗仁炒各一錢　木香

甘草炙各五分

右薑棗水煎服

八珍湯

治氣血俱虛及帶下虛者用此加減

人參　白朮　白茯苓各二錢　熟地黃三錢

甘草炙　當歸酒拌　芍藥炒　川芎各一錢

右煎服

龍膽瀉肝湯

治肝經濕熱兩拘腫痛或腹中疼痛或小便澀滯等證亦用此加減治帶下

龍膽草酒拌炒黃　澤瀉各一錢　車前子炒

木通　生地黃酒拌　當歸酒拌　山梔仁炒

黃芩炒　甘草各五分

右水煎服

妙香散

治心氣不足精神恍惚虛煩少睡盜汗等證亦用此加減治帶下

人參　甘草炒　桔梗各五錢　遠志去心炒

山藥薑汁炙　茯苓　茯神　黃芪各一兩

辰砂研三錢　麝香研二錢　木香煨二錢半

右爲末每服二錢溫酒調下

四七湯

治七情鬱結成痰或如梅核梗於喉間或中脘停痰氣痞或痰壅氣喘或痰飲中脘嘔逆惡心亦治帶下有痰者

半夏薑製一錢五分　紫蘇葉　厚朴薑製

茯苓各一錢

右薑棗水煎服

丁香膠艾湯 東垣下同

治崩漏不止白帶白滑之物多間如屋漏水下時有鮮血自覺臍下如冰求衣被以禦其寒右尺脉時微洪

熟地黃　白芍藥各三分　川芎　丁香各四分

阿膠六分　生艾葉一錢　當歸一錢二分

右川芎爲細末當歸酒洗剉熟地黃丁香爲細末艾亦剉都作一服水五大盞先煎五味作一盞零二分去柤入膠再上火煎至一大盞帶熱空心服之

延胡苦楝湯

治臍下冷撮痛陰冷大寒白帶下

黃蘗一分　延胡索　苦楝子各二分　附子炮

肉桂各三分　炙甘草五分　熟地黃一錢

右都作一服水二大盞煎至一盞食前服

神聖復氣湯

治復氣乘冬足太陽寒氣足少陰腎水之旺能令母實手太陰肺實反來侮土火木受邪腰背胷膈閉塞疼痛善噫口中涎目中泣鼻中流濁涕不止或如息肉不聞香臭欬嗽痰沫上熱如火下寒如冰頭作陣痛目中流火視物䀮䀮耳鳴耳聾頭并

口鼻或惡風寒喜日陽夜臥不安常覺痰塞膈咽不通口失味兩脅縮急而痛牙齒動搖不能嚼物陰汗前陰冷行步欹側起居艱難掌中寒風痹痲木小便數而晝多夜頻而欠氣短喘喝少氣不足以息卒遺失無度婦人白帶陰戶中大痛牽心而痛黧黑失色男子控睪牽心腹陰陰而痛面如赭色食少大小便不調心煩霍亂逆氣裏急而腹皮色白後出餘氣腹不能努或腸鳴膝下筋急肩胛大痛此皆寒水來復火土之讎也

黑附子　乾薑炮各三分　當歸身六分　防風
椰李仁湯浸去皮尖另研如泥　人參各五分
半夏湯泡七次　川升麻各七分　白葵花
橘皮各五分　甘草　藁本各八分　柴胡
羌活　草豆蔻仁麪裹煨熟去皮　黃芪各一錢
生地黃二分酒洗　黃蘗酒浸　黃連酒浸
枳殼各三分已上四味預一日另用新水浸
細莘二分　川芎細末　蔓荊子各三分已上三味預一日用新水半大盞分作二處浸

右將白葵花已上十三味都作一服水五盞煎至二盞入橘皮已上三味再煎至一盞又入生地已下七味復上火煎至一大盞去柤稍熱服空心忌肉湯宜食肉不助經絡中火邪也

擒鼻香

治子宮久冷赤白帶下

牡蠣煅　紫梢花　韶腦　母丁香　蛇牀子
黃狗頭骨煅　破故紙　桂心各等分

右爲細末煉蜜丸如雞頭大臨事用一粒

又方

治婦人赤白帶下

平胃散　黃芪炒分兩各隨宜

右調服

衛生湯

治脾養血亦用此加減治帶下

當歸　白芍藥各三兩　黃芪二兩　甘草一兩

右爲粗末每服半兩水二盞煎至一盞去滓溫服空心

如虛者加人參一兩

十棗湯

治帶下熱滯不散

芫花　大戟　甘遂各等分

右爲末水一錢棗十枚劈開煮汁半錢調藥末半錢匕實者一錢匕

瓜蔕散（事親下同）

治赤白帶下隨宜酌用

瓜蔕　赤小豆各七十五箇　人參　甘草各半兩

右爲細末每服一錢或半錢或二錢量虛實加減用之空心蒸汁調服一方甘草二錢五分

獨聖散

治同上

瓜蔕不拘多少

右爲細末每服一錢或二錢蒸汁調服

如脅痛加全蠍

如頭痛加鬱金

導水丸

治同上

大黃　黃芩各二兩　滑石　黑牽牛頭末各四兩

右爲細末滴水丸梧子大每服五十丸或加至百丸臨臥溫水下

禹功散

治同上

黑牽牛頭末四兩　茴香一兩炒　或加木香一兩

右爲細末以生薑自然汁調一二錢臨臥服

無憂散

治同上

黃芪　木通　桑白皮　陳皮各一兩　胡椒
白朮　木香各半兩　牽牛頭末四兩

右爲細末每服三五錢以生薑自然汁調下食後

五苓散

治同上

官桂　澤瀉　猪苓　茯苓　白朮各半兩

右爲細末每服二錢熱湯或新水調下

葶藶木香散

治同上

苦葶藶　茯苓　猪苓　官桂各一分　澤瀉
木通　甘草各半兩　滑石三錢　木香半錢

右爲細末每服三錢生薑湯調食前服

玉燭散（丹溪下同）

治赤白帶下隨宜酌用

當歸　芍藥　川芎　熟地　芒硝　大黃　甘草

右㕮咀生薑三片煎服

三花神佑丸

治赤白帶下隨證酌用
輕粉一錢　大黃一兩　牽牛二兩　芫花醋炒
甘遂　大戟各半兩
右爲末滴水丸小豆大初服五丸每服加五丸溫水下無時日三
小胃丹
治同上
芫花醋拌勻過一宿瓦器不住手攪炒令黑勿焦
甘遂麪裹長流水浸半日水洗曬乾冬七春秋五夏一日　大戟長流水煮一時水洗曬乾各半兩
大黃濕紙裹煨勿焦切焙乾酒潤炒乾一兩半
黃蘗三兩焙炒
右爲末粥丸麻子大每服二三十丸臨臥津液吞下或白湯一口送下取其膈上之濕痰熱積以意消息之欲利則空心服
五積散（入門下同）
半夏二分　白芷　川芎　芍藥　甘草　茯苓
當歸　桂各三分　陳皮　麻黃各六分　厚朴
乾薑各四分　桔梗一分半　蒼朮七分半
枳殼五分
右薑葱煎服
如調經入艾酢
如體薄有汗去蒼朮麻黃
平胃散
婦人帶下用此補衛厚脾
蒼朮二錢　陳皮一錢四分　厚朴薑汁炙一錢
甘草八分
右薑棗入鹽少許溫服
二陳湯
治肥人痰濕流下致成白帶
半夏一錢　陳皮二錢　茯苓八分　甘草四分
右生薑三片水煎服
如血虛合四物湯
如氣虛合四君子湯
黃芪建中湯
治白帶如涕沫極腥臭
黃芪　肉桂各七分　甘草一錢半　白芍三錢
右薑棗煎去查入飴糖少許再煎令鎔空心服
大延胡索散
婦人濕熱帶下用此調之
延胡索　莪朮　當歸　三稜　官桂　厚朴
赤芍　川楝肉　木香　川芎各一分半　桔梗
黃芩　大黃各五分　甘草一錢　檳榔二分
右水煎日三次熱服
螵斯丸
治帶下腥臭多悲不樂
香附　白薇　半夏　茯苓　厚朴　杜仲
當歸　秦艽各三兩　肉桂　乾薑　牛膝
防風　沙參各二兩二錢　細辛　人參各四錢
右爲末蜜丸梧子大每服二十五丸酒下
苓薸楝皮丸
治瘦人多熱致成帶下
黃芩　黃蘗　楝皮　滑石　川芎　海石
青黛　當歸　芍藥各等分
右酢糊丸服
苓朮楝皮丸
治孕婦白帶
黃芩　白朮各三錢　黃蘗錢半　楝皮　白芍
山茱萸各二錢半　白芷　黃連各二錢
右爲末酒糊丸溫酒下
蒼蘗荜苎散
治婦人上有頭風鼻涕下有白帶
蒼朮　黃蘗　辛夷　川芎　南星　滑石
半夏　牡蠣　黃芩酒炒
右水煎溫服
龜蘗薑梔丸
治赤白帶下或時腹痛
龜板三兩　黃蘗一兩　山梔子炒二錢半
乾薑炒一錢
右爲末酒糊丸白湯下
側柏楝皮丸
治七情所傷脉數白帶下
楝皮二兩　側柏葉　黃蘗酒蒸　黃連各五錢
香附　白朮　白芍各一兩　白芷燒存性三錢
右爲末粥丸米飲下
蒼蘗楝皮丸
治肥人濕痰致成白帶
黃蘗　楝皮　海石　半夏　南星　川芎
香附　蒼朮　乾薑各等分
右爲末酢糊丸梧子大每五六十丸白湯下
如暑月去薑加滑石

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百十八卷目錄
醫部彙考三百九十八
婦人帶下門二
方二　小烏雞丸　芩术芍葵丸　琥珀珠砂丸
益母膏　四物湯　桂枝
湯　理中湯　升陽燥濕湯　升陽調經湯
牛夏丸　胃風湯　補經固衝湯　四妙圓
丹溪白散　八妙丸　固經丸　又方
玉仙散　朝元散　四神丸　二氣丹　又方
散　下虛藥　導痰丸　萬靈膏藥　七味白术
人參黃芪湯　六味丸　加味逍遙散
補宮丸　四物加芩連湯　人參順氣
君子湯　和劑四陽丸　又方　又
散　加減人參黃芪湯　椒皮丸　依前散
方　固腸丸　又方　乳香散
馬鞍丸　白正散　牡蠣散　補宮丸　白鞘
丸　補氣調腸湯　又方　又方
萩丸　當歸痛　茯苓散　本柏丸　艾附丸
沉香　牡丹丸　芩柏丸　固衝丸　芎花散
茶煎丸　地榆煮　豆花散　調經補氣湯
本事地黃丸　柏附湯　香附六合湯　又
方　二豆散　鶴頂丸　白堊丸　養氣活血
丹　茱萸湯　牛藥龍膽行　膠艾丹　阿
膠丹　酒黃芩丸　溫經湯　益母散　香
蠻散　琥珀丸　白芍藥散　神仙聚寶丹
又方　麒麟竭湯　白芷丸　當歸附子湯
單方
鍼灸
醫案

方二

小烏雞丸

治帶下腥臭腹痛陰冷

吳茱萸　艮薑　白薑　當歸　芍藥　延胡索
補骨脂　陳皮　川椒　青皮　劉寄奴　生地
枝术　川芎各一兩　荷葉灰四兩　北艾二兩
烏雞肉

右爲末用烏雞肉煮爛爲丸每五十丸作一服如

單赤帶茶清下

芩术芍葵丸

治結痰白帶

白术二兩　黃芩五錢　紅白葵花二錢半
白芍七錢半

右爲末蒸餅丸煎四物湯下

琥珀珠砂丸

治室女帶下

琥珀　木香　當歸　沒藥各四錢　乳香一錢
麝香　硃砂各二分半

右爲末水丸如龍眼核大每用一丸溫酒磨服

益母膏

治產後赤白帶

益母草端午日採紫花方莖者連根洗淨

右於石臼內搗爛以布濾取濃汁入砂鍋內文武火熬成膏如砂糖色爲度磁罐收貯每服一匙膠艾湯調下一方陰乾爲末忌鐵蜜丸彈子大每服一丸膠艾湯下

四君子湯

婦人帶下脾胃極弱者用此加減

人參一錢　白术　茯苓各二錢　甘草六分
生薑三片　棗子一枚

右水煎服不拘時如有汗去生薑

四物湯

治血虛帶下用此加減

白芍　熟地各二錢半　當歸　川芎各二錢

右煎服

桂枝湯

古方治帶下間用此加減以固衛氣

桂枝　白芍各三錢　甘草一錢

右薑棗煎服

理中湯

古方治帶下間用此加減以燥水健脾

甘草一錢半　人參　白术　乾薑炮各二錢

右薑棗煎服

升陽燥濕湯

治白帶下陰戶痛控心急痛身黃皮緩身重如山陰中如水

柴胡一錢二分　防風　艮薑　乾薑　梔李仁
甘草各一錢　陳皮　黃芩各五分　白葵花七朵

右分作二貼水煎服

升陽調經湯

治夏月帶下脫漏及飲食勞倦暴崩不止等證

獨活五分　葵荊子七分　當歸　防風　甘草
升麻　藁本各一錢　柴胡　羌活　蒼术
黃芪各一錢半
右空心水煎服以飯壓之

半夏丸

古方治帶下用此加減以燥水健脾

半夏香油炒
右爲末粥丸梧子大每服三五十丸薑湯下

胃風湯

治風邪傷腎帶下黑如鼈血

茯苓　人參　當歸　川芎　白术　芍藥
肉桂各七分　粟米百粒
右水煎溫服

補經固眞湯

一名補陽固眞湯治始病崩中日久白帶下流不止

柴胡　黃芩　梔李仁　甘草各一錢　人參
乾薑各二錢　橘皮五分　白葵花一朵
右水煎溫服如赤帶用紅葵花一方用白葵花十六朵

四炒固眞丹

治婦人崩帶下血子宮血海虛冷等證

蒼术一斤分作四分一分用茴香青鹽各一兩炒
一分用川烏川楝各一兩炒　一分用川椒破故紙各一兩炒　一分用酒醋炒俱以术黃爲度去各炒藥
右將各炒藥爲末煮藥酒醋打糊丸梧子大每服三十九淡醋湯下

清白散（醫鑑下同）

治白帶

當歸　川芎　白芍炒　生地酒洗過各汁炒
黃蘗鹽水炒　貝母　楝根白皮酒炒各等分
乾薑炒黑　甘草各減半
右剉一劑生薑煎服

如肥人多濕痰加白术半夏
如赤帶加酒芩荊芥久下加熟地牡蠣
如氣虛加人參黃芪
如腰腿痛加鹿角膠或只以二陳湯加蒼术白术
如血虛加芎歸
如升膀胱之濕二陳加升麻柴胡蒼术白术

解帶散

治婦人血氣不調濕熱白帶四肢倦怠五心煩熱痰鬱嘈雜

歸身一錢半　白芍酒炒　白术炒各一錢二分
蒼术米泔浸炒　茯苓　香附酢炒　丹皮酒洗
陳皮去白各一錢　甘草炙四分　延胡炒
川芎各八分
右剉一劑生薑煎空心服

八妙丸

治經脉不調濕氣白帶腹痛胃弱

香附便製　丹皮　川芎酒炒　延胡炒各二兩
當歸身酒洗　生地黃薑汁炒　白茯苓各二兩
赤芍藥酒炒一兩半
右爲細末酒糊爲丸如菉豆大每服五十丸空心滾水下

如腹痛酒下七十丸

固經丸

治赤白帶下屬濕熱者

白术七錢　香附炒　黃蘗各一兩炒　龜甲炒
梔子各二兩炒　貝母　乾薑炒各二錢　苦參
山茱萸肉　楝根白皮酒炒各五錢　白芍七錢半
右爲末酒糊爲丸如梧桐子大每服八十丸空心滾水送下

玉仙散

治赤白帶下屬寒者

乾薑炒　香附炒　白芍炒各一兩　甘草生五錢
右爲末每服三錢空心黃酒送下

朝元散

治赤白帶下腹臍冷痛子宮虛寒

白芷　陳皮　厚朴　枳殼　桔梗　川芎
白芍　當歸　茯苓　蒼术　半夏　乾薑
官桂　香附　吳茱萸　小茴香　甘草
右剉一劑生薑三片棗一枚水煎空心服

一方加乳香沒藥各二錢半烏藥一兩酒煎入米糖一斤早晚隨量飲酒大效

四神丸

治白帶

香附米八兩酒醋童便各浸二兩浸三日炒
砂仁去殼炒　蒼术米泔水浸透牡蠣粉炒
椿根白皮各二兩蜜水炒
右爲末黃米煮飯爲丸如梧子大每服五六十丸

空心黃酒送下

二氣丹

治赤白帶下

舶硫黃鍮化傾水中如此七次　硃砂　官桂

乾薑各一兩炮　大附子麪包煨去皮五錢

鹿茸二兩酥炙　麝香一錢

右爲末酢糊爲丸如梧子大每服三十丸空心鹽湯送下如虛勞發熱先以四物湯四錢小柴胡湯六錢合和煎服後用十全大補湯

又方

治婦人赤白帶下上熱下寒口出惡氣咽乾牙痛耳鳴上下流注疼痛發熱惓寒口吐酸水嘈雜惡心心腹氣痛時下五色相雜來而無度面黃肌瘦不思飲食

當歸　川芎　赤芍　生地　陳皮　半夏薑炒

茯苓　蒼朮米泔浸炒　香附童便浸炒　柴胡

升麻　黃芩酒炒　丹皮　甘草

右剉生薑煎服一方加地榆尤良

下焦藥（治法彙）

治臍下寒痛如冰

三柰　川烏　大椒各五分　全蠍三箇　柴胡

羌活各二錢　白礬枯三分　升麻二分　大蒜

破故紙與蒜同焙各一錢　麝少許

右爲末煉蜜丸彈子大綿裹留係在陰外內陰中導痰丸（元戎方）

帶下有痰者兼服此

甘遂製　百藥煎各二兩　全蝎　殭蠶各一兩

大半夏六兩分作三分一分用白礬一兩爲末浸水一分用肥皂角爲末浸水一分用巴豆肉一百粒爲末浸水餘藥在下半夏在上浸至十日或半月要常動水令二藥相透次相合處揀去巴豆并皂角將餘水以慢火煮令水乾取出半夏切揚碎曬乾或陰乾亦佳

右爲細末薄糊丸如梧子大每服十九或十五九亦量人虛實白湯下

萬靈膏藥（醫貫）

治元氣虛弱女人赤白帶下子宮虛冷血山崩等證貼丹田熨一百二十手

香油四斤　白芷　赤芍　大黃　黃連　白芍

兩頭尖　草烏　元參　川芎　生地　川椒

胎髮頭生男者　穿山甲　熟地　杏仁　槐角

黃蘗各一兩　歸尾二兩　木鼈子五十箇去殼

黃香十二兩化開傾米泔水九次　蓖麻子去殼

巴豆各一百二十粒去殼

以上各咀片入油內浸春五日夏三日秋七日冬十日取傾鍋內熬枯黑色濾去查將淨油入鍋文武火熬滴水成珠方細退火黃丹二斤飛過焙乾徐徐下以槐柳桃杏楮各二枝不住手攪再下黃香去火少冷又下後細藥攪勻將好瓶貯之放水內浸一七出火氣用時放滾水內頓化攤開細藥刻後

阿魏　丁香　沉香各一兩　麝香二兩　血竭

孩兒茶　乳香　沒藥各三兩　珍珠製五錢

琥珀三錢

右各爲極細末入前膏內

七味白朮散（醫貫下同）

治帶下中氣虛口乾或吐瀉等證用此加減

人參　白朮　木香　甘草　藿香　白茯苓

乾葛各一錢

右作一劑水煎服

人參黃芪湯

治帶下氣血虛并血下不止等證用此加減

人參　黃芪炒　當歸　白朮炒　白芍炒

艾葉各一錢　阿膠炒二錢

右作一劑水煎服

六味丸

一名地黃丸治帶下兼腎虛發熱作渴唾痰小便淋瀝頭運眼花咽燥脣裂齒不堅固腰腿酸等證用此兼服

熟地黃八兩　山萸　山藥各四兩　白茯苓

澤瀉　丹皮各三兩

右煉蜜丸梧子大食前服

加味逍遙散

治帶下肝家有熱者用此加減

甘草炙　當歸炒　芍藥酒炒　茯苓　白朮炒

柴胡各一錢　丹皮　山梔炒各五分

右水煎服

補宮丸（萬氏下同）

治帶下下元虛脫者用此固之

鹿角霜　白茯　白朮　白芍　白芷　龍骨煅

牡蠣煅童便淬　山藥炒　赤石脂煅各等分

乾薑炒減半
右酢糊丸空心米飲下
三補丸
治赤帶兼服此丸
黃芩　黃連　黃檗各炒等分
右蜜丸白湯下
四物加芩連湯
帶下熱盛者用此
四物湯　赤芍　黃芩炒　黃連炒各一錢
甘草生五分
右水煎服
加味六君子湯
治白帶
陳皮　半夏泡　蒼术泔水浸　人參各一錢
白术一錢五分　白茯一錢二分　炙草七分
升麻　柴胡各五分
右薑水煎服
震靈丹
一名紫金丹治婦人血氣不足崩漏虛損帶下虛冷胎臟無子
滴乳香另研　五靈脂　沒藥並去砂石各二兩
朱砂飛一兩　禹餘糧火煅酢淬手撚得碎爲度
紫石英　代赭石如禹餘糧炮製　赤石脂以上四味並作小塊入鍋內鹽泥固濟候乾用炭十斤煆通紅火盡爲度入地埋出火毒二宿
右爲細末以糯米粉煮糊爲丸如鷄頭實大曬乾出火每一丸空心酢湯下
如有孕不可服
和劑固陽丸　準繩
治帶下不止間用養血固血藥煎湯吞此
黑附子炮三兩　川烏頭炮二兩　白龍骨一兩
補骨脂　船上茴香　川楝子各一兩七錢
右爲末酒糊丸如梧子大每服五十丸空心溫酒送下
人參順氣散　婦人良方
証治要訣治赤白帶下用順氣散恐卽此
人參　川芎　桔梗　白术　白芷　麻黃去節
陳皮　枳殼　烏藥　白薑炮　甘草炙各一錢
右水二鍾煎至一鍾或爲細末食前用甘草湯調服
加減人參黃芪湯　醫統
治帶下虛滑之證
人參黃芪湯　芍藥酢炒　牡蠣粉　禹餘糧
右分兩隨宜水煎服
楊皮丸　準繩　下同
治赤白帶有濕熱者
芍藥五錢　艮薑三錢燒灰　黃檗二錢炒成炭
椿根皮一兩半
右爲末粥丸每服三五十丸空心米飲吞下
又方
治赤白帶因濕熱勝而下者
滑石炒　蒼术鹽炒　白芍各一兩　椿根皮炒
乾薑煨各二兩　地榆半兩　枳殼　甘草各三錢
右爲末用粥和丸米飲下
又方
治帶下
椿根皮二兩　神麯炒　蒼术泔浸　青皮麪炒
黃檗炒各一兩　芍藥兩半　滑石　枳殼各半兩
右爲末糊丸桐子大每服五十丸空心下
固腸丸
治濕氣下利大便血白帶去脾胃陳積之後用此以燥下濕亦不會單用看病作湯使
椿根皮
右爲末粥糊爲丸服按此藥性凉而燥須炒用一方加滑石一半
又方
治白帶因七情所傷脈數者
黃連炒　側柏葉酒蒸　黃檗炒各半兩　白芍
香附子酢炒　白术炒各一兩　白芷燒存性
木香各三錢　椿根皮二兩炒
右爲末飯粥爲丸米飲湯送下
已上五方治帶俱用椿皮乃凉燥之劑濕熱盛者宜之後一方有黃連香附木香故可治七情所傷
乳香散
治赤白帶下
草果一枚去皮入乳香一小塊用麵餅裹火炮焦黃
畱性取出和麵用之
右爲細末每服二錢陳皮飲調下重者三錢
伏龍肝散
治赤白帶下久患不瘥庇悴乏力六脉微濡
伏龍肝炒令煙盡　屋梁上懸塵炒令煙盡

樸櫚燒赤存性
右並出火毒等分研勻入腦麝各少許每服三錢溫酒或淡醋湯下患十年者半月可愈

馬蹄丸
治白漏不絕
白馬蹄　禹餘糧各四兩　龍骨三兩　白殭蠶
鴛鴦魚骨　赤石脂各二兩
右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十丸空心酒送下不止加三十丸

白芷散
治赤白帶下
白芷二兩　海螵蛸二箇煅　胎髮一箇煅
右爲細末空心溫酒調下二錢

牡蠣散
治帶下兼經水過多或暴下血片不限年月遠近
牡蠣　龍骨　赤石脂並煅　肉蓯蓉酒浸切焙
石斛　鴛鴦骨去甲　黃芪各兩半　牛角鰓灰
阿膠炒　熟地黃焙　芍藥炒各二兩　乾薑炮
人參　白朮　桑耳　當歸焙各一兩二錢半
芍藥　附子炮去皮臍　柱心　艾葉炒各一兩
右爲細末每服三錢平旦米飲調服日再

補宮丸（出溪）
治白帶及白淫
鹿角霜　白茯苓　白芍　白朮　龍齒　魚骨
白芍藥　牡蠣煅　白薇　山藥各等分
右爲末糊丸梧子大米飲下五十丸

白蘞丸（出婦）

治婦人赤白帶下久不瘥肌瘦悴黃及經年崩漏不止諸藥不效脈濡微與前伏龍肝散兼服即愈
白蘞四兩　附子二兩　黃狗頭骨四兩燒灰
右爲末粥丸桐子大每服三十九

補真潤腸湯
一名助陽湯治白帶下陰戶中痛控心面急痛面黃皮緩身重如山陰中如氷
柴胡一錢二分　良薑二錢　白葵花七朵
防風　椰李仁　乾薑　甘草各一錢　陳皮
生黃芩各五分
右爲細末只作一服水二盞煎至一盞去滓食前熱服按葵花椰李仁之滑以潤燥蓋枯澗滯蓄者宜之

又方（出溪下同）
治白帶
龜板炙　椷子各二兩　黃蘗二兩炒　香附子
山茱萸肉　苦參　楮根白皮　貝母各半兩
白芍藥七錢半　乾薑炒二錢半
右爲末以酒糊爲丸空心米飲下

又方
治赤白帶
龜板塗酒炙二兩　黃蘗炒一兩　乾薑炒一錢
椷子二錢半
右爲末酒糊爲丸日二服每服七十丸

又方
治帶下脈數者
枸杞根一斤　生地黃五兩
右二味以水一斗煮取五升分三服已上三方治帶用龜板黃蘗地黃蓋腎水真陰虛者宜之

白薇丸（濟生方）
治室女衝任虛寒帶下純白
鹿茸酒蒸焙二兩　白薇　狗脊燎毛製各一兩
右爲細末艾煎醋汁打糯米糊丸如梧子大每服五十丸空心溫酒送下

當歸煎（準繩下同）
治赤白帶下腹內疼痛不欲飲食日漸羸瘦
當歸酒浸　赤芍藥　牡蠣火煅取粉　白芍藥
阿膠　熟地黃酒蒸焙　續斷酒浸各一兩
地榆半兩
右爲末醋糊丸如梧子大每服五十丸空心米飲下

茯苓散
治婦人血傷傘帶下積久不止面黃體瘦漸成虛勞腰腳沉重胎氣多損
白茯苓　菖蒲　木香　熟地黃焙　阿黎勒皮
柏子仁研　杜仲炙　青橘皮去白焙　赤石脂
鴛鴦魚骨去甲　五加皮判　艾葉燒灰　秦艽
牛角鰓灰　兔絲子酒浸另搗　當歸焙各一兩
右爲細末每服二錢溫酒調下糯米飲亦得如有胎息用鯉魚糯米粥下藥

卷柏丸
治婦人室女腹藏冷熱相攻心腹絞痛腰腿疼赤白帶下面色痿黃四肢羸乏

卷柏酢炙　鹿茸酢炙　桑寄生　艾葉酢炒
白石脂　赤石脂　代赭石各火煅酢淬七次
當歸酒浸炒　芎藭　鼈甲酢炙　地榆各一兩
木香不見火　龍骨各半兩　乾薑炮七錢半
黃芪蜜炙　熟地黃洗各一兩半
右爲細末酢煑糯米糊和丸如梧子大每服七十丸空心米飲送下

艾煎丸

治婦人一切虛寒胎前產後赤白帶下或成血瘕久服此藥自然融化
伏道艾葉去塵土枝梗先用大棗肉十二兩煑爛同艾葉搥爛如泥捻作薄餅猛火焙乾急碾爲末
漢椒去目枝梗及合口者秤各五兩以阿膠二兩米酢三升同椒於砂瓶內煑極乾取出焙乾燥爲末
當歸酒浸　川芎　白薇　附子大者炮去皮臍
白芍藥　卷柏取青葉　澤蘭葉去枝梗各焙乾
熟地黃淨洗漉去浮者曬乾酒浸蒸曬再入酒浸蒸五七次如糖煎香美方可用亦焙乾秤各缺兩
右同爲細末與前艾末椒末拌勻米酢煑糊和丸如梧桐子大每服五七十丸至百丸二百丸空心艾酢湯送下

沉香牡丹丸

治婦人血海久虛經候不利赤白帶下血氣衝心多發刺痛四肢煩困
沉香七錢半　牡丹皮　赤芍藥　當歸　巴戟
吳茱萸湯泡去苦炒　桂心　黃芪蜜炙　川芎
人參　茯苓　山藥　橘紅　乾生薑　白龍骨
木香　白朮　牛膝酒洗　枳殼麩炒　肉豆蔻
厚朴製各半兩
右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心溫酒下若心腹痛白芷煎酒下

紫桂丸

補益血海治衝任氣虛經脉不調腰痛腹痛冷帶崩漏
禹餘糧火煅酢淬七次三兩　龍骨　艾葉酢炒
赤石脂　牡蠣煅　地榆各二兩　厚朴　當歸
牡丹皮　阿膠蛤粉炒成珠子　吳茱萸湯洗
香白芷　肉桂去粗皮各一兩　附子炮半兩
右爲末麵糊爲丸梧桐子大每服三十丸濃煎酢湯下

固眞丸

治白帶久下不止臍腹冷痛其寒捫之如冰陰中亦然目中溜火上壅視物䀮䀮無所見齒皆惡熱飲即痛須得黃連末擦之其痛乃止惟喜乾食大惡湯飲
白石脂燒赤水飛研細曬乾　柴胡各一錢
白龍骨酒煑水飛曬乾二錢　當歸酒洗三錢
乾薑炮四錢　黃蘗酒洗　白芍各五分
右爲細末水煑稀糊爲丸如鷄頭大每服三十丸空心宿食消盡煎白沸湯放溫送下無令胃中停住待少時以早膳壓之是不令熱藥犯胃忌生冷硬物與酒濕麵按石脂龍骨之澀以去脫也蓋濕多滑脫者宜之

茅花散

治婦人血崩不止赤白帶下
茅花一握　棕櫚樹皮三寸　嫩荷葉三張
甘草節二寸
右爲細末空心酒調半匙服

苦楝丸

治婦人赤白帶
苦楝碎酒浸　茴香炒　當歸各等分
右爲末酒糊丸每服三五十丸空心溫酒下
如腰腿疼四物湯四兩加羌活防風各一兩煎湯送下

地榆膏

治赤白帶下骨立者
地榆一斤
右用水三升煎至一半去查再煎如稠餳絞淨空心服三合日二服一方用地榆三兩酢水煎服按治帶用地榆寒澀之劑也亦濕熱盛而滑脫者宜之又方書云地榆本血分之藥而其性寒故凡血分有熱而妄行者能止之非澀劑也

豆花散

治婦人白崩
白扁豆花焙乾
右爲末炒米煑飲入燒鹽空心服數次即效紫花勿用

調經補眞湯

冬後一月微有地泥水泮其白帶再來陰戶中寒一服立止大進飲食
麻黃五分不去節　人參　白朮　當歸　黃芩

升麻根　甘草炙各五分　杏仁三枚　澤瀉
艮薑各一錢　黃芪七分　桂枝少許　乾薑炮
蒼朮各二分　柴胡　羌活各四分　防風
獨活　藁本各二分　白葵花七朵去蕚
右除黃芩麻黃外都爲粗末先將水二盞煎麻黃
一味令沸掠去沫入餘藥同煎至二盞再入生黃
芩煎至一盞去查稍熱服空心宿食消盡日高服
之一時許可食早膳
本事地黃丸準繩下同
治婦人月經不調每行數日不止兼有白帶漸漸
瘦悴飲食少味累年無子
熟地黃二兩　山茱萸　白蕪荑　白芍藥微炒
乾薑　代赭石火鍛醋焠各一兩　厚朴薑炙
白礬煅各半兩
右細末煉蜜丸桐子大每服四五十丸空心酒下
日三服此龐老方也
桂附湯
治白帶腥臭多悲不樂大寒
肉桂一錢　附子三錢　黃蘗　知母各五分
右爲粗末作一服水二盞煎至一盞食遠熱服
如少食常飽有時似腹脹加白芍藥五分
如不思飲食加五味子二十箇
如煩惱面上痲木如蟲行乃胃中元氣極虛加黃
芪一錢人參七分甘草二分升麻五分
香附六合湯
治赤白帶下
四物湯　茴香　桂　香附
右同煎服
又方
治赤白帶下年月深久不瘥
白芍藥二兩　乾薑半兩
右各炒黃色同爲末空心米飲調下二錢日二服
二豆散
治耳鳴心躁腰脚疼重腹內虛鳴臍下虛冷頻下
白水如泔渾濁
白豆蔻　肉豆蔻　丁香　茯苓　巴戟　丁皮
蒼朮　黑附子炮　杜仲各一兩　人參　白朮
山藥　桔梗　茴香　粉草各半兩
右剉碎每服三錢水一盞半生薑二片紫蘇葉三
片同煎至七分去查空心溫服
鶴頂丸
治室女經水初下或浴冷水或熱而扇或當風及
婦人陰陽過多血水相連而下并產後帶下
當歸七錢半酒浸　附子半兩炮去皮　乾薑炮
龍骨鹽泥煅　吳茱萸湯泡　赤石脂醋煅火淬各
一兩半　牡蠣一兩三錢鹽泥煅　艾葉一兩醋炙
右爲細末研勻醋糊和丸如梧子大以赤石脂末
爲衣每服五十丸空心用艾葉鹽湯或烏梅煎湯
下
白堊丸濟生方
治婦人白帶久而不止腰膝冷痛日漸羸困
白堊煅　禹餘糧　鼈甲　鷄鳅骨各用醋淬炙
當歸酒浸　鵲巢灰　乾薑　附子炮　狗脊製
紫石英醋煅淬七次　川芎　鹿茸醋炙各一兩
香附醋煮二兩
右爲末用醋煮糯米糊丸如梧子大每服七十丸
溫酒下
養氣活血丹準繩下同
治勞傷衝任赤白帶下
大艾葉炒焦取五兩　乾薑炒末二兩半　附子
白芍藥　白朮　橘紅　川芎　當歸　人參
巴戟去心搗米炒　五味子各二兩
右將乾薑艾二味用醋二升無灰酒二升生薑自
然汁二升將乾薑艾末調於銀器內用慢火熬成
膏將下附子等九味爲細末入前膏內拌炒熱熟
白麵二兩半和爲劑杵千下丸梧子大每服五十
丸溫酒或米飲下
茱萸浴湯
治下焦虛冷臍腹疼痛帶下五色月水崩漏淋瀝
不動
吳茱萸湯泡　杜仲炒去絲　蛇牀子　五味子
丁皮各一兩　木香　丁香各半兩
右剉如麻豆大每用半兩以生絹袋盛水三大碗
煎數沸乘熱熏下部通手淋浴早晚二次煮洗
坐藥龍鹽骨
治同上
丁香　木香　川烏頭炮各一錢半　全蠍五枚
龍骨　歸尾　茴香　炒黃鹽　酒防己　肉桂
紅豆各二錢　延胡索五錢　厚朴三錢　良薑
木通各一錢　枯礬半錢
右爲末煉蜜丸彈子大綿裹留繫在外納陰戶內

勝陰丹

爲上藥力小再取三錢內加行性熱藥

三奈子　川烏頭　大椒各五分　全蠍三個

柴胡　升麻　枯白礬　羌活各二錢　大蒜

破故紙與蒜同焙各一錢　甘松三分　麝香少許

右爲細末同前法用製

回陽丹

治同上

全蠍　升麻　甘松各二分　大椒　三奈子

華茇　枯礬各五分　草烏頭　羌活各三分

川烏頭　柴胡各七分　大蒜　破故紙各二錢

木蛭炒焦　蝱蟲各三枚去翅足炒　炒黃鹽二錢

右爲極細末依前法製如指尖大用縣裹納陰戶

中覺臍下煖爲效按炒黃鹽必用之藥去之則不

效

酒煮當歸丸

治癥瘕白帶下痠脚氣腰已下如在冰雪中以火

焙炕重厚綠衣蓋上猶冷不任面白如枯魚肌如

刀削小便不止與白帶長流而不禁固自不知覺

目青藍如菜色脣脣無所見身重如山行步欹側

不能安地腿膝枯細大便祕結口不能言無力之

極食不下心下痞煩心懊憹而停垢背惡寒噦噯

不止脈沉厥緊而澀按之空虛

當歸一兩　黑附子炮去皮臍　良薑各七錢

炒黃鹽　茴香　丁香各半兩　延胡索四錢

全蠍三錢　柴胡　升麻根　木香各二錢

苦楝子　甘草炙各五分

右將當歸茴香附子良薑四味剉如麻豆大以好

酒一升同煮生酒盡爲度炭火焙乾同爲極細末

又將炒黃鹽以下九味細末之共合一處拌勻酒

煮麵糊爲丸如桐子大每服二十丸空心宿食消

薄淡醋湯下忌油膩冷物酒麵

溫經湯

治曾經半產瘀血在少腹臍口乾燥帶下

吳茱萸三兩　當歸　芎藭　芍藥　人參

桂枝　阿膠　牡丹皮　生薑　甘草各二兩

半夏半升　麥門冬一升

右十二味以水一斗煮取三升分溫三服

一方用肉桂不用桂枝

按此方亦主婦人少腹寒久不受胎兼治崩中去

血或月水來過多及至期不來

益母散

治帶下赤白惡露下不止

益母草開花時採

右搗爲細末空心溫酒下二錢日三服

香礬散

治帶下

香附子不拘多少極醋浸一宿炒炭存性一兩

白礬二錢

右爲細末每服二錢米飲調服空心神效一法用

荷葉湯尤妙

塲珀丸

治赤白帶下不止

塲珀　續斷各二兩　安息香　麒麟竭　乳香

沒藥各半兩　故錦灰七錢半

右爲細末以蜜及安息香熬和藥末丸如菉豆大

每服二十丸食前溫酒送下

白芍藥散

治赤白帶久不止

白芍藥二兩　乾薑五錢

右各炒黃色爲末米飲調下二錢日二

神仙聚寶丹

治婦人血海虛寒外乘風冷搏結不散積聚成塊

或成堅癖及血氣攻注腹脅疼痛小腹急脹或虛

鳴噫吐涎沫頭旋眼花腿膝重痛面色痿黃肢體

浮腫月候欲行先若重病或多或少帶下赤白崩

漏不止驚怖健忘小便頻數或白時見虛熱盜汗

羸瘦此藥不問胎前產後室女並皆治之常服安

心去邪逐敗血養新血令有子

木香另研　琥珀另研　當歸焙　沒藥各一兩

滴乳二錢半研　麝香研　辰砂研各一錢

右爲末糯米糊杵爲丸每一兩作十五丸每一丸

溫酒磨下不拘時服

如胎息不順腹內疼痛一切產難酒和童便磨下

如產後血運敗血奔心口噤舌強或惡露未盡發

渴面浮煎烏梅湯和童便磨下

如室女月候不調溫酒磨下半丸

如產後血氣不調童便磨下

又方

治赤白帶下腰痛或小腹痛有熱者

棓皮二兩　延胡索　桃仁　側柏葉　川楝肉

茴香　當歸各半兩　香附八錢　官桂去粗皮
烏藥各三錢　麥皮麴一兩炒
右爲末酒糊爲丸每服五六十丸神效

麒麟竭湯 [illegible]

治婦人血傷赤白帶下小腹疼痛
麒麟竭另研　黃蘗去粗皮炙　地榆各一兩
禹餘糧火煅酢淬七次　赤芍藥炒各一兩半
熟地黃切炒四兩
右剉碎每服二錢水一盞煎至七分去查不拘時
服一方爲細末粥飲調下二錢一方用生乾地黃

白芷丸 人門

治帶下腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂至臍腹
更增冷痛此爲敗膿血所致須以此排膿
單葉紅蜀葵根二兩　白芷一兩　白芍藥
白枯礬各五錢
右爲末蠟丸梧子大空心米飲下十五丸俟膿盡
別以他藥補之如無葵根以蘇木節代之

當歸附子湯 [illegible]

治臍下冷痛赤白帶下
柴胡七分　良薑　乾薑　附子各一錢　升麻
蠍梢各五分　甘草炙六分　炒黃鹽三分
當歸二錢　黃蘗少許
右併爲細末用五錢水二盞煎至一盞去查熱服
爲丸亦得

又方 丹溪

治有孕白帶
蒼朮三錢　山茱萸去核　白芍藥各二錢半
黃芩炒　白芷各二錢　樗皮根炒　黃連炒
黃蘗炒各一錢半
右爲末糊丸空心溫酒下五十丸

單方

婦人白帶用酒及艾葉煮鷄卵日日食之 袖珍方
五色帶下白馬左蹄燒灰酒服方寸匕日三 外臺
婦人帶下羊胞一具以酢洗淨空心食之不過三次
忌魚肉滑物犯之即死 外臺
赤白帶下常炙豬腎食之 張文仲方
赤白帶下白果蓮肉江米各五錢胡椒一錢爲末烏
骨鷄一隻如常治淨裝木瓜於腹煮熟空心食之
女人白帶椿根白皮滑石等分爲末粥丸梧子大每
空腹白湯下一百丸
白帶不止槐花炒牡蠣煅等分爲末每酒服三錢取
效 摘元方
赤白帶下銅錢四十文酒四升煮取二升分三服 千金
下同
婦人帶下水和雲母粉方寸匕服立見神效
婦人白帶苦草煎湯服 本草
婦人白帶松香五兩酒二升煮乾木臼杵細酒糊丸
如梧子大每服百丸溫酒下 摘元方
五色帶下甑帶煮汁溫服一盞日二服 千金
赤白帶下炒黃荊子爲末酒調下二錢或米湯亦可 [illegible]
赤白帶下櫨子石菖蒲等分爲末每旦鹽酒溫服二
錢 經驗方
赤白帶下桑耳切碎酒煎服 圖經
赤白漏下礬石火鍊服之良 本草
赤白帶下禹餘糧火煅酢淬乾薑等分赤下乾薑錢
半爲末空心服二錢 勝金方
赤白帶下多年不止石燕每日磨汁飲之一枚用三
日以此爲準亦可爲末水飛過每日服之半錢至一
錢米飲服至一月諸疾悉平 本草
婦人白帶多因七情內傷或下元虛冷所致沙參爲
末每服二錢米飲調下 要訣
婦人五色帶下以麪作煎餅七箇安於燒赤黃古磚
上以黃苦蔞傅麪上安布兩重令患者坐之令藥氣
入腹熏之當有蟲出如蠶子不過三五度瘥
白帶沙淋白鷄冠花苦壺盧等分燒存性空心火酒
服之 摘元方
婦人白帶白芷四兩以石灰半斤淹三宿去灰切片
炒研末酒服二錢日二服 集成
赤白帶下月水不來用蛇牀子枯白礬等分爲末酢
麪糊丸彈子大臙脂爲衣綿裹納入陰戶如熱極再
換日一次 子和
赤白帶下苦參二兩牡蠣粉一兩五錢爲末以雄猪
肚一箇水三盌煮爛搗泥和丸梧子大每服百丸溫
酒下 [illegible]

赤白帶下年深諸藥不能療者用貫衆狀如刺蝟者一箇全用不剉只採去毛及花萼以好醋蘸濕慢火炙令香熟候冷爲末米飲空心每服二錢甚效婦人良方

白帶白淫風化石灰一兩白茯苓二兩爲末糊丸梧子大每服二三十丸空心米飲下集元方

赤白帶下夏枯草花開時采陰乾爲末每服二錢米飲下食前服家傳方

婦人白帶白鷄冠花曬乾爲末每旦空心酒服三錢

赤帶用紅者集效方

下血血崩或五色漏帶香附子去毛炒焦爲末極熱酒服二錢立愈昏迷甚者三錢米飲下亦可加煨灰本事方

赤白帶下及血崩不止者香附子赤芍藥等分爲末鹽一撮水二盞煎一盞食前溫服聖惠下同

婦人帶下臍腹冷痛面色痿黃日漸虛困用葵花一兩陰乾爲末每空心溫酒服二錢七赤帶用赤葵白帶用白葵

赤白帶下石菖蒲破故紙等分炒爲末每服二錢更以菖蒲浸酒調服日一婦人良方

赤白帶下三葉酸草陰乾爲末空心溫酒服二錢千金下同

崩中赤白帶下用墓頭回草一把酒水各半盞童尿半盞新紅花一捻煎七分臥時溫服日近者一服久則三服愈其效如神

赤白帶下蕎麥炒焦爲末鷄子白和丸梧子大每服五十丸鹽湯下日三服

女人帶下赤白薤白作羹食之

赤白帶下韭根擣汁和童尿露一宿空心溫服取效海上仙方

又方白扁豆炒爲末米飲調服二錢

女人帶下用韭子七升酢煮干沸焙研末煉蜜丸梧子大每服三十丸空心溫酒下

赤白帶下樗根皮二兩切以白酒一碗半煎一碗空心服之白帶用紅酒甚妙藥鑑

婦人赤帶下懸鉤子根皮濃煮汁飲之藏器

崩中赤白不問遠近取槐枝燒灰食前酒下方寸匕日二服深師方

婦人白帶百草霜一兩香金墨半兩研末每服三錢猪肝一葉批開入藥在內紙裹煨熟細嚼溫酒送之末煎方

崩中白帶用椒目末又用白芷石灰炒去灰爲末茜草少許粥丸服丹溪下同

又方用生狗頭骨燒灰存性或酒調服或入藥服

又方五靈脂半生半炒末之酒調服

崩中帶下訶黎勒和蠟燒煙熏之及煎湯熏洗本草

赤白帶下不問老稚孕婦悉可服取馬齒莧擣汁三大合和鷄子白二枚先溫令熱乃下莧汁微溫頓服之不過再作卽愈海上方

赤白帶下以猪肝一葉薄批擂著訶子末炙之再擂再炙盡末半兩空腹細嚼陳米飲送下本草

女子白帶陳冬瓜仁炒爲末每空心米飲服五錢救急易方

鍼灸

甲乙經曰婦人乳子下赤白腰俞主之

婦人下赤白沃後陰中乾痛惡合陰陽少腹膜堅小便閉曲骨主之一本作肩骨

婦人下赤白裹急癒癒五樞主之

女子下蒼汁不禁赤瀝陰中癢痛少腹控胁不可俯仰下節主之刺腰尻交者兩胂上以月死生爲痛數發鍼立已

女子疝瘕按之如以湯沃兩股中少腹腫陰挺出痛經水來下陰中腫或癢漉青汁若葵羹血閉無子不嗜食曲泉主之

千金方曰月事不利見赤白而有身反敗陰寒刺行間入六分灸三壯穴在足大趾間動脉應手

赤白裹急癒癒刺五樞入一寸灸五壯穴在帶脉下二寸

女人漏下赤白月經不調灸交信三十壯穴在內踝上五寸

女人漏下赤白灸營池四穴三十壯穴在內踝前後兩邊池中脉上一名陰陽穴一本是榮衛

女人漏下赤白四肢酸削灸漏陰三十壯穴在內踝下五分微動脚脉上

女人漏下赤白泄注灸陰陽隨年壯三報穴在足拇趾下屈裏長頭白肉際

李杲十書曰婦人赤白帶三陰交刺入五分灸三十壯

又法漏陰刺入五分灸三十壯穴在內踝下五分微有動脉

朱震亨心法曰婦人得子多變成白水淋瀝而下經久身面虛腫刺陰谷入二寸半
又法絕骨穴刺入二寸半
又法如喘滿刺魚際穴透太淵穴左右共四十九呼治肺經水氣極妙
證治準繩曰赤白帶刺中極入二寸半赤瀉白補白環俞一寸半瀉六吸補一吸
又法氣海中極白環俞三穴不效取陽交穴補多瀉少灸七壯又取三陰交
又法下白帶不已漸漸如蟲取氣海穴六分中極委中二穴各五分赤帶如法
又法下白帶不已漸漸如蟲取曲骨承陰二穴各七分中極六分穴在兩旁柱骨下赤帶如法
又法四花穴治赤白帶如神

醫案

儒門事親曰息城李左衙之妻病白帶如水窈漏中綿綿不絕穢臭之氣不可近面黃食減已三年矣諸醫皆云積冷起石硫黃薑附之藥重重燥補汚水轉多常以衲日易數次或用一藥以木炭十斤置藥在坩鍋中鹽泥封固三日三夜炭火不絕燒令通赤名曰火龍丹服至數升汚水彌甚灼艾燒針三年之間不可勝數戴人斷之曰此帶濁水本熱乘太陽經其寒水不可勝如此也夫水自高而趨下宜先絕其上源乃涌痰水二三升次日下汚水十餘行三遍汗出周身至明旦病人云汚已不下矣次用寒涼之劑服及半載產一子內經曰少腹冤熱溲出白液帶之爲病溶溶然若坐水中故治帶下同治濕法瀉利皆宜逐水利小溲勿以赤爲熱白爲寒今代劉河間書中言之詳矣

頃頓丘一婦人病帶下連綿不絕白物或來已三年矣命予脈之診其兩手脈俱滑大而有力得六七至常上熱口乾眩運時嘔酢水余知其實有寒痰在胃中以瓜蒂散吐出冷痰二三升皆酢水也間如黃涎狀如爛膠次以禁粥養其胃氣又次用導水禹功以瀉其下然後以淡劑滲泄之藥利其水道不數日而愈

丹溪心法曰胡安人患白帶下月經甚多食少倦怠面黃經中有如血塊者有如筋膜者與參朮等補血氣調脾胃後諸證皆退惟帶未止以椿皮丸主之而愈

薛氏醫案曰一婦婦腹脹脅痛內熱晡熱月經不調肢體痠痲不時吐痰或用清氣化痰之藥喉間不利帶下青黃腹脅膨脹又用行氣之劑胷膈不利肢體如痲此乃鬱怒傷損肝脾朝用歸脾湯以解脾鬱生脾氣夕用加味逍遙散以生肝血清肝火百餘劑而愈

一婦人頭運吐痰胃滿氣喘得食稍緩苦於白帶二十餘年矣諸藥不應此氣虛而痰飲也痰飲愈而帶自愈遂朝用六君子湯夕用六味地黃丸不一月而驗

一婦人耳鳴胃痞內熱口乾喉中若有核吞吐不利月經不調兼之帶下余以爲肝脾鬱結用歸脾湯加半夏山梔升麻柴胡間以四七湯下白丸子而愈

一婦人吞酸飽滿食少便泄月經不調服清氣化痰丸兩膝漸腫寒熱往來帶下黃白面痿體倦此脾胃俱虛濕痰下注用補中益氣倍用參朮加茯苓半夏炮薑而愈

一婦人帶下四肢無力余曰四肢者土也此脾胃虛弱濕痰下注以補中益氣濟生歸脾二藥治之而愈

一婦人帶下黃白怒則胷膈不利飲食少思或用消導利氣之藥痰喘胷滿大便下血余曰此因脾氣虧損不能攝血歸源用補中益氣加茯苓半夏炮薑四劑頓減又用八珍加柴胡山梔而痊

一婦人年踰六十內熱口乾勞則頭運吐痰帶下或用化痰行氣前證益甚飲食益少肢體或痲服祛風化痰之劑肢體常痲手足或冷或熱日漸消瘦余曰此證屬脾氣虛弱而不能生肺祛風之劑復損諸經也當滋化源遂用補中益氣加茯苓半夏炮薑二十餘劑脾氣漸復飲食漸加諸證頓愈

證治準繩曰雪翁妻年三十餘十八胎九殤八夭會因事驚憂過甚遂昏昏不省人事口唇舌皆痛或至封喉下部虛脫白帶如注如此四十餘日或時少醒至欲自縊自悲不能堪醫或投涼劑解其上則下部疾愈甚或投熱劑及以湯藥熏蒸其下則熱運欲絕四肢還脈之始知爲亡陽證也急以鹽煮大附子九錢爲君制以薄荷防風佐以薑桂芎歸之屬水煎入井冰冷與之未盡劑鼾呼熟睡通宵覺卽能識人時

止一嗣于二女相抱痛哭珠玻皆悲執友趙憲長驚曰君何術也弟曰方書有之假對假眞對眞耳上乃假熱故以假冷之藥從之下乃眞冷故以眞熱之藥反之斯上下和而病解矣癒後主以女金丹錯綜以二三方不但去其疾且調治元氣庚午生一子壬申生一子去年又患瘧疾十三月亦主以養元氣調生氣待飲食大進然後劫以毒藥吐下塊物甚多投以附子湯三錢而愈不責效旦暮間其用女金丹卽勝金丸也得之異人倍加香附而視氣血之偏者又加薑黃條芩倍川芎之屬取效甚多予念無子者往往有之翻思予得子之難其苦何如乃次第錄其方幷女金丹以濟人

陶遵道外姑年七十形瘦善啖病白帶食前薑湯吞大補丸五十丸一二次午膳後及臨臥時各與小胃丹十五丸愈

一婦人因產後虛寒嘔惡不食腹痛如割時作寒熱復出盜汗瘦悴骨立臍腹之左結成硬塊其大如掌冰冷雖盛暑此處獨無汗每塊微動則痛不可忍百藥治不效夢中忽有人授以艾煎丸方因服之惡心寒熱盜汗輒止盡一料遂平復獨血塊如故服至五六料其塊自融化而出如魚凍

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百十九卷目錄
醫部彙考三百九十九
婦人諸乳疾門
宋寶漢卿瘡瘍全書乳病證治
陳自明婦人良方乳病證治
張從政儒門事親治法
朱震亨格致餘論乳硬論
樓英醫學綱目痰證　論證治法
李梴醫學入門總論　論證治法
薛己醫按　治法
陳實功外科正宗總論
張介賓景岳全書　病證治
方　加味逍遙散　甘桔湯　解毒湯　不換金正氣散　金元散　補中益氣湯　四君子湯　八物湯　十全大補湯　歸脾湯　逍心散　一醉膏　保元湯　聖散　歸脾湯　古庄日散　內托升麻湯　托裏消毒散　內托十宣散　瀉黃散　又方　金銀花露　藥湯　冰蛤散　生肌玉紅膏　通氣散　金甘菊飲　解毒湯　丹溪方　薄荷散　皂角散　牛蒡子湯　張氏橘皮湯　勝金丹　雞鳴散　又方　東垣方　瓜蔞散　清肝解鬱湯　竹葉湯　加味歸脾湯　完帶湯　柴胡清肝湯　加味逍遙散　黃芪六一湯　木香調氣散　又方　加味四物湯　加味四君子湯　加味六君子湯　又方　單行龍骨丸　甘草湯　又方　單行石膏湯　又方　單行龍骨丸　甘草湯　又方　單行龍骨丸　十七味　丸散俱佳
單方
鍼灸
醫案

宋寶漢卿瘡瘍全書

乳病證治

乳房屬陽明經乳頭屬厥陰經此毒因驚憂鬱結乳間成癰初起二三日即用鹿角散酒調服外用金箍散蜜水調敷若不能消急用荊防敗毒散加苦蘆子天花粉不散服內托散加白芍藥金銀花
外吹乳者小兒吮乳吹風在內故也內吹乳者女人腹中有孕其胎兒轉動吹風在外故也煎藥中須用保胎之劑以治乳發之藥同治之
皂角散治乳癰及乳疼用皂角一條燒灰蛤粉三錢乳香一錢末之酒調下以手揉乳令散外用金箍散傅之或內服復元通氣散已潰者用人參黃芪貝母白朮之類
妳媽因女子十五六歲經脈將行或一月二次或過月不行致生此疾多生寒薄氣體虛弱宜服敗毒散加地黃再服黃蘗丸其毒自散不致損命每乳上只有一核可治若串成三四個即難療也治法逍遙調經湯開鬱順氣解毒湯加減用之
乳巖乃陰極陽衰血無陽安能散致血滲於心經即生此疾若未破可療已破即難治捻之內如山巖故名之早治得生遲則內潰肉爛見五臟而死未破用綱毒流氣飲加紅花酥木生地熟地青皮甘草小柴胡苦蘆仁
陳自明婦人良方

乳病證治

婦人乳汁乃氣血所化若元氣虛弱則生子乳汁短少初產乳房嫩脹此乳未通若怒氣乳出此肝經風熱若累產無乳此內亡津液蓋乳汁資於衝任若婦人疾在衝任乳少而色黃者則怯弱而多疾

前證若氣血虛弱而不能化生宜壯脾胃怒動肝膽而乳腫汁出宜清肝火夫乳汁乃氣血所化在上爲乳在下爲經若屢產無乳或大便澀滯當滋化源

按大全凡婦人乳汁或行或不行者皆由氣血虛弱經絡不調所致也乳汁勿令投於地蟻食之令乳無汁若乳盈溢可潛東壁上佳或有產後必有乳若乳雖脹而產後畀作者此年少之人初經產乳有風熱耳須服清利之藥則乳行若累經產而無乳者亡津液故也須服滋益之藥以動之若雖有乳却又不甚多者須服通經之藥以動之仍以羹臛引之蓋婦人之乳資於衝脈與胃經通故也有屢經產而乳汁常多者亦婦人血氣不衰使然也

產後乳汁自出乃胃氣虛宜服補藥止之若乳多滿痛用溫帛兜之未產而乳自出謂之乳泣生子多不育

註前證若氣血俱虛用十全大補湯肝經血熱用加味逍遙散肝經怒火用四物參术柴梔肝脾鬱怒用加味歸脾湯

按大全產後乳汁自出以漏蘆散治之亦可

產後吹乳因兒飲乳口氣所吹令乳汁不通壅結腫

痛不急治多成癰速服苦蘡散及敷南星更以千捵散之

按前證用藥切不可損其氣血治驗詳乳癰乳巖下

按大全產後吹妳者因兒喫妳之次兒忽自睡呼氣不通乳不時洩畜積在內遂成腫鞕壅閉乳道津液不通傷結疼痛亦有不癢不痛腫鞕如石名曰吹妳若不急治腫甚成癰產後吹妳最宜急治不爾結癰逮至死者速服皂角散苦蘡散傳以天南星散以手捵之則散矣

妬乳因兒未能飲餘乳畜結以致腫痛初不吮通之必致成癰若乳頭生瘡浸淫名妬乳宜赤龍皮湯大麻湯飛烏膏飛鳥散傳以黃連胡粉散

乳盛或無子飲乳以致腫痛炒大麥芽煎服其乳即散若成瘡當從乳癰類治若皮膚浸淫成瘡當用本方

按大全妬乳者由新產後兒未能飲之及乳不洩或乳脹捏其汁不盡皆令乳汁畜結與血氣相搏即壯熱大渴引飲牽强掣痛手不得近是也初覺便知以手捋捏去汁更令旁人助吮引之不爾或作瘡有膿其熱盛必成癰也輕則爲吹乳妬乳重則爲癰雖有專門不可不知

乳癰乳巖經曰乳頭屬足厥陰肝經乳房屬足陽明胃經若乳房忽壅腫痛結核色赤數日之外漸痛脹潰膿湧出膿盡而愈此屬膽胃熱毒氣血壅滯名曰乳癰爲易治若初起內結小核或如鼈棋子不赤不痛積之歲月漸大巖巖崩破如熟石榴或內潰深洞血水滴瀝此屬肝脾鬱怒氣血虧損名曰乳巖爲難療治法漸痛寒熱宜發表散邪腫漸痛甚宜疎肝清胃或不作膿膿成不潰宜用托裏或肌肉不生膿水清稀宜補脾胃或膿出反痛惡寒發熱宜補氣血或腫漸作痛脈熱內熱宜補陰血或飲食少思時作嘔吐宜補胃氣或飲食難化泄瀉腹痛宜補脾氣或勞碌腫痛宜補氣血怒氣腫痛宜養肝血慎不可用尅伐之劑復傷脾胃也乳巖初患用益氣養榮湯加味逍遙加味歸脾可以內消若用行氣破血之劑則速其亡

元張從政儒門事親

治法

夫婦人有本生無乳者不治或因啼哭悲怒鬱結氣溢閉塞以致乳脉不行用精猪肉清湯調和美食於食後調益元散五七錢連服三五服更用木梳梳乳周回百餘遍則乳汁自下也

又一法用猪蹄湯調和美味服之乳汁亦下或用熟猪蹄四枚食之亦效

夫乳癰發痛者亦生於心也俗呼曰吹乳是也吹者風也風熱結薄於乳房之間血脉凝注久而不散潰腐爲膿也可用一法禁之呪曰謹請東方護司族吹妳是灰妳子右用之時當先問病人曰甚病病人答曰吹妳取此氣一口但吹在兩手坎字文上用大拇指緊捏定面北立一氣念七遍吹在北方如此者三遍若作法時以左右二婦人面病人立於病乳上痛揉一二百數如此亦三次則愈

朱震亨格致餘論

乳鞕論

乳房陽明之經乳頭厥陰所屬乳子之母不知調養怒忿所逆鬱悶所遏厚味所釀以致厥陰之氣不行故致不得通而汁不得出陽明之血沸騰故熱甚而化膿亦有所乳之子腸有滯痰口氣熾熱含乳而睡熱氣所吹遂生結核於初起時便須忍痛揉令稍軟吮令汁透自可消散矣失此不治必成癰癤治法疏厥陰之滯以青皮清陽明之熱以細研石膏行汗濁之血以生甘草之節消腫導毒以苦蘡子或加浚藥青橘葉皂角刺金銀花當歸或湯或散或加減隨意消息然須以少酒佐之若加以艾火兩三壯於腫處其效尤捷彼庸工喜於自衒便用針刀引惹抽痛良可哀憫若夫不得於夫不得於舅姑憂怒抑鬱朝夕積累脾氣消沮肝氣橫逆遂成隱核如大棋子不痛不癢數十年後方爲瘡陷名曰妳巖以其瘡形嵌凹似巖穴也不可治矣若於始生之際便能消釋病根使心清神安然後施之以治法亦有可安之理

明樓英醫學綱目

病因

乳鞕病多因厚味濕熱之痰停畜膈間與滯乳相搏而成又有滯乳因兒口氣吹噓而成又有抑怒氣激滯而生者煆石膏燒檸皮苦蘡子甘草節青皮皆神效藥也婦人此病若早治之便可立消有月經時悉是輕病五六十後無月經時不可作輕易看也

李梴醫學入門

總論

婦人之乳與男子之腎同皆性命根也煩渴嘔吐者

膽胃風熱也甚則毒氣上衝咽膈妨碍寒熱者肝邪也此皆表證宜不換金正氣散加天花粉能止渴嘔定寒熱咽膈有碍者甘桔湯加生薑或薤心散如潰後見此四證爲虛

治婦人乳疾與男子微異者女損肝胃男損肝腎故也婦人胎產後亦有肝虛者

論證治法

乳房結核乃飲食厚味忿怒憂鬱以致胃火上蒸乳房汁化爲濁膿肝經氣滯乳頭竅塞不通致令結核不散痛不可忍初起便宜用隔蒜灸法切忌針刀能飲者一醉膏加芎歸各一分一服兩服即效不能飲者苦蘡散

結核亦有氣血虛弱略被外感內傷以致痰涎凝滯俱以古庄貝散爲主血虛合四物湯更加參朮柴胡升麻氣虛合四君子湯更加芎歸柴胡升麻憂思傷脾者歸脾湯加苦蘡根貝母白芷連翹甘草節水酒各半煎服有鬱火結核腫痛甚者清肝解鬱湯吹乳因乳子腦有漿滯口氣熱含乳而睡風熱吹入乳房凝滯不散作痛初起須忍痛揉令稍軟吸取竅通自可消散不散宜益元散令薑湯或井水調一日一服至三五七次自解重者解毒湯頓服之挾氣者古庄貝散單青皮湯外用漏蘆爲末水調敷又有乳汁不行停乳作痛者湧泉散

乳癰乃結核久內脹作痛外腫堅鞕手不可近謂之乳癰未潰者仍服苦蘡散內托升麻湯或復元通聖散加蒌蘆盧者托裏消毒散將潰兩乳間出黑頭瘡項下作黑暈者內托升麻湯已潰寒熱者內托十宣散少食口乾者補中益氣湯哺熱內熱者八物湯加五味子胃虛嘔者六君子湯加香附砂仁胃寒嘔吐或瀉者六君子湯加乾薑藿香遇勞腫痛者八物湯倍參芪歸朮遇怒腫痛者八物湯加山梔

乳巖乃鬱怒有傷肝脾結核如簸棋子大不痛不癢五七年後外腫紫黑內漸潰爛名曰乳巖傷盡氣血方死急用十六味流氣飲及單青皮湯兼服虛者只用清肝解鬱湯或十全大補湯更加清心靜養庶可苟延歲月經年以後必於乳下潰一穴出膿及中年無夫婦人死尤速故曰夫者妻之天惟初起不分屬何經絡急用葱白寸許生半夏一枚搗爛爲丸芡實大以綿裹之如患左塞右鼻患右塞左鼻一宿而消

乳懸乃產後瘀血上攻忽兩乳伸長細小如腸直過小腹痛不可忍名曰乳懸危證也用川芎當歸各一斤水煎濃湯不時溫服再用二斤逐旋燒煙安在病人面前桌子下令病人曲身低頭將口鼻及病乳常吸烟氣未甚縮再用一料則瘀血消而乳頭自復矣若更不復舊用蓖麻子搗爛貼頂上片時收即洗去薛己醫按

癰巖治法

乳癰乳巖若因暴怒或兒口氣所吹腫痛者疏肝行氣熾痛發寒熱者發散表邪腫熾痛甚者清肝消毒未成膿者疎肝行氣不作膿或不潰托裏爲主潰而不斂或膿清者宜大補氣血嘗見患者責效太速或不戒七情及藥不分經絡虛實者俱難治

大抵此證四十以外者尤難治蓋因陰血日虛也

大抵乳房屬陽明胃經乳頭屬厥陰肝經若忿怒傷肝或厚味積熱以致氣不行竅不通乳不出則結而爲腫爲痛陽明之血熱甚則爲腐爲膿若膿一成即針之以免遍潰諸竅之患

夫乳之爲物各有竅竅若一有膿即針之否則遍潰諸竅矣少壯者得以收斂老弱者多致不救

乳巖乃七情所傷肝經血氣枯槁之證宜補氣血解鬱結藥治之

大抵鬱悶則脾氣阻肝氣逆遂成隱核不痛不癢人多忽之最難治療若一有此宜戒七情遠厚味解鬱結更以養血氣之藥治之庶可保全否則不治亦有二三載或五六載方潰陷下者皆曰乳巖蓋其形巖凸似巖穴也最毒慎之可保十中一二也

陳實功外科正宗

總論

夫乳病者乳房陽明胃經所司乳頭厥陰肝經所屬乳子之母不能調養以致胃汁濁而壅滯爲膿又有憂鬱傷肝肝氣滯而結腫初起必煩渴嘔吐寒熱交作腫痛疼甚宜牛蒡子湯主之厚味飲食暴怒肝火妄動結腫者宜橘葉散散之又憂鬱傷肝思慮傷脾積想在心所願不得志者致經絡瘀憊聚結成核初如豆大漸如棋子半年一年二載三載不疼不癢漸漸而大始生疼痛痛則無解日後腫如堆栗或如覆椀色紫氣穢漸漸潰爛深者如巖穴高者若芝蓮疼痛連心出血作臭其時五臟俱衰四大不救名曰乳巖凡犯此者百人百必死如此證知覺若早只可用清肝解鬱湯或益氣養榮湯患者再加清心靜養無掛無礙服藥調理只可苟延歲月若中年已後無夫

之婦得此死更速故夫乃婦之天也惟初生核時急用艾灸核頂待次日起泡挑破用鈹針針入四分用冰蝉散條插入核內糊紙封蓋至十三日其核自落用玉紅膏生肌斂口再當保養不發

初起紅赤腫痛身微寒熱無頭眩無口乾微疼者順已成膿腫發熱疼痛有時一囊結腫不侵別囊者輕已潰膿黃而稠腫消疼痛漸止四邊作癢生肌者順潰後膿水自止腫痛自消新肉易生膿口易合者順

初起一乳通痞大痛不紅寒熱心煩嘔吐不食者逆已成不熱不紅堅鞕如石口乾不眠胃痞食少者逆已潰不膿正頭腐爛腫勢愈高疼痛愈盛流血者死

潰後肉色紫黑痛苦連心惡氣日深形體日削者死

初起發熱惡寒頭眩體倦六脉浮數邪在表宜散之發熱無寒惡心嘔吐口乾作渴胃腸不利者宜清之憂鬱傷肝思慮傷脾結腫堅鞕微痛者宜疏肝行氣已成膿腫發熱疼痛有時已欲作膿者宜托裏消毒

膿已成而脹痛者宜急開之如脾胃虛弱更兼補托潰而不斂膿水清稀腫痛不消疼痛不止大補氣血結核不知疼痛久而漸大破後流汚水宜養血清肝

景岳全書 臣張介賓著

乳病證治

乳癰乳巖腫痛熱甚熱毒有餘者宜以連蒲金貝煎先治之甚妙

產後乳自出乃陽明胃氣之不固當分有火無火而治之無火而泄不止由氣虛也宜八珍湯十全大補湯若陽明血熱而溢者宜保陰煎或四君子湯加梔子若肝經怒火上衝乳脹而溢者宜加減一陰煎若乳多脹痛而溢者宜溫帛熨而散之

孕婦乳病名曰內吹其因與產後同惟用藥不可犯其胎耳

產後吹乳勢甚者惟連翹金貝煎最妙

方

加味歸脾湯 醫按下同

治女人乳巖初起用此內消

白朮炒　人參　茯苓各一錢　柴胡　川芎　山梔炒　芍藥炒　甘草炒各五分　熟地黃　當歸各八兩

右水煎服

加味逍遙散

治證同上

甘草炙　當歸炒　芍藥酒炒　茯苓　白朮炒各一錢　柴胡　丹皮　山梔炒各五分

右水煎服

甘桔湯 人門下同

治女人乳癰咽膈有碍

甘草一兩　桔梗五錢

右水煎服

解毒湯

一名黃連解毒湯治女人乳房凝住不散

黃連　黃芩　黃蘗　山梔各二錢半

右水煎服

不換金正氣散

治女人乳病表證

厚朴　陳皮　藿香　半夏　蒼朮各一錢　甘草五分

右薑三片棗二枚水煎溫服

益元散

一名六一散治女人乳腫不散

滑石六兩　甘草一兩

右爲末每三錢入蜜少許沸湯調服

補中益氣湯

治女人乳癰食少口乾

黃芪　人參　甘草各一錢　當歸　白朮　陳皮　柴胡　升麻各五分

右水煎已午未初時溫服

四君子湯

治女人氣虛乳中結核用此加減

人參一錢　白朮　茯苓各二錢　甘草六分

右薑三片棗二枚水煎不拘時服本方加陳皮半夏名六君子湯

八物湯

治女人乳癰痛熱內熱

人參　茯苓　白朮土炒　白芍藥　當歸熟地各二錢　甘草炙　川芎各一錢

右煎服

十全大補湯

治女人乳巖盛者
人參　白朮　茯苓　甘草　當歸　川芎
熟地　芍藥　肉桂　黃芪各二分半
右薑棗煎服
復元通聖散
治女人乳癰未潰
穿山甲　苦蔞根各四錢　青皮　陳皮各二錢
甘草三錢
右爲末酒調服
歸脾湯
治女人憂思傷脾乳中結核用此加減
當歸　龍眼肉　棗仁　遠志　人參　黃芪
白朮　茯神各一錢　木香五分　甘草三分
右薑棗煎服
護心散
治女人乳病咽膈有碍者
菉豆粉四錢　乳香二錢
右爲末甘草煎湯調服時時細呷
一醉膏
治女人乳癰初起神效
苦蔞一箇去皮研爛　甘草五錢　沒藥二錢半
右用紅酒三椀煎至一椀半分兩次温服重者再
進一服以瘡爲度或加當歸白芷乳香亦妙如要
宣毒加皂刺一分
古芷貝散
治女人吹乳及結核
白芷　貝母各等分
右爲末每一錢酒調頻服
清肝解鬱湯
治女人乳內結核或腫潰不愈
當歸　白朮各一錢半　人參　柴胡　牡丹皮
陳皮　川芎各八分　白茯苓　貝母　白芍藥
熟地　山梔各一錢　甘草五分
右水煎服
內托升麻湯
治女人兩乳間出黑頭瘡
葛根　升麻　連翹各一錢半　黃芪　當歸
炙甘草各一錢　鼠黏子五分　肉桂三分
黃蘗二分
右水二盞酒一盞同煎服
托裏消毒散
治女人乳癰盛者
人參　黃芪　當歸　芍藥　白朮　白茯苓
陳皮各一錢　連翹　白芷　金銀花各七分
甘草五分
右水煎服　方去連翹加川芎皂刺乳香沒藥治
癰疽腫痛俱色慢不甚亦元氣虛弱或行攻伐不
能潰散者宜用之未成者消已成者潰又去腐生
新之良劑也加減同前但虛弱及已潰者去芷翹
金銀花三味消毒之藥
內托十宣散
治女人乳癰已潰寒熱
人參　黃芪　當歸　厚朴　桔梗　肉桂
川芎　防風　白芷　甘草各等分
右爲末每二錢至五六錢不飲酒者木香磨湯調
下瘡愈服之尤佳或加忍冬藤尤妙如天熱去桂
加苦蔞根赤茯苓
湧泉散
治女人乳汁不通作痛
瞿麥　麥冬　王不留行　龍骨　穿山甲各等分
右爲末每一錢熱湯下先食豬懸蹄羹後服此藥
服後以梳刮左右乳房
又方
治女人乳脹痛及乳癰腫
王不留行　白丁香　漏蘆　花粉　殭蠶各等分
右爲末猪懸蹄煮汁下
益氣養榮湯（外科正宗下同）
治女人乳巖初患
人參　茯苓　陳皮　貝母　香附　當歸
川芎　赤芍　熟地　白芍各一錢　甘草
桔梗各五分　白朮二錢
右薑三片棗二枚水二盃煎八分食遠服
冰蟬散
治女人乳中結核
大田螺五枚去殼線穿日中曬乾　冰片一分
白礬一錢二分麵裹煨熟　硇砂三分
右用曬乾螺肉切片同煨熟白礬碾爲細末加硇
片再碾小罐密收凡用時先用艾灸核上七壯次
候灸瘡起泡以小針挑破將前藥一二釐津唾調
成餅貼灸頂上用綿紙以厚糊封貼核上勿動泄
氣七日後四邊有裂縫再七日其核自落換搽玉

紅膏內服補藥兼助完口
生肌玉紅膏
治證見上
甘草一兩二錢　瓜兒血竭　輕粉各四兩
當歸身　白蠟各二兩　白芷五錢　紫草二錢
麻油一斤
右先用甘草當歸紫草白芷四味入油內浸三日大杓內慢火熬藥微枯色細絹濾清將油復入杓內煎滾下整血竭化盡次下白蠟微火亦化完用茶鍾四枚預頓水中將膏分作四處傾入鍾內候片時方下研極細輕粉每鍾內投和一錢攪勻候至一伏時取起不得加減致取不效
連翹金貝煎　景岳全書
治女人乳癰乳巖熱毒有餘之證
金銀花　土貝母　蒲公英　夏枯草各三錢
紅藤七八錢　連翹一兩或五七錢
右用好酒二椀煎一椀服後暖臥片時若火盛煩渴乳腫者加天花粉
通和湯　寶鑑
治婦人乳癰疼痛不可忍者
穿山甲炮　木通各一兩　自然銅五錢酢淬七次
右爲末每服二錢熱酒調下食遠服之
丹溪方　編目下同
治乳癰
青皮　苦蔞仁　橘葉　連翹　桃仁留尖
皂角刺　甘草節
水煎服破加參芪
神效苦蔞散
治乳癰妳巖神效
苦蔞一箇去皮焙爲末子多者有力　生甘草
當歸酒浸焙各五錢　乳香研　沒藥研各二錢半
右爲末用無灰酒三升以銀石器內慢火熬取一升清汁分作三服食後良久服如有妳巖便服此藥可杜絕病根毒氣已成能化膿爲黃水毒未成即於二便中通利如疾甚再合服以退爲度立效散與前方間服神妙但以苦蔞散方減去當歸加紫色皂角刺一兩六錢是也丹溪云妙捷恐貧賤之家未能辦集者用單方內蒲公英方尤妙
張氏橘皮湯
治乳癰未結即散已結即潰極痛不可忍者極效
因小兒吹乳變成此疾者並皆治之
陳皮一味湯浸去白曬乾麪炒微黃
爲細末麝香研酒調二錢初發覺赤腫疼痛一服見效
勝金丹
治婦人吹乳極效
百齒霜即木梳上髮垢
右一味不拘多少用無根水爲丸如桐子大每服三丸倒流水送下食後令病人左乳者左臥右乳者右臥於溫處汗出愈新汲水傾於房上接之乃倒流水也
獨勝散
治婦人吹乳
白丁香五錢
右搗羅爲末每服一錢七溫酒調下服無時
皂角散
治婦人吹乳
皂角燒灰　葛粉研細
熱酒一盃調一字頃間採散即愈一本是蛤粉治乳癰
丹溪方
楊梅人乳腫痛
青皮　石膏煅　連翹　皂角刺炒　黃藥子
當歸頭　木通各一錢　生甘草三分
作一貼入好酒些少同煎飲之外用散堅解毒藥洗腫處
又方
義烏人平時乳內有結核不爲痛忽乳邊又有一腫核頗痛
黃芩　川芎　木通　陳皮各四錢　人參二錢
大腹皮三錢　白芍藥　炙甘草　生甘草
當歸頭各一錢
分二貼煎服
又方
二孺人但經將行而乳腫先兩日發口乾而不渴食少減脈左弦帶數右却平
川芎　歸身　炒白芍　熟地　陳皮　白朮
茯苓
帶熱下與點丸三十粒與點丸即黃芩爲末粥丸是也
東垣方

婦人兩乳間出黑頭瘡瘡頂陷下作黑眼子其脉弦洪按之細小

升麻　連翹　葛根各一錢五分　肉桂三分

黃芪　歸身　炙甘草各一錢　鼠黏子五分

黃蘗二錢

右作一服水一盞酒半盞煎至一盞二服愈

牛蒡子湯（外科正宗）

乳癰乳疽結腫疼痛勿論新久但未成膿者服

陳皮　牛蒡子　山梔　金銀花　甘草　黃芩

苦蔞仁　天花粉　連翹　角針各一錢　柴胡

青皮各五分

水二鍾煎八分入酒一盃和均食遠服

橘葉散

治婦人有孕胎熱爲內吹有兒喫乳名外吹致乳結成腫痛寒熱交作甚者惡心嘔吐並服之

柴胡　陳皮　川芎　山梔　青皮　石膏

黃芩　連翹各一錢　甘草五分　橘葉二十箇

水二鍾煎八分食遠服滓再煎服

清肝解鬱湯

治一切憂鬱氣滯乳結腫鞕不疼不癢久漸作疼或胷膈不利肢體倦怠面色痿黃飲食減少

陳皮　白芍　川芎　當歸　生地　半夏

香附　青皮　遠志　茯神　貝母　蘇葉

桔梗各八分　甘草　山梔　木通各四分

水二鍾薑三片煎八分食遠服

鹿角散

治乳癰初起結腫疼痛憎寒發熱但未成俱效

鹿角尖三寸炭內燒紅存性碾末

每服三錢食後熱酒一茶鍾調服甚者再一服必消

回乳四物湯

治婦人無兒喫乳致乳汁腫脹堅鞕疼痛難忍

麥芽二兩炒爲末　川芎　當歸　白芍藥

熟地各二錢

水二鍾煎八分食遠服用脚布束緊兩乳以手按揉其腫自然消散甚者再用一服

如意金黃散

治癰疽發背諸般疔腫跌撲損傷濕痰流毒大頭時腫漆瘡火丹風熱天泡肌膚赤腫乾濕脚氣婦女乳癰

天花粉十斤　黃蘗　大黃　薑黃各五斤

白芷三斤　紫厚朴　陳皮　甘草　蒼朮

天南星各二斤

以上共爲咀片曬極乾燥用大驢磨連磨三次方用密絹羅廚篩出磁壜收貯勿令泄氣

凡遇紅赤腫痛發熱未成膿者及夏月火令時俱用茶湯同蜜調敷

如微熱微腫及大瘡已成欲作膿者俱用葱湯同蜜調敷

如漫腫無頭皮色不變濕痰流毒附骨癰疽鶴膝風證等病俱用葱酒煎調

如風熱惡毒所生患必皮膚亢熱紅色光亮形狀遊走不定者俱用蜜水調敷

如天泡火丹赤遊丹黃水漆瘡惡血攻注等證俱用大藍根葉搗汁調敷加蜜亦可

湯潑火燒皮膚破爛麻油調敷

以上諸引理取寒熱溫凉製之又在臨用之際順合天時洞窺病勢使引爲當也

下乳天漿散

治乳母元氣虛弱乳汁微少或痛或生兒日久乳少

川芎　當歸　白芍藥　熟地黃　天花粉

甘草　王不留行炒　麥冬　漏蘆　茯苓

穿山甲炒　通草各一錢

用健猪前蹄一隻煮蹄爛取汁二椀同藥煎至椀半二次頓熱食遠服之以熱木梳梳其乳房其汁如湧泉而來

木香餅

治一切氣滯結腫成核或痛或閃肭風寒所傷並效

木香五錢　生地黃二兩搗膏

右木香爲末同地黃和勻量患處大小作餅置腫上以熱熨斗熨之堅而木痛者間日熨之妙

加味四物湯

治產婦乳汁不通如治他病隨證加減不必執此藥

人參　歸身　川芎　赤芍　生地　桔梗

甘草　麥冬　白芷各一兩

水煎服

鯽魚湯（千金方下同）

治同上

鯽魚長七寸　猪肪半斤　漏蘆　石鍾乳各八兩
右四味切猪肪魚不須洗治清酒一斗二升合煑魚熟藥成絞去滓適寒溫分五服其間相去須臾一飲令藥力相及爲佳乳卽下

鍾乳湯

治婦人乳無汁

石鍾乳　硝石　白石脂各六兩　通草十二銖
桔梗五錢切
右五味㕮咀以水五升煑三沸三上三下去滓內消石令烊分服一方無硝石有滑石

又方

治同上

石鍾乳四兩　甘草二兩　漏蘆三兩　通草
苦蔞根各五兩
右五味㕮咀以水一斗煑取三升分三服一云用苦蔞實一枚一方無甘草

又方

治同上

石鍾乳　通草各一兩　漏蘆五錢　桂心
甘草　苦蔞根各六銖
右六味治下篩酒服方寸匕日三最驗

漏蘆湯

治同上

漏蘆　通草各二兩　石鍾乳一兩　黍米一升
右四味㕮咀米宿漬揩撻取汁三升煑藥三沸去滓作飲飲之日三服

漏蘆散

治同上

漏蘆五錢　石鍾乳　苦蔞根各一兩　蠐螬三合
右四味治下篩先食糖水服方寸匕日三

單行石膏湯

治同上

石膏四兩研
右以水二升煑三沸稍稍服一日令盡

麥門冬散

治同上

麥門冬　通草　理石　石鍾乳各等分
右四味治下篩先食酒服方寸匕日三服

又方

治同上

麥門冬　通草　理石　石鍾乳　土瓜根
大棗　蠐螬各等分
右七味治下篩食畢用酒服方寸匕日三

又方

治同上

石鍾乳四兩　白頭翁一兩　滑石　通草
苦蔞根　漏蘆各三兩
右六味治下篩以酒服方寸匕日三

單行鬼箭湯

治同上

鬼箭五兩
右以水六升煑取四升每服八合日三亦可燒作灰水服方寸匕日三

甘草散

治同上

甘草一兩　通草三十銖　石鍾乳二十銖
雲母二兩五錢　屋上散草二把燒爲灰
右五味治下篩食後溫漏蘆湯服方寸匕日三乳下不止

竹皮大丸 仲景

治乳中虛嘔逆煩亂

生竹茹　石膏各二分　桂枝　白薇共一分
甘草七分
右爲細末棗肉和丸彈子大以飲服一丸日三夜二
若有熱者倍加白薇
若煩喘者加柏實一分

玉露散 良方

凉膈下乳汁

桔梗　川芎　白芷各二錢　赤芍藥一錢半
人參　赤茯苓　甘草各一錢　當歸五分
右剉作一貼水煎服

豬蹄粥 本草

治乳無汁

豬蹄四隻治如食法
右水二斗煑取一斗去蹄入土瓜根通草漏蘆各三兩剉煑取六升去滓入葱豉及小米煑作稀粥食之

十六味流氣飲 瘡瘍全書

治女人乳巖傷盡氣血欲死

人參　當歸　黃芪　桔梗　防風　木香

甘草　枳殼　芍藥　川芎　肉桂　檳榔
白芷　厚朴　紫蘇　烏藥　木香各等分
右水煎服一方無檳榔肉桂有皂刺此表裏氣血藥也非脈洪緩沉遲緊細者不用

單方

婦人氣惱勞傷或寒熱不調乳內忽生腫痛用椀一隻內用粗燈草四根十字排勻椀內燈草頭各露寸許再用平山粗紙裁成一寸五分闊紙條用水濕紙貼蓋椀內燈草上紙與椀口相齊將椀覆於腫乳上留燈草頭在外將艾大圓放椀足底內點火灸之艾盡再添灸至椀口流出水氣內痛覺止方住甚者次日再灸一大必消（外科正宗）

女人乳癰初起腫痛未成膿者用蒲公英連根帶葉二兩搗爛用好酒半斤同煎數沸存滓敷腫上用酒熱服蓋睡一時許再用連鬚葱白湯一茶鍾催之但微汗面散此方鄉村偏僻無藥之所用之極妙亦且簡便

蒲公英在處田間路側三四月開黃花似菊味甘解毒散滯入陽明太陰經洗淨細研以忍冬藤濃煎湯入少酒佐之隨手便欲睡睡覺已失之矣（丹溪）

婦人吹乳用豬牙皂角去皮蜜炙爲末酒服一錢（袖珍方）

吹妳腫痛半夏一箇煨研酒服立愈一方以末隨左右嗆鼻效（經驗方）

婦人吹妳水調麵煮糊欲熱即投無灰酒一盞攪勻熱飲令人徐徐按之藥行即瘥（聖惠方）

又方赤小豆酒研溫服以滓傅之（熊氏方）

婦人乳毒敗龜板一枚燒研酒服四錢（小品方）

婦人乳裂秋月冷茄子裂開者陰乾燒存性研末水調塗（補遺方）

婦人妳乳酢和梁上塵塗之（千金方）

妬乳乳痛丁香末水服方寸匕（梅師方）

乳巖乳癰用穿山甲炮研末酒服方寸匕日二服外以油梳梳乳即通（單驥）

婦人吹乳乳痛櫸皮燒灰存性熱酒調下三錢食後服之（事親）

又方馬明退燒灰五錢輕粉三錢麝香少許爲細末每服二錢熱酒調下服之

又方以淘米水杓上砂子七箇酒下以吹簫枝透乳孔甚妙

女人乳巖用蒲公英草搗爛盒患處神妙（澗目）

婦人乳腫馬尿塗之立愈（產寶）

又方小豆莽草等分爲末苦酒和傅佳（梅師）

又方治吹乳鼠黏二錢麝香少許溫酒細吞下（袖珍方）

女人吹乳以胡椒七粒同百齒霜和丸熱酒下得汗立愈（產寶）

又方蛇皮一尺七寸燒末溫酒一盞服（產乳）

又方鼠屎七粒紅棗七枚去核包屎燒存性入麝香少許溫酒調服（集要方）

又方用韭地中蚯蚓屎研細篩過米酢調厚敷乾則換三次即愈凉水調亦可（經驗方）

吹妳乳癰五月五日蠶箔燒灰酒服二錢即散累效（濟急仙方）

乳癰腐爛靴內年久櫸皮燒灰酒服一錢日一服（摘玄驗）

乳癰初起蕊汁一升頓服即散（千金）

又方大熟苦蔞一枚熟搗以白酒一斗煮取四升去滓溫服一升日三服（子母秘錄）

又方用石膏煅紅出火毒研每服三錢溫酒下滾酒盡醉睡覺再進一服（經驗方）

又方用丹參白芷芍藥各二兩㕮咀以酢淹一夜豬脂半斤微火煎成膏去滓傅之（必效方）

乳癰不消白麵半斤炒黃酢煮爲糊塗之即消（聖惠）

乳婦氣脈壅塞乳汁不行及經絡凝滯妳房脹痛留畜作癰毒者用葵菜子炒香縮砂仁等分爲末熱酒服二錢此藥滋氣脈通營衛行津液極驗乃上蔡張不愚方也（本草）

妬乳乳癰雞矢白炒研酒服方寸匕三服愈（產寶）

又方葵菜及子爲末酒服方寸匕日二（本草）

又方柳根皮搗火溫帛裹熨之冷易一宿消（肘後方）

乳痛成癰以益母草爲末水調塗乳上一宿自瘥生搗爛用之亦得（續目）

吹乳用桑樹蛀屑飯搗成膏貼之（本草）

乳頭破裂丁香末傅之（梅師方）

吹妳腫痛取戶限下土和雄雀糞暖酒服方寸匕（本草）

又方貝母末吹鼻中大效（得效方）

又方遠志焙研酒服二錢以滓傅之（直指方）

又方萱草根擂酒服以滓封之本草

又方葛蔓燒灰酒服二錢三服效易簡方

乳癰腫大如椀白薑石末和雞子清敷之乾即易外臺

乳癰初腫貝母末酒服二錢仍令兒吮之即通直指方

乳汁不下乃氣脉壅塞也又治經絡凝滯乳內脹痛邪畜成癰服之自然內消漏蘆二兩半蛇退十條炙焦苦蔞十箇燒存性爲末每服二錢溫酒調下良久以熱羹湯投之以通爲度和劑

乳癰堅鞕以罐盛酢燒熱石投之二次溫漬之冷則更燒石投之不過三次即愈千金

乳癰寒熱蔓菁根併葉去土不用水洗以鹽和搗塗之熱即換不過三五次即瘥冬月只用根此方已救數十人須避風兵部手集

乳癰潰爛銀杏半斤以四兩研酒服之以四兩研傅之急救易方

乳癰腫痛桂心甘草各二分烏頭一分炮爲末和苦酒塗之紙覆住膿化爲水神妙肘後方

又方用水楊柳根生擂貼瘡其熱如火遂平

又方馬鞭草一握酒一椀生薑一塊擂汁服滓傅之易簡方

又方用川大黃粉草各一兩爲末好酒熬成膏收之以絹攤貼瘡上仰臥仍先以溫酒服一大匙明日取下惡物經驗方

乳癰堅鞕新莨菪子半匙水服不得嚼破外臺

乳癰初腫扁竹根如殭蠶者同萱草根爲末蜜調敷之神效末類方

又方內消花即玉簪花取根擂酒服以滓傅之海上方

女子妬乳生蔓菁根搗和鹽酢漿水煮汁洗之五六度良又和雞子白封之亦效食療本草

乳癰腫毒龍舌草忍冬藤研爛蜜和傅之多能鄙事

產後乳汁不泄結毒者皂角刺蔓荊子各燒存性等分爲末每溫酒服二錢袖珍方

婦人乳巖因久積憂鬱乳房內有核如指頭大不痛不癢五七年成癰名乳巖不可治也用青橘皮四錢水一盞半煎一盞徐徐服之日一服或用酒服丹溪

乳瘡腫痛用芝麻炒焦研末以燈窩油調塗即愈本草

乳頭裂破臙脂蛤粉爲末傅之得效方

乳汁不通絲瓜連子燒存性研酒服三錢被覆取汗即通簡便方

乳汁不行內服通乳藥外用木梳梳乳周廻百餘遍即通事親

女人乳汁不出內結成腫名妬乳用蜂房燒灰研每服二錢水一小盞煎六分去滓溫服濟衆方

乳汁不通白殭蠶末二錢酒服少頃以芝麻茶一盞飲之梳頭木梳梳之數十徧妳汁如泉經驗方

又方用穿山甲炮研末酒服方寸匕日二服外以油梳梳乳即通單驗方

又方死鼠燒作屑酒服方寸匕日三立下勿令知千金下同

又方鯉魚頭燒爲末酒服三指撮

又方母豬蹄一具粗切以水二斗熟煮得五六升汁飲之不出更作一方入酒煑之

又方豬蹄二枚熟炙搥碎通草八兩細切以清酒一斗浸之稍稍飲盡不出更作

又方女人無乳或少苦蔞子青色大者一枚熟搗以白酒一斗煑取四升去滓溫服一升日三黃色小者用二枚亦好

又方土瓜根治下篩服半錢匕日三乳如流水不竭

又方芝麻炒研入鹽少許食之唐氏

又方女人無乳石鍾乳漏蘆各二兩治下篩飲服方寸匕即下千金下同

又方女人乳少或無乳石鍾乳通草各等分爲末粥飲服方寸匕日三後可兼養兩兒通草橫心者勿取是羊桃根色黃無益

又方前方二味酒五升漬一宿明旦煑沸去滓服一升日三夏冷服冬溫服

婦人無乳用羊肉六兩獐肉八兩鼠肉五兩作臛啖之崔氏

婦人回乳用男子裹脚布勒住經宿即止本草下同

產婦無子食乳乳不消令人發熱惡寒用大麥蘖二兩炒爲末每服五錢白湯下良甚丹溪

乳汁不下用麥門冬末二錢酒磨犀角汁一盞調服本草下同

又方用鯉魚作羹食之

又方用野豬脂每取一匙和一盞溫酒服日三乳即下且多可供五兒冬月豬脂亦可

鍼灸

甲乙經曰妬乳大淵主之

乳癰淒索寒熱痛不可按乳根主之

大驚乳痛梁丘主之

乳癰有熱三里主之

乳癰太衝及復溜主之

神封膺窻主乳癰寒熱短氣臥不安

太谿俠谿主乳癰腫潰

乳癰驚痹脛腫足跗不收跟痛刺下廉入三分灸三壯穴在上廉下三寸

月水不利見血而有身則敗乳腫刺臨泣入二分灸三壯穴在足小趾次趾間去俠谿一寸半

乳癰腫痛諸藥不能止痛者三里穴鍼入五分其痛立止如神穴在膝下衝外廉兩筋間舉足取之

儒門事親曰乳汁不下針肩井二穴效

醫學綱目曰乳癰刺乳中穴在乳下中針入一分沿皮向後一寸半灸瀉之

醫學入門曰婦人乳癰等證先以溫紙覆上立候紙先乾處爲瘡頭記定然後用獨蒜去兩頭切中間三分厚安瘡頭上用艾炷於蒜上灸之每五炷換蒜再灸如瘡大有十數頭作一處生者以蒜搗爛攤患處鋪艾灸蒜敗再換若痛灸至不痛不痛灸至痛其瘡乃隨火而散此拔引鬱毒從治之法有回生之功

醫案

格致餘論曰余族姪婦年十八時曾得乳巖病察其形脉稍實但性急躁伉儷自諧所難者後姑耳遂以本草單方青皮湯間以加減四物湯行其經絡之劑兩月而安

一婦人年六十厚味鬱氣而形實多妬夏無汗而性急忽左乳結一小核大如棊子不痛自覺神思不佳不知食味將半月以人參湯調青皮甘草末入生薑汁細細呷一日夜五六次至五七日消矣此乃妳巖之始不早治隱至五年十年已後發不痛不癢必於乳下潰一竅如巖穴出膿又或五七年十年雖飲食如故洞見五內乃死惟不得於夫者有之婦人以夫爲天失於所天乃能生此謂之巖者以其如穴之嵌岈空洞而外無所見故名曰巖患此者必經久淹延惟此婦治之早正消患於未形餘者皆死凡十餘人又治一初嫁之婦只以青皮甘草與之安

薛己醫按曰一婦人內熱脅脹兩乳不時作痛口內不時辛辣若臥而起急則臍下牽痛此帶脉爲患也用小柴胡加青皮黃連山梔二劑而瘥

一婦人因怒兩乳腫兼頭痛寒熱此肝經氣證用人參敗毒散二劑表證已退用小柴胡加芎歸枳殼桔梗四劑而愈

一婦人久鬱右乳內腫硬此肝經血證也用八珍加遠志貝母柴胡青皮及隔蒜灸兼神效苦蔞散兩月餘而痊

一婦人先熱渴至夜尤甚後兩乳忽腫服敗毒藥熱反熾診之肝脉洪數乃熱入血分用加味小柴胡湯而愈

一婦人因怒左乳作痛發熱因表散太過腫熱殊甚用益氣養榮湯數劑熱止膿成因不即針益腫脹熱渴針之膿大泄仍服前湯月餘而愈

一婦人因怒左乳作痛胷膈不利此屬肝脾氣滯以方脉流氣飲加木香青皮四劑而安

一婦人患此膿清腫硬面黃少食內熱晡熱自汗盜汗月經不行此肝脾氣血俱虛也用十全大補加遠志貝母及補中益氣各三十餘劑外用葱熨法而消

一婦人患此膿成脹痛余欲針之使毒不侵展不從至數日針出敗膿三四椀許虛證蜂起幾至危殆用大補之劑兩月餘始愈

一婦人素弱多鬱患時疫後脾胃愈虛飲食愈少因怒右乳脅紅腫應內作痛或用炒麩皮熨之內痛益甚服加減四物湯腫勢愈大胷脅背心相引而痛余謂病後脾弱怒復傷肝用八珍加陳皮黃芪柴胡山梔白芷八劑稍愈去白芷加青皮木香桔梗又六劑而安

一婦人左乳內腫如桃不痛不赤發熱漸瘦此肝脾鬱怒也用八珍湯加香附遠志青皮柴胡百餘劑又兼神效苦蔞散三十餘劑膿潰而愈

一婦人久鬱左乳內結核如杏三月不消心脉濇脾脉大按之無力此肝脾氣血虧損以八珍加貝母遠志香附柴胡青皮桔梗五十餘劑而愈

一婦人禀實性躁懷抱久鬱左乳內結一核按之微痛此皆氣血鬱滯以連翹飲十餘劑少退更以八珍加青皮香附桔梗貝母二十餘劑而愈

一婦人右乳內結三核年餘不消朝寒暮熱飲食不甘此肝脾氣血虧損內服益氣養榮湯外以木香餅熨之年餘血氣復而消

一婦人乳內結核年餘晡熱少食余謂此血氣不足欲用益氣養榮湯彼反服行氣之劑潰出清膿而歿又一婦乳內結核如栗亦服前藥大如覆椀堅鞕如石出血水而歿

一婦年踰二十稟弱乳內作痛頭疼脉浮與人參敗毒散倍加人參一劑表證悉退但飲食少思日晡微熱更以小柴胡湯合六君子湯二劑熱退食進方以托裏藥加柴胡十餘劑針出膿而愈

一婦患此證膿成畏針病勢漸盛乃強針之膿出三椀許脉數發渴以大補藥三十餘劑而愈丹溪云乳房爲陽明所經乳頭爲厥陰所屬厥陰者肝也乃女子致命之地宗筋之所且各有囊橐其始癰腫雖盛受患止於一二囊若膿成不刺攻潰諸囊矣壯者猶可弱者多致不救所以必針而後愈也

一婦人乳內腫一塊如雞子大勞則作痛久而不消服托裏藥不應此乳勞證也屬肝經血少所致先與神效茶蓼散四劑更隔蒜灸之腫少退再服八珍湯倍加香附夏枯草蒲公英仍間服前散月餘而消亦有乳疽一證其狀腫硬木悶雖破而不潰腫亦不消尤當急服此散及隔蒜灸斯二證乃七情所傷氣血所損亦勞證也宜戒怒節飲食慎起居否則不治

一婦人患乳癰氣血頗實但瘡口不合百法不應余與神效茶蓼散四劑少可更與數劑及豆豉餅灸之而愈

一婦患此未潰亦與前藥三劑而消艮甫云如有乳癰便服此藥可杜經病根如毒已成能化膿爲水毒未成者則從大小便中散之

郭氏妾乃放出宮人年四十左乳內結一核堅鞕按之微痛脉弱懶言此鬱結證也名曰乳巖須服解鬱結益血氣藥百貼可保郭謂不然別服十宣散流氣飲瘡反盛逾二年復請余視其形如覆椀腫鞕如石膿出如泔余謂膿清脉大寒熱發渴治之無功果歿

一婦人患乳癰寒熱頭痛與荊防敗毒散一劑更與蒲公英一握搗爛入酒二三盞再搗取酒熱服查熱畧患處而消丹溪云此草散熱毒消腫核又散滯氣解金石毒之聖藥

一婦人患乳癰愈後發熱服養氣血藥不應與八珍湯加炮乾薑四劑而止仍以前湯加黃芪香附三十餘劑氣血平復

一婦人乳腫而不作膿以益氣養榮湯加香附青皮數劑而膿成針之旬日而愈

一婦人右乳腫發熱怠惰嗜臥無氣以動至夜熱益甚以補中益氣湯兼逍遙散治之而痊

一婦人兩乳內時常作痛口內常辣臥起若急腈下牽痛以小柴胡湯加青皮黃連山梔治之而痊

一婦人產女子而無乳服下乳藥但作脹余謂人乳皆氣血所化今脹而無乳是血氣竭而津液亡也當補其氣血自然有乳矣乃與八珍湯倍加參朮少加肉桂二十餘服乳遂生後因勞役復竭夫其初有乳再產而無其氣血祇給一產耳其衰可知間有產後乳出不止亦爲氣虛宜補藥止之其或斷乳兒不吮亦能作脹則用麥蘗炒爲末白湯調服以散之若兒吮破乳頭成瘡則用蒲公英末或黃連臘粉散摻之若乳頭裂破以丁香末或蛤粉膩脂傅之並效

一產婦勞役忽乳汁如湧昏眛吐痰此陽氣虛而厥也灌以獨參湯而甦更以十全大補湯數劑而安若婦人氣血方盛乳房作脹或無兒飲脹痛憎寒發熱用麥芽二三兩炒熟水煎服立消其耗散血氣如此

何脾胃虛弱飲食不消方中多用之

一產婦素有肝火患陰蝕疳瘡內潰癢痛食少熱渴小水淋瀝用加味逍遙散加味歸脾湯兼服間以蘆薈丸外以鶴虱草煎洗而愈

一產婦因乳少服藥通之致乳房腫脹發熱作渴余謂血氣虛以玉露散補之而愈

證治準繩曰隆慶庚午余自秋闈歸則亡妹已病蓋自七月乳腫痛不散八月用火針取膿醫以十全大補湯與之外敷鐵箍散不效反加喘悶九月產一女潰勢益大而乳房爛盡延及胃腑膿水稠粘出膿幾六七升略無斂勢十一月始歸就醫改用解毒和平中劑外掺生肌散龍骨寒水石等藥膿出不止流溅所及即腫泡潰膿兩旁紫黑瘡口十數胃前腑下皆腫潰不可動側其勢可畏余謂產後毒氣乘虛而熾宜多服黃芪解毒補血益氣生肌而醫不敢用十二月中旬後益甚瘡口廿餘諸藥盡試不效始用余藥時膿穢粘滯煎豬蹄湯沃之頓爽乃製一方名黃芪托裏湯黃芪之甘溫以排膿益氣生肌爲君甘草補胃氣解毒當歸身和血生血爲臣升麻葛根漏蘆爲足陽明本經藥及連翹防風散結疎經苦蓼仁鼠黏

子解毒去腫皂角剌引至潰處白芷入陽明敗膿長肌又用川芎三分及肉桂炒藥爲引每劑入酒一盞煎送白玉霜丸疎膿解毒時膿水稠粘方盛不可遽用收澀之藥理宜追之以翠青錠子外摻明日膿水頓稀痛定穢解始有向安之勢至辛未新正患處皆生新肉有紫腫處俱用葱熨法隨手消散但近腋足少陽分尚未斂乃加柴胡一錢青皮三分川芎倍之膿水將淨者即用搜膿散摻之元宵後遂全安

外科正宗曰一婦人因怒左乳腫痛寒熱交作以人參敗毒散一劑表證已退又以牛蒡子湯二服腫消漸漸而安

一婦人憂思過度久鬱成痛左乳結核如桃半年似痛非痛欬嗽生痰身發潮熱診之脉微數而無力此眞氣雖弱而邪火尚未有餘如用藥合理亦堪調治先用逍遙散加香附貝母十餘服而欬嗽漸止寒熱間作又以八珍湯加香附丹皮柴胡遠志十餘服身熱去其八九又以益氣養榮湯加青皮木香兩月餘其胃腸得利嗳氣得舒飲食漸進肌膚漸澤外腫以阿魏化痞膏貼之半年餘而消

一婦人右乳疼痛腫如覆椀診之脉數有力此有餘證欲作膿也以托裏消毒散數服而膿痛即針之出膿椀許又以十全大補湯加香附十餘服而安

一婦人暴怒左乳結鞕疼痛自服仙方活命飲二服疼痛稍止結腫不消仍服清凉敗毒之劑痛腫反作形體日弱余診之脉浮數而無力此屬眞氣虛而邪氣實也非補不可以益氣養榮湯四五服其腫始高寒熱亦退又十餘服而膿潰兼以十全大補湯兩月而痊此非純補之功其疾豈能得愈

一婦人左乳結核三年方生腫痛診之脉緊數而有力此陽有餘而陰不足也乳結腫如石皮肉紫色不澤此乳巖証也辭不治後果歿

又一婦左乳結腫或小或大或軟或硬俱不爲痛已半年餘方發腫如覆碗堅硬木痛近乳頭纍纍遍生疙瘩時痛時痒診之脉弦而數腫皮慘黑不澤此氣血已死辭不可治

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百二十卷目錄
醫部彙考四百
婦人前陰諸疾門
張機金匱要略 前陰諸證
王叔和脈經 脈證
陳自明婦人良方 陰病方論
薛己醫按 陰病證治
李梴醫學入門 陰病證治 脈法
張三錫醫學準繩六要 陰病總論 證治
王肯堂證治準繩 陰病證治
陳實功外科正宗 總論
陳士鐸石室祕錄 治法
方 補中益氣湯 龍膽瀉肝湯 四物湯 逍遙散 歸脾湯 古硫黃丸 雄黃鉛散 銀杏散 清肝瀉火湯 柵瘡湯 雄黃解毒散 芎歸湯 內疎黃連湯 透膿散 八珍湯 加減八味丸 小柴胡湯 消風散 蘆薈丸 加味逍遙散 三茱丸 當歸一捻金丸 黃芩散 丹溪方 潔古方 崔香養胃湯 又方 又方 又方 附後方 黃芩湯 雄黃散 補心湯 又方 又方 當歸散 菖蒲散 又方 胡腫湯 洗浴散 雄黃散 蛇牀子散 蟻酸 狼牙湯 蟾蜍湯 白礬散 大黃散 單行太方 千金方 珍珠散 海螵蛸散 和湯 洗心散 膏髮煎 集驗方 桑白皮湯 來復丹 五加皮陵酒方 又方 溫中生薑芒硝子散 八味丸
張介賓景岳全書 論證治
方 正神散 桃仁丸 附桂丸 花龜雄黃散 調經散 朱砂散 又方 太乙神熱丹 六一泥法 蘇合香丸 妙香散
單方
鍼灸
醫案
婦人交腸門
樓英醫學綱目 交腸論證治
方 五苓散 補中益氣湯 四物湯
醫案

漢張機金匱要略

前陰諸證

少陰脈滑而數者陰中卽生瘡陰中蝕瘡爛者狼牙湯洗之

婦人臟腫如瓜陰中疼引腰痛者杏仁湯主之

婦人陰寒溫中坐藥蛇牀子散主之

胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也膏髮煎導之

晉王叔和脈經

脈證

少陰脈數則氣淋陰中生瘡

婦人少陰脈弦者白腸必挺核

少陰脈浮而動浮則爲虛動則爲痛婦人則脫下

師曰脈得浮緊法當身軀疼痛設不痛者當射云何

因當射言若腸中痛腹中鳴欬者因失便婦人得此

脈者法當陰吹

師曰寸口脈浮而弱浮則爲虛弱則無血浮則短氣

弱則有熱而自汗出趺陽脈浮而濇浮則氣滿濇則

有寒喜噫吞酸其氣不下少腹則寒少陰脈弱而微

微則少血弱則生風微弱相搏陰中惡寒胃氣下泄

吹而正喧

宋陳自明婦人良方

陰病方論

婦人陰挺下脫或因胞絡傷損或因子臟虛冷或因

分娩用力所致

前證當升補元氣爲主若肝脾鬱結氣虛下陷

用補中益氣湯若肝火濕熱小便濇滯用龍膽瀉

肝湯

婦人陰癢爲三蟲在腸胃之間因臟虛而蝕陰中微

則爲癢甚則爲痛也

前證屬肝經所化當用龍膽瀉肝湯逍遙散以

主其內外以桃仁研膏和雄黃末或雞肝納陰中

以制其蟲

按大全三蟲動作發於陰內其蟲作熱微則爲癢

重則爲痛也

婦人少陰脈數而滑者陰中有瘡名曰蟨或痛或癢如蟲行狀膿水淋瀝亦有陰蝕幾盡皆由心神煩鬱脾胃虛弱氣血流滯耳內當補心養胃外以藥傳洗乃可

註按前證乃肝脾鬱結之證木旺生蟲耳宜解鬱清肝

婦人陰腫因胞絡素虛風邪客之乘於陰部血氣相搏故也

註前證若氣血虛弱用補中益氣湯舉而補之肝經濕熱用龍膽瀉肝湯滲而清之但陰腫及陰冷陰挺等證仍當與陰癢方論參看

按大全婦人陰腫者是虛損受風邪所爲胞絡虛而有風邪客之風氣乘於陰與血氣相搏令氣不泄腠理壅閉不泄越故令腫也

婦人陰冷因勞傷子臟風冷客之用五加皮乾薑丹參蛇牀子熟地黃杜仲各三兩鍾乳粉四兩天門冬一兩地骨皮二兩酒十五升漬二宿每服一盞空心食前飲之

註前證屬肝經內有濕熱外乘風冷所致若小便澀滯或小腹痞痛用龍膽瀉肝湯若內熱寒熱或經候不調用加味逍遙散若寒熱體倦飲食少思用加味四君子若鬱怒發熱少寐嗜食用加味歸脾湯

明薛己醫按

陰病證治

婦人陰中生瘡乃七情鬱火傷損肝脾濕熱下注其外證陰中出如蛇如菌或如雞冠狀或生蟲濕癢或潰爛出水或腫悶墜痛其內證體倦內熱經候不調或飲食無味晡熱發熱或胃脘不利小便短赤或赤白帶下小水淋瀝其治法腫痛者四物湯加柴梔丹皮瞻草濕癢者歸脾湯加柴梔丹皮淋濇者龍膽瀉肝湯加白朮丹皮潰腐者逍遙散加山梔川芎腫悶墜痛者補中益氣湯加山梔丹皮佐以外治之法

女子交接傷丈夫頭痛當用補中益氣六味地黃以滋化源爲主

婦人小戶嫁痛當從女人交接傷丈夫頭痛門互相主治

李梴醫學入門

陰病證治

陰中挺出一條尺許如蛇痛墜出水溻濕者朝服補中益氣湯晚服龍膽瀉肝湯外塗黍蘆膏而收

陰中突出如菌如雞冠四圍腫痛者乃肝鬱脾虛下陷先以補中益氣湯加山梔茯苓車前子青皮以清肝火兼升脾氣漸愈更以歸脾湯加山梔茯苓川芎調理外塗黍蘆膏

陰戶突出因勞力者血虛四物湯加龍骨氣虛補中益氣湯

陰中生蟲墮如小蛆者乃濕熱甚而心氣又鬱氣血凝滯而生宜藿香養胃湯補心湯古硫黃丸外用生艾汁調雄黃末燒烟熏之更用雄黃銳散納陰中

陰中生細蟲癢不可忍食入臟腑即死令人發寒熱與勞證相似先以蛇牀子煎湯洗淨拭乾後用梓樹皮焙乾爲末入枯礬四分之一麝香少許敷之立效

陰腫痛極便祕欲死者但搐熨但腫痛者四物湯加柴胡山梔牡丹皮龍膽草如時常陰痛者四物湯加藥本防風

濕癢出水又痛者憂思過也歸脾湯加柴胡山梔牡丹皮芍藥生甘草

陰戶腫痛不閉者逍遙散十全大補湯腫消不閉者補中益氣湯腫墜者加山梔牡丹皮

陰戶腫痛不閉寒熱溺澀體倦少食者補中益氣湯加升麻柴胡至一錢量入茯苓山梔

陰戶不閉小便淋瀝腹中一物攻動眼痛者逍遙散加柴胡山梔車前子

交接出血乃房室有傷肝脾虛不藏血補中益氣湯外用熟艾帛裹入陰中或用亂髮青皮燒灰傅之若出血過多見雜證者調補肝脾自愈

脈法

少陰脈浮而動浮則爲虛動則爲痛或崩帶或陰戶脫下

少陰滑數或爲氣淋或陰中生瘡痛癢

少陰微者氣閉腸脫女人見之陰中生瘡大實易愈虛澌其亡

少陰脈弦則陰戶掣痛白賜挺

腎脈沉甚主陰癢或腰腳痛皆衛氣不升濕熱甚也女人脈緊細長至關而止主陰中切痛上引腹臍

張三錫醫學準繩六要

陰病總論

婦人陰瘡乃七情鬱火傷損肝脾濕熱下注其外證有陰中舒出如蛇俗呼陰挺有翻突出如菌俗呼陰

菌亦有如雞冠花有生蟲腫痛濕癢潰爛出水脹悶脫墜者其內證口乾內熱體倦經候不調飲食無味晡熱發熱胃腦不利脅脹小腹痛痞赤白帶下小水淋瀝治法腫痛宜四物加柴胡山梔膽草丹皮濕癢者宜歸脾加山梔丹皮柴胡淋瀝者宜龍膽瀉肝湯加白朮丹皮潰爛者加味逍遙散腫墜宜補中益氣加山梔丹皮薛氏之法確不可易

證治

婦人陰蝕瘡濕熱客於肝經而然陰戶生蟲癢不可忍入臟腑即死令人發熱惡寒與瘍相似用熟豬肝切長條乘熱內陰中以取蟲蟲聞腥俱出肝上如此數次內服瀉肝和血藥亦妙

陰中癢亦是肝家濕熱瀉肝湯妙瘦人燥癢屬陰虛坎離爲主外用蛇牀子煎湯洗之蟨瘡同治要分虛實耳

尺脈數婦人陰中生瘡下部蟨久之有蟲用猪肝煮熟切長條納陰中引蟲出乃上殺蟲藥

陰茄乃婦人陰中腫痛不可忍有物如茄突出即是男子之疝但名瘕聚耳俱屬肝經濁氣平肝破氣爲主與疝同治外以枳實切碎炒熱帛包熨之冷再易但是陰痛俱妙

新室嫁孔痛宜舒鬱和血四物加香附紅花

婦人陰冷肥盛者多是濕痰下流所致二朮二陳加風藥外用坐藥妙

明王肯堂證治準繩

陰病證治

婦人陰中生痔者凡九竅有肉突出皆名爲痔

婦人茄子疾即陰痔也由心躁連綿黃水易治白水難愈

良方云婦人少陰脈數而滑者陰中必生瘡名曰蟨瘡或痛或癢如蟲行狀淋露濃汁陰蝕幾盡者此皆由心神煩鬱胃氣虛弱致氣血留滯按經云諸痛癢瘡皆屬於心又云陽明主肌肉痛癢皆屬於心治之故當補心養胃外以熏洗坐導藥治之乃可

婦人陰瘡連氣皆屬寒經云太陽之勝陰中乃瘍隱曲不利治以苦熱是也

婦人陰瘡者由三蟲或九蟲動作侵蝕所爲也諸蟲在人腸胃之間若臟腑調和血氣充實不能爲害若勞傷經絡腸胃虛損則動作侵蝕於陰輕者或癢或痛重者生瘡仲景云診其少陰之脈滑而數者陰中生瘡也

明陳實功外科正宗

總論

婦人陰瘡乃七情鬱火傷損肝脾濕熱下注爲患其形固多不一總由邪火所化也陰中有如挺出一條蛇形尺許墜重流水溺濕者乃脾氣下陷肝火從之朝服補中益氣湯晚服龍膽瀉肝湯外塗雄黃黃蘆散其患漸收陰中突出如菌子如雞冠四邊腫痛者乃肝鬱脾虛所致先以補中益氣湯加山梔茯苓青皮清肝補脾兼升中氣更以歸脾湯加山梔川芎茯神香附陳皮調理陰戶忽然腫突作痛因勞傷血分濕火下流宜四物湯加丹皮澤瀉花粉柴胡治之陰中生蟲蟨如小蛆者乃心氣鬱而邪火所化宜四物加黃連膽草木通石菖蒲以通散心竅鬱滯外以銀杏散納入陰中陰器外生疙瘩內生細蟲作癢不可忍者此蟲食入臟腑即死令人多發寒熱與瘍瘵相似有此證之婦人畏羞都不肯說因循日久面黃肌瘦身發寒熱欬嗽生痰往往不治者多矣如有此證急與逍遙散吞蘆薈丸早晚二服外用銀杏散綿裹塞入陰中殺蟲止癢半月漸愈陰戶開而不閉者憂思過也逍遙散歸脾湯俱加柴胡山梔白芍丹皮間服交接出血者肝虛有火不能藏血四物湯加膽草黃芩山梔柴胡新交房事傷而腫痛者珍珠散猪脊髓調搽又婦人久居寡室淫火動而又鬱鬱而又動邪火久注多致陰中作癢生蟲此蟲食人內臟陰中腐爛攻刺疼痛臭水淋漓口乾發熱形削不食有此證者非藥能愈終歸於死又名失合證也

石室祕錄 臣陳士鐸著

治法

女人陰內生蟲乃濕熱也用雞肝入藥末引之亦妙終不若用蚯蚓三四條蔥數根各火上炙乾爲末用蜜一椀煮成膏將藥搗於其中納入陰戶蟲盡死矣自然隨溺而下又婦人陰門邊生瘡作癢作痛不止者以此方煎水洗之立效方用蛇牀子一兩花椒三錢白礬三錢水十椀煎五椀乘熱熏之溫則洗之一次即止癢二次即止痛三日即全愈分作五日洗之每日止須洗一次神效之極

婦人羞隱之處不便明言然大約非寒則熱耳今有一方先用歸芍各三錢川芎一錢熟地五錢甘草柴胡白芥子各一錢黃芩炮薑各三分水煎服後較前平善則是虛證也隨用四物湯治之可也未好則

是熱病作祟方中加梔子三錢治之必奏效

方

補中益氣湯 醫技下同

治女人氣血虛弱陰腫

陳皮五分　黃芪炒　人參　白朮炒　甘草炙　當歸各一錢　柴胡　升麻各三分

右薑棗水煎空心午前服

龍膽瀉肝湯

治女人陰中生瘡淋溼用此加減

龍膽草酒拌炒黃　澤瀉各一錢　車前子炒　木通　生地黃酒拌　當歸酒拌　山梔仁炒　黃芩炒　甘草各五分

右水煎服

四物湯

治女人陰腫作痛用此加減

當歸酒拌　芍藥炒　川芎各一錢　熟地黃二錢

右水煎服

逍遙散

治女人陰瘡潰爛用此加減

甘草炙　當歸炒　白芍藥酒炒　白茯苓　白朮炒各一錢　柴胡酒炒五分

右水煎服

歸脾湯 人門下同

治女人陰戶突出用此加減

當歸　龍眼肉　棗仁　遠志　人參　黃芪　白朮　茯神各一錢　木香五分　甘草三分

右薑棗煎服

古硫鯉丸

治女人陰中生蟲

大鯉魚一箇去頭皮　硫黃一兩

右將硫黃入鯉魚內黃泥固濟火煅烟盡爲末米糊丸梧子大每二十丸溫酒下如下疳生蟲所下如柿汁臭穢及心中疙痛悶絕虛煩甚者不治

雄黃銳散

治女人陰中生蟲用此納之

雄黃別研　青葙子　苦參　黃連各二錢半　桃仁一錢

右爲末生艾搗汁和如小指尖大綿裹納下部肛門內

銀杏散 外科正宗下同

治女人濕熱下注陰中作癢及內外生瘡

杏仁去皮尖研　輕粉　水銀鉛製　雄黃各一錢

右各爲細末共和一處每用五分囊肉一枚和丸用絲綿包裹留一綠條撚線在外用塌癢湯煎洗將藥安入陰內留線在外恐小便取出再入一日一換重者只四五枚痊愈仍兼服後藥

清肝滲濕湯

治女人肝經鬱滯邪火流行致陰腫痛或風熱作癢

滑石二錢　川芎　當歸　白芍　生地　山梔　黃連　連翹　膽草各一錢　銀柴胡　澤瀉　木通各六分　蘆薈五分　甘草三分　防風八分

右水二鍾淡竹葉燈心各二十件煎八分食前服

凉榮瀉火湯

治婦人懷抱憂鬱不清致生內熱小水澀滯大便祕結及陰中火鬱作痛亦如溼淋宜此瀉之

川芎　當歸　白芍　生地　黃芩　黃連　山梔　木通　柴胡　茵陳　膽草　知母　麥門冬各一錢　甘草五分　大黃酒炒二錢

右水二鍾煎八分空心服便利去大黃

塌癢湯

治證與銀杏散同

苦參　威靈仙　蛇牀子　歸尾　狠毒各五分　鶴虱草一兩

右用河水十碗煎數滾濾清貯盆內乘熱先熏待溫後洗臨洗和入公猪膽汁二三枚同洗更妙

雄黃黎蘆散

治女人陰中突出如蛇或似鷄冠菌樣者

葱管藜蘆碾細如麪二錢　輕粉　雄黃並細研　鼈頭煅黃色各一錢　冰片二分

右各研極細末和勻再研磁罐收貯先用芎歸湯煎洗隨後搽藥早晚二次

芎歸湯

治證同上

川芎　當歸　白芷　甘草　膽草各等分

右每用五錢煎湯浴洗患上隨後搽藥

內疎黃連湯

陰瘡應用之藥

木香　黃連　山梔　當歸　黃芩　白芍藥

薄荷　檳榔　桔梗　連翹各一錢　甘草五分

大黃二錢

右水二茶鍾煎八分食前服臨服加蜜二匙亦可

透膿散

治同上

黃芪四錢　穿山甲炒末一錢　川芎三錢

當歸二錢　皂角針一錢五分

右水二鍾煎一半臨服入酒一杯亦好

八珍湯

治同上

川芎　白芍　當歸　熟地黃　人參　白朮

茯苓各一錢　甘草炙五分

右水二鍾薑三片棗三枚煎八分食前服

加減八味丸

治同上

茯苓　山藥　丹皮各四兩　山萸肉五兩

澤瀉蒸三兩　五味子炒三兩　肉桂六錢

熟地杵膏酒煮八兩

右共爲末煉蜜丸如梧子大每服二錢空心服鹽湯送下尋常酒服亦可

小柴胡湯

治同上

柴胡二錢　黃芩炒一錢　人參　半夏各七分

甘草炙五分

右薑水煎服

消風散

治同上

當歸　生地　防風　蟬蛻　知母　苦參

胡麻　荊芥　蒼朮　牛蒡子　石膏各一錢

甘草　木通各五分

右水煎食遠服

蘆薈丸

治同上

胡黃連　黃連　蘆薈　白蕪荑　白雷丸

青皮　鶴蝨草各一兩　麝香一錢　木香三錢

右爲末蒸餅糊丸如麻子大每服一錢空心清米湯下

加味逍遙散

治同上

柴胡五分　甘草炙　當歸炒　芍藥酒炒

茯苓　白朮炒各一錢　丹皮　山梔各隨宜

右水煎服

三茱丸 準繩下同

治陰中生一物牽引腰腹脹痛甚至不思飲食皆因多服熱藥及煎煿或犯非理房事兼意淫不遂

名陰挺

食茱萸　吳茱萸湯浸微炒　白蒺藜　青皮

桔梗水浸漉出慢火炒　舶上茴香淘去砂土焙

山茱萸肉微炒各一兩　五味子淨　海藻洗焙

大腹皮酒洗曬　川楝子肉　延胡各一兩二錢半

右爲末酒糊爲丸如梧子大每服三十五丸木通湯下一方每服二錢生地黃湯調仍用金毛狗脊五倍子白礬水楊根魚腥草川黃連各一兩爲散分作四服以有嘴瓦罐煎熟預以銀錫作一長小筒下透罐嘴嘴上貫挺上先熏後洗立效更服白薇散凌霄花少許煎

如下虛加川烏炮去皮肉桂去粗皮各一兩

如腰腹痛甚加桃仁去皮尖麩炒別研青皮去白枳實去穰各一兩眞南木香七錢半服之

一捻金丸

服前藥未效却用此丸

延胡索　舶上蘹香　吳茱萸炒　川楝子去核

青木香各二兩

右爲末粳米飯糊丸如梧桐子大每服三十五丸空心木通湯服又用梅花腦子五分鐵孕粉一錢水調刷上

如陰畔生疱以涼血飲每服三錢加凌霄花少許煎空心服見效

黃芩散

治婦人陰挺脫下

黃芩　蝟皮炒微焦　當歸各半兩　赤芍一兩

牡蠣　竹皮各二兩　狐莖一具一作狐皮

右治下篩飲服方寸匕日三禁舉重房勞冷食一方以酒服二錢妙

丹溪方

權小娘瘡後右腿股生癤破後筋弔疼脈虛而濇詢之小便時疼患處亦相應宜與生血導熱

川芎　當歸頭　條芩　生地　赤芍　牛膝
黃蘗　甘草炙各二分　青皮炒　檳榔各五分
通草三分　桂皮一錢

右煎食前熱飲之

潔古方

治男子婦人陰部濕痙瘡

文蛤研　乳香各五分　白礬一錢　銅綠少許

輕粉一字

右爲極細末洗淨摻之

當歸湯 準繩

治婦人陰蝕瘡

當歸　川芎　芍藥　甘草各二兩　地榆三兩

右細切以水五升煮取三升去查熏洗日三夜二一方用蛇牀子不用川芎

藿香養胃湯 危氏方

治陽明經虛不榮肌肉陰中生瘡不愈

藿香　白朮　白茯苓　神麯炒　烏藥　砂仁
薏苡仁　半夏麯　人參各半兩　葷澄茄
甘草炙各三錢半

右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗三枚同煎不拘時候

又方 千金方

治陰瘡

蕪荑　芎藭　黃芩　甘草　礬石　雄黃
附子　白芷　黃連各六銖

右咬咀取猪膏四兩合煎傅之

又方 準繩下同

治婦人陰瘡與男子妬精瘡大同小異

黃丹　枯白礬　蒴薔　藥本各一兩　白蛇皮一條燒灰　硫黃半兩　荊芥　蛇牀子各半兩研細

右細末另以荊芥蛇牀子煎湯溫洗軟帛拭乾清油調塗如瘡濕乾末摻之

又方

治疳瘡因月後便行房致成濕濁伏流陰道疳瘡遂生搔癢無時先用胡椒葱白作湯一日兩三度淋洗却服後藥

赤石脂　龍骨　黑牽牛炒　菟絲子酒浸蒸
黃芪鹽水炙　沙苑蒺藜炒

右爲末蜜丸梧桐子大每服二十丸燕窩蒸酒澄上清者吞下

肘後方

療女人陰中生瘡

杏仁　雄黃　礬石各二分　麝香二分半

右四味研細傅之

黃芩湯

療婦人陰中生瘡

黃連一分　雄黃　當歸　黃芩　川芎　大黃
礬石各二分

右七味切以水五升煮取四升洗瘡日三度

雄黃散

治同上

雄黃　川芎　辰砂　藜蘆　北細辛　當歸
川椒各分兩隨宜

右爲末綿裹內陰中又傅外瘡上忌如常法

補心湯 危氏方

治陰中生瘡名曰蠶瘡或痛或癢如蟲行狀淋瀝膿水

白茯苓　人參　前胡　半夏湯洗七次去滑
川芎各三分　枳殼去穰麩炒　紫蘇　桔梗
甘草炙　橘皮　乾薑各半兩　當歸一兩三錢
白芍藥二兩　熟地黃一兩半

右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗一枚同煎食前服

又方 準繩下同

治同上

五倍子　甘草　滑石　黃丹各等分

右爲末先以甘草湯洗然後傅之

又方

治同上

眞平胃散　貫衆末

右每服二錢煮熟猪肝拌藥內陰戶數日可安

當歸散

治婦人陰中突出一物長五六寸名陰挺

當歸　黃芩各二兩　牡蠣一兩半　赤芍五錢
蝟皮一兩炙

右爲末每服二錢食前溫酒調下滾湯亦可如不應更以補中益氣湯倍加升麻柴胡兼服之

又方

治證同上

當歸　穿山甲炙　蒲黃炒各半兩　辰砂一錢
麝香少許
右爲末每服三錢酒調下尤效

菖蒲散
治婦人陰戶腫痛月水澀滯
菖蒲　當歸各一錢　秦艽七錢半　吳萸製五錢
右爲末每服三錢空心葱湯調下更以枳實炒熱頻熨患處

又方
治陰內膿水淋漓或癢痛
升麻　白芷　黃連　木通　當歸　川芎
白朮　茯苓
右水煎服更用塌腫湯浴洗

塌腫湯
治婦人陰戶生瘡或癢痛或膿水淋漓
甘草　乾漆各三錢　生地黃　黃芩　當歸
川芎各二錢　鼈甲五錢炙
作一劑用水數碗煎數沸去柤常洗患處

洗搨散 大全
治陰蝕瘡
甘草　乾漆各一兩　黃芩　當歸　地黃
芍藥各二兩　龜甲五兩
右細切以水七升煑取一半去查以綿帛內湯中用搨瘡處良久卽易日二度每搨湯可作十里許卽挹乾捻取疳濕散薄傅瘡上使徧可經半日又以湯搨搨訖如前傅藥

疳濕散 準繩下同
治證同上
蚺蛇膽眞者　青木香　石硫黃　鐵精粉
麝香各四分 臨時入緣麝辟蛇毒若先相和膽卽無力
右各等分爲末更研細有患取如三碁子大和井華水日再服訖先令便利了卽以單方內桃枝熏法先熏下部訖然後取藥如碁子大安竹管裏內下部中日再度老少量減其熏法每日一度不用再舊用五月五日蝦蟆

蛇牀子散
濕熱陰中生瘡主藥
蛇牀子仁　白粉少許
和令相得如棗大緜裹內之自然濕熱消散

狼牙湯 錄驗
治婦人陰蝕其中爛傷膿水淋瀝臭穢
狼牙三兩
右㕮咀以水四升煑至五合去查內苦酒如雞子中黃大沸湯一杯消盡夜適寒溫以緜纏筯頭大如繭濡湯以瀝瘡中日四五度卽痊

麻黃湯
治婦人陰腫或瘡爛者
麻黃　黃連　蛇牀子各二兩　北艾葉一兩半
烏梅十箇
右剉細以水一斗煑取五升去查熱洗避風冷

白礬散
治婦人陰腫堅痛
白礬半兩　甘草半分生　大黃一分生
右爲細末每用棗大緜裹內陰中日兩換

大黃散
治婦人陰癢
大黃微炒　黃芩　黃芪炙各一兩　赤芍藥
元參　丹參　山茱萸　蛇牀子各半兩
右爲細末食前溫酒調二錢服

廣濟方
療婦人陰癢不止
藜蘆二錢半　蚺蛇膽　雄黃　硫黃　朱砂
硝石　蕪荑各半兩
右爲細末研停以臘月猪脂和如膏用故布作纏子如指長一寸半以藥塗上內陰中日一易之易時宜用猪椒根三五兩水煑稍熱洗乾拭內之效

千金方
療小戶嫁痛連日
甘草　生薑各三分　白芍藥　桂心各二分
右細剉以酒二升煑取三沸去滓溫服神良

珍珠散 外科正宗
女人陰蝕瘡或新嫁內傷痛甚者用此搽極效
青缸花五分　珍珠一錢不論大小以新白爲上入豆腐內煑數滾研爲極細無聲方用　眞輕粉一兩
右三味共研千轉細如飛麵方入罐收如無青缸花用頭刀靛花輕虛色翠者代之終不及缸花爲妙

海螵蛸散
療婦人小戶嫁痛
鰞鯽魚骨二枚
右一味燒研細末酒調方寸匕日三服

單行太和湯
療婦人嫁痛
大黃三兩
右一味切以酒一升煮一沸頓服
洗心散
治女人陰挺
麻黃　當歸　生大黃　荊芥穗　赤芍藥
甘草各一錢　白朮五分
右剉作一貼入薄荷七葉水煎服
膏髮煎 方見
治婦人胃氣下泄陰吹而正喧
猪膏半斤　亂髮如雞子大三枚
右二味和膏中煎之髮消藥成分再服
集驗方
治女人傷丈夫四體沉重嘘吸頭痛
生地黃八兩　芍藥五兩　豉一升　葱白一斤
生薑四兩　甘草二兩
右六味以水七升煮取二升半分三服不得重作
忌房事
桑白皮湯
療諸婦人傷丈夫苦頭痛欲嘔悶
桑皮半兩　乾薑一兩　桂心五寸　大棗二十枚
右四味切以酒一斛煮三四沸去滓分溫服衣適
厚薄毋令汗出
來復丹
治婦人與男子交接相傷因而四肢沉重頭痛昏
運

青皮去白　陳皮去白　五靈脂水澄去砂臞乾各
二兩　舶上硫黃透明者　太陰元精石研水飛
硝石同硫黃爲末入瓷碟內以微火炒用柳箒攪不
可火太過恐傷藥力再研極細名二氣末各一兩
右用五靈脂青橘皮爲末次入元精石末及前二
氣末拌勻好醋打糊爲丸豌豆大每服三十丸空
心米飲下
五加皮浸酒方 聖惠方
治婦人癖痩陰冷
五加皮　熟地黃　丹參　杜仲去粗皮炙微黃
蛇牀子　乾薑各三兩　天冬一兩　鍾乳四兩
地骨皮二兩
右細剉以生絹袋盛以酒一斗五升漬二宿後每
煖服一大盞空心及晚食前服一方用枸杞子無
地骨皮
又方 大全
治婦人陰冷
遠志　乾薑生用　蓮花各半兩　蛇牀子
五味子各一兩
右搗羅爲末每用兼以兔糞塗陰門用綿裹一錢
內陰中熱卽爲效
又方
治同上
蛇牀子三分　吳茱萸製　甜葶藶各半兩
沒石子一枚
右搗羅爲末綿裹棗許大內陰中令腹內熱爲度
溫中坐藥蛇牀子散

治婦人陰冷
蛇牀子　白粉少許
右爲末和勻丸如棗大綿裹內陰中自然溫矣
八味丸
治血弱不能榮養臟腑津液枯澀風寒客於子臟
以致陰冷
熟地黃八兩杵膏　山茱萸肉　乾山藥各四兩
丹皮　茯苓　澤瀉各三兩　肉桂　附子各一兩
右爲末和地黃膏加煉蜜丸桐子大每服七八十
丸空心食前滾湯下按此丸果係肝脾腎虛殊有
神效

單方
婦人陰挺出下脫桂心吳茱萸各一兩戎鹽二兩並
熬令色變搗羅爲末以綿裹如指大內陰中日再易
之甚妙一方用川椒不用桂心 肘後下同
又方川椒川烏頭並生用白芨各半兩搗羅爲末綿
裹一錢內陰中深三寸腹中熱卽止來日再用之一
方無川椒止用川烏頭白芨二味
又方蛇牀子五兩烏梅二七枚以水五升煮取三升
去查稍熱洗之每日夜三五度用

又方硫黃鮎鯛骨各半兩搗羅爲末傅之

又方鐵精粉研細以羊脂調布裹炙令熱熨之以瘥爲度

又方弊帚頭燒爲灰酒服方寸匕食前服

婦人陰下脫若肚用羊脂煎訖適冷暖取塗上以鐵精傅之多少令調以火炙布令暖熨肚上漸塗內之然後末磁石酒服方寸匕日三

又方用荊芥穗臭椿樹皮藿香葉煎湯熏洗即入

又方用蓖麻子葉有九角者好飛過白礬爲末以紙片攤葉托入

又方先以淡竹根煎湯洗仍用五倍子白礬爲末乾摻立效

又方用溫鹽水洗軟却用五靈脂燒烟熏次用蓖麻子研爛塗上吸入如入即洗去

婦人陰中生痔用烏頭七箇燒存性用小瓦罐盛釅酢淬之乘熱熏候溫通手沃之良

婦人茄子疾用茄皮白礬馬椿頭根矾硝澤蘭煑水熏洗加入炒石灰少許妙

又方用矾硝爲末黃荊柴燒瀝調傅或濃磨鐵漿水調傅

又方用生枳殼爲散煎湯熏洗却用綿帛包枳殼查納入陰中即日漸消

女人陰蝕取東南桃枝五七枝輕打頭使散以緜纏之又搗石硫黃爲末將此緜纏桃枝撚轉之令末少厚又截一竹筒先內下部中仍以所撚葉桃枝燒著熏之

陰蝕蒲黃三升水銀一兩二味研勻以粉傅上

又方肥猪肉十斤水一石煑水浸冷即易不過三兩度

陰蝕欲盡以蝦蟆兔屎等分爲末傅之良

女人陰癢炙猪肝納入當有蟲出（肘後方下同）

婦人陰癢用桃仁杵爛緜裹塞之

婦人陰䘌作癢羊肝納入引蟲（集簡方）

婦人陰瘡紫葳爲末用鯉魚腦或膽調搽（摘元方下同）

婦人陰癢牆頭爛茅荊芥牙皂等分煎水頻熏洗之

又方用蛇牀子一兩白礬二錢煎湯頻洗（集簡方）

又方用小薊煑湯日洗三次（廣濟方）

又方用狼牙二兩蛇牀子三兩煎湯熱洗（外臺）

女子陰瘡硫黃末傅之瘥乃止（肘後方）

女人陰瘡如蟲咬癢痛者生搗桃葉綿裹納之日三四易（食療）

婦人陰門邊生瘡作癢作痛不止者蛇牀子一兩花椒白礬各三錢水十碗煎五碗乘熱熏之溫則洗之一次即止癢二次即止痛三次即全愈分作五日洗之每日止洗一次神效（石室秘錄）

婦人陰腫堅痛枳實半斤麩炒帛裹熨之冷即易（子母秘錄）

婦人陰腫或生瘡枸杞根煎湯頻洗（末類方）

婦人陰腫作癢蒜湯洗之效乃止

女人陰腫甘菊苗搗爛煎湯先熏後洗（得效方）

婦人陰痛青布裹鹽熨之（藥性論）

又方礬石三分炒甘草末半分綿裹導之取瘥（百一）

婦人陰痛絹盛蛇牀子蒸熱熨之（千金下同）

又方牛膝五兩酒三升煑取一升半去滓分三服

婦人陰挺鐵精粉一錢龍腦半錢研水調刷產門（得效方）

女陰挺出茄根燒存性爲末油調在紙上捲筒安入內一日一上（乾坤生意）

婦人陰癩硬如卵狀隨病之左右取穿山甲之左右邊五錢以砂炒焦黃爲末每服二錢酒下（摘元方）

婦人陰脫作癢礬石燒研空心酒服方寸匕日三（千金翼方）

又方用白芨川烏頭等分爲末絹裹一錢納陰中入三寸腹內熱即止日用一次（廣濟方）

婦人陰脫煎羊脂頻塗之（廣利方）

婦人陰中腫痛不可忍艾葉五兩防風三兩大戟二兩剉細以水一斗煑至五升熱洗日三次切宜避風冷（準繩下同）

陰中腫痛枳殼半斤炒令熱以故帛裹熨冷即換之

陰腫鐵精粉傅上

又方小麥矾硝白礬五倍子葱白煑水洗

又方陰腫大馬鞭草搗爛塗之

陰腫不下小戶嫁痛冬青葉小麥甘草等分水煎洗

婦人陰癢不可忍杏仁燒作灰乘熱綿裹內陰中日二易之

產門蟲蛆痛癢不可忍用杏仁去皮燒存性杵爛綿裹納入陰中取效

又方取鷄肝炙熱內陰中如有蟲當盡下

又方取牛肝截五寸繩頭內陰中半日蟲入肝出之猪肝亦得

陰中有蟲癢且痛目腫身黃欲得男子漏血下白少

氣思美食用鯉魚長一尺去頭肉取骨搗末熬黃黑以猪脂和以絹袋盛如常法內陰中至痛處卽止蟲當自出

小戶嫁痛牛膝五合切酒三升煮至二升分三服

婦人陰痛用靑鹽炒熱以布裹熨之

婦人陰冷蛇牀子一兩吳茱萸一兩半生搗羅爲末煉蜜和丸如酸棗大以綿裹內陰中下惡物爲度

又方用麝香合前二味玉門覓冷硫黃煎水頻洗之

心痛方

女人陰冷五味子四兩爲末以口中玉泉爲丸冤矢大頻納陰中取效

婦人陰寒十年無子者用吳茱萸川椒各一升爲末煉蜜丸彈子大綿裹納陰中日再易之但子宮煖卽有子也經心鑑

婦人陰冷母丁香末紗囊盛如指大納入陰中病卽已本草衍義

女人交接輒出血桂心伏龍肝各二分右爲末酒服方寸匕瘥止準繩下同

又方黃連六分半牛膝甘草各四分三味細切以水四升煮取二升洗日三四度瘥

又方以熱艾緊裹一團然後以絹裹內陰中

女人交接陽道違理及他物所傷致血流漓不止取釜底墨斷壺盧塗藥內之

女童交接陽道違理血出不止燒髮並靑布末爲粉塗之

又方割鷄冠血塗之

又方以赤石脂末摻之

又方五倍子末摻亦良

鍼灸

甲乙經曰女子禁中癢腹熱痛乳餘疾缺三字子門不端少腹苦寒陰癢及痛經閉不通中極主之

女子手脚拘攣腹滿疝月水不通乳餘疾絕子陰癢陰交主之

腹滿疝癥乳餘疾絕子陰癢刺石門

婦人陰中痛少腹堅急痛陰陵泉主之

女子疝及少腹腫溏泄癥遺溺陰痛面塵黑目下背痛太衝主之

婦人下赤白沃後陰中乾痛惡合陰陽少腹膹堅小便閉曲骨主之

女子下蒼汁不禁赤瀝陰中癢痛少腹控肘不可俛仰下廉主之刺腰尻交者兩脾上以月死生爲病數發鍼立已

小腹脹滿痛引陰中月水至則腰脊痛胞中寢子門有寒引髓辟水道主之

女子絕子陰挺出不禁白瀝上巨虛主之

婦人陰挺出四肢逕漯身悶照海主之

女子月水不利或暴閉塞腹脹滿癥逕深身熱腹中絞痛癲疝陰腫氣衝鍼上入三寸氣至瀉之

女子不字陰暴出經水漏然谷主之

女子疝瘕拽之如以湯沃兩股中少腹腫陰挺出痛經水來下陰中腫或癢漉青汁若葵羹血閉無子不嗜食曲泉主之

女子陰中寒歸來主之

月事不利見血而身反敗行間主之

千金方曰月事不利見赤白而有身反敗陰寒刺行間入六分灸三壯穴在足大趾間動應手

水原穴照海穴主不字陰暴出淋漏月水不來而多悶心下痛

照海主陰挺下血陰中腫或癢漉清汁若葵汁

女子不字陰暴出經漏然谷入三分灸三壯穴在足內踝前起大骨下陷中

赤白沃陰中乾痛惡合陰陽小腹膹堅小便閉刺屈骨入一寸半灸三壯穴在中極下一寸

醫學綱目曰女子陰中痛取大敦

醫案

瑯嬛記曰一婦人病陰中癢不敢告人苦甚平日奉觀世音像甚謹正病時見一尼持藥一函至曰煎此洗之卽愈矣尼忽不見啓視之乃蛇牀子吳茱萸苦參也

醫學綱目曰一婦人患臍下腹上連二陰遍滿生瘡瘡狀如馬刀他處並無熱癢而痛大小便澀出黃汁食亦減身面浮腫醫作惡瘡治用鯽鮐魚松脂黃丹之類塗瘡上愈熱痛甚治不對證故也細問之此人

嗜酒食咸喜魚蟹發風等物急令用温水洗拭去肯藥尋馬齒莧四兩研碎入青黛一兩再研勻塗瘡上即時熱減痛癢皆去仍服八正散日三服發散客熱每塗藥一時久即乾又再塗新濕藥如此二日減三分之一五日減二自此二十日愈既愈乃問曰此病何緣至此曰中下焦畜風熱毒熱氣若不出當作腸癰內痔仍須禁酒及發風物後不能禁酒果患內痔醫學準繩六要曰一婦陰中挺出一條五寸許悶痛重墜水出淋漓小便澁滯夕與龍膽瀉肝湯分利濕熱朝與補中益氣湯升補脾氣諸證漸愈再與歸脾加山梔茯苓川芎黃蘗間服調理而愈後有蟲亦用此法有膿水腫痛用補中益氣倍升柴加茯苓炒梔子自效

薛己醫按曰一婦人陰中突出如菌四圍腫痛小便頻數內熱晡熱似瘡似痛小腹重墜此肝脾鬱結之證蓋肝家濕熱作腫作痛脾虛下陷則重墜先以補中益氣湯加山梔茯苓川芎調理外以生猪脂和黎蘆末塗之遂收

一婦人陰中挺出五寸許悶痛重墜水出淋漓小便澁滯夕與龍膽瀉肝湯分利濕熱朝與補中益氣湯升補脾氣諸證漸愈再與歸脾加山梔茯苓川芎黃蘗間服調理而愈後因勞役或怒氣下部濕瘡小水不利仍用前藥即愈

一婦人陰中腐潰膿水淋漓腫痛寒熱小便赤澁內熱作渴肢體倦怠胃脘不利飲食少思余以爲肝脾虧損用補中益氣湯內柴胡升麻各用一錢加茯苓一錢山梔二錢數劑少愈又與歸脾湯加山梔川芎茯苓二十餘劑諸證悉退惟內熱尚在再與逍遙散倍用山梔而愈

一婦人素性急陰內痛小便赤澁怒而發甚或發熱或寒熱此肝經濕熱所致用芎歸炒梔柴胡苓术丹皮澤瀉炒芍車前炒連生甘草數劑漸愈乃去黃連澤瀉又數劑全愈

一婦人陰內膿水淋漓或癢或痛狀似蟲行診之少陰脈滑數此陰中有瘡也名曰蟨由心神煩鬱胃氣虛弱氣血凝滯所致與升麻白芷黃連木通當歸川芎白术茯苓柴胡煎服用搗腫湯熏洗更探蒲黃水銀兩月餘而愈或有胞絡虛風邪乘陰血氣相搏令氣否澀致陰腫痛當以菖蒲散治之更以枳實炒熱帛裹熨之冷則再炒或有子臟虛冷氣下衝致陰脫出謂之下脫或因產努力而脫者以當歸散治之久不愈者以補中益氣湯倍加升麻柴胡升舉之

一婦人胃脘不利內熱作渴飲食不甘肢體倦怠陰中悶癢小便赤澁此鬱怒傷肝脾所致用歸脾湯加山梔而愈復因怒患并小腹脹痛用小柴胡加山梔芎歸芍藥痛止用逍遙散加山梔而愈又因勞役患處腫脹小便仍澁用補中益氣加山梔茯苓丹皮而痊

一婦人陰內痛癢不時出水食少體倦此肝脾氣虛濕熱下注用歸脾湯加丹皮山梔芍藥柴胡生甘草主之而安

一婦人陰內瘙痛內熱倦怠飲食少思此肝脾鬱怒元氣虧損濕熱所致用參芪歸术陳皮柴胡炒梔車前升麻芍藥丹皮茯苓而瘥若陰中有蟲瘙痛亦屬肝木以桃仁雄黃研納陰中以殺之仍用清肝解鬱之藥有以雞肝納之者乃取蟲之法也

一婦人陰中腫悶小便澁滯兩脅作腫內熱晡熱月經不調時或寒熱此因肝脾鬱怒元氣下陷濕熱壅滯朝用歸脾湯加柴胡升麻解鬱結補脾氣升元氣夕用加味逍遙散清肝火生肝血除濕熱各數劑諸證悉愈又用四君芎歸丹皮調補肝脾而經水如期

一婦人陰中寒冷小便黃澁內熱寒熱口苦脅脹此因肝經濕熱用龍膽湯祛利濕熱用加味逍遙散調補血氣而安

一婦人所患同前更寒熱嘔吐兩股腫痛先用小柴胡加山梔一劑寒熱嘔吐頓止次用龍膽瀉肝湯一劑腫痛頓消

一婦人陰中寒冷小便澁清腹中亦冷飲食少思大便不實下元虛寒治以八味丸月餘飲食漸加大便漸實又月餘諸證悉退

一婦人交接出血作痛發熱口渴欲嘔或用寒凉之藥前證益甚不時作嘔飲食少思形體日瘦余曰證屬肝火而藥復傷脾所致也先用六君加山梔柴胡脾胃健而諸證愈又用加味逍遙散而形氣復

一婦人陰腫下墜悶痛出水胃腹不利小便頻數內熱晡熱口苦耳鳴此肝脾火證用小柴胡加車前膽草茯术升麻二劑而小愈又用加味逍遙加升麻數劑漸愈乃以加味歸脾加升麻柴胡并補中益氣加山梔數劑頓愈仍用加味逍遙加味歸脾二藥調理全愈

一婦人患前證熱痛或用寒凉敗毒藥飲食不入時

欲作嘔小腹重墜余謂此脾胃復損元氣下陷先用補中益氣加炮薑二劑重墜頓愈又加茯苓半夏二十餘劑而愈乃以歸脾湯少加柴胡升麻并六味地黃丸而安

一婦人每交接出血作痛此肝火動脾而不能攝血用補中益氣濟生歸脾二湯而愈若出血過多但用前藥調補肝脾

外科正宗曰一婦人肝經風濕下流陰器浮腫癢甚致抓出血不痛以消風散加苦參膽草澤瀉木通山梔外以蛇牀子湯熏洗搽銀杏散十餘日癢止腫消而愈

一婦人孀居十餘載陰器作癢生蟲含忍不說後陰器蝕爛已蝕內臟人形消瘦發熱作渴脉浮洪數方請醫治詢問陰癢痛日久陰器黑腐小水不禁內臟已壞不可用藥彼苦求治予曰癢者蟲也痛者損也先用鯽魚數枚以香料摻炙魚熟以絲綿包裹納入陰中夾之良久取出紅蟲長者一寸短者五六分細如絲綿約有二十餘條置溫水中搖擺片時方死彼家懽悅以爲可治予曰非也再取再有生化無窮強投養血清肝藥終至不痊而死

一婦人無辜發熱月餘忽陰中突出一物如雞冠一片此肝鬱脾虛所致以補中益氣湯加青皮山梔柴胡黃芩外以甘草白芷蒼术紫蘇煎湯每日熏洗十餘日其患漸消仍用煎湯倍參术服月餘而安

一婦人陰中作癢遇痛則心煩躁作渴不睡此思慮太過致心腎不交以四物湯加龍膽草山梔黃連知母外以銀杏散納入陰中二日其發漸止又朝以八味丸午用歸脾湯加柴胡茵陳月餘而愈

一婦人陰器半邊腫痛身發寒熱口乾便祕脉實有力以內疎黃連湯一劑大便通利口乾乃止惟腫痛尤甚此濕毒結聚欲爲膿也以四物湯加角針澤瀉二劑膿熟脹痛又以透膿散一服出臭膿鍾許疼痛頓止以八珍湯加丹皮澤瀉十餘劑而安

一婦人陰器腫痛小水澀滯遇晚寒熱交作此肝經濕熱爲患以龍膽瀉肝湯二服小水通利又以四物湯兼小柴胡加天花粉木通炒山梔服之而愈

婦人夢與鬼交門

宋陳自明婦人良方

論證脈

人稟五行秀氣而生承五臟神氣而養若調理失節血氣虛衰則鬼邪干其正隱避而不欲見人時獨言笑或時悲泣是其候也脉息遲伏或如烏啄或綿綿而來不知度數面顏不變亦其候也

前證多由七情虧損心血神無所護而然也宜用安神定志等藥則正氣復而神自安若脉乍大乍小乍短乍長亦爲鬼祟也宜灸鬼哭穴

按大全陰陽調和臟腑強盛邪鬼安得而干之明方賢奇效良方

總論證治

人有五臟中有七神稟五行秀氣而生皆承神氣所以保養若陰陽調和則臟腑強盛鬼魅不能傷之若攝護失節而血氣衰鬼邪侵傷故婦人夢中多與鬼魅交通由臟腑虛神不守舍故鬼氣得爲病也其狀不欲見人如有對語或時獨笑或時悲泣者是也其脉伏遲或爲烏啄皆鬼邪爲病也又脉來綿綿不知度數者顏色不變亦此候也昔戴人治效已載於書信不誣矣且寡婦尼僧夜夢交通邪氣交感久作癥瘕或成鬼胎以茯神散桃仁丸治之

景岳全書 臣依本資著

論證治

人稟五行正氣以生氣正則正氣邪則邪氣強則神旺氣衰則鬼生如素法論曰神失守位則邪鬼外干即此類也然婦人之夢與邪交其證有二一則由慾念邪思牽援意志而爲夢者此鬼生於心而無外干也一則由稟賦非純邪得以入故妖魅敢於相犯此邪之自外至者亦有之矣病因有內外則證亦有不同病由內生者外無形迹不過於夢寐間常有所遇以致遺失及爲恍惚帶濁等證亦如男子之夢遺其機一也但在女子多不肯言耳至若外有邪犯者其證則異或言笑不常如有對語或喜幽寂不欲見人或無故悲泣而面色不變或面帶桃花其脉息則乍疎乍數三五不調或伏沉或促結或紛細或代易不常是皆妖邪之候凡此二者若失於調理久之不愈則精血日敗真陰日損乃致潮熱發熱神疲體倦飲食日減經水日枯肌肉消削漸成勞損脉見緊數多致不救矣凡治此者所因雖有不同而傷精敗血其病則一故凡病生於心者當先以靜心爲主然後因其病而藥之神動者安其神定其志精滑者固其精養其陰尤當以培補脾腎要約門戶以助生氣爲主若爲妖魅所侵則內當調補正氣如歸神湯之類外宜速灸鬼哭穴以驅邪氣則自當漸愈

方

茯神散 大全下同

治婦人風虛與鬼交通妄有所見語言雜亂茯神一兩半　人參　菖蒲各一兩　赤小豆半兩右㕮咀每服三大錢水一盞煎六分去滓食前溫服一方加茯苓一兩

桃仁丸

治婦人與鬼魅交通

辰砂　檳榔　當歸　桃仁各七錢半　麝香阿魏麪裹煨　沉香各半兩　水銀二錢半棗肉研令星盡

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大空心桃仁湯吞下十丸

辟瘟丹 準繩下同

治證同前

虎頭骨半兩　硃砂　雄黃　雌黃　鬼臼　皂莢　蕪荑仁　鬼箭　藜蘆各一兩

右件生爲末煉蜜丸如彈子大囊盛一丸繫女人右臂上及用一丸當病人戶前燒之一切邪鬼不敢近

殺鬼雄黃散

治婦人與鬼交通

雄黃　丹砂　雌黃各一兩俱細研　羚羊角屑　蕪荑　虎頭骨　石菖蒲　鬼臼　鬼箭　蒼朮　白頭翁　石長生　馬懸蹄　猪糞各半兩

右爲細末以羊脂蜜蠟和搗爲丸如彈子大每用一丸當患人前燒之

別離散

治婦人風虛與鬼交通悲思喜怒心神不定楊柳樹上寄生　白朮各一兩　桂心　茵芋　天雄炮去皮臍　薤根　菖蒲九節者　細辛　附子炮去皮臍　乾薑炮各半兩

右爲細末每服一錢食前溫酒調下

朱砂散

治婦人風虛與鬼交通悲笑無恆言語錯亂心神恍惚睡臥不寧

朱砂細研水飛過　鐵粉研各一兩　雄黃研　龍骨各半兩　蛇蛻一尺燒　虎睛一對炙　牛黃　麝香各二錢半

右同研極細每服一錢以桃符湯調下不計時候

又方

治婦人與鬼交通

雄黃　人參　防風各一兩　五味子一合

右搗篩淸且以井華水服方寸匕三服瘥

太乙神精丹

治女人夢與鬼交

雄黃油煎七日　雌黃　硃砂光瑩者　慈石曾青各一兩　金牙石六錢

右各研細將雄雌二黃硃砂酥浸三日曾青用好酒於鍋器中浸紙封曝百日急用七日亦得如天陰用火焙乾六味同研勻用砂盒盛令藥滿得三分許以此藥盒子大小先以赤石脂末固縫外用六一泥固濟記須候透乾以晴明六合吉日合別用泥作三箇柱子高五寸令平穩如鼎足狀安盒子下置炭火二升逐旋添炭常令及五斤只在盒底不得過口煆五日爲度放冷水中浸盒子候泥透剝去泥將盒輕手取開其藥精英五色盡在蓋上亦有三色者純白爲上研細棗肉丸如粟米大每服一丸米飲服之口噤牙緊斡前兩齒灌下即甦

六一泥法

礬石黃泥裹火燒一伏時研細　蚯蚓糞　鹼土　黃蘗遠看如金絲色精明其色本綠以黃泥裹火燒通赤如血取出研細　鹽各二兩　黃泥一斤

同爲末以紙一處搗和成泥

蘇合香丸

治證同上

白朮　靑木香　鳥犀角屑　香附子炒去毛　硃砂研水飛　訶黎勒煨取皮　白檀香　丁香　安息香另末無灰酒一升熬膏　沉香　麝香研　蘇合香二兩　龍腦研　薰陸香別研各一兩

右爲細末入研藥勻用安息香膏并煉白蜜和劑每服旋丸如桐子大早朝取井華水溫冷任意化服四丸老人小兒化服一丸溫酒化服亦得並空心服之用蠟紙裹一丸如彈子大絳絹袋當心帶之一切邪神不敢近

妙香散

治女人心氣不足精神恍惚夜夢顚倒與鬼交通言語錯亂宜先服補氣養血鎭心安神然後以上數方隨宜用之

木香煨二錢半　山藥薑汁炙　茯苓　茯神
遠志炒　黃芪各一兩　辰砂二錢另研　人參
桔梗　甘草炙各半兩　麝香一錢另研
右爲細末每服二錢不拘時溫酒調下

單方

女人與邪物交通獨言笑悲思恍惚用雄黃末一兩以松脂二兩鎔和虎爪攪令如彈丸夜內火籠中燒之令女人踞坐其上以被自蒙唯出頭目未瘥再作不過三劑自斷也（準龜下同）

又方以安息香和臭黃合爲丸燒熏丹田穴永斷

婦人夢與鬼交鹿角爲末三指撮和清酒服卽出鬼精兼治漏下不斷

婦人爲妖所魅迷惑不肯言狀以水服鹿角屑方寸匕卽言實也

鍼灸

證治準繩曰婦人夢與鬼交脈來乍大乍小乍短乍長宜灸鬼哭穴以患人兩手大拇指相並用線緊紮當合縫處半肉半甲間灼灸七壯若果是邪祟病者卽乞求免灸云我自去矣

景岳全書曰女人夢與鬼交灸鬼哭穴其穴以兩手大指相並縛定用艾炷於爪甲角縫灸之務令兩甲連肉四處著火方效或七壯或二七壯兩足大指亦名足鬼眼

醫案

儒門事親曰一婦年三十四歲夜夢與鬼神交驚怕異常及見神堂鬼府舟楫橋梁如此一十五年竟不娠孕巫祈覡禱無所不至鑽肌灸肉孔穴萬千黃瘦發熱引飲中滿脚腫診其兩手寸脈皆沉而伏知胃中有痰實也此其陽火盛於上陰水盛於下鬼神者陰之靈神堂者陰之所舟楫橋梁水之用兩手寸脈皆沉而伏知胃中有痰實也凡三涌三泄三汗不旬日而無夢一月而有孕

婦人交腸門

明樓英醫學綱目

交腸論證治

婦人小便中出大糞名交腸服五苓散效如未盡愈可用舊幔頭燒灰酒調服之

方

五苓散

治女人交腸

澤瀉二錢半　赤茯苓　白朮　豬苓各一錢半
肉桂五分

右爲末每二錢白湯調下或剉作一貼水煎服

補中益氣湯

治女人交腸兼用此湯

陳皮五分　黃芪炒　人參　白朮炒　甘草炙
當歸各一錢　柴胡　升麻各三錢

右薑棗水煎空心午前服

四物湯

治女人尿出後竅六脈沉澀用此加減

熟地黃三錢　芍藥　當歸　川芎各一錢

右水煎服

醫案

朱震亨心法曰一婦人性嗜酒常痛飲不醉忽糟粕出前竅溲尿出後竅六脈皆沉澀與四物湯加海金沙木香檳榔木通桃仁服之而愈此人酒多氣升不降陽極虛又酒濕積久生熱煎熬其血陰亦大虛陰陽俱盡而暫時活者以其形實酒中穀氣尚存故也三月後必死果然

薛己醫按曰一婦人病愈後小便出屎此陰陽失於傳送名大小腸交也先用五苓散二劑而愈又用補

中益氣而安

寓意草曰姜宜人得奇證簡本草經疏治交腸用五苓之說以爲神祕余見辨之曰交腸一證大小二便易位而出若交易然古用五苓散治之專爲通前陰而設也若此證閉在後陰二便俱從前陰而出擬之交腸誠有似是實非者況交腸乃暴病驟然而氣亂於中此證乃久病以漸而血枯於內有毫釐千里之不同安得擬之原夫疾之所始始於憂思結而傷脾脾統血者也脾傷則不能統攝而錯出下行有若崩漏實名脫營脫營病宜大補急固迺誤認爲崩漏以凉血清火爲治則脫出轉多不思天癸已盡潮汛已絕萬無是病其年高氣弱無血以實漏尼者毫不念也於是胞門子戶之血日漸消亡勢不得不借資不仰給矣借資於大腸轉將大腸之血運輸而滲入胞囊久之大腸之血亦盡而大腸之氣附血而行者孤而無主爲拳爲塊奔騰澒散與林木池魚之殃禍同矣又如救荒者剝鄰國爲立盡之墟所不顧矣猶未也仰給於胃脘轉將胃脘之血吸引而滲入胞囊久之胃脘之血亦盡下脫之血始無源自止夫胃脘之血所以榮週身而灌百脉者今迺暗歸烏有則苞稂失潤而黍離足憂血盡而止較之血存而脫又倍遠矣故血盡然後氣亂氣亂然後水穀舍故趨新舍寬趨隘江漢兩渠併歸一路身中爲之大亂勢必大瞞之故道復通迺可撥亂返治與五苓一方全無干涉又況水穀由胃入腸另有幽門泌別清濁今以滲血之故釀爲穀道是幽門闢爲坦徑矣尚可用五苓再闢之乎又況五苓之劫陰爲亡血家所深戒乎今之見一病輒有一藥橫於胷中與夫執成方奉爲靈祕者大率皆悞人者也若宜人之病余三指纔下便問曰病中多哭泣否婢媪曰時時泣下乃知臟燥者多泣大腸方廢而不用也交腸云乎哉今大腸之脉纍纍而現於指可虞之時其來春喪葉生乎棗葉生而言果驗

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百二十一卷目錄

醫部彙考四百一
小兒未生胎養門
列女傳 胎教論
孫思邈千金方 養胎論
陳自明婦人良方 胎教論 孕元立本章 凝形殊稟章 氣質生成章 胎教避忌產前將護法 月遊胎殺 十干日遊胎殺 十二支日遊胎殺 六甲旬遊胎殺 大史局日遊胎殺 食忌論 孕婦藥忌歌
朱震亨格致餘論 慈幼論 胎成論
方賢奇效良方 形質受胎之始論 小兒初生總說
萬氏育嬰家祕 胎養以保其眞
虞摶醫學正傳 小兒總論
郭子章博集方論 未生
徐春甫古今醫統 姙婦不守禁忌生子多疾詩
李梴醫學入門 胎殺禁忌 生子所向方
方 丹參圓 柴胡和胎飲
單方
醫案

藝術典第四百二十一卷

醫部彙考四百一

小兒未生胎養門

列女傳

胎教論

古者婦人姙子寢不側坐不邊立不蹕不食邪味割不正不食席不正不坐目不視邪色耳不聽淫聲夜則令瞽誦詩道正事如此則生子形容端正才過人矣

唐孫思邈千金方

養胎論

舊說凡受胎三月逐物變化稟質未定故姙娠三月欲得觀犀象猛獸珠玉寶物欲得見賢人君子盛德大師觀禮樂鐘鼓俎豆軍旅陳設焚燒名香口誦詩書古今箴誡居處簡靜割不正不食席不正不坐彈琴瑟調心神和情性節嗜慾庶事清淨生子皆良長壽忠孝仁義聰慧無疾斯蓋文王胎教者也

兒在胎日月未滿陰陽未備腑臟骨節皆未成足故自初姙迄于將產飲食居處皆有禁忌

姙娠食羊肝令子多厄食山羊肉令子多病

姙娠食驢馬肉令子延月食騾肉產難

姙娠食兔肉犬肉令子無音聲并缺脣

姙娠食雞肉糯米令子多寸白蟲

姙娠食雞子及乾鯉魚令子多瘡

姙娠食椹并鴨子令子倒出心寒

姙娠食雀肉并豆醬令子滿面多黯黯黑子

姙娠食雀肉飲酒令子心淫情亂不畏羞恥

姙娠食鼈令子短項

姙娠食冰漿絕胎

姙娠勿向非常地大小便必半產殺人

徐之才曰姙娠三月名始胞當此之時未有定儀見物而化欲生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數視璧玉欲子賢良端坐清虛是謂外象而內感者也

宋陳自明婦人良方

胎教論

巢氏病源論姙娠一月名胎胚足厥陰脉養之二月名始膏足少陽脉養之三月名始胎手心主脉養之當此之時血不流行形象始化未有定儀因感而變欲子端正莊嚴常口談正言身行正事欲生男宜佩弦執弓矢欲生女宜佩韋施環珮欲子美好宜佩白玉欲子賢能宜看詩書是謂外象而內感者也四月始受水精以成其血脉手少陽脉養之五月始受火精以成其氣足太陰脉養之六月始受金精以成其筋足陽明脉養之七月始受木精以成其骨手太陰脉養之八月始受土精以成膚革手陽明脉養之九月始受石精以成毛髮足少陰脉養之十月五臟六腑關節人神皆備此其大略也又五臟論有稱者婆者論一月如露珠二月如桃花三月男女分四月形象具五月筋骨成六月毛髮生七月游其魂兒能動左手八月游其魄兒能動右手九月三轉身十月受氣足更有顱顖經云一月爲胎胞精血凝也二月爲胎形成胚也三月陽神爲三魂四月陰靈爲七魄五月五行分五臟也六月六律定六腑也七月精開竅

通光明也八月元神具降眞靈也九月宮室羅布以定生人也十月受氣足萬象成也今推究數說如五臟論者類皆淺鄙妄托其名至於三藏佛書且涉怪誕漫不可考今按顧頤經三卷云中古巫方所撰其巢氏論姙娠至三月始胎之時欲談正言行正事佩弦韋執弓矢施環珮白玉讀詩書之類豈非胎教之理乎嘗試推巢氏所論云姙娠脈養之理若厥陰肝脈也足少陽膽脈也爲一臟腑之經餘皆如此且四時之令必始於春木故十二經之養始於肝所以養胎在一月二月手心主心包絡脈也手少陽三焦脈也屬火而夏旺所以養胎在三月四月手少陰手太陽乃心脈也以君主之官無爲而尊也足太陰脾脈也足陽明胃脈也屬土而旺長夏所以養胎在五月六月手太陰肺脈也手陽明大腸脈也屬金而旺秋所以養胎在七月八月足少陰腎脈也屬水而旺冬所以養胎在九月又兒母之腎臟繫於胎是母之眞氣子之所賴也至十月兒於母腹之中受足諸臟氣脈所養然後待時而生此論奧微而有至理世更有明之者亦未有過於巢氏之論矣余因述其說

巢氏論曰陽施陰化精氣有餘兩胎有俱男俱女者道藏經云婦人月信止後一日三日五日值男女旺相日陽日陽時交合有孕多男若男女禀受皆壯則多子一或怯弱則少子顱頤經云陽盛發陰當孕成男六脈諸經皆舉其陰又云三陽所會則生男三陰所會則生女葛仙翁肘後方云男從父氣女從母氣聖濟經云天之德地之氣陰陽之至和流薄於一體因氣而左動則屬陽陽資之則成男因氣而右動則屬陰陰資之則成女易稱乾道成男坤道成女此男女之別也凡姙娠有疾投以湯藥衰其大半而已使病去母安胎亦無損矣

註按東垣丹溪云經水斷後一二日血海始淨精勝其血感者成男四五日後血脈已旺精不勝血感者成女蓋父精母血因感而會精之施也血能攝精故成男此萬物資始於乾元也血之行也精不能攝故成女此萬物資生於坤元也陰陽交搆胚胎始凝所藏之處名曰子宮一采在下上有兩岐一達於左一達於右精勝其血則陽爲之主受氣於左子宮而男形成精不勝血則陰爲之主受氣於右子宮而女形成此二先生之確論也若夫姙娠藥餌宜禁當參本門考之

褚氏云男女之合二情交暢陰血先至陽精後衝血聞裏精精入爲骨而男形成矣陽精先入陰血後參精開裏血血入爲本而女形成矣陽氣聚而故男子面重涸死者必伏陰氣聚背故女子背重溺死者必仰走獸溺死仰伏皆然陰陽均至非男非女之身精血散分骈胎品胎之兆父少母老產女必羸母壯父衰生男必弱古之良工首察乎此氣受偏疼與之補之補羸女則養血壯脾補弱男則滋腎節色羸女宜及時而嫁弱男宜待壯而婚此疾外所務之本不可不察也

馬益卿先生論曰胎教產圖之書不可謂之迂而不加信然亦不可抑犯之方今俚俗之家與不正之屬將息避忌略不如儀或藥毒不消或產於風露無產厄而子母均安者亦偉有之若保胎之法須多方豫養方無後患如鄰家有所與修亦或犯其胎氣令兒破形須命如刀犯者形必傷泥犯者竅必塞打擊者色青黯繫縛者相拘攣如此等驗有如影響不可不慎也

孕元立本章

有太初有太始混沌一判既見氣矣故曰太初既立形矣故曰太始氣初形始天地相因生生化化品物彰矣故曰大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生

註吳禔註云混沌未判則氣形俱泯混沌既判則氣形已分既見氣矣是爲太初既立形矣是爲太始太初者凡有氣之所本故天得之以統元氣太始者凡有形之所本故地得之以統元形天地交泰相因爲氣形生生者得所以生化化者得所以化品物流行而形色名聲彰矣大哉乾元太初之所寓也故以萬物之資始爲言至哉坤元太始之所寓也故以萬物資生爲言惟萬物資始資生於乾坤故乾元則兆象至坤元然後形無不成有生之初雖陽亨之正育而充之必陰爲之主

註薛左丞註陰陽離合論曰天覆地載萬物方生未出地者命曰陰處名曰陰中之陰既出地者命曰陽處名曰陰中之陽陽亨之正陰爲之主王冰謂陽施正氣萬物方生陰爲之主羣形乃立字說始而生之者天地也育而充之者人也

因形移易日改月化坤道之代終也

註列子周穆篇尹文先生曰因形移易謂之化莊子田子方篇曰消息盈虛一晦一明日改月化日有所爲而莫見其功易坤卦文言曰地道無成而

代有終也地之承天其無成而有終也豈迫於不得已耶蓋道之所在萬物失之則死得之則生有生之類聽命於此故無成而代有終者以道言也

謂之姙陽既受始陰壬之也

註字說壬子謂之姙壬一陽也二陰也陽既受始陰乃壬之解曰壬陽水之干也位在亥子之間陰至亥極矣陽復受胎而謂之姙於壬至子然後生

謂之胞已爲正陽陰包之也

註已正陽也而陰能包之陰與陽更用事故也已者孟夏之月於卦爲乾純陽用事故詩謂之正月正月者正陽之月也陰方用事而物爲之主則雖正陽亦在所包而退聽焉

謂之胚未成爲器猶云坯也

註說文瓦未燒者謂之坯胚婦孕一月也字說胚未成爲器猶坯也

謂之胎既食於母爲口以也

註說文胎婦孕二月也字說元胎既食於母爲口以也

若娠則以時動也

註字說女娠以時動

若懷則以身依之也

註字說心所懷則身依焉目隸焉

天之德地之氣陰陽之至和相與流薄於一體

註靈樞經曰天之在我者德地之在我者氣德流氣薄而生者也

惟能順時數謹人事勿動而傷則生育之道得矣

註自一月積之至於十月所謂時數也保衛輔翼防閑忌慎適其宜所謂人事也

觀四序之運生長收藏代出萬物儀則咸備而天地之氣未始或虧者蓋陰陽相養以相濟也

註陰陽離合論曰天覆地載萬物方生陽予之正陰爲之主故因春生因夏長因秋收因冬藏失常則天地四塞莊子天地篇曰流動而生物物生成理謂之形形體保神各有儀則謂之性昧者曾不知此乃欲拂自然之理謬爲求息之術方且推生死於五行斷補養於藥石以僞勝眞以人助天雖或有子孕而不育育而不壽者衆矣昔人論年老有子者男不過盡八八女不過盡七七則卵氣血在人固自有量夫豈能逃陰陽之至數哉

天眞論帝曰有其年已老而有子者何也岐伯曰此其天壽過度氣脈常通而腎氣有餘也此雖有子男不過盡八八女不過盡七七而天地之精氣皆竭矣

註雖老而生子子壽亦不能過天癸之數

凝形殊象章

天地者形之大也陰陽者氣之大也惟形與氣相資而立未始偏廢

註莊子則陽篇太公謂曰天地者形之大者也陰陽者氣之大者也氣以形載形以氣充惟氣與形兩者相待故曰相資而立未始偏廢

男女構精萬物化生天地陰陽之形氣寓焉

註緊辯曰天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生

語七八之數七少陽也八少陰也相感而流通故女子二七天癸至男子二八而精通則以陰陽交合而兆始故也

註岐伯曰女子二七而天癸至任脈通衝脈盛月事以時下故能有子男子二八腎氣盛精氣溢瀉陰陽和故能有子傳曰女子十四有爲人母之道男子十六有爲人父之道六十四絕陽化之理

語九十之數九老陽也十老陰也相包而賦形故陰窮於十男能圍之陽窮於九女能方之則以陰陽相生而成終故也

註字說陰窮於十圍之者男陽窮於九方之者女九有變也女足以方之十無變也男足以圍之解曰男有室所以圍陰於外女有家所以方陽於內易曰婦人之吉從一而終也夫子制義從婦凶也圍圓也君道也夫道也圓則可以制義而行方仁也臣道也婦道也方則從一而已男從圍與規從夫同意女從仁與臣從仁同意

元氣孕毓皆始於子自子推之男左旋積歲三十而至巳女右旋積歲二十而至巳巳爲正陽陰實從之自巳懷壬男左旋十月而生於寅女右旋十月而生於申申爲三陰寅爲三陽而生育之時著矣其稟賦也體有剛柔脈有強弱氣有多寡血有盛衰皆一定而不易也

註十九難曰男子生於寅寅爲木陽也女子生於申申爲金陰也楊氏註云元氣起於子人之所生也男從子左行三十女從子右行二十俱至於巳爲夫婦懷妊也古者男子三十女年二十然後行嫁娶十月而生者男從巳左行至寅爲十月故男

行年起於丙寅女從巳右行至申爲十月故女行年起於壬申

以至分野異域則所產有多寡之宜吉事有祥則所夢各應其類是故荆揚薄壤多女雍冀厚壤多男熊羆爲男子之祥蛇虺爲女子之祥是皆理之可推也

註 周官職方氏揚州其民三男五女荆州其民一男二女雍州其民三男二女冀州其民五男三女詩斯干篇吉夢維何維熊維羆維虺維蛇大人占之維熊維羆男子之祥維虺維蛇女子之祥

胎化之法有所謂轉女爲男者亦皆理之自然如食雄雞取陽精之全於天產者帶雄黃取陽精之全於地產者

註 千金方轉女爲男丹參丸用東門上雄雞頭又方取雄黃一兩絳囊盛帶之本草丹雄雞補虛溫中通神殺毒其肝補腎其冠血益陽雄黃人佩之鬼神不能近毒物不能傷

操弓矢藉斧斤取剛物之見於人事者氣類滑通造化密移必於三月兆形之先蓋方儀形未具陽可以勝陰變女爲男理固然也

註 巢氏論云姙娠三月始胎形象始化未有定儀見物而變欲得男者操弓矢食雄雞

氣質生成章

具天地之性集萬物之靈陰陽平均氣質完備成其形爾然而奇耦異數有衍有耗剛柔異用或強或羸血榮氣衛不能逃於消息盈虛之理則稟質之初詎可一槩論耶是以附贅垂疣駢拇枝指侏儒跛蹩形氣所賦有如此者瘡瘍癰腫聾盲瘖瘂瘦瘠疲瘵氣形之病有如此者然則胚胎造化之始精移氣變之後保衛輔翼固有道矣

註 孝經云天地之性人爲貴書泰誓曰惟人萬物之靈

天有五氣各有所湊地有五味各有所入所湊有節適所入有度量凡所畏忌悉知戒慎資物爲養者理固然也故寢興以時出處以節

註 六節藏象論曰天食人以五氣地食人以五味王冰云天以五氣食人者臊氣湊肝焦氣湊心香氣湊脾腥氣湊肺腐氣湊腎地以五味食人者酸味入肝苦味入心甘味入脾辛味入肺鹹味入腎也

可以高明可以周密使霧露風邪不得投間而入因時爲養者理宜然也故必調喜怒寡嗜慾

胎殺避忌產前將護法

一受孕之後切宜避忌胎殺所遊如經云刀犯者形必傷泥犯者竅必塞打擊者色青黯繫縛者相拘攣甚至母殞禍如反掌

月遊胎殺

立春在房牀

驚蟄在戶

單扇也入門云在牕戶

清明在門

雙扇也入門云在門堂

立夏在竈

芒種在母身

入門云在身牀

小暑在竈

入門云在牀倉

立秋在碓

京本云在正北方

白露在廚前

入門云在廁戶

寒露在門

入門云在門房

立冬在戶及廚

入門云在牀房

大雪在罏及竈

小寒在房母身

入門云在牀房

十干日遊胎殺

甲己日占門

乙庚日占碓磨

丙辛日占井竈

丁壬日占廚廨

戊癸日占米倉

十二支日遊胎殺

子丑日占中堂

寅卯辰酉日占竈

巳午日占門

未申日占籬下

戌亥日占房

以上禁忌總要全不修理爲高

六甲旬遊胎殺

甲子旬遊窻碓
甲戌旬遊正廳
甲申旬遊中庭
甲午旬遊房內
甲辰旬遊房中
甲寅旬遊二 闕

太史局日遊胎殺

每遇癸巳甲午乙未丙申丁酉五日在房內北
庚子辛丑壬寅三日在房內南
癸卯一日在房內西
甲辰乙巳丙午丁未四日在房內東
六戊六己日在房內中餘日在外無占

凡遊神在房內不宜於方位上安牀帳及掃舍皆凶又有小兒殺及本年三殺及產母身黃定命皆不可犯凡姙娠之後將此貼於房內常照見之切不可穿鑿修掘移徙釘擊籬壁重物碾壓之類犯之重則胎死腹中母亦不利輕則子受其殃成人之後必定破形拳攣跛縮瘖瘂犯之極驗

食忌論

一受孕之後切宜忌不可食之物非惟有感動胎氣之戒然於物理亦有厭忌者設或不能戒忌非特延月難產亦能令兒破形損命可不戒哉

食螃蟹令子橫生
食荳醬合藿香食之墮胎
食生薑令子多指生瘡
食蝦蟆鱓魚令兒瘖瘂餘物已見千金方

如此之類無不驗者則知聖人胎教之法矣

孕婦藥忌歌

蚖蟹水蛭地膽蟲烏頭附子配天雄躑躅野葛螻蛄類鳥啄側子及虻蟲牛黃水銀井巴豆大戟蛇蛻及蜈蚣牛膝藜蘆井薏苡金石錫粉黃雌雄牙硝芒硝牡丹桂蜥蜴飛生及蠯蟲代赭蚱蟬胡粉麝芫花薇蘅草三稜槐子牽牛并皂角桃仁蠐螬和茅根 闕 根硇砂與乾漆亭長波流茵草中瞿麥藺茹蟹爪甲蝟皮赤箭赤頭紅馬刀石蠶衣魚等半夏南星通草同乾薑蒜雞及雞子驢肉兔肉不須供切須有姙胎前忌可免嬰兒疾厄凶

元朱震亨格致餘論

慈幼論

古之胎教具在方冊愚不必贅若夫胎孕致病事起茫昧人多玩忽醫所不知兒之在胎與母同體得熱則俱熱得寒則俱寒病則俱病安則俱安母之飲食起居尤當慎密不可不知也

胎感論

成胎以精血之後先分男女者褚澄之論也愚切惑焉後閱李東垣之方有曰經水斷後一二日血海始淨精勝其血感者成男四五日後血脈已旺精不勝血感者成女此論亦爲未瑩何以言之易曰乾道成男坤道成女夫乾坤陰陽之性情也左右陰陽之道路也男女陰陽之儀象也父精母血因感而會精之泄陽之施也血能攝之陰之化也精成其骨此萬物之始於乾元也血成其胞此萬物資生於坤元也陰陽交姤胎孕乃凝胎之所居名曰子宮一系在下上有兩岐一達於左一達於右精勝其血及剛日陽時感者則陽爲之主受氣於左子宮而男形成精不勝血及柔日陰時感者則陰爲之主受氣於右子宮而女形成或曰分男分女吾知之矣其有雙胎者將何如曰精氣有餘岐而分之血因分而攝之故也若夫男女同孕者剛日陽時柔日陰時感則陰陽混雜不屬左不屬右受氣於兩岐之間者也亦有三胎四胎五胎六胎者猶是而已或曰其有男不可爲父女不可爲母與男女之兼形者又若何而分之耶予曰男不可爲父得陽氣之虧者也女不可爲母得陰氣之塞者也兼形者由陰爲駁氣所乘而爲狀不一以女兼男形者有二一則遇男爲妻遇女爲夫一則可妻而不可夫又有下爲女體上具男之全形此又駁之甚者也或曰駁氣所乘獨見於陰而所成之形又若是之不同耶予曰陰體虛駁氣易於乘也駁氣所乘陰陽相混無所爲主不可屬左不可屬右受氣於兩岐之間隨所得駁氣之輕重而成形故所兼之形有不可得而同也

虞摶曰右丹溪此論極造精微發前人之未發是知男女之分已定於萬物資始乾元之際陰陽交姤之時昧者不悟是理妄有轉女爲男之法惑矣夫萬物皆資始於乾元獨男女之分不資始於乾元乎按婦人姙娠四月欲知男女法左脈疾爲男右脈疾爲女俱疾爲生二子又遣姙娠人面南行從後呼之左迴首者是男右迴首者是女又看上圊時夫從後急呼之左迴首者是男右迴首者是女也右丹溪云男受胎在左子宮女受胎在右子宮斯言大契是說也蓋男胎在左則左重故迴首

時愼護重處而就左也女胎在右則右重故迴首時愼護重處而就右也推之於脉其義亦然胎在左則血氣護胎而盛於左故脉亦從之而左疾爲男左大爲男也胎在右則血氣護胎而盛於右故脉亦從之而右疾爲女右大爲女也亦猶經云陰搏陽別謂之有子言受胎處在臍腹之下則血氣護胎而盛於下故陰之尺脉鼓搏有力而與陽之寸脉殊別也又如癰癤發上則血氣從上而寸脉盛發下則血氣從下而尺脉盛發左則血氣從左而左脉盛發右則血氣從右而右脉盛也丹溪以左大順男右大順女爲醫人之左右手蓋智者之一失也

明方賢奇效良方

形質受胎之始論

太初者凡有氣之本也天得之以統氣太始者有形之本也地得之以統形故輕清爲天稟陽剛健而立乎上重濁爲地積陰柔順而處乎下感坤德而行化應乾道以經營是以天地相因生生化化品物彰矣易曰大哉乾元萬物資始故陽施陰化血氣和調感而爲胚者亦資始資生之理也夫兆形之初命門先具天一生水壬爲陽水合丁之陰火而生丙爲命門然後生心心主血脉丙爲陽火合辛之陰金而生庚有心然後生肺肺主皮毛庚爲陽金合乙陰木而生甲有肺然後生肝肝主筋爪甲爲陽木合己之陰土而生戊有肝然後生脾脾主肌肉戊爲陽土合癸之陰水而生壬有脾然後生腎腎主骨髓故臟合於五行本其性情互相尅制及其配合互相生成且胚胎懷抱於此者乃在母腹中之事皆有經之可證也所謂胚者食氣於母所以養其形食味於母所以養其精滋育氣味爲本故天之五氣地之五味母既食之而胎又食之外則充乎形質內則滋乎胎氣皆藉氣味之養育也今胎之所食始起厥陰也聖濟經云原四時所化始於木也究十二經之所養始於肝也故一月血凝足厥陰肝經養之臍乃肝之腑一月胚兆足少陽膽經養之二月陽神爲魂木生火手心主包絡經養之四月陰靈爲魄手少陽三焦經養之五月五行分五臟火生土足太陰脾經養之六月六律定六腑足陽明胃經養之七月七情開七竅通光明也土生金手太陰肺經養之八月八景神具濟眞靈也手陽明大腸經養之九月宮室羅布以定精也足少陰腎經養之十月氣足萬象成也足太陽膀胱經養之自肝爲始臟腑相滋各養三十日此食於母以養其精也且手太陽小腸經手少陰心經此二經不在十月養經之數平居之日在下爲月水有胎之時在上爲乳汁故不養於胎也夫胚胎之兆始也受水精而成血脉受火精而成氣受金精而成筋受木精而成骨受土精而成膚華皮毛五行具而百骸皆備此所以集萬物之靈也倘有奇耦之充耗剛柔之強弱榮衛之盈虛一時所感乃於氣形稟賦之始此皆冥默之中稟於清者其子聰明智慧壽而且康稟於濁者愚痴不壽夭在節慾以全其眞陰陽配合得子必壽素問云陰陽所奉其人壽也昔有人妻妾多而無子擇良家未笄之女相配亦無子曰求男有道乎褚澄曰合男女必當其年男雖十六而精通必三十而娶女雖十四而天癸至必二十而嫁此皆陰陽之氣完實然後交合則交而孕孕而育育而爲子堅壯強壽今未笄之女天癸始至已近男色陰氣早泄未完而傷未實而動是以交而不孕孕而不育育而子脆不壽此配合太早有傷陰陽以無子也有婦人所產皆女者多慾之過也所產皆男者此男子節慾惜精以婦人經行後一日三日五日於夜半時生氣瀉精受胚必男經行後二日四日六日瀉精者受胚皆女若過六日瀉精者受胚皆女若過六日已後包絡新血已滿雖交終難成孕今刪葺節要識者鑒之

小兒初生總說

夫人稟陰陽二氣而生得患起自三焦然冠壯易明童幼難治一云不能察其幼小者是以別爲一家調理耳且小兒所稟形質壽命長短者全在乎精血二和者而有胚在母之胎中十月而生大抵壽夭窮通聰明愚痴皆以預定豈能逃乎

萬氏育嬰家祕

胎養以保其眞

妊子論云夫至精縕化一氣方凝始受胞胎漸成形質子在腹中隨母聽聞自妊娠之後則須行坐端嚴性情和悅常處靜室多聽美言令人誦讀詩書陳說禮樂耳不聞非言目不觀惡事如此則生男女福壽敦厚忠孝賢明不然則生男女多鄙賤不壽而愚頑此所謂因外象而內感也昔太妊懷文王耳不聽惡聲目不視惡色口不出惡言世傳胎教之道此之謂也

妊娠三月名胎始當此之時血不流行形象始化未

有定儀見物而變須知端正嚴莊當令母見貴人不可見狀貌醜惡人也欲生男宜操弓矢乘壯馬欲生女宜著珥璫施環珮欲子美好宜玩白璧視孔雀欲子賢能宜看詩書務和雅吾見鄙俗婦人懷胎時看搬傀儡裝神像舞猴戲者後來生子貌多肖之

胎養之法有所謂轉女成男者亦皆理之自然也如食雄雞取陽精之全於天產者帶雄黃取陽氣之全於地產者操弓矢藉苓朮取陽物之見於人事者氣類潛通造化祕密必於三月兆形之先儀象未具陽可以勝陰變女爲男理固然也

天有五氣各有所湊地有五味各有所入所湊有節適所入有度量凡所畏忌悉當戒懼愼勿以爲養者理固然也以致調喜怒節嗜慾作勞不妄而氣血從之皆所以保攝姙娠使諸邪不得干焉苟爲不然方稟受之時一失調養則內不足以爲守中外不足以爲強身氣形弗充而疾病因之如食兔缺脣食犬無聲食雜魚而疥癬之屬皆以食物不戒之故也心氣大驚而顚疾腎氣不足而解頤脾胃不和而羸瘦心氣虛乏而神不足之類皆以氣血不調之故也

全嘗由此推廣之兒在母腹中藉母五臟之氣以爲養也苟一臟受傷則一臟之氣失養而不足矣如風則傷肝熱則傷心與肺濕則傷脾寒則傷腎此天之四氣所傷也酸多則傷肝苦多則傷心甘多則傷脾辛多則傷肺鹹多則傷腎此地之五味所傷也怒則傷肝喜則傷心思則傷脾憂則傷肺恐則傷腎此人之七情所傷也是以風寒暑濕則避之五味之食則節之七情之感則絕之皆胎養之道也若夫勿登高勿臨險勿獨處暗室勿入廟社勿恣肥甘之味勿啖瓜菓之物勿遊犯禁之方所調護輔翼者各有道也如不利嗣息或驕倨太甚者動必成咎

姙娠有疾不可妄投藥餌必在醫者審度病勢之輕重藥性之上下處以中庸不必多品視其病勢已衰藥宜便止則病去於母而子亦無殞矣

全嘗集女科凡孕婦無疾不可服藥設有疾只以和胎爲主中病即已勿過用劑也故孕婦之病宜柴胡和胎飲主之

虞摶醫學正傳

小兒總論

嘗聞小方脉科古人謂之啞科最費調治誠哉是言也蓋以嬰兒之流難問證難察脉耳抑且臟腑脆嫩而孟浪之劑與夫峻寒峻熱之藥俱不可輕用試詳論之夫孺子之在襁褓中也內無七情六慾之交戰外無大風大寒之相侵奚其幼科之疾若是之繁且甚與抑考其證大半胎毒而小半傷食也其外感風寒之證什一而已曰變蒸曰痘疹曰斑爛曰驚悸曰風癇曰發搐曰痰壅曰赤瘤曰白禿曰解顱曰重舌木舌已上數證豈非孕母不謹胎毒之所致與夫小兒之在胎也母饑亦饑母飽亦飽辛辣適口胎氣隨熱情慾動中胎息輒躁或多食煎煿或恣味辛酸或嗜慾無節或喜怒不常皆能令子受患先正所謂古者婦人姙子寢不側坐不邊立不蹕不食邪味等語厥有旨哉其飲食男女養胎幼幼之法必深得造化生生不息之意故古人多壽考兒少夭折者即此之由也嘗見今有稟性溫良之婦有娠不嗜慾縱口生子少病而痘疹亦稀亦可以爲師法矣

郭子章博集方論

未生

蔡氏曰小兒在母腹中其母罔知禁忌或好食辛辣之物或恣意淫慾以此蘊毒流注小兒經絡他日發爲瘡瘍痘疹職此之由

指掌圖曰夫嬰兒在胎稟陰陽五行之氣以生臟腑百骸氣血筋脉其形雖具肌體未實骨格未成陽氣既足陰血未全所以不可太飽煖以消其陰此丹溪先生之大戒也然兒在腹中必藉母氣血所養故母熱子熱母寒子寒母驚子驚母弱子弱所以有胎熱胎寒胎驚胎弱之證

新安方廣曰按瘡疹之源蓋由母姙娠之時飲食煎炒炙煿厚味醇酒兒在腹中浸漬食母血穢蘊而成毒伏於五臟之間及生之後或因外感風寒內傷生冷跌撲驚恐時氣流行觸動鬱火發於肌膚之間心臟之毒爲斑肺臟之毒爲疹肝臟之毒爲水泡瘡脾臟之毒爲膿泡瘡小兒稟厚毒少氣血調勻表裏充實則易發易靨苟或稟弱毒勝表裏虛氣血弱必須醫藥調治庶幾有生

拙者曰諸公之論猶是古人胎教遺意嬰孩之殤痘疹最厲父母罹此孰不痛悼顧達者委命愚者尤神孽自己作誰則知之彼笄黛者流目不辨書責在人父父爲母誦說母爲兒保練庶幾培根清源之助余聞婦有身者別寢處淡飲食謹視聽免而男女端正智慧堅強健固微獨省胎毒免痘厲已矣故與其痛悼於後孰若謹嚴於初

徐春甫古今醫統

妊婦不守禁忌生子多疾論

古人胎養胎教之方最爲愼重所以上古之人多壽多賢良有以也世之婦人妊子既能如列女傳所云矣又要飲食清淡饑飽適中自然妊娠氣清身不受病臨產易生子疾亦少痘疹亦稀此爲氣血貫通所感明驗夫何後世風俗漸偷鮮能悟道男婦縱慾無往弗勝懷孕之時殊不加意以致臨產氣血乖張不能順應生兒下地驚搐無時此蓋胎中受毒病種淵深雖良醫神劑莫之能爲

李梴醫學入門

胎殺禁忌

凡胎殺所在不宜修整雖鄰家興動孕婦當避縱不墮胎令兒破形色青體攣竅塞夭殤

生子所向方

子午卯酉日宜西南寅申巳亥日西北辰戌丑未日東南

方

丹參圓（千金方）

治婦人始覺有妊養胎并轉女爲男

丹參　續斷　芍藥　白膠　白朮　柏子仁　甘草各二兩　人參　芎藭　乾薑各三十銖　吳茱萸　橘皮　當歸各一兩十八銖　白芷　貴冠紅纓燒灰各一兩　乾生地黃一兩五錢　蕪荑十八銖　犬卵一具乾　東門上雄雞頭一枚

右十九味爲末蜜和丸如梧子大酒服十九日再稍加至二十九

柴胡和胎飲（有嬰家秘）

治孕婦有疾當以此方爲主自無損於其子

柴胡　黃芩條實沉水者佳　白朮無油者佳　當歸身酒洗　白芍　陳皮　甘草　紫蘇莖葉

右八味以柴胡黃芩白朮爲君芩朮二味乃安胎之聖藥當歸白芍爲臣陳皮甘草紫蘇爲佐

挾傷風者加葛根葱白

挾傷食者加枳殼神麴

挾熱者加知母石膏

胃滿者加枳殼桔梗

腹滿者加大腹皮

胎中痛者加枳殼砂仁

漏下者加阿膠陳艾葉

如方加減不可輕忽水煎食前服

單方

轉女爲男取原蠶矢十枚井花水服之日三（千金方下同）

又取弓弩弦一枚絳囊盛帶婦人左臂一法以繫腰下百日去之

又取雄黃一兩絳囊盛帶左腰間要女者帶雌黃右腰間

又以斧一柄於產婦臥牀下置之仍繫刃向下勿令人知如不信者待雞抱卵時依此置於窠下一窠雞子盡爲雄也

萱草一名宜男草妊婦佩之（醫人良方下同）

雄雞長尾拔二莖置孕婦蓐下勿令知之

取夫頭髮手足爪甲鋪孕婦蓐下亦勿令知

醫案

列女傳曰太任文王之母摯任氏之仲女也王季娶以爲妃太任之性端一誠莊惟德之行及其娠文王目不視惡色耳不聽淫聲口不出敖言生文王而明聖太任敖之以一而識百卒爲周宗君子謂太任爲能胎敎

李東垣曰李叔和問中年以來得一子至一歲以後身生紅絲癗不救後生四子一二歲皆病癗而死何緣至此翼日見之謂曰汝乃腎中伏火精氣中多有紅絲以氣相傳生子故有此疾俗名胎癗是也子試觀之果如其言遂以滋腎丸數服以瀉腎中火邪補眞陰不足忌酒酢辛燠熱物其妻與六味地黃丸以養陰血受胎五月之後以黃芩白朮二味作散啖五七服後生三子前證不復作矣

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百二十二卷目錄
醫部彙考四百二
小兒初生護養門
孫思邈千金方 初生出腹論
張從政儒門事親 過愛小兒反害小兒說
朱震亨格致餘論 慈幼書
危亦林得效方 灸法論
方賢奇效良方 初生說 逆和說
萬氏秘傳片玉心書 指南賦
育嬰家秘 發微賦 小兒不宜安針灸 鞠養以慎其疾
幼科發揮 治未病
魯伯嗣學嬰童百問 初誕 護養法
虞摶醫學正傳 小兒初生食忌
薛氏保嬰金鏡錄 論初生用藥
保嬰撮要 初誕法 護養法
樓英醫學綱目 初生禁忌
徐春甫古今醫統 嬰幼論 孔竅 孔竅 除胎毒 初生總論 落孔法
沐浴法 斷臍法 著衣法 襁衣法 養子十法 養子日用法
王肯堂證治準繩 小兒論 乳哺 乳令兒病 斷乳法 雜證 護法 浴 斷臍法 灸臍法 下胎毒法 藏胞衣法 剃頭法
李梴醫學入門 初生求乳 藏胎水 調護
龔廷賢萬病回春 初生
小兒衛生總微論方 洗浴論 斷臍論 慎護 食忌論
董汎翀活幼精要 食忌論
景岳全書 見初生
東醫寶鑑 保護法

方 和平飲子 百壽散 浴體湯 經驗安化湯 防風通聖散 涼膈散 神芎丸 益元散 解毒雄黃丸 消乳丸 安臍散 資壽膏 茯苓丸 又方 保生第一良法 延生第一方 煉臍藥 烙臍餅子 封臍散

單方

醫案

藝術典第四百二十二卷

醫部彙考四百二

小兒初生護養門

唐孫思邈千金方

初生出腹論

小兒初生先以綿裹指拭兒口中及舌上青泥惡血此謂之玉衡一作衝若不急拭啼聲一發即入腹成百病矣

兒已生即當舉之舉之遲晚則令中寒腹內雷鳴乃先浴之然後斷臍不得以刀子割之須令人隔單衣物咬斷兼以暖氣呵七遍然後纏結所留臍帶令至兒足趺上短則中寒令兒腹中不調常下痢一云成內豹

若先斷臍然後浴者則臍中水臍中水則發腹痛其臍斷訖連臍帶中多有蟲宜急剔撥去之不爾入兒腹成疾斷兒臍者當令長六寸長則傷肌短則傷臟不以時斷若授汁不盡則令暖氣漸微自生寒令兒臍風

生男宜用其父故衣裹之生女宜以其母故衣皆勿用新帛爲善不可令衣過厚令兒傷皮膚害血脈發雜瘡而黃兒衣綿帛特忌熱慎之慎之凡小兒始生肌膚未成不可暖衣暖衣則令筋骨緩弱宜時兒風日若都不見風則令肌膚脆輭便易中傷皆當以故絮衣之勿用新綿也

凡天和暖無風之時令母將兒於日中嬉戲數見風日則血凝氣剛肌肉牢密堪耐風寒不致疾病若常藏在幃帳之中重衣溫暖譬猶陰地之草木不見風日輭脆不堪風寒也

凡裹臍法椎治白練令柔輭方四寸新綿厚半寸與帛等合之調其緩急急則令兒吐哯兒生二十日乃解視臍裹臍時閉戶下帳燃火令帳中溫暖換衣亦然此謂冬時寒也

兒洗浴斷臍竟綢抱畢未可與朱蜜宜與甘草湯以甘草如手中指一節許打碎以水二合煮取一合以綿纏沾取與兒吮之連吮汁計得一蜆殼入腹止兒當快吐吐去心胷中惡汁也如得吐餘藥更不須與若不得吐可消息計如饑渴須與更與之若前所服及更與並不得吐者但稍稍與之令盡此一合止如得吐出惡汁令兒心神知慧無病也飲一合盡都不吐者是兒不含惡血耳勿復與甘草湯乃可與朱蜜以鎮心神安魂魄也兒新生三日中與朱蜜者不宜多多則令兒脾胃冷腹脹喜陰癇氣急變噤痙而死新生與朱蜜法以飛鍊朱砂如大豆許以赤蜜一蜆殼和之以綿纏筋頭沾取與兒吮之得三沾止一日令盡此一豆許可三日與之則用三豆許也勿過此則傷兒也與朱蜜竟可與牛黃如朱蜜多少也牛黃

益肝膽除熱定精神止驚辟惡氣除小兒百病也
新生三日後應開腸胃助穀神可研米作厚飲如乳酪厚薄以豆大與兒咽之頻咽三豆許止日三與之滿七日可與哺也兒生十日始哺如棗核二十日倍之五十日如彈丸百日如棗若乳汁少不得從此法當用意小增之若三十日而哺者令兒無疾兒哺早者兒不勝穀氣令生病頭面身體喜生瘡愈而復發令兒尪弱難養三十日後雖哺勿多若不啫食勿強與之不消復生疾病
凡乳兒不欲太飽飽則嘔吐每候兒吐者乳太飽也以空乳乳之即消日四乳兒若臍未愈乳兒太飽令風中臍也夏不去熱乳令兒嘔逆冬不去寒乳令兒欬痢母新房以乳兒令兒羸瘦交脛不能行母有熱以乳兒令變黃不能食母怒以乳兒令善驚發氣疝又令上氣癲狂母新吐下以乳兒令虛羸母醉以乳兒令身熱腹滿凡新生小兒一月內常飲猪乳大佳凡乳母乳兒當先極挼散其熱氣勿令汁奔出令兒噎輒奪其乳令得息息已復乳之如是十返五返視兒饑飽節度知一日中幾乳而足以爲常又常捉去宿乳兒若臥乳母當以臂枕之令乳與兒頭平乃乳之令兒不噎母欲寐則奪其乳恐塡口鼻又不知饑飽也
浴兒法凡浴小兒湯極須令冷熱調和冷熱失所令兒驚亦致五藏疾也凡兒冬不可久浴浴久則傷寒夏不可久浴浴久則傷熱數浴背令則發癇若不浴又令兒毛落新生浴兒者以猪膽一枚取汁投湯中以浴兒終身不患瘡疥勿以雜水浴之兒生三日宜用桃根湯浴桃根李根梅根各二三兩枝亦得㕮咀之以水三斗煮二十沸去滓浴兒良去不祥令兒終身無瘡疥治小兒驚辟惡氣以艾虎湯浴艾一斤虎頭骨一枚以水三斗煮爲湯浴但須浴卽煮用之

元張從政儒門事親

過愛小兒反害小兒說

小兒初生之時腸胃綿脆易饑易飽易虛易實易寒易熱方書舊說天下皆知之矣然禮記曲禮王符潛夫論所云天下皆不知曲禮云童子不衣裘裳說云裘太溫消陰氣且人十五歲成童尚不許衣裘今之人養稚子當正夏時以綿袱裹腹日不下懷人氣相蒸見天稍寒卽封閉密室睡罷下幕煖炕紅爐使微寒不入大煖不泄雖哀老之人尚猶不可況純陽之小兒乎然君子當居密室亦不當如是之煖也王符潛夫論云嬰兒之病傷于飽也今人養稚子不察腸胃所容幾何但聞一聲哭將謂饑號急以漸乳納之兒口豈復知量不吐不已及稍能食應口輒與夫小兒初生別無伎倆惟善號泣爲强良耳此二者乃百病之源也小兒除胎生病外有四種曰驚曰疳曰吐曰瀉其病之源止有二曰飽曰煖驚者火乘肝之風木也疳者熱乘脾之濕土也吐者火乘胃膈甚則上行也瀉者火乘肝與大腸而瀉者也夫乳者血從金化而大寒小兒食之肌肉充實然其體爲木故傷乳過多反從濕化濕熱相兼吐痢之病作矣醫者不明其本輒以紫霜進食比金石餅之屬其中皆巴豆杏仁其巴豆大熱有大毒杏仁小熱有小毒小兒陽熱復以熱毒之藥留毒在內久必變生故劉河間先生以通聖涼膈神芎益元治之皆無毒之藥或曰此大人所服之藥非小兒所宜也余聞笑曰大人小兒雖年壯不同其五臟六腑豈復殊耶大人服多小兒服少其實一也故不可下者宜解毒可下者宜調胃瀉心然有逐濕爲之方者故余嘗以牽牛大黃木通三味末之爲丸以治小兒諸病皆效蓋食乳小兒多濕熱相兼故也今之醫者多以此藥謗予彼既不明造化難與力辯故予書此方以俟來世知道者然善治小兒者當察其富貴貧賤治之蓋富貴之家衣食有餘生子常夭貧賤之家衣食不足生子常堅貧家之子不得縱其慾雖不如意而不敢怒怒少則肝病少富家之子得縱其慾稍不如意則怒怒多則肝病多矣夫肝者木也甚則乘脾矣又況貧家無財少藥故死少富家有財多藥故死多故貧家之育子雖薄於富家其成全小兒反出於富家之右其暗合育子之理者有四焉薄衣淡食少慾寡怒一也無財少藥其病自痊不爲庸醫熱藥所攻二也在母腹中其母作勞氣血動用形得充實三也母既作勞多易生產四也此四者與富家相反也俚諺曰兒哭卽兒歌不哭不慢儻此言雖鄙切中其病世俗豈知號哭者乃小兒所以泄氣之熱也老子曰終日號而不嗄余嘗授人以養子之法兒未坐時臥以赤地及天寒時不與厚衣布而不綿及能坐時以鐵鈴木壺雜戲之物連以細繩置之水盆中使一浮一沉弄之有聲當炎暑之時令坐其傍掬水弄鈴以散諸熱內經曰四肢者諸陽之本也手得寒水陰氣達於心中乃不藥之藥也余嘗告於陳敬之若小兒病緩急無藥不如不用

庸醫但恐妻妾怪其不醫宜湯浸蒸餅令軟丸作白丸給其妻妾以爲眞藥使兒服之以聽天命最爲上藥忽蔵在丙戌羣兒皆病泄瀉但用藥者皆死蓋醫者不達濕熱之理以溫燥行之故皆死惟陳敬之不與藥用余之言病兒獨存噫嗚呼班固眞良史嘗曰有病不治得中醫除暴得大疾病服藥者當謹熟陰陽無與衆謀若未病之前從予調養之法亦復不生病縱有微疾雖不服藥可也

朱震亨格致餘論

慈幼論

人生十六歲以前血氣俱盛如日方升如月將圓惟陰長不足腸胃尚脆而窄養之之道不可不謹童子不衣裘帛前哲格言具在人耳裳下體之服帛溫輭甚於布也裘皮服溫軟甚於帛也蓋下體主陰得寒凉則陰易長得溫煖則陰暗消是以下體不與帛絹夾厚溫煖之服恐防陰氣實爲確論

血氣俱盛食物易消故食無時然腸胃尚脆而窄若稠粘乾硬酸鹹甜粹一切魚肉水果濕麪煎炙煨炒但是發熱難化之物皆宜禁絶只與熟菜白粥非惟無病且不縱口可以養德此外生菜味鹹乾柿性凉可爲養陰之助然菜太補柿太澁俱爲難化亦宜少與婦人無知惟務姑息畏其啼哭無所不與積成痼疾雖悔何及所以富貴驕養有子多病迫至成人筋骨柔弱有疾則不能忌口以自養居喪則不能食素以盡禮小節不謹大義亦虧可不慎歟

至於乳子之母尤宜謹節飲食下咽乳汁便通情欲中動乳脉便應病氣到乳汁必凝滯兒得此乳疾病立至不吐則瀉不瘧則熱或爲口瘡或爲驚搐或爲夜啼或爲腹痛病之初來其溺必少便須詢問隨證調治母安亦安可消患於未形也夫飲食之擇猶是小可乳母稟受之厚薄情性之緩急骨相之堅脆德行之善惡兒能速肖尤爲關係

危亦林得效方

灸法論

小兒新生無疾慎不可逆針灸之如逆針灸則忍痛動其五脉因易成病河洛關中土地多寒兒喜病痙其生兒三日多逆灸以防之又灸頰以防噤有噤者舌下脉急牙車筋急其土地寒皆決舌下去血灸頰以防噤也吳蜀地溫無此疾也古方既傳之今人不詳南北之殊便按方而用之是以多害於小兒也所以田舍小兒任其自然皆得無有夭横也小兒驚啼眠中四肢掣動變蒸未解慎不可針灸爪之動其百脉仍因驚成癎也惟陰癎噤痙可針灸爪之

明方賢奇效良方

初生說

凡嬰孩始生浴水未到且以綿絮包裹煖大人懷中浴湯亟須調和若冷熱失所則令兒驚亦致五臟疾矣雖浴出亦當煖之若遇暑月亦未可去其綿絮乍出母腹不可令冒寒氣也宜以預先煎下沸湯以瓶收之臨時漸煖不犯生水則兒不生瘡如此一月爲佳自然長而少病矣

初生小兒未乳之先用黃連些少浸汁調乾胭脂一蜆殼抹兒口中去其腹中舊糞方可與兒乳之三日內以少朱砂入蜜些少調灌半蜆殼一月以牛黃少許徐徐抹兒口中若兒多唾慎勿強與乳之

新生浴兒用五根湯浴兒五根者桃柳棟梅槐加之苦參白芷煎湯浴之辟諸不祥若遇熱時以軟絹蘸湯拭之

小兒肌膚未成不可煖衣煖則令筋骨軟弱時常宜見風日若愛惜不見風日令兒肌膚脆軟便易傷損當將父母穿過舊絮著衣少假父母之餘氣幸勿以新綿著兒又當消息衣服無令衣多多則令兒汗出汗多則致虛損風邪易感

夫小兒當慎風池在頸項筋兩轅之間諸疾從此而發小兒臍帶未脫不可頻浴頻浴則臍中入水撮口臍風皆從此起不可不慎此乃前人之成說後人之龜鑑者歟

違和說

書云陽升陰加四序無差萬物稟陰陽之氣男女由精血而成三旬而陰氣純厚子稱孩孺兩月而陰氣方生兒呼爲芽在百日名嫺星至半載而爲誇乳童週期而陰陽各半孩兒千日乃眞氣方奢此際全在乳母能調則和不調則違且和者其母慈祥能調寒暑乳哺得宜是以百病頓釋形貌充悅筋骨隆盛情性異常違者乳哺失節不能調攝或嗔怒乳兒令兒邪在或酒醉乳兒令兒驚癎或有孕乳兒令兒黃瘦疳積或感患乳兒令兒患驚風異疾或吐後乳兒令兒嘔逆羸瘦或傷飽乳兒令兒多熱喘急或勞房未定乳兒令兒多病或乳母與孩兒同睡口鼻之氣侵吹頷門令兒鼻塞或母過愛綳袍衣服遇寒常加火烘熱氣鬱積令兒患熱病風毒丹毒又有乳母悞將

孩兒衣服當於月下曬眼過夜被惡鳥羽屎落於衣上遂成無辜之疾或將惡相異物嬉戲乍忽一見遂成驚忤書云衣安月下招無辜以爲殃童子未成兒稀物而觸忤皆爲母之過失使兒傷精損血形體黧黑四肢枯瘁病之生殺從此而來是以內經不載其說乳下嬰兒之疾有病難治者皆無所據中古巫妨氏著顯頤經以占壽夭歷世相授於是小兒醫方典焉其次晉宋江左推諸家小兒方傳習有驗隋間有巢氏方撰集病源唐有孫眞人留心此術逈後賢俊羣集名醫頗衆然小兒治法散在諸書博考羣書論說但有證而無治法張機有方而闕脉證惟錢氏一書古今所重謂小兒方脉固難求證不可以言語取者乳下之嬰襁褓之孩故專於一科古人有言醫之爲難而茲幼科比諸醫者又出人一頭地雖然人有長幼病感則一但幼小不能言者耳人有四百四證能調則生失和則死幼者歸罪於母壯者或四氣七情或饑飽勞逸或嗜慾憾犯皆能成疾故上古神農氏之王天下也觀人之違和啜草木之味以定鹹酸甘苦以治疾病沉痾鹹以軟之酸以收之甘以緩之苦以堅之奇哉辛味總攝四性然後播種百穀以養人之形骸古者巢居穴處不昧其道故能全形返質以道自守氣血堅剛終保百年之壽於是乎明醫間出繼踵不絕岐和振秧於前李華馳聲於後悲哉後人巧僞日增故此天壽不滿雖有明醫續世診視無功淫祀妖邪以求餘福可謂息燬夏朗枯壑駕舟雖欲求生反遭艱險大抵養生之士要識違和之理則天命無窮矣

萬氏秘傳片玉心書

指南賦

小兒方衛號曰啞科口不能言脉無可施惟形色以爲憑竭心思而調治故善養子者似養龍以調護不善養子者如飢猿而愛惜寵之愈勤害之愈急乍頭溫而足冷忽多啼而不乳若之危釐失之千里腸胃脆薄分飲食易傷筋骨柔弱分風寒易襲父母何知看承太弛重綿厚襖反助陽以抵險流欲放飯徒敗脾而損胃聞異聲見異物失於隄防深其居簡其出過於周密未期而行立分喜其長成無事而嬉笑分謂之聰慧一旦病生雙親心戚不信醫而信巫罔求藥而求鬼乃人事之不修謂天命之如此

育嬰家秘

發微賦

醫道至博幼科最難如草之芽分貴於調養似籞之苗分慎於保全血氣未充分脉無可診神識未開分口不能言誠求於心詳察於面苟得其要也握造化于妙手未達其旨也摘章句於殘編調護若失疾病乃生頭要凉而背要煖食勿飽而衣勿綿賜胃脆薄分乳哺傷而成積精神怯弱分聞見異而成癎嗟哉慈母分過於姑息笑彼粗工分誤於湯丸伎其發生之氣天其童稚之年徒啼號於丘壟休禱祀於廟壇

小兒不宜妄針灸

芽兒嫩小不耐傷針灸湯丸莫妄嘗破肉損筋成瘦疾壞賜敗胃作餘殃

初生小兒內外脆薄藥石針灸必不能耐也良工當以愛己子之心而愛人之子憐惜之撫摩之未可輕治爲兒作禍也書曰如保赤子其愛養之謂歟爲父母者不可不知

調養以慎其疾

小兒神氣衰弱忽見非常之物或見未識之人或聞雞鳴犬吠或見牛馬禽獸嬉戲驚嚇或聞人之叫呼雷霆銃爆之聲未有不驚動者也皆成客忤驚癎之病蓋心藏神驚則傷神腎藏志恐則志失大人皆然小兒爲甚也凡小兒嬉戲不可反指他物作蟲作蛇小兒啼哭不可令裝扮欺詐以止其啼使神志昏亂心小膽怯成客忤也不可不慎

小兒玩弄嬉戲常在目前之物不可去之但勿使之弄刀劍銜銅錢近水火見鬼神耳

小兒能言必教之以正言如鄙俚之言勿語也能食則教以恭敬如夔漫之習勿作也能坐能行則扶持之勿使傾跌也宗族鄉黨之人則教以親疎尊卑長幼之分勿使諜嫚言語問答教以誠實勿使欺妄也賓客教以拜揖迎送勿使退避也衣服器用五穀六畜之類遇物則教之使其知之也或教以數目或教以方隅或教以歲月時日之類如此則不但無疾而知識亦早也

小兒週歲有病者勿妄用藥調其乳母可也不得已而用必中病之藥病衰則已勿過其則也

幼科有拏掐法者乃按摩之變也以小兒未週歲者難以藥餌治權宜之則可以治外邪而不能治內病也能治小疾及氣實者如大病氣虛者用之必誤兒也爲父母喜拏而惡藥致令妖折者是誰之過歟父母當將幼子憐愛因愛慮取愁煩育嬰家秘無多

衛要受三分儀與寒
人之無子者置姬妾覓方術問命卜禱鬼神其心勞矣及其生子愛恤之深保養之失過於熱也熱則生風過於飽飽則成積醫不擇良藥或犯毒不可救也柳子種木傳云雖曰愛之其實害之所以取辱也諺云若要小兒安常受三分饑與寒饑謂節其飲食也寒謂適其寒溫也勿令太飽太煖之意非不食不衣之謂說也
頭要清涼背要溫露其下體養真陰天時勿犯如春候寒熱乖違客氣侵
此言適其寒溫之法也頭者六陽之會常要涼不可纏裹腹爲陰背爲陽皆臟腑之命門也常要和煖不可使露小兒純陽之氣嫩於無陰故下體要露使近地氣以養其陰也天時者即寒熱也春者溫和之氣萬物皆賴以生長也謂襁褓之中寒不犯寒熱不犯熱常如春氣溫和時以長養兒之身體若有乖違寒熱之客氣來侵矣
乳爲血化美如飴肉穀雖甘更亂最到得後來能食日莫教縱恣損脾陰
此言節其飲食之法也兒在母胞之時賴血以養既生之後飲食之乳亦血之所化也雖有穀肉不可與之以亂其腸胃中和之氣至於能食尤當節之不可縱其所好以快其心因而致病者多矣內經曰飲食自倍腸胃乃傷不可不慎也
耳目之神寄在心異聞異見易生驚痰生氣逆因成癇恨煞終身作廢人
乳母須求不病人擇其體厚性和平不貪口腹無淫欲鞠養何求子不成
養子之道當擇乳母必取無病婦人肌肉豐肥性情和平者爲之則其乳汁濃厚甘美瑩白溫和於子有益如病寒者乳寒病瘡者乳毒貪口腹者則味不純喜淫慾者則氣不清何益於子故宜遠之

幼科發揮

治未病

臍在兩腎之間任衝胃三脈之所係也兒之初生斷臍護臍不可不慎故斷臍之時隔衣咬斷者上也以火燎而斷之次也以剪斷之以火烙之又其次也護臍之法臍既斷矣用軟布纏裹待乾自落勿使犯水也三朝洗兒當護其臍勿使水漬入也臍落之後當換包裙勿使尿濕浸及臍中也如此調護則無臍風之病所謂上工治未病十得十全也
小兒病有二因衣太厚則熱太薄則冷冷熱之傷此外因也乳多則飽乳少則饑饑飽之傷內因也客忤中惡陰仆折傷此不內不外因也順乎天時適其寒溫則不傷冷傷熱矣慎擇乳母節其飲食則不傷饑飽調護之法愛惜之深必無縱弛之失矣慎勿使庸醫妄用湯丸誤見性命

魯伯嗣學嬰童百問

初生

嬰童在胎稟陰陽五行之氣以生成五臟六腑百骸之體悉具必稍胎液以滋養之受氣既足自然分娩初離母體口有液毒啼聲未出急用軟綿裹指拭去口中惡汁雖是良法然倉卒之際或有不及如法者古人有黃連法朱蜜法甘草法用之殊佳免使惡物嚥下伏之於心遇天行時氣久熱不除乃乘於心心主血脈得熱而散流溢於胃而胃主肌肉發出於外故成瘡疹之候世之長幼無有可免者若依初生拭口之法得免痘疹之患或有時氣侵染只出膚瘡細疹易爲調理亦後童之幸也楊氏云初生拭口不前惡穢入腹則腹滿氣短不能飲乳者宜用茯苓丸加減治之又法下胎毒臨產落草時濃煎淡豉汁服極好不可與辰砂黃連輕粉等

護養法

小兒始生肌膚未實不可煖衣止當薄衣但令背煖薄衣之法當從秋習之不可以春夏卒減其衣否則令中風寒所以從秋習之者以漸捐寒如此則必耐寒冬月但著兩薄襦可耐冀若不忍見其寒當略加耳若愛而煖之適所以害之也又當消息無令出汗如汗出則表虛風邪易入也晝夜寤寐常當慎之其哺乳之法亦當有節不可過飽或宿滯不化當用消乳丸化積溫脾等劑治之陳氏所謂忍三分寒哭七分飽頻採肚心澡洗及要背煖肚煖足煖要頭涼心胷涼亦至論也

廣搏醫學正傳

小兒初生食飲

小兒受患其爲母者胎前既不能謹節胎後又不能調護是以椎務姑息不能防微杜漸或未滿百晬而遂與酸鹹之味或未滿週歲而輒與肥甘之物百病由是而生焉曰吐瀉曰黃疸曰五痢曰腹脹曰水腫曰瘧曰痢曰痰喘豈非吃食過傷調養失宜之所致歟

薛氏保嬰金鏡錄

論初生用藥

愚謂凡小兒在月內外者調補之劑每服亦不過二三匙若表散攻伐之藥則每服只可匙許而已過多則反傷元氣餘當量大小虛實加減若乳母之疾致兒爲患當治母爲主子少服之後倣此

保嬰撮要

初誕法

小兒分娩之時口含血塊須急於未啼時用軟帛裹指穵去其血用黃連豆豉硃蜜甘草解之但黃連性寒若稟母氣膏粱積熱者宜服若滋味淡薄胎氣元弱者又不宜用其硃砂固能解毒恐金石鎮墜不若只以牛黃分許蜜調與吮爲佳世多用犀角解毒丸其胎氣虛寒虛弱者反傷脾胃生氣甚致不育又有嬰兒因其難產或冒風寒而垂危者切不可使斷臍帶急烘綿絮包抱懷中急以胎衣置火中煨燒更以火紙捻於臍帶上往來燎之使煖氣入腹須臾氣復自甦尤戒洗浴恐脉理不密元氣發泄而外邪乘之也

護養法

小兒初生須令乳母預慎七情六淫厚味炙煿則乳汁清寧兒不致疾否則陰陽偏勝血氣沸騰乳汁敗壞必生諸證若屢用藥餌則臟腑陰損多變敗證可不慎歟大抵保嬰之法未病則調治乳母既病則審治嬰兒亦必兼治其母爲善

樓英醫學綱目

初生禁忌

田氏曰大凡小兒過煖生熱熱極生風提抱生癰餧飼生癖最宜慎之

錢氏曰大喜後食乳食多成驚癇大哭後食乳食多成吐瀉

徐春甫古今醫統

嬰幼論

王隱君曰凡嬰兒六十日後瞳人將成而能應和人情自此爲有識之初便當誘其正性父母尊長漸次令其別之僮僕婢妾不可訓其手舞足蹈無禮罵人高舉放倒猛推閃避兒雖强笑失色驚駭乖張惡性自此無端乳母縱嗜厚味絕醪煎煿兒亦受之於乳是以驚疳積癖瀉痢由之而生及其臨病又忌灌以苦辛之藥味姑息隱忍無所不至人抵愛子之偏無出於母所嗜之食任其飽足以致所傷余幼時酷嗜甘飴忽於一日甘飴中有蚯蚓引頭而出自此不敢食飴至長始知長上爲之不然脾疳久患深染難調奈何不爲戕害

護養

千金論曰小兒二百四十日掌骨成母當教以匍匐一周滿母當扶以行步此皆則法若或煖衣重圍不見風日不著地氣致令筋骨軟弱數歲不能行者有之今觀田舍小兒則反是所以見風日得土氣筋力常健豈貴賤之理有異哉明乎此則保嬰之道得矣

乳哺

乳哺之法不可不慎小兒脾胃怯弱乳食易傷初得作嘔瀉久則成積癖乳母飲食乳汁便通兒食其乳所感立應母食熱則乳熱母食寒則乳寒夏食熱乳則致吐逆冬食寒乳則致嗽利母不欲怒怒則氣上爲狂母不欲醉醉則身熱腹痛懷孕乳兒致令黃瘦腹大脚軟名曰魃病大都乳哺不可太過諺云小兒常病傷於飽也又曰忍三分餓吃七分飽亦至論也

除胎毒

方書皆云小兒一出腹啼聲未發之時急用綿裹指拭去口內惡汁固是良法而倉卒之際或有不及者故有黃連甘草硃蜜等法用之殊佳東垣云只須淡豆豉一味煎湯與三五口其毒自下又能助胃氣也尤妙

初生總論

初生小兒必忌外客所觸古人一歲之內忌之者並無客忤之患小兒略識人物不宜攜至神廟觀望神像閃爍恐生恐懼

小兒將入夏時用色帛縫囊盛去皮尖杏仁七箇與小兒隨身佩之聞雷自然不驚

猪乳法

張煥論云初生時或未有嫡子產婦之乳未下可用猪乳代之可免驚癇痘瘡

錢氏曰初生小兒至滿月內可常取猪乳滴口中最佳按聖惠方取猪乳須令猪兒飲母次便提猪母後脚起猪兒口自離乳急用手捋之即得乳矣非此法不可取也

沐浴法

小兒洗浴不可先斷臍帶候洗了方斷不致水濕傷臍可免臍風臍瘡等證用清油調髮灰傅臍洗兒不可用水打濕臍帶

斷臍法

大抵兒初生斷臍之後宜用熟艾厚裹愛護若乳母不謹或因洗浴水入臍中或遺尿在裙抱之內濕氣傷於臍中或因解脫爲風冷邪氣所侵皆能令兒臍腫多啼不能乳哺卽成臍風也

著衣法

聖惠論曰小兒一期之內造衣服皆須用故帛爲之不可用新綿若用新綿則令兒壯熱或作驚癇

曬衣法

大抵兒衣日曬夜收不可露天過夜次早與兒穿上致染濕熱使兒不安此則所謂八邪之害久則令兒黃瘦腹痛身上壯熱夜間啼哭或生瘡疥世俗謂之無辜疾謂其衣在露天過夜染著無辜鳥屎令兒致疾故曰無辜疾其實非理先哲所謂八邪之害則溫熱風寒驚積饑飽是也

養子日用法

喫熱喫軟喫少則不病喫冷喫硬喫多則多病忍三分寒喫七分飽頻揉肚少洗澡

歌曰四時欲得小兒安常要三分饑與寒但願人皆依此法自然諸病不相干

養子十法

一要背煖經云背脊三椎下節之兩旁是肺之俞也若風寒傷於肺俞使人毫毛畢直皮膚閉而爲病熱其證或咳嗽或喘或嘔噦或吐逆及胷滿增寒壯熱皆肺經著寒而得之也故要背煖

二要肚煖俗云肚無熱肚肚者胃也爲水穀之海若冷則物不腐化腸鳴腹痛嘔噦泄瀉等疾生焉經云胃熱而能消穀必能飲食故要肚煖

三要足煖經曰足爲陽明胃經所司寒從下起故要足煖

四要頭涼經曰頭者六陽之會諸陽所湊也頭爲髓之海若大熱則髓溢汗泄或顱頤腫起或頭縫開解或頭瘡目疾俗云頭無涼頭故頭宜涼

五要心胷涼心屬丙火若外受客熱內接心火則內外俱熱也其證輕則口乾舌燥腮紅面赤重則啼叫驚跳故心宜涼

六者精神未全小兒忽見非常之物或見未識之人或聞雞鳴犬吠忽見牛馬等畜或嬉戲驚駭或忽聞大聲因而作搐者緣心氣成虛而精神離散故也當用補心益氣藥治之如用鎮心朱砂牛黃琥珀金銀腦麝水銀等藥則成慢驚風搐以致腹脹足冷不能療也

七者不溫脾胃致成吐瀉慢驚經曰脾爲黃婆胃爲金公主養五臟六腑若脾胃全固則津液通行氣血流暢表裏冲和一身康健蓋脾胃屬土而惡濕小兒變蒸上脣腫而頭熱或上氣身熱父母不曉妄作傷風傷食治之或以表藥出汗或以通藥宣泄或以涼藥鎮心或以帛湯展繳致令冷熱不調內傷脾胃搏於大腸故糞便青色久不已者必吐吐不已者作搐搐作又言熱則生風轉用涼藥治之愈覺敗傷眞氣漸不救者多矣經云脾土虛弱肝木乘之故筋攣而作搐宜用補脾溫胃暢氣之藥治之庶可得痊也

八者兒哭未定勿使飲乳致兒嘔嬭糞青小兒在胎之時其母取涼過度冷氣入於胞胎之中兒生之後因悲啼未定便與乳食使氣與食蓄結於中久而不散致傷脾胃輕則嘔嬭糞青重則腹中氣鳴氣逆涎潮流溢以致難治

九者勿得輕服輕粉朱砂夫水銀輕粉俱有毒雖云下痰性冷損心氣辰砂雖鎮墜性寒損神小兒服之易傷每每被其誤也多矣

十者因浴致生丹毒小兒一周之內不可輕易頻洗肌膚脆嫩腠理不密洗之恐濕熱之氣鬱蒸不散變生赤遊丹毒片片如臙脂身發壯熱若毒氣入腹者死又有因浴傷寒咳嗽上氣外感之疾多由此也

王肯堂證治準繩

小兒論

初生兒出月必須人襁褓襁褓之道必須得宜如春夏之月乃萬物生長之時宜敎令地臥使之不逆生長之氣如秋冬之月乃萬物收藏之時宜就溫煖之處使之不逆收藏之氣然後血凝氣和則百病無自而入矣

乳哺

湯氏曰小兒乳哺須要得法乳者嬭也哺者食也乳後不得便與食哺後不得便與乳小兒脾胃怯弱乳食相併難以尅化周歲以上必成乳癖食癖於腹中作疼作熱疳病從此起也

凡乳母血氣爲乳汁也五情善惡悉血氣所生宜戒喜怒一切禁忌不可用狐臭癭瘻氣嗽病者及身體疥癬頭瘡髮少緊唇耳聾音啞齆鼻癇病等方可用乳兒

夏中盛熱時乳母浴後或兒啼不可與乳能使兒成

胃毒秋成赤白痢浴後可令定息良久熱退乳之故無患也

聶氏曰盛啼不可食乳恐氣逆不順聚而爲噎亦能成驚風也

千金論曰凡乳兒乳來多徧取出搦後再乳父母交合之間兒臥於側或驚起不可乳兒蓋氣亂未定必能殺兒也

巢氏云小兒啼未定氣息不調母不可以乳飲兒蓋恐乳不得下停滯胃脘則爲嘔吐也

夜間乳兒母起身坐抱兒餧之

每侵早欲飲乳皆須捏去宿乳

乳汁勿投於地蟲蟻食之令乳無汁可沃東壁上佳

乳令兒病

喜乳逆喘生驚

孫兆云令兒上氣顛狂亦令兒生痰喘急或生驚怒乳痫氣腹脹

千金翼云怒乳令兒痫氣扁鵲云女子則腹脹寒乳蠕片不化

華佗論云乳氣寒虛冷故令便青而啼千金翼云令兒咳嗽

熱乳面黃不食

千金翼云令兒嘔吐張氏云熱乳傷損肺氣令兒龜胃

氣乳吐瀉腹脹

寶鑑云令兒面黃白乳哺減少夜啼哯乳

病乳能生諸疾

令兒黃瘦骨蒸盜汗嗞煎夜哭孫氏云病乳則致虛羸及生諸疾

壅乳吐逆生痰

靈祕云壅乳成痰涎逆壅生驚寶鑑云壅乳成妳癖又吐逆生痰

魅乳腹急臟冷

寶鑑云腹急而瀉胃脘皆熱夜啼肌瘦一如積塊

醉乳恍惚多驚

千金翼云令小兒熱腹急痛扁鵲云醉淫隨亂乳兒恍惚多驚

淫乳必發驚痫

寶鑑云乳母淫佚情亂乳兒令吐瀉身熱啼叫如鴉不治

已上乳急欲乳兒能生諸病不可不忌也凡喜怒氣亂未定乳兒則成吐瀉腹痛疳黃不食寒熱壅積不散乳兒則成痰癖逆嗽肺脹龜胃醉淫喘乳多發驚痫聖惠方云醉淫喘乳能殺小兒聖濟總論乳者夏不欲熱熱致叶逆冬不欲寒寒則孜下痢母不欲怒怒則令上氣顛狂母不欲醉醉則令身熱腹滿母方吐下而乳則致虛羸母有積熱而乳則變黃不能食新房而乳則瘦悴交脞不能行大抵乳食不好則生疾病

寶鑑云兒五十日可哺如棗核百日彈丸早晚二哺莫抱簷下澡浴當風解衣哭未斷而乳冒冷而哺又不可在神佛蠶馬畔各房異戶之親諸色物器竝不可觸犯之害子性爲驚癎經云三歲未滿勿食雞肉子腹生蟲

錢乙云兒多因愛惜過當三兩歲猶未飲食致脾胃虛弱平生多病半年方煎陳米稀粥粥熟時時與之十月後漸與稠粥爛飲以助中氣自然易養少病惟忌生冷油膩甜物等

外臺崔氏初哺兒法以平定成日丑寅辰巳酉日大吉

男忌戊己日女忌丙丁日

斷乳法

小兒年至四五歲當斷乳而不肯斷者宜用青黛斷乳之後方可漸與肉食則無疳癖之患

雜將護法

張煥曰乳母須每日三時摸兒項後風池若壯熱者即須熨之使微汗即瘥

諺云戒養小兒謹護風池風池在頸項筋兩輟之邊有病乃治之疾微切不可妄鍼灸亦不用輒吐下所以然者鍼灸傷兒經絡吐下傷動臟腑故也

嬰兒暑中令在稍凉處乳母勿禁新水亦不宜多

嬰兒春夏間有疾不可亂有動下使下焦虛上焦熱變成大病也

嬰兒須看稟受南北之殊蓋地生寒溫不同故也

嬰兒生後兩滿月即目瞳子成能笑識人乳母不得令生人抱之及不令見非常之物

嬰兒百脖任脉生能反復乳母當存節喜怒適其寒溫

嬰兒半脖尻骨已成乳母當教兒學坐

嬰兒二百日外掌骨成乳母教兒地上匍匐

嬰兒三百日臂骨成乳母教兒獨立

嬰兒周脖膝骨已成乳母教兒行步

上件並是定法蓋世之人不能如法存節往往抱兒過時損傷筋骨且宜戒之爲吉

萬全論云田婦護兒絕無他疾譬之草木生深山大澤容易合抱至於異果奇材縱加培養間有不秀實者豈貴賤異哉數見風日即血凝氣剛肌肉硬密堪耐風寒以田舍兒較之相似

浴兒

兒生三日以桑檢桃柳各取嫩枝三寸長者二三十節煎湯看冷熱入猪膽汁二三枚浴之

浴湯用猪膽益母草不生癖疥用金銀虎頭骨磨丹砂辟惡氣客忤驚癇用桃梅李楮根解體熱溫壯之病須浴時煮

湯須不冷不熱於無風密室浴之勿令久

浴訖以粉摩之或以光粉蚌粉撲身辟邪吉

紀用經浴法寅卯酉日吉壬午丁未癸巳凶不能上三日勿犯下三日

兒初生以三日浴或五日浴七日浴須選吉日

斷臍法

寶鑑論斷臍若用剪刀先於懷中令煖又水入臍多天釣痛苦啼叫面青黑臍傷動令久不乾傷外風即口噤不可救

灸臍法

聖惠云兒生一宿抱近明無風處看臍上有赤脈直上者即於脈盡頭灸三壯赤散無患矣

下胎毒法

張燦云嬰兒初生第一日纔斷臍綳抱訖看兒形色若面紅潤色赤啼聲響快者宜用汞粉法良久有臍糞便下爲佳大用甘草法大用朱蜜法臨時更看形色若面色多青白啼聲不響即不須服大用牛黃法

古方又有黃連法韭汁法豬乳法等在人看兒寒熱怯壯擇所宜而用之爾

藏胞衣法

崔氏云兒衣清水洗勿令沙土草汚又清酒洗之仍內錢一文在衣中盛新瓶內青綿裹瓶口密蓋置便宜處二日後依月吉地向陽高燥處入地三尺埋之瓶上土厚一尺七寸須牢築令兒長壽智慧若不謹爲猪狗食令顛狂蟲蟻食令病惡猪犬鳥食令兵死近社廟令見鬼近深水汙池令溺死近故竈令驚惕近井旁令聾盲棄道路街巷令絕嗣當門戶令聾不出耳聾著水流下令盲棄火裏令生爛瘡著林木頭令自絞死此忌須慎

每於天德月空處埋之（正月天德在丁月空在丙千金作辛官本作甲）若遇反支宜掛宅外福德上向陽高燥處待過月然後依法埋藏吉

甲乙日生丙丁日藏丙丁日生戊己日藏戊己日生庚辛日藏庚辛日生壬癸日藏吉

剃頭法

集驗方云小兒初剃頭俱不擇日皆於滿月日剃之蓋風俗所尚前產婦未得出房於滿月即與兒俱出謂胎髮穢有觸神忌令小兒不安故於此日必剃頭而出凡剃頭就溫煖避風處及剃後須以杏仁三枚去皮尖研碎入薄荷三葉再同研却入生麻油三四滴脈粉拌和頭上摩以避風邪免生瘡疥熱毒其後小兒亦宜此法

李梴醫學入門

初生裹臍

夫人之臍也受生之初父精母血相受凝結胞胎混沌從太極未分之時一氣分得二穴穴中如產四穴外通二腎內長赤白二脈四穴之中分爲表裏在母腹中母呼兒呼母吸兒吸是一身臍帶如花果在枝而通蒂也一月一週眞氣漸足既產胎衣未脫臍帶且緩斷倘臍門未閉感風傷寒即損嬰兒眞氣遂以艾火熏蒸數次則眞氣無患矣

凡初生時用綿裹臍帶離肚二三寸處以綿紮住却於線外將臍帶剪斷片時去線待血流盡看近肚處臍有兩小孔一大孔用鵝毛管送煉臍藥一二分入大孔內以手指輕輕揉散艾灸臍頭三灶結作肫搭軟帛腰裹切不可時常揭看待臍落去自無風矣又法落胎之時視其臍軟者不須治如臍硬直者定有臍風急用銀簪於臍根旁剌破一二處入麝香末少許艾灸三灶極妙

藏胎衣

小兒胎衣藏之宜生氣方上正月子方二月丑三寅四卯五辰六巳七午八未九申十酉十一戌十二亥方如生氣方有不便依曆日藏於奏書博士月德方上忌月空三殺太歲方上俗多置之河中者非

調護

養子須調護看承莫縱弛乳多終損胃食進即傷脾被厚非爲谷衣單正所宜無風頻見日寒暑順天時初生三五月宜繃縛令臥勿豎頭抱出免致驚癇六箇月方可與稀粥不可將乳同喫令兒生疳積五歲

方可喫葷腥

襲廷賢萬病回春

初生

小兒初生宜用七八十歲老人舊裙舊襖改作小兒衣衫眞氣相滋令兒有壽富貴之家切不宜新製紵絲綾羅氈絨之類與小兒不惟生疾抑且折福必致夭傷

小兒衛生總微論方

洗浴論

兒纔生下須先洗浴以蕩滌汙穢然後可斷臍也若先斷臍則浴水入臍而爲臍瘡等病及浴水須用藥預先煎下以瓶貯頓臨時旋煖用之不犯生水方佳井已後浴之亦用藥煎湯揀所宜時日則大良矣凡浴宜用寅卯酉日若初生不值但於日中選此三時如時亦不值惟忌壬午丁巳癸巳日時大凶而無避之餘皆可也

用猪膽汁湯浴兒則不患瘡癬皮膚滑澤用金銀虎骨丹砂煎湯則辟邪惡去驚單用虎骨亦得用李葉切半斤煎湯則解肌熱去溫壯用白芷二兩苦參三兩挫碎煎湯則去諸風用蔪葱白胡麻葉白芷藥本蛇牀子煎湯退熱用苦參黃連猪膽白芨杉葉柏葉楓葉煎湯去風用大麻仁零陵香丁香桑甚藥本煎湯治諸瘡用金銀桃奴雄黃丹砂煎湯則辟邪除驚用益母草煎湯治疥瘡諸瘡

凡煎湯每用水一斗入藥煎至七升去滓適寒溫用之冬不可太熱夏不可令冷須調停得宜乃可用之兒自生之後須依時洗浴以去垢汙又不可數數若都不洗浴則皮皺毛落多生瘡疥凡洗浴時於背上則微微少用水餘處任意既不可極淋其背亦不可久坐水中則引驚作病切須慎之如常能依法用之令兒體滑舒暢血脉通流及長少病無不驗也

斷臍論

兒生下須當以時斷臍若不以時斷臍者則令臍汁不乾而生寒爲臍風之由其斷臍帶當令長至足趺或云當長六寸若太短則傷臟令兒腹中不調若太長則傷肌令兒皮枯鱗起纔斷臍訖須用烙臍餅子安臍帶上燒三壯灶如麥大若兒未啼灸至五七壯灸了上用封臍散封裹之法須搥治帛子令柔軟用方四寸許上置新綿厚半寸及上置藥末適緊慢以封之如不備其藥即用極細熟艾一塊置於上封之但不令封帛緊急急則令兒吐哯又須常切照顧勿令溫著及襁褓中亦不可令兒尿濕恐生瘡腫及引風也

聖濟經云凡兒初生惡血未納者拭以綿指吞而在胃腸者吐以甘草入而在腹內者利以黃連末粉脊所以革污穢也次用好硃砂一大豆許細研水飛煉蜜一蜆殼看稀稠和膏分三劑每用一劑乳汁化時時滴兒口中三日內服盡即止姚和衆云成煉硃砂能溫腸胃壯血氣也一日只可一豆許勿得過也分三次用次用眞牛黃一大豆許細研以煉蜜酸棗大和成膏每用一大豆許乳汁化下時時滴兒口中姚和衆云能去驚辟邪惡之氣若兒形色不實怯弱者不宜服之如胎熱或體色赤黃者宜多服此法在三日外也

慎護論

凡乳母慎護養兒乳哺欲其有節襁褓欲其有宜達其饑飽察其强弱適其濃薄循其寒煖蓋自有道不可不知也

凡兒自初生至滿月常取猪乳滴兒口中又以珍珠末一大豆許用蜜一蜆殼和之分三次或四次每十日內外與一次塗兒口中安心神鎮魂魄

凡兒於春時不可覆頭裹足致陽氣不得出泄則發熱矣

食忌論

凡小兒有不可食之物不可不知今具於後

小兒不可多食栗子令兒氣弱行遲熱食則氣滯

小兒不可食蕨菜令兒立則無力久不能行

小兒不可食芡令兒不能行

小兒不可食黍米雞肉胡瓜令兒腹中生蟲

小兒不可食越瓜令兒發病疾

小兒不可食蕎麥令兒髮落

小兒不可食蒐芙令兒臍下痛

小兒不可食鱔魚令兒生癥癖

小兒不可食炒豆猪肉令兒生氣壅致死

董氏翀活幼精要

食忌論

大凡小兒不宜多食心之有病不宜食鹹肺之有病不宜食苦肝之有病忌食辛辣脾之有病忌食傻酸腎之有病忌食甘甜生葱與蜜共食害人菓菜鼈肉共食生毒魚蝦油膩肺病忌食生冷雞卵脾病忌食雞羊煎炒心病忌食葱蒜油麪肝病忌食腰子肚肺

心血葫荽有病無病俱不可食飛禽瓦雀食生瘡疥螺螄蟹鯗食生瀉利食甜成疳食飽傷氣食冷成積食酸損志食苦耗神食鹹閉氣食肥生痰食辣傷肺蓮子芡實能通心氣石榴酸柑大澀腸胃乾柿煑蔗猶能益肺蒸藕炊豆於肝宜利五味淮棗脾家可意食味淡薄臟腑清氣愛子惜兒須知禁忌丁奚哺露疾作無辜救療無門悔之不及育子之家當爲留意

景岳全書

兒初生

凡小兒初誕宜以甘草細切少許用沸湯泡汁以淡爲妙不宜太甜乃用軟帛蘸汁徧拭口中去其穢濁隨用胡桃肉去皮嚼極爛以稀絹或薄紗包如小棗內兒口中使吮其汁非獨和中且能養臟最佳法也若母氣素寒小兒清弱者只以淡薑湯拭口最能去胃寒通神明幷可免吐瀉之患此法最妙人所未知也拭後用核桃法如前

一法以牛黃半分同硃砂研勻蜜調如前與吮爲佳極能辟痰去穢惡除熱安神然必母氣多熱小兒肥盛者可用清弱者不宜用

一古法拭口多有用黃連者不知黃連大寒大苦而小兒以胃氣爲主安得初生即可以苦劣之氣相犯致損胃氣則他日變嘔變瀉由此而起矣大非所宜

一古法多用硃砂開口者按陳文仲曰小兒初生便服硃砂輕粉白蜜黃連本欲下胎毒不知此皆傷脾敗陽之藥輕粉下痰損心硃砂下涎損神兒實者服之軟弱弱者服之易傷反致變生諸病是故不可不察也

東醫寶鑑

保護法

良方曰夜間不得令兒枕臂須作一二豆袋令兒枕兼左右附之可近乳母之側蓋覆衣衾須露兒頭面若一向仰臥恐成驚痰須時時回動之

方

平和飲子（顱顖經）

兒初生日與飲指迷云兒生三日後與母服

人參　茯苓　甘草　升麻各二錢五分

水一盞煎一合半時時與之乳母忌油膩滿月及百晬

如時冷加白朮

熱加硝各半錢

百壽散（海藏方）

小兒初生未滿月已前用之者老無瘡疥

黃連一兩　硃砂一錢

右水煎令老母拭去口涎淨灌下餘藥傾盆中浴兒遍身搽妙

浴體湯（小兒直訣）

青黛三錢　天麻二錢　烏梢肉酒浸焙末三錢

蠍尾去毒炒　硃砂研各半錢　白礬三錢

麝香一錢

右七味同研勻入白礬末三錢和勻每用三錢水三碗桃枝一握幷葉五七枚同煎十沸溫熱得所浴之勿浴背上

經驗安化湯（慈幼要覽）

孩兒初生莫與乳食急以此飲之

黃連　薄荷　天花粉各一錢　木通五分

甘草四分　菊花三分

右用新汲水三盞煎作一盞大溫灌兒三五茶匙咽下間歇方與乳食

防風通聖散（劉河間方下同）

治小兒表裏俱實

防風　川芎　當歸　芍藥　大黃　薄荷葉

芒硝　麻黃去根不去節　連翹各五分　石膏

黃芩　桔梗　甘草各二錢　滑石三錢　荊芥

白朮　山梔各一錢

右爲麤末每服五七分入生薑一小薄片水煎去渣熱服

如涎嗽加半夏五分生薑製過

涼膈散

大黃一錢　連翹四錢　甘草　黃芩　薄荷

砂硝　山梔各一錢

右爲粗末每服三五分入蜜竹葉水煎三五沸去渣溫服無時

神芎丸

大黃　黃芩各二錢　滑石　黑牽牛各四錢

黃連　薄荷　川芎各五分

右爲末水丸桐子大每服五七丸溫水下視兒大小加減

益元散
滑石六錢　甘草一錢　辰砂少許
右爲細末每服三分蜜調新水送下
解毒延齡膏（育嬰家寶）
治小兒初生拭去口中惡物三日之內卽以此藥抹兒口中能解穢惡之毒亦可免瘡疹驚風之疾
兒胞衣上臍帶取一二寸許新瓦焙爲末五分
黃連末二分半　硃砂末一分
右共研用蜜和當生下三日內抹兒口中令嚥之
以解胎毒
茯苓丸（嬰童百問下同）
治嬰兒初生其聲未發急拭其口令惡血淨盡不得下咽則無他病稍遲惡穢入腹則腹滿氣短不能飲乳或胎中受寒則令兒腹痛不乳宜服此
赤茯苓　黃連冷證去此加芍藥　枳殼炒
右等分爲末煉蜜爲丸如桐子大每丸乳汁調下
消乳丸
又名消食丸巢氏云宿食不消脾胃冷故也小兒乳哺飲食生冷過度冷氣積於脾胃胃爲水穀之海脾氣磨而消之胃氣調和則乳哺消化脈沉者傷食不化故也
縮砂仁　陳皮　三稜煨　莪朮煨　神麯炒
麥芽炒各半兩　香附子炒一兩
右爲末麵糊丸如麻子大食後白湯送下
安臍散（保嬰撮要）
羚羊角鎊屑一錢略炒　亂髮一團燒灰令存性
蜈蚣一寸赤脚者炙

右爲末斷臍後卽傳之以絹帕緊束恐犯風也
畫眉膏（證治準繩下同）
治小兒不肯斷乳
山梔三箇燒存性　雄黃　硃炒各少許
右爲極細末入生麻油輕粉各少許調勻候兒睡著濃抹於兩眉上醒來便不食乳未效再用加黃丹一錢
封臍散
飯帶灰　亂髮灰　白薑灰　紅帛灰俱要淨者
南星　白斂　當歸頭　赤小豆　五倍子
血竭　龍骨　赤石脂煅　海螵蛸　百草霜
胭脂各半錢
右合研爲極細末濕乾傅乾則清油塗忌生水浴
臍
又方
紅綿灰　黃牛糞灰　龍骨煅研　亂髮灰
乾胭脂各半錢
右爲極細末濕乾摻乾清油塗臍
保生第一良法
此方一以解毒一以補養蓋臍帶乃有生之紫河車也繫於母之命門兩腎之所生乃以腎補腎腎既充足卽不受邪故無他日變黑歸腎之證亦無顧門不合之疾
本兒臍帶落下卽用新瓦上焙燥爲末　辰砂
黃連　甘草各末五分
右共和勻蜜拌做三五次塗乳母乳上俟兒吞之必使一日夜吞盡次日惡毒皆從大便而出日後不但痘疹稀疎竟有不出痘者俟臍帶落下卽便製服在六七日之間爲妙其辰砂必須研極細末以甘草湯飛過任服無害
延生第一方（萬病回春）
小兒初生用此終身永無瘡疹及諸疾生一子則得一子十分妙法也
小兒初生臍帶脫落取置新瓦上用炭火四圍燒至烟將盡放土地上用瓦盞蓋之存性研爲細末
硃砂透明者預爲極細末水飛過
右二味臍帶若有五分重硃砂用二分五釐生地黃當歸身煎濃汁一二蜆殼調和前兩味抹兒上齗間及乳母乳頭上一日之內至晚須盡次日大便遺下穢汚濁垢之物以去胎毒永無瘡疹之疾
按此二方及解毒延齡膏同一臍帶燒製性使諸藥各有輕重不同今並列之俟良工隨時因兒參互酌用可也
煉臍藥（醫學入門）
初生小兒用之結臍可去臍風大人用之熏灸可去百病
麝香五分能引諸藥入五臟六腑週徹百節
青鹽四錢能入腎以實其子使肺母無泄漏加乳補下益其氣脘　丁香三錢入肺補血實脾胃
夜明砂五錢能透肺孔補氣不足散內傷有餘
乳香　木香末各二錢　小茴四錢能治濕澀證調
達周流升降其氣不致喘嗽如欲斷水先尋此源
沒藥　虎骨　烏梢蛇骨　龍骨　硃砂各五錢
雄黃三錢能削去病根扶弱助强　白附子五錢能
循各經絡有推前洩後之功　人參　附子

胡椒各七錢能補元氣行榮血化痰涎爲津液

五靈脂五錢保肺氣削有餘補不足

右爲末初生小兒結臍時用一二分入近肚處大孔內用手輕輕揉散可免臍風大人熏臍另用白麵作條圈於臍上將前藥一料分爲三分內取一分先填麝香末入臍眼內又將前藥一分入麵圈內按藥令緊中揷數孔外用槐皮一片蓋於藥上能閉押諸氣之性使無走竄用艾火灸之取其火勢劫病去毒起死回生灸至五六十壯或一百二十壯凡一年四季各熏一次則百病頓除益氣延年婦人則去麝加韶腦一錢灸時遍身大汗要愼風寒戒油膩生冷保養一月

烙臍餅子（俾幼大全下同）

小兒初生斷臍用此安臍帶上灸之

豆豉　黃蠟各一分　麝香少許

右以豆豉爲細末入麝香研勻鎔蠟和劑看大小捻作餅用

封臍散

既用烙臍餅灸了用此封裹

雄鼠糞七枚兩頭尖者是　乾薑如棗大許

飯帶雜子許三味同燒灰　綿灰半兩別燒稱

緋綿灰別燒稱半分　胡粉三錢炒黃　麝香少許

右同研極細末每用半錢至一錢傅臍上封之永不患臍瘡腫如已因風濕患瘡腫者看臍帶落與未落依此用藥便差

單方

孩兒初生下時宜進生地黃汁點在孩兒口中卽下黑屎至壯年亦不害瘡疹（普濟方）

甘草法用好甘草中指一節許拍碎以水二蜆殼煎一蜆殼以綿纏蘸令兒吮之若吐出惡汁爲佳若服一蜆殼不吐卽不須更服嬰兒虛實寒熱皆須服之（封後方）

黃連法初生兒惡汁下留胃膈壅塞易生蘊熱驚癇瘡癤用好肥黃連數塊搥碎綿裹如奶頭大狀湯內浸成黃汁拈撫一二點滴兒口中惡汁自下乳食便美未盡用空綿別浸黃連後以朱蜜間與之（集驗方）

淨黃連一錢水一盞煎先煎下待兒生未出聲時便用灌下以除腹中惡物臍屎兼解胎中蘊積熱毒終身不生瘡又去臍風等病（肯藏方）

小兒初生欲解下胎毒生嚼脂麻綿包與兒咂之其毒自下（二四方）

韭汁法甘草後煖水浸韭子汁塗兒脣上乾又塗數次止不令入口（聖惠方）

牛黃法眞牛黃一塊好蜜煉和成膏每服一豆大乳汁化時時滴口中形色不實者不宜多服若嬰兒胎熱或身體黃色宜多服之（張渙方下同）

兒生紅潤色赤啼聲響快者用禾粉半錢旋旋令兒吮之良久有臍糞便下爲佳

小兒初生與韭根汁灌之卽吐出惡水（本草綱目）

朱蜜法好硃砂一大豆許細研水飛煉赤蜜一蜆殼看稀稠和成膏每用一豆大乳汁化下時時滴口中三日內止三粒臨時更看形色若面色多青白啼聲不響卽不須服（證治準繩）

小兒初生銀粉抹口舌上下左右兩頰然後飼朱蜜（資壽）

醫案

景岳全書曰余季子於丁巳正月生於燕邸及白露時甫及半週余見新涼日至虞稠褥之薄恐爲寒氣所侵每切囑眷屬保護之而眷屬不以爲意及數日後果至吐瀉大作余卽用溫胃和脾之藥不效隨用理中等劑亦不效三日後加人參三錢及薑桂吳茱肉荳蔻之類亦不效至四日則隨乳隨吐吐其半而瀉其半腹中毫無所留矣余不得已乃用人參五六錢製附子薑桂等各一二錢下咽卽吐一滴不存而所下之乳則白潔無氣仍猶乳也斯時也其形氣之危已萬無生理矣余靜坐默測其故且度其寒氣犯胃而吐瀉不止若舍參薑桂附之屬尚何術焉伎止此窘甚忽於夜半而思意起謂其胃虛已極但藥之氣味略有不投則胃不能受隨拒而出矧附子味鹹亦能致嘔必其故也因自度氣味酌其所宜似必得甘辣可口之藥庶乎胃氣可安尚有生意乃用胡椒三錢搗碎加煨薑一兩用水二鍾煎至八分另盛聽用又用人參二兩亦用水二鍾煎至一鍾另盛聽用

用此二者取其氣味之甘辛純正也乃用茶匙挑合二者以配其味凡用參湯之十加椒薑湯之一其味微甘而辣正得可口之宜遂溫盞熱湯中徐徐挑而與之陸續漸進經一時許皆咽而不吐竟得獲效自後乳藥皆安但瀉仍未止也自四鼓服起至午未間已盡二兩之參參盡後忽爾躁擾呻吟煩劇之甚家人皆怨謂以嬰兒嬌嫩臟腑何堪此等熱藥是必斃斷肚腸也相與抱泣余雖疑之而不爲亂仍凝神熟思意此藥自四鼓至此果藥難堪何於午前相安而此時遽變若此其必數日不食胃氣新復而倉廩空虛饑甚則然也傍有預備之粥取以示之則張皇欲得其狀甚急乃與一小盞輒鯨吞虎噬又望其餘遂復與半碗猶然不足又與半碗遂寂然安臥矣至次日復加製附始得瀉止全愈嗚呼此兒之重生固有天命然原其所致之因則人之臟氣皆繫於背薄夜寒則寒從背命而入內干於臟中必深矣原其所治之法用藥雖當而氣味不投無以相入求救難矣及其因饑發躁使非神悟其機倘妄用清凉一解則全功盡棄害可言哉故余筆此以見病源之輕重氣味之相關及診治之活變有如此關係者雖然此特以己之兒故可信心救療如是設以他人之子同有是病者於用參數錢之時見其未效不知藥未及病必且煩言吠起謗其誤治改用苦寒無不即死而仍歸罪於用參者此時黑白將焉辨之故再贅其詳用以廣人之聞見云

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百二十三卷目錄
醫部彙考四百三
小兒診視門一

黃帝靈樞經　論疾診尺
嚴助相兒經　壽夭
王叔和脈訣　小兒生死候歌　外證十五候歌
孫思邈千金方　小兒總論
錢乙小兒直訣　脈法　面部證　目部證　死證
朱肱活人書　論小兒治法
許叔微本事方　小兒脈
劉完素六書　小兒論
朱震亨平治會萃　小兒病
幼科全書　觀形察色　辨脈　論治法　論胎氣有餘不足以知壽夭　審手冷熱　法古辨小兒三關手筋脈　辨手經脈形色　辨手筋色歌　驗病歌　形證歌　聽聲知病　辨生死　總歌
危亦林得效方　論小兒　虎口脈
方賢奇效良方　看小兒三脈五脈法　辨三部脈證　看三關脈五色　正定三十一般死候　小兒生下三月已前中病不治證　虎口脈色　面部　七表　八裏　九道　視嬰孩大要
萬氏祕傳片玉心書　活幼指南賦　慈幼微心賦　小兒總治　看虎口紋　脈法　雜證　水鏡訣　湯氏虎口紋訣　辨虎口指脈紋　總治　頌印堂山根論歌　年壽論歌　承漿兩眉論歌　風池氣池兩頤論歌　兩目論歌　鼻準論歌　正口論歌　兩太陽論歌　兩臉論歌　兩頤金匱風門論歌　部位歌　觀形察色
萬氏育嬰家祕　發微賦　貧富異病　論胎疾　食積外感　家傳三法　辨壽夭　辨形色　辨脈息　辨脈證治

藝術典第四百二十三卷
醫部彙考四百三
小兒診視門一

黃帝靈樞經

論疾診尺

嬰兒病其頭毛皆逆上者必死

註此論人之血氣本於先天所生而上下環轉者也嬰兒者始生之兒毛髮者血之餘少陰精血之所生也髮復下垂以應人之血氣從下而升復從巔而下若髮上逆是惟升而無降矣升降息故不免於死亡

耳間青脈起者掣痛甲乙經作悲腹痛

註腎主骨而開竅於耳故耳間青脈起者當主筋骨掣痛此承上文而言人之血氣始於先天腎臟之所生

大便赤辨甲乙經作青辨殞泄脈小者甲乙經作脈大手足寒難已

殞泄脈小手足溫泄易已

註辨別也大便赤辨者謂黃赤之間別也蓋中焦泌糟粕蒸津液乃化而爲血獨行於徑隧命曰榮氣水穀常并居於胃或糟粕而俱下於大腸濟泌別汁而滲入於膀胱如大便赤辨乃中焦之血與糟粕並下矣殞泄大腸虛而不能濟泌矣此腸胃虛泄於下中焦之汁不能榮於脈中故脈小也若手足溫者得下焦之生氣故泄易已此言中焦水穀之精微又藉下焦之生氣以合化

晉嚴助相兒經

壽夭

兒初生叫聲連延相屬者壽
聲絕而復揚急者不壽
啼聲散者不成人
啼聲深者不成人
臍中無血者好
臍小者不壽
通身軟弱如無骨者不壽
鮮白長大者壽
自開目者不成人
目視不正數動者大非佳
汗血者多厄不壽
汗不流不成人
小便凝如脂膏不成人
頭四破不成人
常搖手足者不成人
早坐早行早齒早語皆惡性非佳人
頭毛不周匝者不成人
髮稀少者強不聽人一作不聰
額上有旋毛者早妨父母
兒生枕骨不成者能言語而死
尻骨不成者能踞而死
掌骨不成者能匍匐而死
踵骨不成者能行而死
臏骨不成者能立而死
身不收者死
魚口者死
股間無生肉者死

頤下破者死
陰不起者死
陰囊下白者死赤者死
卵縫通達黑者壽
王叔和脈訣
小兒生死候歌
小兒乳後輒嘔逆更兼脈亂無憂慮
註變蒸未定氣息未調嘔逆脈亂不得爲病
弦急之時被氣纏脈緩即是不消乳
註小兒之脈弦急乃風邪寒氣所纏則脾病而乳食不消
緊數細快亦少苦虛濡邪氣驚風助
註數而細快乃小兒平脈加之以緊亦有些須表邪若虛而濡乃邪氣驚風之候
痢下宣腸急痛時浮大之脈歸泉路
註下痢之脈不宜浮大故也
外證十五候歌
眼上赤脈下貫瞳人
註池氏曰赤脈屬心瞳人屬腎乃心火勝腎水水乾則不能生木致腎肝皆絕故也入門曰水火困絕
顱門腫起兼及作坑
註熱勝則腫熱極則陷皆熱候也入門曰心絕
鼻乾黑燥
註火尅金也入門曰肺絕
肚大筋青
註木尅土也入門曰脾絕氣不榮

目多直視視不轉睛
註經曰迴則不轉是也入門曰目直視則五藏俱絕
指甲青黑忽作鴉聲
註肺肝已絕入門曰指甲青黑肝絕鴉聲氣有出無入脈絕也
舒舌出口齧齒咬人
註心氣已絕入門曰舒舌心絕咬人腎絕
魚口氣急啼不作聲
註魚口張而不合也是謂脾絕氣急作喘哭而無聲是謂肺絕
蛔蟲既出必是死形
註蛔蟲生於胃中藉穀食以養胃絕而穀食不入蟲故出也
用藥速救十無一生
註總結上文十五證而言也小兒有是證者十中莫治其一
唐孫思邈千金方
小兒總論
兒三歲以上十歲已下視其性氣高下即可知其天壽大略兒小時識悟通敏過人者多夭大則項羣顏回之流是也小兒骨法成就威儀迴轉遲舒精神費人修孔融之徒是也由此觀之天壽大略可知也亦猶梅花早發不覩歲寒甘菊晚成終於年事是知晚成者壽之兆也
宋錢乙小兒直訣

脈法
脈弦急氣不和脈沉緩傷食脈促結虛驚脈浮爲風脈沉細爲寒脈亂不治
註夫脈也者人身之造化病機之先見用藥之準繩不可不先明諸心者也全幼心鑑云小兒一歲以前看虎口食指寅卯辰三關以驗其病脈紋從寅關起不至卯關者易治若連卯關者難治若寅侵卯卯侵過辰者十不救一其脈紋見有五色如因驚必青瀉痢色紫當以類而推之一歲後則可用一指轉側辨其三部脈弦急浮沉四五歲後脈七八至而細數者爲平九至者傷十至者困六至五至者爲虛爲寒弦緊者爲風痫弦急爲客忤其變蒸者脈必散亂骨間有熱脈則沉數若浮而不調爲鬼祟浮大而數爲風熱伏結爲物聚微細爲疳積爲腹痛浮而洪爲有蟲浮而遲爲胃寒此論脈之大要耳然小兒血氣未實驚則氣散氣散則脈亂矣又當參以三部五脈三部者乃看面上氣色虎口脈紋寸口一脂脈五脈者上按額前下診太衝并前三部謂之五脈也治法雖分虛實然實者病氣實而形氣虛也虛者形氣病氣俱虛也經云眞氣奪則虛邪氣勝則實又云虛則補其母實則瀉其子東垣先生云形病俱實當瀉之形病俱虛當補之
面部證
左腮爲肝右腮爲肺額上爲心鼻爲脾頦爲腎若色赤者熱也宜隨證治之
註左腮屬肝其色青者爲順白者爲逆若色赤主

肝經風熱發熱拘急青黑主驚風腹痛淡赤主潮熱痰嗽右腮屬肺其色白者爲順赤者爲逆若赤色甚者主咳嗽喘急悶亂飲水傳於腎則小便赤濇或淋閉不通額上屬心其色赤者爲順黑者爲逆若青黑主驚風腹痛癎瘛啼哭微黃主盜汗頭髮乾燥驚疳骨熱鼻屬脾其色黃者爲順青者爲逆若色赤主脾經虛熱飲食少思深黃主小便祕而鼻燥衄血頦屬腎其色黑者爲順黃者爲逆若色赤主腎與膀胱有熱而小便不通

目部證

目內色赤者心實熱導赤散淡紅者心虛熱生犀散青者肝實熱瀉青丸淡青者肝虛熱地黃丸黃者脾實熱瀉黃散微黃者脾虛熱益黃散白而混者肺實熱瀉白散目無睛光者腎虛也地黃丸主之

夫目者五臟之精華各有所主白睛屬肺黑睛屬肝上下眼胞屬脾紅脈屬心瞳人屬腎此五藏之正色也然白睛本屬肺而見紅色此心刼肺之賊邪也見青色此肝乘侮之微邪也見黑色此腎乘肺之實邪也見黃色此脾乘肺之虛邪也餘倣此

死證

瀉不定精神好大渴不止止之又渴吹鼻不嚏病重口乾不睡脣上青黑點頰深赤如塗胭脂鼻孔開張喘急不定面有五色不常不澤

朱肱活人書

論小兒治法

小兒大人治法一般但小分劑藥性差凉耳尋常風壅發熱鼻涕痰嗽煩渴惺惺散主之咽喉不利痰實咳嗽風粘子湯主之頭額身體溫熱大便黃赤腹中有熱四順散連翹飲三黃丸主之頭額身體溫熱大便白而酸臭者胃中有食積雙丸主之小兒無異疾唯飲食過度不能自節心腹脹滿身熱頭痛此雙丸悉治之小兒身體潮熱頭目碎痛心神煩躁小便赤大便祕此熱劇也洗心散調胃承氣湯主之頭疼發熱而畏人惡寒者此傷寒證也升麻湯主之無汗者麻黃黃芩湯有汗者升麻黃芩湯皆要藥也小兒尋常不可過當服凉藥胃冷蟲動其證與驚相類醫人不能辨往往復進驚藥如腦麝之類遂發吐胃虛而成慢驚者多矣小兒須有熱證方可疏轉仍慎用丸子藥利之當以大黃川芎等吮咀作湯液以蕩滌腸熱蓋丸子巴豆乃攻食積耳

許叔微本事方

小兒脈

候兒脈當以大指按三部一息六七至爲平和八九至爲發熱五至爲內寒脈弦爲風癎沉緩爲傷食促急爲虛驚弦急爲氣不和沉細爲冷浮爲風大小不勻爲惡候爲鬼祟浮大數爲風爲熱伏結爲物聚單細爲疳勞凡腹痛多喘嘔而脈洪者爲有蟲沉而遲潮熱者胃寒也溫之則愈訣曰小兒脈緊風癎候沉緩食傷多嘔吐弦急因知氣不和急促急驚神不守冷則沉細風則浮牢實大便應祕久腹痛之候緊而弦脈亂不治安可救變蒸之時脈必亂不治自然無過緩單細疳勞洪有蟲大小不勻爲惡候脈沉而遲有潮熱此必胃寒來內宜瀉利脈大不可醫仔細酌量宜審究

雲岐子云未及五歲不可視聽者未可別脈五歲已上方可以脈別浮沉遲數按錢氏論又不拘五歲上下也

金劉完素六書

小兒論

素問云身熱惡寒戰慄驚惑皆屬熱證爲少陰君火暴強直支痺戾裏急筋縮皆屬風證爲厥陰風木夫小兒六歲之上爲小兒十八歲已上爲少年其六歲以下者諸經不載是以乳下嬰兒有病難治無可定也然小兒與大人不可一例各異治之雖小兒誕生襁褓之後骨肉脆軟腸胃細微可以乳食調和臟腑適得平安肌膚滋潤筋骨輕嫩以綿衣之故生壅滯內有積熱乘於心心受邪熱乃發爲驚驚不止返爲潮搐大槩小兒病者純陽熱多冷少也

元朱震亨平治會萃

小兒病

小兒食積痰熱傷乳爲病大槩肝與脾病多小兒肝病多肝只是有餘腎只是不足

幼科全書

觀形察色

額上屬心火左頰屬肝木右頰屬肺金鼻準屬脾土下頦屬腎水

色紫者熱盛色紅者熱主外感色青者多驚色白者主蟲色青黑者腹痛色白者主疳色黃者脾虛色黃白而腎青者寒疾色黃者食積面紫黑者中惡面青白者主肝惡面黃色黑者主濕熱

凡觀小兒形色青筋脾熱生風兩腮紅赤熱相攻黃色脾虛取用黑氣腹疼中惡白爲府瘦生蟲如逢兩眼黑重重此是南柯一夢

要識小兒證候但將外貌推求黃浮肌削痞瘕留脣撮面青痛楚吐舌脣焦內熱目昏好睡脾枯手掀足掣是驚由府疾青筋大肚

眼角脇生肝熱口邊涎出脾寒頭毛稀豎血將乾泡腫脾家濕顯鼻孔黑焦肺熱耳輪枯燥腎傳胃高氣促肺炎炙熱懣顱門腫陷

小兒精神忽減面皮黃白無常必然乳食內成傷生冷油膩阻當或至腸鳴泄利或爲瘧疾相當忽然膨脹漸贏疳癥積蟲府四樣

小兒面皮紅色兩腮恰似塗硃風寒外感事何如潮熱無時來去或作驚風證治或爲斑毒驅除口乾啼哭淚如珠睡困昏昏不乳

小兒病形各樣慢憑眼力猜詳懷中猥縮怯風凉合面睡時熱瘧夜啼熱煩腹痛目直驚搐須防長吁短氣熱中藏痰喘上冲火旺

要辨小兒死證顱門下陷成坑喉中拽鋸氣和痰目閉無神拘管口脣牙齦粉白手足恰似冰寒鴉聲口緊眼常翻不乳遺尿鬨亂

辨脈

小兒一歲以上可以看脈以六至爲平和七八至爲數爲實熱一二三四至者爲遲爲虛弱

小兒尋常脈候一息六至平和七至八至熱生多三四虛寒病作九十連來雀啄一二動指成疴微寒緊數不差訛補瀉分明用藥

身熱脈浮可汗身寒脈細休攻喘咳緊數藥無功腫脹細微堪痛泄瀉沉遲勿愈痘疹洪數宜從若還吐衄怕浮洪腹痛沉微拈弄

論治法

如足脛熱兩腮紅煩渴不止頭面好露揚手擲足大便閉小便黃身壯熱不退凡此皆宜凉解不可服熱藥補藥也

小兒不宜熱藥兩腮渾似桃紅手足壯熱火烘烘六脈浮洪亂動小便赤黃又澀大便祕結難通掀衣飲水喜當風煩渴鼻流血湧

如足脛冷面晃白口中氣冷熱進退不定身常寢人眼珠青吐瀉不止肚腹作痛凡此皆宜溫補不可用凉藥利藥也

小兒不宜凉藥面容晃白無精四肢厥冷似寒冰六脈微沉隱隱食乳不消嘔吐糞如鴨屎頻頻神虛腹痛目睛青病久成疳諸證

凡小兒一歲以下有病者多是胎毒並宜解毒爲急二歲以上有病者多是食積並宜消積補脾餘法散見各條此不述

若帶風寒外感惺惺散子堪行內傷乳食不安寧和中消導兼進咳嗽參蘇可飲吐瀉理中最靈驚手搐掣却關心導赤瀉青勿混

論胎氣有餘不足以知壽夭

凡小兒生下有身破裂者必死哭如鴉聲者必死陰囊白者必死陰不起者必死腹間無肉者必死哭如鴉聲者必死週歲之時頭顱骨開解齒髮未生手足攣縮膝如鶴節身體瘦弱長大不能行立者此皆胎氣不足也多夭若

筋實則多力骨實則早行血實則形瘦多髮肉實則多病精實則伶俐多笑語不怕寒暑氣實則少髮而體肥此皆胎氣之有餘多壽

審手冷熱

五指梢頭冷驚來不可當若逢中指熱必定是傷寒中指獨自冷痲痘證相傳男左女右手分明仔細看

法古辨小兒三關手筋脈

夫嬰兒生下一月至三歲若有疾患須看虎口脈文指表節爲命關次氣關次風關古人所謂初得風關病猶可傳入氣關定難治是也

辨手經脈形色

男看左手食指女看右手食指第一節風關易治第二節氣關病深第三節命關死候

三關青四足驚三關黑水鬼三關紫白人捧抱驚紅是破大嚇有此通度三候脈是極重之候必死餘病可治

風關青如魚刺易治是初驚候黑色難治氣關青如魚刺主府勞身熱易治用保命丹加柴胡黃芩命關青如魚刺主虛風邪傳脾難治用紫金錠加白朮茯苓

風關青黑如懸針主水驚氣關有此主府兼肺臟積熱用保命丹加燈心竹葉命關有此五色皆是死證不治

風關如水字主膈上有痰幷虛積停滯治法宜下在氣關主驚入肺咳嗽面赤用保命丹在命關主驚風府證夾極驚候用蘆薈丸若通過三關則不治

風關如乙字主肝臟驚風易治在氣關主急驚風在

命關青黑色主慢脾風難治

風關如曲蟲主疳病積聚胸前如橫排算子肚皮似吹起猪胞在氣關主大腸積穢在命關主心臟傳肝難治

風關如環主肝臟疳熱有積聚在氣關主疳入胃吐逆不治在命關其疳難治

若有亂紋止在風氣二關尚猶可治若在命關通度則難治矣

若有疹子或青或黑或在手或在脚或在面上或在左右臉皆死

有脈紋曲向裏者是氣疳犯此證者肚若緊脹宜利之

有脈紋曲向外者是風疳犯此證者宜用急驚方治之

有脈紋斜向右者是傷寒身熱不食無汗治法宜惺惺散

有脈紋斜向左者是傷風身熱不食有汗

有雙勾脈者是傷寒

有三曲如長蟲者是傷硬物

有脈兩曲如勾者是傷冷物

有脈一頭如環又有獨脚者亦傷冷

若面上有點子四五相連必是再發之證

頭面皮上或肚腹上有又字上二下一疊紋脈兼有青筋是食毒物及驚積難治

又有脈如亂蟲是嘗疳亦有蟲疳蚘疳食積之疳治之必愈凡脈不足細者並是風氣但消疳後取蟲肥兒爲效

辨手筋色歌

此看小兒生一月至三歲止

紫風紅傷寒青驚白色疳黑時因中惡黃積困脾端虎口亂紋多須知氣不和色青驚積聚霍亂瀉如何青黑慢驚發入掌內弔多三關忽通度此病必沉疴

驗病歌

鼻冷定知是疼痛（一云是瘧疹）耳冷因傷風熱證牽衣肚熱是傷寒上熱下冷傷食病

形證歌

搖頭揉目肝熱生風眵淚憎明三焦積熱鼻流清涕肺受其寒頰赤面黃風傷肺熱霍亂吐逆胃積氣傷瀉積不常氣攻腸滑面青呵欠驚風傳肝盜汗頻頻臟腑虛熱傷寒驚搐風盛發强胃熱生斑氣傷冷厥長吁齧齒風盛氣生上竄搖頭胸高胃結肺壅氣傷咳嗽咯血涎盛發哮積傷風熱小便痳赤熱聚膀胱疝氣因啼胎中積結嬭脾癖痞因物所傷喉閉丹瘡肺之受熱愛吃泥土脾臟生疳吐逆痰涎蚘蟲上出脫肛瀉血冷熱積傷消渴口瘡心家受熱面黃浮腫積氣所攻鶴膝解顱因物腑熱行遲語澀胎積氣傷項硬肝風氣傷木舌醫經要略病源更別

聽聲知病

聲悲是肝病聲笑是心病聲慢是脾病聲呼是肺病聲沉是腎病聲清是膽病聲短是小腸病聲速是胃病聲長是大腸病聲微是膀胱病聲悲慢是肝脾相尅病聲速微細是胃與膀胱相尅病聲細斷是實聲輕是虛聲沉粗是風聲短細是氣聲粗是熱聲短遲是瀉聲細長是痢聲實是閉澀

辨生死

小兒中風熱喘鳴肩息脈緩則生急則死

小兒痢疾脈浮大而腹痛者必死

乳子病熱脈懸小手足溫則生寒則死

小兒病困汗出如珠著身不流者死

小兒有病胷陷口脣乾目直睞口中氣冷頭低臥不舉身手足垂懊身體强直掌心冷皆不可治脈亂者仝

眼翻上者曰天弔宜湧泉焠燈火不知人事宜艾灸指甲紅者可治沉重用通關散吹入鼻中用奪命丹治之入鼻不醒者則勿醫遍身紅者肺經之疾脾經有熱不須服藥

小兒面手黑疹掌腫無紋坎宮有黑人中平滿溏垢糟粕頭倒天柱者必死

凡看小兒若吮乳緊者易治吮乳寬者難治

總歌

小兒醫家別有科一時要用不知何驚風發熱幷痰嗽保命丹吞不可蹉急慢二驚紫金錠未出斑疹神異磨吐瀉肚疼宜助胃脣口生瘡化毒和潮熱抱龍惺惺散嘔吐燒針丸用多諸疳蘆薈皆通用免教尋問苦搜羅

危亦林得效方

論小兒

爲醫之道大方脈爲難治幼科尤難以其臟腑脆嫩皮骨軟弱血氣未盛經絡如絲脈息如毫易虛易實易冷易熱兼之口不能言手不能指疾痛之莫知非觀形察色聽聲切脈究其病源詳其陰陽表裏虛實

而能療之者蓋亦寡矣

虎口脈

第一節赤紋乃飛禽內外人驚赤紋緩乃火驚黑紋木驚青紋乃天雷四足驚內隱青紋微屈則是急風候第二節紫色紋乃驚疳青色紋乃疳傳肝白色紋乃疳傳肺黃色紋乃疳傳脾黑色紋難治第三節青黑紋三關通度斜歸指甲則不治

明方賢奇效良方

看小兒三脈五脈法

水鑑先生曰小兒雖受陰陽二氣成其形氣尚未周何言有脈直至變蒸候盡陰陽氣足方可看脈其髫齔之年方生陰陽古云男子七歲曰髫生其原陽之氣女子八歲曰齔其陰陽方成故未滿髫齔之年呼爲純陽若髫齔滿後呼爲童兒始可看脈小兒初生至半歲之間有病速看額前眉上髮際下以無名指中指食指輕手滿按之若三指俱熱感寒鼻塞氣粗三指俱冷上吐下瀉若食指熱胃堂不寬無名指熱乳食不和以致病也半歲已上方可看虎口過歲已上看虎口兼一指脈若五百六十四日變蒸滿足只看一指脈以食指按之上下衰轉分取三部凡言三部非寸關尺也小兒三部面看其色爲一部虎口脈紋爲二部一指脈爲三部五脈者上按額前下按太衝井前三部共爲五脈小兒有疾病無惡候不必常診太衝之脈此脈定生死之要會如七八歲脈一息六至爲常人之脈一息八至爲熱九至風五至虛四至損三至脫二至死十至必是病勞虛損形容瘦劣若或體肥而色青白一息十一二至謂之虛是風病死是爲脈亂若一息一二至爲脈不來其人當厥冷而死遲若一息十一二至者爲脈速死不滿三月何謂一息一呼一吸爲一息呼吸者卽是出一氣入一氣謂之一息其脈若指下來硬隱指急大者是有積若小微細卽是冷若輕虛緊卽是熱時復一大卽是人驚若大小不勻卽是惡候也所論浮數爲熱伏結爲寒沉細爲冷大小不勻爲惡候數者緊也浮者輕也伏者貼也重手方見結者亂也沉者重沒沉細者微也大小不勻卽是或大或小而不勻是謂氣不生其人必死也且如前人備述三脈五脈之法書之於左後學將此不可視以細事人命所繫務要誠心診察兢兢業業庶幾則可設有所悞禍之不輕醫爲人之司命可不謹乎

辨三部脈證

上黑須知腎臟傳中關黑候又纏綿人驚此患兩相雜目多直視定痰涎下黑須知是再驚但宣風積便和平上下是同因打撲熱來閉悶沒心情上青肝臟有風停目直便青面更青中是人驚并四足渴來發躁不惺惺下青原是再驚根解熱宣腸是何論上下俱青候是惡十個之中得一存上赤風多入肺停或來發熱嗽聲頻中是風來入心臟腸痛頻頻下瀉青下赤重驚見本宗但調心臟有神功上下一同難治療口開目下是知凶上青肝臟本因留目閉身疼四體柔中是水瀉并再撲熱來喘嗽不知休下青因是再驚來妙藥宣風定少災上下若青俱發熱四肢逆冷奄奄臺上黑之時目上瞪大便流糞又兼青中見之時狀消渴下熱尿黃便安寧下黑若見赤相隨氣多下瀉候如斯上下俱同須看手虛煩躁渴速求醫

看三關脈五色

上關見赤脈是心之疾也轉瀉惡虛而生風痰俱下鎮心丸驚風散

中關若赤便多風熱只下解風腸藥

下關若赤發熱大腸閉結惡候

上關見黑脈是腎臟之脈爲順若是大腸閉澀生風之候也下硃砂膏

中關黑脈生風之候不爲惡候下中黃膏

下關黑見無惡候起下宣轉丸卽痰若自瀉是腸冷只下溫煖臟腑湯藥不得轉換

上關若見青脈四肢逆嘔吐加喘者惡候吐喘定生候

中關青脈風搏觸心急與治風卽癒下烏犀硃砂等膏

下關青脈若見無候卽不宣轉癒

上中俱同四肢熱爲和四肢逆凶候也

上關黑并眼下黑暈生未滿二歲得此脈與候者及大腸流或身體壯熱全者須渴若不發熱或無渴與解之癒先下天竺黃散後下硃砂膏

黑脈錯亂者腹脹是候或下痛卽是積候下宣風丸散次下勻氣散和胃氣

赤脈錯亂者是打撲急下鎮心丸及大驚丸散

脈透中關立變風候忌下宣轉藥傷虛動脾臟生逆叶者凶候用勻氣散補虛

如第一日便見赤脈三關都見是五臟之應患若第二日中關部隱隱或不見只中關見者多氣候

若三關都見或隱隱或面浮者是精氣候常隱隱者不交出沒數旬而死

如左手上部赤脈曲歸裏者是傷積下保童丸曲歸外者客風觸之卽發搐也下鎮心丸散

中關若歸裏者是客風傳變下調中散解之曲外者凶候

曲候過命關幷外有惡候起者凶候

上關赤脈亂者傷冷之患下勻氣散

中部脈亂風者傷熱傳風盛之疾下烏犀膏用宣利藥而解之

下關若亂急須下溫脾臟若下進食凶候

兩雙指關若見青與赤相雜如紫色無黑者惡候

上關脈見傷寒必發咳嗽須解表微微

浮入中關是風候下清金膏

下關若見頻退爲吉不退爲凶候若孩童從氣關傳至命關方可調治

已上祕訣爲神聖之醫也此前人消息後之學者宜細推之

孫華二眞人曰凡小兒左手見右手脈逆惡也右手見左手脈爲逆惡候也此陰陽定之而決生死何況虎口脈乎五歲已上至十歲已下自斷乳而進食陰陽備矣故可善一指而定三關分寸關尺象天地之九候也

正定三十一般死候

凡小兒病弱聲放黑糞瀉青膿手摳衣縫目多直視語喃喃見人虛笑覆面向地啼哭無淚目無精光四肢就頸足臥藥到口不納四肢臥地變爛汗出如珠

摳眉咬指甲引身長吁出氣愛喫冷水脚曲如鉤反張不已言語聲震魚口吐舌出脣黑久患脣紅下氣無定久患愛喫泥土眼醺脾瀉變痢成赤紅更有無辜之疾候是也

小兒生下二月已前中病不治證

風噤　糊猱噤　臍風　撮口　咳嗽　伏聲

木舌　重齦　解顱　項强　胷高

虎口脈色

脈色純紅者爲初得病爲陽爲熱爲病在外

脈色紅而紫者爲病傳變爲內外尚有熱或但熱爲陽

脈色紅或紫而青爲病在苒爲病一寒一熱外爲之變作

脈色純青者爲病久而過經爲冷爲熱在內爲陰

脈色青而黃爲病變極爲冷冷極則變熱治則貴力爲虛寒則爲五臟之邪相干陰陽之證相反

脈色青而黑爲病極或爲久病再作形色黧黑

脈色黑而黃黃而露出者十無一生大凶

面部

面上赤紅乃心氣絕蓋火屬心主炎上故知心絕則死主咬牙弄舌虛舌出滿口生瘡木舌鵝口喉閉舌上白胎舌下重舌咽喉腫爛痰涎上壅魚口此爲危急惡候

左太陽井日角紅脈現變蒸候主煩躁啼叫頭肚上溫溫壯熱一二日而退

太陰上紅脈現傷寒之候主壯熱鼻塞

文臺上紅脈現傷寒三日候主內熱頭疼

太陽脈紅至太陰內外有熱又連文臺熱極不解至武臺漸生變證

顴門紅脈受熱受驚之候主不時驚跳時多吹唧夜啼難睡

額上紅脈至眉心驚風發熱之候引入印堂驚痰搐搦有熱主小便澀少

印堂紅脈現心經積熱眉心連印堂紅脈或紅影心肝上焦熱蘊痰涎上壅貫上焦夜啼將生驚候近眉頭左下有凸伏驚時睡中驚跳

顴門紅脈腫凸此風熱痰生驚正緣熱氣上衝攻急心胃有熱痰不止漸成驚風之候以凉劑去痰解熱卽安如顴門上紅脈引入印堂此驚候搐動多日了

左眉頭紅變蒸熱未退肝肺有熱之候當以清肺疏風熱正胃氣之劑

風池紅有風熱在上中焦瞬息將有搐動之候宜截風化痰

氣池紅傷風久傳變在臟三焦有熱之候可頻解利

眉心印堂紅有熱驚痰飲食不吐則成驚搐

印堂至山根紅脈是心與小腸熱候小便赤澀而少

山根下至鼻柱紅心門熱候小便大便皆赤澀

印堂連至上準紅三焦有積熱可以清凉之劑過之

準上紅黃色此平穩無恙

頤門紅脈外腎因風溫候生熱爲釣

臉堂紅內有煩躁而熱

右太陽井日角紅脈因喫乳母傷風壅痺汁成乳癖停滯生風熱痰等證

右太陰紅脈喫乳母熱病痰壅恐生痰候引入

武皇紅脈漸成吐瀉生驚之候
風池紅母不忌椒薑麪或猪羊骨汁毒乳生風
氣池紅母有熱痰乳兒雖至十歲病亦須發見此熱痰乳入兒五臟令兒眼目生昏傳變他病
顖門紅腎中氣病緣母能飲或好異物及食雞鵝鴨子生魚韭蒜將來傳變異疾

七表

浮乳滑實弦緊洪

浮主中風乳失血滑吐實下分明別弦爲拘急緊爲風洪脈由來偏主熱

八裏

微沉緩濇遲伏濡弱

遲寒緩結微爲痞濇脈敗血濡氣滯伏患癖痛沉積冷弱因患後虛浮是

九道

長短虛促結代牢動細

脉長陽毒在三焦短脉胃中食不消虛主多驚人恍惚促時加峻命難逃結爲氣痞代氣瘦牢者骨蒸似火燒動則血崩精不固細還疲歷主枯標

視嬰孩大要

一視兩眼精神二視聲音響大三前後頂顖四形貌五毛髮

一兩目爲五臟精華所聚一身之神氣所鍾若精珠黑光滿輪精神明快主兒有壽一生少病雖有病亦易愈若眼白多睛昏懶睛珠或黃或小此是稟受怯弱兒多患也

二聲音大而響亮五臟之氣壯令兒易得長成孩兒自生來不曾大啼哭乃聲音不出此乃一臟或二臟之陰竅不通神氣怯或叫聲如啾唧唧啞之狀此兒不壽而難養必矣

三顖門乃母氣血充實令兒顖門堅實而耐養如母多病氣血怯弱令兒顖門虛軟而不實又後頂顖乃父之精元氣充實令兒後頂上堅硬而耐養如父之元氣不足骯酒多慾令兒後頂虛孔不堅亦不壽如父母俱怯生下兒女俱不壽若如此其父母不能保於天年前顖又曰信門道家爲泥丸後信名腦後頂門頭中心頂上又名百會穴華陀看面部訣載甚詳顖與信同音凡前後信及百會開而虛名解顖

四形貌口大鼻端眉聳目秀此嬰孩易長福氣堅厚如口小鼻喎眉心凹皺令兒怪異不貧則夭亦是乖離此等難剖決

五毛髮乃血之餘母之血氣充實則髮黑而光潤如母之血虛帶漏敗墮月事不調或骯酒多淫或母胎有患令兒髮黃焦稿生疳熱瘡瘊之患

凡視小兒神氣色脈無出於此五者不能全見但得兩目精神聲音響亮此可保其六七此乃漢東王氏之心法口授之祕訣也

萬氏祕傳片玉心書

活幼指南賦

小兒方術號曰啞科口不能言脈無可施惟形色以爲憑竭心思而施治故善養子者似豢龍以調護不善養子者如牴犢而愛惜愛之愈勤害之愈急乍頭溫而足冷忽多啼而不乳差之毫釐失之千里此小兒方術專門以補化工之不及

腸胃脆薄兮飲食易傷筋骨柔弱兮風寒易襲父母可知看承太弛重綿厚襖反助陽以耗陰流欲放飯徒敗脾而塡胃鬧異聲見異物失於隄防深其居簡其出過於周密未期而行立兮喜其長成無事而嘻笑兮謂之聰慧一旦病生雙親心戚不信醫而信巫罔求藥而求鬼乃人事之弗修謂天命之如此

欲觀氣色先分部位左頰兮青龍屬肝右頰兮白虎屬肺天庭高而離陽心火地角低而坎陰腎水鼻在面中脾上通氣觀乎色之所現知乎病之所起又兒脾應乎唇肺通乎鼻舌乃心苗目爲肝液胃流注於雙顴腎開竅於兩耳爪則筋餘而脾爲之運髮則血餘而腎爲之主脾司乎足腎連牙齒荀本臟之或衰即所屬之先憑能辨形色兮似梃擅鐘若昧脈兆兮如石投水

凡觀乎外可知其內紅色現而熱蒸青色露而驚搐如煤之黑兮中惡之因似橘之黃兮脾虛之謂白乃疳勞紫爲熱急青逆口角扁鵲難醫黑掩太陽盧醫莫治年壽赤光兮多生膿血山根青色兮顖見災危能察色以知由豈按圖而索驥

朱雀貫於雙瞳兮火入水鄉青龍繞於四白兮肝乘肺位泄痢而帶陽者須防咳嗽而拖藍者可畏腹痛方殷常面青而唇攝驚風欲發先頰赤而目瞪火光燄燄兮外感風寒金氣浮浮兮中藏癖積乍黃乍白得理鴉聲魚口枉費心機肉折皮乾空勞氣力

氣色改移形容變易氣乏則顖門成坑血衰則頭毛作穗眼生眵淚兮肝風灑目口流涎沫兮脾冷滯頤

面目虛浮定膨脹而氣喘眉毛顰蹙則肚痛以多啼蚘蛔兮脾胃漸敗蠱瘡兮肛臟先虧苟瞑眩而弗瘳縱神仙亦何益

手如數物兮驚風將發面若塗硃兮心火已熾坐臥愛冷兮煩熱之攻伸縮就煖兮風寒之畏肚大脚小脾欲困而成疳眼撐口張勢已危而必斃弄舌脾熱解顱腎憊重舌木舌蓋熱積於心脾哽氣喘氣實火浮於肝肺齦宣息露必是牙疳哺露丁奚多緣食積脣乾作渴腸鳴自利夜啼分爲四證變蒸周於一歲心熱欲言而不能脾虛無時而好睡病後失聲者腎怯咳嗽失聲者肺痿肚痛而青水流出者蟲腹痛而大便酸臭者積口頻撮而脾虛舌長伸而火熾龜胷是肺火脹於胷膈龜背乃腎風入於骨髓鼻乾黑燥兮火盛金衰肚大筋青兮木强土潰

丹瘤瘡疥皆胎毒之流連吐泄瘧痢乃積食之沾滯不能吮乳者熱在心脾嘗欲俯臥者火蒸腸胃喜視燈火煩熱在心愛喫泥土疳熱在脾腹痛寒侵口瘡熱積臍風忌於一臘火丹畏於周歲驚自熱來癇因痰致吐泄而精神耗者則危瘧痢而飲食減者必瘁驚本心生風由肝致搐分左右兮證有順逆藥分補泄兮病有虛實急驚由於積熱之深凉泄偏宜慢驚得於大病之後溫補爲貴頭搖目竄而氣喘兮上工莫醫口禁鼻張而足冷兮神丹何濟閉目者無魂狂叫者多祟不知吞吐者必見閻羅反加悶亂者終歸蒿里既明證候次知調理

胎毒用甘草黃連食積用白术枳實急驚搐掣以導赤瀉青慢驚瘈瘲以補中益氣集聖去疳備急治積抱龍丸化痰鎮驚胃苓丸補腎開胃夜啼須退熱清心晡熱必養血升提理中止泄香連止痢積熱不除凉驚丸大有神功沉寒難療養脾丸最爲祕密痰火內攻兮三黃爲丸木穀不化兮金丹一粒柴苓治瘧月蟬消痞潮熱金花咳嗽玉液瘡疥者胡麻丹瘤者凉膈吐泄而渴者白术可投煩熱而渴者益元爲最斑疹兮消毒腹痛兮脾積衄血咳血者茅煎重舌木舌者針刺口瘡不愈者洗心腹脹不食者平胃五拗治喘四苓利水退黃消腫胃苓加減以堪行破積安蟲集聖從容而可治大抵嬰兒易爲虛實調理最取其平補泄無過其劑尤忌巴牛勿多金石辛熱走氣以耗陰苦寒敗陽而損胃如逢食積解之不可或遲若遇虛羸補之尤爲至急纔少俄延便成勞敝

慈幼儆心賦

醫門治例幼科最難腸胃脆而多傷乳食筋骨嫩而易感風寒易虛易實兮變如反掌或補或泄兮貴若轉丸醎多泄腎酸甚扶肝苦入心而寒凉損胃辛走肺而燥熱傷元欲求中正無過平甘或病須於瞑眩兮勿犯其毒且治從於權宜兮但取其能中病卽已救本爲先苟悞投於湯藥卽便致於殞殘此上工誓於活人而良醫驗於折肱

嘗聞法無一定但占證候醫不三世勿服湯丸病者詳於擇術醫者務於救痊視疾若己見利勿貪先察運氣兮陰陽妙契次觀形色兮順逆了然春夏陽而苦寒可用在夫人之身健秋冬陰而辛溫可參相其人之勞疳既溫反補已寒再宣七神離散五臟虧崩雖留心於方脈兮何補於世反致人於傷殀兮獲罪於天是故胎疾兮急於解毒食積兮利在消疳治分二法效可十全襁褓未寧但調其母匍匐不快當固其元悲夫腸胃中和豈堪藥石微乎氣血稚弱以漸發生治非得已病有卒然如護風燭心常凜凜若惜掌珠意惟拳拳醫可補乎司命應無忝於家傳

且如病則熱起熱則驚生或治熱以熱或攻熱以寒熱在表而柴葛解肌可飲熱在裏而芩連消毒急煎積熱無如集聖虛熱妙以調元要在識夫脈色不可妄投湯丸胎終身之痼疾促嬰兒之壽年輕以變重功不補患徒委命於氣數不詳審乎簡編前車既覆後轍猶然魂魄遊於郊野哭聲達於淵泉職此之故是誰之愆嗟夫渡蟻駕橋放雀解樊況伊萬物之靈匪值一蟲之賤不知謹密遽爾輕泛推惻隱之良心如見入井考聖賢之遺訓如弗及泉居易慮險因蹶知平證隨百出治無一偏變調造化保養眞元善攻不如善守宜急不若宜緩種杏成林踵當年之董奉植橘名井見今日之蘇耽奈何泄久變痢積久成疳瘧久成痞驚久成癇未至留連兮攻之宜速已見沉疴兮治之且緩腸胃祕塞兮急泄而已氣血虛羸兮急補而安外毒急攻毋令入腹表邪急解毋令再傳餘則緩而調理嘗恐急而生變若藥下咽猶防其過治或中病勿張其能知者常慮一失死者不可復全與其悔於已悞孰若謹於未然欲求魚兔當守筌蹄苟多方而治病宜三復乎斯言

小兒總治

面赤發熱服凉驚黃白發熱用胃苓身熱便祕三黃下瘦弱發熱集聖靈變蒸發熱用拏法驚風導赤吞

瀉青泄瀉胃苓用一粒熱泄玉露散同行寒泄理中丸可服泄渴白术散生津痢疾保和同香連癉疾養脾癉自平咳嗽玉液降痰氣浮腫胃苓引燈心瘡疥胡麻丸最好養脾最是保孩嬰蛔蟲寸白用集聖臨時用藥細叮嚀

看虎口紋

今人專看虎口紋風關氣關命關分風關病輕氣關重命關若過死將臨青驚紅熱黑勢惡直輕斜曲重看云

脈法

小兒一指分三位息數須將六至看七至八至數爲熱三至四至遲虛寒堅實平和無病斷細小沉遲有病看

雜證

小兒喫泥土脾熱用瀉黃集聖相間服疳成不可當小兒合面睡原來熱在心只因導赤散瀉心與凉驚小兒多白尿落地如米泔胃苓鹽湯送數服解憂煎小兒大便青邪熱在肝經只用瀉青丸此法效如神小兒養雀黃邪熱在脾鄉誰知瀉黃散端的是奇方

水鏡訣

夫陰陽運合男女成形已分九竅四肢乃生五臟六腑部位各分順逆難明若憑寸口之浮沉必乃橫亡於孩子須明虎口辨別三關參詳用藥始無差悞未至三歲止看虎口男左女右從第二指第一節名風關若脈見初交病第二節爲氣關脈見則難治第三節爲命關脈見則死又當爲辨其色若三關青四足驚三關赤水驚三關黑人驚紫色泄痢黃色雷驚三關脈通度是急驚之證必死餘病可治或青或紅有紋如線一直者是乳食傷脾及發熱驚左右一樣者是驚與積齊發有三條或散是肺生風痰或作痫船聲色青是傷寒及嗽如紅火是瀉有黑相兼主下痢青多白痢紅多赤痢有紫相兼加渴不虛虎口脈紋亂乃胃氣不和也蓋脈紋見有色者曰黃紅紫青由其病甚色能加變如黃紅之色紅盛作紫紅紫之色紫盛作青紫青之色青盛作黑青黑之色至於純黑之色者不可治矣又當辨長珠形主夾積傷滯肚腹疼痛寒熱飲食不化來蛇形主中腕不和積氣攻刺臟腑不寧乾嘔去蛇形主脾虛冷積泄瀉神困多睡弓反裏形主感寒熱邪氣頭目昏重心神驚悸倦怠四肢梢冷小便赤色弓反外形主痰熱心神恍惚作熱夾驚夾食風癇證候鈴形主邪熱痰盛生風發搐驚風魚骨形主驚痰熱水字形主驚積熱煩躁心神迷悶夜啼痰盛口噤搐搦針形主心肺受熱熱極生風驚悸煩悶神困不食痰盛搐搦透關射指主驚風痰熱四證皆聚在胃瞬不散透關射甲主驚風惡候受驚傳入經絡風熱發生十死一生難治此十三位形脈悉有輕重察其病根則詳其證

湯氏虎口紋訣

小兒初生至五歲血氣未定呼吸至數太過必辨虎口脈色方可察病之的實男驗左手女驗右手蓋取左手屬陽男以陽爲主右手屬陰女以陰爲主然男女一身均具此陰陽左右兩手亦當參驗左手之紋病應心肝右手之紋病應肺脾知此消息又得變通之意驚風初得紋出虎口或在初關多是紅色傳至中關色赤而紫病又傳過其色紫青病勢深重其色青黑而脈紋亂者病深重若見純黑危惡不治大抵紅者風熱輕赤者風熱甚紫者驚熱青者驚積青赤相半驚積風熱俱有主急驚風青而淡紫伸縮來去主慢驚風或紫糸青糸黑糸隱隱相雜似出不出主慢脾風脈紋從寅關起不至卯關者病易治若連卯關者有病難治如寅關連卯侵過辰關者十難救二若脈紋小或短者看病不妨如紋勢彎曲入裏者病雖重而證順猶可用力紋勢弓反出外暖暖靠於指甲者斷不可回其有三關紋如流珠碎米三五點相連或形於面或形於身危惡尤甚

辨虎口指脈紋

黃色無形者卽安樂脈也紅若無形亦安寧脈也有前數樣形者卽病之脈次第而變初作一點漸於氣關多脈紋至命關其病危急純黑分明不可療治左有紅紋似線形定知發熱又兼驚右有雙紋如左狀脾傷驚積一齊生紋頭有似三叉樣肺氣生痰夜作聲青赤應是傷寒證只是空紅泄定生

指上辨青紋認是四足驚虎口脈青色是猪犬馬驚黑色因水撲赤色大人驚紫色多成瀉黃色是雷驚曲反風還盛彎弓食上蒸但看叉手處方可辨其形凡小兒三歲以上有病深重危急者指甲口鼻多作黑色蓋兒脈絕神困證候惡極雖有良醫斷斷乎不可保矣

總治

小兒純陽之體陰陽不可偏傷常帶三分餒與凉此個孩兒易養大抵脾常不足有餘肝氣須防不寒不

熱藥爲良切忌妄行猛浪

小兒何爲難治古今號曰啞科脈無可視如之何口不能言病作父母時時驚怕醫人試驗誠多從容對證詳用藥有甚難爲捉摸

額印堂山根論歌

額紅火熱燥青色有肝風印堂青驚見由於火則紅忽然生黑氣客忤崇爲衝山根青隱隱遺驚必兩重若還斯處赤煩躁定相攻

年壽論歌

年上微黃爲正色若平更陷天難禁忽有黑色痢疾候霍亂吐瀉黃色深

承漿兩眉論歌

承漿青色食時驚黃多吐逆痢紅形煩躁夜啼青色吉久病眉紅死證眞

風池氣池兩頤論歌

風氣二池黃吐逆煩躁啼哭色鮮紅更有兩頤胎樣赤肺家客熱此非空

兩目論歌

白睛青色有肝風若是黃時有積攻或見黑睛黃色現傷寒病重此其宗

鼻準論歌

鼻準微黃赤白平深黃燥黑死難生人中短縮吐因痢脣反黑候蛔必傾

正口論歌

正口常紅號曰平燥乾脾熱積黃生白主失血黑遶口青黑驚風盡死形

兩太陽論歌

太陽青色驚方始紅色赤淋萌藥起要知死證是如何青色從蒸生入耳

兩腮論歌

兩腮黃爲痰實因青色客忤紅風熱傷寒赤色紅主淋二色請詳分兩頰

兩頤金匱風門論歌

吐蟲青色滯頤黃一色頤間兩自詳風門黑痢青驚水紋青金匱主驚狂

部位歌

中庭與天庭司空及印堂額角方廣處有病定存亡青黑驚風惡體和滑澤光不可陷兼損脣黑最難當青甚須憂急昏黯亦堪傷此是命門地醫師妙較量

觀形察色

凡看小兒疾病先觀形色而切脈次之蓋面部氣總見而五位青色者驚積不散欲發風候五位紅色者疾積壅盛驚悸不寧五位黃色者食積癥傷疳候瘧癖五位白色者肺氣不實滑泄吐痢五位黑色者臟腑欲絕爲疾危惡面青眼青肝之病面赤心之病面白肺之病面黃脾之病面黑腎之病先別其五臟各有所主次者禀受盛虧胎氣虛實陰陽二證補過泄多當救其失兼五臟六腑表裏各有相應若能辨其標本則神聖工巧矣

萬氏育嬰家祕

發微賦

醫道至博幼科最難如草之芽兮貴於調養似蠶之苗兮慎於保全血氣未充兮脈無可診神識未開兮口不能言誠求於心詳察乎面苟得其要也握造化於妙手未達其旨也摘章句於殘編

調護若失疾病乃生頭要涼而背要暖食勿飽而衣勿綿腸胃脆薄兮乳哺傷而成積精神怯弱兮聞見異而成癎嗟哉慈母兮過於姑息笑彼粗工兮誤於湯丸伐其發生之氣夭其童穉之年徒啼號於丘壟休禱祀於旗壇

證候要識天壽須知不在手指之側但憑面部之間心火上而天庭可察腎水下而地角宜觀右頰金而屬肺左頰木而屬肝脾土之位鼻準之間青驚赤熱黃積白疳如煤之黑兮必中乎惡毒似赭之紫兮斯感乎風寒

胎稟虛損兮則髮稀而頭軟賦質充實兮自肉厚而骨堅性靜兮少笑神困兮多眠肺熱兮濁涕結於鼻內脾冷兮清涎滯於頤間兩目連劄兮肝風之鼓變瞳直視兮心火之炎氣不足而顛陷突起則爲熱也血有餘而脸鮮萎黃則爲虛焉

行坐遲者腎弱啼哭多者心煩脾熱者弄舌肝强者握拳髮豎作穩兮疳疹漸起顱解欲破兮短折可占皮聚肉脫兮元氣損而欲逝鼻昂脣縮兮穀氣絕而難全赤蚓入眼兮不必問夫蘆扁青蛇遶口兮何須問乎神丹

五臟各證一言可參肝主風而叫哭煩悶心主熱而驚悸呵欠肺主氣而喘嗽善噫脾主困而吐泄喜眠惟腎本虛爲命所關肝常有餘兮實則生風脾常不足兮虛則成疳本乘於土兮泄痢久而發搐者不治火刑於金兮咳嗽久而成痢者必殘

一月之中臍風最險百晬之內痰嗽尤難證莫危於

中惡勢莫急於流丹變蒸盡於週歲必計日以爲準驚搐發於期月難引日以求安有所苦者呻吟失所欲者啞煎盡常叫喊兮肝臟之熱夜多啼哭兮脾臟之寒

出胎而疾者胎毒之發能食而疾者食積之干胎毒之變也爲黃爲癉爲瘡毒食積之變也爲癰爲痛爲痞滿吐瀉有寒有熱有食咳嗽有虛有實有痰痢因積得瘧以痞延賑乃脾胃之虛腫則風濕之感疳本肝來淋以膀胱之熱疳因脾致渴以津液之乾

風從肝起熱自心生風熱併而搐急吐瀉久而成慢證分八候治貴十全痰涎未去兮爲言語之蹇澀氣血未復兮成手足之拘攣天弔如痙而上竄內弔似痼而裏疼客忤輕於中惡蟲痛類於發痫形證既泥於雷同診治宜詳於藻鑑

眼中白膜兮肝疳已現鼻下赤爛兮肺疳所傳壯熱而渴兮邪火熏於絳宮多瘡而癖兮眞水涸於元關飲食傷而脾損津液亡而胃乾丁奚手足之漸細哺露精粕之不斂愛喫泥土兮面黃齒白而頭皮光急喜啖瓜果兮口饞肉削而腹皮滿堅

論病之證已明立治之法尤簡平胃燥濕五苓利水二藥合而吐瀉兼調瀉青疏風導赤瀉火兩方并而驚風可蠲金花涼驚而退熱玉液寧嗽以化痰保和消積兮同香連又治痢疾異功補脾兮助集聖可救瘍疳理中止吐瀉而寒熱通用保命鎮驚癇而急慢相兼

抱龍主驚風而平痰火惺惺解變蒸而散風寒養脾平瘧兮瘧久有母者消癖荳蔻止泄兮泄久生風者調元白朮救虛渴之仙藥丁香取蟲積之神丹五色泄臟中之熱三聖除膈上之痰口舌生瘡者洗心肖脅急痛者控涎參苓肥兒兮脾虛羸甚者勿棄地黃補腎兮稟氣怯弱者有驗

嗟夫嬰兒稚弱兮豈堪藥石良工調理兮尤貴精專或補或泄兮中病即止易虛易實兮其證勿犯治不乖方兮有如援溺救焚藥不對病兮何異操刀背劒發吾心之祕兮爲取冤以設置獲斯術之利兮勿得魚而忘筌

貧富異病

人有恆言富貴之子多病者其氣清其體薄而過於飽煖也貧賤之子少病者其氣濁其體厚而常受饑寒也上智之醫識得此意觀父母而知其氣稟之厚薄觀形色而知藏腑之虛實猛峻之藥不可妄加和平之方亦不可執用也歌曰

醫不執泥曰上工能知富貴與貧窮生來氣體分清濁居來看承又不同

論胎疾食積外感

小兒初誕多胎疾能食過多爲食積於斯二者作提綱仲陽復起從吾議

小兒之疾如痘疹丹癗膿風變蒸斑黃蟲疥解顱五軟之類皆胎疾也如吐瀉瘧痢腫脹痞積疳瘍之類皆傷寒之疾也惟發熱咳嗽或有外感風寒者故曰小兒之疾屬胎毒者十之四屬食傷者十之五外感者十之一二

驚癇原來肝有餘脾常不足致疳虛形體不全知腎弱上醫會得謹其初

大抵小兒脾常不足肝常有餘腎主虛亦不足也故小兒之病驚風屬肝疳痞屬脾胎氣不足屬腎上醫治病必先知所屬而預防之故曰不治已病治未病

家傳三法

家傳三法救孩童驚癇須防用抱龍胎稟怯時宜補腎肥兒痫病有奇功

治癇用琥珀抱龍丸治疳用肥兒丸治胎稟不足用補腎地黃丸此三方者祖訓相傳子孫敬守

辨壽夭

幼科精熟是專門壽夭平時認得明色脈合觀知五臟補虛瀉實藥通神

古語云三折股肱爲良醫謂歷練熟也故幼科專精者凡小兒之壽夭先瞭然於目中矣病不可治必不治也至於臨病之時觀形察色便知五臟之證治所以補之瀉之意之所生有通神之妙也

小兒壽夭最難明只在良工眼力精形氣有餘爲壽相如其不足豈遐齡

小兒壽夭須觀形氣如形實氣實此稟氣有餘爲壽相無病易養如形虛氣虛者此稟氣不足爲夭相多病難養蓋兒之生也受氣於父成形於母父母俱强者則形氣有餘父母俱弱者則形氣不足父强母弱則氣有餘形不足父弱母强則氣不足而形有餘也大抵壽夭窮通聰明愚痴皆以預定豈能逃乎小兒所稟全賴父母之餘氣以長形質故肥不可生瘦瘦不可生肥大小與父母不等則難養也雖初生多患若形體相稱多壽也小兒面舒轉首遲滯稍費人彫琢者壽之兆也若小兒預知人意身輕力弱者難養

也古人有言譬如梅花早發不賭歲寒甘菊晚榮終於年事故知晚成壽之兆也若小兒陰小而黑與身相等者可養之子若陰大而白者難養也若小兒形體弱頭面多青精神昏瘁者難養若小兒剛悍眼目俊朗神氣爽健髮紺而澤者壽之相也若小兒精神實則少病故易長成也若形瘁而多病者難養也若小兒黑珠少白睛多面色晃白者非壽之相也縱長不及天年若黑珠大而白睛少面色黑形不淡者亦要觀其眼中黑白分明表裏相稱曰壽曰康若黑珠動搖光明閃爍縱長亦應目疾壽亦不及四旬也頭圓背厚腹如垂目秀眉清鼻準齊耳角分明口方正腎堅肉實體豐肥

頭者髓之海也腎主骨髓頭圓則腎足矣背者五臟之所附也背厚則五臟安矣腹者水穀之海也腹大則水穀盈矣目者肝之竅耳者腎之竅鼻者肺之竅口者脾之竅七竅無闕則形全矣脾主肉肉實者脾氣足也肝主筋筋強者肝氣足也腎主骨骨氣足則腎堅矣

腮妍髮紺形表端二便調和裏氣安脚健項肥囊緊小肌膚溫潤更紅鮮

腮妍如桃髮黑如漆此表實也小便長大便潤此裏實也脚者身之柱也柱壯而强則身不撓項者頭之莖也項長而肥則頭不欹囊者宗筋之會也囊黑而小如荔枝者壽肌肉者榮衛之所舍也溫潤紅鮮則榮衛宣暢而氣血足矣

性靜神安狀若愚自然精采與人殊榮然後笑不多哭若到眠時不久噓

英華不露神氣內藏此非凡兒相也心主笑不妄笑者心氣足也肺主哭不多哭者肺氣足也又哭聲不絕連綿者肺氣實也脾主睡睡不久者脾氣實也此上三條皆壽相也其兒無病而易養也

頭破露縫眼露睛鼻乾唇縮口流津髮稀項軟腓腨小滿面紛青紫筋

諸陽皆會於頭頭破則陽上衰矣諸陰皆起於足腓腨者足肚肉也小則陰下衰矣鼻爲肺竅鼻乾則肺氣衰矣唇口爲脾竅唇縮流津脾氣衰矣髮爲血餘髮稀則血衰矣項爲天柱項軟則柱折矣青紫之筋皆風熱之候散見於面必多驚癎之病

形枯色夭欠火晶肚大筋浮瀉利頻蟲疳浸淫多叫哭見人笑語弄精神

形枯色夭者此表虛也瀉利無時者此裏虛也疳瘧啼哭多笑語者皆陽火妄動之候此上三條皆夭相也其兒多病而難養也

辨形色

小兒有病觀形色青主驚風紅主熱黃爲傷食白主疳若中惡時其面黑

肝主風其色青心主熱其色紅脾主穀其色黃白者氣血不榮於面也故主疳黑者凶色也故主中惡

氣色須看何部中心主正額火光紅左頰木肝右金肺頰爲腎部鼻脾宮

此五形分部位也肝屬木東方故於左頰候之肺屬金西方故於右頰候之心屬火南方故於額上天庭候之腎屬水北方故於頤下地閣候之脾屬土中央故於鼻準候也

肝病須觀眼目中脾唇心舌自相通肺有病時常在鼻腎居耳內認其宗

此以五竅分五臟也肝之病見於目心之病見於舌脾之病見於唇肺之病見於鼻腎之病見於耳各隨寒熱虛實決之

目揚面赤熱生風眉縐呻吟腹痛攻面腫色黃知癖疾髮稀面白有疳蟲

肝主風目揚者肝病也揚者直視也心主熱面赤者心病也風熱相傳必生驚搐人有痛則眉縐而呻吟

訣云痢疾眉頭縐腸中痛也脾主濕濕勝則腫面腫色黃故知脾病宿食成積積久成癖疳者津液不足之病也髮稀面白血之虛也疳病多蟲

下痢應嫌面貌妍驚風面赤亦堪憐咳嗽面白爲眞色青遠唇傍青紫筋

訣云瀉不定精神好者死風病面如塗硃者死咳久不止面光白者肺之眞臟色見也

小兒疾厄命宮尋虎口三關食指紋欲知死生無錯誤不離五色認分明

命宮謂山根也小兒山根斷絕青紅紫黑筋橫欄者多病難養相法云山根青色出胎頻見災危是也男左女右手指橫紋其紋曲向內者病在內曲向外者病在外下大上小者吉下小上大者凶

辨脈息

小兒未損天眞氣指下脈來宏有力大滑數實最爲良細濇遲虛終不吉

脈大者氣實也脈滑者血盛也六至爲數脈來有力皆馭熏有餘之脈也脈細者氣虛也脈滑者血虛也

三至爲遲虛則無力皆賦稟不足之脉也小兒壽夭以此辨之

一息六至號平和八至之說不可憑四至以下虛冷備八九十至熱生驚

小兒之脉一呼三至一吸三至謂之一息六至乃和平無病之脉也訣云八至爲平和脉者勿從一息四至曰離經三至以下謂之損脉爲虛冷疳癆之病一息八至曰離經九至以上謂之至脉爲實熱驚風之病

辨脉證治

上醫色脉盡須明虛實證治如法行有一乖違即不中爲兒作禍犯天刑

內經曰能合色脉可以萬全蓋上醫之治小兒也以色合脉以脉合色實則瀉之虛則補之不違則制萬全之道也且如兩腮紅者色實也脉急數者脉實也大便祕小便黃渴不止上氣急足腫熱者實證也有此三實者宜以寒凉之藥瀉之所謂不可服熱藥者有七也如面見白者色虛也脉微沉者脉虛也黃色青腹虛脹嘔乳眼珠青足腫冷虛證也有此三虛者宜以溫熱之藥補之所謂不可服寒藥者有七也今之粗工色脉證治懵然無知妄作湯丸天兒性命天必譴之

藥必對證無差錯中病即已無太過待其來復眞氣生會養盡之無補佐

此謂治病之要術也色脉證治了然在心故以寒治熱以熱治寒實則瀉之虛則補之皆制病之方藥也服藥之後中病即已勿過其制者即內經大毒治病十去其三小毒治病十去其五無毒治病十去其七之法也內經曰及其衰也待其來復謂病衰其半即止其藥以待其眞氣之發生又以乳食之養助其發生之氣諺云藥補不如食補者是也粗工不知此理攻寒令熱寒未退而內熱以生制熱令寒熱未除而中寒不起欲求疾愈安可得乎天札之由必始於此

此條治法亦吾輩緊爲人處

小兒用藥擇其良毒藥毫釐不可嘗邪氣未除眞氣損可憐嫩草不耐霜

良謂氣味平和無毒之藥也毒謂猛峻蝕利瞑眩之藥也故小兒之方實則瀉之如瀉青導赤瀉白瀉黃之類虛則補之如安神異功阿膠地黃之類如凉驚治熱理中治寒抱龍治癇肥兒治疳之類皆和平無毒之劑此吾家祕傳之良方也如巴豆牽牛雖未嘗不用亦不敢專用也予見今之行幼科者以硇砂治積輕粉治痰以砒治瘧以硫治寒皆是大毒之藥小兒之腸胃嬌脆安能當此毒也

小兒汗下勿輕嘗實實虛虛必損傷寒熱誤投如太過溫中解毒有奇方

按仲景傷寒法云不應汗而汗之者爲斑疹驚惕汗不止之證所謂桂枝下咽陽盛則斃也不應下而下之者爲痞滿腹痛吐瀉腸滑不止之證所謂承氣入胃陰盛乃亡也

小兒有病不可下不熱自汗兼自瀉神困顛陷四肢冷乾嘔氣虛神怯怕

吐蟲面白髮焦穗疳瘦潮熱食不化鼻塞咳嗽及虛痰脉細腸鳴煩躁呀若將有積與疏通是謂虛虛誡可怕

孩兒實熱下無妨面赤睛紅氣壯強脉上弦紅肚上熱咋腮喉痛尿如湯屎硬腹脹脅肋滿四肢浮腫夜啼長遍身生瘡肚隱痛下之必愈是爲良

如慎服寒凉藥過多者以致脾胃虛弱胃脘痛宜溫胃散主之如慎服熱藥太過者以致煩躁悶亂或作吐或在或渴宜先解毒菉豆粉飲主之

如小兒病驚多用藥性太溫及熱藥治之有驚未退而別生熱證有病愈而致熱證者有反爲急驚者甚多當問病者數日因何得之曾以何藥調之可用解毒之藥無不效也以豆卷散主之

病來發熱不惺惺不信醫師信鬼神龍木祝由眞人訣未聞生殺解病驚

經曰惑于鬼神者不足與言至德故有信巫不信醫之戒祝由科龍木所傳乃移精變氣之術如禱鬼神之事徒殺牲耳何益哉

病不可治對人言病可醫時用意專三法始經常記憶勿傷脾胃反成愆

古語云病不可治即宜早告不可隱忍遭人恥笑誠哉是言也其病可治親人之子如己子調護保養無所不致可也然有三法初用猛法以攻病之藥去之不可惡攻而愛補反助其邪爲兒之害中用寬猛相濟病久不除乳食必少脾胃大倦於補脾藥中加攻病藥看兒強弱加減末則用寬法兒病既久久則成疳只以補脾胃爲主正氣完則邪氣自盡矣

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百二十四卷目錄

醫部彙考四百四

小兒診視門二

魯伯嗣學嬰童百問　脈法　面上證氣色總見
虞摶醫學正傳　小兒脈法總論　面上諸形證歌　內八段錦　外八段錦
薛氏保嬰金鏡錄　頭面部位圖　圖解
保嬰撮要　面上證　脈形
龔信古今醫鑑　小兒三關紋色主病歌　三關脈紋變見歌　脈法總歌　指脈歌　病原論　入門審候歌　觀面部五色歌
徐春甫古今醫統　胎氣稟受不同論　用藥論　觀形氣　察病形色歌　諸病形色　面部察色應病歌　壽夭歌　相服神法　得病之源　無患歌　聽聲驗病　諸病形狀　雜病歌　雜證病機　雜病不治歌　戒輕易服藥　小兒難醫於大人

藝術典第四百二十四卷

醫部彙考四百四

小兒診視門二

明魯伯嗣學嬰童百問

脈法

小兒一歲至三歲看虎口更用指按高節乃一指分三關定其息數呼吸八至爲平脈九至不安十至危困短長大小各有邪干浮主風生數主有驚沉遲主虛冷實主有熱緊是癲癇洪主熱盛沉細主腹痛沉緩主虛瀉微遲有積有蟲遲澀主胃脘不和沉主乳食難化沉細主乳食結緊弦主腹熱痛牢實主大便祕沉而數者主骨中有熱弦長是肝膈有風緊數驚風四肢掣戰浮洪胃口有熱沉緊主腹痛不歇虛濡有氣又兼慢驚芤多痢大便有血四歲用一指按虛實五歲六歲用一指滾轉尋三部平正關上爲準七歲八歲稍移指少許尋三部九歲十歲次第依三關部位尋取十一歲十二歲亦同十歲看十四歲十五歲方依大方脈部位診視凡看脈先定浮沉遲數陰陽冷熱皆依大方也沉遲爲陰浮數爲陽更兼看面部青色主驚風白色主虛瀉赤色主痰熱黑色病勢難當黃色是脾家疳積以此相參察其病源審度治療必無疎失矣

面上證氣色總見

左腮爲肝右腮爲肺額上爲心鼻上爲脾下頦爲腎赤者熱也隨證治之此仲陽之至論也口議所謂五位氣色總見者其藍青色者乃驚積不散欲發風候其火紅色者痰積壅盛驚悸增進其黃土色者食積癥傷欲作疳疾痞癖其色白者大腸滑泄水穀不分欲作吐利其黑色者臟腑欲絕其疾危惡其兒不久也又有面部形色額有青色主驚風欲發紅主大熱印堂青色初入驚井瀉紅主大驚夜啼黑主客忤山根青至主二次驚青色主瀉後發躁黑色及黃甚主死年壽平陷者主夭青主發熱生驚黑主痢死紅主燥死微黃曰平黃甚主霍亂死鼻準微黃曰平黃甚爲土動死候黑赤危甚人中黑主蛔蟲咬患久脣反者死短縮者因利死邊旁黃主胃逆青色主下利正口紅者平乾燥脾熱白主失血死黃有積青因驚風死黑氣遶口者死承漿青因飲食時被驚黃主吐逆赤主血痢赤黑主驚風兩眼黑睛黃有熱白睛黃食積不化疳蛔白睛青肝風驚黑睛黃傷寒眉上青吉忽紅主煩躁夜啼黃主霍亂久病紅者死風氣二池青主風候紫主吐逆又發熱黃吐逆紅主煩躁夜啼兩顴赤色肺有客熱兩太陽青主二次受驚青自太陽入耳者死紅主血淋兩臉青主客忤黃主痰溢赤主風熱兩頰赤主傷寒左赤心熱口瘡右赤肺熱黃主有積紅主血淋兩頤青主吐蟲兩金匱青主第三次驚生風黑遶口二日死青連目入耳七日死兩風門紅主風熱黑主疝青水驚黑從眉入耳當日死脣黑不食者死又面青眼青肝之病面赤心之病面白肺之病面黃脾之病面黑腎之病五臟各有所主看稟受盈虧胎氣虛實陰陽補瀉當救其失臟腑表裏若能辨其標本則神聖工巧自然得矣

虞摶醫學正傳

小兒脈法總論

小兒七歲八歲曰齔九歲十歲曰髫始可以一指探掌後尺寸三部之脈而以一息七八至爲無病之常脈十一歲至十四歲曰童丱而以一息五六至爲常脈也數則爲熱遲則爲寒浮則爲虛爲風沉則爲實爲積爲痛浮而數者爲乳癇驚悸虛而軟者爲慢驚瘈瘲緊而實者爲風癇牢而革者爲便祕沉而弦者爲食積爲腹痛緊而弦者爲氣急爲風寒洪數者爲熱伏結爲傷食軟細者爲蟲疳若氣促脈代散亂無倫次者死在須臾而不治也

面上諸形證歌

痢疾眉頭皺驚風面頰紅渴來脣帶赤毒熱眼胞朧
山根若見脈橫青此病明知兩度驚赤黑困疲時吐
瀉色紅啼夜不曾停
青脈生於左太陽須驚一度見推詳赤是傷寒微燥
熱黑青知是乳多傷
右邊青脈不須多有則額驚怎奈何紅赤爲風抽眼
目黑青三日見閻羅
指甲青兼黑暗多脣青惡逆病將瘥忽作鴉聲心氣
急此時端的命難過
蚘蟲出口有三般口鼻中來大不堪如或白蟲兼黑
色靈丹縱服病難安
四肢瘡疼不爲祥下氣冲心兼滑腸氣喘汗流身不
熱手拿胃腸定遭殃
眼中赤脈實難量大數元來此不祥最怕亂紋鋪目
下更兼赤脈貫瞳光
顱門腫起定爲風此候應知最是凶忽陷成坑如盞
足未過七日命須終
鼻門黑燥渴難禁面黑脣青命莫存肚大筋青俱惡
候更嫌腹有直身紋
忽見眉間紫帶青看來立便見風生青紅碎雜風將
起必見疳瘡隔氣形
亂紋交錯紫嫌青急急求醫免命傾盛紫再加身體
熱須知臟腑惡風生
紫少紅多六畜驚紫紅相等則疳成紫點有形如米
粒傷寒夾食證堪評
紫散風傳脾臟間紫青口渴是風癇紫隱深沉難治

療風痰祛散命須還
黑輕可治死還生紅赤傷寒痰積停赤青脾受風邪
證青黑脾風作慢驚
紅赤連兮勿藥輕必然乳母不相應兩手忽然無脈
見定知衝惡犯神靈

內八段錦

血淨爲安不用驚若逢紅黑便難寧更加紅亂青尤
甚取下風痰病立輕
赤色輕微是外驚若如米粒勢難輕紅散多因乘怒
亂更加搐搦實難平
小兒初誕月腹痛兩眉顰時號盤腸氣啼哭又呻吟
如反目仰視者天弔風也
小兒初誕月肌體瘦危羸髮禿毛稀少元因鬼王胎

外八段錦

先望孩兒眼色青次看背上冷如冰陽男搐左無妨
事搐右令人甚可驚女搐右邊尤可治若逢搐左疾
非輕歪斜口眼終爲害縱有仙丹也莫平
薛氏保嬰金鏡錄



圖解

頭者諸陽經絡所會面者五臟氣血之榮色者五臟
精神之華欲察兒病吉凶先分部位生尅五臟虛敗
色必枯槁五色充實色必光華面色光澤者生面色
枯槁者死經以望爲先故曰能察色脈可以萬全
全幼心鑑云小兒半歲之間有病當於額前眉端髮
際之間以名中食三指橫按之兒頭在左舉右手在
右舉左手食指爲上中指爲中名指爲下若三指俱
熱主感受風邪鼻塞氣粗發熱咳嗽若三指俱冷主
外感內傷發熱吐瀉若食中指熱主上熱下冷名中
指熱主夾驚食指單熱主胃腸氣滿名指單熱主乳
食不消
竊謂額間赤色主心經風熱煩躁驚悸若發熱作渴
飲水或發叫哭屬本經實熱用瀉心湯以清心火微
赤則困臥而悸發熱作渴飲湯屬虛熱用祕旨安神
丸以生心血青黑主驚風腹痛或瘈瘲啼叫用五味
異功散加木香柴胡釣藤鉤補脾肝青黑甚主心腹
疼此寒水勝心火爲賊邪用益黃散以補脾胃微黃
皮燥主驚疳此心經疳證用祕旨安神丸以養心血
骨蒸作渴盜汗頭髮乾黃此爲腎疳用地黃丸以滋
補肝腎
左臉青或兼赤乃肝經風熱項強煩悶發搐目劄瘈
瘲用柴胡清肝散主之色微赤咬牙屬虛熱用地黃
丸補之青黑主肝尅脾虛寒驚搐腹痛用六君薑桂
溫之微赤主潮熱血虛心躁用祕旨安神丸佐以地
黃丸
右臉赤主肺大腸風邪實熱氣粗欬嗽發熱飲水用

瀉白散若哽氣出氣脣白氣短屬虛熱用五味異功散若脾熱所傳用清胃散心火所刑用人參平肺散淡赤主潮熱心躁或大便堅祕用宣明柴胡飲子以疏導其熱如潮熱未止更用釣藤飲以清肝補脾色青白主玆噁惡心先用惺惺散解其表邪健其脾土繼以六君子湯調補中氣色青黑主驚風腹痛盤腸內釣此肝木侮脾土用六君子湯加釣藤鉤以調補元氣不宜治肝

鼻色赤主脾胃實熱身熱飲水飲食如常用瀉黃散清熱理脾微赤主脾經虛熱飲食難化而不思食用五味異功散以補中健脾色深黃主小便不通鼻中乾燥氣粗衄血乃脾熱傳於肺腎先用濟生犀角地黃湯清熱養血後用地黃丸以滋益腎水色淡白乃脾氣虛弱主泄瀉飲食不化用六君子以調補中氣青色主脾土虛寒肝木所勝用五味異功散加木香炮薑溫中平肝黑爲死候

頰間色赤主腎與膀胱陰虛有熱而小便不通用四物湯加山梔以養血清熱赤甚主膀胱氣滯而熱結用五苓散以分利其邪若鼻準微黃右腮微赤乃脾肺燥熱不能化生腎水用黃芩清肺飲膀胱陰虛陽無所生用滋腎丸若頰間微赤乃膀胱陽虛陰無所化用六味地黃丸若兼小腹脹滿或陰囊腫脹屬陰虛濕熱壅滯用六味丸加車前子牛膝兼脾肺氣虛不能通調水道者亦用前藥其小便赤色久而尿血亦屬肝腎氣虛有熱用六味地黃丸主之不應則用補中益氣湯益脾肺生腎肝若小便後出白津或莖中作痛者屬肝經濕熱先用龍膽瀉肝湯後用六味地黃丸

印堂色青黑主腹痛夜啼此脾經虛寒脾屬至陰故夜間腹痛而啼用釣藤飲色淡白主泄瀉飲食不化屬脾氣虛弱用五味異功散加木香主之

目內色青主肝經風熱發驚若直視叫哭屬肝經實熱用抑肝散兼咬牙煩悶屬虛熱用六味地黃丸色赤主心肝二經發熱抽搐煩躁若小便赤屬小腸實熱用導赤散若驚悸倦怠屬肝經血虛用六味地黃丸色黃主脾積少食夜間發熱用四味肥兒丸飲食停滯吐瀉並作用胃苓散去桂加茵陳山梔目鮮發搐眼眨屬風熱相搏先用柴胡梔子散後用六味地黃丸眼泡微腫主久咳惡心或脾疳食積用五味異功散補脾肺兼肥兒丸以消積滯或目視不明或雀目揩拭眉眼此欲生風也急用抑肝散以解之睛尾紅絲乃肝木勝脾土先用四君子加柴胡山梔後用地黃丸

人中色黃主傷食胃逆青主下利乳食不化噯噫酸腐此脾虛停滯用平胃散以消積和中色青赤主驚肝氣傷脾用五味異功散加柴胡以平肝補中黑主蛔蟲咬痛

脣色白主吐涎嘔逆或吐血便血乃脾氣虛弱不能攝涎統血歸源急用六君子湯調補中氣則諸病自愈切忌涼藥若色赤乾燥而皺者主脾經有熱發熱作渴口中氣臭大便不通煩躁不寐先以清胃散治其熱更以六君子湯加黃連山梔兼補其脾色黃主脾經食積泄瀉飲食不化以六君子湯溫補中氣色赤兼白主衄血乃脾肺虛熱不能攝血歸源用聖濟

犀角地黃湯以清熱補血兼用六君子以補脾氣久不愈用麥門冬散或人參補肺湯或人參安胃散

口畔色黃主脾經積熱用清胃散以理脾清熱久病用四味肥兒丸以治疳熱若唇口抽動主驚熱不安用五味異功散加山梔鉤藤鉤以補脾平肝若口流涎唇色紫乃胃氣虛寒也用益黃散若腹中痛口吐涎水者乃蟲痛也先用蕪荑散後用調中丸不吐涎者乃積痛也但用五味異功散調補胃氣手足並冷用理中湯加烏梅溫補中氣則蟲不動而痛自止矣亦有積痛者或吐後痛止或大便去後痛止者宜用消積丸消導積滯佐以異功散調補胃氣白主失血死青主驚風死黑色繞口者不治

耳前微赤此少陽經風熱也用柴胡梔子散生肝血清肝火微黃主睡中驚悸咬牙因肝脾虛熱宜用四君子加芎歸升麻以安神

耳輪乾燥主骨疳蒸熱爲腎經虛熱也用六味地黃丸補之若小便後出白津或陰莖痒痛者屬肝經濕熱也先用龍膽瀉肝湯後用六味地黃丸若稟賦腎氣不足或早近女色致小便滑瀝或作痛如淋者急用六味地黃丸補中益氣湯滋其化源或大小便道牽痛者尤爲虛也亦用前藥加牛膝車前子肉桂救之如手足逆冷或畏寒少食陽氣虛寒也急加附子多有生者大抵小兒之證多因稟賦臟氣不平或乳食寒暑失宜或姙娠乳母飲食起居六淫七情所致若初病元氣無虧乳食如常發熱壯熱二便祕結作湯飲水臥不露睛者悉屬形病俱實當治邪氣若病久元氣已虧食少發熱口乾飲湯嘔吐泄瀉肢體畏

寒臥而露睛者悉屬形病俱虛當補正氣況今之小兒元氣與昔不同用藥失宜脾胃先傷豈可泥古方而施治哉余故考諸名家宗諸東垣於凡諸證各補以方藥治者能即色以驗其病察病以固其本斯無失矣是以古之治病望色爲先也且驚則氣散脈亂不可專診故必兼察色心鑑云若面色未盡當參之以指脈指脈未盡當參之以面色色脈兼盡無餘蘊矣

保嬰撮要

面上證

面色青主驚積不散欲發風候紅主痰積驚悸黃者食積癰傷欲作疳癖白主洩瀉水穀更欲作吐黑主臟腑欲絕

印堂青主初患驚瀉紅主大驚夜啼黑主客忤

山根青主二次驚瀉後發躁黑黃甚者死

年壽平陷主夭青主發熱生驚黑主利死紅主躁死

微黃曰平黃甚曰霍亂

承漿青主食時被驚黃主吐逆亦主血利黑主驚風

兩眼黑睛黃主有熱白睛黃主食積疳痢白睛青主驚風黑睛黃主傷寒

眉上青吉忽紅主煩躁夜啼黃主霍亂久病紅者死

風氣二池青主風候紫主吐逆或發熱黃主吐逆赤主煩躁夜啼

兩顴赤主肺有客熱

兩太陽青主二次受驚青自太陽入耳者死紅主血痲

兩臉青主客忤黃主痰盛赤主風熱

兩頰赤主傷寒兩頤青主吐蟲

兩金匱青主第三次驚風黑遶口二日死青連目入耳七日死

兩風門紅主風熱黑主疝青主水驚黑從眉入耳即日死唇黑不食者死

脈形

流珠形主飲食所傷內熱欲吐或腸鳴自利煩躁啼哭用助胃膏消飲食分陰陽若食消而病仍作用香砂助胃膏以補脾胃

環珠形主脾虛停食胃脘脹滿煩渴發熱用五味異功散加山楂枳實健脾消食後用六君子湯調養中氣

長珠形主脾傷飲食積滯肚腹作痛寒熱不食先用大安丸消其積滯次以異功散健其脾氣

來蛇形主脾胃濕熱中脘不利乾嘔不食此疳邪內作先用四味肥兒丸治疳後用四君子湯補脾去蛇形主脾虛食積吐瀉煩渴氣短喘急不食困睡先用六君子湯加枳實健脾消積次以七味白术散調補胃氣

弓反裏形主感冒異邪哽氣出氣驚悸倦怠四肢梢冷小便赤色咳嗽吐涎先用惺惺散助胃氣祛外邪後以五味異功散加茯神當歸養心血助胃氣若外邪既解而驚悸指冷脾氣受傷也宜用七味白术散補之若悶亂氣粗喘促哽氣者難治脾虛甚故也

弓反外形主痰熱心神恍惚夾驚夾食風癇痰盛先以天麻防風丸祛外邪又以五味異功散調中氣

鎗形主風熱生痰發搐先用抱龍丸如未應用牛黃清心丸若傳於脾肺或過用風痰之藥而見一切諸證者專調補脾胃

魚骨形主驚痰發熱先用抱龍丸治之如未應屬肝火實熱少用抑青丸以清肝隨用六味丸以補肝或發熱少食或痰盛發搐乃肝木尅脾土用六君子湯加柴胡補脾土以制肝木

水字形主驚風食積胃脘煩躁煩悶少食或夜啼痰盛口噤搐搦此脾胃虛弱飲食積滯而木尅土也先用大安丸消導飲食次以六君釣藤鉤補中清肝若已服消食化痰等劑而病不愈者用四君升麻柴胡釣藤鉤升補脾氣平制肝木

針形主心肝熱極生風驚悸煩悶困倦不食痰盛搐搦先用抱龍丸祛風化痰次用六君子加釣藤鉤平肝實脾

透關射指形主驚風痰熱聚於胃脘乃脾肺虧損痰邪乘聚先用牛黃清心丸清脾肺化痰涎次用六君子湯加桔梗山藥補脾土益肺金

透關射甲形主驚風肝木尅制脾土之敗證急用六君木香釣藤鉤官桂溫補脾土未應即加附子以回陽氣多得生者

嘗聞古人云小兒爲芽兒如草之芽水之漚蓋因臟腑脆嫩口不能言最難投劑當首察面色而知其所屬次驗虎口以辨其所因實爲治法之簡要也

註　流珠只一點紅色環珠差大長珠圓長已上非謂圈子總皆紅脈貫氣之如此來蛇即是長珠散一頭大一頭尖去蛇亦如此分上下朝故曰來去

角弓反張向裏爲順向外爲逆鎗形直上魚骨分

開木字即三脈並行鍼形即過關一二粒米許射甲命脈向外透指命脈曲裏雖然余嘗治之亦有不專執其形脈而投劑者蓋但有是證只服是藥而亦多驗

龔信古今醫鑑

小兒三關紋色主病歌

紫熱紅傷寒青驚白色疳黑時因中惡黃即困脾端青色大小曲人驚并四足赤色大小曲水火飛禽撲紫色大小曲傷米麪魚肉黑色大小曲脾風微作搐

三關脈紋變見歌

魚刺驚風證莫疑氣關疳病熱相隨命關見此爲難治此是肝家轉到脾

初節懸針瀉痢生氣關肺熱更疳疑二關直透黃泉近此候須知是慢驚

水字生驚肺受風氣關喘嗽積痰攻醫人仔細詳虛實出命驚疳夾證凶

乙字驚風肝肺隨氣關形見發無時此形若直命關上不久相將作慢脾

曲蟲爲候主生疳若見氣關積穢肝直到命關爲不治須知心藏已傳肝

雙環肝藏受疳深入胃氣關吐逆臨若是命關爲死候枉教醫者更勞心

流珠形見死來侵面上如斯也不生縱有神丹人不救醫人仔細更丁寧

傷寒斜向右傷食七堪倚雙鉤傷冷定逢驚山字浮絲紋將發搐丰字引堪愁若遇傷風證脈斜向左朝形如新月樣向右氣疳留若是彎居左風疳藥可投形如三疊曲傷硬物爲仇更有環生脚尤嫌上下鉤皆是傷冷候醫者用心求疳極如勞狀亂蟲皆可憂交了紋互疊腹面見因由更有青筋貫百中無一瘳

脈法總歌

小兒有病須憑脈一指二關定數息遲冷數熱古今傳浮風沉積當先識左手人迎主外證右手氣口主內疾外候風寒暑濕侵內候乳食痰與積洪緊無汗是傷寒浮緩傷風有汗波浮洪多是風熱盛沉細元因乳食積沉緊腹中痛不休弦緊喉間作氣急緊促之時疹痘生緊數之際驚風至虛軟慢驚作瘛瘲緊實風癇發搐搦軟而細者爲疳蟲牢而實者因便閉脈芤大小便中血虛濡有氣兼驚悸滑主露濕冷所傷弦急客忤若須記大小不勻爲惡候二至爲脫三至卒五至爲虛四至損六至平和曰無疾七至八至病尤輕九至十至病勢極十一二至死無疑此訣萬中無一失

指脈歌

小兒食指辨三關男左女右一般看皆知初風中氣候末是命關易亦難要知虎口氣紋厥倒指看紋分五色黃紅安樂五藏和紅紫依稀有損益紫青傷食多虛煩青黑紋時證候逆忽然純黑在其間好手醫人心膽寒若也直上到風關粒米短長分兩端如鑰衝射驚風至分作指又有數般弓反裏順外爲逆順逆交連病已難又頭長短有可救如此醫人仔細看男兒二歲尚爲嬰三歲四歲幼爲名五六次第年少長七髻八齠漸論情九歲爲童十稚子有病關格辨其因十一痢疾號顯風疳病還同勞病攻疳癖定爲沉重候退他潮熱不相同初看掌心中有熱便知身體熱相從肚熱身冷傷積定脚熱額熱是感風額冷脚熱驚所得瘧疹發來耳後紅小兒有積宜與塌傷寒三種解爲宜食瀉之時宜有積冷瀉須用與溫脾水瀉宜與溫臟腑先將滯竭散與之孩兒無事忽大叫不是感風是天弔大叫氣促長聲粗誤吃熱毒悶心竅急須吐下却和脾若灌驚藥真堪笑

病原論

夫小兒者幼科也初生者曰嬰兒三歲者曰小兒十歲者曰童子兒有大小之不同病有淺深之各異形聲色脈之殊望聞問切之間若能詳究於斯可謂神聖工巧者矣

蓋望者鑑貌辨其色也假如面部左應屬肝右應屬肺額屬心鼻屬脾頰屬腎肝病則面青肺病則面白心病則面赤脾病則面黃腎病則面黑是乃望而知之也

聞者聽聲知其證也假如肝病則聲悲肺病則聲促心病則聲雄脾病則聲慢腎病則聲沉此屬於藏又大腸病則聲長小腸病則聲短胃病則聲速膽病則聲清膀胱病則聲微此屬於腑是乃聞而知之也

問者問病究其原也假如好食酸則肝病好食辛則肺病好食苦則心病好食甘則脾病好食鹽則腎病好食熱則內寒好食冷則內熱是乃問而知之也

切者切脈察其病也假如三歲小兒已下有病先看男左女右手虎口三關從第一指側看第一節名風關第二節名氣關第三節名命關辨其紋色紫者屬熱紅者傷寒青者驚風白者疳病黑者中惡黃者脾

之困也若見於風關爲輕氣關爲重過於命關則難治矣至三歲已上乃以一指按寸關尺三部常以六七至爲率添則爲熱減則爲寒浮洪風盛數則多驚沉遲爲虛沉實爲積是乃切脈而知之也

大抵小兒之疾大半胎毒而少半傷於食也其外感風寒之證十一而已蓋小兒之在胎也母饑亦饑母飽亦飽辛辣適口胎氣隨熱情慾動中胎息輒躁或多食煎煿或恣味辛酸或嗜慾無節或喜怒無常皆能令子受患

其爲母者胎前既不能謹節產後又不能調護是以惟務姑息不能防微杜漸或未滿百晬而遂與醯酸之味或未及週歲而輒與甘肥之物百病由是而生焉小兒脾胃本自嬌嫩易於傷積且如乳食傷胃則爲嘔吐乳食傷脾則爲泄瀉吐瀉既久則成慢驚或爲疳病乳食停積則生濕痰痰則生火痰火交作則爲急驚或成喉痹痰火結滯則成痈釣或爲喘嗽胎熱胎寒者稟受有病也胎風撮口者胎元有毒也鵝口口瘡者胃中有濕熱也重舌木舌者脾經有實火也走馬牙疳者氣虛濕熱也愛喫泥土者脾臟生疳也胎驚夜啼者邪熱乘心也變蒸發熱者胎毒將散也丹毒者火行於外也蘊熱者火積於中也中惡者外邪乘也睡驚者內火動也喉痹者熱毒也眼痛者火盛也癰耳者腎氣上冲也鼻塞者因冒風邪也頭瘡者熱毒攻也臍瘡者風濕中也尾骨痛者陰虛痰也諸蟲痛者胃氣傷也陰腫疝氣者寒所鬱也盤腸氣痛者冷所搏也脫肛者大腸虛滑也遺尿者膀胱冷弱也尿濁者濕滯脾胃也便血者熱傳心肺也下

淋者膀胱鬱熱也吐血者榮衛氣逆也小便不通者有陰有陽也大便祕結者有虛有實也解顱鶴節者胎元不全也行遲髮遲者氣血不充也龜胷者肺熱脹滿也龜背者風邪入脊也語遲者邪乘心也齒遲者腎不足也瘧者膈上痰結也痢者腹中食積也咳嗽者肺傷風也喘急者痰氣盛也心痛者蟲所嚙也腹痛者食所傷也內傷發熱則口苦舌乾也外感發熱則鼻塞聲重也腹脹者脾胃虛弱也水腫者土虧水旺也黃疸者脾胃濕熱也斑疹者陰陽毒氣也自汗者氣虛也積者有常所有形之血也聚者無定位無形之氣也胃主納受也脾主運化也調理脾胃者醫中之王道也節戒飲食者却病之良方也驚疳積熱者小兒之常病也望聞問切者醫家之大法也若夫療疾用藥如爺箭中鵠心者則又可以心悟而不可以言傳也孟子所謂梓匠輪輿能與人規矩不能使人巧斯言得之矣

入門審候歌

觀形察色辨因由陰弱陽強髮硬柔若是傷寒雙足冷要知有熱肚皮求

觀面部五色歌

面赤爲風熱面青驚可詳心肝形此見脈證辨溫涼脾怯黃疳積虛寒皖白光若逢生黑氣腎敗命須亡徐春甫古今醫統

胎氣稟受不同論

千金論曰兒在母胎受其精氣一月胚二月胎三月血脈四月形體成五月能動六月筋骨成七月毛髮生八月臟腑具九月穀神入胃十月百神備而生生後六十日瞳子成能笑語識人百日任脈生能反覆一百八十日尻骨成能獨坐二百一十日掌骨成能匐匍三百日髕骨成能獨立三百六十日爲一朞腠骨成乃能移步此理之常不如是者身不得其平矣或有四五歲不能行立此皆受胎氣之不足者也若筋實則多力骨實則早行血實則形瘦多髮肉實則少病精實則伶俐多語笑不怕寒暑氣實則少髮而體肥此皆受胎氣之充足者也大抵稟賦得中陰陽純粹剛柔兼濟氣血相和精神全備形體壯健其未周之先顱顖堅合睛黑神清口方脣厚骨粗臀滿臍深肚奧莖小卵大齒細髮潤聲洪睡穩此皆受胎氣之得中和者也以故聽其聲觀其形則可以知其虛實壽夭矣

用藥論

夫人稟陰陽二氣生疾病於三焦然冠壯易明童幼難治黃帝云吾不能察其幼小者爲別是一家調理爾此不在黃帝圖經之論也又云小兒如水上之波草頭之露以意用藥毋令造次焉惟小兒臟腑嬌血氣未足肌體不密精神未備故稱不易醫也初生曰嬰兒三歲曰小兒十歲曰童子大小各異切不可一槩而用藥也必明消息形候審定生死察病患之淺深知藥性之寒溫乃世之良工也

觀形氣

形者面形也氣者神氣也原夫小兒證候不可取之一端在表裏相應內外消息豈惟相鼓瑟者所能觀其形而知其證哉信斯言也況小兒虛實有非係乎肥瘦而係乎氣色者何以言之蓋有肥而氣怯瘦而

氣壯氣怯則色必嫩其爲虛可知氣壯則色必盛其爲實可知五藏之氣形於面部則肝青心赤肺白腎黑脾黃是其五色肝旺於春心旺於夏肺旺於秋腎旺於冬各七十二日脾寄旺於四季後一十八日是其本位然有時乎不春不冬而面變青黑者非肝之與腎也不秋不夏而面變赤白者非心之與肺也蓋五藏之氣色層見疊出隨形流證初無一定忽然青黑主乎痛忽然赤者主乎熱忽然白者主乎冷忽然黃者主乎積此氣之開闔非係乎時非拘乎位又如心主額肝主眼井左臉脾主脣之上下肺主右臉腎主耳前頦外其形或見於位或露於他部所謂不可取之一端此其選也且脾主脣之上下爲吐瀉或患利日久然其色黑則腎水反尅土名爲強勝其藏或敗爾肝主眼井左臉其色青本色也主驚駭驚風是爲順證若見白色乃肺尅肝卽爲逆證以此推考變而通之存乎其人

嬰兒惟察其面部五色以知病源又看眼睛有神無神神者目中精神光彩是也隱顯橫衝應位而見以應五藏五色青黑黃白赤是也肝青心赤脾黃肺白腎黑凡五藏主病蘊其內必有形色見於外小兒有病先觀本部形色論其五行生尅吉凶形色若有相應然後聽聲切脈

察病形色歌

大病唇紅不可醫看來眼慢不相宜睛青頰赤井乾黑髮直鴉聲轉淚啼手足無紋指頭白鼻乾燥熱口角垂昏沉口禁不開眼便是神仙難治之

五藏精明面上窺假如肝病面青時三春白氣如形見此病須亡餘倣之

目如赤白並青黑面若黃時病易瘳目黑與青井赤白面無黃色救無由

諸病形色

面上青色者爲驚積不散欲發風候

紅赤色者爲熱爲痰積壅成驚悸煩躁增進

黃色者亦爲熱爲食積癥瘕痃癖疳疾若神思昏沉其候潮熱氣粗困倦或嘔噦或瀉利

白色爲寒爲肺氣不利大腸滑泄欲作吐痢

黑色者爲痛所傳不煩燮證卽爲逆候榮衛失序爲痰爲惡候

正口常紅無病乾燥脾熱白爲虛

人中黑腹痛蟲動點點黑吐痢

山根紫傷乳食青驚人叫喚黑爲危

印堂青驚紅驚熱白無病

額青驚紅熱

兩眉紅夜啼燥熱

兩眼黑睛黃傷寒白睛黃濕積赤心熱淡紅心虛熱青肝熱

太陽紅血痲青驚兩紋青第二驚赤傷寒右青驚紅熱黑危惡候

風池紅熱多啼黃吐逆

金匱青筋驚

兩頰熱赤啼哭

顴紅熱

準頭近乘黃吐利赤熱紅紫痰氣青驚

承漿黃吐青驚

目無精彩瞳人不活眼珠上膜赤脈貫瞳人俱死證也

額上心證赤色者心經有風熱主心煩驚悸臥坐不安青黑色中有邪主驚風腹痛寶鑑云心乃中邪手瘛瘲面啼叫青黑甚則心腹痛微黃色皮乾燥主盜汗頭髮乾黃燥主驚疳骨熱微渴

鼻上脾證赤色身熱不思飲食深黃色小便不通鼻孔乾燥氣粗主衄血寶鑑云鼻乾喘息鼻氣有聲主衄血肺熱淡白色主泄瀉食不化

下頦腎證赤色主膀胱熱膀胱與腎爲表裏有熱則水道不利小便不通

左臉肝證赤色身熱拘急肝風熱也青黑主驚或腹痛淺赤潮熱心躁有一等小兒夜間潮熱日間面臉不安唇紅乾燥恐驗不眞脈必緊數

右臉肺證赤色身熱淺色潮熱或不便而氣粗壅嗽青白色主欬嗽惡心青色主風入肺時時欬嗽青黑主驚欲發或腹痛嬰兒盤腸內釣

印堂證青黑色主腹痛夜啼靈祕云印堂青黑夜啼如傷風主頭疼傷寒主久痢靈祕云痢疾眉頭皺王氏云眉中心淡白色主洩瀉糞白食物不化

人中證寶鑑云人中左右兩邊黃主傷食人中下青主乳不化便清糞白靈祕云人中鼻下俱青亦主乳食不消

唇口證唇白主吐涎嘔逆亦主吐血便血唇紅赤乾燥而皺者主渴靈祕云渴來唇帶赤唇紅赤不皺主口臭大便不通夜間心躁不睡紅乾而燥主熱王氏云口臭唇黃脾受積後必發腫夜起利糞白色又曰

脣口紫及吐涎主蟲痛飛仙論云脣口紫不吐涎是積痛寶鑑云脣口四畔黃如橘主口臭乃脾之積熱千金云脣緣赤主心熱口舌生瘡至墾訣云脣紅赤主蛔血脣白赤熱脣口動主驚熱又云口滴清水欲生重舌又主口瘡錢氏云口頰撮氣不和益黃散又云血虛怯爲冷所乘則脣青孫眞人云脣青主脾寒或時腹疼乳食減少蓋脾開竅於脣木來尅土知脾弱不能食也如久渴瀉脣紅者是虛證也不可用凉藥

舌上證舌乾舌黑舌白舌燥舌胎舌黃舌赤腫主大便不通雖通少焦黃舌裂舌上芒刺舌上出血皆熱極陽毒也舌上生瘡心脾熱舌上捲主驚有久瀉痢舌黑必潤不可以爲熱蓋久痢上焦虛熱舌黑必潤死不治

氣噎證氣噎不通必主驚候靈祕云噎飲須知死噦氣哽氣下氣頻呵欠主驚

兩耳證王氏云耳前微赤主耳聾微黃主腎驚睡中咬牙耳輪乾燥主疳骨蒸熱

面色淡白主惡心不食驚瀉面青白主吐瀉靈祕云主驚風欲發王氏云面青脣白主吐蟲不化胃冷難經云面白喜噫悲愁不樂只欲哭

面青黑色吐沫者蟲痛不吐沫者食積亦主驚靈祕云主天釣風面青遍身熱發躁多變痢疾面青有汗口內氣熱必發釣痛已上三證出靈祕寶鑑云面黃夜臥盜汗面青白有驚面青黑或時吐沫者客忤面黑青主天釣啼呼凶

面青臉赤主壯熱驚搐面青白黑往來不定主腹痛發瀉無時寶鑑云臉赤面黃白主心疳壯熱千金云面赤目黃主小便不禁通眞子云面青筋急或多嘆悶

面紅赤色主傷寒發熱心躁不安欲驚發狂靈祕云主身熱傷寒通眞子云面赤心煩仍喜笑

面黃臉赤主傷寒潮熱驚搐睡臥不安如肉內微微赤者主疳食潮熱錢氏云心疳面黃臉赤身壯熱安神丸主之

面黃白色主疳積大便不調夜起食不消嘔逆寶鑑云面黃白有積靈祕云面黃白主脾肺有積通眞子云面色痿黃瀉利無時錢氏云面見白氣發肚腹疼痛不思乳食

面目皆黃是脾熱黃疸寶鑑云黃疸皆因胃熱錢氏云此證多於大病之後若不因病而身微黃者胃熱面黃肚大脾乾初生嬰兒身黃曰胎疸

頭面青筋此爲欲發驚因熱必作搐因吐必肚痛若頭面大小青筋如絲繩透起者急治不爾便發搐搐則進退難瘥

非時奔色面色不定謂之奔色面色非時變易不定者是胎風有驚亦主客忤面色或青或白或黑不定者心腹疼痛

面部察色應病歌

兩腮肝肺位鼻準內斯脾正額爲心主頦間三腎隨有內斯形外觀之識病機面赤脣青者傷寒熱證推驚風青黑應脣臉所由知面黃多疾病瘧疾亦何辭白多應是瀉痢更慮雙眉面青肝有病春患最難醫舉金來尅木餘倣此推之

壽夭歌

身軟陽痿頭四破臍小臍高肉不就髮稀色嫩短聲啼遍體青筋俱不壽尻腫臏骨若不成能倨能行能立死臍深色老性尊持方是人家長命子

相眼神法

小兒病證或可畏若太衝有脈神氣未脫顖門未陷看顏色三關未至黯點者猶可著力雖然五臟六腑之精氣上注於目望而知之當先以目中神氣之全爲驗若目中神氣有者必不死目無神者必死

得病之源

大喜後乳食變驚癎喜屬心大喜後乳食則傷其心錢氏曰心主驚驚是癎也素問云暴怒傷陰暴喜傷陽孫眞人云傷陰則瀉傷陽則驚通眞子云喜後飲水傷三焦多成喘急

大哭後乳食多成吐瀉錢氏云哭屬肺大哭後乳食則傷肺肺氣逆則作吐瀉肺與大腸爲表裏故瀉也

大饑後乳食多成腹痛千金云饑人急食多成腹痛修眞祕云饑食過多成結積聚又云食不欲急急則傷脾扁鵲云急食久成痞塊面黃

大飽後飲水多成氣乏素問云飲多則肺布葉是故氣逆而上奔也故能生痰疾仙經云飽後迎風多成暴厥不醒如中風之狀也

大驚後乳食嘔吐心痛大驚後乳食則手少陰經受邪多成心痛抱村子云大驚乳食及飲水氣飾不通或吐逆翻胃百端經曰驚後飲水則傷心舌多成不語也

當風乳兒或嗽吐腹脹倉公曰小兒迎風飲乳風冷

入肺則令咳嗽寶鑑云風冷傷於乳令兒成嘔吐氣冷腹膨又經曰形寒飲冷則傷肺傷肺則咳嗽肺主氣氣傷則腹脹

夜露乳兒多成嘔吐修眞訣云夜露下乳兒冷乳入喉不散多成嘔逆寶鑑云天中餧乳氣逆停胷皆成嘔逆

正食便乳成疳黃口臭王氏云正食便乳令兒口臭牙中出血通眞子云乳食並飡令兒面黃口臭又能生痰癖

正汗便乳成心疳壯熱葛洪云汗者心之液正汗便乳則傷其心心傷則液散液散則皮膚燥成心疳壯熱

食熱麪乳兒多成龜胷孫兆云母食五辛令兒龜胷徐氏云食熱麪便乳兒久必成龜胷

食酸鹹炙煿乳兒成渴聖惠方云乳母恣食五辛炙煿厚味停積乳兒致兒臟腑生熱熱則煩躁生渴不止又云兒食醬肉渴飲水漿則成渴痢

醉臥當風乳兒失音乳母醉臥當風乳兒令兒失音抱朴子云乳母飲酒過度當風取凉乳兒風冷酒毒邪乳入喉故令兒失音不語也

嗽後飲乳成驚喘痰噎嗽後飲乳痰聚不散氣道不利關膈不通則成痰噎而驚喘

悲喜未定便乳成涎嗽孟氏云悲喜未定便乳兒必涎嗽引風寶鑑云悲喜未定飲水則逆其氣氣勝血血道行多成吐血

兒啼未定便乳生癭氣凡兒啼未定便以乳塞其口乳之令氣不得消散故結聚成癭也孟氏云兒啼未定肺竅開卽便乳兒與氣相逆氣凝結聚多成癭癧瘻癤也

無患歌

孩兒常體貌情態貌殊然鼻內乾無涕喉中絕響涎頭如青黛染脣似點硃鮮臉方花映竹頰綻水浮蓮喜引方纔笑非時手不宣縱哭無多哭雖眠不久眠意同波浪靜性若鏡中天此子多安吉何愁患病纏

聽聲驗病

樂記曰凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲相應故生變蓋人病蘊於內聲音顯然於外樂聲亂則五音不和人聲亂則五臟不和所以聽聲音驗人疾病也素問云視喘息聽聲音而知所苦是故周官云以五氣五色五聲視其生死孫眞人云五臟不和五聲不順五色不定必主病也三因方云觀五臟有餘不足喉之於聲中之守也中盛則氣盛中虛則氣弱故聲如從室中言氣之溫也言而微終日乃復言氣之奪也言語善惡不避親疎此神明之亂也聲音意不相續陰陽失守也故曰得守者生失守者死

諸病形狀

小兒驚哭聲沉不響者是病重醫難得效聲浮者輕調治便瘥頭額乾枯筋脈緊急脣外赤而內白有瘡痍而無津甚者兼驚而難痊斯爲熱之極矣眼赤是肝積熱怕明心肝有驚牙疳妳食之毒喫食不消是脾積冷耳聾是腎之虧胎癬是肺積風潮熱因驚而得或悲或歌是邪入脾口瘡肚脹疳積氣逆吐蟲胃與大腸積熱瘧疾是脾之傷開口睡是五臟毒盛多哭是驚風入肺愛喫泥土脾臟生蟲夜多盜汗是血虛有熱五心熱是疳勞停耳是腎經邪熱腹脹惡心是脾胃之積愛喫木炭是肝臟生蟲喫茶葉知爲心臟喫生米須識脾宮推之以理度之以意斯爲醫哲圓融

雜病歌

小兒雜病切須知不問童兒與女兒多睡只因肝是本心中積熱夜驚啼叫呼冷汗因蟲痛寒熱其中積在脾臉赤口瘡心肺壅虛風搐搦四肢垂冷滑傷脾或瀉痢如膿如血下無時積多肚大多掀水氣喘腮黃不問醫眼垂吐涎頭擺急莫教脈息慢微微甚笑愚人偏問鬼不求良藥苦求巫

雜證病機

急驚風眼喜張慢脾風眼喜閉啼而不哭是煩哭而不啼是躁張口出舌是風瞑目似睡不思乳食是虛腹痛盈盈是氣壅翻身伏臥是脾疾換手長揮聞言卽哭是實清涕流出肺經受寒搖頭硬頸三焦壅熱魚目定睛夜死面青脣黑晝亡

雜病不治歌

吐瀉生風眼上膜風在掌中抓不著急驚過了喘無休慢驚過了皮膚薄盤腸過了心中孤嗽吐嘔逆心凹惡傷寒赤脈青相交結熱面黑皮毛落痘子入眼眼不開熱泄出水口乾惡鎖口腰低脣黑青積痢脾毒脣捲縮此病因驚無有積豈有神仙留妙藥

戒輕易服藥

羅謙甫案一小兒五月間因食冷粉腹中作痛遂於市藥鋪中贖得神芎丸服臍腹漸加冷痛時發時止

踰七八年不已因思古人云寒者熱之治寒以熱良醫不能廢其繩墨而更其道也攻所傷之物寒也所攻之藥亦寒也重寒傷胃其爲冷病可知矣凡人之脾胃喜溫而惡冷況小兒血氣尚弱不任其寒故陽氣潛伏寒毒留連久而不除也治病必先其本當用和中養氣之藥以救前失服之月餘方愈嗚呼康子饋藥孔子曰未達不敢嘗此保生之重者也奈何常拱默而令切脈以謂能知病否且脈者人之血氣附行經絡之間熱勝則脈疾寒勝則脈遲實則有力虛則無力至於所傷何物豈能別其形象乎醫者不可不審其病源且此子之父不以病源告醫而求於市肆以致七年之病皆昧此理也孫眞人云未診先問最爲有準東坡云只圖愈疾不欲困醫二公之言有功於世大矣

小兒難醫於大人

夫醫之道誠爲難矣故治小兒爲尤難孫眞人云能醫十男子莫醫一婦人何也男子者榮衛氣壯婦人血脈相衝衆產又難爲治千金云婦人之病比男子十倍難療又云能醫十婦人莫醫一小兒何也婦人可以問病血氣尚全小兒言語不能精神未備切脈難憑故曰難治

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百二十五卷目錄

醫部彙考四百五
小兒診視門三
王肯堂證治準繩 察色 面上證 聽聲 脈應雜病 審脈逆順 死證
李梴醫學入門 觀形 察脈 成童脈法 用藥賦
小兒衛生總微論方 諸般色 渾紋證論 面目死生色 金匱死色 外臺死色 鼻上色 目內色 諸處狀候 諸紋總歌 諸般死證 通眞子死候歌 脈理論 死證脈 諸般病脈
董鳳翀活幼精要 幼科 聽聲歌 外證歌 雜病不治歌 一見生死歌 察色歌 血氣論 虛實論 形氣論
景岳全書 小兒總論 看毒夭法 脈法 聲音 顏色 診治大法 論時醫藥餌之誤
陳士鐸石室祕錄 兒科治法 又

藝術典第四百二十五卷

醫部彙考四百五

小兒診視門三

明王肯堂證治準繩

察色

古稱望而知之謂之神而小兒醫號爲啞科脈來駛疾難於指下分明尤以察色爲要故首叙之

夫嬰兒惟察其面部必有五色以知病源人身五體以頭爲首首中有面面中有睛睛中有神神者目中光彩是也隱顯橫衝應位而見以應五臟五色者青黃赤白黑五臟之色心赤肝青脾黃肺白腎黑五臟所主病證蘊於內必形色見於外故小兒有病先觀其本部形色以論其五行生尅吉凶形色若不相應然後聽聲切脈

面上證

左腮爲肝合左手關位肝膽之分應於風木爲初之氣

右腮爲肺合右手寸脈肺與大腸之分應於燥金爲五之氣

額上爲心合左手寸口心與小腸之分應於君火爲二之氣

鼻爲脾合右手關脈脾胃之分應於濕土爲四之氣

頦爲腎合左手尺下腎與膀胱之分應於寒水爲終之氣

赤者熱也黃者積也白者寒也青黑者痛也隨證治之

全嬰方云左頰屬肝東方之位春見微青者平深青者病白色者絕赤色主身熱拘急肝熱生風黑色主驚悸腹痛淺赤色主潮熱夜間發日中歇脣紅焦燥脈必緊數

右頰屬肺西方之位秋見微白者平深白者病赤色者絕淺色主潮熱或大便堅而氣粗壅急青白色主咳嗽惡心青色主風入肺時時咳嗽青黑色主驚風欲發或肚疼盤腸內釣

額上屬心南方之位火性炎上故居上夏見微赤者平深赤者病黑色者絕赤色主心經有風熱心燥驚悸睡臥不安青黑色主心中有邪驚風腹疼手足瘈瘲而啼叫青黑甚主心腹疼黃色主驚疳骨熱口渴皮毛乾燥夜多盜汗頭髮焦黃

鼻上屬脾中央之位故居中而四季見微黃者平深黃者病青色者絕赤色主身熱不思乳食深黃色主小便不通鼻孔乾燥氣粗鼻衄夜間多哭淡白色主泄瀉食不化青色主吐乳口鼻乾燥大小便不利

下頦屬腎北方之位水性潤下故居下冬見微黑者平深黑者病黃色者絕赤色主膀胱與腎爲表裏有熱則水道不利故小便癃閉

肝部所主睛中瞳人內藏其神外究五輪眶眩屬脾熱主生眵兩眥總心熱痛如鍼白屬肺家熱赤生砂黃屬肝臟昏瞀腎障中心瞳人腎熱不明眼忽眨竄發風發驚

心部所主顴面臉頰皆屬心位黑即沉困青即驚悸赤必發風白即疳氣虛黃衛積浮腫氣逆心絕何因大叫數聲過關不叫必作鴉聲加熱驚讝散熱清心

脾部所主脣口見病人中承漿四圍上下合曰脾鄉開口屬心心脾有熱脣裂舌瘡三焦積熱脣紅如血深紅重渴鵝口撮口木舌重舌脾肺熱就口內噴臭

脾腎氣寒色如死肝大驚一嚇口乾脣白常時積驚漸必傳心心氣不足令兒煩哭何知脾絕指甲皆黑目無神光定難用藥五種撮口驚風更惡爲不治證

肺部所主鼻準兩孔并連山根大小二眥肺部所存鼻孔黑煤即肺經焦黑煤如墨肺經即絕鼻中赤癢疳盛蛔長或流白涕腦寒困寐或流青涕傷風喜睡肺熱鼻塞因息吹得或感風寒亦閉關膈鼻爛即疳

鼻臭膿熱
腎部所主耳穴之前名曰耳花耳弦名輪輪裏名廓輪廓焦黑腎家虛熱其黑如炭腎絕死旦耳門生瘡衛積非常耳中膿出腎熱疳極臭名曰耳癰耳膿汁不止瘡癢如裂其候虛熱忽聽不聰心腎氣塞常作鬪聞熱氣上攻或如蟲刮榮虛衛熱耳輪如冰（更石耳後有紅絲）麻疹相侵耳輪紅熱傷寒是則熱極內痛腫氣相攻清心凉膈關竅通塞兒孩兩腎常虛無病切莫攻擊補更無益

聽聲

重實聲　重實雄聲體熱爲三焦氣塞在心脾傷風咳嗽喉咽痛結澼腸中糞出遲
悲焦聲　聲悲焦有躁恐怖欲生風重濁聲沉靜疳攻必耳聾
啼哭聲　但哭無聲只是驚多啼不哭痛分明聲輕顚嗄風癇病速緩聲頻吐瀉成
噫煎聲　噫煎煩躁病難安燥促聲音爲感寒語短氣微尿主澼長遲聲細痢多般
遲緩聲　語短聲遲緩腸鳴泄瀉頻嗄聲多不響風熱肺家因

脈應雜病

諸數脈　爲熱爲腑
諸遲脈　爲冷屬臟
陽數脈　主吐逆不吐必發熱
陰微脈　主泄瀉不瀉必盜汗
沉數脈　寒熱寒多熱少亦主骨蒸熱
緊數脈　寒熱熱多寒少又主骨熱急則驚痫
沉緊脈　心腹痛短數同亦主咳嗽
沉細脈　乳食不化亦主腹痛下痢
沉伏脈　爲積聚亦主霍亂
微緩脈　乳不化泄瀉沉緩亦同
微澀脈　奧瘀筋攣
微急脈　寒熱吐血
浮滑脈　宿食不消亦主咳嗽
浮緊脈　疳氣耳聾
浮弦脈　頭疼身熱
緊滑脈　吐血惡
心脈急數　驚病不驚者疳痲
肝脈急甚　顚癇風癇痰涎流液
肺脈浮實　鼻塞幷大小便不通
關脈緊滑　主蛔蟲尺脈沉亦主蛔
尺脈微細　溏泄冷痢乳食不化
尺脈微澀　便血無血者必盜汗
脈過寸口入魚際　主遺尿

審脈逆順

鶩搐脈　浮數順沉細逆身溫順肢冷逆
夜啼脈　微小順洪大逆身冷逆
心腹痛脈　沉細順浮大逆身溫順肢冷逆
傷寒脈　洪弦順沉細逆浮大順微伏逆
汗後脈　沉細順洪緊逆困睡順狂躁逆
溫病脈　洪大順沉細逆身熱順腹痛逆
咳嗽脈　滑浮順沉細逆身溫順肢冷逆
霍亂脈　浮洪順遲微逆身溫順肢冷逆
吐哯脈　浮大順沉細逆身溫順肢冷逆
泄瀉脈　緩小順浮大逆身溫順肢冷逆
諸痢脈　沉細順浮大逆身溫順肢冷逆
諸渴脈　洪數順微細逆身溫順肢冷逆
諸腫脈　浮大順沉細逆臟實順腸泄逆
腹脹脈　浮大順虛小逆臟實順泄瀉逆
痰喘脈　滑大順沉細逆身溫順肢冷逆
寒熱脈　緊數順沉細逆倦怠順強直逆
疳勞脈　緊數順沉細逆臟實順脾泄逆
蟲痛脈　緊滑順浮大逆身溫順唇青逆
諸失血脈　沉細順浮數逆身溫順發熱逆
中惡腹脹脈　緊細順浮大逆身熱順身冷逆
黃疸脈　浮大順沉細逆腹寬順泄瀉逆
火癰脈　浮洪順沉細逆身熱順身冷逆

死證

凡小兒顱腫顏陷汗出不流如珠如油舒舌出口舌腫發驚瀉黑黯血髮直如麻皮膚無血色此心絕也並壬癸日死
病重啼哭及病不哭下淚爪甲青黑眼深如陷舌捲囊縮發搐目斜連唇口動手如抱頭之狀或脚面直
素問云其華在爪其充在筋肝絕也並庚辛日死
人中滿人中黑唇縮反張唇焦枯燥唇乾紫黑唇不蓋齒血腫尿血舌縮或捲鼻孔張開齒禁冷涎如油
撮口如囊面如土色四肢逆冷如濕石之狀喫乳不收瀉糞赤黑脾絕也並甲乙日死
有熱嘱湯水幷藥食喉中鳴是胃脘直不能蔭肺此證醫書少有蓋累曾試之有驗並死不治
目直青鮮氣喘不回喫食噎噦痰涎塞口喉中鳴響

鼻塞不通鼻乾黑燥肺脹胃隔頭汗四肢冷此肺絕也並丙丁日死

面黑神昏眼黑眼睫目無光彩耳輪青黃焦枯疳牙齒落髮疎黃燥皮膚黑燥驚風咬乳戛齒洩屁黑色遶口此腎絕也並戊己日死

李梴醫學入門

觀形

察兒氣色

肝青心赤脾黃肺白腎黑凡病面無黃色不治春白夏黑秋赤冬黃者逆

先分部位左頰兮青龍屬肝

應春青爲有餘

右頰兮白虎屬肺

應秋白爲不足

天庭高而離陽心火

額也應夏色紅主大熱青乃肝風印堂青者人驚

紅白者水火驚紅者痰熱印堂連準頭紅者三焦積熱印堂至山根紅者心小腸熱小便青赤澀山根至鼻柱紅者心胃熱大小便澀

地閣低而坎陰腎水

頰也應冬色白腎虛承漿色青食時驚或煩躁夜啼黃多吐逆紅者腎中氣病兩顴赤者肺熱

鼻在面中

應四季準頭紅黃者無恙

脾應唇際

紅主渴蛔蟲咬心頭者唇必反人中候小腸喜深長惡平滿黑者瀉痢死凡五岳赤者皆熱淡白者皆虛陳氏五臟驚積冷熱詩曰肝驚起髮際肝積在食倉肝冷脣青白肝熱正眉當心驚在印堂心積額角荒心冷太陽位心熱兩頰裝脾驚正髮際脾積唇應黃脾冷眉中岳脾熱穴太陽肺驚髮際赤肺積髮際當肺冷人中見肺熱兩頤傍腎驚耳前穴腎積眼泡相腎冷額色紫腎熱赤食倉紅氣見而熱痰壅盛

印堂屬心紅色熱痰青黑驚痰黃青風痰

青色露而驚風怔忡如煤之黑爲痛中惡逆傳似橘之黃食傷脾虛吐利

右太陰文武臺皆青爲食傷亦有熱而脾虛吐利白乃疳勞

爲寒肺氣不利

紫爲熱熾

變黑者死

青遮口角難醫

驚狂

黑掩太陽不治

左太陽青驚輕紅色傷寒鼻塞變蒸壯熱黑青乳積右太陽青驚重紅色風抽眼目黑者死紅至太陰者內外有熱連文臺者熱極連武臺者漸生變證

年壽赤光多生膿血山根青黑額見灾危

年壽平者壽陷者天山根青黑必死黑色痢疾赤黑色吐瀉困倦黃色霍亂紅色夜啼紫色傷飲食

朱崔貫於雙瞳火入水鄉

朦朧熱毒黑睛黃者傷寒危證

青蛇遶於四白肝乘肺部

青爲肝風黃乃食積

瀉痢而帶陽須防疢嗽而拖藍可忌痙痛方殷面青而脣口撮驚風欲發面赤而目竄視火光焰焰外感風寒金氣浮浮中藏積滯乍黃乍白疳積連綿又赤又青風邪痰癖氣乏顱門成坑

紅色驚熱夜啼紅腫驚風痰熱前顱虛軟母氣血弱後顱不堅父精不實

血衰頭毛作穗

髮黃焦槁者腑熱肉折皮枯者死

肝氣眼生翳淚脾冷涎流滯頤

正口紅色爲平乾燥脾熱白主失血青黃驚積青黑者死

面目虛浮定腹脹而上喘眉毛頻蹙必腹痛而多啼

久病兩眉紅者夜啼紫色風熱赤紅者死皴者痢疾

風氣二池如黃土則爲不宜

風池紅有風痰將欲發搐氣池紅傷風有熱入裏

左右兩頰似青黛則爲客忤

黃色痰實紅主驚風赤者傷寒

風門黑主痂而青爲驚

紅主吐瀉

方廣光滑吉而昏黯凶

中庭天庭司空印堂額角方廣皆命門部位青黑爲驚風惡候亦忌損陷

手如數物兮肝風將發

將手抱頭者死

面若塗硃兮心火似炙坐臥愛煖風寒之入伸縮就冷煩熱之攻肚大脚小脾欲困而成疳目瞪口張勢似危而必斃噫五體以頭爲尊一面惟神可恃

小兒諸病但見兩眼無睛光黑睛無轉運目睫無鋒芒如魚猫眼狀或兩眼閉而黑睛矇昧者死或外若昏困而神藏於內不脫者生黑珠滿輪睛明者少病眼白多睛珠或黃或小者禀弱多病目證內赤者心熱淡紅者心虛熱青者肝熱淺淡者肝虛黃者脾熱無睛光者腎虛白而混者肺熱

況乎聲有輕重之不同

聲輕者氣也弱也重濁者痛也風也高喊者熱欲狂也聲急者神驚聲塞者痰聲戰者寒聲噎者氣不順喘者氣促噴嚏者傷風驚哭聲沉不響者重聲濁沉靜者疳積如生來不大啼哭聲啾唧者夭

啼有乾濕之頓異

直聲往來而無淚者是痛連聲不絕而多淚者是驚慈煎聲煩躁者難愈聲音燥促者感寒

病之初作必先呵欠

肝所主也面赤者風熱面青者驚風面黃者脾虛多腫者內熱心神不安者氣熱聲甕者傷風

火之大發忽然驚叫

乃火動氣虛必死夜半發者多有口瘡宜即看之藜藿不同於膏粱韋布自殊於綺絹雖由外以識中勿刻舟而求劍

察脈

額脈三指熱感寒俱冷吐瀉臟不安食指若熱胷中滿無名熱者乳消難上熱下冷食中熱夾驚名中指

詳看食指風氣命三關

男左女右以左陽右陰故也然陰陽男女均有兩手亦當參驗左應心肝右應肺脾於此變通消息可也故有以左手紅紋似線者發熱兼驚右手紅紋似線者脾積兼驚三叉者肺熱風痰夜啼風關無脈則無病有脈病輕氣關病重命關脈紋短小而色紅黃外證又輕則無妨若直射三關青黑外證又重者死

五色惟有紅黃安

五色紅黃紫青黑由其病盛色能加變如紅黃之色紅盛作紫紅紫之色紫盛作青紫青之色青盛作黑青黑之色至於純黑者不治又白色主疳黃而不光者主脾困

淡紅寒熱青驚積

深青色或大小曲者四足驚赤色大小曲者水火飛禽驚紅色大小曲者人驚青帶黃者雷驚或紅或青如絲一直者是母傷食所致紫絲青絲或黑絲隱隱相雜似出不出主慢脾風

深紅疹痘是傷寒

赤紅傷寒痘疹空紅泄瀉

紋彎停食細腹痛

多啼乳食不消紋多則主氣不和紋亂者病久紋曲者風熱盛

紋麤黑射驚風頑

紋麤直射指甲必主驚風惡候紋黑如墨因重難治

懸針青黑水疳熱

青黑風關水驚氣關疳熱命關人驚多傳慢脾風不治餘倣此

魚刺青驚虛勞艱

又有此樣刺青色風關驚氣關虛勞

水字肺驚膈痰積

風關肺咳驚風或疳疾

乙字驚風盡屬肝

風氣二關

曲蟲疳積大腸穢

風關肝病氣關疳積

肝胃疳積總如瘕

氣關多吐

流珠膈熱三焦亂

紅點霍亂吐瀉腸鳴自利煩躁啼哭

長珠寒熱腹積團

腹痛夾積

來蛇乾嘔臟腑滯

左手則爲肝病

去蛇昏睡瀉潺潺弓反裏形感寒熱

頭目昏重心神驚悸倦怠四肢梢冷小便赤色

反外心神恍惚間

夾驚夾食風癇證候紋勢彎曲入裏者病雖重而證順猶可用力若紋勢弓反出外駸駸靠於指甲者斷不可回其有三關紋如流珠流米三五點相連或形於面或形於身危證尤甚

氣疳向裏風疳向外斜左傷風斜右傷寒雙鉤三曲傷冷硬脈亂如蟲疳蛔攢鎗形痰熱驚風搐雙字食

毒驚積難
孩兒三歲至五歲一指三關定其息浮洪風盛數多驚
浮緩傷風洪緊傷寒人迎緊盛傷寒氣口緊盛傷食急促虛驚
虛冷沉遲實有積脈緊如索是風痾沉緩須知乳化難腹痛緊弦牢實祕沉而數者骨中寒弦長多是腦干風
弦緊者氣不和
緊數驚風四肢掣浮洪胃口似火燒單細疳勞洪蟲嘔虛濇有氣更兼驚
有氣不和也驚神不守舍也
脈花多痢大便血變蒸脈亦隨時移伏遲寒嘔無潮熱
伏結爲物聚
前大後小童脈順前小後大必氣咽
大小不勻者鬼祟
四至洪來苦煩滿沉細腹中疼切切滑主蓐濕冷所傷弦長客忤分明說五至夜甚浮大煞六至夜細浮晝別純陽六至號平和
五至虛四至病三至脫七至八至病輕九至十至劇十一二至死
此是聖人傳妙訣
成童脈法
童卯脈全浮沉爲先浮表沉裏便知其源大小滑濇虛實遲數各依大人以審證治
用藥賦

幼科未載素問扁鵲始稱兒醫夾驚夾積是主出痲出痘尤奇
兒病與大科相同惟百病多夾驚夾積與出痲痘爲異耳
驚則利之涼之溫之辰砂龍腦救急積則消之化之下之紫霜白餅爲先風感傷寒羌活大青膏當煮痰喘咳嗽芎牛百部丸可爲生犀紫陽連翹飲能寬變蒸諸熱天乙觀音銀白散善調虛弱脾胃噫率醫十男子莫醫一婦人寧醫十婦人莫醫一小兒
小兒衛生總微論方
諸般色澤紋證論
經云小兒六歲以還者經所不載有病難治無承據之也詳之此謂嬰兒未能言者有病則無由問其所苦故無承據也若能言者必能問之小兒豈有六歲尚不能言者哉其不能言者惟一二歲兒也故先賢言嬰兒未能言者最爲幼小有病則肌膚未全寸關不辨變蒸交互氣血細微若憑診切實難明曉惟在觀其形色參其證候乃知病之所在者矣其觀視之法須要安神定志勿令情意惑亂不得於兒哭斷之時睡起之際則色不正矣須於辰時之後巳時之前夏卽未熱冬卽未温外色不稜內氣閑雅乃可向明而觀察之也聖濟經曰通識之士必察剛柔剪快視其盛衰虛實適以寒温平以陰陽病之輕重緩急隨證以治之不必苦於難治也諸所論察素難以執據今採其當者敘而次之
面目死生色
內經曰凡病面黃目青面黃目赤面黃目黑者皆不死聖濟經云脾眞爲本而面黃必生者以眞氣外榮故也若面青目赤面青目白面青目黑面黑目白面赤目青者皆死謂無脾色外榮而眞氣已絕故也
金匱死色
凡小兒病者有黑色滿面或繞口入口或延眉繞目或暗人中者皆死有青色延面連目入耳者死目無精光眼中有物如橫紅針者死
外臺死色
凡小兒病者面上有青黑色如紗蓋定從髮際至印堂者不以疾狀淺深六十日死至鼻柱者一月死至人中者十日死滿面者卽日死
鼻上色
聖濟經曰鼻端青爲腹冷黑爲水氣白爲無血黃爲智寒赤爲有風鮮明爲留飲
目內色
赤者心熱淡紅者虛熱青者肝熱淺淡者肝虛黃者脾熱無精色腎虛
諸處紋狀候
耳後完骨上有青脈如線三兩路臥不靜者此病疾候當刺掐破令血出以爲小治若自腫破者死候
手大指後白肉魚際之上有筋絡色青黑者胃中有寒赤黃者有熱赤青黑雜者寒熱若青而小短者少氣
叉手處手大指第二指之間虎口上有筋脈如線者看顏色曲直以訣其病若紋直者是驚曲者是傷沉隱爲風曲外有冷曲內爲食
歌曰虎口青紋直精知四足驚黑色元因水赤水火

飛禽淡紅人驚發鬱紫有傷寒外冷內焦食沉隱定風生長大疾須重短小得安平但看叉手處病候驗虛實

第二指上之二節名曰三關小兒有男左女右看之有八般筋脈紋狀以驗其病名曰八卦錦魚刺形主初驚在氣關主壯熱吐瀉在風關主初驚纔發在命關驚極難治歌曰

形如魚刺是初驚遍體如湯面色青吐瀉躁煩如似此通腸和氣便惺惺

垂針形主瀉痢在氣關主傷冷吐瀉在風關瀉傳驚風在命關驚傳慢驚風極候歌曰

形如懸針瀉利多發驚身熱定違和此病若變驚風慢命關已度是沉痾

水字形主肺驚在氣關逆痰咳嗽虛積在風關發驚喘哽涎在命關困不治歌曰

形如水字肺家驚虛積相傳面色青腸上有涎須與治命關若過更無寧

乙字形又曰中曲主食驚在氣關主食傷吐利在風關傳變風乙形屬肝肝刑於脾在命關傳慢脾風不治歌曰

形如乙曲病因肝眼慢驚啼喫瘧偏冷積爲傷傳變此慢脾風已度三關

去蛇形主內實外虛來蛇形主外實內虛蛇去來形內外俱虛此數樣皆曲蟲又曰曲蛇在氣關主疳積在風關主勞帶驚在命關不治歌曰

形如蛇曲病因深脾積疳勞又帶驚未過三關宜早治若過三關更莫論

長者弓形短者環形主疳積在氣關吐逆疳熱喫泥土在風關疳極羸瘦在命關不治歌曰

形如環弓疳氣黃好食泥土是尋常此病早求良醫治三關已到命飛揚

亂紋形主蟲痛在氣關主氣不和有蟲積食諸生物在風關主蟲咬心腹痛在命關病困極難治歌曰

紋亂縱橫蟲上尋晚夜啼號不可禁神佛求遍都無應安蟲取出得康寧

珠形此候不拘三關上下見者皆爲死候歌曰

流珠死候不須醫便是沉痾莫療之三關若見都休望安排後事更無疑

諸紋總歌

魚刺初驚候懸針瀉痢多水紋驚肺積乙樣是肝乱曲蟲驚疳病環弓一論過亂紋蟲咬其流珠病已痾諸般死證

病因汗出如珠不流頭毛上逆臂口估乾口鼻冷氣頭足相低臥正如縛四肢垂彈手足掌冷

通真子死候歌

顱陷脣乾目直視口中冷氣臥如癡身形強直手足軟掌冷頭低盡莫醫

脈理論

凡兒稟受臟腑氣血榮衛形體雖有生皆全然於未語之前變蒸之際則血氣未充膚革未固筋骨未堅脈狀未成若有病也難爲診切又難訪問是以先賢言嬰小之病難治者以無承據也故立其觀視形色之法焉兒自生積五百七十六日大小變蒸數畢則氣血榮精神異筋骨壯脈理全然後方可診切又能言問也或以謂小兒之脈與壯老不同者是不達診治之大體也凡脈之長短遲速在因形以別之不必拘於至數經言小兒脈多雀關要以三部爲主其脈小數小細者平也諸家所言其衆今擇其當者具之孫真人云小兒之脈固難分表裏今撮其要者不出數條其總目歌曰

小兒有病須憑脈一指三關定其息

小兒脈短難以布其三指以分三關也以一指診之

浮洪風熱數爲驚虛冷沉遲實有積

浮洪爲風秋得之曰平餘時得之主傷風寒頭疼壯熱或夜熱晝涼咳嗽嘔噴鼻塞清涕嘔逆不食歌曰

浮爲風分秋日平餘中風寒頭目疼壯氣夜極勇清涕嘔噴咳嗽吐食頻

洪脈爲熱夏得之曰平餘時得之主風熱痰盛身體溫壯瘡瘍血泄歌曰

洪爲應候夏時和餘須發熱壯溫多風壅作驚或瘡腫有時泄下血膿沱

數脈爲驚春得之曰平餘時得之主驚風抽掣脈數小者多睡惕跳直視怕怖盜汗非時咳牙吐舌微吐喘息脈數大者一兩日間必發搐搦也歌曰

數爲驚候春日長餘時小數睡驚揚喘息直視舌頻吐大數潮搐發沉痰

沉遲爲虛冷冬得之曰平餘時得之主脾胃虛弱泄瀉滑腸脫肛吐痢不止日漸危羸以成脾困或作疳勞歌曰

沉遲之脈冬日安餘時脾胃弱虛言泄瀉滑腸肛脫

出吐痢尪羸瘦變疳
實脈爲積滯四時得之皆主食傷積聚面黃腹脹髮焦煩渴吐哯腹痛歌曰
實脈含傷積滯言壯熱腹脹髮毛乾吐痢肚疼或爲癖四時無異一般看
寶鑑四時脈謂春弦夏洪秋浮冬沉四季緩各推其王相表裏以察其病假令春得弦而浮者病在表在腑爲陽爲順病則易治若得弦而沉者病在裏在臟爲陰爲逆病則難治餘時放之
王氏脈歌曰小兒乳後輒吐逆更兼脈亂無憂慮弦急之時被寒纏脈緩即是不消乳緊急細駛亦少苦虛濡邪氣驚風助痢下宣腸急痛時浮大之脈歸泉路
脈經曰小兒之脈駛疾一息七八至曰平不及曰損太過曰至
通眞子歌曰小兒三歲至五歲呼吸須將八至看九至不安十至困短長大小有邪干
又曰小兒脈緊是風癇沉脈須知乳化難腹痛緊弦牢實祕沉縮有熱在骨間

死證脈

脈來三動而止不見者死脈來速如弓弦硬直者死脈來瞥然不見者死歌曰
三動而止不來凶速硬如弦勁在弓瞥然至而反不見皆爲死脈定由宗

諸般病脈

脈弦者爲風寒
弦數者爲瘧
脈急者爲氣不和或爲客忤
脈緊者爲痛
緊數者驚癇
脈浮者爲風
浮緊者驚風
浮大者傷寒
浮虛者盜汗
浮數者風熱
脈伏者爲氣滯
脈緩脈細者皆爲冷爲乳不化
脈虛脈濡者爲虛弱爲驚
虛濡者慢驚風
虛緊者伏熱
脈沉重者爲有積
沉數者骨間冷一云骨間熱
沉遲者虛冷
沉緩者傷食
脈牢緊者癖聚
牢實者腸祕
心脈滿大肝脈小急者驚癇
心脈數小者疳痳
數急者熱
寸口脈直上直下者爲驚
寸口脈大小脈不勻亂者變蒸
左手寸口無脈心痛中熱嘔逆口瘡或咳嗽喉中哽聲頭汗出而熱此乳母食冷以乳兒所作也又脈亂者吐逆
右手寸口無脈胷滿短氣吐逆噫噦喉中響此乳母抱兒衝冒風寒所作也
凡脈如雀啄而緊者風癇
凡脈大小不依部次者惡候
凡小兒脈駛呼吸八至曰平九至曰病十至曰困
凡小兒脈虛者病亦虛（乾音也）脈實者病亦實（中子得也）故急驚脈促急慢驚脈虛微
董鳳翀活幼精要

幼科

小兒有疾最難醫口不能言辨是非惟在揣摩而測度聽聲察色採元微

聽聲歌

聲輕知氣弱重濁痛兼風長吁氣鬱熱呻吟命必終大叫多驚嚇搖頭神已空不語心經絕何須用藥攻

外證歌

肚熱脚冷傷積定脚熱額熱是感風肚冷脚熱驚所作瘡疹發來耳後紅

雜病不治歌

白膜遮睛上紅筋貫眼中牽抽長握手强直反如弓魚口頻舒舌鴉聲作齒齧要啼全不哭纔哭却無聲粘痰喉內響驚氣腹中鳴痢熱膿多聚傷寒汗不流久瀉精神脫大渴皮膚槁冷氣喘聲粗風牽天柱倒

一見生死歌

幼童脈氣辨何形一十四種甚分明抱著遍身不溫煖（血絕）四肢軃重哭鴉聲（胃絕）鼻乾黑燥目直視（脾絕）啼哭無淚瀉涎青（肝絕）撏眉摘眼爪甲黑顖門腫起忽成坑（筋絕）將口咬人魚口急脚直肚大見青筋（氣絕筋不收）上視

似覷如高物長吁出氣黑文行（血不落脈）喫乳不收舌出口（骨絕心絕）脣不蓋齒眼眶傾（絕絕）瀉痢多下黑黯血偏搐似笑沒心情（心絕）不問貴賤及男女救療十人無一生

察色歌

紅紫因風熱青黑病深沉白多元氣弱黃爲飲食傷脣紅知渴瀉青色命將亡面黑人難救良醫要審詳

血氣論

心爲血主肝爲血臟肺爲氣主腎爲氣臟血出於心血納於肝氣出於肺氣納於腎假如血痢五苓門冬行其心志巴豆大黃逐其積滯其病猶存血之所藏無以養也佐以歸芎則痢自止假如喘嗽枳桔薑桂以調其氣南星半夏以豁其痰終不升降氣之所藏無以收也佐以參芪則氣歸元病有標本治有先後心得之法不傳之妙在外爲標在內爲本外感治標須當發散內傷治本補瀉調停急則治標緩則治本治得標本萬無一損

虛實論

虛熱身溫面色青白口氣溫冷手心不熱兩便自利泄瀉多尿虛汗自出不可攻熱只宜溫補實熱面赤氣粗口熱煩渴脣腫便難掀衣頻啼暴叫在表宜汗在裏宜下便黃堅澀面黃頰赤脣燥口乾表裏俱熱得利勿補恐熱復作餘熱不退不用關心純用凉藥熱去寒起有熱除熱逢虛補虛見證隨宜莫執而醫

形氣論

觀形觀氣須要精詳先明部分細察盈虧隨宜用藥必見奇功額紅熱燥青主驚風印堂青現防驚作變忽然紅黑鬼祟來衝山根青露遭驚兩重若還赤色煩渴相攻重病脣紅決不可醫若還眼慢斷不相宜手足無紋開口閉眼髮直鴉聲神仙難治肝家無氣常宜腎水澄清肺準多光必懼兩顴火焰脣紅作渴頰赤饒驚眉頭鎖皺父母多憂

景岳全書

小兒總論

小兒之病古人謂之啞科以其言語不能通病情不易測故曰寧治十男子莫治一婦人寧治十婦人莫治一小兒此甚言小兒之難也然以余較之則三者之中又惟小兒爲最易何以見之蓋小兒之病非外感風寒則內傷飲食以至驚風吐瀉及寒熱疳癇之類不過數種且其臟氣清靈隨撥隨應但能確得其本而撮取之則一藥可愈非若男婦損傷積痼癡頑者之比余故謂其易也第人謂其難謂其難辨也余謂其易謂其易治也設或辨之不眞則誠然難矣然辨之之法亦不過辨其表裏寒熱虛實六者洞然又何難治之有故凡外感者必有表證而無裏證如發熱頭痛拘急無汗或因風搐搦之類是也內傷者止有裏證而無表證如吐瀉腹痛脹滿驚疳積聚之類是也熱者必有熱證如熱渴躁煩祕結癰瘍之類是也寒者必有寒證如清冷吐瀉無熱無煩惡心喜熱者是也凡此四者卽表裏寒熱之證極易辨也然於四者之中尤惟虛實二字最爲緊要蓋有形色之虛實有聲音之虛實有脈息之虛實如體質強盛與柔弱者有異也形色紅赤與青白者有異也聲音雄壯與短怯者有異也脈息滑實與虛細者有異也故必內察其脈候外觀其形氣中審其病情參此數者而精察之又何虛實之難辨哉必其果有實邪果有火證則不得不爲治標然治標之法宜精簡輕銳適當其可及病則已毫勿犯其正氣斯爲高手但見虛象便不可妄行攻擊任意消耗若見之不眞不可謂姑去其邪諒亦無害不知小兒以柔嫩之體氣血未堅臟腑甚脆略受傷殘萎謝極易一劑之謬尚不能堪而況其甚乎矧以方生之氣不思培植而但知剝削近則爲目下之害遠則遺終身之羸良可嘆也凡此者實求本之道誠幼科最要之肯綮雖言之若無奇異而何知者之茫然也故余於篇端首以爲言然非有察察之見者固不足以語此此其所以不易也

看壽夭法

看小兒法以聽聲爲先察色爲次凡聲音清亮者生有回音者生澀者病散而無出聲者不壽

忽然大聲而無病者須細看其身恐有瘡毒卽須治之

臍帶中無血者生臍帶銀白色者生短帶紫脹者於斷帶之後捻去紫血可保無虞

額皮寬者壽

卵縫通達黑色者壽初生下如水泡之狀者險

面轉微黃之色者吉

生下粉白花色必主臍風而死

生下皮寬肉瘦五六日頓肥者亦必有臍風之患

生下皮肉不光者死

泣不出聲者死

泣而無淚者死

舌如猪肝者死

口角上有紫色如蝦鬚者死
髮粗長者生細軟不放者死
陰物不起者死
陰囊不收者死白者死赤者死
無糞門者死按此條今時皆見有可治者古今醫統載有治法詳細此門醫案醫者值此必須詳究內外施治
臀肉不生者死
股肉不生者不壽
面無彩色者夭
臍帶短大紫色者夭
生下渾身銀白色者夭
生下有齒者大凶致傷父母不然必傷自身
生下未裹即撒尿者殺父母蕩家財在世一生勞苦

脈法

凡小兒形體既具經脈已全所以初脫胞胎便有脈息可辨故通評虛實論曰乳子病熱脈懸小者手足溫則生寒則死乳子病風熱喘鳴肩息者脈實大也緩則生急則死此軒岐之診小兒未嘗不重在脈亦未嘗不兼證爲言也自水鏡訣及全幼心鑑等書乃有三歲以上當察虎口寅卯辰風氣命三關之說其中之可取者惟曰脈從寅關起不至卯關者易治若連卯關者難治若寅侵卯卯侵過辰者十不救一只此數語乃於危急之際亦可用辨吉凶至若紫爲風紅爲傷寒青爲驚白爲疳及青是四足驚赤是水驚黑是人驚黃是雷驚之類豈此一線之色果能辨悉如此最屬無稽烏足憑也即今幼科所尚無不以此爲科套全不知脈而信口胡猜試問其心果亦有的確之見否茫然無據而欲以人子爲嘗試良可嘆也故凡診小兒既其言語不通尤當以脈爲主而參以形色聲音則萬無一失矣然小兒之脈非比大人之多端但察其强弱緩急四者之脈是即小兒之肯綮蓋强弱可以見虛實緩急可以見邪正四者既明則無論諸證但隨其病以合其脈而參此四者之因則左右逢源所遇皆道矣再加以聲色之辨更自的確無疑又何遁情之有此最活最妙之心法也若單以一脈鑿言一病則一病亦能兼諸脈其中眞假疑似未免膠柱實有難於確據者然法不可廢最所當察惟擇其得理者可耳

聲音

聲由氣發氣實則聲壯氣虛則聲怯故欲察氣之虛實者莫先乎聲音如內經諸篇有曰言而微終日乃復言者此奪氣也
有曰氣海有餘者氣滿胷中悗息面赤氣海不足則氣少不足以言
有曰心氣虛則悲實則笑不休
有曰手少陰虛則不能言
有曰內奪而厥則爲瘖此腎虛也
華元化曰陽候多語陰證無聲多語者易治無聲者難榮
凡此皆聲音虛實之辨故彼聖人者聞聲知情無所不達此聲音之學所以不可忽也

顏色

脈要精微論曰夫精明五色者氣之華也赤欲如白裹朱不欲如赭白欲如鵝羽不欲如鹽青欲如蒼璧之澤不欲如藍黃欲如羅裹雄黃不欲如黃土黑欲如重漆色不欲如地蒼五色精微象見矣其壽不久也
玉版論要篇曰色夭面脫不治百日盡已色見上下左右各在其要上爲逆下爲從女子右爲逆左爲從男子左爲逆右爲從
五色篇曰官五色奈何曰青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒是謂五官
又曰以色言病之間甚奈何曰其色麤以明沉夭者爲甚其色上行者病益甚其色下行如雲徹散者病方已
經脈篇曰凡診絡脈脈色青則寒且痛赤則有熱胃中寒手魚際之絡多青矣胃中有熱魚際絡赤其暴黑者留久痹也其有赤有黑有青者寒熱氣也其青短者少氣也
凡察色之法大都青白者少熱氣病主陰邪黃赤者多熱氣病主陽盛
青主風氣主肝邪主脾胃虛寒主心腹疼痛主暴驚傷心膽之氣主驚風當察兼色以分急慢
白主氣虛甚則氣脫主無火主脾肺不足白兼青者主慢驚主大小腸泄瀉
赤主火主痰熱主傷寒熱證主煩渴主急驚躁擾主閉結主陽邪喘促主癰瘍痘疹
黑屬水主陰寒主厥逆主痛極沉黑主危篤
黃主積聚主痞塊主脾病主脹滿主脾疳黃兼白者主脾寒脾弱主氣虛神怯黃兼青者主脾虛泄瀉主慢脾風黃兼赤者主疳熱

兩顴紲紅或作或止者當之面戴陽乃眞陰弱此非陽證也不得以熱赤同論

診治大法

凡小兒之病本不易察但其爲病之源多有所因故凡臨證者必須察父母先天之氣而母氣爲尤切如母多火者子必有火病母多寒者子必有寒病母之脾腎不足者子亦如之凡骨軟行遲齒遲語遲顖門開大疳熱脾泄之類多有由於母氣者雖父母之氣俱有所稟但母氣之應在近父氣之應在遠或以一強一弱而偏得一人之氣者是皆不可不察至若稍長而縱口縱欲或調攝失宜而自爲病者此又當察其所由辨而治之如果先天不足而培以後天亦可致壽雖曰先天俱盛而或父母多慾或撫養失宜則病變百端雖強亦夭此中幾圓理微貴在知常知變也

論時醫

小兒血氣未充亦如苗萼之柔嫩一或傷殘無不凋謝故平時最宜培植不可妄行消導其或果有食滯脹痛則宜暫消果有風寒發熱則宜暫散果有實熱痰火則宜暫清此不得不治其標也捨此之外如無暴急標病而時見青黃羸瘦或腹膨微熱溏泄困倦等證則由脾腎不足血氣薄弱而然而時醫見此無非曰食積痰火而但知消導尤尚清涼日消日剝則元氣日損再逢他疾則無能支矣此幼科時俗之大病有不可不察者也

藥餌之誤

小兒血氣未充而一生盛衰之基全在幼時此飲食之宜調而藥餌尤當慎也今舉世幼科既不知此大本又無的確明見而惟苟完日前故凡遇一病則無論虛實寒熱但用海底兜法而悉以散風消食清痰降火行滯利水之劑摠不出二十餘味一套混用謬稱穩當何其誕也夫有是病而用是藥則病受之矣無是病而用是藥則元氣受之矣小兒元氣幾何能無陰受其損而變生不測耶此當今幼科之大病而醫之不可任者正以此也又見有愛子者因其青黃瘦弱每以爲慮而詢之庸流則不云痰火必云食積動以肥兒丸保和丸之類使之常服不知肥兒丸以苦寒之品最敗元陽保和丸以消耗之物極損胃氣謂其肥兒也而適足以瘦兒謂其保和也而適足以違和耳卽如抱龍丸之類亦不宜輕易屢用余嘗見一富翁之子每多痰氣或時驚叫凡遇疾作輒用此丸一投卽愈彼時以爲神丹如此者不啻十餘次及其長也則一無所知疑然一癡物而已豈非暗損元神所致耶凡此尅伐之劑所以最當愼用故必有眞正火證痰熱乃宜肥兒丸及寒涼等劑眞正食積脹滿乃宜保和丸及消導等劑眞正痰火喘急乃宜抱龍丸及化痰等劑卽用此者亦不過中病卽止非可過也若無此實邪可據而誤見出入之病則多由虧損元氣悉當加意培補力是保赤之主倘不知此而徒以肥兒保和等名乃欲藉爲保障不知小兒之元氣無多病已傷之而醫復伐之其有不萎敗者鮮矣此外如大黃芒硝黑丑芫花大戟三稜蓬朮之類若非必不得已皆不可輕易投也

陳士鐸石室秘錄

兒科治法

兒科得其要無難治者今傳一法門使萬世小兒盡登仁壽法在先看氣色後看脈小兒有疾其顏色必鮮艷以鼻之上眼之中間中正精明穴上辨之色紅者心熱也紅筋橫直現於山根皆心熱也色紫者心熱之甚而肺亦熱也色青者肝有風也青筋直現者乃肝熱也青筋橫現者亦肝熱也直者風上行橫者風下行也色黑者風甚而腎中有寒色白者肺中有痰色黃者脾胃虛而作瀉黃筋現於山根不論橫直總皆脾胃之證止有此數色無他顏色故一覽而知小兒之病大人看脈于寸關尺小兒何獨不然但小兒不必看至數只看其數與不數耳數甚則熱不數則寒也數之中浮者風也沉者寒也緩者濕也濇者邪也滑者痰也如此而已七表八裏俱不必去看自知吾訣則脈訣亦不必讀也有止歇者乃痛也餘亦不必再談小兒證大約吐瀉厥逆風寒暑熱而已其餘痘疹癰無他病或心疼腹痛或有痞塊或有疔瘡可一覽而知也然而小兒之病虛者十之九實者十之一故藥宜補爲先今立三方通治小兒諸證第一方人參三分白朮五分茯苓一錢甘草一分陳皮二分神麴三分半夏一分此六君子加減也通治小兒脾胃弱病神效如傷肉食者加山楂五粒傷米食者加麥芽五分傷麵食者加蘿蔔子三分吐者加白荳蔻一粒去甘草加生薑三片瀉者加乾薑三分猶苓五分第二方治外感也或傷風傷寒或咳嗽或發熱或不發熱或頭痛或鼻塞或痰多或驚悸或角弓反張皆以此方通治之無不神效方用柴胡七分甘草

三分桔梗五分半夏三分黃芩三分白芍二錢白朮二錢當歸五分陳皮二分茯苓五分水煎服頭痛加蔓荊子三分心痛手不可按者乃實火也加梔子一錢按之不痛者乃虛火也加甘草八分貫仲五分廣木香三分乳香一分脅痛者加芍藥三錢腹痛者以手按之手按而痛甚者乃食也加大黃一錢按之而不痛者乃寒也非食也加肉桂三分乾薑三分有汗出不止者加桑葉一片眼痛而紅腫者乃火也加黃連三分白蒺藜一分喉痛者加山荳根三分第三方治虛寒之證夜熱出汗夜啼不寐怔忡久嗽不已行遲語遲龜背狗肚將成癆瘵等證方用熟地三錢山茱萸二錢麥冬二錢北五味五分元參二錢白朮二錢茯苓一錢薏仁三錢丹皮一錢沙參二錢地骨皮二錢水煎服倘兼有外感加柴胡五分白芍三錢白芥子一錢餘無可加減矣

又

山根之上有青筋直現者乃肝熱也用柴胡三分白芍一錢當歸五分半夏三分白朮五分茯苓一錢山梔三粒甘草一分水煎服有青筋橫現者亦肝熱也但直者風上行橫者風下行亦用前方多加柴胡二分加麥芽一錢乾薑一分有紅筋直現者乃心熱也亦用前方加黃連一二分麥冬五分去半夏加桑白皮三分天花粉二分有紅筋斜現者亦心熱也亦用前方加黃連二分蓋熱極於胃中也亦不可用半夏用桑白皮天花粉有黃筋現於山根者不必論橫直總皆脾胃之證或水瀉或上吐或下瀉或腹痛或不思飲食余定一方皆可服服之無不神效如皮黃即黃筋也方用白朮五分茯苓五分陳皮二分人參二分神麴一分麥芽二分甘草一分水二鍾煎半酒盡分二起服加淡竹葉七片有痰加半夏一分或白芥子二分或天花粉二分有熱如口渴者是加麥冬三分黃芩一分有寒者加乾薑一分吐者加白荳蔻一粒瀉者加豬苓五分腹痛者如小兒自家捧腹是須用手按之大叫呼痛者乃食積也加大黃三分積實一分如按之不痛不呼號者乃寒也加乾薑三分如身發熱者不可用此方予另立一方名萬全湯凡小兒發熱者毋論夜熱早熱晚熱用之無不神效

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百二十六卷目錄
醫部彙考四百六
小兒臟腑形證門
錢乙小兒直訣五藏虛實寒熱　五藏相勝證治
萬氏育嬰家秘五藏證治總論
幼科發揮五藏主病
魯伯嗣學嬰童百問五藏病治
薛氏保嬰撮要肝　心　脾　肺　腎
龔信古今醫鑑五藏生成　聽面部五藏形色歌
樓英醫學綱目五藏
徐春甫古今醫統五藏相通虛證　五藏克紀
王肯堂證治準繩五藏　五藏補瀉法
李梴醫學入門五藏形證
喬岳五藏絕歌心　肝　脾　肺　腎

藝術典第四百二十六卷
醫部彙考四百六
小兒臟腑形證門
宋錢乙小兒直訣
五臟虛實寒熱
心主驚實則叫哭發熱飲水而搐虛則困臥而悸心熱則合面睡或上竄咬牙者導赤散主之
心氣實而喜仰臥者瀉心湯主之
註按前證若心小腸實熱宜治以前藥若心脾血虛用五味異功散加當歸若因心血不足用秘旨安神丸治肝心血燥用柴胡梔子散若因肝心血虛用六味地黃丸若因脾虛食鬱生痰而鬲悸不安者宜用四君子以健脾神麴麥芽以消導山梔柴胡以清熱如用前方病氣雖去前證仍作急調補元氣或反甚急溫補元氣凡此多因姙娠厚味七情或小兒乳哺失宜或乳母飲食鬱怒所致病氣既見形氣已虛必當推其所因而以助胃壯氣爲主佐以治病之劑爲善餘倣此

肝主風實則面青目直叫哭壯熱項急煩悶虛則咬牙呵欠

肝熱則手尋衣領及亂捻物瀉青丸主之壯熱飲水喘悶瀉白散主之
註按前證若肝木實熱生風而自病肺金實熱而剋木者宜用前二藥以瀉其邪氣之實若肝經風熱而目直等證者用柴胡梔子散以清肝火加味四物湯以養肝血若腎虛而咬牙諸證者用六君子湯以健脾土六味地黃丸以滋腎水苟不審其證之虛實而妄用前藥則虛虛之禍不能免矣慎之

肝有風則目連劄得心熱則發搐或筋脈牽動而直視用瀉青丸以治肝導赤散以清心

肝熱則目赤或兼青發搐者亦用前二藥風甚則身反張強直用地黃丸以補腎瀉青丸以治肝
註按前證若肝經實熱而自病宜用瀉青丸若肝經血燥而自病宜用抑肝散腎水虛不能生肝者宜用地黃丸若脾土虛不能培木者宜用六君子湯凡肝經既病風火相搏則肝臟虧損若不固根本必變他證百出也

脾主困實則身熱引飲用瀉黃散虛則吐瀉生風用異功散

面白腹痛口中氣冷不思飲食或吐清水以益黃散溫補脾虛下利用調中丸

呵欠多睡者脾氣虛而欲發驚也
註按前證若發熱作渴喜冷飲食或泄瀉色黃睡不露睛屬形病俱實宜用瀉黃散疏導之若發熱口乾惡冷飲食或泄瀉色白睡而露睛屬形病俱虛宜用異功散調補之若脾氣下陷者補中益氣湯升補之寒水侮土者益黃散溫補之肝木剋土者六君柴胡平補之若目睛微動潮熱抽搐吐瀉不食宜用秘旨保脾湯凡小兒諸病先當調補脾胃使根本堅固則諸病自退

肺主喘實則悶亂氣急喘促飲水虛則哽氣出氣

肺熱則手掐眉目鼻面用甘桔湯主之

肺盛復感風寒則胷滿氣急喘嗽上氣先用瀉白散以清肺氣後用大青膏以散風寒

肺臟怯則脅白用阿膠散補之悶亂氣粗喘促哽氣者難治肺虛甚也
註按前證若腠理不密外邪所感而肺病者用清肺丸若脾胃氣虛不能相生而肺病者用六君子湯若脾胃氣實大腸不利而肺病者用瀉黃散若

心火炎爍肺金而肺病者用地黃丸

腎主虛若胎稟虛怯神氣不足目無睛光面白顯解此皆難育雖育不壽或更加色欲變證百出愈難救

瘈或目畏明下竄者蓋骨重而身縮也咬牙者腎水虛而不能制心火也皆用地黃丸

註按潔古先生云下竄者腎氣不足兩足發熱故不喜衣覆也蓋臍以下皆腎之所主緣心氣下行於腎部也所以宜用地黃丸壯水制火而補腎故凡此必待精血完固而後嫁娶庶可以免前患精血篇云男子精未滿而御女以通其精則五體有不滿之處異日有難狀之疾今小兒稟賦不足豈有不本於此哉

五臟相勝證治

肝臟病秋見肝强勝肺而肺怯也宜阿膠散以補肺益黃散以補脾瀉青丸以治肝

註按潔古張先生云肝勝肺則身熱發搐喘促氣短病見於申酉戌時此受所制而不能勝謂之眞强若心乘肝爲實邪壯熱而搐有力利驚涼驚二丸主之肺乘肝爲賊邪呵欠而搐無力以地黃丸補肝以瀉白散治肺肝乘脾爲賊邪多睡體重發搐瀉青丸主之腎乘肝爲虛邪悄寒呵欠而搐羌活膏主之大凡肝之得病必先察其肺腎然腎者肝之母金者木之賊非腎水不能相生必肺金鬼邪來剋故其源在肺先治其肺攻其鬼也其源在腎先補其腎滋其本也然後察其本臟之虛實而寒溫之從用誠滑伯仁先生亦云然

心臟病冬見心强勝腎甚則下竄不語當以地黃丸補腎以導赤散治心

註按潔古云若喘而壯熱此肺乘心也爲微邪用瀉白散若風熱相搏此肝乘心也爲虛邪用大羌活湯下大青丸吐瀉身熱此脾乘心也爲實邪用瀉黃散若恐怖畏寒腎乘心也爲賊邪用安神丸

大凡心臟得病必先調其肝腎爲心之鬼也肝氣通則心氣和肝氣衰則心氣乏此心病先求其肝清其源也五臟既病必傳其所勝則腎之受邪必傳于心故先治其腎逐其邪也若肝腎平和而心自病然後察其虛實而治之

肺病春見肺勝肝也以瀉白散治肺若目淡青或目赤者當發搐爲肝怯也以地黃丸補肝

註按潔古云肺病喘嗽氣盛見於寅卯辰時當補肝瀉肺若肺病久嗽宜補脾清心若心乘肺爲賊邪熱而喘嗽用地黃丸導赤散阿膠散若肝乘肺爲微邪惡風寇冒昏憒用羌活散若腎乘肺爲實邪惛寒咳嗽清利用百部丸若脾乘肺爲虛邪體重吐痰泄瀉咳嗽用人參白术散大凡肺之得病必先察心脾二臟治之若心火亢盛上炎燥肺而肺爲病宜抑心氣若肺氣不足腠理不密風邪所感宜先補脾氣若中焦痞實大腸壅滯熱氣上蒸宜先理脾氣若心脾平和則治其本經

腎病夏見水勝火腎乘心也甚則悸動發搐宣風散主之

註按潔古云心乘腎者爲微邪發熱不惡風寒用桂枝丸肺乘腎者爲虛邪喘嗽皮膚寒澀用百部丸肝乘腎者爲實邪拘急發搐身寒用理中丸脾乘腎者爲賊邪體重泄瀉惡寒用理中丸大抵五行之間惟腎一臟母盛而子反受邪然物之性有不可以一槩論者肺腎是也何則肺主氣肺有熱則熱得氣而上蒸不能下生於腎而腎受邪矣此腎之病源於肺也又有脾經之濕相刑於腎者法當解肺熱去脾濕若本經自病者宜滋補之

脾病見四傍皆做此治之順者易治逆者難治脾怯當面目黃五臟相乘隨證治之

註按潔古云凡脾之得疾必先察其肝心二臟之虛實而治之蓋肝者脾之賊心者脾之母也肝氣盛則賊邪勝心氣虛則脾氣虛故肝乘脾則風瀉而嘔茯苓半夏湯主之若心氣實而壯熱體重泄瀉羌活黃芩蒼术甘草湯主之若肺乘脾而咳嗽便祕飲食如常者煎檳榔大黃湯下葶藶丸若腎乘脾而惡寒泄瀉理中丸之類主之獨謂五臟之證相乘伏匿隱顯莫測然病機不離五行生剋制化之理況小兒未有七情爻因形體怯弱血氣未全故有五臟勝乘之病更當調治其母若專治其子多致誤矣

萬氏育嬰家祕

五臟證治總論

是病皆從五臟生不知臟腑亦徒然細將色脈相參合對證裁方治不難

五臟平和則病不生或寒暑之違和或飲食之失節則風傷肝暑傷心寒傷肺濕傷腎飲食傷脾而病生矣語其色則肝青心赤脾黃肺白腎黑也語其脈則肝弦心洪脾緩肺毛腎沉也語其證則肝主風心主驚脾主困肺主喘腎主虛也語其治則心肺脾三臟有補有瀉肝則有瀉無補腎則有補無瀉也色脈證治本諸五臟心中了了謂之上工

五臟之中肝有餘脾常不足腎常虛心熱爲火同肝論嬌肺遭傷不易愈

人皆曰肝常有餘脾常不足予亦曰心常有餘肺常不足有餘爲實不足爲虛內經曰邪氣盛則實眞氣奪則虛此所謂有餘不足者非經云虛實之謂也蓋肝之有餘者肝屬木旺於春春乃少陽之氣萬物之所資以發生者也兒之初生曰芽兒者謂如草木之芽受氣初生其氣方盛亦少陽之氣方長而未已故曰肝有餘有餘者乃陽自然有餘也脾常不足者脾司火氣兒之初生所飲食者乳耳水穀未入脾未用事其氣尚弱故曰不足不足者乃穀氣之自然不足也心亦曰有餘者心屬火旺於夏所謂壯火之氣也腎主虛者此父母有生之後稟氣不足之謂也肺亦不足者肺爲嬌藏難調而易傷也脾肺皆屬太陰天地之寒熱傷人也感則肺先受之水穀之寒熱傷人也感則脾先受之故曰脾肺皆不足

肝爲風木主生風形證昭然在目中雖然瀉之無用補少陽生氣與春同

肝者足厥陰風木也木生風故主風錢氏云肝主風實則目直視大叫呵欠煩悶項急虛則咬牙多欠氣熱則外生氣濕則內生此肝病之證也肝之竅在目故有病常以目候之如肝有風則目連劄肝有熱則目直視肝疳則白膜遮睛之類是也又肝主筋肝病則筋急爲項强爲搐搦牽引肝主怒病則性急大叫哭甚則卵腫俗呼氣卵是也肝在下焦熱則大小便難肝藏魂肝熱手尋衣領胡亂捻物甚則提空摸牀此喪魂之病也

肝病錢氏有瀉青丸一方而無補者謂其氣有餘也然肝乃少陽之氣所以養生者也肝無病固不可瀉以伐生氣亦不可補以助長也

肝胆原來從火治木中有火無人識水不能勝虢龍雷惟有甘溫差可制

肝胆之病從火治者木中原有火燧人氏傳云知空有火麗木則明此其驗也肝胆之火水不能滅寒不能勝又謂龍雷之火惟甘溫之劑如人參甘草之類可以制之也故曰甘能瀉火也內經曰辛以散之如川芎防風之類又曰辛甘發散爲陽以辛甘之藥合而用之所謂火鬱則發之此治肝病之大略也

肝熱以瀉青丸當歸蘆薈丸瀉之肝實同法肝虛以六味地黃丸補之肝乃腎之子虛則補其母也肝寒以溫胆湯及吳茱萸生薑之類

兒病目視物不轉睛或斜視不轉或目合不開或目開不合或哭無淚或不哭淚自出者皆肝絕也

心爲神舍易生驚色脈相逼惡熱侵實則避嫌惟瀉腑如虛叢脞要安神

內經曰心者君主之官神明出焉兒之初生知覺未開見聞易動故神怯而易生驚也錢氏云心主驚實則叫哭發熱飲水而搐虛則困臥悸動不安此心病之證也心主血脈色者血之萃脈者心之合也如色見紅潤脈來大數者此心氣有餘之象其兒易養如色見昏黯脈來沉細者此爲不足其兒多病難養此觀其形色脈以知其心中之虛實也心惡熱與風相搏則發搐故肝生風得心熱則搐也心屬火火盛則津液乾而病渴心藏神熱則神亂而臥不安喜合面睡臥者心氣熱則胷中亦熱欲言不能而有就冷之意故合面臥心氣實則氣上下行澁合面則氣不通故喜仰臥有勞其身而直伸者謂之上氣亦心熱也

舌者心之苗熱則舌破成瘡又爲重舌木舌舌長出不收之病內經曰諸痛癢瘡皆屬於心火兒病瘡丹斑疹尤纏虎帶蟲疥瘭瘡皆心火之病也

錢氏治心熱病以導赤散夫導赤乃瀉小腸之藥也心爲君主不可犯之瀉其腑者以避嫌也心虛則主不安故以安神丸補其臟也

心爲君主豈容邪客熱來侵事可嗟瀉實補虛有成法何須方外覓靈砂

心爲火臟常苦緩散而不收孫眞人立生脈散夏月服之以五味子之酸能收耗散之氣也治兒心病者擴而充之可也故心熱病生於內者宜導赤散瀉心湯東垣安神丸之類生於外者如口舌生瘡洗心散主之心氣虛者錢氏安神丸虛易驚者琥珀抱龍丸內經曰以苦瀉之黃連是也以鹹補之澤瀉車前子是也神氣浮越多驚悸者宜硃砂赤石脂龍骨以鎮之如心病久汗出髮潤或舌出不收或暴啞不語或神昏憒亂或斑疹變黑此皆心絕之候不治

幼科方中脾病多只因乳食致沉痾失餒失飽皆成疾寒熱交侵氣不和

內經曰脾胃者倉廩之官謂爲水穀之所聚也兒之初生脾薄而嫩乳食易傷故曰脾常不足也錢氏云脾主困實則困睡身熱飲水虛則吐瀉生風此脾病之證也脾屬土其體靜故脾病喜困土主濕濕傷則腫爲脹爲黃爲吐瀉不止則成慢驚風內經曰土

氣之下木氣承之土爲坤土坤爲腹故脾病則腹中痛脾疳則肚大筋青也脾之竅在口唇脾有風則口喎唇動熱則口臭唇瘡寒則口角流涎謂之滯頤氣不和則口頓撮脾主舌本熱則吐舌弄舌脾主肉脾虛則瘦大肉折脾主味脾虛則不喜食脾熱則食不作肌膚傷於食則成積積久則成癖脾主津液脾熱則口乾飲水虛則津液不生而成疳也

脾與胃異同論蓋胃受穀脾消穀也調其脾胃者當適其寒溫節其飲食也故飽則傷胃餓則傷脾熱則傷胃寒則傷脾

胃愛清涼脾愛溫難將脾胃一般論陰陽相濟和爲貴偏熱偏寒不可患

脾喜溫而惡寒胃喜清凉而惡熱喜惡不同故難拘一法也蓋脾胃屬土居中以應四傍其立法也必四氣俱備五味調和而後可四氣者謂寒熱溫凉也五味者謂酸苦甘辛鹹也辛甘溫熱爲陽酸苦鹹寒爲陰氣味合而服之謂之陰陽相濟得其中和之法也

如偏熱則傷胃偏寒則傷脾非中道也錢氏立方以益黃散補脾東垣老人謂其偏熱而以異功散代之其慮深矣祖訓錢氏諸方法當遵守惟脾胃一條吾於脾熱者瀉黃散胃熱者人參白虎湯脾胃寒者理中湯丸脾胃虛者異功散調元湯人參白朮散養脾丸傷食者消積丸保和丸宿食成積者枳朴大黃丸濕勝者胃苓丸欲成疳者肥兒丸已成疳者集聖丸此吾家祕之法也不可輕泄

如脾病久大肉消削肚大青筋或口噤不開或脣口開張或遍身虛腫或脚背腫眼下胞腫或吐瀉不止飲食不入或睡則露睛口開不合或多食而瘦口饞喜唉甜物或蟲出於口或唇瘡而縮此皆脾絕之證也不可治

肺爲嬌臟原主氣寒熱蒸侵其氣逆熱壅胷高喘不寧虛羸氣短難報息

肺最居上爲臟腑之華蓋口鼻相通息之出入氣之升降必由之路故主氣錢氏云肺主喘實則悶亂喘促有飲水者有不飲水者虛則哽氣長出氣此肺病之證也難經曰形寒則傷肺兒之衣太薄則傷寒內經曰熱傷肺兒衣太厚則傷熱寒熱傷肺則氣逆爲喘爲咳鼻者肺之竅肺受風則噴嚏鼻流清涕受寒則鼻塞呼吸不利受熱則鼻乾或爲衄血肺疳則鼻下赤爛肺主皮毛肺虛則皮乾毛焦病喘咳者喘不止則面腫咳不止則胷骨高謂之龜胷交鷺者死證也肺屬金其體燥病則渴不止好飲水謂之鬲消

眞鬲肺氣與天通藥用清湯以類從肺實麻黃葶藶瀉白阿膠虛補有奇功

內經曰天氣通於肺輕清爲天清陽出上竅本乎天者親上也故治肺病者宜用辛甘升浮之藥如苦酸必用酒炒使上升也錢氏立方肺實者以瀉白散葶藶丸虛者以阿膠散祖訓云其法太簡肺主喘咳因於寒者麻黃湯爲主因於熱者以瀉白散肺熱在胷者以東垣凉膈散渴飲水者人參白沙湯咽喉痛者甘桔牛蒡子湯咳有痰者玉液丸肺虛甚者調元湯肺乃脾之子虛則補其母也或單以生脈散其法始備

如肺久病咳嗽連綿喘息不休或肩息或龜胷或咳血不止或欬而驚或鼻乾黑燥或鼻孔張開而喘或瀉利不休大吼如筒或面目虛浮上喘氣逆此皆肺絕之候不治

天一眞精聚命門人無天脉木無根內行骨髓宜堅固一水難勝二火焚

腎屬水乃天一眞精之所生也人之有腎由木之有根其脈在尺腎之虛實以尺脈候之命門在腎之間爲元氣聚會之處兒之強弱壽夭尤係於斯全主實無虛也腎氣不足則下竅蓋骨重惟欲下墜而縮身腎水陰也腎虛則目畏明兒本虛怯由胎氣不成則神不足目中白睛多其顴即解邑見白此皆難養或有因病而致非腎虛也此屬病之證也腎主骨腎虛者骨髓不滿也兒必畏寒多爲五軟之病尻骨不成則不能坐髕骨不成則不能行齒乃骨之餘骨不餘則齒生遲腎之液爲血髮乃血之餘腎虛則髮希不黑腎之竅在耳腎虛則耳薄熱則耳中出膿腎主齒熱則生疳即走馬疳也

腎開竅於二陰腎熱則大小便不通腎冷則小便下如米泔二火者乃君相火也經曰一水不勝二火正此謂也

陰常不足腎常虛筋骨難成貌必癉錢氏立方惟有補經云癉疹瀉其餘

水爲陰火爲陽一水不勝二火此陽常有餘陰常不足腎之本虛也明矣故錢氏只用補腎地黃丸一方不敢瀉者因無實證也或謂痘疹腎不可實當瀉之此言甚謬蓋腎主液痘中之血化爲水水化爲膿皆腎之津液所化也若無腎水則癉枯黑而死矣豈可

瀉之痘疹曰歸腎者蓋瘡疹之毒內發於骨髓外發於皮毛者爲順變黑復陷入於骨髓之中故爲害此非順之爲害也乃火旺水衰之病錢氏以百祥丸牛李膏治黑陷者以瀉腎中之邪非腎中之眞陰也詳見痘疹心要腎熱大便不通者宜以猪膽汁導之猪者水畜也小便不利者宜五苓散瀉其膀胱腑也東垣滋陰丸以瀉腎火如腎病久身下瘡目中如見鬼狀或骨委弱臥不能起或二便遺失皆腎病之候不治

本臟自病論精神補瀉分明有定方若是相傳作兼病更宜通變互提綱

按難經有五邪之論論本臟自病者爲正邪自前來者爲實邪自後來者爲虛邪自所勝來者爲微邪自所不勝來者爲賊邪此以五行生尅之理論也錢氏所論肝主風心主驚脾主困肺主喘腎主虛此皆本臟自病者謂之正邪故立五補六瀉之方以主之潔古先生乃取難經之言以明五臟傳變之證補錢氏之所未及者其法始備故風傷肝熱傷心濕傷肺寒傷腎飲食勞倦則傷脾此五臟自受之邪爲本病也如肝主風其中風者本病也謂之正邪由傷熱得之乃心乘肝自前來者爲實邪由傷濕得之乃腎乘肝自後來者爲虛邪由飲食勞倦得之乃脾乘肝自所勝來者爲微邪餘臟倣此詳見四十九難潔古論其治五臟之法如肝臟自病只治其肝宜瀉青丸若心乘肝者宜以導赤瀉心實則瀉其子也腎傷肝者宜以薑附四逆湯補腎虛則補其母也肺傳肝者宜以瀉白散瀉肺地黃丸補肝先補而後瀉也脾乘肝者宜調元湯以益脾制肝餘倣此推之其餘方法不必拘定會而通之可也是皆治其初得之病也

又有一臟之病而傳別臟者謂之兼證當視標本之緩急而治之先見病謂之本緩後見病謂之標急如大小便不通或吐瀉不止或咽喉腫痛飲食不入或心腹急痛之類雖後得之當先治之故曰急則治其標也如無急證只從先得之病治之以後病之藥隨其證而加治之所謂緩則治其本也

大抵嬰兒脾病多只因乳食欠調和卻他臟病須調胃若到成疳受折磨

胃主納穀脾主消穀儻則傷胃飽則傷脾小兒之病多過於飽也或母有氣實形壯者其乳必多求兒不哭縱乳飲之定乃傷於乳也母之氣弱形瘦者其乳必少恐子之哭必取穀肉糕菓之類嚼而哺之不飽不止定乃傷於食也故小兒之病胃最多也五臟以胃氣爲本賴其滋養也胃者中和之氣也非若五臟之偏也如五臟有病或瀉或補愼勿犯其胃氣胃氣若傷則不食而瘦或善食而瘦疳病成矣不可治經曰全穀則昌絕穀則亡誠醫科之龜鑑也

幼科發揮

五臟主病

此因五臟氣動所生之病乃病生於內者也

肝主風實則目直視呵欠大叫哭項急煩悶虛則咬牙呵欠氣溫則內生風氣熱則外生風也氣謂口中氣也實則瀉青丸當歸龍膽丸瀉之虛則地黃丸補之

諸風搐搦牽引喎斜皆肝之病也宜瀉青丸主之

肝所生病諸風掉眩皆屬肝木脈訣云熱則生風是也

兼見心證則發熱而搐肝有風則目連劄小搐得心熱則搐肝有熱則目直視不搐得心熱則搐瀉肝用瀉青丸瀉心用導赤散主之

兼見脾證輕則昏睡不嗜飲食當視其大便何如大便祕者宜蜜導法愼勿下之恐下得脾虛反爲篤疾大便潤者宜琥珀抱龍丸主之

兼見肺證喘急悶亂痰涎壅塞須從大小便以利之如喘息有聲肩聳泡高喉中痰響者不治清寧散主之

兼見腎證暴啞失音手足强直此從風治輕者地黃丸主之重則爲廢疾而不可治矣

心主驚實則叫哭發熱飲水而猶虛則困臥悸動不安實則導赤瀉心湯虛則二安神丸服之

諸熱驚悸不安多啼此心臟本病也宜導赤散加朱砂主之甚者涼驚三黃瀉心丸主之

心所生病經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火

兼見肝證則發熱而搐宜木通散主之

兼見脾證則嗜臥夢中咬牙多驚宜錢氏安神丸主之

兼見肺證則發熱作搐而喘宜清寧散主之

兼見腎證爲驚癇發則忽然臥仆咬牙搐搦手足逆冷發過即醒精神恍惚益心藏神驚則傷神腎藏志恐則傷志小兒神志怯弱有所驚恐則神志失守而成癇矣如書傳所謂請僧寄名僧爲摩頂誦呪而兒被嚇而成癇後見穿皂衣人即發是也亦有驚久成

癇者初起即可治定志丸主之父母怠忽久而不治遂成終身之患

心火者君火也君務德而不爲毒爲痒痛瘡瘍者乃命門相火之所爲也小兒諸瘡皆胎毒也

脾主困實則困睡身熱飲水虛則吐瀉生風實則瀉黃散三黃丸主之虛則益黃散異功散小建中湯調元湯肥兒丸補之

諸困睡不嗜食吐瀉皆脾臟本病也昏睡身熱宜胃苓丸琥珀抱龍丸主之吐瀉有冷有熱冷者不渴理中丸主之熱者渴飲冷水五苓散調天水散主之

脾所生病經云諸濕腫滿皆屬脾土

兼見肝證初傷風吐瀉惡風發熱煩急煩悶此宜發散惺惺散主之如先吐瀉後變慢驚風者不治

兼見心證發熱昏睡夢中驚悸宜東垣安神丸主之渴欲飲水辰砂五苓散主之

兼見肺證發熱昏睡氣促而喘者宜葶藶丸主之

兼見腎證羸瘦瘇弱嗜臥不能起者宜脾腎兼補補腎宜地黃丸補脾宜養脾丸如瀉久便膿血者死蓋腎者元氣之主腎虛則稟賦不足之證脾者氣穀之主脾虛則爲津液不足之病故小兒五臟之病脾腎爲多肝心次之肺又次之

肺主喘實則悶亂喘促好飲水有不飲水者虛則哽氣長出氣實則瀉白散葶藶丸瀉之虛則阿膠散生脈散合甘桔湯補之

諸氣喘促上氣咳嗽面腫皆肺臟之本病也加味瀉白散主之桔梗防風二錢甘草一錢地骨皮一錢二分

肺所生病經云諸氣上逆喘逆皆屬於肺

兼見肝證由中風得之鼻流清涕惡風喘嗽宜發散加減參蘇飲主之如久咳嗽變風疾不治如錢氏所謂三瀉肝而肝病不退三補肺而肺證尤虛是也

兼見心證發熱飲水喘嗽悶亂此心火勝也宜涼膈散加知母石膏主之久嗽不止黃連阿膠丸黃連赤茯苓能抑心火肝得其清

兼見脾證咳則吐此傷乳食而喘嗽不寧宜葶藶丸小陷胃加大黃主之

兼見腎證腎者水臟也受五臟六腑之津液而藏之入心爲汗入肝爲淚入肺爲涕入脾爲涎入腎爲精凡咳嗽之多吐痰者乃腎之精液不歸元也宜補腎地黃丸主之加巴戟杜仲鹽水炒肉蓯蓉酒洗去甲小茴香炒破故紙炒研末蜜丸煎麥門冬湯下

腎主虛無實地黃丸主之惟痘疹腎實則黑陷此非錢氏之語乃記者之誤焉而不詳者也以啓後人之疑有瀉腎之方如百祥丸之類有補脾瀉腎之論令兒天札盡信書則不如無書也蓋人之一身肺主皮毛心主血脈脾主肌肉肝主筋腎主骨髓五臟之有腎猶四時之有冬也瘡疹之毒乃自骨髓出現於筋肉血脈皮膚之外如品物之斂聚於冬者發散而爲春之生夏之長秋之藏也變黑歸腎則不能發散於外而反陷於內此腎中眞氣之虛邪氣之實所以立百祥丸牛李膏以瀉腎中之邪氣非瀉腎之眞氣也兒腎中之水潤澤充壯由津液之充滿也瘡疹黑陷者正腎主虛水不勝火津液乾枯故變爲黑倒陷入裏所謂瀉之者瀉水救火之良法也

諸虛不足胎稟怯弱者皆腎之本臟病也五臟病後成腎虛者各用地黃丸加減隨證惟瘡疹歸腎有瀉有補

腎所生病錢氏曰腎主虛即胎稟不足之病也

兼見肝證驚風及手足癱者宜地黃丸加牛膝當歸續斷各一兩肉桂一兩爲末蜜丸用

兼見心證驚風及失音不語者宜地黃丸加石菖蒲柏子仁遠志各二兩爲末蜜丸服

兼見脾證吐瀉及變痢疾者宜地黃丸加黃連黃檗各酒炒二兩乾薑炒車前子肉荳蔻炒各一兩爲末蜜丸服

兼見肺證咳嗽痰中有血宜地黃丸加天門冬麥門冬焙知母黃檗蜜水炒阿膠炒各二兩蜜丸服

按五臟虛實補瀉之法引經解之經云邪氣盛則實眞氣奪則虛所謂實則瀉之者瀉其邪氣也虛則補之者補其眞氣也如眞氣實則爲無病兒矣豈有瀉之者乎云肝常有餘脾常不足者此却是本臟之氣也蓋肝乃少陽之氣兒之初生如木方萌乃少陽生長之氣以漸而壯故有餘也腸胃脆薄穀氣未充此脾所以不足也

小兒五色修明聲音清響此心肺之氣足也乳食能進大小便調此腸胃之氣足也手足和暖筋骨剛健此皆腎肝之氣足也是謂無病易養不宜妄投藥餌誅罰無過也

如面色晃白聲音微小此心肺不足也乳食減少吐痢頻併此腸胃不足也解顱項軟手足痿弱此肝腎不足也是兒多病難養此以形體之虛實辨五臟之

強弱也有病者各宜隨五臟之虛實按方治之

魯伯嗣學嬰童百問

五臟病治

治療之法大抵肝病以疏風理氣爲先心病以抑火鎮驚爲急脾病當溫中消導肺病宜降氣清痰腎病則補助真元斯得其治法之大要也

假如肺病又見肝證咬牙多呵欠者易治肝虛不能勝肺故也若目直大叫哭項急煩悶者難治蓋肺病久則虛冷肝强實而反勝肺也宜視病之新久虛實虛則補母實則瀉子

肝外主感風呵欠煩悶口中氣熱當發散大青膏主之若能食飲水不止當大黃丸微下餘不可下肝熱手尋衣領及亂捻物瀉青丸主之壯熱飲水喘悶瀉白散主之肝病勝肺肝病秋見肝强勝肺肺怯不能勝肝當補脾治肝益脾者母令子實故也補脾益黃散治肝瀉青丸肝有風目連眨不搐得心熱則搐治肝瀉青丸治心導赤散主之肝有熱目直視不搐治同上法肝有風甚身反張强直不搐心不受熱也當補腎治肝補腎地黃丸治肝瀉青丸主之凡病或新或久皆引肝風之動而動止於頭目目屬肝風入於目上下左右如風吹不輕不重兒不能任故目連眨也若熱入於目牽其筋脈兩眥俱緊不能轉視故目直也若得心熱則搐以其子母俱有實熱風火相搏故也肝病見秋木旺肝强勝肺也宜補肺瀉肝輕者肝病退重者脣白而死

心熱視其睡口中氣溫或合面睡及上竄咬牙皆心熱也導赤散主之心氣熱則心胃亦熱欲言不能而有就冷之意故合面臥心氣實則氣上下行澁阻滯則不得遍故喜仰臥則氣得上下通也瀉心散主之

心病見冬火旺心强勝腎當補腎治心輕者病退重者下竄不語腎怯虛也

脾胃不和面見白無精光口中氣冷不思食吐水當補脾益黃散主之脾胃虛冷面見白色瘦弱腹痛不思食當補脾益黃散下痢者調中丸主之傷風手足冷脾臟怯也當和脾後發散和脾益黃散發散大青丸主之脾病見四旁皆倣此治之順者易治逆者難治脾怯當面赤黃五臟相反隨證治之

肺盛復有冷風胃滿短氣氣急喘嗽上氣當先散肺後發散風冷散肺瀉白散主之肺只傷寒則不胃滿肺熱則手掐眉眼鼻面甘桔湯主之肺虛熱脣深紅色治之散肺虛熱少服瀉白散肺臟怯脣白色當補肺阿膠散主之若悶亂氣粗喘促哽氣者難治肺虛損故也脾肺病久則虛而脣白脾者肺之母也母子皆虛不能相管故曰怯肺主脣白而光澤者吉白如枯骨者死肺病春見肺鞕勝肝當補腎肝治肺臟肝怯者受病也補肝腎地黃丸治肺瀉白散主之肺病見春肺旺勝肝當瀉肺輕者肺病退重者目淡青必發驚更有赤者當攝爲肝怯當目淡青色也

腎虛兒本虛怯由胎氣不成則神氣不足目中白睛多其顱即解顱開面色恍白此皆難養縱長不過八八之數若恣於色慾多不過四旬而亡或有因病而致腎虛者非此論也又腎氣不足則下竄蓋骨重惟欲墜下而縮身也腎水陰也腎虛則畏明皆宜補腎地黃丸主之腎病見夏水勝火腎勝心也當瀉腎輕者病退重者悸動當攝也

薛氏保嬰撮要

肝

錢仲陽云肝主風實則目直大叫項急煩悶虛則咬牙呵欠氣熱則外生風氣溫則內生風大青膏散之若能食飲水不止用大黃丸微下之肝熱則目直不攝手尋衣領及亂捻物瀉青丸主之壯熱飲水喘悶瀉白散主之肝病秋見肺怯不能勝肝也當用益黃散補脾瀉青丸治肝肝有風則目連眨得心熱則攝用瀉青丸治肝導赤散治心甚則身反張目直不攝心不受熱也當用地黃丸補腎瀉青丸治肝脣白者不治又張潔古云肝主風自病則風攝拘急若心乘肝爲實邪肺乘肝爲賊邪腎乘肝爲虛邪凡肝得病必先察其肺腎肺者肝之母肺者肝之賊今肝之得病若非腎水不能相生必是肺金鬼邪來尅故其來在肺先治其肺攻其鬼也其來在腎先補其腎滋其源也然後審其本臟之虛實而寒溫之竊謂前證若肝經實熱而外生風者宜用大青膏散之若既服而前證仍作益甚者此邪氣已去而脾氣虧損也宜用異功散加芎歸補之若肝經虛熱或因尅伐而內生風者宜用異功散地黃丸補之若風邪入臟能食飲冷大便祕結者此邪氣內實也宜用大黃丸下之若既下而食少飲湯或腹作脹者此脾氣內虛也宜用白朮散補之氣血素弱或因病後或服攻伐之劑而手尋衣領咬牙呵欠目淡青者乃肝經虛甚也急用地黃丸以補腎肝咳氣短氣長出氣乃肺經虛甚也急用異功散以補脾肺若申酉時叫哭直視呵欠煩

悶項急驚悸手足搖動發熱飲水者此風火相搏而勝肺金也用柴胡梔子散以治肝火生肝血用異功散補脾土生肺金若脣白者爲脾絕不治夫嬰童之證多因姙娠厚味七情或兒乳哺失宜或乳母飲食鬱怒所致病氣既見形氣已虛當推其所因用藥加減庶以治其母兒飲一二是後做此

心

錢仲陽曰心主驚實則叫哭發熱飲水而搐虛則困臥驚悸不安又云熱則睡中口氣溫及上竄咬牙而合面臥有就冷之意皆心熱也導赤散主之若仰面臥者乃心氣實氣不得上下流通也瀉心散主之心病冬見火勝水也當補腎治心輕者病自愈下竄不語者腎虛怯也又張潔古云心主熱若肺乘心爲微邪肝乘心爲虛邪脾乘心爲實邪腎乘心爲賊邪凡心臟得病必先調其肝腎肝氣通則心氣和肝氣滯則心氣乏此心病先求其肝清其源也五臟受病必傳其所勝腎之邪必傳於心故先治其腎逐其邪也若肝腎脈俱和然後察其心家虛實治之竊謂仰面臥者因其心胷實熱故喜仰面而向虛也合面臥者因心胷虛熱故喜合臥而就實也實則調治心肝虛則調補脾肺二者別之盡其狀矣其咬牙等證多有雷同不必拘泥如用瀉心導赤等劑邪氣雖去而病仍作當調補元氣或反其急溫補元氣其心氣冬見或亥子時病益甚或下竄不語者乃腎水虛而心火甚也用地黃丸其乳下嬰兒須母服之

脾

錢仲陽云脾主困實則困睡身熱飲水或不飲水虛則吐瀉生風脾胃虛寒則面見白目無精光口鼻氣冷肌體瘦弱吐水腹痛不思乳食用益黃散下利用調中丸傷風手足冷者脾臟怯也先用益黃散補脾後用大青膏發散脾病見四季皆做此順者易治逆者難治脾怯當面赤黃若兼五臟相勝隨證治之又張潔古云脾主濕自病則泄瀉多睡體重昏倦若肝乘脾爲賊邪心乘脾爲虛邪肺乘脾爲實邪腎乘脾爲微邪凡脾之得病必先察其肝心二臟蓋肝是脾之鬼心是脾之母肝氣盛則鬼邪有餘心氣虧則生氣不足當用平肝氣益心氣若診其脈肝心俱和則脾家自病察其虛實而治之竊謂前證實者病氣實而形氣虛也若面色見白吐瀉腹痛口鼻氣冷屬寒水侮土宜用益黃散若面青唇黯吐瀉手足並冷此脾土虛寒用乾薑理中湯若面色痿黃手足並冷吐痰咳嗽吐瀉腹脹此脾肺氣虛用五味異功散實脾氣加防風升麻散外邪若發於寅卯之時用六君柴胡升麻補脾土平肝木然面黃者脾之本色也面赤者火生土爲順面青者木剋土爲逆當平其所勝以補元氣爲善

肺

錢仲陽曰肺主喘實則悶亂喘促或飲水虛則哽氣出氣短氣若肺盛復感風寒則胷滿氣急喘嗽用瀉白散肺熱則手掐眉目鼻面用甘桔湯肺虛熱則唇色深紅少用瀉白散肺怯則唇色白用阿膠散若悶亂氣粗喘促哽氣者難治肺病久唇白者此脾肺子母皆虛也若白如猪脂者吉白如枯骨者死如肺病春見肺勝肝也用地黃丸補肝腎瀉白散以治肺目淡青必發驚更有赤者當攝爲肝怯也又張潔古云肺主燥自病則喘嗽燥則潤之若心乘肺爲賊邪肝乘肺爲微邪腎乘肺爲實邪脾乘肺爲虛邪凡肺之得邪必先觀心脾二臟之虛實若心火燥金當抑心滋肺若脾氣虛冷不能相生而肺氣不足則風邪易感宜補脾肺若脾實中痞熱氣上蒸於肺宜瀉脾氣若心脾平和而肺自病當察虛實治之竊謂肺經鬱熱用瀉白散肺氣自虛用四君子湯外邪所乘用參蘇飲心火炎燥用人參平肺散中焦實痞用大承氣脾不能生肺用異功散夫肺氣盛者肺中之邪氣盛也其脈右寸必浮而有力宜用瀉白散以瀉之若肺虛而有熱者執肺熱傷肺之說而不用人參誤矣仍參某證治之

腎

錢仲陽曰腎主虛無實證惟疳瘡實則黑陷當更分別證之虛實假如肺病又見肝證咬牙呵欠者易治肝虛不能勝肺也若目直視大叫哭項急煩悶者難治蓋肺病虛冷肝強實而勝肺也視病新久虛實虛則補其母實則瀉其子夫腎虛者由胎氣不盛則神短頤開目多白睛面色見白此皆難養縱長不過八八之數若恣色慾不及四旬而亡或有因病而致腎虛者又云腎氣不足則下竄蓋腎虛骨重惟欲墜下而縮身也腎水陰也腎虛則目無睛光畏明皆用地黃丸腎病見夏水勝火也輕者病自退重者當驚發搐又張潔古云腎主寒自病則足脛寒而逆腎無實瘡疹黑陷乃實是水制火也若心乘腎爲微邪肺乘

腎爲虛邪肝乘腎爲實邪脾乘腎爲賊邪本臟虛弱正令不行鬼賊尅害當補本臟之正氣假令肺病喘嗽見於初春當補腎見於夏救肺見於秋救脾見於冬補心瀉本臟乃名寒嗽大抵五臟各至本位卽氣盛不可更補到所尅位不可更瀉然五行之中惟腎水一臟母盛而反受邪何則肺屬金射干皮毛所主者氣腎屬水主於骨髓所藏者精氣之輕浮能上而不能下精之沉重能下而不能上此物性之自能今肺氣得熱而上蒸則不能下生於腎而受邪矣急服涼藥解之此腎氣必先求肺或脾經之濕刑尅於腎宜去脾濕若脾肺平和而腎自病則察其本臟而治之竊謂下竄等證足不喜覆者蓋腰以下皆腎所主乃心氣下行於腎部也法用地黃丸壯腎水以制心火若因脾肺虛而不能生腎水者用補中益氣湯六味地黃丸以滋化源其瘡疹黑陷乃腎虛而邪氣實也尤當用地黃丸

龔信古今醫鑑

五臟生成

夫一月之孕有白露之稱二月之胚有桃花之譬及其三月則先生右腎而爲男陰包陽也先生左腎則爲女陽包陰也其次腎生脾脾生肝肝生肺肺生心以生其勝己者腎屬水故五臟由是爲陰其次心生小腸小腸生大腸大腸生膻膽生胃胃生膀胱膀胱生三焦以生其勝己者小腸屬火六腑由是爲陽其次三焦生八脈八脈生十二經十二經生十二絡十二絡生一百八十絲絲絡生一百八十纏絡纏絡生三萬四千孫絡孫絡生三百六十五骨節骨節生三百六十五大穴大穴生八萬四千毛竅則耳目口鼻四肢百骸之身皆備矣

觀面部五臟形色歌

心經有冷目無光

太陰黑目無光彩此心經冷也

面赤須言熱病當

面頰赤色此爲心有熱也

赤在山根驚四足

山根赤色心經生風下至準頭惡也

積看虛腫起陰陽

二陰二陽虛腫心有積也

肝經有冷面微青

面青爲肝受冷主發驚也

有熱眉泡赤又臨

眉上有紅赤爲肝有熱也

髮際白言驚氣入

髮際至印堂略白者爲肝驚也

食倉黃是積熱深

眉上有紅赤爲肝有熱也

脾冷應知面色黃

面黃印堂反白者爲脾冷也

三陽有白熱爲殃

三陽上白者爲脾熱也

青居髮際生驚候

髮際及印堂色青者脾驚也

脣口皆黃是積傷

上下脣黃爲脾受積也

肺受面白冷爲由

白色在面皮及人中或青者皆肺冷也

熱赤人中及嘴頭

人中及嘴頭有赤者肺有熱也

青在山根驚四足

山根青色是肺受驚也

熱居髮際積爲仇

髮際赤色乃有積也

面黑當知腎臟寒

面帶黑者腎有冷也

食倉紅是熱須看

食倉紅者腎有熱也

風門黃可言驚入

風門黃者腎有驚也

兩目微沉積所干

兩目微沉是積在腎也

樓英醫學綱目

五臟

五臟相勝病隨時令乃錢氏擴充內經藏氣法時論之旨實發前人所未發者也假如肝病見於春及早晨乃肝自病於本位也今反見於秋及日晡肺之位卽肺虛極肝往勝之故當補脾肺瀉肝也餘倣此

潔古曰熱則從心寒則從腎嗽而氣上從肺風從肝瀉從脾假令瀉兼嗽又氣上乃脾肺病也宜瀉白益黃散合而服之脾苦濕肺苦燥氣上逆也其證見瀉又兼面色黃腸鳴吻吻者宜服理中湯瀉而嘔者宜服茯苓半夏湯如瀉而渴熱多者宜服黃芩厚朴湯

不渴而熱少者宜服白朮厚朴湯其他五臟若有兼證皆如此類推之更詳後論四時推詳用藥

心主熱自病或大熱瀉心湯主之實則煩熱黃連瀉心湯主之虛則驚悸生犀散主之

肺乘心微邪喘而壯熱瀉白散主之肝乘心虛邪風熱煎大羌活湯下大青丸主之脾乘心實邪泄瀉身熱瀉黃散主之腎乘心賊邪恐怖惡寒安神丸主之

肺主燥自病則喘嗽燥則潤之實則喘而氣盛瀉白散主之虛則喘而少氣先益黃散後阿膠散主之

心乘肺賊邪熱而喘嗽先地黃丸中導赤散後阿膠散主之肝乘肺微邪惡風眩冒昏憒嗽羌活膏主之

腎乘肺實邪增寒嗽清利百部丸主之脾乘肺虛邪體重吐痰溲瀉嗽人參白朮散主之

肝主風自病則風搐拘急肝苦急急食甘以緩之佐以酸苦以辛散之實則風搐力大瀉青丸主之虛則風搐力小地黃丸主之

心乘肝實邪壯熱而搐利驚丸凉驚丸主之肺乘肝賊邪氣盛則前伸呵欠微搐法當瀉肺先補本臟補肝地黃丸主之瀉肺瀉白散主之脾乘肝微邪多睡體重而搐先當定搐瀉青丸主之搐止再見後證則別立法治之腎乘肝虛邪增寒呵欠而搐羌活膏主之

脾主濕自病則泄瀉多睡體重昏倦脾苦濕急食苦以燥之實則泄瀉赤黃睡不露睛瀉黃散主之虛則泄瀉色白睡露睛白朮散主之

肝乘脾賊邪風瀉而嘔茯苓半夏湯主之心乘脾虛邪壯熱體重而瀉羌活黃芩蒼朮甘草湯主之肺乘脾實邪能食不大便而嘔吐嗽煎橫椰大黃湯下葶藶丸腎乘脾微邪惡寒泄瀉理中丸之類主之

腎主寒自病則足脛寒而逆人之五臟惟腎無實小兒瘡疹變黑陷則是腎實水尅退心火

心乘腎微邪內熱不惡寒桂枝湯主之肺乘腎虛邪喘嗽皮澀寒百部丸主之肝乘腎實邪拘急氣搐身寒理中丸主之脾乘腎賊邪體重泄瀉身寒理中丸主之

凡五臟虛弱是自己正令不行乃鬼賊之所尅害當補本臟之正氣假令肺病喘嗽時於初春見之法當補腎見於夏救肺見於秋瀉肺見於冬補心瀉本臟又名寒瀉大抵五臟各至本位即氣盛不可更補到所克位不可更瀉

潔古曰肝病面白肺病面赤脾病面青腎病面黃心病面黑若肝病驚搐而又加面白痰涎喘急之類此皆難治餘倣此推之假令春分前風寒也宜用地黃羌活防風或地黃丸及瀉青相間服之春分後風熱也宜用羌活防風黃芩或瀉青丸導赤散下之立夏後熱也宜用三黃丸導赤散夏至後濕熱也宜用導赤散瀉黃散合而服之或黃芩人參木香之類秋分後用瀉白散立冬後用地黃丸主之謂不受瀉也

海藏曰補肝丸四物湯內加防風羌活等分爲細末煉蜜丸是也

鎮肝丸瀉青丸去梔子大黃治肝虛

瀉腎丸治脈洪而實前熟地改生地去山茱萸是也此治左手本部脈若右尺洪實以鳳髓丹瀉之此地黃丸即仲景八味丸去桂附若加五味子腎氣丸也此益肺之源以生腎水焉

徐春甫古今醫統

五竅相通應證

心竅通於舌心爲臟小腸爲腑心色赤主夏三月心味苦心液汗心主血心聲言心氣呵有餘笑不足憂

千金云心氣實則笑不休虛則悲不已

肝竅通兩目肝爲臟膽爲腑其色青旺春三月肝味酸肝液淚肝主筋肝聲泣肝氣噓有餘怒不足悲千金云怒則實悲則虛

脾竅通唇口脾爲臟胃爲腑其色黃旺四季月脾味甘脾液涎脾主肌肉脾聲歌脾氣呼有餘腹滿不足少氣

肺竅通鼻孔肺爲臟大腸爲腑其色白旺秋三月肺味辛肺液涕內主氣外主皮毛肺聲哭肺氣咳有餘喘不足嘆息

腎竅通兩耳腎爲臟膀胱爲腑其色黑旺冬三月腎味鹹腎液唾腎主骨腎聲呻腎氣吹有餘瀉洩不足則厥逆

五臟克絕

心病目黑腎尅心壬癸日絕肝病皮黑肺尅肝庚辛日絕脾病唇青肝尅脾甲乙日絕肺病頰腫目赤心尅肺丙丁日絕腎病面腫唇黃脾尅腎戊己日絕

王肯堂證治準繩

五臟

張潔古曰五臟子母虛實鬼賊微正若不達旨意不易得而入焉在前者爲實邪子能令母實拒賊傷於母其子又引母所尅者妻來相助故曰實邪也在後

者爲虛邪母引子之鬼賊至由母能使子虛也內經云子能令母實母能令子虛此之謂也妻來乘夫爲微邪夫來乘妻爲賊邪法當瀉鬼補本臟本臟自病爲正邪當虛則補之實則瀉之經云滋苗者必固其根伐下者必枯其上逆其根伐其本則敗其眞矣肝勝肺則肝病身熱發搐又見肺虛喘而氣短病見於申酉戌時是肝眞強也經云受所制而不能制謂之眞強法當補脾肺而瀉肝導赤散瀉黃散主之劉宗厚云此皆五臟相勝病機不離五行生尅制化之理者蓋小兒初生襁褓未有七情六慾只是形體脆弱血氣未定臟腑精神未完所以有臟氣虛實勝乘之病但世俗不審此理往往遇是率指爲外感內傷而用藥致枉死者多矣悲夫錢氏論時有脫略幸而潔古補之今特參附誠無窮之惠也

五臟補瀉法

錢氏曰凡病先虛或已經下有合下者必實其母後瀉其子也假令肺虛而痰實此可下之證先當益脾後方瀉肺也

瀉青丸又名瀉肝丸

錢氏謂肝無補法故無補肝藥王海藏以四物湯加防風羌活等分爲細末煉蜜丸名補肝丸又以瀉青丸去梔子大黃名鎮肝丸治肝虛導赤散瀉丙小腸

瀉心湯瀉丁心

安神丸治心虛疳熱神思恍惚

海藏八物定志丸補心正藥

益黃散又名補脾散海藏云此劑補脾以燥濕東垣云治胃中寒濕嘔吐腹痛瀉利清白之聖藥也

瀉黃散又名瀉脾散海藏云瀉脾熱

阿膠散又名補肺散海藏云杏仁本瀉肺非若人參天門冬麥門冬之類也

瀉白散又名瀉肺散海藏云治肺熱骨蒸白汗用此直瀉之梔子黃芩亦瀉肺當以氣血分之

地黃丸即金匱八味丸去桂附海藏云治腎虛解顱即魅病也治脈毛而虛

錢氏謂腎無瀉法故無瀉腎藥海藏瀉腎丸治脈洪而實即前地黃丸熟地改生地去山茱萸是也此治左手本部脈若右尺洪實以鳳髓丹瀉之

李梴醫學入門

五臟形證

肝風目直手捾捻

註氣熱爲外傷風氣溫爲內生風熱則兩脅俱緊不轉凡目直兼青者必發驚咬牙甚者亦發驚肝主謀故捾衣領亂捻物風甚身強反張力大瀉青心乘風火相搏則發搐導赤散瀉喘瀉白散

虛則咬牙呵欠兼

註心不受熱目連劄不搐或發搐力小俱當補腎治肝腎氣丸如心乘肝等兼證詳見綱目所謂乘者猶乘車之乘五臟相乘莫測如肝病必先治肺補腎然後審肝臟虛實而調之餘臟倣此

心驚難言合面臥

註心驚搐也煩熱上竄舌強欲言不能叫哭胃熱故欲合臥就涼宜瀉心湯導赤散小生犀散

虛則困臥驚悸添

註溫驚丸主之

脾困身熱渴不食

註脾困倦也實則困睡不露睛身熱渴欲飲水或閉或泄黃赤色宜瀉黃散

虛則吐瀉風生痰

註虛則吐腥泄瀉白色多睡露睛四肢漸次生風或有痰錢氏白朮散異功散理中丸如肝乘脾風泄而嘔二陳湯加黃芩

肺燥鼻乾手掐目

註肺燥則喘嗽實則喘而氣盛或渴瀉白散潤之手掐眉目鼻面者甘桔湯主之肺只傷寒則不胃滿胃熱復有風冷胃滿短氣喘嗽瀉白散大青膏主之

虛則少氣喘無厭

註虛則唇白色氣哽長出少氣先服益黃散而後阿膠散

腎寒畏明顧白解

註腎只不足小兒腎虛皆難養多天有因病而致

虛者可補

下竄足熱火欲炎

註下竄者骨重惟欲墜下而縮身也足熱不喜衣覆心火下於腎部宜腎氣丸或正氣湯又肺病重見肝虛證易治見肝熱證難治益肺病久則虛冷肝強實而反勝也經曰受所制而不能制謂之眞強法當補脾肺而後瀉肝肺勝者當補肝瀉肺然嗽久虛羸不可服瀉白散宜腎氣丸五臟病機不離五行生尅制化之理所以有臟腑虛實乘勝之

病世俗不審此理往往率指爲外感內傷而用藥枉死此錢氏潔古之功大矣哉

喬岳五臟絕歌

心

吐瀉變爲痢血黑渴難當
心主血心絕則血色變黑虛燥而發渴
肌瘦難行坐虛舌不縮藏
心主舌絕則不能收
兩臉如脂赤
痢久則面當無色今而色反如脂者心絕則陽虛上發也
無語口生瘡
心主舌絕則不能語
若向夏中得更莫細思量

肝

眼目時時澀渾身似醉人頻頻只要睡心煩又多嗔
肝青絕則不能開視故澀而只要睡又肝主筋力絕則如醉人不能舉也又肝主怒絕則多怒不止也
唇白眼泡腫狂躁足喘聲東方應此候病則不宜春

脾

面色黃時好不可見相傳體弱增寒甚蟲行覓食蚤
脾主肢體絕則體弱又脾絕則腎逆乘之故發惕寒脾絕則胃熱故蟲不安而上吐出
喫乳唇無力齒露蓋時難
脾主脣絕則不能收掩其齒又不能吮乳
眼領休下藥
眼眶屬脾絕則傾陷
免更住人間

肺

肺候應白色莫使見絕形鼻青孔燥黑腹脹眼眶傾
肺主鼻絕則肝逆乘之而色青又肺絕則無涕故孔黑燥也肺主眼泡絕則陷之
項直喘氣急胃凸沒迴聲
肺主氣絕則喘急項直以引氣也氣絕則胃中滿凸但有出氣而無迴氣也
秋間逢此候四方別托生

腎

冷汗時時有尿多夜裏驚
腎絕則陰陽相離故冷汗出而小便不禁精者神之舍絕則精神離故夜裏多驚腎屬陰夜亦屬陰故也
遍身生粟疥手足冷如冰
陽盡不能充煖故也
項倒頭難舉面黑沒精神
腎絕則天柱骨倒面目皆黑無精神也
此候應壬癸冬得須其身

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百二十七卷目錄

醫部彙考四百七

小兒初生諸疾門一

黃帝素問 奇病論篇

孫思邈千金方 初生出腹論 驚癇 變蒸論

錢乙小兒直訣 胎驚 變蒸 吐瀉 夜啼 鵝口 胎肥胎熱胎怯 臍風 胎黃 語遲 行遲齒遲

張從政儒門事親 夜啼 物哭不止 悲哭不止 小兒風門

朱震亨心法 小兒論

幼科全書 胎疾 臍風 鵝口 噤風 西江月 變蒸 西江月

方賢奇效良方 辨小兒生下三月已前中病不治 胎熱 變蒸

萬氏秘傳片玉心書 初生諸疾胎疾

幼科發揮 胎疾 胎驚 臍風 變蒸 痰證

育嬰家秘 初生 胎疾 臍風 啼哭 夜啼 胎驚 百晬咳

黃帝素問

奇病論篇

帝曰人生而有病巓疾者病名曰何安所得之岐伯曰病名爲胎病此得之在母腹中時其母有所大驚氣上而不下精氣并居故令子發爲巓疾也

註 此女子胞之爲病也有所大驚則氣暴上而不下夫精以養胎而精氣并居者也母受驚而氣上則子之精氣亦逆故令子發爲巓疾也愚謂巓當作癲按嬰兒癲癇多因母腹中受驚所致然癲疾者逆氣之所生也故因氣上逆而發爲癲疾兆瑣曰胎中受病非止驚癇姙娠女子飲食起居大宜謹慎則生子聰俊無病長年

唐孫思邈千金方

初生出腹論

小兒初生出腹骨肉未斂肌肉猶是血也血凝乃堅成肌肉耳其血沮敗不成肌肉則使面目繞鼻口左右悉黃而啼閉目聚口撮面口中乾燥四肢不能伸縮者皆是血脈不斂也多不育若有如此者皆宜與龍膽湯也

兒生落地不作聲者取煖水一器灌之須臾當啼兒生不作聲者此由難產氣少故也可取兒臍帶向身却將之令氣入腹仍呵之至百度啼聲自發亦可以葱白徐徐鞭之即啼

兒生十許日怒啼似衣中有刺者此或臍燥還刺其腹當解之易衣更裹仍以溫粉粉之若臍不愈燒箠帛末粉之若過一月臍有汁不愈燒蝦蟆灰粉之日三四度若臍中水及中冷則令兒腹絞痛天糺啼呼面目青黑此是中水之過當炙粉黎以熨之不時治護臍至腫者當隨輕重重者便灸之乃可至八九十壯輕者臍不大腫但出汁時時啼呼者擣當歸末和胡粉傳之炙黎日熨之至百日愈以啼呼止爲候 按初生小兒鬱灸不可妄施若云灸之可至八九十壯雖今古異宜未須斟酌

若兒糞青者冷也與臍中水同

乳哺不進者腹中皆有痰癖也當以四物紫丸微下之節哺乳數日便自愈小兒微寒熱亦當爾利之要當下之然後乃瘥

驚癇

新生即癇者是其五藏不收斂血氣不聚五藏不流骨怯不成也多不全育其一月四十日已上至期歲而癇者亦由乳養失理血氣不和風邪所中也病先身熱掣瘛驚啼叫噢而後發癇脈浮者爲陽癇病在六腑外在肌膚猶易治也病先身冷不驚掣不啼呼而病發時脈沉者爲陰癇病在五藏內在骨髓極難治也

初出腹血脈不斂五藏未成稍將養失宜即爲病也時不成人其經變蒸之後有病餘證並寬惟中風最暴卒也小兒四肢不好驚顫氣息小異欲作癇及變蒸日滿不解者並宜與龍膽湯

凡小兒不能乳哺當與紫丸下之小兒始生生氣尚盛但有微惡則須下之必無所損及其愈病則致深益若不時下則成大疾疾成難治矣凡下四味紫丸最善雖下不損人足以去疾若四味紫丸不得下者當以赤丸下之赤丸不下當倍之若已下而有餘熱不盡當按方作龍膽湯稍稍服之并摩赤膏

風癇亦當下之然當以猪心湯下之驚癇但按圖灸之及摩生膏不可大下也何者驚癇心氣不定下之內虛益令甚爾驚癇甚者特爲難治故養小兒常愼驚勿令聞大聲抱持之間當安徐勿令驚怖又天雷時當塞兒耳并作餘細聲以亂之也凡養小兒皆微驚以長其血脈但不欲大驚大驚乃爨驚脈若五六

十日灸者驚復更甚生百日後灸驚厥乃善

變蒸論

凡兒生三十二日一變六十四日再變變且蒸九十六日三變一百二十八日四變變且蒸一百六十日五變一百九十二日六變變且蒸二百二十四日七變二百五十六日八變變且蒸二百八十八日九變三百二十日十變變且蒸積三百二十日小蒸畢後六十四日大蒸蒸後六十四日復大蒸蒸後一百二十八日復大蒸凡小兒自生三十二日一變再變爲一蒸凡十變而五小蒸又三大蒸積五百七十六日大小蒸都畢乃成人小兒所以變蒸者是榮其血脈改其五臟故一變竟輒覺情態有異其變蒸之候變者上氣蒸者體熱變蒸有輕重其輕者體熱而微驚耳冷尻冷上脣頭白泡起如魚目珠子微汗出其重者其體壯熱而脈亂或汗或不汗不欲食食輒吐哯目白睛微赤黑睛微白又云目白者重赤黑者微變蒸畢自精明矣此其證也單變小微兼蒸小劇凡蒸平者五日而衰遠者十日而衰先期五日後期五日爲十日之中熱乃除耳兒生三十二日一變二十九日先期而熱便治之如法至三十六七日蒸乃畢耳恐不解了故重說之且變蒸之時不欲驚動勿令傍多人兒變蒸或早或晚不如法者多又初變之時或熱甚者違日數不歇審計變蒸之日當其時有熱微驚慎不可治及灸刺但和視之若良久熱不可已少與紫丸徹下熱歇便止若於變蒸之中加以時行溫病或非變蒸時而得時行者其診皆相似惟耳及尻通熱口上無白泡耳當先服黑散以發其汗汗出溫粉粉之熱當歇便就瘥若猶不都除乃與紫丸下之兒變蒸時若有寒加之卽寒熱交爭腹腰夭糺啼不止者熨之則愈也（變法卽灸粉粉絮髮之）變蒸與溫壯傷寒相似若非變蒸身熱耳熱尻亦熱此乃爲他病可作餘治審是變蒸不得爲餘治也

又一法凡兒生三十二日始變變者身熱也至六十四日再變變且蒸其狀臥端正也至九十六日三變定者候丹孔出而泄至一百二十八日四變變且蒸以能咳笑也至一百六十日五變以成機關也至一百九十二日六變變且蒸五穢成也至二百二十四日七變以能匍匐也至二百五十六日八變變且蒸以知欲學語也至二百八十八日九變以亭亭然也凡小兒生至二百八十八日九變四蒸也當其變之日愼不可妄治之則加其疾變且蒸者是兒送迎月也蒸者甚熱而脈亂汗出是也近者五日歇遠者八九日歇也當是蒸上不可灸刺妄治之也

宋錢乙小兒直訣

胎驚

小兒初生壯熱吐哯身體强直手足抽掣目反直視是胎驚風證也

註按前證多因娠婦忿怒驚恐調攝乖常或挾外邪內傷於胎蓋母有所觸胎必感之當用猪乳膏拭兒口中或用惺惺散加漏蘆令母煎服使藥通乳中兒病自愈矣

百日內發搐眞者不過兩三次必死假者頻發不死眞者內生驚癎假者外傷風冷血氣未實不能勝任故發搐口中氣熱用大青膏塗顖浴體二法

註按前證多因胎中受患或乳母鬱怒傳兒或兒脾傷自病當固元氣爲主而兼治其母仍禁吮乳不能類治之後倣此

變蒸

小兒在母腹中乃生骨氣五臟六腑成而未全自生之後卽長骨脈五臟六腑之神智也變者易也自內而外自下而上又身熱故以生之日後三十二日一變蒸卽智意有異於前何也長生藏腑智意故也何謂三十二日長骨添精神人有三百六十五骨除手足中四十五碎骨外有三百二十數自生下骨一日十段而上之十日百段而三十二日計三百二十段爲一變亦曰一蒸骨之餘氣一自腦分入齦中作三十二齒而齒牙不及三十二數者由變不足其常也或二十八日卽長二十八齒已下倣此但不過三十二之數也凡一周遍乃生盧熱諸病如是十周則小蒸畢也計三百二十日生骨氣乃全而未壯也故初三十二日一變生腎生志六十四日再變生膀胱其發耳與骸冷腎與膀胱俱主於水水數一故先變生之九十六日三變生心喜一百二十八日四變生小腸其發汗出而微驚心爲火火數二一百六十日五變生肝哭一百九十二日六變生膽其發目閉（一云目不開）而赤肝主木木數三一百二十四日七變生肺聲二百五十六日八變生大腸其發膚熱而汗或不汗肺者金金數四一百八十八日九變生脾智三百二十日十變生胃其發不食腹痛而吐乳此後乃齒生能言知喜怒故云始全也太倉云氣入四肢長碎骨於十變後六十四日長其經脈手足手受血故能持

物足受血故能行立也經云變且蒸謂蒸畢而足一歲之日也師曰不汗而熱者發其汗大吐者微止不可餘治是以小兒須變蒸蛻齒者如花之易苗所謂不及三十二齒者由變之不及齒當與變日相合也年壯而視齒方明

註按小兒變者變其情態蒸者蒸其血脉故三十二日一變每變畢則情態異常全嬰方論云變蒸者以長氣血也變者上氣蒸者發熱也輕則體熱虛驚耳冷微汗臀生白泡三日可愈重者寒熱脉亂腹疼啼叫不能乳食食即吐哯五日方愈古方以黑散子紫丸子主之竊謂此證小兒所不能免者雖勿藥可也況前藥乃屬峻厲非惟臟腑不能勝抑且反傷氣血慎之慎之予嘗見一小兒至二變發熱有痰投以抱龍丸一粒卒至不救觀此可驗矣若不熱不驚略無證候而暗變者蓋受胎氣壯實故也然其候與傷寒相似但以臀上白泡驗之亦有受胎氣壯實不熱不驚或無證候而暗變者不必服藥然父母愛子之心勝稍有疾病急于求醫而醫不究病情率爾投劑殊不知病因多端見證相類難以卒辨況古人稟厚方多峻厲之劑慎服可也

吐瀉

初生十日內吐瀉壯熱不乳或乳不消或白色先用白餅子下之後用益黃散和之

初生下吐因穢惡下咽故也用木瓜丸主之凡初生急須拭淨口中否則啼聲一發穢物嗽下致生諸病

註按芽兒初生之患多因乳母不慎七情不節厚味傳兒爲病當審其因以調治其母前所用之藥恐臟腑脆嫩不能勝受治者審之

夜啼

夜啼者小兒筋骨血脉未成而多哭脾臟冷而痛也當與溫中藥或花火膏主之

若虛怯爲冷所乘則唇青

註按前證多因稟賦不足或乳母飲食七情虧損所致若面色白及白睛多者屬腎氣不足至夜則陰盛而腹痛也用六味丸若臉青唇白或小便黃短屬脾氣不足至夜則陰盛而腹痛也用釣藤散若臉紅舌白或小便赤澁小腸熱也用導赤散加辰砂如不應屬腎火用地黃丸唇色青白口中氣冷或肢體冷或泄瀉曲腰或泄瀉不乳此脾腎虛弱用六神散兼嘔吐用六君子湯大便不化乳少腹脹用五味異功散加漏蘆令母服之兒病自愈兒亦服四五滴尤妙兒大數滴

驚啼

驚啼者邪氣乘心也當以安神丸主之

註按哭而不啼多淚是驚悸也啼而無淚是痛也若因心血不足用祕旨安神丸心火熾盛用導赤散木火相搏用柴胡梔子散肝血不足用六味丸所云十啼者蓋亦大同小異耳

撮口

若浴後拭臍不乾風入作瘡令兒撮口甚者是脾虛也若頻撮口是氣不和也益黃散主之

註愚按前證果因浴後拭抱不乾用枯礬爲末搽之即愈若兼乳母肝脾有熱助兒爲患當用加味逍遙散以治其母若風入作瘡邪傳于脾撮口者其害匪輕七日內患者其危尤速

胎肥胎熱胎怯

胎肥者生下豐厚目睛粉紅大便乾難時出涎水

胎熱者生下有血色時叫哭身熱淡黃目睛多赤大便色黃急欲食乳並用浴體法主之

胎怯者生下面白肌肉瘦弱大便白水身無血色哽氣多噦亦用浴體法

註按浴體之法乃開發腠理疏泄陽氣者也其胎氣果熱在暑月庶幾可用其或胎怯而用前法恐復傷眞氣也然此證屬有餘者胎肥胎熱也因母食膏粱厚味或怒火鬱熱胎怯弱者因父精不足或母氣虛弱用八珍湯父精不足用地黃丸俱加漏蘆令子母俱服

臍風

急欲乳不能食者此風邪由臍而襲熱心脾致舌厚脣燥不能吮乳也

註按前證果因外邪而脣口撮緊者名爲臍風多不能救若心脾有熱舌尖痛不能吮乳舌本痛不能送乳者以柳華散數之若舌下腫如小舌者或舌絡牽痛或齒齦患白星俱用線針刺出毒血亦數前散若脣腫痛或裂紋作痛以當歸膏調前散數之若暴病發熱作渴飲冷大便祕結用瀉黃散疏導其熱若病後發熱口渴飲湯大便不實用異功散調補胃氣若服攻伐之劑兼嘔吐或腹痛脾胃復傷也用四君子湯或口角流涎或痰氣壅盛脾不能攝也用六君子湯若兒自食甘肥或母食

酒麵致兒口舌生瘡用清胃散以清熱若作嘔少食泄瀉用白朮散以補脾若手足並冷或腹痛惡寒用六君炮薑以溫中若因乳母飲食勞役失宜致兒發熱用補中益氣湯因乳母肝脾二經血虛內熱傳兒用加味逍遙散八珍湯因乳母肝脾鬱怒血傷內熱致兒爲患用加味逍遙散加味歸脾湯俱加漏蘆于亦服數滴仍參前弄舌類凡針重舌以針直刺不可橫挑恐傷舌絡則言語不清

胎黃

若百日或半年不因病而身黃者胃熱胎疸也若淡黃兼白者胃怯也

註初生身黃壯熱不乳便祕此爲胎熱用地黃湯若二便赤澀腹脹面赤飲水用茵陳湯調五苓散若清便自調四肢並冷用益黃散淡黃白用調中丸

語遲

若患吐瀉或大便後雖有聲而不能言又能噉物者非失音此腎怯不能上接于陽也當以地黃丸主之

凡口噤不止則失音語遲

註按前證多因稟腎不足蓋腎脉繫于舌本非地黃不能治故患此證者若仰首呵欠則嘿如未應須兼以補中益氣湯滋其化源若陰火上炎肺金受傷而失音者亦治以前法保嬰集云小兒五六歲腎氣不足而不能言者用菖蒲丸口噤不能言者用地黃丸

行遲齒遲

長大不行行則脚軟齒久不生生則不固皆胎弱也註按前證卽五遲之證也蓋腎主骨齒者骨之餘也良由父母精血不足腎氣虛弱不能榮養而然耳有肝腎虛長而不能行者有肝氣虛手足拳攣者有肝腎虛而脚不能舒展者並用地黃丸滋補之有心氣虛而不能言語用圍參湯補中益氣湯培養之若久病或五疳所致者但調補脾胃爲主全嬰方云頭項手足身軟謂之五軟證皆胎稟腎氣怯弱也

元張從政儒門事親

夜啼

夫小兒夜啼不止者當用燈花一枚研細隨乳汁下併三服則每服用燈花一枚服罷此藥於淨室中臥一兩日卽止也

拗哭不止

夫小兒拗哭不止或一二日或三四日乃邪祟之氣襲于心拗哭不止也有藏經一法以綿絹帶縛手足訖用三姓婦人爭嚷槽臥小兒于其中不令傍人知而覷之移時則拗哭自止也

悲哭不止

夫小兒悲哭彌日不休兩手脉弦而緊戴人曰心火甚而乘肺肺不受其屈故哭肺主悲王太僕云心爍則痛甚故爍甚悲亦甚今浴以溫湯漬形以爲汗也肺主皮毛汗出則肺熱散矣浴止而啼亦止仍命服涼膈散加當歸桔梗以竹葉生薑卒碎同煎服瀉膈中之邪熱

小兒風門

凡小兒三五歲或七八歲至十餘歲發驚涎潮搐搦如鋸拽不省人事目瞪喘急將欲死者內經曰此者得之在母胎胞之所受悸惕驚駭恐懼之氣故令小兒輕者爲驚風天弔重者爲病病風搐胎中積熱者爲膿風已上諸風證可用吐涎散吐之吐訖宜珠犀龍麝清凉墜痰之藥其食乳子母皆宜服之安魂定魄之藥定志丸之類是也故婦人懷孕之月大忌悲憂驚怖縱得子必有前疾小兒風熱涎嗽者可以通聖加半夏同煎溫服

朱震亨心法

小兒論

乳下小兒常多濕熱食積痰熱傷乳爲病大概肝與脾病爲多

小兒易怒肝病最多大人亦然肝只是有餘腎只是不足

小兒夜啼此是邪熱乘心

註夜啼小兒臟冷也陰盛于後則冷動冷動則爲陰極發躁寒盛作疼所以夜啼而不歇

小兒變蒸是胎毒散也

幼科全書

胎疾

凡小兒在月內有病者皆胎疾也並治其母小兒月內腸胃甚脆氣血未充若有微疾不可妄施補瀉恐傷臟腑藏腑一傷將貽患于終身或至夭命可不戒哉如不得已而用湯丸毋伐天和中病卽止又不可過劑也乳母服藥必別擇乳母乳之而後可補可瀉也若藥母自乳則不可亂投湯藥蓋產後之婦氣血甚虛有補無瀉苟兒有熱而用涼藥則犯產後之禁

必害其母如有溫補則反助小兒之熱又害其子醫者人之司命偏害之事而可妄爲乎必須斟酌謹愼勿損陰騭也

凡小兒生下就死者急看兒口中懸癰前齶上必有泡塞住即以手指摘破其泡速用軟綿拭令血淨若血入喉即死

萬氏曰兒生十日之內常抱向明處視其口中爲要

凡小兒初生下氣絕不能啼者必因難產或因冒寒所致急以綿絮包裹于懷中未可輕斷臍帶却將包衣置銚中向炭上以水煮之又作大油灶點著往來于臍帶上下燎之須臾熱氣由臍入腹便能啼哭方可洗浴却斷臍帶若不如此急救便斷臍帶者多死不治

萬氏曰俗名悶臍生即寤生鄉俗有連呼其父乳名即醒者

凡小兒初出胎時被風寒所吹鼻塞服藥不得者用天南星爲末生薑自然汁調成膏貼顖門上自愈

萬氏育嬰貼顖法加北細辛葱汁更好

凡小兒生後或月內或百日痰多氣喘目閉眼赤胳泪神困呵欠遍身壯熱小便赤澁大便不通時復驚煩此胎熱也因母平日恣食辛熱貪服煖藥而致以凉驚丸黃連解毒湯治之

凡小兒生後覺口中冷腹痛腸鳴泄瀉昏昏多睡或夜啼此胎寒也因母喜啖生冷或有外感多服凉藥致傷胎氣以理中丸勻氣散治之

凡小兒生下浮腫遍身紅色滿月以後漸漸瘦弱五心煩熱此名胎肥又有生下面無精光身無血色目無精采肌肉瘦削者此名胎怯並宜內服八物湯而外用浴體法

凡小兒生下遍身面目皆黃狀如金色身上壯熱大便不通小便如梔子汁乳食不思此胎黃也因孕母受熱而傳于胎以地黃湯治之

凡小兒生下壯熱番眼握拳禁口直目涎潮搐熱目閉面青此胎驚也因母忿怒跌蹼以致觸胎視其眉間氣色赤而鮮者可治若黑暗者不可治以至聖保命丹金銀燈心湯下

凡小兒生下大小便三五日不通者此名鎖肚胎中受熱熱毒壅盛結于肛門閉而不通無復滋潤急令婦人以溫水漱口吸咂兒前後心并臍下手足心共七處凡四五次再用輕粉五分蜜少許溫水化開時時少許服之以通爲度如更不通即是肛門內合或以金簪透而通之須刺入二寸許以香油和蜜納入孔中糞出爲快也若肚脹不乳作呻吟聲至于一七難可望生

凡小兒初生時即不吃乳者此由拭口不淨惡穢入腹致令腹滿氣短不能吃乳或有吐嘔乳不得下或胎中受寒令兒腹痛亦不吮乳此則多啼俱以木香散治之

臍風

臍風者由斷臍之後被水濕風冷之氣所乘而流入心脾遂令腹脹臍腫四肢強直日夜多啼不能吮乳甚則發爲風搐若臍青腫撮口不開者是爲內搐不治爪甲黑者即死

撮口

撮口者由胎氣夾熱兼之風氣入臍流入心脾二經故令舌強脣青口撮喘急啼聲不出不乳若口出白沫而四肢冷者不治撮口最爲急候一臘之內見之尤甚

噤風

噤風者眼閉口噤啼聲漸少吮乳不得口吐白沫大小便皆不通亦由胎中受熱熱毒流入心脾故形見于喉舌間也

此上三證其名雖異受病之源則一初生七日得此證者多不可治若不急救坐以待死良可惜焉

但見小兒噴嚏多啼身熱不乳急看小兒上齶有小泡如粟米大或以指甲或以宅耳輕輕刮去以絹纏手指醮溫水拭淨其血勿令下咽便安妥不必服藥誠良法也

如兒牙關緊急已成撮口驚搐者先用撮風散以開其關次用控痰散以吐其痰後用益脾散以和其胃保命丹祛驚即愈若手足攣拳口噤不開者不治

亦有熱在胃腔伸縮無時呢呢作聲努脹其氣以致臍突浮腫此非斷臍使之然也但散其熱自愈加減龍膽湯主之

亦有肚脹青筋弔腸卵疝內氣引痛而撮口者皆腸胃鬱結不通致之治法貴乎疏利紫霜丸量而與之一粒金丹尤妙

西江月

胎黃狀如金色身熱大便難通小便黃赤色朦朧少乳時時舌弄此證傳來母毒脾胃濕熱相攻凉經凉

血解重重保養胎元兼用
外有胎肥胎瘦此爲稟賦虛羸父精母血必多虧兒子不充元氣此個甚難調理愚夫不曉支持一朝有病至傾危却把命來抵對
生下時時吐奶不思乳食昏沉此爲穢物下咽門拭洗未能潔淨會厭中間阻隔太倉上口留凝豁痰順氣藥通神炮製生薑作引
生下忽然腹脹臍中血水淋漓斷臍將息失其宜客水邪風侵入外用灰攀粘貼速令乾較爲奇若還撮口哭聲稀縱有神丹莫治
小兒生下數日睡中啼哭多驚此因母氣失和平常因七情爲病以致胞胎氣逆痰涎流入脾心治須順氣更精神鎮墜痰涎始定
胎熱遍身如火發斑丹毒風瘡神昏目痛又驚章大小便難哭嚷此是母貪煎炒溫經煖藥乖方急須解毒令清凉甘草黃連爲上
胎寒生來吐瀉大便滑溜多清腹中疼痛哭聲頻面色青白不定平日母多生冷寒邪傳入胎經治宜丸散用甘溫可保嬰兒性命
小兒初生病證許多名狀難同胎驚撮口共臍風寒熱瘦肥黃腫嘔吐昏昏不乳臍間血水溶溶未從滿月病來兒好似風中燭弄
最是臍風可畏三朝八日爲殃初然噴嚏似風傷啼哭時時炒嚷急看小兒上齶刮破白泡中央展指惡血細端詳莫使下喉爲上
若是不知此法致令泡落兒吞忽然腹脹滿膨膨臍腫青筋散亂撮口昏昏不乳目瞪又緊牙關啼聲不出命歸天勸取衣棺急辦
小兒爲何難治古今號曰啞科脈無可診待如何口不能言病作父母時時驚怕醫人試驗誠多從容審證用方藥有甚難爲捉摸
要識小兒治法方爲業擅專門半週一歲病何因胎毒單現證自後飲食漸廣肥甘之變須明此時脾胃病多尋消食養脾法定
小兒純陽之體陰陽不可偏傷常帶三分飢與凉此個孩兒易養大抵脾常不足有餘肝氣須防不寒不熱藥爲良切忌妄行孟浪
胎病要行解毒無如甘草黃連若加脾弱病相纏參朮陳皮有驗巴豆牽牛丁桂砒硫白汞青鉛俱傷正氣損眞元悞了孩兒命短

變蒸

此小兒正病者蓋變者變易也每變畢卽性情有異于前何者生長臟腑之意也蒸者蒸蒸然熱也萬物生于春長于夏者以陽主生長也于人亦然所以變蒸足始乃成人血氣充實骨肉堅牢也小兒此證譬如蠶之有眠龍之脫骨虎之轉爪而變化同也故每三十二日有一變蒸至五百七十六日大小變蒸足矣輕則發熱微汗其狀似驚重則壯熱脈亂而數或汗或煩啼躁渴輕者五日解重者八日解其候與傷寒相似亦有變蒸之餘感寒邪者但變蒸則耳冷上唇發泡狀如濁珠若寒邪搏之則寒熱交爭腹中作痛而啼哭之聲日夜不絕治此之法輕者不須服藥重者以平和飲子微表之熱甚便祕以紫霜丸微利之若吐瀉或不乳而多啼者以調氣散治之
凡小兒當變蒸之時不熱不驚別無他證者是爲暗變此受胎氣壯盛故也

西江月

小兒變蒸何以三十二日爲期精神改變異常時發熱蒸蒸昏睡或遇風寒外感或兼乳食傷脾留連苦楚莫差池好把湯丸調治
大抵六十四日初生腎與膀胱再生心火與小腸肝膽第三長養肺與大腸居四脾胃五次猜詳三焦包絡不同鄉只爲有名無狀

變蒸發熱此小兒正病不須服藥當于類下求之不可錯誤

小兒變生智慧自然發熱如蒸昏昏不乳欠醒醒恰似蠶眠相應醫者不須妄治父母何必憂驚三日之后自和平莫怕別生形證
若遇風寒外感惺惺散子堪行內傷乳食不安寧保和養脾兼進咳嗽參蘇飲子吐泄理中最靈驚來搐掣用瀉青導赤亦宜選用
明方賢奇效良方

辨小兒生下三月已前中病不治

風噤　猢猻噤　臍風　撮口　咳嗽　伏聲
木舌　重齶　解顱　項强　胷高

胎熱

凡小兒胎熱者但看初生下肌膚紅白二月已後遍身黃腫眼閉不開作呻吟聲此因胎內有熱或因母服熱藥所致亦謂之血疸治之以辰砂金箔散牛黃膏乳上吮之兼以黃檗皮煎湯浴之此良法也

變蒸

觀諸變蒸熱作驚須見日角左邊眉間脈紅是也大凡初蒸見一條長一二分在眉上者輕自日角垂至眉上者重變蒸發熱見二條紅者兩三次蒸熱在內不解脈紅帶叉因驚而蒸脈青變蒸多次青在左太陽因傷風而蒸自顖門青至眉之上因驚而蒸三處皆青三證皆見若及三十二齒者變蒸足也

萬氏秘傳片玉心書

初生諸疾胎疾

初生三五日大便血嘗來黑色爲胎糞鮮紅實可哀初生便嘔吐胞漿蓄胃中物盡吐自止不止便爲凶小兒初生十日內少乳多啼常噴嚏急看喉中有珠泡手法刮去免憂慮

怕看撮臍風撮臍糞少通急用解毒散便下得從容便閉肚膨脹口緊咬唇青時時手足掣臍風柱用心腹脹不便名鎖肚口緊不乳是噤風目視叫哭盤腸釣天釣身仰似角弓初生芽兒有此病父母歡喜一場空

變蒸休用藥三日自然安外感惺惺散傷食保和丸胎熱甘草黃連湯胎寒去連加桂方胎黃甘草加茵陳胎驚辰砂一味良胎瘦胎肥浴體法胎怯五軟用地黃此是家傳眞口訣兒孫記誦莫遺忘

肝色多青心赤紅脾黃肺白腎黑同黃白疳虛黑中惡赤紅是熱青驚風

語遲者由兒在胎之時母受驚邪之氣乘心兒感母氣心神不定不能榮舌故而語遲菖蒲丸主之

受胎母卽有驚邪二氣乘心舌本加菖蒲茯神參遠志麥冬當歸乳香砂蜜丸粟大吞二十薄荷湯下語遲瘖

夜啼之證有四驚啼熱煩啼腹痛啼神不安啼驚啼者邪熱乘于心也當安心以導赤散加燈心退心熱以安神丸定心效

熱煩啼者其哭無淚見燈則喜而止以導赤散加麥冬梔子仁治之

腹痛啼者藏冷而痛也面青而無光以溫中藥調理中丸益黃散治之

神不安啼者睡中忽覺自哭以安神丸燈心燒灰調湯吞服

又有拂其性而拗哭者要審明白不可妄投湯丸

祖傳治夜啼以至聖保命丹燈心灰調湯下甚效

小兒夜啼四證忤驚肚痛心煩如逢拗哭忤家言睡中忽啼驚見肚痛手足厥冷腰曲口氣冰寒心熱煩躁不安眠其證面赤腹煖

既辨夜啼證候其間治法須明分明傳授與人間只得心誠求遍忤驚安神丸子理中專治脾痛凉驚錠子治心煩總用燈花妙散

啼哭直視熱在肝瀉青一服卽時安啼哭面赤熱在心導赤麥冬效如神

面赤回逆腹中痛益黃散用薑湯送夜夜見燈多拗哭父母嬌愛多不足

幼科發揮

胎疾

小兒初生至周歲者皆爲胎疾

氣陽也血陰也人之有生受氣于父陽之變也成形于母陰之合也陰陽變合而成其身身之中形藏四頭面一也耳目口鼻二也手足三也皮肉筋骨四也神藏五心藏神肝藏魂脾藏意肺藏魄腎藏志是也

凡五藏者肯父母一體而分者也形拘于一偏而不能相通者陰之靜也神隨感而動者陽之動也兒之初生只是一塊血肉耳雖有形而無所用雖有五藏而無其神猶空藏也至于變蒸之後皮肉筋骨以漸而堅聲色臭味以漸而加志意智慧以漸而發知覺運動而始成童此天地生物之心至誠不息

有因父母稟受所生者胎弱胎毒是也胎弱者稟受于氣之不足也子于父母一體而分如受肺之氣爲皮毛肺氣不足則皮膚薄怯寒毛髮不生受心之氣爲血脈心氣不足則血不華色面無光彩受脾之氣爲肉脾氣不足則肌肉不生手足如削受肝之氣爲筋肝氣不足則筋不束骨機關不利受腎之氣爲骨腎氣不足則骨軟此胎稟之病當隨其藏氣求之肝腎心氣不足宜六味地黃丸主之脾肺不足者宜參苓白朮丸主之子之羸弱皆父母精血之弱也所謂父強母弱生女必羸父弱母強生男必弱者是也故兒有頭破顱解神慢氣少項軟頭傾手足痿弱齒生不齊髮生不黑行走坐立要人扶掖皆胎稟不足也並宜六味地黃丸主之

或問胎稟不足之證得于父母有生之初如何醫得予曰諸器破損者尚可補之豈謂胎弱者不可補之乎貴得其要也夫男女之生受氣于父成形于母故父母強者生子亦強父母弱者生子亦弱所以肥瘦長短大小妍媸皆肖父母也兒受父母之精血以生凡五藏不足者古人生地黃丸主之或曰五藏不足

而專補腎何也曰太極初分天一生水精血妙合先生兩腎腎者五藏之根本也經云植木者必培其根此之謂也

胎驚

初生月內非臍風證發搐者此胎驚也宜至聖保命丹金銀磨水送下或用全蠍一枚薄荷葉包炙爲末硃砂末三分和勻猪乳調五粒許如常發者名胎癇不可治也

臍風

治未病臍在兩腎之間任衝胃三脈之所係也兒之初生斷臍護臍不可不愼故斷臍之時隔衣咬斷者上也以火燎而斷之次也以剪斷之以火烙之又其次也護臍之法臍既斷矣用軟布纏裹待乾自落勿使犯去也三朝洗兒當護其臍勿使水漬入也臍落之後當換包裙勿使尿濕浸及臍中也如此調護則無臍風之病所謂上工治未病十得十全也

治初病兒生旬日之內臍風爲惡病也凡覺小兒噴嚏多啼此臍風欲發之候急抱兒向明晶處審視口中上齶有泡如珠如米成聚此病根也其色白者初起也黃者久也可用銀挖耳輕手刮出煎甘草薄荷湯拭洗之須取桑白皮汁塗之自此日日視之有即去之不可因循以貽後禍所謂中工治初病十全六七也

治已病不知保護于未病之先不知調護于初病之日其泡子落入腹中變爲三證一曰撮口二曰噤風三曰鐵肚證雖不同皆臍風也撮口證兒多啼口頻撮者此臍股痛也可用雄黃解毒丸加乳香沒藥各五分丸如黍米大每服五丸竹瀝生薑自然汁送下利去惡涎良外用斬艾炒熱杵熨護其臍頻換使溫煖之氣不絕也不乳者不治

噤風證牙關緊急不能吮乳啼聲不出發搐者不治

鐵肚證臍突青腫肚腹脹大青筋浮露大便澁不通者不治

或問臍風三證古人有方何謂不治予曰一臟之內謂初生八日草木方萌稍有觸犯即便折傷經曰根于中者命曰神機神去則機息故噤風者乳食不得入則機廢于上矣鎖肚者便溺不得出則機廢于下矣所謂出入廢則神機倉滅者是也神出機息雖有神丹不可爲也豈蜈蚣蠍蟅諸毒藥之可治耶

變蒸

變蒸非病也乃兒生長之次第也兒生之後凡三十二日一變變則發熱昏睡不乳似病非病也恐人不知誤疑爲熱而汗下之誅罰太過名曰大惑或誤以變蒸得于胎病者或曰兒之生也初無變蒸既生之後當以三十二日一變至于三百八十四日之後又無變者何也曰初無變蒸者藏諸用陰之閎也中有變者顯諸仁陽之闢也終無變者陰陽闔闢之機成也故不復蒸也故兒之初生語其皮肉則未實也語其筋骨則未堅也語其腸胃則穀氣未充也語其神智則未開發也只是一塊血肉耳至于三百八十四日然後藏腑氣足經絡脈滿穀肉菓菜以漸而食方成人也

或曰變蒸之日必以三十二日者何也曰易傳云生生之謂易易者變易也不變不易不足以見天地生物之心人有五藏六腑以配手足十二經絡腑屬陽以配陽卦三十二藏屬陰以配陰卦三十二取其一藏一腑各以三十二日一小變六十四日一大變陽卦之爻一百九十二陰卦之爻一百九十二合歲並閏月凡三百八十四爻所以變蒸一朞之日三百八十四以應六十四卦爻之數也或曰三十二日一小變六十四日一大變所生者何物也所生之物亦有說歟曰形既生矣復何生也所生者五藏之知覺運動也故初生三十二日一變生足少陰癸水腎之精也六十四日二變生足太陽膀胱壬水而腎之一藏一腑成矣此天一生水矣水之精爲瞳子此後始能認人矣九十六日三變生手少陰心丁火一百二十八日四變生手太陽小腸丙火而心與小腸一藏一腑之氣足矣此地二生火也火之精爲神此後能嬉笑也一百六十日五變生足厥陰肝乙木一百九十二日六變生足少陽膽甲木而肝與膽一藏一腑受氣足而神合矣此天三生木也木之精爲筋此後能坐矣二百二十四日七變生手太陰肺辛金二百五十八日八變生手陽明大腸庚金而肺與大腸一藏一腑之氣足矣此地四生金也金之精爲聲此後始能習人語矣二百八十八日九變生足太陰脾己土三百二十二日十變生足陽明胃戊土乃脾胃一藏一腑之氣足矣此天五生土也土之精爲肉脾胃主四肢此後能匍匐矣三百五十二日十一變生手厥陰心包絡三百八十四日十二變生手少陽三焦三焦配腎腎主骨髓自此能坐象能立能行矣變蒸已足而形神俱全矣此正如蠶之眠不如是不足成人

矣凡一變之過則筋骨手足以漸而堅知覺運動以漸而發日異而月不同曰變者變易也曰蒸者發熱也祖訓云變蒸雖是胎疾非胎熱胎毒之可比此少陰生長之氣發育萬物者兒之强者雖有是病不覺氣弱者始見如變後形體漸長知識漸增及爲無病兒也故無用治古方黑子散姑置之可也其間或有未及期而發熱者或有變過熱留而不除者抑有他故須詳察之如昏睡不乳則不須治待其自退

兼證

變蒸之時有外感風寒者宜發散惺惺散主之按摩法亦可用也內傷乳食者宜須消導胃苓丸主之輕則節之可也有被驚嚇及客忤者安神丸至聖保命丹如變蒸過受病以治病爲主慎勿犯其胃氣咳嗽甘草桔梗湯加阿膠吐瀉理中湯加藿香葉驚風琥珀抱龍丸瀉青丸導赤散如受病後而變蒸養正補脾爲主錢氏異功散加對病之藥

變蒸發熱甚者發搐只用導赤散瀉青丸主之效

夜啼

心屬火惡熱心熱則煩多夜啼或日夜啼宜導赤散主之

百日嗽

小兒初生至百日內嗽者謂之百晬內嗽痰多者宜玉液丸肺虛者阿膠散主之此名胎嗽最爲難治如喘嗽氣促連聲不止以致發搐必死

育嬰家祕

初生

孩兒初生襁褓中如苗秀實漸成童四因內外能分辨治不乖方大有功

幼科立方古有定制兒初生后病者惟以膏丸化而服之蓋以變蒸未定腸胃脆薄恐不勝藥則立調治乳母之法一歲之后則有湯藥與大人同但劑小耳

有因氣動而病生于內者如驚病蟲癖之屬驚用安神丸內釣用木香丸蟲用安蟲丸癖用消癖丸

有不因氣動而病生于內者如傷乳食之屬初傷以胃苓丸和之和之不去以保和丸消之消之不去以脾積丸取之量兒虛實勿損胃氣

有因氣動而病生于外者如結核蟲疥丹癗之屬結核用家祕內消丸蟲疥用苦參丸丹癗用砭法

有不因氣動而病生于外者如傷風傷寒傷暑傷濕之屬風用瀉青丸防風惺惺散寒用理中丸藿香正氣散暑用凉驚丸黃連香薷飲濕用胃苓丸天水五苓散

胎疾

胎疾初生治最難幼科證治若空談丹溪妙論如繩墨家祕書中次第看

小兒胎病有不必治有不可治者嘗觀內經顛疾之文東垣紅絲瘤之論則兒疾之生于父母者似乎不必治矣一臘之臍風不治百晬之痰咳難醫未三月而驚搐者凶恰一月而丹瘤者死又不可治者矣今幼科有胎熱胎寒胎肥胎瘦胎驚胎黃之論證治雖詳豈小兒常服之藥也況寒熱者胎胚之餘毒也肥怯者父母之賦予也非惟不可治亦且不必治矣惟丹溪論治胎毒者只謂治乳母其法誠幼科之繩墨歟

胎寒者母娠時多熱病乃服寒凉之藥令兒受之生後昏昏多睡間或吮乳瀉白此其候也或百日之內忽病戰慄口冷手足卷曲不伸拘攣握拳腹痛晝夜啼哭不止此生后受寒得之亦名毒胎宜服溫補之劑當歸散主之乳母宜服釀乳當歸散

胎熱者母娠時喜食煎炒辛熱之物或患熱病失于清解使兒受之生後目閉面赤眼泡浮腫常以身努呢呢作聲或時啼叫或時驚煩遍身壯熱小便黃澀此胎熱也若不早治則丹瘤瘡癤由此而生宜用凉黃連炙甘草各等分爲末入硃砂半之和勻生蜜調成劑每取豆許大納兒口中令其嚥下乳母宜服釀乳亦芍散

胎驚者母娠時曾因驚悸氣傳于子子受之生後頻頻發驚此胎癇也不可治治之無功如因有熱發搐者必先啼哭亦名胎驚用燈心湯下東垣安神丸效如搐不止者此眞搐也勿治

小兒胎疾有胎稟不足並宜地黃丸有胎毒者如胎熱法所謂胎稟不足者各隨五藏論之如語遲心氣不足也心主言行遲者肝氣不足也肝主筋齒髮不生者腎氣不足也髮者血之餘腎主血齒者骨之餘腎主骨吐瀉頻併者脾胃之氣不足也脾胃爲水穀之府啼聲短者肺氣不足也肺主聲

臍風

臍在身中號命關衝任在此養壻根最宜調護無傷損纔少差池減壽元

臍在兩腎之間謂之命門乃人之根本也衝任胃三脈皆起于臍之下任脈自中而上至于人中與腎脈

合衝脉二道夾任脉而上散于舌下與脾脉合胃脉二道又夾衝脉任脉而上入于齦中上下往來如環無端故男子十六歲而精行女子十四歲而血動任脉行衝脉滿胃脉實也小兒初生三脉方具而臍之關係尤重也所以斷臍之時不可不慎或剪臍帶太短或結縛不緊致外風侵于臍中或用鐵器斷臍爲冷所侵浴兒時或牽動臍帶水入生瘡客風乘虛而入內傷于腎腎傳肝肝傳心心傳脾脾傳肺肺蘊蓄其毒發爲臍風之病其證面赤啼哭者心病也手足微搐者肝病也脣青口撮痰涎壅塞者脾病也牙關緊者腎病也啼聲不出者肺病也五臟之中略見一二臟形證者病猶可治悉見不能矣

臍風惡候幾遭傷一臘之中最不祥識得病在何處起無求無患早隄防

小兒初生一臘之內惟臍風爲惡候也如臍腫腹痛啼哭不止脣青口撮者曰臍風牙關緊急吮乳不得啼聲不出者曰噤風肚腹緊脹腸若雷鳴大小便不通者曰鎖肚此三者同一病也但證不同耳俗名馬牙風者是也三證多死臍腫脣撮者脾胃之氣絕于中也噤風乳食不入者心肺之氣絕于上也鎖肚大小便不通者肝腎之氣絕于下也任脉止衝脉閉胃脉散如之何不死欲免此證須要隄防

預防之法小兒初生十日之內但見噴嚏多啼不乳者此將發之候也急抱兒向明處視其喉中懸癰上齶有小泡如珠之樣相聚者卽用銀挖耳或手指甲刮去之以軟綿醮甘草汁拭去其血去之早而泡白者無慮也其色黃或泡痕在而落入腹中者急用硃砂牛黃麝香各少許研細取猪乳汁調稀抹入口中或取猪乳汁一二匙與兒吞之佳蓋猪乳汁主小兒口噤不開最良或用五苓散加當歸川芎木通木香磨汁入藥內與乳母服或與兒服如上法

若失預防之法其病將來而口漸撮多啼少乳者此腹中痛也與內釣同宜五苓散加酒當歸炒吳茱萸木香乳香沒藥釣藤各二分爲極細末乳拌如芡實大納兒口中服之無時乳母仍服上五苓散又取附子桂等分爲末生薑自然汁調作餅約一分厚與臍相等放在兒臍上以紙托住上用熨斗火熨之如諸證悉見不可治也

按古方治臍風者初用控涎膏吐風痰次用益胃散和胃又用辰砂膏利驚此良法也又用殭蠶全蠍蜈蚣蜘蛛諸毒藥以祛噤風者此皆治其標也不治其本而治其標故鮮克有濟者矣然父母愛子之心必欲救之醫有活人之心不可不救也病輕各如上以五苓散爲主蓋五苓散是太陽膀胱之裏藥也澤瀉茯苓以養心安神官桂吳茱萸當歸以伐肝臟寒邪之氣白朮茯苓以去脾臟寒濕之氣木香乳香沒藥以止腹中之痛官桂茯苓澤瀉猪苓又去腎中之濕以釣藤官桂去風之搐以人乳和之或乳母乳化其氣同也若有痰者本方加膽星末口噤者加白殭蠶末更加人參末服之如大便不通者宜三黃解毒丸下之此急則治其標也去其惡毒後如此法治之

臍風之病有胎毒者十無一生吾見人家難于子息者所生之子多以臍風死如東垣所論紅瘤之事是以知之

臍瘡者其帶因有所犯而落故根未斂潰腫而成瘡也宜白龍骨枯礬黃蘗三味爲末敷之甚妙要宜常看勿使抱裙之內有尿濕也

臍突者小兒多啼所致也臍下爲氣海啼哭不止則觸動氣氣動于中臍突于外理之常也其狀突出者光浮如吹起者捏按則微有聲此證鄉俗但遇婦人挑水來者卽抱兒以突臍當擔頭上觸之不拘日數以臍入爲度每試輒效亦良法也吾見小兒臍突者多難養由于多哭也

不乳似臍風小兒生下三日之內忽有不乳者當審問之勿以不乳似臍風治也臍風有多啼撮脣之證若此無之但不乳也有吐乳乳之又吐者或因拭口不淨惡物入腹也用黃連甘草木香木瓜各少許爲末每用少許納兒口中乳汁下如有啼哭不乳者此腹痛也乃胎寒證宜上方去黃連甘草加乳香沒藥以當歸湯少許調藥如上喂之如無上證無故不乳者問其母之乳汁多少多者傷乳也宜少節之不久自思乳矣乳少者必有他證心誠求之

啼哭

孩兒多哭事堪憐何事漣洳晝夜聞饑渴癢痛如不中拂其心意自煩棼

小兒初生百日一周之內神安意靜不妄笑多哭者易養如日夜啼哭不止者難養啼與哭不同啼者無時有聲而無淚也哭者時作時止大號咷而有淚也小兒啼哭非饑則渴非癢則痛爲父母者心誠求之渴則飲之饑則哺之痛則摩之癢則抓之其哭止者中其心也如哭不止當以意度蓋兒初生性多執拗

凡有親狎之人玩弄之物一時不在其心不悅而哭謂之拗哭須急與之勿使怒傷肝氣生病也假如又不止請醫視之如大叫哭晝夜不止者肝熱也宜瀉青丸主之淡竹葉湯入沙糖一豆許化下如日夜啼哭身熱煩躁者心熱也宜導赤散加黃連燈心湯服或用東垣硃砂安神丸燈心湯下神效

夜啼

夜啼四證驚爲一無淚見燈心熱煩面瑩頰青下臍痛睡中頻笑是邪干

夜啼者臟冷也陰虛于夜則冷動冷動則爲陰極發躁寒甚作痛所以夜啼而不歇也釣藤散益黃散主之

其心熱煩啼者必有臉紅舌白赤澀之病宜導赤散加麥冬燈心或東垣安神丸甚效

小兒夜啼見燈即止者此由點燈習慣乃拗哭也

驚啼者常在夢中哭而作驚錢氏安神丸主之

有因客忤觸犯禁忌而夜啼者宜四聖保命丹用燈草燒灰和藥杵細乳汁調塗乳上令兒吮之更以術法驗之

胎驚

臍風發搐此胎毒也兒生一臘之內多啼不乳或撮脣或牙關緊或肚大或臍突發搐者此胎驚也謂之眞搐生于內者氣喘痰鳴手足冷者不治

變蒸發搐此胎病也因變蒸之後或傷風或傷乳或喫驚或發搐百日之內搐有眞假皆曰胎驚眞搐者頻發必死假搐者少宜散風化痰安神至聖保命丹主之百日以後發搐口中氣熱此肝旺病也宜瀉青丸竹葉湯入沙糖少許化服後以至聖保命丹安其神如逢變蒸之期必發搐者此胎癇也自內生者若不急治後成終身之病宜安魂鎮心定魄頻頻細與服之以不發爲度祕傳三聖散主之

胎癇者由兒在腹中受驚氣得之生來便有是病不可治也

百晬咳

小兒百日內有痰嗽者謂之百晬嗽或因出胎之時暴受風寒或因浴兒之時爲風所襲或因解換褓裳或出懷喂乳皆風之自外入者也或因乳脈湧出吞嚥不及而錯喉者或因啼哭未定以乳哺之氣逆嗆出者此病之從內出者也皆能爲咳如汗下調理之劑難與服之蓋胃氣方生恐藥傷也故曰小兒百晬咳難治

如上百晬嗽一歲及三歲者加以痰涎壅塞逆氣冲併以致發驚搐者多不可治蓋小兒無知痰在咽中不會吞吐往來自任故也將作搐者急進硃砂膏以降去之搐止者吉頻搐者凶故頭搖者目帶上視者閉目呻吟者手足擺舞者肩息胷突者喉中痰鳴者口噤不乳者喘不休者手足冷者咬牙者皆死也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百二十八卷目錄

醫部彙考四百八

小兒初生諸疾門二

魯伯嗣學嬰童百問 初誕 變蒸 噤風 撮口 臍風 胎驚風 胎風遲 身軟 五軟 五硬 夜啼 客忤驚啼 胎疾 語遲 百聆內嗽

王綸明醫雜著 臍風 小兒無補腎法

薛氏保嬰撮要 臍風 胎驚 胎風 五軟 五硬 胎證 夜啼 悲哭 語遲 百聆內嗽

樓英醫學綱目 百日內不治證 胎疾 夜啼

徐春甫古今醫統 小兒初生總論 便血臟毒 五軟五硬 變蒸

王肯堂證治準繩 初生不能啼 不小便 不大便 不小便不通 垂蘊 口中有蟲 噤風 撮口 臍風 臍突 臍溫 臍瘡 胎驚 胎癇 胎熱 胎寒 胎赤 胎黃 百聆內嗽 悲哭 五軟

李梴醫學入門 初生 撮口 噤口 臍風 胎風 胎驚夜啼 變蒸 五硬 五硬 乳嗽

龔廷賢萬病回春 初生

小兒衛生總微論方 五氣論 初生 變蒸治 變蒸賦

董鳳翀活幼精要 初誕歌

藝術典第四百二十八卷

醫部彙考四百八

小兒初生諸疾門二

明魯伯嗣學嬰童百問

初誕

楊氏云初生拭口不前惡穢入腹則腹滿氣短不能飲乳者宜用茯苓丸加減治之又法下胎毒臨產落草時濃煎淡豉汁服極好不可與辰砂黃連輕粉等其或乳食宿滯不化當用消乳丸化積溫脾等劑治之

變蒸

巢氏云小兒變蒸者以長氣血也變者上氣蒸者體熱仲陽云變者易也又云變蒸者自內而長自下而上又身熱故以生之日後至三十二日一變每變畢即覺性情有異於前何者生長臟腑意智故也何謂三十二日長骨添精神人有三百六十五骨以象天數以應期歲以分十二經絡故初生至三十二日一變生癸屬足少陰經腎臟藏精與志至六十四日二變一蒸生壬屬足太陽經膀胱腑其發耳與骫冷腎與膀胱合俱主於水天一生水地六成之至九十六日三變生丁屬手少陰經心臟藏神其性爲喜至一百二十八日四變二蒸生丙屬手太陽經小腸腑其發汗出而微驚心與小腸合主火地二生火天七成之至一百六十日五變生乙屬足厥陰經肝臟藏魂喜哭至一百九十二日六變三蒸生甲屬足少陽經膽腑其發目不閉（一本作開）而赤肝與膽合主木天三生木地八成之至二百二十四日七變生辛屬手太陰肺臟藏魄主聲至二百五十六日八變四蒸生庚屬手陽明經大腸腑其發膚熱而汗或不汗肺與大腸合主金地四生金天九成之至二百八十八日九變生己屬足太陰經脾臟藏意與智至三百二十日十變五蒸生戊屬足陽明經胃腑其發不食腹痛而吐乳脾與胃合主土天五生土地十成之又手厥陰經心包絡爲臟手少陽經三焦爲腑此一臟一腑俱無形狀故不變而不蒸也前十變五蒸乃天地之數以生成之然後始生齒能言知喜怒故云始全也太倉云氣入四肢長碎骨於十變後六十四日爲一大蒸計三百八十四日長其經脈手足手受血故能持物足受血故能行立經云變且蒸謂蒸畢而足一歲之日有餘也師曰不汗而熱者發其汗大吐者微止不可別治又六十四日爲二大蒸計四百四十八日又一百二十八日爲三大蒸共計五百七十六日變蒸既畢兒乃成人也變者變生五臟也蒸者蒸養六腑也所以成人變者上氣蒸者體熱每經一變一蒸情態則異輕則發熱微汗其狀似驚重則壯熱脈亂而數或吐或汗或煩啼躁渴輕者五日解重者七八日解其候與傷寒相似亦有變蒸之餘續感寒邪者但變蒸則耳冷骫冷上脣發泡狀如濁珠若寒邪搏之則寒熱交爭腹中作痛而啼叫之聲日夜不絕變者易也蒸於肝則目眩微赤蒸於肺則嚏嗽毛聳凡五臟六腑筋脈骨節皆循環各有證應其治法平和者微表之實熱者微利之或不治亦自愈可服紫霜丸一丸或二丸并黑散子柴胡湯變蒸者有寒無熱并吐瀉不乳多啼者當歸散調氣散主之變蒸之外小

兒如常體貌情態自然端正鼻內喉中絕無涎涕頭如青黛唇似朱鮮臉腮如花映竹情意若天淨月明喜引方笑似此平安議曰人得中和之道以爲純粹陰陽得所剛柔兼濟氣血相和百脉相順所以心志益通精神俱備臟腑充實形體固壯凡觀嬰孩顱顖固合睛黑神清口方背厚骨麤臀滿臍深肚軟齒細髮黑聲洪睡穩此乃受氣充足稟賦得中而無疾也

噤風撮口臍風

初生噤風撮口臍風三者一種病也噤風者眼閉口噤啼聲不出舌上聚肉如粟米狀吮乳不得口吐白沫大小便皆通蓋由胎中感受熱氣流毒於心脾故形見於喉舌間也抑亦生下復爲風邪擊搏所致自滿月至百二十日見此名曰犯風噤依法將護防於未然則無此患撮口者面目黃赤氣息喘急啼聲不出蓋由胎氣挾熱兼風邪入臍流毒心脾之經故令舌强脣青聚口撮面飲乳有妨若口出白沫而四肢冷者不可救其或肚脹青筋弔腸卵疝內氣引痛皆腸胃鬱結不通致之治法貴乎疏利撮口最爲惡候一臘內見之尤急臍風者斷臍之後爲水濕風冷所乘風濕之氣入於臍而流於心脾遂令肚脹臍腫身體重著四肢柔直日夜多啼不能吮乳甚則發爲風搐若臍邊青黑撮口不開是爲內搐不治爪甲黑者卽死其或熱在胷堂伸引努氣亦令臍腫可與千金龍膽湯如前三者受病之源非一朝一夕大抵裏氣鬱結壅閉不通竝用所下胎毒天麻丸定命丹朱銀丸之類可量與之千金論云小兒始生其氣尚盛若有微患卽須下之若不時下卽成大疾疾成則難療矣紫霜丸可量與之治風噤用控痰散吐風痰不若用甘草湯吐痰極穩然後和胃益脾散加減用又用辰砂膏利驚卽愈或手握拳禁口不開者不治又撮口用殭蠶膏傅脣口中或甘草湯撮風散臍風用瓜蔕散湯氏治嬰兒因剪臍傷於外風致臍瘡不乾用白礬龍骨爲末少許傅之又用舊綿少許燒灰爲末乾摻之效議曰斷臍不盈尺一臘之內隨其根蔕自腐實者深之弱者淺之淺深之理以其稟賦得之初生之兒有熱在胷堂則頻伸引呃呃作聲努脹其氣抑入根本之中所以臍突腫赤虛大可畏無識之夫將謂斷臍不利而使之然者非也此乃由胎中母多驚悸或因食熱毒之物所作宜與大連蘊飲子其熱自散其臍歸本不必以藥傅之此證亦宜早治久則難療也又有一法小兒臍風撮口初生七日內患此證者百無一生如坐視其斃者良可憫焉此法極驗世罕有知者凡患此證看兒齒齦上有小泡子如粟米狀以溫水蘸熟帛裹指擦破便安不用服藥亦良法也安臍散治臍中汁出或赤腫用白石脂末日三度傅之或油髮灰或當歸末傅亦佳

胎驚風

胎驚風者以胎婦調適乖常飲酒嗜慾忿怒驚撲母有所觸胎必感之或外挾風邪有傷於胎故子乘母氣生下卽發也其候月內溫壯翻眼握拳噤口身腰强直涎潮嘔吐搐掣驚怖啼哭腮縮頤開眼合莫誤作慢脾妄用溫藥視其眉間氣色紅赤鮮碧者可治若色黯青黑者不治虎口指紋曲入裏者可治反出外者不治其治法解散風邪利驚化涎調氣貼頤甚則以朱銀丸利之面青拳搐者當服保命丹釣藤散

胎風遍身軟

此證生下如湯火潑因胎熱母肥如腦額生瘡難治乃胎內失於扶持如脚上有瘡爛此兒不滿五年如未滿臘前便撮口兩拳相握腰項如隨便知臟腑之中生邪毒此只三朝定不可療男指向裏女指向外尚可醫治逆候則不須投藥餌矣便看眉中有青筋碧色應須有命若眉紅斷不可治如有可治之證但用全蠍散釣藤散等劑

五軟

五軟者頭軟項軟手軟脚軟肌肉軟是也無故不舉頭腎府之病項脉軟而難收治雖暫瘥他年必再發手軟則手垂四肢無力亦懶擡眉若得聲圓還進飲食乃慢脾風候也尚堪醫治肌肉軟則肉少皮寬自離喫食不長肌肉可服錢氏橘連丸莫教瀉利頻併卻難治療脚軟者五歲兒不能行虛羸脚軟細小不妨榮衞但服參芪藥等味併服錢氏地黃丸長大自然肌肉充滿又有口軟則虛舌出口陽盛更須隄防必須治膈卻無妨脣青氣喘則難治也

五硬

五硬者仰頭取氣難以動搖氣壅疼痛連胷膈間脚手心如冰冷而硬此爲風證難治肚大青筋急而不寬用去積之劑積氣消卽安恐面青心腹硬者此證性命難保如風證只依中風治之必有回生之理小續命湯加減治之尤良羌活散等劑皆可用

夜啼客忤驚啼

夜啼者臟冷也陰盛於夜則冷動冷動則爲陰極發

躁寒盛作疼所以夜啼不歇也釣藤散主之或心熱煩啼必有臉紅舌白小便赤澀之證釣藤散去當歸木香加硃砂木通煎湯調下又有觸犯禁忌而夜啼者用醋炭熏可服蘇合香丸客忤者小兒神氣嫩弱外邪客氣獸畜異物暴觸而忤之其候驚啼口出青白沫水穀鮮雜面色變易喘息腹痛反側瘛瘲狀似驚癎但眼不上竄脉來弦急而數視其口中懸癰左右若小小有腫核即以竹針刺潰之或以爪甲摘破亦佳治法辟邪正氣散驚定心爲上延久則難爲力也凡客忤中惡急作醋炭或降眞香皂角併用熏之仍服蘇合香丸即自痊愈治驚啼拗哭本事方龍齒散主之又有花火青亦卒急可用也論曰心藏神神安則臟和故小兒晝得精神安而夜得穩睡若心氣不和邪氣乘之則精神不得安故暴驚而啼叫也安神散等劑治之又有腹啼之證小兒胞胎中其母將養失宜傷於風冷則邪氣入於胞胎既生之後冷氣停留復因乳哺不節邪氣與正氣相搏故腹痛腹脹感是氣而啼也牛黃丸等劑主之冷甚者理中丸主之

胎疾

胎疾謂月數將滿母失調護或勞動氣血相干或坐臥饑飽相役或飲酒食肉冷熱相制或恐怖血脉相亂胎氣有傷兒形無補有胎熱胎寒胎肥胎弱等證胎熱則兒在胎中母多驚悸或因食熱毒之物誕生之後兒多虛痰氣急喘滿眼目睛淚神困呵欠不得伸舒吮吮作聲大小便不利或通利即有血水甚則手常拳緊脚常攣縮眼常邪視身常掣跳皆由胎中受熱宜速與大連翹飲子解散諸熱次與消風散數服無恙其胎驚胎風自見本證茲不贅述胎寒則兒在胎中母因感受寒邪或喜食生冷過度寒盛則腸鳴洩利邪氣以亂其眞氣治寒邪當用和解治藏寒則溫藏寒甚則有盤腸內釣皆因寒而得之大便青者是也各有本證見之胎黃候則小兒生下遍體面目皆黃狀如金色身上壯熱大便不通小便如梔子汁乳食不思啼叫不止皆因母受熱而傳于胎也凡有此證乳母可服生地黃湯仍忌熱毒之物胎肥則生下肌肉厚遍身色紅滿月以後漸漸羸瘦目白睛粉紅色五心煩熱大便難時時生涎浴體法主之胎弱則生下面無精光肌肉薄大便白水身無血色時時哽氣多噦目無精彩亦當浴體法治之凡胎氣稟賦有壯有弱其母飲食恣令饑飽起止無忌令兒得疾不寒即熱不虛即怯熱乃作壅寒乃作洩虛則作驚怯則作結寒則溫之熱則凉之虛則壯榮怯則益衛驚用安神丸結用微利詳審用之可保無虞不若古人胎教之法決無諸證生子必形容端正爲世之英傑也

語遲

巢氏云小兒四五歲不能言蓋人之五臟以心之聲爲言所不能言者由在胎時其母卒有驚怖內動於兒臟邪氣乘於心故令心氣不足而不能言也宜服錢氏菖蒲丸以意加減久服取效

百晬內嗽

此名乳嗽實難調理亦惡證也當審虛實而施治焉實者散之虛者補之其證氣麤痰盛口瘡眼熱發後可利之比金丸等藥主之散其實也其證嘔吐後驚悸困倦自汗當用補肺散益黃散天麻散補其虛也大抵治驚嗽琥珀散主之天麻丸乃要藥也用天麻蟬退殭蠶川芎人參甘草硼砂天竺黃牛膽南星白附子雄黃末之煉蜜丸如芡實大金箔爲衣每服一丸薄荷湯化下治未滿百晬咳嗽不止遠勝諸藥也

王綸明醫雜著

臍風

小兒初生百日內臍風方書率用南星殭蠶等風藥多不效當作胎毒瀉陽明火邪馬牙亦是胎毒用針挑破桑樹白汁塗之桑汁主小兒鵝口及口瘡舌上瘡神效初生小兒時時與看頻傅桑汁不然舌硬緊漸至撮口難治

註　按曾世顯云嬰兒一七之內壯腹脹硬臍畔浮腫撮口不開攢眉而叫名臍風或因剪臍帶少短或因束縛不緊牽動風入臍中或因鐵器斷臍冷氣入內傳於脾絡致舌强唇青手足微搐不能吮乳啼聲似鴉喉痰潮響急掐破口泡去其毒水以艾炙臍中亦有復生者治法多端無如灸法或以天南星一錢生薑自然汁調灌爲妙

小兒無補腎法

小兒無補腎法蓋稟父精而生此天一生水化生之源腎之根也此根日賴脾胃乳食水穀長養男至十六而腎始充滿既滿之後婚媾妄用虧損則可用藥補之若受胎之時稟之不足則可無補藥之原足又何待於補耶

註按小兒行遲齒遲解顱頗塡五軟鶴膝腎肘齒齡睛白多愁凡此皆因稟受腎氣不足當以六味地黃丸加鹿茸補之若因精氣未滿而御女以通多致頭目眩暈作渴吐痰或發熱足熱腰腿痠軟或自汗盜汗二便濇痛變生諸疾難以名狀余嘗用六味八味二丸及補中益氣之劑加減用之無不奏效

薛氏保嬰撮要

臍風

臍風宜先用龍膽湯天麻丸之類以去痰涎後用益脾散之類補脾胃若臍邊青黑手拳口噤是爲內搐不治受病之源皆因乳母七情氣鬱厚味積熱所致若爪甲黑伸引努力臍突者用大連翹飲子之類又田氏治噤風用天南星末一錢片腦少許以指蘸蓋汁擦齦立開丹溪用赤足蜈蚣去足炙爲末以猪乳調五分徐徐灌之或用牛黃以竹瀝調服一字隨以猪乳滴於口中聖惠方用鬱金藜蘆瓜帶爲末水調搐鼻中錢氏云撮口因浴後拭臍風邪所入而作用益黃散補之無擇云視其齒齦有泡擦破口既開用眞白殭蠶爲末蜜調塗口內保嬰集云小兒百日臍風馬牙當作胎毒瀉足陽明火用針挑破以桑樹白汁塗之又云初生小兒時時宜傅桑汁不然多有舌硬撮口之證竊謂臍風果因浴拭外傷皮膚者用綿灰或枯礬抹擦即愈若因乳母肝脾鬱怒致兒爲患當治其母若因剪臍短少或因束縛不緊或因牽動風入臍中或因鐵器斷臍冷氣傳於脾絡以致前證者口內有小泡急挌破去其毒水以艾灸臍中亦有生者

胎驚

小兒胎驚風當散風利驚化痰調氣及貼顱法甚則以硃銀丸下之若面青拳搐用保命丹釣藤散全蠍散之類大抵小兒臟腑脆弱不可輒用銀粉鎮墜之劑反傷眞氣多致不救者且姙娠每月各有經脈滋養一月屬肝二月屬膽三月屬心四月屬小腸五月屬脾六月屬胃七月屬肺八月屬大腸九月屬腎十月屬膀胱多因姙娠時受患而作也須察於某月受病在某經和其陰陽調其脾胃兼以見證之藥佐之無有不愈

胎風

小兒初生其身有如湯潑火傷者此皆乳母過食膏粱所致也其母宜服清胃散及逍遙散以清其氣血兒亦飲數滴可也有身無皮膚而不燃赤者皆由產母脾氣不足也用粳米粉傅之燃赤發熱者皆由產母胃中火盛也用石膏傅之經謂脾主肌肉肺主皮毛故知病脾肺也如腦額生瘡者火土相合遂成濕熱下流攻擊腎水也難治如脚上有瘡者陰虛火盛也此不滿五歲而斃如未滿月而撮口握拳腰軟如隨者此肝腎中邪勝正弱所致也三日內必不治若因大病虧損胃氣而諸臟虛弱所致者用補中益氣湯錢氏地黃丸若面唇赤色正屬腎水不足肝經陰虛火動而內生風熱爾當滋腎水以制陽光其身軟者內稟氣不足肌肉未堅也當參五軟而施治之

五軟

五軟者頭項手足肉口是也夫頭軟者臟腑骨脉皆虛諸陽之氣不足也乃天柱骨弱腎主骨足少陰太陽經虛也手足軟者脾主四肢乃中州之氣不足不能營養四肢故肉少皮寬飲食不爲肌膚也口軟者口爲脾之竅上下齦屬手足陽明陽明主胃脾胃氣虛舌不能藏而常舒出也夫心主血肝主筋脾主肉肺主氣腎主骨此五者皆因稟五臟之氣虛弱不能滋養充達故骨脉不強肢體痿弱原其要總歸於胃蓋胃水穀之海爲五臟之本六腑之大源也治法必先以脾胃爲主俱用補中益氣湯以滋化源頭項手足三軟兼服地黃丸凡此證必須多用二藥仍令壯年乳母飲之兼慎風寒調飲食多能全形

五硬

五硬者仰頭取氣難以動搖氣壅作痛連於胷膈脚手心冷而硬此陽氣不營於四末也經曰脾主四肢又曰脾主諸陰令手足冷而硬者獨陰無陽也故難治若肚筋青急者木乘土位也急用六君子湯加炮薑肉桂柴胡升麻以復其眞氣若係風邪當參驚風治之此證從肝脾二臟受病當補脾平肝仍參痙證急慢驚風門治之

胎證

小兒胎證謂胎熱胎寒胎黃胎肥胎弱是也胎熱者初生旬日之間目閉色赤眼泡腫啼叫驚煩壯熱溺黃此在胎中受熱及胷膈內蘊宜用清胃散之類胎寒者初生百日內或手足攣屈或口噤不開此在胎母過食生冷或感寒氣宜用五味異功散之類胎黃者體目俱黃小便祕澀不乳啼叫或腹膨泄瀉此在胎母過食炙煿辛辣致生濕熱宜用生地黃湯之類

熱盛者瀉黃散之類胎肥者肌肉熏厚遍身血色彌月後漸瘦五心煩熱大便不利口吻流涎此受母胃熱所致也乳母服大連翹飲兒用浴體法以疏通其腠理胎弱者面無精光肌體瘦薄身無血色大便白水時時哽氣目無精神亦宜用浴體法

夜啼

夜啼有二曰脾寒曰心熱也夜屬陰陰勝則脾臟之寒愈盛脾爲至陰喜溫而惡寒寒則腹中作痛故曲腰而啼其候面青白手腹俱冷不思乳食是也亦曰胎寒用釣藤散若見燈愈啼者心熱也心屬火見燈則煩熱內生兩陽相搏故仰身而啼其候面赤手腹俱緩口中氣熱是也用導赤散若面色白黑睛少屬腎氣不足至夜陰盛而啼也宜用六味丸若兼泄瀉不乳脾胃虛弱也用六神散若兼吐瀉少食脾胃虛寒也用六君炮木香大便不化食少腹脹脾氣虛弱也用異功散心血不足者歸脾湯安神丸木火相搏者柴胡梔子散肝血不足者地黃丸大抵此證或因吐瀉內亡津液或禀賦腎陰不足不能滋養肝木或乳母恚怒肝火侮金當用六君子湯補脾土以生肺金地黃丸壯腎水以滋肝木若乳母鬱悶而致者用加味歸脾湯乳母暴怒者加味小柴胡湯乳母心肝熱搏者柴胡梔子散仍宜叅客忤驚啼覽之

悲哭

悲哭者肺之聲淚者肝之液也若六脈弦緊者先以溫湯浸其身取汗次以凉膈散之類清其內熱此張子和治法如此若因乳母怒火遺熱於肝肝火炎熾反侮肺金金木相擊故悲哭有聲者宜用六君柴胡山梔以補脾清肝用六味丸以壯水生木有因驚風過服祛風燥血之藥而致者有因吐瀉內亡津液而致者及禀父腎陰不足不能生肝者治各審之若小兒忽然大叫作聲者不治此稟腎陰不足虛火炎上故也用六味丸多有生者仍叅覽夜啼客忤驚啼重舌口瘡天釣內釣等證

語遲

錢氏云心之聲爲言小兒四五歲不能言者由娠母卒有驚動邪乘兒心致心氣不足故不能言也有稟父腎氣不足而言遲者有乳母五火遺熱閉塞氣道者有病後津液內亡會厭乾涸者亦有脾胃虛弱清氣不升而言遲者心氣不足用菖蒲丸腎氣不足用羚羊角丸閉塞氣道用加味逍遙散津液內亡用七味白术散脾胃虛弱用補中益氣湯

百晬內嗽

百晬內嗽者名乳嗽甚難調理當審其虛實若氣粗痰盛口瘡眼熱先用比金丸嘔吐驚悸困倦自汗用補肺散驚嗽用琥珀散乳嗽用天麻丸若脾胃內熱用抱龍丸風邪外感者用惺惺散痰熱既去而氣粗痰盛或流涎者脾肺氣虛也用異功散加桔梗口瘡眼熱大便堅實者用三黃丸大便不實者用白术散若嘔吐不乳困倦自汗或自利腹脹者脾胃氣虛也用六君子加柴胡若驚悸困倦痰盛不乳者心脾血虛也四君子加芎歸酸棗仁或因乳母食五辛厚味致兒爲患者仍叅喘嗽諸證

樓英醫學綱目

百日內不治證

發斑膿風撮口馬脾風龜背

胎疾

胎實面紅黑睛多者善胎怯面黃目黑睛少白睛多者多哭更別父母肥瘦肥不可生瘦瘦不可生肥也母氣不足則羸瘦肉薄父精不足則解顱眼白多

胎熱生下有血氣時時叫哭身壯熱如淡茶色目赤大便亦黃糞稠急釀乳浴法主之

小兒在胎時因母有熱或恣食酒麵熱毒之物傳於胎中令兒生下面赤眼閉身體壯熱哭聲不止口熱如湯乃胎熱之候也宜生地黃湯

凡胎熱服藥不可求速效治法當釀乳漸解之若處以凉藥攻之必損脾胃加以嘔吐乃成大患宜服生地黃湯用釀乳法

小兒胎中有寒生下不能將護再傷於風其候面色青白四肢逆冷手足顫動口噤不開乃胎寒之故或寒氣乘虛入藏作腹痛盤腸內釣

月裏生驚急取猪乳細研辰砂牛黃各少許調抹口中神效乳母服防風通聖散三劑其驚自消

月裏生嘔先用硃砂丸下之如利後用硃沉煎墜其邪氣使穢物自下而不嘔也

月裏生肌膚如赤丹塗者先用牛黃散托裏續用藍葉散塗外乳母服清凉飲子三大劑

右小兒初生下月裏諸疾蓋胎毒之淺者若一二歲後所生之疾乃胎毒之深者宜權法治之

夜啼

小兒夜啼有四證一曰寒二曰熱三曰重舌口瘡四曰客忤寒則腹痛而啼面青白口有冷氣腹亦冷曲

腰而啼此寒證也熱則心躁而啼面赤小便赤口中熱腹煖啼時或有汗仰身而啼此熱也若重舌口瘡要吮乳不得口到乳上即啼身額皆微熱急取燈照口若無瘡舌必重也客忤者兒生人氣忤犯而啼也各隨證治之

徐春甫古今醫統

小兒初生總論

凡小兒初生一周之內密室穩褓大地八風之邪豈得爲害良由在胎之時母失調護或過勞相干或過食傷胃或驚恐相觸或跌撲致傷誕生之後故有胎驚胎黃胎寒胎熱胎肥胎怯諸證生焉外因浴洗拭口斷臍灸顱之不得其法致有噤口臍風鎖肚不乳等證患此者多難救療雖黃帝之聖亦稱不能察別今世小兒醫尤宜精審淺深虛實而權衡爲治乃濟世之良工也

小兒初生無穀道者逾旬日必不可救至腹脹不食乳則成內傷雖通穀道似不勝其治矣必須早用刀刺之要對腸孔親切開通之後用綿帛如榆錢大卷如指以香油浸透插之使其再不合縫四傍用生肌散搽之自愈

便血臟毒

小兒初生七日內大小便有血出者此由胎氣熱盛所致也母食酒麵多煿熱物流入心肺兒在胎內稟受熱毒亦傳心肺且女子熱入於心故小便有之男子熱入於肺故大腸有之血出淡淡有水胚紅色盛則其血鮮凡有此證不可以他藥只以生地黃取自然汁入蜜少許和勻溫服自愈男女皆效

五軟五硬

五軟證名曰胎怯良由父精不足母血氣衰而得有因母血氣弱而孕者有受胎而母多疾者或其父母貪色體氣虛弱或年紀已邁而復見子有日月不足而生者或服墜胎之劑不去而竟成胎者耗傷眞氣及其降生之後精氣不充筋骨痿弱肌肉虛瘦神色昏慢致使頭項手足身體軟弱名爲五軟歌曰稟氣元虛髓不充六淫之氣易來攻頭兼手足身羸弱此證名爲五軟同

五硬證頭硬不能俯視氣雍骨腦手足心冷如冰而硬名曰五硬又有肚大青筋而不寬宏去積之劑心腹硬者亦是

變蒸

初生小兒變蒸者陰陽水火變蒸於氣血而使形體成就是五臟之變蒸而七情所由生也變者性情變易也蒸者身體蒸熱也兒當變蒸之候身上溫溫壯熱上脣頭起白泡珠如魚目耳尻俱冷目無光彩微欲驚而不乳哺輕則如此重則脈亂壯熱躁渴夜啼傷寒相似或自汗盜汗如此者須用古法調和不可深治太過亦有胎氣稟賦當其變蒸之候皆無形證自然一一變易知覺此爲脫變蒸也就物言之亦有變龍蛻骨虎換爪豹變文物類尚變況於人乎故兒初生三十二日爲一變六十四日爲二變兼蒸九十六日爲三變一百二十八日爲四變幷蒸一百六十日爲五變一百九十二日爲六變幷蒸二百二十四日爲七變二百五十六日爲八變幷蒸二百八十八日爲九變三百二十日爲十變幷蒸此十變畢後更逾六十四日爲一大蒸逾一百二十八日爲二大蒸逾一百九十二日爲三大蒸通計五百七十六日總共十變八蒸兒乃血脈充榮骨肉堅壯而成人也

凡一變蒸三十二日其候當二十八九日之間或有蒸熱至三十六七日方退此爲先期五日而作後期五日而已重者常有十日輕者先二日而微覺後二日而即退亦有全不見候而暗變者爲胎盛也寶鑑謂初變屬肝木二變肺金三變心火四變脾土五變腎水五行生尅故有變蒸錢氏謂初變屬腎水爲天一生水故以生成爲次序二說俱通大抵亦有不依序而變如傷寒不循經之次第也但看何臟見候而調之爲妙如蒸於肝則目昏而微赤蒸於肺則嚏咳而毛脫蒸於脾則吐乳而或瀉蒸於心則微驚而壯熱蒸於腎尻冷而耳熱五臟六腑各見其候以意消息調和不必深固膠執而返求全之毀也抑此自然有是變蒸之理輕者不須用藥至期自愈甚者過期不愈按候而調之著中而已

王肯堂證治準繩

初生不能啼

水鑑方云胎風生下不能啼須使園中小葉葵搗取汁調熊膽末纔交入口免傾危

不小便

小兒初生不尿者多因在胎時母恣食噉熱毒之氣流入胎中兒飲其血是以生而臍腹腫脹如覺臍四旁有青黑氣色及口撮即不可救也如未有青黑色不飲乳者宜服葱乳湯

不大便

俗名鎖肚由胎中受熱熱毒壅盛結於肛門閉而不通無復滋潤所以如此至若第三日不通急令婦人以溫水漱口吸咂兒前後心并臍下手足心共七處凡四五次仍以輕粉半錢蜜少許溫水化開時時將少許服之以通爲度如更不通即是肛門內合當以物透而通之金簪爲上王瞢次之須刺入二寸許以蘇合香丸納入孔中糞出爲快若肚腹膨脹不能乳食作呻吟聲至於一七難可望其生也

田氏治法先用硬葱鍼紲肛門如大便不下後用牛黃散送硃砂丸一時自見

大小便不通

小兒初生日腹脹欲絕大小便不通亦如前法吸咂臍前背心手足臍下七處以紅赤色爲度須臾自通

垂癰

小兒出腹六七日後其血氣收斂成肉則口舌喉頰裏清淨也若喉裏舌上有物如蘆葦盛水狀者若懸癰有脹起者可以綿纏長鍼留刃處如粟米許大以刺決之令氣洩去去青黃赤血汁也一刺之止消息一日未消者來日又刺之不過三刺自消盡餘小小未消三刺亦止自然得消也有著舌下如此者名重舌有著頰裏及上齶如此者名重齶有著齒斷上者名重斷皆刺去血汁也刺後用鹽洗拭急用如聖散或一字散摻刷

口中有蟲

外臺療兒吃奶不穩七日以來壯熱顏色赤鼻孔黃恐作撮口及牙關蟲似蝸牛亦似黃頭白蚌螺用竹瀝半合和少許牛黃服瘥又猪肉拭口即蟲出

噤風

巢氏云兒口內忽結聚舌上如黍不能取乳名噤由在胎熱入臟心偏受熱

聖惠初生兒須防三病一撮口二著噤三臍風皆急病著噤尤甚過一臘方免牙關緊急哭乳不穩啼聲漸小口吐涎沫人兒大小便通以爲冷熱所得不知病在喉舌狀亦極重善救療者十不得三四依將護法防於事先必無此患

但有此證急看兒上齶有點子先以指甲輕輕刮破次服定命散辰砂全蠍散之類如口噤不開服諸藥不效者生南星去皮臍研爲極細末龍腦少許合和用指蘸生薑汁於大牙根上擦之立開凡臍風撮口噤風三者雖異其受病之源則一也大抵裏氣鬱結壅閉不通並宜服煎豆豉汁與喫取下胎毒千金云小兒初生其氣高盛若有微患即須下之若不時下則成大疾難爲療矣紫霜丸量而與之

茅先生云兒生一百二十日內犯風噤因母受胎有疾故受毒氣生來血氣未調又被風邪所擊致之治法先與奪命散吐風涎後下醒脾散夾勻氣散與服又下雄牛散夾硃砂膏常服即愈如手捉拳噤口不開死

撮口

外證舌強脣青聚口撮面而目黃赤氣息喘急啼聲不出飲乳有妨若口出白沫而四肢冷者不可救療其或肚脹青筋弔腸卵痛內氣引痛皆腸胃鬱結不通致之治法費乎疏利辰砂膏是也初生一臘乃免七日也

張涣云嬰兒胎氣挾熱亦因母有邪熱傳染或生下沐浴當風穢觸失度致令嬰兒啼聲不出乳哺艱難名曰撮口不開病七日之內尤甚急風散主之

臍風

千金有臍風臍瘡臍濕三者皆因斷臍後爲風濕傷而成夫風入臍臍腫腹脹四肢不利多啼不能乳甚者發搐爲臍風腫濕經久不乾爲臍濕風濕相搏令臍生瘡久不瘥爲臍瘡有一不已入于經脈多變爲癇癇成作癇治

曾氏法先投劫風膏次以五苓散加寬氣飲入薑汁葱白煙心煎湯調服與解風痰及用一字金煎荊芥湯或薄荷湯調抹口內證輕即快

如稟賦充實發熱有痰驚搐投黑白飲溫蜜湯空心調下微泄似茶褐色二三行進白芍藥湯水薑棗煎服常用此法亦妙若臍凸肚緊微有青色口撮一開肝風盛而脾土受制不可施治凡有此候百無一治縱使得安亦非長壽

臍突

曾氏曰臍突一證又非臍風此亦因初生洗浴緊臍不緊穢水浸入于內產後旬日外臍忽光浮如吹捻動微覺間或驚悸作啼治用白芍藥湯加慈苡仁水煎空心溫服次以外消散塗貼自然平復

臍風撮口在百日內多不治

臍濕

嬰兒臍中腫濕經久不瘥若至百日即危急宜速療之

臍瘡

巢氏曰因浴兒水入臍中或尿濕綿包致臍中受濕腫爛成瘡或解脫爲風邪所襲入于經絡則成風痢若臍腫不乾久則發搐

胎驚

小兒壯熱吐哯心神不寧手足抽掣身體强直眼目反張是胎驚風證

胎驚者以妊婦調攝乖常飲酒嗜慾忿怒驚仆母有所觸胎必感之或外挾風邪有傷於胎故子乘母氣生下卽病也其候月內壯熱翻眼握拳口噤咬牙身腰强直涎潮嘔吐搐掣驚啼腮縮顯開或赤或面青眼合

凡胎風搭眼噤口之類急取猪乳細研牛黃麝香各少許調抹入口中仍服導赤散以瀉肝之子卽愈矣石壁經敎未出胎中一月來母驚成患于臨胎腰直哭時先口撮面青拳搐縮雙腮眼閉咬牙筋脉急

受氣時若陰氣弱胎易驚落肉消甚陽氣弱胎難驚落手足細肌肉瘦皆不盡天年若日月滿因驚落口撮腮臉起鼻塞口噤勿作驚治微汗次治驚

調氣乳母服調氣藥兒貼顖

任喚千聲眼不開退卻風涎爲治療涎去驚邪自不回

失治則目瞑先治驚則吐瀉秋夏必脾風初見勿作脾風治恐汗不出生別證先風用髓烏犀丸次珠銀丸

湯氏云治胎癇驚風皆可服全蝎頭尾全者用生薄荷葉包外以麻線縛火上炙燥爲末別研生硃麝香各少許煎麥門冬湯調下

胎癇

曾氏云胎癇者因未產前腹中被驚或母食酸鹹過多或爲七情所汨致傷胎氣兒生百日內有者是也發時心不寧面微黃氣逆痰作目上視身反張啼聲不出先用蘇飲和解次以不驚丹或琥珀抱龍丸間投輕則可愈重者難痊

胎熱

兒在胎中母多驚悸或因食熱毒之物降生之後旬日之間兒多虛痰氣急喘滿眼閉目赤目泡浮腫神困呵欠呢呢作聲遍體壯熱小便赤色大便不通時復驚煩此因胎中受熱或惯服溫劑致令熱蓄於內熏蒸胎氣故有此證若經久不治則鵝口重舌木舌赤紫丹瘤白此而生宜先以木通散煎與母服使入於乳令兒飲之通心氣解煩熱然後以四聖散溫洗兩目目開進地黃膏天竺黃散及牛蒡湯當歸散亦令母服凡有胎疾不可求速效當先令乳母服藥使藥過乳漸次解之百無一失若卽以凉藥攻之必生他病乳母仍忌辛辣酒麪庶易得安不致反覆

胎寒

嬰兒初生百日內覺口冷腹痛身起寒粟時發戰慄曲足握拳晝夜啼哭不已或口噤不開名曰胎寒其證在胎時母因腹痛而致產經云胎寒多腹痛亦有產婦喜唼甘肥生冷時果或胎前外感風寒暑濕治以凉藥內傷胎氣則生後昏昏多睡間或吐瀉白若不早治必成慢驚慢脾凡有此候宜以冲和飲當歸散和合木煨薑煎服使之微泄泄行進勻氣散調補泄止氣勻神安痛定手足舒伸次用參苓白术散以養胃氣白芍藥湯去其寒濕乳母宜節生冷飲食庶易痊也

又有手足梢冷唇面微青額上汗出不顧乳食至夜多啼頗似前證但無口冷寒戰名曰藏寒其疾夜重日輕腹痛腸鳴泄瀉清水間有不泄者此證亦在百日內有之皆因臨產在地梢久冷氣侵逼或以凉水淫湯洗兒或斷臍帶短而又結縛不緊爲寒氣所傷如此宜以白芍藥湯及冲和飲加鹽炒茴香茱萸水薑煎服并乳母同服

胎赤

張湜云嬰兒初生須洗目令淨若洗不淨則穢汁浸漬於眼皆中使臉赤爛至長大不瘥者名胎赤宜用二金散

曾氏云純陽之子始生旬月忽兩目俱紅弦爛溢癢成瞽此因在胎爲母感受風熱傳於心肝而得先以百解散加當歸散水薑煅心煎服次導赤散及牛蒡湯加黃連　賊蟬殼水煎服自效

有因難產胎氣頗澀轉側差緩其血壓于兒首遂至濺血淫下盛則灌注其眼不見曛人輕則外泡腫赤上下弦爛若投凉藥必寒臟腑宜與生地黃湯主之

胎黃

小兒生下遍體面目皆黃狀如金色身上壯熱大便不通小便如梔汁乳食不思啼哭不止此胎黃之候皆因乳母受濕熱而傳於胎也凡有此證母子皆宜服地黃湯及地黃飲子有生下百日及半周不因病後生徵黃者胃熱也若自生而身黃者胎疸也經云諸疸皆熱色深黃者是也茅茹散主之若淡黃兼白

者胃怯也白朮散主之

百晬內嗽

曾氏曰百日內嬰孩偶咳嗽痰壅睡中不寧亦因產後感風而得但不可過用發散之劑先以解表散一二服次投貝母湯及惺惺散治之

悲哭

小兒有驚啼有夜啼有腹啼夫驚啼者由風邪乘心臟腑生熱熱則精神不定睡臥不安故驚啼夜啼者臟冷也夜則陰盛陰盛相感痛甚於晝故令夜啼一云有犯觸禁忌亦令兒夜啼可作法術斷之其腹啼者由腹中痛甚兒身軀張氣壅而啼也又有胎寒而啼者此兒在胎時已受病也其狀腸胃虛冷不消乳哺腹脹下痢顏色青白而時或啼叫是也

又悲哭者肺之聲淚者肝之液也若六脈弦緊者先以溫湯漬其身取汗次以涼膈散之類清其內熱此張子和治法如此若因乳母怒火遺熱於肝肝火炎熾反侮肺金金木相擊故悲哭有聲者宜用六君柴胡山梔以補脾清肝用六味丸以壯水生木有因驚風過服祛風燥血之藥而致者有因吐瀉內亡津液而致者及棄父腎陰不足不能生肝者治各審之若小兒忽然大啼作聲丹溪謂必死此禀腎陰不足虛火炎上故也用六味丸多有生者仍參觀夜啼客忤驚啼重舌口瘡天釣內釣等證

五軟

戴氏論五軟證名曰胎怯良由父精不足母血素衰而得誠哉是言以愚推之有因母血海久冷用藥強補有孕者有受胎而母多疾者或其父好色貪酒氣體虛弱或年事已邁而後見子有日月不足而生者或投墮胎之劑不去而竟成孕者從爾耗傷眞氣苟或有生譬諸陰地茂土之草雖有發生而暢茂者少又如培植樹木動搖其根而成者鮮矣由是論之嬰孩怯弱不耐寒暑縱使成人亦多有疾爰自降生之後精髓不充筋骨痿弱肌肉虛瘦神色昏慢才爲六淫所侵便致頭項手足身軟是名五軟治法用調元散補腎地黃丸漸次調養日久乃安若投藥不效亦爲廢人

李梴醫學入門

初生

初生何故便虛醫胎熱胎寒胎瘦肥胎寒身冷多瀉利盤腸內釣痛無時或不能啼或腎縮

初生有腎縮者乃初生受寒用硫黃吳茱萸各五錢爲末研大蒜汁調塗腹上仍以蛇牀子燒煙薰

生泡遍身或無皮胎熱懸癰落地死穀道無孔事亦奇二便不通因不乳若兼腹脹難支持生赤如丹生黃疸鵝口口瘡急拭之重舌木舌牙齦白盡皆母熱遺于兒

撮口

撮口聚面氣喘急胎家熱毒入心脾亦有脾肺虛寒者口沫肢冷不可爲

噤口

噤口不乳不能啼胎熱復爲風搏之此證皆因裹氣鬱吐痰利驚最得宜吹鼻噴嚏還可治七朝見此十分危

臍風胎風

臍風冷濕氣流臍腫腹脹四肢柔或多啼搐防撮噤間有熱者生可求

若日夜多啼不能飲乳甚則發搐撮口噤口是爲內搐不治凡臍邊青黑爪甲黑者俱死古方大利驚丸主之或用吹鼻法有噦可治其者金烏散或外科賽命丹一捻金妙如風搐稍定多啼煩躁者大溫驚丸主之亦有熱在胃堂伸引努氣亦令臍腫于金龍膽湯小涼驚丸主之

胎風癇證多嘔吐生者紅色注眉頭

胎驚夜啼

上夜驚啼多痰熱仰身有汗赤面頰

月內夜啼驚惕抽掣者乃胎中受驚所致宜豬乳膏琥珀防風各一錢硃砂五分爲末用猪乳汁調一字抹兒口中或保命丹金箔鎮心丸驚有痰者抱龍丸驚有熱者涼驚丸龍腦安神丸尋常邪熱夜啼者用燈花三顆爲末燈心煎湯調抹兒口中以乳汁送下日二服大概有痰熱者多上半夜仰身有汗而啼面赤心躁小便赤澀口中與腹皆熱也

下夜曲腰必虛寒甚則內釣手足掣

夜啼氣虛者四君子湯加山藥扁豆挾熱加黃連竹葉血虛焦啼者用當歸爲末乳汁調服氣血俱虛腹痛夜啼者用黃芪當歸赤芍木香甘草等分爲末每挑少許著乳頭上使吮乳服之有胎寒及衣被過凉以致臟寒盤腸內釣肚腹脹痛啼則眼目上視手足搐掣蓋夜則陰盛寒則作痛甚則陰

盛發蹙所以夜啼宜保命丹輕者益黃散外炒麥麩熨之凡下半夜曲腰而啼面目青白捫腹覺冷必冒寒腹痛也有因驚受風邪而啼者二活散羌活獨活各二分檳榔天麻麻黃甘草各一分水煎或加南星爲末蜜調可貼顖門有傷乳食作痛而啼者消乳食丸

客忤中惡哭黃昏

有日夜驚啼必黃昏前後尤甚者乃客忤中惡

飲乳方啼爛口舌

有欲飲乳到口便啼身額皆熱者看其口若無瘡必喉舌腫痛宜水梅丸薄荷煎治之凡初生月內多啼者吉胎熱胎毒胎驚得散且無奇疾要知頻浴傷腹便成臍風不忌生人異物則爲客忤噤口驚啼乳食重服則吐瀉痰逆過煖則口舌瘡瘍過凉則臟寒釣氣調理之法適中而已

變蒸

變則氣升蒸則熱八蒸十變長氣血

小兒初生形體雖具臟腑氣血尚未成就而精神志意魂魄俱未生全故變蒸既畢學語倚立扶步能食血脉筋骨皆牢稟氣盛者暗合而無外證稟氣弱者乃有蒸病

輕則潮汗微似驚

輕則發熱微汗似驚五日乃解

重則壯熱吐且渴

重則壯熱脉亂而數或吐或汗或煩啼燥渴七八日始解與傷寒相似亦有變蒸之後續感寒邪者如蒸於肝則目昏微赤蒸於肺則嚏嗽毛孕隨證調治

治貴平和汗下微

不汗而熱微發其汗若吐乳者微止之不可妄治宜平和飲子白茯苓一錢半人參甘草各五分升麻二分稟受弱者加白朮一錢水煎服變蒸前後三日各進一服可免百病及百日內亦宜吐瀉不乳多啼者和氣散木香香附厚朴人參陳皮藿香甘草各等分薑棗煎服宿乳者紫霜丸痰熱者惺惺散

柴胡當歸寒熱渴

骨熱心煩啼叫不已者柴胡飲柴胡人參麥門冬甘草各二分龍膽草防風各一分水煎服有寒無熱者當歸湯當歸四分木香粹桂人參甘草各二分薑棗煎服蒸熱甚者紫陽黑散積熱寒熱如瘧者梨漿飲

五軟五硬

五軟皆因稟受虧行遲語遲齒髮遲五硬強直本風證若兼腹硬兼積證

乳嗽

乳嗽百日內不宜戀膈損胃肺孤危

或因啼叫未定喫乳或飲乳過度以致停蓄胃膈胃口上干於肺故發咳嗽呃逆肺胃俱病百日內見者爲惡候

熱嗽面赤丸葦薤

其有四時感冒嗽者當用麥蘇飲惺惺散之類微表如挾熱暴嗽面赤壯熱便閉者宜葦牛丸下之虛者阿膠散可醫

襄廷賢萬病回春

初生

凡初生小兒口齶并牙根生白點名馬牙不能食乳此與鵝口不同少緩即不能救多致夭傷急用針縛筋頭上將白點挑破出血用好京墨磨薄荷湯以手指撚母油頭髮醮墨遍口齶擦之勿令乳食待睡一時醒方與乳食再擦之

小兒不時變蒸變者異常也蒸者發熱也所以變換五臟蒸養六腑須要變蒸多變氣血方榮骨脉始長情性有異則後來出痘輕可凡變蒸不宜服藥或因傷食因傷風因驚嚇等項夾雜相值而發令人疑惑亦須守候一二日俟病勢眞的是食則消食是風則行痰是驚則安神若變蒸而妄投藥餌則爲藥引入各經證遂難識而且纏綿不脫蓋藥有所悞也

一小兒月內發搐鼻塞乃風邪所傷以六君子湯加桔梗細辛子母俱服更以葱七莖生薑一片細擂攤紙上合置掌中令熱急貼顖門少頃鼻利搐止

一小兒未滿月發搐嘔乳腹脹作瀉此乳傷脾胃用五味異功散加漏蘆令母服兒亦服甚許遂愈

小兒衛生總微論方

五氣論

兒自胎孕以至生成皆稟五行而分五臟故自五氣以生五態而各不同聖濟經言五行孕秀有異宜五態委保有殊氣冲和均賦體性潛異者蓋母氣胎育有盛衰之虛實故其子生也有剛柔之勇怯又經云心氣虛而語睨肝氣微而行遲脾氣弱而肉瘠腎氣怯而解顱如此之類悉皆是矣然五臟之氣稟受殊

異其于怯弱者聖人亦有方藥以補養之矣

初生

凡小兒患臍瘡未愈不可乳令太飽太飽則令兒臍風

兒纔生舉遲或斷臍晚者令兒冒冷故寒中之也又先斷臍後洗浴則水氣得入之或洗時水氣所干亦爲中寒之候其證腹中絞痛天乩啼呼面青黑尿清白當以當歸末爲粉著于絮上炙而熨臍腹日日頻熨至啼止臍乾爲度仍不炙令太熱恐引驚也

兒自初生至七日內外忽然面青啼聲不出口撮唇緊不能哺乳口青色吐白沫四肢逆冷乃臍風撮口之證也此由兒初生剪臍不定傷動或風濕所乘其輕則病在皮膚而爲臍瘡不差其重則病入臟腑而爲臍風撮口亦如大人因有破傷而感風則牙關噤而口撮不能入食身鞭四肢厥逆與此候頗同故謂之臍風撮口乃最惡之病也急視小兒口中上下斷間若有白色如豆大許便以指甲於當中掐之自外達內令匝至微有血出亦不妨又於白處兩邊盡頭亦依此掐令內外氣斷不必直破入指甲矣恐太甚則傷兒子母祕錄云於掐破處以蜈蚣末傳之

凡兒產時諸物但令開口勿閉以厭撮口口噤也

兒自生下至　臘前後有病者多是未生之前在母胎孕之時母食毒物胎有所感至生下之後毒氣發而爲病又有母于娠娠之時失于因養氣形弗充疾因之故聖濟經言病生于中者與生俱生也

兒自初生至七日內外忽口噤不能乳腹急多啼下青黑糞或口生瘡如粟米名曰口噤此證牙關急而口噤與撮口相似撮口證面色青啼聲不出口吐白沫此口噤證面色赤而多啼口不吐白沫所以異也此緣兒在母腹中時爲風熱傷胎所致故聖濟經曰風熱傷胎生而口噤也

兒自初生已來身色青白無血色好啼哭晝夜不止身體仰而軀夜則甚腹滿不乳大便青白晝夜啼諸藥不效者此名軀啼乃兒未生以前在胞胎中時爲風冷傷所致故聖濟經曰風冷傷胎生而軀啼千金有云小兒有胎寒則腹痛軀啼時時吐哯或腹中如雞子黃大按之如水聲便泄泪而後出不急治多變爲痢

小兒難乳有二一者兒初生客風邪熱中臍流入心脾之經即令舌厚脣燥而急口不能乘乳故乳而不能咂飲也二者兒初生時拭掠口中穢血不及嚥而入腹則令兒心腹痞滿氣短促急故口不能吮乳飲之也宜服五福化毒丹等藥

兒未生之前在母腹中藉母經血以滋養焉至生下時須拭去口中惡血及用藥下盡兒腹中穢血之糞方纔飼乳若於生時揩拭兒口中惡血不令吞嚥入腹或腹中舊有穢糞不曾下之或下之不盡因而成癖故名曰血癖又名胎積至生下百日內外兒生頭瘡眼目赤澁小便如血口中氣急身體紫色腹脹躁煩多啼不乳

變蒸論

小兒在母腹中胎化十月而生則皮膚筋骨臟腑氣血雖已全具而未充備故有變蒸者是長神智堅骨脈也變者易也蒸者熱也每經一次之後則兒骨脈氣血稍強精神情性特異是以聖濟經言嬰孺始生有變蒸者以體具未充精神未壯尚資陰陽之氣水火之濟甄陶以成非道之自然以變爲常者哉故兒自生每三十二日一次者以人兩手十指每指三節共骨三十段又兩掌骨共三十二段以應之也足亦如之太倉公曰氣入內支長筋骨于十變者乃是也聖濟經又曰變者上氣蒸者體熱上氣者則以五臟改易而皆上朝藏真高于肺也體熱者則以血脈敷榮陽方外固爲陰使也故變蒸畢而形氣成就者也亦由萬物之生非陰陽氣蘊熱蒸無以榮變也兒當變時不欲食食則輒吐目白者重目赤黑者微閉而不開至變蒸了自然明矣其輕者五日而衰重者十日而衰或先期五日或後期五日或十日之中熱乃除耳若熱甚達旦不歇不得驚動勿令傍邊人多而語雜不可妄行灸刺但少與紫丸微利之則熱便止矣或用孫真人肘後黑散子粉香散調治亦可唯不可餘治若傷寒時行溫病及驚熱溫壯等候雖與變蒸頗皆相似耳熱散熱唇上無白泡珠乃爲他病各從其證爲治若于變蒸內有寒加之寒熱交爭臍腹天矯啼不止者變之則愈

變蒸賦

看病嬰兒先明四時既有變蒸之狀還如溫狀之推寒熱初來慎一七而方退周期未滿當四八以重期原夫魂魄將成筋骸始榮開舒腠理通徹奇經運用而陰陽以正往來而血氣初平頓覺精神嬰孺全然有異未知變蒸一一仔細須明肝者幹也東方所屬爲木象之三數發形證于兩目渾身壯熱令臍子以

無輝遍體昏沉爲神魂而未足四數千金二由在火
咳嗽頻頻汗珠顆顆兩日間噴噴仍加數夜裏虛驚
又可暗增骨髓學反覆以翻身漸長性情畏傍人而
戀我脾土五呼腎水一稱穀氣暗引精志時增乳哺
甘甜尻骨成而獨坐戲經絡流利掌骨具而匍匐能
次後筋脉之稍更膝踝之漸變氣盈而榮于四肢光
彩而滋于滿面亭亭立猶未穩嘍嘍語尚聲顫手足
受血移步行而堪憐耳目通神意智生而可羨斯由
呼吸以定肌體乃厚兩氣而外陽內陰一息而入鼻
出口期來應節自然臟腑充盈將養乖宜致得風邪
甚有於是髮豎無潤乳見叶口珠起丹唇冷侵骫耳
或腸鳴而微利或驚啼而勿喜經云蒸即蒸血肉之
堅變即變形神之正矣

董鳳翀活幼精要

初誕歌

小兒初誕月噤口病非輕吐氣并吹沫胎中久受驚
胷陷手顛翻父母惜應難小兒誕月初驚積變臍風
口如魚口樣天命定須終

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百二十九卷目錄

醫部彙考四百九

小兒初生諸疾門三

方龍騰湯　紫圓　白石脂散　蒲黃湯　紫圓　馬齒莧圓　龍骨圓　芍藥
散一物硝石圓　治青丸　導赤散　泌旨
安神丸　瀉黃散　五味異功散　金黃散
七味白术散　阿膠散　十全大補湯　四君子湯　六君子湯
四物湯　八珍湯　加味逍遙散　保和丸　惺惺
湯　補中益氣湯　柳華散　大連翹飲
散　加味逍遙散　茵陳湯　牛膝丸　鈎藤飲　大青
黃丸　白餅子　凉驚丸　鈎藤飲　大青
脊丸　調中丸　張氏妊娠散　鈎藤飲　六神
散　當歸散　羚羊角丸　酸棗仁湯　圓參湯
木瓜丸　塗頌丸　浴體法　消積丸　小柴胡
活散　參蘇飲　甘桔散　桔梗湯　小柴胡
湯　加味小柴胡湯　毛子清肝散　抱龍丸
小續命湯　十二味異功散　化痰打
神丸　花大脊　蟬蛻鈎藤散　天竺黃散　安
辰砂金箔散　牛黃脊　琥珀丹砂丸
搜香正氣散　磨香散　烏犀丸
定命散　立聖散　瓜蒂散　五福化毒丹
綿灰散　白龍散　一字金　封臍散　白龍
散　神效散　至聖百命丹　又　全蠍圓　角
散　白芍藥湯　木通散　全蠍圓　角
蠍散　寬氣飲　調元散　此
金脊　釀乳方　生地黃湯　丸　是
消食丸　木香丸　涼驚散　稀涎散　碧雲
散　防風通聖散　黃連解毒湯　勻氣散　丸
定志丸　枳术丸　黃連解毒湯　勻氣散　丸
下和飲子　調氣散　木香散　撮風散
換散　加減涼膈湯　安神丸　調
元湯　金蠍散　蟬花散　井硫　理中湯　滌
腎丸　玉液散　全蠍散　蠶活湯　二陳湯
理中丸　釀乳當歸散　蠶乳赤芍散　三
聖散　加減升麻葛根湯　雄黃解毒丸　東
垣安神丸　鎮金散　琥珀抱龍丸　天竺
定命丹　朱銀丸　甘草湯　艾葉湯
號散　醒脾散　發脊　惡
定命散

藝術典第四百二十九卷

醫部彙考四百九

小兒初生諸疾門三

方

龍騰湯　千金方

治嬰兒出腹血脈盛實寒熱溫壯四肢驚掣發熱大吐哯者若已能進哺中食實不消壯熱及變蒸不解中客人鬼氣幷諸驚癇方悉主之十歲以下小兒皆服之小兒能騰湯第一此是新出腹嬰兒方若日月長大者以次依此爲例一百日兒加三銖二百日兒加六銖一歲兒加半兩餘藥皆準此耳

龍騰草　鈎藤皮　柴胡　黃芩　桔梗　芍藥　茯苓一作茯神　甘草各六銖　蜣螂二枚

大黃一兩

右十味㕮咀以水一升裹取五合爲劑也服之如後節度藥有虛實虛藥如足數合水也兒生一日至七日分一合爲三服兒生八日至十五日分一合半爲三服兒生十六日至二十日分二合爲三服兒生二十日至三十日分三合爲三服兒生三十日至四十日盡以五合爲三服皆得下卽止勿再服也

紫圓

治小兒變蒸發熱不解幷挾傷寒溫壯汗後熱不歇及腹中有痰癖哺乳不進乳則吐哯食癇先寒後熱

赤石脂酥焙　代赭石煅醋淬七次各一兩

巴豆三十枚去殼膜油淨　杏仁五十枚去皮尖

右四味爲末巴豆杏仁別研爲膏相和更搗二千杵當白相得若硬入少蜜同搗之密器中收三十日兒服如麻子一丸與少乳汁令下食頃後與少乳勿令多至日中當小下熱除若未全除明旦更與一丸百日兒服如小豆一丸以此準量增減夏月多熱善令發疹二三十日輒一服佳紫圓無所不療下不虛人

錢氏直訣去赤石脂名紫霜丸

幼科全書云治小兒肚脹青筋鈎腸卵疝內氣引痛而撮口下小兒痰積尤效蓋小兒初生其氣高盛若有微疾卽須下之苟不下時卽成大疾難爲治矣惟元氣素怯者不用此法

黑散

治小兒變蒸中挾時行溫病或非在蒸時而得時行者

麻黃　杏仁各半兩　大黃六銖

右三味先搗麻黃大黃爲散別研杏仁如脂乃細細內散又搗令調和內密器中一月兒服小豆大一枚以乳汁和服抱令得汗汗出溫粉粉之勿使見風百日兒服如棗核以兒大小量之

白石脂散

治小兒臍汁不止兼赤腫

白石脂

右細研熬令微暖以粉臍瘡日三四度

蒲黃湯

治小兒落牀墮地如有瘀血腹中陰陰寒熱不止

乳哺但啼哭叫喚

蒲黃　麥冬　大黃　黃芩各十銖　甘草八銖

碎硝七銖　黃連十二銖

右七味咬咀以水二升煮取一升去滓內碎硝分三服消息視兒羸瘦半之大小便血卽愈忌冷食

當歸圓

治小兒胎寒驅啼腹中痛舌上黑青涎下一名黑丸

當歸　狼毒各九銖　吳萸一作杏仁各半兩

細辛　乾薑　附子各十八銖　巴豆十枚

豉七合（關一味）

右九味擣七種下篩秤藥末令足研巴豆豉如膏稍稍內末擣令相得蜜和棗餽盛蒸五升米飯下出擣一千杵一月兒服如黍米一丸日一夜二不知稍加以知爲度亦治水癖

馬齒礬圓

治小兒胎寒驅啼驚癎腹脹不嗜食大便青黃

馬齒礬一片燒半日

右以棗膏和如梧子大人服二丸日三小兒以意減之以腹內溫爲度有食食去極神妙

龍骨圓

治小兒五驚夜啼崔氏名五驚丸

龍骨六銖　牡蠣一作牡丹　川大黃各七銖

黃芩半兩　蚱蟬二枚　牛黃如小豆五枚

右六味末蜜丸如麻子蔚裹兒服二丸隨兒大小增減

芎藭散

治小兒夜啼至明卽安寐

芎藭　白朮　防己各半兩

右三味治下篩以乳和與兒服之量多少又以兒母手掩臍中亦以摩兒頭及脊驗二十日兒未能服散者以乳汁和服如麻子一丸兒大能服散者以意料酌與之

一物前胡圓

治少小夜啼

前胡

隨多少擣末以蜜和丸如大豆服一丸日三稍加至五六丸以瘥爲度

瀉青丸（錢氏直訣下同）

治小兒肝經實熱急驚搐搦一名瀉肝丸

羌活　壬乙同歸一治　龍膽草炒　益肝膽氣止驚

大黃瀉諸實熱　川芎入手足厥陰以其用藏血也　防風

當歸酒洗入足厥陰以其用藏血也　山梔仁瀉心火實則瀉其子各等分

右爲末煉蜜爲丸芡實大每服半丸煎竹葉湯入砂糖化下

薛己曰按前方足厥陰肝經解散肌邪疏通內藏之苦寒藥也若大便祕結煩渴飲冷飲食如常屬形病俱實宜用此瀉之若大便調和煩渴飲冷屬病氣實而形氣虛宜用抑青丸平之若大便不實作渴飲湯飲食少思肢體倦怠屬形病俱虛宜用地黃丸補之若肝經血虛生風先用四物湯加釣藤鉤以生肝血繼用四君子湯以補脾土若因肝經血燥生痰用地黃丸生腎水益肝血若土不能培木用四君子湯加當歸以補中用地黃丸以滋腎若因肺金剋肝木用六君子湯加芎藥木香實脾土以平肺金若因心虛奪母之氣或腎水虛不能生肝木者並用地黃丸主之若屢服峻劑而脾胃虛寒者必用六君子湯加丁香木香補脾胃以培陽氣若因乳母恚怒肝火妄動致兒爲患者母服加味小柴胡湯若因乳母肝脾血虛發熱致兒爲患者母服加味逍遙散子亦服數滴

導赤散

治小兒小腸實熱小便祕赤

生地黃　心與小腸之藥　甘草炙生用瀉心火

木通利小腸之熱故錢氏用以導赤也各等分

右爲末每服一錢入淡竹葉凉心經水煎服

薛己曰按瀉心湯導赤散瀉心小腸實火之劑蓋心爲脾母脾爲心子然心旣病則脾土益虛矣用者審之

祕旨安神丸

治小兒心血虛而睡中驚悸或受驚嚇而作

人參補五臟治驚悸　半夏湯泡燥脾土健胃

酸棗仁炒寧心志　茯神各一錢開心益志

當歸　橘紅　赤芍炒各七分　五味子五粒杵

甘草炙三分

右爲末薑汁糊丸芡實大每服一丸生薑湯下

瀉黃散

治小兒脾胃實熱

防風二兩　藿香入手足太陰經助脾開胃止嘔生甘草各七錢五分　石膏研五錢瀉胃火

山梔仁一兩治胃中熱氣
右用蜜酒微炒爲末每服一二錢水煎
薛己曰按前證若作渴飲冷臥不露睛手足熱甚或遍身發黃屬胃經實熱宜用瀉黃散若作渴飲湯臥而露睛手足並冷屬胃經虛熱宜用異功散若面青搐搦乳食少思肝乘脾也用祕旨補脾湯若面赤驚悸身熱昏睡心乘脾也用祕旨安神丸若面白喘嗽肢體倦怠肺乘脾也用補中益氣湯若唇黑泄瀉手足指冷腎乘脾也用益黃散病後津液不足口乾作渴宜用七味白术散若乳母膏粱厚味七情鬱火所致當審其因而治其母

五味異功散
治小兒脾胃虛弱吐瀉不食
人參　茯苓　白术炒　甘草炒　陳皮各等分
右爲末每服三錢薑棗水煎
薛己曰按前方補脾胃之聖藥也況人之一身以脾胃爲主若小兒乳食失節寒冷失宜或乳母六淫七情失調兒飲其乳諸病頓起當專以此藥治之其應如響

益黃散
治小兒脾土虛寒嘔吐泄瀉
丁香二錢去脾胃中寒　青皮下食入太陰倉　陳皮去白　訶子肉各五錢能開胃消食止痢　甘草炙三錢
右爲末每服一二錢水煎
薛己曰按前證若因脾土虛弱而吐瀉者用五味異功散若因肝木侮脾土而吐瀉者用六君子加柴胡如不應或手足指冷屬脾胃虛寒也更加木香炮薑若因乳母脾土虛而肝木侮亦治以前藥若乳母鬱怒致兒患前證母服加味歸脾湯

七味白术散
治小兒吐瀉或病後津液不足口乾作渴
乾葛二錢能鼓胃氣上行生津液陽明經藥也　人參　白术土炒　木香　白茯苓　甘草炙　藿香葉各一錢
右爲末每服二三錢水煎
薛己曰按胃傷則嘔脾傷則瀉故用前藥調補胃氣以化生津液如無他證只因胃氣虛而津液不足者用四君子湯尤效
張景岳曰此方治小兒虛熱而渴如無氣滯吐瀉等證則當減去木香藿香以避燥而耗氣

阿膠散
治小兒肺虛咳嗽口乾作渴
明阿膠一兩麩炒能補氣不足　甘草炙一錢
馬兜鈴五錢主肺熱咳嗽清肺補肺　糯米一兩
杏仁七箇去皮尖定喘治氣　鼠粘子二錢五分
右爲末每服二錢水煎
薛己曰按前證若因脾胃弱而肺氣虛者宜用補中益氣湯若肺金自虛者宜用四君子湯

地黃丸
治小兒腎虛解顱或行遲語遲等證
熟地黃八錢酒洗益腎水眞陰補血虛要藥　山茱萸肉補腎添精　乾山藥各四錢凉而能補　牡丹皮凉腎瀉陰中之火治足少陰無汗之骨蒸　澤瀉補陰入腎經　白茯苓各三錢入壬癸
右地黃杵膏餘爲末加煉蜜丸桐子大每服二三十丸空心白湯下

薛己曰按前丸治腎經虛熱作渴小便淋祕痰氣上壅或肝經血虛燥熱風客淫氣而患瘰癧結核或四肢發搐眼目瞤動或肺經虛火咳嗽吐血頭目眩暈或咽喉燥痛口舌瘡裂或心經血虛有火自汗盜汗便血諸血或脾虛濕熱下刑於腎腰膝不利或疥癬瘡毒等證並用前藥爲主而佐以各臟之藥大抵此藥爲天一生水之劑若稟賦不足肢體瘦弱解顱失音或畏明下竄五遲五軟腎疳肝疳或早近女色精氣虧耗五臟虛損凡諸虛不足之證皆用此以滋化源其功不能盡述

四君子湯
治小兒脾氣虛弱飲食不化腸鳴泄瀉或嘔噦吐逆
人參　白茯苓　白术　甘草炙各五分
右水煎服

四物湯
治小兒肝經血虛發熱日晡益甚或煩躁不寧
當歸　熟地黃各二錢　白芍藥一錢　川芎五分
右作二劑水煎服

八珍湯
治小兒氣血俱虛或因失血過多或因尅伐元氣以致內熱發熱肢體瘦瘁
即四物四君子二湯合服

十全大補湯

治小兒氣血虛熱或因病後惡寒發熱或自汗盜汗食少體倦或發熱作渴頭痛眩暈等證

即八珍湯加黃芪肉桂

六君子湯

治小兒脾胃虛弱體瘦面黃或久患瘧痢不思乳食或嘔吐泄瀉飲食不化或時患飲食停滯或母有前證致兒爲患

人參　白朮　茯苓各二錢　陳皮　半夏　甘草炙各一錢

右每服二三錢薑棗水煎

補中益氣湯

治小兒中氣不足困睡發熱或元氣虛弱感冒風寒諸證或乳母勞役發熱致兒爲患

黃芪炙　人參　白朮炒　甘草炙　當歸　陳皮各五分　升麻　柴胡各二分

右薑棗水煎

柳華散

治小兒熱毒口瘡

黃蘗炒　蒲黃　青黛眞正者　人中白煅各等分

右爲末敷之

保和丸

治小兒食積

山楂二兩　神麴二兩　半夏　茯苓各一兩　陳皮　連翹　蘿蔔子各五錢

右爲末粥糊丸桐子大每服一二十丸白湯吞下

一方有炒麥牙一兩黃連五錢

惺惺散

治小兒傷寒時氣風熱痰壅咳嗽

桔梗　細辛　人參　甘草炙　茯苓　白朮炒　瓜蔞根各等分

右爲末每服二錢入薄荷五葉水煎

加味逍遙散

治小兒乳母肝脾氣血虛弱發熱致兒爲患

當歸　白朮　茯苓　芍藥炒黃各一錢　柴胡　牡丹皮　山梔炒　甘草炒各五分

右水煎服本方去丹皮山梔卽逍遙散

茵陳湯

治小兒身熱鼻乾汗出二便赤澁濕熱發黃

茵陳六錢　梔子二箇　大黃二錢

右每服一錢水煎

大連翹飲

治小兒積熱大小便不利或痘後餘毒肢體患瘡或丹瘤遊走不止

連翹　瞿麥　荊芥　木通　赤芍藥　當歸　防風　柴胡　滑石　蟬蛻　甘草各一錢

山梔炒　黃芩炒各五分

右每服一二錢水煎

牛黃丸

治小兒驚熱消疳積

雄黃研水飛　牽牛各一錢　天竺黃二錢

右爲末麵糊丸粟米大每服五七丸薄荷水下

白餅子

治小兒腹中有癖但飲乳嗽而吐痰涎

滑石　輕粉　半夏湯浸焙　南星各一錢

巴豆二十四粒去皮膜用水一升煮乾研爛

右爲末糯米飯丸菉豆大捻作餅每服二三餅煎葱白湯下

薛己曰凡用此方及利驚丸紫霜丸三味牛黃丸褊銀丸之類乃斬關奪門起死回生之重劑也必審形病俱實方可施之恐致失手命在反掌經云邪之所湊其氣必虛留而不去其病乃實實者病氣實而形氣則虛也東垣先生云形病俱實者當瀉不當補形病俱虛者當補不當瀉治者審焉

張景岳曰或紫蘇湯下忌熱物量兒加減

涼驚丸

治小兒驚疳

龍膽草炒　防風　青黛各三錢　鈎藤鉤二錢

川黃連炒一錢二分　龍腦另研一錢　牛黃　麝香各二分

右爲末麵糊丸粟米大每服十九煎金銀花湯下

薛己曰按前丸心肝二經清熱祛風化痰散氣之劑蓋疳者津液乾涸之證不宜多服恐傷胃氣無以滋腎水生肝血也

鈎藤鉤飲

治小兒吐利脾胃虧損虛風慢驚

鈎藤鉤三分　蟬殼　防風炒　人參　天麻　白殭蠶炒　麻黃去節　蝎尾去毒炒各五錢

甘草炙　川芎各二錢五分　麝香一錢另研

右爲末每服一二錢水煎

幼科全書曰寒多加附子末半錢

薛己曰按慢驚之證屬脾胃虧損所致前方乃辛

溫散表之藥而無調補之功須審用之

大青膏

治小兒傷風吐瀉身溫凉熱

天麻　青黛各一錢　白附子　乾蝎去毒

烏梢蛇肉酒浸焙　硃砂五分　天竺黃二錢

麝香二分

右爲末生蜜和膏每服一豆許月中兒用半粒薄荷湯化服

薛己曰愚按大青膏乃表散之劑也必外邪蘊結於肺而肺氣之未損者乃可施之況前證屬脾肺氣虛而邪之所湊必以固脾胃爲主否則虛虛之禍恐不能免矣

調中丸

治小兒脾胃虛寒吐瀉

白朮　人參　甘草炒各五錢　乾薑炮四錢

右爲末用蜜丸菉豆大每服二三十丸白湯下

薛己曰按前方本經自病之藥若腎水侮土而虛寒者當加半夏茯苓陳皮或嘔吐更加藿香泄瀉加木香

張氏溫脾散

治小兒脾胃磨損腹脅虛脹乳食不進困倦無力

訶子肉　人參各七錢　白朮　木香　桔梗

白茯苓　藿香　陳皮去白　黃芪炒各五錢

甘草炙二錢半

右每服二三錢薑棗水煎

薛己曰按前方治脾肺虛弱之證若肺病已去前證未已但用六君子湯以調補脾胃

歸脾湯

治乳母脾經氣鬱致兒爲患

人參　白朮　茯神　黃芪　龍眼肉各二錢

遠志一錢　酸棗仁　木香　甘草炙三分

右薑棗水煎服加柴胡山梔名加味歸脾湯

六神散

治小兒面青啼哭口出冷氣或泄瀉不乳

人參　山藥　白朮各五錢　甘草二錢　白茯

扁豆炒各一兩

右爲末每服一錢薑棗水煎

嬰童百問曰一方用當歸白芍人參各二錢半甘草桔梗陳皮各一錢爲散每服二錢煎服

當歸散

治小兒夜啼不乳

當歸　白芍　人參各二錢半　甘草一錢二分

桔梗　陳皮各一錢

右爲末每服二錢水煎灌之

羚羊角飲

治小兒行遲

羚羊角鎊　虎脛骨醋炙　生地黃焙　酸棗仁

白茯苓各五錢　肉桂　防風　當歸酒洗

黃芪各二錢五分

右爲末煉蜜成劑每服一兒子大白湯化下

菖蒲丸

治小兒心氣不足不能言語

菖蒲　赤石脂各三錢　人參五錢　丹參二錢

大門冬去心一兩焙

右爲末蜜丸菉豆大每服十丸若病後腎虛不語宜服地黃丸

聖濟總錄有黃連

團參湯

治小兒心虛血熱自汗盜汗

人參　當歸各等分

右用猪心一片每服三錢水煎服

木瓜丸

治小兒生下吐

木瓜　麝香　臘粉　木香　檳榔各等分

右爲末麪糊丸黍大每服一二丸甘草湯化下

薛己曰按前證多因妊娠胃經有熱或鬱痰所致當審其母而兼治之

塗頤法

治小兒傷風鼻塞

麝香　牛黃　青黛各二分半　蠍尾去毒分半

薄荷　蜈蚣各二分

右爲末生薑肉杵膏塗帛上貼頤中以手烘熱頻熨之

薛己曰按前法辛凉發散開竅祛風之劑當審用之余每以葱頭三五莖細切搗爛攤紙上以兩掌護熱貼頤門良久其邪即解諸病自退乃去其葱却以投帛寸餘涂糊仍貼頤門護之春夏常用絹帛秋冬用紵絲以護貼之未無傷風之患亦有因母病致兒發搐者

浴體法

治小兒胎肥胎熱胎怯

烏梢蛇肉酒浸焙　白礬　青黛淘淨各三錢
麝香二分半　天麻二錢　蝎尾　硃砂各五分
右爲末桃枝一握水煎浴之勿浴背

消積丸

治小兒食積大便酸臭發熱
丁香九箇　縮砂十二箇　巴豆二粒去皮心膜
烏梅肉三箇
右爲末麪糊丸黍米大每服五七丸溫水下

薛己曰愚按前證若食積既去而熱不退或作嘔少食宜用五味異功散以補胃氣或用四君子加藿香半夏以安中氣若無泄瀉用六君子湯如不應加升麻柴胡以升補脾氣若久瀉不已宜用補中益氣湯以升補陽氣若虛寒加炮薑木香如不應兼以四神丸以補脾腎若體瘦潮熱口渴大便不調宜用肥兒丸以消疳積

羌活散

治小兒風邪所傷頭目昏眩疾涎痰滯肢節煩疼
羌活　前胡　麻黃　白茯苓　川芎　黃芩
甘草炙　蔓荊子　枳殼麩炒　細辛　防風
菊花　石膏另研各一兩
右爲末每服一二錢水煎

參蘇飲

治小兒感冒風寒或腹脹少食泄瀉嘔吐或手足並冷喘促疾涎
人參　紫蘇　陳皮　半夏　茯苓　枳殼麩炒
桔梗炒　前胡　乾葛根　甘草炒各五分
木香三分
右爲末每服一二錢水煎

白朮　黃芩　川芎　白芍藥　當歸　半夏湯泡
甘草炙各一兩
右爲末每服一二錢水煎

白朮散

治小兒吐瀉不止
白朮　茯苓　人參　藿香葉　木香　甘草炙
右爲末每服一二錢水煎

治小兒吐瀉不止

結膈謂之表裏俱虛宜用此藥治之若悶亂煩渴吐瀉不食腹痛腹脹痰喘氣急謂之表裏虛寒急用此藥送萆薢丸或十日或十一日當臍不動煩渴咬牙手足並冷飲沸湯而不知熱此陽虛脫陷急用此湯救之亦有復生者

化毒丹

治胎毒及痘後頭面生瘡眼目腫痛

生地　熟地　天門冬　麥門冬　黑參各三兩

甘草　甜硝各二兩　青黛一兩五錢

右爲末煉蜜丸芡實大每服一丸白湯化下

薛己曰按前方生血凉血解毒寒中之劑用之得宜殊有良驗

安神丸

治邪熱驚啼心肝壯熱面黃頰赤

麥門冬去心焙　牙硝　白茯苓　乾山藥

寒水石　甘草各五錢　硃砂研水飛一兩

龍腦二分半

右爲末煉蜜丸芡實大每服半丸砂糖水化下

薛己曰按前方降火化痰辛散寒凉之劑不宜過服恐反傷脾胃也若睡中驚悸不安宜用祕旨安神丸若因乳母脾氣鬱熱致兒爲患者宜用加味逍遙散若因乳母怒氣肝經發熱致兒爲患者宜用加味小柴胡湯若因乳母飲酒胃經發熱致兒爲患者宜用葛花解醒湯

花火膏

治夜啼

燈花一顆

右塗乳上令兒吮之

百一方曰加硼沙一字硃砂少許蜜調成膏子塗乳令吮

薛己曰按前證有因停乳腹痛者有因陰盛發躁者有因寒盛腹痛者有因乳母鬱悶怒氣傳兒者有因乳母停滯傳兒者治法說見本論

蟬蛻釣藤散

治肚痛驚啼

釣藤　天麻　茯苓　川芎　白芍藥各二錢

甘草　蟬蛻各一錢

右每服一錢燈心水煎

天竺黃散　奇效良方卜同

治小兒驚風熱

天竺黃研　川鬱金　山梔子　殭蠶炒去絲嘴

蟬殼去土　甘草各等分

右爲末一歲半錢熱水薄荷湯皆可服不拘時

辰砂金箔散

治小兒心腸邪熱神志不寧驚惕煩渴恍惚忡夜臥不安齒齗腫爛及痰實咳嗽咽膈不利

辰砂　桔梗各二錢半　人參　白茯各一錢半

蛤粉四錢木飛另研　牙硝枯過一錢五分

甘草炙一錢二分半　片腦一分半　金箔一片

右爲末一歲半錢薄荷湯調不拘時白滓小兒臟腑多熱睡臥不穩大便不利蜜湯調一字

牛黃膏

治驚化痰祛邪熱止涎嗽

蒙荳粉二兩錢氏用寒水石五錢細細另研

牛黃一錢另研　片腦子少許　甜硝三錢

甘草末半錢　硼砂二分半

右爲末和勻煉蜜丸如芡實大金箔爲衣或一丸或半丸薄荷湯磨化服不拘時

一方有硃砂半錢

硃砂膏

治小兒鎮心臟壓驚化痰嗓涎除風

白殭蠶炒去絲嘴　白附子濕紙裹煨焙乾

天南星炮　硃砂另研各半兩　乾蠍一兩炒

右件入麝香半錢共爲細末熬糊爲丸粟米大硃砂爲衣每服十丸煎金銀薄荷湯下

如盜汗煎麻黃根湯下不拘時服

烏犀丸

治小兒驚疳乳食不化內成積聚腹大體小潮熱往來五心煩熱揉指吱甲蚵蟲自利頸項結核肚痛無時遍身癬疥小便如泔夜多盜汗嗜泥好喜甘甜或瘧或渴或吐或瀉或百日內外因吞惡血絞刺啼叫脾部虛弱易爲傷犯故百疾發生並宜服之常服消宿食破滯氣發散癖毒不可疑藥味粗賤兼見巴豆可畏不容服餌殊不知脾主中州萬物發生之原脾積閉飲血營氣衛寧免爰溷何疾不因此發生累累用驗告勿他疑

巴豆一百單八粒並去心膜對對切數得定不可失落星兒更用沉香木浸過此藥去心殼膜務在精製猶有不淨難取神效蓋膜能傷胃心能發嘔

橘皮一兩去白切小指面大片片令勻將巴豆和拌露七夜鍋內文武火炒黑色揀出巴豆舍出油盡

蒼朮去粗皮六錢濃煎犀角木浸受太陽七日曬乾入鍋內微炒遂將橘皮同研爲細末將巴豆搥入末內再研爲細末

右件爲末和勻水浸蒸餅糊爲丸如蘿蔔子大量兒大小加減丸數臨臥生薑湯送下

藿香正氣散

治小兒傷寒發嘔

甘草五分　藿香　厚朴薑製　半夏　陳皮

蒼朮米泔水浸一宿取出麩皮炒各七分半

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

育嬰家祕曰如有汗去蒼朮用白朮又加有白茯白芷桔梗腹皮紫蘇

益脾散

治小兒吐瀉虛弱調理脾胃

人參　白朮土炒　白茯苓各一錢　陳皮

厚朴各七分　木香　甘草炙各三分

右作一服用水一鍾生薑三片棗一枚煎至五分食前服

幼科全書曰加蘇子去白朮治噤風

麝香散

治小兒撮口胎熱

麝香　丹砂各二錢　虵蛻皮一尺炙

右爲細末每用一字唾調塗脣上

丹砂丸

治小兒臍風撮口

丹砂　麝香　牛黃各二錢半　半夏　丁香　白附子　鐵粉　天麻　南星

右爲細末煮粳米飯爲丸如麻子大每服五九用荆芥湯不拘時下

定命散

治小兒撮口吐白沫

川烏尖三箇生用　赤足蜈蚣半條酒浸炙黃色

麝香少許

右爲細末每服半字用金銀薄荷湯調服不拘時

立聖散

治小兒口噤不開不收乳食

乾蜘蛛一枚去口足用新竹瀝浸一宿炙乾焦用

乾蠍梢七箇　臘粉一錢

右爲細末每服一字乳汁調與服時時灌之

瓜蒂散

治小兒口噤

瓜蒂七枚　全蠍一枚炒　赤小豆十四粒

右爲細末每服一字米湯調服以吐爲度

五福化毒丹

治小兒上焦有熱胎熱胎毒口舌生瘡

黑參一兩　桔梗去蘆八錢　赤茯苓　人參

馬牙硝各五錢另研　青黛　甘草各一錢

麝香五分另研

右爲細末煉蜜爲丸如芡實大每服半丸用薄荷湯不拘時化服

錦灰散

治小兒七日臍風發腫

錦帛燒灰一錢　雄鼠囊七枚兩頭尖者是炒　麝香少許

右爲末搗棗肉爲膏封裹臍上

白龍散

治初生小兒臍風

天漿子一枚　殭蠶一枚直者　臘粉少許

右同爲末每服一字用薄荷湯調服不拘時

一字金

治初生小兒七日之外忽成臍風撮口牙關緊閉殭蠶去絲四兩　蘇靈仙去蘆　明礬生用

生甘草各二錢　細辛一錢

右爲末每用半錢煎荆芥湯調塗兩牙關內

封臍散

治小兒臍瘡濕腫爛

飯帶灰　亂髮灰　白薑灰　紅帛灰四灰同研

南星　白斂　當歸　赤小豆　五倍子爲末

血竭　龍骨　赤石脂煅　海螵蛸　百草霜

胭脂同研

右各等分爲末拌勻再研極細每用一字如濕乾摻乾用清油調塗臍上

白礬散

治小兒臍瘡不乾

白礬枯　龍骨各等分

右爲末摻敷臍中

神效散

治小兒風臍水臍腫爛

黃連　鬱金　黃蘗各一錢　輕粉一分半

白礬五分枯用

右同爲末以葱煎湯先洗淨然後用藥摻臍上日三四次

至聖保命丹

治小兒胎驚胎風內弔腹肚堅硬夜多啼哭急慢驚風目睛上視手足搐掣角弓反張涎痰壅盛一切急慢驚風並皆治之

全蝎十四箇　殭蠶直者炒　附子　天南星炮　硃砂　麝香各一錢　防風　天麻各二錢　蠍蛇去泥一錢　金箔十片爲衣

右爲細末以粳米炊飯取中心軟者搗和爲丸每一兩作四十丸每服一丸金銀薄荷湯或釣藤燈心湯不拘時化下

幼科發揮曰加琥珀三分

嬰童百問曰加人參白茯苓各二錢

片玉心書曰有熱加牛黃腦子蓮砂又曰加羌活二錢此藥常服鎮心化痰

全蝎餅

治胎驚寧神定志

全蝎十四箇去毒用薄荷汁浸炙　殭蠶炒五錢　茯神　天花粉　苦梗去蘆　天麻炮　遠志肉　羌活　生甘草各二錢

右爲末麪糊爲丸如芡實大捻作餅子每服半餅用金銀薄荷湯化下不拘時

犀角散

治小兒客忤驚啼壯熱

犀角　麥門冬　釣藤　丹砂各二錢五分　牛黃半分　麝香少許

右同爲細末每服半錢用薄荷湯調服不拘時

白芍藥湯

治小兒胃寒腹痛至夜多啼

白芍藥一兩半煨　澤瀉七錢　白朮五錢　桂心二錢半　當歸一錢半　乾薑煨二錢　甘草三錢炙

右剉碎每服二錢用水一盞煎至五分空心服

木通散

治小兒肝心有熱驚悸用此藥瀉肝風降心火利驚熱

羌活　山梔子各二錢　大黃煨　木通　甘草　赤茯苓各一錢

右剉碎每服二錢紫蘇葉些少用水一盞煎至五分不拘時服

又

治小兒急驚宜與此藥通其心氣祛除風邪

木通　石菖蒲　防風　枳殼　全蝎炒　木香　殭蠶炒　甘草　天南星炮各等分

右剉碎每服二錢用水一盞煎至五分生薑三片同煎亦可不拘時服

硃砂丸

治小兒口眼喎斜筋脉牽引

硃砂研五錢　全蝎炒　天麻　白附子炮　殭蠶直者炒去絲嘴　乾薑炮　牛黃各五分　麝香一分

右爲末粳米糊丸如黍米大每服三十丸用薄荷湯不拘時化服

全蝎散

治小兒口眼喎斜語言不清

全蝎炒　川芎　黃芩　殭蠶炒　赤芍藥　甘草　硃砂　南星湯泡去皮臍焠

右爲細末每服一錢用生薑湯不拘時調服

寬氣飲

治小兒風痰壅滿風傷於氣不能言語

枳殼去穰一兩　人參去蘆五錢　明天麻　殭蠶炒去絲嘴　羌活　甘草炙各三錢

右剉碎每服二錢用水一盞生薑三片煎五分不拘時服

補腎地黃丸

治小兒稟賦不足腎氣虛弱骨髓不充頂縫不合體瘦力弱

熟地黃酒浸焙乾　牛膝酒浸焙　鹿茸蜜塗炙　山茱萸酒浸蒸透去核取皮　乾山藥各五錢　牡丹皮洗淨　白茯苓各三錢　澤瀉二錢

右爲末煉蜜爲丸如麻子大每服十五丸或二十丸空心用鹽湯或溫酒任下

調元散

治小兒稟受元氣不足顱頂開解

乾山藥五錢　人參　白朮　白芍藥　當歸　茯神　白茯苓　熟地黃　黃芪各二錢半　炙甘草　川芎各二錢

右剉碎每服二錢用水一鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾不拘時服

比金膏

治小兒驚癇

人參 琥珀 白茯苓 遠志肉 薑製焙 硃砂
天麻 川芎 菖蒲 南星薑汁浸各二錢
麝香一字 青黛一錢

右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三五丸煎金銀薄荷湯磨化不拘時服

釀乳方

解胎中受熱生下面赤眼閉不開大小便不通乳食不能進

澤瀉一兩二錢 猪苓 赤苓 花粉各七錢半
生地黃兩一茵陳 甘草五各錢

右剉碎每服一兩用水一鍾煎至八分食遠令乳母捻去宿乳却服此藥

生地黃湯

治小兒生下遍體皆黃狀如金色身上壯熱大小便不通乳食不進啼叫不止此胎黃之證皆因母受熱而傳於胎也凡有此證宜服此略與小兒服之

生地黃 赤芍藥 川芎 當歸 天花粉各等分

右剉碎每服五錢水一盞煎至五分食後服

幼科全書加赤茯苓猪苓澤瀉木通甘草茵陳是齋白术散

治小兒積熱吐血咳血若因飲食過度負重傷胃吐血者最宜服之

白术二兩 人參 白茯苓 黃芪蜜炙各一兩
柴胡二錢五分 山藥 百合去心各七錢
甘草半兩炙 前胡二錢半

右剉碎每服五錢水一鍾生薑三片紅棗一枚煎五分食遠服

消食丸

又名消乳丸消積滯化乳食

砂仁 橘皮炒 三稜炒 莪朮炒 神麴炒
麥芽炒 甘草炒各半兩 香附子炒一兩

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如麻子大每服二三十食遠白湯送下量兒大小加減

嬰童百問曰有丁香五分枳殼橫棚烏梅各半兩用紫蘇湯下常服寬中快氣

木香丸

治乳積食積氣積

木香 蓬朮 砂仁 青皮去白 硃砂細研
代赭石煅研各二錢 巴豆肉研紙壓去油淨
大丁香各一錢

右爲細末和勻飛白麪糊爲丸如麻子大風乾每服三五丸至十丸乳傷乳汁下食傷米飲下不拘時

凉膈散

治小兒臟腑積熱口舌生瘡

連翹 甘草 黃芩 川大黃 矾硝 梔子
薄荷葉各等分

右剉碎每服五錢竹葉五葉蜜少許煎至五分食後服

稀涎散 舊門事親下同

小兒痰壅用此吐之

猪牙皂角不蛀者去弦稱一兩炙用之 綠礬
藜蘆各半兩

右爲細末每服半錢或一二錢幹開牙關漿水調下灌之

碧雲散

治小兒驚風有涎用此吐之

膽礬五錢 粉霜一錢 銅青 輕粉各一分

右研爲細末每服一字薄荷湯調下用之

如中風用漿水調服

防風通聖散

治小兒風熱涎嗽

防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 薄荷
麻黃去根不去節 連翹 芒硝各半兩 石膏
黃芩 甘草 桔梗各二兩 滑石三錢 荆芥
白术 山梔子各一兩

右爲麤末每服五七錢水一大盞生薑三片煎至七分去滓熱服

如涎嗽加半夏五錢生薑製過

黃連解毒湯

治小兒胎熱牙疳

黃連 黃蘗 黃芩 大梔子各等分

右剉爲麻豆大每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服之

三黃丸

治證同前

大黃 黃芩 黃蘗各等分

右爲末水丸每服三十丸水下

一方去黃芩用黃連

定志丸
安魂定魄之藥
柏子仁　人參　茯苓　遠志去心　茯神
酸棗仁
右爲末酒糊丸小豆大每服五七十丸生薑湯下
枳朮丸
治氣不下降胷膈滿悶
枳實麩炒　白朮各半兩
右爲細末燒飯爲丸如桐子大每服五十丸米飲
送下
黃連解毒湯幼科全書下同
治小兒胎熱
黃連　甘草　人參　木通　連翹　生地黃
川芎　陳皮
右燈心三莖薄荷少許水煎服
勻氣散
治小兒胎寒
桔梗　陳皮各一錢　砂仁　茴香炒各五分
白芍炮二分半　粉草炙四分　木香二分
右爲細末每服一匙棗湯調下
平和飲子
治小兒變蒸重者
人參五分　白茯去皮一錢　炙甘草五分
煨升麻二分
右水煎服
稟受虛者加白朮一錢
張景岳曰小兒於三月後每三日進一服可免百
病百日內宜服之
調氣散
治變蒸吐瀉或不乳而多啼
木香　香附子　炙厚朴　人參　陳皮　藿香
甘草
右水煎服
木香散
治小兒不乳及胎中受寒
木香　乾薑　茯苓　甘草　木瓜　丁香　陳皮
右等分爲細末水煎每服一字綿醮滴與之
撮風散
治小兒臍風撮口噤口
全脚蜈蚣一條去足炙令焦　蠍梢五箇去毒
麝香少許　直殭蠶七箇炒去嘴
右爲細末每用一字以猪乳和之滴入口中卽開
控痰散
治風噤
蠍梢　銅青各五分　硃砂一錢　膩粉一錢
麝香少許
右爲細末每服一字臘茶清調下吐去風痰
加減龍膽湯
治小兒內熱
龍膽草　柴胡　黃芩　麥門冬　防風　桔梗
赤芍　茯苓　甘草　大黃煨減半
右水煎服得下卽止
一方用前胡
理中湯
治小兒胎寒
人參　白朮　乾薑煨各等分　炙甘草半之
右水煎服此藥性熱所以治寒若爲丸煉蜜爲之
臨時拖丸百沸湯吞下欲其速化
安神丸
治小兒心煩不寐
黃連去根鬚二錢　石菖蒲　遠志去心各二錢
當歸身　麥門冬去心　山梔仁炒各二錢
茯神八錢
共爲末粟米糊和猪心血爲丸硃砂爲衣燈心湯
下
調元湯
此治虛熱之聖藥也
黃芪炒一錢　人參五分　甘草炙二分半
白芍五分
右水煎服內經云熱淫於內以甘瀉之以酸收之
此之謂也
一方無白芍
全蠍散
下兒之痰平時可用
全蠍二十四箇　殭蠶二十四箇　白附子一錢
南星一兩　甘草　天麻　硃砂各二錢半
川芎一錢半
右爲末薑湯下
熱甚加薄荷湯下
蟬花散普濟方
治小兒夜啼不止狀若鬼祟

蠐螬一箇用下半截
爲末一字薄荷湯入酒少許調下或者不信將上半截爲末前湯調下卽復啼也古人立方莫知其妙

嬰童百問曰用蠐螬四十九箇爲極細末名安神散分作四服用釣藤湯送下

升麻葛根湯 錢氏方 見生黃總門下同

治小兒時氣溫疫頭痛發熱肢體煩疼

升麻　甘草　白芍藥各十兩　葛根十五兩

右四味剉碎每服三錢水一盞半煎八分稍熱服不以時日二三服

塗脣膏

治雞解小兒咳嗽吐乳久不愈

石燕子一味不拘多少

爲末每用一捻蜜少許調塗兒脣上日三五次不拘乳食前後

玉液散

治小兒嘔逆吐利霍亂不安煩躁不得臥及腹脹小便赤煩渴悶亂或傷寒瘧病

丁香一錢　藿香半兩　桂府滑石四兩

右爲末每服一錢清水半盞調下冷服

全蠍散

治胎驚胎癇諸驚

全蠍一箇焙　琥珀　辰砂各少許

爲末麥冬湯調下一字

獨活湯

治胎驚發散風邪

羌活　獨活各二錢　檳榔　天麻　麻黃去節　甘草各一錢

右剉散每服一錢白水煎服

渣加天南星末蜜調貼額上

二陳湯

此藥性平寒熱通用

陳皮　半夏薑汁泡七次　白茯苓　甘草

水一鍾生薑三片引

嘔吐加白朮煨乾薑此二味嘔吐必用之藥也

挾熱而吐者加煨乾薑炒黃連

傷食加神麴炒麥芽砂仁香附子山楂此五味消導必用之藥也

理中丸

治小兒胎寒

人參　白朮　炙甘草　乾薑　砂仁　藿香

烏梅　附子　猪苓　澤瀉

爲末米飲爲丸

釀乳當歸散 育嬰家 事下門

治小兒胎寒生下外感乳母服之

當歸　川芎　赤芍藥　生地黃　香附炒

炙草各等分　桂心　煨薑各減半

㕮咀水煎食后服少頃捻去宿乳與兒吮之

釀乳赤芍散

治小兒胎熱乳母服之

生地　酒黃芩　川芎　當歸　木通　天花粉

赤芍　酒炙甘草　連翹各等分

㕮咀加淡竹葉水煎食后服令乳母捻去宿乳與兒吮之

三聖散

治小兒胎癇

白滑石飛過兩半　甘草二錢半

右和勻作三分

一用青黛一錢和勻名安魂散早以竹葉湯下

一用硃砂飛過一錢和勻名鎮心散午用燈心湯下

一用苦梗細末一錢和勻名定魄散晚用蘇葉湯下

加減升麻葛根湯

治小兒初生驚丹

桔梗　乾葛　升麻　川芎　赤芍　歸尾

羌活　柴胡　甘草各等分

井水煎服此驚丹之要藥也

雄黃解毒丸

治小兒胎毒痧癍發搐

雄黃另研　礬金各一兩　巴豆八錢去油炒焦

乳香　沒藥各二錢另研

右各製爲末醋糊丸硃砂爲衣此方治諸惡病甚妙

東垣安神丸 幼科雜 撣下同

經云熱淫所勝治以甘寒以苦瀉之以黃連之苦寒能去煩除熱爲君以甘草生地黃瀉火補氣生陰血爲臣以當歸身補其血不足硃砂鈎浮游之火以安其神也

甘草五錢半　黃連酒炒六錢　當歸身二錢半

生地黃一錢半　硃砂五錢水飛爲末
右爲末蒸餅丸黍米大硃砂爲衣每服十丸至三十丸溫水送
景岳全書名硃砂安神丸又名黃連安神丸治心神煩亂發熱怔忡不寐或寐中驚悸頭暈等證

眞金散

治初生洗眼不淨穢汁浸漬於眼目中不能開者
黃連　黃蘗　當歸　赤芍　杏仁去皮尖各五分
右俱切乳汁浸一宿曬乾爲極細末以生地汁調一字點眼中自開

琥珀抱龍丸

治小兒諸驚四時感冒風寒溫痰邪熱至煩躁不寧痰嗽氣急及瘡疹發搐
眞琥珀　天竺黃　檀香細剉　人參去蘆
白茯苓各一兩半　粉草去節三兩　枳殼
枳實麩炒　牛膽星各一兩　硃砂研飛五錢
山藥一斤去黑皮　金箔百片
右於乳鉢內研極細末取新汲水和丸如梧子大陰乾每服用薄荷湯化下

天麻丸 嬰童百問下同

治小兒因斷臍後爲水濕風冷所乘入於臍中流於心脾遂令肚脹臍腫四肢柔直日夜冬啼不能吮乳此藥利驚化痰凡釣腸鎖肚撮口並宜服之奇效良方云治食癇
南星泡二錢　附子炮　牙硝　天麻　五靈脂
全蠍焙各一錢　輕粉五分　巴霜一字
右末糊丸如麻子大每服三丸薄荷生薑煎湯下

定命丹

治小兒急驚天釣撮口通利痰熱
全蠍七箇　天麻　南星炮　白附子各二錢半
硃砂　青黛各一錢半　輕粉　麝香各五分
片腦一字
右爲末粟米糊爲丸菉豆大每服一丸荊芥薄荷湯化下先研半丸吹入鼻中

一方無片腦

朱銀丸

治臍風壯熱痰盛翻眼口噤取下胎中蘊受之毒亦治驚積但量情用之

一方無積字

水銀蒸棗肉研如泥　全蠍去毒　牛膽南星
硃砂各一錢　白附子一錢五分　天漿子去殼
牛黃　蘆薈各一錢二分　鉛霜和水銀研
麝各五分　片腦一字　殭蠶炒七箇
右爲末粟米糊丸芥子大每服一丸薄荷湯下如未通利加至二三丸

甘草湯

治小兒撮口取吐風痰
生甘草一錢
右剉煎服令吐出痰涎却以猪乳點入口中瘥

辰砂膏

治眼閉口噤啼聲不出吮乳不得口吐白沫大小便皆通
辰砂三錢　硼砂一錢　馬牙硝一錢　元明粉二錢
全蠍　眞珠末各五分　麝香一字
右爲末和畢用好油紙封裹自然成膏每服一豆粒許

諸驚金銀箔薄荷煎湯下

潮熱甘草湯下或用乳汁調傅乳上令兒吮下

證治準繩去硝粉眞珠加龍腦名辰砂全蠍散

幼科發揮曰如胎驚猪乳汁和棗湯下此藥下痰甚妙

葱號散

治初生小兒七日不乳
葱白三四寸　人乳不拘多少
右同搗如泥抹兒口內即喫乳

證治準繩用葱白三四寸破之用乳汁半盞煎灌名葱乳湯

蠶號散

治初生小兒七日不食乳名撮口
殭蠶四箇去嘴略炒　茯苓少許
右爲末蜜稠調抹兒口內

殭蠶膏

治小兒撮口
赤脚蜈蚣半條炙　釣藤　硃砂　直殭蠶焙
全蠍梢各一錢　麝香一字
右末每服一字取竹瀝調下竹瀝解熱

撮風散

治小兒撮口
直殭蠶二枚去嘴略炒
右爲末蜜調傅兒口中

瓜蔕散

治小兒三歲忽發心滿堅硬腳手心熱則變爲黃若不急治害人甚速臍風撮口吹入鼻內噯則可醫

瓜蒂七箇　赤小豆七粒　秫米七粒

右爲末用一豆許吹兩鼻內令黃水汁出殘藥未盡水調服之得吐黃水即瘥

一方瓜蒂一兩赤小豆四兩爲末每服一錢溫水調下藥下便臥即當有吐只吐爲度吐出黃水爲妙

定命散

治小兒初生口噤不開

蠮螉十四箇去翼脚　全蝦十四箇去毒

右爲細末入輕粉少許和勻用乳汁調乳前服

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百三十卷目錄
醫部彙考四百十
小兒初生諸疾門四
單方
鍼灸
醫案

藝術典第四百三十卷
醫部彙考四百十
小兒初生諸疾門四
單方

小兒初生不能發聲謂之夢生庸俗不知此理遂棄而不救極爲可憫今凡有此切不可斷臍帶將胞衣用火燒炙令火氣入兒腹內兒身已煖却取猫一隻用青衣包裹其頭足令一乖覺婦人拿住用猫頭在兒耳邊却以手捉住猫頭婦人以口齒著力咬破猫耳猫遂大叫一聲孩兒即醒開口發聲眼開遂得長生矣（體仁彙編）

初生不啼取冷水灌之外以葱白蒸鞭之即啼（全幼心鑑）

小兒胎毒淡豉煎濃汁與三五口其毒自下又能助脾氣消乳食（聖惠方）

預解胎毒七八月或三伏日或中秋日剪壺盧鬚如壞子脚者陰乾於除夜煎湯浴小兒則可免出痘（唐瑤經驗方）

初生胎毒小兒落地時用橄欖一箇燒研砂硃末五分和勻嚼生脂麻一口吐唾和藥絹包如棗核大安兒口中待咂一個時頃方可與乳此藥取下腸胃穢毒令兒少疾及出痘稀少也（孫氏集效方）

小兒胎毒初生時以韭汁少許灌之即吐出惡水惡血永無諸疾（四聲本草）

初生解毒小兒初生未可便與朱砂蜜只以甘草一指節長炙碎以水二合煮取一合以綿染點兒口中可與一蜆殼當吐出胷中惡汁此後待兒飢渴更與之令兒智慧無病出痘稀少（士瑋選方）

小兒初生六日解胎毒溫腸胃壯氣血朱砂豆大細研蜜丸一粟大調與吮之一日令盡（姚和衆至寶方）

小兒臍風用壁虎後半截焙爲末男用女乳女用男乳調勻入稀雞屎少許摻舌根及牙關仍以手蘸摩兒取汗出甚妙（華佗神效方）

小兒臍風撮口艾葉燒灰填臍中以帛縛定放或隔蒜灸之候口中有艾氣立效（簡便方）

治臍風爛瘡用紅綿燒灰黃牛糞燒灰乾臙脂各五分如濕乾敷乾則清油調之（衛生總微）

小兒臍爛成風杏仁去皮研傅（子母秘錄下同）

小兒臍風濕腫久不瘥者蜂房燒末傅之效

小兒撮口用硃砂末安小瓶內捕活蝘虎一箇入瓶中食砂末月餘待體赤陰乾爲末每次薄荷湯服三四分（方廣附餘）

小兒撮口初生豆牙研爛絞汁和乳灌少許良（普濟方）

小兒撮口臍風乃胎熱也用蝸牛五枚去殼研汁塗口取效乃止（本草綱目下同）

又用蝸牛十枚去殼研爛入蒔蘿末半分研勻塗之取效甚良

小兒初生忽患撮口不飲乳名曰馬牙不治則百無一生便看兒齒齦上有小泡子如粟米狀急以針挑出血用墨磨薄荷汁斷母髮少許裹手指塗搽（證治準繩）

初生撮口急視口中上下斷間若有白色如豆大許便以指甲於當中掐之於掐破處以蜈蚣末傅之大良（衛生總微下同）

又以蛇蛻砂麝香各一分每用半字津調塗口中日五七次

又以夜合花枝濃煎汁拭口并洗

又于兒口傍先刺令見血碎雀甕汁塗之

又生搗鼠婦并雀甕汁相和調塗抹口中漸漸乳得效鼠婦乃濕生虫也

又以生甘草一分細剉水一盞煎至六分去滓放溫分數次灌兒口中令吐出痰涎穢物後取猪乳汁點兒口中差亦治撮口

又以眞牛黃少許研細淡竹瀝調一字灌之次以猪乳滴口中

又以赤足蜈蚣去頭足炙黃爲末以猪乳調半錢分三四次溫灌之

一方同雀甕不開口者五枚燒灰研細末米飲調服一字

又以白殭蠶二枚爲末蜜和傅兒口內如無以原蠶蛾二枚炙黃代之亦治撮口

又以雀矢白末和圓麻子大乳服二圓鷄矢白亦佳

一方鷄矢白棗大綿裹水五合煮二沸分服

治小兒臍風撮口用全蠍二十箇頭尾俱全者要去

毒用好酒塗炙爲末麝香一字另研共爲細末用半字金銀煎湯調服卽效

小兒口噤中風不能乳用雀屎水丸麻子大飲下二丸卽愈或用雀屎四枚爲末著乳頭飲兒兒大十枚 千金方下同

小兒口噤而赤者屬心白者屬肺用鷄矢白如棗大綿裹以水一合煑分二服一方酒研服之

小兒百日內風噤口中有物如蝸牛或如黃頭白蟲者薄猪肪擦之卽消 聖惠方下同

小兒初生口噤十日內者用牛口齡草絞汁灌之

小兒口噤驚風不乳白棘燒末水服一錢

小兒口噤病在咽中如麻豆許令兒吐沫不能乳食葛蔓燒灰一字和乳汁點之卽瘥

治小兒口噤體熱以青竹茹三兩酢一升煎取三分之一溫分數服 衛生總微下同

治小兒口噤牙關不開天南星一箇煨熟急用紙封角莫令透氣却以紙裹近上尖處剪一竅子鷄頭大令熱氣出于鼻孔中熏之牙關立開亦治撮口

治小兒口噤不開用天南星去皮臍研爲細末龍腦少許和勻將藥於牙根上搽之卽好

又用蟬蛻十四个去頭足全蠍十四个去頭足同爲細末入輕粉少許和勻用乳汁調服

治初生兒口噤不開不收乳以鹿角粉大豆等分研細乳和塗乳上與兒吮之

小兒初生不乳咽中有噤物如麻豆許用水銀米粒大與之下咽卽愈 聖惠方下同

小兒口噤身熱吐沫不能乳取東行牛口中涎沫塗口中及頤上自愈

百日內小兒無故口青不飲乳用凌霄花大藍葉碎硝大黃等分爲末以羊髓和丸梧子大每研一丸以乳送下便可吃乳熱者可服寒者勿服 吉凶方

小兒初生不乳用好乳一酒鍾葱白三寸入銀器內煎滾服之不用葱如無銀器瓦器亦可 奉郎便方

小兒初生不肯食乳者乃心熱也葱煎乳汁令小兒服之亦妙終不若用黃連三分煎湯一分灌小兒數匙卽食乳矣神效 石室秘錄

襁褓中風取驢前交介中毛一拇指大入麝香豆許以乳汁和銅器慢慢炒爲末乳汁和灌之 千金方

小兒胎癇琥珀硃砂各少許全蠍一枚爲末麥門冬湯調一字服 直指方下同

小兒胎驚琥珀防風各一錢硃砂半錢爲末豬乳調一字入口中最妙

小兒胎驚硃砂雄黃各等分爲末取少許猪乳汁調抹口中卽效入麝香少許尤妙 月羨

小兒胎驚蠍一枚薄荷葉包炙爲末入硃砂麝香少許麥門冬煎湯調下一字效 湯氏寶書

小兒百日發驚蚱蟬去翅足炙三分赤芍藥一分黃芩三分水二盞煎一盞溫服 聖惠方

初生兒驚月內驚風欲死硃砂新汲水塗五心最驗 十門方

小兒胎風手足搐搦用蚤休卽紫河車爲末每服半錢冷水下 衛生易簡方

治臍濕用枯礬龍骨爲末入麝少許拭臍乾用避風 顱顖經下同

又用乾蝦蟆牡蠣各一枚燒灰細研少許傅臍中日三兩上瘥

氣臍大如栗虛腫而軟痛用竹瀝塗日數上消

兒臍濕淹破屋爛草爲末頻摻效

小兒臍瘡用乾蝦蟆灰傅日三四佳 肘後方

小兒臍瘡出血及膿海螵蛸臙脂爲末油調搽之 聖惠方下同

小兒臍瘡用龍骨煅研傅之效

小兒臍腫出汁不止白礬燒灰傅之

小兒臍濕不早治成臍風或腫赤或出水川當歸末傅之

一入麝香少許

一用胡粉等分試之最驗若愈後因尿入復作再傅卽愈

治小兒臍中生瘡桑汁傅乳上使兒飲之 千金方下同

又飲羖羊乳及血

治小兒風臍作惡瘡歷年不瘥取東壁上土傅之大佳若汁不止燒蒼耳子粉之

又用乾蠐螬蟲末粉之不過四五度瘥

小兒臍不合取車轄脂燒灰日一傅之

又燒蜂房灰爲末傅之

小兒臍中生瘡燒甑帶灰和猪膏傅之

小兒臍赤腫杏仁半兩猪頰車髓十八銖先研杏仁如脂和髓傅臍中腫上

小兒臍瘡久不瘥者馬齒菜燒研傅之

小兒臍腫荊芥煎湯洗淨以煨葱刮薄出火毒貼之卽消 海上方

小兒臍瘡出汁久不瘥蝦蟆燒末傅之日三甚驗一加牡蠣等分（斗壹）

小兒臍汁出赤腫白石脂末熬溫撲之日三度勿揭動（朱宙獨行方）

嬰兒臍腫多因傷濕桂心炙熱熨之日四五次（姚和衆方）

小兒臍瘡久不合者黃蘗末塗之（子母祕錄）

初生小兒臍汁不乾用綿繭亂髮燒灰掩之（窮鄉便方下同）

小兒肚臍突出用原斷臍帶并艾葉同燒灰以油胭脂調搽即安

小兒臍汁不乾用綿裹落下臍帶燒研一錢入當歸頭末一錢麝香一字摻之（全幼心鑑）

小兒斷臍即用清油調髮灰傅之不可傷水臍濕不乾亦傅之（本草綱目）

治小兒初生臍未落時腫痛水出取故緋絹燒灰研細末傅之（衛生總微下同）

又以綿燒灰研爲細末傅之新舊皆可

小兒肚臍突出半寸許此氣旺不收也若不急安之往往變爲角弓反張方用茯苓一錢車前子一錢甘草二分陳皮三分通草三分如無通草燈心一團共煎湯灌之一劑即安神方也（本草綱目下同）

小兒初生臍汁不乾用車前子炒焦爲細末傅之即乾神效

初生小兒胎熱或身體黃者以眞牛黃一豆大入蜜調膏乳汁化開時時滴兒口中形色不實者勿多服（錢氏小兒方）

初生小兒五七日有熱證不得已只以益元散時時灌之（傷寒心鏡）

小兒胎熱黑豆二錢甘草一錢入燈心七寸淡竹葉一片水煎（全幼心鑑下同）

小兒初生七八日大小便血出乃熱傳心肺不可服涼藥只以生地黃汁五七匙酒半匙蜜半匙和服

小兒初生無皮色赤但有紅筋乃受胎未足也用早白米粉撲之肌膚自生（聖濟方）

小兒初生遍身如魚脬又如水晶破則成水流以密陀僧生研擫之仍服蘇合香丸（救急方）

治兒初生兒血凝皮肉不斂哭無聲不吮乳以胡粉研細酒和塗之乾即再塗（衛生總微下同）

又以白殭蠶爲末煎湯適寒溫浴之

小兒胎寒好啼晝夜不止因此成癇當歸末一小豆大以乳汁灌之日夜三四度（附後方）

小兒胎寒腹痛汁出用衣中白魚二七枚絹包于兒腹上回轉摩之以愈爲度（聖惠方）

治小兒忽患腹痛夭矯汗出名曰胎寒煑梨葉濃汁七合可三四度飲之（千金方）

小兒初生貼顖頭熱鼻寒者天南星炮爲末水調貼顖上炙手熨之（危氏得效方）

小兒初生面青身冷口噤乃胎寒也用白殭蠶木香肉桂陳皮檳榔甘草炙各五分水煎取汁以綿蘸入兒口中（入門）

又以當歸爲末每用一小豆許乳汁調下日二夜一兒大添之（衛生總微下同）

又以柏子仁爲末每服一錢半溫水調下

小兒五十日以來胎寒腹痛躽啼弄舌微熱而驚此癇疾也猪腎一具當歸一兩焙以清酒一升煑七合每以杏仁大與嚥之日三夜一（聖惠方下同）

小兒躽啼驚癇腹滿大便青白色用柏子末溫水調服一錢

小兒躽啼面青腹強是忤客氣馬糞一團絞汁灌之（聖濟總錄）

小兒滿月百日內發寒啼者用車前子元胡索小茴猪苓澤瀉釣藤各三分赤茯苓木通各四分甘草一分燈心煎半儀服如藥不便用燈心火爆四花穴即臍上下左右（窮鄉便方）

小兒夜啼青黛量大小水研服之（生生編下同）

小兒夜啼黑牽牛末一錢水調傅臍上即止

小兒夜啼用本兒初穿毛衫安放瓶內自不哭也

小兒夜啼取井邊草私著蓆下勿令母知

小兒夜啼乳香一錢燈花七枚爲末每服半字乳汁下（聖惠方下同）

小兒驚啼白玉二錢寒水石半兩爲末水調塗心下

小兒夜啼猪屎燒灰淋汁浴兒并以少許服之

小兒夜啼明鏡挂牀脚上

小兒腹痛夜啼牛黃一豆許乳汁化服仍書田字於臍下

小兒夜啼死人朽棺木燒照即止

小兒腹痛夜啼樹孔中草暗著戶上即止

小兒夜啼取鷄窠草安蓆下勿令母知猪窠中草亦可

治小兒夜啼寫若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來燒灰吞之男左一本女右一本（劉氏方）

治小兒夜啼不已醫所不治者取狼屎中骨燒灰爲

末水服如黍米大二枚千金方下同

治小兒驚啼取鷄屎白熬末以乳服之佳

又酒服亂髮灰

又車轄脂如小豆許內口中及臍中

又臘月縛猪繩燒灰服之

小兒夜啼以姙娠時食飲偏有所思者物以此哺兒卽愈

又取伏龍肝交道中土各一把治下篩水和少許飲之

又取馬骨燒灰傅乳上飲兒啼卽止

小兒驚啼亂油髮燒研乳汁或酒服少許良

小兒驚啼啼而不哭煩也哭而不啼躁也用蟬蛻二七枚去翅足爲末入硃砂末一字蜜調與吮之活幼口議

小兒驚啼發歇不定眞麝香一字淸水調服日三廣利方

小兒夜啼牛屎一塊安蓆下勿令母知食療

小兒夜啼用凉膈調益元散肚飢臨睡服傷寒心鏡

小兒夜啼五倍子末津調塡于臍內楊起簡便方

小兒夜啼取燒尸塲土置枕邊集簡方

小兒一百二十日內夜啼用蟬蛻四十九箇去前截用後截爲末分四服釣藤湯調灌之心鑑

小兒夜啼劉季奴半兩地龍炒一分甘草一寸水煎灌少許聖濟總錄下同

小兒夜啼馬蹄末傅乳上飲之

小兒客忤夜啼用本家廚下燒殘火柴頭一箇削平焦處向上硃砂書云撥火杖撥火杖天上五雷公差來作神將捉住夜啼鬼打殺不要放急急如律令書畢勿令人知安立牀前脚下男左女右蚼螻神書

小兒夜啼甑帶懸戶上卽止子母秘錄下同

小兒驚啼狀如物刺用猬皮三寸燒末傅乳頭飲兒

小兒夜啼取伏龍肝末二錢硃砂一錢麝香少許爲末蜜丸菉豆大每服五丸桃符湯下普濟方下同

小兒夜啼以白花蛇目睛一隻爲末竹瀝調少許灌之

小兒驚熱夜臥多啼硃砂半兩牛黃一分爲末每服一字犀角磨水調下

小兒夜啼硫黃二錢半鉛丹二兩研勻瓶固煅過埋土中七日取出飯丸黍米大每服二丸冷水下

小兒驚啼黃芩人參等分爲末每服一字水飲下

小兒夜啼前胡擣篩蜜丸小豆大日服一丸熟水下至五六丸以瘥爲度

小兒夜啼驚熱用人耳塞石蓮心人參各五分乳香二分燈花一字丹砂一分爲末每薄荷湯下五分

小兒夜啼人參一錢半黃連炙一錢半薑汁炒甘草半錢竹葉二十片作二服加薑煎平治會萃

小兒夜啼用大蟲眼睛一隻爲散以竹瀝調少許與喫姚和衆方

小兒初生三日內啼哭腹內嚮打屁陰囊稀名爲盤腸氣用車前子防風各三分薄荷甘草各一分元胡子木通各四分蟬殼五隻水洗去頭足如脣紅目赤加宣黃連二分燈心一丸同煎服窮鄉便方

小兒夜啼蟬蛻二十箇去頭足燈花三分乳香末一錢竹葉炙過爲細末唾丸入小兒臍以舊膏藥封之身經通考方下同

治小兒夜啼用神前燭花研碎無根水下

小兒血眼兒初生艱難血瘀眦睚遂濺滲其睛不見瞳人輕則外泡赤腫上下弦爛用杏仁二枚去皮尖嚼乳汁三五匙入輕粉少許蒸熟絹包頻點重者加黃連砂硝最良全幼心鑑

小兒百晬內吐乳或糞青色用年少婦人乳汁一盞入丁香十枚陳皮去白一錢石器煎一二十沸細細與服陳文中小兒方

小兒吐乳胃寒者白豆寇仁十四箇砂仁十四箇生甘草二錢炙甘草二錢爲末常摻入兒口中危氏得效方

小兒初生吐不止者用籧篨少許同人乳二合鹽二粟許煎沸入牛黃粟許與服此劉五娘方也外臺秘要下同

小兒哯乳不止服此立效膩粉一錢鹽豉七粒去皮研勻丸麻子大每服三丸藿香湯下活幼口議

襁褓吐乳咳嗽久不愈石燕子末以蜜調少許塗脣上日三五次衛生寶鑑

小兒初生二便不通用皂角燒存性研爲細末煉蜜作丸如棗核樣內穀道中卽通育嬰家秘

小兒初生大小便不通用眞香油一兩皮硝少許同煎滾冷定徐徐灌入口中服下卽通蘭氏經驗方

小兒初生便閉甘草枳殼煨各一錢水半盞煎服全幼心鑑下同

小兒初生鎖肚由胎熱毒結於肛門兒生之後閉而不通三日者急令婦人咂兒前後心手足心并臍七處四五次以輕粉半錢蜜少許溫水化開時時與少許以通爲度

治初生小便不通用孩兒茶研極細末分許煎扁蓄

湯調下立通萬病回春

治小兒穢惡入腹令兒嘔吐不乳木香乾薑茯苓甘草木瓜丁香各等分水煎綿蘸滴與之證治準繩

小兒晬嗽百日欬嗽痰壅貝母五錢甘草半生半炙二錢爲末沙糖丸芡子大每米飲化下一丸全幼心鑑

治小兒百晬內嘔吐乳妳或大便青色用少婦乳汁一盞丁香十粒陳皮一錢磁器內煮數沸稍熱空心以緜毬吮服保嬰撮要

治小兒未晬欬嗽用白殭蠶直者爲細末塗少許妳頭上令兒喫立效

小兒不語四五歲不語者赤小豆末酒和傅舌下千金方

小兒語遲者以伯勞所踏樹枝鞭之卽速語李時珍曰案羅氏爾雅翼云本草言伯勞所踏樹枝鞭小兒令速語者以其當萬物不能鳴時而獨能鳴之故以類求之也完素六書

小兒從小至數歲不能言此心氣不足舌本無力不能發轉故也一云風冷傷于少陰以赤小豆爲末酒和塗舌上神效以社壇餘胙酒與飲少許衛生總微

鍼灸

甲乙經曰小兒臍風目上插刺絲竹空主之

小兒臍風口不開善驚然谷主之

千金方曰治小兒四五歲不語灸足兩踝各三壯

聖惠方曰小兒撮口胎風先灸兩乳中三壯後用烏驢乳一合以東引槐枝三寸長十根火煨一頭出津拭淨浸乳中取乳滴口中甚妙

黎居士簡易方曰小兒臍風獨頭蒜切片安臍上以艾灸之口中有蒜氣卽止

危氏得效方曰小兒卒然腹皮青黑而死灸臍上左右去臍各半寸并鳩尾骨下一寸凡五處各灸五壯仍酒和胡粉塗腹上乾則易

寶鑑曰夜啼灸幼宮三壯又灸中指甲後一分

萬全方曰灸小兒夜啼上燈啼鷄鳴止者灸中指甲後一分中衝穴一壯炷如小麥大

萬氏片玉心書曰凡小兒初生多有灸百會者取其可以截風也殊不知地分南北人有勇怯北人用灸固宜南人用之無益而有害也

醫學綱目曰兒生二七日內不吮乳多啼者乃客風中臍循流入脾灸承漿在下唇稜下宛宛中次灸頰車在耳下頰骨後炷如雀屎各七壯非灸不療

兒喉中嗚咽乳不利灸璇璣三壯在天突下一寸陷者中

古今醫統曰小兒撮口臍風鍼然谷三分不宜見血灸則三壯然谷一名龍淵在足內踝前起大骨下陷中又三內踝前在下一寸別於太陰蹻脉之郄足少陰脉所流爲榮

小兒氣不足數歲不語鍼心俞三分灸則三壯心俞在五椎下兩旁相去脊各一寸五分正坐取之

衛生總微論方曰小兒心氣不足從小至數歲不能言灸心俞三壯灸兩足踝三壯

初生兒血凝以臍四邊各去臍半寸并鳩尾下五處各灸三壯

治小兒初生撮口以鹽豉置臍上灸之

小兒方曰小兒撮口出白沫以艾灸口之上下四壯鯽魚燒研酒調少許灌之仍掐手足兒一歲半則以魚網洗水灌之

證治準繩曰小兒臍腫灸腰節臍骨間灸三壯名命門穴炷如麥

東醫寶鑑曰凡小兒七日以上周年以下不過七壯炷如雀屎

醫案

小兒直訣曰李司戶孫百日發搐日三五次或作胎驚治之不應卽用大青膏豆許塗顖浴體二法三日而愈蓋嬰兒血氣未實不能勝外邪而發搐故用浴體法凡搐頻者風在表易治宜發散搐稀者風在臟難治宜補脾

獨醒雜志曰樞密孫公抃生數日患臍風已不救家乃盛以盤合將棄諸江道遇老嫗曰兒可活卽與俱歸以艾炷灸臍下遂活

保嬰金鏡錄曰一小兒印堂青黑至夜啼搐余謂脾土虛寒用釣藤飲而安後因驚發搐夜啼用釣藤飲前證頓止又用異功散而愈

一小兒發熱夜啼乳食不進昏迷抽搐痰盛口噤脉数如水字此脾肺氣虛風木所乘痰食積於胃腹也先用大安丸後用六君子加釣藤鉤而痊

一小兒生旬日面目青黃此胎黃證姙娠胃熱也用瀉黃散乳調少許即愈後復身黃吐舌仍用前散而安

明醫雜著曰一小兒十四歲肢體倦怠發熱脯熱口乾作渴吐痰如湧小便淋瀝或面目赤色身不欲衣此稟賦不足也用補中益氣湯及地黃丸加鹿茸而愈

一小兒十三歲內熱脯熱形體倦怠食少作渴或用清熱等藥治之虛證悉具余以爲所稟怯弱用六味丸加鹿茸補之不越月而痊蓋古今元氣虛實不同故也

幼科發揮曰一兒一日發搐五月不醒藥石難入予鍼其三里合谷人中而醒父母喜乞調養之予曰曩用鍼時鍼下無氣此稟賦不足也如調理數年後出疹痘可保無事若在近年不敢許次年果以痘疹死

一小兒生後三日啼哭不乳予視其證非臍風乃臍腹痛也取靳艾炷爛火上烘熱掩其臍上以帛勒之須臾吮乳而不啼矣

一小兒生八日噴嚏多啼請予視予曰此臍風也視其上齶果有泡色變黃矣乃取銀挖耳刮去之其父慘然愛惜之心見于形色故去之未盡也有老嫗聞之急使婢女告其父當急去之其言迫切父益懼自取銀挖耳刮之不惜也遣人告予予曰旬日後當發驚風後果病迎予視之投以至聖保命丹而愈

儒學陶教授一子生八月病吐諸醫治之不止湯丸入口即吐諸醫云食入即吐是有火也欲作火治用瀉火藥又不效衆醫不能治其吐益劇既請予至議治予作理中湯劑用豬膽汁童便各半拌之炒焦以水煎服藥入立止師請言其法予曰吐本寒邪當用理中湯熱藥以止之內寒已甚格拒其陽故熱藥入喉被寒所拒不得入也今膽汁之苦寒童便之鹹寒下喉之後兩寒相得故不復出須臾之間陰氣漸消陽氣乃發此熱藥須冷服以主治格拒之寒以止嘔噦者是也

一兒生二月忽昏睡不乳予以日計之非變蒸也視有二乳母皆年少氣壯者其乳必多更代與之必傷乳也戒以今且損之令飢一日自愈後宜絕之只用一乳母可也次日果安父母如其教亦無傷食病

本縣大尹張鼎石子生四月無乳取一民壯婦人乳之一夜大啼醫甘大用治之呼爲腹痛用理中湯不效又呼爲傷食用益黃散又不效夜更啼哭請予視之甘語其故益心本惡熱藥中又犯乾薑丁香如何不助火而益增其病也乃往看之尹曰夜啼四日矣全曰夜啼有四心煩一也尹曰傷食乎腹痛乎全曰腹痛則面色青傷食則面多晃白今面多赤心煩證的也用導赤散加麥冬燈心進一服次早往問之甘自內出云昨夜到天明不止予嘆彼喜藥不中病也不知病退矣入問尹曰昨夜哭尤甚也予告之曰病安矣四日夜未乳昨夜病退思乳乳母在外往夜之哭病哭也昨夜之哭飢哭也尹喜曰怪哉乳母來後再不復啼病果退矣

王少峯次子三個月病吐請醫治之藥乳不納予見其兒在乳母懷中以身伸努上竄呃呃作聲有發驚之意乃取理中湯丸末子一分用猪膽汁童便各半匙調分三服初一次少停略以乳喂一二口即止又進一次又乳之其兒睡一覺醒則嘔止不伸努不呃呃作聲矣予以是法教諸子活人甚多乃良法也

一兒自滿月後常吐乳父母愛之諸醫不能止一日問予予曰嘔吐者非常有之病也今常吐乳非病也然孩兒賴乳以生頼吐乳者非所宜也恐傷氣不可不求其故有母氣壯乳多者唯恐兒飢縱兒飽足飽則傷胃所食之乳湧而出此名溢乳如瓶之注水滿而溢也宜損節之更服肥兒丸兒之初生筋骨軟弱爲乳母者當懷抱護持可也不然則左右傾側其乳流出此名碗乳如瓶之側其水流出也能緊護持則不吐也有胃弱者不能受乳而變化之無時吐出所吐不多此名哺露如瓶之漏不能容受也當補其脾胃助其變化可也亦以肥兒丸主治

一女五個月內發搐予以瀉青丸投之三四服搐不止轉甚予思痰壅氣鬱乃發搐也丸散頗粗與痰粘滯于咽喉之間致氣不通而搐愈甚也用竹葉煎作湯取綿紙濾去其渣滓澄清服之搐止而安其父嘆曰醫之貴於變通也如是夫

先翁治一兒滿月後發搐以至聖保命丹治之安祖訓治急驚風只用瀉青丸導赤散

育嬰家祕曰一小兒初生遍身無皮俱是赤肉用白果粉遍身摻上候生皮乃止

一小兒初生如魚泡又如水晶破則水流用密陀僧研極細摻之

保嬰撮要曰一小兒患胎驚諸藥不應用紫河車研爛如泥每用錢許乳化服之更以十全大補湯加釣藤鉤漏蘆與母服兩月餘舉發漸輕服年餘舉發漸稀更服年餘不再發至出痘後復發取紫河車研爛入糯米粉丸小豆大每服百丸以乳送下服二具全瘥畢姻又發仍服前丸及十全大補湯六味丸加當歸黃芪肉桂五味子年餘喜其能遠帷幕得痊後因勞役更作又用前丸及十全大補湯等藥不應用大劑獨參湯服數斤然後舉發稍緩乃用人參二兩附子一錢數服頓止仍用前藥間用獨參湯而痊

一小兒患胎驚用紫河車及十全大補湯釣藤膏而愈畢姻後發用大劑獨參湯六味丸加五味子黃芪當歸煎服半載舉發稍輕年餘不再發後每勞役怒氣仍發即用前藥隨愈又傷寒愈後復作虛證悉具莫能名狀用紫河車二具獨參湯十餘斤而痊後患傷風咳嗽咽乾內熱用六味地黃丸料加五味子煎服及十全大補湯而痊

一小兒百日內患抽搐痰涎自流用驚風藥益甚視其面色黃白仍用六君子補中益氣二湯而愈

一小兒面青黑或瘦黃審其母素有鬱怒所致用加味逍遙散加味歸脾湯治其母其子亦愈

一小兒月內發搐鼻塞余以爲風邪所傷以六君子加桔梗細辛子母俱服更以葱頭七莖生薑一片細搥攤帛上兩掌護溫貼於顖間半晌鼻利搐止

一小兒未兩月發搐嘔乳腹膨作瀉余以爲乳多傷脾胃用五味異功散加煨薑母服之子服數滴而尋愈

一小兒旬日內先兩目發黃漸及遍身用瀉黃散服之瘥

一小兒因母食鬱飽脹噎酸而患遍身皆黃余以越鞠丸治其母以瀉黃散治其子竝愈

一週歲兒痰嗽啼哭或用抱龍丸未止余視其右腮白左腮青此肺肝二經相勝先用瀉白散以祛肺邪次用柴胡梔子散以平肝火又用地黃丸以滋腎水而痊

一小兒三歲夜啼面色白黑睛少小便清此脾腎氣虛朝用補中益氣湯加山藥五味子夕用地黃丸頓愈

一小兒白睛多面色赤時作啼此稟腎不足用地黃丸半載後忤其意雖哭面色不赤丹溪先生云小兒忽大叫必死卽此義也

一小兒顱解足軟膝大不能行履用六味丸加鹿茸治之三月而能步履

一小兒年十四歲而近女色發熱吐痰至有室兩目羞明頭覺脹大仍不斷慾頭漸大顱門忽開用地黃丸益氣湯之類斷色慾年餘而愈

一小兒十三歲患前證內熱腠熱形體倦怠食少作渴余以爲所稟怯弱用六味丸加鹿茸補之不越月而痊

一小兒停食腹痛夜啼用大安丸而愈後乳食雖入其腹仍痛用六君子加山楂神麴痛少止乃去二味又四劑痛全止

一小兒三歲面白夜啼小便青而數此肺腎虛弱朝用補中益氣湯加肉桂一分夕用地黃丸而愈大凡小兒面色青黑睛少或解顱足熱者出痘多在腎經預用地黃丸補腎氣多得無恙者

一小兒二歲夜啼面色赤黑睛色淡小便頻赤朝用補中益氣湯加山藥五味夕用地黃丸而愈

一小兒發熱多啼乳食不進昏迷抽搐痰盛口噤此脾肺氣虛風木所乘痰食積於胃腹也先用大安丸後用六君子釣藤鉤而痊

一小兒每忽哭白睛多每悲面色赤余謂稟賦腎虛火妄動而然也用地黃丸半載後雖哭而面色不赤諸證皆愈

一小兒停食腹痛發熱嘔吐服峻腐之劑更吐瀉汗多手足並冷發痙不止其脈決浮按之如絲用六君子湯加升麻炮薑痙證頓已惟寒熱往來又用四君升麻柴胡而愈

一小兒癡癎啼叫額間青黑此驚風肝木乘脾腹中作痛也先用六君子湯加木香柴胡釣藤鉤啼叫漸緩更加當歸又二劑而安

一小兒言遲泄瀉聲音不亮雖用分利清熱等劑喉音如痘飲食少思朝用地黃丸加五味子夕用補中益氣湯其瀉漸止遂專服前丸兩月喉音漸響

一小兒白睛多瀉後喉痺口渴兼吐大便不實朝夕服地黃丸而痊後患瀉喉復痺仍服前丸而愈此皆稟賦腎氣不足故用是藥

一小兒五歲不能言戚以爲癡人矣但見其形色憔屬肺腎不足遂用六味地黃丸加五味子鹿茸及補中益氣湯加五味子兩月餘形氣漸健將半載能發一二言至年許始音聲如常

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百三十一卷目錄

醫部彙考四百十一

小兒頭面耳目鼻病門一
孫思邈千金方 頭瘡
錢乙小兒直訣 解顱 髮遲
張從政儒門事親 甜瘡 面上瘡 白疵瘡 目疾 瘡疱入眼 疳眼
朱震亨平治會萃 解顱 頭癩
方賢奇效良方 解顱 髮黃
萬氏祕傳片玉心書 解顱 頭腫 頤陷 腦疳 髮遲
育嬰家祕 解顱 頤塡 頤陷 頭瘡 髮遲
幼科發揮 頤陷 枕陷 顎軟 疳眼
魯伯嗣學嬰童百問 解顱 頤陷 頤塡 目內證 耳病 鼻病 耳證 目內
薛氏保嬰撮要 解顱 頤塡 頤陷 耳證 目內證 鼻塞 鼻衄
徐春甫古今醫統 顱頤論
王肯堂證治準繩 解顱 頤陷 頤塡 天柱倒 頭瘡論 髮遲 髮黃 目赤腫痛 外障 痘瘡入目 痘疹餘毒證 眼疳 鼻病 鼻塞 鼻流清涕 鼻乾無涕 鼻有瘜肉 耳論 耳聾 耳鳴 聾耳
李梴醫學入門 解顱 頤塡 頤陷
張三錫醫學準繩六要 斑後腎膜遮睛 雀目
小兒衛生總微方論 解顱 頤門 腫陷論 頭上諸病論 髮 耳中諸病論 耳中鳴痛 耳中腫瘡出膿汁 眼目病論 鼻中病論
陳治幼幼近編 解顱 頤陷 頤塡
東醫寶鑑 頂軟 髮不生 胎患 遍睛 眼中生贅 青盲 疳眼

藝術典第四百三十一卷

醫部彙考四百十一

小兒頭面耳目鼻病門一

唐孫思邈千金方

頭瘡

論曰小兒頭生小瘡浸淫疽癢黃膏出不生痂連年不瘥者名妒頭瘡以赤龍皮湯及天麻湯洗之內服漏蘆湯不宜傅飛烏膏散及黃連胡粉水銀膏散

宋錢乙小兒直訣

解顱

解顱者生下頤門不合也長必多愁少笑目白睛多面色晃白肢體消瘦皆腎虛也

註 按腎主髓腦爲髓之海前證因父母精血不足不能榮養宜用地黃丸補之有至七八歲或十四五歲氣血既盛而自合若縱恣飲食色慾戕賊眞陰亦不能盡其壽矣此證若在乳下當兼補其母更以軟帛緊束兒首使其易合亦有頤陷頤塡俱屬稟不足或五疳久病元氣虧損者仍參後小便不通類主之

髮遲

髮久不生生則不黑皆胎弱也

註 前證卽五遲之一證也髮者腎之榮也良由父母精血不足腎氣虛弱不能養榮而然耳

元張從政儒門事親

甜瘡

凡小兒甜瘡久不愈者俗呼爲香瘡是也多在面部兩耳前一法令母口中嚼白米成膏子臥塗之不過三上則愈矣小兒幷母皆忌雞猪魚兔酒酢動風發熱之物如治甜指亦同此法

面上瘡

凡小兒面上瘡謂眉煉瘡耳上謂之轍耳足上瘡謂靴癬此三者一究其本皆謬名也經曰諸痛瘡瘍皆屬心火乃血熱劇而致然也或謂內經曰大槩不可使熱以爲皆然此不明造化之道也愼勿妄信可用鉼針刺之出血一次不愈當復刺之再刺不愈則三刺必愈矣內經曰血實者決之眉煉不可用藥傅之以其瘡多癢癢則爬矣藥入眼則目必損矣

白疵瘡

夫小兒白疵瘡者俗呼爲雞糞禿者是也可用甜瓜蔓龍頭不以多少河水浸之一宿以砂鍋熬取極苦汁濾去瓜蔓以文武慢火熬成如稀餳狀盛於磁器中可先剃頭去盡瘡痂死血出盡著河水洗淨却用熬下瓜蔓膏子一小盞加半夏末二錢生薑自然汁一兩匙狗胆一枚同調不過三兩上立可大忌雞猪魚兔動風發熱之物

目疾

內經曰熱勝則腫治火之法在藥則鹹寒吐之下之在鍼則神廷上星頤會前頂百會血之醫者可使立退痛者可使立已昧者可使立明腫者可使立消惟小兒不可刺頤會爲肉分淺薄恐傷其骨然小兒水在上火在下故目明

瘡疱入眼

小兒瘡疱入眼者乃餘熱不散耳止宜降心火瀉肝風益腎水則愈矣

疳眼

夫小兒疳眼數日不開者乃肝木風熱之致然也可調服凉膈散數服眼開而愈

朱震亨平治會萃

解顱

解顱者乃是母氣虛與熱多耳戴云卽初生小兒頭上骨未合而開者宜以四君子湯四物湯有熱加酒芩炒黃連生甘草煎服外以絹帛繫緊用白斂末敷之

頭癬

小兒頭瘡用紅炭焠長流水令熱洗之又服酒製通聖散除大黃酒炒外以胡荽子伏龍肝懸龍尾黃連白礬爲末調敷

明方賢奇效良方

解顱

顖門乃母氣血充實令兒顖門堅實而耐養如母多病氣血虛弱令兒顖門虛軟而不實又後頂顖乃父之精元氣充實令兒後頂上堅硬而耐養如父之元氣不足酗酒多慾令兒後頂虛孔不堅亦不壽如父母俱怯生下兒女俱不壽若如此其父母自亦不能保於天年前顖又曰信門道家爲泥丸後信名腦後頂門頭中心頂上又名百會穴華陀看面部訣載甚詳顖與信同音凡前後信及百會開而虛名解顱

髮黃

髮乃血之餘母之血氣充實則髮黑而光潤如母之血虛帶漏敗墮月事不調或貪酒多淫或母胎有患令兒髮黃焦槁生疳熱瘡瘍之患

萬氏秘傳片玉心書

解顱

腎主骨髓脊者髓之路腦者髓之海也肝之脉與腎脉內行於脊骨之中上會於腦故頭破解顱脊疳之病又肝腎之風熱子傳於母之病也

解顱者有二或生下之後頭縫四破頭皮光急日漸長大眼楞緊小此髓熱也

又有生下五六個月後顖門已合而復開者此等小兒大數難養腎肝風熱之病宜加味瀉青丸主之所謂實則瀉其子也蘆薈瀉青丸加黃蘗黃芩黃連等分碾末蜜丸服

解顱八物有熱加連以綿繫束香附白斂

顖腫

乳食不常饑飽起寒熱積脾氣上冲致成顖腫隨輕重風熱相交未易攻治宜退熱疏風證瀉青丸子顯神功

顖陷

瀉泄久而氣血虛不能上冲元氣虧弱脊炙黃爲細末雞卵白調服卽愈藥用參苓白朮散服之顖陷頓能除

腦疳

腦疳者小兒生後生瘡成餅狀如覆盤此風熱也宜加味瀉青丸加蔓荊子白蒺藜炒

髮遲

髮乃血之餘腎之苗也小兒髮久不生雖生不黑而稀此由腎氣衰而血氣不足之故也地黃丸主之

育嬰家祕

解顱

兒本虛怯由胎氣不成則神氣不足目中白睛多其顱卽解而色恍白此皆難養縱長不過二八之數若戒色慾多不過四旬而亡

解顱有二初生後頭骨漸開此胎氣怯弱腎不足也有合而復開者自顱至印堂有破痕可開一分又有頭四破成縫者此皆解顱由病後腎虛水不勝火火氣上蒸其髓則熱髓熱則解而頭骨復分開矣腎虛者宜服地黃丸以補腎之不足調元湯十全大補湯母子共服之以補脾胃使氣血漸實其顱自合矣其髓熱者宜逼聖散爲丸服去硝不用外用封顱法或用軟帛緊束有作巾遮護久而自合亦良法也

又有兒生後頭漸大頭皮赤光眼小此腦疳也乃受父母熱毒之氣藏於腎中上熏於腦故頭大漸紅也此難養不出二八之數其未周歲滿頭生瘡結餅作癢作痛兒不能忍日夜啼哭者亦難養也宜服前苦參丸及松皮散敷之

顖填顖陷

顖填顖陷訣云熱甚則腫虛熱則陷

顖陷者顖門腫起骨高突也經云熱甚則腫由邪火炎上使清明之氣上升而不降其證有二以手摸之腫堅實者此有寒邪在表腠理閉寒熱不得出所謂氣上冲則堅勁者是也宜升陽散火湯此鬱則發之也如摸之其腫虛浮者此積熱在裏熏蒸於上所謂氣上冲則窠臼者是也宜酒製神芎丸此高則抑之也一發一下中病卽止

頭瘡

頭生胞瘡者初因皮破成瘡膿水不乾頭毛粘結內生虱痒則抓之年久不愈有成癩頭當先去其虱用石菖蒲煎湯洗之其虱盡死待乾用水銀臘粉二味放碗中以指研勻入津調濕指蘸藥搽瘡上四畔及髮內虱盡去方用秋牛皮窖口上烟膠不拘多少松香研末入輕粉少許雄黃少許熬熱油調塗患處頭生軟癩者年久不愈用紫金丹塗之效

髮遲

頭之有髮猶山之有草木也髮者血之餘髮之多寡由於血之盛衰也坎爲血卦血聚腎之液髮者腎之苗也故其色黑也兒髮久不生生不黑者皆腎虛也宜地黃丸主之

大病後其髮成穗或稀少者乃津液不足疳勞之外候也宜集聖散主之

幼科發揮

頓陷

頓陷者謂顖門陷下成坑也其證有二經云陷者下氣虛也大病之後津液不足眞氣下陷成坑窞者宜大補元氣調元湯加升麻主之有脾胃虛弱飲食減少脾主肌肉肉去皮薄顖門露見非陷也宜服肥兒丸參苓白朮散補脾胃則能飲食肌肉自平頓不露矣

枕陷

又有後枕陷者活幼心書謂其證尤重於頓陷者此大虛極有無一活殊不知此非病也乃父母之過也初生兒頭骨未合當用菉豆作枕枕之常與移動勿使只在一邊則頭骨必正矣此後枕骨陷下者乃兒臥日久之所致也若難養則頭骨四破高下成縫者皆非壽子也

頭軟

頭仰者頸軟也頭者頭之莖也一名天柱骨頭軟者乃天柱骨不能任元而前後左右傾倒也此惡病也其證有二小兒初生便頭軟者皆胎稟不足腎氣虛弱也腎主骨脾主筋筋不束骨其骨則折母能令子虛也此兒難養縱長不及四旬腎氣虛矣宜服地黃丸加當歸續斷主之有因大病之後頭骨不能起者此血氣虛弱也宜十全大補湯煉蜜丸服經云頭者精明之府也頭仰斜欹神將去矣凡大病人有是證難治

疳眼

此證多是飲食炙煿甘辛積熱以致脾胃成疳上攻眼目赤澁烏珠有翳久漸變白宜速治療若不早除多成痼疾初服清熱飲次服五疳丸

魯伯嗣學嬰童方問

解顱

仲陽謂解顱生下而顖不合腎氣不成也長必少笑更有目白睛多晃白身瘦者多愁少喜也餘見腎虛證楊氏曰小兒年大頭縫開解而不合者腎主髓腦爲髓海腎氣有虧腦髓不足所以頭顱開而不能合也人之腦髓如木無根凡得此者不遠千日其間亦有數歲乃成廢人設有此證不可來手待斃宜與錢氏地黃丸仍用南星微炮爲末米醋調數於綳帛烘熱貼之亦良法也柏子仁散三幸散等劑傅之尤妙

頓陷顖塡

頓陷者始因臟腑有熱渴飲水漿致成洩利久則血氣虛弱不能上充腦髓故顖陷如坑不能平滿用狗頭骨炙黃爲末雞子清調敷之顖塡者顖門腫起也脾主肌肉乳哺不常饑飽無度或寒或熱乘于脾家致使臟腑不調其氣上衝爲之塡脹顖突而高如物堆起毛髮短黃自汗是也若寒氣上衝則牢靭（音吊反頭）（也靭破如反頭突起）熱氣上衝則柔軟寒者溫之熱者凉之劑量輕重兼與調氣小兒肝盛風熱反攻亦然此證未易退差或熱證用大連翹散以消之有表熱證柴胡散主之又有封頓散掩之論曰小兒胃氣冲和則腦髓充盛頓項漸合若胃氣熱熏蒸臟腑則渴而引飲因致洩利令臟腑壅熱血氣虛弱不能上充腦髓所以顖陷也聖濟經用當歸散地黃丸

目內證

目內赤者心熱導赤散主之淡紅者心虛熱生犀散主之清肝熱瀉青丸主之漫淡者補之黃者脾熱瀉黃散主之無精光腎虛地黃丸主之龍木論小兒以圊睛候皆因失誤築打損著頭面額角兼倒仆令兒肝受驚風遂使兩眼圊睛宜服牛黃丸口議血眼宜服生熟地黃散流行血氣熱毒服小防風湯風毒服小流氣飲積毒服小菊花膏主之斑瘡入眼決明散密蒙花主之又有犀角散石楠散通頂爲妙或瀉後眼如上膜或痘疹入眼眼不能開及諸證眼定無精光難治

耳病

耳者腎之候小兒腎經氣實其熱氣上衝於耳遂使津液壅滿爲膿爲汁者也亦有澡浴水入耳中水濕

停留搏於血氣釀成熱亦令耳聾久而不瘥變而聾耳龍骨散主之又湯氏有五般停耳候停耳者常有黃膿出是也膿耳者常有白膿出是也底耳者裏面腥臭糞耳者裏面虛鳴時出清膿然五般病源一也皆由風水入耳內有積熱上壅而成若不早治久則成聾胭脂膏等治之仍服化痰退熱等劑即愈

鼻病

凡牙兒三朝五日六晨一臘忽然吻乳鼻塞不能開口呼吸者多是乳母安睡之時鼻中出息吹著兒顏或以水浴洗用水溫冷不避風邪所以致兒鼻塞宜與通關膏傅之消風散服之或有驚悸作熱薄荷散與服生者亦佳

又有鼻衄是熱搏於氣而乘於血也肺主一身之皮毛口氣開竅於鼻蘊寒先客皮膚搏於氣而成熱熱乘於血血得熱而妄行從鼻中出者名鼻衄也或未及發汗而鼻燥喘息鼻鳴即衄治法皆依大方而分劑略輕耳黃芩湯犀角地黃湯主之生地黃茅根煎服尤佳

鼻衄者黃芩主之清肺飲子治蠶鼻涼膈

薛氏保嬰撮要

解顱顖塡顱陷

夫腎主骨腎氣實則腦髓充而顱早合骨脉盛而齒早生腎氣怯則腦髓虛而顱不合此由父母精血不足宜地黃丸補之若在乳下當兼補其母調補脾腎爲善亦因所稟腎氣不足及乳哺失宜脾胃虧損所致並用補中益氣湯亦有瀉痢氣血虛脾胃不能上充者亦用前法若手足並冷前湯加薑桂未應虛寒甚也急加附子綏則多效不救

耳證

耳者心腎之竅肝膽之經也心腎主內證精血不足肝膽主外證風熱有餘或聾聵或虛鳴者稟賦虛也或服痛或膿痒者邪氣客也稟賦不足宜用六味地黃丸肝經風熱宜用柴胡清肝散若因血燥用梔子清肝散未應佐以六味丸間服九味蘆薈丸若因腎肝俯熱朝用六味丸夕用蘆薈丸若因食積內熱用四味肥兒丸若因乳母膏粱積熱而致者宜加味清胃散脾經臂結而致者加味歸脾湯肝經怒火而致者宜加味逍遙散皆令乳母服之兼與其兒少許不可專於治外不惟閉塞耳竅抑亦變生他證延留日久遂成終身之癰矣慎之

目內證

經曰目者五臟六腑之精榮衛魂魄之所常營也神氣之所常主也又曰諸脉者皆屬於目目得血而能視五臟六腑精氣皆上注於目而爲之精故白睛屬肺黑睛屬肝瞳人屬腎上下泡屬脾兩背屬心而內背又屬膀胱五臟五色各有所司心主赤赤甚心實熱也用導赤散赤微者心虛熱也用生犀角散肝主青青甚者肝熱也用瀉青丸淡青者肝虛也用地黃丸脾主黃黃甚者脾熱也用瀉黃散淡黃者脾虛也用異功散目無精光及白睛多黑睛少者肝腎俱不足也用地黃丸加鹿茸晝視通明夜視罔見者因稟陽氣衰弱遇夜陰盛則陽愈衰故不能視也用冲和養胃湯凡赤脉腎物從上而下者屬足太陽經用東垣選奇湯從下而上者屬足陽明經用局方流氣飲蓋腎瞖者風熱內蘊也邪氣未定謂之熱腎而浮於外邪氣已定謂之水腎而沈於內邪氣既深謂之陷腎宜升發之退腎之藥佐之若上眼皮下出黑白腎者屬太陽寒水從外至內者屬少陽風熱從下至上緣邑者屬足陽明及肺腎合病也疳眼者因肝火濕熱上衝脾氣有虧不能上升清氣故生白腎睛開不閉眵淚如糊久而膿流遂至損目用益氣聰明湯茯苓瀉濕湯及四味肥兒丸目閉不開者因乳食失節或過服寒凉之藥使陽氣下陷不能升舉故目不開用柴胡復生湯若胃氣虧損眼睛無力而不能開者用補中益氣湯暴赤腫痛者肝火熾盛也用龍膽瀉肝湯多淚羞明者肝心積熱也用生犀散亦有肝腎虛熱者用地黃丸風沿爛眼者腦有積熱也用清胃散時時作痒者膿潰生蟲也用點藥紫蘇膏眼睛連劄者肝經風熱也用柴胡清肝散若生下目黃壯熱大小便祕結乳食不思面赤眼閉者皆由在胎時感母熱毒所致兒服瀉黃散母服地黃丸若乳母膏粱積熱致兒目黃者令母服清胃散若吸體面目爪甲皆黃小便如屋塵色者難治又有痘疹後餘毒未盡上侵於目者屬腎肝虛也用滋陰腎氣丸前證宜審治其母兼調其兒

鼻塞鼻衄

巢氏云鼻乃肺之竅皮毛腠理乃肺之主此因風邪客於肺而鼻塞不利者宜用消風散或用葱白七莖入油膩粉少許搗攤絹帛上掌中護溫貼鼽門因驚仆氣散血無所歸而鼻衄者用異功散加柴胡山梔

子左臉青而兼赤者先用柴胡清肝散後用地黃丸右臉赤乃肺大腸實熱也用瀉白散鼻色赤乃脾胃實熱也用瀉黃散微赤乃脾經虛熱也用異功散加升麻柴胡色深黃用濟生犀角地黃湯後用楊氏地黃丸淡白色用六君子湯類間色赤用四物湯加山梔赤甚用五痲散小便赤色用六味丸補中益氣湯腎色白用六君子湯久不愈用麥門冬飲子若初病元氣未虧乳食如常發熱壯熱二便祕結作渴飲水臥不露睛者悉屬形病俱實當治邪氣若病久元氣已虧食少發熱口乾飲湯嗌吐泄瀉肢體畏寒臨臥而露睛者悉屬形病俱虛當補正氣爲要

徐春甫古今醫統

顱顬論

顱顬經曰顬門未合筋骨柔弱顬門青筋脈虛不榮顬門常坑滑泄便便顬門突起風疾不止顬門久冷吐利清涕顬門虛軟顬癇不免顬門扁闕暴泄易脫顬門喝長風作必亡顬門連額驚癇易得顬門未完怕熱怯寒顬門緩收胎氣不周顬門動數神昏氣弱顬門寬大多疾受害顱顬者精神之門戶也開竅之橐籥也上下相貫百會相通七竅應透五臟所藉泥丸之宮魂魄之穴氣實則關氣虛則開良由長大不可不合醫師見之當知可否用藥消息之顬門寬大受病深重恐藥難療不可不慎也

王肯堂證治準繩

解顱

父精不足則解顱眼白多

解顱者人之無腦髓如木無根古人雖有良方勢而無功也亦不可束手待斃宜依錢氏補腎萬一有可生之理錢氏補腎地黃丸加鹿茸之類是也

曾氏云凡得此候不及千日之內間有數歲者偶因他疾攻激遂成廢人若氣色清明能飲食者多服調元散補腎地黃丸旬日內頗見效者次第調理或有可治若投藥後如故亦難療矣

田氏云解顱治法宜用生地散

顬陷

曾氏云顬陷者虛之極也胃氣虛寒則顬陷慢驚中有之胃寒脾困吐瀉者爲虛極急以金液丹固眞湯及諸救元等藥治之外則貼以烏附膏有後枕陷者其證尤重治法以顬陷藥同不效亦爲難療此大虛極百無一活耳

顬塡

顬塡之證亦有因小兒脅下有積咳且啼而氣上逆啼甚久其氣未定因而乳之者肝氣盛風熱上衝者皆能令顬塡當一一審其因而治之寒者溫之熱者凉之氣上逆者和而降之肝氣盛者瀉青爲主熱證裏多大連翹湯表多柴胡散虛者以補中益氣湯送下地黃丸神而明之存乎其人言不盡意

曾氏云世言顬腫皆以爲熱殊不知有陰陽二證切宜詳辨堅硬爲陰紅軟爲陽故嬰孩寶書云寒氣上衝則牢勒熱氣上衝則柔軟正此之謂若陰證以勻氣散理中湯主之陽證用玉露飲當歸散防風湯爲治

石壁經歌曰積聚脾中熱不通致令面赤口脣紅舌高夜嗽多塡脹休使流傳肺有風喉裏作聲涎上壅顬門腫起熱來衝但教凉膈安靈腑能使三朝速有功

積有冷熱皆能作腫冷則糞白或酸臭氣衝人亦有蟲出其食物皆不能化腹脹滿而多困喉中亦鳴也熱則使多渴其糞赤面色亦黃赤口內臭氣亦蟲出各看其證候調治且須分水穀去積并調氣冷則溫脾胃熱則去其熱化涎止渴顬陷則冷也腫則熱也積熱顬虛腫宜將時氣門中三十六種除濕散膿煎桑白皮湯下

形證論云肺熱生風涎鳴顬腫將白丁香膏一二服或南星丸一二服便退

祕要指迷論方凡小兒生下一月日內或顬門腫此乃受胎熱氣卽用黃蘗膏塗於足心湧泉穴如陷卽用半夏膏塗手心此乃嬰兒腎受冷氣邪干心致令病生黃蘗半夏皆爲末皆冷水調貼

天柱倒

王先生云小兒久患疳疾體虛久不進飲食患來日久諸候退只是天柱骨倒醫者不識謂之五軟候須進金靈散生筋散

形證論歌天柱纔倒道難醫算來此病非心脾若患先須因吐瀉不曾調氣至危羸大患傷寒無汗脈

鳳髓經此一句云却被傷寒無浮脈

定應妙藥療他遲無此卒然生此患又兼不辨四肢肥身軟難堪頭似石面紅唇赤臉如緋此病多因傷腎熱後來因熱病相隨

此兩句在鳳髓經卽云此患只應傷膽熱後來伏熱又相隨

肝受熱風天柱倒但將凉藥與維持貼須性熱筋方緩立見温和請勿疑吐瀉項軟惟調氣傷寒柱倒不須醫

此或傷寒或吐或瀉乘虛邪毒透入肝脉熱邪所侵是致令筋軟長或手足軟而不解舉或項頸軟而不解舉若有前證即須凉膈若吐瀉則先調胃氣貼項并服凉肝膽藥不可太熱亦恐過寒

頭瘡論

小兒頭瘡是六陽受毒熱而攻頭成瘡也若頭上散成片常常燥痒毛髮稀少有類白屑此因積熱上攻名曰禿瘡瘡雖生於頭世人只知以藥外傅得愈不逾旬月其瘡又發何爲而然蓋頭者諸陽所會之處洪範五行火曰炎上熱毒上攻兩陽相灼故瘡生於頭法當解陳莝之積熱導心經之煩躁斯可矣

小兒久癩頭以防風通聖散酒製除大黃另研爲末再用酒拌曬乾爲末每用一錢水煎服日四五服至三十貼見效

髮遲髮黃

巢氏云足少陰爲腎之經其華在髮小兒有稟性少陰之血氣不足即髮疎薄不生亦有因頭瘡而脫落不生者皆由傷損其血血氣損少不能榮於髮也足少陰腎經其血氣華於髮血氣不足則不能潤悅於髮故髮黃也

目赤腫痛

曾氏云熱極挾風則目赤腫痛晝夜不開驚啼不已先用九仙散水薑葱煎服次三解散溫米泔水調下及點以黃連膏

若夫天行時證暴赤腫痛晝夜苦甚久則昏瞀治法先以九仙散解表次以小柴胡湯去半夏加大黃薄荷竹葉生地黃水煎服併投草龍膽散及點以黃連膏貼以清凉膏

有孩兒胃氣素虛脾氣實盛眼泡赤腫羞澀不開遽按苦寒之劑以退赤腫反傷脾胃不吐則瀉或四肢微寒復以溫藥調治則目疾轉加宜先用皁咀五苓散水薑燈心煎服次投瀉黃散自愈

有心脾蘊熱經久及肝受邪熱致兩目羞明眼泡浮腫微有紫色大腑閉或流利小便澀或通順先以百解散發表次投明目飲自然平復仍忌酒葷三五日

有小兒薄劣多致塵埃入目揩摩成腫發熱作痛啼哭不已用辟塵膏治之立效

余平生無眼赤之患用之如神大人小兒可通用凡眼赤澀之初只用自己小便張目溺出用一指按抹眼中便閉目少頃即效此以眞氣逼去邪熱也

外障

小兒病目生翳不可輕用點藥只以服藥內消爲主看赤脉上下內外分經處治

痘瘡入目

痘瘡之毒發於五臟六腑毒之盛者眼必受之古人當護眼之法其意深矣凡瘡出太甚兩眼常出淚者肝熱也此時眼中無瘡但內服瀉肝火之藥益眼中之痘常在收靨不齊之後有之如瘡入目成膚翳者切不可用點眼藥損睛破瞳成廢人矣痘疹收後目不可開者肝熱則目澀不敢開明暗皆然心熱見明則合暗處則開謂之羞明此有餘熱在心肝也如瘡未成膿腫去目開者瘡已過期收靨不齊目閉不開者瘡壞欲變目上宜者心絕也直視不轉者腎絕也非泣而淚自出者肝絕也微瞑者氣脫也血貫瞳子者火勝水竭皆死候也

痘毒入眼而虛弱者不宜凉劑俟靨後治之雖有目翳切不可用點藥只宜活血解毒俟五臟和平翳當自去若誤用點藥則非徒無益而反害之

丹溪云如痘傷眼必用山梔赤芍決明歸翹連翹防風桔梗升麻小劑末之調服如眼無光過百日後血氣完復則自明矣

張炳云治瘡疹後毒氣攻眼或生翳膜赤黑之類宜用四物湯加荊芥防風煎服兼用黑豆皮穀精草海蛤甘草等分爲末用熟豬肝切片蘸服神妙一方治痘毒目翳用江西蛤粉黑豆皮甘草蕊蒙花等分爲末調服

丹溪云痘後生翳數服效用歲靈仙仙靈脾等分洗淨不見火與日爲細末每服隨時

錢氏黃蘗膏痘初出塗面護眼調肝散治瘡疹太盛服之不入眼

痘疹餘毒證

痘疹爲毒最重爲自稟受以來蘊積惡毒深久之故古稱曰百歲瘡謂人生百歲之中必不能免一發則諸經百脉清純太和之氣皆爲其擾亂一番正氣大虛而邪得以乘之各因所犯而爲疾況目又清純之最者通於肝膽肝膽爲清淨之府邪正不並立今受濁邪熏灼則目有失發生長養之源而病亦易侵皆由人不能救而且害之之故也或於病中食物太過

懷藏太暖誤投熱藥多食甘酸而致病者或於病後因虛未復恣食辛辣燥臘竭視勞瞻好烘多哭衝目風沙烟瘴而致病者有爲昏蒙流淚之內證者有爲赤爛星障之外證者有餘邪蘊積爲癬脂黃膜花瞽蟹睛等證之重而目精凸者有餘邪偶流爲赤絲羞明微星薄瞽等證之輕而病自消者輕重淺深亦各隨人之犯受所患不一當驗其證而審其經以治之不可執一反有激變之禍蓋痘疹之後人同再造比之常人不同若有所悞貽害終身行斯道者宜加謹焉大抵治之早則易退而無變遲則雖無變恐血氣凝定即易治之證亦退遲矣今人但見痘後目疾便謂不治不知但瞳神不損者縱久遠亦有可治之理惟久而血定精凝障瞽沈滑瀏損者則不治耳

倪仲賢云斑疹餘毒所害者與風熱不制之病稍同而異總以麈羊角散主之便不鞕者減硝黃未滿二十日而病作者消毒化斑湯主之

眼疳

龍木論治小兒疳眼外障此眼初患時皆因頭腦上有瘡或因經多時瀉痢潛腫疼痛淚出難開瞞間伏熱氣肝風入眼初患此疳時癢瀏揉眉咬甲致令瞽生赤腫疼痛淚出難開臉硬白睛遮滿怕日合面臥不喜擡頭此疾不宜燒灸頭面恐損眼也切忌點藥宜服殺疳散退瞽丸

聖惠論夫肝開竅於目目者肝之候若小兒內有疳氣肌體瘦羸而藏腑挾於風熱壅滯不得宣通因其乳食過多胃腸痰結邪熱之氣上攻於目則令腦熱目癢或赤爛生瘡或生障瞽漸漸遮睛久而不瘥損於眼目故號眼疳也

玉訣云此患先與凉膈後瀉肝次淋洗之即無誤也又云此患小兒肝熱宜瀉肝散薤仁膏凉膈退熱又云小兒疳眼雀目斑瘡入眼者先與利膈退熱凉心經後與疳藥也

鼻病

張潠云按小兒肺氣通於鼻氣爲陽若氣受風寒停滯鼻間則成鼻塞氣寒使津液不收則多涕若冷氣久不散膿涕結聚使鼻不聞香臭則成齆鼻若挾熱則鼻乾皆妨害乳食

鼻塞

演山云凡牙兒鼻塞宜以通關膏傳之消風散服之通關膏用白殭蠶猪牙皂角荊芥香附子川芎細辛等分爲末葱白同研傳鼻至妙

鼻流清涕

聖惠云肺氣通於鼻若其藏爲風冷所傷冷隨氣乘於鼻故使液涕不收也夫津液涕唾得熱則乾燥得冷則流溢也

鼻乾無涕

聖惠云小兒肺臟壅滯有積熱上攻於腦則令腦熱也又肺氣通於鼻主於涕若其臟有熱則津液乾燥故令無涕也

鼻有瘜肉

千金翼論曰凡人往往有鼻中肉塞眼食皆不快利得鼻中出息而俗方亦衆而用之皆無成效惟見本草云雄黃主鼻中息肉此言不虛但時人不知用雄黃之法醫者生用故致困斃曾有一人患鼻不得喘息余以成鍊雄黃日內一大棗許大過十日肉塞自出當時即得喘息更不重發其鍊雄黃法在千金翼仙丹方中具有之宜尋求也

耳論

張潠云小兒耳中諸病由風入於腦停積於手太陽之脈則令耳聾風與濕相搏則兩耳生瘡又兒稍大見月初生以手指之則耳下生瘡者名月蝕瘡又乳母與兒洗浴悞令水入耳中水濕停積搏於血氣蘊結成膿謂之聤耳

寶鑑歌云太陽入耳損聽聰氣滯時多耳必聾鳴是風井氣相擊痛應腦戶有邪風腎熱鬱蒸聤耳患日深疼痛出稠膿不有稠膿非此患只因滴水入其中

耳聾

巢氏云手太陽之經入於耳內頭腦有風入乘其脈與氣相搏故令耳聾

耳鳴

巢氏云邪氣與正氣相搏故令耳鳴久即邪氣停滯遂成聾也

聤耳

巢氏云耳宗脈之所聚腎氣之所通小兒腎臟盛而有熱者熱氣上衝於耳津液壅結即生膿汁亦有因沐浴水入耳中而不傾瀝令盡水濕停積搏於血氣蘊結成熱亦令膿汁出皆謂之聤耳久不瘥即變成聾也

李梴醫學入門

解顱

解顱原是腎家虛

小兒年大頭縫開解而不合宜腎氣丸或八物湯加酒炒芩連外用南星白蘞爲末醋調攤紅帛上烘熱貼之或虎頭骨燒灰油調敷縫中外作頭布遮護其父母宜服腎氣丸虎潛丸俾精血充足後育子女無是患也

顖塡顖陷

風熱顖塡脾虧陷

顖塡者肝氣盛風熱衝上而成此候也玉壺集歌曰顖門腫起定爲風此候應腎也不中若或加坑如盞足七日之間命必終

張三錫醫學準繩六要

斑後腎膜遮睛

海藏云東垣治斑後風熱餘毒腎膜氣障遮睛以瀉青丸治之大效保命集云退腎膜妙不特斑後減大黃服余以爲肝經久蘊風熱乃生腎膜瀉青丸正所以拔病根也

小兒斑疹後毒上攻於目腎膜腫痛脈實强壯能食者羚羊角散加減以解之氣血虛而胃弱者須以補養爲先而佐以解毒斯得之矣丹溪曰斥酌性升散較諸角尤甚痘後有餘毒者用之如無餘毒虛虛之禍如指諸掌不可不知

雀目

小兒雀目屬肝脾二經脾弱者健脾肝虛者養血亢分兩途飲食面色如常但夜不能見物還明飲妙小兒衛生總微方論

解顱

腎氣盛者顱小而合早腎氣怯者解顱而顱不合顱不癒而病交攻極難將護最爲大病

顖門腫陷論

小兒初生皆有顖門者藏氣未充骨髓未完滋養未備故也臟腑皆以脾胃爲養兒自生以後得五穀所滋則臟氣充而骨髓完所以兒至能食則顖門合也顖門者繫於脾胃聖濟經言衛顖之天五五者土也脾胃屬焉小兒有顖腫者由脾胃不和冷熱不調或怒啼飲乳或喘急咳嗽致陰陽氣逆上衝而顖腫也熱則腫而軟冷則腫而硬又有顖陷者或因瀉痢或小便頻數或曾服清藥以利小便或本怯氣弱或別病纏綿皆使藏虛而不能上榮於顖故令顖陷也此皆小兒惡證得愈者鮮矣

頭上諸病論

小兒頭上生軟癤者由風邪冷熱之氣客於皮膚持於血氣壅滯經絡蘊結而生亦如身上生癤無異但生在頭上始則赤腫而硬其邪微者散則自消其邪甚者腫赤內搐潰膿血作痛以頭上皮緊至熟多不能去膿根中有惡汁不盡因而復發或在根邊別生連續不癒常常拱膿故名曰軟癤

小兒頭有禿瘡者按九蟲論云是蟯蟲動作與風邪相乘上於頭之皮膚搏於血氣傷其榮衛而所生也榮爲血受病則爲赤禿爲氣受病則爲白禿榮在內邪稍難干故患赤禿者少衛在外邪易得著故患白禿者多其始生如癬之斑點上有皮屑漸漸作痂以成其瘡遂至滿頭髮落殆盡若刮去其痂則瘡皆是孔眼大小不等如蟲之窠有膿汁出不痛而癢癢乃不可禁是知有蟲爲風也又一種俗呼爲鬼氈頭小兒有頭瘡過夜被鬼氈之則引及滿頭有赤痂或云便赤禿也

小兒頭瘡者由臟腑有熱上衝於頭外被風濕復相乘之搏於血氣而生其瘡故曰頭瘡此候與禿瘡特異且禿瘡者有白有赤硬痂遍滿其頭此頭瘡者但一兩處生其痂並不白硬而乾時時常有膿血濕汁俗呼爲長頭瘡小兒失於沐浴者便生此瘡也

髮

心氣盛者形神清而多髮心氣怯者髮久不生生則不黑心主血髮爲血之餘怯則久不生也

耳中諸病論

小兒有忽患耳聾沉聽者由風邪乘於手太陽之經也邪隨其經入於耳內邪正相搏氣停塞滯則令耳聾不能聰聽於音聲也輕者則爲沉聽謂耳中沉沉然輕小之音則不辨重大之聲纔聞也

耳中鳴痛

小兒有耳中或鳴或痛者由風邪入耳與正氣相干搏於血氣者卽爲鳴搏於經絡者卽爲痛也

耳中膿瘡出膿汁

小兒有耳中腫或生瘡出膿汁者由風濕相乘入於耳邪正相干搏於氣血傷於經絡輕則爲腫重則生瘡若津液結潰變爲膿血汁出又有因水或眼淚入耳停搏正氣亦爲膿汁俱名聤耳又名膿耳也

眼目病論

小兒眼目生病者多因恣食甘酸臟生邪熱熏炙肝經衝發於目或爲赤腫痒痛或眵淚隱澁或生赤脉或生腎膜又痰飲毒氣漬肝致臟氣不得宣通者則

精華未得明審故黑睛雖全而視物朧朧此名睛盲若晝日明至暝不見物者此邪干經之陰也謂之雀目言如鳥雀之目暝時無所見也又有痛眼者乃氣毒障幔其睛也又有痛肝之氣衝於目者亦能生其翳膜以爲遮障也

鼻中病論

肺氣通於鼻氣不和爲風冷所乘停滯鼻中搏於津液使涕凝結壅氣不通快不聞臭香謂之鼻塞若風冷搏於血氣而生息肉塞滯者謂之齆鼻若風濕相搏則鼻內生瘡而有膿汁出也若腦熱攻鼻中乾燥或生瘡痂鞕而無膿汁也

陳治幼幼近編

解顱

解顱者腎氣有虧腦髓不足濕熱上熏故頭縫解開不合也宜地黃丸加鹿茸酒炒片芩亦有氣虛有熱者宜四君子加酒芩

衍義治解顱以蟹螯同白芨搗爛敷顖上

傾陷

傾陷者氣血脾胃俱虛而元氣下陷也宜補中益氣湯手足冷者加製桂甚至加附子

顖塡

顖塡者脾胃元氣虛而氣逆上衝也亦有脾胃虛熱者有脾胃濕熱者並宜異功散加酒芩木香薏苡荊子濕熱上熏者加蒼朮

東醫寶鑑

項軟

項軟者天柱骨倒也宜用健骨散生筋散

小兒久患疳疾體虛不食及諸病後天柱骨倒醫者不識謂之五軟

小兒因風頸項軟頭不得正或去前或去後宜用天柱丸五加皮散風熱項軟合用凉肝丸方

髮不生

髮不生者因禀受氣血不足不能榮於髮宜服蓖蓉丸

胎患

初生觀物轉睛不快至四五歲瞳人潔白昏蒙不見延至年高無藥治由胎中受熱致損也

通睛

嬰兒雙眼睛通者欲觀東邊則見西邊苦振掉頭腦則睛方轉此肝受驚風宜服牛黃丸

眼中生贅

眼瞼中生贅子初生如麻子大日漸如豆懸垂瞼內此脾經風熱所攻宜服五退散加減

青盲

胎中受風五臟不和嘔吐黃汁兩眼一同視物不明無治法青盲者瞳子黑白分明直視物而不見者也

疳眼

小兒疳眼雀目或盲膜不見物或流膿宜羚肝丸龍膽飲子

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百三十二卷目錄
醫部彙考四百十二
小兒頭面耳目鼻病門二
方一 苦參湯 藜蘆膏 六味地黃丸 五味異功散 補中益氣湯 四君子湯 柏子仁散 大連翹飲 柴胡散 頤脈湯 元戎十月 狗獺丸 虎骨方 參苓散 茯苓散 王氏封頤散 當歸散 烏附飲 星蝎飲 金鈴散 生犀散 四十八味助元藥方 竹茹散 吉氏聚頭起痘藥方 吉氏聚頭起痘膏 二十六種貼頭藥方 吉氏聚頭起痘膏 氏良秋奇丸 玉露散 防風湯 全蝎丹 星附大連翹湯 柴胡散 理中湯 星附 脊八珍湯 頭瘡方 頭瘡方 如聖膏 活命飲 苦參丸 調元湯 勻氣散 肥兒丸 參苓白朮散 十全大補湯 通聖散 封頤洪 益黃散 元精石散 瓜蔞散 淡豉散 黃連散 胡粉膏 又方 荊藤丹 肉蔻丸 放蛔丸 集翠丸 又方 蟾頭方 聖惠神效生髮黑豆膏 又方 齊黨煎方 驅痛方 通泉飲 青湯 腦痂散 藥 治大無驗湯 四味肥兒丸 七味肥兒丸 五 治面瘡出黃水方 治面瘡赤腫瘙痒方 福化寒丹 柴胡清肝散 魄子清肝飲 九 味蘆薈丸 蘆薈丸 清上散 當歸蘆薈丸 龍竹散 清黃散 禹餘糧丸 交泰丸 白蔻散 羊角散 滋陰地黃丸 加味清 旋覆子湯 白蔻散 加味逍遙散 胃散 加味歸脾湯 烏麝湯 乾蝎丸 骨 金箔散 草麻膏 龍腦散 小兒虛熱兩耳常鳴方 又 遍鳴散 細辛膏 小兒耳聾不差方 又方 又方 麝香散 舊烏散 紅玉散 龍黃 散 麝香散 麝香散 新蚌散 油引散 綿裹散 紅藍花散 治耳疾痛方 還明飲 合明散 車前子散 三味蘆薈丸 通頂散 養肝丸 生犀散 瀉黃散 益氣聰明湯 導赤散 瀉青丸 草龍膽散 目飲 石榴散 五苓散 發痘散 瀉 青散 生熟地黃散 地黃散 小防風湯 小流氣飲 小菊花膏 決明散 蟬蛻花散 犀角散 導赤散 東 牛黃丸 熱黃連 但人參補胃湯 千金治瘧百方 黃芩丸 瀉 本事方 廣大重明湯 助陽和血補氣湯 治瘕赤暴發腫方 助陽活血湯 芍藥 清肝散 黃連天花粉丸 連翹飲子

小兒頭面耳目鼻病門二

方一

苦參湯 千金方 下同

治小兒頭瘡

苦參 黃芩 黃連 黃蘗 甘草 大黃 萯蒿各一兩 藜蘆于三合

右八味㕮咀以水六升煮取二升漬布揩瘡上日數過

藜蘆膏

治小兒一切頭瘡久卽瘢癥不生痂

藜蘆 黃連 雄黃 黃芩 松脂各二兩 猪脂半斤 礬石五兩

右七味爲末煎令調和先以赤龍皮大麻湯洗訖傅之赤龍皮槲木皮是也

六味地黃丸 錢氏造 下同

治小兒稟賦虛弱解顱囟陷髮稀短少焦黃成穗耳或聾聵或虛鳴肝經虛熱日內色淡青

熟地八錢酒洗杵膏 山茱肉 山藥各四錢 澤瀉 牡丹皮 白茯苓各三錢

右爲末入地黃膏量加米糊丸桐子大每服數丸溫水空心化下

五味異功散

治小兒頤硬腫陷及因驚仆氣散血無所歸而鼻衄血

人參 茯苓 白朮 甘草炒 陳皮各等分

右爲末每服二錢薑棗水煎

黃連散 錢氏 門 事親

治小兒頭瘡

川黃連 黃蘗去粗皮用 草決明 輕粉各等分

右爲細末用生小麻油調藥於瘡上塗之立愈

補中益氣湯 脾胃門 下同

治小兒元氣上衝頤塡元氣下陷頤陷髮稀短少焦黃成穗胃氣虧損眼瞼無力閉而不開鼻衄小便赤色

人參 黃芪蜜炙 白朮土炒 甘草 當歸 陳皮各一錢 柴胡 升麻各二分

右薑棗水煎徐徐服

四君子湯

治小兒解顱

人參 白朮 茯苓 甘草各等分

右各等分每服二錢薑棗水煎

柏子仁散 嬰童百 問下同

治小兒頤不合

防風 柏子仁

右等分爲末乳汁調塗頤門上十日自合

大連翹飲

治瘡疹壯熱小便不通諸般瘡癤丹毒腫風

連翹 瞿麥 荊芥 木通 當歸 防風 柴胡 赤芍藥 滑石 蟬脫 甘草炙各一錢 山梔仁 黃芩各五分

右剉每服二錢紫草煎溫服

熱甚加大黃五分

柴胡散
治小兒傷寒無汗有表證壯熱頭疼身體痛口乾煩渴小便赤大便祕澀夾驚聰腫
石膏　黃芩　甘草　赤芍藥　葛根各二錢半
麻黃去節　柴胡半兩
右剉散三歲兒每服二錢水一盞生薑一片葱白三寸煎半盞不拘時服

封頓散（張渙方）
蛇蛻皮一兩燒灰細研　川大黃濕紙裹煨存性
白芨　防風各半兩
右件碾爲細末入青黛半兩同研勻每用半錢猪胆汁調勻用一紙照頓子大小攤之四邊卷合各畱少白紙用淡生醋麵和貼頓上不住以温水潤動一伏時換

調元散（恩治準繩下同）
主衆受元氣不足顱顖開解肌肉消瘦腹大如腫致語遲行運手足如筒神色昏慢齒生遲服之效
乾山藥去黑皮五錢　人參去蘆　白茯苓去皮
茯神去皮木　白朮　白芍藥　熟地黃酒洗
當歸酒洗　黃芪蜜水炙各二錢半　川芎
甘草炙各三錢　石菖蒲二錢
右碎每服一錢水一盞薑一片棗一枚煎七分無時温服
如嬰兒幼嗽與乳母同服

玉乳丹（張渙方）
治嬰兒頭骨應合而不合頭縫開解
鍾乳粉依古法製煉者　熟乾地黃依法蒸焙者　柏子仁別研　當歸洗焙乾各半兩　防風剉
補骨脂揀淨微炒各一分
右件除別研者研爲細末次入鍾乳粉等拌勻煉蜜和如黍米大每服十粒煎荆芥湯下乳食前服
或加黃芪茯苓

狗腦丸（恩治準繩下同）
治小兒腦長喜搖頭解顱
狗腦一個　豉漆即五加皮　甘草炙　白朮
防風　鍾乳　乾地黃各一分　牛黃二分
右以狗腦丸小豆大一歲欵下二九日再未知加之又云兒顱常令暖冷即病死

虎骨方
治小兒解顱
虎骨　敗龜板　不灰木　乳香各半兩
右爲末用生猪血於手心內調塗在頭縫開處以舊綿紙包裹七日第八日以葱湯水洗去前藥再用此藥塗之又服參苓散

參苓散
人參　茯苓　白附子　羌活　炙草　芎藥
白朮以上木炙各一分　犀角鎊屑　京芎
藿香後三味減半
右爲末每服半錢水　葱用少許銀同煎荷三葉煎至三分温服通驚氣

莊氏家傳方
治腦縫不合
山茵陳一兩　車前子　百合各半兩
右爲末用烏牛乳汁調塗脚及腦縫上用帛子裹頭三日一換五上必效

王氏封頓散
治頓開不合頭縫開張顱開崎陷咳嗽鼻塞
柏子仁　防風　天南星各四兩
右爲細末每用一錢以猪胆汁調勻稀稠得所攤在緋絹帛上看頓子大小剪貼一日一換不得令乾時時以湯潤動

當歸散（薛氏醫案）
治小兒臟腑有熱渴飲水漿致成瀉痢久則血氣虛弱不能上充腦髓故顱陷
當歸　白芍藥　人參　甘草炙各二分　桔梗
橘紅去白各一錢
右爲末水煎半盞時時少與服

百問去白芍
烏附骨（衛生寶鑑下同）
治顱門陷
綿川烏生用　綿附子生用各五錢　雄黃二錢
右件爲末用生葱和根葉細切杵爛入前藥末同煎空心作成餅貼陷處

聖惠生乾地黃散
治小兒臟腑壅熱氣血不榮致頓陷不平者
生乾地黃二兩　烏雞骨一兩酥塗炙令黃
右搗細羅爲末不計時候以粥飲調下半錢

金靈散（恩治準繩下同）
治小兒天柱倒
白殭蠶不拘多少直者去絲炒

右爲末每服半錢一錢薄荷酒調下一日三服更須用生筋散貼之

生筋散

木鼈子三個　蓖麻子三十個

右各取肉同研每用一錢許津唾調貼急抱揩項上令熱貼之

四十八候貼項藥方

川烏頭　白芷　地龍　五靈脂　赤小豆各等分

右末生薑自然汁與酒同調貼在項上更服竹茹散

竹茹散

菊花三錢　黃芩　人參各一錢　大黃半兩

甘草二錢

右爲末竹葉煎湯下

三十六種貼項藥方

草烏頭　赤小豆各等分

右爲末薑汁調攤帛子上貼經宿項立起

吉氏貼頭起項膏

治小兒肝熱膽冷頭項軟倒

川烏　肉桂　芸薹子　南星　蓖麻子各一錢

黃丹炒一錢匕

右各爲末用大蒜一頭煨熟去皮乳鉢內研和藥細每用一錢入米醋和勻貼項上一日許

吉氏狠毒丸

治小兒膽熱肝風天柱倒折宜服此藥更用前起頭貼項藥

狠毒酒浸焙　白附子　大附子尖　天麻

防風　羌活各一分　朱砂　地龍去土各一錢

麝香半字

右爲細末法酒煮糊爲丸如小豆大每服七丸至十五丸用黑豆薄荷湯入酒一滴吞下

玉露飲

治小兒頤塡紅軟並治頰赤咽乾身熱頭痛

寒水石中有細紋手可碎者　石膏潔白堅硬而有牆壁者各一兩　甘草三錢臘乾天陰火焙

右除前二味外甘草剉臘或焙同爲細末每服半錢至一錢溫湯無時調服或麥冬湯

防風湯

治同上

防風　羌活　枳實各半兩　川芎　甘草炙

大黃煨各二錢五分

右剉末每服三字薑棗煎服

金液丹

治小兒胃寒脾困吐瀉虛極致頤陷如坑

舶上硫黃十兩研細用磁合盛令八分水和赤石脂封縫鹽泥固濟曬乾地上埋一小罐子盛水滿安合子在上又以鹽泥固濟以炭火煅三日三夜候冷取出爲末

右以柳木槌乳鉢研極細每服二錢生薑湯下

固眞湯

治同上

人參去蘆　附子湯泡裂去皮臍　白茯苓去皮

白朮各二錢五分　山藥去黑皮　黃芪蜜水炙

肉桂去粗皮　甘草濕紙裹煨透各二錢

右件㕮咀每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分空心溫服或無時

大連翹湯

治小兒內多熱證致頤門塡起

連翹　瞿麥穗　滑石　牛蒡子炒研　車前

赤芍藥各一兩　木通　山梔子　川當歸

防風各半兩　黃芩　荊芥穗各一兩　柴胡

甘草炙各二兩　蟬脫去足二錢半

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分食後服

柴胡散（許氏醫案下同）

治小兒外多熱證致頤塡腫

人參去蘆　甘草微炙　麥門冬去心各二錢

龍膽草酒炒黑　防風各一錢　柴胡五分

右每服一錢水煎

理中湯

治同上

人參去蘆　白朮　乾薑炮各等分　甘草炙減半

右每服三錢水煎熱服或研末白湯調下

星附膏

治小兒軟項

天南星　附子各等分

右爲末用生薑自然汁調敷項間乾卽潤之

八珍湯

卽八物湯治小兒頭縫不合

人參　白朮　白茯　甘草　熟地黃　白芍

川芎　當歸各等分

右三五錢薑棗水煎服

頭癩方 證治準繩下同
松香一兩乾銚鎔開安石上候冷取起輕輕研細
黑龍尾即垂掛屋塵 黃丹各三錢 白芷半兩
松樹皮燒灰存性 水銀 雄黃 白礬各二錢
右爲末以血餘入香油煎爛調敷患處

頭瘡方
猪油一錢半生半熟 雄黃 水銀各二錢半
右研和勻傳瘡上

癩頭方
川芎 片芩酒洗 芍藥酒洗 陳皮各半兩
白朮 當歸酒洗各一兩 天麻酒洗七錢半
蒼耳子七錢五分 黃蘗酒洗 粉草酒洗
防風各三錢
右㕮咀煎服四五次服之服過睡片時

如聖膏
治小兒頭上軟瘍
菜油一兩 黃蠟半兩 歷青一錢 黃丹半錢
羊筒骨內髓一箇
右一處熬成膏於紙上攤貼患處上用冷鐵一片
於瘡口壓定四面針破如膿出不快以紙撚任之
熬藥不得把銅鐵器

仙方活命飲
治小兒頭患軟瘍寒熱作痛
金銀花 陳皮去白各三錢 皂角刺炒二錢
穿山甲蛤粉同炒 防風 沒藥 白芷 乳香
當歸 貝母 天花粉 甘草節各一錢
右末服五錢酒煎服嬰兒每服一兩母子同服爲
末酒調服亦可

毒在表者加麻黃散汗之
毒在內者加大黃下之當臨時制宜此解毒回生
起死之良劑

苦參丸
治小兒生後其頭漸大頭皮赤光眼小此腦疳也
苦參一兩 白蒺藜 胡麻 牛蒡子各半兩
甘草二錢五分
右爲末酒調麵爲丸竹葉湯下

調元湯 萬氏方下同
治小兒初生後頭骨漸開此胎氣怯弱腎不足也
黃芪蜜炙 人參各等分 炙甘草減半
右水煎服無時

勻氣散
治小兒顖填堅硬屬陰證
木香 青皮 山楂肉各等分
右爲末每服一錢甘草湯調服

肥兒丸
治小兒脾胃虛弱飲食減少脾主肌肉肉去皮薄
顖門露見非陷也
人參 白朮 白茯苓 山藥蒸 白蓮肉
當歸身酒洗各五錢 陳皮二錢 青皮 木香
砂仁 史君子 神麯各三錢 炙甘草 桔梗
麥芽各二錢
右爲末荷葉浸水煮粳米粉糊丸麻子大每服十
五九二十五九三十五九四十五九至五十丸米
飲送下

參苓白朮散 薛氏醫案下同
治小兒脾胃虛弱顖門露見
白扁豆二兩半薑汁浸去皮微炒 人參 白茯
白朮 炙草 山藥各三兩半 蓮肉 桔梗炒
薏苡仁 砂仁各二兩
右爲末每服一錢棗湯調下

十全大補湯
治小兒腎虛顖解元氣不足
白茯苓 人參 當歸 白朮 黃芪炒 川芎
白芍炒 肉桂 熟地黃 甘草炒各等分
右三五錢薑棗水煎服

通聖散 證治準繩
治小兒髓熱解顱瘡瘡入眼生腎膜
白菊花如無甘菊代之然不如白菊花 菉豆皮
穀精草去根各一兩
右爲細末每服一大錢柿乾一個米泔水一盞同
煎候米泔盡只將柿乾去核食之不拘時日三枚
日近者五七日遠者半月取效

封顖法 萬氏方下同
防風 南星 白斂 白芨各等分
右爲末用猪夾車髓搗和封顖上一日三易之

益黃散 衛生總微下同
治小兒顖腫硬及陷脾經虛熱目內色微黃
陳皮一兩 青皮 訶子肉 甘草炙各五錢
丁香二錢
右爲末每服二錢水一盞煎六分食前溫服萬氏
補劑以異功散代之

元精石散

治小兒頭瘡

太陰元精石煅　寒水石各一分研　輕粉　麝香各少許

右爲細末先以淡漿洗去瘡痂拭乾油調藥塗之甚者不過再

瓜蔞散

治證同前

瓜蔞一枚用鹽豉一合入瓜蔞中合井燒灰研末

竈下黃土一分　臘粉一分

右爲末入麝香一字拌勻每用少許油調塗之濕者乾摻

淡豉散

治證同上

淡豉炒黑焦乾　綠礬各一兩　臘粉二錢

右上二味先研末入粉和研勻先以桑柴灰淋汁熱洗瘡淨用甘草末摻瘡上後以生油調藥塗之濕者乾摻

黃連散

治證同上

黃連去鬚二兩　胡粉一兩

右爲細末先洗去瘡痂拭乾傅之即瘥再發再用

胡粉膏（千金方下同）

治頭瘡久不瘥經隔年歲

松脂　苦參　黃連去鬚各一兩半　生大黃

胡粉　黃芩　水銀各一兩　白礬枯半兩

蛇牀子三分

右爲細末以臘月猪脂和研至不見水銀星爲度傅之

又方

治頭瘡久不瘥

胡桃和皮燈上燒過存性用椀盖出火毒研末

臘粉少許

右爲細末以生油調塗仍剃去瘡上髮塗之只一二次

荳豉丹（張渙方）

治髮不生

當歸　生地　赤芍各一兩已上搗羅爲末次用

荳豉一合炒　胡粉半兩細研

右件同研勻煉蜜和丸如黍米大每服十粒煎黑豆湯下衆化塗搽頭上無妨量兒大小加減

肉蔻蒼丸（稽效方）

治髮不生

當歸　生地黃　肉蔻蓉　白芍藥各一兩

胡粉五錢

右爲末蜜丸黍米大每十九黑豆湯吞下衆磨化二三十丸塗搽頭上

故紙丸（證治準繩下同）

安師傳治小兒髮黃極妙

破故紙不計多少銀石器中慢火炒熱

右爲細末用地黃汁煎成膏和爲丸菉豆大每服十五二十丸鹽湯送下食前

集聖丸

治小兒大病後其髮成穗或稀少者乃津液不足疳勞之外候也

蘆薈　五靈脂　夜明砂　砂仁　陳皮　青皮

莪朮煨　史君子　木香　當歸　川芎各二錢

黃連　乾蟾炙焦各三錢

用猪膽一個取汁和藥粟米糊丸黍米大服三十丸米飲下

癩頭方（平治會粹）

松樹厚皮燒灰　白膠香熬沸傾石上二兩

黃丹研飛　軟石膏各一兩　黃連　大黃

白礬火飛各五錢　輕粉四盞

右極細末熬熟油調敷瘡上須先洗了瘡疣數乃佳

聖惠神效生髮黑豆膏（證治準繩下同）

治小兒腦疳頭髮連根作穗子禿落不生兼瘡白禿髮不生者並用生髮

黑豆　荳豉各三合　訶黎勒皮一兩

右件藥搗羅爲末以水拌令勻內於竹筒中以亂髮塞口用糖灰內煨取油貯於瓷器中先以米泔皂莢湯洗頭拭乾塗之日再用十日髮生

又方

葛根末　猪脂　羊脂各二兩

右件藥入銚子內以慢火熬成膏收於瓷合中每取一錢塗摩頭上日再用不過五七度效

香薷煎

治小兒白禿不生髮燥痛

陳香薷二兩　胡粉一兩　猪脂半兩

右件藥以水一大盞煎香薷取汁三分去滓入胡

粉猪脂相和令勻塗於頭上日再用之

腦疳方（薛氏醫按）

治頭皮光急髮結如穗滿頭併瘡胃熱如火

川芎　片芩俱酒製　白芍　陳皮去白各半兩

白朮酒製　當歸酒製各一兩半　天麻酒製

蒼朮　蒼耳各七錢　黃蘗酒製　甘草各四錢

防風三錢

右爲末量兒大小加減調服日四五次服後睡片時乳母宜服邊源解毒湯

邊源解毒湯（簡氏方）

黃芩　蒼朮　蔓荊子　何首烏俱須酒製

白羌黎酒浸炒去刺　胡麻炒　升麻酒洗

右共爲末酒糊丸麻子大服三五十丸防風湯下

外用敷藥

腦疳敷藥

松樹厚皮燒灰　白膠香各二兩　黃丹飛一兩

枯白礬五錢　黃芩　黃連　大黃各七錢

蛇牀子　寒水石各三錢　無名異少許　木香

輕粉各少許

右爲末熬熟油調敷瘡上先用椒鹽湯洗去瘡痂敷之佳又治白禿

大蕪荑湯（證治準繩下同）

治小兒脾疳發熱髮黃脫落面黑生瘡

蕪荑　山梔炒黑各五分　當歸　白朮土炒

赤茯苓各四分　柴胡　麻黃　羌活各三分

防風　黃連　黃蘗　炙甘草各二分

右作二劑水煎服

四味肥兒丸

治小兒食積五疳目生雲翳髮稀成穗或白禿瘡疥及食積內熱致耳聾聤虛鳴等證

蕪荑　神麴　麥芽俱炒　黃連各等分

右爲末猪胆汁丸黍米大每服二三十丸木通煎湯下

七味肥兒丸

治小兒食積五疳髮稀成穗發熱作渴等證

黃連　神麴　木香各一兩半　檳榔二十個

史君子酒浸　麥芽炒各四兩　肉荳蔻炮二兩

麪糊丸麻子大每服三五十丸米飲下良久用五味異功散一服以助胃氣

治面瘡出黃水方（薛氏醫按下同）

豆豉一合炒焦黑　黃蘗一兩剉

右爲細末每用先以熱灰汁洗瘡淨拭乾傅之亦治身生如此瘡

治面瘡赤腫瘙痛方

地榆八兩

右細剉水一斗煮至五升去滓適寒溫洗之

五福化毒丹

治胎毒及痘後頭面生瘡頭目腫痛

生地杵膏　熟地自製杵膏　天門冬去心杵膏

麥門冬去心杵膏　元參各三兩　生甘草

甜硝各二兩　青黛一兩五錢

右爲末煉蜜丸如芡實大每服一丸白滾湯化下

甜硝即朴硝以滾湯製過者便是

薛己曰按前證服此而發搐痙喘者皆中氣受傷而變虛熱也急服五味異功散若手足並冷者中氣虛寒也前湯加薑桂多有生者

柴胡清肝散

治小兒肝經風熱致耳聾聤或虛鳴眼睛連劄

柴胡一錢半　黃芩炒　人參　川芎各一錢

山梔炒黑一錢五分　連翹　甘草各五分

桔梗八分

右水煎服

梔子清肝散

一名柴胡梔子散治肝經血燥致耳聾聤虛鳴目內色黃發搐眼眨屬風熱相搏

柴胡　梔子炒　牡丹皮各一錢　茯苓　川芎

芍藥　當歸　牛蒡子炒各七分　甘草三分

右水煎服

九味蘆薈丸

治同上

胡黃連　黃連　白蕪荑　蘆薈　木香　青皮

白雷丸破開赤者不用　鶴虱微炒各半兩

麝香二錢另研

右爲末粟米飯丸菉豆大每服一二十丸米飲下

蘆薈丸（莊氏家傳）

治小兒自胎胎時兩目赤腫或作痒生腎及腎肝疳熱致耳聾聤或虛鳴

蘆薈一錢別研杵或只以皂角水磨　草龍膽一兩

洗淨剉焙乾秤

右件藥一處搗羅爲末用不蛀皂角三挺以水二升揉汁用生絹濾去滓入銀器內慢火熬成膏入

前二味調和得所丸如菜豆大每服三丸至五丸薄荷湯下

清上散 證治準繩下同

治上焦風熱耳出膿汁頭面瘡瘍亦治胎熱眼睛腫赤糞色稠黃肚脹啼哭及身上紅腫

川芎 甘草 北梗 天花粉 乾葛 薄荷葉各等分

右爲末入蜜拌勻白湯下三五七分或一錢仍用艾葉煎濃湯溫浸足底以引其熱下行

當歸蘆薈丸

治肝膽風熱耳中鳴出青膿名曰震耳大便祕小便黃常服宣通血氣調順陰陽

當歸 龍膽草 柴胡各一兩 青黛 膽星 大黃 蘆薈各五錢 麝香五分 梔子仁 黃芩 黃連 黃蘗各一兩 木香二錢五分

右爲末煉蜜丸小豆大每服二十丸薑湯送下

清黃散

治耳出黃膿名曰聤耳內有風熱外爲水濕所干醒久而成

防風 滑石飛各五錢 炙草一錢 藿香葉

酒黃連各二錢 梔子酒炒三錢

右爲末白湯調下二錢食後服

清白散

治肺熱痰火上壅耳出白膿名曰纏耳兼治咳嗽

桑皮蜜炒 骨皮 寒水石各三錢 甘草一錢 貝母二錢 天花粉 酒芩 天門冬各一錢半

右爲末以蜜水調食後服或通草煎湯下尤妙

交感丹

治耳中忽臭名曰缶耳或怒氣上逆上下不得宣通遂成聾聵

香附子童便浸透炒三錢 茯神 黃連各二錢 桂心 甘菊花各一錢

右爲末每服一錢五分燈心湯下

禹餘糧丸

治聤耳出膿水

禹餘糧煅醋焠七次 海螵蛸去背骨 百草霜 伏龍肝各二錢五分 大附子去皮臍生用一枚

右爲末以綿裹如豆納眼按大安耳內日再易之如不瘥乃有蟲也

龍骨散

治諸膿耳

枯礬 龍骨 胭脂脚各一錢 麝香少許

右爲細末以綿裹杖子拭去耳中膿再吹一字入耳中日再加海螵蛸一錢尤妙

羊角散

治耳內膿汁不乾

山羊角燒存性

右爲末每吹二三分入內一日二次三日全瘳

滋陰地黃丸

治耳虛鳴膿汁不乾腎陰不足

熟地黃一兩 白茯苓 牡丹皮 甘菊花 何首烏黑豆拌蒸三次 黃蘗酒炒各四錢 山茱萸五錢

右爲末煉蜜丸梧子大每服三五十九

白敝散

治小兒凍耳成瘡或痒或痛黃蘗 白敝各半兩

右爲末先以湯洗瘡後用生油調塗 蔓荊子湯

治內熱耳出膿汁

升麻 木通 麥冬 赤芍 生地黃 前胡 甘菊 甘草 桑皮 赤茯 蔓荊子各等分

右用薑棗水煎食後服

白龍散

一名香礬散治小兒腎臟盛而有熱熱氣上衝於耳津液結滯則生膿汁有因沐浴水入耳內水濕停積搏於血氣蘊積成熱亦令耳膿汁出謂之聤耳久而不愈則成聾

枯白礬 黃丹 龍骨各半兩 麝香一錢

右研極細先以綿杖子撚盡耳內膿水用藥一字分摻兩耳日二次勿令風入

加味逍遙散 薛氏醫按下同

治小兒肝經怒火致耳聾聵

當歸 甘草炙 芍藥酒炒 茯苓 白朮炒 柴胡各一錢 牡丹皮 山梔炒各七分

右水煎服

加味清胃散

治乳母膏粱積熱致兒耳聾聵虛鳴

升麻五分 生地黃 牡丹皮 黃連炒 當歸 柴胡 山梔各三分

右水煎服

加味歸脾湯
治脾經鬱結致耳爲患
人參　黃芪　茯神　甘草　白朮炒　遠志
棗仁　龍眼肉　當歸　丹皮　山梔炒各一錢
木香五分
右水煎服

烏麝湯（衛生總微下同）
治小兒風邪入耳致令耳聾
大川烏頭一個重二錢以上者以猪脂油煎令燥烈剉了面上塊子只刮皮盡切碎杵羅爲細末
通草半兩薄切作片子片片相似以糯米粉作稀糊拌勻焙乾杵羅爲細末
右二味入麝香末少許研勻每服一錢水一小盞入薄荷二葉棗一枚煎數沸放溫服或只以溫酒調服

菖蒲圓
治耳聾
菖蒲一寸　巴豆一粒去皮心
右二物合杵爲劑分作七丸用一粒綿裹塞耳中一日一易

又
菖蒲末一分　杏仁半兩湯浸去皮尖雙仁者
右二件合杵如泥每服用　麻子許綿子裹內耳中一日一易

蕓麻膏
治耳聾
蕓麻子十枚去皮　棗肉七枚
右同研爲膏每用糞核許綿裹內耳一日一易

龍朱散
治耳中癰及生瘡出膿汁或只痒痛虛鳴應耳中一切諸病悉主之
龍腦一字　朱砂一錢　竹箭幹內蚰蜒糞三錢
坯子胭脂半錢　麝香一字
右各研細末和勻以幹耳子挑藥入病耳中如有膿水者先以新綿撚子纏之淨盡方傾入藥每夜臨臥時一次

龍黃散（聖惠方同下同）
治小兒聤耳汁出不止
枯礬　龍骨煅　黃丹炒各半兩　麝香研一錢
右同研細先以綿杖子撚却耳中膿水用一字摻入耳內但用之勿令風入

乾胭脂膏
治小兒聤耳常出膿水不止
乾胭脂　白龍骨　白礬煅　白石脂研各等分
右研如粉用猪肉和丸棗核大以綿裹一丸納耳中日三換之

金箔散
枯礬　胭脂各半兩　金箔
右同研令勻爲細末日三四度摻少許于耳內

龍骨散
治膿耳
明礬煅　龍骨煅各二錢　黃丹炒一錢半
胭脂一錢　麝香一字研
右爲細末先以綿撚拭去膿汁次以鵝毛管吹藥入耳本方加海螵蛸末尤妙

小兒風熱兩耳聾鳴方（聖惠方）
遠志去心　甘草炙微赤　柴胡　菖蒲各一分
磁石三分搗碎水淘去赤汁　麥冬去心焙半兩
右搗細羅爲散每服葱白湯調下半錢日二服量兒大小以意加減

通鳴散（張渙方）
治耳聾
菖蒲一寸九節者　遠志去心各一兩　柴胡
麥冬門去心　防風各半兩　細辛去土淨
甜葶藶各一分已上搗羅並爲極細末次入
磁石一分如前製　杏仁十四個湯浸去皮尖研
右件都研勻每服半錢煎葱白湯調下日二乳後

細辛膏（聖惠方下同）
治小兒耳聾或因腦熱或因水入或因吹著並宜用此
細辛　防風　川大黃微炒　黃芩各一分
川椒十粒　蠟半兩
右件藥細剉用清麻油三合煎藥紫色濾過下蠟候消爲膏每日三度用一大豆大點於耳中

小兒耳聾不差方
甜葶藶　杏仁湯浸去皮　鹽各等分
右件藥搗研如膏以少許猪脂和合煎令稠以綿裹如棗核大塞耳中日一易之

又方
松脂　菖蒲末　烏油麻各半兩
右件藥相和搗熟綿裹如一紅豆大塞耳日一易

又方

芥子搗令爛

右以人乳和綿裹少許塞耳中日一易之

麝香散 證治準繩下同

治沉耳

麝香少許 白礬一錢火煅 五倍子二錢

右件爲末紙撚子點入耳中少許

菖烏散

治小兒耳自鳴日夜不止

菖蒲 烏豆炒各四分

右爲末綿裹內耳中日再

紅玉散 田氏方

治小兒聤耳

枯礬 麝香 乾胭脂各等分

右爲末研勻先以綿杖子撚膿淨摻入少許

龍黃散 湯氏方

治聤耳

枯礬 龍骨 黃丹各半兩 麝香 黃蘗各一錢

右爲末膿淨摻耳內

礬香散 衛生總微下同

治聤耳

白礬一兩燒灰 蛇牀子一分爲末

右相和入麝香末五分同研細每用一字摻入病耳

麝香散

治聤耳

蜘蛛一個 胭脂半錢 麝香半字

右件極乾研勻細末每用半斡耳許以鵝毛管吹入耳

箭蚛散

治聤耳

凌霄花 海螵蛸 胭脂 箭竹內蛀糞各二錢

麝香一字研後入

右爲細末拌勻每用時先以綿撚子搌耳中膿盡乃以紙撚蘸藥入耳中日三

紅綿散

治聤耳

坯子胭脂三錢 信砒一錢 麝香一字匕

右爲末拌勻以柳絮滾和勻每用黃米許摻入耳中

如意耳生瘡膿不差者依此傳瘡上紙片封之妙

油引散

治聤耳

石燕雌雄一對用磚墨一盆爐炭火煅白色爲末

虢丹飛等分 腻粉 麝香各少許量入

右同研勻先以綿撚子搌耳中膿汁盡時側臥摻藥一字許入耳中以油一滴引下立效

綿裹散

治聤耳

桂心一分 青羊屎一分炒令轉色

右同末每用一字綿裹塞耳中

紅藍花散 張涘方

治聤耳久不瘥

紅藍花洗焙乾 黃蘗剉各一兩 烏魚骨

枯黃芩各半兩已上四味搗羅共爲細末次用

雄黃水磨細研半兩 麝香一分研細

右件都研勻細以綿纏搌藥塞耳中日再換

治耳疼痛方 千金翼

附子炮去皮 菖蒲

右二味等分裹塞之

還明飲 袖珍方

治小兒每至夜不見物名曰雀眼

夜明砂 井泉砂 穀精草 蛤粉各等分

右爲末煎黃蠟丸雞頭肉大三歲兒一丸猪肝一片切開置藥於內麻皮扎定砂鍋內煮熟先熏眼後食之

合明散 原機啓微下同

治小兒雀目至夜不見物

楮實 覆盆酒浸 車前酒蒸 石斛各一兩

沈香另研 青鹽別研各半兩

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服七十丸空心鹽湯下

養肝丸

治小兒肝血不足眼目昏花或生瞖淚

當歸酒浸 車前酒蒸焙 防風 白芍藥

蒺藜 熟地黃酒蒸杵膏 川芎 楮實各等分

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服七十丸淡湯下不拘時候

車前子散

治小兒肝經積熱上攻眼目生瞖血灌瞳人羞明多瞖

蘹蒙花　羌活　菊花　大粉草　白蒺藜
草決明　車前子　黃芩　龍膽草洗淨炒各等分
右爲末每服二錢食後飯湯調服

三味蘆薈丸

治小兒黑水凝瞖內障不痛不痒微有頭旋脹澀者
蘆薈　甘草各一錢　羚羊角蜜炙二兩
右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大空心茶清下十丸

通頂散

治小兒腦熱腦枕骨疼閉目不開或頭風痛攢眉啼哭并赤目
川芎　薄荷各半兩　茵陳　甘草各四錢
矾硝三錢甜硝亦可
右爲末用少許吹鼻中即效
如要嚏噴加躑躅花一錢只用矾硝吹鼻亦止
一方用好坯臙脂子水調塗眼眶

生犀散

治小兒心經虛熱目內淡紅
犀角二錢　骨皮　赤芍　柴胡　乾葛各一兩
甘草半兩
右爲末每服二三錢水煎服入犀角食後服

瀉黃散

治小兒脾胃實熱眼目作痛目內色黃鼻色發赤衄血
藿香七錢　山梔一兩　防風四兩　石膏半兩
甘草七錢五分
右用蜜酒拌微炒爲末每服二三錢水煎服

益氣聰明湯 丹溪

治小兒眼目生瞖睫閉不開眵淚如糊久而膿流遂至損目
人參　黃芪各一錢　升麻　葛根各六分
白芍藥　黃蘗酒炒各二分　蔓荊子三分
甘草炙一錢二分
右水煎臨睡熱服五更再煎服

導赤散 嬰童百問下同

治心驚內虛邪熱
生地黃　生甘草　木通各等分
右剉散竹葉煎加黃芩赤芍藥羌活燈心煎

瀉青丸

治小兒赤眼多淚睛疼心躁并消熱瞖急驚發搐等證
當歸　川芎　防風　膽草　大黃　羌活
山梔仁各等分
右爲末煉蜜丸如芡實大每服一丸沙糖湯下
一方加甘草赤芍藥

草龍膽散 幼科全書下同

治小兒暴赤火眼晝夜澀痛作腫淚多
草龍膽　木賊　荊芥穗　甘菊花　防風
草決明半生半炒　甘草各等分
每服二錢煎溫服
痛甚加羌活乳香

明目飲

治小兒脾經蘊熱肝受風邪致兩目羞明經久不愈
山梔仁　香附子淨各一兩　夏枯草半兩
每服二錢入蜜一匙水煎服

石楠散 普濟方

治小兒誤跌或打著頭腦受驚肝系受風致瞳人不正觀東則見西觀西則見東宜此吹鼻通頂
石楠一兩　藜蘆三分　瓜蔕五七個
右爲末每吹少許入鼻一日三度內服牛黃平肝藥

五苓散 全幼心鑑

治小兒胃氣素虛脾氣實甚眼泡赤腫羞澀不開
澤瀉　猪苓去皮　白茯苓　白朮壁土炒
官桂去皮各等分
右爲末每服一錢溫湯調不拘時服
如口渴燥新水化下

殺疳散 龍木論

治小兒疳眼腫痛淚出難開臉硬白睛遮瞞怕日合面臥不喜擡頭
防風　龍腦　牡蠣煅粉　白芷　細辛去土
五味子各二兩
右爲末每服一錢食後粥飲調下

瀉青散 幼科全書下同

淺淡者補之黃者脾熱
藿香七錢　山梔一兩　石膏五錢　甘草五錢
防風四兩
右剉散同蜜酒微炒每服二錢水煎服不拘時

生熟地黃散

治小兒疳蝕眼患閉合不開羞明怕日及內障

生地黃　熟地黃　麥冬去心各一兩　當歸　枳殼麩炒　炙草　防風　杏仁去皮尖炒赤　赤芍各半兩

右剉每服二錢黑豆七粒煎豆熟爲度去滓服

地黃散

治小兒心肝蘊熱目赤腫疼內生赤脈或白翳遮睛四邊散漫者猶易治若暴遮黑睛多致失明宜速用此方亦治瘡疹入眼

生地黃　熟地黃　蟬蛻去頭足　木賊草　穀精草　生犀末　當歸各二錢半　防風　羌活　白蒺藜去刺　生甘草　沙苑蒺藜　木通各一錢半　黃連去鬚　大黃煨各一錢

元參半錢

右爲細末每服一字或半錢量大小加減煎羊肝湯食後調服日三忌口將息亦治大人

小防風湯

治小兒熱毒眼患

大黃蒸　山梔子　甘草炙　防風　赤芍藥　當歸洗　羌活各等分

右剉每服二錢水一盞煎五分去滓通口溫服

小流氣飲

治小兒風毒眼患

蟬蛻去足　炙草　羌活　天麻　當歸　防風　赤芍　大黃　薄荷　杏仁各等分

右剉散每服二錢水煎去滓食後通口服

小菊花膏

治小兒積毒眼患

黃連　黃芩　大黃　菊花　蕎木米泔浸　羌活　荊芥穗　防風各等分

右爲細末蜜丸芡實大每服一丸白滾湯化下

決明散

治小兒瘴疹入眼白睛赤

花粉半兩　決明子　赤芍　炙草各二錢半

右爲細末每服半錢蜜水調下日三一方去花粉

蘘蒙花散

治小兒瘴疹并諸毒入眼

蘘蒙花一錢　青葙子　決明子　車前子各五分

右末用羊肝一片破開縫三條摻藥合勻紮緊以濕紙七重裹炭火中煨熟空心食之效如神

犀角散

治脾火眼疼

犀角一兩　射干　龍膽草　黃芩各半兩　釣藤鉤七錢半　人參去蘆二兩　赤茯苓　甘草各二錢半

右剉散每服二錢水一盞煎至五分食後去滓溫服

牛黃丸

治肝受驚風遂使眼目疼痛

牛黃　白附子　肉桂　全蠍去毒　川芎　石膏各二錢半　白芷　藿香各半兩　辰砂　麝香各少許

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大臨臥時薄荷湯下三丸乳母忌食辛辣熱物並濕麵等物

導赤散湯氏方

治心熱小便赤眼目赤腫

赤芍　羌活　防風各半兩　大黃　甘草各一錢

右爲末燈心黑豆同煎食後服

黃肝丸

治肝眼腎膜羞明大人雀目甚效

夜明砂　青蛤粉　穀精草各一兩

右爲細末每服一錢五七歲以上二錢以豬肝批開摻藥在內攤勻麻綿縛定以米泔水半碗煮肝熟取出肝湯傾碗內熏眼候湯溫分肝作三服嚼訖就用肝湯下一日三服大人雀目空心服

東垣人參補胃湯

治勞役飲食不節內障眼痛神效

黃芪根　人參各一兩　炙草八錢　蔓荊子炒　白芍炒　黃蘗酒拌炒四次各三錢

右每服二三錢水煎稍熱臨臥服

千金治雀盲方

地膚子五兩　決明子一升

右爲末以米飲和丸每服二三十丸

瀉熱黃連湯薛氏醫案下同

治內障有胗淚昏眶

黃芩　黃連　生地黃並酒洗　柴胡各一兩　升麻五錢　龍膽草三錢

右每服一錢水煎午前服

本事方

治小兒赤熱腫眼

大黃　白礬各等分

右爲末冷水調作餅子貼眼立效

廣大重明湯 [illegible]

治兩瞼或兩眥赤爛熱腫疼痛及眼泡痒極抓之至破爛赤腫眼楞生瘡痂目多眵淚癮澀難開

草龍膽　防風　生甘草根　細辛苗葉各一錢

右水一碗半煎龍膽至七分入餘藥再煎至半碗熱洗日五七次洗畢合眼須臾瘥

助陽和血補氣湯

治發後熱壅白睛紅多眵淚癮澀此過服涼藥而眞氣不能通九竅也

防風　升麻各七分　黃芪一錢　蔓荊子

白芷各二分　炙草　柴胡　歸身酒洗各五分

右水一鍾煎至半鍾熱服

治眼赤暴發腫方 [illegible]

防風　羌活　黃芩炒　黃連炒各等分

右每服一錢水煎服

如大便祕加大黃二分

痛甚加川歸地黃各二分

煩躁不得臥加梔子仁三分

助陽活血湯

治眼病之後猶有上熱白睛赤色癮澀難開而多眵淚等證

蔓荊子二分　白芷三分　柴胡　黃芪　防風

甘草炙　當歸酒洗各五分　升麻七分

右水煎服

芍藥清肝散

治眵多眊燥緊澀羞明赤脈貫睛臟腑祕結者

白朮　甘草　川芎　防風　荊芥　桔梗

羌活各三分　芍藥　柴胡　前胡　薄荷

黃芩各二分半　山梔仁炒　知母　滑石

石膏各二分　大黃四分　芒硝二分半

右水煎服

黃連天花粉丸

治證同上

黃連　菊花　川芎　薄荷各一兩　連蘊

黃芩　花粉　梔子各四錢　黃蘗六錢

右爲末蜜丸桐子大每服量兒大小加減茶湯下

連蘊飲子

治目赤癮澀緊小久視昏花迎風自淚等證

蔓荊子　生甘草　連蘊　生地黃　當歸

紅葵花　人參各三分　黃芪　防風　羌活

黃芩各五分　升麻一錢　柴胡二分

右水煎服

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百三十三卷目錄
醫部彙考四百十三
小兒頭面耳目鼻病門三
方二 保命點眼藥 千金補肝散 本事方 羚羊角散 東垣羌活退腎湯 濕熱五秀重明丸 中和養胃湯 柴胡復生湯 黃連羊肝丸 小柴胡湯 百解散 退翳丸 神芎丸 涼膈散 清胃散 鴻膏散 羚羊角丸 龍麝湯 薛氏碼聖退雲散 猪膽黃連丸 又方 龍麝湯 肝風 洗心散 洗肝散 四順飲 清涼膏 元精石散 羌活退腎湯 決明丸 千金傳水散 本事方 蒺藜散 柴胡散 五退散 羚羊肝散 蟬菊散 秦皮散 黃蘗膏 海藏地黃飲子 世傳地黃丸 世傳茶水散 猪肺甲散 又方 九味蘆薈丸 蛤粉散 二物散 通頂散 九傳散 三解散 金箔散 黃連膏 清涼膏 附塵膏 連翹飲子 龍麝飲子 射香丸 復明散 山茱萸丸 附車丸 井泉石散 真珠膏 牛黃膏 貼頑通關散 黃芩湯 薄荷湯 消風散 通關散 辛夷膏 芎藭膏 犀角地黃湯 地黃散 六君子湯 四物湯 五痺散 蒺藜芍藥湯 麥門冬飲子 木通散 犀角升麻散 清肺膏 通竅散 又方 麥門冬丸 龍腦散 雄黃散 菊花散 芎藭散

藝術典第四百三十三卷
醫部彙考四百十三
小兒頭面耳目鼻病門三
方二
保命點眼藥 薛氏醫案下同
除昏退翳截赤定痛
當歸 黃連各二錢 防風二錢半 細辛五分
甘草一錢
右水一大碗文武火熬滴水中不散爲度入熟蜜少許點用

千金補肝散
治目失明
青羊肝一具去膜薄切新瓦炙乾 決明子錢半
藜香一合熬令香
右爲末每服方寸匕日二服久而有驗

本事方
治太陽寒水陷腎膜遮睛
防風 白蒺藜各一兩 羌活兩半 甘菊三兩
右爲末每服二錢入鹽少許百沸湯點服

保命羚羊角散
治冰腎久不去
羚羊角 升麻 細辛各等分 甘草減半
右爲末一半蜜丸桐子大每服五七十丸一半汁水煎吞送丸子煩發陷腎亦羚羊角散之類用之在人消息若陰虛有熱者兼服神仙退雲丸

東垣補陽湯
治陽不勝其陰乃陰盛陽虛則九竅不通令青白腎見於大背乃足太陽少陰經中鬱遏厥陰肝經之陽氣不得上通於目故青腎內阻也當於太陽少陰經中是九泉之下以益肝中陽氣衝天上行此乃先補其陽後於足太陰標中瀉足厥陰之火下伏於陽中內經曰陰盛陽虛則當先補其陽後瀉其陰每日空心服升陽湯臨臥服瀉陰丸須預期調養體氣和平天氣晴明服之補其陽使上升通於肝經之末利空竅於目矣
羌活 獨活 當歸身酒洗焙乾 甘草梢
熟地黃 人參 黃芪 白朮各一兩 澤瀉 橘紅各半兩 生地 白茯 知母炒黃各三錢
柴胡二兩 防風 白芍各五錢 肉桂一錢
右每服五錢水煎空心服候藥力行盡方可飲食也

東垣羌活退腎湯
柴胡 甘草 黃芪各三錢 羌活 黃連
五味子 升麻 當歸身各二錢 防風一錢半
黃芩 黃蘗酒浸 芍藥 草龍胆酒洗各五錢
石膏二錢五分
右分二服水煎入酒少許臨臥熱服忌言語

謙甫五秀重明丸
治眼腎膜遮睛隱澀昏花常服清利頭目
甘菊五百朵 荊芥五百穗 木賊去節五百根
楮實五百枚
右爲末蜜丸桐子大每服五十丸白湯化下

冲和養胃湯
治內瘴初起視覺微昏空中有黑花神水變淡綠色天則視岐視則成二神水變淡白色久則不視
神水變純白色
柴胡七錢 人參 當歸 炙甘草 乾生薑
升麻 葛根 白朮 羌活各一兩 防風五錢
黃芪一兩五錢 白茯苓三錢 白芍藥六錢
五味子二錢
右每服二錢水煎服

滋陰腎氣丸
治神水寬大漸散昏如霧露中行漸視空中有黑

花視物二體久則光不收及瘴神水淡白色者
熟地黃三兩　當歸尾　牡丹皮　五味子
乾山藥　柴胡各五錢　茯苓　澤瀉各二錢半
生地黃酒炒四兩
右爲末蜜丸桐子大辰砂爲衣每服十丸空心滾湯化下

柴胡復生湯
治紅赤羞明淚多眵少腦頂沉重睛珠痛應太陽眼睫無力常欲垂閉久視則酸痛醫陷下者
藁本　蔓荊子　川芎藭　川羌活　川獨活
白芷各二分半　白芍藥炒　炙甘草　薄荷
桔梗各四分　五味子十二粒杵　蒼朮　茯苓
黃芩炒各五分　柴胡六分
右每服二錢水煎食後服

黃連羊肝丸
治目中赤脉洪甚眵
黃連爲末　白羖羊肝一具
先以羊肝竹刀刮下如糊除去筋膜再擂細入黃連丸桐子大每服十丸茶清化下

小柴胡湯
治小兒兩目暴赤腫痛晝夜苦甚
柴胡　人參　黃芩　甘草炙　半夏各等分
右藥量兒大小加減水煎服
久則昏矇去半夏加大黃竹葉生地黃

百解散 證治準繩下同
治小兒兩目羞明眼泡浮腫微有紫色大腑閉或流利小便澀或通順
乾葛　升麻　赤芍藥　黃芩　麻黃酒製
薄桂去粗皮　甘草各等分
右碎每服二錢水一盞煎七分無時溫服
風熱甚加薄荷同煎

退醫丸
治同上
黑參　防風各一兩　北細辛　石決明研
車前各半兩　桔梗　黃芩各兩半
右爲末煉蜜爲丸梧桐子大空心茶下十丸

神芎丸
治小兒兩目赤腫發痛不止
大黃　黃芩各二兩　牽牛一兩　滑石四兩
黃連　薄荷　川芎各半兩
右爲末水糊丸桐子大每服三四丸溫水下

涼膈散
治小兒疳澀眼數日不開
大黃　砂硝　甘草炙各一兩　連翹二兩
梔子　黃芩　薄荷各半兩
右剉散每服二錢水一盞入竹葉七個蜜少許煎四分食後溫服大小加減

清胃散 醫學入門
治小兒風浴爛眼膈有積熱
升麻　生地黃　丹皮　黃連炒　當歸各等分
右水煎服加柴胡山梔即加味清胃散

瀉肝散 [illegible]
治同上
木賊　葳靈仙　紫參　菊花　羌活　蟬蛻
生大黃　炙甘草　石決明各等分　腦子少許
右爲末每用藥二錢豶猪肝一兩批開去膜摻藥在內線纏米泔煮熟嚼下

蕤仁膏 證治準繩下同
蕤仁四十九粒去皮出油　腦子少許
右研成膏用燈心點少許

靈苑羚羊角丸
治小兒肝肺壅熱眼生努肉赤脉澀痛及赤眼障醫睛疼痒痛羞明及風疳爍陽眼神效
羚羊角屑曬乾爲末　生甘草　白何首烏
瓦松以紗絹內洗去土各一兩　生乾地黃洗
鬱金炮過用地上去火氣各二兩
右六味並細剉曝乾搗羅爲細末煉蜜爲丸如菉豆大每服七丸至十丸

譚氏殊聖退雲散
治小兒疳眼呲哩饒啼不住
草決明　土瓜根　大黃　元參各半兩　炙草
宣連　砱砱石即井泉石各一分
右細爲散每服一錢水一盞煎至七分

猪膽黃連丸 胡氏家傳下同
治小兒疳眼白膜遮睛諸藥不痊者
胡黃連　雄黃細研　夜明砂細研各等分
猪膽數個　麝香少許不入膽煮
右爲末以猪膽汁調藥稀稠得所却入原膽皮內以線緊繫口米泔水煮五七沸取出放冷先以麝香於乳鉢內研細却入藥一處同研不用膽皮只取出藥研細用軟飯爲丸如大麻子大每服十丸

大者加至十五丸米飲吞下
如肝氣盛須用陳米飲下
又方
治小兒肝臟風熱眼中不見物及有汗
石決明　乳香各一分　龍膽二分　大黃煨半兩
右爲末每服二錢用薄荷溫水調下
龍膽瀉肝湯（證治準繩）
治小兒肝經濕熱兩目腫痛作痒
龍膽草酒拌炒黃　澤瀉　車前子　木通
生地黃酒拌　當歸酒拌　山梔　黃芩炒
甘草各三分
右水煎食前服
鎮肝散（衛生總微下同）
治痰熱眼生瞖膜
胡黃連　梔子各一兩　甘草微炙　馬牙硝
青葙子各半兩　眞珠　牛黃各一分俱另研
右爲末拌勻每服一錢水八分入荊芥薄荷各少
許煎至半盞去滓溫服食後
洗心散
治心臟邪熱目赤腫痛
麻黃一兩去根　煨大黃　荊芥穗各一兩半
生甘草半兩
右爲細末每服半錢或一字蜜水調下
洗肝散
治三焦壅熱眼目赤腫隱澀多淚
芍藥一分　羌活半分　防風并椏枝一分
大黃　甘草各半分

右爲細末嬰小一字二三歲半錢大者一錢水半
盞入燈心黑豆各少許煎數沸食後放冷服須銀
石沙銚中煎仍與四順散間服并用清涼膏貼太
陽穴
四順散
治眼目赤腫
當歸去蘆酒洗焙　赤芍藥　大黃紙裹煨
甘草炙各等分
右爲末每服一錢水一盞煎至半盞去渣溫服更
量大小加減無時
清涼膏
治眼赤腫痛貼太陽穴
芙蓉葉立秋日已後取陰乾爲末
右每一字或半錢井花水調貼太陽穴
元精石散
治眼生赤脈
元精石一兩　甘草半兩
右爲細末每服半錢竹葉湯調下
羌菊散
治眼生浮瞖障膜
羌活　菊花揀淨半兩　防風并椏枝各一分
山梔子去殼二分炒　甘草一分半炒
白蒺藜炒去刺半兩
右爲末每服半錢或一錢蜜湯調日三與決明丸
間服
決明丸
治同上

決明子揀淨　車前子　菊花揀淨　川芎
宣連　當歸洗淨各一分　大黃　黃芩各半分
右爲細末煉蜜和丸麻子大每五歲下三五丸大
者七八丸煎桑枝湯或麥門冬湯送下
千金僊术散
治氣障眼又治肝熱目赤生病
蒼术四兩米泔水浸七日逐日換泔至日足取出刮
去黑皮細切入青鹽末一兩同炒黃色去鹽
木賊二兩童便浸一宿水淘淨焙乾
右二味同爲細末每用米飲調下一錢服之甚效
一方有甘草一兩
本事方
治小兒赤熱腫眼
大黃　白礬各等分
右爲末同冷水調作罨子貼眼立效
苽蔕散（儒門事親下同）
治目赤多淚服此散加鬱金上涌下瀉自愈
苽蔕　赤小豆各七十五個　人參半兩去蘆
甘草半兩或二錢五分
右爲細末每服一錢或半錢或二錢量兒大小加
減用之空心薑汁調下服之
蒺藜散
治小兒斑瘡入眼
麩炒蒺藜炙甘草羌活防風等分搗每服二錢漿水
下撥雲見日直到老
牛黃丸（人門）
治小兒通睛

犀角屑二錢　牛黃一錢　金箔　銀箔各五片
甘草二錢半
右爲末蜜丸菉豆大每七丸薄荷湯吞下
龍腦膏 醫林
治小兒胎風赤爛
龍腦一錢　蕤仁泥二錢半　杏仁七個爲泥
右入人乳研爲膏點之
五退散 入門
治脾受風毒倒睫拳毛刺痛
穿山甲炒　川烏炮　甘草炙各五錢　蟬退
蠶退　蛇退酥煮　猪蹄退炒　荆芥穗各二錢半
右爲末每二錢鹽湯調下食後服
選奇湯 回春
治小兒赤脉瞖物從上至下
羌活　防風　半夏製各二錢　酒片芩一錢半
甘草一錢
右剉作一貼水煎服
博金散 衛生總微下同
治眼赤痛不可忍
白藥子半兩　黃芩錢半
右爲末每用一字沸湯點洗之
洗肝明目散
治瘡後目疾
當歸　羌活　柴胡　蔷薇花　川芎　防風
木賊　山梔　龍膽草各等分
右爲末每服一錢淡沙糖水調服
羊肝散
治瘡毒入眼或無辜疳氣入眼
蔷薇花二錢　青葙子　決明子　車前炒各一錢
右爲末用羊肝一大葉薄批摻上濕紙裹煨熟空心食之
蟬菊散
治瘡疹入目或病後生翳障
蟬退去土淨　白菊花各等分
每服一二三錢水八分加蜜少許煎四分食後溫服
秦皮散
治小兒風毒赤眼痛痒澁皺胗淚羞明
秦皮　滑石　黃連各等分
湯泡熱洗日二三次
黃蘗膏 錢氏
用此護眼可免瘡毒入目
黃蘗一兩　綠豆末二兩　生甘草三兩
右爲細末以麻油調成膏用塗耳前眼角目下四五遍若早塗之瘡出必稀若既患眼塗之必減
海藏地黃散 海藏
治小兒心肝壅熱目赤腫痛生赤翳或白膜遮睛
四邊散漫者尤易治若暴遮黑睛者多致失明宜速用此方亦治瘡疹入眼
熟地黃　當歸　黃連　大黃煨　防風　羌活
生犀末　蟬退　木賊　穀精草　沙苑蒺藜
白蒺藜各一錢　生地　木通　甘草各一錢半
元參五分
右爲細末每服一字或五分量兒大小加減煎羊肝湯食後調下日三夜一忌口將息大人亦治
世傳地黃丸 錢氏醫案下同
治腎虛目睛多白
鹿茸五錢，澤瀉　茯苓　山茱萸　熟地黃
牡丹皮　牛膝各一兩
右爲末蜜丸桐子大每服二十丸鹽湯下
世傳蒼术散
治雀目
蒼术四兩米泔浸切片焙
右爲末猪肝二兩批開摻藥在內用麻繫定粟米一合水一碗砂鍋內煮熟熏眼候溫臨臥每服三錢大效
猪蹄甲散 儒門事親下同
治小兒斑瘡入眼
猪懸蹄甲二兩安鍋內鹽泥固濟燒焦爲末
蟬殼去土取末　羚羊角鎊爲細末各一兩
右二味爲末研入羚羊角細末一分拌勻每用一字百日外兒服半錢三歲已上服二錢新水或溫水調下日三四服夜一二服一年之外則難治
又方
透耳藥
朱砂一錢　粉霜八分
右研爲細末水調少許用匙杓頭傾一兩點於耳內後用
白菊花　菉豆皮　穀精草　夜明沙
右四味爲末用米泔半碗熬成膏去滓入乾柿十餘箇再同熬每日喫三兩個仍飲煮乾柿湯

又方

治小兒斑瘡入眼

朱砂　腦子　水銀　麝香各等分

右四味研爲細末用水調滴入耳中

九味蘆薈丸（醫學準繩六要下同）

治三焦及肝膽經風熱目生雲翳或瘰癧耳內生瘡寒熱作痛或肌燥消瘦發熱作渴飲食少思肚腹不調或肝疳口內生瘡牙齦潰爛或牙齒蝕落頰顎腐爛食少下部生瘡

蘆薈五錢　胡黃連　當歸　芍藥　川芎　酒炒膽草　蕪荑各一兩　木香　炙草各五錢

右爲末茯神打糊丸麻子大每服五七十丸淡湯下

蛤粉散

治小兒瘡痘入目

穀精草　蛤粉

右爲末三歲一錢猪肝一兩批開摻藥在內以竹葉包裹線束定水一盞煮熟入罐內熏眼至溫取食之

二粉散

治小兒斑瘡入目

輕粉五分　粉霜一錢

右研勻結裹如患左睛塞左耳內右同之左右俱患俱塞眼卽開得瘡亦隨愈

通頂散（證治準繩下同）

治眼疼風熱腫脹作楚

瓜蒂　蜈蚣各一錢　皂角肉半錢　麝香少許研

右爲細末研勻每少許吹入鼻中

九仙散

解諸目疾不拘歲月遠近並宜先服

柴胡　蒼朮米泔浸刮去黑皮炒燥各二兩　赤芍藥　荊芥穗　甘草各六錢半　川芎　麻黃剉去節湯泡濾乾焙　薄荷連梗各半兩　旋覆花去老梗三錢

右碎每服二錢水一盞薑二片葱一根煎七分不拘時溫服

三解散

一名寧心湯主上焦積熱傷風面紅目赤狂躁氣急渴水驚啼煩悶丹毒口瘡瘀歐搐掣

人參去蘆　防風去蘆　天麻　茯神去皮木　麝金無以山梔仁代　白附子　大黃各二錢半　赤芍　黃芩　殭蠶各五錢　全蠍十五尾去毒　枳殼水浸去瓤麩炒二錢　粉草六錢

右焙爲末每服半錢至一錢用薄荷湯無時調下或燈心湯

金波散

治時行赤眼腫痛成瞽有熱多淚

黃連一兩　鵬砂　寒水石　大黃各二錢　海螵蛸　銅青各一錢　元明粉二錢五分　全蠍去尖毒七枚　麝香一字

右除元明粉麝香餘七味剉曬爲末仍入元明粉麝香乳鉢內同前藥末杵勻每用一字至半錢溫湯或涼水調化澄清去滓無時頻洗

有風夾蟲作痒入輕粉取效仍忌酒葷三五日

黃連膏

治時行火眼赤腫澁痛晝夜煩啼

淨黃連二錢半

右件細剉用雞子一枚取清瓦盞盛入黃連和勻釀一時見黃色以絹濾過成膏患者仰面臥令人挑一字許頻頻點入目內俟覺口中有苦味至滿舌上乃藥之驗也瘡瘡餘毒攻眼睛多有熱用之亦驗

清涼膏

治暴赤火眼腫痛及血癰作疼發熱

大黃　淨黃連　黃蘗　赤葛　細辛和葉　薄荷葉　風化硝硝七味各一兩

右前六味或曬或焙爲末臨入硝硝乳鉢內同杵勻每用一錢至二錢冷水加薑汁調塗太陽或新汲井水調妙熱癤以涼米湯水調搽患處

辟塵膏

治小兒塵埃入目揩成腫熱作痛啼哭不已

油煙細墨新汲井水濃磨入元明粉半錢和勻爲膏

右用筆點目內三五次卽效仍忌飲酒一晝宵

速效飲

治長成小兒因他物或跌著觸損兩目血脹腫痛

荊芥穗　薄荷葉微炒　草決明微炒各一兩　甘草三錢生用

右爲麤末和半生半炒芝蘇等分抄二錢掌中盛乾嚼之味盡吐去渣如此法投三五次卽效

菊睛丸（局方）

治脾腎不足眼花昏暗

枸杞子　蒺藜酒浸炒　巴戟去心各一兩
甘菊花四兩
右爲末蜜丸梧子大每服十丸空心白湯化下
復明散（證治準繩下同）
治小兒每至日暮即不見物乃雀目也
蒼木米泔浸刮去皮剉焙乾二兩　穀精草一兩
地膚子　決明子　黃芩各半兩
右件搗羅爲細末每服一錢水八分入荊芥少許煎五分去滓溫服食後
山茱萸丸
治小兒眼白多屬虛
山茱萸二兩　熟地黃　丹皮　牛膝　茯苓
澤瀉各一兩　鹿茸半兩
右爲末煉蜜丸如梧子大食後鹽湯下二十丸
龍膽飲子
治疳眼流臊生疳腎濕熱爲病神效不治寒熱爲病者
蛤粉　穀精草各半兩　羌活　草龍膽各三錢
麻黃二錢半　黃芩炒　升麻各二錢　鬱金
虵蛻皮各五錢　甘草炙半錢
右爲細末每服二錢食後茶清調下
舟車丸（丹溪）
治小兒目翳目赤多淚用瓜蒂散加鬱金吐後服此丸
生大黃二兩　甘遂　大戟　芫花　青皮
陳皮各一兩　牽牛頭末四兩　木香半兩
右爲末水丸如梧子大每服六七十丸白湯下隨證加減
井泉石散（張潔）
治眼疳邪熱攻於眼目漸生幛翳致損睛瞳
井泉石一兩　石決明　甘菊花　夜明沙微炒
黃連去鬚　晚蠶沙微炒各半兩
右件搗羅爲細末每服一錢用米泔一盞入生猪肝少許煎五分肝爛爲度放溫時時服乳食後
眞珠膏（證治準繩下同）
專治眼病久不瘥昏不見物
眞珠末細研　甘菊花爲末　香豉炒黃爲末
井泉石細研各二錢半
右拌勻白蜜一合鯉魚膽一枚同藥慢火熬成膏入好龍腦一錢同拌勻每用少許時時點眼中
牛黃膏
治小兒雙目通睛
牛黃一錢　犀角末二錢　甘草一分二釐
金銀箔各五片
右爲末煉蜜丸菉豆大每服七丸薄荷湯下
貼頷通關膏（奇效良方）
治小兒被乳母鼻息吹著兒頷令兒鼻塞不能吮乳
荊芥一兩　香附炒　白直殭蠶各七錢半
皂角二錢五分　川芎一兩七錢半　細辛五錢
右爲細末用葱白研爛入前藥末研勻捻作餅貼顖門上
黃芩湯（婦人良方）
治下痢而頭痛胃滿口苦咽乾或往來寒熱而嘔其脈浮大而弦者專治協熱而利
黃芩一兩半　芍藥一兩　甘草炙半兩
右㕮咀每服三錢棗子一個水一盞煎七分去滓溫服
嘔者加半夏一兩二錢生薑三片
薄荷湯
治乳下嬰兒鼻塞不通及治夾驚傷寒
薄荷葉半兩　羌活　全蠍　甘草　麻黃去節
蠶殭炒去絲嘴　天竺黃　白附子各一錢半
右爲末薄荷湯下
熱極生風加竹瀝少許與服一方有柴胡苦芎桔梗茯苓無全蠍殭蠶天竺黃白附子
消風散
治諸風上攻頭目昏痛頂背拘急肢體煩疼肌肉蠕動目眩旋暈耳作蟬鳴眼澀好睡鼻塞多嚏皮膚頑麻瘙癢癮疹小兒慮風目澀昏困
白茯苓　川芎藭　羌活　荊芥穗　防風
藿香葉　白殭蠶炒　蟬蛻去土　甘草炙
厚朴薑炒　陳皮去白各一兩
右爲細末每服半錢茶清調下薄荷湯亦可
急慢驚風乳香荊芥湯調下或加雄黃名雄黃散
通關散
治小兒鼻塞驚風搐搦關竅不通皆由痰塞中脘留滯百節所致痰之所以潮塞者氣實使之
南星炮一錢　麝香一字　皂角略燒存性二錢
赤蜈蚣炙一條　直殭蠶炒去絲嘴一錢
右爲末以手點藍汁蘸藥少許擦牙或用物引滴

入藥二三點涎出自開

鼻塞調敷兒顖

辛夷膏 張渙

治鼻塞

辛夷葉一兩洗焙乾　細辛　木通　香白芷

木香各半兩爲細末　杏仁一分泡去皮尖研

右件用羊髓猪脂各二兩同諸藥相和於石器中慢熬成膏赤黃色放冷入龍腦麝香各一錢拌勻每用少許塗鼻中若乳下嬰兒乳母吹著兒顖鼻塞者只塗顖上

葱涎膏 吉氏

治兒生三五日鼻塞氣急飲乳之時啼叫不止

葱葉　猪牙皂角爲末去皮各七條

右爛研同皂角末成膏貼顖門上瘥

犀角地黃湯 證治 繩準

治鼻衄

犀角末　牡丹皮各一兩　生乾地黃八錢

赤芍藥七錢

右每服一二錢水煎服

地黃散 楊氏方

治榮中有熱肺壅鼻衄

生地黃　赤芍藥　當歸身　川芎各等分

右每服二三錢水煎熟入蒲黃少許

春夏衄入地黃汁蒲黃各少許

秋冬衄用車前子汁少許

六君子湯 薛氏醫按下同

治小兒鼻衄

人參　白朮　茯苓　陳皮　半夏　甘草各等分

右爲末每服二錢薑棗水煎

四物湯

治小兒顖解鼻衄頦間色赤

當歸　川芎　芍藥　山梔　熟地黃各一錢

右水煎服

五麻散

治證同上

赤茯　赤芍藥各五分　山梔炒　當歸各三分

甘草二分

右用燈心十根水煎服

黃芪芍藥湯

治衄多歲面黃眼澀多眵手麻

黃芪三兩　甘草炙　升麻　葛根　羌活半兩

芍藥炒黃各一兩

右每三錢水煎服

薛己曰按此手足太陰陽明藥也然血虛久則陽亦虛矣故血不足則麻木陰虛火動變證百出實非風也此出升陽滋陰例

麥門冬飲子

治小兒脣色白鼻衄久不愈

五味子十粒　麥門冬去心　黃芪各一錢

當歸身　人參　生地黃各五分

右水煎服

木通散 聖惠方

治小兒腦熱無涕口乾心躁眠臥不安

木通剉　麥門冬去心焙　川升麻各半兩

知母　杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃　犀角炙甘草微赤剉各一分　梔子仁三枚

右件藥搗羅爲粗散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小加減溫服

犀角升麻散 張渙方

治腦熱肺壅鼻乾病

犀角屑一兩　川升麻　馬牙硝　川黃連

朱砂研飛各半兩　牛黃　龍腦各一分細研

右件搗羅爲細末每服半錢溫蜜湯調下乳後服

麥門冬丸 茜全方

治小兒心肺壅熱腦乾無涕時有煩躁

麥門冬去心焙一兩　龍腦細研半分　甘草炙

牛黃研入各一分　黃連　赤茯苓　犀角屑

粉霜　朱砂　馬牙硝以上俱各研　子芩

生乾地黃各半兩

右件搗羅爲末研勻每服半錢以溫湯調下

龍腦散 聖惠方

治小兒鼻齆不聞香臭

龍腦半錢細研　瓜蔕十四枚　赤小豆三十粒

黃連三大莖去鬚

右件藥搗細羅爲散入龍腦研令勻每夜臨臥時以菉豆許吹入鼻中每用有少許清水出爲效

清肺膏 張渙方

治齆鼻病

瓜蔕半兩　附子一枚去皮臍　赤小豆　細辛

甘草各一分

右藥搗羅爲細末入龍腦一錢研勻煉蜜和丸綿

裹內鼻中隨鼻之大小
右二方前一方有熱者宜之後一方有寒者宜之
通辛散 千金方
治小兒鼻塞生息肉
通草　細辛各一兩
右二味揭末取藥如豆著綿纏內鼻中日二
又方 千金翼下同
治鼻中息肉鼻中不得喘息
取細辛以口濕之屈頭內鼻中傍內四畔多著日十易之滿二十日外以萃蔚一兩松羅半兩二味揭篩以綿薄裹如棗核大內鼻中日五六易之滿二十日外以吳白礬上上者二兩瓦坯裹相合令置窯中燒之待瓦熟取揭篩以面脂和如棗核大內鼻中日五六易盡更和不得頓和二十日外乃瘥慎行作勞及熱食及蒜麵百日
又
治龜鼻有息肉不聞香臭
瓜蒂　細辛各半兩
右二味爲散絮裹豆大塞鼻中須臾卽通
雄黃散 片漢
治小兒赤鼻
雄黃　黃丹各等分
右用無根水調傅或用菖蒲半葉酒蒸爲末調服解食毒無根水者天落雨水用椀盛之者是也
菊花散 張渙方
治鼻塞多涕等病
甘菊　防風　前胡各一兩　甘草一分　細辛　桂心各半兩
右揭羅爲細末每服半錢研入乳香少許煎荊芥湯調下乳後
菊花散 聖惠方
治小兒腦戶傷於風冷鼻內多涕精神昏悶
甘菊花　白朮　細辛　白茯苓　甘草炙　防風　人參各一分
右件藥揭粗羅爲散每服一錢以水一小盞入生薑少許煎至五分去滓不計時候量兒大小以意分減溫服
芎藭散 簡要方
治同上
芎藭半兩　甘菊　白朮　防風　人參　細辛　白茯　甘草炙各一分
右件藥揭羅爲散每服一錢以水一盞生薑少許煎至五分去滓溫服

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百三十四卷目錄

醫部彙考四百十四

小兒頭面耳目鼻病門四

單方

鍼灸

醫案

藝術典第四百三十四卷

醫部彙考四百十四

小兒頭面耳目鼻病門四

單方

治小兒解顱熬蛇蛻皮末和豬頰車中髓傅頂上日三四度（千金方下同）

又用猪牙頰車髓煎熬傅顖上痊

治小兒腦長解顱不合羸瘦色黃至四五歲不能行用半夏生薑苦參各一升細辛三兩桂心一尺烏頭十枚㕮咀以醇苦酒五升漬之晬時煮三沸絞去滓以綿一片浸藥中適寒溫以熨顖上冷更溫復熨如前朝夕各三四熨乃止二十日可愈

治小兒解顱用生蟹足白斂各半兩搗末以乳汁和傅顖上立愈

治小兒解顱以細辛桂心各半兩乾薑十八銖爲末以乳汁和傅顖上乾復傅之兒面赤卽愈一方用薑汁和傅顖上

治小兒顖開不合用防風一兩柏子仁白芨各一兩爲末以乳和傅顖上日一十日知二十日愈

小兒解顱顖開不合鼻塞者天南星炮去皮爲末淡酢調緋帛上貼顖門炙手頻熨之立效（小兒直訣）

小兒解顱黃狗頭骨炙爲末雞子白和塗之（楊氏直指）

小兒解顱以丹雄雞冠上血滴之隨以赤芍藥末粉之甚良（普濟方）

小兒顖腫軟以青黛冷水調傅之及兼服化毒丹（證治準繩）

小兒顖門生下卽腫者黃蘗末水調貼足心（普濟方）

小兒顖陷因臟腑壅塞血氣不榮用烏雞骨一兩酥炙黃生地黃焙二兩爲末每服半錢引飲調下（聖惠方）

小兒顖陷乃冷也水調半夏末塗足心（本草衍義）

小兒顖陷綿烏頭附子並生去皮臍二錢雄黃八分爲末葱根搗和作餅貼陷處（全幼心鑑）

小兒顖陷以天靈蓋炙令黃搗羅爲末以生油塗之（證治準繩）

小兒頂軟因風虛者蛇含石一塊煆七次酢淬七次研鬱金等分爲末麝香少許白米飯丸龍眼大每服一丸薄荷湯化服一日一服（活幼全書）

小兒頂軟乃肝腎虛風邪襲入用附子去皮臍天南星各二錢爲末薑汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸（全幼心鑑）

治小兒頭面瘡疥用麻子五升爲末以水和絞取汁與蜜和傅之若有白犬膽傅之大佳（千金方下同）

治小兒頭上惡毒腫瘂癰諸瘡用男子屎尖燒灰和臘月猪脂先以酢泔洗拭清淨乾傅之

治三日小兒頭面瘡起身體大熱用升麻柴胡石膏各六銖甘草當歸各十二銖大黃黃芩各十八銖㕮咀以水四升煮取二升分服日三夜一量兒大小用之

治小兒身體頭面悉生瘡用榆白皮隨多少曝令燥下篩酢和塗綿以傅瘡上蟲自出亦可以猪脂和塗之

小兒頭瘍及浸淫黃爛熱瘡疥疽陰蝕用益母草天麻草切五升以水一斗半煮一斗分數次洗之以殺痒

治小兒頭瘡禿瘡經年不瘥取屋梁上塵土末和油瓶下滓以皂莢湯洗傅之

又取大蠭脂傅之亦治白禿

又髮中生瘡頂白者皆以熊白傅之

治小兒頭瘡用胡粉一兩黃連二兩二味爲末去痂拭乾傅之卽瘥更發如前傅之

又取胡粉連翹各一兩水銀半兩以水煎連翹內胡粉水銀和調傅之

又用白松脂胡粉各二兩水銀一兩猪脂四兩合煎去滓內水銀粉調傅之大人患同

小兒肥瘡用龍骨一錢火飛府丹一錢火飛搽面粉五錢火煆陳石灰一兩黃香三錢海螵蛸二錢共爲末乾摻妙（普濟方下同）

又頭瘡流膿用松香五倍子枯礬府丹各等分爲末洗淨搽之

小兒頭瘡杏仁燒研傅之（事林廣記下同）

小兒頭瘡熟雞子黃炒令油出以麻油調粉搽之（子母秘錄）

小兒頭瘡兔絲苗煮湯頻洗之

小兒頭瘡草鞋鼻子燒灰香油調傅之聖濟錄下同
小兒頭瘡烏梅燒末生油調塗之
小兒頭瘡以馬骨燒灰和酢調傅之孟詵
小兒頭瘡面瘡月蝕並用蛇蛻燒灰臘猪脂和傅之肘後方
小兒頭瘡因傷濕入水成毒膿汁不止用紅麴嚼罨之甚效百一選方
小兒頭瘡鏡面草自乾爲末和輕粉麻油傅之立效楊氏家藏方
小兒頭瘡粘肥及白禿用皂角燒黑爲末去痂傅之不過三次卽愈鄧肇舉衞生雜典
小兒頭瘡以葱汁調膩粉塗之葉簡方
小兒頭瘡以黃泥裹豉煨熟取研以純菜油調傅之勝金方
小兒頭瘡吳茱萸炒焦爲末入水粉少許猪脂酢調塗之聖惠方下同
小兒頭瘡枳實燒灰猪脂調塗
小兒頭瘡龜甲燒灰傅之
小兒頭瘡樹上乾桃燒研入膩粉麻油調搽
小兒頭瘡用皮鞋底洗淨煑爛洗淨瘡傅之
又用舊皮鞋面燒灰入輕粉少許生油調傅
小兒胎癬及頭生瘡手爬卽延生謂之胎癬先以葱鹽湯洗淨用桑樹木蛀屑燒存性入輕粉等分油和傅之
小兒腦疳鼻痒毛髮作穗黃瘦用鯽魚膽汁滴鼻中三五日甚效
小兒頭瘡晝開出膿夜卽復合用鯽魚長四寸一枚去腸大附子一枚去皮研末塡入炙焦研傅搗蒜封之效
小兒頭瘡田螺殼燒存性清油調摻之
小兒頭瘡蠶蛻紙燒存性入輕粉少許麻油調傅
小兒頭瘡水磨檳榔曬取粉和生油塗之
小兒頭面諸瘡用芝麻生嚼傅之普濟方下同
小兒頭瘡糯米飯燒灰入輕粉清油調傅
小兒頭瘡黑豆炒存性研水調傅之
治小兒癩頭併身癩等證以松皮燒灰白膠香枯礬大黃黃蘗油調傅患處
小兒頭瘡野外久乾牛屎不壞者燒灰入輕粉麻油調搽
小兒頭瘡用羊糞煎湯洗淨仍以羊屎燒灰同屋懸煤清油調塗
小兒頭瘡猪髑骨中髓和膩粉成劑火中煨香研末先溫鹽水洗淨傅之亦治肥瘡出汁
小兒頭瘡用猪腰子一個批開去心膜入五倍子輕粉末等分在內以砂糖和麵固濟炭火炙焦爲末清油調塗經驗良方下同
小兒頭瘡浸濕名胎風瘡古松上自有赤厚皮入豆豉少許瓦上炒存性研末入輕粉香油調塗之
嬰兒胎瘡滿頭用水邊烏臼樹根曬研入雄黃末少許生油調搽
小兒頭瘡蓼子爲末蜜和雞子白同塗之蟲出不作痕藥性論
小兒頭瘡出膿水用鮑魚以麻油煎熟取油頻塗本草綱目
治小兒頭瘡以大笋殼燒灰量瘡大小用灰調生油傅又加膩粉佳證治準繩下同
治小兒頭生諸瘡燒雞卵殼和猪脂傅之
治鱔攻頭以敗龜板酥炙爲末用飛麵少許和油塗頂上留孔出毒不可調太柔
小兒頭瘡久不愈胡桃仁皮燈上燒存性盌蓋出火毒入輕粉少許生油調塗一二次愈衞生總微下同
小兒頭瘡絳礬一兩淡豉一兩炒黑膩粉二錢研勻以桑灰湯洗淨摻之良
治小兒禿頭瘡取雄雞屎陳醬汁苦酒和以洗瘡了傅之千金方下同
又用芫花臘月猪脂和如泥洗去痂傅之日一度一方用治白禿
治小兒頭禿瘡葶藶子細末先洗傅之
又用不中水蕪菁葉燒作灰和猪脂傅之
治小兒頭禿瘡無髮苦痒用野葛末猪脂羊脂各一兩三味合煎令消待冷以傅之不過三上愈
治少小禿瘡頭不生髮用楸葉搗取汁傅頭立生
小兒禿瘡燒鯽魚灰以醬汁和傅之
小兒頭禿蔓菁子末和酢傅之一日三上
小兒赤禿桑椹取汁頻服
小兒禿瘡大蜈蚣一條鹽一分入油內浸七日取油搽之極效海上方
小兒白禿黑葚入罌中曝三七日化爲水洗之三七日神效聖濟總錄下同
小兒禿瘡以鹽湯洗淨蒲葦灰傅之
小兒禿瘡冷泔洗淨以羊角葱搗如泥入蜜和塗之

神效

小兒白禿用瓠藤同裹鹽荷葉濃煎洗三五次愈

小兒禿瘡黃蜀葵花大黃黃芩等分爲末米泔洗淨香油調搽（普濟方下同）

小兒白禿用虎骨末油調塗之

小兒白禿用鼠屎瓦煅存性同輕粉麻油塗之即愈（百一方）

小兒禿瘡用黑羊糞爲末猪膽調搽（身經通考方）

小兒禿瘡白頭翁根搗傅一宿已作瘡者半月愈（附後方）

小兒白禿馬齒莧煎膏塗之或燒灰猪脂和塗（聖惠方下同）

治小兒赤禿以赤馬皮白馬蹄燒灰和臘猪脂傅之良一方無赤馬皮

小兒白禿紫草煎汁塗之

小兒禿瘡韶腦一錢花椒二錢脂麻二兩爲末以退猪湯洗後搽之（簡便方下同）

小兒禿瘡用松香五錢猪油一兩熬搽一日數次數日即愈

又用瀝青二兩黃蠟一兩半銅綠一錢半麻油一兩半文武火熬收每攤貼之神效（衛生寶鑑）

治小兒禿瘡羊糞熬湯洗去痂用屋懸煤炒羅爲末以麻油塗瘡上（儒門事親下同）

小兒白禿瘡者俗呼爲雞糞禿者是也可用甜瓜蔓龍頭不拘多少河水浸之一宿以沙鍋熬極苦汁濾去瓜蔓以文武慢火熬成如稀餳狀盛於磁器中可先剃頭去盡瘡痂死血出盡河水洗淨却用熬下瓜蔓膏子一小盞加半夏末二錢生薑自然汁一二匙狗膽一枚同調不過三兩上立可大忌雞猪魚兎動氣發熱之物

小兒白禿頭上團團白色以蒜切口日日揩之（子母秘錄下同）

小兒白禿牛屎厚封之

小兒白禿大豆髑髏骨各燒灰等分以臘猪脂和塗（姚僧垣集驗方）

小兒禿瘡酢和榆白皮末塗之蟲當出（產乳方）

小兒白禿猪蹄甲七個每個入白礬一塊棗兒一個燒存性研末入輕粉麻油調搽不過五上即愈（本草綱目下同）

小兒臘梨頭瘡取慈竹內蠹蟲搗和牛溺塗之

又用鯽魚去腸入皂礬燒研搽

又用大鯽去腸入亂髮塡滿燒研入雄黃末二錢先以虀水洗拭生油調搽（危氏方）

治小兒白禿乾殼不出汁以雞子七枚去白皮銅器中熬和油塗之（衛生總微下同）

又以陳香薷煎濃汁少許同脂和胡粉傅之

又以雞窠中草和白頭翁花一處燒灰研細用臘月猪脂和勻先用酢泔洗瘡後傅之

又以椿楸桃三般葉心取汁傅之大效

又以人屎燒灰末用臘月猪脂和傅

又以虎脂消令凝塗之日三四次

又以酢少許和淨水洗去瘡痂再以溫水洗之挹乾用百草霜入輕粉研細用少許生油調塗

又以兎絲煎湯洗之以竹葉燒灰研細猪脂和塗

又以黑豆炒烟盡杵爲末入膩粉研細生油調塗

治久癩頭以黃連細末傅之（證治準繩下同）

治久癩頭以苦參丸食後服之外用苦參末油傅之二月愈

又以燒紅炭焠長流水令熱洗之仍用芫荽子煎猪脂去滓用脂傅患處

又以胡荽子伏龍肝懸龍尾黃連白礬爲末油調傅之

又以臘月馬脂油搽患處極效

治小兒頭上軟癤以青澀柿子連皮薄切焙乾杵爲細末每用時先以溫湯洗捻去其膿血用藥少許入輕粉三分之一拌勻以薄薄牛皮膠水調成膏攤熟帛子上貼之（衛生總微下同）

又以炒脂麻就銚子中乘熱取起嚼爛傅之

又以生油餅劑子一個捻薄畱一竅于癤上皺來日膿自出便效屢驗

又以兎毛皮不拘多少燒灰研細入膩粉少許用油調塗

又用枳殼去穰週圍用糊合于瘡上去膿生肌屢驗極效

治小兒濕癬用枸杞根搗作末和臘月猪脂傅之（千金方下同）

又以桃青皮搗末和酢傅之日二

又煎馬尿以洗之

又揩破以牛鼻津傅之

又燒狗屎灰和猪脂塗之

治小兒癬雜瘡白膠香黃蘗輕粉爲細末羊骨髓調

塗癬上（儒門事親）

治鬼舐頭以兒糞臘猪脂和傅（證治準繩下同）

又以臘月猪屎燒灰爲末猪脂和傅

治頭皮虛腫如蒸餅裹水狀以口嚼麵傅之（衛生總微）

治小兒頭禿不生髮苦痒取蔓菁子搗爲末以猪脂調塗于禿處佳（聖惠方）

小兒髮遲陳香薷二兩水一盞煎汁三分入猪脂半兩和勻日日塗之（末類鈐方）

小兒髮黃用臘月猪脂和羊屎灰蒲灰等分傅之三日一傅取黑止（千金翼下同）

治髮禿不生先以酢泔清洗禿處以生布揩令火熱臘月猪脂并細研生鐵煎三沸塗之日三遍

又以酢汁煎大豆爛去豆煎令稠塗髮即生（證治準繩下同）

又用貫衆燒灰細研油調傅

又用麻子一升熬黑壓取脂傅頭上良

又用甑氣水主長毛髮以物于炊飯時承取沐頭令其髮長密黑潤不能多得朝朝梳小兒頭漸漸覺有益好（本草綱目下同）

又用鴈脂塗之（證治準繩下同）

又以熊白塗之

又以羊屎燒灰淋汁用豉汁洗之三日一次不過七次即生（衛生總微下同）

又治血熱髮薄不生以桃柳煎湯入猪膽汁和抹頭髮自生

小兒奶疽生面上用楓香爲膏攤貼之（活幼全書）

小兒面瘡焮赤腫痛地榆八兩水一斗煎五升溫洗之（衛生總微下同）

治小兒面上生瘡如火燒以赤薜荔葉杵末生油調傅一名山喬麥

又以黃粱米一升杵末蜜水和傅以瘥爲度

治面上生瘡出膿汁以蛇蛻皮炙焦爲末和猪脂傅上

治面瘡出黃水以鯽魚頭燒灰研末和醬清汁傅上一日易

治面上生諸般瘡以兔絲湯洗之

又以大麥燒存性爲末生油膩粉調塗神效大麥只炒焦黑亦得

治小兒面湮瘡俗云鍊銀瘡者是母受胎之日食酸辣及邪味過度多生此瘡百藥煎五錢生白礬二錢爲細末小油調旋搽之神效（外科精義）

小兒諸疳遍身或面上生瘡爛成孔臼如大人楊梅瘡用蒸糯米時甑蓬四邊滴下氣水以盤承取掃瘡上不數日即效神妙（集簡方）

小兒眉瘡黑驢屎燒灰研油調塗立效（聖惠方）

小兒眉瘡猪頸骨髓六七枚白膠香二錢同入銅器熬稠待冷爲末麻油調塗（本草綱目下同）

小兒眉瘡小麥麩炒黑研末酒調傅之

小兒眉癬用旋覆花天麻苗防風等分爲末洗淨以油調塗之（衛生總微）

小兒聤耳以桑木上露蜂房炙黃杵末溫酒調下半錢（本草綱目下同）

又以蚯蚓糞研細吹耳中極效

耳上生瘡以雞子白傅之

小兒耳出膿用天鵝油調草烏末入龍腦少許和傅立效無則以鴈油代之（通元論）

月蝕耳瘡望夜取兔屎納蝦蟆腹中同燒爲末傅之（肘後方）

小兒耳瘡月蝕胡粉和土塗之（子母秘錄下同）

小兒月蝕生于耳後黃連末傅之

小兒耳疳生于耳後腎疳也地骨皮一味煎湯洗之仍以香油調末搽之（夔州閒錄）

小兒月蝕薔薇根四兩地榆二錢爲末先以鹽湯洗過傅之（全幼心鑑）

小兒耳爛輕粉棗子灰等分研油調傅（摘元方）

治小兒聤耳末石硫黃以粉吹耳中日一夜一（千金方下同）

治小兒耳瘡燒馬骨灰傅之

又燒雞屎白竹筒吹入耳中

小兒聤耳硫黃和蠟作挺插之日二易

小兒耳瘡屠几上垢傅之

小兒聤耳桃仁炒研綿裹日日塞之

小兒耳聾以巴豆一粒蠟裹針令通透塞耳中（衛生總微下同）

又以猫兒捉住老鼠奪之取其鼠膽汁灌病耳中一云只以鼠膽用之亦可

又以地龍一條鹽少許俱貯葱筒中時動搖則化爲水用點耳中

又以米酢一碗用鐵一塊彈子大燒赤投酢中令耳就上使氣熏入耳中即效二三日可治

又以葱白于灰火中煨令熱將葱白頭內耳中一日三易

又以芥菜子杵爛入人乳汁和綿裹內耳中一日一易

治沉聽新聾以荊子中蚛蟲白粉和油滴耳中

治久聾以驢脂和生椒杵爛作丸綿裹塞耳中

又以醇酢微火煎附子至軟削令尖塞耳中

治耳中鳴痛以乾百合爲末溫水調下一錢乳後服

又以柳樹蚛蟲糞水化取汁調白礬末少許滴耳中妙

又以鹽二三升蒸熱包裹以耳枕之冷卽易亦治耳洪洪聲

治小兒耳鳴如流水如風聲以生烏頭纔撅得乘濕削如棗核塞耳中旦用夜易夜用旦易不過三日愈及治耳痒無卽用乾者

治耳中常鳴以生地黃截塞病耳數數易之或以紙裹微煨用

治耳中腫或自瘡以白礬燒灰研細每用少許以葦筒吹耳中日三四次或以綿裹塞耳中生瘡者用胡桃油調著耳內

治小兒聤耳膿汁出以硫黃細研每用少許摻入耳中日一次夜一次

又以白礬麝香研勻少少摻入耳

治小兒疣目以針及小刀子決目四面令血出取患瘡人瘡中汁黃膿傅之莫近水三日卽膿潰根動自脫落千金方

小兒雀盲至晚忽不見物用羯羊肝一具不用水洗竹刀剖開入穀精草一撮瓦罐煑熟日食之屢效忌鐵器如不肯食炙熟搗作丸綠豆大每服三十丸茶下衛生家寶方

小兒腦熱好閉目或太陽痛或目赤腫川芎藭薄荷硇硝各二錢爲末以少許吹鼻中全幼心鑑下同

小兒赤眼水調黃連末貼足心甚妙

小兒目瞖或來或去漸大侵睛雪白鹽少許燈心蘸點日三五次不痛不礙屢用有效活幼口議

小兒麩瞖未堅不可亂藥宜以珊瑚研如粉日少少點之三日愈錢相公藥中方

小兒腦熱常欲閉目大黃一分水三合浸一夜一歲兒服半合餘者塗頂上乾卽再上婦和衆至寶方

嬰兒赤目茶調胡黃連末塗手足心卽愈濟急仙方

嬰兒赤目在蓐內者人乳浸黃蘗汁點之小品方

小兒疣目雞肫黃皮擦之自落集要方

嬰兒目澀月內目閉不開或腫羞明或出血者名慢肝風用甘草一截以豬膽汁爲末每用米泔調少許灌之

小兒雀目仙靈脾根脆蠶蛾各半兩炙甘草射干各二錢半爲末用羊肝一枚切開摻藥二錢紮定以黑豆一合米泔一盞煑熟分二次食以汁送之普濟方下同

小兒雀目牽牛子末每以一錢用羊肝一片同麵作角子二個炙熟食米飲下

小兒目瞖嫩楸葉三兩搗爛紙包泥裹燒乾去泥入水少許絞汁銅器慢熬如稀餳瓷合收之每旦點

小兒赤眼羊肝切薄片井水浸貼

治小兒胎赤眼風赤眼用小兒吐出蚘蟲二條磁盒盛之紙封埋濕地五日取出化爲水磁瓶收每日以銅筯點之

治小兒雀盲以蒼朮二錢米泔浸切片焙爲末豬肝二兩批開摻藥在內用麻繫定粟米一合水一碗砂鍋內煑熟熏眼候溫臨臥每服三錢大效世傳方

治雀盲不計時用蒼朮一兩每服一錢效聖惠方

小兒雀目夜明砂炒研豬膽汁和丸綠豆大每米飲下五丸一方加黃芩等分爲末米泔煑豬肝取汁調服半錢本草綱目下同

小兒雀目用雀頭上血頻點之

小兒雀目取牛肝生食之

一用烏牛膽點之

小兒疳眼用生雞肝一具不拘大小雌雄二三歲者只用半具外去衣內去筋膜研細如麵入疳積散若干調極勻加好熟白酒厚薄相和隔湯頓溫熱空心通口服用甜麴酒少加熟白酒亦佳服至眼開瞖散方止證治準繩

小兒目睛上生白膜以白礬一分水四合于熱銅器中煎取半合下白蜜調之用綿濾過每用芥子許點之日三衛生總微下同

瞖膜厚重以豬膽白皮曝乾合作小繩如粗釵股大燒作灰放冷研細點瞖上三五度瘥

治目盲以豬膽一枚取汁微火上煎之可圓如黍米大或芥心大每用一丸內眼中食後

治睛盲神法于正月八日二月八日三月六日四月四日五月五日六月二日七月七日八月二十日九月十二日十一月二十日十二月晦日每遇上件神日用桑柴灰一合煎湯于磁器內澄令極清稍熱洗之如覺冷卽重湯煑令得所不住手沃之如法用之

視物如鷹鶻眞有神效

治雀目以黃蠟不拘多少器內鎔成汁取下入蛤粉相和得所團成毬子每用以刀子切下一二錢許以猪肝一二兩批開摻藥在內麻縷扎水一碗銚內煑熟乘熱氣熏眼至溫時并肝食之神效日二服

又以豆豉子新瓦上炒令黃色入雄黃半兩同研爲細末每用藥一錢豶猪肝一片批開摻藥裹合陳米飲煑熟與食之

又以石膏爲細末每用一錢猪肝一片薄批摻藥在中麻縷纏定入砂瓶中煑熟切作塊子與食此方治諸藥不效者服之如神

小兒疳眼以烏鰂魚骨牡蠣各等分研爲細末糊丸皂子大每用一丸用猪肝一葉同藥入清米泔煑至肝熟爲度和肝食汁送下

治悞飛麥芒入目不出者用新布覆目上持蠐螬于布上摩之其芒出著布上甚良

治諸物入眼眯之不出者用好墨清水研汁銅筯點之卽出

治悞被諸物衝觸傷目以牛尿點之日二仍避其風雖黑睛破損亦愈

治眼赤腫痛取嫩槐芽或嫩葉煎湯放溫洗之白睛如血淚多者最宜用

洗赤毒眼以細矾硝沸湯浸澄去滓乘熱洗之

小兒初生目閉熊膽少許煎洗七八次愈幼幼近編

小兒鼻塞生息肉用通草細辛各一兩二味搗末取藥如豆著綿纏頭內鼻中日二千金方下同

治小兒鼻塞不通濁涕流出杏仁半兩蜀椒附子細辛各六銖四味㕮咀以酢五合漬藥一宿明日以猪脂五合煑令附子色黃膏成去滓了更以塗絮導鼻孔中日再兼摩頂

小兒鼻疳赤爛蘭香葉燒灰二錢銅青五分輕粉二字日傅三次良乙小兒方

小兒鼻蝕用熊膽半分湯化抹之聖惠方下同

小兒鼻塞頭熱用薰草一兩羊髓三兩銚內慢火熬成膏去滓日摩背上三四次

小兒頭熱鼻塞不通取濕地龍糞捻餅貼顖上日數易之

小兒鼻乾無涕腦熱也用黃米粉生礬末各一兩每以一錢貼顖上日二次普濟方

小兒鼻䶊鼻下兩道赤色有疳以米泔洗淨用黃連末傅之日三四次子母秘錄

小兒鼻疳蝕爛臍礬燒烟盡研末摻之一二日愈集簡方

小兒鼻塞不通不能食乳用醍醐二合木香零陵香各四分湯煎成膏塗頭上并塞鼻中外臺方

衄血不止麥門冬生地各五錢水煎服立止幼幼近編下同

又用車前葉搗汁飲之甚效

小兒鼻塞以槐葉爲末用乳母唾調厚塗顖門上莊氏家傳

鼻塞不通以天南星大者一枚微炮爲末以淡酢調塗緋帛上以貼顖上炙熱手頻熨之張雞峯方

鼻塞不聞香臭水出不止者用蒺藜子半掬爲細末以水一小盞煎至減半令患人仰臥滿含飯一口以藥汁灌鼻中不過再卽嚏病出兒大者有此病小者未有衛生總微下同

治鼻中生瘡有膿取黑牛耳中垢先搌鼻中膿盡傅之

治齆鼻有宿肉出氣不快不聞香臭以白礬末和面脂綿裹塞鼻中數日宿肉隨藥自出

鍼灸

千金方曰小兒顖陷灸臍上下各半寸及鳩尾骨端又足太陰各一壯

醫學綱目曰顖門不合臍上臍下各五分二穴灸三壯灸瘡未發先合

古今醫統曰小兒陷顖灸水分七壯禁鍼水分在下脘下一寸臍上一寸穴當小腸下口至是泌別清濁水液入膀胱渣滓入大腸故曰水分或鍼長强三分灸則五壯長强一名氣之陰郄一名撅骨在脊骶骨端計三分伏地取之乃得足少陰少陽結會督脈別走任脈

原機啓微曰治小兒雀目夜不見物灸手大指甲後一寸內臁橫文頭白肉際灸一壯炷如小麥大

衛生寶鑑曰小兒疳眼灸合谷二穴各一壯炷如小麥大在手大指次指兩骨間陷者中

醫學綱目曰小兒乳癖目不明者灸肩中俞二穴各一壯在肩甲內兼去脊二寸陷中

古今醫統曰小兒三五歲兩眼每至春秋忽生白瞖

遮膧子疼痛不可忍灸大椎上一壯
小兒斑瘡入眼灸大椎二穴項後第一椎下兩傍各一寸半
小兒目瀝怕明狀如青盲灸中渚二穴各一壯左手小指次指大節後陷中
小兒熱毒風盛眼睛疼痛灸手中指本節頭三壯名拳尖也

醫案

萬氏幼科發揮曰一兒頸細其父常問于予可養何如予曰頸者頭之柱也頸細則不能任元在父母調養之八歲後再議至五歲死
一兒解顱未一歲認字念書父母甚愛之予曰此兒胎稟不足腎虛解顱眞陽弱矣聰慧早發眞陽洩矣恐貽父母憂未一歲而發搐死
一兒頭縫四破皮光而急兩眼甚小予曰腦者髓之海也腎主骨髓中有伏火故髓熱而頭破額顱大而眼楞小也宜服地黃丸父母不信至十四歲而死
一小兒頭患瘡甚多寒熱作痛時季夏乃形病俱實先用人參敗毒散加黃連香薷一劑其痛頓止次用仙方活命飲末三服大者出膿小者自消後食厚味復發用清胃散活命飲各一服而愈
一小兒頭面腫痛燉赤屬胃經熱毒先用仙方活命飲次用清胃散而痊後口舌生瘡別搽末藥腹痛重墜作嘔不食手足指冷余謂脾胃虛寒用異功散加升麻而痊
一小兒生旬餘頭患毒高寸許有赤暈勢危急臥鍼砭出黑血兒即安翌日眉間有患亦有赤暈余意宜砭之衆議第二日砭之果血疑不出腹脹而歿
一小兒頭面患熱毒服清胃之藥腫痛益甚余謂毒氣熾盛而瘀血不散也用仙方活命飲二劑而愈後因傷食朝寒暮熱頭面仍患之服降火之劑口舌赤腫手足並冷余謂胃氣復傷而虛寒也用五味異功散而愈
薛氏保嬰撮要曰一小兒顱解足軟兩膝漸大不能行履用六味地黃丸加鹿茸治之三月而起
一小兒十四歲解顱自覺頭大視物皆大畏日羞明此是稟賦腎氣怯弱用六味丸加五味鹿茸及補中益氣湯加山藥山茱萸半載漸愈二載而顱合既婚之後仍復顱門開解足心如炙喜其斷色慾薄滋味日服前藥二劑三載而愈後入房兩腿痿軟又教以服前丸守前戒而愈
一小兒年十四歲而近女色發熱吐痰至有室兩目羞明頭覺脹大仍不斷慾其頭漸大顱門忽開用地黃丸益氣湯之類斷色慾年餘而愈
一小兒年十三歲患前證內熱晡熱形體倦怠食少作渴余以爲所禀怯弱用六味丸加鹿茸補之不越月而痊
一小兒吐瀉發熱顱陷作渴用七味白朮散母子並服而愈
一小兒久病發熱其顱或陷或塡手足或溫或冷余用補中益氣湯加蔓荊子炮薑治之而安
一小兒顱陷吐瀉手足並冷用白朮散加木香炮薑治之而愈後傷食腹痛手足復冷用六君子炮薑治之更加昏憒口角流涎此脾胃虛寒之甚也急加附子遂愈
一小兒病後其顱或陷或塡此脾胃虛熱也朝用補中益氣湯加蔓荊子炮薑木香治之而顱平但作瀉日乾用白朮散以生胃氣而愈
吳江史萬湖子七歲患吐瀉顱目頓陷天柱骨倒兼面赤色余適在彼先用補中益氣湯加附子一劑其瀉止而諸證愈又用錢氏地黃丸料煎服頓安
一小兒七歲夏間過食生冷之物早間患吐瀉面赤作渴手足並熱項軟顱陷午後面色頓白手足並冷脈微欲絕急以六君子湯加附子一劑諸證頓除顱頂頓起而安小兒易虛易實故雖危證若能速用對證之藥亦可回生者
一小兒九歲因吐瀉後項軟面白手足並冷脈微細飲食喜熱余先用六君子湯加肉桂五劑未應更加炮薑四劑諸證稍愈面色未復尺脈未起佐以八味丸月餘面色微黃稍有胃氣矣再用前藥又月餘飲食略增熱亦大減乃朝用補中益氣湯食前用八味丸又月餘元氣漸復飲食舉首如常又月餘而肌肉充盛諸病悉愈
一小兒十二歲瘧疾後項軟手足冷飲食少思粥湯稍離火食之即腹中覺冷用六君子湯加肉桂乾薑飲食漸加每飲食中加茴香胡椒之類月餘粥食稍可離火又用前藥百劑飲食如常手足不冷又月餘其首能舉後飲食停滯患吐瀉項仍痿軟朝用補中益氣湯夕用六君子湯及加減八味丸兩月餘而項

復舉畢姻後眼目昏花項骨無力頭自覺大用八味丸補中益氣湯三月餘元氣復而諸證退後每入房勞役形氣殊倦盜汗發熱服後二藥即愈

一小兒項軟服前二藥而愈舉姻後患解顱作渴發熱以二藥作大劑煎熟代茶恣飲兩月餘而渴熱減年餘而顱顬合又年餘而肢體強若非慎疾雖藥不起

薛氏外科心法曰小兒頭患白瘡皮光且急諸藥不應名曰腦疳瘡乃胎毒挾風熱而成也服以龍膽丸及吹蘆薈末于鼻內兼擦解毒散而愈若重者髮結如穗腦熱如火遍身出汗腮腫胃高尤當服此藥

一小兒頭面患瘡數枚作痒出水水到處皆潰成瘡名曰黃水瘡也用菉豆粉松香爲末香油調傳飲以荊防敗毒散而愈

一小兒頭面生瘡數枚作痒瘡痂積累名曰粘瘡以枯白礬黃丹末等分麻油調搽更飲敗毒散而愈

薛氏保嬰撮要曰一小兒髮稀短少屬足三陰虛用六味地黃丸補中益氣湯年餘而效

一小兒三歲髮稀短少體瘦骨立發熱作渴目黑睛少服肥兒丸不應此腎虛疳證也前丸乃脾胃經之藥久服則腎益虛而疳益甚用六味丸加鹿茸五味子半載而愈

一小兒髮黃成穗用地黃丸加鹿茸五味子爲主佐以補中益氣湯半載而愈

一小兒患瘡疥于髮際之間作痒診其母有肝火用加味逍遙散加漏蘆用牛黃解毒丸解毒散而愈

一小兒患于左耳髮際漸延上頭作痒此稟肝膽二經熱毒用柴胡清肝散母子並服而愈後不戒膏粱復發膿水淋漓右頰赤色此胃經有熱先用清胃散仍用柴胡清肝散治肝火母子俱服又用立效散牛黃解毒丸而愈

薛氏保嬰撮要曰一小兒腮腫肉色不變大便不實屬胃經虛熱用五味異功散加升麻柴胡而愈又乳母飲酒兼怒兩腮赤腫憎寒發熱用加味清胃散二劑加味逍遙散一劑治其母兒亦飲數滴而愈

一小兒腮頷腫痛後耳內出膿久而不愈視其母兩臉青黃屬脾怒所致朝用加味歸脾湯夕用加味逍遙散母子皆愈

儒門事親曰黃氏小兒面赤腫兩目不開戴人以鈹鍼刺輕砭之除兩目尖外亂刺數十鍼出血三次乃愈此法人多不肯從必欲治病不可謹護

一小兒眼發赤其母買銅綠欲洗兒日煎成家慌與兒飲之須臾大吐吐訖立開

清州王氏子年十餘歲目赤多淚衆工無效戴人見之曰此兒病目翳當得之母腹中被驚其父曰娠時在臨清被圍戴人令服瓜蒂散加鬱金上涌而下泄各去涎沫數升人皆笑之其母亦曰兒腹中無病何吐瀉如此至明日其目耀然爽明李仲安見而驚曰奇哉此法救人其日又與頭上出血及眉上鼻中皆出血吐時次用通經散二錢舟車丸七十二粒自吐却少半又以通經散一錢投之明日又以舟車丸三十粒投之下十八行病更不作矣

戴人女僮至西華目忽暴盲不見物戴人曰此相火也太陽陽明氣血俱盛乃刺其鼻中攢竹穴與頂前五穴大出血目即明

薛氏保嬰撮要曰一女子年十四因恚怒先月經不行寒熱骨痛後兩目生翳青綠色從外至內余謂寒熱骨痛足厥陰之證也翳從外背起足少陽之證也左關脈弦數按之而濇肝驚風熱兼血滯也遂以加味逍遙散加防風龍膽草四服而寒熱骨痛頓減用六味丸月餘而翳消

一小兒十五歲兩目白翳腹脹遍身似疥非疥哺熱口乾形體骨立此肝疳之證也用六味肥兒丸而痊後陰莖作癢小便澄白瘡疥益煩狀如大風用大蘆薈四味肥兒丸諸證漸愈又用大蘆薈湯而痊

一小兒白睛多吐痰發搐先用抑青丸四服而痰搐止後用地黃丸年許而黑睛多

一小兒白睛多三歲不能行語聲不暢兩足非熱則冷大便不實朝用補中益氣湯加五味子乾山藥以補脾肺夕用地黃丸加五味子牛膝鹿茸補肝腎不三日而痊

一小兒眼白腿軟兩足熱面似愁容服地黃丸兩月餘漸健服年餘白睛漸黑出痘無恙

一小兒雀盲服羚羊肝丸而目明服四味肥兒丸而目不劄

一小兒目無光芒視物不了了飲食少思大便不調服大蕪荑湯九味蘆薈丸而愈後飲食停滯妄用消導尅伐之劑目證仍作至晚尤甚用人參補胃湯漸愈又用五味異功散四味肥兒丸而痊

一小兒九歲素有肝火兩目生翳服蘆薈肥兒等丸隨愈至十四歲後遇用心過度飲食不節即夜視不

明用補中益氣湯人參補胃湯四味肥兒丸而愈

一小兒眼泡微腫欬嗽惡心小便澁白余謂脾胃食積以五味異功散爲主佐以四味肥兒丸而愈後不節飲食夜視不明余曰此脾胃復傷須補養爲主不信乃服峻厲之劑後變風證竟不起

一小兒因發熱表散出汗眼赤發搐審其母素有肝火發熱以異功散加柴胡升麻子母並服稍愈又用加味逍遙散其熱頓退繼用補中益氣湯六味地黃丸母子尋痊

一小兒目赤作痛咬牙寒熱余謂肝經風熱用柴胡飲子一劑而赤痛止又用四物參芪白朮柴胡而寒熱退又用補中益氣湯而飲食加

一小兒眼素白或青患眼赤作痛服降火之劑眼如血貫脈洪大或浮緩按之皆微細用十全大補湯加柴胡山梔數劑外證漸退而脈漸斂又數劑而愈

一小兒停食腹痛服巴豆之藥更加目赤作痛寒熱往來飲食少思手足並冷余用六君升麻炮薑諸證頓愈惟寒熱未已用四君柴胡升麻而安

一小兒眼赤痛服大黃之藥更加寒熱如瘧余謂脾胃復傷用四君升麻柴胡炮薑釣藤鉤而寒熱愈又用補中益氣湯間服而目疾痊

一小兒因乳母恚怒患發熱等證兒患目痛兼作嘔吐先用小柴胡湯子母俱服頓安但兒睛熱仍嘔以異功散加升麻柴胡治之痊

一小兒生下目黃三日面亦黃一小兒旬日內目黃而漸至遍身此二者胎稟胃熱各用瀉黃散一服皆愈

一小兒旬日面目青黃此胃熱胎黃也用瀉黃散以乳調服少許即愈後復身黃吐舌仍用前散而安

一小兒患目黃知其乳母食欝身黃所致以越鞠丸治母瀉黃散治子並愈

一小兒面青寒熱形氣瘦弱眼目生翳用九味蘆薈丸五味異功散目翳漸退乃以四味肥兒丸五味異功散而肌肉生

一小兒眼每生翳皆因乳母恚怒而作用九味蘆薈丸柴胡梔子散母子服之並愈

一小兒乳哺失節服藥過劑腹脹少食大便不調兩眼生花服治眼之藥漸生浮翳余用異功散加當歸柴胡飲食漸進便利漸調少佐以九味蘆薈丸其眼漸明乃用人參補胃湯肥兒丸而痊

一小兒未週歲目內有翳余謂此稟母肝火所致詢其母果素多恚怒見患瘡癤目疾自乳其子余用地黃丸治之其母稍愈後彼無此藥其子遂瞽

一小兒十二歲傷寒咳嗽發熱服發散之藥日漸不明服降火等藥飲食日少日漸生翳余謂中氣虛用人參補胃湯飲食漸進又用千金補肝丸及熏眼之法而痊

一女子十二歲目生白翳面黃浮腫口乾便泄用四味肥兒丸而痊

一小兒目羞明癢澀兩足發熱大便不實食少時咳仍欲治肝祛風余曰兩足發熱小便不調腎肝虛也大便不實食少時咳脾肺虛也朝用補中益氣湯夕用六味地黃丸元氣漸復乃佐以四味肥兒丸又月餘而痊

一小兒目痛恪服瀉火治肝之藥反加羞明癢澀睡中驚悸悲啼此肝經血虛火動傷肺也用五味異功散加山梔補脾土清肺金用地黃丸滋腎水生肝血而安乃兼服四味肥兒丸而痊

一小兒自脫胎即兩目赤腫或作痒或作翳此胎稟肝火耳用六味蘆薈二丸而愈

一小兒目青發搐直視叫哭或用牛黃清心丸加咬牙煩悶小便自遺余謂肝經血氣虛甚也用補中益氣湯及六味地黃丸而痊

一小兒發搐目劄屬肝膽經風熱先用柴胡清肝散治其肝後用地黃丸補其腎而愈

一小兒目痛兼痒因膏粱積熱仍口渴飲冷便祕先用瀉青丸疏導肝火更用清胃散煎熟磨生犀角服之以解食毒又用四味肥兒丸以治肝證而痊

一小兒目疾久不愈用大蕪荑湯五劑蟾蜍丸數服又用四味肥兒丸而愈

一小兒十四用功勞苦半載後自汗盜汗形體殊倦朝用補中益氣湯加五味子蔓荊子夕用十全大補湯尋愈後畢姻因吐痰頭暈恪服清痰理氣之藥忽目不能開余用地黃丸十全大補湯二月餘而痊

吳江史氏孫自乳兒時患目疾年二十目劄頭搖用金匱腎氣丸愈而復作兩目生翳用聰明益氣湯并前丸既愈而復發形體消瘦脈數洪大用補中益氣湯及前丸而痊

一小兒因驚眼劄或搐先用加味小柴胡湯加蕪荑黃連以清肝熱又用地黃丸以滋腎生肝而痊

一小兒兩目連劄或畏赤或時拭眉此肝經風熱欲

作肝痛也用四味肥兒丸加龍膽草而痊

一小兒白睛多吐痰發搐用地黃丸爲主佐以抑青丸而搐止後用世傳地黃丸而黑睛多

一女子十四歲兩目作痛或發痒或頭運或頭痛或兩脇作痛或寒或熱內熱口渴少食經候不調此肝脾二經氣血虛而有熱也用補中益氣湯柴胡清肝散而愈後左眉上結一核如豆許漸大如栗腐而作痛此肝經火燥而血病也用加味逍遙散月餘腐肉脫乃用八珍湯及前藥而愈

一小兒九歲目劄畏明年深不愈或以爲實火服瀉青丸之類益甚求治于予仍欲瀉肝余謂肝經虛火用地黃丸補之而愈夫肝氣爲陽爲火肝血爲陰爲水肝經之證若非肝火血燥而生風必因肝血虛而火動其初患而病氣形氣俱實者宜少與瀉青丸瀉之其久患而病氣形氣俱虛者當與地黃丸補其腎肝蓋此證原因肝血少而生風耳不可輒用瀉青峻劑經云凡病虛則補其母實則瀉其子前證果肝經實熱宜用柴胡黃連之類以治心火治者審焉

一小兒十三歲目久痛漸生青綠翳後赤爛左關脈弦數用九味蘆薈丸加味逍遙散而愈畢姻後復發用滋陰腎氣丸爲主佐以加味逍遙散而痊

一小兒十五歲因大勞目赤作痛發熱作渴脈洪大而虛用八珍湯加炒黑山梔一劑諸證頓退又用補中益氣湯而痊後因夢遺目仍赤痛用六味地黃丸料加五味子二劑而痛止又三十餘劑而復明

一小兒目內色青發搐目直上視叫哭不已或用牛黃清心丸不愈反咬牙煩悶小便自遺此肝經血氣虛甚故耳余用補中益氣湯及六味地黃丸而痊

一小兒發搐目劄屬肝膽經風熱先用柴胡清肝散以清其肝後用六味地黃丸以補其腎而痊

萬氏幼科發揮曰王氏一女四歲耳後側有結核悶予予曰非癰瘡乃痰核也不必治亦不爲害他醫惑之作癰而治用蟹蚕內消之藥過多脾胃受傷致成疳勞而死哀哉馬刀多生于耳後前腫硬赤痛俗名痄腮用敗毒散傳之神效

薛氏保嬰撮要曰一小兒耳內出膿穢不可近連年不愈口渴足熱或面色微黑余謂腎疳證也用六味地黃合母服加味逍遙散而愈後因別服伐肝之藥耳畜復作寒熱面青小便頻數此肝火血燥也用柴胡梔子散以清肝六味地黃丸以滋腎遂痊

一小兒耳內出膿久不愈視其母兩腮青黃屬乳母鬱怒致之也遂朝用加味歸脾湯夕用加味逍遙散母子皆愈

一小兒十二歲素虛羸耳出膿水或痛或痒至十四稍加用心卽發熱倦怠兩腿乏力八年矣用補中益氣湯及六味地黃丸稍愈畢姻後不守禁忌惡寒發熱頭運唾痰余謂腎虛不能攝水而似痰清氣不能上升而頭運陽氣不能護守肌膚而寒熱遂用補中益氣湯加蔓荊附子一錢四劑不應遂用人參一兩附子一錢二劑而應乃用十全大補湯百餘劑而痊又因大勞入房喉痺痰湧兩腿不遂用地黃飲子頓愈仍用十全大補湯而安後又起居失宜朝寒暮熱四肢逆冷氣短痰盛兩寸脈短用十全大補湯加附子一錢數劑而愈乃去附用人參三錢常服始安

一小兒耳中流膿項中結核眼目或劄或赤痛小便或痒或赤澀皆肝膽經風熱之證也用四味肥兒丸悉愈

一小兒因乳母恚怒兼經行之後多食炙煿兒遂耳內作痛出膿余先用加味小柴胡湯次用加味逍遙散令其母服之子母並愈

一小兒耳出穢水屬肝腎不足先用九味蘆薈丸而痊畢姻後面黃發熱多病又用黃檗知母等藥更胃腸痞滿飲食少思痰涎上壅又利氣化痰加噫氣下氣余用六君子補中益氣二湯加乾薑木香等味治之尋愈

一小兒年十餘歲鼻衄肝脈弦數肝藏血此肝火血熱而妄行用小柴胡加山梔龍膽草四劑而血止又用四物芩連蘆薈山梔甘草作丸服又以地黃丸滋腎水生肝血而愈

一小兒久鼻衄右腮鼻準微赤此脾胃傳熱于肺而不能統也先用六君桔梗當歸山梔而血止次用人參黃芪散以調補脾肺而愈

一小兒咳嗽惡心鼻塞流涕右腮青白此乃脾肺氣虛而外邪所乘也先用惺惺散嗌嗽頓愈但飲食不思手足指冷用六君子少加升麻一劑而痊

一小兒潮熱鼻衄煩渴便秘氣促咳嗽右腮色赤此肺與大腸有熱也用柴胡飲子一服諸證頓愈後因驚復作微搐煩悶此肝脾氣血虛也用四君子加芎歸釣藤鉤而愈

一小兒遍身生疥宂鼻出血因肝脾有熱用四味肥兒丸而愈後食炙煿鼻血復出瘡疥復發先用清胃

散二劑又用四味肥兒丸月餘而痊

一小兒鼻衄滯頤作渴時汗乃胃經實熱也先用瀉黃散二服而滯頤止又用四味肥兒丸數服而鼻血愈後鼻不時作痒發渴便血用犀角地黃湯四劑母子並服別令兒更服四味肥兒丸月餘而愈

一小兒鼻衄發熱作渴右腮青色余謂肝火乘脾先用加味逍遙散母子並服熱渴漸止另用五味異功散少加柴胡升麻與子服之而愈

一小兒鼻衄服止血之劑反見便血右腮色黃或赤此脾氣虛熱不能統血也用補中益氣湯又用五味異功散加柴胡升麻而愈

一小兒鼻衄久不愈四肢倦怠飲食少思惡風寒此脾肺虛也先用五味異功散而鼻血止又用補中益氣湯而不畏風寒繼用四君少加柴胡升麻而愈

一小兒鼻衄兩頰赤余謂鼻賦腎氣不足虛火上炎也不信別服清熱凉血之藥病益甚余用地黃丸果效畢姻後虛證悉至用八珍湯地黃丸料尋愈

一小兒鼻衄作渴喘嗽面赤此心火刑肺金也用人參平肺散及地黃丸料加五味麥門冬而痊

一女子七歲鼻生息肉搽攻毒之藥成瘡腫痛外以黃連甘草黃蘗末傳之以解熱毒更以加味逍遙散清肝火佐以四味肥兒丸而愈

一女子鼻中及下部常出息肉屢用毒藥蝕之各挺出一條三寸許先與龍膽草湯爲主以加味逍遙散爲佐而愈

一小兒肌體瘦弱嗜土炭煤灰後鼻間不利恪服清熱之劑肌體愈瘦食少熱甚善驚善怒小便良久變白鼻中出息肉二寸許耳下頸間結小核隱于筋肉之間余謂肝脾虛羸之變證不信乃內清肺火外用腐蝕喉間亦腐余先用五味異功散加升麻柴胡無黃爲主更用四味肥兒丸爲佐脾氣漸健夕用九味蘆薈丸爲主以五味異功散爲佐而愈

一小兒小便不利鼻乾衄血鼻間色赤屬脾肺有熱用濟生犀角地黃湯前證已愈後頰間常赤作渴有痰此稟賦腎氣不足用地黃丸而諸證皆痊

薛氏外科心法曰一小兒鼻外生瘡不時搽擦延及兩耳諸藥不效以蘆薈丸服及松香菜豆末搽之而愈

一小兒咳嗽喘逆壯熱惡寒皮膚如粟鼻痒流涕咽喉不利隨爛吐紅氣脹毛焦作利名曰肺瘖以地黃清肺飲及化蠱丸治之而愈

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百三十五卷目錄

醫部彙考四百十五

小兒唇口齒舌喉病門一

孫思邈千金方 鵝口 重舌 重齶重斷 齒齦 走馬疳

錢乙小兒直訣 弄舌 舌厚脣燥

張從政儒門事親 口瘡脣緊 牙痛

朱震亨平治會萃 木舌 口糜

危亦林得效方 齒不生

方賢奇效良方 弄舌

萬氏秘傳片玉心書 脣瘡

魯伯嗣學嬰童百問 鵝口口瘡 重舌木舌 弄舌 舌短 齒齦 喉痺腫腫 淨瘡

虞搏醫學正傳 重舌重齶

吳崑身經通考方 舌腫

薛氏保嬰撮要 滯頤 喉痺 吐舌弄舌

徐春甫古今醫統 口瘡

王肯堂證治準繩 口舌 舌 齒齦 口舌瘡 弄舌 重舌 木舌

咽喉

陳實功外科正宗 鵝口口瘡 重舌 走馬疳

小兒衛生總微方論 脣口病論 弄舌論 舌病論 咽喉病論 諸瘡 痰疳論

方 丹麻湯 又方 辰砂膏 蟾酥丸 保命散 吳茱萸散 洗心散 辰砂七寶散

瀉心散 一捻金散 葛氏方 犀角消毒飲 胡黃連丸 青黛散 一字散 弓黃散 連翹湯 金星丸 連翹湯 清涼飲子 金黃散 溫脾丹 冰硼散 赴筵散 鉛霜散 甘露飲 如聖散 地骨皮丸 冰麝丸 加減泡白散 生香膏 槐柳散 溫胃散 麝香散 葵根散 麥灰散 七味白术散 五倍子散 導赤散 柴胡清肝散 瀉白散 異功散 加味逍遙散 桃紅散 立效飲 黃金散 天竺黃散 香附散 清胃散 又方 又方 雄黃丸 齒齦腫痛方 又方 聖惠蝦蟆散 又方 又方 牛蒡散 龍膽飲子 黃連石膏湯 苦參散 地黃膏 溫脾散 四君子湯 人參安胃散 人參如母散 硇黃散 硇砂散 天竺黃散 當歸散 玉露飲 羌活散 牛黃散 五苓湯 金朱飲 砂膏 礬硝散 烏魚散 當歸連翹湯 如拔三黃丸 鐵粉散 蛇蛻散 定命散 犀角散 絳雲散 如聖湯 如聖圓 通關散 金露膏 射干湯 荊芥桔梗湯 又方 又方 又方 又方 又方 又方 又方 銳鞭拳方 通氣散 大聖玉屑無憂散

醫部彙考四百十五

小兒唇口齒舌喉病門一

唐孫思邈千金方

鵝口

凡小兒初出腹有鵝口者其舌上有白屑如米劑者鼻中亦有之此由兒在胞胎中受穀氣盛故也或娠時嗜糯米使之然治之之法以髮纏筯頭沾井花水撩拭之三日如此便脫去如不脫可煮粟秩汁令濃以綿纏筯頭拭之若春夏無粟秩可煮粟木皮如用井花水法

重舌

小兒初出腹有連舌舌下有膜如石榴子中隔連其舌下後令兒言語不發不轉也可以爪摘斷之微有血出無害若血出不止可燒髮作灰末傅之血便止也

重齶重斷

小兒出腹六七日後其血氣收斂成肉則口舌喉頰裏清淨也若喉裏舌上有物如蘆箨盛水狀者若懸癰有脹起者可以綿纏長針留刃處如粟米許大以針刺決之令氣泄去青黃赤血汁也一刺之止消息一日未消者來日又刺之不過三刺自消盡餘小小未消三刺亦止自然得消也有舌下如此者名重舌有著頰裏及上齶如此者名重齶有著齒斷上者名重斷皆刺去血汁也刺後用鹽洗拭意用如聖散或一字散摻刷

齒病論

凡齒斷宣露多是疳蟲及月蝕以角蒿灰夜傅斷間使滿勿食油不過二三日瘥食油及乾棗即發所以患齒者忌油乾棗及桂心每旦以一捻鹽內口中以溫水含揩齒及叩齒百遍爲之不絕不過五日口齒即牢密凡人齒斷不能食果菜者皆由齒根露也爲此鹽湯揩齒叩齒法無不愈也神良凡人好患齒病多由月蝕夜食飲之所致也識者深宜慎之所以日月蝕未平時特忌飲食小兒亦然

宋錢乙小兒直訣

弄舌

弄舌者脾臟微熱令舌絡牽緊時時舒熱當少用瀉黃散或飲水者脾胃虛而津液少也兼面黃肌瘦五心煩熱者疳瘦也用胡黃連丸大病未已而弄舌者凶

註 按小兒舌微露而即收名弄舌屬心脾虧損用溫脾散補之舌舒長而收緩名吐舌乃心脾積熱少用瀉黃散主之兼口舌生瘡作渴飲冷屬胃經實熱用瀉黃散作渴畏冷屬胃經虛熱用四君子

湯食少作渴或大便不實脾胃虛弱也用七味白术散口角流涎或腮頰患腫胃虛風熱也先用人參安胃散後用七味白术散若午後甚者脾血虛也四物湯多加參术茯苓未應用補中益氣湯及審相勝其疳瘦證當參諸疳門

舌厚唇燥

急欲乳不能食者此風邪由臍而蘊熱心脾致舌厚唇燥不能吮乳也

註按前證果因外邪而唇口撮緊者是名爲臍風多不能救若心脾有熱舌尖痛不能吮乳舌本痛不能送乳者以柳花散敷之若舌下腫如小舌者或舌絡牽痛或齒齦患白星俱用線針刺出毒血亦效前散若唇腫痛或裂紋作痛以當歸膏調前散敷之若暴病發熱作渴飲冷大便祕結用瀉黃散疏導其熱若病後發熱口渴飲湯大便不實用異功散調補胃氣若服攻伐之劑兼嘔吐或腹痛脾胃復傷也用四君子湯或口角流涎或痰氣壅盛脾不能攝也用六君子湯若兒自食甘肥或母食酒麵致兒口舌生瘡用清胃散以清熱若作嘔少食泄瀉用白术散以補脾若手足並冷或腹痛惡寒用六君炮薑以溫中若因乳母飲食勞役失宜發熱致兒用補中益氣湯因乳母肝膽二經血虛內熱傳兒用加味逍遙散八珍湯因乳母肝脾鬱怒血傷內熱致兒爲患用加味逍遙散加味歸脾湯俱加漏蘆子亦服數滴仍須參前弄舌類詳看

元張從政儒門事親

口瘡唇緊

凡小兒口瘡唇緊用酸漿水洗去白痂臨困點綠袍散如或不愈貼赴筵散又不愈貼鈴白霜散則愈

牙疳

牙疳者齒齦也齒齦者牙斷腐爛也下牙屬手陽明大腸之經燥金爲主上牙屬足陽明胃經濕土爲主上下是腸胃二經也或積熱於內或因服銀粉巴豆大毒之藥入於腸胃乳食不能勝其毒毒氣循經而至於齒齦牙縫嫩薄之分反爲害也可以麝香玉線子治之乳母臨臥當服黃連解毒湯一服牙疳病則愈矣

朱震亨平治會萃

木舌

戴云木舌者舌腫硬不和軟也又言重舌者亦是此類二者蓋是熱病用百草霜滑石芒硝爲末酒調敷

口瘡

戴云謂滿口生瘡者便是江茶粉草傳之或用苦參黃丹五倍子青黛各等分傳之

危亦林得效方

齒不生

齒不生者由齒者骨之所絡髓之所養腎氣不足則髓不能充於骨故齒久不生宜服芎黃散

明方賢奇效良方

弄舌

夫弄舌者神藏微熱令舌絡微緊時時衍舌治之切不可用涼藥下之少與龍腦飲子地黃膏治之若大病未已弄舌者凶學者愼之

萬氏祕傳片玉心書

唇瘡

兒疳蟲昏睡煩躁鼻爛汁臭齒齦生瘡下利黑血蟲食下部爲狐下唇有瘡蟲食其臟爲惑上唇有瘡

魯伯嗣學嬰童百問

鵝口口瘡

巢氏曰鵝口候者小兒初生口裏白屑滿口上舌如鵝之口故曰鵝口也此乃胎熱而心脾最盛熏發于口也葛氏用髮纏指頭蘸井花水揩拭之睡時以黃丹煅出火氣摻於舌上小兒初出腹有連舌舌下有膜如石榴子中隔連其舌下後令兒言語不發不轉也可以爪甲摘斷之微有血出無害若血出不止可燒髮作灰末傳之血便止也用保命散枯白礬一錢馬牙硝半錢硃砂一分同研細取白鵝糞以水攪取汁調塗舌上頷頰內先用髮纏指揩拭舌上垢了然後用藥敷之口瘡候乃小兒血氣盛兼將養過溫心臟積熱熏蒸於上焦故成口瘡也宜用南星末淡酢調貼兩腳心乳母宜服洗心散却用洗心湯傳口之法用黃連末以蜜水調抹口中黃藥青黛冰片皆可又以牛黃少許末之竹瀝調塗口內治鵝口以馬牙硝如豆許塗亦好或口如魚口不能合或作鵝聲者難治

重舌木舌弄舌

巢氏曰小兒重舌者心脾俱有熱也心候於舌而主血脾之絡脈出於舌下若心脾有熱則血氣俱盛附於舌根重生壅出如舌而短小是也有著頰裏及上齦者名曰重齦著齒齦者曰重齦皆當刺去其血用

眞蒲黃傳之或髮灰或馬牙硝或硼砂或焰硝傳之或竹瀝浸黃蘗點之亦好

又木舌證舌者心之候脾之脈絡于舌也臟腑壅滯心脾積熱熱氣上衝故令舌腫漸漸脹大塞滿口中是爲木舌若不急療必致害人用朴硝二分紫霜一分白鹽半分同研每半錢竹瀝井花水調傳不用朴硝及鹽亦可又方用黃葵花研細黃丹伴之同研點七次又舌脹滿口單用冰片點之亦妙

又弄舌者脾臟微熱令舌絡微緊特特舒舌治之勿用冷藥下之當少與瀉黃散漸服之亦或飲水醫疑爲熱必以冷藥下之非也飲水者脾胃虛津液少也又加面黃肌瘦五心煩熱即爲疳瘦宜胡黃連丸葦大病未愈用藥後弄舌者凶又有舌上白胎井黑色者用硼砂爲末摻之熱甚者加冰片或單用黃丹如豆許以按舌下尤妙

齒痙

聶氏云受腎氣不足者即髓不滿益骨之所絡而爲髓髓不足故不能充于齒所以黃生遲也宜用芎藭乾地黃山藥當歸芍藥甘草各等分研末用熱水調服或時以藥末擦牙齦齒即生也

喉痹腮腫

巢氏云此二證乃風毒之氣客於咽喉與血氣相搏而結腫成毒熱入於心即煩亂不食而死此候急用金星丸下之治小兒咽喉腮腫疼痛當用升麻馬牙硝硼砂牛黃等劑連翹湯不可缺也連翹湯鼈湯亦可服

滯頤

巢氏云小兒滯頤者涎流出而漬於頤間也此由脾冷涎多故也脾之液爲涎脾胃虛冷不能收制其津液故流出漬於頤也張氏溫脾丹主之一法百藥煎舍嚥其涎自不出亦截法也益黃散亦治此證溫脾散亦可服

虞摶醫學正傳

重舌重齦

兒有重舌重齦者宜用三稜針刺去血內服東垣凉膈散凡口內諸病唯針最捷

吳崑身經通考方

舌腫

小兒噤風凡舌腫下必有噤蟲狀如螻蛄有頭毛其頭小白可燒鐵烙頭上即消不急治能殺人世傳走馬喉痹滿口白瘡如雪脾虛所致若帶風邪當先瀉其邪進補脾氣生脾血之劑蓋龍火不宜凉物宜以甘溫從治也

薛氏保嬰撮要

滯頤

小兒滯頤者涎流出而漬於頤間也脾之液爲涎由脾胃虛寒不能收攝耳治用六君子湯加木香凡作湯飲冷者屬實熱宜瀉胃火作湯飲湯者屬虛熱宜補中益氣若脾經實熱而廉泉不能約制者用牛黃清心丸脾經虛熱而廉泉不能統攝者用六君子加木香胃經實熱而蟲動津液流出者用瀉黃散虛熱用五味異功散大便秘結用清凉飲中氣下陷用補中益氣湯食積內熱用大安丸仍參口瘡腮腫條互覽之

喉痹

小兒喉痹因胃梁積熱或稟賦有熱或乳母七情之火飲食之毒當分其邪蓄表裏與證之輕重經之所主而治之若左腮色青赤者肝膽經風熱也用柴胡梔子散右腮色赤者肺經有熱也用瀉白散額間色赤者心與小腸經熱也用導赤散若兼青色風熱相搏也用加味逍遙散鼻間色黃脾胃經有熱也用瀉黃散若兼青色本乘土位也用加味逍遙散兼赤色心傳土位也用柴胡梔子散額間色赤腎經有熱也用地黃丸凡此積熱內蘊一便不通者當疏利之風邪外客而發寒熱者當發散之外感風邪大便閉結煩渴痰盛者當內疏外解若因乳母胃梁積熱者母服東垣清胃散若因乳母恚怒肝火者母服加味逍遙散稟賦陰虛者兒服地黃丸大概當用輕和之劑以治其本切不可用峻利之藥以傷眞氣也

吐舌弄舌

舌屬心脾二經小兒舌微露而即收者名弄舌此屬心脾虧損用溫脾散神之舌舒長而良久不收者名吐舌乃心脾積熱用瀉黃散主之或兼口舌生瘡作渴飲冷屬胃經實熱亦用前散作湯飲熱屬胃經虛熱用四君子湯食少作渴或大便不實脾胃虛弱也用七味白术散口角流涎或腮頰患腫胃虛風熱也先用人參安胃散次用七味白术散若午後甚者脾血虛也四物多加參术佐芩术不應用補中益氣湯及審五臟相勝若因痞瘦所致當參諸痞門

徐春甫古今醫統

口瘡

口疮者乃脾氣凝滯風熱加之則發口瘡小兒將養太過溫煖心臟客熱其口亦瘡傷寒孤惑之證上脣生瘡蟲食其臟下脣生瘡蟲食其肛此口瘡內應臟腑之邪熱然也

王肯堂證治準繩

口

嬰兒新產出胎急以綿裹指揩拭兒口中舌上惡血穢露謂之玉銜若啼聲一發即入腹成百病

舌

又看舌下若連舌有膜如石榴子若啼不出聲不轉速以指爪摘斷之或用葦刀子割之微有血出即活若舌下血出多者以燒亂髮灰同豬脂少許和塗之

齒脣

聖惠云看齒根有黃筋兩條以葦刀割斷點豬乳佳如兒目難開先點猪乳

兒上脣與齒齦連處皆有一筋牽引若上脣筋緊即生上煉下脣筋緊即生下煉上煉生瘡滿頭或眉間如癬狀瘙癢不已復流黃汁至處生瘡下煉起腰背漸至四肢患亦如上或疾甚不治或頭面上下相通累年不愈遂致夭折或成大病惟每日早晨拭口佳

口舌瘡

諸疳口瘡因乳哺失節或母食膏粱積熱或乳母七情鬱火所致其證口舌齒齦如生瘡狀若發熱作渴飲冷額間色赤左寸脈洪數者此屬心經先用導赤散清心火次用地黃丸滋腎水若寒熱作渴左頰青赤左關脈弦洪者屬肝經先用柴胡梔子散清肝火次用六味地黃丸生肝血若兩腮黃赤牙齦腐爛大便酸臭右關脈洪數按之則緩者屬脾經用四味肥兒丸治脾火以五味異功散補脾氣若發熱咳嗽右腮色赤右寸脈洪數按之濇者屬肺經先用清肺飲治肺火用五味異功散補脾胃若發熱作渴兩頰黧色左尺脈數者屬腎經不足先用六味地黃丸以生腎水次用補中益氣湯以生肺氣又有走馬疳者因病後脾胃氣血傷損虛火上炎或痘疹餘毒上攻其患甚速急用銅綠散大蕪荑湯輕則牙齦腐爛脣吻腮腫重則牙齦蝕露頰腮透爛若飲食不入喘促痰甚此脾胃虛而肺氣敗也頰腮赤腐不知痛者此胃氣虛甚而肉死也並不治

經云手少陰之經通于舌足太陰之經通于口因心脾二經有熱則口舌生瘡也當察面圖部位分經絡虛實而藥之若元氣無虧暴病口生白屑或重舌者用亂髮纏指蘸井花水揩之或刺出毒血以柳花散傅之或上齶腫脹或有泡者並令刺破敷前散或以青黛搽之刺後又生又刺若脣吻坼裂者用當歸膏調柳花散敷之若元氣虧損或服寒涼之藥或兼作嘔少食者此虛熱也用五味異功散加升麻柴胡若泄瀉作渴者脾胃虛弱也用七味白朮散若腹痛惡寒者脾胃虛寒也用六君薑桂若因母食酒麵煎煿者用清胃散若因母飲食勞役者用補中益氣湯肝脾血虛者用加味逍遙散鬱怒內熱者用加味歸脾湯母子並服若泥用降火必變慢脾風矣仍參吐舌弄舌治之凡針重舌以線針直刺不可橫挑恐傷舌絡致言語不清也

舌

舌者心之候脾之脈絡于舌也二經有熱無所于泄而發于舌如舌絡微緊時時舒舌謂之弄舌附舌下近舌根生形如舌而小謂之重舌舌漸漸腫大塞滿口中謂之木舌

曾氏云凡患此證是脾與心肝屢受極熱所謂重舌木舌又謂之舌黃鵝口名雖異皆熱也大抵重舌生于舌下挺露如舌故曰重舌然脾之絡脈繫舌傍肝之絡脈係舌本心之絡脈係舌根凡此三經或爲濕熱風寒所中則舌捲縮或舒長或腫滿宜消黃散綠袍散主之及當歸散羌活散與服

弄舌

弄舌者脾臟微熱田氏云若肥實者用牛黃散治之

重舌

田氏云重舌治法用苦竹瀝漬黃蘗末點舌上如不愈後用眞蒲黃傅之不過三次愈用眞蒲黃微炒紙鋪地上出火氣研細每挑些摻舌下更以溫水蘸熟帛裹指輕按之按罷摻藥

木舌

曾氏云木舌者舌腫硬而妨乳食此爲風熱盛也以當歸散瀉黃散玉露飲皆可服之次消黃散點擦舌上蓋舌者心之管心熱則生瘡破裂肝壅則血出如湧脾閉則白胎如雪熱則腫滿風則強木口合不開四肢壯熱氣喘語塞即其候也治法涼解上焦及心肝脾三經邪熱疏風化痰初用百解散加五和湯木薑燈心煎次投以牛蒡湯同當歸散入生地黃水薑煎服

咽喉

心盛云咽喉爲一身之總要與胃氣相接呼吸之所從出若胷膈之間蘊積熱毒致生風痰壅滯不散發而爲咽喉之病喉內生瘡或狀如肉腐爲腫爲痛窒塞不通吐嚥不下甚則生出重舌治之尤重先去風痰以通咽膈然後解其熱毒遲則有不救之患又有熱毒衝于上齦而生瘡謂之懸癰及腑寒亦能令人咽閉吞吐不利臨病詳審治之

咽喉之疾本傷熱毒上攻也四時受熱藏心腑之間一旦所觸上攻咽喉所謂腎傷寒也然其證有單肉蛾雙肉蛾有重舌木舌痒腮有懸癰腫脹有裏外皆腫甚者上攻頭面皆腫大法先洗去口中舌上白胎其次掃去風涎如是單雙肉蛾可針則針有不可針者則用熏擦藥退後方依次用服藥如是木舌服藥之外仍用擦藥痒腮則用塗藥輕者但服藥而自退不須用針及藥點其瘡自消也

陳實功外科正宗

鵝口瘡

鵝口瘡皆心脾二經胎熱上攻致滿口皆生白斑雪片甚則咽間纍纍腫起致難乳哺多生啼叫以青紗一條裹筯頭上蘸新汲水揩去白胎以淨爲度重手出血不妨隨以冰硼散揩之內服涼腦之藥

重舌

小兒重舌乃心火旺動發之當以線針點刺患上令出惡血內服解毒瀉心湯外以冰硼散揩之又有紫舌木舌亦由心火而發用飛鹽加冰片少許揩出涎自愈又有痰氣結于舌上成核作痛硬強者用線針點破出血用冰硼散揩之服後藥

走馬疳

走馬疳言患迅速不可遲延故也其患多在痘瘡餘毒所中又有雜病熱甚而成者其患牙根作爛隨便黑腐作臭甚者牙齦脫落根柯黑朽不數日間以致穿腮破脣誠爲不治初起宜用蘆薈消疳飲外用人中白散或冰硼散二藥揩之取去黑腐肉見紅肉血流者爲吉如取時頑肉不脫腐爛漸開瘀腫外散臭味不止更兼身熱不退者俱爲不治

牙疳五不治

口臭涎穢者一不治黑腐不脫者二不治牙落無血者三不治穿腮破脣者四不治用藥不效者五不治

小兒衛生總微方論

脣口病論

風毒濕熱隨其虛處所著搏于血氣則生瘡瘍若發于脣上生瘡乍癢乍發謂之緊脣又曰潘脣其發頰者脣常腫大粗厚或上有瘡不效甚者以至脣腫若發于脣裏連兩頰生瘡者名曰口瘡若發于口吻兩角生瘡者名曰燕口俗云因乳食看視燕子則生燕口瘡也

弄舌論

小兒弄舌者其證有二一者心熱心繫舌本熱則舌本乾澁而緊故時時吐弄舒緩之二者脾熱脾絡連舌熱則舌亦乾澁而緊故時時吐弄舒緩之皆欲飲水心熱則發渴脾熱則津液耗皆引飲二證相似宜加審別心熱者面赤睡卽口中氣熱時時煩躁喜就其冷咬牙上竄治宜退熱脾熱者大便猶硬赤黃色面黃身亦微黃治宜微導之不可用冷藥又不可轉下若悞下之則脾胃虛津液耗又加五心煩熱面黃肌瘦變爲疳也若大病未已用藥後弄舌者大凶也以人參知母散瀉黃散治之

舌病論

小兒舌上偶生瘡腫者由風毒邪熱搏于血氣隨其虛處著而生病也發于舌上紫腫者名曰紫舌脹若腫粗大木悶而鞕者名曰木舌脹若風濕相搏而生瘡者名曰舌瘡若風多而舌腫如吹胞者名曰鼓舌其紫舌木舌鼓舌腫甚者則滿口溢出塞閉氣門皆能殺人

咽喉病論

小兒咽喉生病者由風毒濕熱搏于氣血隨其經絡虛處所著則生其病若發于咽喉者或爲喉痹或爲纏喉風或爲乳鵝重者或爲馬喉痹又或懸癰腫或腮頷腫或喉中生瘡

諸物梗喉論

小兒有悞吞諸物在喉中不能下不能出妨碍飲食氣出不快甚者塞剌疼痛時寢不任便致危殆

方一

升麻湯（千金方下同）

治小兒喉痛若毒氣盛便咽塞

升麻　生薑　射干各二兩　橘皮一兩

右四味㕮咀以水六升煮取二升去滓分三服

又

治小兒卒毒腫著喉頸肚熱妨乳

升麻　射干　大黃各一兩

右三味㕮咀以水一升五合煮取八合一歲兒分

三服以滓傅腫上大兒以意加之

辰砂膏（身經通考下同）

治小兒虛熱舌腫噤風

辰砂三錢　硼砂　牙硝各一錢半　明粉二錢

全蠍　眞珠末各一錢　麝香一字

右爲末好油紙包裹自然成膏每用菉豆許乳汁調敷乳頭上吮下金銀薄荷湯下亦可有潮熱甘草湯下此藥雖凉有全蠍熱品監制無過凉之患或用牛黃細研一錢以竹瀝調一字灌之更以豬乳點于口中此先治其標

蟾酥丸

治小兒牙疳

蟾蜍一枚酥油炙去骨　胡連　宣連　草龍膽

川練　木香　史君肉　蕪荑各一兩

末之猪膽汁糊丸麻子大入青黛茴香陳皮麝少許各研細旋滾爲衣常服紫蘇湯下量兒大小與之

保命散（嬰童百問下同）

治小兒口內白屑滿舌上如鵝口

枯礬一錢　牙硝半兩細研　朱砂二錢半

右同研細每服一字取白鵝屎以水攪取汁調塗舌上含頰內未用時先以手指纏亂髮拭舌上垢然後使藥傅之

吳茱萸散

治初生兒喫乳後口內即生白屑煩躁

吳茱萸不拘多少

右用酢調傅脚心內退即去之

心有客熱口生瘡以南星末酢調傅脚心茱萸散亦治口瘡即洗去之

洗心散

治風壅壯熱頭目昏痛痰涎壅滯涕唾稠黏心神不寧眼澀睛疼及鼻塞聲重咽乾多渴五心煩熱小便黃赤大便祕澀並宜服之

白朮一錢半　甘草炙　當歸　荊芥穗　麻黃

芍藥　大黃麪裹煨去麪切焙各六錢

右剉散每服四錢生薑薄荷湯去滓乳母服或兒服

辰砂七寶散

治小兒口瘡壯熱傷風壅熱治夾驚傷寒解諸般熱亦治疹痘熱治驚風定搐搦

麻黃去節　白朮　當歸　大黃　赤芍　荊芥

前胡　生地　甘草各半兩

右爲末傷風發散用生薑薄荷煎

急驚加辰砂薄荷調下

瀉心散

治心經實熱咬牙及痰氣實則氣行澀合臥則氣不通故喜仰臥則上下通也

黃連一兩去鬚

右爲末每服半錢或一錢臨臥時溫水服

牛黃散

治小兒重舌木舌重齶重齦腫痛口中涎出

牛黃　龍腦　丹砂各二錢半　鉛霜半兩

太陰元精石一兩

右爲末每服半錢先於腫處針破出血鹽湯拭口摻藥在內

一捻金散

治小兒鵝口口瘡重舌木舌

雄黃三錢　硼砂一錢　甘草半錢　片腦少許

右爲細末乾摻患處或用蜜調塗

葛氏方

治小兒鵝口

黃丹

右炒黑水飛研細摻舌上即愈仍服消毒飲

犀角消毒飲

治嬰孩風毒赤紫丹瘤壯熱狂躁睡臥不安胷膈滿悶咽喉腫痛九道有血妄行遍身丹毒

牛蒡子炒一兩半　荊芥穗五錢　生甘草

防風各二錢半　犀角一錢半

右剉散用水煎不拘時服

瀉黃散

治小兒胃經實熱致生喉痹咬牙心脾積熱吐舌

藿香葉七錢　山梔一兩　石膏　甘草各五錢

防風四兩

右剉散同蜜酒微炒香每服二錢水煎服

胡黃連丸

治小兒五心煩熱面黃弄舌

川黃連　胡黃連各半兩　硃砂一分另研

將二連爲細末入朱砂末塡入猪膽內用淡水煮以杖安銚子上用綿釣之勿著底候一炊久取出研入蘆薈麝香各一分飯和丸如麻子大每服五七丸至一二十丸食後米飲下一作食前治疳證

有熱者一方加蝦蟆半兩不燒
青液散
治嬰孩鵝口重舌口瘡
青黛一錢　砂硝一錢　冰片少許
右爲細末蜜調以鵝翎少許傳上一方去砂硝
一字散
硃砂　冰片各少許
蜜調鵝翎刷口內嚥下無妨
芎黃散
治齒生遲或嚼物少力此方主之
川芎五錢　山藥　當歸酒炒　白芍藥炒
甘草炙各二錢半
右爲細末用白湯調化食後服或將乾藥末摻齒斷一方加生地半兩去芍藥
金星丸
治小兒風熱壅盛喉中痰鳴喘氣粗面赤紅腮赤腫痛咽喉壅塞目閉不開多眠發熱狂言煩躁多渴則生驚風大便不通小便如血者般熱壅瘡瘍煩躁並宜服之
眞礬金　雄黃飛各二錢半　脂粉煅半錢
巴豆七粒去油
右爲末調勻酢糊爲丸麻子大薄荷湯下
連翹漏蘆湯
治小兒癰瘡丹毒瘡痱咽喉腫痛腮腫
漏蘆　麻黃去根節　連翹　升麻　黃芩
白斂各一錢　甘草　枳殼各半錢
右爲粗末每服一錢以水一小盞煎至五分去滓量兒大小不拘時溫服
熱甚加大黃硃硝
連翹湯
治瘡疹壯熱小便不通諸般瘡癤丹毒膀風
連翹　瞿麥　荊芥　木通　當歸　防風
赤芍藥　柴胡　滑石　蟬蛻　甘草炙各一錢
山梔　黃芩各五分
右剉細每服二錢加紫草煎溫服
熱甚加大黃更詳證加減
清凉飲子
治小兒百病變蒸客忤驚癇壯熱痰涎壅盛煩悶頰赤口乾煩渴項頸結熱頭面瘡瘍肚中熱痛
大黃　連翹　芍藥　羌活　當歸　防風
甘草　山梔仁各等分
右剉散每服二錢水半盞煎三分去滓不拘時服
益黃散
治小兒吐瀉脾虛不食米穀不化困倦力少滑腸夜起井疳虛盜汗滯頤
陳皮去白一兩　丁香二錢　訶子炮去核
青皮去穰　甘草炙各五錢
右爲末每服二錢水煎三分食前服
一方去丁香加木香
溫脾丹　張潔方
治滯頤
半夏麴　丁香　木香各一兩　乾薑　白朮
青皮　陳皮各半兩
右爲末糊丸如黍米大一歲十九二歲二十九大小加減米湯下
冰硼散　外科正宗
治咽喉口齒新久腫痛及久嗽痰火咽啞作痛
冰片五分　飛過硃砂六分　煉過元明粉
硼砂各五分
共研極細末吹搽患上甚者日搽五六次最效
赴筵散　證治準繩下同
治小兒口瘡脣緊
薄荷　黃蘗
右等分爲末入青黛少許搽之
鉛霜散
治證同上
鉛霜研　菉豆粉各半兩
右用芸薹菜自然汁調塗
甘露飲　證治準繩
治小兒胃中客熱牙宣牙齦腫爛時出膿血口舌生瘡咽喉腫痛
枳殼麩炒　石斛　枇杷葉拭去毛　熟地黃
生黃芩　山茵陳　麥門冬去心　生地黃
天門冬去心各一錢　甘草炙五分
右作一服水二鍾煎七分食後服
本事方無麥冬茵陳加山豆根犀角屑大有神效
如聖散　證治準繩下同
治小兒口瘡不能吮乳
江子一粒　硃砂　黃丹各少許
右將江子去皮研爛不去油入後二味傳紙綿上剃開小兒顖門貼在顖上如四邊起粟米泡便用

溫水洗去藥恐成瘡用菖蒲水洗其效如神

一方無硃砂

地骨皮丸 入門

治小兒肺熱口中如膠舌乾發渴小便多

地骨皮　黃芪　桑白皮　山梔　馬兜鈴各等分

右爲細末甘草膏和丸如芡實大每一丸食後噙化

冰蘗丸 良方

治小兒口瘡

龍腦少許　黃蘗　硼砂研　薄荷葉各等分

右爲細末研勻生蜜和丸如龍眼大每服一丸津液化下

瘡甚者加腦子研

加減瀉白散 直指方

治胃中客熱口臭生瘡

桑白皮　地骨皮　炙草　知母　黃芩各一錢

五味子　麥門冬　桔梗各七分

右㕮咀水煎去渣食遠溫服忌辛熱

生香膏 類要

黃蘗半錢　螺青二錢

右同研細每服一字或半錢摻患處

檳榔散 大全

治諸口瘡

檳榔　銅綠　貝母各等分

右爲細末如患乾瘡生蜜調掃之若口瘡濕則乾摻之

溫胃散 薛氏醫案下同

治脾冷涎多流滯于頤

丁香一兩　人參　半夏　肉荳蔻　白朮

乾薑　甘草各半兩

右爲末每服一錢薑水煎

薛己曰按此方治脾胃虛寒涎流不止或嘔吐腹痛之良劑也脾氣稍溫但服五味異功散

麝香散 莊氏

治小兒唇口臭爛齒斷宣露

麝　雄黃　蘆薈　龍骨各一錢　密陀僧二錢

石膽半兩生　乾蟾一枚重半兩者入瓶燒存性

右合研令極勻細用綿子纏筯頭上以鹽礬漿水輕輕洗過然後上藥

葵根散 保幼大全下同

治小兒緊唇

葵根一兩燒灰　烏蛇燒灰　黃蘗爲細末

鼈甲燒灰各半兩

右用半錢猪脂少許和塗唇上時時用

髮灰散

治小兒口傍瘡久不軟

亂髮燒灰　故絮灰　黃連去鬚土　乾薑各等分

右爲末每少許傅上不過三次愈

七味白朮散

治小兒吐舌弄舌飲食所傷脾胃虛弱致生馬牙

人參　白茯苓　白朮　藿香葉　木香　甘草

乾葛

右水煎量兒大小與之

五倍子散 證治準繩

治牙齒搖及外物所傷諸藥不效欲落者

川五倍子　乾地龍去土微炒各半兩

右爲細末先用生薑揩牙根後以藥末傅之五日內不得咬硬物如齒初折落時熱貼齒槽中貼藥齒上即牢如故

導赤散 薛氏醫案下同

治小兒虛熱咬牙及小腸經熱咽喉作患

生地黃　朮通　甘草各等分

右爲末每服一錢入淡竹葉水煎

柴胡清肝散

治小兒肝經實熱咬牙及風熱致生喉痹

柴胡　黃芩炒　人參　川芎　山梔炒各一錢

連翹　甘草　桔梗各五分

右水煎服

瀉白散

治小兒肺經實熱咬牙致生喉痹

桑白皮炒黃　地骨皮　甘草炒各等分

右爲末入粳米百粒水煎

異功散 錢氏

治小兒胃經虛熱咬牙

人參　白朮　茯苓　甘草炒　陳皮各等分

右爲末水煎服

加味逍遙散 薛氏

治小兒夜間咬牙風熱相搏致生喉痹

當歸　甘草炙　芍藥酒炒　茯苓　白朮炒

柴胡各一錢　山梔炒　牡丹皮各七分

右水煎服

桃紅散（保幼大全）
治小兒牙癰腫爛膿血
硃砂一錢研水飛　菉豆粉一兩　硼砂半錢
片腦　麝香各一字
右爲末每用一字傅患處或揩貼之

立效飲（蓋治準繩下同）
治小兒牙根舌上發瘡作痛致言語飲食不便
淨黃連一兩　北細辛去葉二錢半　元明粉二錢
右細剉或曬或焙爲末仍同元明粉乳鉢內杵勻
每用一字乾點患處或以一錢新汲井水調塗瘡
上兒小者畏苦不肯點嚥用蜜水調敷患處令其
自化

咽痛茶清調下
黃金散
解口內舌上瘡毒及治痘瘡後目生翳膜
黃蘗用生蜜潤透烈日曬乾再塗蜜曬凡十數次
粉草各一兩
右剉研爲細末
治口瘡用藥末乾點患處或用麥門冬熟水調點
舌上令其自化
若痘瘡後目生翳膜湯泡澄清無時頻洗仍投糖
煎散柿煎散二藥

天竺黃散
治上焦風熱口鼻生瘡兩目赤腫咽膈不利痰涎
壅滯氣不通暢驚搐煩悶神思昏迷
天竺黃　鬱金無山梔仁代　茯神去皮根
甘草各半兩　硼砂　牙硝　白芷　川芎
殭蠶　枳殼麩炒微黃各二錢半　硃砂飛二錢
麝香一字　蟬殼十五枚洗去泥土嘴足
右除硼砂牙硝硃砂麝香四味乳鉢細杵餘九味
焙乾爲末同入乳鉢內再杵勻每服半錢或一錢
溫薄荷湯無時調服或麥門冬湯

香附散（袁氏方）
治齒不生
香附揀淨刮去皮　沉香各一兩　雄鼠糞燒灰
乾蟾燒灰　檳榔各半兩
右件搗羅爲細末用羊髓四兩煮爛和成膏如黍
米大每服十粒麝香湯下量兒大小加減

清胃散（薛氏）
治胃火牙痛或連頭面青粱積熱致生喉痹
升麻五分　生地黃　牡丹皮　川黃連炒
當歸各三分
右水煎服加柴胡山梔卽加味清胃散
薛己曰愚按前方治脾胃實火作渴口舌生瘡或
唇口腫痛齒齦潰爛煩面或惡寒發熱或重
舌馬牙吐舌流涎等證子母並宜服之若因脾胃
氣虛寒涼尅伐或虛熱上行口舌生瘡弄舌發熱
飲食少思或嘔吐困睡大便不實流涎齦爛者用
五味異功散

藥本散（證治準繩下同）
藥本　白附子　川芎　莽草各半兩並末次用
青黛　蘆薈　麝香各一錢研細
右件都再研勻每用一字塗揩患處
雄黃丸
治小兒牙齒黑蛀氣息疼痛
雄黃二錢　麝香半錢
右爲細末軟飯和爲梃子安在牙內

齒斷腫痛方（千金翼）
生地黃　獨活各三兩
右二味切以酒漬一宿含之

又方（證治準繩下同）
治齒根腫
松葉一握　鹽一合　好酒三升
右三味煎取一升含之

又方
治齒根空腫痛困斃無聊賴
獨活四兩　酒二升
右二味于器中漬之煻火煖之令煖稍稍沸得半
去滓熱含之不過四五度

又方
治齒斷疼痛
杏仁一百枚去皮尖及雙仁者　鹽末方寸匕
右二味以水一升煮令沫出含之味盡吐却更含
不過再三差

聖惠蝦蟆散
治小兒齒痛風齲連頰微腫
乾蝦蟆一枚　青黛　柑子皮　細辛　白雞糞
薰黃各一分　麝香細研　乾薑炮製剉各半分
右件藥搗細羅爲散都研令勻以薄綿裹少許內
齲齒孔中日一易之

又方

白附子　藁本　細辛　芎藭　莽草各一兩

右件藥搗細羅爲散以薄綿裹少許著齲齒上

又方

治小兒齲齒風疼及蟲蝕疼痛

乾蝦蟆一枚燒灰　青黛一分　蘆薈半分

右件藥同研令細以生地黃熬成膏塗于齒上

又方

治小兒風齲齒痛及蟲蝕疼痛黑爛

青黛細研　雞糞白燒灰　藁本　北細辛

雄黃細研各一分　麝香少許細研

右件藥搗羅令細同研令勻旋取少許傅于齒上

聚寶黃龍散要訣

治齒齗疳蝕有竅子不合者

龍實龍骨中有之深黃或淡黃色緊掬人舌者是

白礬灰　蝸牛殼　南粉　牛黃各一錢

右五味爲末每用少許貼竅子內時時用之

黃連石膏湯明醫雜著

治小兒齒腫流涎腮腫馬牙主陽明之熱

升麻　川芎　白芍藥　半夏炒各七分　乾葛

生甘草　防風　黃連酒炒各五分　石膏煅

白朮各一錢　白芷三分

右水煎每服二錢若能漱藥者則含藥漱而吐之

漱藥不用白朮半夏

苦參散證治準繩

治小兒牙宣齒縫出血

苦參末一兩　白礬灰一錢

右爲末一日三次揩牙上立驗也

牛蒡散養生必用

治小兒牙病

牛蒡子炒香一分　乳香一錢

右爲末入白麵少許溫水調塗

龍腦飲子良方下同

治小兒脾熱弄舌

甘草炙　大梔子炒　藿香葉　石膏　縮砂仁

瓜蔞各等分

右爲末蜜水調服不拘時

地黃膏

治同上

鬱金皂角水煮切焙　豆粉各半兩　炙草一分

馬牙硝研一錢

右用生地黃汁蜂蜜對合熬成膏和藥每服兩皂子大并治重舌用熟水含化或鵝翎掃口內

溫脾散薛氏醫案下同

治小兒心脾虧損弄舌

訶梨勒皮　人參去蘆頭　白朮　木香各一錢

黃芪剉　白茯苓　藿香　陳橘皮湯浸去白焙

桔梗去蘆頭各二錢

右件搗粗羅爲散水煎不計時候量兒大小溫服

四君子湯

治小兒吐舌胃經虛熱作渴飲湯

人參　白朮　茯苓　甘草炙各五分

右水煎服

人參安胃散

治小兒胃虛風熱口角流涎或頤頰患腫吐舌弄舌

黃芪二錢　人參一錢　陳皮去白　生甘草

炙甘草各五分　白芍藥七分　白茯苓四分

黃連二分

右爲粗末每服二三錢水煎五沸去渣溫服

人參知母散大全

治大病未已用藥後弄舌

知母一兩　藍葉半兩　人參去蘆半兩　釣藤

川升麻　乾葛　黃芩各一分

右爲細末每服一錢水八分入竹瀝三兩滴煎至五分去滓無時溫服

硝黃散證治準繩下同

治風熱上攻舌硬腫大不消

風化矾硝　眞蒲黃各半兩

右蒲黃曬乾爲末同矾硝乳鉢內細研勻每用一字或半錢揩舌上下

綠袍散

治重舌及滿口內外瘡毒咽膈不利

薄荷葉　荊芥穗各五錢　青黛　元明粉

硼砂各二錢半　百藥煎　甘草各三錢

右剉焙爲末除元明粉硼砂在乳鉢內細杵同前藥末再杵勻用一字至半錢乾點舌上令其自化或新汲水入蜜調點舌上亦好

聖濟當歸散

治小兒脾肝心經爲濕熱風寒所中致重舌木舌或舌捲縮舒長或腫滿

當歸去蘆　白芍藥　人參　甘草炙　桔梗
陳皮各一錢
右㕮咀煎五分時時少服

羌活散
治重舌木舌及舌上生瘡
人參　羌活　赤茯苓　柴胡　前胡　川芎
獨活　桔梗　枳殼　蒼朮　甘草各一兩
右剉每服二錢水一盞薑二片薄荷三葉煎七分
無時服

牛黃散
治脾臟積熱令舌絡微緊時時弄舌
牛黃研　硃砂研飛　麝香　天竺黃並細研
蠍梢　釣藤俱研末各一分
右件一處研勻每服一字新汲水調下

天竺黃散
治小兒上焦極熱致生重舌木舌鵝口重齶并舌
口上生瘡
天竺黃研　鬱金　山梔　白殭蠶炒去絲嘴
蟬殼去土　甘草各等分
右爲末一歲半錢熟水薄荷湯皆可服不拘時

硃砂膏
治同上
硃砂飛五錢　牙硝　硼砂　元明粉各二錢半
麝香一字　金箔　銀箔各十五片　白附子
枳殼麩炒微黃各三錢　川芎　粉草各四錢
人參去蘆　黃芩　薄荷葉各二錢
右剉爲末摻口內

玉露飲
治小兒木舌腫硬不能乳食
寒水石中有細紋手可碎者　石膏各一兩
甘草曬乾天陰火焙三錢
右爲細末每服半錢至一錢溫湯無時調服

百解散
治小兒木舌
乾葛　升麻　赤芍　黃芩　麻黃製　薄桂
甘草各等分
右碎水煎無時溫服
風熱甚加薄荷同煎

五和湯
治木舌
當歸酒洗　赤茯苓去皮各半兩　炙草　大黃
枳殼水浸潤去穰剉片麥麩炒微黃各七錢半
右水煎無時溫服

金朱飲
治驚壯熱傷寒伏熱上焦虛熱重舌口鼻生瘡赤
眼等證
川鬱金剉皂莢水煮焙乾佳　天竺黃　炙甘草
馬牙硝各半兩　硃砂一分研　蟬殼十四個
麝香少許
右爲末每服半錢至一錢蜜湯調下

砂硝散聖惠
治小兒木舌
砂硝一兩　眞紫雪五錢　食鹽二錢半
右爲細末每服五分入竹瀝三兩點用白湯調塗
舌上嚥津無妨

烏魚散張渙
治小兒重舌
烏魚骨一兩　蜣螂燒灰　蒲黃炒各五錢
枯白礬二錢五分
右爲極細末用雞子黃調塗舌下嚥津無妨

當歸連蔥湯準繩
治小兒心脾有熱致生重舌
當歸尾　連蔥　川白芷各三錢　大黃煨
甘草各一錢
右㕮咀用水一盞煎食前服

加減三黃丸千金翼
治舌上黑有數孔出血如涌泉
戎鹽　黃芩　黃蘗　大黃各五兩　人參
桂心各二兩　甘草一兩炙
右七味末之煉蜜丸如梧子每服十丸日三服仍
燒鐵而烙之

鐵粉散保幼大全下同
治小兒喉痹腫悶
鐵葉粉一分　硼砂一分　生白礬半兩
右爲末每服半錢冷水調下連二三服

蛇蛻散
治喉痹腫悶
蛇蛻一分　白梅肉炒一分　牛蒡子炒半兩
生甘草一分
右爲散每服一錢匕綿裹湯浸少時含咽津汁小
兒吮之

定命散
治小兒練喉乳鵝等病
川大黃炒　黃連去鬚　直白殭蠶炒去絲嘴
生甘草各半兩　五倍子一分　臘粉五筒子
右爲細末每用一字竹葦筒子吹入喉中如毒氣攻心肺喉中生病嘶飲不得者以乳汁調藥一字雞羽蘸之深探入喉中得吐者活不吐者死
犀角散
治小兒馬喉痹其候如喉痹更加連咽項頷頰腫甚咽喉閉塞但數數噴氣此證極惡
射干　桔梗各三分　馬蘭根一錢　甘草炙
川升麻　犀角屑各半兩
右爲粗末每服錢半水一盞入竹葉五片煎至六分去滓入馬牙硝半錢攪勻細細含嚥
綠雲散
治小兒口瘡喉痹馬喉鵝乳重舌木舌一切咽喉之疾
螺青　盆硝　生蒲黃　生甘草各等分
右爲細末每服一錢生薑白然汁調細細含嚥若已閉塞不通者用葦筒入藥吹入喉中
如聖湯
治咽喉一切諸疾
甘草二兩　桔梗去蘆一兩
右爲粗末每服一大錢水一盞煎去滓放溫時時呷煎六分
龍石散
治同上
寒水石煅通赤一分　朱砂研水飛二分半
腦子研半分
右爲細末每用少許擦患處病在咽喉者吹入喉內細細嚥津日五七次臨臥一兩次用妙
如聖圓
治同上
川大黃末一分　白礬末一分　馬屁勃末一分
蝸牛十四箇　陳白梅肉十分
右十五月五日午時取蝸牛以白梅肉同研爛入藥和丸如棟子大每用一丸綿裹含化嚥津若病重不能開口即研藥作末葦筒吹入喉中滴水三兩點送之或以淨水磨藥灌之立瘥
通關散
治同上
枯白礬　雄黃水飛　黎蘆微炒　殭蠶去絲嘴
猪牙皂角去皮弦
右各等分爲細末每用一字鼻內搐之甚者葦筒吹入喉中涎出或血出立愈
金露膏
治同上
寒水石煅通赤四兩研　雄黃一兩研水飛
硼砂二錢研　甘草末四錢　腦子一字研
右拌勻煉蜜杵丸桐子大食後含化一圓
射干湯
治同上
射干　川升麻各一兩　馬牙硝　馬屁勃各半兩
右爲末每服一錢水一盞煎至六分去滓溫服
荊芥桔梗湯
治喉中生瘡
荊芥穗　桔梗去蘆　生甘草　牛蒡子炒各等分
右爲細末每用一錢水一小盞煎至六分去滓溫服之
又方
治同上
桔梗去蘆　生甘草　牛蒡子炒各一兩
右爲粗末每用一錢水一小盞入青鹽少許煎至六分去滓放溫時時呷
又方
治繼喉風寒氣不通
蛇蛻炙令焦黃　當歸去蘆焙各等分
右爲末溫酒調下
又方
治同上
萆麻子去皮二箇　砒硝二錢
右爲末新水調服未效再服
又方
治同上
生天南星　生白殭蠶去絲嘴各等分
右爲末每服一字或半錢生薑白然汁調下
又方
治咽喉腮頰悶
黃蘗　寒水石各等分
右爲末量腫處以薄荷水調藥用雞翎掃上乾即再掃

又方

治小兒喉痹

桂心　杏仁各半兩

右二味爲末以綿裹如棗大含咽汁

張銳雞峯方

治齒間出血

苦竹葉不拘多少

水濃煎取汁入鹽少許寒温得所含之吟即吐之

通氣散

治小兒誤吞金銀銅鐵錢物在喉中不下

鵝毛一錢燒灰　磁石皂子大一塊煅醋淬研飛

象牙一分燒存性

右爲細末每服半錢新水調下

大聖玉屑無憂散

治諸物梗喉及一切咽喉諸病解毒治百疾立見效驗

元參　貫衆　白茯苓炒黄　縮砂仁　滑石

制芥　川黄連去鬚　山豆根　甘草炙　硼砂

寒水石火煅埋土中出火毒各三兩

右同爲末每用半錢抄口中新汲水一口嚥之

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百三十六卷目錄
醫部彙考四百十六
小兒唇口齒舌喉病門二
單方
鍼灸
醫案
小兒胷背手足病門
錢乙小兒直訣總論總論背　行遲
萬氏片玉心書總論總論背　行遲　鶴膝
魯伯嗣學嬰童百問總論總論背　總論鶴膝行遲
薛氏保嬰撮要總論總論背　鶴膝風
樓英醫學綱目　行遲
尊生書總論
王肯堂證治準繩總論　總論背　行遲
李梴醫學入門手足
陳治幼幼近編總論　總論背　行遲
方地黃丸　紅內消散　加味地黃丸　加減
拳歷丸　總論丸　積熱防風丸　大黃丸
百合丹　生乾地黃丸　松蕊丹　虎骨散　鹿茸丹　紛
羊角丸　柴胡飲　澡浴方　左經丸　續命丹
皮散藥方　應藥方　降氣消痰湯　百合丹
二活散　虎脛丸　加味熟地黃丸　葱苡
丸　除痛散　五加皮散　調元散　地黃丸
鍼灸
醫案

單方

小兒緊唇頭垢塗之方附後

小兒唇緊蟬蛻研末猪脂和傅之千金方

又松脂炙化貼之聖惠方下同

又赤莧擣汁洗之良

小兒緊唇脾熱唇瘡並用烏蛇皮燒灰酥和傅之

小兒腫唇桑木汁塗之即愈

小兒緊唇葵根燒灰酥調塗之

又雞矢白研末傅之有涎易去

又用馬芥子搗汁驟濃揩破頻塗之崔氏纂要方

又人屎灰傅之頓如方

又用頭垢枯礬研勻猪膽調敷普濟方

小兒口瘡黃葵花燒末傅之肘後方

治小兒口瘡不得吮乳用大青十八銖黃連十二銖咬咀以水三升煮取一升二合一服一合日再夜一（千金方）

又以蜜二升甘草如指大三十臘月猪脂一斤合煎相得含如棗大稍稍咽之日三（下同）

又以礬石如雞子大置醋中塗兒足下二七遍愈

治小兒燕口兩吻生瘡燒髮灰和猪脂傅之

治小兒口下黃肌瘡取殺羊髭燒作灰和臘月猪脂傅之角亦可用

治口傍惡瘡亂髮灰胡粉乾薑黃連乾薑四味等分爲散以粉瘡上不過三徧

治小兒口中涎出以白羊屎煩內口中

又以東行牛口中沫塗口中及頤上又桑白汁塗之瘥

小兒口緊不能開口飲食不語即死蛇蛻燒灰拭淨傅之

治小兒鵝口不能飲乳用鵝屎汁瀝兒口中

又用黍米汁塗之

又取小兒父母亂髮淨洗纏桃枝沾取井花水東向向日中以髮拭口得口中白乳以置水中七過瀝洗三朝作之

治小兒心熱口內生瘡重舌鵝口用柘根刨五升無根弓材亦佳以水五升煎取二升去滓煎取五合細細服之數次良

治口瘡白漫漫先以父淨髮拭口次取桑汁塗之

小兒流涎胃腸有痰新桑根白皮搗自然汁塗之甚效乾者煎水聖惠方下同

小兒鵝口滿口白爛貝母去心爲末半錢水五分蜜少許煎三沸緻淨抹之日四五度

小兒吻瘡經年欲腐葵根燒研傅之

小兒口噤病在咽中如麻豆許令兒吐涎不能乳食葛蔓燒灰一字和乳汁點之即瘥

小兒鵝口重舌甑帶燒灰傅舌下

小兒口瘡赤葵莖炙乾爲末蜜和含之

燕口吻瘡胡粉炒一分黃連半分爲末傅之普濟方下同

小兒口瘡寒食麵五錢硝石七錢水調半錢塗足心男左女右

又用釜底墨時時搽之

又用大栗黃熟日日與食之甚效
小兒口瘡糜爛黃丹一錢生蜜一兩相和蒸黑每以雞毛蘸搽甚效
小兒口瘡及百日內口瘡用腕蠶蛾爲末入麝香少許摻之
小兒流涎脾熱也用鹿角屑末米飲服一字
小兒鵝口滿口白爛枯礬一錢朱砂二分爲末每以少許傳之日三次神驗
小兒流涎用牛噍草絞汁少少與之服
小兒燕口兩角生瘡髮灰三錢飲汁服
小兒口瘡五月五日蝦蟆炙研末傳之即瘥
小兒鵝口桑皮汁和胡粉塗之
小兒口瘡用勃臍燒存性研末摻之
小兒口瘡白礬裝入五倍子內燒過同研摻之
又用蕉皮燒研摻之
又以黃連蘆薈等分爲末每蜜湯服五分走馬疳入蟾灰等分青黛減半麝香少許
小兒口瘡風疳用柳木蛀蟲屎燒存性爲末入麝香少許搽之雖木亦可
小兒赤口淡竹瀝點之或入乳
小兒口瘡不能吮乳蜜陀僧末酥調塗足心瘡愈洗去蔡醫博方也
口鼻急疳數日欲死以藍澱傳之令遍日十度夜四度
小兒口瘡細辛末酥調貼膀上
治小兒口瘡通白者及風疳瘡蝕透者以白殭蠶炒令黃色拭去蠶上黃肉毛爲末用蜜和敷之去風熱也
小兒吻瘡竹瀝和黃連黃檗黃丹傅之
小兒口瘡羊脂煎慈菇根塗之
治赤白口瘡小兒失驚即生口瘡用生白礬一錢噙歠之從瀝頓涎立效
治小兒疳口瘡用天南星一個去皮爲末好酢調攤在紙上男左女右貼在脚心底以帛繫定三日外取了以溫水洗盡脚下藥
小兒鵝口重舌口瘡用青黛砂硝各一錢片腦二分半蜜調敷仍視舌上有膜如橘子則哭聲不絕隨以指摘破即愈
小兒口疳人中白煅黃檗蜜炙焦爲末等分入冰片少許以青布拭淨摻之累效
小兒口瘡羊乳結濾入含之數次愈
小兒鵝口馬牙硝擦舌上日五度
小兒口中白屑名曰鵝口用砂硝兒茶各二分硼砂一分爲細末用蠟葉揭自然汁調搽兒口內即安井
治馬牙
小兒口瘡糜爛生硫黃水調塗手心足心效即洗去
小兒流涎脾熱有痰兒菜子仁半兩半夏湯泡七次一錢二分爲末薑汁丸麻子大每水下五丸
小兒口瘡鐵鏽末水調傳之
嬰孩鵝口白厚如紙用坯子胭脂以乳汁調塗之一宿效男用女乳女用男乳
小兒諸口瘡以香白芷銅綠等分爲末摻上立效

又以白錫燒灰傅之
又以湯瓶內堿爲末臨臥時以好酢調於脚心底明書個十字立驗
治口氣熱臭用乾甜瓜子去殼研細蜜少許調成膏食後含化或傅齒上
小兒口舌病小兒口瘡難用藥以天南星取中心龍眼大爲末酢調塗兒脚心甚妙
又用白礬或吳茱萸爲末酢調塗脚心亦效
小兒口瘡黃檗青黛等分片腦少許爲末竹瀝調敷之乳母宜服瀉心湯涼膈散
小兒口瘡用薄荷汁拭口內西瓜水徐徐飲之
治小兒齒落久不生以牛屎中大豆二七枚小開豆頭以注齒根處數度即生
又取雄鼠屎二七枚以一屎拭一齒根處盡此上二十一日即生雄鼠屎兩頭尖者是
治牙齒根搖欲落以生地黃大者一寸綿裹嚙牙上嚥瞧汁汁盡去之日三即愈可十日含之更不發也
治蟲蝕齒根肉黑燒腐棘取瀝塗之十遍雄黃末傳即愈若齒黑者以松木灰揩之細末雄黃塗日日再塗之七日愈油猪肉神效
治小兒齒齲切白馬懸蹄可孔塞之不過三度
治蟲蝕齒疼痛閉氣細書日南方赤頭蟲飛來入某姓名裂齒裏今得蠍蟲孔安置耐居上急急如律令小紙紙內著屋柱北邊蠍蟲孔中取水一盃禹步如法去還誦上文以水沃孔以淨黃土泥之勿令泄氣永愈

小兒齒遲止旦取屎坑中竹木刮塗之即生（寧壽方同）

一取路旁道即栢葉十齒路點三七下其齒自生神效

小兒牙疳出血大鯽魚一尾去腸留鱗入當歸末泥固燒存性入煅過鹽和勻日用

小兒齒痛以皂莢炙去皮子搗末取少許著齒痛上差

小兒齲齒以松栢脂捏銳如錐柱齲孔內須臾齲蟲綠松脂出即差

小兒牙疳雄黃一錢銅綠二錢（陳氏小兒方）為末貼之

小兒口疳鼠爛氣臭血出鉛白霜銅綠各二錢白礬豆許（古今錄驗方）為末揩之

小兒風蚰牙漐煎郁李仁水含之（日華子）

治裂齒以腐棘針二百枚以水二升煮取一升含漱之日四五差（千金翼方）

小兒走馬牙疳蛀蝕口鼻乾蚵蛾黃泥裹固煅過黃連各二錢半青黛一錢為末入麝香少許和研傅之（聚寶方）

治小兒牙疳用煉信青黛輕粉各一錢麝香五分同細末用小油調薄攤紙上用木鍱鍱實收起每用臨臥以漿水洗淨印乾可瘡口大小以藥紙封之至曉去藥紙嗽淨勿令嚥下大者不過三上必效（外科精義）

小兒齒不生用雄鼠屎兩頭圓者三七枚每日一枚拭其齒勿食鹹酸或入麝香少許尤妙（小品）

初生小兒生馬牙以熟針挑去白點須有血出為妙用白綿拭去血薄荷煎湯摩上好京墨頻塗之即愈（聚寶方）

小兒齒疳鴨背膿羹一錢匙上煅紅研香少許研勻傅齒上立效（孔氏雜記）

小兒牙齒不生用黑豆三十粒牛糞火內燒令煙盡研入麝香少許先以針挑破血出以少許揩之不得見風忌酸鹹物（聚寶方）

走馬牙疳以小便盆內白屑取下入甕瓶內鹽泥固濟煅紅研末入麝香少許貼之（許學士方）

齒縫出血用蚯蚓糞水和作團以火燒令極赤末之如粉以臘月猪脂傅斷上日三即差（聖惠方）

小兒齒不生用雄雞糞各十四顆焙乾同研如粉入麝香少許仍先以針挑破損齒脚下血出將散子敷之生齒神效（普濟方）

走馬牙疳小兒口內生瘡牙齦潰爛齒黑欲脫或出血臭氣白芷五錢馬牙硝銅青各一錢麝香一字末之敷口角擦齒上仍服蟾酥丸又用燒蚵蛾黃連青黛各等分入麝香少許為末敷之（勿藥元詮方下同）

治牙疳用人腳上皺垢焙黃色研末上二次效

小兒齒裂取死曲蟮末敷痛處即止（本草下同）

齒縫出血用童子小便半升分為兩三次含之冷即吐了

走馬牙疳用婦人尿桶中白垢火煅一錢銅綠二分麝香一分和勻貼之尤有神效（本草綱目下同）

又用鯽魚一個去腸入礬一分生地黃一兩紙包燒存性入枯白礬麝香少許為末摻之

治小兒牙痛用大硼砂研細水化雞羽掃（證治準繩下同）齒根空腫痛燒松柏槐枝令熱柱病齒孔須臾蟲綠枝出

小兒風齲齒痛及蟲蝕疼痛黑爛以郁李根白皮五兩剉以水一大盞半煎取一盞熱含冷吐之當吐蟲出

一以雞舌香半兩以水一中盞煎至六分去滓熱含冷吐

齒齦腫痛常以白鹽末封齒斷上日三夜二一每日扣齒三百下日一夜二即終身不發至老不病齒

又以風化石灰一塊大火中煅通赤取出放冷為末每用少許旋入麝香少許傅牙根上（保幼大全下同）

小兒齒齲以黃連為末入麝香研勻貼病處

一以馬鞭草煎湯含漱之

治牙齒宣爛臭有血以皂角一挺羊脛骨一條煅為末如常揩齒用之（千金方下同）

治重舌舌強不能收唾以鹿角末如大豆許安舌下日三四度亦治小兒不能乳

又取蛇蛻燒末以雞毛醮醇酢點藥掠舌下愈重齲亦可用

治小兒重舌取田中蜂房燒灰酒和塗舌下愈

又衣魚塗舌上千金翼云衣魚燒灰傅舌上愈

又竈月下黃土末苦酒和塗舌上

又以二家屠肉切令如指大摩舌上兒立能啼

又以赤小豆末酢和塗舌上

又燒箕灰傅舌上

又用黃檗以竹瀝漬取細細點舌上良

小兒重舌出涎驢乳豬乳各二升煎一升五合服

小兒舌瘡飲乳不得白蜜和雞子黃酢中塗兒足底

二七日愈
治小兒舌上瘡蜂房燒灰屋閭塵各等分和勻傅之
良
又桑白汁塗乳上與兒飲之
又羊骨蹄中生髓和胡粉傅之
又舌腫强滿滿口含糖酢良
又飲羖羊乳即瘥
小兒重舌皂角刺灰入矾硝或腦子少許漱口滲入
舌下涎出自消聖惠方下同
小兒木舌長大滿口鯉魚切片貼之以帛繫定
小兒重舌腫木用伏龍肝末牛蒡汁塗之
小兒木舌黃蜀葵花爲末一錢黃丹五分傅之直指方
小兒重舌木蘭皮一尺廣四寸削去粗皮入酢一升
漬汁噙之子母秘錄下同
小兒重舌蜣螂燒末唾和傅舌上
小兒重舌嚼粟米哺之
小兒重舌黃丹一豆大安舌下
小兒舌瘡胡粉和猪髑骨中髓日三服之食醫心鑑
初生小兒有白膜皮裹舌或遍舌根可以指甲刮破
令血出以燒礬末半綠豆許傅之若不摘去其兒必
啞嬰和衆生寶方
小兒重舌用三稜針于舌下紫筋刺出惡血即愈又
用竹瀝調蒲黃末敷舌上效幼幼近編
小兒生下舌下有膜如榴子連于舌根令兒語言不
發可摘斷微有血如血不止燒髮灰摻之又用白礬
灰釜底墨酒調用此瘡名七星瘡或以細針撥之瘡瘍全書

小兒舌瘡野薔薇根剉碎每用一匙頭以水二盞煎
至六分去滓熱含冷即吐了治口舌生瘡久不瘥張難峯方
治木舌用紫雪二錢半竹瀝半合和之時時抹入口
中自消局方
一用百草霜滑石芒硝爲末酒調傅證治準繩下同
小兒舌上瘡燒葵根爲灰每日少許傅之
小兒重舌用眞蒲黃微炒紙鋪地上出火氣研細每
挑些摻舌下更以溫水醮熟帛裹指輕輕按之按罷
然後以藥摻之不過三次愈
小兒重舌燒烏賊魚骨細研和雞子黃傅喉及舌上
又取亂髮灰細研以半錢傅舌下日不住用之
小兒舌腫鮮鯽魚切片貼之頻換總微論
重舌鵝口桂末和薑汁塗之
治小兒卒毒腫著喉頸肚熱妨乳用升麻射干大黃
各一兩㕮咀以水一升五合煑取八合一歲兒分三
服以滓敷腫上冷更暖以敷大兒以意加之千金方
治小兒喉痹桂心杏仁各半兩爲末以綿裹如棗大
含咽汁
小兒咽腫痹痛用鯉魚膽二七枚和竈底土以塗咽
外立效千金方
小兒喉痹棘鍼燒灰水服半錢聖惠方
小兒咽腫杏仁炒黑研爛含嚥普濟方下同
小兒咽腫牛蒡根搗汁細嚥之
稻芒入喉中取鵝涎灌之立出瘡瘍全書下同
釣魚針勾入喉中難出先用木針撐口次以糯米珠
如算盤珠樣穿線中扯直即出

小兒喉痹腫悶以露蜂房燒灰研細末每一錢乳汁
調服俗幼大全下同
一以蛇脫皮燒灰研細末每一錢乳汁調服
一以川升麻令含一片
一以韭一把杵爛熬敷上冷即易
一以白礬棊子大含之
一以陳白梅一個取肉裹白殭蠶一枚含咽津
一以地龍一條研爛內雞子白和勻便傾入喉咽中
良
一以繩纏扎手大指屈于節上針挑刺出血即瘥
小兒喉痹咽腫出氣不快以鼠粘子二兩炒焦甘草
半兩炙黃同爲細末每服一錢用新汲水調下更入
蜜少許
小兒喉痹不能語以大豆煎汁放冷含之
一以黿膽少許生薑薄荷汁化服得吐便愈
一青魚膽亦得收得以青黛釀之
小兒纏喉風束氣不通以白殭蠶二個去絲爲末生
薑自然汁調更入蜜少許拌勻分二三服或只用半
錢一字旋調服之
纏喉乳鵝喉痹咽喉頷項腫悶閉塞氣不得通者令
患人先呷好麻油少許後以茶葉燒灰細末水調下
半錢立效大者增之
一方以馬銜一具水二盞煎至半量大小分服
治懸癰忽倒以白礬灰鹽各半兩研細筯頭點上撥
正亦治腫悶日七八遍
治咽喉腮頰腫悶以蒜塞耳鼻中
又以馬鞭草根截去兩頭取在中者搗汁服之

小兒咽喉腫塞悶以桑上壇螂窠一兩燒灰馬屁勃半兩同研勻細煉蜜丸桐子大三歲煎犀角湯研下三圓大者加之

小兒飲乳不快覺似喉痹以沙牛角燒刮取灰塗乳上吮兒嚥下卽差

治小兒悞吞針刺喉中以磁石如棗核大磨令光鑽作竅子以線穿繫定令兒含之針則自出若悞吞錢者用棗大

治悞吞竹木入喉燒秤錘通赤漬酒飲之

治悞吞金銀銅鐵錢物在喉中不下以南天燭根燒灰研細熟水調服一錢立下

治悞吞金銀銅鐵錢等物在腹內不下以石灰一皂子許硫黃半皂子許同研爲末酒服之

又以胡粉一兩水調分服量大小加減

治魚骨鯁喉不下以硇砂少許口中咀嚼嚥之立下

又以故魚網覆頸項則下未可煮汁飲之立下

又以鷄鴨毛燒灰水調服量大小與

治一切諸般骨刺竹木簽刺梗喉不下干臘月取鱖魚膽北簷下陰乾每用少許酒煎化溫呷得逆便吐梗乃隨出未吐再服其梗刺雖嚥在腹內久痛黃瘦者服之亦出極妙無鱖魚取青魚鯉蠶魚膽亦可并

治喉痹

治桃李果梗以狗頭煮湯摩頭上

治諸物梗喉以瞿麥爲末水調半錢或一錢服

治一切珠璫錢等物梗喉以弩弓銅牙燒赤內水中放冷飲之

鍼灸

千金方曰小兒重舌灸行間隨年壯穴在足大趾岐中又灸兩足外踝上三壯

古今醫統曰小兒乳鵝鍼少商一分灸卽一壯少商在大指端內側去爪甲角如韭葉白肉際宛宛中肺脈所出爲井木單乳鵝鍼合谷三分灸則三壯合谷一名虎口手大指次指岐骨間陷中手陽明大腸脈所過爲原

小兒五六歲不語者心氣不足舌本無力發轉難灸心俞穴三壯在五椎下兩旁各一寸半陷中

小兒急喉痹天穴一穴灸一壯在結喉下三寸耳骨間

幼幼近編曰凡小兒患喉蛾急以銀針挑破髮頂上出血卽愈

醫案

萬氏幼科發揮曰一兒患口舌生瘡醫用藥服之搽之者皆苓連知檗類無效予曰心熱所爲苦入心而反助其熱宜無效乃作洗心散與之一服而安

予甥男滿口生瘡咽喉脣舌皆予用蘗連一錢朱砂白礬五分鼠婦焙乾三分共爲研細敷之立效乃奇方也

薛氏醫按曰一小兒弄舌發搐手指不冷余謂肝脾虛熱用異功散加升麻柴胡而愈後傷乳腹服服寇代作瀉弄舌手指發熱審乳母肝火與小柴胡湯加升麻白朮治之母子並愈

一小兒乳食過多患吐瀉用大劑異功散加柴胡升麻母子服之而愈後因驚服至寶丹之類發搐弄舌幾至慢驚余用六君子湯加白附子服之而愈

一小兒吐舌發熱飲冷額鼻黃赤吐舌流涎余謂心脾實熱用導赤瀉黃二散而愈後復作別服清熱等藥更弄舌余用異功散加釣藤鉤而安又用六君子湯全愈

證治準繩曰一小兒喉間腫痛驚悸飲水服驚風降火之藥益甚他醫仍欲攻風痰余曰驚悸飲水心經虛證蓋胃爲五臟之本先用五味異功散以補胃加桔梗甘草以消毒諸證頓退後用牛蒡子湯加柴胡而愈

一小兒發熱飲冷大便黃色手足並熱不能吮乳視口內無患惟其喉間則哭此喉內作痛乃脾胃實熱也用瀉黃清胃二散各一劑母子並服而愈後因乳母飲酒兒躁不安口內流涎仍用前二散而愈

一小兒喉間腫痛發熱咳嗽大便祕結此肝與大腸有熱先用牛蒡子湯加硝黃一服大便隨通乃去硝黃再劑頓愈審其母有肝火發熱用柴胡清肝散母子並服而痊

薛氏醫按曰一小兒喉腫作渴大便乾實右腮赤色此肺與大腸經實熱也用柴胡飲子一服而愈後因飲食停滯服峻厲之藥喉間仍腫腹中脹痛此脾氣復傷也用異功散加升麻當歸而痊

一小兒因母忿怒患前證兼咬牙呵欠余謂肝經虛

熱之證子用甘桔湯加柴胡山梔牛蒡子母服加味逍遙散而愈

一小兒嗜膏粱之味喉間腫痛痰涎壅盛服巴豆丸前證益甚口鼻出血脣舌生瘡大便不實余用犀角地黃湯解膏粱之熱用東垣安胃散解巴豆之毒又用桔梗湯而愈

一小兒喉間腫痛左腮色青赤此心肝二經之熱也用柴胡清肝散而愈後因驚服至寶丹吐痰發搐手足指冷此肝木虛而肺金乘之用補中益氣湯以補脾肺六味地黃丸以滋肝腎而痊

一小兒額間赤足心熱喉中常痛服清胃敗毒之藥余謂禀腎水不足而心火熾甚也當用地黃丸壯水之主以制陽光不悟口舌赤烈小便如痲而歿

一小兒喉間腫痛口角流涎手足並熱用瀉黃清胃二散母子服之而愈後因母大怒兒憎寒發熱仍復流涎用柴胡清肝散加漏蘆母子服之而愈

一女子六歲喉間腫痛鼻中息肉塞熱往來小便頻數良久變白此肝疳之證先用加味逍遙散加炒黑焦龍膽草熱痒漸退乃去龍膽草佐以四味肥兒丸而愈

小兒胸背手足病門

宋錢乙小兒直訣

龜胸龜背

龜胸龜背者由兒生下風客于脊入于骨髓致成龜背若肺熱脹滿攻于胸膈即成龜胸並用龜尿點其骨節自愈其取尿法用青蓮葉安龜在上用鏡照之其尿自出

註按小兒元氣未充腠理不密風邪乘之或痰飲蘊熱于肺風熱交攻而致或坐早風入骨髓治當調補脾肺爲主若因乳母厚味辛辣而致者當兼治其母若因禀父肝腎虛熱者用六味地黃丸若禀腎氣不足者用八味地黃丸

行遲

長大不行行則脚軟胎弱也

註小兒行遲有肝腎虛長而不能行者有肝氣虛而手足拳攣者有肝腎虛而脚不能舒展者並用地黃丸滋補之

明萬氏片玉心書

龜胸龜背

龜胸者其胸高腫狀如龜樣此肺熱也加減葶藶丸主之

小兒龜胸證肺熱脹于胸加減葶藶丸服之有神功

龜背者坐臥傴僂狀如龜背由客風吹脊入于骨髓此證多成痼疾間有灸肺俞二穴第三椎骨節下兩傍各寸半腦俞穴第二骨下兩傍各寸半如此而收功者然未盡見效也以枳殼丸主之

龜背爲惡證腎風入骨髓內服枳殼丸灸法宜相繼

行遲

行遲者何也蓋骨乃髓之所養血氣不充則髓不滿骨故弱軟不能行此由腎與肝俱虛得之蓋肝主筋筋弱而不能早行腎主骨骨弱而不堅加味地黃丸主之

肝腎兩虛行不足肝主筋兮腎主骨若要二經氣血充加味地黃能助補

鶴膝

脚細者禀受不足氣血不充故肌肉瘦薄骨節俱露如鶴之膝此亦由腎虛名鶴膝節加味地黃丸主之

小兒鶴膝此屬腎虛地黃加味服却無虞

魯伯嗣學嬰童百問

龜背龜胸鶴膝行遲

聖惠論小兒龜胸者緣肺熱氣脹滿而成此疾乳母多食辛辣之物亦成此候或乳母有宿乳乳兒亦成此疾常捏去宿乳則無此證也當用聖惠龜胸丸治之

聖惠論龜背者小兒初生未滿半周强令早坐逢使客風吹脊故令背高如龜之狀也有灸法可療

又有鶴膝證錢氏地黃丸加鹿茸以補腎氣

又有行遲之證地黃丸加牛膝五加皮補骨脂及酒炙鹿茸又有五加皮散治之

又治龜胸有龜胸丸以散其熱松蕊丹百合丹治龜胸龜背丸佳羚羊角丸治五六歲不能行走

薛氏保嬰撮要

龜胸龜背

龜胸龜背法當調補脾肺爲主而以清熱消痰佐之

若因乳母膏粱厚味者當以清胃散治其母子亦服少許

鶴膝風

鶴膝風者其腿漸細其膝愈粗狀如鶴膝是以名之此因禀腎經不足外邪所乘而患之初則膝內作痛外色不變伸屈艱難若一二月間漸腫色赤而作膿者可治腫硬色白而不作膿者難治初起者用大防風湯爲主佐以益氣養榮湯成者用補中益氣湯爲主佐以大防風湯切勿用十宣流氣等藥若不潰不斂或發熱等證者須調補脾胃爲善否則必變敗證矣

楳英醫學綱目

行遲

小兒三歲不能行者由受氣不足體力虛怯腰脊脚膝筋骨軟足故不能行用眞五加皮爲末粥飲調次入好酒少許每服一栗殼許日三服效

尊生書

龜胷

龜胷乃肺熱脹滿有痰成之忌破氣發散肺虛也亦忌收澁宜降氣消痰

王肯堂證治準繩

龜胷

張氏云乳母乳兒常捏去宿乳夏常洗乳淨捏去熱乳若令兒飲熱乳損傷肺氣胷高脹滿令兒胷高如龜乃名龜胷

曾氏云此候因風痰停飲聚積心胷再感風熱肺爲諸臟華蓋居于膈上水氣犯之則肺爲之浮日久凝而爲痰停滯心胷兼以風熱內發其外證唇紅面赤咳嗽喘促致胷骨高如覆掌名曰龜胷治法寬肺化痰利膈以除肺經痰飲先用五苓散和寬氣飲入薑汁葱湯調服次清肺飲雄黃散碧玉丸如意膏爲治若投前藥愈而復作傳變目睛直視痰涎上湧兼以發搐則難治矣

龜背

坐見稍早爲客風吹脊風氣達髓使背高如龜雖有藥方多成痼疾以灸法爲要在百日內不治

行遲

張氏云凡兒生至週歲三百六十日膝骨成乃能行近世小兒多因父母氣血不足故令胎氣不强骨氣軟弱筋脈無力不能行步鹿茸丹主之會經大效

湯氏云小兒不能行治法當用錢氏補腎地黃丸加鹿茸五加皮麝香外甥黃知錄之于三歲不能行遂合此方服之有驗

李梴醫學入門

手足

手軟無力以動也所受肝弱兩手筋縮不能舒伸慧哲丸主之

脚軟行遲乃骨髓不滿氣血不充筋弱不能束骨宜腎氣丸加牛膝五加皮鹿茸五六歲不行者羊角丸三歲不能行者用五加皮一兩牛膝木瓜各五錢爲末每二錢米飲入酒少許調服有脚指蹉縮無力不能展伸者海桐散主之有鶴節風俗云鼓搥風乃腎虛精髓內耗爲風邪所襲皮膚不榮日漸枯瘁如鶴脚之節宜腎氣丸加五加皮鹿茸牛膝

陳治幼幼近編

龜胷

肺經受熱故胷高腫滿狀似龜胷也輕則瀉白散加山梔天門冬甚則百合丹切禁五辛酒麪炙煿煎炒之物

龜背

風寒客于脊髓故令背高如龜也宜二活散外灸肺腧三椎下兩旁膈腧七椎下各三五壯亦有坐早致傴僂者用六味丸加薏仁木瓜當歸肉桂

行遲

行遲屬肝腎俱虛腎主骨腎虛則髓不滿骨故骨軟不能行肝主筋肝虛則血不榮筋故筋痿不能束骨也宜虎脛丸

方

地黃丸小兒直訣下同

治腎虛解顱或行遲語遲等證

熟地黃八錢酒洗益腎水滋眞陰補血生精

山茱萸肉補腎添精　乾山藥各四錢凉而能補

牡丹皮凉腎瀉陰中之火治足少陰無汗之骨蒸

澤瀉補陰入腎經　白茯苓各三錢入壬癸

右地黃杵膏餘爲末加煉蜜丸桐子大每服二三十丸空心白湯下

薛己曰按前丸治腎經虛熱作渴小便淋祕痰氣上壅或肝經血虛燥熱風客淫氣而患瘰癧結核或四肢發搐眼目瞤動或肺經虛火咳嗽吐血頭目眩暈或咽喉燥痛口舌瘡裂或心經血虛有火自汗盜汗便血諸血或脾虛濕熱下刑於腎腰膝不利或疥癬瘡痛等證並用前藥爲主而佐以各臟之藥大抵此藥爲天一生水之劑若稟賦不足肢體瘦弱解顱失音或畏明下竄五遲五軟腎疳肝疳或早近女色精氣虧耗五臟齊損凡諸虛不足之證皆用此以滋化源其功不能盡述

紅內消散（本草綱目）

治小兒龜背

紅內消即赤何首烏

右爲末用龜尿調點背上骨節久久自安

加味地黃丸（片玉心書下同）

治小兒行遲

虎脛骨酒炙　生地黃　酸棗仁炒　桂　白茯苓　防風　當歸

煉蜜爲丸白湯下

如驚後得前證者加羌活

腎弱失音者本六味加巴戟去心石菖蒲各三錢爲丸麥冬湯下

加減葦萡丸

大黃煨　天冬去心　杏仁去皮尖另研　百合　桑白皮炒　木通　甜葦萡炒

蜜丸滾白水送下

龜胷丸（嬰童百問下同）

治小兒龜胷龜背緣肺熱氣脹滿而漸成此疾乳母多食辛辣之物亦能成此證

大黃煨一錢　天門冬去心　百合　木通去節　杏仁去皮尖炒　枳殼麩炒　桑白皮蜜炙　甜葦萡炒　砂硝各五錢

右爲細末煉蜜丸如芡實大每用一丸溫湯化服食後

枳殼防風丸

枳殼麩炒　防風　獨活　大黃煨　前胡　當歸　麻黃去節各三錢

右爲細末麪糊丸如黍米大每服十丸米飲食後服

大黃丸（證治準繩下同）

治龜胷肺熱壅滯心膈悶滿

大黃七錢半微炒　天冬焙　杏仁麩炒微黃　百合　木通　桑白皮　甜葦萡隔紙炙紫　砂硝各五錢

右爲細末蜜丸如菉豆大不時溫水研五丸量兒大小加減

幼科類萃去砂硝加石膏

百合丹

即前大黃丸加減

百合一兩　砂硝　杏仁湯浸去皮尖　桑白皮　木通　川大黃　天門冬各五錢

右爲極細末煉蜜和如黍米大每服十粒米飲送下量兒大小加減

龜胷丸

蒼术　黃檗酒炒　芍藥酒炒　陳皮　防風　山楂　威靈仙　當歸

右爲末蜜丸食後溫水下

利後加生地黃

松蕊丹

治龜背病

川大黃炮　前胡　麻黃去根節　桂心各半兩　松花洗焙　枳殼去瓤麩炒　獨活　防風各一兩

右爲細末煉蜜和如黍米大每服十粒粥飲下量兒大小加減

聖惠麻黃丸多芍藥少前胡

一方多檳榔訶皮

一方無松花有當歸麥麵和丸名枳殼防風丸

鹿茸丹

治數歲不能行

麝香　鹿茸酥炙黃　生地黃　虎脛骨酥塗炙當歸洗焙乾　黃芪剉

右件各一兩爲細末用羊髓四兩煮爛和成膏如黍米大每服十粒磨沉香湯下乳食前日三服

羚羊角丸

治小兒腎虛或病後筋骨弱五六歲不能行宜補益肝腎

羚羊角尖細而節密者錯取末　生乾地黃焙　虎脛骨敲破塗酥炙黃　酸棗仁去皮秤炒　白茯苓各半兩　桂去皮取有味處不得見火　防風　當歸　黃芪切焙各二錢半

右同爲細末煉蜜和成劑每服一皂子大兒大者

加之食前溫水化下日三四服久服取效

生乾地黃丸

治兒十歲不行

生地黃 當歸焙 防風 酸棗仁微炒 赤茯苓 黃芪 芎藭 羚羊角 羌活 甘草炙微赤 桂心各等分

右揭羅蜜丸如菜豆大食前溫酒下量兒加減

虎骨散

虎脛骨酒炙 生地黃 酸棗仁酒浸去皮炒 辛桂去皮 白茯苓去皮 防風 當歸俱去蘆 川芎 牛膝酒浸去蘆各等分

右爲極細末每服一錢半以粥飲調次入好酒二滴再調食前服日二

一方用煉蜜丸如黍米大木瓜湯下五丸或十丸

寶鑑加黃芪

三因五加皮散

治小兒三歲不能行者由受氣不足體方虛怯腰脊脚膝筋軟足故不能行

真五加皮

爲末粥飲調次入好酒少許每服一栗殼許日三服效

柴胡飲

治小兒骨熱肺脈寒長不能行骨熱痠勞肌肉消瘦

柴胡 鼈甲米醋塗炙黃色 知母 桔梗 枳殼麩炒 元參 升麻

右件各等分細剉三歲以下藥半兩水五合煎二合分二服空心食前服忌毒物服後澡浴

澡浴方

苦參 茯苓皮 蒼朮 桑白皮 白蘞各半兩 葱白少許

右剉沸水二升浸藥一兩通與兒浴溫處避風

左經丸

治筋骨諸疾手足不隨不能行步走動

草烏頭生肉白者去皮臍 木鼈去殼 白膠香 五靈脂各三兩半 蜚蠊去翅足一百枚酢煮熟當歸一兩

右爲末黑豆去皮生杵粉一斤酢糊丸雞頭實大酒磨下一丸不曾針灸傷筋絡者四五丸必效十歲兒一丸分三服此藥能通榮衛導經絡專治心腎肝三經服後小便少淋瀝乃其驗也按此方非內有污血痼疾不宜用

續命丹

治小兒剉骨行步艱難脚無力

防風 乳香 蔓荊子 牛膝 麻黃 羚羊角 棗仁 草烏頭 沒藥 白朮 茯苓各二錢半 天麻酒炙 胡麻炒 當歸 續斷各半兩

川烏頭去皮 黃芪各四錢 蒺藜一錢二分半

右爲細末蜜丸小彈大每服一丸煎酒細嚼一日三五服用後洗藥服藥三日方洗

洗藥方

草烏頭 當歸 地龍 木鼈子 紫貝草 椒目 葱鬚 荊芥各一兩

爲末煎湯露脚指甲從上淋洗次用熏法熏藥方

柴胡 草烏頭 赤小豆 吳茱萸 羌活 晚蠶沙各一兩

末黑豆三升熱水泡少頃去黑豆入前藥煮盆盛熏剉閃處令出骨中汗

降氣消痰湯 活幼精要

蘇子 枇杷葉 桑皮 花粉 沙參 百合 薄荷 射干 前胡 貝母 右水煎

百合丹 幼幼近編下同

大黃酒煨七錢半 天冬 杏仁 百合 桑皮 亭歷炒 石膏 枳殼 桔梗 生甘草各五錢 煉蜜爲丸

二活散

羌活 獨活 人參 黃芪 薏苡仁 當歸 肉桂 杜仲

虎脛丸

虎脛骨 熟地 山茱萸 牛膝 山藥 當歸 木瓜 川芎 鹿茸 薏苡仁 五加皮 肉桂

蜜丸梧子大三歲兒日服三九

內熱者去桂

加味熟地黃丸

熟地黃 山茱萸 牡丹皮 山藥 牛膝 澤瀉 鹿茸 肉桂 補骨脂 人參童便浸炙 白茯苓

煉蜜爲丸

薏苡丸 醫學入門下同

治小兒兩手筋縮不能舒伸

薏苡仁二兩　當歸　秦艽　酸棗仁　防風　羌活各一兩

右爲末蜜丸芡實大每一丸至二丸麝香荊芥煎湯化下

海桐散

治小兒脚指蹉縮無力不能展伸

海桐皮　牡丹皮　當歸　熟地　牛膝各二分　山茱萸　補骨脂各一分

右葱煎服

五加皮散得效方

治三歲不能行

五加皮二錢半　牛膝　木瓜各一錢二分半

右末每一錢米飲調下

調元散萬病回春

治行遲

山藥五分　白朮　白芍藥　熟地黃　當歸　川芎　黃芪蜜炒各二分半　人參　白茯苓　茯神各二分　甘草一分半　石菖蒲一分

右剉作一貼薑三棗二水煎服

地黃丸

治頭顱不合體瘦骨露有如鶴膝皆腎虛不足并治腎疳天柱傾倒腎主骨也

熟地黃洗焙八錢　澤瀉洗二錢　牡丹皮去心　白茯苓各三錢　山茱萸肉　牛膝　鹿茸酥炙　山藥各四錢

右末蜜丸梧子大三歲以下三二丸溫水空心化下

哺兒方千金方

治數歲不行

葬家未閉戶盜食與哺日三便行

千金翼云未閉戶嬰孩就墓門中哺

鍼灸

田氏曰小兒龜胷取兩乳前各一寸五分上兩行三骨罅間六處各三壯炷如麥春夏從下灸上秋冬從上灸下

莊氏曰龜胷取九家灰一斗盛簸箕中令兒合面印胷跡于龜胷印從上當中及兩邊令三姓人同下火各于灰上灸三壯棄灰河流或水中

聖惠曰小兒龜背當灸第三椎骨節下兩傍各一寸半肺俞穴又第五椎骨節下兩傍各一寸半心俞穴又第七椎骨節下兩傍各一寸半高俞穴以小兒中指節爲一寸艾炷如小麥大三五壯即止此法累用十有一二得效亦無全效之功

寶鑑曰小兒數歲不行灸兩足踝各三壯

醫案

顱顬經曰符殿直之孫龜背絡熙辛亥春灸即效

萬氏幼科發揮曰黃州府甘秀才女驚後右手大指屈而不能伸醫用全蝎殭蠶治之不效問予求治法肝主筋筋賴血養故曰掌得血而能屈也血燥則筋枯屈而不能伸也手大指手太陰之脈以起也金本性燥復用風藥以治之燥益甚矣劉宗厚云休治風休治燥治得火時風燥了乃授一方用人參固本丸加黃芩黃蘗知母作丸服之

外科心法曰一三歲小兒臂患毒瘍痛服解毒丸搽神功散而消嘗治便祕或煩躁服五福化毒丹亦效若膿成者急刺去用紙撚蘸麻油紮瘡內以膏藥貼之若兒安靜不必服藥候有膿取去仍用紮貼有小兒瘡毒不愈或愈而復發皆因母食炙煿辛辣或有熱證宜先治母熱就于母藥中加漏蘆煎服兒瘡亦愈若小兒自患前證不能飲藥者將藥加漏蘆令母服之其瘡亦愈

一小兒臂患痘毒不寧按之復起此膿脹痛而然也遂刺之以托裏藥而愈有痘後肢節作腫而色不赤飲以金銀花散更以生黃豆末熱水調傅乾以水潤之自消若傅六七日不消膿已成急刺之宜服托裏藥

保嬰撮要曰愚治一小兒體瘦腿細不能行步齒不堅固髮稀短少屬足三陰虛用六珠地黃丸補中益氣年餘諸證悉愈形體充實

一小兒三歲言步未能牙髮稀少體瘦骨立發熱作渴目黑睛少服肥兒丸不應此腎虛疳證也前丸乃

脾胃經之藥久服則腎益虛而疳益甚不信牙髮漸落用六味丸加鹿茸五味子半載而愈

一小兒七歲左腿細短寸許不良于行目睛白多或有盜汗發黃成穗用地黃丸加鹿茸五味子爲主佐以補中益氣湯半載行履如故

薛氏醫按曰一小兒十五歲手足痿軟齒不能嚼堅物內熱晡熱小便澀滯如淋服分利之劑小便如淋服滋陰之劑內熱益甚服燥濕之劑大便重墜余謂此稟腎氣不足早犯色慾所致故精血篇云男子精未滿而御女以通其精五臟有不滿之處異日有難狀之疾老人陰已痿而思色以降其精則精不出而內敗小便澀痛如淋若陰已耗而復竭之則大小便牽痛愈痛則愈便愈便則愈痛正謂此也遂朝用補中益氣湯夕用六味丸加五味子煎服各三十餘劑諸證漸愈後夢遺諸證復作手足時冷痰氣上急用十全大補湯加味八味丸料各八劑二便稍利手足稍溫仍用前二藥三月餘元氣漸復飲食如常又飲食停滯吐瀉腹痛按之不疼此脾胃受傷也用六君子湯加木香肉荳蔻治之其吐未已左尺右關二脈輕診浮大按之如無經云腎開竅于二陰用五味子散四服大便頓止後又傷食嘈酸作瀉大便重墜朝用補中益氣湯夕用六君子湯加木香乾薑而痊

一老年得子四肢痿軟而惡風寒見日則喜余令乳母日服加減八味丸三次十全大補湯一劑參與其子年餘肢體漸強至二週而能行

一小兒五歲稟父腿軟不便于行早喪天眞年至十七畢姻後腿軟頭顱自覺開大喜其目謹寓居道舍遂朝服補中益氣湯夕用地黃丸料加五味子鹿茸煎服年餘而健

一小兒九歲患腿作痛用葱熨法及大防風湯腫起色赤用仙方活命飲補中益氣湯間服腫漸消又以獨活寄生湯與補中益氣湯間服二三日用葱熨一次至兩月餘而消

一小兒患此大潰不斂體倦食少口乾發熱日晡尤甚此脾氣虛甚也用補中益氣湯五劑以補元氣乃用大防風湯一劑以治其瘡如是月餘諸證悉退遂用十全大補湯佐以大防風湯而斂

一小兒患此潰而不斂不時寒熱小便赤澀此血氣虛也用十全大補湯加麥門冬五味諸證頓退乃去桂令常服佐以和血定痛丸而愈

一女子左腿作痛服流氣飲之類左膝腫硬頭運吐痰余謂此鶴膝風也其脈弦數而無力乃稟賦肝脾腎三經之證此形氣病氣俱虛者當先調補脾胃爲主不信仍攻邪氣諸證蜂起余先用五味異功散加升麻乾薑肉桂脾氣稍健又用異功散八珍湯而潰却間服大防風湯地黃丸而痊

一小兒兩膝漸腫傳服皆消毒之藥足顫赤腫此稟父腎氣不足用地黃八珍湯而消若用流氣敗毒等藥必致不起

正體驗要曰一小兒足傷作痛肉色不變傷在骨也頻用炒葱熨之五更用和血定痛丸日間用健脾胃生氣血之劑數日後服地黃丸三月餘而痊

一小兒臂骨出臼接入腫痛發熱服流氣等藥益甚飲食少思余以葱熨之其痛卽止以六君子黃芪柴胡桔梗續斷骨碎補治之飲食進而腫消又用補中益氣加麥門五味治之氣血和而熱退愈矣

一小兒閃腿腕墜腫形氣怯弱余欲治以補氣血爲主佐以行散之劑不信乃內服流氣飲外敷寒凉藥加寒熱體倦余曰惡寒發熱脈息洪大氣血虛極也治之無功後內潰瀝盡氣血而亡

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百三十七卷目錄

醫部彙考四百十七

小兒風寒門一

孫思邈千金方 傷寒

錢乙小兒直訣 傷風兼變證治

魯伯嗣學嬰童百問 傷寒正受傷寒夾驚 小兒傷寒與時氣同異 傷寒表裏 傷寒咳嗽傷風

王綸明醫雜著 傷風流涕

徐春甫古今醫統 傷寒候

王肯堂證治準繩 小兒傷寒表裏攻發

小兒衛生總微方論 傷寒論

董汎神活幼精要 傷寒

藝術典第四百三十七卷

醫部彙考四百十七

小兒風寒門一

唐孫思邈千金方

傷寒

論曰小兒未能冒涉霜雪乃不病傷寒也大人解脫之久傷于寒冷則不論耳然天行非節之氣其亦得之有時行疾疫之年小兒出腹便患斑者也治其時行節度故如大人法但用藥分劑少異藥小冷耳

宋錢乙小兒直訣

傷風兼變證治

傷風貪睡口中氣熱呵欠煩悶用大青膏發散之若飲冷不止而善食者用大黃丸微下之餘不可下

傷風手足冷者脾臟怯也當以益黃散溫脾胃以大青膏散風邪

傷風自利脾臟虛怯也亦用益黃散大青膏未瘥用調中丸有下證用大黃丸後服溫驚丸

傷風腹脹或作噦脾臟虛也當先發散仍補脾

傷風兼肝則發搐煩悶兼心則驚不安兼肺則喘嗽哽氣兼脾則困睡兼腎則目畏明各隨補其母

傷風多睡能食引飲吐瀉大便色黃此胃虛熱也當先用白术散以生津後用大青膏以發散

傷風吐沫瀉色青白悶亂不渴哽氣出氣睡而露睛先用益黃散後用大青膏

傷風或凉或熱多睡氣粗大便黃白嘔乳不消不時咳嗽先用大青膏後服益黃散愼不可下

傷風誤用下藥而作渴飲水者此胃亡津液而虛熱也多用白术散熱渴自止

註按大青膏乃表散之劑必外邪蘊結於肺而肺氣未虧損者方可用之大黃丸乃疏利之劑其食痰積滯於胃而胃氣尚充實者乃可施之況前證制宜屬脾肺氣虛腠理不密外邪所乘又當臨證制宜必以固脾胃爲主若兼肢冷自利腹脹喘嗽者脾肺虛寒也六君子加木香升麻桔梗若兼驚悸痰甚飲食少思屬心脾臟虛也四君子加芎歸酸棗仁若兼肢體倦怠喘嗽哽氣脾肺氣虛也六君子當歸桔梗若兼目畏明白睛多腎氣虛也六味丸加五味鹿茸如未應更用補中益氣湯加五味子乾山藥以補腎母若多睡能乳飲水吐瀉大便色黃脾氣虛而下陷也補中益氣湯升補元氣若吐沫瀉青睡而露睛脾虛木所乘也六君子加升麻柴胡調補脾氣若乍凉乍熱喘嗽氣粗大便黃白嘔乳不消脾肺氣虛而有邪也先用惺惺散後用四君子湯若誤用下藥而作渴者脾胃之氣傷也用白术散或六君子補中益氣二湯補之大凡前證若病邪急而元氣無虧者先用原方或用輕清表散之劑若元氣不足者當如前法固其元氣則外邪自退若因病久或因服尅伐之藥而未愈或更加變證者但調補脾胃諸證自愈其小兒傷風發熱鼻塞或痰壅發搐多因乳母鼻吹顖門但服惺惺膏或用葱頭三五莖細切搥爛以紙寸餘攤葱在上兩掌合煖待溫貼於顖門其邪即解乃去其葱却用絹段寸餘塗以麵糊仍貼顖門永無傷風之患

魯伯嗣學嬰童百問

傷寒正受傷寒夾驚

小兒傷寒初得渾身發熱無汗多啼哭看眼急有如驚風但用發散退熱莫令發渴如渴便欲飲水不歇當發散羌活散三黃散柴胡散抱龍丸或虛煩可用竹葉湯如嫩小兒當服洗心散薄荷散紅綿散四肢發汗自然精神喜悅感傷寒之重者當依仲景之法治之又有傷寒夾驚先要發散其熱乃退化痰截驚乳下嬰兒抱龍丸羌活散加荊芥防風三黃散微利

瘀熱次用柴胡黃芩藥調理管取向安葱白湯亦可服

小兒傷寒與時氣同異

夫小兒傷寒得之與大人無異所異治者兼驚而已又有因夾驚食而得治法與大人一同但小其分劑使藥性少差耳仲景云春氣溫和夏氣炎熱秋氣清涼冬氣冷冽此則四時正氣之序也冬時嚴寒觸冒之者乃名傷寒耳其傷於四時之氣皆能爲病冬受寒毒之氣其即時而病者頭痛身疼肌膚熱而惡寒名曰傷寒其不即時病者寒毒藏於肌膚之間至春夏陽氣發生則寒毒與陽氣相搏於榮衛之間其病與冬時即病無異但因春而發名曰溫病至夏而發名曰熱病陽熱未盛爲寒所制病名爲溫陽熱已盛寒不能制病名爲熱故太醫均謂之傷寒也然熱病傷寒溫病時氣傳變無異也凡時氣者四時之間有不正之氣也如春應暖而反寒夏應熱而反冷秋應涼而反熱冬應寒而反溫非其時而有其氣氣之中人則頭疼壯熱咳嗽氣粗煩渴心躁恍忽驚悸傳變與傷寒無異故一歲之中病無長少率相似者此則時行之氣俗謂之天行是也治法三四月或有暴寒其時陽氣尚弱爲寒所折病熱猶輕升麻湯解肌湯主之五六月陽氣已盛爲寒所折病熱則重七八月陽氣已衰爲寒所折病熱亦微調中湯射干湯半夏桂甘湯可選用也秋溫冬溫治濕則利小便治冬溫亦宜解利其利小便也則以五苓散葦其解利冬溫宜葳蕤湯葛冬溫者感溫氣而作寒疫者暴寒折人非觸冒之過其治法不同所施寒熱溫涼之劑亦異不可拘以日數發汗吐下隨證施行要之治熱以寒溫而行之治溫以清冷而行之治寒以熱涼而行之治清以溫熱而行之以平爲期不可以過此爲大法湯氏有七寶散加減服之併與乳母尤好有熱者升麻湯加柴胡黃芩等劑治之柴胡石膏湯極效

傷寒表裏

凡治小兒傷寒須辨表裏表裏不分汗下差誤古人云桂枝下咽陽盛即斃承氣入胃陰盛以亡傷寒有表證有裏證有半在表半在裏有表裏二證俱見然在表者宜汗在裏者宜下在半表半裏者宜和解表裏俱見隨證施治無表裏證用大柴胡湯下之其表證者發熱惡寒身體痛而脈浮無汗頭疼項強腰脊痛此足太陽膀胱經受病也宜汗之然傷寒發表當隨病輕重而汗之頭疼發熱兼驚亦只用葱白湯汗之甚則麻黃湯各半湯解肌湯葛根湯柴胡散皆可選而用之其裏證者惡熱而不惡寒手掌心幷腋下濈濈汗出胃中乾咽燥糞結聚潮熱大便鞕小便如常腹滿而喘躁渴脈沉而滑內熱而譫語此屬足陽明胃經也宜下之小承氣湯大承氣湯四順飲洗心散斟酌輕重用之其在半裏者心下滿口不欲食大便鞕脈沉細是裏證當下其人頭汗出微惡寒手足冷即當汗此兩證俱見者仲景所謂半在表半在裏也小柴胡湯主之太陽病不解傳入少陽脅下鞕滿乾嘔不能入飲食往來寒熱尚未吐下診其脈弦緊者小柴胡湯主之此屬少陽膽經也宜和解其表裏兩證俱見者病人脈浮而大是表證當汗其人發熱煩渴小便赤是裏證當下是表裏證俱見五苓散主之又傷寒不大便六七日頭痛有熱者是也裏證當下其人小便清者知不在裏仍在表當須發汗此是兩證俱見即未可下宜與桂枝湯又太陽病醫反下之因亦腹痛是有表復有裏仲景用桂枝加芍藥湯痛甚者桂枝加大黃湯或腹滿時痛尺寸脈俱浮洪者此足太陰脾經也自利不渴當溫之四逆湯理中湯其無表裏者傷寒四五日以後以至過經無表裏證又於裏證未可下者既非下證亦非汗證皆可用小柴胡湯隨證加減用之以至十餘日外用小柴胡湯不愈者若大便鞕看可汗則用大柴胡湯下之仲景云六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱此爲實也當下宜大承氣湯若不渴口不燥舌乾而目沉者急溫之宜四逆湯此足少陰腎經也其表熱裏寒者身大熱而反欲得衣熱在皮膚寒在骨髓也宜先與陰旦湯寒已次以小柴胡湯加桂以溫其表又身大寒而反不欲近衣寒在皮膚熱在骨髓也宜先與白虎加人參湯熱除次以桂枝麻黃各半湯以解其外又厥陰證脈浮緩者必裏不縮外證必發熱惡寒似瘧爲欲愈宜桂枝麻黃各半湯若脈尺寸俱沉短者必裏縮毒氣入臟宜承氣湯下之厥陰病其脈微浮爲欲愈不浮爲未愈宜小建中湯此足厥陰肝經也然以表裏證內近似三陰三陽之證而疏於各證之下非可以盡備六經之大法也當以活人書傷寒論爲主其瘧證與大方治法同後有本條夏傷於暑秋必痎瘧其暑證玉露散主之其詳亦與大方同其治法但用分劑輕耳口議有脫甲散大能除熱扶表救裏真良方也

傷寒咳嗽傷風

仲陽云咳嗽者肺感微寒八九月間肺氣大旺病嗽者其病必實非久病也其證面赤身熱痰盛法當以葶藶丸下之若久嗽不可下也冬月嗽乃傷風咳也當以麻黃湯汗之有熱證面赤飲水涎痰濃稠咽喉不利者宜甘桔湯有肺盛者嗽而喘面腫欲飲水有不飲水者其身即熱以瀉白散瀉之有嗽而吐涎痰乳食者以白餅子下之然肺主氣應於皮毛肺爲五藏華蓋小兒感於風寒客於皮膚入傷肺經微者咳嗽重者喘急肺傷於寒則嗽多痰涎喉中鳴急肺傷於暖則嗽聲不通壅滯傷於寒者必散寒邪傷於暖者必泄壅滯發散屬以甘辛即桂枝麻黃細辛是也湧泄係以酸苦即葶藶大黃是也更五味子烏梅之酸可以斂肺氣亦治咳嗽之要藥也久嗽不已必主驚悸頑涎血脉灌臉其嗽傳受五藏或吐逆或痰涎或厥冷或恐悸甚而至於眼目兩眶紫黑如被物傷損眼白紅赤如血謂之血眼治之之法當用生地黃及溫黑豆研成膏掩眼上而眼腫黑自消其血皆自眼泪而出眞良方也兼服麥煎散而嗽自止久嗽成癇當服散癇等劑凡治嗽先要發散寒邪然後服寬氣化痰止嗽之藥即得疼痊先服九寶丸華蓋散葶藶丸抱龍丸或細辛五味子湯如有熱可服凉肺之藥柴胡黃芩等劑并瀉白散痰多氣喘用金星丸利痰了却服前藥後服百部丸生犀散天麻定喘飲調理而安冷證咳嗽小青龍湯加杏仁去麻黃亦可服有熱及時氣咳嗽柴胡散加杏仁五味子柴胡石膏湯亦可錢氏生犀散加減亦佳有驚咳嗽天麻防風丸治之惺惺散化風丹皆可服金沸草散二拗湯加減及治傷風咳嗽之常劑也和解湯治四時感冒可加減服

王綸明醫雜著

傷風流涕

小兒八歲以下無傷寒雖有感冒傷風鼻塞流涕發熱咳嗽以降痰爲主略加微解凡散敗毒非幼稚所宜感冒輕者不必用藥候二三日多有自愈

註　按前證若手足冷或腹脹脾虛也用六君子湯加升麻柴胡若腹脹或氣喘肺虛也用四君子湯加柴胡升麻經云肺主氣而司皮毛肺虛則腠理不密外邪易感凡發表之後其邪既去用補脾肺以實其表庶風邪不能再入往往表散之後熱嗽不退復行發表多變壞證

徐春甫古今醫統

傷寒候

小兒傷寒與大人無異所以異者兼有夾食而已其或偶而中傷謂之時氣又與傷寒不同若小兒在襁褓中或長成而稟賦怯弱多因乳母解脫衣服不避風寒所致也然小兒患此口不能言其致病之由脉不能診其必然之理但只煩啼發熱而已故不可不盡心焉初得之時嬰幼則以虎口三關脉紋紅色驗之長而童稚則以一指按其三部據左手脉之緊盛而斷之其喘急憎寒心氣熱呵欠煩悶項急者是也其惡寒惡風必猥人藏身引衣密隱是爲表證惡熱內實者必出頭露面揚手擲足煩渴燥糞溲衣氣粗是爲裏證至若頭額冷汗手足凉口冷氣面色黑暗淡大便瀉青此爲陰證觀其小便或赤或白可以知裏熱之有無或青或濁可以知裏證之輕重舉是觀之則汗下清溫之法可類推矣

王肯堂證治準繩

小兒傷寒表裏攻發

有表證惡風惡寒者當發

海藏云惡風者白朮散惡寒者神朮湯如氣盛能食不大便無表證者可攻裏

春主溫屬木身溫當發汗

海藏云神朮湯

夏主長屬火身熱而煩躁合大發散

海藏云神朮加黃芪湯

長夏主化屬土及居四季同當調其飲食

海藏云四君子湯

秋主收屬金身凉納溫合微下

海藏云通關丸金花丸

冬主藏屬水身熱而惡寒是熱在外而寒在內身寒而惡熱是熱在內而寒在外

海藏云熱在內者調胃承氣湯寒在內者調中湯丸

凡傷寒宜依四時陰陽升降逆順剛柔而施治法氣升浮則順發之收藏則下之有汗發熱惡風脉沉緩者風傷衛桂枝湯

無汗發熱惡寒不當風而自憎寒脉浮緊者寒傷榮麻黃湯

有汗發熱惡風脉浮緊無汗發熱惡寒脉浮緩謂之榮衛俱傷青龍桂枝麻黃各半湯

無汗發熱不惡風寒脈沉洪者可下之更詳認其厥與不厥量寒熱深淺而治之

有汗四肢厥脈沉微者名陰厥四逆湯

無汗四肢厥脈沉微者名陽厥大承氣湯加賦粉

如四肢不厥身熱內外皆陽不動三焦宜凉藥三五服下之黃芩甘草湯黃芩白朮湯黃芩蒼朮湯黃芩梔子湯連翹飲子小柴胡湯八正散凉膈散白虎湯五黃散此上中下三焦藥宜選用之

中暑脈虛背惡寒自汗而渴者白虎湯

身凉脈緊熱在內者急下之口燥咽乾不大便是無汗身大熱者可發汗升麻湯大青膏天麻膏

有汗身大熱者桂枝湯惺惺散解肌湯小柴胡湯白朮防風湯可選用之

發汗者暈四時暄暑燥濕風寒各宜春凉夏寒秋温冬熱而發之

小兒衛生總微方論

傷寒論

經曰傷寒者有五有中風有熱病有温病有中濕有傷寒其所苦各不同此五者配入五氣隨四時爲病故春風夏熱秋濕冬寒中温而傷寒則居一焉其細論在傷寒類證集中其四時之病皆謂之傷寒者乃總挈之名也內熱病者乃盛暑之時炎熱之氣中人爲病也又名中暍濕病者乃雨露霜霧烟嵐水漬濕氣中人爲病也小兒無此二病謂小兒不治家事未有幹辦早臥晚起不致衝冒故也外傷風傷寒温病小兒有此二病謂嚴寒屬風温氣無所不至小兒肌肉脆軟氣血柔弱易爲傷之故也是三病者其證其脈不可診切兒稍大者可切脈而別之傷風之脈陽浮而陰弱也傷寒之脈陰陽俱盛而緊濇也温病之脈行在諸經未知何經之動隨其經之所在而取之也若嬰小未能診切者但看其形候耳

傷風者乃四時八方爲厲之風傷人其候昏睡呵欠煩悶口中氣熱或自汗惡風發熱鼻鳴乾嘔熱多寒少面光而不慘手足皆熱煩躁治當發散有飲水者有能食者有不能食者其飲水能食者可微下之餘不可下也

傷寒者乃冬時嚴寒之氣傷人入於腠理當是之時壯者氣行而已怯者則著而爲病其即發者爲傷寒至春發者爲温病

一云在夏至之前非時行温氣之病

夏發者爲熱病

一云在夏至之後非中暍之熱病

其候面赤渾身壯熱頭痛體疼鼻塞聲重清涕咳嗽寒毛立氣促急或嘔吐白水寒多熱少面色慘而不舒手足指末微冷不煩躁而惡寒

傷風者不惡寒而惡風傷寒者不惡風而惡寒其惡風者當風而乃憎寒也其惡寒者雖不當風而亦自憎寒也以此別之

治者若脈洪盛身體壯熱頭痛面赤四肢暖者爲陽證宜汗之若脈微細身冷不甚頭痛體疼面青四肢冷者爲陰證宜温之

温病者四時之間非節候邪氣傷人如春應温而反寒夏應熱而反冷秋應凉而反熱冬應寒而反温言此時通行此氣爲病無少長略同故名天行時氣又名時行温病其候頭痛身重壯熱體疼與傷寒相似但臨時看其脈與其證以屬何經受病隨經而求之爲治也已上三病通以傷寒爲治邪在外者解之汗之邪在內者温之下之當隨證按法而行之錢乙言傷寒男體重面黃女喘急面赤各憎寒口中氣熱呵欠煩悶項急此乃不分傷風傷寒而概言之也況傷風傷寒證候傳變多端自有專經可憑孫眞人云治小兒與大人無異惟減用湯劑極少耳更有傷風寒而兼食者俗呼謂之夾食傷寒也其候壯熱煩渴鼻塞聲重四肢困倦眼黃腹中脹痛涎唾嘔逆或呵欠煩悶治者不先攻所傷但先解表候表解然後下之則病與食皆去也若不顧其表便以藥攻之多致結痞也又有因失饑而食寒飲冷傷於脾胃而中風寒其候胃膈不快腹脹而痛面色唇口皆青手足逆冷脈沉細者此寒傷於脾漫屬太陰庸工不識以爲胃膈不快妄用針灸或便投駛藥則胃膈愈不快而吐利只一兩日間便致危殆此不明之誤非其治也所謂傷寒本經藥證甚多難以具述今採其小兒常所患者之方及有兼見之證略爲條叙傷風寒手足冷身熱面赤頭痛者此脾怯也宜先和脾然後發散傷風寒自利者脾虛也宜先補脾然後發散未差者先調順其中有下證者微下之有驚者退之

傷風腹脹而喘者脾虛也宜先補脾去脹定喘候喘定然後發散

傷風寒得下後大熱已退而餘熱未解者是下之太過胃虛而熱乘之故也胃中虛熱者雖是無多當生胃中津液津液得生則熱自退矣

傷風寒其熱在外者爲表病若未入於裏兩解之夫裏虛氣逆熱結胷中堅硬而痛者此爲結胷若但硬滿而不痛者此爲痞氣若因飲水得者則爲水結若三四日外熱入於裏則腹滿痞內實有燥糞者當下之若熱入大腸則爲大便結澀不通若熱入小腸則爲小便難澀不通熱入大小腸則爲大小便不通熱入脾胃脾胃屬土候於肌肉熱盛蘊蒸於外則爲發黃熱熏於心胷則爲煩躁津液耗減者則爲發渴熱上衝咽喉口舌者則生瘡腫疼痛有血泄者血得熱則流溢妄行從鼻出者則爲衄血從口出者則吐血從大便出者則便血從小便出者則遺血若壯熱未汗躁喘鼻鳴因衄一升數合而熱得歇者病則解矣若出至二三升者危矣若熱毒積滿於內不得時下致毒乘瘀血則煩盛發狂若燠寒昏冒悶亂者死若胃有寒氣相搏則嘔噦咳逆若肺有寒相搏則咳嗽氣急若氣怯者傳變入陰則四肢厥逆面青體冷下利清穀並當隨證施治

錢乙論傷風傷寒瘧疹傷食壯熱昏睡一皆相似若倉卒未能辨認之間但與升麻葛根湯惺惺散小柴胡湯此數藥通治甚驗

聖惠論嬰孩傷寒不可用性燥藥發汗燥加臟腑熱極傷心則厥逆難治又不可用性熱藥熱乃助陽陽極則陰爭四肢汗出如油手足或冷或熱多致發狂顛癇搐搦爲難治又不可用性寒藥寒則陽受其冷則寒熱相擊一向叫啼不睡使熱上衝於腦則頭骨縫開爲難治予流落錢塘就館於親家蘇伯正防禦家伯正以醫治傷寒名予常觀其用藥次第若小兒傷寒壯熱頭痛體疼脈大鼻塞聲重嘆咳呵欠惡風憎寒病在表可汗者用銀白散熱多者甘露散有食飲宿滯脾胃不和者以安胃丸間服胃苓不快者以香殼散間服煩渴飲水或作寒熱者靈砂散間服有驚者天麻防風丸人參化風膏涎盛咳嗽者小珍珠丸如此施治隨手得愈者十有八九餘一二者乃病久傳深或已成變證方纔請名亦依法調治乃得痊可其所用之藥多非古方性不燥熱率皆溫平是謂曉南北之異地識寒熱之所宜深通古人治病之大體也

董鳳翀活幼精要

傷寒

凡治傷寒須別表裏表裏不分汗下差誤表證當汗裏證當下發表攻裏不易之法表證屬陽病在六腑裏證屬陰病在五臟陽盛陰虛汗之卽死下之當愈陽虛陰盛下之卽死汗之卽愈陽虛外寒陰盛內熱陽盛外熱陰盛內寒不汗強汗津液枯竭合汗不汗竅閉閉絕不下強下洞泄不禁合下不下腫脹悶亂犯此數者皆是死證

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百三十八卷目錄
醫部彙考四百十八
小兒風寒門二
方
五味子湯 莽草浴湯 又 雷丸浴湯
麥門冬湯 芍藥四物解肌湯 麻黃湯
羌活散 大羌活湯 人參羌活散 祕旨清肺散 敗毒散 溫胃散 流心散 惺惺散
麻黃 黃芩湯 升麻黃芩湯 甘露飲子
雙丸 石膏麻桂湯 連翹飲 十物升麻湯
六物葛芩湯 五物人參飲 八物麥門冬飲 柴葛飲 羌活散 柴胡散 三黃散
搶龍丸 竹葉石膏湯 反砂七寶散 薄荷散 紅綿散 惡白湯 羌活湯 月麻湯
解肌湯 調中湯 射千湯 半夏桂甘湯
五答散 蔻殼湯 七寶散 柴胡石膏湯
葛根湯 柴胡散 桂枝麻黃各半湯 小承氣湯 大承氣湯 桂枝加芍藥湯 四順飲 小柴胡湯 小桂枝湯 桂枝加大黃湯 四逆湯 理中湯 大柴胡湯 陰旦湯 白虎加人參湯 小建中湯 玉露散 脫甲散 白餅萃雄丸 麻黃湯 甘桔湯 消白散
子湯 麥煎散 九寶飲 華蓋散 細子五味子湯 金屑丸 百部丸 生犀散 天麻防風丸 定志丸
嘔湯 小青龍湯 柴胡石膏湯 三拗湯 和化風丹 金沸草散 又
解湯 蒼香正氣散 薄荷湯 銀白散 甘露散 香殼丸 小珍珠丸 藏青散 紅蜘蛛散 千金丸 茯苓散 枳實散 竹瀝湯 瓜蒂散 真珠散 泰半煎 藕汁蜜 蜀根湯 百合散 黃芩散 石熱散
又方 菊根汁 立應散 犀角散 金汁蜜
神白散 麥門冬湯 一捻金散 地黃汁 赤芍藥散 麥門冬湯 羣良湯 靈砂膏 調膈散 四味人參湯 附子豉朴丸 半夏湯 大麥苗汁 人參柴蘆根飲子 三黃散 四陳湯 蜂白調散 黃連丹 商陸散 甘桔防風湯 黃芩湯 金鈴子 生熟散 苦參酒 黃連湯 梔子仁湯 烏仙散 燒附散 玉女散 人參化風膏 黑龍散
單方
醫案

藝術典第四百三十八卷
醫部彙考四百十八
小兒風寒門二
方
五味子湯 千金方
治小兒傷寒病久不除瘥後復劇瘦瘠骨立
五味子十銖 大黃 黃連 黃芩 麥門冬
前胡各六銖 碎硝五銖 石膏一兩 甘草
當歸各十二銖
右十味㕮咀以水三升煮取一升半服二合得下便止計大小增減之
莽草浴湯
治少小傷寒
莽草半斤 雷丸三十枚 蛇牀子炒一升
牡蠣四兩 大黃一兩
右五味以水三斗煮取斗半適寒溫以浴兒避眼及陰
又
治小兒卒寒熱不佳不能服藥
莽草 丹參 桂心各三兩 石菖蒲半斤
雷丸一升 蛇牀子二兩
右六味以水二斗煮三五沸適寒溫以浴兒避眼及陰
雷丸浴湯
治小兒忽寒熱
雷丸二十枚 大黃四兩 黃芩一兩 苦參
石膏各三兩 丹參二兩
右六味㕮咀以水二斗煮取一斗半浴兒避眼及陰浴訖以粉粉之勿厚衣一宿復浴
麥門冬湯
治小兒未滿百日傷寒鼻鼾身熱嘔逆
麥門冬十八銖 石膏 寒水石 甘草各半兩
桂心八銖
右五味㕮咀以水二升半煮取一升每服一合日三
芍藥四物解肌湯
治少小傷寒
芍藥 黃芩 升麻 葛根各半兩
右四味以水三升煮取九合去滓分服歲以上分三服
麻黃湯
治少小傷寒發熱苦嗽頭面熱者
麻黃 生薑 黃芩各一兩 甘草 桂心
石膏 芍藥各半兩 杏仁十枚
右八味㕮咀以水四升煮取一升半分二服兒若小以意減之
古今醫統曰前方治傷寒頭痛發熱腰疼骨節痛惡寒無汗而嗌以此汗之蓋暖取汗熨熨至手心足心而止不須再服
羌活散 錢氏直訣下同
治風邪所傷頭目昏眩痰涎壅滯肢節煩疼
羌活 前胡 麻黃 白茯苓 川芎 黃芩
炙甘草 蔓荊子 枳殼麩炒 細辛 石膏
菊花 防風各等分

右爲末每服一二錢水煎

大羌活湯

羌活　獨活　防己　防風　黃芩　黃連　蒼朮　白朮　炙甘草　川芎　細辛各二錢　知母　生地黃各一錢

治傷寒時氣頭疼發熱

右爲末每服一二錢水煎熱服

人參羌活散

人參　羌活　獨活　柴胡　前胡　桔梗　茯苓　枳殼麩炒　川芎　天麻　地骨皮　甘草炒二分

右入薄荷三葉水煎

薛己曰按前方乃解肌發表化痰利氣之劑然元氣虛者宜用清肺散

祕旨清肺散

治感冒發熱鼻流清涕或咳嗽吐痰輕者勿藥自愈重者用此輕和之劑

橘紅　半夏炮　桔梗炒　川芎蔓各五分　白茯　桑皮蜜炙各七分　炙草　防風各四分　薄荷　白朮　枯黃芩炒各三分

右每服二三錢薑水煎

薛己曰按前證若風邪退而痰熱不止但健中氣則痰自化而病自愈若專用化痰利氣則中氣愈虛痰熱愈甚矣

敗毒散

治傷寒時氣寒熱咳嗽

人參　茯苓　甘草炒　前胡　川芎　羌活　獨活　桔梗　柴胡　枳殼麩炒各等分

右爲末每服一二錢生薑薄荷水煎

薛己曰按祕旨云小兒雖有感冒傷風鼻塞流涕發熱咳嗽以降痰爲主略加微解凡散利敗毒非幼稚所宜或冒輕者不必用藥候一二日自愈竊謂前證若手足冷或腹脹脾虛也用六君子湯加柴胡升麻若腹脹或虛喘肺虛也用四君子湯加柴胡升麻若蓋肺虛則腠理不密邪易感發表之後其邪既去卽補脾肺以實其表庶無變證矣

溫胃散（育嬰家祕）

如小兒誤服寒凉藥過多者以致脾胃虛弱胃腕痛宜服此散主之

陳皮　黃芪炙各七錢　縮砂仁　甘草炙　厚朴薑汁炒　益智仁各四錢　白豆蔻仁　澤瀉　乾薑炮　薑黃各三錢　人參二錢

共細末每服五分至一錢水煎去滓食前溫服

洗心散（類證活人書下同）

治遍身壯熱頭目碎痛背膊拘急大熱衝上口苦脣焦夜臥舌乾咽喉腫痛涕唾稠粘痰壅喫食不進心神躁熱眼澀睛疼傷寒鼻塞四支沉重語聲不出百骨節痛大小便不利麩豆瘡時行溫疫狂語多渴及小兒天弔風夜驚並宜服之

當歸四兩炒　芍藥四兩生用　甘草四兩炙　荊芥四兩　白朮一兩炒　麻黃四兩去節炒

大黃四兩以米泔水浸一炊間漉出令乾慢炒

右搗羅爲細末每服抄二錢水一盞入薑一片薄荷二葉同煎至八分放溫和滓服了仰臥仍去枕

少時如五臟壅實煎四五錢七若要瀉轉則熱服

惺惺散

治小兒風熱及傷寒時氣瘡疹發熱

桔梗　細辛　人參　白朮　瓜蔞根　甘草炙　白茯苓　川芎各等分

右搗羅爲末每服二錢用水一盞生薑二片薄荷二葉同煎七分服三歲已下作四五服五歲已上分二服凡小兒發熱不問傷風風熱先與此散數服往往瘥愈

麻黃黃芩湯

小兒傷寒無汗頭疼發熱惡寒

麻黃去節一兩　黃芩炒　赤芍藥各半兩　甘草炙　桂枝去皮各一分

右搗羅爲細末每服二錢滾水調下日三服兼治天行熱氣生豌豆瘡不快益煩躁昏憒或出尚身疼熱者

升麻黃芩湯

治小兒傷風有汗頭痛發熱惡寒

升麻　葛根　黃芩　芍藥各三錢　炙草一錢半

右剉如麻豆大每服二錢以水一中盞煎至六分去滓溫服

若時行瘡疱出不快煩躁不眠者加木香一錢五分

甘露飲子

治胃中客熱口臭不思飲食或飢煩不欲食齒齦腫疼膿血口舌咽中有瘡赤眼赤臉目不欲開瘡疹已發未發並宜服之

熟地黃　生地黃　天門冬　麥門冬並去心焙
枇杷葉去毛　枳殼麩炒　黃芩　石斛去苗
山茵陳　甘草炙各等分
右爲細末每服二錢水一盞煎至六分食後臨臥
去滓溫服

雙丸

治小兒身熱頭痛飲食不消腹脹滿或心腹疼痛
大小便不利或下重數起未差可再服小兒蒸候
哺食減少氣息不快夜啼不眠是腹內不調並宜
用此丸下之
甘遂半兩　朱砂一錢另研　麥冬二兩半去心
蕤核去仁四兩半　牡礪二兩煅　甘草一兩炙
巴豆六十枚去皮心膜研新布絞去油日中曬之白
如霜者
右麥門冬甘草甘遂牡礪四味爲細末入巴豆朱
砂蕤仁合和搗二千杵更入少蜜搗和極熟旋丸
半歲兒服如荏子大一雙一歲兒服如半麻子大
分爲一雙服如二歲麻子大一枚分一雙三四歲
者服如麻子大二丸五六歲者服如大麻子大二
丸七八歲者如小豆大二丸十歲微大於小豆二
丸常以鷄鳴時服如至日出時不下者熱粥飲服
數合投之即下藥丸皆雙出也下利甚者濃煎冷
粥飲之便止

石膏麻桂湯

治小兒傷寒未發熱咳嗽頭面赤
黃芩　麻黃一兩去節湯泡　甘草炙　石膏
芍藥各半兩　桂心一分　杏仁十枚去皮尖
右七味爲散每服二錢水一中盞入生薑二片煎
半盞去滓服兒若甚小以意增減之

連翹飲

治小兒一切熱
連翹　防風　甘草　山梔子各等分
右件搗羅爲末每服二錢水一中盞煎七分溫服

十物升麻湯

治小兒傷寒變熱毒病身熱面赤口燥心腹堅急
大小便不利或口瘡或因壯熱便四肢攣掣驚仍
作癇疾時發時醒醒後身熱如火者
升麻　白薇　麻黃去根節　萎蕤　柴胡
甘草各半兩炙　黃芩一兩　矾硝　大黃
釣藤各一分
右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎至七分去滓
下硝再煎化溫服

六物黃芩湯

治少小腹大短氣熱有進退食不安穀爲之不化
黃芩　大青　甘草炙　麥門冬　石膏各半兩
桂心三錢
右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎七分溫服

五物人參飲

治小兒天行壯熱咳嗽心腹脹滿
人參　甘草各半兩炙　麥門冬一兩去心
生地黃一兩半如無只用乾生地半兩
右剉如麻豆大每服三錢水一盞入茅根半握煎
至七分去滓溫服

八物麥門冬飲

治證同前
麥門冬三兩去心　甘草炙　人參各一分
紫苑　升麻各二兩　貝母一分半
右剉如麻豆大每服三錢水一盞入茅根半握煎
至七分去滓再入竹瀝少許重煎服

棗葉飲

治小兒天行五日以後熱不歇者
棗葉半握　麻黃半兩去根節　淡豆豉一合
葱白切一合
右件共童子小便二盞煎至一盞去滓分二服

羌活散 嬰童百問下同

治風寒驚熱
羌活　獨活　前胡　柴胡　川芎　白茯苓
桔梗　枳殼　人參　地骨皮　天麻各等分
生甘草減半
右剉散生薑薄荷煎
加麻黃乾葛薏苡仁治中風體硬
加蟬蛻治驚熱

柴胡散

治小兒傷寒無汗有表證壯熱頭疼身體痛口乾
煩渴小便赤大便祕澀夾驚腮腫
石膏　黃芩　甘草　赤芍藥　葛根各二錢半
麻黃去節　柴胡各半兩
右剉散三歲兒每服二錢水一盞生薑少許葱白
三寸豆豉一撮煎至七分不拘時溫服

三黃散

解傷風熱證

白朮　大黃蒸　赤芍藥半兩　黃芩二錢
麻黃去節一錢　桂枝二錢
右㕮咀生薑一片棗二枚水一盞煎七分溫服

抱龍丸

治傷風溫疫身熱氣粗痰實壅嗽常服安神鎮驚亦治疹痘壯熱小兒宜時與服
膽星一兩　天竺黃　雄黃　辰砂各二錢
麝香少許
右爲末煮甘草汁丸櫻桃大陰乾薄荷湯吞下

氣喘有痰加杏仁

竹葉石膏湯

治傷寒表裏俱虛偏身胃煩悶或汗已解內無津液虛羸少氣氣逆欲吐及諸虛煩傷寒解後傷寒未解切不可服
石膏四兩　半夏六錢　人參　甘草各半兩
麥門冬去心一兩
右㕮咀每服三錢生薑一片粳米五十粒煎米熟爲度去滓溫服

嘔者加生薑三片竹葉數片

辰砂七寶散

治小兒壯熱傷風壅熱治夾驚傷寒解諸般熱亦治疹痘熱治驚風定搐搦
麻黃去節　白朮炒　當歸酒洗　赤芍藥
生大黃　荊芥穗　前胡去蘆　生地黃酒洗
生甘草各半兩
右爲末每服三錢
傷風發散用生薄荷泡湯下

急驚加辰砂薄荷調下

薄荷散

治乳下嬰兒鼻塞不通及治夾驚傷寒變蒸熱
薄荷葉半兩　羌活　殭蠶炒　白附子　全蠍
生甘草各一錢半　麻黃去節　天竺黃各一錢
右爲末每服三錢薄荷湯下

熱極生風加竹瀝少許與服

一方有柴胡白芍桔梗茯苓無全蠍殭蠶天竺黃
白附子

紅綿散

治傷風咳嗽鼻塞或流清涕
全蠍五箇去毒　麻黃去節　殭蠶炒　白芷
川芎　天麻各二錢　生甘草　蘇木各一錢
右剉綿少許煎服

有熱加荊芥

一方有大黃

葱白湯

治頭痛不止身疼渴發熱小便赤黃脈浮數無汗
葛根　芎藥　知母各半兩　芎川一兩
右㕮咀每服二錢水一小盞生薑二片葱白三枚煎至七分去滓熱服出汗如有汗溫服

加甘草治小兒夾驚傷風并治發癮頭疼

嘔者加半夏半兩

羌活湯

解利邪氣傷風
羌活　人參　防風　川芎各一錢
右剉一劑生薑三片薄荷七葉水一盞煎至七分不拘時服

一方加芍藥甘草

升麻湯

治小兒時行溫疫頭痛發熱肢體煩疼及瘡疹已發未發疑似之間治傷寒中風惡寒壯熱肢體痛疼鼻乾不得睡兼治寒暄不時人多疾疫乍緩脫著及暑熱之忽變陰寒身體疼痛頭重如石者亦可加柴胡
升麻　葛根　白芍藥　甘草炙各一錢
右㕮咀每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服瘡疹亦準此服藥身凉止藥

加紫蘇茯苓川芎名升麻蘇葉散

有熱加黃芩

無汗加麻黃

咽喉痛加桔梗

發丹加黑參效

解肌湯

治傷寒溫病時行寒疫頭疼項强畏寒肢體拘急骨節煩疼腰脊强痛胃脘煩悶無汗惡風壯熱
葛根一兩　麻黃去節　芍藥　甘草各半兩
桂枝二錢半
右㕮咀每服三錢水一盞棗一枚煎至六分去滓稍熱服以汗出爲度

一方無桂枝

夏月加石膏知母各一錢

調中湯

治夏末秋初忽有暴寒折於盛暑熱結於四肢則

壯熱頭疼寒傷於胃則下利或血或赤或白壯熱迷悶脈數宜下之

大黃七錢半　桔梗炒　蘗本　茯苓　甘草　乾葛　黃芩　芍藥　白朮各半兩

右㕮咀白水煎量大小加減服

得快氣利壯熱便歇去大黃加黃連枳殼止利尤妙或加地榆或加當歸皆可

感風加荊芥秋宜下當下大黃

射干湯

治初秋夏月暴雨冷及天行暴寒其熱喜伏於內咳嗽曲折不可得氣息喉腔失聲乾嗽無唾喉中如硬

半夏湯泡五錢　生薑泡四錢　射干　杏仁　甘草炙　紫苑　肉桂　枳實炒　當歸　橘皮　獨活　麻黃去節湯泡各二錢

右㕮咀每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服

半夏桂甘湯

治伏氣之病謂非時有暴寒中人伏於少陰經始不覺病旬月乃發脈便微弱咽痛似傷寒非喉痹之病次必下利始用半夏桂甘湯主之次用四逆散此病一二日便差古方謂之腎傷寒

半夏洗　桂心　甘草炙各二兩

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎至六分放冷少含細嚥之入生薑三片煎

五苓散

治傷寒溫熱病表裏未解頭疼發熱口燥咽乾煩渴飲水或水入即吐或小便不利及汗出表解煩渴不止又治霍亂吐利燥渴引飲

澤瀉二兩半　豬苓　白朮　茯苓各一兩半　肉桂一兩

右為細末每服二錢熱湯調下不拘時服記冬飲熱湯有汗出即愈

又治瘧熱在裏身發黃疸濃煎茵陳湯下食前服疸病發渴及中暑引飲亦可用水調服小兒加白朮末少許

如發虛加綿黃芪人參末少許

葳蕤湯

治風溫冬溫及春月中風傷寒發熱頭疼咽乾舌強智腹滿腰脊強

葳蕤三錢　石膏一兩　白薇　葛根　羌活　麻黃　川芎　杏仁去皮尖　炙草　木香各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至八分去滓溫服

七寶散

治時氣頭昏體熱此藥大人可服小兒乳母服

紫蘇　香附炒各三兩　陳皮　甘草炙　桔梗　白芷　川芎各一兩

右㕮咀每服二錢水半盞薑一片棗一枚煎三分去滓服

有熱加葛根升麻荊芥

柴胡石膏湯

治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽乾心悶煩滿寒熱往來痰熱咳嗽涕唾稠黏並療之

黃芩三兩　升麻二兩半　石膏　前胡　赤芍　乾葛　柴胡各五兩　荊芥穗　桑白皮各三兩

右為粗末每服二錢水一盞生薑二片淡豉十粒煎至七分去滓稍熱服小兒分作三服量大小加減不拘時候

無汗加麻黃半夏北五味

葛根湯

治太陽病項強兀兀惡風無汗不惡寒剛痓

葛根四兩　麻黃　肉桂各一兩　生甘草　芍藥各二兩

右剉每服五錢水一盞半入生薑五片棗二枚煎七分去滓服取微汗為度

柴胡散

治小兒傷寒無汗有表證壯熱頭疼身體痛口乾煩渴小便赤大便祕夾驚腮腫

柴胡半兩　石膏　黃芩　生甘草　赤芍藥　麻黃去節各二錢半

右剉每服三錢葱白三箇薑一片水一盞煎服

桂枝麻黃各半湯

治太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者欲愈也脈微而惡寒者此陰陽不升更發汗更吐下也面赤色者未欲解也以其不能得少汗出身必癢

桂枝八錢　芍藥　生薑　甘草　麻黃各半兩　杏仁去皮尖十四箇　大棗二箇

右㕮咀每服三錢水一小盞煎八分去滓溫服

小承氣湯

治太陽病吐下後發汗而微煩小便數大便堅宜

陽明病若汗出多而微惡寒爲外未解無潮熱不可與之若腹滿不大便可少少與之

大黃微炒　枳實炒各一兩　厚朴製半兩

右㕮咀煎陽明病潮熱大便微硬可與大承氣湯不硬者不可與之若不便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者必先硬後溏不可攻之攻之必腹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便硬而少也以小承氣湯和之不轉失氣者不可攻也

大承氣湯

治剛痙胃滿內實口噤咬牙大熱渴大便祕澀

大黃　芒硝各半兩　厚朴薑炒　枳實各一兩

右剉每服三錢薑三片水一盞煎七分空心服

四順飲

治小兒血脉壅實臟腑生熱頰赤多渴五心煩躁睡臥不安四肢驚掣及因乳哺不時寒溫失度令兒血氣不順腸胃不調小便少大便澀或溫病遲滯欲成伏熱或壯熱不歇欲發驚癎又治風熱結核頭面瘡癤目赤咽痛瘡疹毒一切壅滯並宜服之

赤芍藥　當歸　生甘草　大黃各一兩

右剉散三歲以上每服二錢水一盞煎至七分作兩服

一方名四順散加薄荷二葉爲引

欲利小便加白茯苓

虛熱加甘草

不利加大黃

冒風邪加去節麻黃

中風體強眼睛上視加獨活量兒大小虛實加減

微溏利爲度

小柴胡湯

治傷寒溫熱病身熱惡風頸項强急胷脇滿痛嘔吐噦逆煩渴寒熱往來身面皆黃小便不利大便祕澀或過經不解或潮熱不除及瘧後勞復發熱疼痛煩熱經血適來適去寒熱如瘧

人參　甘草炙　黃芩各三錢　柴胡八錢

半夏湯泡七次焙乾二錢半

右剉散每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎七分去滓溫服不拘時

桂枝湯

治太陽中風陽浮而陰弱陽浮熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒翕翕發熱鼻鳴乾嘔者

桂枝去皮　生薑　芍藥各一兩半　炙草一兩

棗子六箇

右爲飲子每服三錢水一盞煎至八分去滓大小加減服須臾啜熱粥一盞以助藥力溫覆令一時許通身熱微似有汗者加減桂枝湯

自西北二方居人四時行之無不應驗

江淮間惟冬及春可行

自春末及夏至已前桂枝證加黃芩一分謂之陰旦湯

夏至後有桂枝證可加知母半兩石膏一兩或升麻一分

若病素虛寒者止用古方不在加減也

戒曰桂枝最難用雖用云表不解可發汗宜桂枝湯須是病人常自汗出小便不數手足溫和或手足指梢作微冷少須却溫身雖微似煩而又惡寒始可行之若病人身無汗小便數或手足冷不惡寒或飲酒家不喜甘者慎不可行桂枝也仍有桂枝證服湯已無桂枝證者尤不可再與

桂枝加芍藥湯

治太陽病反下之因腹痛是有表復有裏宜服

桂枝　生薑各一兩半　芍藥三兩半利者先煎

大棗六箇　甘草炙一兩

右㕮咀水煎加減服

痛甚者加大黃大實者加一兩半

羸瘦虛弱者減之

桂枝加大黃湯

治太陽病反下之因腹滿痛屬太陰桂枝加芍藥主之大實痛者桂枝加大黃湯主之

桂枝去皮一兩　白芍藥一兩半　甘草炙

大黃羸者減之各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎一片棗一枚煎服

四逆湯

治陰證傷寒自利不渴嘔噦不止吐利俱作小便或澀或利脉微欲絕腹痛脹滿手足厥冷或咳或悸內寒外熱下利清穀四肢沉重或汗出熱不出內拘急身疼痛而惡寒者用此方治之

乾薑一兩半　附子一箇生用　生甘草一兩

右㕮咀每服三錢用水一盞煎七分不拘時冷服

理中湯

治脾胃不和中寒止衝胷脅逆滿心腹疠痛痰逆惡心嘔吐心下虛煩痞滿腸塞不通飲食減少短氣羸困溫中逐水止邪汗去濕瀉注下水穀不分腹中雷鳴傷寒時氣裏寒外熱霍亂吐利手足厥冷胷痹心痛逆氣短氣寒多不飲水吐者

人參去蘆　白朮　乾薑炮各三兩　炙草一兩半

右㕮咀每服三錢水一盞煎六分去滓帶熱服空心食前或研細末白湯調下

腹痛者加人參一兩半

寒多加乾薑一兩半

渴者加白朮一兩半

臍上築者腎氣動也去白朮加肉桂四兩

吐多者去白朮加生薑三兩

下多者還用白朮

悸者加茯苓二兩

或四肢拘急腹滿下利轉筋者去白朮加附子一箇生用末之蜜丸如鷄子黃大名理中丸又名調中丸治厥陰藏寒蚘上入鬲吐長虫或胃中虛冷因發汗故吐蟲先服理中丸或加枳實茯苓蜜丸

治傷寒結胷欲絕心鬲高起實滿作痛手不得近並用熱湯化下

大柴胡湯

治傷寒十餘日邪氣結在裏往來寒熱邪實太盛大便祕澀腹滿脹痛譫語心中痞硬飲食不下或不大便五六日遶臍刺痛時發煩躁及汗後如瘧日晚發熱兼臟腑實厥有力者可服

柴胡去蘆八錢　黃芩炒　赤芍藥各三錢　枳實去穰麩炒五錢　半夏泡七次切片焙半兩

右剉散薑棗煎加減服之

欲下加大黃半兩

陰旦湯

治傷寒肢節疼痛內寒外熱虛煩

肉桂二兩　炙甘草一兩　乾薑炮　芍藥

黃芩各一兩半

右㕮咀每服三錢水一盞棗一箇同煎去滓溫服覆令少汗

白虎加人參湯

治傷寒若吐若下後七八日不解熱結在裏內外俱熱時惡寒大渴大汗煩渴不解脈洪大者

石膏四兩研細　知母一兩半　粳米一合

人參　炙甘草各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎六分米熟為度服

小建中湯

治傷寒陽脈澁陰脈弦法當腹中急痛先與小建中湯

桂枝一兩半　芍藥三兩　炙草二兩　膠飴半升

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎六分去滓下膠飴兩匙許再煎化溫服日三夜二尺脈尚遲再作一劑加黃芪末一錢

玉露散

涼心經解諸熱治口燥咽乾煩渴躁啼小便閉

寒水石　石膏水飛各一兩　生甘草三錢

右為末每服半錢麥門冬泡湯化下湯使隨意

加辰砂金箔名桃紅散亦治急驚

一方入梔子仁名金蓮散

一方加滑石名玉眞散

湯氏治小兒秋夏伏暑多煩熱吐黃涎頭額溫五心熱小便赤少或乾嘔無物服香薷散又服玉露散生薑汁和白湯調下獨用薑汁一服而止

脫甲散

治嬰孩小兒傷寒體熱頭目昏沉不思飲食夾驚夾食寒熱大小便閉澁或赤或白煩躁作渴冷汗妄流夾積傷滯腸滿脹急青黃體瘦日夜大熱及瘧傷風傷寒傷暑驚癇洛忤筋骨腎臟疳氣等熱並宜服之

當歸酒洗　白茯苓　龍膽草去蘆各三錢

人參去蘆　柴胡　川芎　知母去毛各二錢

甘草炙四錢

右為末每服一錢水一盞連鬚葱白一寸煎至半盞溫服不拘時此方散熱扶表救裏表虛令汗不妄行裏熱令氣不閉結外即通關內即開渠通關流行經絡開渠不壅臟腑熱在表裏之間施無不可

葶藶丸

治食乳衝脾咳嗽傷風面赤痰盛身熱喘嗽急促化痰寬氣進食

葶藶子隔紙略炒　漢防己　黑牽牛略炒

杏仁去皮尖雙仁者同乾麵炒黃別搗各一兩

右為末研入杏霜拌勻取蒸棗肉和再搗為劑九如麻子大每服五九至七九淡薑湯下乳食後或

臨夜服量大小加減

麻黃湯

治傷寒頭疼發熱身痛惡風無汗而喘又治太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此當發其汗服藥已其人煩熱目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也

甘草生用半兩　麻黃去節二兩　桂枝一兩　杏仁去皮尖三十箇

右㕮咀每服三錢水一盞煎八分去滓大小加減服被覆取汗

夏至後須加知母石膏各一兩黃芩八錢蓋麻黃性熱夏月溫之必有發黃發斑之失凡傷寒熱病藥性須凉不可太溫惟冬及春或病人素虛寒者乃用正方不在加減例

甘桔湯

治風熱毒氣上攻咽喉咽痛喉痹腫塞妨悶及肺壅咳嗽咯吐膿血胷滿振寒咽乾而渴時出濁沫氣息腥臭久久吐膿狀如米粥

桔梗　生甘草各二兩

右爲粗末每服二錢水一盞煎至七分去滓食後溫服加荆芥防風名如聖湯

熱甚加黃芩

瀉白散

化痰止嗽寬氣進食

地骨皮　桑白皮炙各一兩　甘草炙半兩

右剉每服二錢水一盞粳米一撮煎米熟爲度

白餅子

治小兒夾食傷寒其證發熱嘔吐亦有疼肚者噯氣辛得分曉先用此藥一服推下食積却用平和藥發散調理如惺惺散加減參蘇飲皆可服却不可服冷藥

滑石　天南星　半夏各一錢　輕粉五分

巴豆二十四箇去皮膜用水一升煮乾研細

右三味揚羅爲末入巴豆霜次入輕粉又研勻却入餘藥末令勻糯米飲丸如菉豆大量小兒壯瘦虛實用藥三歲以下每服三丸至五丸紫蘇湯空心下忌熱物若三五歲兒壯實者不以此拘加至二十丸以利爲度

麥煎散

治小兒夾驚傷寒吐逆壯熱表裏不解氣奄喘急面赤自汗或狂語驚叫或不語無汗及癮疹遍身赤癍往來潮熱時行痲痘疹子餘毒未盡渾身浮腫痰涎咳嗽或變急慢驚風手足搐搦眼目上視及傷風頭疼竝治一方無地骨皮赤芍藥滑石知母有釣藤桔梗川芎亦可

滑石　地骨皮　赤芍藥　石膏　白茯苓

杏仁　知母　生甘草　萊菔子　人參各半兩

麻黃去節一兩

右爲末每服一錢麥子煎湯調下

如初生芽兒感冒風冷鼻塞身熱噴嚏多啼每一字用麥子煎湯調下

有熱加大黃

九寶飲

治小兒嗽是肺臟感寒須是表散了却服嗽藥

麻黃去節　薄荷　大腹皮　紫蘇　陳皮

杏仁各一兩　肉桂　桑皮炙　枳殼各半兩

生甘草二錢

右㕮咀生薑烏梅煎

冷證去薄荷

熱證去肉桂

華蓋散

治肺感寒邪咳嗽上氣胷膈煩滿項背拘急聲重鼻塞頭目昏脏痰氣不利呀呷有聲

麻黃　蘇子炒　桑皮蜜炙　杏仁去皮尖炒

赤茯苓　陳皮去白各半兩　炙甘草一錢

右爲末每服一錢水一盞煎五分去滓食後服

細辛五味子湯

治肺經不足胃氣怯弱或冒風邪或停寒有飲咳嗽喘息不得安臥胷滿迫塞短氣減食乾嘔作熱咳唾結痰或吐涎沫頭目昏脏身體疼重語聲不出痛引胷脇不問新久竝宜服之

細辛　半夏湯泡　烏梅去核　甘草炙各一兩

鷄粟殼去蒂炒一兩五錢　北五味子二兩

桑白皮炒二兩

右㕮咀每服二錢水一盞生薑一片煎六分服

金星丸

治小兒風熱壅盛喉中痰鳴嗽喘氣粗面頰紅腮赤腫疼咽喉壅塞目開不得多眠發熱狂言煩躁多渴則生驚風大便不通小便如血諸般熱壅瘡瘍煩躁竝宜服之

川鬱金　雄黃各二錢半　巴豆七粒去油

臟粉半錢

右爲末調勻酢糊爲丸麻子大薄荷泡湯吞下

百部丸

治小兒肺寒咳嗽微喘有痰

杏仁四十箇去皮尖微炒麪三五沸研　百部炒麻黃各三兩

右爲末煉蜜爲丸如芡實大熱水化下

仲陽加松子仁肉五十粒胡桃仁十箇爲丸含化

幼幼方加甘草

生犀散

治咳嗽解時氣痰逆喘滿心忪驚悸風熱

杏仁炒　人參　桔梗各二錢　前胡一錢半

半夏　五味　茯苓　生甘草各一錢

右㕮咀生薑薄荷煎

有熱加羌活或加麻黃

天麻定喘湯

治小兒喘嗽驚風

明天麻　防風　羌活　生甘草　半夏麴

桔梗各一兩　白朮　人參　川芎各半兩

右㕮咀每服二錢水一盞麥門冬十四箇煎至七分食後服

有熱去白朮加芍藥枳殼

小青龍湯

治傷寒表不解惡寒體熱水停心下乾嘔發熱咳嗽喘急又主肺脹胃滿鼻塞清涕咳逆上氣喘鳴怕寒仲景曰治表不解心有水氣乾嘔發熱而嗽或渴或利或小便不通或噎小腹脹滿

麻黃去節一兩　赤芍藥　半夏炮　乾薑

甘草炙　桂枝去皮淨各三錢　北五味子

細辛各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分溫服

微利者去麻黃加蕘花如彈子大炒令赤色

若噎者去麻黃加附子半錢炮

若小便不利者去麻黃加茯苓一兩

如喘者去麻黃加杏仁半兩去皮尖

若渴者去半夏加瓜蔞根一兩半

柴胡石膏湯

治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽乾心胃煩滿寒熱往來痰實咳嗽涕唾稠黏

柴胡五兩　黃芩三兩　半夏　甘草各二兩半

石膏一斤　知母六兩　粳米六合

右剉每服二錢水一盞生薑二片淡豆豉十粒煎至七分去滓稍熱服小兒分作三服不拘時

無汗加麻黃半夏五味去

天麻防風丸

治一切驚風身體壯熱多睡驚悸手足抽掣精神昏憒咳嗽痰涎不利及風溫邪熱並宜服之

明天麻　防風　人參　辰砂研飛　雄黃

甘草炙各一錢　麝香　牛黃各一分　全蠍炒殭蠶炒各半兩

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服一丸至二丸薄荷湯下不拘時

化風丹

凉風化痰退熱定搐

蟾星　羌活　獨活　防風　天麻　人參

川芎　荊芥　粉草　全蠍各一兩

右爲末煉蜜丸如芡實大每服二丸薄荷湯下

一方加辰砂麝香各半兩

金沸草散

治傷風痰盛頭目昏痛顎項強急往來寒熱肢體煩疼胃膈滿痛咳嗽喘逆涕唾稠粘及時行寒疫壯熱惡風

荊芥穗四兩　前胡　麻黃去節　旋覆花

甘草炙各三兩　半夏製　赤芍藥各一兩

右剉每服二錢水一盞生薑二片棗一箇煎六分去滓溫服不拘時

有寒邪則汗出惡風加杏仁五味

又

治傷寒中脘有痰令人壯熱頭疼脈緊急時發寒熱皆類傷風但不頭疼爲異耳

前胡　旋覆花各三兩　荊芥穗四兩　赤茯苓

細辛　甘草炙　半夏洗淨薑汁浸製切各一兩

右爲末每服一錢水一盞生薑一片棗一箇煎六分去滓熱服未愈再服

三拗湯

治感冒風邪鼻塞聲重語音不出或傷風傷冷頭疼目眩四肢拘急咳嗽多痰胃滿氣短

麻黃不去節　杏仁不去皮尖　甘草生用各等分

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片煎至六分去滓溫服取汗爲度

一方加荊芥桔梗

嗽甚加五味子細辛各減半
一方麻黃去節杏仁去皮尖甘草炙名三和湯治喘嗽尤妙
有熱加前胡
傷風加荊芥
有痰加半夏
和解湯
治小兒四時感冒寒邪壯熱煩躁鼻塞多涕驚悸白汗肢體疼痛及瘡疹已發未發皆可服
羌活　防風　川芎　人參各一兩　乾葛
升麻　生甘草　芍藥各半兩
右㕮咀每服三錢水一盞生薑一片棗一箇煎至六分不拘時服
無汗加麻黃
咳嗽者加杏仁五味子桔梗
藿香正氣散局方
治小兒傷寒吐利
藿香　白朮　厚朴　陳皮　半夏　白茯
白芷　桔梗　大腹皮　蘇葉　甘草
右㕮咀入生薑三片煎徐徐服之
如發汗用蒼朮去白朮
補陽湯婦科
治小兒初冬間大寒證明堂青脈額上青黑腦後青絡高起唇青舌上白滑喉鳴而喘大便微青耳尖冷眼澀常常淚下出仍多駭胃中不利臥而冬驚無搐即寒
柴胡　升麻　麻黃　歸身各三錢　地龍五錢
蠍梢少許　生地　吳茱萸各五分　黃芪二分
陳皮一分　葛根　連翹　黃蘗　甘草各一錢
右爲麁末作一服水一盞煎法如常乳食後熱服
始漸喜睡精神出氣和順乳食旺
銀白散傷生總錄下同
治傷寒壯熱頭痛體疼脈大腹脹發汗夾驚者皆可服
寒水石半斤煅熟
右研極細入炒薑黃一錢半研勻如淡即添入些小以紅顏色爲度每服一錢生薑湯調下未能飲者稠調抹口以乳汁送下無時
甘露散
治傷寒壯熱頭疼體痛解表發汗及熱多者
桂府滑石二兩研細　甘草半兩
右共末拌勻每服一錢濃煎蘿蔔湯調下
一方有防風半兩
香殼丸
治傷寒心胷滿悶不快
橘皮去穰不拘多少
右爲細末每服一錢生薑湯調下乳前食
小珍珠丸
治風壅痰實利咽痛除咳嗽止煩熱清頭目
半夏湯洗七次焙乾爲末　白礬火枯研末
寒水石煅通赤出火毒研末各一兩
右拌勻細麵糊和丸黃米麻子粟豆三等每服五七九至十九溫生薑湯下食後量大小加減與服
歡喜散
治傷風寒發熱頭痛無汗惡風或溫熱鼻塞清涕淚出嚏噴
防風　人參　炙草　天麻　前胡各二錢半
細辛　柴胡各一錢半　白茯苓　桔梗各二錢
枳殼麩炒三錢半　川芎三錢
右爲細末每三歲以上抄一錢水六分薄荷兩葉同煎三兩沸通口服無時
紅綿散
治傷風寒及夾驚取汗
麻黃去根節　全蠍炒　大黃紙裹煨熟切焙
炙甘草　白附子　蘇木剉炒　生天麻各一分
右爲細末一歲下兒服一字以上兒半錢四五歲一錢水一小盞以綿少許裹藥煎之至綿紅色卽去綿溫服
坯煎散
治傷風寒夾驚潮發頭痛體熱咳嗽手足冷
麻黃去根節半兩　人參　茯苓　殭蠶去絲嘴
全蠍　天麻　白附　炙草各一分　硃砂二錢
川烏炮去皮尖一錢半
右爲末每服半錢至一錢水五分坯子胭脂一豆大薄荷兩葉葱白一寸同煎至四分放溫服不拘時
千金丸
治傷寒傷風夾驚夾食取微利
硃砂　膩粉各一錢　全蠍　白丁香各七箇
麝香半錢
右爲末白飯和丸蘿蔔子大薄荷湯下一歲兒三

丸量大小加減無時

茯苓散

治傷寒數日胷膈不利調中養胃

赤茯苓一兩　陳皮三分　桔梗去蘆一兩

炙甘草半兩

右爲末每服一錢水六分入生薑二片煎至四分溫服無時

枳實散

治傷寒已汗未汗卒胷膈痞痛

枳實麩炒黃不拘多少

右爲末每服一錢或半錢米飲調下無時

竹瀝湯

治傷寒數日煩躁不解

竹瀝不拘多少

右用新汲水如竹瀝多少盞內和勻服無時

眞珠散

治傷寒口乾心神煩躁

眞珠研末　龍腦研　牛黃研各半錢　瓜蔞根

茯神　硃砂研各一分　牙硝　寒水石煅各半分

右爲末每服半錢蜜水調下無時

秦艽煎

治傷寒心神煩躁口乾煩渴

秦艽半兩去蘆

右細剉用牛乳半盞煎至六分去滓放溫分三四服無時

藕汁蜜

治傷寒煩渴

生藕搗取汁半盞

右入蜜一錢調勻服無時

葛根湯

治傷寒發熱煩渴

葛根　人參各半兩　麥門冬去心　白茯苓

炙甘草　澤瀉各一分

右爲末每服半錢或一錢水半盞薄荷兩葉煎至四分去滓溫服無時

百合散

治傷寒腹中滿痛

百合炒黃半兩

右爲末每服半錢或一字米飲調下無時

黃芩散

治傷寒五六日大便不通熱躁悶亂

黃芩　枳殼去穰麩炒　大黃　大腹子各半兩

右爲麁末每服一錢水半盞煎至四分去滓服不拘時

犀角散

治如前

犀角屑　大黃炮　柴胡各半兩　人參一分

砂硝　甘草各半分

右爲末每服半錢水五分入粟一箇煎至四分去滓溫服量大小加減

石燕散

治傷寒小便不通小腹脹滿

石燕火煅爲末

右用葱白湯調下一字以通爲度無時

又方

萓草根

右煎湯調五苓散服之乳前食

葛根汁

治傷寒衄血不止

生葛汁一小盞

右分三四服卽止無時

立應散

治如前

蒲黃　乾葛根末　右槐花焙乾末各一分

右爲細末每服半錢或一字生地黃汁調下併二三服止無時

又方

蒲黃炒黑

右爲末每服半錢或一字新汲水調下無時

金汁蜜

治傷寒衄血數日不止

生地黃汁　川蜜各小半盞　蒲黃半兩

右和勻微炒過每服半盞或少許無時

神白散

治傷寒吐血衄血咯血大小便血

槐花一分微炒　臘粉半兩

右同爲細末每服一錢或半錢煎柳枝湯放溫調下如修合不及但以柳枝爲末新水調下亦可

香墨丸

治傷寒衄血兒小不能服散藥者

好細墨爲末

右以鷄子清和丸黍米大每用七丸飲下或灌之

地黃汁

治傷寒吐血心胷不利煩渴不已亦治衄血

生地黃杵絞取汁

右量兒大小與之

麥門冬湯

治傷寒咳嗽喘息

麥門冬　款冬花　人參　紫菀洗焙各一兩

桂心半兩　甘草一分

右爲末後入杏仁二十枚麩炒去皮尖研細拌勻每服一錢水一盞生薑二片煎至六分去滓溫服無時

一捻金散

治傷寒風熱咳嗽

白殭蠶去絲嘴一錢　甘草半兩　延胡索一分

右爲細末每服一捻薑汁調下無時

潤肺散

治傷寒鼻塞涎壅咳嗽肺氣不利語聲不出

麻黃去根節　人參去蘆　杏仁麩炒去皮尖

貝母麩炒黃各一兩　炙草半兩　陳皮一分半

桔梗去蘆　阿膠蛤粉炒如珠子大各一分

右爲末每服一錢水八分煎至六分去滓溫服無時

赤芍藥散

治傷寒陽證咳逆

赤芍藥不拘多少沸湯浸七遍每遍以丸盆蓋少時數足取出炒燥爲末每服一錢豆豉三粒生薑一片水七分煎至五分放溫服無時

華良湯

治傷寒寒多咳逆

華澄茄　良薑各等分

右爲末每服一錢水六分煎數沸入酢少許攪勻帶熱服

靈砂膏

治傷寒脉數熱入胃嘔吐

澤瀉二兩半　肉桂一兩　猪苓　赤茯苓

白朮去蘆各一兩半　硃砂細末一錢

右爲末煉蜜和膏鷄頭大每服一丸生薑自然汁化破與服

只末用使是五靈散亦治發熱煩渴飲水水入即吐或小便不利

積熱在裏發黃濃煎茵陳蒿湯調下餘病飲調

四味人參湯

治傷寒脉遲胃冷嘔吐

乾薑炮　黃芩　黃連去鬚　人參各等分

右爲粗末每服一錢水六分煎至四分去滓溫服無時

附子薑朮丸

治傷寒寒多嘔吐手足厥冷

附子炮去皮臍半兩　乾薑炮　厚朴薑製各一分

右爲末糊丸麻子大每服五七丸米飲下無時

半夏湯

治傷寒嘔逆不下乳食及乾嘔欲死

半夏半兩湯泡七次　生薑一兩

右同剉碎焙乾每服一錢水一盞煎至五分去滓時時與服無時

蘆根飲子

治傷寒乾嘔及反胃嘔吐

生蘆根切碎　青竹茹各二合　糯米半合

生薑半兩

右㕮咀先以水一升煮千里鞋底取半升澄清下藥再煮取二三合隨意服量大小加減

三黃散

治傷寒發黃

川大黃半兩剉微炒　黃芩　黃連各一分

右爲末每服半錢水六分煎半去滓溫服無時

大麥苗汁

治如前

大麥苗搗爛

右絞汁與服小麥苗亦得

人參柴胡飲子

治體虛傷於寒邪潭身壯熱頭目昏重項背拘急支體疼痛乾嘔嘔逆或作寒熱發歇無時煩渴不食

人參　柴胡　白朮　白茯苓　青皮　桔梗

麥冬　川芎　白芍藥　炙甘草　桑白皮

升麻各等分

右爲末每服一錢或二錢水一盞烏梅一箇同煎至六分量大小分服無時

鷄白調散

治傷寒傷風發寒熱似瘧久不差漸變骨間蒸熱

硃砂　枯礬　鐵華粉　粉霜　鉛白霜各一錢

輕粉　白附子各二錢　蝋梢六箇　龍腦

麝香各少許

右爲末每服半錢入鷄子白井花水共約一茶盞調勻服無時

茵陳散

治傷寒發黃不可下

茵陳一兩　白朮　甘草各半兩

右爲散每服半錢沸湯調下

小便不利者加茯苓一兩

絳雪丹

治傷寒五六日發黃小便不利煩躁熱悶飲水煩躁不解

硃砂半兩研　水飛硝石二兩研　龍腦少許

右同研勻細白米和丸鷄頭子大沙糖水化下量大小服

商陸散

治傷寒咽喉腫痛

商陸根切碎杵爛

右炒熟用手帕子裹熨患腫處冷卽易之

甘桔防風湯

治傷寒咽喉腫

桔梗一兩米泔浸焙用　甘草　防風各二兩炒

右爲末每二錢水一盞煎六分放溫冷細細呷服

黃蘗蜜

治傷寒熱毒口舌生瘡赤爛

黃蘗去麄皮

右用蜜漬一宿微煎過含之嚥汁勿絕或以黃蘗爲末同煎膏含之

黃芩湯

治傷寒口舌諸病舌黃舌黑舌腫舌裂舌上生芒刺舌上出血皆治亦治鼻衄

黃芩三錢　赤芍藥　炙甘草各二錢

右㕮咀每二錢水一盞煎至六分去滓溫服

勝金錠子

治傷風結胷氣痞

大黃半兩　枳殼去穰麩炒黃淨一兩

右爲細末煉蜜和劑捏作餅子如小錢大

結胷者用芒硝半錢用生薑水化半餅或一餅服之

痞氣者煎陳皮湯化下無時

生熟散

治傷寒結胷硬痛

草烏頭二箇一生一炮

右同爲末生薑自然汁和勻爲丸如鷄頭子大每一丸用蜜湯化下

苦參酒

治傷寒熱毒結在胷膈六七日垂死

苦參半兩

右剉碎用酒一盞煎至半盞去滓放溫分三四服連併服之須臾吐出羊膽汁立愈

黃連湯

治傷寒熱入腸胃下痢膿血

黃連二兩　黃蘗俱微炒　阿膠各一兩蛤粉炒

梔子仁半兩

右爲粗末每服一二錢水六分煎至四分去滓溫服無時

梔子仁湯

治傷寒熱毒攻於腸胃下赤汁或如爛肉鴨肝壯熱腹痛

梔子仁二十一箇　豉二合　薤白一握切

右以水二大盞同煎至一盞去滓量大小分作數服無時

烏仙散

治陰證傷寒四肢厥逆

川烏不拘多少

右以童便浸不計日數直至浸脫皮時用水洗淨切碎曬至八分乾便以紙袋盛懸於當風處用時旋取爲末臘茶調下半錢量大小及病勢與之

燒附散

治傷寒陰盛隔陽身冷厥逆脉沉細而煩躁體冷大附子一枚半兩重者

右入急火燒微存中心二三分取出用磁器合蓋放冷爲末更入臘茶末一錢同研勻細每服半錢水一小盞蜜少許同煎半盞去滓溫服服訖須臾躁止得睡汗出而解

一方燒附末每一字或半錢酒調下頻服取汗出差小兒本怯者最宜服

玉女散

治傷寒汗後潮熱日發諸藥不效

川烏一兩火炮去皮臍
右爲細末每服一錢或半錢水一盞半入生薑一片棗一枚煎至四分溫服無時
人參化風膏
治風癇發搐涕咳無時
天麻一兩酒浸　全蝎十四箇微炒　殭蠶微炒
人參　川芎　白附子各半兩　羌活　獨活
防風各一錢
右爲細末煉蜜丸如皂子大每服一丸荊芥湯化下量大小與之無時
黑龍散
治小兒傷寒在表服冷藥寒伏于中危困不得汗
麻黃　竹茹　蘇木　烏龍土乃火團也各一分
蝎梢二十一箇
右爲末每服半錢水五分煎至三分溫服無時

單方

治小兒傷寒用葛根汁淡竹瀝各六合相和二三歲兒分三服百日兒斟酌服千金方下同
治小兒時氣桃葉三兩擣以水五升煮十沸取汁日五六遍淋之若復發燒雄鼠屎二枚水調服之
小兒流涕是風寒也白芷末葱白搗丸小豆大每茶下二十丸仍以白芷末蔥汁調塗太陽穴乃食熱葱粥取汁聖惠方
治小兒吹乳胃寒白豆蔻仁縮砂仁各十四箇生甘草炙甘草各二錢爲末常摻入兒口中得效方
小兒風寒煩熱有疾不省人事荊芥穗半兩焙麝香
片腦各一字爲末每茶服半錢大人亦治普濟方
小兒春月外感風寒用防風陳皮各三分羌活蘇葉
各二分蟬殼三隻甘草一分葱白一寸生薑一片煎
熱服取汗錢氏方
小兒傷寒百日內患壯熱用鐵鎚一斤燒赤水二斗
淬三七次煎一半入柳葉七片浴之聖濟錄
小兒風寒蘿蔔子生研末一錢溫葱酒服之取微汗
大效衛生易簡方
治傷寒時氣頭痛不可忍以砒硝研細末油調塗頂上衛生總微下同
治傷寒毒攻手足痛者以羊桃汁雜鹽豉汁漬之
治傷寒因飲水心下結痞硬痛名水結以芫花醋拌
慢火炒熟用綿裹熨之冷即易再炒用以效爲度
治傷寒熱毒乘心神志昏悶煩躁昏亂以藍靛一字
或半錢新水調下
治傷寒陰證厥逆以茱萸半升酒和勻濕用絹袋二
枚盛蒸令熱共以熨脚心冷即易之候氣通暢勻暖
即止
治傷寒汗後餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能食
以牛蒡根杵爛絞取汁服看大小多少與之

醫案

萬氏幼科發揮曰一小兒外感風邪服表散之劑汗出作喘此邪氣去而脾肺虛也用異功散而汗喘止再劑而乳食進
薛鎧保嬰撮要曰一小兒九歲素惡風寒飲食少思至秋冬口鼻吸氣陰冷至腹手足如冰飲薑湯及燒酒方快其脈細微兩尺如無余謂此稟命門火衰也用還少丹不應改用八味丸旬餘諸證即愈吳江史安卿子傷風用表散化痰之藥反痰盛咳嗽肚腹膨大面色兒白此脾土虛不能生肺金也余用六君子湯加桔梗一劑頓愈至三日前證仍作鼻中流涕此復傷風寒所致仍用前藥加桑皮杏仁桔梗而愈
史少參季子喘嗽胃腹膨脹泄瀉不食此飲食傷脾土而不能生肺金也用六君子湯一劑諸證悉愈
史木川子六歲感冒咳嗽發散過度喘嗽不食用六君子湯加桔梗而愈時四月隨其父巡視耕種忽發寒戰仍復咳嗽或用發表之劑痰中有血余曰此成肺癰也次日吐痰兼膿用桔梗湯而愈後元氣未復大便似痢或用五苓黃連枳實之類痰喘日劇四肢抽搐余曰此脾氣敗而變慢脾風也辭不治果然

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百三十九卷目錄

醫部彙考四百十九

小兒諸熱門一

黃帝素問 通評虛實論篇

錢乙小兒直訣 諸經發熱證治 黃疸

羅天益衛生寶鑑 小兒季夏身熱疼黃治驗

朱震亨幼科全書 發熱 西江月

方賢奇效良方 小兒諸熱須分主治

萬氏幼科發揮 諸熱

曾伯嗣學嬰童百問 諸熱證 瘧熱 壯熱溫 壯熱頻躁 爲證 壯熱溫 黃疸

王綸明醫雜著 潮熱

樓英醫學綱目 黃病

陶華六書 小兒諸熱

王肯堂證治準繩 發熱辨證 五臟熱 實熱 虛熱 表熱 裏熱 餘熱 壯熱溫 壯熱 蒸熱 潮熱 骨蒸熱 頻躁 註夏 黃疸

陳治幼幼近編 潮熱

小兒衛生總微論方 諸身熱 黃疸 渴

醫部彙考四百十九

小兒諸熱門一

黃帝素問

通評虛實論篇

帝曰乳子而病熱脈懸小者何如

註 夫病熱者皆傷寒之類也凡傷於寒藉陽氣以化熱熱雖盛不死然陽氣生於精水之中男子八歲女子七歲腎氣始實乳子天癸未至腎氣未盛故帝有此問焉夫心主脈而養生於腎心腎水火之氣上下時交腎氣不能上養於心則心懸如病饑而寸口之脈懸絕小者腎氣未盛也

岐伯曰手足溫則生寒則死

註 伯答乳子之生陽藉後天之氣也四支皆稟氣於胃故陽受氣於四末是以手足溫者胃氣尚盛故生寒則胃氣已絕故死夫水穀入於胃津液各走其道腎爲水臟受五臟之精而藏之是先天之精猶藉後天之所資益者也又別出兩行營衛之道其大氣之搏而不行者名曰宗氣積於胸中上出於肺以司呼吸是四支之原俞又受資於胃府所生之營衛宗氣是以手足溫者生寒者死

帝曰乳子中風熱喘鳴肩息者脈何如岐伯曰喘鳴肩息者脈實大也緩則生急則死

註 此復論後天所生之宗氣而亦不可傷也宗氣者五臟六腑十二經脈之宗始故曰宗氣肩息者呼吸搖肩也風熱之邪始傷皮毛喘鳴肩息是風熱盛而內干肺氣宗氣故脈實大也夫脈之所以和緩者得陽明之胃氣也急則胃氣已絕故死

宋錢乙小兒直訣

諸經發熱證治

潮熱者時間發熱過時卽退來日依時而發此欲發驚也

壯熱者常熱不已甚則發驚癎也

風熱者身熱而口中氣熱乃風邪外感也

溫壯者肢體微熱也

發熱而不欲飲水者胃氣虛熱也用白术散

發熱而飲水作渴喜冷飲食者胃氣實熱也用瀉黃散

註 按秘藏保嬰集云小兒潮熱或壯熱不退多是變蒸及五臟相勝不必用藥又多食積鬱熱由中發外見於肌表只理其中清陽明之熱而表熱自除不可認作外感用小柴胡輕利等藥重傷其內又潮熱不退恐是出痘亦當審察勿便用藥竊謂發熱飲水者熱在內不飲水者熱在外也又當以此辨之其諸熱證說見各類

黃疸

若大病後身目皆黃者黃病也

身痛背强大小便澀一身盡黃小便黃赤此黃疸也瀉者難治

若百日或半年不因病而身黃者胃熱胎疸也若淡黃兼白者胃怯也

註 按大病後身目皆黃或肢體黃胖者脾氣虧損而真臟爲病宜用六君子湯參苓白术散調補元氣病後發渴者脾氣虛而津液少也用七味白术

散若脾經濕熱壅滯二便祕滕理不得疏泄而爲患者名爲黃疸用茵陳湯初生身黃壯熱不乳便祕此爲胎熱用地黃湯若二便赤澁腹脹面赤飲水用茵陳湯調五苓散若清便自調四肢並冷用益黃散淡黃白用調中丸

元雞天益衛生寶鑑

小兒季夏身熱痿黃治驗

小兒身體蒸熱胃脘煩滿皮膚如潰橘之黃眼中白睛亦黃筋骨痿弱不能行立此由季夏之熱加以濕令而蒸熱薄於經絡入於骨髓使藏氣不平故脾逆乘心濕熱相合而成此疾也蓋心火實則身體蒸熱胃脘煩滿脾濕勝則皮膚如潰橘之黃有餘之氣必乘己所勝而侮不勝是腎肝受邪而筋骨痿弱不能行立內經言脾熱者色黃而肉蠕動又言濕熱成瘼信哉斯言也此所謂子能令母實實則瀉其子也若脾土退其本位腎水得復心火自平矣又內經曰治痿獨取於陽明正謂此也予用加減瀉黃散主之

朱震亨幼科全書

發熱

凡小兒有病皆熱證既不同治亦當異須明虛實不可妄自汗下

凡傷風發熱其證汗出身熱呵欠面赤目潤多睡惡風喘氣此因解脫受風所致宜疏風解肌退熱先服柴葛解肌湯發去風邪俟熱之時再服涼驚丸以防內熱

凡傷寒發熱其證無汗身熱呵欠煩悶項急面赤喘急惡寒口中熱氣此因解脫受寒所致宜發散寒邪退熱鎮驚先服惺惺散發去寒邪後服涼驚丸以防內熱

二證如小兒稟賦厚者可用涼驚丸虛怯者用胃苓丸甚效

如傷風發熱又吐又瀉者不可發散此脾家虛怯也以五苓散吞理中湯最效

凡傷風發熱多得於夏其證身熱自汗作渴昏睡手足俱熱此因天氣已熱包裹太厚重受其熱也先用白虎湯調益元散以解其熱次服調元生脈散以補元氣

傷暑發熱多得於夏其證身熱自汗作渴昏睡手足微冷此因陰室之中取涼太過所致先服調元生脈散補其正氣次服四君子湯以防吐瀉之患

如夏月汗出當風以致身熱自汗不止者此名暑風先用四君子湯加麻黃根黃芪以去其風次用益元散以清其熱

傷食發熱其證手心熱肚背尤熱一噯氣便吐乳大便酸臭或腹痛多啼或腹飽脹喘急不思乳食此得之飲食過度所傷宜先利去其積用丁香醒脾丸後以集聖丸調之如傷食已久日漸黃瘦作熱無時者不可下輕者保和丸重者集聖丸百無一失

痘疹發熱其證面燥腮赤目泡亦赤呵欠煩悶乍熱乍寒咳嗽噴嚏手足指冷驚悸多睡此因時行痘疹各相傳染宜清涼解毒惟痘疹宜用參蘇飲加木香麻疹宜荊防敗毒散不可妄用自發汗恐生變證

變蒸發熱此小兒正病不須服藥當於類下求之不可錯誤

潮熱者當分二證有時間發熱過時即退來日依時復發其狀如瘧此肺熱也有蚤晚發熱每日兩度如潮水應期此胃熱也蓋因感觸邪氣以致血脈凝滯不即流通若不治之變驚癎者多矣肺熱者地骨皮散主之胃熱者三黃丸下之虛弱者集聖丸調之

驚熱者遍身發熱面青自汗心悸不寧脈數煩躁顛叫恍惚此心熱也以涼驚丸退熱以安神丸定心

夜熱者但夜間發熱晝作便住此血虛證也以人參當歸散治之兼服抱龍丸以防作搐

餘熱者傷寒汗下後而熱又來乃表裏俱虛氣不歸元陽浮於外不可再用涼藥蓋熱去則寒起古人戒之當和胃氣使陽氣收斂其熱自退參苓白朮散主之甚者四君子湯加乾薑甚效

疳熱者形色黃瘦食不長肉骨蒸盜汗泄瀉無常肚大筋弱此多得於大病之後失於將息又或傷飢失飽而致集聖丸大有奇功

壯熱者一向熱而不已由血氣壅實五臟生熱熬蒸於內則眠臥不安精神恍惚蒸發於外則表裏俱熱躁急喘粗甚則發驚癎也治法先以導赤散吞瀉青丸以治其熱後以抱龍丸鎮其驚如實熱大小便閉者三黃丸下之

煩熱者心躁不安五臟煩熱四肢溫壯小便赤澀宜用導赤散麥門冬山梔仁治之再以涼驚丸撤其餘邪

積熱者煩赤口瘡大小便澀表裏俱實或內因酒麵煎煿熱藥峻補外用重衾厚綿爐火侵迫皆能生熱此內外蘊積之熱非食積之熱也先以三黃丸下之

後以凉驚丸調之

虛熱者或因汗下太過津液虛耗或因大病之後元氣受傷皆能發熱其證困倦少力面色青白虛汗自出神慢噓氣軟弱手足厥冷此血氣俱虛氣虛則發厥血虛則發熱也四君子湯加炒乾薑甚者加熟附子一片待熱少退以集聖丸調之

客熱者邪妨於心也心若受邪則熱形於額故先起頭面次而身熱恍惚多驚聞聲則恐良由眞氣虛而邪氣勝也邪氣既勝則眞氣與之交爭發渴無時進退不定如客之往來也先以導赤散去其邪後以凉驚丸調之

癖熱者由乳食不消伏結於內致成癖塊以生熱於外也治法以集聖丸主之

瘧熱者寒熱往來有頭痛汗出者有嘔吐不食者有憎寒壯熱而作渴者有遍身疼痛者有腹痛者有吐瀉者證皆百出治非一端頭痛汗出遍身疼痛者小柴胡湯加羌活蒼朮治之腹痛者脾積丸治之作渴者白朮散治之吐瀉者理中湯治之俱用平瘧養脾丸調之

血熱者每日巳午間發熱遇夜則凉此心熱也輕者導赤散重者四順飲治之

祖傳治熱不問其證肝腎虛弱者以胃苓丸竹葉炒米湯吞治之元氣素厚者以凉驚丸竹葉燈心薄荷湯吞治之

西江月

小兒病則生熱須知得病根因風寒外感熱來潮飲食內傷煩躁吐瀉瘧痢瘡疥變蒸痘疹如燒骨蒸體弱漸成勞調治般般分曉

若是風寒外感面紅又惡風寒惺惺散子妙難言有咳參蘇靈驗飲食內傷可下三黃脾積相參再添集聖保平安莫使脾虛表轉

吐瀉胃苓最好痢如赤白香連瘧家平瘧解邪干瘡疥胡麻丸散變蒸小兒常病不宜妄用丸湯如逢痘疹別科傳集聖散調疳款

治熱汗下休錯誤汗誤下傷人應汗而下痞滿侵應下而汗驚定只爲不明表裏致令大命將傾果難捉摸且因循用藥胃苓集聖

明方賢奇效良方

小兒諸熱須分主治

夫小兒驚熱者誤因驚著執以爲常致令心氣不和身體微熱睡夢虛驚遍身有汗甚者手足拳縮變成癇疾此由氣血不和實熱在內心神不定所以發搐又小兒變蒸亦微驚所以然者亦熱盛故也治之以七寶散天竺黃散甘露散辰砂金箔散皆可治之小兒因驚則生熱熱則心不寧故睡臥不安身體悚動心主驚實則發熱飲水虛則臥而悸動不安此其候也

小兒溫壯者由胃氣不和氣行壅塞故蘊積體熱名曰溫壯若大便糞臭而黃者此腹內有伏熱以四順飲子治之若糞白而酸臭則挾宿食不消當服紫霜丸輕者少服重者節乳哺增丸藥當取微利可也

小兒壯熱者因五臟生熱熏動於外故身體壯熱大抵與溫壯相類而有小異但溫溫然不甚盛是溫壯也其壯熱者一向熱而不止甚則發驚也以七寶散大黃朴硝湯皆能治之

小兒風熱若身熱面青口中亦熱煩叫不時有風證者宜虎睛丸天竺黃散治之若熱甚大便祕澀者四順飲子亦可服之

小兒煩熱者由臟腑實熱血氣盛表裏俱熱則苦煩躁不安皮膚壯熱也以八珍飲子七寶散皆可服之

小兒手足多熱心煩躁哭唇深紅飲水不止以竹葉石膏湯加味甘露散治之

小兒潮熱者時間發熱過時即退來日依時而發此欲發驚也大抵血氣壅盛五臟驚熱熏發於外故溫壯相類或夾伏熱或帶宿寒夾伏熱者大便黃而臭帶宿寒者大便白而帶酸臭皆緣臟腑冷熱之氣俱盛腸胃蘊積故也治之以金蓮飲尅效湯加味甘露散過期不解小柴胡湯或竹葉石膏湯錢氏云假如潮熱是一臟實一臟虛而內發虛熱也法當補母而瀉本臟則愈且如日中發潮熱者是心虛也肝爲心之母則宜先補肝肝實而後瀉心心得母氣則內平以潮熱愈也醫見潮熱妄謂其實乃以大黃朴硝輩諸冷藥利之利既多矣不能禁約而津液內竭縱取一時之瘥鮮有不成疳病而身瘦也

小兒積熱者由表裏俱熱則遍身皆熱頰赤口乾小便赤大便焦黃先以四順飲子三解牛黃散利動臟腑熱卽去既去復熱者裏熱已解而表熱未解也當用惺惺散或紅綿散加麻黃微發汗表熱乃去表熱既去又發熱者何也世醫到此盡不能曉或再用凉藥或再解表或以爲不可醫誤致天殤者甚多此表裏俱虛氣不歸原而陽浮於外所以再發熱非熱證

也只用異功散入粳米煎和其胃氣則收陽氣歸內身體便凉熱重者辰砂金箔散治之錢氏白朮散亦可

小兒虛熱者因患後平復血氣未勻四體羸弱時多發熱治宜調氣補虛其熱自退如錢氏白朮散異功散四君子湯之類或未退人參生犀治之爲良

小兒實熱者頭昏頰赤口內熱小便赤澁狀如豆汁大便堅鞕或祕澁不通腹急此熱證也宜四順飲子大黃朴硝湯八珍散略挨動臟腑卽安

小兒疳熱者發熱形瘦多渴喫食不長肌膚者爲之疳熱三四歲後有此疾蓋喫食則有疳用金瓜丸玉蟾丸肥兒丸之類治之最爲穩當

小兒純陽未有虛羸形瘵之證溫補之劑寡矣且如前人論小兒發熱有一十四證見證立方多獲功效今人常效前人之心觀形察色切脈論證以分表裏虛實設有所誤非惟夭閼人命抑且欺於心哉萬氏幼科發揮

諸熱

肝熱者目中青手尋衣領及亂捻物爲青丸當歸龍薈丸主之

心熱者目中赤視其睡口中氣溫喜合面睡或仰睡上齦咬牙宜導赤散黃連安神丸主之

如目中熱心虛也宜錢氏安神丸主之

脾熱者目中黃渴黃散茵陳五苓散主之

肺熱者目中混白甘桔湯木通散主之

腎熱者目無精光畏明脊骨重目中白翳多其顴卽解地黃丸主之

虛熱者多在大病後或溫熱或潮熱或渴或不渴大小便如常宜補之竹葉湯調元湯地骨皮散主之

實熱者面赤腮燥鼻乾焦喜就冷或合面臥或仰臥露出手足掀去衣被大渴飲水大小便祕宜瀉之神芎丸大金花丸大便不通者用膽導法

或問治熱以寒治寒以熱良工不能廢其繩墨也今治虛熱乃用溫藥者亦有說乎予曰說具內經實熱邪火也可以水制可以實折故以寒治熱者逆治法也虛熱者眞火也水不能制寒不能折唯甘溫之劑可以勝之故以溫治虛熱者從治法也逆之從之不離乎正

魯伯嗣學嬰童百問

諸熱證

小兒之病其熱雖多大熱有虛有實實則面赤濃黃氣粗口熱燥渴唇腫大小便難掀揭露衣煩啼暴叫虛則面色青白恍惚神緩口中清冷噓氣輭弱泄瀉多尿夜出盜汗其或乍凉乍溫怫鬱驚惕上盛下虛泄水穀不分此則冷熱不調之證虛則敗毒散加木香當歸然小兒表裏俱熱面黃頰赤唇燥口乾小便赤澁大便焦黃先以四順清凉飲爲之疏利其熱卽去或表未解也當先用惺惺散少加麻黃去節以取發出其汗或用柴胡散則表熱已除又當和解其熱自平若驚熱風熱積熱可服寬熱散下之保壽散金粉散以退餘熱可也

潮熱

仲陽云潮熱者時間發熱過時卽退來日依時發熱此欲發驚也發來潮熱又似瘧熱總曰潮熱蓋發作有期其熱有三榮熱衛熱瘴氣熱兩日一發或三日一發並用黎漿飲治之王氏云潮熱乃是血氣壅實五臟生熱熏發於外故令發熱傷寒論云潮熱者實熱也當利大便大柴胡湯承氣湯等劑治之虛熱者地骨皮散主之犀角飲髓甲散靈犀飲秦艽飲生犀散聖濟經用地骨皮飲羌活餅等劑

壯熱溫壯

仲陽云壯熱者一向熱而不已甚則發驚癇也溫壯者但溫而不熱也巢氏云小兒壯熱者是熱氣盛熏發於外故令身體壯熱其發無漸大體與溫熱相似少有異者熱加甚也此候宜服輕藥惺惺散羌活散皆可甚則黃芩柴胡乾葛之劑散之夫溫壯者由小兒臟腑不調內有伏熱或挾宿寒皆搏於胃氣故令不和氣行壅澁故積體熱名曰溫壯大便黃而臭者內有伏熱其大便白而臭酸者則挾宿寒故也宜溫之服理中四君子輩加桂治之伏熱宜五苓散幷白虎湯二藥俱效其腹中有伏熱溫壯柴苓散主之其心神不安大腑祕熱二黃犀角散主之溫壯常熱不止牛黃散主之凡解後餘熱不退可服地骨皮散黃龍湯牛黃膏亦治壯熱直指羚羊角湯治諸驚壯熱治下後熱不退身壯熱百骨節疼梔子仁湯大連翹飲六物黃芩湯五物人參飲對證選用之古法去伏熱則用龍腦湯去宿滯則紫霜丸甚效聖濟經用升麻芍藥等劑治之

煩躁

論云啾煎不安是煩啾啾唯不定是躁啾煎者心經有熱精神恍惚內煩不安心煩則滿自然生驚啾唯者

心經有風邪精神恍惚心躁生風熱多不安煩久而驚風多不定躁久而搐治法涼心經退熱通利小便爲佳熱甚者黃連解毒湯輕者導赤散玉露散風熱者至寶丹琥珀散解毒丸皆可服有傷寒證者大小柴胡湯白虎湯去大黃加乾葛治之有驚熱者金箔鎮心丸七物黃連湯尤妙

渴證

議曰小兒渴證一見脣紅如丹三五分即發三五分渴若紅甚即渴甚脣紅焦黑者即久渴虛盛疾加轉極證危篤故也凡小兒三焦虛煩作渴引飲不歇宜服三黃丸小兒傷寒後發渴脣焦口乾煩躁盛者白虎湯主之竹葉湯亦可服小兒瀉利作渴者五苓散去桂加乾葛尤妙香薷飲車前子散皆可服小柴胡湯加天花粉亦佳加乾葛尤穩太熱煩躁而渴者黃連解毒湯亦可服七物黃連湯亦可服極穩大抵小兒本自盛實易爲生熱熱氣熏蒸故渴而引飲也

黃疸

仲陽云身痛背臂强大小便澀一身皆黃面目爪甲俱黃小便如屋塵汁色著物皆黃渴者難治此黃疸也二證多病於大病後別有一證生下百日及半年不因病後身微黃者胃熱也大人亦同又有面黃腹大食吐渴者脾疳也又有初生而身黃者胎疸也諸疸皆熱色深黃者是也若淡黃兼白者胃怯不和也茵陳湯梔子檗皮湯犀角散連翹赤小豆湯主之通治黃疸茵陳五苓散尤爲穩也又有脾弱痿黃小便清者治以溫劑當歸丸散主之小半夏湯亦可用

王綸明醫雜著

潮熱

小兒潮熱或壯熱不退多是蒸發五臟相勝不必用藥又多是飲食停積鬱熱由中發外見於肌表只理其中清陽明之熱而表熱自除不可認作外感輕易發汗用小柴胡輕利等藥重傷其內又潮熱不退恐是出痘亦當審察勿便用藥

（註）按前證若因飲食停積或腹痛吐瀉或肚腹膨脹宜用保和丸以消導健脾若飲食既消或腹痛不食或肚腹膨脹宜用四君子以保養胃氣若因誤行汗下損傷元氣宜用參芪歸朮陳皮甘草以補中氣大凡傷食脾胃必損宜固胃氣庶無變證若寅卯辰時熱者屬肝經也巳午未時熱者屬心經也申酉戌時熱者屬肺經也亥子丑時熱者屬腎經也當詳其虛實而治之凡屬虛熱實熱投以攻補之劑其病既不增減乃是病根深固而藥力未能及耳須宜多服功力既至諸病悉退切不可改爲別治設或藥不對證禍在反掌慎之

樓英醫學綱目

黃病

潔古云陽黃則大小便赤澀身熱是脾土與心火相搏爲陽病法當先利小便後下大便

凡治黃病腹脹當用茵陳蒿湯下五苓散若欲利小便去大黃欲利大便則加大黃之類有陽證可服謂面赤飲水者是也

陰黃則清便自調面目及身黃四肢冷是脾虛不能制腎水當用益黃散及史君子丸淡黃白者胃不和下平胃散調中丸渴者人參白朮散

陶華六書

小兒諸熱

治小兒壯熱昏睡傷風風熱瘡疹傷食皆相似未能辨認間服升麻葛根湯惺惺散小柴胡湯甚驗蓋此數藥通治之不致誤也惟傷食則大便酸臭不消化畏食或吐宜以藥下之

王肯堂證治準繩

發熱辨證

風溫熱壯熱相似

風溫者身不熱而口中氣熱又有風溫證者但溫而不熱

傷寒熱口熱呵欠煩悶項急

傷寒熱十指梢冷鼻流清涕發熱無汗面慘凌振右腮有紫紋

痘瘡熱噴噎悸動耳尖冷

麻痘熱面赤足冷身發壯熱呵欠煩悶咳嗽腰疼時或作驚腹痛自痢及中指獨冷者是也

變蒸熱唇上白泡珠起耳冷

變蒸熱溫溫微熱氣粗驚少哯乳瀉黃上唇尖有小泡如水珠子即變蒸也不須用藥攻治

疳熱面黃吃炭土羸瘦鼻下赤爛

驚風熱發搐悸瘛脈數煩躁顛叫恍惚

驚風熱遍身發熱面光自汗心悸不寧脈數煩躁治法與急驚證同所用藥餌必先解表

小兒之病惟熱居多夫熱有潮熱驚熱夜熱餘熱食熱疳熱壯熱煩熱積熱風熱虛熱客熱癖熱寒熱血熱瘡疹熱十六者大同而小異熱之始發必有所因

也其潮熱發歇有時驚熱顛叫恍惚夜熱夕發旦止餘熱寒邪未盡食熱壯腹先發疳熱骨蒸盜汗壯熱一向不止煩熱心躁不安積熱頰赤口瘡風熱汗出身熱虛熱困倦少力客熱來去不定痰熱涎嗽飲水寒熱發如瘧狀血熱辰巳發熱瘡疹熱耳鼻尖冷諸證候之各有所歸其間或有三兩證交互者宜隨其輕重而處治之

小兒之熱有肝心脾肺腎五藏之不同虛實溫壯四者之不一及表裏血氣陰陽浮陷與夫風濕痰食各當詳之心熱者額上先赤心煩心痛掌中熱而噦或壯熱飲水已午時益甚肝熱者左頰先赤便難轉筋尋衣捻物多怒多驚四肢困倦寅卯時益甚脾熱者鼻上先赤怠惰嗜臥身熱飲水遇夜益甚肺熱者右頰先赤手掐眉目喘嗽寒熱飲水日西熱甚腎熱者頷下先赤兩足熱甚骨蘇蘇如蟲蝕熱甚不能起牀夜間益甚仍當辨其虛實實則面赤氣粗口燥唇瞤作渴飲冷大小便難或揪衣露體煩啼暴叫伸體而臥睡不露睛手足指熱宜用表下虛則面色青白恍惚神緩口中虛冷噓氣輭弱喜熱惡寒泄瀉多尿或乍凉乍溫怫鬱驚惕上盛下泄夜則虛汗屈體而臥睡而露睛手足指冷宜用調補壯熱者肢體大熱熱不已則發驚瘛溫熱者肢體微熱熱不已則發驚搐搦陰虛則內熱陽盛則外熱以手輕捫之則熱重按之不熱此皮毛血脈之熱熱在表也重按之筋骨之分則熱輕手則不熱此筋骨之熱熱在裏也不輕不重按之而熱此肌肉之熱熱在表裏之間也以虛實分屬表裏而言之壯熱惡風寒爲元氣不充表之虛熱也壯熱不惡風寒爲外邪所客表之實熱也壯熱飲湯爲津液短少裏之虛熱也壯熱飲水爲內火銷爍裏之實熱也若夫內外皆熱則喘而渴齒乾煩冤腹滿四肢熱逢風寒如炙於火能冬不能夏是皆陽盛陰虛也脈尺寸俱滿爲重實尺寸俱弱爲重虛脈洪大或緩而滑或數而鼓此熱盛拒陰雖形證似寒實非寒也熱而脈數按之不鼓此寒盛格陽雖形證似熱實非熱也發熱惡熱大渴不止煩躁肌熱不欲近衣其脈洪大按之無力或兼目痛鼻乾者此血虛發躁也當補其血如不能食而熱自汗者氣虛也當補其氣仲景論內外不足發熱自汗之證禁不可發汗如飲食勞役雖病發熱誤發其汗則表必虛也身熱而汗出者風也發熱身疼而身重黃者濕也增寒發熱惡風自汗脈浮胷痞者痰也發熱頭痛脈數者食也寸口脈微爲陽不足陰氣上入陽中則惡寒尺脈弱爲陰不足陽氣下入陰中則發熱陰陽不歸其分則寒熱交爭也晝則安靜夜則發熱煩躁是陽氣下陷入陰中也晝則發熱煩躁夜則安靜是重陽無陰也當急瀉其陽峻補其陰至若身熱脈弦數戰慄而不惡寒者癉瘧也發熱惡寒脈浮數者溫病也若四肢發熱口舌咽乾是火熱乘土位濕熱相合故煩躁悶亂也若身體沉重走注疼痛乃濕熱相搏風熱鬱而不得伸也

五藏熱

肝熱手尋衣領及亂捻物瀉青丸主之

壯熱飲水喘悶瀉白散主之

肝熱者左頰先赤便難轉筋多怒多驚四肢困倦寅卯時益甚宜瀉青丸柴胡飲子

心熱視其睡口中氣溫或合面睡及上齦咬牙皆心熱也導赤散主之

心氣熱則心胷亦熱欲言不能而有就冷之意故合面臥也

心熱者額上先赤心煩心痛掌中熱而噦或壯熱飲水已午時益甚宜瀉心湯導赤散安神丸

脾熱則目黃肚大怠惰嗜臥身熱飲水四肢不收瀉黃散主之

脾熱者鼻上先赤其熱在肌肉遇夜益甚

肺熱手掐眉目鼻面甘桔湯主之咳嗽寒熱壯熱飲水凉膈散主之若肺虛熱唇深紅色少服瀉白散肺熱者右頰先赤日西熱甚輕則用瀉白散重則用凉膈散及地骨皮散

腎熱兩足不喜衣覆地黃丸主之

腎熱者頷下先赤兩足熱甚骨酥酥如蟲蝕熱甚不能起於牀夜間益甚宜用滋腎丸

實熱

實則伸體而臥睡不露睛手足指熱等證

按實中宜分表裏表實宜汗裏實宜下半表半裏宜和解今一以利下爲主非通論也治法并方更於後表裏條內求之

小兒實熱在內者四順飲之類在上者吐之

小兒熱病六一散妙藥也

實熱宜四順清凉飲加柴胡

虛熱

虛則喜熱惡寒乍凉乍溫怫鬱驚惕上盛下泄屈體

而臥睡而露騎手足指冷等證

虛熱因病後發熱無時一日三五次者此客熱乘虛而作先以胃苓湯加黃芪末溫米清湯調服次投錢氏白术散或固眞湯帶涼服及用溫鹽湯參入凉水送下黑錫丹固守元氣

風熱邪熱四君子湯加生薑荊芥煎

小兒客熱在內先用導赤散次用益黃散

薛氏以虛實分屬表裏及熱盛拒陰寒盛格陽血虛氣虛發熱等證俱仲景東垣諸聖醫辨證妙法宜詳玩而熟記之則虛熱似實熱之證庶幾不至誤認而全活衆矣

虛熱宜惺惺散

表裏

身熱不飲水者熱在外

身熱飲水者熱在內

四順飲子治熱在內而不厥

連蔥飲治熱在外而不厥

薛氏云壯熱惡風寒爲元氣不充表之虛熱也壯熱不惡風寒爲外邪所客表之實熱也壯熱飲湯爲津液短少裏之虛熱也壯熱飲水爲內火銷爍裏之實熱也按傷風惡風傷寒惡寒豈可以惡風寒爲元氣不充而不惡風寒爲外邪所客乎薛氏之意本圓而語則滯凝人前豈可說爰須以東垣外感內傷細辨別之則無失矣

表熱

熱而二便調和風邪蘊結於裏而發者用惺惺散加麻黃汗之

餘熱

餘熱者謂寒邪未盡傳經之遺熱也仁齋曰傷寒汗下後而熱又來乃表裏俱虛氣不歸元陽浮於外不可再用凉藥蓋熱去則寒起古人戒之法當和胃氣使陽氣收斂歸內其熱自止宜參苓白术散主之

有小兒熱證用表裏藥後其熱俱退既退復熱者何也熱病至此難以概舉或再解表攻裏或施凉劑熱見愈甚以陰陽辨之何者爲是推其原乃表裏俱虛而陽浮於外陰伏於內所以又發熱宜用溫平之藥和其裏則體熱自除投錢氏白术散去木香加扁豆水煎及黃芪六一湯安神散自然平復若日久汗多煩渴食減脈微緩喜飲熱可服眞武湯雖附子性溫取其收斂陽氣內有芍藥性寒一寒一溫停分得宜用之無不驗矣

汗後血虛而熱益甚者六神散加粳米汗後氣虛而惡寒發熱者補中益氣湯汗後陰虛陽無所附而熱者用四物湯加參芪汗後陽虛陰無所附而熱者用四君子湯加芍藥

壯熱

壯熱者一向不止血氣壅實五臟生熱蒸熬於內則眠臥不安精神恍惚熏發於外則表裏俱熱煩躁喘粗甚則發驚癎也輕劑火府丹地黃煎重劑雙解飲七寶散大黃朴硝湯

溫壯

溫壯與壯熱相類而有小異一向熱而不止是壯熱也但溫溫然不甚盛是溫壯也若大便臭而黃者此腹內有伏熱以四順飲子治之若糞白而酸臭則挾宿食不消當服紫霜丸輕者少服重者節乳哺增加丸藥當取微利可也

驚熱

驚熱者遍身發熱或熱而不甚面青自汗睡夢虛驚顛叫恍惚有因驚而生熱者有因熱而生驚者錢氏導赤散凉驚丸安神之類皆其治也

骨蒸熱

小兒一歲至十歲衣絮皆不得著新綿又不得冬月以火烘衣被勿令食桃杏楊梅果實又不得食炙煿熱麵之類皆令兒體熱或因傷寒後食肉太早令兒體熱者有之或作骨蒸者宜服生犀散克效湯地骨皮飲七寶散金蓮飲子治之

骨蒸熱身體虛羸遇晚而發有熱無寒醒後渴汗方止此乃疳病之餘毒傳作骨蒸或腹內有癖塊有時微痛用參苓白术散鼈甲三稜煎湯調服或投化癖丸先療脾虛宿滯次以柴胡飲爲治仍忌鷄酒羊麵毒物

潮熱

熱有作止每日應時而發謂之潮熱如潮信之不失其期也

潮熱有風寒疳積食癖之分陰陽虛實五臟之異如汗出身熱呵欠面赤者風熱也傷寒時疫陰陽相勝外感熱也肌瘦口乾骨蒸盜汗疳熱也大小便祕澀汗下不解積熱也腹背先熱夜發旦止食熱也涎嗽飲水乳食不消癖熱也又有煩熱者氣粗喘促心躁不安頰赤口瘡氣發癇證瘡疹熱者耳鼻尖冷血熱者巳午間發至夜則凉虛熱者困倦少力發於病後

陽邪干心則來去不定陰陽相勝則寒熱如瘧前證在小兒有因乳母或姙娠七情厚味遺熱或飲食停積衣衾過暖及頻浴熱湯而爲患若寅卯辰時熱而力盛飲水者肝經實熱也用柴胡清肝散熱而力怯飲湯者肝經虛熱也用六味地黃丸巳午時熱心經也實用導赤散虛用秘旨安神丸申酉戌時熱肺經也實用瀉白散虛用秘旨保脾湯亥子丑時熱腎經也用地黃丸大凡壯熱飲水大便秘結屬實熱用二黃犀角散下之熱渴飲湯大便如常屬血虛用四物湯補之若下後陰虛陽無所附而仍熱用四物參芪汗後陽虛陰無所生而仍熱用四君芎歸若汗下後煩渴面赤血虛發躁也當歸補血湯若見驚搐等證肝血虛而內生風也用四物天麻釣藤鉤頓赤口乾小便赤澀大便焦黃表裏俱實熱也用清凉飲子如大便已利或熱未止表邪未解也惺惺散未應加麻黃微汗之既汗而仍熱此表裏俱虛氣不歸源陽浮於外而虛熱也六神散加粳米陽氣下陷於陰中而發熱者用補中益氣湯若乳下嬰兒當兼治其母

會氏先用百解散發表次以當歸散及三解散治之脈實者以大柴胡湯下之虛浮數者百解散微汗之若發熱而嘔者小柴胡湯和解之

小兒潮熱盜汗胡黃連柴胡等爲細末煉蜜丸芡實大每二丸酒化開入少水煎小沸服

潮熱有時有滿氣短者梔枝丸

晝熱

全嬰方小兒每早食後發熱夜則凉世醫多謂虛勞或爲疳熱不知此血熱證也宜龍膽丸地黃膏之類

時時與服即瘥

按全嬰方所云血熱者巳午發熱遇夜則凉與東垣所謂夜則發熱晝則明了不同然東垣所云血熱者指陰虛而生內熱也夜則發熱晝則明了取其晝陽夜陰也鄭氏所云血熱者指小兒血盛實而言也蓋謂巳午者心火用事之時也心主血血氣行至巳午則陽氣盛陽氣與正氣相搏故至期而發熱非其時者非血熱也

夜熱

海藏云夜熱屬陰四順飲之類此血熱在夜也

脈經云小腸有宿食嘗暮發熱明日復止此宿食夜熱也

風瘀熱晚熱早凉吃水無時此候乃痰作潮而生風熱卽宜金星丸下之或氣弱者不可下宜奪命散以控下涎次服惺惺散加南星白附子

積熱

積熱者久熱也疳熱亦久但兼面黃吃炭土鼻下爛也

小兒表裏熱去後又發熱者非熱證也只用六神散入粳米煎和其胃氣則收陽歸內身體便凉熱重者用銀白散

積熱眼泡浮腫面黃足冷發熱從頭至肚愈甚或聞飲食之氣惡心及腸疼嘔吐治法詳載傷積論中

按會氏所謂積熱乃指腹中有癖而熱與久積之積不同不妨並存之

寒熱

寒熱者證如瘧狀陰陽相勝也先寒而後熱陽不足先熱而後寒陰不足寒多而熱少陰勝陽也熱多而寒少陽勝陰也寒熱相半陰陽交攻也寒熱隔日陰陽乍離也陽盛發熱陰盛發寒也其有頭疼汗出者有嘔吐不食者有增寒而飲水者壯熱而飲湯者有筋骨疼痛者或瀉或秘或內寒而外熱或內熱而外寒又有寒而腹中痛熱而腹中鳴是有食積也治法因於食積者當用白餅子下之次行補助以錢氏白术散寒多熱少者小柴胡湯加桂熱多寒少者白虎湯加桂寒熱相半者並用小柴胡湯主之

經曰陽盛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒寒熱往來此乃陰陽相勝也故寒氣并於陰則發寒陽氣并於陽則發熱寸口脈微爲陽不足陰氣上入陽中則惡寒尺脈弱爲陰不足陽氣下入陰中則發熱陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒陰陽不歸其分則寒熱交爭也又上盛則發熱下盛則發寒陽勝則乍熱陰勝則乍寒陰陽相勝虛實不調故邪氣更作而寒熱往來故乍寒乍熱也少陽膽者肝之府界乎太陽陽明之間半表半裏之分陰陽之氣易於相乘故寒熱多主肝膽經證以小柴胡湯加減調之若祇見寒熱起居如常久而不愈及大病後元氣未復悉屬陰虛生熱陽虛生寒宜用八珍湯補之甚者十全大補湯有食積爲病亦令寒熱用保和丸消之若兼嘔吐泄瀉用六君子湯厥冷飲熱人參理中丸作渴不止七味白术散食積旣消而寒熱尚作者肝邪乘脾所勝侮所不勝也用異功散加柴胡山梔其瘧證寒熱詳見瘧門

頰赤

仲景云火入於肺則煩入於腎則躁夫心者君火也火旺則金燔水虧而火獨存故肺腎合而爲躁也活人云但煩熱者虛煩也諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒鼻不痛故知非傷寒也頭不痛脉不緊故知非裏寒也不可發汗攻下當與竹葉湯兼嘔者與橘皮湯又心虛則先煩而後渴翕翕發熱其脉浮緊而大是也蓋煩者心中煩擾而內熱故屬陽躁者肢體躁動或裸身欲入井中爲外熱故屬陰外熱者無根之火也是以爲虛脉數而實便祕有熱者神芎丸此皆實熱之治法也若煩而頭痛短氣口乾咽燥不渴者虛也用四君加芎歸因藥攻伐而作渴者用竹茹湯煩而不得眠者酸棗仁湯心神顛倒煩熱欲吐者硃砂安神丸面戴陽目內赤六脉洪大按之全無者血虛發躁用當歸補血湯若躁而裸體欲入井中脉沉細或浮大按之如無者此皆陰盛發躁也宜用參附湯有回生之功

注夏

脾爲太陰位屬坤土喜燥而惡濕故凡脾胃之氣不足者遇長夏潤濕之令則不能升舉清陽健運中氣又復少陽相火之時熱傷元氣則肢體怠惰不收兩脚痿弱嗜臥發熱精神不足飲食少思口中無味呼吸短乏氣促目中視物眩眩小便赤數大便不調名曰注夏此皆稟賦陰虛元氣不足之證丹溪補陰論言之詳矣育子者可不知冬月養陽之道乎治法用補中益氣湯去升麻柴胡加炒黑黃蘗主之若因勞役發熱血虛脉大者用當歸補血湯氣血兩盛者八珍湯肝腎陰虛者地黃丸大便作瀉者人參理中湯

若乳母肝火乘脾寒熱少食者柴胡梔子散胃火作渴者竹葉石膏湯小兒多因乳母之氣不調而致當戒怒氣調飲食適寒溫則可以遠病又如今人夏月皆以香薷湯浸冷代茶飲之殊不知香薷利水大損元陽厚朴苽伐大瀉真氣況脾性喜溫而惡寒夏月陰盛於內冷啜傷脾若胃強有火濕熱爲病之人固無大害其脾胃虛弱中氣不足者必爲腹痛少食泄瀉寒中之疾矣此大人亦當戒者況小兒乎愼之愼之

黃疸

難知云色如熏黃乃濕病也一身盡痛色如橘子黃者黃病也身不痛

乾黃燥也小便自利四肢不沉重渴而引飲者梔子蘗皮湯

濕黃脾也小便不利四肢沉重似渴不欲飲者大茵陳湯

大便自利而黃者茵陳梔子黃連三物湯

往來寒熱一身盡黃者小柴胡加梔子湯

湯氏云身疼腰背疼大小便澀皮膚面目齒爪皆黃小便如屋塵色利者易治澀者難治宜服五苓散加茵陳煎湯調又宜服導赤散加茵陳煎或身熱宜服小柴胡湯甚者服承氣湯

凡黃病者不可一槩而論標本不同證治亦異乃脾胃氣虛感受濕熱鬱於腠理淫於皮膚蘊積成黃熏發於外故有此證或脾胃虛弱內因癥癖攻之而成然疸瀉亦主皮黃髮豎肚大青筋肌肉消瘦外無色澤身必發黃此又本於疸病而作致有是證治法若

感濕熱而得身黃如煙熏之色以咬咀五苓散加麻黃水薑煎投汗之即愈或用茵陳蒿湯調下五苓散亦好

若得於疸癖者其形如黃土相類以醒脾散化癖丸醒脾快胃磨積理疸胃氣已和飲食倍進運化精微榮養百骸灌溉臟腑五色各見於本部精華乃形於面貌其黃自除

經曰中央黃色入通於脾故黃疸者脾之色也夫人身之神貴於藏而默用見於外則內虛矣其證皆因脾氣有虧運化失職濕熱留於肌膚發而爲疸錢仲陽所謂身痛背彊二便澀滯遍身面目爪甲皆黃是也小便褐色者難治療法宜固脾爲先如專用苽伐寬中淡泄利水之藥則鮮有不致危者矣若初生及百日半年之間不因病而身黃者胃熱胎黃也腹大食土爲脾疸兼作渴飲冷者用瀉黃散小便不利者茵陳湯病後發黃肢體浮腫者用白术散清便自調肢冷嗜臥者益黃散身淡黃白者調中丸及補中益氣湯加茵陳身熱腸滿肌膚面目皆黃者加減瀉黃散辨其所以若閉目壯熱多哭不已大小便赤澀口中熱氣者乃妊娠厚味胎毒之候也母子並服生地黃湯仍忌酒炙五辛熱物設不自愼誤傷脾土急則變爲驚風吐瀉緩則肢體浮腫小便不利眼目障閉多成疳疾矣又有脾虛發黃者當於脾胃中求之

陳治幼幼近編

潮熱

小兒初病潮熱或病後潮熱俱屬食傷太陰脾經宜參苓白术散有瘧癖潮熱八珍湯加貝母

小兒衛生總微論方

諸身熱

小兒身熱但溫而不甚壯熱此爲溫熱

小兒身熱口中氣熱叫哭無時呵欠煩悶面目青色此爲風熱甚亦發驚

小兒身熱飲水悸惕手足搖動上視弄舌印內青筋見掌中赤怕物生涎此爲驚熱

小兒身熱面赤時久不退睡覺顬叫氣急發渴胷高涎壅此爲積熱與壯熱相似但胷高涎壅爲異乃臟腑積蘊熱毒三焦高腕壅滯也又搖頭項鞕者亦三焦高腕壅也

已上皆甚則發搐治在驚癇門中

小兒身體發熱氣促鼻塞清涕噦噴寒毛立眼淚出或出痰水此爲傷寒治在傷寒門中

小兒身熱時發時退退但肚熱或夜發熱面黃腹脹吐瀉乳食不化糞酸臭異常此爲食傷治在傷食門中

小兒夜發熱曉即如故多涎喜睡此肺虛發熱也此與食傷夜發熱相似要須識之況二證餘候各皆不同食傷者可下肺虛者不可下下之則失津液發渴引飲昔錢乙治朱監簿子五歲夜發熱曉即如故衆醫作熱以凉藥解之不愈其候多涎喜睡又以藥下其涎病益甚至五六日請乙治之乙曰不可下乃取白朮散煎湯三升使任意取足服朱曰飲多不作瀉否乙曰無生水不能作瀉縱利亦不足怪但不可下耳朱又曰先治何病乙曰止瀉治痰退熱清神皆此藥也服盡又作兩次與服其子不渴無痰又投阿膠散二服而安是此證也錢乙方本集載之

小兒身熱形瘦多渴飲食不爲肌肉此爲疳熱治在疳門中

小兒血氣旺盛發渴引飲大便黃緊小便赤少四肢身體翕然而熱此爲胃實熱也治宜下之

小兒身發熱微驚耳凱冷上脣頭有白泡起如魚目珠子或汗或不汗此爲變蒸治在變蒸門中

小兒身熱昏睡驚悸喜噦耳尻冷此爲瘡疹候治在瘡疹門中此與食傷變蒸相似傷寒耳尻皆熱變蒸脣上有白疣泡珠子爲異

小兒身熱者更有內外在內者多飲水得之在外者多因風寒得之錢氏有云小兒身熱飲水者熱在內身熱不飲水者熱在外此大槩之驗也在內者宜下之在外者宜散之

閻孝忠論小兒壯熱傷風溫疫傷寒風熱瘡疹傷食率皆相似未能辨認之間但與升麻葛根湯惺惺散小柴胡湯服之甚驗蓋此數藥通治之不致誤也惟傷食者則大便酸臭乳不化畏食或吐宜與微下

孫眞人論小兒內外氣盛眠時小驚或微覺傷風傷食又慮變蒸身熱者但以紫圓或龍膽湯爲治此二藥無所不療雖微利動以減盛氣亦不虛人小兒糞黃而臭者此腹中有伏熱也宜服龍膽湯若糞白而酸臭者此挾寒不消也宜服紫圓但少與令內消甚者少增令微稀溏皆須節乳哺一兩日令胃氣平和若不節則病易復復則復下傷其胃氣令腹脹滿若至再三下之則過傷矣

小兒於立夏之後有病身熱者愼勿妄爲吐下但以除熱湯浴之除熱粉粉之赤摩膏塗之

黃疸

小兒有身體肌膚面目悉黃者此黃病也因將息過度飲食傷飽脾胃受熱與穀氣相搏蒸發於外脾胃象土其色黃候肌肉故爲是病也愼不可灸灸則熱轉甚矣若身體痛背膊强大小便澀腹脹滿一身盡黃及目睛爪甲皆黃小便如屋塵色著物皆黃此疸病也若發渴小便澀腹滿脈沉細爲難治也黃病者稍輕疸病極重又有自生下面身深黃者此胎疸也因母臟氣有熱熏蒸於胎故也經言諸疸皆變色深黃者是也若身微黃者胃熱也若但面黃腹大渴而食泥土者脾疳也

渴

小兒有渴而飲水者此因臟腑有熱熱則臟燥故多體熱發渴亡耗津液即令作渴欲飲水以解之也又有疳渴吐瀉發渴霍亂發渴者各逐本項具之閻孝忠云凡小兒諸渴因亡失津液引飲但多煎錢氏白朮散與服使任意取足飲之彌多彌好

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百四十卷目錄

醫部彙考四百二十

小兒諸熱門二

方一 神驗柴胡散 丹參赤膏 五物甘草生摩膏 李葉浴湯 柳枝浴湯 清木香浴湯 十二物寒水石散 李根湯 升麻湯 大黃湯 蜀漆湯 石膏湯 竹葉湯 又大黃牡蠣湯 調中湯 生地黃湯 犀角飲 加味小柴胡湯 柴朮參苓湯 芍藥參苓散 龍膽瀉肝湯 清涼飲 黃連香薷飲 連翹飲子 全蠍散 洗心散 惺惺散 麻黃黃芩湯 升麻黃芩湯 甘露飲子 雙丸 石膏麻桂湯 連翹飲 麥門冬湯 五物人參飲 八物麥門冬飲 棗葉飲 涼膈散 柴葛解肌湯 調元生脈散 參蘇飲 荊防敗毒散 菉豆粉飲 豆卷散 玉液丸 胃苓丸 神芎丸 敗毒散 四顆清涼飲 柴胡散 茵陳湯 梔子蘗皮湯 犀角散 乾葛根汁 連翹赤小豆湯 麥苗汁 茵陳五苓散 當歸散 小半夏湯 消食丸 小柴胡湯 葛根黃連黃芩湯 三黃丸 竹葉湯 香薷飲 車前子散 黃連解毒湯 玉露散 導赤散 至寶丹 琥珀散 解毒丸 七物黃連湯 全蒲鎮心丸 棗葉飲子 大柴胡湯 大承氣湯 地骨皮散 犀角飲 鱉甲飲 鹽犀飲 生犀飲 青蒿散 柴胡散 理中湯 四君子湯 五苓散 白虎湯 柴苓散 二黃犀角散 牛黃散 龍湯 牛黃膏 羚羊角湯 梔子仁湯 大連翹湯 龍膽湯 紫霜丸

藝術典第四百四十卷

醫部彙考四百二十

小兒諸熱門二

方一

神驗柴胡散 中藏經

治小兒骨熱夜間如蒸甚者不過十數日見效

土柴胡不拘多少去蘆洗淨炙黃色不令太焦亦不須銀州者

右爲末每服二錢水一盞入地骨皮指面大二片子同煎至七分食後溫服如虛瘦但空心服補藥食後煎下數服時時如水飲之

丹參赤膏 千金方下同

治少小心腹熱

丹參 雷丸 硭硝 戎鹽 大黃各二兩

右五味㕮咀以苦酒半升浸四種一宿以鍊成猪肪一觔煎三上三下去滓乃內硭硝膏成以摩心下冬夏可用

一方但用丹參雷丸亦佳

五物甘草生摩膏

治少小新生肌膚幼弱喜爲風邪所中身體壯熱或中大風手足驚掣

甘草 防風各一兩 白朮 桔梗各二十銖

雷丸二兩

右㕮咀以不中水猪肪一觔煎爲膏以前藥微火上煎消息視稠濁膏成去滓取如彈丸大一枚炙手以摩兒百過寒者更熱熱者更寒小兒雖無病早起常以膏摩顖上及手足心甚辟風寒

李葉浴湯

治少小身熱

李葉無拘多少

右㕮咀以水煑去滓將浴兒良

柳枝浴湯

治小兒生一月至五月乍寒乍熱

柳枝無拘多少細切

右煑取汁洗兒

若渴絞冬瓜汁服之

青木香浴湯

治小兒壯熱羸瘠

青木香四兩 麻仁 竹葉各一升 虎骨五兩 白芷三兩

右五味㕮咀以水二斗煑取一斗稍稍浴兒

十二物寒水石散

治少小身體壯熱不能服藥

寒水石 硭硝 滑石 石膏 赤石脂 大黃 青木香 甘草 黃芩 防風 芎藭 麻黃根

右各等分合治下篩以粉一升藥屑二合相和復以篩篩之以粉兒身日三

李根湯

治小兒暴有熱得之二三日者

李根 桂心 硭硝各十八銖 麥門冬去心 甘草各一兩

右五味㕮咀以水三升煑取一升分五服

升麻湯

治小兒傷寒變熱毒病身熱面赤口燥心腹堅急大小便不利或口瘡者或因壯熱便四肢攣掣驚仍成癇疾時發時醒醒後身熱如火者悉主之

黃芩一兩 升麻 白薇 麻黃 萎蕤 柴胡 甘草各半兩 砂硝 大黃 釣藤各六銖

右十味㕮咀以水三升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取一升兒生三十日至六十日一服二合六十日至百日一服二合半百日至二百日一服三合

大黃湯

治小兒肉中久挾宿熱瘠熱進退休作無時

生大黃　硇硝　甘草各半兩　桂心八兩
石膏一兩　大棗五枚
右六味㕮咀以水三升煮取一升每服二合

蜀椒湯

治小兒潮熱
蜀椒　甘草　知母　龍骨　牡蠣各半兩
右五味㕮咀以水四升煮取一升去滓一歲兒少少服半合日再

石膏湯

治小兒腹大短氣熱有進退食不安穀爲不化
大黃　黃芩　甘草　麥門冬　硇硝各半兩
石膏一兩　桂心八銖
右七味㕮咀以水三升煮取一升半三服暮歲已下小兒作五服

竹葉湯

治小兒夏月患腹中伏熱溫壯來往或患下痢色或白或黃三焦不利
竹葉切　小麥各五合　柴胡　麥門冬　人參
甘草各半兩　茯苓十八銖　黃芩一兩六銖
右八味㕮咀以水四升煮竹葉小麥取三升去竹葉小麥下諸藥煮取一升半分三服若小兒夏月忽壯熱燒人手胸下黃湯氣力慘然脈極洪數用此方加大黃二兩再服得下即瘥

又

治五六歲兒溫壯腹中急滿息不利或有微腫亦治極麤不下飲食堅痞手足逆冷
竹葉一升　小麥半升　甘草　黃芩　瓜蔞根
澤瀉　茯苓　知母　白朮　大黃各一兩
桂心二銖　生薑一兩半　人參　麥門冬
半夏各二兩　當歸十八銖
右十六味㕮咀以水七升煮竹葉小麥取四升去滓內藥煮取一升六合分四服

大黃牡蠣湯

治小兒壯熱實滯不去寒熱往來微驚悸
大黃一兩　黃芩　瓜蔞根　甘草各十八銖
滑石二兩　桂心　牡蠣熬　人參　龍骨
凝水石　白石脂　硝石各半兩
右十二味㕮咀以水四升煮取一升半每服三合一日一夜令盡雖吐亦與之
一本加紫石英半兩

調中湯

治小兒春秋月晨夕中暴冷冷氣折其四肢熱不得泄則壯熱冷氣入胃變下痢或赤白滯起數小腹脹痛極壯熱氣脈洪大或急數者服之熱便歇下亦瘥也但壯熱不吐下者亦主之
葛根　黃芩　茯苓　桔梗　芍藥　白朮
藁本　大黃　甘草各六銖
右九味㕮咀以水二升煮取五合服如後法兒生一日至七日取一合分三服生八日至十五日取一合半分三服生十六日至二十日取二合分三服生二十日至三十日取三合分三服生三十日至四十日取五合分三服恐喫五合未得更以意斟酌百日至三百日兒一如前篇龍膽湯加之

生地黃湯
治小兒寒熱進退啼呼腹痛
生地黃　桂心各二兩
右二味以水三升煮取一升暮歲以下服二合已上三合

一方七味有芍藥寒水石黃芩當歸甘草各半兩

犀角飲

治小兒心臟熱感
犀角十八銖　茯神一兩　麥門冬一兩半
甘草半兩　白朮六銖
右五味㕮咀以水九合煎取四合分服加龍齒一兩佳

加味小柴胡湯（錢氏直訣下同）

治乳母肝火發熱等證致兒爲患子母竝服
柴胡一錢　黃芩七分　人參　半夏各四分
甘草三分　山梔　丹皮各五分
右水煎

柴朮參苓湯

治肝火血熱遍身瘙痒或起赤暈或筋攣結核
白朮炒　人參　茯苓各一錢　柴胡　川芎
山梔　芍藥炒　甘草炒各五分　熟地黃自製
當歸各八分
右水煎服

芍藥參苓散

治肝木剋脾土目劄面青貪少體倦
芍藥炒　人參　茯苓　白朮　陳皮各七分
柴胡　山梔炒　甘草炒各五分
右薑水煎

龍膽瀉肝湯

治肝經濕熱或囊癰便毒小便澁滯

龍膽草酒炒五分　車前子炒　木通　當歸尾　澤瀉各三分　甘草　黃芩　生地　山梔各二分

右水煎服

清涼飲

治消中能食而瘦口乾自汗大便結燥小便頻數

羌活　柴胡　炙甘草　知母酒製　黃芪炒　黃芩酒製各一錢　生甘草　防己　生地酒製　防風各五分　當歸六分　紅花少許　杏仁　桃仁各五箇　升麻四分　石膏　川黃蘗　草龍膽各一錢五分

右每服一二錢水煎入酒少許服

黃連香薷飲

香薷四兩　厚朴二兩　黃連一兩

右每服一二錢將朴連同生薑炒令紫色入香薷水酒各一盞煎冷服

連翹飲子 本事方

治大人小兒五臟積熱煩躁多渴唇裂喉閉目赤鼻頷結硬口舌生瘡陽明證傷寒發狂見鬼譫語大小便閉一切風壅並皆治之

山梔　甘草　赤芍藥各一兩　大黃　朴硝　連翹　薄荷　乾葛各二兩

右爲散每服二錢水一盞天竹葉七片蜜三匙同煎至七分去滓食後服惟陽明證傷寒息下

全蠍散 初虞世方

治小兒驚熱

全蠍　天南星取心爲末一錢　人參三錢　蛇蛻三錢

右爲末蜜湯調下或薄荷加蜜湯調下

洗心散 續活人書下同

治小兒遍身壯熱頭目碎痛背膊拘急大熱衝上口苦唇焦夜臥舌乾咽喉痛腫涕唾稠粘痰壅喘食不進心神躁熱眼澀睛疼傷寒鼻塞四肢沉重語聲不出百骨節痛大小便不利瘟瘧時行瘟疫狂語多渴及小兒天弔風夜驚竝宜服之

大黃四兩以米泔水浸一炊間漉乾慢炒取熟　當歸炒　芍藥　炙草　荊芥　麻黃各四兩炒　白朮一兩炒

右搗羅爲細末每服二錢水一盞入薑一片薄荷二葉同煎至八分放溫和滓服了仰臥仍去枕少時如五臟壅實煎四五錢七若要瀉轉則熱服

惺惺散

治小兒風熱及傷寒時氣瘡疹發熱頭痛壯熱目澀多睡咳嗽喘粗鼻塞清涕

桔梗　細辛　人參　白朮　瓜蔞根　甘草炙　白茯苓　川芎各等分

右搗羅爲細末每服二錢用水一盞生薑二片薄荷二葉同煎七分服三歲已下作四五服五歲已上分二服凡小兒發熱不問傷風風熱先與此散數服往往瘥愈

幼科全書加麻黃

嬰童百問無川芎

麻黃黃芩湯

治小兒傷寒無汗頭疼發熱惡寒

麻黃去節一兩　黃芩　赤芍各半兩　甘草炙　桂枝去皮各一分

右搗羅爲細末每服二錢滾水調下日三服兼治天行熱氣生豌豆瘡不快發熱煩躁昏潰或出尚身疼熱者

升麻黃芩湯

治小兒傷風有汗頭疼發熱惡寒

升麻　葛根　黃芩　芍藥各三錢　炙草一錢半

右剉如麻豆大每服二錢以水一中盞煎至六分去滓溫服若時行瘡痘出不快煩躁不眠者加木香一錢五分

甘露飲子

治小兒胃中客熱口臭不思飲食或饑煩不欲食齒齦腫疼膿血舌口咽中有瘡赤眼紅臉目不欲開瘡疹已發未發並宜服

熟地黃　生地黃　天門冬　麥門冬並去心焙　枇杷葉去毛　枳殼麩炒去穰　黃芩　石斛　山茵陳　甘草炙各等分

右爲細末每服二錢水一盞煎至六分去滓食後臨臥溫服

雙丸

治小兒身熱頭痛飲食不消腹脹滿或心腹疼痛大小便不利或下重數起未差可再服小兒蒸候哺食減少氣息不快夜啼不眠是腹內不調竝宜用此丸下之

甘遂半兩　朱砂一錢另研　麥門冬二兩半

棘核去仁研四兩半　牡蠣二兩　炙甘草一兩
巴豆六十枚去皮心膜研新布絞去油日中曬之白如霜者
右麥門冬甘草甘遂牡蠣四味爲細末入巴豆朱砂棘仁合和搗二千杵更入少蜜搗和極熟旋丸半歲兒服如荏子大一歲兒服如半麻子大分爲一雙服如二歲麻子大一枚分一雙三四歲者服如麻子大二九五六歲者服如大麻子大二丸七八歲者如小豆大二丸十歲微大於小豆二丸常以雞鳴時服如至日出時不下者熱粥飲服數合投之卽下藥丸皆雙出也下利甚者濃煎玲粥飲之便止

石膏麻桂湯

治小兒傷寒未發熱咳嗽頭面赤
麻黃湯泡　黃芩各一兩　炙甘草　石膏
芍藥各半兩　桂心一分　杏仁十枚去皮尖
右七味爲散每服二錢水一中盞入生薑二片煎半盞去滓服兒若甚小以意增減之

連翹飲

治小兒一切熱
連翹　防風　甘草　山梔子各等分
右件搗羅爲末每服二錢水一鍾煎七分溫服

麥門冬湯

治少小未滿百日傷寒鼻鼾身熱喘逆
麥門冬三分　石膏　寒水石　炙甘草各半兩
桂心三錢半
右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎七分溫服

五物人參飲

治小兒天行壯熱咳嗽心腹脹滿
人參　甘草各半兩炙　麥門冬一兩去心
生地黃一兩半如無只用生乾地半兩
右剉如麻豆大每服三錢水一盞入茅根半握煎至七分去滓溫服

八物麥門冬飲

治小兒諸熱
麥門冬三兩去心　炙甘草　人參各一分
紫苑　升麻各二兩　貝母一分半
右剉如麻豆大每服三錢水一盞入茅根半握煎至七分去滓再入竹瀝少許重煎溫服

棗葉飲

治小兒天行五日以後熱不歇者
棗葉半握　麻黃半兩去根節　淡豉一合
葱白切一合
右件共童子小便二盞煎至一盞去滓分二服

涼膈散（傷寒直指格論方）

一名連翹飲子治傷寒表不解半入於裏下證未全或復未愈者或燥熱怫結於內而煩心懊憹不得眠者及無問傷寒雜病大人小兒臟腑積熱煩躁多渴面熱頭昏脣焦咽燥舌腫喉痹目赤鼻衄頷頰結硬口舌生瘡痰實不利咳唾稠粘睡臥不安譫語狂妄腸胃濕燥便尿閉結一切風熱壅滯風眩瘡癬及傷寒陽明胃熱發斑下證未全者或誤服暖藥過多爲諸熱證并酒甚熱毒兼小兒斑疹痘瘡已出未快者或熱極黑陷將死者
梔子仁　連翹　薄荷　黃芩　甘草各一兩半
大黃　硇硝各半兩
右爲粗末每一兩水二盞竹葉七片煎至一盞去滓入蜜少許食後服加薑煎亦得

去六經熱減大黃硇硝加桔梗甘草人參防風

治肺經邪熱咳嗽有痰加半夏

涼膈與四物各半服能益血洩熱名雙和散

錢氏去連翹加藿香石膏爲瀉黃散

寶鑑連翹四兩硝黃各二兩餘各一兩

柴葛解肌湯（幼科全書下同）

柴胡　乾葛　黃芩　桂枝　赤芍　人參　甘草
右竹葉七片薑棗作引煎服

調元生脈散

黃芪　人參　麥門冬　甘草　五味子
右水煎服

參蘇飲

人參　半夏　茯苓　甘草　桔梗　枳殼
乾葛　前胡　木香　陳皮　蘇葉
右薑棗引煎服

荊防敗毒散

生大黃　防風　荊芥穗　酒紅花　牛蒡子
升麻　元參　人參　桔梗　酒芩　酒蘗
甘草
右水煎服

蒹荳粉飲（育嬰家秘下同）

如小兒誤服熱藥太過者以致煩躁悶亂或作吐或狂或渴宜先解毒此飲主之

葉豆粉一兩　黃連炙　乾葛　生甘草各半兩
三味共末同葉豆粉杵勻每服五分至一錢淡豆豉湯溫調服

豆卷散

如小兒病驚多用藥性太溫及熱藥治之有驚未退而別生熱證有病愈而致熱證者有反爲急驚者甚多當問病者數日因何得之曾以何藥調之可用解毒之藥無不效也以此散主之

大豆黃卷以水浸黑豆生卷是也曬乾　炙草
貫衆　板藍根
每各一兩爲末服五分至一錢水煎去滓服

玉液丸（片玉心書下同）

治風壅化痰利膈清頭目煩熱除咳嗽

寒水石火煅水飛二兩，半夏製一兩　枯礬五錢
共爲末米糊丸如粟米大薑湯下

感風寒咳嗽桑白皮湯下

咳血茅根湯下

常咳茶湯下

咳而吐熾薑湯下

胃苓丸

分陰陽退潮熱止吐泄消浮腫黃疸調脾胃止便濁小兒常用之藥也

蒼术米泔水浸刮去黑皮焙乾　厚朴薑汁炒
陳皮　白术各五錢　粉草炙　草果各二錢
猪苓　澤瀉　白茯各三錢　官桂一錢
共爲末水和丸如粟米大炒米湯下

嘔吐熾薑湯下

調胃炒米湯下

白濁鹽湯下

瀉泄炒米車前湯下

黃疸加茵陳五錢燈心湯下

潮熱水竹葉炒米湯下

浮腫長流水煎燈心五加皮湯下

疝氣茴香湯下

神芎丸

治小兒上焦積熱驚風壅滯頭目赤腫咽閉大小便亦澀及痰喘之證並皆治之

大黃酒蒸　黃芩各一錢　黑牽牛取頭末
滑石各四錢　黃連　川芎　薄荷葉各五錢
共爲末滴水以丸如粟米大竹葉湯下

敗毒散（聚奎百問下同）

治小兒傷寒瘟疫風濕頭目昏眩四肢痛憎寒壯熱項強目睛疼尋常風眩拘倦風痰身體項疼及寒壅咳嗽鼻塞聲重寒熱並治之

柴胡洗去蘆　前胡　川芎　枳殼炒　羌活
川獨活　白茯苓　桔梗炒　人參各一兩
甘草半兩
右爲粗末每服二錢生薑薄荷煎加地骨皮天麻或剉散加蟬蛻防風

治驚熱可加芍藥乾葛黃芩

無汗加麻黃

四順清凉飲

治小兒血脈壅實臟腑蓄熱頰赤多渴五心煩躁睡臥不安四肢驚掣及因乳哺不時寒溫失度令兒血氣不順腸胃不調小便少大便澀或溫壯連滯欲成伏熱或壯熱不歇欲發驚癇治風熱結核頭面瘡癤目赤咽痛瘡疹毒一切壅滯並宜服之

赤芍藥　當歸　甘草　大黃各等分
右剉散三歲已上每服二錢水一盞煎至七分作兩服

準繩加薄荷

治挾熱瀉不止加木香大黃用熾

欲利小便用赤芍藥準繩加燈心木通

虛熱加甘草

不利減大黃

冒風邪加去節麻黃

中風體強眼睛上視加獨活量兒大小虛實加減

微溏利爲度可加荊芥

柴胡散

治小兒傷寒無汗有表證壯熱頭疼身體痛口乾煩渴小便赤大便閉澀夾驚腮腫

石膏　黃芩　甘草　赤芍藥　葛根各二錢半
麻黃去節　柴胡半兩
右剉散三歲兒每服二錢水一小盞生薑少許葱白三寸豆豉一撮煎六分溫服

茵陳湯

治陽明病發熱汗出者此爲熱越不能發也但頭汗出身無汗齊頸而還小便不利渴飲水漿者此爲瘀熱在裏身必發黃傷寒七八日身黃如橘色

小便不利腹微滿者

茵陳嫩者一兩　大黃二錢半　梔子大者三枚

右剉散以水一大椀先煎茵陳減半次用二味煎八分去滓溫服日三服小便當利如皂角汁狀色正赤一宿身減黃從小便中去也量大小加減

梔子蘗皮湯

治傷寒身黃發熱

梔子八枚　黃蘗一兩　甘草炙半兩

右剉散每服二錢水一盞煎六分去滓溫服

犀角散

治小兒黃疸一身盡黃

犀角銼一兩　茵陳　乾葛　升麻　龍膽草

生地黃各半兩　寒水石七錢半

右剉散白水煎

乾葛根汁

治小兒忽發面目黃皮肉盡黃

乾葛根汁

右和蜜服

連翹赤小豆湯

治小兒傷寒發黃身熱

麻黃去節　連翹　生甘草　生薑　赤小豆

生梓白皮各二兩　杏仁四十一粒　大棗十二枚

右剉散白水煎

麥苗汁

小麥苗搗汁

右服之立效

茵陳五苓散

五苓散加茵陳湯十分五苓散五分

右二件拌勻每服一錢溫水調下日三服

當歸散

治小兒夜啼者臟寒而腹痛也面青手冷不吮乳是也宜用此方

甘草炙　桔梗　陳皮　當歸各一錢

右爲末水煎半盞時時少與服之

又有熱痛亦啼叫不止夜發面赤唇焦小便赤與三黃丸人參湯下

小半夏湯

治黃疸小便色不異欲自利腹滿而喘者不可除熱熱去必噦

半夏湯洗七次

右剉散每服三錢水一盞薑一片煎七分溫服

消食丸

常服寬中快氣消乳食正顏色

縮砂炒　陳皮炒　三稜煨　蓬朮煨　神麴炒

麥芽炒　香附米泔浸一宿炒　枳殼　檳榔

烏梅各半兩　丁香二錢半

右爲末麪糊丸如菉豆大食後紫蘇湯下二十丸或三十丸

小柴胡湯

治小兒傷寒潮熱少陽汗出口渴溫熱身熱惡風頭痛項強四肢煩疼往來寒熱脅痛耳聾嘔噦痰實中暑瘧疾並服之

人參　甘草炙各三錢　黃芩二錢　柴胡八錢

半夏湯泡七次焙乾二錢半

右剉散每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎去滓溫服不拘時

王肯堂曰愚按前方若肝膽經風熱肝火瘧歷寒熱往來日晡發熱潮熱不欲飲食或怒火口苦耳聾咳嗽或脅痛脘滿小便不利或泄瀉吐酸苦水或胠體搐動眉目抽搐及乳母有前證致兒爲患者並宜服之

葛根黃連黃芩湯

治太陽病桂枝證反下之利遂不止脈促者邪未解也喘而汗出者

葛根二兩　黃芩　黃連各七錢五分　甘草五錢

右剉散每服三錢水一盞煎七分去滓加減服喘甚加葶藶子

三黃丸

治小兒三焦積熱大渴引飲眼目赤腫口舌生瘡心膈煩躁不美飲食大小便祕澀五臟實熱或下鮮血瘡癤熱證

黃連去鬚　黃芩　大黃煨各十兩

右爲末煉蜜丸桐子大每服三十丸熱水下

如臟腑壅實加服丸數小兒積熱可服

竹葉湯

治小兒傷寒發渴虛羸少氣氣逆欲吐四肢煩熱

石膏二兩　半夏四錢　人參　甘草炙各二錢

麥門冬六錢去心

右剉散每服二錢水一盞青竹葉生薑各四片粳米七十粒同煎

嘔加生薑竹葉

香薷飲

治夏月中暑下咽卽甦

香薷一兩　白扁豆炒　厚朴薑製各半兩
右剉散每三錢水一盞生薑三片煎服
一方加黃連治瀉痢
一方加苓芷香蘇散治霍亂吐瀉暑月感冒傷暑之證

車前子散

治暑月伏熱霍亂吐瀉
白茯苓　豬苓　香薷　車前各等分　人參減半
右爲末每一錢用燈心湯調下

肚疼加芍藥
瀉不止加石蓮肉

黃連解毒湯

治大熱煩躁渴悶欲死下咽卽活
黃連三錢　黃蘗五錢　梔子四箇劈　黃芩一兩
右剉散每服三錢水一盞煎六分去滓溫服

玉露散

治嗌喉煩躁不安煩赤咽乾身熱頭痛兼中暑發渴昏悶小便不通驚氣入腎夢中咬牙加金珠散薄荷湯調服
寒水石　石膏各二兩水飛　甘草三錢
右爲末每服半錢麥門冬湯下湯使隨意
加辰砂金箔名桃紅散亦治急驚
入梔子仁名金蓮散

加滑石半兩名玉眞散

湯氏曰前方治小兒秋夏伏暑多有熱吐黃涎頭額溫五心熱小便赤少或乾嘔無物宜服香薷飲又宜服玉露散生薑汁和白湯調下獨用薑汁一服而止

導赤散

治心驚內虛邪熱
生地黃　甘草　木通各等分
右咬咀竹葉煎加黃芩赤芍藥羌活燈心煎服

至寶丹

治精神恍惚心躁生風
生犀屑　玳瑁屑　琥珀研　硃砂細研水飛
雄黃細研水飛各一兩　金箔五十片一半爲衣
銀箔五十片研　片腦一分研　麝香一錢研
安息香一兩半爲末以無灰酒飛濾去沙石約取一兩慢火熬膏　牛黃半兩
右生犀玳瑁揭羅爲細末研入諸藥令勻將安息香膏以重湯煮凝成和搗爲劑如乾卽入少熟蜜盛不津器中旋丸桐子大二歲兒服二丸人參湯化下大小以意加減又治大人卒中不語中惡氣中諸物毒中熱暗風產後血暈死胎不下竝用童便少許生薑自然汁三五滴同溫過化下五丸立效

琥珀散

治煩躁不寧消風豁痰
辰砂一錢半　琥珀　牛黃　殭蠶炒去絲嘴
南星水浸夏三日春秋五日冬七日牛膽中製佳
全蠍去毒　白附子　代赭石　天麻　乳香
蟬蛻各一錢　麝香五分　片腦一字
右爲末三歲半字薄荷湯下
慢驚加附子

解毒丸

治小兒五臟積熱毒氣上攻胃膈煩悶咽喉腫痛赤眼癰腫頭面發熱脣口乾燥兩頰生瘡精神恍惚心忪悶亂坐臥不寧及傷暑毒面赤身熱心煩躁而渴飲食不下
寒水石　石膏研各八兩　青黛
右研如粉入青黛和勻蒸餅七個水調丸芡實大每服一丸食後新汲水化下或細嚼生薑湯下亦可中諸毒竝宜服及小兒驚風潮熱痰涎壅塞心胃煩躁頰赤多渴坐臥不穩每三歲兒可服半粒量大小加減

七物黃連湯

治夏月傷寒四肢煩疼發熱其人喜煩嘔逆支滿劇如禍祟寒熱相搏故令喜煩
黃連　茯苓　芍藥各七錢半　黃芩　甘草
乾薑各一兩　小麥三合
右剉散白水煎

欲止瀉加枳實半兩

金箔鎮心丸

治驚悸痰聚上脘煩躁欠安
硃砂一兩　白茯苓　人參　甘草各半兩
山藥一兩半　腦子一錢　牙硝錢半　麝五分
紫河車二錢半黑豆煮　金箔十二帖
右爲末煉蜜丸每兩半作五十丸以金箔爲衣每服一丸薄荷湯下含化亦可臥時常服安心鎮神祛邪熱凉咽膈止驚啼
梨漿飲子

治潮熱柴熱衛熱瘧氣熱兩日一發三日一發積熱脾熱痞熱胃熱癖熱瘧熱邪熱寒熱脾瘧鬼瘧夜發單瘧獨熱

青蒿童便浸一日曬乾　柴胡　人參　黃芩炒　前胡　秦艽　甘草炙各等分

右㕮咀每服一歲半錢二歲一錢水一小盞入生藕生梨薄荷生地黃同煎至半去滓通口空心食前服

大柴胡湯

治傷寒十餘日邪氣結在裏往來寒熱大便祕澀腹滿脹痛譫語心中痞硬飲食不下或不大便五六日繞臍刺痛時發煩躁及汗後如瘧日晚發熱兼臟腑實脈有力者可服

柴胡八錢　黃芩　赤芍藥　枳實麩炒各三錢　半夏湯泡七次切片焙乾一錢半

右剉散薑棗煎加減服之

欲下加大黃半兩效

大承氣湯

治剛痓胃滿內實口噤咬齒大熱發渴大便閉澀

大黃半兩　硝半兩　厚朴一兩　枳實一兩

右剉散每服三錢水一盞煎六分不拘時熱服

地骨皮散

治虛熱亦治傷寒壯熱餘熱

知母　骨皮各二兩炒　柴胡　生甘草　人參　茯苓各半兩　半夏湯泡七次切片曬焙三錢

右㕮咀薑水煎服每用二錢

全嬰方加秦艽名秦艽飲子

有驚熱加蟬退天麻黃芩

海藏曰地骨皮散即小柴胡湯加減法自汗者地骨皮散無汗者柴胡湯三黃湯仲景所用錢氏改諸丸散加減竝出古法

犀角飲

治小兒骨蒸潮熱盜汗肌瘦

犀角鎊　鼈甲酥炙　柴胡　知母炒　地骨皮　胡黃連各一兩　大黃　桃枝各半兩

右㕮咀每三歲一錢水一盞煎三分去滓溫服

鼈甲飲

治小兒骨蒸潮熱盜汗咳嗽多渴心躁多驚面黃消瘦

鼈甲酥炙　地骨皮　秦艽　柴胡　枳殼麩炒　知母　當歸各一兩

右㕮咀三歲一錢水半盞桃柳枝各三寸烏梅一個煎三分去滓服無時

靈犀飲

治小兒骨蒸潮熱盜汗咳嗽可食多渴面黃肌瘦腹急氣粗等證虛熱餘熱通用

犀角鎊　胡黃連各半兩　茯苓去皮　人參　川芎　秦艽　生甘草　羌活　柴胡　桔梗　地骨皮各一兩

右㕮咀三歲一錢水半盞烏梅竹葉少許煎服

生犀飲

治小兒骨蒸肌瘦頰赤口乾日晡潮熱夜有盜汗五心煩熱四肢困倦飲食雖多不生肌肉及大病差後餘毒不解或傷寒病後因食羊肉體熱不除

地骨皮　秦艽　人參　犀角鎊　大黃蒸　麥冬　枳殼　柴胡　白茯　赤芍　桑白皮　鼈甲酥炙黃各一兩

右剉每服二錢水一盞入青蒿少許煎溫服食後

小兒分爲二服

準繩加黃芪烏梅二味

青蒿散

治小兒室女肌瘦潮熱

青蒿三錢　生甘草一寸　烏梅一個搗碎　小麥五十粒

右㕮咀河水二碗煎至三分去滓服

柴胡散

治小兒骨蒸潮熱面黃瘦弱

柴胡　地骨皮　甘草炙各半兩

右㕮咀水一盞每用二錢煎七分去滓服不拘時

理中湯

治脾胃不和中寒上衝心腹疼痛痰逆惡心嘔吐心下煩悶痞滿腸塞不通飲食減少短氣羸困溫中逐水止汗去濕泄瀉注下水穀不分腹中雷鳴傷寒時氣裏寒外熱霍亂嘔吐瀉利手足厥冷

人參　白朮　乾薑炮各等分　甘草炙減半

右剉散每服二錢水一盞薑三片棗一枚同煎腹痛加人參

渴減白朮

寒多加乾薑附子

吐甚去白朮加生薑

瀉多還用朮

悸者加茯苓

四肢厥冷下利轉筋方可加附子爲末蜜丸名理中丸治厥陰臟寒蚘上入膈吐出長蟲胃虛冷故先服理中丸或加茯苓枳實

四君子湯

治榮衛氣虛臟腑怯弱心腹脹滿全不思食腸鳴泄瀉嘔噦吐逆

人參　茯苓　生甘草　白朮各等分

右爲末每服二錢水一盞煎七分通口服不拘時鹽少許白湯點服溫和脾胃進益飲食辟寒邪障霧氣

五苓散

治傷寒溫熱病表裏未解頭疼發熱口燥咽乾煩渴飲水或水入卽吐或小便不利汗出表解煩渴不止又治霍亂吐利躁渴引飲

澤瀉二兩半　猪苓　白朮　茯苓各一兩半

肉桂一兩

右爲末每服二錢熱湯調下不拘時多飲熱湯有汗出卽愈

又治濕熱在裏身發黃疸濃煎茵陳湯下食前服疸病發渴及中暑引飲亦可用水調服小兒加白朮末少許

如發虛加綿黃芪人參末少許服之

白虎湯

治傷寒大汗出表證已解心胷大煩渴欲飲水及吐或下後七八日邪毒不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲數升者宜服

又治夏月中暑毒汗出惡寒身熱而渴

知母三兩　甘草炙一兩　石膏八兩另研

粳米三合

右㕮咀每服三錢水一盞煎六分米熟爲度去滓溫服聖惠方加乾葛

柴苓散

治小兒腹中有伏熱溫壯來去

柴胡七錢半　麥門冬去心　人參　赤茯苓

甘草各半兩　黃芩一兩

右剉散每服二錢水一盞入小麥一撮竹葉三片煎五分去滓溫服量大小加減與之

二黃犀角散

治小兒身體溫壯心神不安大腑祕熱

犀角屑　大黃酒浸蒸　鈎藤　梔子　生甘草

黃芩各五分

右爲末每服五分量大小加減熱湯調下

牛黃散

治小兒溫壯身體常熱不止或寒熱往來

牛黃研　生甘草各五分　柴胡去苗　梔子炒

龍膽草　黃芩各二錢半

右爲末每服五分以金銀薄荷湯調下無時

黃龍湯

治傷寒身熱不退或寒熱往來

柴胡五錢　黃芩　生甘草各二錢　赤芍藥三錢

右㕮咀每服二錢薑一片棗一枚水一盞煎至五分去滓溫服無時

牛黃膏

治小兒天弔驚風手足搐搦面脣紅赤咽喉痰響渾身頭額壯熱喚問不知不醒人事或只左手左脚偏搐或只右手右脚偏搐或只脣口眼鼻顫搐此疾則多肚腹緊脹熱極則胷膈久積驚涎忽被風邪所觸故作是候也此患大忌不得鍼灸若鍼灸迺誤矣凡中此疾須辨認有前項形證宜服此劑

蠍尾四十九枚　巴豆去殼一錢半不去油

梅花片腦半字　辰砂研二錢　麝香一字

鬱金三錢以皂角水煮過　牛黃少許

右六味爲末每遇小兒中前項證候周歲半字三四歲一字仍觀孩兒身體肥瘦臟腑虛實及病勢輕重則加藥用熟蜜水一二分調勻灌下或薄荷湯亦可服藥後良久壓下痰涎疏去風氣當宣瀉兩三行其瀉出如鷄子白是應效或胷膈痰涎壅盛痞滿服此藥宜吐風痰亦爲美也下藥後或吐或瀉手足搐搦稍定喉嚨不響頭額腹肚漸凉眼目不翻識得人事面紅赤色但時時有少溫壯驚潮風熱來未退便續下保壽散三兩服金粉散一二服蚤晨更可下均氣補虛進乳哺白朮散一日蚤晨與一服或服此數件藥後只覺得腹肚至夜微熱不進乳食宜空心與進一服寬熱散微微通去腹中餘熱風涎或有是疾服藥少退忌兩日不可見風

方加粉霜二錢名硃砂膏

羚羊角湯

治諸驚壯熱

羚羊角屑　蟬蛻　茯神　麥門冬　柴胡
地骨皮各一錢　黃芩　甘草炒各五分
右剉散每服二錢薑棗煎服

梔子仁湯

治陽毒傷寒壯熱百節疼痛下後熱不退者
梔子仁　赤芍　大青　知母　柴胡各一兩
甘草半兩　杏仁去皮尖雙仁者麩炒微黃㕮
升麻　黃芩　石膏各二兩
右剉散每服三錢水一盞生薑三片煎六分去滓
不拘時溫服

大連翹湯

治瘡疹壯熱小便不通諸般瘡癰丹毒膀胱風
連翹　羌活　荊芥　木通　赤芍藥　當歸
防風　柴胡　滑石　蟬蛻　甘草炙各一錢
山梔子　黃芩各五分
右剉細每服一錢加紫草煎溫服
熱甚加大黃更詳證加減爲佳

龍膽湯

治胎驚月內氣盛發熱凡膀風撮口壯熱皆可用
治嬰兒出腹血脈盛實寒熱溫壯四肢驚掣發熱
大吐哯者若已能進哺中食實不消壯熱及變蒸
不解中客人鬼氣并諸驚痫方悉主之十歲以下
小兒皆服之小兒龍膽湯第一此是新出腹嬰兒
方若日月長大者以次依上爲例若必知客忤及
有魅氣者可加人參當歸各如龍膽多少也一百
日兒加三銖二百日兒加六銖一歲加半兩
龍膽草　釣藤皮　柴胡　黃芩　桔梗　芍藥
茯苓　生甘草各六錢　蜣螂二枚去翅炙
大黃一兩煨
右㕮咀以水一升煮取五合爲劑也服之如後節
度有藥虛實宜定數合水也兒生一日至七日分
一合爲三服兒生八日至十五日分一合半爲三
服以漸加服皆得下卽止勿再服也
直指方爲末每服一錢北棗煎服
或加防風麥門冬以導心熱黃芩減半去蜣螂亦
可

紫霜丸

治食積亦是傷寒之藥治乳哺失節宿滯不化胃
腹痞滿嘔吐惡心便利不調乳食減少又治傷寒
溫壯挾熱實大便酸氣食不消化或已得汗身熱
不止或變蒸發熱多日不解或因食而發癇先寒
後熱竝宜服之
代赭石火煅用醋淬七次　赤石脂各一兩
杏仁五十粒去皮尖炒　巴豆三十粒去皮膜油炒
右先將杏仁巴豆入乳鉢內細研如膏却入代赭
石脂末研和勻以湯浸蒸餅丸如粟米大一歲兒
五丸米飲下一二百日兒三丸亦要看肥瘦加減
微瀉爲度大凡變蒸與傷寒調理一同此藥竝治
之此仍是瀉食積之劑量虛實用

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百四十一卷目錄
醫部彙考四百二十一
小兒諸熱門三
方二　升陽散火方　退內熱方　梔子清肝散　柴胡清肝散　龍膽飲子　滋腎丸　三解牛黃散　牛黃京膽散　當歸龍薈丸　錢氏泰艽散　人參　錢氏白朮散　人參　錢氏百解散　當歸　錢氏地黃丸　錢氏地黃丸　錢氏異功散　錢氏異功散　錢氏白朮散　錢氏泰艽

右各等分爲末每服半錢或一錢薄荷蜜湯調

牛黃涼膈散

治風壅痰實蘊積不散頭痛面赤心煩潮熱痰涎壅塞咽膈不利精神恍忽睡臥不安口乾多渴脣焦咽痛頷頰赤腫口舌生瘡

牛黃一兩　甘草炙十兩　寒水石　牙硝枯石青各二十兩　紫石英飛　腦　麝各五兩

膽星七兩半

右末之蜜丸每兩作三十丸溫薄荷人參湯嚼一丸食後服常服半丸治急驚竝薄荷水化

當歸補血湯

治肌熱躁熱目赤面紅煩渴晝夜不息其脈洪大而虛重按全無此脈虛血虛也若誤服白虎湯必死宜此主之

黃芪三錢　當歸一錢

右水煎服

補中益氣湯

治中氣虛弱體疲食少或發熱煩渴等證

當歸三分　人參　黃芪各八分　白术　甘草

陳皮各五分　升麻　柴胡各二分

右薑棗水煎空心午前服

加味逍遙散

去牡丹皮山梔卽逍遙散治肝脾血虛等證

當歸　甘草炙　芍藥酒炒　茯苓　白术炒

柴胡各一錢　牡丹皮　山梔炒各七分

右水煎服

王肯堂曰愚按前方若乳母肝脾血虛內熱寒熱徧身瘙痒肢體作疼頭目昏重怔忡頰赤口燥咽乾或發熱盜汗食少不寐或口舌生瘡耳內作痛胃乳腹脹小便不利致兒爲患尤宜用之又治婦人陰虛發熱兒飲其乳以致患瘡者

清解散

治感風發熱頭疼鼻塞涕流及溫壯憑主之

北參　防風　天麻　北前胡　茯苓　北梗

枳殼劑　甘草各二錢　細辛　柴胡各一錢半

川芎三錢

右末每一錢水一小盞乾薄荷三葉略煎溫和服

集驗荊术散

治小兒傷風傷寒或瘡或疹此藥無寒無熱疏風順氣一切諸熱證

荊芥穗　赤芍藥各一兩　蒼术二兩泔製

甘草半兩炒

細末隨大小一二錢又名冲和散

傷風傷寒壯熱咳嗽鼻塞聲重生薑葱白湯下

傷風潮熱或變蒸發熱薄荷湯下

風熱傷肺鼻涕氣粗紫蘇湯下

暴卒急驚風熱宜急驚門疏風散

久病後急慢驚熱保嬰全蠍散

發汗去節麻黃湯調

盜汗自汗牡蠣浮麥湯調

丹毒風熱煎四順飲調

服暴赤熱腫煎羌活黃芩生地黃湯調

口舌瘡項熱腫生瘡煎防風牛蒡子湯調

咽喉重舌煎升麻枳殼大黃防風薄荷湯調

人參羌活散

治傷寒發熱頭痛身疼或潮熱煩渴痰實咳嗽

羌活　白獨活　柴胡　川芎　人參　甘草炙

白茯苓　枳殼各一兩　前胡　桔梗　地骨皮

天麻酒浸焙各半兩

咬咀每一錢水半盞薑一片棗半個薄荷一葉煎溫服無時瘡疹未發亦可服

羌活散

治傷風時氣頭痛發熱身體煩疼痰壅咳嗽失音鼻塞聲重及解時行下痢赤白

人參去蘆　羌活　赤茯苓去皮　柴胡去蘆

前胡去蘆　川芎　獨活　桔梗剉炒　枳殼

蒼术各如前製　甘草各一兩

右剉每服二錢水一盞薑二片薄荷三葉煎七分無時熱服

發散風邪入葱白同煎

痢證薑倉米煎

人參幸梗湯

治小兒傷風發熱鼻塞咳嗽時行瘡疹

人參七分　細辛五分　桔梗　乾葛　升麻

白术　茯苓　柴胡各七分　薄荷　甘草各五分

每服水一鍾薑三片煎五分不拘時服

紅綿散

治小兒四時感冒風寒徧身發熱變蒸諸驚胎驚丹毒等熱竝皆治之及急慢驚風亦宜服之

人參二錢五分　天麻洗　殭蠶炒　麻黃去節全蠍去毒各二錢　甘草炙　辰砂一錢五分研

右爲末入硃砂和勻再乳極細每服半錢用木半盞煎數沸入乾胭脂少許再煎一沸不時溫服

大黃矾硝湯

治小兒驚熱涎風前後不通

川大黃蒸　生甘草　矾硝各一兩

右剉碎每服二錢水半盞入蜜少許煎至三分不拘時服

五和湯

主宣利臟腑積熱調和榮衛

當歸酒洗　赤茯苓去皮各半兩　甘草炙

大黃　枳殼水浸去穰剉麥麩炒微黃各七錢半

右咬咀每二錢水一盞煎七分無時溫服

寬熱飲

主伏熱在裏風痰滿氣促昏悶或脾胃停滯日久飲食減少面黃脈實發熱無時並宜服之

枳草七錢五分　元明粉二錢五分　大黃

枳殼去穰各一兩剉片巴豆十五粒作兩片去殼膜心同炒枳殼見微黃色去巴豆

右剉焙爲末臨時入元明粉乳鉢內同藥末杵勻無時調服半錢至一錢兒小止抄一字並用薑蜜湯或薄荷湯

七寶散

治小兒溫壯伏熱傷寒煩躁面赤氣喘夜熱曉涼此藥涼心臟消風熱

川大黃蒸　赤芍藥　甘草炙　當歸各二錢半

麻黃　白朮　荊芥穗各二錢

右爲末一歲一錢水半盞葱白一寸薄荷一葉煎至三分不拘時溫服

寶脾散

治小兒餘熱不除

川芎　茯苓　甘草　白朮

右剉散用水煎食遠服

參苓白朮散

主脾胃虛弱飲食不進多因少氣中滿痞噫吐逆此藥不寒不熱性味和平常服調脾悅色順正去邪

人參　白茯苓　粉草　白朮土炒　白扁豆

山藥去皮　桔梗剉炒　蓮肉去心　縮砂仁

薏苡仁各一兩

右剉焙爲末每服半錢至一錢用棗湯空心調服或溫米湯亦可

安神散

治吐瀉諸病後心虛煩悶觸物易驚氣鬱生涎涎與氣搏睡不得寧預防變生他證

人參　白茯苓　半夏製　甘草炙　陳皮去白

枳實製各五錢

右剉每服二錢水一盞薑兩片棗一枚竹茹小團煎七分無時溫服

有微熱渴入麥門冬去心同煎

簡易凝神散

治小兒經汗下熱去復作收斂胃氣清涼肌表神效

人參　白朮　白茯苓　山藥炒各一兩　扁豆

粳米　知母　生地黃　甘草各半兩　淡竹葉

地骨皮　麥門冬各一分

細末每二錢水小盞薑二片棗一枚煎無時

地黃煎

治小兒壯熱煩心眠臥不安

生地黃汁一升　白沙蜜　酥　麥門冬汁各三合

右重湯煮至成膏每服數匙

火府丹

治小兒壯熱

生地黃　木通　甘草　黃芩

右水一鍾煎服

金蓮飲子

治小兒蘊積壯熱赤眼口瘡心煩躁悶咽乾多渴潮熱不止

防風　炙甘草　連翹　柴胡　山梔各半兩

右爲末每服二錢用水六分煎至三分食後服

天竺黃散

治小兒驚風熱

天竺黃研　鬱金　山梔　白殭蠶炒去絲嘴

蟬殼去土　甘草各等分

右爲末一歲半錢熟水薄荷湯皆可服不拘時

甘露散

治小兒驚熱通利小腸去驚涎清心腑止煩渴安神穩睡加硃砂名加硃甘露散

寒水石　石膏各二兩　生甘草末一兩

右件爲末和勻量兒大小或一錢或半錢熱月冷服寒月熱服用薄荷湯調或燈心湯調被驚心熱不安臥皆可服小便不通快麥門冬燈心湯若驚

熱入硃砂少許不拘時服
一方有赤茯苓一兩
蘇沉方用滑石不是石膏
錢氏名玉露散或服一字或半錢或一錢食後溫白湯調下
辰砂金箔散
治小兒心膈邪熱神志不寧驚惕煩渴恍惚忡夜臥不安齒斷腫爛及痰實咳嗽咽膈不利
辰砂　栝樓各二錢半　人參　白茯各一錢半
蛤粉四錢飛　牙硝一錢半　炙草一錢二分半
片腦一分半　金箔一片
右爲末一歲半錢薄荷湯調不拘時
百粹小兒藏腑多熱睡臥不穩大便不利蜜湯調一字
地骨皮飲
治小兒骨蒸潮熱往來心腦煩悸及傷寒後氣未解
柴胡　地骨皮各二兩　知母　炙草　黃芩
鼈甲酢炙黃　人參各二錢半　赤茯苓五錢
右剉碎一歲二錢水六分盞梅各一片煎三分不拘時服
柴胡散
治骨蒸肺氣五心煩熱日晡轉盛口乾無味渴多身瘦胃滿痰緊小便黃色食減神昏
北柴胡　人參　當歸酒洗　黃芩　赤芍藥
甘草炙各一兩　大黃　栝樓剉炒　北五味
半夏各半兩
右剉每服二錢水一盞小烏梅一箇薑二片煎七分無時溫服
一粒金丹
治小兒五藏蘊熱胸膈煩悶五心煩熱
人參　犀角　玳瑁　琥珀　防風各一錢
白茯苓　寒水石煅　甘草各二錢　龍腦
硃砂水飛各半錢
右爲細末入麝半錢用陳米糊丸芡實大金箔二十五片爲衣麥門冬去心煎湯下
絳雪丹
治小兒煩熱
硇硝　硃砂各一兩
右爲末飯丸芡實大三歲一丸砂糖水化下
地黃煎丸
治小兒風壅上膈煩熱鼻衄口瘡咽喉腫痛口舌生瘡或血熱五心常熱多渴飲水
生地黃　熟地黃各一兩　薄荷葉一兩一錢
甘草炙　山梔仁　黑參各七錢半　片腦半錢
右爲末煉蜜丸如芡實大每服一丸白湯磨化乳後服
錢氏秦艽散
治潮熱減食蒸瘦
秦艽切焙　炙草各一兩　蓮荷葉切焙半兩
右爲粗末每服二錢水一鍾煎八分食後溫服
人參芍歸散
治小兒虛勞內熱潮熱或遍身瘡
北參　當歸　遠志浸取肉薑製焙　北前胡
柴胡　地骨皮　防風　北桔梗　枳殼製半夏麴各一錢五分　川芎　赤芍藥　茯苓
麥門冬去心各二錢　甘草三錢焙
右剉細每服二錢水小盞薑三片紫蘇葉三四葉煎瘡者兼服猪肚黃連丸別作小丸不惟治瘡治渴其發熱而服者可與服二十丸
十味人參散
治潮熱身體倦怠
柴胡　甘草　人參　茯苓　半夏　白朮
當歸　芍藥　葛根　黃芩
右㕮咀水一鍾薑三片煎服
會氏百解散
主和解百病虛慢陰證不宜
乾葛二兩半　升麻　赤芍各二兩　黃芩一兩
麻黃製七錢半　薄桂二錢五分　甘草一兩五錢
右碎每服二錢水一盞薑二片葱一根煎七分無時溫服
有風熱盛加薄荷同煎
當歸散
順調氣血和解表裏爽利心腹疏理百病及治溫熱停積自痢煩躁不寧
當歸酒洗　赤芍各二兩　甘草半生半炙一兩
大黃半生半炮一兩二錢　川芎　麻黃各半兩
右碎每服二錢水一盞薑二片煎七分無時溫服
三解散
一名寧心湯主上焦蘊熱傷風面紅目赤狂躁氣急飲水膈咽煩悶丹毒口瘡痰嗽搐掣

人參　防風　天麻　茯神　鬱金如無山梔代
白附子　大黃各二錢半　赤芍藥　黃芩
殭蠶各五錢　全蝎十五尾去尖毒　枳殼二錢
粉草六錢
右碎焙爲末每服半錢至一錢用溫薄荷湯無時
調下或燈心湯

龍膽丸

治小兒食後發熱夜則凉此血熱證疳熱皆可治
宣黃連去毛　赤芍藥各半兩　龍膽草去苗
青皮去穰各二錢半　檳榔一大個　麝香少許
右爲末猪膽汁少入麵糊爲丸蘿蔔子大每三二
十丸米飲空心服

六合湯

治小兒血熱每日巳午間發熱遇夜則凉
當歸　大黃　川芎　熟地黃
右爲末三歲水半盞煎至三分無時服

金星丸

治風熱結聚喉內痰鳴喘鬆咳嗽面紅頸腫咽膈
壅塞發熱狂躁多渴
川鬱金末　雄黃另研各一分　膩粉半分
巴豆七枚去油
右爲末米酢糊丸麻子薄荷臘茶下

四物二連湯

治血虛勞五心煩熱盡則明了夜則發熱脇肋并
一身盡熱日晡肌熱
當歸　生地黃　白芍藥　川芎　川黃連
胡黃連各等分
右水煎服

紅縣散

白殭蠶炒　天南星切薄片油浸黃各二兩
蘇木節另研二兩半　天麻生用一兩
右爲末每服一錢水一小盞入紅綿少許同煎至
六分溫服

凡小兒風熱頭目不清竝宜服之

若傷寒有表證發熱者每服入去節麻黃末五分
有裏熱心燥渴者入滑石末半錢同煎服之

六神散

人參　白茯苓　乾山藥　白朮　白扁豆
甘草炙各等分
右爲末每服一大錢水一小盞棗一枚薑二片同
煎至五分服

治胃冷加附子

治風證加天麻

治痢加鴉粟殼

銀白散

乾山藥　白朮　白茯苓各半兩　人參　白扁豆
知母　炙草　升麻各等分
右爲末每服一大錢水一小盞棗一枚薑二片同
煎溫服不拘時

桃枝丸

疏耶積熱及結胷又名桃符丸
巴霜　大黃　黃蘗各一錢　輕粉　硇砂各半錢
右細末麪糊丸粟米大煎桃枝湯下一歲兒五七
丸五七歲二三十丸未睟兒二三丸臨臥服

梔豉飲子

治小兒畜熱在中身熱狂躁昏迷不食
梔子仁七枚　豆豉半兩
右用水三盞煎至二盞看多少服之無時或吐不
吐立效

梔子湯

治小兒積熱心臟小便赤腫口內生瘡
梔子仁　木通　當歸尾　白芷各二錢　防風
甘草各一錢
右爲細末麥門冬煎湯送下

益元散

解暑毒利小便理煩渴除驚悸
滑石六兩　粉草一兩細剉
右二味或曬或焙研爲細末每服一錢至二錢溫
水無時調服凉水亦可

萬安飲

推陳致新除邪輔正和益脾胃宣通氣血調順飲
食疏解風寒寧心化痰去煩理熱不拘證在表裏
竝宜可投常服百病不生眞元益固補養諸虛亦
有奇驗此與宣明論當歸飲相類不遠治法最多
其藥品之外惟加枳殼半夏
人參去蘆　當歸酒洗　大黃生用　芍藥洗淨　黃芩
枳殼去瓤炒　半夏炮製　甘草各一兩　滑石末六兩
防風去蘆　甘草各一兩　滑石末六兩
右剉除滑石末臨入和勻每服一錢水一盞薑二
片煎七分無時溫服或加棗一枚同煎

調胃散

桃枝丸取積熱後服之
人參二錢　白朮二錢半　甘草炙　藿香
鴉粟子各一錢　白附子製半分　白茯苓
丁香各半錢
右爲末紫蘇湯下半錢或一錢

橘皮湯
橘皮去白一兩半　炙甘草　竹茹各半兩
人參二錢五分
右每服五錢薑水煎食前服

酸棗仁湯
酸棗仁去殼取白　炙甘草　生地黃　梔子仁
麥門冬　人參　當歸身各等分
右剉細加燈心水一盞煎七分去滓溫服不拘時

清暑益氣湯
治暑邪中衛身熱自汗
黃芪　蒼朮泔浸去皮各一錢　升麻七分
人參　白朮　陳皮炒　神麴炒　澤瀉各五分
甘草　黃蘗酒浸炒　當歸身　麥門冬去心
青皮炒　葛根各三分　五味子九粒杵
右水煎服

清燥湯
治小兒自汗或因熱傷元氣大小便祕澀
黃芪炒　蒼朮各五分　白朮　陳皮　澤瀉
人參　白茯苓　升麻　麥門冬去心　當歸身
生地黃　神麴炒　豬苓　黃蘗酒拌炒各三分
五味子五粒杵　黃連炒　甘草炙各二分
右剉一片水一鍾煎服

加減瀉黃散
此藥退脾土復腎水降心火
黃連　茵陳各五分　黃蘗　黃芩　山梔
茯苓各三分　澤瀉二分
右㕮咀都作一服水一盞煎至六分去滓稍熱服
食後一服減半待五日再服而良愈
經云土位之主其瀉以苦又云脾苦濕急食苦以燥之故用黃連茵陳之苦寒除濕熱爲君腎欲堅急食苦以堅之所以黃蘗之苦辛寒強筋骨爲臣濕熱成煩以苦瀉之故以黃芩山梔子之苦寒止煩滿爲佐濕淫於內以淡泄之故以茯苓澤瀉之甘淡利小便導濕爲使也

張澳蘆根湯
治黃病
蘆根一兩　茵陳　山梔　黃芩　甘草各半兩
右件搗羅爲細末每服一錢水八分入薄荷三葉煎至五分去滓放溫服

子芩散
治黃病
黃芩　瓜蔞根　茯神去木各一兩　甘草
胡黃連各半兩
右件爲細末每服一錢水八分煎五分去滓溫服

茵陳湯
治小兒發黃等病身如橘色
山茵陳　山梔子仁各一兩　川大黃　川硇砂
木通　寒水石各半兩
右煎服法同前

雙連丹
治疸病
川黃連去鬚　胡黃連各一兩
右件搗羅爲細末用黃瓜一枚去穰留一小蓋子入二藥末後以蓋子蓋定用麪裹慢火燒令麪焦去麪搗熟如荳菜大每服七粒至十粒溫水下量兒大小以意加減

當歸丸
治小兒冷熱不調大便青黃心腹多痛或腹中氣滿或時嘔逆不欲飲食加枳殼尤妙以下治陰黃
當歸　白芍藥　人參　川芎各三錢　炙甘草
白朮各半兩
右爲末水煮麵糊爲丸如麻子大三歲兒每服十丸粥飲下日三服量兒大小加減
冷甚加陳皮

茯苓滲濕湯
治小兒黃疸寒熱嘔吐而渴欲飲水身體面目俱黃小便不利不得安臥不思飲食
茯苓五分　澤瀉二分　茵陳六分　豬苓
山梔　黃連　防己　白朮　蒼朮　陳皮
青皮　枳殼　黃芩各二錢
右㕮咀水煎徐徐溫服

丹溪稜朮散
治小兒吐瀉黃疸
三稜　蓬朮　青皮　陳皮　神麴　麥牙
黃連　甘草　白朮　茯苓各等分
右爲末溫熟水調服

若傷乳食吐瀉加山楂
時氣吐瀉加滑石
發熱加薄荷

擂鼻瓜蒂散

治小兒忽發心滿堅硬腳手心熱變爲黃疸不急治則殺人

瓜蒂七枚　赤小豆七粒　秫米七粒

右爲末用一字吹兩鼻內令黃水出餘末盡水調服之得吐出黃水卽愈

又

瓜蒂一兩　赤小豆四兩

右爲末每一錢溫湯調服後卽臥當吐清黃汁爲效虛者不宜服

泰王九疸散

治大人小兒

傷食多喜飲梔子仁主之　心疸煩躁心中熱苦根主之　腎疸脣乾熬葶藶子主之　脾疸尿赤出少惕惕恐瓜蔞主之　膏疸飲水尿多秦椒瓜蒂主之　膏一作肺　舌疸渴而數便鍾乳主之　肉疸小便白凝水石主之　髓疸目深多嗜臥牡蠣澤瀉主之　肝疸胃熱飲多水激肝白朮主之

右一十一味等分隨病所在加半搗篩爲散飲服五分七日三稍稍加至方寸匕兒小者量與之

千金翼方

治大人小兒黃黑等疸

當歸三兩　桂心六兩　乾棗十七枚去核
麥門冬一升　生大黃一兩　茵陳　黃芩　黃芪一本無　乾薑　茯苓　芍藥　黃連　石膏碎　人參　甘草各二兩

右十五味㕮咀以水一斗煮取三升半分四服小兒減服

赤茯苓散

主黑疸身皮大便皆黑通治大人小兒

赤小豆三十枚　赤茯苓　女萎各六銖
雄黃一銖　瓜丁四銖　甘草二銖

右六味以水三升煮豆茯苓取八合搗四味爲散和半錢匕服之須臾當吐吐則愈亦主一切黃小兒服半字匕

犀角圓（傷生豬微下同）

治小兒積熱痰實三焦蘊毒及風熱面赤大小便祕澁

生犀末一分　人參　枳實　檳榔各半兩

大黃酒浸切片以巴豆一百個去皮貼在大黃上紙裹飯上蒸三次切碎炒黃焦去巴豆只用大黃黃連去鬚各一兩

右爲細末煉蜜和圓如麻子大每服一二十圓臨臥熱水下未利加圓數疏導極穩

勝金散

治小兒潮熱溫壯

雄黃一錢水飛　白附子半錢　甘草半兩炙
巧藥半兩水煮十沸曬乾　天南星半兩炮
荊芥穗一分

右爲末每服半錢水一小盞入薄荷三葉煎至五分去滓溫服無時

金花散

治小兒潮熱發躁

川大黃一兩　秦艽半兩

右爲末每服一字或半錢水一小盞入青蒿三兩葉葱白二寸同煎至五分去滓溫服

若變骨蒸勞氣用童子小便浸青蒿葱白煎藥

涼肌圓

治小兒溫壯身熱臉赤煩渴躁悶

龍膽草二兩　元參一兩　當歸洗淨一兩

右爲細末煉蜜和圓菉豆大每服二十圓竹葉湯下兒大增之無時

牛黃膏

治小兒溫壯風熱

寒水石四兩煅　雄黃水飛　牙硝各一兩
山梔一錢半　炙草一分　鉛白霜半兩

右爲細末入麝香少許煉蜜和旋取皂子許薄荷木化下乳食後

尅效散

治小兒溫壯風熱睡臥不穩咳嗽喘急

薄荷二兩　白殭蠶炒去絲嘴　元胡索各半兩

右爲末每服半錢或一錢蜜湯調下無時

鎮心丹

治小兒風熱驚熱眠睡不安

鐵粉一分　蛇黃一兩　代赭石俱煅醋淬七次
馬屁孛各半兩　麝香一分別研

右爲細末煉蜜入糊圓如小豆大每服一粒磨剪刀環水化下食後亦治驚癇發搐

梨汁粥
治小兒風熱昏塞躁悶不食
鵝梨三枚
右切碎以水二升煮取汁一升去滓入粳米一合
煮粥食之
龍齒散
治小兒驚熱如火亦治溫壯
龍齒
右爲末調服或以爛龍角研濃汁服一二合
人參牛黃散
人參　牛黃
右等分爲末以薄荷水調下最佳
竹瀝湯
竹瀝二合
右溫之分三四服無卽刮竹茹以酢煎溫服
青金丹
治小兒積熱啼叫三焦壅滯
青黛四兩　生甘草二兩　蟬殼去足一兩
麝香一錢研　辰砂一分研水飛　牛黃研
腦子各三錢　龍齒末　天竺黃各半兩
右爲細末以飴糖和圓雞頭大每一粒分四服溫
水化下無時
四順飮子
治小兒諸熱
地骨皮去骨　防風去蘆并梗枝　山梔仁
連翹各等分
右爲細末每用一錢或二錢水一小盞入燈心竹
葉少許煎至五分放冷服無時
甘露散
治小兒諸熱
薄荷葉一兩　大黃　甘草各半兩　牙硝
芎藭　雄黃水飛各一分
右爲末每服半錢蜜水調下無時
牛黃散
治小兒諸熱煩躁
臍金大者濕紙裹慢火煨熱
右爲末入牛黃少許冷水調下大者一錢小者半
錢無時
雞卵蜜
雞卵一枚
右和白蜜服之
除熱湯
小兒立夏後有病身熱者愼勿妄爲吐下但以此
浴之
白芷根苗各等分
右爲麤散用清漿水煎更入鹽少許以浴兒浴畢
用粉粉之
又
白芷　苦參　秦皮
右煎湯或無衆藥但得一味煮湯皆可
又
楮葉一升
右用水七升煎至五升適溫煖用之澡浴
涼肌粉
白芷　楓葉　藁本　苦參　黃連
右等分爲細末每用三錢以蛤粉二大塊同研勻
細入生絹袋子每浴了以撲身遍令勻亦治夏月
伏暍遍身生赤痱子用之極妙
猪膽圓
治小兒血熱早食後發熱至晚則涼
胡黃連　宣黃連去鬚各半兩　赤芍藥一兩
右爲細末以猪膽汁和成劑却入在膽皮中懸
銕上用漿水煮勿令漿水入煮熟取出圓如菜豆
大每服二十圓米飮湯下食後臨臥日三有生瘡
癤一證亦早食後身熱頗相似但以鼻衄泄瀉宜
審辨之
升麻葛根湯
治小兒溫壯驚風及傷寒身體發熱或作瘡疥身
熱未辨之間並宜服此
乾葛細剉　升麻　芍藥　甘草炙各等分
右爲麤末每服二錢水一小盞煎至五分去滓溫
服無時
桔梗湯
治小兒風熱溫壯或傷寒時氣瘡疹未發並宜服
之仍兼小黑膏服尤善
桔梗　細辛　人參　瓜蔞根　白朮　甘草
川芎　白茯苓各等分
右爲末每服二錢水一盞入生薑三片薄荷三葉
同煎至七分盡三歲以下兒作四服無時
小黑膏
川烏　南星各一枚大者

右入一小瓶子內用濕紙密搭封口慢火燒之候火滅取出削出中心所存白處如皂子大用之須燒數枚擇中度者方用爲末次入薄荷元參末各五錢匕研勻煉蜜和成劑每用旋剝豆許圓之葱白湯下頻頻服

若筋脈或緩或急加乳香同葱白湯下之

腦子圓

治小兒發熱極甚因伏留心經昏迷不醒或誤服熱藥蓄熱所致用之神效

生梅花腦子半字或一字

右取新殺猪心中血一兩滴同研作一圓新汲水少許化下大良未醒即再服一粒

薄荷散

治小兒風熱溫壯及傷寒傷風痘疹未辨之間皆可服之

薄荷葉　藿香葉去土　荊芥穗　甘松去土

白芷　防風去蘆并椏枝　川芎　桔梗去蘆

白殭蠶去絲嘴　甘草炙　藁本去土各一兩

細辛去苗半兩

右爲末每服一錢茶調溫服亦治大人風氣不順頭面風等疾大能清利頭目止昏眩聰明耳目

單方

小兒寒熱及熱氣中人用猪後蹄甲燒灰乳汁調服一撮日二服千金方下同

治小兒傷寒發黃擣土瓜根汁三合服之

又擣韭根汁澄清取大豆許滴兒鼻中即出黃水立瘥

又擣青麥汁服之

小兒出汗有熱雷丸四兩粉半斤爲末撲之

小兒熱痛口禁體熱竹青茹三兩酢二升煎一升服一合子母秘錄

小兒發熱不拘風寒飲食時行痘疹並宜用之以葱涎入香油內手指蘸油摩擦小兒五心頭面項背諸處最能解毒涼肌直指方

小兒陽明經風熱濕氣相搏陰莖無故腫或痛縮宜寬此一經自愈廣木香枳殼麩炒二錢半炙甘草二錢水煎服曾氏小兒方

小兒潮熱往來盜汗用南番胡黃連柴胡等分爲末煉蜜丸芡子大每服一丸至五丸安器中以酒少許化開更入水五分重湯煑二三十沸和滓服孫兆祕寶方

小兒熱渴久不止葛根半兩水煎服聖惠方下同

小兒天行壯熱頭痛木香六分白檀香爲末清水和服仍溫水調塗顖頂取瘥

小兒骨蒸體瘦心煩天靈蓋酥炙黃連等分研末每服半錢米飲下日二服

小兒熱病壯熱頭痛用瓜蔞根末乳汁調服半錢

小兒頭熱鼻塞不通濕地龍糞捻餅貼顖上日數易之

小兒身熱苦參煎湯浴之良外臺秘要下同

小兒蒸熱脾虛羸瘦不能飲食用白朮白茯苓白芍藥各一兩甘草半兩爲散薑棗煎服

小兒五心煩熱胡黃連末米飲服一錢易簡方

小兒心經實熱瀉心湯用黃連三錢半水一盞煎半盞食遠溫服和劑局方

小兒發黃皮肉面目皆黃用生瓜蔞根搗取汁二合蜜二大匙和勻暖服日一服廣利方

小兒疳熱肚脹潮熱髮焦不可用大黃黃芩傷胃之藥恐生別證以胡黃連五錢靈脂一兩爲末雄猪膽汁和丸菉豆大米飲服每服一二十丸全幼心鑑

小兒五心煩熱渴欲飲水者煑黑豆與食之安古今醫統

小兒夏月傷暑用赤茯苓猪苓澤瀉炒扁豆薑製厚朴香茹各三分用生薑一片煎如有吐加藿香窮鄉便方

小兒渴疾桑葉不拘多少逐片染生蜜緜繫蒂上陰乾細切煎汁日飲代茶勝金方

小兒熱渴蓮實二十枚炒浮萍二錢半生薑少許水煎分三服聖濟總錄下同

小兒身熱汗出拘急因中風起丹參半兩鼠屎三十枚爲末每服三錢漿水下

小兒熱病壯熱煩渴頭痛生地黃汁三合蜜半合和勻時時與服普濟方下同

小兒挾風蘊熱體熱太陰元精石一兩石膏七錢半龍膽半兩爲末每服半錢新汲水下

小兒身熱石膏一兩青黛一錢爲末糕糊丸龍眼大每服一丸燈心湯化下

小兒腦熱嘗欲閉目大黃一分水三合浸一夜一歲

兒服半合餘者塗頂上乾即再上至後方下同

小兒狂語夜後便發竹瀝夜服二合

小兒多熱熟湯研郁李仁如杏酪一日服二合

小兒黃疸胡黃連川黃連各一兩爲末用黃瓜一個去瓤留蓋入藥在內合定麪裹煨熟去麪搗丸菉豆大每量大小溫水下後倣此

小兒躁渴粉霜一字大兒半錢蓮花湯調下冬月用蓮肉

小兒積熱毛焦睡語欲發驚者牛黃六分硃砂五錢同研以犀角磨汁調服一錢

鍼灸

古今醫統曰小兒飲水不歇面目黃者灸陽剛二穴各一壯在十四椎下兩傍各開一寸陷中

醫案

錢氏直訣曰朱監簿子五歲忽發熱醫曰此心熱也腮赤而唇紅煩躁引飲遂用牛黃丸三服以一物瀉心湯下之來日不愈反加無力而不能食又下之使利黃沫錢曰心經虛而有留熱在內必破寒藥下之致此虛勞之病也宜先用白术散生胃中津液次以生犀散治之朱曰大便黃沫如何曰胃氣正即瀉自止虛熱也朱曰醫用瀉心湯如何錢曰瀉心湯者黃連一物耳黃連性寒多服則利能寒脾胃也坐久衆醫至皆曰實熱錢曰虛熱若實熱何以瀉心湯下之不安又加面黃頰赤五心煩躁不食而引飲醫曰既虛熱何大便黃沫錢笑曰便黃沫者服瀉心湯故也

鄭人齊郎中者家奸收藥散施其子忽臟熱齊白取青金膏三服并一服餌之服畢至三更瀉五行其子困睡齊言子睡多驚又與青金膏一服又瀉三行加口乾身熱齊言尚有微熱未盡又與青金膏其妻曰用藥十餘行未安莫生他病否召錢氏至曰已成虛羸先用白术散時時服之後服香苽丸十三日愈

朱監簿子五歲夜發熱曉即如故衆醫有作傷寒治者有作熱治者以凉藥解之不愈其候多涎而喜睡他醫以鐵粉丸下涎其病益甚至五日大引飲錢曰不可下之乃取白术散一兩煎藥汁三升使任意取足服朱曰飲多不作瀉否錢曰無生水不作瀉縱多不足惟也但不可下耳朱曰先治何病錢曰止瀉治疾退熱清神皆此藥也至晚服盡錢視曰更可服三升又煎白术散三升服盡得稍愈第三日又服白术散三升其子不渴無涎又投烏膠散二服而安

曹宣德子三歲面黃時發寒熱不食飲水或用牛黃磨香二丸不愈用止渴乾葛散反吐師謂食伏於胃脘先以白餅子下之又以消積丸磨之而愈

儒門事親曰蔡塞成家一童子年十五歲病疸一年面黃如金遍身浮腫乏力惟食鹽與焦物戴人以茶調散吐之涌涎一盂臨晚又以舟車丸七八十粒通經散三錢下四五行待六七日又以舟車丸續川散下四五行鹽與焦物見而惡之面色變紅後再以茶調散涌之出痰二升方愈

萬氏幼科發揮曰一兒發熱至日晡尤甚其醫作瘧治不效又作潮熱治亦不效予曰此胃虛有宿食也謂瘧疾則寒熱有發有止謂潮熱則發有時如水之潮過即退次日依時復發此兒身體溫熱至申酉時則甚故知是宿食發熱也彼曰有所據乎曰出仲景傷寒正理論陽明病證云潮熱者實也宜下之以三化丸下之愈

一兒驚風時熱不退羣醫有議用小柴胡湯者有欲用竹葉湯者有欲用凉驚丸者予曰大驚之後脾胃已虛宜溫補之三藥寒凉不可服也乃作理中湯用炒乾薑一劑熱除

明醫雜著曰李閣老子患潮熱飲食如故日中酉時甚至子丑時方止遍身似疥大便祕結小便赤澀熱渴飲冷余以爲脾胃實熱傳於肺與大腸先用清凉飲四劑結熱始退又用四物湯加柴胡黃連數劑其病漸愈彼欲速效另用槐角丸之類諸證益甚遂求於施院長亦用四物湯加柴胡黃連加桃仁赤芍藥

至百劑而愈

保嬰金鏡錄曰一小兒四歲發熱飲冷口內生瘡額鼻黃赤吐舌流涎余謂心脾有熱用導赤瀉黃二散而愈後復作余因他往服清熱化痰等藥前證益甚更弄舌余用異功散加釣藤鉤而安又用六君子湯而愈蓋吐舌者爲脾經實熱而舌長出也弄舌者乃脾臟虛熱也令舌時舒而卽收也治者審之

一小兒發熱飲食少思大便不實常服蘆薈等丸視其鼻赤此寒凉之劑復傷脾土而虛熱也用五味異功散數劑而元氣復

一小兒小便不利鼻乾衄血鼻間色赤屬脾肺有熱用濟生犀角地黃湯前證已愈後頰間常赤作渴有痰此稟賦腎氣不足用地黃丸而諸證皆瘥

一小兒發熱咳嗽右頤色赤此肺金有熱用瀉白散而愈復感冒風邪前證更作又加聲重流涕用參蘇飲加杏仁桑皮而愈但右頤仍赤兼額微赤此兼心火乘肺金也用人參平肺散一劑遂痊

一小兒五歲作渴右頤鼻準微赤或飲冷水或服凉藥卽時嘔吐余曰右頤微赤肺經虛熱也鼻準微赤胃經虛熱也此胃虛不能生肺耳先用四君子加升麻一劑服之而不吐又用白术散二劑而不渴再用四君子四劑而安

一小兒潮熱煩渴大便乾實氣促咳嗽右頤色赤此肺與大腸有熱用柴胡飲子一服諸證頓退後因微驚又發搐咬牙煩悶此肝脾氣血虛也用四君子加芎歸釣藤鉤而愈

一小兒潮熱煩躁左頤青赤此心肝血虛用祕旨安神丸及四物湯加防風酸棗仁治之尋愈又用六味地黃丸調補肝腎而愈

保嬰撮要曰一小兒先壯熱便祕服清凉飲之頰愈而復作服地骨皮散而潮熱不已服四物連苓之類不時而熱甚余曰不時而熱或晝見夜伏晝伏夜見是虛火也當滋化源不信仍服寒藥愈甚余夕用六味丸朝用補中益氣加山藥山茱黃而瘥

一小兒五歲發熱作渴右頤鼻準微赤或與冷水凉藥卽時嘔吐余曰右頤微赤肺經虛熱也鼻準微赤胃經虛熱也此胃虛不能生肺耳先用四君子加升麻三分一劑而不吐又用白术散二劑而不渴再用四君子四劑而頓安

一小兒發熱作渴用瀉黃散大便重墜口角流涎仍欲瀉火余曰鼻準青白脾虛肝木所侮也口角流涎胃氣不能攝涎也大便重墜脾氣不能升也不信另服凉劑果眉唇微動四肢微抽余曰此元氣虛極而變慢脾風也用六君子加炮薑當歸木香釣藤鉤二劑益甚彼欲更劑余曰此藥力不及也設藥不對其證禍在反掌仍以前藥加炮薑附子一片服之卽安乃去附子又二劑而愈

一小兒旬日內先兩目發黃漸及遍身用瀉黃散服之瘥

一小兒因母食鬱而致飽脹嘈酸遍身皆黃余以越鞠丸治其母以瀉黃散治其子竝愈

一小兒患前證服五苓散消食丸之類其黃不退作渴飲湯腹膨少食余謂胃氣虛津液少故喜飲湯脾氣虛故腹脹少食也先用白术散漸愈又用補中益氣湯而瘥

一小兒飲食不調腹脹身黃小便金色雜用治瘀劑作渴飲水余謂胃氣實熱先用瀉黃散二劑其渴頓止用梔子檗皮湯其黃亦退用白术散而飲食進

一小兒寅卯時發熱或鍼搐有痰服抱龍瀉青二丸而愈後復患服前藥兼咳嗽氣喘不時發搐面赤色或青黃或浮腫或流涎予謂咳嗽氣喘脾肺氣虛也不時發搐肝木乘脾也面青而黃肝入心脾也浮腫流涎脾氣虛也用益智丸以養心血補中益氣湯以補脾氣而愈

一小兒巳午時發熱驚悸發時形氣倦怠面黃懶食流涎飲湯予謂心氣不足所致不信反服凉心之藥更加吐瀉睡而露睛手足竝冷幾致慢脾風先用六君桂薑湯佐以地黃丸而愈

一小兒申酉時發熱面赤腹中作痛或用峻利之劑下之致發搐吐痰作渴腹痛按之卽止此脾胃傷而變證也用七味白术散補中益氣湯頓安

一小兒亥子時發熱形氣倦怠面黃懶食流涎飲湯用益黃散而愈後又復發服前藥及清熱之劑病發不時嗜臥露睛作渴少食大便頻黃此脾虛而肝木勝之兼元氣下陷也用補中益氣湯佐以地黃丸而愈

一小兒夜間發熱腹脹此脾虛肝盛朝用五味異功散夕用四味肥兒丸熱止乃朝用六味地黃丸夕用異功散而瘥

一女子年十四患注夏經行之後發熱晡熱煩躁作渴面赤脈洪大按之如無此血脫發躁先用當歸補

血湯四劑又用八珍湯而安

一小兒每春夏口乾發熱怠惰嗜臥勞則頭痛服清涼化痰之藥喘瀉煩躁不安服香薷飲脈大神思昏憒余用補中益氣湯去升麻柴胡加五味麥門炮薑一劑未愈又加肉桂五分即甦更用六味丸而愈

一小兒稟脾腎虛弱注夏發熱二便不調朝用補中益氣湯夕用地黃丸而愈後因乳母怒氣致兒發熱驚搐用柴胡梔子散母子竝服而瘥

一小兒素有食積注夏發熱倦怠少食大便不實朝用五味異功散少加升麻柴胡夕用四味肥兒丸而尋愈

一小兒稟賦腎虛患注夏之疾因乳母大勞則發熱盜甚用補中益氣湯令母子竝服而愈後因乳母多食膏粱又患瘧疾煩躁作渴先用竹葉石膏湯及補中益氣湯將瘥母著怒氣大熱發搐用柴胡梔子散加味逍遙散而瘥

一小兒注夏食生冷之物腹中作痛之甚則發搐厥冷用人參理中丸而愈

一小兒吐瀉後患渴證飲食少思肌體消瘦用七味白术散渴漸止五味異功散加升麻飲食漸進又用補中益氣湯肌肉頓生

一小兒嗜膏粱甘味發熱作渴小便白濁用四味肥兒丸佐以瀉黃散稍愈復傷食吐瀉服消食丸胃氣復傷飲食少思肢體倦怠而渴先用七味白术散而渴止次用五味異功散而瘥

一小兒面目色白患渴證吐痰發熱服清熱化痰之藥大便洞瀉小便頻數此脾腎虛而復傷也朝用補中益氣湯夕用四神丸諸證漸愈又佐以六味地黃丸而愈

一小兒煩躁驚悸熱渴飲冷額間色赤此心經實熱先用瀉心湯一服稍緩又用柴胡梔子散而瘥

嘉靖甲寅敬臣之女年十二患脾胃素弱自夏入秋時瀉時止小腹微痛至八九月間隨成疳積之證發熱凡二十餘日不止汗泄熱解汗已復熱自中脘至小腹膨脹堅直大便溏氣喘咳嗽作嗳俱晝輕夜重徹夜煩躁不睡鼻塞眼暗譫語其家以爲必死矣余診之曰脈浮大而無根此大虛證也非獨參湯不可乃用參一兩加熟附三分煨生薑三片日進二劑乃併相煎服之大下疳積其氣則脹腹漸寬熱漸減脈漸斂然手猶尋捻不已鼻孔出血余曰此肝證也煎六味丸料與之一服如脫乃晝服獨參薑附湯夜服六味丸料脈漸有根諸證漸退先此手足恆熱至是乃始覺寒余喜曰此病邪盡退而眞氣見矣然猶飲食不進乃單用六君子湯加炮薑遂能食咳嗽獨甚與補中益氣湯嗽遂止夜始安睡而瘥

證治準繩曰羅謙甫治一小兒季夏身體蒸熱胃腸煩滿皮膚如漬橘之黃眼中白睛亦黃筋骨痿弱不能行立此由季夏之熱加以濕氣而蒸熱搏於經絡入於骨髓使臟氣不平故脾遂乘心濕熱相合而成此疾也蓋心火實則身體蒸熱胃腸煩滿脾濕勝則皮膚如漬橘之黃有餘之氣必乘己所勝而侮不勝是腎肝受邪而筋骨痿弱不能行立內經言脾熱者色黃而肉蠕動又言濕熱成痿信哉斯言也所謂子能令母實實則瀉其子也蓋脾土退其本位腎水得復心火自平矣又內經曰治痿獨取於陽明正謂此也加減瀉黃散主之

景岳全書曰余之仲兒生於乙卯五月於本年初秋忽爾感寒發熱脈微緊然素知其臟氣屬陰不敢清解遂與芎蘇羌芷細辛生薑之屬冀散其寒一劑下咽不惟熱不退而反大瀉作連二日瀉不止而喘繼之愈瀉則愈喘斯時也將謂其寒氣盛耶何以用溫藥而反瀉將謂其火刑金耶豈以清瀉連日而尚堪寒涼將謂其表邪之未除耶則何以不利於疏散束手無策疑懼已甚且見其表裏俱劇大喘垂危又豈淺易之劑所能挽回因沉思良久漸有所得乃用人參二錢生薑五片煎汁半盞然未敢驟進恐再加喘必致不救因用茶匙挑與二三匙即懷之而旋走室中徐察其呼吸之進退然喘雖未減而亦不見其增甚乃又與三四匙少頃則覺其鼻息似乎少舒遂放膽與以半小鍾更覺有應自午及酉完此一劑適一醫至急呼曰誤矣誤矣焉有大喘如此而尙可用參者速宜以抱龍丸解之余諾之而不聽乃復以人參二錢五分如前煎湯自酉至子盡其劑劑完而氣息遂平鼾鼾大睡瀉亦止而熱亦退矣此所以知其然者觀其因瀉反喘豈非中虛設有實邪自當喘隨瀉減是可辨也向使聽彼醫易以清利中氣一脫即當置之死地必仍咎余之誤用參也孰是孰非何從辨哉余因紀此以見溫中散寒之功其妙有如此者

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百四十二卷目錄
醫部彙考四百二十二
小兒嗽喘門一
黃帝素問 通評虛實論
錢乙小兒直訣 咳嗽兼變證治
張從政儒門事親 風熱涎嗽
朱震亨幼科全書 孝喘 西江月 咳嗽 西江月
魯伯嗣學嬰童百問 喘急 鮑船
虞摶醫學正傳 喘
薛氏保嬰撮要 肺臟 咳嗽 喘
徐春甫古今醫統 咳嗽
王肯堂證治準繩 肺論 咳嗽 百晬內嗽 嗽作呀呷聲 鮑船 驚驅 嗽 喘
小兒衛生總微論方 肺論 肺臟 咳嗽論
董鳳翀活幼精要 肺臟形證論 咳嗽
東醫寶鑑 痰涎喘嗽
方一 竹瀝湯 紫菀湯 五味子湯 地黃門冬湯 射干湯 半夏湯 杏仁圓 半夏圓 八味生薑煎 四物圓 菖蒲圓 桂枝湯 麻黃湯 瀉白散 瀉黃散 地黃丸 阿膠散 百部丸 麻黃湯 葶藶丸 惺惺散 參蘇飲 茯苓半夏湯 甘桔散 桔梗湯 人參平肺散 京膈丸 壽命散 麻黃定喘湯 五聖丹 蘇沉丸 寶湯 五虎湯 茅根湯 甘桔湯 久嗽方 天麻散 琥珀散 天麻丸 葛根芩連湯 梅花飲子 吳子玉方 半夏丸 保壽散 小歸命散 解肌散 白玉丸

藝術典第四百四十二卷

醫部彙考四百二十二

小兒嗽喘門一

黃帝素問

通評虛實論

帝曰乳子中風熱喘鳴肩息者脈何如岐伯曰喘鳴肩息者脈實大也緩則生急則死

註此復論後天所生之宗氣而亦不可傷也宗氣者五臟六腑十二經脈之宗始故曰宗氣肩息者呼吸搖肩也風熱之邪始傷皮毛喘鳴肩息是風熱盛而內干肺氣宗氣故脈實大也夫脈之所以和緩者得陽明之胃氣也急則胃氣已絕故死

宋錢乙小兒直訣

咳嗽兼變證治

夫嗽者肺感微寒證也八九月間肺氣大旺咳嗽面赤痰盛身熱當以葶藶丸下之若久病不可下也

十一月十二月嗽者乃傷風嗽也風從背脊第三椎肺俞穴而入當以麻黃湯汗之有熱證面赤飲水咽喉不利者兼用甘桔湯治之

若五七月間身熱甚唾粘者以褊銀丸下之若無熱證而但嗽者以葶藶丸主之後用化痰藥

咳而後喘面腫者肺火盛也用瀉白散瀉之

咳而哽氣喉中有聲或嗽久肺亡津液者皆肺虛也並用阿膠散補之痰盛者先實脾土後用褊銀丸微下涎退即補肺

嗽而吐青綠水者百祥丸下之嗽而吐痰涎乳食者白餅子下之嗽而咯膿血者甘桔湯主之嗽而痰實面赤飲水者褊銀丸下之治初嗽下之久則補之更量虛實以意增損

註按前證或兒自因腠理不密外邪內蘊或因乳母七情厚味鬱熱若風邪外傷者用麻黃湯表散鬱熱內蘊者用葶藶丸疏導鼻流清涕或頭痛聲重者用參蘇飲散之更用四君子以固肺氣若心火刑肺用人參平肺散以清肺金用六味地黃丸以滋腎水若嗽而吐青綠水者用六君子加柴胡桔梗平肝補脾若嗽而吐痰乳者用六君子加桔梗補土生金若嗽而吐膿血者用桔梗湯排膿理肺潔古先生云嗽而兩脅痛肝火侮肺也用小柴胡湯嗽而嘔苦水膽汁溢上也用黃芩半夏生薑湯嗽而喉中作梗心火刑金也用甘桔湯嗽而下氣小腸失約也用芍藥甘草湯嗽而喘急風邪傷肺也用麻黃湯嗽而嘔長蟲胃氣虛也用烏梅丸嗽而痰涎壅盛風傷脾也用升麻湯嗽而遺尿大腸氣虛也用赤石脂禹餘糧湯不止猪苓湯嗽而腰背痛痛甚則咳涎風邪傷腎也用麻黃附子細辛湯嗽而遺尿膀胱氣虛也用茯苓甘草湯嗽而腹滿面腫不食脾虛氣逆也用五味異功散丹溪先生云上半日嗽者胃中有火也黃昏嗽者脾肺氣虛也午後嗽者腎中陰火也大抵咳嗽之證多因肺氣虛腠理不密外邪所乘若風中於衛則呼氣不出熱至於榮則吸氣不入風熱相搏血氣稽留於肺若寸口脈數而虛爲肺痿脈數而實爲肺疽此因汗下過度重亡津液所致其麻黃湯乃發汗解表之劑葶藶丸乃內疏通利之劑白餅子亦

疏利之劑審有是證方可暫用之苟泛投施治重亡津液必致敗證

元張從政儒門事親

風熱涎嗽

小兒風熱涎嗽可用通聖加半夏多煎少少服之不過三五日愈

朱震亨幼科全書

哮喘

其證有二不離痰火有卒感風寒而得者有曾傷鹽酢湯水而得者故天陰則病發連綿不已輕則以五虎湯一服即止重則葶藶丸治之皆一時解急之法若欲斷根當內服五聖丹外用灸法取對心穴左背上足三里各灸三壯仍禁酸鹹辛熱之物

西江月

哮喘多成宿疾天陰欲雨纏綿治法發表又行痰九寶時常靈驗表邪未除五虎裏實葶藶為先不宜砒石作成丸悞了孩兒命短

咳嗽

治法有三有發汗者有下瀉者有滴補者如初起挾風寒外感者輕則蘇沉九續湯重則五虎湯一服有神

如咳久身熱而喘急者此肺中伏火也以葶藶丸利之

如咳久肺虛連綿不已者即當補肺治法以阿膠丸主之

如咳久連聲不已且口鼻俱出血者治法以茅根湯主之甚效

如夏月得咳嗽者以加味白虎湯治之不可汗下

如咳喘盛者以利痰丸主之

如咳嗽而嘔吐者以二陳湯加薑汁治之

如咳久而成鼈胃者治以葶藶丸主之

如咳嗽咽痛聲嘎者治以甘桔湯主之

祖傳治咳嗽只用玉液丸細茶湯下

凡咳嗽日久面色恍白目無神彩氣急痰壅一連百十聲不止晝夜如是人事虛弱作熱者不治

面青而光其氣喘促哽氣又時常唇白如練此肝氣旺而肺氣絕不治

一胃高而喘肩動胃脘動更加驚搐者不治

一潮熱喘急咳之時面青黑目上瞼血從口鼻出者此木火旺盛而肺已絕不治

一面白或青唇白目閉悶亂頭搖手擺此肺將絕也不治

一喉舌生瘡其聲嘎者不治俱日久論

西江月

肺乃五臟華蓋皮毛易感風寒初醫發汗最為先麻黃杏仁靈驗草葉黃芩桔梗石膏薄荷人參前胡枳殼臘茶煎一服風寒發散

久咳不宜發散化痰順氣為宜潤下玉液有神奇不效再行湯劑貝母陳皮枳殼茯苓甘桔芩梔前胡薄荷杏仁泥有熱石膏堪取

久咳痰壅發熱看他二便何如若還清利是中虛只用抱龍醫處如果結閉實熱或因日久肺虛要分虛實不須拘此是嬰兒命主

久咳連聲血出清金降火為佳芩梔甘梗款冬花知母二冬多下去白陳皮枳殼前胡地骨婁霜茯苓元參麥芽加此個方兒無價

大凡咳嗽治法必須清化痰涎化痰順氣最為先氣順痰行喘減順氣陳皮枳殼化痰半夏天南黃芩梔子火邪干桔梗茯苓開滲

久咳連聲不止面青目瞼長吁胃高眉顫汗如珠臉白唇青背曲骨瘦如柴潮熱鼻高髮燥神虛啞嘎驚搐不堪除縱有靈丹無處

虛咳時常作熱面黃氣短無神當歸陳皮白茯苓梔子黃芩桔梗知貝前胡天麥甘草枳殼人參再加黃蘗妙如神前胡生薑作引

明魯伯嗣學嬰童百問

喘急

議曰小兒有因驚暴觸心肺氣虛發喘者有傷寒肺氣壅盛發喘者有感風咳嗽肺虛發喘者有因食鹹鹼傷肺氣發虛痰作喘者有食熱物毒物冒觸三焦積熱熏蒸清道肺肝氣逆作喘者喘與氣急有輕重之別耳喘即口開欲言不能隘於胃腑息短促急心神迷悶其因驚發喘逆觸心肺暴急張口虛煩神困者大效雄硃化痰定喘丸主之佐以天麻定喘飲乃效其傷寒肺氣壅盛發喘者是表不解以小青龍湯麻黃杏子甘草石膏湯辨其冷熱而施治焉其感風咳嗽肺虛發喘者則三拗湯加減治之其食鹹鹼而喘者略以生扁有熱治之以涼肺定喘之劑又有哮喘者以許叔徵十六般哮喘之法治之無不愈又有汗下之後而喘急者葛根黃連黃芩主之喘甚者加葶藶子又有葶藶丸覓氣進食千金射干湯治咳

逆喘急大效

齁齡

經濟論齁齡證肺經受風寒因咳嗽肺停冷血生痰致使腑臟有熱睡臥不安故成齁齡咽喉間如拽鋸之聲小兒若有此候可服通關梅花飲子并半夏丸及保壽散小歸命散解肌散三兩服自安若齁齡如瘕證喉間若拽鋸聲者乃肺感風邪上氣喘急面脣青色項下有深凹陷坑痰涎粘如膠漆口生腥臭惡氣舌縮者皆不可治也

虞摶醫學正傳

喘

或問小兒氣喘世俗例以爲犯土謂犯其土皇也或安碓或作竈或浚井塡塞開通溝渠等事適遇小兒氣喘遂云犯土無疑矣信聽術士退土或書符命貼於動土之處或呪法水焚符調服或按家之九宮謂土皇居於何宮太陽落在何宮當取太陽之土與兒飲之能釋土皇之厄而喘定間亦有驗者夫歷代醫書汗牛充棟何不該載而遺此證爲黃冠之流醫治歟請明以告我曰夫小兒發喘多由風寒外束腠理壅遏而肺氣不得宣通而爲病耳治法當用錢氏瀉白散或三拗湯等劑使腠理開通肺氣舒暢而喘息定矣或因吐瀉之後而中氣不足亦使氣短而喘治用錢氏益黃散東垣補中益氣湯或用伏龍肝湯泡放溫飲之其喘立定者有之蓋脾土大虛必借土氣以培益之術士窺竊此意而巧立名色謂太陽之土能安土也夫小兒之證不一或慢驚直視而喘或肺脹氣促而喘縱取太陽土盈盎以沃之亦莫能救其萬一醫者自宜檢方按法調治毋聽末流之俗以致惑焉

薛氏保嬰撮要

肺臟

小兒腠理不密外邪所感而肺病者用清肺丸若脾胃氣虛不能相生而肺病者用六君子湯若脾胃氣實大腸不利而肺病者用瀉黃散若心火炎爍肺金而肺病者用地黃丸

咳嗽

錢仲陽云嗽者肺感微寒八九月間肺氣正旺若面赤身熱其病爲實當用葶藶丸下之久嗽者不宜下若在冬月乃傷風嗽當用麻黃湯汗之面赤飲水咳嗽吐膿痰咽喉不利者以甘桔湯清之先咳後喘面腫身熱肺氣盛也以瀉白散平之嗽而唾痰涎乳者以白餅子下之潔古云嗽而兩脅痛者屬肝經用小柴胡湯咳而嘔苦水者屬膽經用黃芩半夏生薑湯咳而喉中如梗者屬心經用甘桔湯咳而失氣者屬小腸用芍藥甘草湯咳而右脅痛者屬脾經用升麻湯咳而嘔長蟲者屬胃經用烏梅丸咳而喘息吐血者屬肺經用麻黃湯咳而遺尿者屬大腸用赤石脂湯咳而要背痛甚則咳涎者屬腎經用麻黃附子細辛湯咳而遺尿者屬膀胱用茯苓甘草湯咳而腹滿不欲食面腫氣逆者屬三焦用異功散若咳嗽流涕外邪傷肺也先用參蘇飲喘嗽面赤心火刑肺也用人參平肺散及六味地黃丸嗽而吐青綠水肝木乘脾也用異功散加柴胡桔梗嗽而吐痰乳脾肺氣傷也用六君子加桔梗若嗽吐膿痰者熱蘊於肺而成肺癰也用桔梗湯凡風邪外傷法當表散而實腠理其用下藥非邪傳於內及胃有實熱者不宜輕用面色白脈短濇者肺之本證也易治面色赤脈洪數者火刑金也難治

喘

喘急之證多因脾肺氣虛腠理不密外邪所乘眞氣虛而邪氣實者爲多若已發則散邪爲主未發則補脾爲主設槩攻其邪則損眞氣逕補其肺則益其邪凡喘嗽之證若小便不利則必生脹脹則生喘要分標本先後先喘而後脹者主於肺先脹而後喘者主於脾蓋肺金司降外主皮毛肺朝百脈通調水道下輸膀胱肺既受邪則失降下之令故小便漸短致水溢皮膚而生脹滿此則喘爲本而脹爲標也治當清金降火爲主而行水次之脾土惡濕而主肌肉土能尅水若脾土受傷不能制水則水濕妄行浸漬肌肉水既上溢則邪反侵肺氣不能降而生喘矣此則脹爲本而喘爲標也治當實脾行水爲主而清金次之苟肺證而用燥脾之藥則金燥而喘愈甚脾病而用清金之藥則脾寒而脹益增觀其證若中氣虛弱者用六君子湯中氣虛寒者前方加炮薑鬱結氣滯者用歸脾湯加柴胡山梔肝木尅脾土者用六君柴胡山梔肺氣壅滯者用紫蘇飲加白朮食鬱壅滯者用養胃湯加木香肺中伏熱水不能生而喘者用黃芩清肺飲及五淋散脾肺虛弱不能通調水道者用補中益氣湯及六味丸膏粱厚味脾肺積熱而喘者用清胃散及滋腎丸心火刑金不能生水者用人參平肺散亦用滋腎丸腎水虧虛火鑠金小便不利者用

六味丸及補中益氣湯肝木乘脾不能相制而喘者用六君柴胡升麻脾胃虛寒臍突腹脹者用八味地黃丸脾腎虛寒不能攝水如蠱脹者用加減腎氣丸凡虧損足三陰而致喘脹或二便不調及牽引作痛者俱用六味八味加減腎氣等丸治之仍參傷風咳嗽證

愚按活人方云喘者肺氣盛而有餘然氣盛當認作氣衰有餘當認作不足蓋肺氣盛者肺中之火盛也有餘者肺中之邪有餘也其脈右寸必浮而有力右頰色赤用瀉白散以瀉之前證若乳母感冒風寒肺經蘊熱致兒爲患用參蘇飲若乳母膏粱醇酒積熱致兒是病用清胃散

徐春甫古今醫統

欬嗽

小兒初生百日內欬嗽肺葉脆弱最爲難治平常冷熱邪入肺中無能得出又不堪吐利必明病源清解風寒化痰順氣益肺生津胃開氣壯嗽即漸減不可强攻

冷嗽鼻流清涕面白痰薄日輕夜重或微有邪熱

熱嗽面微紅鼻乾熱痰稠脉浮數

胃熱不因風寒而得以兒啼便乳壅結心肺不散即嗽而逆以玉佛子下錢氏治嗽之法先實脾脾母得實肺則和平

小兒咳嗽者腠理受風邪感激臉紅喘促辨虛實若見脣縮胷前陷鼻枯乾黑皆爲不治

王肯堂證治準繩

肺論

肺主喘

實則悶亂喘促有飲水者有不飲水者

虛則哽氣長出氣

肺病悶亂哽氣長出氣氣短喘急

肺熱手掐眉目鼻面甘桔湯主之

肺盛復有風冷胷滿短氣氣急喘嗽上氣當先散肺後發散風冷散肺瀉白散大青膏主之肺只傷寒則不胷滿

肺虛熱脣深紅色治之散肺虛熱少服瀉白散

肺臟怯脣白色當補肺阿膠散主之若悶亂氣粗喘促哽氣者難治肺虛損故也

脾肺病久則虛而脣白脾者肺之母也母子皆虛不能相營故名曰怯肺主脣白而澤者吉白如枯骨者死

此以脣診肺之法也脣白色者肺臟怯也阿膠散主之若手尋衣領及亂捻物者肝熱也宜瀉青丸手掐眉目鼻面者肺熱也宜甘桔湯之類是也

肺病見春金旺肺勝肝也當瀉肺輕者肺病退重者目淡青必發驚更有赤者當搐海藏云爲肝怯故目淡青也

肺主燥自病則喘嗽燥則潤之

實則喘而氣盛瀉白散主之

虛則喘而少氣先益黃散後阿膠散主之

心乘肺賊邪熱喘嗽先地黃丸中導赤散後阿膠散主之

肝乘肺微邪惡風眩冒昏憒嗽无活膏主之

腎乘肺實邪憎寒嗽清利百部丸主之

脾乘肺虛邪體重吐痰泄瀉嗽人參白朮散主之

凡肺之得病必先觀心脾二臟之虛實若心火爍金即當先抑心氣後喫肺藥若心氣和即便看脾脉若脾氣虛冷即不能相生而肺家生氣不足則風邪易感故患肺寒者皆脾虛得之若脾氣盛實則亦痞隔中焦而大腸與肺表裏不能相通夫中焦熱隔則肺與大腸不通其熱毒之氣必上蒸於肺而生痰故患肺熱者多脾實得之心氣盛者瀉之脾氣虛者益之脾氣實者通之然後隨其肺之寒熱以治之故有抑心氣益脾氣通肺氣三藥若診其脈氣心脾兩臟俱和而肺自生疾則但察肺家虛實而治之

肺經鬱熱用瀉白散肺氣自虛用四君子湯外邪所乘用參蘇飲心火炎燥用人參平肺散中焦實痞用大承氣湯脾不能生肺用異功散夫肺氣盛者肺中之邪氣盛也其脈右寸必浮而有力宜用瀉白散以瀉之若肺虛而有熱者執肺熱還傷肺之說而不用人參則誤矣仍參其證治之

肺苦氣上逆急食苦以瀉之訶子皮一作黃芩

肺欲收急食酸以收之白芍藥

以酸補之五味子

以辛瀉之桑白皮

肺虛以五味子補之如無他證錢氏補肺阿膠散主之虛則補其母脾乃肺之母以甘草補脾

肺實以桑白皮瀉之如無他證以瀉白散主之實則瀉其子腎乃肺之子以澤瀉瀉腎

咳嗽

內經曰五臟六腑皆令人咳非獨肺也皮毛者肺之

舍也皮毛先受邪氣邪氣聽從其令也五藏之咳久乃移於六腑又病機式要云咳謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾濕動而爲痰也咳嗽謂有聲有痰也因傷肺氣動於脾濕故咳而嗽也又生氣通天論云秋傷於濕冬必咳嗽大抵素秋之氣宜清而肅反動之則氣上衝而爲咳嗽甚則動於脾濕而爲痰也蓋風乘肺者日夜無度汗出頭痛痰涎不利熱乘肺者急喘而嗽面赤潮熱手足寒冷小兒多有之火乘肺者咳嗽上壅喘唾出血甚者七竅血溢燥乘肺者氣壅不利百節內痛頭面汗出寒熱往來皮膚乾燥細瘡燥癢大便祕澀涕唾稠粘寒乘肺者或因形寒飲冷冬月坐臥濕地或受冷風春秋之氣或因外感夏是火氣炎上最重秋是濕熱傷肺冬是風寒外來也各宜隨其證而治之

潔古曰肺之生病而成嗽大抵秋冬則實春夏則虛更詳五藏兼見之證以辨虛實若實則面赤飲水身熱痰涎盛涕唾稠粘咽乾不利喘嗽面腫吐食皆當先補脾益黃散後瀉肝瀉青丸若咯膿血是肺痿也用清肺散治之若虛則面白脫色氣少不語喉中有聲唾痰清利法當阿膠散補之若亡津液用白朮散主之

曾氏曰咳嗽者固有數類但分冷熱虛實隨證疏解初中時未有不因感冒而傷於肺內經曰肺之令人咳何也岐伯曰皮毛者肺之舍也皮毛先受邪氣邪氣得從其令故難經云形寒飲冷則傷肺使氣上而不下逆而不收衝壅咽膈淫淫如痒習習如梗是令嗽也乍暖脫著暴熱遇風邪氣侵於皮膚肺先受之而爲咳嗽若初得時面赤唇紅氣粗發熱嗽來痰鳴此是傷風壅痰作嗽用清肺飲五拗湯及小柴胡湯羌活散皆可解表次青木香湯

有小兒汗出未乾遽與戲水亦致傷風咳嗽外證眼泡微浮額汗痰鳴亦宜清肺飲瀉肺湯與之疏風化痰解利邪熱小柴胡湯亦可

若嗽日久津液枯耗肺經虛矣肺爲諸藏華蓋臥開而坐合所以臥則氣促坐則稍寬乃因攻肺下痰之過名爲虛嗽聲連不斷喉中痰鳴氣息欲絕嗽罷則吐白沫欲乾嘔此肺虛而氣不順也面唇皆白而慘嗽過額上多汗哽氣長出乳食減少皮脾虛胃亦虛宜其有吐投茯苓厚朴湯及藿香飲次溫脾潤肺理中湯加杏仁北五味子水煎服蓋此藥補而益肺藉土氣以生金則自愈矣或嗽而頰紅有紫黯色理中湯再加乾薑爲用亦良法也

有脾虛亦能作嗽當投補劑用醒脾散茯苓厚朴湯令脾氣實然後間以清肺飲煎服疏解肺經風寒及藿香飲助脾養胃亦救子益母之法也

有一證咳嗽至極時頓嘔吐乳食與痰俱出盡方少定此名風痰壅盛肝木剋脾土宜以白附飲投之即效

百晬內嗽

此名乳嗽實難調理亦惡證也當審虛實而施治焉實者散之虛者補之其證氣粗痰盛口瘡眼熱發散後可利之此金圓等藥主之散其實也其證嘔吐嗽後驚悸困倦自汗者當用補肺散益黃散大麻散補其虛也大抵治驚嗽琥珀散主之天麻圓乃要藥也治未滿百晬咳嗽不止遠勝諸藥

百日內嬰孩偶咳嗽痰壅睡中不寧亦因產後感風而得但不可過用發散之劑先以解表散一二服次投貝母湯及惺惺散治之

脾胃內熱者用抱龍丸風邪外感者用惺惺散痰熱既去而氣粗痰盛或流涎者脾肺氣虛也用異功散加桔梗口瘡眼熱大便堅實者用三黃丸大便不實者用白朮散若嘔吐不乳困倦自汗或自利腹脹者脾胃氣虛也用六君子加柴胡若驚悸困倦痰盛不乳者心脾血虛也四君加芎歸酸棗仁或因乳母食五辛厚味致兒爲患者仍參喘嗽諸證

嗽作呀呷聲

聖惠云夫小兒嗽而呀呷作聲者由胃腸痰多嗽動於痰上搏於咽喉之間痰與氣相擊隨嗽動息呀呷有聲其咳嗽本體雖同至於治療則加消痰破飲之藥以此爲異耳

齁鮯

郭氏曰小兒此疾本因暑濕所侵未經發散邪傳心肺變而爲熱有熱生風有風生痰痰實不化因循日久結爲頑塊圓如豆粒遂成痰母推本其原或啼哭未休遽與乳食或飼以酸鹹氣鬱不利致令生痰或節令變遷風寒暑濕侵襲或墮水中水入口鼻傳之於肺故痰母發動而風隨之風痰潮緊氣促而喘乃成痼疾宜急去風化痰先以五苓散同寬氣飲寬熱飲用少薑汁和勻沸湯調服次進如母湯雄黃散如意膏半夏丸

鷄膈嗽

小兒患驚風驚止而嗽作謂之驚膈嗽茅先生下金杏丸夾勻氣散與服

喘

曾氏云小兒喘疾重於咳嗽然有虛實冷熱之分不可概舉實熱者投清肺飲加五和湯水薑葱煎及瀉肺湯碧玉丸爲治經云喘急多因氣有餘蓋肺主氣故也虛冷者投枳實湯水薑煎井如意膏補肺散坎離湯自效此肺虛感風氣不升降所致及用定喘飲常驗不拘冷熱皆可服涎壅失音二聖散主之

雲岐云小兒結熱上氣喘者四順清凉飲子

丹溪云痰嗽痰喘並用涌法吐之重劑瓜蔕散輕劑苦參赤小豆末須鹹虀汁調服

小兒衞生總微論方

肺論

肺氣盛者肌膚瑩白滑膩髮細黑淺肺氣怯則肌膚沮敗若無皮而血凝故寶鑑亦名血凝孫眞人言小兒出腹肌肉猶是血也漸漸堅化肺主皮膚肺氣不充則血沮敗不成肌膚故若無皮毛而血凝面目繞鼻口悉黃閉目撮面口中乾燥四肢不能伸縮哭無聲不吮乳此皮毛不斂也多是不育千金治以龍膽湯方

肺臟

肺候應白色莫使見絕形鼻青孔燥黑腹脹眼眶傾

肺主鼻絕則肺逆乘之而色青又肺絕則無涕故孔黑燥也肺主眼泡絕則陷之

項直喘氣急胷凸沒廻聲

肺主氣絕則喘急項直以引氣也氣絕則胷中滿凸但有出氣而無廻氣也

秋間逢此候四方別托生

咳嗽論

治嗽大法盛則下之久則補之風則散之更量大小虛實意以施治是以愼護小兒須素著夾背心雖夏月熱時於單背心上當背更添襯一重蓋肺俞在背上恐風寒傷而爲嗽嗽久不止亦令生驚若百晬內兒病嗽者十中一二得全亦非小疾也

又有停飲作痰者由兒乳飲失宜致脾胃不和停滯其飲不散留結成痰隨氣上干於肺而嗽者此爲痰嗽若不嗽者則肺壅不利咽塞唾涎脅腹鬲滯

董鳳翀活幼精要

肺臟形證論

肺臟形證在天爲燥在地爲金在人爲肺在時爲秋脾土爲母腎水爲子尅制肝木主氣藏魂聲則爲哭液則爲涕其味好辛鼻爲其竅外應皮毛其色主白白喜光澤不欲灰色形寒體冷則傷肺經面白則病面赤則逆肺經若虛鼻涕嗌乾喘乏咳血肺經若實乾嗽鼻寒肺經若絕汗出如雨發喘不休秋脈應時輕虛以浮若是賊脈浮大而牢若是危脈毛如風吹

肺實瀉腎肺虛補脾

肺部所主鼻尖準頭孔名井竈不宜翻露鼻孔黑陷如煤焦黑肺家已絕其候難治鼻中赤癢蛔長疳盛或瀉白涕腦寒喜困時或流涕傷風喜睡鼻下生瘡潰爛生疳鼻中常息積熱爲殃

咳嗽

小兒咳嗽乳母之過丸散狼虎醫士之過凡見咳嗽須究表裏有熱解表溫平順氣和順三焦滋潤肺經化痰退熱避風愼冷不可妄汗不可妄下鼻流清涕面白痰薄日輕夜重微有邪熱冷嗽之因鼻熱面赤痰稠脉數日重夜輕熱嗽之源治嗽之法先實脾土脾土得實肺自和平脣縮胷陷鼻塞不治失聲喘急

神仙難醫

東醫寶鑑

痰涎喘嗽

痰乃風苗火靜則伏於脾火動則壅於肺痰火交作則咳嗽喘急宜瀉白散合導痰湯脾肺母子也二臟俱虛則生頑涎頑涎者脾肺所出也涎則流溢在於咽喉如水雞之聲喘嗽煩悶宜抱龍丸奪命散

馬脾風宜用馬脾風散牛黃奪命散保命丹

方一

竹瀝湯 千金方下同

治小兒出胎二百許日頭身患小小瘡治護小瘥復發五月中忽小小咳嗽微溫和治之因變癇一日二十過發四肢發動背脊伏眺眼反須臾氣絕良久復蘇已與常治癇湯得快吐下經日不間爾後單與竹瀝汁稍進一日一夕中合進一升許發時小疎明日與此竹瀝湯吐下發便大折其間猶稍稍與竹瀝汁

竹瀝五合　黃芩三十銖　木防己　羚羊角
白朮各六銖一作白鮮　大黃二兩　茵芋三銖
麻黃　白薇　桑寄生　葶藶　甘草各半兩

右十二味㕮咀以水二升半煮取藥減半內竹瀝煎取一升分服二合相去一食久進一服

一方無葶藶

紫菀湯

治小兒中冷及傷寒暴嗽或上氣咽喉鳴氣逆或鼻塞清水出

紫菀　杏仁　黃芩　當歸　甘草　橘皮
青木香　麻黃　桂心各六銖　大黃一兩

右十味㕮咀以水三升煮取九合去滓六十日至百日兒一服二合半一百日至二百日兒一服三合

五味子湯

治小兒風冷入肺上氣氣逆面青喘迫咳嗽晝夜不息食則吐不下

五味子　當歸各半兩　麻黃　乾薑　桂心
人參　紫菀　甘草各六兩　白朮　款冬花
細辛各二銖　大黃一兩半

右十二味㕮咀以水二升半煮取九合去滓兒六十日至百日一服二合半一百日至二百日一服三合其大黃別浸一宿下

一方無款冬花大黃有大棗三枚

地黃門冬湯

治小兒寒熱咳逆腸中有癖乳吐不欲食

乾地黃四兩　麥門冬　五味子　蜜各半兩
大黃　硝石各二兩

右六味㕮咀以水三升煮取一升去滓內硝石蜜煮令沸服二合日三餐中當有宿乳汁一升許出大者服五合

射干湯

治小兒咳逆喘息如水雞聲

射干　麻黃　紫菀　甘草　生薑各一兩
半夏五枚　桂心五十寸　大棗二十枚

右八味㕮咀以水七升煮取一升五合去滓內蜜五合煎一沸分溫服二合日三

嬰童百問加細辛阿膠

半夏湯

半夏四兩　紫菀　桂心　生薑　細辛　阿膠
甘草各二兩　款冬花二合　蜜一合

右九味㕮咀以水一斗煮半夏取六升去滓內諸藥煮取二升五合五歲兒服一升二歲服六合量大小多少加減服之立效

杏仁圓

治小兒咳逆上氣

杏仁三升熟搗如膏

右蜜一升爲三分以一分內杏仁搗令强更內一分搗之如膏又內一分搗熟止先食已含嚥之多少自在日三每服不得過半方寸匕則利

半夏圓

半夏二斤去皮河水洗六七度　白礬一斤爲末
丁香　甘草　草豆蔻　升麻　縮砂各四兩

右七味以好酒一斗與半夏拌和勻同浸春冬二七日夏秋七日密封口日足取出用冷水急洗風吹乾每服一粒嚼破用薑湯下或乾嗽候六十日乾方得服

八味生薑煎

治少小嗽

生薑七兩　乾薑四兩　桂心二兩　甘草
款冬花　紫菀各三兩　杏仁　蜜各一升

右合諸藥爲末微火上煎取如飴餹量其大小多少與兒含嚥之百日小兒如棗核許日四五服甚有驗

四物圓

治小兒嗽晝瘥夜甚初不得息不能復啼

款冬花　紫菀各一兩五錢　伏龍肝六銖
桂心半兩

右爲末蜜和如泥取如棗核大傅乳頭令兒飲之日三傅之漸漸令兒飲之

菖蒲圓

治小兒暴冷嗽及積風冷嗽兼氣逆喝

石菖蒲　烏頭　杏仁　白礬石　北細辛
猪牙皂各六銖　款冬花　乾生薑　桂心
赤蜀各十八銖　蜀椒五銖　吳茱萸六合

右十二味爲末蜜丸如梧子三歲兒飲服五丸加至十丸日三兒小以意減之兒大以意加之暴嗽數服便瘥

桂枝湯

治少小十日以上至五十日卒得聲欬吐乳嘔逆暴嗽晝夜不得息

桂枝半兩　甘草二兩五錢　紫菀十八銖
麥門冬一兩十八銖
右四味㕮咀以水二升煮取半升以綿著湯中捉綿滴兒口中晝夜四五過與之節乳哺
麻黃湯
治少小卒肩息上氣不得安此惡風入肺
麻黃四兩　甘草一兩　桂心五寸　半夏生薑各二兩　五味子半升
右六味㕮咀以水五升煮取二升百日兒服一合大小節度服之便愈
瀉白散 錢氏直訣下同
治肺經實熱咳嗽痰喘
桑根白皮炒瀉肺氣之有餘有餘者邪有餘也地骨皮各一兩　炙甘草五錢
右爲末每服一二錢入粳米百粒水煎
薛己曰按活人方云喘者肺氣有餘也氣盛當認作氣衰有餘當認作不足肺氣盛者乃肺中之火盛也有餘者肺中之邪有餘也故用前藥以瀉之若土虛不能生肺用補中益氣湯火來尅金用人參平肺散瞥水奪母之氣或陰火上炎用地黃丸若肺虛肝木乘侮先用阿膠散後用瀉青丸若因乳母肺經受證致兒爲患母服前散若因乳母感冒風寒肺經鬱熱致兒爲患用十味參蘇飲若因乳母膏粱醇酒積熱致兒爲患用加味清胃散
瀉黃散
治脾胃氣實大腸不利致令肺病
藿香　甘草各七錢五分　山梔仁炒一兩
石膏五錢　防風二兩
右蜜酒微炒爲末水煎服
地黃丸
治心火炎爍肺經致令肺病
熟地黃八錢杵膏　山茱萸肉　乾山藥各四錢
澤瀉　牡丹皮　白茯苓各三錢
右爲末用地黃膏量加米糊丸桐子大空心白湯化下其地黃用生者自製杵膏
阿膠散
治肺虛肺疳咳嗽痰吐稠粘口乾作渴幼科全書云此補肺之藥
明阿膠一兩麩炒能補氣不足　炙甘草一錢
馬兜鈴五錢主肺熱咳嗽清肺補肺　糯米一兩
杏仁七箇去皮尖下喘治氣　鼠粘子二錢五分
右爲末每服二錢
薛己曰按前證若因脾胃弱而肺氣虛者宜用補中益氣湯若肺金自虛者宜用四君子湯
百部丸
治肺寒壅嗽微喘
杏仁去皮尖四十箇微炒水煮三五沸　百部炒
麻黃去節各三錢
右研如泥用煉蜜丸皂子大每服一二丸薑湯化下
一方加松子仁五十箇蜜丸更加胡桃含化大妙
一方加甘草二錢
麻黃湯
治傷風發熱無汗咳嗽喘急
麻黃去節三錢水煮去沫漉出驅乾　肉桂二錢
炙甘草一錢　杏仁七箇去皮尖麩炒黃研膏
每服一錢水煎服以汗出爲度自汗者不宜服
薛己曰按前方乃發表出汗之劑審其寒邪在表宜用若邪既去宜補脾肺以實其表庶風邪不能再入往往表散之後熱嗽不退復行發表多變壞證
葶藶丸
治傷風咳嗽面赤身熱痰盛喘促
甜葶藶隔紙略炒　黑牽牛炒　杏仁炒黃研膏
漢防己各一兩
右爲末入杏膏蒸棗肉搗丸麻子大每服十丸薑湯下
薛己曰按前方行氣導濕之峻劑若脾肺虛熱而致諸證者當調補中氣爲主若果係前證宜用惺惺散參蘇飲清肺丸茯苓半夏湯選用之
惺惺散
治傷寒時氣風熱痰壅咳嗽
桔梗　細辛　人參　炙草　白茯苓　白朮炒
瓜蔞根各等分
右爲末每服二錢入薄荷五葉水煎
參蘇飲
治感冒風寒或腹脹少食泄瀉嘔吐或手足並冷喘促痰涎
人參　紫蘇　陳皮　前胡　半夏　茯苓
枳殼麩炒　桔梗炒　乾葛　甘草炒各五分
木香二分

右爲末每服一二錢薑棗水煎服
茯苓半夏湯
治胃氣虛弱痰涎惡心或飲食不化嘔吐發搐或睡臥不寧口流痰涎或乳母脾胃虛弱飲食不節以致兒患前證亦宜用此藥主之
白朮土炒　茯苓　半夏　神麴炒各一錢
大麥炒五錢　陳皮　天麻各三錢
右每服一二錢水煎
甘桔散
治咳吐熱涎咽喉不利小兒肺熱手掐眉目鼻面
甘草炒二兩　桔梗一兩米泔浸焙
右爲末每服二錢入炮阿膠半片水煎服
薛己曰按前證若風熱蘊於肺而咳膿血用桔梗湯若心熱於肺而吐痰涎用人參平肺散
桔梗湯
治咳嗽吐膿痰中有血已成肺癰證
桔梗炒　貝母　當歸酒浸　薏苡仁　瓜蔞仁
枳殼麩炒　桑白皮炒　百合蒸各一錢五分
五味子炒　甜葶藶炒　地骨皮　知母炒
甘草節　防己　黃芪炒　杏仁各五分
右每服一二錢水煎
人參平肺散
治心火尅肺咳嗽喘嘔痰涎壅盛胃膈痞滿
人參　廣橘紅　炙甘草　地骨皮各五分
茯苓　知母炒各七分　五味子炒　青皮
天門冬各四分　桑白皮炒一錢
右每服一二錢水煎

涼膈丸（聖惠方）
治小兒熱嗽
甘草二兩猪膽浸五宿炙研末
右蜜丸菜豆大食後薄荷湯下十九
奪命散（痘門準繩）
治小兒胃膈喘滿
黑犀牛　白犀牛皆當各半生熟用之　檳榔
大黃各等分
右爲細末蜜水調服之
麻黃定喘湯（東垣）
治小兒寒鬱而喘喉鳴腹內鳴堅滿鼻流清涕脈沉急而數
麻黃　草豆蔻各一錢　益智仁一分半　厚朴
吳茱萸各二分　甘草　柴胡　生黃芩各一分
歸尾　蘇木　升麻　神麴各半分　紅花少許
全蠍一枚
右分二服水一大盞煎七分稍熱服食遠忌風寒微汗效
五聖丹（幼科全書下同）
南星煨　陳皮鹽水炒各一兩　半夏炮二兩
杏仁另研四十九粒　甘草五錢
先以南星半夏二味另研同薑汁皂角汁拌勻合作麵取出再用甘草陳皮研爲細末別取竹瀝一椀將前末捏成餅子焙乾又浸又焙瀝盡爲度再研入杏泥蒸蜜和丸臨臥嚼一丸薄荷湯嚥下
蘇沉九寶湯
此發散之輕藥也

桑白皮去赤　甘草　大腹皮　官桂　薄荷葉
蘇葉　麻黃不去根節　陳皮　杏仁不去皮尖
右加烏梅薑一片煎服微汗
五虎湯
此發散之重藥也
麻黃七分　杏仁一錢　甘草四分　細茶八分
白石膏錢半
右水煎服取汗禁風
茅根湯
陳皮去白　半夏製　茯苓　甘草　天冬
片芩　梔仁　貝母　知母　石膏　生大黃
桔梗　杏仁泥　瓜蔞霜
右水一盞以茅根搗取自然汁和之煎服
甘桔湯
桔梗　甘草　杏仁泥
右水煎服同竹瀝半鍾和之細細嚥下
久嗽方（醫貫）
治小兒食積嗽
陳皮　枳殼各四分　半夏麴　甘草　桔梗
黃連薑炒各三分　茯苓　地骨皮　麥冬
山楂肉各八分　黃芩　瓜蔞實各六分　知母
白皮　葛粉各五分
水薑煎服
天麻散（嬰童百問下同）
治嬰兒百脈內咳嗽有痰氣壅面紅
南星春秋浸五日冬七夏三半兩　天麻三錢
硃砂一錢　麝香一字

右爲末每服一字用杏仁湯調下人參湯亦可

琥珀散

治小兒急慢驚風涎潮昏冒目瞪搐搦驚弔肚疼及和順痘瘡小可驚哭眠臥不安

辰砂一錢半　琥珀　牛黃　殭蠶炒去絲嘴　全蠍去毒　白附子　乳香另研　蟬蛻去土　代赭石煅酢淬七次　牛膽南星各一錢　麝香　冰片各一字

右爲細末每服一錢薄荷湯下

證治準繩有天麻慢驚加附子

天麻丸

治小兒未滿百晬咳嗽不止名曰乳嗽

川芎一兩半　生甘草二兩　硼砂半兩　天麻　蟬蛻　殭蠶　人參　辰砂　天竺黃　雄黃　白附子　坯各一兩　金箔五片

右爲末煉蜜丸如芡實大金箔爲衣每服一丸薄荷湯下

證治準繩加牛膽南星

葛根芩連湯

治太陽病反下之利遂不止脈促者喘而汗出

葛根二兩　黃芩　黃連各七錢半　生甘草半兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分去滓加減服

喘甚加葶藶子

梅花飲子

治嬰孩驚熱潮熱虛熱積熱五臟蘊熱上焦壅熱手足心熱喉中多痰面色或紅或白變蒸嗞呀鼻流清涕氣急肝肺壅熱目赤咳嗽或被人物所驚夜啼睡臥不安心中驚怖情緒不快或傷寒漸安尚有餘熱未除亦宜進此三兩服常服鎮心壓驚化痰退熱安神可除未來之患

硼砂　馬牙硝　硭硝俱另研　甘草炙各半兩　人參一兩　辰砂二錢半　片腦　麝香各一字

右八味爲末以磁器收之遇有此證服一匙麥門冬湯調下

氣喘咳嗽桑白皮湯調下常服薄荷湯下

吳子玉方

治證同前

白色信石一字并下豆粉研泡過用　生南星　枯礬各一錢　鵝管石　硼砂各半錢　菉豆粉　雄黃各一錢半

右爲末糊丸如蘿蔔子大臨臥用冷茶淸吞下五丸

半夏丸

治肺氣不調咳嗽喘滿痰涎壅塞心下堅滿短氣煩悶風壅痰實頭目昏眩咽膈不利嘔吐惡心神思昏憒心忪面熱涕唾稠粘並皆治之

枯礬二兩五錢　半夏三兩湯洗去滑薑汁浸一宿

右爲細末生薑自然汁爲丸梧桐子大每服十丸或二十丸食後臥時生薑湯下小兒丸如麻子大

保壽散

白茯苓　人參　川雄　牙硝　甘草炙各一兩　片腦四字　麝香一字　牛黃少許無亦得

右八味細研入錫合內收之湯使如金粉散

小歸命散

治小兒變蒸傷寒潮熱驚熱嗞呀鼻流清涕咳嗽渾身溫壯咽喉有涎兼前項傷寒等證及退驚熱墜涎安神百病不生

白茯苓　人參　白朮各半兩　甘草三錢　辰砂二錢　片腦　麝香各少許

右七味爲末每服半錢薄荷湯調下

解肌散

治嬰孩傷寒傷風面部紅赤嗞呀渾身壯熱有前項等形證兼服人參散後得熱退可觀患勢輕重若患稍輕脉候不洪數面不大赤不加煩躁然須呻吟讝語此爲輕可之候但只進此

人參　釣藤　桔梗　甘草　川芎各三錢　葶藶一錢炒　白茯苓二錢　杏仁四十九箇　石膏煅　麻黃去節各四兩

右剉散每服二錢棗一枚水一盞煎半盞服如初中傷寒先下此藥是須要仔細辨認形證若是痲痘瘡疹便不得下此藥蓋痲痘之證則面青白耳珠脚膝尻骨俱冷如冰身體溫壯亦狂躁讝語夢中驚笑乃是此候也若小兒傷寒等服此解肌散漸得熱退次第可服大歸命散保壽散輕粉白朮散等調理

白玉丸

利膈下痰涎去心胷噎塞不止并咳嗽多痰

南星　半夏　殭蠶　白礬生熟各二錢半

右爲末杏仁七箇去皮尖巴豆一粒同研勻再用去皮生薑汁爲丸如粟米大每服一二十丸薑湯

送下不拘時

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百四十三卷目錄

醫部彙考四百二十三

小兒嗽喘門二

方二六君子湯　大青膏　黃芩清肺散　導赤散　六君子湯　黃芩清肺散　導赤散　金黃散　人參白木散　四君子湯　大承氣湯　異功散　百合湯　蟾蚣湯　桔梗湯　補銀丸　清膈飲　滴脾飲　硃朱丸　白術子　圓參丸　硃滴散　加味理中湯　小柴胡湯　黃芩湯　半夏生薑湯　芍藥甘草湯　烏梅丸　升麻湯　赤石脂禹餘糧湯　白朮散　黃芩湯　五物湯　茯苓甘草湯　瀉青丸　茯苓厚朴湯　藿香飲　羌活散　青木香湯

藝術典第四百四十三卷

醫部彙考四百二十三

小兒嗽喘門二

方二

六君子湯　薛氏醫案下同

治脾胃氣虛不能相生致令肺病

人參　白朮　茯苓　甘草　陳皮　半夏各等分

右每服二錢薑棗水煎

大青膏

治肺盛復有風冷胃滿短氣氣急喘嗽上氣

天麻　青黛各一錢　白附蝎　烏蛇肉酒浸焙

蝍尾各五分　天竺黃　麝香各一字

右爲末蜜丸豆大每用半粒薄荷湯化下

黃芩清肺散

治肺熱而小便不通

黃芩一錢　梔子一箇打破

右水煎服

不利加鹽豉二十粒

導赤散

治小兒肺經邪熱

生地黃　木通　甘草各等分

右爲末每服一錢入淡竹葉水煎

金黃散　證治準繩下同

治肺經虛怯喘而少氣面赤飲水身熱痰涎盛渧

唾稠粘咽喉不利喘嗽面腫吐食

陳皮一兩　青皮　訶子肉　炙甘草各五錢

丁香二錢

右爲末每服二錢水煎

羌活膏

治肝乘肺微邪惡風眩冒昏憒

防風　川芎　人參　白附炮　赤茯苓各半兩

天麻一兩　白殭蠶湯浸炒黃　乾蠍炒去毒

白花蛇肉酒炙各一分　川附子炮去皮臍

麻黃去節各三錢　肉豆蔻　沉香　母丁香

藿香　木香　輕粉　眞珠末　牛黃各一錢半

麝香　辰砂　雄黃各一錢已上六味各另研

羌活半兩　龍腦半字另研

右爲細末煉蜜作劑旋丸如菜豆大每服三丸食

前服或薄荷湯或麥門冬湯化下實熱急驚勿服

性溫故也

人參白朮散

治脾乘肺虛邪體重吐痰泄瀉嗽

人參　白朮土炒　藿香葉　木香　甘草

白茯苓各一錢　乾葛二錢

右剉細加生薑一片水一盞煎七分去滓溫服無

鍼灸

時

四君子湯 [illegible]

治小兒肺氣虛弱

人參 白朮 茯苓 甘草各等分

右每服二錢水煎

大承氣湯 薛氏醫案

治小兒中焦實痞

大黃 硭硝各五錢 厚朴一兩 [illegible] 枳實麩炒

右水煎服

異功散 錢氏直訣

治脾不能生肺氣逆嗽而腹滿面腫不食

人參 白朮 茯苓 甘草炒 陳皮各等分

右爲末每服三錢薑棗水煎

百合湯 衛生總微

治肺經風寒痰壅不利

百合 紫菀洗焙 白朮 人參各一兩 白茯苓

青皮 甘草 麥門冬各半兩

右爲末每服一錢水八分淡竹葉三片薄荷二葉

煎至五分去滓溫服不拘時候

蟬殼湯 張渙方

治肺氣不利病

蟬殼 北五味子 人參各一兩 陳橘皮

甘草各半兩

右件搗羅爲細末每服半錢煎生薑湯調下

桔梗湯 證治準繩

治小兒咳嗽呀呷胷膈不利幷內有熱證面赤飲

水

桔梗 半夏泡 紫蘇葉 石膏 炙草各半兩

皂莢燒灰存性一分

右件搗羅爲細末每服一錢水一盞入生薑三片

煎五分放溫時時與兒服

褊銀丸 薛氏醫案

治咳嗽身熱唾粘及乳食不消腹脹喘粗

巴豆去油膜皮心細研霜半兩 水銀五錢

鉛二錢半同水銀炒結砂 墨火燒醋淬研八錢

麝香另研五分

右將巴豆末幷墨再研勻和入砂子麝香陳米粥

和丸如菉豆大一歲兒一丸二三歲二三丸五歲

以上五六丸煎薄荷湯放冷送下不得化破更量

虛實加減

清肺飲 證治準繩下同

治肺受風邪客熱嗽聲不斷氣促喘悶痰壅鼻塞

流涕失音

柴胡洗淨二兩 人參半兩 杏仁湯泡去皮尖

桔梗剉炒 赤芍藥 荊芥 枳殼麩炒微黃

桑白皮炒 北五味 麻黃去節湯泡濾過焙

半夏湯煑透濾過剉焙乾各一兩 旋覆花五錢

甘草一兩半

右剉每服二錢水一盞薑二片葱一根煎七分無

時溫服或入薄荷同煎

清肺散

治小兒嗽咯膿血

麻黃一錢五分 麥門冬 桔梗各二錢 知母

荊芥 天花粉各一錢 訶子 菖蒲各八分

右剉分爲二服入竹瀝薑汁水煎服

解肌丸 王氏手集方

治外搏風邪內挾痰飲寒熱往來煩渴頰赤心忪

減食熱在上焦咳嗽有血

防風 地骨皮各一分

右件燒沙糖爲丸每服一丸食後煎紫蘇湯下

團參丸

治嗽血

阿膠 皂子黃 人參各半兩

右除膠爲細末湯少許洋膠和雞豆大白湯化下

雞清散 朱氏方

治咳嗽出血下涎

鬱金半兩用皂莢水一盞或酸菜汁煑乾爲度

生滑石半兩 雄黃半兩醋煑半乾用

右爲細末每服一字常服薄荷湯調下

止嗽螺粉水下

嗽血雞子清調下

加味惺惺散 證治準繩下同

主傷風傷寒痰嗽咳逆理虛和氣寧心清肌止啼

去煩利咽解失音

人參半兩 桔梗剉炒 白茯苓 白朮炒

天花粉各一兩 細辛二錢 防風 川芎

南星生用各二錢半 甘草半生半炙七錢

右件㕮咀每服二錢水一盞薑二片薄荷三葉慢

火煎七分無時溫服

百祥丸

治小兒嗽吐青綠水

紅牙大戟不以多少陰乾漿水煑軟去骨日中曝乾
復納汁煑汁盡焙乾爲末
右水丸如黍米大每服一二十丸研芝麻湯下吐
利同無時
白餅子
治小兒嗽吐痰涎乳食
滑石　輕粉　半夏湯洗焙　南星各一錢爲末
巴豆二十四粒去皮膜水一升煑水盡爲度
右研勻巴豆後入衆藥以糯米飯爲丸小菉豆大
捏作餅子兒三歲已上三五餅四歲以下一二餅
葱白湯下臨臥服
小柴胡湯薛氏醫案下同
治肝火侮肺嗽時兩脅痛甚或氣粗發熱喘嗽痰
鳴
人參二錢　甘草微炙二錢　麥門冬去心二錢
龍膽草酒炒黑　防風各一錢　柴胡五分
右每服一錢水煎
黃芩半夏生薑湯
治膽腑咳嘔苦水若膽汁
黃芩　生薑各一錢　甘草炙　芍藥各六分
大棗二箇　半夏一錢五分
右水煎服
芍藥甘草湯
治小腸腑咳咳而失氣
芍藥　甘草炙各一錢
右水煎服
烏梅丸

治胃腑咳咳而嘔嘔甚則長蟲出
烏梅三十箇　細辛　附子製　桂枝　人參
黃蘗各六錢　乾薑　黃連各一兩　當歸
蜀椒各四兩
右爲末用酒浸烏梅一宿去核蒸之與米飯搗和
丸如桐子大每服十丸白湯下
升麻湯
治脾臟咳咳而右脅下痛痛引肩背甚則不可以
動動則咳涎
甘草　白芍藥　升麻　乾葛各等分
右爲末每服一錢水煎服
赤石脂禹餘糧湯
治大腸咳咳而遺尿
赤石脂　禹餘糧各二兩並打碎
右每服二錢水煎
麻黃附子細辛湯
治腎臟咳咳則腰背相引而痛甚則咳涎又治寒
邪犯齒致腦齒痛宜急用之緩則不救
麻黃　細辛各二錢　附子一錢
右每服一錢水煎服
茯苓甘草湯
治膀胱咳咳而遺溺
茯苓二錢　桂枝二錢半　生薑五大片
右每服二錢水煎
瀉青丸通治準繩同下
治面赤飲水身熱痰涎盛涕唾稠粘咽喉不利喘
嗽面腫吐食

當歸　川芎　龍膽草各一錢　大黃五分
羌活　山梔仁各等分
右爲末煉蜜丸芡實大每服一丸沙糖湯下
一方加甘草芍藥
白朮散
治小兒咳嗽內亡津液
白朮一兩微炒　當歸　地榆微炒　木香
赤芍藥　炙甘草各半兩
右件藥搗粗羅爲散每服一錢以水一小盞煎至
五分去滓不計時候量兒大小分減
五拗湯
治小兒面赤臀紅氣粗發熱嗽來痰鳴
麻黃不去根節　杏仁不去皮尖　荊芥不去梗
桔梗蜜水拌炒各五錢　甘草二錢半
右每服二錢水一盞煎七分無時溫服
羌活散
治同上
人參去蘆　羌活　赤茯苓去皮　柴胡去蘆
前胡去蘆　川芎　獨活　桔梗剉炒　枳殼
蒼朮各如前製　甘草各一兩
右剉每服二錢水一盞薑二片薄荷三葉煎七分
無時溫服發散風邪入葱白同煎
青木香湯
治同上
青木香　枳殼浸去穰麩炒各半兩　甘草二錢半
右每服二錢水一盞煎七分不拘時溫服
茯苓厚朴湯

治小兒面唇慘白嗽過額上多汗嗆氣長出氣乳食減少作吐

白茯苓　半夏湯煮剉焙各七錢半　炙草三錢

厚朴五錢去粗皮剉碎每斤用生薑一斤切薄片杵爛拌勻浸一宿慢火炒乾用

右件咬咀每服二錢水一盞半薑三片煎七分無時服或加棗一枚去核同煎

藿香飲

治同上

人參　半夏如前製　赤茯苓　炙甘草各一兩

蒼术米泔水浸一宿濾剉片炒至微黃色二兩

陳皮　藿香各七錢半　厚朴製一兩半

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分空心溫服或入姜鹽同煎

理中湯

治同上

人參　白术各一兩　乾薑炮　炙甘草各二錢半

右件剉焙爲末每服半錢或一錢用溫白湯空心調服或加杏仁北五味子同煎

醒脾散

治脾虛作嗽

白术陳壁土炒　人參　甘草　橘紅　白茯苓

全蠍各半兩　半夏　木香各一分　白附四個

南星兩枚以上二味各炮　陳倉米二百粒

右爲末每服一錢水半盞薑二片棗半個煎二分漸漸服之

一方無白术半夏加薤肉一錢亦可

白附飲

治小兒風痰壅甚肝木尅制脾土咳嗽過甚頓作嘔吐乳食與痰俱出方得少定

白附子　生南星　生半夏　生川烏去皮臍

明天麻　陳皮　南木香　全蠍去尾尖毒

殭蠶去絲　丁香各二錢

右件剉每服二錢水一盞半薑三片慢火煎七分作五次空心溫服

三拗湯

治感冒風邪鼻塞聲重語音不出或傷風冷頭疼目眩四肢拘緊咳嗽多痰胃滿氣短

麻黃不去節　杏仁不去皮尖　甘草生用

右各等分剉散每服三錢水一盞生薑三片煎至六分去滓溫服取汗爲度

一方加荊芥桔梗

嗽甚加五味子細辛各減半

又方麻黃去節杏仁去皮尖甘草炙各三和湯治咳嗽尤妙

加減在乎活法有熱加前胡

傷風加荊芥

有痰加半夏

加減三拗湯

麻黃去根節三錢水煮去沫焙乾　桂枝二錢

杏仁七個去皮尖炒黃另研如膏　炙甘草一錢

右爲粗末入杏膏拌勻每服一錢水六分煎至四分去滓溫服無時以汗出爲度量大小加減若自汗者不宜服之

金沸草散

治傷風化痰頭目昏痛頸項强急往來寒熱胠體煩疼胃膈滿痰涎不利咳嗽喘滿涕唾稠粘及治時行寒疫壯熱惡風

荊芥四兩　前胡　麻黃去節　旋覆花各三兩

炙甘草　半夏湯洗七次薑汁浸　赤芍各一兩

右剉散每服二錢水一盞生薑三片棗一枚同煎六分去滓不拘時有寒邪則汗出

嗽甚加杏仁五味子

麥煎散（薛氏醫案下同）

治小兒夾驚傷寒吐逆壯熱表裏不解氣粗喘急面赤自汗或狂語驚叫或不語無汗及癮疹遍身赤癢往來潮熱時行痲痘疹子餘毒未盡渾身浮腫痰涎咳嗽或變慢驚風手足搐搦眼目上視及傷風頭疼並治之

滑石　地骨皮　赤芍　石膏　白茯苓　杏仁

葶藶子炒　人參各半兩　麻黃去節一兩半

右爲末每服一錢麥子煎湯調下如初生牙兒感冒風冷鼻塞身熱噴嚏多啼每一字用麥子煎湯調下

一方去地骨皮滑石加羌活川芎薄荷煎湯調下

小青龍湯

治傷寒表不解惡寒體熱水停心下乾嘔發熱而嗽或渴或利小便不利或噎小腹滿喘

麻黃　赤芍　半夏炮　細辛　乾薑炮　肉桂

甘草各七錢半　五味子半兩

右剉散每服二錢水一盞煎七分去滓加減服

微和者去麻黃加薤花如彈子大炒令赤色
若噎者去麻黃加附子半錢炮
若小便不利者加茯苓一兩
若喘者加杏仁去皮尖
若渴者去半夏加苦葉根
人參荊芥散（澤古方）
治身熱痰嗽胷膈不利宜下痰去熱
人參半兩　荊芥穗一兩　大黃二錢
右爲細末水煎調檳榔末香細末五分輕粉一字
乳後服
如身熱潮熱宜服清凉飲子去大黃三服之後一
二日却入大黃服之令疏利則愈不可便動臟腑
解表散（證治準繩下同）
主傷風感冷咳嗽痰喘嘔吐瀉利驚悸有熱證在
表裏並宜可投
麻黃製　杏仁湯炮去皮尖　赤茯苓各一兩
川芎　防風　枳殼去穰麩炒微黃各一兩半
甘草半生半炙七錢五分
右剉每二錢水一盞薑二片葱白一莖煎七分溫
服無時
有熱入薄荷同煎
和解湯
治小兒感冒寒邪壯熱煩躁鼻塞多涕驚悸自汗
肢體疼痛及瘡疹已發未發皆可服
羌活　防風　人參　川芎各一兩　乾葛
升麻　甘草　芍藥各半兩
右剉散每服三錢薑棗煎服
一方加荊芥
無汗加麻黃
咳嗽者加杏仁五味子桔梗
天門冬散（聖惠方）
治小兒心胷煩悶體熱咳嗽
天門冬去心焙　桑根白皮剉　赤茯苓　柴胡
百合　紫菀洗去苗土　藍葉　炙甘草各半兩
右件搗羅爲散每服一錢以水一小盞入生薑少
許煎至五分去滓量兒大小以意分減溫服
百部散
治小兒欬嗽煩熱令乳母服
百部　貝母煨微黃　紫菀洗　葛根各一兩
石膏二兩
右件搗羅爲散每服三錢以水一小盞入竹葉二
七片煎至六分去滓每於食後服令兒飲乳甚佳
黃芩散（證治準繩下同）
治小兒嗽
黃芩不拘多少用童子小便浸三日取出剉碎焙乾
右爲細末每服一字或半錢白湯少許調下乳食
後服
柴胡石膏湯
治時行瘟疫壯熱惡風頭疼體疼鼻塞心胷煩滿
寒熱往來咳嗽涕唾稠粘
桑根白皮　黃芩各三錢半　升麻二錢半
石膏　前胡　赤芍　乾葛　柴胡各五錢
荊芥穗三錢
右爲末每服一二錢薑二片淡豉十粒水煎
養肺湯（張渙方）
紫菀洗去土焙乾　半夏湯洗七遍　款冬花
眞阿膠炙各一兩　人參　桂心各半兩
右件搗羅爲細末每服一錢水一小盞入生薑二
片糯米五粒煎至五分去滓放溫時時服
舊蒲煎（證治準繩下同）
治肺中風邪喘鳴肩息
石菖蒲一寸九節者　款冬花　紫菀洗焙乾
人參　桂心各一兩
右件搗羅爲細末煉蜜同石臼中搗一二百下和
如皂子大每服一粒煎糯米飲化下
木香半夏丹
治胃寒咳嗽
木香　半夏湯洗七次焙乾　肉荳蔻各一兩
藿香葉　丁香　白朮各半兩
右件搗羅爲細末取生薑自然汁和如黍米大每
服十粒煎人參湯下量兒大小加減
順肺湯
治心肺不利咳嗽
紫蘇葉　半夏湯洗七遍焙各一兩　五味子
款冬花　陳橘皮湯浸　桂心　木香各半兩
右件搗羅爲細末每服一錢水八分入生薑人參
各少許煎四分去滓溫服
陳橘皮散（聖惠方）
治小兒咳嗽胷中滿悶不欲乳食
陳橘皮湯浸去白焙乾　桔梗去蘆　雞蘇
杏仁湯浸去皮尖麩炒微黃　人參去蘆各一兩

貝母煨微黃半兩

右件搗羅爲柤散每服一錢以水一小盞入燈心十莖煎至五分去滓溫服日三四服量兒大小以意加減

麥門冬煎 證治準繩下同

治小兒咳嗽壯熱胃膈壅滯

麥門冬一兩 生薑半兩取汁 酥 蜜各二合

杏仁湯浸去皮尖雙仁二兩

右件藥先以水一大盞煎麥門冬及杏仁至四分入砂盆內研絞取汁却入銀器中次內生薑汁慢火熬成收於瓷器中每服以清粥飲調下半茶匙日三服夜一服量兒大小以意加減

茅先生奶豆膏

瓜蔞穰 蜜各半盞 人參 鉛白霜各半兩

陳槐花一分 瓜蔞子百二十粒

右將瓜蔞穰及蜜煉成膏入諸藥末同爲膏每服一大黃豆大用杏仁煎湯調服

注胷膏

治小兒諸般咳嗽

鬱金三大箇剉用薑汁浸一宿 直白殭蠶七條

鉛白霜半錢研 腦子一字

右件爲細末煉蜜爲膏用菜荳大注孩兒胷上二三歲桐子大十歲已上皂子大薄荷生薑湯化下

生犀散

治咳嗽解時氣痰逆喘滿心悶忡驚悸風熱

杏仁去皮尖炒 桔梗各二錢 茯苓 甘草

人參 半夏各一錢 五味子 前胡各一錢半

右剉散生薑薄荷煎服

有熱加羌活或加麻黃細辛

保肺湯

治肺胃受風熱痰盛咳嗽喘吐不止及治久嗽不愈

乾山藥 白茯苓 紫蘇葉 黃芩 防風

杏仁麩炒 五味子 桔梗 百部各六分

藿香 百合各五分 白殭蠶二錢去絲嘴炒

右水煎食後服

天麻防風丸

治驚風咳嗽身體壯熱多睡驚悸手足抽掣精神昏憒痰涎不利及風邪溫熱

天麻 防風 人參 辰砂 雄黃 麝香

甘草炙各一錢五分 全蠍炒 殭蠶炒各半兩

牛黃少許

右爲末煉蜜丸桐子大每服二三丸薄荷湯下

一方有牛膽南星無麝香

紫蘇子散

治小兒咳逆上氣因乳哺無度內挾風冷傷於肺氣或小兒啼氣未定與乳飲之與氣相逆氣不得下

紫蘇子 訶子肉 杏仁去皮尖炒 蘿蔔子炒

木香 人參各三兩 青皮 甘草各一兩半炒

右爲細末每服二錢水一盞生薑三片煎至五分去滓不拘時服量兒加減

紫苑散

治小兒咳嗽

紫苑六分 貝母二分 款冬花一分

右搗爲細散每服如豆大著乳頭上令兒和乳嚥之日三四乳母忌食大鹹醋物聖惠用清竹飲調下一字

馬兜鈴丹 張漢方

治小兒肺壅咳嗽大便不利

馬兜鈴 紫蘇子 人參各一兩 款冬花

木香各半兩並爲細末 杏仁七錢五分另細研

右件同拌勻煉蜜和如黍米大每服十粒煎生薑湯下量兒大小加減

人參半夏丹 證治準繩下同

消痰飲止嗽

人參 半夏湯洗七遍焙乾 白朮 川烏薑

天南星微炮各一兩

右件搗羅爲末取生薑汁打麪糊和如黍米大每服十粒煎生薑湯下月內百晬嬰兒如鼓頭大沾在乳頭上令兒吮之

貝母湯

治肺中風咳嗽喘滿

貝母炒黃色 半夏白礬湯洗七遍焙乾各一兩

乾薑 麻黃去根節 款冬花 甘草各半兩

右件搗羅爲細末每服一錢水一小盞入生薑三片杏仁二粒去皮尖同煎至五分去滓溫服

黃芪湯 潔古方

治小兒咳嗽喘逆身熱鼻乾燥者是熱入肺經爲客熱呷呀有聲

黃芪二兩 人參 甘草各二錢半 地骨皮五錢

桑白皮三錢
右咬咀水煎放溫頻服之
加味四君子湯（海藏方）
治涎嗽
人參　白朮土炒　白茯苓　甘草　杏仁
桑白皮各等分　半夏麴減半
右水煎服
又治咳嗽用四君子末煎紫蘇湯調下
細辛五味子湯（證治準繩下同）
治肺經不足胃氣怯弱或冒風邪或停寒有飲咳嗽倚息不得安臥胃滿短氣乾嘔作熱嗽吐結痰或吐涎沫頭目昏暈身體疼重語聲不出痛引胃脘不問新久並宜服之
細辛　半夏湯炮各一兩　鸚粟殼去蒂蓋炒
五味子各三兩　烏梅去核　炙甘草各一兩半
桑白皮炒六錢
右剉散每服二錢水一盞生薑五片煎至六分去滓溫服
白朮五味湯
治咳逆氣逆上喘
五味子　白朮　丁香　人參　款冬花各半兩
細辛去土一分
右搗羅爲細末每服一錢水八分入薑三片煎至四分去滓放溫令時時呷之
貝母湯
主百日內嬰孩咳嗽有痰
貝母一兩　甘草半炙半生二錢
右件剉焙爲末每服一字或半錢用陳米煎湯空心調服
痰盛淡薑湯調下
比金圓（壽域良方）
治百晬內嗽氣粗痰盛口瘡眼熱發散後用之
人參　白茯苓　遠志去心　山藥　辰砂
明天麻　石菖蒲　川芎　炙甘草各一分
天南星炮二錢生薑汁製　麝香一字
右爲細末煉蜜爲丸皂子大每服一粒煎薄荷湯下
抱龍丸（全幼心鑑）
治小兒風痰熱毒壅滯涼心壓驚
牛膽南星一兩入金箔十片　丹砂一錢半
龍腦　麝香各一字
右研末煉蜜丸芡子大每服一丸竹葉湯化下
四物湯（外臺小品）
治少小十日以上至五十日卒得暴嗽吐乳嘔逆晝夜不得息
桔梗　紫菀各三分　炙草一分　麥門冬七分
右藥以水一升煮取六合去滓分五服以瘥爲度
千金有桂心無桔梗以水二升煮取一升以綿著湯中捉綿滴兒口中晝夜四五過節哺乳
雄黃膏（張潢方）
治月裏兒咳嗽并三歲以下皆可服
半夏七個童子小便浸一宿切作片干焙乾爲末
雄黃一錢細研　杏仁七粒去皮尖
右一處研勻用生薑自然汁半兩蜜半兩一處入藥末於罐子內重湯中熬用柳枝子攪成膏每服以皂子大塗奶頭與兒吮或糯米飲調下
抱龍丸（痘疹總義）
治小兒百晬內脾胃內熱咳嗽
南星如無牛膽者只將生者剉炒熟用四兩
天竺黃一兩　雄黃水飛　辰砂另研各半兩
麝香另研一錢
右爲細末煮甘草膏和丸皂莢子大溫水化下百日小兒每丸分作三四服五歲兒一二丸
三黃丸（證治準繩下同）
治百晬內嗽口瘡眼熱大便堅實
黃連　黃芩　大黃煨各等分
右爲末煉蜜丸桐子大量大小加減服白滾湯下
金華散（痘疹總義）
治嬰小咳嗽
鬱金半兩　防風去蘆及梗枝　半夏各一分
巴豆二十一粒　皂角一錠
右以水一升於銀器內煮諸藥至水乾去巴豆皂角不用外三味別用溫湯洗淨焙乾爲細末每嬰孩一字二三歲半錢四五歲上者一錢薄荷蜜水調下不拘時候
杏仁煎（聖惠方下同）
治小兒嗽聲不出
杏仁湯浸去皮尖入水一盞研濾汁二兩　酥蜜各一合
右件藥先以杏仁汁於鐺中以重湯熬減去半入酥蜜又湯熬二十沸却入貝母紫菀末各一分甘

草末半分更煎攪如餳收瓷器中每服以清粥飲下半錢日三服夜一服嗽止爲度量兒大小加減

又方

貝母半兩煨　牛黃細研一錢　炙甘草一分

右件藥搗羅爲散每服以溫水調下半錢日三四服量兒大小加減

又方

麥門冬去心焙　杏仁去皮尖麩炒黃　甘草炙　貝母煨　款冬花各一分　紫菀去土半兩

右件藥搗細羅爲散每服以乳汁調下半錢日三四服量兒大小加減以意

又方

杏仁一兩去皮尖雙仁以水一中盞研絞取汁　紫菀末半兩

右以杏仁汁并紫菀末入蜜一合同煎如膏每服以清粥飲調下半茶匙量兒大小加減

陳橘皮散

治小兒咳嗽咽中作呀呷聲

陳橘皮湯浸去白焙　杏仁湯浸去皮尖麩炒黃　甘草炙微赤剉　甜葶藶隔紙炒令微紫色　桑根白皮剉各一分

右件藥搗粗羅爲散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓放溫量兒大小加減服

蘿蔔子散（證治準繩下同）

治小兒咳嗽喘悉作呀呷聲

蘿蔔子炒　麻黃去根節各一分　燈心一束　皂莢子十枚燥去皮　甘草炙微赤剉半分

右件藥搗粗羅爲散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小以意加減溫服

蟬殼散

治小兒心胃痰壅咳嗽咽喉不利常作呀呷聲

蟬殼微炒　半夏湯洗七遍去滑　炙草剉　防己各一分　桔梗　陳橘皮湯浸去白焙各半兩

右件藥搗細羅爲散每服以生薑粥調下一字三歲已上加之半錢

知母湯

治鮈鮧氣喘痰鳴發熱咳嗽惡風

知母　甘草各半兩　貝母　羌活　滑石別研大黃　小麥各三錢　麻黃去根節湯泡去沫焙　苦葶藶　訶子肉各一錢半　薄荷去梗二錢

右件㕮咀每服二錢水一盞薑二片煎七分無時溫服

雄黃散

主暴中急慢驚風鮈鮧痰涎滿口及雨侵閉汗不通或凉或熱坐臥生煩

雄黃二錢五分　白芍藥　川烏炮裂去皮臍　草烏炮裂去皮　明天麻　川芎各半兩

右除雄黃外餘五味剉焙同雄黃爲末驚風痰壅每服半錢或一錢用薑汁茶清調下發汗水薑葱薄荷同煎併投三服取效

如意膏

治痰喘氣促咳嗽連聲不已冷熱二證皆可投

半夏炮製　南星炮製二味各一兩五錢

右二味爲末以生薑汁和勻捻作小餅如錢樣用慢火炙乾再爲末復取薑汁如前經兩次炙乾仍焙爲末煉蜜丸芡實大每服一丸至二丸仍用薑蜜湯無時化服

有熱以薄荷湯下

雄黃丹

治小兒鮈鮧喘滿咳嗽心胃煩悶傷熱鬰毒

雄黃　朱砂各一錢另研　杏仁十四粒炒　巴豆七粒　淡豆豉二十一粒

右杏巴豉三味用米醋半盞乾薑一片指大棄令乾研成膏皂角一寸蜜炙焦先去子與皮法製牛膽一分同雄朱與杏膏研細和勻豹和爲丸如麻子大每一歲兒五丸壯者七丸二歲十丸淡生薑湯下

貝母丸（王氏）

治小兒鮈鮧

貝母　天南星薑汁製　人參　茯苓　炙草　白附子各等分　皂角子七枚炮

右末之煉蜜丸小豆大每服五七丸薄荷湯吞下

油衰丸（證治準繩）

治小兒鮈鮧及蟲積

雷丸　五靈脂各一分　巴豆十五粒去油

右末之滴水丸每服三五丸麻油衰過井水吞下

五苓散（全幼心鑑）

治小兒鮈鮧去風化痰

澤瀉　猪苓　白茯苓　白朮　官桂各等分

右爲末每服一錢溫湯調不拘時服

寬氣飲（證治準繩下同）

治同上

枳殼水浸去穰麩炒微黃　枳實製同上各一兩

人參去蘆　甘草炙各半兩

右剉焙爲末每服半錢至一錢淨湯無時調服寬熱飲

治同上

大黃一兩　粉草七錢半　元明粉二錢半

枳殼去穰一兩剉片巴豆十五粒作二片去殼膜心同炒枳殼見微黃色去巴豆

右大黃粉草枳殼剉焙爲末臨入元明粉乳鉢內同前藥末杵勻無時調服半錢至一錢兒小者抄一字並用薑蜜湯或薄荷湯

半夏丸

治同上

半夏生用二兩　赤茯苓去皮　枳殼製各一兩

風化矸硝二錢半

右前三味剉焙爲末入乳鉢同矸硝杵勻用生薑自然汁煮糯米粉爲丸菉豆大每服三十丸至五十丸仍以淡薑湯臨睡送下兒小煮丸如粟穀大

潤肺散劉完素方

治小兒腸熱咳嗽痰喘久不得瘥

瓜蔞實一枚去子用穰

右爲末以寒食麪和爲餅子炙黃爲末每服一錢溫水化乳糖下日三服效乃止

內金丸證治準繩下同

治小兒齁鮎咳嗽

雞內金　雄黃細研水飛過去水露三日方使　生半夏　延胡索各等分

右爲末棗肉爲丸如小豆大周歲三丸至四丸燈心湯下

吉氏家傳治妳齁方

天竺黃　蚱粉炒

右件等分研勻蜜調塗妳頭上與吃

腦子散

治小兒傷風咳嗽不住兼治痰喘

大黃一分　鬱金二錢

右件二味先以猪牙皂角煮一復時取切片子焙乾爲末次入粉霜腦子各少許再同研令研勻每服一字沙糖水調下量兒肥瘦加減用之

九寶飲

治小兒嗽是肺臟感寒須表散却服嗽藥

麻黃去節　薄荷　大腹皮　紫蘇各半兩

陳皮　杏仁去皮尖研　桑白皮炙　肉桂

枳殼各二錢半　甘草一錢半

右剉散每服二錢生薑烏梅煎服

冷盞去薄荷

熱證去陳皮肉桂

華蓋散

治肺感寒邪咳嗽上氣胃膈煩悶項背拘急聲重鼻塞頭目昏眩痰氣不利

麻黃去節　紫蘇子隔紙炒　桑白皮蜜炙

杏仁去皮尖炒　赤茯苓　陳橘皮去白各半兩

甘草炙二錢

右剉散每服二錢水半盞煎至三分去滓量大小加減食後溫服

瓜蔞散聖惠方

治小兒久嗽不止心神煩悶

瓜蔞一顆熟者去仁以童便一升相和研絞取汁

酥一兩　生甘草一分爲末　蜜二兩

右件藥以銀鍋子中慢火煎如稀餳每服以清粥飲調下半錢日四五服量兒大小加減

不灰木散證治準繩下同

治小兒嗽久不止

不灰木用牛糞火燒通赤　貝母煨令微黃

甘草炙微赤巴上各半兩

右件藥搗粗羅爲散每服一錢以新汲水一小盞點生油一二滴打令煎至五分去滓分溫二服日四服量兒大小加減

桑白皮煎

治小兒嗽經時不瘥及傷肺見血

桑根白皮東引者切五片　白狗肺一具切

甘草　茯苓　升麻　貝母各錢二分　芍藥

杏仁炒各十分　李根白皮切四分　款冬花

麥門冬各六分　黃芩十一分　淡竹青皮八分

蜜　地黃汁各一升

右以水一斗煮及三升去滓下杏膏地黃汁蜜微火上煎不住攪至二升三合綿濾絞汁二三歲兒一合溫服之日進三服夜三合

知母散

治小兒久嗽不止吐痰喘悶氣噎

知母　川貝母　柴胡　黃芪炙　紫菀洗

馬兜鈴　杏仁研去皮尖　半夏白礬水煑乾
桑白皮炙　白礬研　款冬花各等分
右爲細末每服一錢水七分盞同煎二分去滓時
時服或生薑自然汁煑糊爲丸每服五七丸生薑
湯下

貝母散

治小兒久咳嗽氣急
貝母煨　杏仁去皮炒　麥冬　款冬花各一分
紫苑半兩
右爲末用乳汁調下半錢

金杏丸

治小兒驚風後咳嗽
杏仁去皮尖　甜葶藶　漢防己　馬兜鈴去皮
右等分爲末用蜜爲丸小豆大每服十丸用麥門
冬熟水吞下茅先生亦於前咳嗽門中已有此方
謂各有牽引不可除故兼存之

勻氣散

治同上
桔梗去蘆頭淨洗乾五兩　甘草二兩　縮砂仁
藿香洗　陳橘皮各一兩　白薑一分
右爲末每服半錢一錢用霜木瓜煎湯調下如無
即用紫蘇鹽煎湯下

藿香散 衞生總微下同

治不因風寒所得肺胃氣不和而咳嗽
藿香葉二十一個　枳殼一片去穰濕紙裹煨熟
蚌粉如枳殼大一塊
右爲細末嬰小服一字二三歲半錢蜜水調下不
過二三服安兒大以意加之無時

生薑煎

治小兒咳嗽
生薑一兩　乾薑六錢　桂心一分　炙草四錢
杏仁去皮尖炒黃一兩　款冬花　紫苑各四兩
右爲末以蜜一兩入藥在內微火上煎之如飴量
大小多少與含化嚥百日兒如棗核大日三次甚
效

款冬花丸

治小兒咳嗽日差夜甚初不得息不能睡者
款冬花　紫苑各兩半　桂心半兩　伏龍肝三分
右同爲細末煉蜜和如泥每取棗核大傅乳上令
兒吮之漸漸與兒飲一日三次

五味子湯

治小兒風冷入肺咳嗽氣逆面青喘急迫晝夜不
息飲食不下
五味子去枝梗　當歸去蘆各半兩　麻黃去節
乾薑炮　桂心　人參　紫苑　甘草各一分
細辛去苗半分　大棗三枚
右爲麄末每服二錢水一盞煎至半盞去滓溫服
量兒大小

人參半夏湯

治小兒痰逆咳嗽不止
人參　半夏麴　白芷各半兩　藿香葉一分
丁香　杏仁霜各半分
右爲細末每服二錢水一鍾生薑五片陳粟米五
十粒煎至七分去滓時時呷服日三四忌酢鹹炙
煿生冷

款肺散

治小兒風壅痰盛咳嗽氣急壯熱煩赤昏憒嘔吐
面目浮腫飲食減少
白殭蠶五兩淨洗去絲頭足焙乾　元胡索三兩
右爲末每服一字或半錢淡薑汁溫調服之無時
嬰孩只乳汁調半字

皂莢豉湯

治小兒咳嗽
皂莢燒灰
右研細末每服半錢或一錢豉湯調下無時服

五靈脂丸

治久嗽漸成羸弱恐變疳勞
蟾頭一枚酥炙黃　五靈脂去沙土　蟬殼微炒
款冬花各半兩　青黛研　雄黃各一分研水飛
右同研勻細糯米飯和丸黍米大每服十丸煎人
參湯下食後

人參犀角散

治時氣寒壅咳嗽痰逆喘滿驚悸風熱
前胡八錢　人參　炙草各三錢　桔梗
杏仁浸去皮尖曬乾爲末各五錢
右將上四味爲末入杏仁末拌勻粗羅篩過每服
二錢水一盞煎至七分去柤溫服食後

辰砂半夏丸

治寒痰咳嗽
瓜蔞根蜜炙　天南星湯洗　半夏湯洗七次
乾薑炮各半兩

右爲末生薑自然汁和丸麻子大硃砂爲衣每服十九生薑湯下不拘時候

玉珠丸

治諸遊嗽

半夏一兩湯洗七次　硝石一分

右爲細末滴水丸麻子大每服三五丸生薑湯送下不拘時候

露蜂房丸

治肺胃虛寒咳嗽喘滿嘔逆不食

蛤蚧一隻重四錢　露蜂房炒　蟬殼去土炒　木香　丁香　人參　地黃　麻黃去根節　馬兜鈴子　五倍子去蟲各二錢　北五味子　貝母去心焙　杏仁童子小便浸二宿去皮尖炒半夏麴各二錢半　款冬花去枝梗半兩

右爲細末煉蜜和丸菜豆大每服二三十丸生薑湯下日三四服食後

杏仁膏

治小兒咳嗽聲不出

杏仁一兩湯浸去皮尖及雙仁以水一鍾搗取汁紫菀半兩洗去土爲末

右將紫菀末入杏仁汁中更入蜜一合同煎成膏每服半茶匙清粥飲調下無時服

一捻金散

治風痰咳嗽頰赤痰盛喘促氣急吐嘔浮腫乳食減少

直白殭蠶去絲嘴一兩　炙草半兩　元胡索一分

右爲細末每服一捻薑汁調下嬰兒只乳汁調下半字食後

緩息湯

治風傷肺氣虛喘咳嗽上氣

桑白皮一兩半　白茯苓　殭蠶去絲炒　白术　杏仁去皮尖研後入　桔梗去蘆　陳皮各半兩　甘草　人參去蘆各一分

右爲細末每服一錢水一盞生薑三片杏仁二箇煎至六分去滓時時溫服

本事方

總治十六般哮嗽

阿膠剉炒　馬兜鈴　炙草　半夏薑汁浸三日　杏仁去皮尖各一兩　人參半兩

右剉散每服二錢水一盞隨病湯使煎至七分臨臥食後服湯使備後

心嗽面赤或汗流加乾葛

肝嗽眼中淚出入烏梅一箇糯米十四粒

哮嗽聲如拽鋸入半夏二箇

脾嗽不思飲食或惡心入生薑二片

胃嗽吐逆吐酸水入蚌粉

臚嗽令人不睡用藥半錢茶清調下

肺嗽上氣喘急入桑白皮

腸嗽出痰如圓塊生薑自然汁調下

勞嗽入秦艽末

冷嗽天晚嗽甚入葱白三寸

血嗽連頻不住入當歸末棗子

暴嗽涕唾稠粘入烏梅生薑

產嗽背甲痛入甘草三寸黃蠟少許

氣嗽腹疼脹滿入青皮

腎嗽時復二兩聲入黃芪白飴糖

以上十六般嗽疾依法煎服無不效驗

歸脾湯薛氏醫案下同

治小兒鬱結氣滯作喘

人參　黃芪　茯神　甘草　白术炒　遠志　酸棗仁　龍眼肉　當歸各一錢　木香五分

右加柴胡山梔煎服

養胃湯

治小兒食鬱痺滯作喘

人參　厚朴　蒼术　半夏炮　藿香　草果仁　茯苓各五錢　炙草　橘紅二錢半

右每服二三錢加木香少許水煎

五淋散

治肺中伏熱水不能生而喘者

赤茯苓　赤芍各五分　山梔炒　當歸各三分　甘草二分

右用燈心十根水煎

黃芩清肺飲

治證同上

黃芩一錢　梔子一箇打破

右水煎服

不利加鹽豉二十粒

滋腎丸

治小兒脾肺積熱作喘

黃檗酒拌炒焦三錢　知母二錢　肉桂五分

右爲末熟水丸桐子大每服二十丸至三十丸食

前百沸湯下
四順清凉飲
治小兒結熱上氣作喘
赤芍藥　當歸　甘草　大黃各等分
右每服一錢水煎作兩服
八味地黃丸
治脾胃虛寒膨脹腹脹作喘
熟地黃八錢　山茱萸肉　乾山藥各四錢
五味　肉桂　澤瀉　牡丹皮　白茯苓各三錢
右爲末入地黃膏量加米糊丸桐子大每服數丸
溫水空心化下
加減腎氣丸（金匱方）
治脾腎虛寒不能攝水如蠱脹作喘
熟地黃八兩　乾山藥　山茱萸各四兩　澤瀉
白茯苓　牡丹皮各三兩　肉桂　附子炮
車前子炒　牛膝酒微炒各一兩
右各另爲末米糊丸小豆大每服三四十丸空心
食前白湯下
馬通粟粒丸（衛生總微下同）
治小兒喘急肩息氣逆脊下作痛寒熱往來不進
乳食漸成羸瘦
馬通中粟粒三分　杏仁湯浸去皮尖　紫苑
細辛各半兩　石膏　秦艽　半夏湯泡七次
茯苓　五味子各一分
右爲末煉蜜丸小豆大每服十九薑湯下日三服
加至二十丸不拘時候
絳朱丹
治痰涎喘滿
南星炮　半夏湯洗去滑　滑石煅各二兩
枯白礬兩半　鉛白霜一分
右爲細末麵糊和丸麻子大硃砂爲衣每服十粒
薑湯送下食後臨臥服
碧玉丸（證治準繩下同）
治痰嗽氣喘胃滿飲食減少睡不得寧煩躁有熱
青黛　生礬　生南星　滑石各二錢五分
巴豆四十九粒去殼膜心存油碎入乳鉢細研
輕粉十五貼　全蠍十五尾去毒
右除輕粉巴豆外餘五味或曬或焙爲末仍前二
味同在乳鉢杵勻薑汁羹糯米粉爲糊丸粟大每
服七丸至九丸或十一丸用淡薑湯空心投
熱甚者薄荷湯下不拘時
坎離湯
治虛喘晝輕夜重食減神昏
蓽澄茄　石菖蒲各一錢　白朮　白茯苓
南木香各二錢　炙草　半夏湯煮透剉焙
紫蘇子略炒杵碎各四錢
右剉每二錢水一盞煎七分溫服無時
杏仁煎（聖惠方）
治小兒咳嗽心煩喘粗
杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃　天門冬去心
寒食麵各一兩　蜜　酥各一合　貝母半兩炒
生地黃汁一大盞
右件煎貝母及天門冬至五分便研絞取汁入杏
仁膏等同熬如稀餳每服用溫水調下半錢量兒
大小以意加減
八味理中丸（證治準繩）
治小兒心肺不和息數脈急上下不升降中膈痞
滿霧溢胃膿坐臥煩悶神情不樂飲食不下
人參　炙甘草　白朮　乾薑　枳實製炒
白茯苓　五味子　桑白皮
右件等分爲細末煉蜜爲丸小指頭大每服一丸
淡豆豉五粒水一小盞煎至半去豉通口服不拘
時候
平氣散（聚寶方）
治小兒氣不和定喘和氣補虛思食
人參　白茯苓　百合　炙甘草　白朮土炒
桔梗各等分
右六味爲末每服一錢水八分生薑少許同煎至
五分溫服
補中益氣湯（薛氏醫案）
治同上
當歸一錢　人參　黃芪各八分　白朮　甘草
陳皮各五分　升麻　柴胡各二分
右件藥㕮咀量病斟酌水盞大小去渣食遠稍熱
服
生白丸（證治準繩下同）
治小兒痰涎不利上喘咳嗽
白附子新羅者　天南星各半兩　半夏一兩
右爲末用生薑汁打麪糊爲丸如菉豆大每服二
十丸至三十丸生薑湯下量兒大小加減
枳實湯

主傷風傷寒胃滿氣促咳嗽不活食多夾痰吐出
枳實去瓤剉片麩炒微黃　赤茯苓去皮各半兩
甘草六錢　半夏一錢湯煮透濾仍剉焙乾
桔梗七錢半剉炒
右件㕮咀每服二錢水一盞薑三片煎七分無時
服
清胃散醫學入門
治小兒過食膏粱厚味脾胃積熱作喘
升麻五分　生地黃　牡丹皮　川黃連炒
當歸各三分
右水煎服
大效雄朱化痰定喘丸薛氏醫案
治小兒因驚發喘逆觸心肺暴急張口虛煩神困
雄黃　硃砂各一錢研　蟬蛻　全蠍炒　地龍
白殭蠶　天南星　白附子炮各二錢五分
輕粉半錢
右爲末麪糊丸如麻子大每服三十丸薄荷茶清
送下食後服
天麻定喘飲證治準繩下同
治小兒喘嗽驚風
天麻　防風　羌活　甘草　人參　桔梗
白朮　川芎　半夏麴各等分
右剉散每服二錢水一盞麥門冬十四粒煎至七
分食後服
有熱去白朮加芍藥枳殼
紫蘇飲子
治肺受風寒喘熱痰嗽
紫蘇葉　桑白皮　青皮　五味　杏仁　麻黃
炙草　陳皮各二分　人參　半夏各三分
右薑三片水煎溫服
麻黃杏子甘草石膏湯
治傷寒發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大
熱下後喘亦治
麻黃二兩湯泡去黃汁焙杵　杏仁二十五箇
石膏四兩研　炙草一兩
右剉散每服二錢水一小盞煎六分去滓溫服
小青龍加石膏湯金匱要略
治小兒肺脹咳而上氣煩躁而喘脈浮者心下有
水
麻黃去節三兩千金四兩　石膏二兩　芍藥
桂枝　細辛各三兩千金各二兩　炙甘草
乾薑各三兩　半夏半升　五味半升千金一升
右九味㕮咀以水一斗先煮麻黃減一升去上沫
內諸藥煮取三升去滓强服一升羸者減之日三
服小兒服四合
瓜蔞方吉氏方
治小兒傷冷氣喘涎多
瓜蔞一大箇開一蓋子　阿膠一分　沙糖半兩
右件將二味投入瓜蔞內以蓋子依舊封著白紙
都糊入飯甑蒸兩遍傾出隨兒大小約多少冷服
眞珠散證治準繩下同
治小兒氣喘多涎
眞珠末　生犀角銼各半錢　香附子四錢
龍腦少許
右爲末每服半銅錢煎桃仁湯調下嬰兒一字一
歲以下者半錢
茅先生方
治小兒諸喘氣急
海螵硝　黑牽牛末　牡蠣　馬兜鈴去皮
右各稱二錢爲末拌勻每服抄一錢用鯽魚淡煮
湯調下
又
海螵硝　牡蠣煅
右等分爲末每服一錢用淡生薑湯調下
二聖散
治風痰壅閉語音不出氣促喘悶手足動搖似搐
非搐
訶子肉十大枚半生半炙　大腹皮洗焙五錢
右剉每服二錢水一盞煎七分無時溫服
五和湯
治小兒實熱作喘
當歸酒洗　赤茯苓各半兩　炙甘草　大黃
枳殼水浸潤去穰剉片麩炒微黃各七錢半
右件㕮咀每二錢水一盞煎七分無時溫服
定喘飲
治夾風痰喘氣促不拘冷熱二證
人參去蘆頭　麻黃不去根節　防己去黑皮
訶子去核　半夏湯洗去滑　甘草各五錢
右剉每服二錢水一盞薑二片煎七分無時溫服
奪命散東垣
治同上

青礞石　焰硝各一兩同入鍋內煅待硝盡候礞石如金色取用

右爲末用薄荷汁入蜜調服

單方

治小兒咳逆短氣胷中吸吸呵出涕唾嗽出臭膿燒淡竹瀝煮二十沸一服一合日五服不妨食息乳哺（千金方下同）

小兒咳嗽生薑四兩煎湯浴之

小兒寒嗽或作壅喘用松子仁五箇百部炒麻黃各三分杏仁四十箇去皮尖以少水略煮三五沸化白砂糖丸芡子大每食後含化十九大妙（錢乙直訣）

小兒咳嗽聲不出者紫菀末杏仁等分入蜜同研丸芡子大每服一丸五味湯化下（全幼心鑑下同）

小兒猝嗽百日內咳嗽痰壅貝母五錢甘草半生半炙二錢爲末沙糖丸芡子大每米飲化下一丸

小兒痰喘巴豆一粒杵爛綿裹塞鼻男左女右痰即自下（錢氏醫鑑）

小兒咳嗽蜂房二兩洗淨燒研每服一字米飲下（膠金方）

小兒風寒煩熱有痰不省人事荊芥穗半兩焙麝香片腦各一字爲末每茶服半錢大人亦治（普濟方）

小兒鮓喘活鼈七箇以器盛令兒自便尿養之待紅煨熟食甚效一女年十歲用此永不發也（集驗方）

小兒喘咳發熱自汗吐紅脈虛無力者人參天花粉等分每服半錢蜜水調下以瘥爲度（經濟方）

小兒喘嗽齁鮯用糯米泔少許磨茶子滴入鼻中令吸入口服之口咬竹筒少頃涎出如線不過二三次絕根屢驗（經驗良方）

小兒痰喘咳嗽膈熱久不瘥瓜蔞實一枚去子爲末以寒食麵和作餅子炙黃再研末每服一錢溫水化下日三服效乃止（劉河間宣明方）

小兒風痰膽礬末一字溫醋湯調下立吐出涎便醒（潭氏小兒方）

小兒涎喘服藥不退者用無雄雞子一箇取清入輕粉抄十錢拌和銀器盛置湯瓶上蒸熟三歲兒盡食當吐痰或泄而愈氣實者乃可用（演山活幼口議下同）

小兒吐痰或風壅所致或咳嗽發熱飲食即嘔半夏泡七次半兩丁香一錢以半夏末水和包丁香用麵重包煨熟去麵爲末生薑自然汁和丸麻子大每服二三十九陳皮湯下

治小兒咳嗽以皂莢燒灰研細末每服半錢或一錢豉湯調下無時（衛生總微下同）

治諸咳嗽墜化痰涎以葉子雌黃不拘多少研細入鍋子內微火中燒令成汁候冷取出再研細軟飲和丸蘿蔔子大熟水下九二箇臨睡

治小兒嗽用瓜蔞皮不拘多少用蜜塗慢火上炙焦赤色爲末每服一錢蜜調成膏時時抹兒口內（聖濟總錄下同）

小兒定喘化痰用豬蹄四十九箇淨洗控乾每箇指甲內半夏白礬各一字入罐子內封閉勿令烟出火煅通赤去火細研入麝香一錢上喘咳嗽用糯米飲下小兒半錢至妙

小兒痰齁多年海螵蛸末米飲服一錢（葉氏摘元方下同）

小兒鹽哮脂麻稭灰內燒存性出火毒研末以淡豆腐調食之

小兒哮病向南牆上年久螺螄爲末日晡時以水調成日落時舉手合掌皈依吞之即效

小兒痰熱咳嗽驚悸半夏南星等分爲末牛膽汁和入膽內懸風處待乾蒸餅丸菉豆大每薑湯下三五丸

治小兒未睜咳嗽用白殭蠶直者爲細末塗少許奶頭上令兒吃立效（趙氏方）

鍼灸

幼科全書曰小兒哮喘灸法取對心穴左背上足三里各灸三壯仍禁酸鹹辛熱之物

古今醫統曰小兒咳嗽不瘥灸肺俞穴在背上第三椎下兩傍各一寸五分

證治準繩曰小兒喘脹俗謂之馬脾風又謂之風喉者以草莖量病兒手中指裏近掌紋至中指尖截斷如此二莖自乳上微斜直立兩莖於梢盡頭橫一莖兩頭盡頭點穴灸三壯此法多曾見愈

醫案

錢氏直訣曰杜氏子五歲仲冬咳嗽吐痰此風寒傷肺也用麻黃丸以瀉肺後用阿膠散以實肺如此者三其病愈虛師曰瀉肺而肺病不退補肺而肺病猶存無能爲矣果大喘而歿

李運使孫八歲咳嗽胃滿短氣或謂肺經有熱用竹葉湯牛黃膏各二服三日加喘師曰此肺氣虛而寒邪所乘用補脾肺之藥而愈蓋竹葉牛黃治心藥也用以治肺誤矣

喪氏孫九歲喘嗽悶亂飲水不止食不能下或用凉藥月許無效師曰此凉藥寒胃也以益胃散補脾土以瀉白散瀉肺金而愈

段齋郎子四歲病嗽身熱吐痰數日咯血或用甘桔湯防己丸其涎上攻吐喘不止用褊銀丸一服下之復以補肺散治之或曰證屬肺虛何以下師曰肺經咯血而有熱故也況痰實上攻亦使發搐故宜先下其痰隨補脾肺而愈

幼科發揮曰一小兒咳嗽服抱龍丸反吐瀉不乳腹脹發熱用六君子湯母子並服而癒後因母飲酒仍嗽用清胃散加麴芽母服而子亦愈

一小兒患嗽或用清痰等藥反吐乳發熱搐搦腹脹此脾胃復傷而內虛熱也用異功散加釣藤鉤漸愈又用前藥加當歸而安

一小兒患咳嗽服牛黃清心丸加喘促腹脹此脾肺氣虛也用六君子湯頓愈

靳水舉人葵沙江有子病咳久不止請予治予往見其連聲不止咳時面青右手掌自擺動謂沙江曰令郎不可治也沙江問何故曰嗽者肺病也肺屬金面青者肝之色也肝屬木手擺者肝風欲發之狀也木來侮金寡乎畏也維金十月金病木生之時四時之序將來者進成功者退火生而進金病而退發搐不可治也甲乙日劇果甲乙日搐而死

醫學綱目曰肺中風多因嗽而始但服嗽藥不能散其風邪入於肺臟之絡其喉喘急面色青黃目能認人口不能言醫不能明其證坐以待盡不亦陋乎紹興王尚書女伴老嫗得此病半月相繼而死庸醫俱不能識又張南軒亦得此病而逝後有樓八哥之子病此證是時乃一氣之行諸醫皆言無術而退于父來告急余往視之以橘皮桑白皮鬱粟殼三件煎湯化百部丸二服急灸肺腧其喘立定而忽能言繼時索粥自此生矣

保嬰金鏡録曰一小兒患咳嗽服牛黃清心丸加喘促腹脹余視其右臉赤脈紋形如鎗屬脾氣復傷用六君子湯頓安

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百四十四卷目錄
醫部彙考四百二十四
小兒諸卒中門
孫思邈千金方 嬰孺客忤
萬氏幼科發揮 客忤
魯伯嗣學嬰童百問 風證風搐
徐春甫古今醫統 物觸疾 小兒中客
王肯堂證治準繩 中風 偏風口噤 中人忤 中惡 卒死 鬼持 疰病 尸疰 蠱疰 馬脾風
小兒衛生總微方論 中風論 三疰論
方 增損續命湯 石膏湯 大黃牡蠣湯 二物礬石湯 二物礬毛散 一物猪蹄散 二物燒髮散 一物馬通浴湯 一物猪通浴湯 千金湯 雀屎圓 太乙備急散 獨肝丸 安息香膽三生丸 沈香順氣散 追風劍毒散 省風湯 羌活散 通關散 防風通聖散 化風丹 鈎藤散 至寶丹 羚羊角散 辟邪青木香散 雞黃丹 悅奴散 鬼箭羽散 雄黃丸 雄麝散 九星鬼箭羽湯 犀角散 外聖方 雄黃丸 雄麝散 九星鬼箭羽湯 犀角散 安神丸 眞珠散 眞珠散 蘇合香丸 沉香降氣湯 殭蠶皮散 升麻散 雄黃散 玉筋散 牛黃奪命散 無價散 白虎湯 保命丹 雄麝散
單方
鍼灸
祝由
醫案

唐孫思邈千金方

嬰孺客忤

論曰少小所以有客忤病者是外人來氣息忤之一名中人是爲客忤也雖是家人或別房異戶雖是乳母及父母或從外還衣服經履鬼神麤暴惡氣或牛馬之氣皆爲忤也執作喘息乳氣未定者皆爲客忤其乳母遇醉及房勞喘後乳兒最劇能殺兒也不可不愼凡諸乘馬行得馬汗氣臭未盥洗易衣裝便向兒邊令兒中馬客忤兒卒見馬來及聞馬鳴驚及馬上衣物馬氣皆令小兒中馬客忤愼護之特重一歲兒也凡小兒衣布帛綿中不得有頭髮履中亦爾白衣青帶青衣白帶皆令中忤凡非常人及諸物從外來亦能驚小兒致病欲防之法諸有從外來人凡有異物入戶當將兒避之勿令見也若不避者燒牛屎令常有煙氣置戶前則善

小兒中客爲病者無時不有此病也而秋初一切小兒皆病者豈是一切小兒悉中客邪夫小兒所以春冬少病秋夏多病者秋夏小兒陽氣在外血脈嫩弱秋初夏末晨夕時有暴冷小兒嫩弱其外則易傷暴冷折其陽陽結則壯熱胃冷則下痢是故夏末秋初小兒多壯熱而下痢也未必皆是中客及魅也若治少小法夏末秋初常宜候天氣溫凉也有暴寒卒冷者其少小則多患壯熱而下痢也愼不可先下之皆先殺毒後下之爾元中記云天下有女鳥名曰姑獲一名天帝女一名隱飛鳥一名夜行遊女又名釣星鬼喜以陰雨夜過飛鳴徘徊人村里噢得來者是也鳥純雌無雄不產陰氣毒化生喜落毛羽於人中庭置兒衣中便令兒作癇病必死即化爲其兒也是以小兒生至十歲衣被不可露也七八月尤忌

凡中客忤之爲病類皆吐下青黃白色水穀解離腹痛大糾面色變易其候似癇但眼不上插耳其脈急數者是也宜與龍膽湯下之加人參當歸各如龍膽秤分等多少也小兒中客急視其口中懸癰左右當有青黑腫脈核如麻豆大或赤或青或白如此便宜用鍼速刺潰去之亦可爪摘決之并以綿纏釵頭拭去血也少小中客之爲病吐下青黃赤白汁腹中痛及反倒偃側喘似癇狀但目不上插少睡耳面變五色其脈弦急若失時不治少久則難治矣欲療之方用豉敷合水拌令濕擣熟丸如雞子大以摩兒頷及手足心各五六遍畢以丸摩兒心及臍上下行轉摩之食頃破視其中當有細毛即擲丸道中痛即止

明萬氏幼科發揮

客忤

心主驚心藏神兒心氣怯弱或聞大聲見異物異人未有不動其神也謂之客忤

客忤者口中吐青黃白沫水穀雜面色變異喘息腹痛反側瘛瘲狀似驚癇但眼不上竄耳治法宜辟邪正氣散驚安神蘇合丸至聖保命丹主之

客忤者謂客氣忤犯主氣之病也如五氣之邪自鼻而入則忤其心肝五味之邪自口而入則忤其脾胃有所驚恐則忤其神有所拂逆則忤其意當博求之

故曰心誠求之雖不中不遠矣

兒性執拗凡平日親愛之人玩弄之物不可失也失則心思思則傷脾昏睡不食求人不得則怒怒則傷肝啼哭不止此忤其心也平日未親愛之人未見之物不可使之見見則驚驚則傷心凡未見之人不可使之近迫近則恐恐則傷腎令兒成癇此皆客忤病也今之爲父母者則稱所畏者以止之如長老止夜啼之故事爲醫者因兒不服藥則持鍼以搏炙以迫之令兒生病

魯伯嗣學嬰童百問

風證風熱

小兒中風者以其血氣未定寒溫失調內則盛熱蘊蓄外則腠理開虛故風邪乘其外虛而暴中之其狀昏不知人壯熱狂躁搐掣氣鬱口噤涎潮是也心中風則偃臥不能傾側發熱失音其舌焦赤若汗流唇赤者可治灸心俞或唇間白黑青黃乃心壞爲水或面目青黑時時竦動者竝不治肝中風則踞坐不得低頭左脅疼痛諸筋攣急頭目轉動上視多怒其目青若遶兩目連額微青唇青面黃者可治灸肝俞大段青黑其目一黃一白不治腎中風則踞坐面浮腰脊痛引小腹其耳黑若兩脅未有黃色起者可治灸腎俞或脅間如黃土髮直而齒黃赤者不治肺中風則偃臥胷滿喘急咳嗽躁悶汗出其鼻白若目下至鼻四圍及脣口皆白色可治灸肺俞或色帶黃乃肺壞爲血不治脾中風則踞坐腹滿皮肉瞤動四肢不收其脣黃若一身通黃口吐穢涎者可治灸脾俞或手足青而厥冷者不治凡人爲風邪所中皆自背上五臟俞而入風入於頷頰之間則口喎而牙噤風塞於咽喉聲音之間則語不出而失音風與氣搏氣與痰隔則喉間如鼾鼾之聲響是風也始入於膚腠次達於經絡而搏於經脉筋得寒則拘急攣痛得熱則緩弛不隨風挾寒邪即攣急也風挾熱氣即緩弛也拘攣脉必浮緊緩弛脉必浮洪寒者小續命湯熱者追風對毒散之類脉浮者病在表脉實者病在裏脉促者病在上在表者散之在裏者利之在上者湧之若虛而寒者則烏附之類又不可缺古人治法雖以灼艾之類爲本亦當消息權度而投劑焉雖然風寒暑濕皆能中人況又有因氣而中風者人之驟病莫急於中風倉卒之際若未能精審且與下氣豁痰蓋中風皆因痰鬱氣滯而作先用通關散以疏之急以南星生薑木香煎湯調蘇合香丸灌下牙緊者南星細辛末入麝香烏梅肉點擦牙自開進藥之後痰消氣下病勢稍蘇即詳審五臟外證而調理之宜省風湯羌活散勢甚者防風通聖散化風丹牛黃散釣藤散至寶丹等劑可選而用之

徐春甫古今醫統

物觸候

大抵小兒隨其心性不可觸逆凡有所愛之物不可強直取之心神所好若不遂欲心氣解散神逐物遷不食不言神昏如醉四肢垂軃狀如中惡醫士見之莫之措手如有此證詢其母及左右順其所欲然後用藥則安也

小兒中暑

小兒伏中暑證發熱汗出引飲或吐瀉攉亂腸痛又有脈虛手足微寒發渴口熱者又有煩熱而嘔吐利不食至成搐搦如驚狀似傷寒者不可便作驚病及傷寒用藥只可與五苓散六和半夏湯消息之萬無一失有偏寒偏熱者以意用藥甚不可執一也

王肯堂證治準繩

中風

張潔等方有中風方論今見小兒絕無患者而用藥多犯香燥恐血熱生風類中風證誤用之則爲害不淺故一切削而不載薛氏云中風之證西北方有之東南氣溫腠理疎泄人患之者皆類中風也況小兒元氣未充皮毛不固易虛易實外邪乘之則壯熱抽掣氣鬱涎湧甚至昏憒口噤即似中風誤以續命等湯投之多至不救大人且無眞中況小兒乎凡有前證當辨其因若陽明經氣虛風邪所乘筋脈拘急者爲外因足厥陰肝火熾盛筋脈偏急者爲內因脾肺虛弱腠理不密外邪乘入或驚風過服金石之劑耗損肝血或吐瀉後內亡津液不能養肝致口眼喎斜者皆肝血不足肝火生風之類中風之類證也

偏風口噤

小兒偏風者屬肝膽二經證也噤者筋急中風木太盛而乘於脾以勝水濕則金太燥然燥金主於收斂勁切故也又曰風之爲病善行而數變或左或右其因一也治須審而藥之若足陽明胃經氣虛風邪所乘其筋脈偏急者屬外因若足厥陰肝經風熱乘脾筋脈偏急者屬內因若脾肺虛弱腠理不密外邪所乘或服金石之劑耗損肝血或吐瀉後內亡津液不能養脾致口眼歪斜或半身不遂諸證皆

屬肝血不足肝火生風宜滋腎水養肝血壯脾土治法脾胃虛而動風者異功散加柴胡釣藤鉤脾肺虛而外邪所乘者用釣藤飲肝火血燥者用六味地黃丸津液不足者用白朮散若兼目緊上視寒熱往來小便淋漓面色帶青兩脅脹痛之類皆肝經之本病也或唇口歪斜腹痛少食目泡浮腫面色青黃肢體倦怠之類皆肝木乘脾之證也當審五臟相勝而主之設執其見證槩投風藥反成壞證者有矣

中人忤

茅先生曰小兒生下犯人噤候面青黑合兩眼閉吐逆不下乳此候因生下來不免外人看問或有腋氣或因婦人月假不淨或外人帶邪神觸著生下來夾故乳哺使觸異氣之物氣血未就又被風邪擊致此所治者先用朱砂膏乳上吮下後用鎮心丸夾醒脾散與服即愈如見不下乳眼視肚硬死候大凡初生下兒子家中人不見不可便與外人入房看問人家各有神祇又恐婦人腋氣及月假不淨觸著恐中客忤此即是養兒之法

中惡

巢氏曰小兒中惡者是鬼邪之氣卒中於人也無問大小若陰陽順理榮衛平調神守彊則邪不干正若精氣衰弱則鬼毒惡氣中之其狀先無他病卒然心腹刺痛悶亂欲死是也凡中惡腹大而滿脈緊大而浮者死緊細而微者生餘勢不盡停滯臟腑之間更發後變爲疰也

治法先下蘇合香丸未醒以皂角末搐鼻次服沉香降氣湯加人參茯苓又能辟邪客忤亦宜服

卒死

巢氏云小兒卒死者是三虛而遇賊風故無病倉卒而死也三虛者乘年之衰一也逢月之空二也失時之和三也有人因此三虛復爲賊風所傷使陰氣偏竭於內陽氣阻隔於外而氣壅閉陰陽不通故暴絕而死也若臟腑未竭良久乃蘇亦有兼挾鬼神氣者皆須邪退乃生也凡中客忤及中惡卒死而邪氣不盡停蓄心腹久乃發動多變成疰也

茅先生云卒死候眼合嚌齒遍身如綿面青黑口鼻冷此候本因生下而遍身熱或因有驚患醫人一向退熱不曾下得驚積及嬭積遂積聚被邪氣至此

右前件三個候都來一般只是要辨元初受患根源治之急下奪命散與吐下風涎

醒後便下勻氣散二服補除後下朱砂膏鎮心丸與服如有伏熱來時即下大附散與調理二三日安樂前件三個形候只是此一般調理上件疾見鴉聲上啼偏搐汗如珠不得睡眼瘴淚出死候不治

鬼持

巢氏云小兒神氣軟弱精爽微羸而神魂被鬼所持其狀不覺有餘疾直爾痿黃多大啼喚口氣常臭是也

嬰童寶鑑小兒鬼持歌云小兒氣弱命中衰魂魄多應被鬼持其候痿黃多哭地不須用藥可求師

鬼氣歌云鬼氣皮膚裏相傳臟腑間腫虛如水病瘈瘲似驚癇熱發渾身澀心攣痛所攢小兒還有此服藥急須看

疰病

巢氏云疰之言住也謂其風邪鬼氣留人身內也人無問大小若血氣虛衰則陰陽失守風邪鬼氣因而客之留住肌肉之間連滯臟腑之內或皮膚掣動遊易無常或心腹刺痛或體熱皮腫沉滯至死死又疰易傍人故爲疰也小兒不能觸冒風邪多因乳母解脫之時不避溫涼暑濕或抱持出入早晚其神魂軟弱而爲鬼氣所傷故病也

尸疰

巢氏云尸疰者是五尸之中一尸疰也人無問小大腹內皆有尸蟲尸蟲爲性忌惡多接引外邪共爲患害小兒血氣衰弱者精神亦羸故尸疰因而爲病其狀沉嘿不的知病之處或寒熱淋漓涉引歲月遂至於死死又疰易傍人故名之爲尸疰也

張渙論小兒亦有疰病與大人所病無異久後疰易傍人傳染骨肉如尸疰蠱毒之類是也

蠱疰

巢氏云人聚蛇蟲雜類以器皿盛之令相噉食餘一存者即名爲蠱能變化或隨飲食入腹食人五臟小兒有中者病狀與大人老子無異則心腹刺痛懊悶急者即死緩者涉歷歲月漸深羸困食心臟盡利血心臟爛乃死死又疰易傍人故爲蠱疰也

馬脾風

暴喘而脹滿也

田氏云暴喘俗傳爲馬脾風也大小便哽宜急下之用牛黃奪命散後用白虎湯平之

馬脾風在百日內者不治

小兒衛生總微方論

中風論

小兒血氣柔弱肌肉脆薄若寒溫失度則皮膚開爲風邪所中始著俞穴而行經脈次隨氣血而入腑臟從其所著卽生病焉其入腑臟者唯心肺二臟居膜鬲之上空隙之處又俞穴亦在於上故風乃易中而有患者其狀昏困不省手足抽掣心胷滿氣短多汗此尤爲急大抵其餘腑臟皆居膜鬲之下屬實之處又俞穴亦在於下故風乃難中而無患者其入於經脈者爲病甚多今採其有患者具之風痙者（一云風痙）風邪傷中陽經也或因解脫或臍瘡未合爲風所傷皆令發痙其狀口噤不開項背身體强直耳中策策而痛一向昏憒不省其脈如弦直上下也雖與驚癎相似然發而時省身輭者驚癎也若發不時醒身鞕强直者風痙也其卒然身痙者死凡角弓反張者亦由風傷陽經也故令背腰反折不能俛屈如角弓之狀此亦頗似痙病然痙病身體强直此病身體反折所以異也中風口噤者手三陽之筋入絡頷頰足陽明之筋上夾於口風邪中於諸陽之筋使機關攣急不利故使口噤不能開也診其脈遲者主中風拘攣及不隨者風邪寒熱入於經絡搏於筋脈筋脈受邪冷則四支拘攣熱則緩縱不隨也診其脈脈急細如弦者筋急拘攣也若脾脈緩弱者四支不隨也中風口眼喎斜者由風邪入於頷頰之筋其脈偏急故令口眼喎斜目不能平視語不能正也診其脈浮而遲者可治又云夜臥當耳有隙因風入耳亦令人口喎也中風癒不省者由風邪先中於陰病發於五臟其狀奄忽不知人事喉中噫噫有聲舌强不能言汗出身軟眼下鼻兩邊人中左右有色白可治若一黑一赤吐沫者難治汗不出體直者死

三痓論

小兒痓病有三一者鬼痓小兒神魂氣弱早晚抱持出入無時爲鬼厲邪氣所干其候皮膚掣痛游易無常或心腹刺痛天矯悶亂迺名中惡甚者卒致於死緩者延引歲月更變沉滯以至於死又注傍人二者尸痓人腹中有蟲曰尸痓小兒血氣嫩弱邪氣外傷蟲滯身中尸蟲移引相乘爲病其候沉沉嘿嘿不知的病之處或寒或熱或心腹悶痛涉引歲月遂至於死又注傍人三曰蠱毒痓謂諸毒蟲之中有一能噉其餘者卽爲之最名之曰蠱或因人作或因引注隨飲食入小兒腹中食兒臟腑其候心腹刺痛懊悶欲絕利下無時或便血片急者卽死名曰中蠱之毒緩者涉引歲月以至曠爛乃死又注傍人

方

增損續命湯（千金方下同）

治小兒卒中風惡毒及久風四肢角弓反張不隨井罷瘦僻不能行步

麻黃　甘草　桂心各一兩　芎藭　葛根
升麻　當歸　獨活各十八銖　人參　黃芩
石膏各半兩　杏仁二十枚

右十二味㕮咀以水六升煮麻黃去上沫乃納諸藥煮取一升二合三歲兒分爲四服一日令盡少取汗得汗以粉粉之

石膏湯

治小兒中風惡痱不能語口眼了戾四肢不隨

石膏一合　麻黃八銖　甘草　射干　桂心
芎藥　當歸各四銖　細辛二銖

右八味㕮咀以水三升先煮麻黃三沸去上沫內餘藥煮取一升三歲兒分爲四服日三

大黃牡蠣湯

治少小中風狀如欲絕

大黃　牡蠣煅　龍骨煅　瓜蔞根　甘草
桂心各二十銖　赤石脂　寒水石各六銖

右八味㕮咀以水一升內藥重半兩煮再沸絞去滓半歲兒服如雞子大一枚大兒盡服入口中卽愈汗出粉之藥無毒可每日二服有熱加大黃不汗加麻黃

無寒水石矽硝代之

二物石膏湯

治少小中風手足拘急

石膏如雞大子大一塊碎　眞珠一兩

右以水二升煮石膏五六沸內眞珠煮取一升稍稍分服

桂枝湯

治少小中風脈浮發熱自汗項強鼻鳴乾嘔

桂心　生薑　甘草　芎藥各一兩　大棗四枚

右五味㕮咀三物以水三升煮取一升分三服

二物驢毛散

治少小新生中風
驢毛取背前交脊上會中拔取如手母指大一把
麝香二豆大
右以乳汁和銅器中微火煎令焦熟出爲末小兒不能飲以乳汁和之葦筒貯瀉著咽中然後飲乳令入腹

一物猪蹄散
治小兒寒熱及赤氣中人猪後脚懸蹄
右燒末搗篩以飲乳汁一撮立效

二物燒髮散
治少小見人來卒不佳腹中作聲者用向來者人頷上髮十莖　斷兒衣帶少許
右合燒灰細末和乳飲兒卽愈

一物馬通浴湯
治少小中忤馬通三升
右燒令煙絕以酒一斗煮三沸去滓浴兒卽愈

一物猪通浴湯
治小兒中人忤軀啼面青腹強者
猳猪通三升
右以熱湯灌之適寒溫浴兒

千金湯
治小兒暴驚啼絕死或有人從外來邪氣所迕令兒得疾衆醫不治
蜀椒　左顧牡蠣各六銖碎
右二味以酢漿水一升煮取五合每服一合

雀屎圓
治小兒卒中風口噤不下一物
雀屎如麻子
右丸之飲下卽愈大良雞屎白亦佳

太乙備急散
主卒中惡客忤五尸入腹鬼刺鬼痱及中蠱疰吐血下血及心腹卒痛腹滿傷寒陰毒病六七日
雄黃　芫花　桂心各二兩　藜蘆　巴豆各一分　野葛三分
附子炮裂去皮臍五分
右九味巴豆別治如脂餘合治下篩以巴豆和合更搗令勻調以銅器中密貯之勿洩有急疾水服一字匕可加至半錢匕兒小者半之痛在頭當鼻齆在腸上吐在腸下利在四肢當汗出此之所謂如湯沃雪手下皆愈祕之非賢不傳

獺肝丸
治疰病相染易及霍亂中惡小兒客忤長病
獺肝一具　雄黃　莽草　丹砂　鬼臼　犀角　巴豆各一兩　麝香二分　大黃　牛黃各一兩
蜈蚣一條
右十一味末之蜜圓空腹服如麻子大一圓加至二圓以知爲度

治鬼持方 圖經
虎睛爪并指骨毛
右繫小兒臂上辟惡鬼

深師五邪丸 外臺
療邪狂鬼魅妄言狂走恍惚不識人此爲鬼忤當得殺鬼丸
丹砂　雄黃俱飛各八錢　龍骨　馬目毒公鬼箭各五兩　鬼臼二兩　赤小豆研三兩
芫青一枚　桃仁百枚去皮尖熬別研
右九味搗下篩細絹篩合諸藥拌令勻調後內蠟和之大如彈丸絳囊盛之繫臂男左女右小兒繫頭合藥勿令婦人雞犬見之所服蜜和圓如梧子大一服三丸日三服忌五辛生血物

沉香順氣飲 古今醫統下同
治小兒物忤逆觸
沉香　茯神　紫蘇葉　人參　炙草各一錢
右爲細末紫蘇梗煎湯調化不拘時服

安息香煎
治同前
安息香　蘇合香　檀香　藿香葉　甘草　膽南星各等分
右爲細末薑汁調作小餅每用磨化塗瘡上及焚烟避一切客忤及物觸

三生丸 全幼心鑑
小兒暑風暑毒入心痰塞心孔昏迷搐搦此乃危急之證非此三生料瞑眩之劑不能伐之
白附子　天南星　半夏並去皮各等分
右生研猪膽汁和丸黍米大量兒大小以薄荷湯下令兒側臥嘔出痰水卽甦

綠雲丹 經驗方
小兒風痰卒中
銅綠不計多少

右研粉醋糊糊芡子大每用薄荷酒化服一丸須臾吐涎如膠神效

通關散 嬰童百問下同

治卒暴中風不省人事牙關緊急藥不得嚥下

細辛　薄荷　牙硝　雄黃各等分

右爲末每用少許吹入鼻中候噦然後進藥或用白梅擦牙更以菖蒲末著舌下牙關卽開

追風到毒散

治中風內外皆熱

大黃　郁李仁炒各二錢　桑白皮炒　檳榔

防風各半兩　羌活一兩

右到散每服二錢黑豆三十粒同煎乳食後服省風湯

治驚風口噤筋脉攣急抽掣疼痛風盛痰實旋暈僵仆胃腦煩滿恍惚不定等證

生南星　防風各四兩　甘草　半夏湯浸一宿

黃芩去蠹皮各二兩

右到散每服二錢生薑一片去滓溫服不拘時

羌活散

治傷風寒驚熱或中風體硬

羌活　川獨活　前胡　柴胡　川芎　白茯苓

桔梗　枳殼　人參　地骨皮　天麻各等分

甘草減半

右到散生薑薄荷煎不拘時服

一方加麻黃乾葛薏苡仁　卽蟬蛻治驚熱

防風通聖散

治小兒熱甚驚風或斑疹出不快者更熱劇黑陷將欲死者或風熱瘡疥久不愈者諸般風熱

防風　川芎　大黃　當歸　薄荷葉　芍藥

麻黃去根節　芒硝各半兩　石膏　黃芩

桔梗各一兩　滑石六兩　生甘草二兩　白朮

荊芥　山梔子各二錢半

右到每二錢薑二片水一盞煎七分不拘時服

化風丹

祛風化痰退熱定搐

羌活　獨活　防風　天麻　膽星　人參

川芎　荊芥　粉草　全蠍各等分

右爲末煉蜜丸如芡實大薄荷湯調下一二丸

一方加辰砂麝香

釣藤散

治吐利脾胃氣虛生風

釣藤鉤三錢　蟬蛻　天麻　防風　蠍尾

人參各半兩　麻黃　白直殭蠶炒　炙草

川芎各二錢半　麝香不拘多少

右到散白水煎

寒多加附子末半錢

至寶丹

治諸癎急驚心熱卒中客忤不得眠睡煩躁風邪擩搦及傷寒狂語伏熱嘔吐並皆治之

生犀角屑　生琥珀屑　眞琥珀研細水飛

雄黃各一兩　金箔一半爲衣　銀箔各五十片

眞片腦研　眞麝香研　眞牛黃研各一錢

安息香一兩半爲末以無灰酒濾去沙石約取一兩慢火熬成膏

右件將犀角琥珀屑搗羅爲細末研入諸藥令調勻將安息膏以重湯煮化和搗爲劑如乾卽添入少熟蜜盛磁器中旋丸如桐子大二歲兒卻服二丸人參湯化下大小以意加減又治大人諸卒中不語中諸惡氣中諸物毒熱暗風產前後血暈死胎不下並用童子小便一合生薑搗自然汁三五滴同溫過化下五丸立效

辟邪膏張渙方

嬰兒血氣未實皆神氣軟弱除父母及乳養之常照管外不可令見生人及抱往別房異戶及不可見牛馬獸畜等其父母家人之類自外及夜行歸家亦不可見兒恐經履鬼神穢惡暴氣若犯之令兒吐下青黃赤白水穀解離其狀似發癎者但眼不上戴脈不弦急名曰客忤

眞降香剉　白膠香　沉香　虎頭骨微炒

鬼臼去毛　草龍膽　人參　白茯苓

右件各半兩搗羅爲細末次入水磨雄黃半兩細研水飛大研麝香一錢都拌勻煉蜜和如雞頭大每服一粒煎乳香湯化下及別丸如彈子大用綠絹袋子盛令兒衣服上帶之仍臥內常燒神妙凡斷乳小兒亦有中惡卒暴者亦宜服

雌黃丹張渙方

治尸疰病

雌黃　雄黃各細研　川大黃錦紋者慢火炮黑

鬼臼去毛各一兩　桃仁三十個湯浸去皮尖研

白頭翁半兩已上並爲細末次用　麝香研一分

巴豆十粒去皮心膜紙裹壓去油

右件都研勻以羊脂五兩鎔諸藥成膏服如黍米大三粒至五粒荊芥湯冷下量兒大小加減

立效湯

川大黃炮　乾桃柳葉洗焙乾各一兩　梔子仁　赤芍藥各半兩

已上搗羅爲細末次用朱砂細研水飛一兩麝香別研雄黃別研各一分都拌勻每服一錢蜜湯調下量兒大小加減

紫參丸 外臺

治小兒蠱疰百病癥瘕積聚痠削骨肉大小便不利卒忤遇惡風顫脹腹滿淋水轉相注殫門盡戶延及男女外孫醫所不能療

紫參　人參　半夏湯洗　藜蘆　代赭石　桔梗　白薇　肉蓯蓉各三分　石膏　大黃　牡蠣熬　丹參各一分　癩蝦蟆燒灰爲末　烏頭炮各四分　狼毒七分　附子炮五分

巴豆七十粒去心皮熬

右件藥搗篩蜜和爲圓以飲下如小豆一丸日三服老小以意減之蜂蠆所螫以塗其上神良忌猪羊肉冷水

一方無蝦蟆有乾薑四分

羚羊角散 聖惠方下同

治小兒中蠱腹內堅如石面目青黃小便淋瀝變易無常

羚羊角屑　蘘荷各一兩　梔子仁七枚　赤芍　丹皮　黃連去鬚各一分　犀角屑半兩

右件藥搗麤羅爲散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓溫服日三四服更量兒大小加減

木香散

治小兒尸疰心腹滿脹疼痛不可忍

木香　鬼箭羽　桔梗去蘆頭　當歸剉微炒　紫蘇莖葉各半兩　檳榔三分

右件藥搗羅爲麤散每服一錢以水一小盞入生薑少許煎至五分去滓不計時候溫服更量兒大小加減服之

桃奴散

治小兒中惡心腹堅脹疼痛顏色青黑大便不通

桃奴五枚　炙草一分　麝香另細研一錢　杏仁二十枚湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃　桔梗　赤芍　黃芩　柴胡　川升麻　川大黃剉微炒　鬼臼去毛各半兩

右件藥搗麤羅爲散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候溫服以利爲度量兒大小以意加減

鬼箭羽散

治小兒中惡心堅强卒痛欲困

鬼箭羽　眞珠末各一分　羚羊角屑　桔梗　川硇硝　川升麻　赤芍　柴胡　黃芩各半兩　桃仁十枚　大黃一兩

右製服法同前

雄黃丸

治小兒中惡心痛辟除邪氣

雄黃　眞珠各半兩　麝香　牛黃各細研一錢

巴豆二十粒去皮心膜研紙裹出油

右件藥都研令勻入棗瓤及煉蜜和圓如粟米大每服以薄荷湯下兩三丸量兒大小加減服之

鬼箭羽湯 嬰孺

治小兒中惡心腹堅硬卒痛欲困

鬼箭羽三分　朱砂一分　羚羊角屑　桔梗　鬼臼　硇硝湯成下各半分　升麻　芍藥　柴胡各五分　生黃芩六分　川大黃八分　桃仁四十九個炒去皮尖

右以水四升煑一升二合二歲兒爲四分更量兒大小與服之

殊聖方 譚氏

治客忤

忽爾連連哭不休渾身壯熱脈如鉤驚啼不得寃神鬼客忤傷心不自由犀角雄黃相共搗桃符煎水看稀稠人參茯苓車前子丸喫三服請不憂

雄黃丸 證治準繩下同

治小兒疰病諸蠱魅精氣入心入腹刺痛黃瘦骨立

雄黃　雌黃各四分　丹砂研飛　野丈人　徐長卿各三分　大黃五分　麝香三棗大　羚羊角屑五分

右爲末以青羊脂和丸百日兒酒服黍大三丸日進二服或豆大亦可

雄麝散

專治蠱毒病

雄黃細研　麝香別研　羚羊角屑　赤芍藥

敗鼓皮炙微黃各一兩　馬兜鈴根　薔苊
鬼臼去毛各半兩已上除雄黃麝香外搗羅爲細末
右件八味都一處拌勻研細每服半錢濃煎甘草
湯調下食前

犀麝湯

犀角屑　鬼箭　安息香　雄黃細研各一兩
苦參　牡丹皮各半兩
已上搗羅爲細末次用麝香半兩細研都拌勻每
服一錢水一大盞煎至五分去滓放溫時時服

犀角散

治小兒尸疰及中惡諸病皆主之
犀角屑　川升麻　木香　川大黃剉碎微炒
桑根白皮炒　檳榔各半兩　麝香一錢細研
桃仁二七枚湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃
右件藥搗細羅爲散每服以溫水調下半錢日四
五服更量兒大小加減服之

眞珠散

治客忤驚風鬼疰驚邪痰熱心舍不寧精神不定
心常怔忡睡中驚跳時或咬牙五心煩熱有汗兼
喘面赤舌白呵欠煩渴小便赤瀉或吐利黃沫常
服辟邪安神

眞珠　海螵蛸　滑石　生珠另研各一錢
白茯苓　人參　白附　炙草　全蠍　麝香
腦子另研各五錢　金箔三十片　銀箔二十片
右末和勻半錢煎燈心麥門冬湯入蜜少許調服
日午臨臥各一
安神丸

生犀角末半錢　雄黃研　人參　白茯苓
車前子各一分
右爲末取桃白皮一兩二味以水三升
同煎至一升去滓更煎成膏和前藥丸如麻子大
每服三丸芍藥湯下

眞珠散

小兒嘔氣菜心連喘息多愁胃口涎唯有此疾互
早治爲緣客忤氣相煎看看病狀醫難效速取眞
珠散半錢龍腦生犀香附子小兒餐了保身安
眞珠末四錢　生犀角末二錢　香附末一錢
龍腦半字
右同研每服一字桃仁湯調下乳母忌生冷油膩
一切毒物半月

蘇合香丸

治傳屍骨蒸諸項勞瘵順氣化痰卒暴心痛鬼魅
瘧疾霍亂吐瀉赤白下利小兒驚搐
丁香　青木香　白檀香　沉香　薰陸　香附
訶子煨取肉　烏犀鎊屑　硃砂研水飛各一兩
蘇合香油五錢入安息香膏內　麝香七錢半
右爲細末用安息香膏入煉蜜和劑圓如梧實大
空心用沸湯化下小兒一丸老人四丸酒下亦可
用蠟紙裹一丸彈子大用緋絹袋盛常帶之一切
邪神不敢近去腦名麝香蘇合丸治一切邪神及
胷膈噎塞腸中虛鳴宿食不消餘證並同

沉香降氣湯

降眞　沉香　白膠香　虎脛骨酥炙　人參
鬼箭　草龍膽各五錢
右爲末次入雄黃五錢麝香一錢煉蜜丸乳香湯
化下又令兒帶及燒臥內尤妙

敗鼓皮散

治小兒中蠱
敗鼓皮三分炙黃　苦參　蘘荷根各一兩
右件搗蠱羅爲散每服一錢以水一小盞煎至五
分去滓溫服日三四服更量兒大小加減服之

升麻散

治小兒初中蠱毒
川升麻　桔梗　瓜蔞根各半兩
右搗羅爲麤散每服一錢以水一小盞煎至五分
去滓溫服日四五服量兒大小加減

雄黃散

治小兒飛蠱狀如鬼氣者宜服
雄黃　麝香各細研　犀角末各半兩
右件藥都研令勻每服以溫水調下半錢匕日四
五服量兒大小加減

玉筯散

治小兒馬脾風
甘草一寸煎水　甘遂末一字
右同油蜜生薑銀釵兒攪調下後用冷水半盞調
奪命散

牛黃奪命散

治小兒肺脹喘滿胷膈起急兩脅扇動陷下作坑
兩鼻竅張閉亂嗽喝聲嗄而不鳴痰涎潮塞俗云

馬脾風若不治死在旦夕
白牽牛　黑牽牛各一兩半生半熟　川大黃
檳榔各一兩
右爲細末三歲兒每服二錢冷漿水調下
涎多加臘粉少許無時
無價散
治風熱喘促悶亂不安俗謂之馬脾風
辰砂二錢半　甘遂麪裹煨焙乾一錢五分
輕粉五錢
右爲細末每服一字用溫漿水少許入滴油一點
挑藥在上沉下去卻以漿水灌之立效
白虎湯
治馬脾風
知母三兩　甘草一兩炙　石膏八兩另研
糯米三合
右每服二三錢水煎至米熟爲度
保命丹（東醫寶鑑下同）
治馬脾風
南星炮三錢膽星尤佳　白附子　防風　天麻
蟬殼去土　白直殭蠶炒各二錢　麝香半錢
全蠍十四個
右爲末飯丸梧子大朱砂爲衣每一丸薄荷湯下
雄麝散
治客忤
雄黃一錢　乳香五分　麝香一字
右爲末每一字刺雄雞冠血調灌之仍以母衣覆
兒身卽愈

單方
小兒中蠱欲死者甘草半兩水二盞煎五分服當吐出（金匱玉函下同）
小兒卒死而吐利不知是何病用狗屎一丸取汁以灌之無濕者水煮乾者取汁
治少小中客忤强項欲死急取衣中白魚十枚爲末以傅母乳頭上令兒飲之入咽立愈一用二枚著兒母手掩兒臍中兒吐下愈亦以摩兒項及脊强處（千金方下同）
治少小客忤用竈中黃土蚯蚓屎等分搗合水和如雞子黃大塗兒頭上及五心良一方用雞子清和如泥
又吞麝香如大豆許立愈
治少小犯客忤發作有時者以母月衣覆兒身上大良
治小兒卒中忤剪取驢前膊胛上旋毛大如彈子以乳汁煎之令毛消藥成著乳頭飲之下喉卽愈
又燒母衣帶三寸并髮合乳汁服之
又取牛鼻津服之
又取牛口沫傅乳頭飲之
治少小卒中客忤不知人者取熱馬屎一丸絞取汁飲兒下咽便愈亦治中客忤而軀啼面青腹强者
治小兒卒客忤用銅鏡鼻燒令赤著少許酒中大兒飲之小兒不能飲者含與之卽愈
治小兒疰用竈中灰鹽等分相和熬熨之
小兒卒癇大蜂房一枚水三升煮濃汁浴之日三四次佳

治卒忤卽今人所謂中惡者與卒死鬼擊相類皆用鹽入合以水三升煮取一升半二服得吐卽愈
治小兒卒死或先病痛或常居褰臥奄忽而絕皆是中惡取葱黃心刺其鼻男左女右入七八寸小兒量度之若使目中血出佳（肘後方下同）
又令二人以衣壅口吹其兩耳極則易人可以筒吹之竝捧其肩上側身遠之莫臨死人上
又以葱葉刺耳耳中鼻中血出者莫怪無血難治有血是候時當捧兩手忽放之須臾死人自當舉手捞人言痛乃止又男刺左鼻女刺右鼻中令入七八寸餘大效小兒量度之亦治自縊死
又以綿漬好酒中須臾置死人鼻中手按令汁入鼻中幷持其手足莫令驚
又視其上脣裏弦有九如黍米大以鍼決去之
又以小便灌其面數迴卽能語
又末皂莢如大豆吹其兩鼻中嚏則氣通矣
又割雄雞頸取血以塗其面乾復塗幷以灰營死人一周
又以管吹下部令數人互吹之氣通則活
小兒客忤卒死眞丹方寸匕蜜三合和灌之
救卒死而壯熱者用礬石半斛水一升半煮消以漬脚令沒踝
小兒中蠱下血欲死搗青藍汁頓服之（聖惠方下同）
兒中馬毒客忤燒馬尾煙於前每日熏之瘥乃止
治小兒卒死取女青末半錢用牛乳汁調服之（聖惠方）
又燒豬猪糞水解取汁服之
又以苦參醋煮汁少許內口中卽蘇水煮亦得又酒

燙爛棺木板取汁服少許
又煎鹽湯令極鹹以物拗口開灌之令入腹即活
又以熱湯和灰厚攤身上逡巡即蘇
治小兒不知所病便死絕取雄鷄冠臨兒口上割血滴入口下即活
治鬼擊若小便不通筆頭七枚燒作灰末和服之即通（備急方）
小兒汗出中風一日頭項腰熱二日手足不屈用慎火草乾者半兩麻黃丹參白朮二錢半爲末每服半錢漿水調服三四歲服一錢（聖濟總錄下同）
小兒身熱汗出拘急因中風起丹參半兩鼠屎炒三十枚爲末每服三錢漿水下
小兒卒驚似有痛處而不知用燕窠中屎煎湯洗浴之（救急方）
小兒客忤死不能言桔梗燒研三錢米湯服之仍吞麝香豆許（張文仲備急方）
小兒無故卒死者取葱白納入下部及兩鼻孔中氣通或嚏即活（經驗方）
小兒卒癇刺白犬血一升食之并塗身上（簡易方）
客忤因而驚忤者治用竈中黃土研二兩雞子一枚去殼二件相和入少許水調先以桃柳枝湯浴兒後將此藥塗五心及項門上（田氏方）
小兒客忤搗葥蒲汁內口中（元和紀用經驗下同）
又生艾汁納口中
又磨刀水三四滴妙
又用好墨搗篩和水溫服半錢匕
治小兒中馬毒客忤取馬口角沫塗兒口中效（簡要濟衆）

小兒客忤口不能言細辛桂心等末以少許納入口中（外臺秘要下同）
小兒飛尸走馬巴豆去心皮熬杏仁去皮尖各二枚二味取綿纏槌令極碎投熱湯二合捻取白汁服之須臾差未差更一服兒大小量之通療鬼擊有尸疰者常蓄此藥用驗忌野猪肉蘆筍
小兒卒然肚皮青黑乃血氣失養風寒乘之危惡之候也大青爲末納口中以酒送下（保幼大全下同）
小兒中暑吐瀉煩渴穀精草燒存性用器覆之放冷爲末每冷米飲服半錢
治小兒五種蠱毒搗馬兜鈴根細羅爲散每服一錢以水一小盞煎五分去滓空腹頓服當時隨吐蠱出未快吐即再服（證治準繩下同）
又用敗鼓皮一片燒灰細研爲粉空心以粥飲調服一錢病人須臾當呼蠱主姓名病便愈
又用薯苡一兩搗羅爲末以粥飲調下一錢甚效量兒大小加減服之
治小兒畏忌中蠱欲死用甘草半兩生剉以水一中盞煎至五分去滓分爲二服當吐蠱出
若平生預防蠱者宜熟炙甘草煮汁服之即內消不吐神效
治小兒中蠱毒令腹內堅痛面目青黃淋露骨立病變無常用桃株寄生二兩搗細羅爲散如茶點服之日四五服
又用磨香半錢細研空腹以溫水調服即吐出蠱毒未效再服

治小兒中蠱毒下血欲死取生赤雌雞翅下血服之立效
又有搗青藍汁頻頻與半合服
治鬼魘不寤末伏龍肝吹鼻中
救卒死而目閉者用騎牛臨面搗薤汁灌之耳中
又救卒死而四肢不收失便者取牛洞一升溫酒灌口中洞者稀糞也
卒死無脈無他形候陰陽俱竭故也用牽牛臨鼻上二百息牛舐必差牛不肯舐著鹽汁塗面上牛即肯舐
治魘死不自覺者宜慎燈火勿令人手動牽牛臨其上即覺若卒不能語取東門上雞頭末之以酒服
治卒魘死搗韭汁灌鼻孔中劇者灌兩耳

鍼灸

葛氏肘後方曰小兒卒死而四肢不收屎便者灸心下一寸臍上三寸臍下四寸各一百壯兒小者隨年又灸鼻下人中一名鬼客聽又治尸厥
徐春甫古今醫統曰小兒客忤久瘧鍼間使三分灸則五壯間使掌後三寸兩筋間陷中心包絡脈所行爲經金
小兒客忤驚風鍼隱白一分灸則三壯隱白在足大指端內側去爪甲角如韭葉肥脈所出爲井木

王肯堂證治準繩曰葛氏肘後灸法以繩圍其死人肘腕男左女右畢伸繩從背上大椎度以下又從此灸橫行各半繩此法三灸各三即起又令爪其病人人中取醒不起者捲其手灸下文頭隨年壯又灸鼻中三壯也又灸頤下宛宛中名承漿穴十壯大效又灸兩足大指爪甲聚毛中七壯效此華佗法一云三七壯又灸臍中百壯也

祝由

孫思邈千金方曰治小兒中馬客忤而吐不止者灸手心主間使大都隱白三陰交各合三壯可用粉丸如豉法竝用唾唾而呪之呪曰摩家公摩家母摩家子兒苦客忤從我始扁鵲雖良不如善唾良呪訖棄丸道中按證治準繩用粉爲丸如豉法摩兒手足心及心頭臍上下行轉摩之而呪中客中人皆可用

又法取一刀橫著竈上解兒衣發其心腹訖取刀持向兒呪之唾輒以刀擬向心腹啡啡曰煌煌日出東方背陰向陽葛公葛公不知何公子來不視去不顧過與生人忤梁上塵天之神戶下土鬼所經大刀鐶犀對竈君二七唾客愈兒驚唾啡啡如此二七啡啡以刀擬之呪當三遍乃畢用豉丸如上法五六遍訖取此丸破視其中有毛棄丸道中客忤即愈矣

醫案

萬氏幼科發揮曰一兒半歲忽日慘然不樂昏睡不乳予曰形色無病將謂外感風寒則無外感之證將謂內傷乳食則無內傷乳食之證此兒莫有所思思則傷脾乃昏睡不乳也其父母悟云有一小廝相伴者我使他往今三日矣乳母亦云自小廝去後便不欣喜不吃乳父急命呼之歸兒見其童嘻笑父曰非翁之妙術不能知也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百四十五卷目錄

醫部彙考四百二十五

小兒驚癇門一
黃帝素問 奇病論篇
孫思邈千金方 驚癇論 候癇法
錢乙小兒直訣 急驚風證治 慢驚風證治 發搐證治 癲癇證治
劉完素六書 驚風
張從政儒門事親 驚風 發驚潮搐 慢驚
羅天益衛生寶鑑 急慢驚風
李杲十書 治小兒驚論
朱震亨平治會萃 急慢驚風
幼科全書 驚風 西江月
方賢奇效良方 驚風搐搦不治證 驚風治證 驚風痰食 五癇
萬氏幼科發揮 驚癇 急驚風有三因 驚後 天釣內釣
育嬰家祕 天釣內釣

藝術典第四百四十五卷

醫部彙考四百二十五

小兒驚癇門一

黃帝素問

奇病論篇

帝曰人生而有病巔疾者病名曰何安所得之岐伯曰病名爲胎病此得之在母腹中時其母有所大驚氣上而不下精氣并居故令子發爲巔疾也

此女子胞之爲病也有所大驚則氣暴上而不下夫精以養胎而精氣并居者也母受驚而氣上則子之精氣亦逆故令子發爲巔疾也愚謂巔當作癲按嬰兒癲癇多因母腹中受驚所致然癲疾者逆氣之所生也故因氣上逆而發爲癲疾

唐孫思邈千金方

驚癇論

論曰少小所以有癇病及痙病者皆由臟氣不平故也新生卽癇者是其五臟不收斂血氣不聚五臟不流骨怯不成也多不全育其一月四十日已上至期歲而癇者亦由乳養失理血氣不和風邪所中也病先身熱掣瘲驚啼叫喚而後發癇脈浮者爲陽癇病在六腑外在肌膚猶易治也病先身冷不驚掣不啼呼而病發時脈沉者爲陰癇病在五臟內在骨髓極難治也病發身軟時醒者謂之癇也身强直反張如弓不時醒者謂之痙也諸反張大人脊不容側手小兒容三指者不可復治也凡脈浮之與沉以判其病在陰陽表裏耳其浮沉復有大小滑澀虛實遲駛諸證各依脈形爲治神農本草經說小兒驚癇有一百二十種其證候微異於常便是癇候也初出腹血脈不斂五臟未成稍將養失宜卽爲病也時不成人其經變蒸之後有病餘證並寬惟中風最暴卒也小兒四肢不好驚掣氣息小異欲作癇及變蒸日滿不解者並宜與龍膽湯凡小兒之癇有三種有風癇有驚癇有食癇然風癇驚癇時時有之十兒之中未有一二是風驚者凡是先寒後熱發者皆是食癇也驚癇皆按圖灸之風癇當與猪心湯食癇當下乃愈紫丸佳凡小兒所以得風癇者緣衣暖汗出風因入也風癇者初得之時先屈指如數乃發作者此風癇也驚癇者起於驚怖大啼乃發作者此驚癇也驚癇微者急持之勿復更驚之或自止也其先不哺乳吐而變熱後發癇者此食癇早下則瘥四味紫丸逐癖飲最良去病速而不虛人赤丸差駛病重者當用之

註本無赤丸方諸醫方並無按此服四味紫丸不得下者當以赤丸赤丸差駛病重者當用之今次後癖結脹滿篇中第一方八味名紫雙丸者用朱砂色當赤用巴豆又用甘遂比紫丸當駛疑此卽赤丸也

凡小兒不能乳哺當與紫丸下之小兒始生生氣尚盛但有微惡則須下之必無所損及其愈病則致深益若不時下則成大疾疾成則難治矣凡下四味紫丸最善雖下不損人足以去疾若四味紫丸不得下者當以赤丸下之赤丸不下當倍之若已下而有餘熱不盡當按方作龍膽湯稍稍服之并摩赤膏風癇亦當下之然當以猪心湯下之驚癇但按圖灸之及摩生膏不可大下也何者驚癇心氣不定（一作足）下之內虛益令甚爾驚癇甚者特爲難治故養小兒常愼驚勿令聞大聲抱持之間當安徐勿令驚怖又天雷時當塞兒耳并作餘細聲以亂之也凡養小兒皆微驚以長其血脈但不欲大驚大驚乃灸驚脈若五六十日灸者驚復更甚生百日後灸驚脈乃善兒有熱不欲哺乳臥不安又數驚此癇之初也服紫丸便愈不愈復與之兒眠時小驚者一月輒一以紫丸下之減其盛氣令兒不病癇也兒立夏後有病治之愼勿妄灸不欲吐下但以除熱湯浴之除熱散粉之除熱

赤膏摩之又以膏塗臍中令兒在凉處勿禁水漿常以新水飲之小兒衣甚薄則腹中乳食不消不消則大便皆酢臭此欲爲癖之漸也便將紫丸以微消之服法先從少起常令大便稀勿大下也稀後便漸減之不酢臭乃止藥也凡小兒冬月下無所畏夏月下難瘥然有病者不可不下下後腹中當小脹滿故當節哺乳數日不可妄下又乳哺小兒當令多少有常劑兒漸大當稍稍增之若減少者此腹中已有小不調也便微服藥勿復哺之但當與乳甚者十許日微者五六日止哺自當如常若都不肯食哺而但欲乳者此是有癖爲疾重要當下之不可不下不下則致寒熱或吐而發癇或更致下痢此皆病重不早下之所爲也此即難治矣但先治其輕時兒不耗損而病可速愈凡小兒屎黃而臭者此腹中有伏熱宜微將服龍膽湯若白而酢臭者此挾宿食不消也當服紫丸微者少與藥令內消甚者小增藥令小下皆復節乳哺數日令胃氣平和若不節乳哺則病易復復下之則傷其胃氣令腹脹滿再三下之尚可過則傷矣凡小兒有癖其脈大必發癇此爲食癇下之便愈當審候掌中與三指脈不可令起而不時下致於發癇則難療矣若早下之此脈終不起也脈在掌中尚可早療若至指則病增矣凡小兒腹中有疾生則身寒熱寒熱則血脈動動則心不定心不定則易驚驚則癇發速也

候癇法

夫癇小兒之惡病也或有不及求醫而致困者然氣發於內必先有候常宜審察其精神而採其候也

手肉白魚際脈黑者是癇候魚際脈赤者熱

脈青大者寒脈青細者爲平也

鼻口乾燥大小便不利是癇候

眼不明上視喜陽是癇候

耳後完骨上有青絡盛臥不靜是癇候

青脈刺之令血出也

小兒髮逆上啼笑面暗色不變是癇候

鼻口青時小驚是癇候

閉目青時小驚是癇候

身熱頭常汗出是癇候

身熱吐哯而喘是癇候

身熱目時直視是癇候

喜欠目上視是癇候

身熱目視不精是癇候

目瞳子卒大黑於常是癇候

臥惕惕而驚手足振搖是癇候

臥夢笑手足動搖是癇候

意氣下而妄怒是癇候

咽乳不利是癇候

身熱小便難是癇候

吐痢不止厥痛時起是癇候

弄舌搖頭是癇候

已上諸候二十餘條皆癇之初也見其候便爪其陽脈所應灸爪之皆重手令兒驟啼及足絕脈亦依方與湯直視瞳子動腹滿轉鳴下血身熱口噤不得乳反張脊强汗出發熱爲臥不寤手足掣瘲喜驚凡八條癇之極者也如有此非復湯爪所能救便當時灸之

宋錢乙小兒直訣

急驚風證治

小兒急驚因聞大聲或驚而發搐搐止如故此熱生於心身熱面赤引飲口中氣熱二便黃赤甚則發搐蓋熱盛生風陽盛而陰虛也宜以利驚丸除其痰熱不可用巴豆之藥

註按保嬰集云急驚風之候牙關緊急壯熱涎湧竄視反張搐搦顫動口中氣熱頰赤脣紅脈浮洪數者此肝經血虛火動生風蓋風生則陰血愈散陰火愈熾火動則肺金愈虧肝木愈盛宜滋肝血養脾氣若屢服祛風化痰瀉火辛散之劑便宜認作脾虛血損急補脾土若風火相搏發熱抽搐目瞤筋攣痰盛者用四物釣藤鉤以生肝血清肝火用四君子加當歸以補脾土生肺金若肝經血燥發熱驚搐目瞤筋攣痰盛者用六味丸以滋腎水四君子以補脾土若肺金尅肝木用六君子湯以實脾土加芍藥木香以平肺金若屢服驚藥而脾胃虛寒者須用六君子湯以補脾胃丁香木香以培陽氣否則必變慢驚

慢驚風證治

小兒慢驚因病後或吐瀉或藥餌傷損脾胃而肢體逆冷口鼻氣微手足瘈瘲昏睡露睛此脾虛生風無陽之證也溫白丸主之

註按保嬰集云急驚屢發屢用直瀉則脾損陰消而變爲慢驚者當補脾養血佐以安心清肺制木之藥最爲切當竊謂前證多因脾胃虧損肝木所

勝但用五味異功散加當歸佐以釣藤飲子以補脾土平肝木亦多得效如不應用六君加炮薑木香溫補脾土更不應急加附子以回陽若用逐風驅痰之藥反促其危也每見小兒脾胃弱者一病即成慢驚不可泥爲久病誤藥而後成也內經云爲慢脾風言脾虛受病也其意可見矣

發搐證治

驚癇發搐男則目左視無聲右視有聲女則右視無聲左視有聲相勝故也故有發時之證

註按前證多因胎中受患或乳母嗔怒傷兒或小兒乳傷自病其證吐乳面青若痰實壅積則壯熱面紅當兼調治其母切不可損其元氣若欲驗逆順男則握拳拇指又入食指中爲順於外爲逆女則又入食指中爲逆於外爲順仍忌吮乳不能類以治其母後倣此

若寅卯辰時身體壯熱目上視手足搖動口出熱涎頸項勁強此肝旺也當補腎治肝用地黃丸瀉青丸主之

註按前證若煩熱作渴飲冷便結者宜用瀉青丸若發熱飲溫大便不結者宜用柴芩參苓散若自汗盜汗腎虛液不歸源也用地黃丸若服峻劑或久病流涎脾虛涎不歸源也用六君子湯所云肝旺者乃肝木虛而邪氣旺也故先補其母後瀉其子

若巳午未時發搐心神驚悸竄視睛赤牙關緊急口中流涎手足搖動此心旺也以地黃丸補肝導赤散瀉心

註按前證屬邪氣實而眞氣虛故用地黃丸其流涎不止則爲心火虛而脾土弱也宜佐以六君子湯

若申酉戌時微搐而喘目微斜身似熱睡而露睛手足逆冷大便淡黃肺旺也當用益黃散以補脾導赤散以治心瀉青丸以治肝

註按前證屬脾土眞寒不能生肺氣而假熱故宜用益黃散以補肺金之母如用六君炮薑九效若手足不冷屬虛弱用五味異功散加木香其導赤散瀉青丸初病元氣未虛者酌量用之若久病元氣已虛者必用六君子湯祕旨安神六味地黃二丸主之

若亥子丑時微搐身體發熱目睛緊斜喉中有痰大便白色多睡不省當用益黃散以補脾導赤散涼驚丸以治心

註按前證屬形病虛寒宜用六君子加炮薑溫補脾土用清心安神丸六味丸調補心血潔古張先生云此證皆因大病後脾胃虧損所致其旨明矣若非六君子湯以固本必變慢脾風也

若傷風發搐口中氣熱呵欠煩悶手足動搐當以大青膏發散之

註按潔古先生云傷風發搐當辨有汗無汗用大青膏小續命湯藕謂前證若口中氣熱搐而有力屬形病俱實宜用大青膏以散風邪若口氣不熱搐而無力屬形病俱虛宜用異功散以補脾土六味丸以滋腎水釣藤飲以清肝火若因風邪鬱熱而變見諸證當理肺經清風邪若外邪既解而諸證不愈當實脾土補肺金若徑治其肺恐脾氣復傷諸證蜂起矣

若傷食後發搐身溫多睡或吐不思食者宜先定搐止用白餅子下之後用安神丸主之

註按前證若飲食停滯嘔吐不食嗅脹便祕者屬實熱宜用白餅子下之若下後搐熱益甚嘔吐不食者屬虛熱用異功散補之若脾胃既傷肝木所勝用六君加釣藤鉤以健脾氣平肝木大凡飲下而不愈者但調補脾胃則諸邪自退矣

百日內發搐眞者不過兩三次必死假者頻發不死眞者內生驚癇假者外傷風冷血氣未實不能勝任故發搐口中氣熱用大青膏塗頤浴體二法

註按前證多因胎中受患或乳母鬱怒傳兒或兒脾傷自病當固元氣爲主而兼調治其母仍參吮乳不能類治之後倣此

小兒初生壯熱吐哯身體強直手足抽掣目反直視是胎驚風證也

註按前證多因娠婦忿怒驚恐調攝乖常或挾外邪內傷於胎蓋母有所觸胎必感之當用猪乳膏拭兒口中或用惺惺散加漏蘆令母煎服使藥通乳中兒病自愈矣

驚啼者邪氣乘心也當以安神主之

賈漢卿痙瘍全書云驚哭有淚是肚腹痛用蘇合香丸酒服良

註按哭而不啼多泪是驚悸也啼而無淚是痛也若因心血不足用祕旨安神丸心火熾盛用導赤散木火相搏用柴胡梔子散肝血不足用六味丸

所云十啼者蓋亦大同小異耳

癲癎證治

凡治五癎皆隨臟治之每臟各有一獃之形並用五色丸治小病也發而重者死病甚者亦死若反折上竄其聲如犬證屬肝也若目瞪吐舌其聲如羊證屬心也若目直腹痛其聲如牛證屬脾也若驚跳反折手縱其聲如雞證屬肺也若肢體如屍口吐涎沫其聲如猪證屬腎也

註 按姙娠若遇驚恐則必內應於胎故一月足厥陰脈養驚則肝受病二月足少陽脈養驚則膽受病三月手少陰脈養驚則心受病四月名爲離經五月足太陰脈養驚則脾受病六月足陽明脈養驚則胃受病七月手太陰脈養驚則肺受病八月手陽明脈養驚則大腸受病九月足少陰脈養驚則腎受病是臟腑納氣於丹田自肝至腎十經滋養而生此則胎中所致也若既生之後或驚怖所觸或乳哺失節或乳母飲食起居六淫七情臟氣不平亦致是證須察見證屬於何經更別陰陽虛實寒熱緩急以調補脾胃爲主否則不時舉發甚至不救

金劉完素六書

驚風

小兒驚風潮搐手足掣縮用驗命散吐之

身熱惡寒戰慄驚惑皆屬熱證爲少陰君火暴強直支緩戾裏急筋縮也皆屬風證爲厥陰風木夫小兒六歲之上爲小兒十八歲已上爲少年其六歲已下者諸經不載是以乳下嬰兒有病難治無可定也然小兒與大人不可一例各異治之雖小兒誕生稚稼之後骨肉脆軟腸胃細微可以乳食調和臟腑乃得平安肌膚滋潤筋骨輕嫩以綿衣之故生壅滯內有積熱乘於心心受邪熱乃發爲驚驚不止返爲潮搐則爲病也大槩小兒病者純陽熱多冷少

註 素問驚駭驚愕少陰君火也

小兒驚風者皆由心火暴甚而制金不能平木故風火相搏而皆冒驚悸潮熱此證皆謂熱甚而風生張從政儒門事親

驚風

戴人常曰小兒風熱驚搐乃常病也常搦時切戒把捉手足握持太急必牢身不遂也氣血偏勝必瘨其一脊漸成細瘦至老難治當其搐時置一竹筒鋪之涼地使小兒寢其上待其搐風力行徧經絡茂極自止不至傷人

發驚潮搐

小兒三五歲時或七八歲至十餘歲發驚潮搐涎如搜鋸不省人事目瞪喘急將欲死者內經曰此皆得於母胎中所授悸惕怕怖驚駭恐懼之氣故令小兒輕者爲驚弔重者爲癎病風搐爲腹中積熱爲膽風已上證候可用吐涎及吐之藥如吐乾宜用朱犀腦麝清涼墜涎之藥若食乳之子母亦宜服安魂定魄之劑定志丸之類如婦人懷孕之日大忌驚憂悲泣縱得子必有諸疾

慢驚

小兒內瀉轉生慢驚及兩目直視魚口出氣者亦不宜下止宜調養溫以和之

元羅天益衛生寶鑑

急慢驚風

小兒急慢驚風者古無之惟曰陰陽癎所謂急慢驚者後世名之耳正如赤白痢之類也陽動而速故陽病曰急驚陰靜而緩故陰病曰慢驚此陰陽虛實寒熱之別治之不可誤也急驚由有熱熱即生風又或因驚而發則曰爲連劄潮涎搐搦身體與口中氣皆熱及其發定或睡起即了了如故此急驚證也當其搐勢漸減時與鎮心治熱之劑一二服候驚勢已定須臾以藥下其痰熱利下痰熱心神安寧即愈慢驚得於大病之餘吐瀉之後或悞取轉致脾胃虛損風邪乘之似搐而不甚搐此名瘈瘲似睡而精神慢四肢與口中氣皆冷睡中露睛或胃痛而啼哭如鴉聲此證已危蓋脾胃虛損故也

李杲十書

治小兒驚論

外物驚宜鎮心以黃連安神丸若氣動所驚宜寒水石安神丸大忌防風丸治風辛溫之藥必殺人何也辛散浮溫熱者火也能令母實助子之氣盛皆殺人也因驚而泄青色先鎮肝以硃砂之類勿用寒涼之氣大禁京驚丸風木旺必克脾胃當先實其土後瀉其木閻孝忠編集錢氏方以益黃補土慢炙其藥有丁香辛熱助火火旺土愈虛矣青橘皮瀉肺金丁香辛熱大瀉肺與大腸脾實當瀉子今脾胃虛反更瀉子而助火重虛其土殺人無疑矣其風木旺證右關脈洪大掌中熱腹皮熱豈可以助火瀉金如寒水來乘脾土其病嘔吐腹痛瀉痢青白益黃散聖藥也今

立黃芪湯先瀉火補金大補其土是爲神治之法
朱震亨平治會萃

急慢驚風

發熱口瘡手心伏熱痰熱痰喘痰嗽並用涌法重則用瓜蒂散輕則用苦參赤小豆末須酸醋汁調服吐之後用通聖散蜜丸服之
驚有二證一者熱痰主急驚當直瀉之一者脾虛乃爲慢驚所主多死當養脾
東垣云慢驚者先實脾土後散風邪
急者只用降火下痰養血
慢者只用硃砂安神丸更於血藥中求之
幼科全書

驚風

驚自是驚風自是風最要分別得明白不可混治驚者因見非常之形異類之物或因爭鬬或因跌仆或水火或禽獸之類以致驚其神氣結于心而痰生焉痰壅氣逆結成搐搦口眼喎斜口吐涎沫一時卽醒如常無事或一日一發或一日再發或三五日一發或一月一發或半年一發若不急治變成癇疾則爲終身之病疾也治法當先利痰順氣後用清心安神
風者或因外感風寒或因內傷飲食以致熱生于內因熱生痰因痰生搐其狀口眼喎斜手足牽動氣喘涎潮口吐涎沫發過略醒潮熱不退須臾復發治法當先瀉火開痰後用清熱安神
驚風有二有急有慢急驚風爲實爲熱當用凉瀉慢驚風爲虛爲寒當用溫補不可一例混治恐致悞人
急驚風者小兒元氣素實或因恐怖或因風寒或因傷飲食而致要詳審明白先察其證而後施治法
如曾因恐怖而成驚者其證發過卽如常若無他病先以利痰丸順氣開痰後用安神丸調之
如因風寒而成風者其證發過略醒須臾復發輕者只用導赤散一服而風卽止後用凉驚丸抱龍丸調之重者痰涎壅閉先以導赤散吞下五色丸降火却痰次以導赤散吞下瀉青丸以瀉心肝之火後以抱龍丸治痰保命丹治風緩緩調之
如曾傷飲食而成風者其證發過略醒醒多啼哭須臾復發不思乳食先用陳皮麥牙煎湯吞下五色丸推去食則痰自降後用辰砂五苓散治之
凡治急驚法除傷飲食一證外不可遽用下藥必先問其大小便如何若小便清大便通其邪在表只用導赤散加防風或瀉青丸去大黃加全蠍作湯服之發去表之寒邪其風自退後以辰砂五苓散調之不可犯麝香恐引邪入裏也若果小便赤澀大便閉結此邪在裏可用五色丸下之後用牛黃清心丸抱龍保命丹調之
凡急驚喘急痰氣者定喘湯加竹瀝治之
凡急驚風涎痰壅塞不開者可用吐法
凡病退後潮熱不退此脾虛熱也四君子湯加炒乾薑治之若小便赤大便硬兩腮紅足脛熱者此餘邪未盡不可作虛看用凉驚丸并牛黃清心丸薄荷燈心湯調之
凡熱退後昏睡不醒者此心脾二經之邪未盡去也安神丸加鬼神丹治之
凡小兒但有微熱觀其兩頰若赤雙目上視者必作驚風也當先以導赤散加燈心薄荷以去其熱次用抱龍丸以安其神則風自不作也
凡驚風之時手散眼閉口張顎陷魚口氣急吐沫噴藥昏不語不啼口噤絕不飲食遺尿失屎面赤如粧者皆不可治
慢驚風小兒胎稟氣弱又多疾病或大吐大瀉久瘧久痢或悞服吐瀉之藥皆致精神虛弱漸成搐搦十無一痊蓋由元氣虛弱又逢恐怖而成也
其證發過卽如常但多啼哭睡中不寧不可妄用利痰之藥先以青州白丸子加青礞石以去其痰次服安神丸以四君子湯送下調之如吐瀉大病之後手足逆冷昏睡目睛微露而無搐掣者此欲成慢驚風證也急溫補之四君子湯加酸棗仁炒乾薑炮大棗作引水煎頻服以手足溫爲度其者加熟附子一片愈後以集聖丸調之
凡治慢驚風不可妄用辛香之藥寒凉之劑蓋辛香能走瀉元氣寒冷反傷脾胃故也
凡吐瀉後手足厥冷吐瀉不止口舌生瘡閉目無魂口張不合髮直搖頭汗出如油昏睡氣急喉中涎響哭作强聲大小便不禁眼上瀉角弓反張頭軟手足一邊牽引者皆不可治
凡咳嗽久日閉神倦面白手搖者不治
凡瘡疥忽平復腹脹氣急悶亂者不治
如小兒夜多啼哭目精上斜日則略定者此內鈞驚也蓋因受寒氣腹中作痛以致痛極目定治法以燈心燒灰調滾白水化下理中丸痛止病退
如小兒日夜啼哭目視物不轉者身後仰者此外鈞

驚也蓋因食積作痛其身强直面赤目定治法以瀉心土炮滾白水送下丁香脾積丸痛止病退

如小兒肺脹喘滿胃腸氣急兩肋扇動陷下作坑兩鼻竅張悶亂咳嗽作瀉聲嘔痰涎壅塞大小便閉此爲脾風也若不急治或治不識證死在旦夕宜先用牛黃奪命散治之後用白虎湯調之

如小兒忽然氣急痰嚮口眼如常手足不搐身上無熱此乍傷風寒肺經受邪也用芎蠍散一服卽止

如小兒兩手輪指目睛直視者此白虎證也但身不發熱手足不掣耳冷法宜向本年白虎方上取土泡滾白湯吞下蘇合香丸散

如小兒痘發驚者只用導赤散調辰砂末一服卽效不可妄用凉驚抱龍保命等藥

西江月

小兒驚風證候須分急慢根由急爲實熱瀉凉求慢是虛寒溫補急因風寒食積慢因久病綢繆如斯辨認不差繆纔顯神功妙手

急驚卒然大熱因而熱則生風痰涎壅塞角張弓口眼歪斜沉重先用噓驚妙散後將導赤疏通合灸少商與中衝瀉青凉驚選用

慢驚先因大病精神頓減脾虛慝沉困氣長吁口眼開張不乳搐搦時時發舉四肢逆冷何如理中附子急驅除不瘥艾燒左乳卽胸門穴

若屬風寒外感先須發汗爲宜瀉青丸子作湯醫加上蠍蠶二味果是內傷飲食又當解利相隨三黃五色任施爲積去熱除驚止

要識驚風死證面如紅粉塗搽口張涎出緊關牙髮直氣粗聲啞喉內嚮如拽鋸毛端汗似珠般目瞪眼小不堪涛大叫悶亂由怕

拘掣乍作乍止痰氣無了無休昏昏睡喚何蘇藥食不知吞吐尿屎遺時少覺四肢僵直難收啼聲潮熱汗如油縱有靈丹難救

明方賢奇效良方

驚風搐搦不治證

如驚風搐搦略定精神如常神思不改卽是躁冒煩躁不安須急急調理稍緩則不及事亦懼不療須要兩眼鮮明爲吉其餘難療之證須詳細審察

驚風搐搦兩眼不開不治

驚風定了兩眼亦開不得不治

叫不出說不得更不唧聲不治

驚風連搐不止不治

手捺胃腑及咽喉間不治

口中不時吐出鮮血不治

吐不出者不一月死

信門腫起紅青脉交橫見不治

大便瀉紫血黑血不治

信門如坑陷青脉現不治

驚風搐動連日不下不治

尋常無事時嗆口嗆眼連日搐動不治

痰涎滿口咽喉間如解鋸不治

痰涎如水雞聲乃二氣爭不治

聲音不出口不治

驚風治證

諸方書所載急驚風易治慢驚風難治此古今之通論也意之度之出自至人傳授別是一宗機杼精思其訣錄方術眞神仙之妙旨也有若小兒受病之原卽驚風寒暑痰食各有由屬若治療之法迥出一人頭地如寒屬膀胱驚熱屬心風屬肝痰食屬脾胃究湯氏幼幼之說驚風痰常相繼於表裏大要察其部位脈色燭見其病之底蘊克時獲效矣

驚

脈在顖門額上印堂三處

紅嫩則初驚方熱

紫脈則重驚而熱

顖門屬腎

髮際屬膀胱

印堂屬心

顖門先紅及印堂青此心之微邪淫水

顖印皆紫紅此同前上證皆輕

顖門青及印堂紅此腎之正邪寇心火必危

顖印皆青同上證病危

如加之左太陽上紅傷風內熱

日角紅至眉中髮蒸兩熱生驚

左太陽紅食了乳母傷風乳汁

右太陽紅青喫乳母傷寒乳汁

風

脈看左太陽及風池

左太陽與風池紅風邪輕青受風邪重

左太陽屬膀胱

左太陰屬腎

左風池屬肝

右風池屬命門
加之左太陽紅傷風初熱
左太陰紅感寒初熱
左文臺紅熱有五七日傳經了
左太陽紫傷風再受
左太陰紫傷寒再得
左文臺紫二四次熱
右文臺紫久熱不退
左太陽青風變蒸
左太陰青生驚了
左文臺青再傳經熱不解
印堂紅生風熱生驚

痰

右太陽屬三焦
右太陰屬脾
右文臺屬肺
右武臺屬胃
右太陽紅青喫母威冒熱妳
印堂青右太陰青右文臺青此三處主痰與食
印堂紅心熱生痰
印堂青黑主胎中驚痰飲
印堂紫主有熱痰
印堂青黃主有風痰
右太陰青紫傷寒夾風熱妳
左太陰青傷寒妳

食

右太陰青及文臺青武臺青皆是食

如食傷因飽食不節或爲冷硬之物或油膩之物致令頭疼發熱嘔吐宿食肚疼如傷在腸上痞塞者藜蘆散吐之停於肚中嘔吐肚疼宜用三物湯瀉之有滯食緣胃弱尅化不迭心胃滿閉肚疼與化鐵丸消食二陳湯快膈有中食因其兒脾胃怯常有停飲或食飽傷飲滯而不化痞塞三焦如驚風搐搦或迷悶而不省似夢如醉神思昏亂發熱全是丸主之

五癇

五癇爲病癈手足或一手一足或兩手兩足如癱不隨或哽眼或哽口或口喎牽引頻事
食癇爲病傷肉食手足搐動角弓反張或拳攣或張狂大聲如羊如犬大叫吐出飲食方定其飲食盡被痰涎包裹在其中
驚癇爲病癈頭目弔口目或一目雙目或昏或肯或邪視或頭喎或搖頭或戰腦
痰癇爲病此患似張狂作之不常或半年一作或一年或一月或一日一次或一日三次一身驚搐不癈手足不癈頭目其人張狂如夢中如半醉燈下不知人皆從夢寐中作所以無常也忽耳不能聞目不能視如狂
飲癇爲病此患喫食不知飽忽然連三五日不甚思食手足搐動多自夢寐中食太飽亦便發作

瘧

若瘧病如寒邪中得患者十有九死
又熱溫病及中暑發患熱者十無一生
頭疼發熱頸項強硬不能回顧搖頭口噤問之全不應人漸漸角弓反張痰在咽喉響者死仲景瓜蔞葛根湯小續命湯入麝局方大防風湯主之且小方脈著書立方者一百餘家各有所長惟錢氏比諸家優於切脈後之學者熟讀玩味治嬰孩之疾則百發百中矣
萬氏幼科發揮

驚

急驚風者肝風甚而心火從之木生火從前來爲實邪實則泄之宜用瀉青丸以瀉肝之風導赤散以瀉心之火
慢驚風錢氏云脾虛則吐瀉生風此脾土散而肝木乘之肝屬木而脾屬土從所不勝來者爲賊邪故慢驚爲難治也脾虛生風虛則補之東垣用調元湯加白芍主之此以黃芪人參補脾之虛白芍藥甘草以瀉肝之實誠千古不傳之祕法也予加桂在內乃黃芪建中湯木得桂而枯古方治慢驚者如醒脾散蜈蚣散皆良法也可用之
或問曰上工治未病急慢驚何以預治之曰方其熱甚之時顋紅面赤兩目如怒直視不轉者此驚風之似也宜服河間當歸龍薈丸以瀉肝膽之火則不成急驚風也當吐瀉不止之時見其手足冷睡露睛口鼻氣出冷者此慢驚風欲成之似也急用參苓白朮散以補脾琥珀抱龍丸去枳殼根實加黃芪以平肝則慢驚不能生矣此吾家傳祕法
驚後其氣不散鬱而生痰痰生熱熱生風如此而發搐者陳氏所謂氣逆而作搐而發驚者是也此驚風二字所以不同
凡因驚而發搐者此心火肚而肝木乘之宜先止其

搐導赤散作湯吞下河間當歸龍薈丸後安其神錢氏安神丸主之有痰遶塞塞者先降其痰辰砂膏主之次止其搐後安其神

急驚風屬陽病在六腑易治宜用凉瀉

慢驚風屬陰病在五藏難治宜用溫補

或問病有急慢陰陽者何也曰肝主風木也亂擊急疾莫甚于風心主驚火也暴烈飛揚莫甚于火木火陽也故病在于心肝者謂之急而屬陽脾胃者土也沉重遲滯莫甚于土脾土者至陰之屬也故病在于脾者謂之慢而屬陰肝常有餘有餘則瀉而損之脾常不足不足則補而益之至於心主驚肝主風似宜前論然火資風勢風賚火威相扇而發搐故不可別論也驚風之病有兼證有類證者不可不辨也

急驚風有三因

有外因者如感冒風寒溫濕之氣而發熱者宜即發散之和解之以除其熱可也苟失而不治熱甚發搐此外因之病也宜導赤散瀉青丸主之

有內因者如傷飲食發熱者即宜消導之下之如保和丸三黃枳朮丸之類以除其熱可也苟失而不治熱甚發搐此內因之病也當視大小便何如如大便不通先去其宿食宜木香檳榔丸及賁導法大便潤宜辰砂五苓散琥珀抱龍丸主之

有不內外因者如有驚恐或客忤中惡得之驚心藏神驚有傷神腎藏志與精恐有傷腎經云隨神往來謂之魂幷精出入謂之魄故神傷則魂離精傷則魄散小兒神志怯弱猝有驚恐所以精神潰亂魂魄飛揚氣逆痰聚乃發搐也客忤中惡出其不意大人且驚況小兒乎宜先去其痰辰砂膏主之後安其神琥珀抱龍丸主之有熱者東垣安神丸下痰之藥慎勿用輕粉巴豆之類恐傷元氣損脾胃誤殺小兒

驚後

搐後成癱瘓者左氏謂風淫末疾是也肝主筋肝熱則筋弛而長長則軟弱手足伸而不能屈矣肝寒則筋縮而短短則拘攣手足屈而不能伸矣並宜六味地黃丸主之拘攣者加附子肉桂軟弱者加黃蘗知母當歸牛膝續斷蜜丸服之

驚風後瘖不能言宜六味地黃丸加巴戟遠志石菖蒲

痢

蓋心藏神驚則傷神腎藏志恐則傷志小兒神志怯弱有所驚恐則神志失守而成痢矣如書傳所謂請僧寄名僧爲摩頂誦呪兒被嚇而成痢後見穿皂衣人即發是也亦有驚久成痢者初起即可治定志丸主之父母怠忽久而不治遂成終身之患

天釣內鈎

天釣內鈎足厥陰肝經之脈起足大指而上環陰器左交右右交左上入小腹下會督脈循脊貫過而上至于巔如風傷肝則發天鈎其狀眼上翻頭項向後仰身反折渾如角弓之狀錢氏云肝有風甚則角弓反張者是也天釣屬木宜發散瀉青丸中去大黃加天麻全蠍殭蠶釣藤

內鈎者肝受寒則小腹痛大叫哭日直視但不搐耳宜急溫其內當歸茱萸湯及木香丸

或問天釣內鈎病症盤腸屬何臟何以辨之曰經云身半已上天氣主之身半已下地氣主之故天鈎在上生於風熱宜發之內鈎在下生于寒宜溫之二鈎者皆足厥陰之脈外則與督脈同行循脊而上入于巔之頂所以病則目上翻背後仰如角弓之反張也內則循陰氣而入于小腹所以病則小腹切痛爲囊腫也諸風掉眩皆屬肝木故二鈎皆有搐掣似驚但天鈎或哭或笑內鈎則多啼爲異耳痙病屬足太陽膀胱經上起兩目上頭循頂而下行手背循腰而下于是與厥陰之脈下行者同所以角弓反張之證亦相似也但天鈎有搐掣而痙病無搐掣也盤腸痛屬手太陽小腸經內行于小腹與厥陰之脈內行者不同所以小腹忽痛也但內鈎有痕癍而盤腸痛無痕癍可辨也

育嬰家秘

天釣內鈎

一天鈎似癎天鈎者壯熱驚悸眼目亂騰手足搐掣或哭或笑喜怒不常甚者爪甲皆青如祟之狀此肝病也但不睡臥耳宜解利風邪則愈鈎藤散主之

一內鈎似癎內鈎者腹痛多啼唇黑囊腫傴僂反張眼內有紅筋斑血者此肝病也但不昏困耳乃受寒氣所致先是內臟抽掣極痛狂叫則泄瀉縮脚腸痛而啼內鈎一過外證抽掣又來內外交攻極難調理須分內外用藥治之內鈎甚者宜乳香膏主之

按天鈎內鈎二證百日內小兒多有之此二者皆肝之病也蓋厥陰肝經內行于小腸外行于背故外感風熱則爲天鈎內傷寒冷則爲內鈎故曰天鈎者陽也內鈎者陰也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百四十六卷目錄

醫部彙考四百二十六

小兒驚癇門二

魯伯嗣學嬰童百問 發搐 急驚 慢驚 脾風 急慢脾風下痰輕重 驚癇 驚風 天釣內釣

虞摶醫學正傳 急慢驚風論

王綸明醫雜著 小兒病多屬肝脾二經 急驚 急驚變慢驚 慢驚 小兒用藥不宜峻厲 慢後目動咬牙 出痘發搐 驚搐宜忌 誤用變斜

薛氏保嬰撮要 肝臟 急驚 心藏 發搐 慢驚 驚癇 驚搐口噤 目直 鼾咬牙 睡中驚動 天釣內釣 驚風痊 搐頭便血

龔信古今醫鑑 驚風不治者八候

樓英醫學綱目 急驚 癇症

徐春甫古今醫統 驚風候各有所屬

藝術典第四百四十六卷

醫部彙考四百二十六

小兒驚癇門二

明魯伯嗣學嬰童百問

發搐

凡急驚欲發先看握拳指內陰順指外陽順男左女右搐須令全用藥通關大忌悶涎入肺逆入心經不能語言即與凉心鎮驚下痰藥始安如逆搐者便不可救若因吐瀉後變證却難調治大凡此證要看握拳順逆若搐順則易調理搐逆恐其復潮先用通關勝撚兒保命丹省風湯後用疏風化痰退熱等藥便可無事又有驚風搐搦吐瀉多啼急搐眼後有淚面紅則難痊愛哭心中聚涎臉有紅筋乃是癇疾指亂青紋疾病又傳下驚風驚風鎮墜太過風疾不散與氣相逆搐不能定當下轉氣疏風藥溫膽湯加酸棗仁丈服省風湯化蘇青丸又有急驚偏搦面青背冷男左女右不妨男右女左難治如手心冷汗搐唇搖肚終日終夜不定者名眞搐兩肩都動此乃掣證不惟定搐亦要順氣當下參湯平其胃氣却進川烏全蝎等藥并順氣藥亦要斡旋仲陽論傷風後發搐若傷風後得之口中氣出熱呵欠煩悶手足動搖當發散大青膏主之傷食後發搐若傷食後得之身體溫多睡多唾或吐不思飲食而發搐當先定搐搐退白餅子下之後服安神丸又百日內發搐眞者不過三兩次必死假者頻發不爲重眞者內生驚癇假者外傷風冷蓋血氣未實不能勝任乃發搐也欲知假者口中氣出熱也治宜發散大青膏主之仍用塗顖浴體法珍珠丸下痰卽定有熱不大便者七寶洗心散竟熱散下之卽效却用祛風定搐天麻防風丸龍齒散釣藤散等劑調理有熱疳疥或不語防風通聖散大連翹湯皆可服

急驚

急驚者小兒熱痰客於心胃因聞聲非常則動驚搐矣若熱極雖不因聞聲及驚亦自發搐急驚之候牙關緊急壯熱涎潮氣視反張搐搦顖開者十指開合動脣口眉眼眨引頻并口中熱氣頰赤脣紅大小便黃赤其脈浮數洪緊蓋由內有實熱外挾風邪心經受熱而積驚肝經生風而發搐治法大要用藥有序通關以後且與截風定搐痰熱尚作乃下之痰熱一洩又須急與和胃定心之劑如搐定而痰熱少者則但用輕藥消痰除熱可也蓋急驚須當下切不可過用寒凉及銀粉巴硝輩蕩滌太驟此等重劑醫家不得已而用之僅去疾卽止或不當用而用或當用而過爲往往由此而成慢驚矣此證亦用搐鼻通關打噴涕牙關開後用疏風化痰退熱藥導赤散柴胡天麻等劑便可無事琥珀散通治諸經驚狂之要藥至寶丹亦可服

慢驚

凡慢驚之候或吐或瀉痰鳴微喘眼開神緩睡則露睛驚跳搐搦乍發乍靜或身熱身冷四肢熱口鼻冷氣面色淡青或眉青脣青其脈沉遲散緩蓋由急驚過用寒凉或轉下太驟傳變成之又有吐利不止而成者有氣虛暴吐瀉而成者有臟腑虛洞泄而成者有久利氣脫而成者有取瀉下積而成者有吐血下血而成者有感風不解傷寒傳變而成者有久嗽作癇不已者有蟲積衝心者有疳氣腹痛者或日夜汗出脾困多睡煩躁引飲四肢浮腫大小便閉丹癍腫毒龍帶纏腰走馬急疳並傳慢候惟吐瀉積利成虛致之則最變甚速治法須當審問源流不可一槩用藥曰慢候如吐瀉得之則理中湯加木香以溫其中五苓散以導其水如臟寒洞洩得之則先與木附湯下積取轉得之則先與調氣散調和脾胃如外感風寒則可與桂枝湯葛根湯輩其他可以類推然

慢驚難屬陰亦須準較陰陽虛盛淺深如何不可純用溫藥及燥烈大熱之劑惟於生胃氣中加以截風定搐如全蠍花蛇殭蠶白附天麻南星輩爲良方傳慢候而尚有陽證者不必回陽但與截風調胃可冷可熱惟均平陰陽而已太乙寶生丹聚寶丹蟬蠍散神寶既濟丹來復丹王氏惺惺散醒脾散大醒脾散溫白丸可選而用之若陽虛陰盛病已傳過純屬慢驚無搐掣反引窟視之證而但昏沉者與星香全蠍散定命飲子四聖散烏蠍四君子湯天南星散烏沉湯沉香散之屬若手足冰冷者方可回陽用硫黃附子慢驚下痰身緩者天南星丸蘇合香丸白丸子痰盛者神寶既濟丹礞石散虛甚不可下痰者臺脂丸七珍丸如腦麝巴霜寒凉通關利膈之輩一切禁止如未發慢驚先要睡吐舌搖頭面青毛髮豎吐乳作腥額上有汗此證乃吐後胃虛生風當下截風醒脾散或四君子湯加全蠍防風銀白散或釣藤飲去麻黃更宜多方早變藥餌不可輕忽又有慢驚正發洩瀉吐乳冷汗雙眼閉唇紅舌出搖頭髮直兩脅動心悶氣粗口瘡當用南星末貼脚底心常進參湯尤好

少間口瘡不納乳食名曰鎖腸却難救凡小兒病證見口如魚口作鴉聲者不治聖濟經有琥珀丸南星煎等劑皆可服論曰心藏神而惡熱小兒體性多熱若感風邪則風熱搏於腑臟其氣鬱憤內乘於心令兒神志不寧故發爲驚若驚甚不已則悸動不寧是爲驚悸之病紫金散牛黃散大丹砂丸治之其急驚則有龍齒散巨勝散等劑可選而用之

脾風

慢脾風之候面青舌短頭低眼合不開困睡中搖頭吐舌頻嘔腥臭噤口咬牙手足微搐而不及收或身冷或身溫而四肢冷其脈沉微陰氣極盛胃氣極虛十救一二蓋由慢驚之後吐瀉損脾病傳已極總歸虛處惟脾所受故曰脾風若逐風則無風可逐若療驚則無驚可療但脾間痰涎虛熱往來其眼合者脾困氣之神志沉迷痰涎凝滯然爾世所謂慢風難療者慢脾風是也然慢脾風一名虛風凡小兒或吐或瀉之後面色虛黃大勢虛損若因虛而發熱繼此必得慢脾風纔見搖頭直視以手摸人昏困喜睡額上汗多身亦黏汗其聲沉小而焦卽是脾風之證不必皆由急慢傳風治法大要生胃回陽黑附湯川烏散金液丹白丸子各一半生附四君子湯可斟酌胃氣漸復則異功散輩溫平而調理之如蠍附散陰痫散等亦可參用若其眼半開半合手足不冷證候尚在慢驚則不必用回陽或已入慢脾而陽氣未甚脫者亦不可用硫黃附子丸服回陽湯劑手足漸煖者仍用醒脾散等繼其後以調之不可輕易用極劑也

急慢脾風下痰輕重

慢驚下痰輕者神寶既濟丹白殭蠶丸重者神砂膏甚則七寶妙砂丹炙慢脾慢風驚逆惡證候諸藥不效者如有太衝脈則取百會穴灸之此治慢脾風之大要然也急驚亦下劑有三輕下則用定命丹利驚丸防風湯宣風散枳殼散小柴胡湯輩重下則用青金丸天麻丸蘆薈散牛黃凉膈丸青金丹王監京墨丸輩稍重下則用揭風湯朱砂膏疏風散柴胡加大黃湯輩下之後宜和氣助胃如生氣散銀白丸茯苓

二陳湯異功散天麻蘇合香丸麥苓白术散和中散醒脾散之類皆可選用凡急驚眼睛翻轉口中出血兩足攣腹肚搐摸體循衣氣促噴藥口中痛絕大叫者難治慢驚四肢厥冷吐瀉咳嗽面黑唇慘鴉聲兩脅動氣口生白瘡髮直搖頭眼睛不轉涎鳴喘噎口眼手足一邊牽引者難痊慢脾身冷黏汗直臥如尸喘嗽頭軟大小便不禁口噤頭搖者最難爲力若急驚甚者服鎮心丸化痰鎮心丸或金箔鎮心丸亦可服珍珠丸下痰亦效熱甚大便閉者寬熱散下之可也

驚癇

發癇者小兒之惡病也幼小血脈不斂骨氣不聚爲風邪所傷驚慴所觸乳哺失節停滯經絡而得之其候神氣怫鬱瞪眼直視面目牽引口噤涎流腹肚膨脝緊手足搐掣似生似死或聲或默或項背反張或腰脊强直但四肢柔軟發而時醒者爲癇若一身强硬終日不醒則爲痙痙矣癇曰五癇病關五臟面赤目睛吐舌噛齒心下煩躁氣短息數者曰心癇面唇俱青其眼上竄手足拳攣抽掣反折者曰肝癇面黑而晦振目視人口吐清沫不動如尸者曰腎癇面如枯骨目白直視驚跳搖頭口吐涎沫者曰肺癇面色痿黃眼睛直視腹滿自利四肢不收者曰脾癇此五臟之證然也調理之法惟以驚風食三種陰陽二證別而治之風癇者汗出解脫風邪乘虛其初屈指數而有熱生痰是也驚癇者震駭恐怖打墜積驚其初驚叫大啼恍惚失魄是也食癇者食時得驚停宿結澼其初吐乳不哺大便酸臭或結成乳癖先寒後熱是也別之以陰陽始者身體有熱抽掣啼叫是爲陽癇

陽病脈浮面色光澤病在六腑肌膚此猶易愈始者身體無熱手足清冷不抽掣啼叫是爲陰癇陰病脈沉面色黯晦病在五藏骨髓此最難痊或以仰臥屬陽覆臥屬陰亦可參驗蓋陽證不可用寒風癇先爲之散風驚癇則爲之利驚食癇則先爲之消積續以定癇等劑主之大概血滯心竅邪氣在心積驚成癇通行心驚調和心血順氣豁痰又其要也總令小兒有熱有痰不欲乳哺眠睡不安時常驚悸此皆發癇之漸即以紫霜丸導之時間量與紫霜丸減其盛氣則無驚風癇釣之患其證方萌耳後高骨間必有青紋紛紛如線見之急爲抓破須令血出啼叫尤得氣通溺濯兒衣不可夜露恐爲無辜鳥羽糞所落汙染未有不爲癇也挾邪慳者其色變易不常見人怕羞諸癇痞不能言者蓋咽喉爲氣之道路風傷其氣以掩其道路之間抑亦血滯於心心竅不通所致耳南星調雄豬膽汁少許名星蘇散啖之輒效若錢氏五癇丸井南星散以菖蒲煎湯調下甘遂猪心湯以和蘇合香丸皆治癇之要藥也故表而出之許叔微治小兒顯癇欲發眼暗瘛瘲聲惡嚼舌雌黃丸主之治風癇宜服薄荷散有熱宜服細辛大黃湯又有蛇黃丸養生必用方斷癇丹散風丹保安丸獨活湯牛黃丸比金膏虎睛丸七寶鎮心丸清神湯蜜陀僧飲食癇通用妙聖丹天麻丸斷癇丸當歸大黃湯蝎虎散代赭石散日應丹地龍散全蠍五癇丸星硃散可選而用之輕者化風丹亦可服

驚風

驚者虛惕怔忡氣怯神散痰涎來去其瀉必青漸生風而未至風也驚邪入心則面紅臉赤惕惕夜啼驚邪入肝則面目俱青眼睛竄視驚邪入腎則面黑惡叫嗌奶咬牙驚邪入肺則面目淡白喘息氣乏驚邪入脾則嘔吐不食虛汗多睡面色淡黃據脈觀之虛則散而濡實則數而駛治法鎮驚化痰安神定志亦須究竟何藏受病之處而調理之然有所謂溫驚有所謂利驚有所謂涼驚虛者溫之實者利之熱者涼之是謂治法睡中驚啼聲浮者易治沉者聲不響難痊又有驚積者受驚日久積而成之其狀額上有汗喘息煩渴潮熱往來肚腹有熱睡中覺腹中有物跳動瀉下如白脂豆沙是也治法量輕重而疏導之仍與調氣和胃取愈大凡小兒腹中或熱或脹或硬皆爲內實法當疏利辰砂膏青龍丸主之凡疏利之劑皆可隨證用之熱甚心經煩渴者至寶丹解之羌活散防風導赤散蟬蛻釣藤飲天麻丸等劑皆可服大便祕澀者七寶洗心散加辰砂治之大小便不利者神芎丸寬熱散極效輕者化風丹可服安神丸亦效

天釣內釣

天釣者蓋由乳母酒肉過度煩毒之氣入乳乳兒遂使心肺生熱痰鬱氣滯加之外挾風邪致有此耳治法解利風熱則愈又有內釣者蓋寒氣壅結兼驚風而得之經云內釣當高時復漸安耶尾紅脈見是也此乃胎中有風有驚故有此證先是內臟抽掣極痛狂叫或泄瀉縮脚忍疼啼叫內證一過外證抽掣又來內外交攻極難調理却要分作二項下藥內證服聚寶丸釣藤骨魂香散外搐服釣藤飲保命丹最要進得乳可以加得小兒受此病間有好者楊氏乳香丸木香丸皆要藥也

虞摶醫學正傳

急慢驚風論

內經曰諸風掉眩皆屬肝木夫小兒八歲已前曰純陽蓋其眞水未旺心火已炎故肺經受制而無以平木故肝木常有餘而脾土常不足也爲父母者有失於保養其或衣服寒暄不調以致外邪侵襲或飲食饑飽失節以致中氣損傷是故急慢驚風之候作矣夫惟急驚屬肝木風邪有餘之證治宜清凉苦寒瀉氣之藥慢驚屬脾土中氣不足之候治宜甲和甘溫補中之劑若夫急驚之候因聞不常之聲或遇驚馬禽畜之號以致面青口噤或聲嘶而厥發過則容色如故良久復作其身熱面赤引飲口鼻中氣熱大小便黃赤色惺惺不睡蓋熱甚則生痰痰甚則生風偶因驚而發耳宜用錢氏利驚丸瀉青丸抱龍丸宜風散五福化毒丹等藥慢驚之證多因飲食不節損傷脾胃以致吐瀉日久中氣大虛而致搐發則無休止時其身冷面黃不渴口鼻中氣寒大小便青白昏睡露睛目上視手足瘈瘲筋脈拘攣蓋脾虛則生風風盛則筋急俗名天弔風者即此候也治宜東垣黃芪湯錢氏釣藤丸溫白丸丹溪參朮湯送下殊砂安神丸之類錢氏謂急驚爲無陰之證因心經實熱而陰不能以配陽是爲陽盛陰虛之候也謂慢驚爲無陽之證因脾土虛甚而陽不能以勝陰是爲陰盛陽虛之候也愚按小兒急慢驚風之證其虛實寒熱如天淵之隔故急驚者十生一死慢驚者十死一生俗醫多不諳此理混爲一途而治悞人多矣業幼科者宜

推幼幼及人之心爲心庶免斯世無夭折之赤子矣幸甚幸甚

王綸明醫雜著

小兒病多屬肝脾二經

小兒病大率屬脾土肝木二經肝只是有餘有餘之病似重急而爲治却易見效亦速脾只是不足不足之病似輕緩而爲治却難見效亦遲二經爲病惟脾居多用藥最要分別若肝木自旺則爲急驚目直視或動搖手足搐搦風痰上壅等證此爲有餘宜伐木瀉肝降火清心若脾胃虛而肝木來侮亦見驚搐動搖諸證但其勢微緩名曰慢驚宜補養脾胃不可錯認將脾經誤作肝經治也

註 按急驚乃風火之證脾土受制肝經實熱者用瀉青丸徑伐其肝或導赤散以瀉其子肝經虛熱者用六味地黃丸以滋腎水補中益氣湯以養脾土則風木自息脾土自安矣若因乳食不調脾胃虧損木來侮土似慢驚而見抽搐搖頭劄目咬牙等證宜用六君子加鉤藤鉤若脾胃虧損寒水反來侮土成慢驚而見前證用前藥加薑桂如未應更加附子多有復甦者

急驚

急驚是有餘之證屬肝木心火陽邪太旺宜直瀉之降火下痰是也五臟俱有陰陽如肝氣爲陽爲火肝血爲陰爲水肝氣旺則肝之血衰矣火妄動則水被煎沸不寧矣陽旺陰消風火相搏陰血走散勢所必至也故亦宜養血急驚雖屬肝心然木火旺則肺金受虧不能平木木來剋土斯損矣故亦宜養脾兒治驚諸藥大率祛風化痰瀉火峻厲及腦麝辛散之味易於消陰血損脾胃者故治有餘急驚之證先須降火下痰一二服後加養血安神之藥若飲食少大便溏或吐瀉則當兼補脾胃若脾胃原虛當於直瀉藥中加補脾藥若屢作屢服利驚驅逐之藥便宜認作脾虛血散治驚藥內加養血補脾藥不可用溫熱丁香等藥恐助胃火宜參朮芍藥等以補脾中氣血麥門冬黃連以清金制木

註 按前證若肝經風熱抽搐目瞤筋急痰盛等證用四物湯以生肝血鉤藤鉤以清肝火更用四君子以補脾土若肝經血燥發熱驚搐眼瞤痰盛筋攣用六味丸以滋腎水生肝血用四君子湯加芍藥以補脾土生肺金若肺金剋肝木用六君子以實脾土芍藥木香以平肺金若屢服利驚之藥而脾胃虛寒者須用六君子以補脾胃加木香丁香以培陽氣若脾土虛寒腎水反來侮土而致中寒腹痛吐瀉少食等證者用益黃散以補脾土而瀉寒水庶幾不致慢驚矣治當審察虛實凡證屬有餘者病氣也不足者元氣也故有餘當認爲不足思患預防斯少失矣

急驚變慢驚

急驚屢發屢治用直瀉藥既多則脾損陰消變爲慢驚當主以補脾養血佐以安心清肺制肝之藥

註 按前證多因吐利脾胃虛損肝木所乘或腎水反來侮土所致故似搐而不搐先用鈎藤飲子如發搐少退乃用寶鑑天麻散若吐利不食急用木香異功散實其脾土其病自已如未應用六君子加木香炮薑溫補脾土更不應急加附子以回陽蓋慢驚之證外虛熱而內眞寒也無膿可逐無痰可驅但溫補脾胃爲主大凡發搐因風則目青面赤因驚則叫呼搐搦因食則嘔吐氣悶肺脾虛則生粘痰喉間作鋸聲乃心火不能生脾土脾土不能生肺金以致肺不能主氣脾不能攝涎故涎氣泛上而喉中作聲耳若用祛風治痰理氣之劑則氣散陰消而促其危矣

驚搐

小兒驚搐之證必有痰或因驚而痰聚或因痰而致驚古人治驚方中俱兼痰藥必須先治其痰然後瀉火清神若痰壅塞胃腸不去則瀉火清神之藥無所施其功也二陳湯加竹瀝入少薑汁最穩痰重者滾痰丸白餅子利驚丸下之滾痰丸下熱痰白餅子利驚丸下痰積在上者宜吐之重則用稀吐輕則探吐之若不必吐下以二陳爲主脾虛有熱痰加白朮芩連風痰稠結加南星貝母枳實胃虛生痰加白朮麥芽竹瀝

註 按前證若因心肝二經風熱熾盛兩目連劄四肢抽搐宜治肝清心若因心經蘊熱叫呼戰慄宜清熱安神若因肺感風邪氣急喘促宜治痰理肺若因飲食停滯嘔吐困睡宜消導健脾若因脾肺虛弱而風痰壅盛以致前證但宜補中益氣爲主若執用祛風治痰理氣之劑則氣散陰消而促其危矣

小兒忽然驚搐目上視搖頭咬牙證候怪異世俗多作肝經有餘之證投以驚藥豈知飲食停滯痰涎壅

積亦多類驚者便須審察有無傷積腹痛胷滿嘔吐惡食輕則消滯化痰重則探吐滯積而後調之又有因感冒吐瀉而發熱氣血虛爲熱所迫雖見驚證不可卽服驚藥但調治吐瀉感冒則氣自定熱自退而驚自除矣

註按前證若因肝木侮脾土用六君子加芍藥木香柴胡若因脾土虛而自病用五味異功散大凡飲食停滯痰積壅滿而見驚證實因脾土虛弱不能運化所致但健脾胃則食自消痰自化若輕用驚藥風藥反所以成其風而重其病也況脆嫩臟腑安能受峻厲之劑耶若專治其病則誤矣

小兒用藥不宜峻厲

小兒驚藥皆些小丸散多峻厲取其易於成功以之治肝心有餘之證對病則可中病宜卽止不可以爲常也病勢輕淺只用輕劑病退便宜和中調理如牛黃丸三四十味亂雜殊甚凉驚丸非氣壯實肝火旺者不宜抱龍丸亦多不見效且麝腦香辛太甚走散眞氣又傷脾胃元氣虛則病愈生矣

註按小兒之證有餘便屬肝經不足便屬脾經蓋有餘是病氣也不足是元氣也凡病氣有餘元氣不足當補不當瀉況脆嫩臟腑安能受峻厲之藥前論厥有旨哉

驚後目動咬牙

驚後目微動及咬牙固爲肝虛亦虛中有熱虛者血不足熱者氣有餘水不足無以制火而火動故也但牙牀屬胃脾胃虛而有熱亦見微咬不可專歸肝腎當以補脾爲主加黃連芍藥川芎便是瀉肝氣補肝血也生地黃凉心血故導赤散宜用之熱地黃補腎血故地黃丸宜用之凡肝腎虛證見者於脾胃藥加地黃可也或以目劄咬牙爲肝腎虛專服地黃丸豈不泥膈生痰適有以妨於脾胃也

註按前證亦有肝熱生風風入於目目系牽動則目連劄熱入於目筋脈拘緊則目直視若面赤仰臥搖頭咬牙此則心熱之所致也又當別其虛實肝實則瀉青丸虛則地黃丸心實則導赤散虛則粉紅丸若脾胃虛熱補中益氣湯和芍藥山梔以瀉脾土制肝木若肝腎虛熱用六味地黃丸以補腎水生肝木

出痘發搐

小兒若因出痘而生驚搐不必治驚若身熱耳冷氣冷疑似未明古方服升麻葛根湯痘已出及出完調理氣血只依丹溪痘瘡法分氣血虛實看紅紫淡白稠密稀疎及參時令用藥常以脾胃爲主虛寒用陳文秀溫補法實熱用解毒法全在活法通變

註按小兒痘瘡未出則補托之已出及出完則調理之更當察色聽聲辨其多寡表裏虛實而治之庶不有誤世皆宗丹溪錢氏陳氏三家之論又必會而通之與時宜之不致膠柱而鼓瑟也竊謂黑陷耳骯冷咬牙吐瀉者乃脾土虛敗寒水反來侮土歸腎之惡候也用百祥丸瀉之急以四君子丁香陳皮木香厚朴炮薑以溫補脾土身熱飲水黑陷復起十救一二蓋此證因脾土虛敗寒水來侮故陳文秀先生云若治寒水於旣侮之後何不保脾土於未敗之先此發前人之未發救後世之誤妄況痘瘡發出成膿收靨卽癒痘起發腐潰生肌皆脾土元氣使然若黑陷寒戰咬牙泄瀉喘嗽卽癒痘陽氣脫陷寒氣內逆之陰證急用異功散倍參芪歸朮蓋附溫補脾胃不可泥其日期而行解毒托裏等法但見其虛弱便宜滋補脾胃以顧收靨觀丹溪先生治一叟發熱而昏倦其脈大而似數與參芪歸朮陳皮大料二十劑而痘出又二十劑而膿泡成身無全膚又六十劑而安其義可見

驚搐等證誤用藥餌

小兒或因驚搐或變蒸或食積或寒熱往來誤服解表瀉利之藥傷損脾胃氣血難以發生面黃肌瘦目動咬牙髮稀足弱不能行步此屬胃虛非肝腎也當長緩調理復全胃氣可也

註按藥餌偏勝之味脾胃非所宜也況小兒之疾多因乳食不調寒溫失節病損脾胃元氣根本不固而邪得以致之亦有因乳母六淫七情飲食起居所致苟不明其本末辨其緩急而誤用峻厲之藥重傷脾胃生生之氣變證百出促其夭亡誰之咎也丹溪先生慈幼論言之詳矣

薛氏保嬰撮要

肝臟

錢仲陽云肝主風實則目直大叫項急頓悶虛則咬牙呵欠氣熱則外生風氣溫則內生風大青膏散之若能食飲水不止用大黃丸微下之肝熱則目直不搐手尋衣領及亂捻物瀉青丸主之壯熱飲水喘悶瀉白散主之肝病秋見肺怯不能勝肝也當用益黃散補脾瀉青丸治肝肝有風則目連眨得心熱則搐

用瀉青丸治肝導赤散治心甚則身反張目直不搐心不受熱也當用地黃丸補腎瀉青丸治肝腎白者不治又張潔古云肝主風自病則風搐拘急若心乘肝爲實邪肺乘肝爲賊邪腎乘肝爲虛邪凡肝得病必先察肺腎腎者肝之母肺者肝之賊今肝之得病若非腎水不能相生必是肺金鬼邪來尅故其來在肺先治其肺攻其鬼也其來在腎先補其腎滋其源也然後審其本臟之虛實而寒溫之竊謂前證若肝經實熱而外生風者宜用大青膏散之若既服而前證仍作或益甚者此邪氣已去而脾氣虧損也宜用異功散加芎藭補之若肝經虛熱或因尅伐而內生風者宜用異功散地黃丸補之若風邪入臟能食飲冷大便祕結者此邪氣內實也宜用大黃丸下之若既下而食少飲湯或腹作脹者此脾氣內虛也宜用白朮散補之氣血素弱或因病後或服攻伐之劑而手尋衣領咬牙呵欠目淡青者乃肝經虛甚也急用地黃丸以補腎肝嗄氣短氣長出氣乃肺經虛甚也急用異功散以補脾肺若申酉時叫哭直視呵欠煩悶項急驚悸手足搖動發熱飲水者此風火相搏而勝肺金也用柴胡梔子散以治肝火生肝血用異功散補脾土生肺金若唇白者爲脾絕不治夫嬰童之證多因姙娠厚味七情或兒乳哺失宜或乳母飲食鬱怒所致病氣既見形氣已虛當推其所因用藥加減蓋以治其母兒飲一二匙後做此

心臟

錢仲陽云心主驚實則叫哭發熱飲水而搐虛則困臥驚悸不安又云熱則睡中口氣溫及上竄咬牙而合面臥有就冷之意皆心熱也導赤散主之若仰面臥者乃心氣實氣不得上下流通也瀉心散主之心病冬見火勝水也當補腎治心輕者病自愈下竄不語者腎虛怯也又張潔古云心主熱若肺來心爲微邪肝來心爲虛邪脾來心爲實邪腎來心爲賊邪凡心臟得病必先調其肝腎肝氣通則心氣和肝氣滯則心氣乏此心病先求其肝清其源也五臟受病必傳其所勝腎之邪必傳於心故先治其腎逐其邪也若肝腎脈俱和然後察其心家虛實治之竊謂仰面臥者因其心胃虛熱故喜合臥而就實也實則調治心肝虛則調補脾肺二者別之盡其狀矣其咬牙等證多有雷同不必拘泥如用瀉心導赤等劑邪氣雖去而病仍作當調補元氣或反甚急溫補元氣其心氣冬見或亥子時病益甚或下竄不語者乃腎水虛而心火甚也用地黃丸其乳下嬰兒須母服之

發搐

寅卯辰時搐而發熱作渴飲冷便結屬肝膽經虛熱用柴芍參芩散作渴引飲自汗盜汗屬肝膽經血虛用地黃丸口吻流涎屬肝木尅脾土用六君子湯巳午未時發搐若兼作渴飲水屬風火相搏以地黃丸補肝導赤散凉驚丸治心若作渴飲湯體倦不乳土虛而木旺也用地黃丸以補腎六君子以補脾申酉戌時發搐而喘目微斜身似熱睡而露睛大便淡黃屬脾肺虛熱用異功散手足逆冷或喘瀉不食屬脾肺虛寒用六君炮薑木香久病而元氣虛者用六君子六味丸二藥主之

亥子丑時發搐身熱目睛緊斜吐瀉不乳厥冷多睡屬寒水侮土用益黃散未應用六君薑桂傷風發搐口氣不熱肢體倦怠用異功散補脾土釣藤飲清肝木若因風邪內鬱發熱而變諸證者當理肺金清風邪若外邪既解而內證未除當理肺補脾若肺經虛損而致驚搐等證者當補脾肺以平肝心則驚搐自止矣若停食發搐嘔吐乳食者宜用消食丸若食既消而前證仍作或變他證者脾土傷而肝木乘之也用六君子加釣藤以健脾平肝若百日內搐者因胎氣所稟亦有乳母七情厚味所致者當兼治其母而以固胃爲先不可遲治其兒也

驚癎

錢仲陽云小兒發癎因血氣未充神氣未實或爲風邪所傷或爲驚怪所嚇亦有因姙娠七情驚怖所致者若眼直目牽口噤涎流肚膨手搐背項反張腰脊強筋形如死狀終日不醒則爲瘓矣如面赤目瞪吐舌嚙脣心煩氣短其聲如羊者曰心癎面青脣青兩眼上竄手足掣掣反折其聲如犬者曰肝癎面黑目振吐涎沫形體如尸其聲如豬者曰腎癎面如枯骨目白反視驚跳反折搐頭吐沫其聲如雞者曰肺癎面色痿黃目直腹滿自利四肢不收其聲如牛者曰脾癎五癎通用五色丸爲主仍兼以各經之藥心癎屬血虛者用養心湯發熱飲冷爲實熱用虎睛丸發熱飲湯爲虛熱用妙香散肝癎者虛證用地黃丸搐有力爲實邪用柴胡清肝散大便不通用瀉青丸腎癎者用地黃丸紫河車丸之類腎無瀉法故徑從虛治之肺癎者屬氣虛用補肺散面色痿黃者土不

能生也用五味異功散面色赤者陰火上衝於肺也用地黃丸脾痢者用五味異功散若面青瀉利飲食少思用六君子加木香柴胡若發熱抽掣仰臥面色光澤脈浮病在腑爲陽易治身冷不搐覆臥面色黯黑脈沉病在臟爲陰難治凡有此證先宜看耳後高骨間先有青脈紋抓破出血可免其患此皆元氣不足之證也須以紫河車丸爲主而以補藥佐之設若泛行尅伐復傷元氣則必不時舉發久而變危多致不救又有驚風食痢三種詳見後方仍參驚風胎風治之

急驚

急驚者陽證也俱腑受病而屬實乃少陽相火旺經曰熱則生風風生痰痰熱客於心膈間則風火相搏故抽搐發動經所謂木太過曰發生其動掉眩顛疾是也當用利驚丸導赤散瀉青丸等藥搐止與安神鎮驚丸婁全善亦曰急驚屬木火土實木實則搐而有力及目上視動劄頻睫土實則身熱面赤而不吐瀉偃睡合睛治法宜凉宜瀉而用凉驚利驚等丸亦有因驚而發者牙關緊急壯熱涎潮竄視反張搐搦顫動脣口眉眼眨引口中熱氣頰赤脣紅二便祕結脉浮洪數緊此內有實熱外挾風邪當截風定搐若痰熱尚作仍微下之痰熱既泄急宜調養胃氣搐定而痰熱少退卽宜調補脾氣東垣云若因外物驚者宜黃連安神丸因氣動所驚者宜安神鎮驚丸之類大忌防風丸如因驚而瀉青色宜硃砂丸大忌凉驚丸蓋急驚者風木旺也風木屬肝盛則必傳尅於脾欲治其肝當先實脾後瀉風木若用益黃散則誤矣經曰邪氣盛則實正氣奪則虛前所云實者乃病氣有餘而形氣不足也當先瀉而後補虛甚急當補脾爲先少以攻邪之藥佐之其所云虛者乃病氣形氣俱不足也當純補眞氣爲要若肝經風火相搏抽搐目瞤筋急痰盛者當用四物湯以生肝血加鈎藤鉤山梔以清肝火更用四君子以補脾六味丸以滋腎若肺金尅木而兼呵欠者用瀉白散以泄肺邪地黃丸以益肝血若邪入肝則用柴胡清肝散加龍膽草亦可邪入心用梔子清肝散加炒黃連亦通邪入腎用六味地黃丸邪入肺用地骨皮散邪入脾用六君子加柴胡山梔此證屬肝膽經血虛風火相搏而善行數變者爲多若不養肝血不補脾氣純用祛風化痰之藥則脾益虛血益損邪氣延綿必傳慢驚矣

慢驚

蓋慢驚者陰證也俱臟受病而屬虛因吐瀉脾肺俱虛肝木所乘而致瘈瘲微搐婁全善所謂木虛則搐而無力經所謂木不及曰委和其病搖頭是也（謂手足搐動泄瀉心悸）火虛則身寒口中氣冷土虛則吐瀉睡而露睛治宜溫補脾胃用六君子湯五味異功散之類徐用誠云乙木屬陰乃肝臟病故慢而難治況有夾熱夾食夾痰與外感證相似者當宗錢氏方主之保嬰集云急驚屢發而屢用直瀉之藥則脾陰愈消而變爲慢驚多矣大率吐瀉痰鳴氣喘眼開神緩昏睡露睛驚跳搐搦乍發乍靜或身熱身冷面淡青白或眉脣青赤其脈遲沉而緩是也當溫補脾氣爲主而佐以安心制肝東垣亦云慢驚風由脾胃虛而生脾虛者因火邪乘其土位火旺能實其木木旺故來尅土當於心經中以甘溫補土之源更於脾土中瀉火以甘寒補金以酸凉致脾土中金旺火衰風木自虛矣稟賦不足或久病脾虛及常服尅伐之藥者多致此證若因土虛不能生金金不能平木木來侮土而致前證者以五味異功散加當歸酸棗仁佐以鈎藤飲子補土平木若脾土虛寒者用六君子加炮薑木香不應急加附子以回陽氣蓋陰血生於脾土宜四君子湯當歸酸棗仁凡元氣虧損而至昏憒者急灸百會穴若待下痰不愈而後灸之則元氣脫散而不救矣此乃臟腑傳變已極總歸虛處惟脾受之無風可逐無驚可療因脾虛不能攝涎故津液妄泛而似痰者當依前法自效若不審其因泛用祛風化痰之劑則脾氣益傷陰血益損病邪益盛而危矣

驚搐目直

小兒忽然驚搐目直者皆肝之風熱也若肝虛生風則目連劄而不搐及多欠咬牙若肝經風實則目直大叫呵欠項急頓悶若肝經有熱則目直視不搐得心熱則搐氣熱則外生氣溫則內生其證手尋衣領及亂捻物宜用瀉青丸壯熱飲水喘悶宜用瀉白散凡病之新久皆能引肝風風內動則上入於目故目爲之連劄若熱入於目牽其筋脈兩眥俱緊不能轉視故目直也亦有飲食停滯中焦致清陽不升濁陰不降肝木生發之氣不得升致生虛風者須詳審之若胷滿腹痛嘔吐惡食輕則消導化痰重則探吐滯積更須審其所傷寒物熱物亦有因感冒吐瀉致使土敗木侮而生虛風者不可遽服驚藥宜用六君子加芍藥木香柴胡制肝補脾若因脾土虛而自病者

用五味異功散凡飲食停滯痰涎壅滿而見驚證者實因脾土虛弱不能生金金虛不能平木故木邪妄動也宜健脾消食其證自愈若輒用驚風之藥反成其風而益其病也況臟腑脆嫩不可投以峻厲之劑治者愼之

目動咬牙

小兒驚後目微動咬牙者皆病後亡津液不能榮其筋脈也亦有肝經虛熱而生風者當審其氣血有餘不足而治之其日中發熱飲冷而動者氣有餘也用瀉青丸夜間盜汗及睡不寧而動者血不足也用地黃丸或因肝經風邪傳於脾腎者亦令咬牙先用柴胡清肝散次用五味異功散六味地黃丸若因脾胃虛熱用補中益氣湯加芍藥山梔實熱用瀉黃散蓋牙牀屬手足陽明故也若肝腎熱用六味地黃丸

睡中驚動

小兒睡中驚動由心腎不足所致蓋心主血與神肝藏血與魂肺主氣與魄腎主精與恐小兒臟腑脆弱易爲驚恐恐則氣下驚則心無所依神無所歸且夫人之神氣寤則行於目寐則棲於腎今心腎既虛則不能寧攝精神故睡中驚動也治宜清心安神用茯苓補心湯加酸棗仁茯神五味亦有驚嚇而作者因擊動其肝故魂不安也治宜鎮驚定魂用安神鎮驚丸若飲食間因驚而停滯者用六君子加神麴厚朴食既消而驚未定用茯苓補心湯若木火太過而心神不寧者用導赤散風熱相搏者用柴胡梔子散食鬱生痰驚動不安者用四君子以健脾神麴半夏以化痰山梔芍藥以清熱

天釣內釣

天釣者發時頭目仰視驚悸壯熱兩目反張淚出不流手足搐掣不時悲笑如鬼祟所附甚者爪甲皆青蓋因乳母厚味積毒在胃致兒心肺生熱痰鬱滯或外挾風邪爲患法當解利其邪用釣藤飲上氣喘粗者用烏蛾四君子湯內釣者腹痛多喘臂黑囊腫傴僂反張眼尾赤此胎中受風及外驚所致若內臟抽掣作痛狂叫或泄瀉縮腳內證一作外證亦然極難調理內證服聚寶丹外證服釣藤飲進乳食者可治若腹痛臂黑囊腫之類用聚寶丹若外驚內臟抽搐之類用釣藤飲若因乳母醇酒厚味積毒在胃用加味清胃散若因乳母鬱怒積熱在肝用加味逍遙散加味歸脾湯俱加漏蘆子母俱服凡母食膏粱厚味飼兒之時先擠去宿乳然後乳之

驚風

驚風者虛惕怔忡氣怯神散痰涎來去泄瀉色青若驚入心則面赤夜啼用梔子清肝散加黃連入肝則面青眼窩用柴胡清肝散入脾則面黃嘔吐虛汗嗜臥用大君加柴胡山梔入肺則面白喘急用異功散加柴胡桔梗入腎則面黑嚙妳咬牙用六味地黃丸若因乳母恚怒肝火或膏粱積熱遺兒爲患或兒吐瀉傷脾清氣不升風木陷入太陰傳變等因皆能致此當隨主治否則必成慢脾也須預愼防爲善

痙證

痙證因傷風汗出悞發汗或濕證汗多所致若項背強直腰背反張搖頭掣瘛噤口不語發熱腹痛病在足太陰也若面目赤色無汗惡寒牙關緊急肢體反張痰涎壅盛昏憒煩渴小便赤澀先譫語而發者名剛痙當發汗若大便滑泄不語不渴有汗而不惡寒先手足厥冷而發者名柔痙並以小續命湯加減主之剛痙去附子用麻黃柔痙用附子去麻黃若壯熱譫語口乾手足微寒大便滑泄此兼剛柔無汗用葛根湯有汗用桂枝加葛根湯若痰塞氣盛用南星半夏茯苓以消痰枳實陳皮紫蘇以順氣更審其熱輕者用敗毒散熱甚者用小柴胡湯壯熱有汗胃滿口噤咬牙便閉爲內熱以大承氣湯下之後用大柴胡湯解之過三日則難治此皆治六淫外傷元氣形病俱實之法也若小兒多因驚駭停食或乳母六淫七情飲食起居失宜所致更當審之兼治其母大要因驚目直呵欠項強煩悶屬肝經實熱用抑肝散咬牙呵欠手尊衣領屬肝經虛熱用地黃丸若肺金不能平木用異功散脾不能養肝用六君子湯水不能生木用地黃丸

搖頭便血

經曰諸風掉眩皆屬肝木木得風則搖動乃肝經火盛而生虛風也湯氏治鄭都丞子搖頭便血七年用祛風藥止血藥百試無效此肝經風熱所乘土受木剋不能攝血而潰入大腸故便血不止遂製清肝益胃湯以平肝益脾祛風熱兼服胃風湯旬餘諸證悉愈便血者風木搖動則土受陵虐而不能統血也或食酸味過多以益其肝致令陰結經曰結陰者便血一升再結二升三結三升又邪在五臟則陰脈不和陰脈不和則血留之結陰之病陰氣內結不得外行滲入腸間故便血也血亦有乳母恚怒風熱熾盛或

肝木傷脾使清氣不升或風邪侵入大腸者治法若因風熱用柴胡清肝散若因怒火用加味小柴胡湯若清氣不升脾氣下陷者用補中益氣湯若風邪侵於大腸者用清肝益胃丸肝經血熱妄行者用六味地黃丸脾土不能培肝木者用六君柴胡釣藤鉤肝木勝脾土者用四君芍藥釣藤鉤結陰者用平胃地楡湯

龔信古今醫鑑

驚風不治證

急驚眼睛翻轉口中出血兩足擺跳肚腹搐動或神經而摸體尋衣或證篤而神昏氣促噴藥不下通關不應心中熱痛忽大叫者不治

慢驚四肢厥冷吐瀉咳嗽面黯神慘殞聲胃痛兩脅動氣口生白瘡髮直搖頭眼睛不轉涎鳴喘急頭軟大小便不禁手足一邊牽引者皆不治

慢脾身冷粘汗直臥如屍喘嗽頭軟背直口噤搖頭痰如牽鋸之聲縮脣氣粗者不治

八候

夫小兒有熱熱盛生痰痰盛生驚驚盛發搐搐盛則牙關緊急而八候生焉搐搦顫反引窻視是也搐者兩手伸縮搦者十指開合掣者勢如相撲顫者頭偏不正反者身仰向後引者臂若開弓窻目直似怒視者睛露不活是謂八候也其四證即驚風痰熱是也而化風丹悉能主之

樓英醫學綱目

急驚

急驚者陽證也俱腑受病熱痰客於心肺是少陽相火旺經云熱則生風因聞大聲而作蓋謂東方震卦得火氣而發搐火本不動焰得風而動當用利驚丸導赤散瀉青丸地黃丸搐止宜服安神丸

急驚內有熱即生風又或因驚而發則目上連劄潮涎搐搦身體與口中氣皆熱及其發定或睡起即了了如故此急驚證也當其搐勢漸減時與鎮心治熱之藥一二服如麝香丸鎮心抱龍丸辰砂丸紫雪之類候驚勢已定須臾以藥下其痰熱如利驚丸軟金丹桃枝丸之類利下痰熱心神安寧即愈

癇痓

身軟時醒者爲癇身强直反張如弓不時醒者爲痓痓候十無一生

徐春甫古今醫統

驚風候各有所屬

小兒非時釣上眼睛是肝風驚白日無時喜笑驚風在心夢中五指捻動驚風在筋畏人恐怖驚在脾夢中非時手足抽動驚風在肝心二藏面色赤非時作黑驚在腎無時咬人驚風在骨非時手足拿人驚風在三焦夢中吐舌驚在心睡時喉中響拽驚在肺井胃脘面色青白無時發熱戰驚在脾無時面上黑色惡叫驚在腎

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百四十七卷目錄
醫部彙考四百二十七
小兒驚癇門三
王肯堂證治準繩 厥 心 驚悸 驚 補瀉
表裏 急慢驚總論 急
慢驚 慢脾風 通治急慢驚 目睛斜
斜口蝸動 泄瀉 胎癇 胎驚 似癇
雜證類驚 急 不治證 角弓反張 天釣
癇 除陽癇 風驚 食三癇 五癇癇
治法 風癇 驚癇 不治證 尋衣撮空
驚癇搐搦

明王肯堂證治準繩

肝

肝病哭叫目直視呵欠煩悶項急

外生感風呵欠煩悶口中氣熱當發散大青膏主之

凡病或新或久皆引肝風風動而上于頭目目屬肝風入于目上下左右如風吹不定兒不能任故目連劄也若熱入于目牽其筋脈兩眥俱緊不能轉視故目直也若得風熱則搐以其子母俱有實熱風火相搏故也

潔古曰肝主謀勇熱則尋衣捻物目連劄直視不能轉視或極則身反强直折皆風熱也目者肝之竅屬木木性急故如是

肝病秋見一作日晡肝强勝肺肺怯不能勝肝當補脾肺治肝益脾者母令子實故也補脾益黃散治肝瀉青丸主之

肝病春見一作早晨肺勝肝當補腎肝治肺臟肝怯者受病也補肝腎地黃丸治肺瀉白散主之

五臟相勝輕重肝病見秋木旺肝勝肺也宜補肺瀉肝輕者肝病退重者脣白而死

婁氏曰五臟相勝病隨時令乃錢氏擴充內經藏氣法特論之旨實發前人所未發者也假如肝病見于春及早晨乃肝自病于本位也今反見于秋及日晡肺之位知肺虛極肝往勝之故當補脾肺瀉肝也餘倣此

潔古曰肝主風自病則風搐拘急急食甘以緩之佐以酸苦以辛散之

實則風搐力大瀉青丸主之

虛則風搐力小地黃丸主之

心乘肝實邪壯熱而搐利驚丸凉驚丸主之

肺乘肝賊邪氣盛則前伸呵欠微搐法當瀉肺先補本臟補肝地黃丸主之瀉肺瀉白散主之

脾乘肝微邪多睡體重而搐先當定搐瀉青丸主之搐止再見後證則別立法治之

腎乘肝虛邪增寒呵欠而搐羌活膏主之

劉氏曰凡肝得病必先察其肺腎兩臟根其病之所起然後審其肝家本臟之虛實方可治療然腎者肝之母金者木之賊令肝之得病若非腎水之不能相生必是肺金之鬼來相攻擊不得不詳審而求之故其來在肺先治其肺攻其鬼也其來在腎先補其腎滋其根也然後審其肝家本臟之虛實而寒溫之

海藏曰肝苦急急食甘以緩之甘草

肝欲散急食辛以散之川芎

以辛補之細辛

以酸補之芍藥

肝虛以生薑陳皮之類補之虛則補其母腎者肝之母也以熟地黃藥補腎如無他證錢氏地黃丸補之

補肝丸四物湯內加防風羌活等分爲細末煉蜜爲丸是也

鎮肝丸即瀉青丸去梔子大黃是也治肝虛錢氏補腎地黃丸

肝實以白芍藥瀉之如無他證錢氏瀉青丸主之實則瀉其子心乃肝之子以甘草瀉心

心

心病多叫哭驚悸手足動搖發熱飲水

潔古曰心主熱自病或大熱瀉心湯主之

實則煩熱黃連瀉心湯主之

虛則驚悸生犀散主之

肺乘心微邪喘而壯熱瀉白散主之

肝乘心虛邪風熱煎大羌活湯大青丸主之

脾乘心實邪泄瀉身熱瀉黃散主之

腎乘心賊邪恐怖惡寒安神丸主之

劉氏曰凡心臟得病必先調其肝腎兩臟腎者心之鬼肝氣通則心氣和肝氣滯則心氣之此心病先求于肝清其源也五臟受病必先傳其所勝水能勝火則腎之受邪必傳于心故先治其腎逐其邪也故當退腎氣益肝氣兩方或診其脈肝腎兩臟俱和而心自生疾然後審其心家虛實治之

若叫哭發熱作渴飲水抽搐有力仰面而睡者屬心經實熱用瀉心湯導赤散若發熱飲湯抽搐乏力驚

瘛咬牙合面睡者屬心經虛熱用補心散若喘嗽面赤壯熱飲水肺乘心也用瀉白散若搖頭劄目身熱抽搐肝乘心也用柴胡清肝散若合目昏睡泄瀉身熱脾乘心也用瀉黃散若瘛視驚悸咬牙足熱腎乘心也用安神丸

海藏曰心苦緩急食酸以收之五味子心欲軟急食鹹以軟之芒硝以鹹補之澤瀉以甘瀉之人參黃芪甘草心虛以炒鹽補之虛則補其母肝乃心之母以生薑補肝如無他證錢氏安神丸是也

驚悸

人身有九臟心藏神肝藏魂二經皆主于血血虧則神魂失寧而生驚悸也經曰東方青色入通于肝其病發驚駭又曰二陽一陰發病主驚駭驚者心卒動而恐怖也悸者心跳動而怔忡也二者因心虛血少故健忘之證隨之用四物安神之類丹溪謂亦有屬痰者宜用溫膽湯加辰砂遠志之類若思慮便動虛也用養心湯時作時止痰也用茯苓丸觸事易驚心膽虛怯也用溫膽湯臥驚多魘血不歸源也用眞珠母丸夢寐不寧肝魂失守也用定志丸恐畏不能獨處膽氣虛冷也用茯神湯睡臥煩躁膽氣實熱也用酸棗仁丸眩運驚悸風痰內作也用本事辰砂遠志丸思慮爲結脾虛氣滯用歸脾湯前證雖曰屬心與肝而血之所統實主于脾脾之志曰思思慮多則血耗損而不能滋養于肝心者脾使之也思慮內動未嘗有不役其心者夫心爲君火之臟十二官之主也夫君之德不怒而威無爲而治故宜鎮之以靜證戒之以妄動動則相火翕合煽燥陰精精血既虧則火空獨發是以驚悸怔忡之所由生五志之火心所不能制者矣故治脾者不可不知養心養心者不可不知鎮靜而寡慾然人孰無思也思之正則無妄動之慾矣朱子曰必使道心常爲一身之主而人心每聽命焉此善于養心者也

驚

婁氏曰驚搐一也而有晨夕之分表裏之異身熱力大者爲急驚身冷力小者爲慢驚仆地作聲醒時吐沫者爲癇頭目仰視者爲天弔角弓反張者爲瘛而治各不同也

補瀉法

潔古曰脾病肝强法當補脾恐木賊害宜先瀉心肝以挫其强而後補脾爲當因潮熱發搐在亥子丑時者此腎用事之時也不甚搐而臥不穩身體溫壯目睛緊斜視喉中有痰大便銀褐色乳食不消多睡不省當補脾治心皆因大病後脾胃虛損多有此疾

表裏

潔古曰小兒生來怯弱者多傷風發搐因傷風而得之證同大人傷風寒痰之類開發則愈

傷食發搐謂不因他證忽然而搐此因飲食過度致傷脾胃故兒多睡多吐不思飲食脾胃既虛引動肝風則發搐當先定其搐如羌活防風煎下瀉青丸後用白餅子下其食漸消用調中丸異功散養其氣

婁氏曰外物驚者元氣本不病故治以黃連安神之苦寒氣動驚者不因外物驚元氣自有病故治以寒水石安神之甘寒也

急慢驚總論

小兒急慢驚風古謂陰陽癇也急者屬陽陽盛而陰虧慢者屬陰陰盛而陽虧陽動而躁疾陰靜而遲緩皆因藏腑虛而得之虛能發熱熱則生風是以風生于肝痰生于脾驚出于心熱出于肝而心亦熱以驚風痰熱合爲四證搐搦掣顫反引竄視爲八候凡眩眼搖頭張口出舌唇紅臉赤面眼唇青及瀉皆青髮際印堂青筋三關虎口紋紅紫或青者皆驚風候也大抵肝風心火二者交爭必挾心熱而後發始于搐故熱必論虛實證先分逆順治則有後先蓋實熱爲急驚虛熱爲慢驚慢驚當無熱其發熱者虛也急驚屬陽用藥以寒慢驚屬陰用藥以溫然又必明淺深輕重進退疾徐之微故曰熱論虛實者此也男搐左視左吹搐右視右男眼上竄女眼下竄男握拇指出外女握拇指入裏男引手挽左直右曲女引手挽右直左曲凡此皆順反之則逆亦有先搐左而後雙搐者但搐順則無聲搐逆則有聲其指紋彎弓入裏者順反外者逆出入相半者難痊故曰證分逆順者此也陽病陰脈陰病陽脈亦爲反凡熱盛生痰痰盛生驚驚盛生風風盛發搐治搐先于截風治風先于利驚治驚先于豁痰治痰先于解熱其若四證俱有又當兼施乖理一或有遺必生他證故曰治有先後者此也綱領如此若分三者言之暴烈者爲急驚沉重者爲慢驚至重者肝風木尅脾土則爲慢脾風矣

婁氏曰急驚證屬木火土實也木實則搐而力大目

上目劄所謂木太過曰發生其動掉眩癲瘛是也火實則身熱面赤土實則不吐瀉睡合睛故其治法合凉瀉而用凉驚丸利驚丸之類慢驚證屬木火十虛也木虛則搐而力小似搐而不甚搐經所謂木不及曰委和其病搖動注恐是也謂手足搐動腹注泄心恐悸也火虛則身冷口氣冷土虛則吐瀉睡露睛故其治法合溫補而用羌活膏益黃散有熱者用東垣黃芪益黃散其東垣非錢氏羌活膏治慢驚者謂土虛泄瀉火木乘之謂手掌與腹俱熱之證若火木土俱虛而搐動恐悸注瀉手腹冷者非羌活膏不能治之

丹溪曰小兒驚風有二急驚屬痰熱宜凉瀉慢驚屬脾虛所主多死宜溫補急驚用降火下痰丸養血藥作湯下之慢驚當補脾兼用硃砂安神丸清米湯下更于血藥中求之如四物四君東垣黃芪益黃散之類世以一藥通治之甚妄

急驚

急驚之候亦曰眞搐牙關緊急壯熱遞潮窻視反張搐搦顫動脣口眉眼眨引頻併口中氣冷臉赤唇紅大小便黃赤其脉浮數洪緊此內挾實熱外感風邪心家受熱積驚肝家生風發搐肝風心火二臟交爭血亂氣并痰涎壅盛百脉凝滯關竅不通風氣蓄盛無所發泄故暴烈也又有搐搦反張斜視而牙關不緊口無痰涎而氣熱未可直指以爲驚風恐是傷風傷寒夾食夾驚疹痘等證此卽錢氏假搐之說又各依本證施治矣又急驚搐搦不可把握但扶持之否則風癇逆入經絡遂使手足拘攣成癖疾

急驚本因熱生于心身熱面赤引飲口中氣熱大小便黃赤劇則發搐蓋熱甚則風生風屬肝此陽盛陰虛也故利驚丸主之以除其痰熱不可用巴豆及溫藥大下之恐搐虛熱不消也小兒熱痰客于心胃因聞大聲非常則動而驚搐矣若熱極雖不聞聲及驚亦自發搐

閻氏曰急驚內有熱卽生風又或因驚而發則目上連劄潮涎搐搦身體與口中氣皆熱及其發定或睡起卽了了如故此急驚證也當其搐勢漸減時與鎮心治熱藥一二服如麝香丸鎮心丸抱龍丸辰砂丸紫雪之類候驚勢已定須臾以藥下其痰熱如利驚丸軟金丹桃枝丸之類利下痰熱心神安寧卽愈

潔古曰急驚者陽證也俱腑受病熱痰客于心肺是少陽相火旺經云熱則生風因聞大聲而作蓋謂東方震卦得火氣而發搐火本不動焰得風而動當用利驚丸導赤散瀉青丸地黃丸搐止宜服安神丸

丹溪曰急驚風發熱口噤手足心伏熱痰嗽痰喘並用涌法間以桑樹上桑牛陰乾研末調服以平其風

桑牛此楊牛則已白黃者是

又以北薄荷葉寒水石各一兩青黛白殭蠶辰砂各一錢全蝎二枚猪牙皂角槐角各五分並爲末燈心湯和乳汁灌之角弓反張目直視因驚而致宜南星半夏入薑汁竹瀝灌之更灸印堂

初驚用防風導赤散生乾地黃川木通防風甘草等分用竹葉三錢煎服須用寧神膏麥門冬去心天竺黃茯神硃砂各一兩麝香一錢各搗研極細煉蜜和捏作小餅子臨臥薄荷湯化下一夜一餅

老醫常言小兒驚搐多是熱證若先便用驚風藥白附子全蝎殭蠶川烏之類便是壞證後有醫幼科者只用導赤散加地黃防風進三服導去心經邪熱其搐便止次服寧神膏神效

從孫道潤幼時患驚搐甚危延京口諸有名幼科療之益困篤其祖易庵兄求方於余以是授之二服立愈自後常以救人無不效者恐人忽易故著之

會氏曰急驚之論前代書所不載惟曰陽癇大概失所愛護或抱於當風或近於熱地晝則食多辛粹夜則衾蓋太厚薰蒸邪熱積於心傳於肝再受人物驚觸或跌撲叫呼雷聲鼓樂鷄鳴犬吠一切所驚未發之時夜臥不穩困中或笑或哭齘齒齩乳鼻額有汗氣促痰喘忽爾悶絕目直上視牙關緊急口噤不開手足搐掣此熱甚而然兒兼面紅脉數可辨蓋心有熱而肝有風二臟乃陽中之陽心火也肝風也風火陽物也風主乎動火得風則煙焰起此五行之造化二陽相鼓風火相搏肝藏魂心藏神因熱則神魂易動故發驚也心主乎神偶不受觸遇有驚則發熱熱極生風故能成搐名急驚治之之法先以五苓散加黃芩甘草水煎或百解散發表次通心氣木通散三解散疏滌肝經安魂退熱牛蒡湯防風湯主之驚風既除之後輕者攸半夏丸重者下水晶丹與之去其免成癡疾但不可用大寒凉藥治之熱去則寒起亢則害承適制若倉卒之間驚與風證俱作只用五苓散加辰砂末薄荷湯調服少解其證蓋五苓散內有澤瀉導小便心與小腸爲表裏小腸流利心氣得通其驚自減內有桂木得桂則枯是以能抑肝之氣其

風自停況佐以辰砂能安神魂兩得其宜大略要解熱凉心肝後惟可用平和湯散調理稍熱之劑則難用醫者宜審之

愚嘗感慨諸人每見驚風搐作不明標本混爲一證遽然全用金石腦麝蜈蠶蛇蠍大寒搜風等劑投之耗傷眞氣其證愈甚多致弗救殊不知驚生於心風生於肝搐始於氣是爲三證其驚與風首已詳及然所謂蓄氣而成搐陳氏之論最爲明理但未著其方余於此證則用寬氣飲治之只以枳殼枳實爲主蓋其氣也四時平和則身安一息壅滯則疾作況小兒哭啼不常其氣蘊蓄內則不能升降外則無由發泄展轉經時亦能作搐善醫者審察病源從而療之萬無一失更辨陰陽虛實不可輕忽若陽實證煎五和湯調三解散主之此急驚有搐之類若陰虛證煎固眞湯調寬氣飲治之此慢驚有搐之類若暴感此證未別陰陽虛實先用五苓散和寬氣飲及少加寬熱飲三藥合用薑汁沸湯調灌卽解大抵治搐之法貴以寬氣爲妙氣順則搐停此自然之理

大凡幼稚欲令常時驚悸不作在乎腎臟和平故戴氏曰治驚不若補腎謂心屬火火性燥得肝氣則煙焰起致生驚悸補腎則水升火降邪熱無侵雖有肝風不生驚駭其法當於申時進補腎地黃丸一服或琥珀抱龍丸用申時者蓋水生於申佐之以藥則腎水得平心火不炎自無驚矣

鈴方治法大要用藥有次序有輕重通關以後且與截風定搐風搐既定却下痰熱理爲至當若患在痰熱未有驚風只可退熱化痰不可妄投驚風藥蓋藥中多用寒凉恐引入痰熱入經絡凡病在熱不可妄治痰止當解表病在驚不可妄治風蓋驚由痰熱得只可退熱化痰而驚自止病在痰不可便治驚急須退熱化痰病在風不可便治搐蓋風由驚作只可利驚化痰其風自散也有搐須用截風散驚至妙之道若治驚而痰不化熱亦不退驚安得自止化其痰熱若不退風亦不散痰安得去是知不治之治所以治之之謂歟急驚初傳風搐得定而痰熱無多則但用輕藥與和胃定心之劑若搐定而痰熱一泄又須急消痰除熱可也然急驚雖當下切不可過用寒凉及水銀輕粉巴豆芒硝等蕩滌太驟或當下之皆不得已但使疾去卽止或不當用而用或可用而過焉由此遂成慢驚矣且如只下痰熱不必太驟但斟酌處用大黃一品足矣且急驚證源在於去肝風降心火幼幼書以爲至要之說也

薛氏曰急驚之候牙關緊急壯熱涎湧窩視反張搐搦顫動口中氣熱頰赤唇紅脈浮洪數者此肝經血虛火動生風蓋風生則陰血愈散陰火愈熾火動則肺金愈虧肝木愈盛宜滋肝血養脾氣若屢服祛風化痰瀉火辛散之劑便宜認作脾虛血損急補脾土初有痰熱未有驚風先且解表祛肝風降心火和劑香蘇散解肌加乾葛

急驚初傳且可通關定驚搐

諸風搐搦關竅不通痰涎潮塞氣實使之先用蘇合香丸以薑自然汁浸薄荷湯調與服使氣下則痰下關竅自通

凡欲下之須當審問前人已下未下或曾經吐瀉否已下及吐瀉者不可再下但驅風化痰消熱而已大約痰熱十分且泄其二之二下劑中須用枳殼菖蒲寬心通氣之類佐之急驚急在一時治不可緩緩則候加深若一時體認不明又不可妄施藥餌

急驚既傳截風定搐次第風驚已定而痰熱下劑有三初且輕下又稍重下又加重下之劑下後和胃助氣而後定志寧神驅風鎮驚防其再發若下後諸證猶存未易痊愈更勿再下當作慢驚推詳

慢驚

慢驚之候或吐或瀉涎鳴微喘眼開神緩睡則露睛驚跳搐搦乍發乍靜或身熱或身冷或四肢熱或口鼻冷氣面色淡白淡青唇口間或青黯其脈沉遲散緩蓋由急驚過用寒凉或轉太驟傳變成之又有吐利不止而成者有氣虛暴吐瀉而成者有夏月脾胃伏熱大吐瀉當解暑熱不可專曰固陽有臟虛洞洩成者有久痢氣脫而成者有下積取瀉成者有吐血瀉血而成者有傷寒轉變陰證成者有得之久嗽作痢者有得之發癇不已者有得之蟲積冲心者有得之卵腫疝氣腹痛其或汗出太過脾困煩渴四肢浮腫大小便閉走馬急疳前傳慢候惟吐瀉積痢成虛致之則證變甚速凡經經吐瀉便是慢驚須用溫中扶裏或搐來緊急乃慢驚初傳尚有陽證不可候作急驚用藥世言搐慢爲慢驚非也若泥此往往以慢脾爲慢驚矣凡慢驚男子以瀉得之爲重女子以吐得之爲重又吐有五證瀉有五證各明所因主治古云病家怕驚不怕瀉醫家怕瀉不怕驚如因洩瀉不止且先治瀉若更治風則驚風愈甚如因他證例當

循原施治也其慢驚候若從急驚傳來只可截風調胃均平陰陽不可全用陽藥使陽歸陽復作急驚之候用藥施治無過不及可也

急驚以關格不通略施腦麝開通定其搐搦尚可慢驚陰重陽虛諸經已虛不宜通關又凉其臟易作慢脾風慢驚危急如眼睛昏定而眨雖眨不左右顧或竄視四肢厥冷汗出如流口面黧黯指甲黑四體垂撋至重慢驚證眼半開半合似睡不睡是也其脉或浮或沈身或熱或凉或吐或瀉或不吐瀉或食乳或阻乳名半陰半陽合病卽如傷寒半表半裏也治法大要審問源流施治不可槩曰慢驚證如因吐瀉得之用湯氏醒脾散之類他證可以類推次第於後然慢驚已傳屬陰亦須準較陰陽虛盛淺深不可溫燥之劑太過

潔古曰慢驚者陰證俱臟受病蓋小兒吐瀉病久脾胃虛損若不早治則成慢驚名曰瘈瘲似搐而不甚搐也因脾胃虛損故大便不聚當去脾間風先用宣風散導之後用益黃散史君子丸平之則其利自止既已失治則脾胃俱虛致被肝木所乘是爲慢驚當用溫補羌活膏主之

閻孝忠編集錢氏方以益黃補土悞矣其藥有丁香辛熱助火火旺土愈虛矣青橘皮瀉肺金丁香辛熱大瀉肺與大腸脾實當瀉子今脾胃虛反更瀉子而助火重虛其土殺人無疑矣其風木旺證右關脉洪大掌中熱腹皮熱豈可以助火瀉金如寒水來乘脾土其病嘔吐腹痛瀉痢青白益黃散聖藥也今立一方先瀉火補金大補其土是爲神治之法以黃耆二錢人參一錢炙甘草五分加白芍藥一錢此四味皆甘溫能補元氣甘能瀉火內經云熱淫於內以甘瀉之以酸收之白芍藥酸寒能瀉火酸味能瀉肝而大補肺金所補得金土之位金旺火虛風木何由而來尅土然後瀉風之邪夫益黃散理中丸養神之類皆治脾胃寒濕大盛神品之藥也若得脾胃中伏火勞役不足之證及服熱藥巴豆之類胃虛而成慢驚之證用之必傷人命夫慢驚風者皆由久瀉脾胃虛而生也錢氏以羌活膏療慢驚風悞矣脾虛者由火邪乘其土位故曰從後來者爲虛邪火旺能實其木木旺故來尅土當於心經中以甘溫補土之源更於脾土中瀉火以甘寒更於脾土中補金以酸凉致脾土中金旺火衰風木自虛矣

海藏曰驚啼手足瘈瘲睡臥不穩四君子加全蝎去尾尖毒炒釣藤白附子炒等分同煎

脾胃虛弱生風多困四君子加炒半夏麴炙石子等分爲細末入冬瓜子少許同煎服

丹溪曰頻吐瀉將成慢驚用錢氏白术散加山藥扁豆炒肉豆寇麵煨各一錢入薑一片煎服若慢驚已作加細辛天麻各一錢全蝎三箇去梢白附子八分麵煨驚而瀉用參苓芍藥酒炒白术薑煎夏月加黃連甘草竹葉服之

曾氏曰治慢驚者考之古書亦無所據惟載陰癇而已蓋慢驚屬陰陰主靜而搐緩故曰慢其候皆因外感風寒內作吐瀉或得於大病之餘或傳誤轉之後目慢神昏手足偏動口角流涎身微溫眼上視或斜轉及兩手握拳而搐或兼兩足動掣各辨男左女右搐者爲順反此爲逆口氣冷緩或頓門陷此虛極也脉沉無力睡則揚睛而兩目半開半合此眞陽衰耗而陰邪獨盛陰盛生寒寒爲木化木生肝木木爲風化木尅脾土胃爲脾之腑故胃中有風瘈瘲漸生其瘈瘲證狀兩肩微聳兩手垂下時復動搖不已名爲慢驚宜以青州白丸子蘇合香丸入薑汁杵勻米飲調下虛極者加金液丹次用冲和飲同七寶散加緩薑煎服使氣順風散少解吐瀉間以胃苓湯救其表裏若吐不止可投定吐飲瀉不減宜服六柱散或曰生湯去胃風定瘈瘲清神氣五苓散導其逆調榮衛和陰陽若痰多脅白四肢如冰不省人事此虛慢之極用固眞湯速灌之以生胃氣胃氣既回投醒脾散沉香飲調理

慢脾風

慢脾風之候面青額汗舌短頭低眼合不開睡中搖頭吐舌頻嘔腥臭噤口咬牙手足微搐而不收或身冷身溫而四肢冷其脉沉微陰氣極盛胃氣極虛十救一二蓋由慢驚之後吐瀉損脾病傳已極總歸虛處惟脾所受故曰脾風若逐風則無風可逐若治驚則無驚可治但脾間痰涎虛熱往來其眼合者脾困氣乏神志沉迷痰涎凝滯而已然慢之名又曰虛風小兒或吐或瀉之後面色虛黃因虛發熱纔見搖頭斜視昏困額汗身亦粘汗聲沉小而嚥卽脾風之證不必皆因急慢風傳次而至又當識之又慢脾之候言脾而不言胃何也蓋胃爲腑屬陽非若脾乃陰臟也故小兒病傳在腑多自愈在臟不可不治蓋小兒純陽之氣在腑爲順在臟爲逆古人皆理其臟未言

治腑也又腎一臟常主虛不可攻治若腎臟有患但清心肺緣心與腎卽既濟也肺與腎又子母也無與腎藥及諸補藥也慢脾唯吐與瀉積與痢傳入慢候其證變至速虛又速也治必循次平和無令速愈之理藥和且平調脾養胃不可過劑也錢氏有黃土湯以土勝水水得其平則風自止以脾土爲本也

治法大要生胃回陽若眼半開半合手足不冷證候尚在慢驚則勿用回陽或已入慢脾而陽氣未甚脫者亦未可卽用硫黃附子等劑手足漸煖仍以醒脾散等調之

曾氏用青金丹天麻飲灌服或六柱散固眞湯

小兒誤服凉藥或用帛蘸水繳口因此傷動脾胃或泄瀉或腹脹或腹中響

小兒面少血色常無喜笑不看上而視下

小兒顱顱高急頭縫青筋時便青糞

小兒肥壯糞如清涕或如凍汁

小兒時時扎眼糞便青白沫有時乾硬

已上五證忽然嘔叶者必成陰癇俗謂慢驚是也

小兒頭雖熱眼珠青白而足冷或腹脹而足冷或瀉而足冷或嘔而足冷或渴而足冷

頭熱目赤痰塞鼻喉皆無根之火逆也

已上五證忽然吐而作搐者名曰慢脾風速與補脾益眞湯一服三錢重加蠍一枚如因驚而搐者前朴散一服三錢重加附子前胡各半錢同煎

右陳文中治慢驚法其治之次第自成一家故另錄之以備採用其醫案所言芎蠍散油珠膏累累取效

通治急慢驚

急驚合凉瀉慢驚合溫補此定法也其間有急驚凉瀉而不愈變爲慢驚有慢驚溫補而不愈變爲急驚者宜用通治急慢驚藥

小兒急慢驚風發熱口瘡手足伏熱痰熱痰喘痰嗽並用涌法重劑以瓜蔕散輕劑苦參赤小豆末酒酸虀汁調服之後用通神散蜜丸服之間以桑牛陰乾研末調服以平其氣

目睛瞤動

目者肝之竅也肝膽屬風木二經兼爲相火肝藏血血不足則風火內生故目睛爲之瞤動經曰曲直動搖風之象也宜用四物益其血柴胡山梔清其肝陰血內榮則虛風自息矣若因肝經血燥而自病者用六味丸以滋其源因肺金尅肝木者用瀉白散以平金邪若眼眶瞤動者肝木乘脾土也用抱龍丸若愈後驚悸不寐或寐中發搐咬牙目睛瞤動者血虛不能榮筋脈也用補中益氣湯或歸脾湯加茯苓五味蓋有餘者邪氣實也不足者眞氣虛也凡病氣有餘當認爲不足此證兼屬肝脾多爲慢驚之漸尤當審之

脣口蠕動

脣爲脾之華口乃脾之竅又陽明之脉環脣口而交人中陽明胃也是以脾胃虛者多有此證不獨病後而已夫脾主涎脾虛則不能收攝多兼流涎或誤認爲痰而用祛逐之藥則津液益枯不能滋養筋脈遂致四肢抽搐病勢愈甚原其治法與慢脾風相同當用大補脾胃之藥加升麻柴胡切勿用青皮龍膽草之類兼察其色黃者脾弱也青者肝勝也青黃不澤木來尅土也青赤相兼木火風熱也黑爲寒水反來侮土白爲氣虛亡陽凡此宜用六君子湯加小柴胡湯若四肢微搐或潮熱往來或泄瀉嘔吐而色痿黃皆脾胃有傷也宜用白朮黃芪川芎當歸人參陳皮肉豆蔻神麯乾葛白芍藥黃連炙甘草白茯苓以補胃氣若脾胃虛弱者用五味異功散虛寒加木香炮薑若脾氣下陷者用補中益氣湯以升其陽作渴者用七味白朮散以生津液若肝木侮脾者用補中益氣湯加茯苓半夏芍藥以制肝補脾

泄瀉

小兒驚瀉者肝主驚肝木也盛則必傳尅於脾脾土既衰則乳食不化水道不調故泄瀉色青或兼發搐者蓋青乃肝之色搐乃肝之證也亦有因乳母脾虛受驚及怒動肝火而致者經曰怒則氣逆甚則嘔血及飧泄法當平肝補肺愼勿用峻攻之藥脾氣益虛肝邪彌甚甚至抽搐反張者亦肝火熾盛中州虧損之變證也凡見驚證卽宜用四君六君異功散等方加白附子定風柴胡平肝引經以杜漸則必不至瀉搐而自安矣今已見瀉吐驚搐尚不知補脾平肝以保命抱龍鎭驚等藥治之其亦去生遠矣

煩渴

閻氏曰驚風或泄瀉等證煩渴者皆津液內耗也不問陰陽宜煎錢氏白朮散使滿意取足飲之彌多彌好

潮熱似瘧

曾氏曰又有急驚天釣之後變作潮熱手足逆冷有

似瘧疾蓋因病癒之後不善將護外感風邪乘虛而入於經絡再未解散以致如此經曰重陽必陰又曰亢則害承乃制此其義也宜服柴胡加桂湯及當歸散氣實者則以烏犀丸水晶丹略與通利勻氣散止補後以參苓白朮散調理自然平癒此證所用藥品間使苦寒之味務在消陽盛之火肺金得勝肝木自平而風邪亦散斯爲良法

雜證類驚

海藏曰心神不安四君子加辰砂半分棗湯調下

又有一證欲發瘡疹先身熱驚跳或發搐搦此非驚風當用發散藥

曾氏曰暑風一證因夏月感冒風熱太甚致面垢唇紅脈沉細數忽發驚搐不省人事治用消暑清心飲辰砂五苓散及琥珀抱龍丸自安切勿以溫劑調補

診

錢氏曰咬牙甚者發驚

目直面青身反折者生驚

呵欠面青者驚風

呵欠面黃者脾虛驚

目赤兼青者發搐

驚癇發搐男發搐目左視無聲右視有聲女發搐目右視無聲左視有聲相勝故也更有發時證

潔古先生曰男爲木故左視木位無聲右視金位相擊則有聲女爲金故右視金位無聲左視木位亦相擊有聲

又肺虛不瀉者何也曰假令男目右視木克金肝旺勝肺而但瀉肝若更病在春夏金氣極虛故當補其肺愼勿瀉也

湯氏曰凡搐男左女右爲順易治男右女左爲逆難治

脈訣啓蒙曰小兒脈促急爲虛驚

直指云浮數洪緊爲急驚

沉遲散緩爲慢驚

虎口脈紋青紫爲驚風

紅者風熱盛

赤者風熱盛

紫者驚熱

青者驚積

青紫相半驚積風熱俱有主急驚風

青而淡紫伸縮來去主慢驚風

紫絲青絲或黑絲隱隱相雜似出而不出主慢脾風

形勢潛入裏者順

出外者逆

不治證

搐而不休休而再搐

驚叫發搐

汗出足冷

痰滿胃喉

口開目直

急驚眼睛翻轉口中出血兩足擺跳肚腹搐動或神緩而摸體尋衣或證篤而神昏氣促噴藥不下通關不嚏心中熱痛忽大叫者不治

慢驚四肢厥冷吐瀉咳嗽面黯神慘鴉聲胃痛兩脅動氣口生白瘡髮直搖頭眼睛不轉涎鳴喘急頭軟大小二便不禁手足一邊牽引者皆爲不治

慢脾身冷粘汗直臥如尸喘嗽頭軟背直口禁搖頭瘀如牽鋸之聲面無潤澤之色縮脣氣粗者不治

角弓反張

錢氏曰肝有風甚則身反張強直不搐心不受熱當補腎治肝補腎地黃丸治肝瀉青丸

丹溪曰痙比癇爲虛宜帶補多是氣虛有火兼痰用人參竹瀝治之不用兼風藥此論實發前人所未發

湯氏雖云痙候十無一生蓋未嘗有此法施於人也

錢仲陽曰角弓反張者由風邪客於太陽經也經曰風從上受足太陽主周身之氣其脈起於目內眥而行於背肝屬木主風所以風邪易侵也夫小兒肌膚未密外邪易傷肝爲相火其怒易發若身反張強直發熱不搐者風傷太陽也宜用人參羌活散小續命湯若因暴怒而擊動其肝火者宜用瀉青丸若飲前劑其證益甚者此邪氣已去而脾氣虧也宜用異功散加芎歸補之若因肝經虛熱或因尅伐眞氣虛熱生風者宜用異功散地黃丸補之若因下而脾氣困憊肚腹膨脹者此中氣損也宜用白朮散補之若氣血素弱或服攻伐之劑而手尋衣領咬牙呵欠者肝經虛甚也急用地黃丸以補之

天釣

天釣亦驚風之證但天釣發時頭目仰視驚風則無也

湯氏曰小兒瘛瘲不定翻眼搽睛狀若神祟頭目仰視名爲天釣凡有此疾宜服蘇合香丸灸兩手大拇指兩甲肉相半男先灸左女先灸右及兩足大拇指

中間各三五壯又灸前後手心各五壯此皆得效之法

張氏曰小兒心胸壅滯邪熱痰涎蘊積不得宣通或乳母飲酒食肉煩毒之氣流入乳中令兒宿滯不消邪熱毒氣乘於心神致使驚悸眼目翻騰壯熱不休四肢瘈瘲其病名曰天釣甚者爪甲皆青狀如神祟今集經效名方治之於後

癇

婁氏曰驚癇即急慢之證但驚癇發時仆地作聲醒時吐沫急慢驚則不作聲不吐沫也

仁齋曰癇小兒之惡候也蓋小兒血脉不斂氣骨不聚爲風邪所觸爲乳哺失節停結癖積而得之其候神氣怫鬱瞪眼直視面目牽引口噤涎流腹肚膨脹手足搐掣似死似生或聲或啞或項背反張或腰脊强迫但四體柔弱發而時醒者爲癇若一身强硬終日不醒則爲痙證矣

陰陽二癇

陽癇初作時病先身熱瘈瘲驚啼叫喊而後發脉浮者爲陽癇乃急驚也內在六腑外在皮膚爲易治若病先身冷不驚瘈不啼呼而作脉沉者爲陰癇乃慢驚也此病內在五臟外在骨髓劇者難治

曾氏曰陽癇者因感驚風三次發搐不與去風下痰則再發然三次者非一日三次也或一月或一季一發驚搐必經三度故曰三次所謂驚風三發便爲癇卽此義也其病主身熱自汗兩目上視嚼沫咬牙手足掣搦面色紅紫六脉浮數以百解散加五和湯水煎疏解次下痰用水晶丹或半夏丸陰癇者因慢驚後去痰不盡痰入心包而得四肢逆冷吐舌搖頭口噤白沫牙關緊閉但不甚驚搐作啼面色或白或青脉息沉微故孩兒寶書云睡中吐舌更搖頭正此之謂治以固眞湯加丹生湯同煎調寬氣飲和解

風驚食三癇

按千金論三癇蓋有三因之分風癇屬外因驚癇屬內因食癇屬不內外因也又按全嬰方云風癇因將養失度血氣不和或厚衣汗出腠理開舒風邪因入之其病在肝肝主風驗其證目青面紅發搐宜驅風膏大青膏琥珀散鎮驚藥有熱四順飲退後與利驚丸下其痰涎驚癇因血氣盛實臟腑生熱或驚怖大啼精神傷動外邪所入爲之其病在心心主驚驗其證忽然叫聲發搐宜琥珀散紅龍散鎮心丸有熱四順飲利驚丸下之不生別病也食癇其病在脾脾納食驗其證嘔吐瀉氣卽發搐此病或大便酸臭紫丸子下之已上三證大同小異並屬陽也各目睛偏斜手足潮搐或作獃聲發過卽差皆十生一死也

五臟癇

三因云古方有五癇五臟癇六畜癇等各證不同難於備載別錄有五癇之證一曰馬癇作馬嘶鳴以馬屬在午手少陰君火主之故其病應於心二曰羊癇作羊叫聲以羊屬未足太陰濕土主之應乎脾三曰雞癇作雞叫聲以雞屬酉足陽明燥金主之應乎胃四曰猪癇作猪叫聲以猪屬亥手厥陰心包主之應乎右腎五曰牛癇作牛吼聲以牛屬丑手太陰濕土主之應乎肺此五癇應乎五畜應乎五臟者也發則旋轉顛倒口眼相引目睛上搐手足搐搦背脊强直食項乃甦各隨所感施以治法

凡治五癇重者死病後甚者亦死輕者五色丸主之按千金敘六畜癇無五臟之分屬錢氏始分之而無馬癇一證會氏謂初發作羊大聲者咽喉爲風痰所梗聲自如此其理甚明言六畜者特强名耳故丹溪謂於經既無所據而治法亦未見有五者之分所以不必分五也

治法

仁齋曰大概血滯心竅邪氣在心積驚成癇通行心經調平血脉順氣豁痰乃其要也假令小兒有熱有痰不欲乳哺眠睡不安常常驚悸此皆發癇之漸卽以紫霜丸導之時間量與紫霜丸減其盛氣則無驚風癇釣之患癇證方萌耳後高骨間必有青紋紛紛如線見之則爲爪破須令出血啼叫尤得氣通諸癇發不能言者蓋咽喉爲氣之道路風傷其氣以掩聲音道路之門抑亦血滯於心心竅不通所致耳南星炮爲末雄猪膽汁調和少許啖之輒效若夫錢氏五癇丸并南星散以菖蒲煎湯調下甘遂猪心湯和蘇合香丸一丸皆治癇之要藥也

劉氏曰小兒神尚弱驚則神不守舍舍空則痰涎歸之或飲食失節脾胃有傷積爲痰飲以至痰迷心竅而作者治法當尋火尋痰而前人多用鎮墜清心之藥固可以治熱可以清痰若有頑痰膠固者此藥未易驅逐在上者必用吐吐後方宜服此藥有痰實在裏者亦須下之隨病輕重而用之也

潔古曰如有客痰發熱而有聲煎大黃荊芥湯下五色丸

潮熱有時積熱也桃枝丸主之壯熱不退當用地骨皮散下五邑丸

風熱當用防風黃芩湯下大青膏

身溫不熱當用白虎湯加蒼朮下五邑丸

風癇

口議曰先用化痰寬利智腦開通關竅安鎮心神然後與治風癇藥服之又云先用化風丹去其風熱次服奪魂散定癇

驚癇

口議曰先凉三焦利驚去熱安神定志平調藏腑溫化痰涎然後與治驚癇藥服之

不治證

小兒癇病日直無聲目視不轉喉生白障眼慢脊黑瞳人瞬動目間青黑面青指黑口出涎沫如白膿口禁肚脹不乳喉如牽鋸之聲多睡不乳身熱下血不乳身體痿軟不醒腹內虛鳴脊逆而痛叶利不止汗出壯熱不止臥久不寤身體反張大人脊下容一手小兒脊下容一指並不治

尋衣撮空

尋衣撮空許叔微謂之肝熱夫肝主筋筋脈血枯而風引之故手指爲之撮斂也宜確服六味地黃丸間有回生之功錢仲陽用瀉青丸此治肝經實熱蓋尋衣撮空皆病後之敗證耳求其實熱則百無一二矣治者審之王海藏經治血脫尋衣撮空摸牀手揚搖頭錯語失神脈弦浮而虛血脫內躁熱之極也氣粗鼻乾此爲難治用生地黃連湯主之

鷺癰鶴膝

肝者東方青龍木也其動則應於風病則主驚駭諸熱引肝風有風則生痰有痰則作搐小兒驚風之際手足動掣當驗其自定然後舉之兒生異證或父母見其病勢可畏從而按伏之豈知筋者肝之合也臨病發時若按束其手足則筋不舒伸遂至經絡爲風所閉終爲廢人內經曰頑弱名緩風疼重名濕痹又有四肢痿痹不仁致手足枯脹痛不堪忍者此風毒之氣使然故傳曰風淫末疾是也凡小兒心悸不常及遍身腫痛或手足不隨此爲鷺癰候也若治之稍遲至臂脛膝脛骨節之間流結頑核或膝大而腫肉消骨露如鶴膝之狀或爲癰爲癭此名鶴膝候也已上形證并宜發汗爲先使腠理開通則風熱可除有濕亦去用百解散和羌活散倍加麻黃水薑葱煎服微得汗爲度或以麻黃湯發散尤佳次防己湯祛風散及獨活湯加桑寄生按服并防風湯或黑虎丹作小丸子間服使風不生而痰不作則其疾易愈若爲癰爲癭疼重者用黑牽牛半生半炒略研碎煎無灰酒調下五苓散以除流注之寒濕則腫毒可消如大腑閉而不通此是風熱內蘊其右腮紅紫及右手三部脈浮而實滑宜五和湯或當歸散枳殼丸治之其加減之法尤在臨機審處若泥一方非良醫也更宜間服排風湯

薛氏曰鶴膝風者其腿漸細其膝愈麤狀如鶴膝是以名之此因稟腎經不足外邪所乘而患之初則膝內作痛外色不變伸屈艱難若一二月間欻腫色赤而作膿者可治腫硬色白而不作膿者難治初起者用大防風湯爲主佐以益氣養榮湯膿成者用補中益氣湯爲主佐以大防風湯切勿用十宣流氣等藥若不潰不斂或發熱等證者須調補脾胃爲善否則必變敗證矣

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百四十八卷目錄

醫部彙考四百二十八

小兒驚癇門四

小兒衛生總微論方　驚癇咬牙　暗癇　慢驚　急驚風　慢驚風　慢脾風　急慢驚風　慢脾風不治證　天釣驚風　痙癇

陳治幼幼近編　急慢驚　胎驚　發搐　天釣

瑜昌寓意草　論東垣所見驚風　痙

景岳全書　癇病　痙風　驚悸　治癇　慢驚風　急驚風　先兒論　慢驚風　予治是證有五候　論都卷

東醫寶鑑　驚風之候　搐搦之證有五候　論都卷

小兒衛生總微論方

驚癇咬牙

小兒驚癇發搐有咬牙不休及未發發過時亦常咬牙者予醫李統制一子病證如是遂請衆醫調治有言是驚入於腎者此乃喬岳漢東王先生歌中睡裏咬牙驚入腎之句其意謂牙爲骨骨入腎故以言之此常流無據語也古書無有亦無驚入腎之理果用藥無驗今詳校其證特爲明之乃足陽明之病也足陽明爲胃之經起鼻交頞循鼻外入齒中還出挾口環脣下交承漿過頤後出大迎循頰車且發搐爲風風屬木胃屬土木能刑土是以牙齒受風則痒頰車邪干則緊故使咬牙不休以緩頰車之急以解牙齒之痒也治當去胃中風

暗癇

暗癇其病似驚癇又似中風痓病遇其發時則暗地急至令人僵仆心神昏塞志意迷悶氣亂不省手足彈撼戰掉搐搦喉中漉響或吐痰沫或作吼叫其脉三部陰陽俱盛每發遠則終日或半日近則一兩時辰發過便起却如不病之人俗呼謂之癇病稍輕者謂之暗風古人又云小者發則爲驚大者發則爲癇小者氣血怯嫩發即難當而傷多大者氣血壯盛即易任而失少

驚癇餘證

小兒驚癇搐搦至發定之後有諸餘證不退者雖大勢已罷而病本尚在或服冷熱藥過多或汗下之失宜故癇搐難退而有餘證也

驚癇兼別病

小兒病久發搐則五臟俱虛並受其病故發則血亂心氣并肺搐搦肝昏困脾體冷腎又有因虛而別病兼發或別病而因帶驚癇或有一方兼治之者並採而具之

陳治幼幼近編

急慢驚

驚有急慢治隔雲泥急驚者或因感冒發熱或因乳食停滯或忽見忽聞或跌磕受驚驚則入通於肝由是風邪內作火得風而動風火相扇故手足牽引視搖頭張口出舌涎潮上壅也項爾發過則如故其脉洪數浮緊急促緣風火之性急暴故也錢氏謂無陰之證者蓋因心經實熱陰不能以配陽是爲陽盛陰虛之候也痰盛者用稀涎散直取其痰後用川瀉青丸利驚丸鎮驚丸去肝風降心火如口噤不能下者即從鼻中灌入牙關少許隨用吐藥痰盛不得吐者用竹瀝薑汁吐之或以小牛黃丸或滾痰丸下取其痰仍須別其所因而治因食過傷者消其食因冒風寒者散其邪因受驚恐者鎮其心不可槩治以驚藥若驚久不醒急以搐鼻散撚紙條取嚏如不嚏或啼聲不出口噤不省額汗如珠遺尿噴藥皆死證也

慢驚起於吐瀉或久病後因脾肺俱虛則肝木橫行土爲風木所乘故作驚狀似搐而不甚搐似睡而不穩睡面青身冷睡則露睛四肢與口鼻中氣俱冷其脉沉遲虛敗錢氏謂無陽之證者蓋脾土虛甚陽不能以勝陰是陰盛陽虛之候也治宜溫補脾胃爲主總有痰涎亦由脾胃虛不能運化而成不可驟去縱見發搐亦由脾土弱而自招木剋不可截風慢驚本無熱縱或發熱亦是虛熱切禁凉驚惟溫補脾胃則肝木自寧譬猶土薄而上有大木不能乘載故無風而自動厚培其土俾根深本固自無風邪之害矣亦須較量陰陽微甚用藥若方傳慢候尚有陽證者不必回陽止宜異功散以溫養脾胃微加天麻全蠍白附子膽星以截風定搐若陽虛陰盛身凉面青純屬

慢驚者宜加味木附湯加味回陽散若四肢厥冷二便不禁髮直頭搖目睛不轉涎喘鴉聲皆死證也凡驚用鎮驚豁痰藥勿效卽宜安神補心蓋驚屬心氣不足愈下則愈虛痰涎驚氣乘虛入客則不可治矣

胎驚

小兒生下百日內不因驚恐不時發搐或劄眼噤口或涎潮嘔吐拳握身強名曰胎驚先用利驚丸後用抱龍丸

發搐

發搐者皆因熱痰滯於胃腹風火相扇故手足牽引也有搐時男左視無聲右視有聲者女右視無聲左視有聲者此金木相勝故也有目連劄者因肝風內動上入於目也有目直視者因熱入於目牽其筋脈兩眥俱緊不能轉盼故也若急驚及風癇發搐宜利驚丸滾痰丸俱用薄荷天麻釣藤煎湯送下若吐瀉後病後慢驚發搐此脾胃虧損之虛象也無風可祛無痰可逐宜六君子加天麻釣藤芎藥木香柴胡制肝補脾陽氣脫陷者補中益氣湯加薑桂陽氣虛敗者參附湯若因飲食停滯痰涎壅滿而見此證者乃脾土弱不能生金金虛不能平木故木邪妄動也宜健脾消食其證自愈不可用凉驚等藥凡搐頻者風在表也易治宜發之搐稀者風在藏也難治宜補脾

天釣

天釣屬心肺積熱所致其證涎潮搐搦項強痰鳴雙眸翻上爪甲色青皆痰熱壅滯上焦所致宜先用滾痰丸去其積熱與痰後以凉膈散隨虛實增損調治之

內釣

內釣屬脾胃虛寒寒主收引故傴僂拳曲腹痛多啼唇黑糞腫也宜理中湯加木香吳茱萸肉桂

喻昌寓意草

傷寒卽是驚風

門人問曰驚風一證雖不見於古典然相傳幾千百年吾師雖闢其謬頑鈍輩尚不能無疑請明辨之以開聾聵答曰此問亦不可少吾爲子輩大破其惑因以破天下後世之惑蓋小兒初生以及童幼肌肉筋骨臟腑血脈俱未充長陽則有餘陰則不足不比七尺之軀陰陽交盛也惟陰不足陽有餘故身內易至於生熱熱盛則生痰生風生驚亦所恆有設當日有立名曰熱痰風驚則人不駭因四字不便立名乃節去二字以驚字領頭風字煞尾後人不解遂以爲奇特之病且謂此病有八候以其頭搖手動也而立抽掣之名以其卒口噤脚攣急也而立目邪心亂搐搦之名以其脊强背反也而立角弓反張之名相傳既久不知其妄造遇見此等證出無不以爲奇特而不知小兒之腠理未密易於感冒風寒風寒中人必先中入太陽經太陽之脈起於目內眥上額交巔入腦還出別下項夾脊抵腰中是以病則筋脈牽强因筋脈牽强生出抽掣搐搦角弓反張種種不通名目而用金石藥鎮墜外邪深入臟腑千中千死萬中萬死間有體堅證輕得愈者又詫爲再造奇功遂至各守額門雖日殺數兒不自知其罪矣百年之間千里之遠出一二明哲終不能一一盡剖疑關如方書中有云小兒八歲以前無傷寒此等胡言竟出自高明偏足爲驚風之說樹幟旁不思小兒不耐傷寒初傳太陽一經蚤已身强多汗筋脈牽動人事昏沉勢已極於本經湯藥亂投死亡接踵何由見其傳經解散耶此所以悞言小兒無傷寒也不知小兒易於外感易於發熱傷寒爲獨多世所妄稱爲驚風者卽是也小兒傷寒要在三日內卽愈爲貴若待經盡方解必不能耐矣又剛痙無汗柔痙有汗小兒剛痙少柔痙多世醫見其汗出不止神昏不醒往往以慢驚風證爲名而用參芪朮附等藥閉其腠理熱邪不得外越亦爲大害但比金石藥爲差減耳所以凡治小兒之熱但當徹其出表不當固其入裏也仲景原有桂枝法若舍而不用從事東垣內傷爲治毫釐千里最宜詳細又新產婦人去血過多陰虛陽盛其感冒發熱原與小兒無別醫者相傳稱爲產後驚風尤堪笑破口頰要知吾闢驚風之說非謂無驚病也小兒氣怯神弱凡遇異形異聲驟然跌仆皆生驚怖其候面青黃青多煩多哭喜過於分別不比熱邪塞竅神識昏迷對面撞鐘放銃全然不聞者細詳勘驗自識驚風鑿空之謬予輩既遊吾門日引光明勝義洗濯肺腸忽然靈悟頓開便與飲上池無二若但於言下索解則不能盡傳者多矣

痙

小兒之體脆神怯不耐外感壯熱多成痙病後世妄以驚立名有四證生八候之鑿說實則指痙病之頭搖手勁者爲驚風之搐搦指痙病之項背反張者爲驚風之角弓反張幼科翁然宗之病家坦然任之不

治外淫之邪反投金石腦麝之藥千中千死而不悞也

景岳全書

癲癎

錢仲陽曰小兒發癎因血氣未充神氣未實或爲風邪所傷或爲驚怪所觸亦有因娠時七情驚怖所致若眼直目牽口噤涎流肚膨發搐項背反張腰脊強勁形如死狀終日不醒則爲痓矣凡治五癎皆隨臟治之每臟各有一獸之形通用五色丸爲主仍參以各經之藥發而重者死病甚者亦死如面赤目瞪吐舌嚙脣心煩氣短其聲如羊者曰心癎血虛用養心湯發熱飲冷爲實熱用虎睛丸發熱飲湯爲虛熱用辰砂妙香丸面青脣青兩眼上竄手足攣掣反折其聲如犬者曰肝癎肝之虛者用地黃丸抽搐有力爲實邪用柴胡清肝散大便不通用瀉青丸面黑目振吐涎沫形體如尸其聲如猪者曰腎癎用地黃丸紫河車丸之類腎無瀉法故徑從虛治之面如枯骨目白反視驚跳反折搖頭吐沫其聲如鷄者曰肺癎肺氣虛者用補肺散面色痿黃者土不能生也用五味異功散面色赤者陰火上衝於肺也用地黃丸面色痿黃目直腹滿自利四肢不收其聲如牛者曰脾癎用五味異功散若面青瀉痢飲食少思用六君子加木香柴胡若發熱抽掣仰臥面色光澤脉浮者病在腑爲陽證易治身冷不搐覆臥面色黯黑脉沉者病在臟爲陰證難治凡有此證先宜看耳後高骨間若有青脈紋先抓破出血可免其患此皆元氣不足之證也須以紫河車丸爲主而以補藥佐之設若泛行尅伐復傷元氣則必不時舉發久而變危多致不救又有驚癎風癎食癎二種治驚癎宜比金丸扶神丸錢氏養心湯辰砂妙香散清神湯虎睛丸之類主之風癎用錢氏牛黃丸消風丸星蘇散之類主之食癎用妙聖丹主之

驚風

驚風之要領有二一曰實證一曰虛證而盡之矣蓋急驚者陽證也實證也乃肝邪有餘而風生熱熱生痰痰熱客於心膈間則風火相搏故其形證急暴而痰火壯熱者是爲急驚此當先治其標後治其本慢驚者陰證也虛證也此脾肺俱虛肝邪無制因而侮脾生風無陽之證也故其形氣病氣俱不足者是爲慢驚此當專顧脾腎以救元氣雖二者俱名驚風而虛實之有不同所以急慢之名亦異凡治此者不可不顧其名以思其義

小兒驚風肝病也亦脾腎心肺病也蓋小兒之眞陰未足柔不濟剛故肝邪易動肝邪動則木能生火火能生風風熱相搏則血虛血虛則筋急筋急則爲掉眩反張搐搦強直之類皆肝木之本病也至其相移木邪侮土則脾病而爲痰爲吐瀉木盛金衰則肺病而爲喘促爲短氣木火上炎則心病而爲驚叫爲煩熱木火傷陰則腎病而爲水涸爲血燥爲肝渴爲汗不出爲搐爲痓此五臟驚風之大槩也治此之法有要存焉蓋一曰風二曰火三曰痰四曰陽虛五曰陰虛但能察此緩急則盡之矣所謂風者以其強直掉眩皆屬肝木風木同氣故云驚風而熱非外感之證今人不明此義但爲治風必須用散不知外來之風可散而血燥之風不可散也故凡如防風荊芥羌活獨活細辛乾葛柴胡紫蘇薄荷之類使果有外邪發熱無汗等證乃可暫用如無外邪則最所當忌此用散之不可不愼也所謂痰火者痰凝則氣閉火盛則陰虧此實邪之病本也若痰因火動則治火爲先火以痰留則去痰爲主火之盛者宜龍膽草山梔子黃連黃藥石膏大黃之屬火之微者宜黃芩知母元參石斛地骨皮木通天麻之屬痰之甚者宜牛黃膽星天竺黃南星半夏白芥子之屬痰之微者宜陳皮前胡海石貝母天花粉之屬此外如硃砂之色赤體重故能入心鎭驚內孕水銀故善透經絡墜痰降火雄黃之氣味雄悍故能破結開滯直達橫行冰片麝香乃開竅之要藥琥珀青黛亦清利之佐助而已又如殭蠶全蝎蟬蛻之屬皆云治風在殭蠶味鹹而辛大能開痰涎破結氣用佐痰藥善去肝脾之邪邪去則肝平是卽治風之謂也全蝎生於東北色青屬木故善走厥陰加以鹽味鹹而降痰是亦同氣之屬故云治風較之殭蠶此其次矣蟬蛻性味俱薄不過取其清虛輕蛻之義非有實濟不足恃也凡驚風之實邪惟痰火爲最而風則次之治實之法止於是矣然邪實者易制主敗者必危蓋陽虛則陰邪不散而元氣不復陰虛則營氣不行而精血何來所以驚風之重重在虛證不虛不重不竭不危此元精元氣相爲並立有不容偏置者也故治虛之法當辨陰陽陽虛者宜燥宜剛陰虛者宜溫宜潤然善用陽者氣中自有水善用陰者水中自有氣造化相須之妙既有不可混乂有不可離者如此設有謂此非小兒之藥此非

驚風之藥者豈驚風之病不屬陰陽而小兒之體不由血氣乎若夫人者開口便可見心又烏足與論乾坤合一之道

驚風反張强直轉筋等病在經筋篇曰足少陰之筋病足下轉筋及所過而結者皆痛病在此者主癇瘈及痙在外者不能倪在內者不能仰故陽者腰反折不能倪陰病者不能仰又曰經筋之病寒則反折筋急熱則筋弛縱不收陰痿不用陽急則反折陰急則倪不伸

急驚風

急驚之候壯熱痰壅視反張搐搦顫動牙關緊急口中氣熱頰赤唇紅飲冷便結脈沉洪數此旺邪風熱陽盛陰虛證也治此之法當察緩急凡邪盛者不得不先治其標若痰甚喘急者宜抱龍丸琥珀散清膈煎梅花飲之類主之火盛而煩熱者宜凉驚丸抑清丸或黃連安神丸牛黃散及山梔黃連龍膽草之屬火盛燥熱而大便祕結者宜瀉青丸或以爲湯煎服之或利驚丸亦可若外感風寒身熱爲驚者當解其表宜抑肝散倍加柴胡或參蘇飲五積散星蘇散之類擇而用之若表邪未解而內亦熱者宜錢氏黃龍湯若驚風漸退而火未清者宜安神鎮驚丸凡以上者皆急則治標之法但得痰火稍退即當調補血氣如後附薛氏之法或參用慢驚諸治以防虛敗此幼科最要之法前哲有云小兒易爲虛實攻伐之藥中病即止不可過劑誠至言也大抵此證多屬肝膽脾腎陰虛血燥風火相搏而然若不顧眞陰過用祛風化痰之藥則脾益虛血益燥邪氣緜延必成慢驚矣

婁全善曰急驚屬木火土實木實則搐而有力及日上視動劄頻睫土實則身熱面赤而不吐瀉便睡合睛治法宜凉宜瀉而用凉驚利驚等丸亦有因驚而發者以致牙關緊急壯熱等證此內有實熱外挾風邪當截風定搐若痰熱尚盛宜徹下之痰熱既泄急宜調養胃氣搐定而痰熱少退即宜調補脾氣

慢驚風

慢驚之候多由吐瀉因致氣微神緩昏睡露睛痰鳴氣促驚跳搐搦或乍發乍靜或身凉身熱或肢體逆冷或眉唇青赤面色淡白但其脈遲緩或見細數此脾虛生風無陽證也小兒慢驚之病多因病後或以吐瀉或因誤用藥餌損傷脾胃所致然亦有小兒脾胃素弱或受風寒則不必病後及誤藥者亦有之總屬脾腎虛寒之證治慢驚之法但當速培元氣即有風痰之類皆非實邪不得妄行消散再傷陽氣則必致不救凡脾土微虛微瀉而內不寒者可平補之宜六神散四君子湯或五味異功散脾腎俱虛而臟平無寒者宜五福飲且陰血生於脾土又宜四君子加當歸棗仁脾氣陽虛微寒者宜溫胃飲理中湯五君子煎脾氣虛寒多痰者宜六君子湯或金水六君煎脾腎陰陽俱虛而寒者惟理陰煎爲最妙脾腎虛寒之甚或吐瀉不止者宜附子理陰煎再甚者宜六味回陽飲或四味回陽飲量兒大小與之脾腎虛寒泄瀉不止者宜胃關煎

急驚屢發屢用攻瀉則脾損陰消而變爲慢驚者多矣當補脾養血佐以安心清肺制木之藥最爲切當

竊謂前證多因脾胃虧損肝木所勝外虛熱而內眞寒也但用五味異功散加當歸佐以釣藤飲以補脾土平肝木亦多得效如不應用六君加炮薑木香溫補脾土更不應急加附子以回陽若用逐風驅痰之藥反促其危也愚按附子溫中回陽爲慢驚之聖藥如元氣脫用之無有不效氣脫甚者急宜炮用之

大驚卒恐

小兒忽被大驚最傷心膽之氣口問篇曰大驚卒恐則氣血分離陰陽破散經絡厥絕脈道不通陰陽相逆經脈空虛血氣不大及失其常此內經槩言受驚之病有如此矧小兒血氣尤非大人之比若受大驚則其神氣失散潰亂不堪尚何實邪之有斯時也收復正氣猶恐不暇顧可復爲清散耶即如硃砂琥珀之類不過取其鎮重之意亦非救本之法今幼科諸書皆以大驚之證例作急驚論治誤亦甚矣不知急驚慢驚一以風熱一以脾腎之虛皆不必由驚而得而此以驚恐致困者本心膽受傷神氣陡離之病所因不同所病亦異胡可以同日語也

治大驚氣散之病當以收復神氣爲主宜祕旨安神丸七福飲茯神湯團參散獨參湯之類加金銀等物煎服之

驚啼

小兒驚啼證本與驚風不同亦與大驚卒恐者有異蓋小兒肝氣未充膽氣最怯凡耳聞聲聲目視驟色雖非大驚卒恐亦能怖其神魂醒時受怖寢則驚惕或振動不寧或忽而啼叫皆神怯不安之證總宜安神養氣爲主如獨參湯團參散七福飲祕旨安神丸

之類皆其所宜若微煩熱者宜生脈散熱甚者宜硃砂安神丸或導赤散驚哭多淚忽啼忽止者是驚傷啼叫無淚聲長不揚者是腹痛

發搐

搐抽搐也是即驚之屬但暴而甚者謂之驚風微而緩者謂之發搐發搐不治則漸成驚風矣雖錢氏等書皆以時候之氣五藏之證爲論治然病變不測有難以時氣拘者是不若察見在之形證因藏腑之虛實隨宜施治者之爲得也總之小兒之實證無他惟東方之實及中央之滯耳蓋東方木實生火生風而爲熱爲驚中央土實則生濕生滯而爲痰爲積知斯二者則知所以治實矣若小兒之虛證則五藏皆有之如心虛則驚惕不安肺虛則氣促多汗脾虛則爲嘔吐爲暴泄爲不食爲痞滿倦臥爲牙緊流涎爲手足牽動肝虛則爲筋急血燥爲抽搐勁強爲斜視目瞪腎虛則爲二便不禁爲津液枯槁爲聲不出爲戴眼爲肢體厥逆爲火不歸源知此五者則知所以治虛矣然此虛實之證固亦多有疑似者但以形色聲音脈息參而察之則無有不燦然者諸治實之法當從急驚治虛之法當從慢驚及如後夜啼諸治法已盡其蘊當并察之總之諸言實者乃邪氣之實非元氣之實也故治此者切不可傷及元氣若病已久尤當專顧腎脾則根本完固諸無不愈矣

若曲腰啼叫哭而無淚者多係腹痛宜木香散或用溫胃飲加木香若脾腎寒甚而兼帶作痛者宜陳氏十二味異功散若過用乳食停滯作痛邪實無虛而啼者宜保和丸和胃飲加減主之甚者宜消食丸若陰盛陽衰心氣不足至夜則神有不安而啼叫者宜四君子湯五味異功散或七福飲祕旨安神丸若面青手冷陽氣虛寒心神驚怯而啼者宜五君子煎或六味異功煎甚者宜七福飲加炮乾薑肉桂若兼泄瀉不乳脾腎虛弱也宜六神散甚者養中煎胃關煎若兼吐瀉少食脾胃虛寒也宜五君子煎溫胃飲或六味異功煎加炮木香若大便不化食少腹脹脾氣虛弱也宜五味異功散或五君子煎加木香若面色白黑睛少至夜分陰中陽虛而啼者此肝腎之不足也宜六味丸八味丸理陰煎若見燈見火愈啼者心熱也心屬火見火則煩熱內生兩陽相搏故仰身而啼其證面赤手腹俱煖口中氣熱是也火之微者宜生脈散導赤散火之甚者宜硃砂安神丸人參黃連散若肝膽熱甚木火相搏者宜柴胡清肝散大都此證或因吐瀉內亡津液或稟賦腎陰不足不能滋養肝木或乳母恚怒肝火侮金當用六君子湯補脾土以生肺金地黃丸壯腎水以滋肝木若乳母鬱悶而致者用加味歸脾湯乳母暴怒者加味小柴胡湯乳母心肝熱搏者柴胡清肝散若因驚夜啼者宜從前驚啼論治

東醫寶鑑

驚風證

小兒之病急慢驚風與夫痘疹等證最爲酷疾以其吉凶反掌生死須臾故也

小兒驚風三發則爲癇乃惡證也

小兒疾之最危者無越驚風之證驚有急驚慢驚慢脾風三者之異

驚風先見證

凡乳兒欲發驚風者先神志不定恍惚懼人剳眼上視左顧右盼伸手握拳悶鬱努氣情態不如尋常皆驚風先見證也

肝有風目連剳不搐有熱則目直視亦不搐得心熱則搐其子母俱有實熱風火相搏故也

王氏曰木能勝土熱動心神而生驚

錢氏曰肝風心火二藏交爭而致搐也

四證八候

四證者驚風痰熱也其肝主風其脾主痰其肺作熱其心發驚四證相臨重者先發

八候者一搐二搦三掣四顫五反六引七窜八視

一搐者臂肘搐縮

二搦者十指開合搦之不已即成握拳男子看大拇指其指握在外爲順在裏爲逆女子反看之

三掣者肩膊搐掣或連身跳起

四顫者或手或脚或頭或身四體顫動

五反者身首反張

六引者以手有如挽弓狀男左手直右手曲爲順右直左曲爲逆女子反看之

七窜者眼上窜覷高男子上窜爲順下窜爲逆女子反看之

八視者男子斜目視左爲順視右爲逆視女子反看之

痰搐

凡搐痰因氣順則痰化而搐自止先以蘇合香丸以薄荷湯入薑汁化下或星香散

驚搐之證有五

驚搐一也而有晨夕之分表裏之異身熱力大者爲急驚身冷力小者爲慢驚仆地無聲醒時吐沫者爲癎頭目仰視者爲天弔角弓反張者爲痙治各不同也

搐搦瘈瘲輕重

其有搐搦反張斜視而牙關不緊口無痰涎者多是外感或內傷夾驚而成謂之假搐非內生驚癎也宜參蘇飲人參羌活散

搐搦者手足牽引一伸一縮卽瘈瘲之甚者也

閻孝忠曰似搐而不甚搐此名瘈瘲

急驚初則搐搦俱作久而搐住只搦有急有緩但只肩動瘈瘲者候之輕也搐則盛也搦又重也

急驚風

急驚乃卒然得之心受驚肝主風致筋脈搐搦肝又主筋宜通心飲瀉青丸涼驚丸大青膏

急驚者因聞不常之聲或遇禽獸之叫以致牙關緊急壯熱涎潮窠視反張搐搦顫動口中熱氣頰赤脣紅大小便黃赤其脈浮數洪緊蓋由內有實熱外挾風邪心家受熱而積驚肝家生風而發搐肝風心火二臟交爭血亂氣併痰涎壅塞所以百脈凝滯關竅不通風氣蕃盛而無所泄故暴烈也

治法通關截風定搐去痰其熱尚作則當下之一泄已後急須和胃鎮心截風定搐先與開關散噁驚散次與驅風育鎮心丸鎮肝丸錢氏安神丸鎮驚丸保幼化風丹靈神膏痰盛宜抱龍丸截風丸鎮心安神宜金箔鎮心丸寧心膏所謂溫驚丸利驚丸凉驚丸者蓋虛則溫之實則利之熱則凉之是謂活法

驚風形證不明若言陰證則渾身又溫若作陽證則又不大搐乃陰陽不分宜用防風溫膽湯下大驚丸小驚丸

急驚先當定搐搐由風也風由熱也搐旣已作方可下熱退驚熱若不退驚亦不散

急驚截風定搐爲要風搐旣定次與下熱去則無風散則不搐

慢驚風

慢驚者得於大病之餘吐瀉之後及過服寒凉藥其證眼慢騰騰或露睛手足瘈瘲面色青白渾身四肢冷默默聲其脈沉遲用白术散益黃散加防風冬瓜仁煎服

慢驚陰證急驚陽證傳來纔經吐瀉便是慢驚男子以瀉得之爲重女子以吐得之爲重

慢驚純陰證宜烏蠍散陽證尚在宜蟬蠍散

方傳慢候而尚有陽證不必回陽但與截風調胃用蟬蠍散醒脾散若手足冰冷方可回陽用硫黃附子如腦麝銀粉巴硇輩一切禁斷

古云病家怕驚不怕瀉醫家怕瀉不怕驚如泄瀉不止且先治瀉若便治風則驚風愈甚

瀉滑青者防慢驚蓋瀉青色者乃夾驚木尅土也

凡兒瀉出青色者由脾土受肝木尅勝而見本質由其臟之虛寒黃芪益黃散主之

小兒慢驚或吐利不止變成虛風搐搦者非風也胃氣欲絕故也用來復丹五粒研碎末飲送下卽效

慢驚宜用溫驚丸神效散觀音散全蝎觀音散三味天漿子散補脾湯保生丹延生丹參术半夏湯防風丸銀白散

涎盛宜奪命散雙金丸南星飲

慢驚風不治證

似搐而不甚搐似睡而精神慢四肢與口中氣皆冷睡中露睛或胃痛而啼哭如獐聲此證已危蓋脾胃虛損也

慢驚欲絕之時虛痰上攻咽喉引氣呼吸聲大脈來浮數是謂陰盛强陽錯認以爲陽氣已復直與峻藥下痰痰隨藥下藥隨痰絕人人咎醫殺之此不識覆燈將絕之候雖不下藥亦無生意矣

急慢驚風通治

宜備急丸牛黃抱龍丸保命丹至聖保命丹千金散星香散朱粉散奪命散探生散

慢脾風

若見眼合卽是脾風

慢驚察視爲要眼睛昏定爲重窠視爲重四肢厥冷爲重睛定不眨爲重難眨不左右顧亦重汗出如油亦重口面忽作黯黯色至重眼在半合半開之間乃知陰氣所盛傳入腦間陽氣已虧脾經屬陰次第入脾故言慢脾風候

慢驚其眼半開半合則當預作慢脾風調理之

慢脾風用藥乃不得已也其危如燈無油漸見昏滅錢氏用金液丹與青州白丸子各半研勻飯飲薄荷湯下一錢此截風回陽也

小兒頭雖熱眼珠青白而足冷

頭雖熱或腹脹而足冷
頭雖熱或泄瀉而足冷
頭雖熱或嘔吐而足冷
頭雖熱或渴而足冷
已上五證作搐者名曰慢脾風速與補脾益眞湯加全蠍一枚或全蠍觀音散

慢脾風不治證

身冷粘汗直臥如尸喘嗽頭軟背直口噤頭搖大小便不禁脣縮氣麤痰如牽鋸之聲者不治
慢脾風若見一臟絕卽不可用藥如眼無光指甲黑四肢垂軃五體俱冷並不須下藥

天釣驚風

孫眞人曰乘馬遠行當沐浴更衣然後方可近於嬰兒否則多爲天弔急驚之疾錢仲陽曰步履糞穢之氣無使近於嬰兒令兒急驚風搐也
天弔亦驚風之證但天弔發時頭目仰視驚風則無也
此由乳母過飧熱毒心肺生熱加以外感風邪所致宜用九龍控涎散釣藤散熱盛則保命丹痰盛則抱龍丸黑傴僂反張外腎腫尿如米泔眼有紅筋血點乃寒氣壅結宜釣藤膏

痓痙

痓與痙亦驚風之類
痓者手足冰冷痙者氣身強直痓痙本一病當以陽剛陰柔別之剛者有汗柔者無汗其證肢體強直腰身反張甚於風癇大抵不治

癲癇

驚風三發則爲癇者小兒惡病也大人曰癲小兒曰癇其實一也又曰十歲以上爲癲十歲以下爲癇
驚癇卽急驚之證但驚癇發時仆地作聲醒時吐涎沫急慢驚則不作聲不吐沫也
癇者卒然暈倒目瞪流涎神氣鬱勃四肢搐搦沉默昏憒似死似生其聲惡叫過後惺惺
錢氏方有五癇病關五臟用五色丸
治法惟以驚風食三種陰陽二證別而治之
驚癇者恐怖積驚而發啼叫恍惚宜定魄丸沉香天麻湯
風癇者邪外襲先屈手指如數物乃發宜追風祛痰丸
食癇者乳食時遇驚停積或成癖或大便酸臭宜紫霜丸
始也身熱抽掣啼叫是爲陽癇易治宜龍腦安神丸清心滾痰丸
始也身無熱手足清冷不抽掣不啼叫是爲陰癇難治宜五色丸引神歸舍
因急驚爲癇宜五癇丹
因慢驚成癇取來復丹薄荷泡湯化下一二丸得利卽愈
又有胎中受驚成癇宜燒丹丸
內經有云厥成爲癲疾又曰邪搏陽則爲癲疾風眩之病起於心氣不足胷上蓄熱實痰熱相感而動風風心相亂則悶瞀故謂風眩
痰在膈間則眩微不仆痰溢膈上則眩甚仆倒於地而不知人名之曰癲癇大人曰癲小兒曰癇其實一也又曰仆倒不醒皆由邪氣逆上陽分而亂於頭中也癲癇者痰邪逆上也痰邪逆上則頭中氣亂氣亂則脉道閉塞孔竅不通故耳不聞聲目不識人而昏眩倒仆也以其病在頭巔故曰巔疾
癇有五肝曰鷄心曰馬脾曰牛肺曰羊腎曰猪以病狀偶類故爲名其實痰火與驚三者而已
大率多因痰結於心胷間宜開痰鎭心神若神不守舍狂言妄作經年不愈如心經蓄熱當清心除熱如痰迷心竅當去痰寧心宜大吐大下而愈
凡癲癇仆時口中作聲將醒時吐涎沫醒後又復發時作時止而不休息中風中寒中暑尸厥之類則仆時無聲醒時無涎後不再發
癲者異常也平日能言癇則沉默平日不言癲則呻吟甚則僵仆直視心常不樂言語無倫如醉如痴癇者卒然暈倒咬牙作聲吐涎沫不醒人事隨後醒醒胎癇宜燒丹丸又身熱脉浮爲陽癇宜妙香丸身涼脉沉爲陰癇宜五生丸肥人多痰宜追風祛痰丸加味壽星丸引神歸舍丹瘦人火盛宜清心滾痰丸龍腦安神丸痰迷心竅宜金箔鎭心丸控涎丸痰火俱盛者宜甘遂散吐下之因驚者宜驚氣丸抱龍丸因怒者宜寧神導痰湯當歸龍薈丸心臟虛損氣血不足宜滋陰寧神湯清心溫膽湯歸神丹婦人宜加味逍遙散硃砂膏五癇通治宜龍腦安神丸五癇丸六珍丹錢氏五色丸育魂丹丑寶丸鴟頭丸活虎丹蝙蝠散礬丹丸癇愈復發宜斷癇丹

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百四十九卷目錄
醫部彙考四百二十九
小兒驚癇門五
方一 龍膽湯 大黃湯 白羊鮮湯 艾虎湯 茵芋圓 鎮心圓 丹參摩膏 雙金散 不驚丸 神穴丹 奪命散 還魂丹 乳香丸 中分散 醒脾散 活脾散 抱龍丸 肥兒丸 蘇合香丸 隆痰丸 鳥雞丸 青丸 抑肝散 寫心散 導赤散 生犀散 祕旨安神丸 馮黃散 瓜蔞湯 溫驚丸 人參理中丸 調中丸 張氏保生丹 安神丸 木附湯 太乙保生丹 聚香丹 金箔鎮心丸 君子湯 天南星散 烏沉湯 蘇沉香散 青丸 銀白散 黑附子湯 四君子湯 瓦粉膏 利驚丸 四物湯 朱砂膏 黃連安神丸 牛黃清心丸 涼驚丸 擦牙 通關散 至聖保命丹 大黃丸 十味安神丸 浴體法 塗頭法 五色丸 驚癇丹 宣風散 補腦丸 銀丸 羌活膏 抱龍丸 天竺黃散 竹瀝鉤 飲 大青膏 溫白丸 牛黃丸 白丹子 蛇黃丸 妙聖丹 消風丸 祛風 保安丸 此金丸 虎潛丸 清神湯 密陀僧散 蟾酥丸 代赭石散 化風丹 扶神湯 酸棗仁丸 定志丸 養心湯 妙香散 大黑龍丸 神聖牛黃會命散 君雲散
藝術典第四百四十九卷
醫部彙考四百二十九
小兒驚癇門五
方一
龍膽湯 下同 千金方
治嬰兒出腹血脈盛實寒熱溫壯四肢驚掣發熱大吐哯者若已能進哺中食實不消壯熱及變蒸不解中客人鬼氣幷諸驚癇方悉主之十歲已下小兒皆服之小兒龍膽湯第一此是新出腹嬰兒方若日月長大者以次依此爲例若必知客忤及有魅氣者可加人參當歸各加龍膽多少也一百日兒加三銖二百日兒加六銖一歲兒加半兩餘藥皆準此耳
龍膽 釣藤皮 柴胡 黃芩 桔梗 芍藥 茯苓一作茯神 甘草各六銖 蜣螂二枚
大黃一兩
右十味㕮咀以水一升煮取五合爲劑也服之如後節度兒生一日至七日分一合爲三服兒生八日至十五日分一合半爲三服兒生十六日至二十日分二合爲三服兒生二十日至三十日分三合爲三服兒生三十日至四十日盡以五合爲三服皆得下卽止勿再服也
大黃湯
治少小風癇積聚腹痛夭矯二十五癇
大黃 人參 細辛 乾薑 當歸 甘皮各三銖
右六味㕮咀以水一升煮取四合服如棗許日三
白羊鮮湯
治小兒風癇胷中有疾
白羊鮮二銖 蚱蟬二枚 大黃四銖 甘草 釣藤皮 細辛各三銖 牛黃如大豆四枚 蛇蛻皮一寸
右八味㕮咀以水二升半煮取一升二合分五服日三
若服已盡而癇不斷者可更加大黃釣藤各一銖以水漬藥半日然後煮之
艾虎湯
治小兒驚辟惡氣以此湯浴之
艾一斤 虎頭骨一枚
右以水三斗煮爲湯浴但須浴卽煮用之
茵芋圓
治少小有風癇至長不除或遇天陰節變便發動食飲堅強亦發百脈攣縮行步不正言語不便者服之永不發
茵芋葉 鉛丹熬 秦艽 釣藤皮炙 石膏 杜蘅 防葵各一兩 菖蒲 黃芩各一兩半 松蘿半兩 蜣螂十枚 甘草三兩
右十二味爲末蜜丸如小豆大三歲已下服五丸三歲已上服七丸五歲已上服十丸十歲已上可至十五丸
鎮心圓
治小兒驚癇百病鎮心氣
銀屑十銖 水銀二十銖 眞牛膽黃六銖
紫石英 珍珠 防葵 鐵精各四分 茯神 茯苓三分 遠志 防己 白斂 雄黃 人參 芍藥各二分 大黃六分
右十六味先以水銀和銀屑如泥別治諸藥和丸二歲兒如麻子二丸隨兒大小增之
一方無牛黃一味
丹參摩膏
治小兒驚癇發熱
丹參 雷丸各半兩 猪膏二兩
右同煎七上七下濾去滓盛之每以摩兒身上日三次

雙金散 直指方

治小兒天弔驚風目久不下眼見白睛及角弓反張聲不出者

大蜈蚣一條去頭足酥炙用竹刀批開記定左右

麝香一錢亦分左右各記明

右研末包定每用左邊者吹左鼻右邊者吹右鼻各少許不可過多若眼猶未下再吹些須眼下乃止

神穴丹 靈苑方

治急驚風癇疾天弔疳熱等證

紫色蛇黃四兩煅過　豶豬屎一兩小者泥固煅

鐵粉一兩　硃砂半兩　麝香一錢

右爲末糯米糊丸芡子大漆盤曬乾看之每丸有一小穴故名神穴每服一丸薄荷酒化下立甦

疳結冷水化下

奪命散 湯氏嬰兒寶方

治小兒急慢驚風痰涎壅塞咽喉命在須臾服此墜下風痰乃治驚利痰之聖藥也

眞礞石一兩　焰硝半兩

右同煅過爲末每服半錢或一錢

急驚痰熱者薄荷荊芥湯入生蜜調下

慢驚脾虛者木香湯入熟蜜調下 按礞石焰硝利痰雖有奇功若因脾胃虛弱而致者非所宜也

王肯堂曰此藥大能控風涎不問急慢驚風痰潮壅盛塞於咽喉其響如潮名曰潮涎百藥不能過咽命在須臾但先用此藥入喉痰即墜下功有萬全奪天地之造化也　又曰急驚風痰壅上身熱如火用生薄荷自然汁入蜜調微溫服之良久其藥自裏痰墜下從大便出如稠涕膠粘乃藥之功也次服退熱祛風截驚等藥慢驚風亦以痰涎潮上塞住咽喉藥食俱不能入醫者技窮勢迫以待其盡但用此藥以青州白丸再研爲末煎如稀糊熟蜜調下其涎即墜入腹次服花蛇川烏全蠍蜈蚣等藥

萬金散 聖惠方下同

治小兒急驚

蜈蚣一條全者去足炙爲末　丹砂　輕粉各等分

右研勻陰陽乳汁和丸菉豆大每歲一丸

返魂丹

治小兒慢驚及天弔夜啼

蝙蝠一枚去腸翅炙黃焦　人中白乾　全蠍焙

麝香各一分

右爲末煉蜜爲丸菉豆大每服乳汁下三丸

不驚丸 陳文中小兒方

治小兒驚風吐逆作搐痰涎壅塞手足掣瘲眼睛邪視

枳殼去穰麩炒　淡豆豉各等分

右爲末每服一錢甚者二錢

急驚薄荷自然汁下

慢驚荊芥湯入酒三五點日三服

中分散 普濟方下同

治小兒驚風定搐

螳蜋一箇　蜥蜴一條　赤足蜈蚣一條各中分之

隨左右研末記定男用左女用右

右每以一字吹鼻內搐之吹左即左定吹右即右定也

醒脾散

治小兒慢脾驚風

馬芹子　丁香　白殭蠶

右等分爲末每服一錢炙橘皮煎湯下之

活脾散

治小兒慢脾驚風

羊屎二十一粒　炮丁香一百粒　胡椒五十粒

共爲末每服半錢用六年東日照處壁土煎湯調下

乳香丸

治小兒慢驚風心神悶亂煩懊筋脈拘急胃虛蟲動反折啼叫

乳香半錢　胡粉二錢研勻　白頸蚯蚓去土搗爛

共和爲丸麻子大每服七丸至十五丸葱白煎湯下

蘇合香丸 惠民和劑局方

治小兒驚癇客忤

白朮　香附子　青木香　白檀香　沉香

丁香　麝香　蓽撥　訶梨勒煨去核　硃砂

犀屑各二兩　龍腦　薰陸香　蘇合油各一兩

安息香末二兩以無灰酒熬成膏入蘇合油內

爲末以香膏加煉蜜和成劑蠟紙包收每服旋丸

梧子大早朝取井華水溫冷任意化服每服一丸

抱龍丸 全幼心鑑下同

小兒風痰熱毒壅滯凉心壓驚

牛膽南星一兩　薄荷十片　丹砂錢半　龍腦麝香各一字

右研末煉蜜丸芡子大每服一丸竹葉湯化下

肥兒丸

治嬰孩驚痞風後失痞不能言

蕪荑炒　神麴炒　麥芽炒　黃連炒各一錢

右爲末猪膽汁打糊丸黍米大每服十丸木通湯下黃連能去心竅惡血

墜痰丸（衛生寶鑑）

治小兒風癇痰迷

天南星九蒸九曬

右爲末薑汁麵糊丸梧子大每服二十丸人參湯下石菖蒲麥冬湯亦可

經驗方曰小兒驚風用墜涎散天南星一兩重一箇換酒浸七伏時取出安新瓦上週迴炭火炙裂合濕地出火每爲末入硃砂一分每服半錢荊芥湯調下每日空心一服午時一服

瀉青丸（小兒直訣下同）

治肝經實熱急驚搐搦

羌活按壬乙同歸一治也　大黃瀉諸實熱

川芎入手足厥陰辛以緩肝　山梔仁瀉心火實瀉其子　龍膽草炒益肝膽氣止驚　當歸入足厥陰藏血　防風各等分

右爲末煉蜜丸芡實大每服半丸煎竹葉湯入砂糖化下

一方加甘草芍藥

一方無當歸

薛己曰前方足厥陰肝經解散肌邪疏通內臟之熱苦寒藥也若大便祕結煩渴飲冷飲食如常屬形病俱實宜用此瀉之若大便調和煩渴飲冷目淡青色屬病氣實而形氣虛宜用抑青丸平之若大便不實作渴飲湯飲食少思肢體倦怠屬形病俱虛宜用地黃丸補之若肝經血虛生風先用四物湯加鉤藤鉤以生肝血繼用四君子湯以補脾土若因肝經血燥生痰用地黃丸生腎水益肝血若土不能培木用四君子湯加當歸以補中用地黃丸以滋腎若因肺金尅肝木用六君子湯加芍藥木香實脾土以平肺金若因心虛奪母之氣或腎水虛不能生肝木者並用地黃丸主之若屢服峻劑而脾胃虛寒者必用六君子湯加丁香木香補脾胃以培陽氣若因乳母恚怒肝火妄動致兒爲患者母服加味小柴胡湯若因乳母肝脾血虛發熱致兒爲患者母服加味逍遙散子亦服數劑得效方曰一名凉肝丸肝主風宜先凉肝而風自退

抑青丸

卽前方去山梔大黃

抑肝散

治肝經虛熱發搐或發熱咬牙或驚悸寒熱或木乘土而嘔吐痰涎腹膨少食睡臥不安

軟柴胡五分入少陽厥陰瀉肝火須用黃連佐之

川芎八分　當歸　白朮炒　茯苓保心驚悸

釣藤鉤各一錢主寒熱十二驚癇客忤胎風

甘草三分

右水煎子母同服

瀉心散

治心經實熱瀉丁心

黃連一兩去鬚

右爲末每服五分臨臥溫水化下

海藏曰易老單方瀉心湯出於此乃實邪也實則瀉其子

薛己曰按前證若叫哭發熱作渴飲水抽搐有力仰面而睡者屬心經實熱宜用瀉心湯或導赤散若發熱飲湯抽搐乏力驚竄咬牙合面而睡者屬心經虛熱用補心散若咳嗽面赤壯熱飲水肺乘心也用瀉白散若頭搖目劄身熱抽搐肝乘心也用柴胡清肝散若合目昏睡泄瀉身熱脾乘心也用瀉黃散若竄視驚悸咬牙足熱腎乘心也用安神丸若因乳母致證亦用前藥以治其母

導赤散

治小腸實熱小便祕赤瀉丙小腸

生地心小腸藥　木通利小腸熱故導赤也

甘草炙各等分生用瀉心火

右爲末每服一錢入淡竹葉凉心經水煎

一方加黃芩赤芍藥羌活燈心煎

一方不用甘草用黃芩

薛己曰按瀉心湯導赤散瀉心小腸實火之劑蓋心爲脾母脾爲心子然心既病則脾土益虛矣用者審之味此說當保脾土

生犀散

治心經虛熱

地骨皮　赤芍　柴胡　乾葛各一兩　甘草五錢
犀角二錢銼主風熱驚癇鎮肝除心熱
右爲末每服一二錢水煎
丹溪曰犀角痘後用以散餘毒若無毒而血虛者或已燥熱發散者而誤用之禍立至
薛己曰按前方云治心經虛熱然其所用藥多屬瀉心瀉肝之劑蓋虛熱二字恐傳寫之誤假如心經自病而血虛熱者用祕旨安神丸脾虛奪心之氣而熱者用祕旨補脾湯肝木不能生心火而虛熱者用地黃丸

祕旨安神丸
治心血虛而睡中驚悸或受驚嚇而作
人參補五臟止驚悸　半夏湯泡燥脾土健胃
酸棗仁炒寧心志　茯神各一錢開心益志
五味子五粒杵　當歸酒洗　橘紅　赤芍藥炒各七分　甘草炙三分
右爲末薑汁糊丸芡實大每服一丸生薑湯下

瀉黃散
治脾胃實熱
藿香葉入手足太陰經開胃止嘔　甘草各七錢半
石膏五錢瀉胃火　山梔仁一兩　防風二兩
右用蜜酒微炒爲末每服一二錢水煎
薛己曰按前證若作渴飲冷臥不露睛手足甚熱或遍身發黃屬胃經實熱宜用瀉黃散若作渴飲湯臥而露睛手足並冷屬胃經虛熱宜用異功散
若面青搐搦乳食少思肝乘脾也用祕旨補脾湯
若面赤驚悸身熱昏睡心乘脾也用祕旨安神丸
若面白喘嗽肢體倦怠肺乘脾也用補中益氣湯
若唇黑泄瀉手足指冷腎乘脾也用益黃散病後津液不足口乾作渴宜用七味白术散若乳母膏粱厚味七情鬱火所致當審其因而治其母

瓜蔞湯
治慢驚
瓜蔞根二錢　白甘遂一錢
右慢火炒黃爲末每二三分煎薄荷麝香湯下
薛己曰按徐用誠云錢氏治慢驚用瓜蔞湯恐傳寫誤耳蓋驚主風木甲木屬陽病急易治乙木屬陰病緩難治況小兒五臟之氣未實神氣未完而自病之慢驚非病後及吐瀉脾胃虛損而得者慎勿用此峻厲之劑
王肯堂曰右瓜蔞湯錢氏治慢驚法脈有力者宜用益濕痰積於腸中使風火不得開發而身冷故用瓜蔞湯劫去濕痰使風火得伸而身溫搐止若脈無力者不宜用之便當補脾及溫白丸羌活膏之類

溫驚丸
治慢驚風證一名粉紅丸
南星爲末入臘月牛膽中陰乾百日爲末四兩
硃砂一錢半　天竺黃一兩　坯子胭脂半錢
龍腦五分另研
右用牛膽汁和丸如雞頭大每服一丸小者半丸沙糖水下
薛己曰按慢驚屬脾胃無陽肝木所勝之寒證故用溫驚丸以溫之但所用之藥乃辛散陽氣祛逐痰涎治者審之

人參理中丸
治中氣虛熱
人參　白术炒　甘草炙各等分
右爲末薑汁糊丸菉豆大每服二三十丸白湯下
一方用乾薑等分加棗二枚

調中丸
治脾胃虛寒
白术　人參　甘草炒各五錢　乾薑炮四錢
右爲末用蜜丸菉豆大每服二三十丸白湯下
薛己曰按前二方本經自病之藥即人參理中丸也若腎水侮土而虛寒者當加半夏茯苓陳皮或嘔吐更加藿香泄瀉加木香

張氏溫脾散
治脾胃虧損腹脅虛脹乳食不進困倦無力
訶子肉　人參各七錢　白术　木香　桔梗
茯苓　藿香　陳皮　黃芪各五錢　炙草二錢半
右每服二三錢薑棗水煎
薛己曰按前方治脾肺虛弱之證若肺病已去前證未已但用六君子湯以調補脾胃

清心丸
治驚熱煩躁
人參　茯神　防風　硃砂　柴胡各二錢
金箔三十片
右爲末煉蜜丸桐子大每服一二丸竹瀝調下此定驚安神一切小驚要藥

安神丸

治邪熱驚啼心肝壯熱面黃頰赤

麥門冬　牙硝　白茯苓　山藥　寒水石
甘草各五錢　硃砂一兩　龍腦二分半

右爲末煉蜜丸芡實大每服半丸砂糖水化下

薛己曰按前方降火化痰辛散寒凉之劑不宜過服恐反傷脾胃若睡中驚悸不安宜用祕旨安神丸若因乳母脾氣鬱熱致兒爲患者宜用加味逍遙散若因乳母怒氣肝經發熱致兒爲患者宜用加味小柴胡湯若因乳母飲酒胃經發熱致兒爲患者宜用葛花解醒湯

木附湯

治風濕相搏身體煩疼不能轉側不嘔不渴大便堅硬小便自利及風證頭目眩重等證

白朮四兩　甘草炒二兩　附子炮去皮臍一兩半

右爲末入附子每服三錢薑五片棗一枚水煎服

薛己曰愚按附子溫中回陽爲慢脾之聖藥也如元氣未脫用之無有不應須用每隻重一兩三四錢端正不尖底平遇團如蓮花瓣者佳否則悞川烏也製法切去皮尖以童便浸之秋冬七日春夏五日每日一換浸畢切作四塊以濕草紙包數層微火煨半日取出切開無白星爲度如急用炮至裂紋即投童便中良久浸透切片如色白再微炙之氣脫甚者急生用亦效

太乙保生丹

治慢驚尚有陽證者

全蠍青者十四箇　白附子生用　直殭蠶
膽星　蟬殼　琥珀　防風　硃砂各一錢

麝香五分

右爲末米糊丸桐子大金箔爲衣每服二三丸薄荷湯化下

聚寶丹

治慢驚

人參　茯神　琥珀　天麻　直殭蠶　全蠍炙
防風　膽星　白附子生用　烏蛇肉酒焙一錢
硃砂半錢　麝香少許

右爲末煉蜜丸桐子大每服二丸菖蒲湯下

金箔鎮心丸

治風壅痰熱心神不寧驚悸煩渴唇焦頰赤夜臥不安譫語狂妄

硃砂一兩　白茯苓　人參　甘草各半兩
山藥一兩半　片腦　牙硝各一錢半　麝五分
金箔十二貼爲衣　紫河車二錢半黑豆煮熟

右爲末煉蜜丸每用五錢作五十丸以金箔爲衣每服一丸薄荷湯化下含化亦得

烏蠍四君子湯

即四君子加生川烏全蠍各少許

右爲末每服半錢薑棗水煎服去服去川烏

天南星散

治吐瀉慢驚壓風豁痰或誤服冷藥脾虛生風痰一名回生散又名天王散

南星重八九錢者一箇掘地坑深尺許先炭五斤燒通紅以好米醋一碗灑坑中即投南星以火炭密蓋又用盆覆時許取出

右爲末入琥珀全蠍各一錢每服一字煎生薑防風湯下

一方入天麻末一錢麝香一字

烏沉湯

治慢驚壓風助胃

天麻二錢　人參　眞川烏生用　全蠍焙
南星焙　木香　沉香各一錢　甘草炒半錢

右爲末每服三五分薑水煎服

沉香散

助胃氣止吐瀉

茯苓二錢　沉香　丁香　木香　藿香　厚朴
甘草炙各一錢

右爲末每服一字米飲湯調下

蘇青丸

蘇合香丸一分　青州白丸子二分

右和勻每服五分薑湯調下

銀白散

治胃虛吐瀉

糯米炒二兩半　扁豆蒸　丁香　藿香各二錢
白朮炒一兩　甘草炙三錢

右爲末紫蘇米飲調下

直指方加炮白附子全蠍木香石蓮薑水煎

一方加大麻砂仁白茯苓炔脾正色又名雙白散

黑附子湯

治慢脾風四肢厥冷

附子炒去皮三錢　木香　人參各一錢五分
白附子一錢　甘草炙五分

右爲散每服三錢薑五片水煎若手足既溫即止

後服
生附四君子湯
治吐瀉不思乳食凡虛冷病先與數服以正胃氣
人參　白朮　附子　木香　茯苓　橘紅
甘草各等分
右爲末每服五七分薑棗水煎服
一方無木香橘紅
辰砂膏
治慢脾冷痰壅滯手足冷而微搐者
黑附子一枚重一兩以上者去皮臍頂上穿一孔入辰砂末一錢仍用附子塞之炭火燒熟存性
膽星半兩　白附子炮　五靈脂　蠍梢各二錢半
右爲末煉蜜丸桐子大每服二三錢生薑汁泡湯下
利驚丸
治急驚痰盛發熱潮搐
青黛　天竺黃　輕粉各二錢　牽牛末半兩
右爲末麪糊丸豌豆大每服十丸薄荷湯下
四物湯
治血虛發熱煩躁或睡熟作渴頭目不清若因脾虛不能生血者用四君子湯
當歸　熟地黃各二錢　芍藥　川芎各一錢
右水煎服
黃連安神丸
治心經血虛頭暈神魂驚悸
黃連六錢（酒洗）　炙甘草五分　生地　當歸各一錢
朱　硃砂飛過五錢
右爲末飯糊丸梧桐子大每服十五丸空心白滾湯下如二三服不應當服歸脾湯補之
牛黃清心丸
治諸風痰癎語言蹇澁健忘恍惚頭目眩運胃中煩鬱痰寒喘嗽精神昏憒等證或小兒風熱上壅抽搐發熱或急驚痰盛發搐目反口噤或大人傷寒汗下之後煩躁發熱不解並宜服之
麝香　龍腦　羚羊角各一錢　當歸　防風
黃芩　白朮　麥門冬　白芍各一錢半　牛黃
柴胡　桔梗　白茯苓　杏仁去皮尖　芍藥
肉桂　大豆黃卷　阿膠各一錢二分半　蒲黃
人參　神麯各三錢半　雄黃八分　甘草五分
白斂七分　犀角二錢　山藥七錢　乾薑三錢
金箔一百二十片　大棗十箇蒸熟爛研
右爲末煉蜜丸每兩作十丸金箔爲衣每服一丸溫水化下
凉驚丸
治驚疳熱搐心神驚悸白睛赤色牙關緊急潮熱流涎手足動搐
黃連五錢　龍腦一錢研　龍膽草酒拌炒黑
防風　青黛三錢研　釣藤鉤子二錢　牛黃
麝香各一字
右各另爲末麵糊丸粟米大每服三五丸至二十丸煎金銀花湯下
薛己曰按前方治心肝二經風熱若心肝虛而見驚搐潮熱用秘旨安神丸肝木乘脾者用異功散加柴胡釣藤鉤心脾虛弱而潮熱流涎者用異功散若虛寒更加木香不應更加炮薑疳者津液乾涸之證前丸乃心肝二經清熱祛風化痰之寒劑不宜多服恐傷胃氣無以滋腎水也
擦牙通關散
治風搐痙閉竅不通痰塞中脘留滯百節牙關緊閉藥不能下
南星二錢　麝香一字　牙皂二錠棄存性
赤脚蜈蚣一條　殭蠶一錢
右爲末薑汁調藥少許擦牙或調服二三點涎自出
至聖保命丹
治胎驚內釣肚腹緊硬啼叫不安及急慢驚風眼目上視手足抽掣不省人事
全蠍十四箇去毒　防風二錢　白附子　蟬殼
炮南星　殭蠶去絲嘴炒　天麻　硃砂各一錢
麝香五分　金箔四十張
右爲末米糊和每兩作四十丸每服一丸白湯化下
有熱者以瞻星易炮星
一方有冰片硼砂各少許
一方人參白茯苓各二錢
大黃丸
治風熱裏實口中氣熱二便祕赤飲水不止
黑牽牛半生半炒　川芎各半兩　甘草一錢
大黃一兩酒洗飯上蒸
右爲末糊丸麻子大每服數丸溫蜜水乳後服以滾利爲度大小量用

薛己曰愚按前證已屬裏實一便祕法當疏下若初服雖未通利而病勢已退不可再服如二便未利病勢未退當減數丸研化服之恐過劑則元氣傷而變病也

十味安神丸

治驚

人參　茯神　麥冬　山藥各二錢　片腦二分

龍齒煅一錢　硃砂　甘草　寒水石各五分

金箔二片

右爲末蜜丸雞豆大燈心湯調下一方有馬牙硝

浴體法

蠍尾去毒　硃砂各五分　烏蛇肉酒浸焙

白礬　青黛　天麻各二錢　麝香一字

右爲末每服二錢水三碗桃枝一握煎至數沸溫浴之勿浴背

塗額法

治發搐

麝香一字　蠍尾去毒　薄荷葉三分　蜈蚣

牛黃　青黛末各一字

右同研用熟棗肉劑爲膏新綿上塗勻貼額上四方可出一指許火上炙手頻熨百日裹外小兒可用此

五色丸

治五癇

硃砂　眞珠各五錢　水銀　雄黃各一錢

黑鉛三兩同水銀結成砂

右爲末煉蜜丸麻子大每服三四丸煎金銀薄荷湯下

一方無黑鉛

薛己曰愚按前證有因驚因風因食之不同雖痰迷心竅然當補脾氣爲主

斷癇丹

治癇差後復作證候多端連綿不除者

黃芪蜜炙　釣藤鉤　細辛　甘草炙各五錢

蛇退三寸酒炙　蟬蛻四箇　牛黃一字另研

右爲末煮棗肉爲丸麻子大每服五七九人參煎湯下

宣風散

治驚風痰熱四證極效能疏風導熱

陳皮　甘草各五錢　牽牛四兩半生半炒

檳榔二箇

右爲末每服三五分蜜湯調下

薛己曰愚按肝氣爲陽爲火肝血爲陰爲水肝氣熱則生風風熱搏則驚搐而肝血必損也然有餘當認爲不足若屢服利驚宣風之劑未免傷損脾胃以成慢驚矣慎之

褊銀丸

治風涎瞞熱及乳食不消腹脹喘促

巴豆　水銀各五錢　京墨八錢火燒醋淬研

黑鉛二錢半水銀煎　麝香五分另研

右爲末陳米粥丸菜豆大每服二三丸煎薄荷湯下

薛己曰愚按前方治顯癇驚搐消積下痰之藥也

右爲末煉蜜丸麻子大每服三四丸煎金銀薄荷湯下

一方無黑鉛

薛己曰愚按前證有因驚因風因食之不同雖痰迷心竅然當補脾氣爲主

斷癇丹

治癇差後復作證候多端連綿不除者

黃芪蜜炙　釣藤鉤　細辛　甘草炙各五錢

蛇退三寸酒炙　蟬蛻四箇　牛黃一字另研

右爲末煮棗肉爲丸麻子大每服五七九人參煎湯下

宣風散

治驚風痰熱四證極效能疏風導熱

陳皮　甘草各五錢　牽牛四兩半生半炒

檳榔二箇

右爲末每服三五分蜜湯調下

薛己曰愚按肝氣爲陽爲火肝血爲陰爲水肝氣熱則生風風熱搏則驚搐而肝血必損也然有餘當認爲不足若屢服利驚宣風之劑未免傷損脾胃以成慢驚矣慎之

褊銀丸

治風涎瞞熱及乳食不消腹脹喘促

巴豆　水銀各五錢　京墨八錢火燒醋淬研

黑鉛二錢半水銀煎　麝香五分另研

右爲末陳米粥丸菜豆大每服二三丸煎薄荷湯下

薛己曰愚按前方治顯癇驚搐消積下痰之藥也其用牽牛巴豆等蓋以痰飲癖積結聚堅固非此不能除故潔古張先生云爲斬關奪旗之將形病俱實者用之誠有起死之功必須詳審不可輕率

羌活膏

治脾虛肝熱熱盛生風或吐瀉或惧藥爲慢驚之證亦治傷寒無不效

羌活　人參　川芎　白附炮　赤茯苓各五錢

明天麻一兩　白殭蠶酒炒　乾蠍炒去毒

白花蛇肉酒浸焙　雄黃　辰砂各另研一分

附子炮　防風　麻黃　肉豆蔻　雞舌香

青香　沉香　木香各二錢　輕粉　眞珠

牛黃各一錢半　龍腦二分　麝香一錢各另研

右爲末煉蜜丸豆大每服一二丸薄荷湯下或麥冬湯下

薛己曰按前方藥味雜亂果脾氣虛而成慢驚者當審用之恐發散眞氣重損陰血故也

抱龍丸

治傷風溫疫身熱昏睡風熱痰實壅嗽又治驚風潮搐及蠱毒中暑沐浴後並可服壯實小兒宜時與服之

雄黃二錢五分　辰砂五錢另研　天竺黃一兩

牛膽南星四兩　麝香五分另研

右爲末甘草湯丸皂子大每服一丸白湯化下

丹溪曰抱龍丸心肺肝藥也抱者保也龍者肝也肝爲母心爲子母安則子安兒心藏神肝藏魂神魂既定驚從何生

薛己曰按前丸化痰祛邪清熱之功居多屬肝心實熱而致者用之殊效若脾肺虛弱而見昏睡痰嗽當用寶鑑天麻散以調補元氣

萬氏曰壯實兒宜用之然內有雄硃金石之藥不可服如麝香之耗眞氣能引風邪入裏如油之入麪不得出也故人皆禁之不輕用也

王肯堂曰前藥百日小兒每丸分作二四服五歲兒一二丸大人三五丸亦治室女白帶俱宜用鹽少許嚼一二丸新汲水送下臘月雪水煮甘草和藥尤佳一法用漿水或新水浸南星三日候透煮軟三五沸取出乘軟切去皮只取白軟者薄切焙乾炒黃色取末八兩以甘草二兩半拍破用水二碗浸一宿慢火熬至半碗去渣漸漸傾入南星末內慢研令甘草水盡方入餘藥

天麻散

治急驚脾胃虛弱或變慢驚者

半夏七錢　天麻二錢五分　炙草　白茯苓　白朮各二錢

右入生薑三錢磁器內水煮候乾爲末每服一錢五分薑棗湯調下

釣藤鉤飲

治吐利脾胃虧損虛風慢驚

釣藤鉤三分　蟬殼　防風炒　人參　麻黃　殭蠶炒　天麻　蠍尾去毒炒各五錢　炙草　川芎各二錢五分　麝香一錢另研

右爲末每服一二錢水煎

一方有蜣螂三箇去頭足炙黃

虛寒加附子一錢

薛己曰按慢驚之證屬脾胃虧損所致前方乃辛溫散表之藥而無調補之功須審用之

大青膏

治傷風吐瀉痰熱發搐

天麻　青黛各一錢　白附子　乾蠍去毒　烏梢蛇肉酒浸焙　硃砂五分　天竺黃二錢　麝香二分

右爲末生蜜和膏每服一豆粒許月中兒用半粒薄荷湯化服五歲以上同甘露散服之

薛己曰愚按大青膏乃表散之劑也必外邪蘊結於肺而肺氣未損者乃可施之況前證屬脾肺氣虛而邪之所湊必以固脾胃爲主否則虛虛之禍恐不能免矣

溫白丸

治驚風潮痰定驚泄瀉痙弱冷痢洞利及久病而成慢驚

天麻五錢　白殭蠶炮　白附子　乾蠍去毒

天南星湯炮焙各二錢五分

右爲末麪糊丸菉豆大每服十丸米飲下

一方有人參防風

一方前藥仍用寒食日麵裹煮七日取出用薑湯下

薛己曰愚按前證屬脾氣虛寒無陽之證無風可散無痰可逐當兼用六君子湯十二味異功散木香散

牛黃丸

治驚熱消痰積

雄黃研水飛　牽牛各一錢　天竺黃二錢

右爲末麪糊丸粟米大每服五七丸薄荷水下

白餅子

治腹中有癖傷食嘔吐肚痛噯氣先用此藥一服推下食積却用惺惺散加減參蘇飲不可服冷藥

滑石　輕粉　半夏湯浸焙　南星各一錢　巴豆二十四粒去皮膜水煮另研

右爲末糯米飯丸菉豆大捻作餅每服二三餅煎葱白湯下忌熱物暈兒加減

薛己曰按前方乃斬關奪門起死回生之重劑也必審形病俱實方可施之恐致失手命在反掌經云邪之所湊其氣必虛留而不去其病乃實實者病氣實而形氣則虛也東垣先生云形病俱實者當瀉不當補形病俱虛者當補不當瀉治者審之

蛇黃丸

治驚癇因震駭恐怖叫號恍惚是也

蛇黃眞者三箇火煅醋淬　鬱金七分一處爲末

麝香另入一匙

右爲末飯丸桐子大每服二十丸煎金銀磨刀水化下

牛黃丸

治風癇因汗出解脫風邪乘虛迷悶搐掣涎潮屈指如計數是也

牛膽南星　全蠍焙　蟬蛻各二錢半　防風　白附子生用　天麻　直殭蠶炒各一錢半　麝香半字

右爲末棗肉和丸水銀半錢研細入藥丸菜豆大每服一二丸荊芥生薑湯下

妙聖丹

治食癇因驚而停食吐乳寒熱大便酸臭是也

赭石煅醋淬二錢半　巴豆三箇去心油三錢

雄黃　蠍梢　硃砂各一錢　輕粉　麝各一匙

杏仁微炒二錢

右爲末棗肉丸梧子大每服一二丸木賊草煎湯送下

消風丸

治風癇先宜此藥

牛膽南星二錢　羌活　獨活　防風　天麻

人參　荊芥　川芎　細辛各一錢

右爲末蜜丸桐子大每服二丸薄荷紫蘇湯調化下

祛風保安丸

諸風久遠治之並驗

川烏去皮尖二錢半生用　五靈脂半兩

右爲末猪心血丸桐子大每服一二丸薑湯化下

比金丸

治驚癇先用此藥

人參　琥珀　白茯苓　遠志薑製取肉炒

硃砂　天麻　石菖蒲細密者　川芎　南星

青黛各一錢　麝香一匙

右爲末蜜丸桐子大每服一二丸金銀薄荷湯下

一方有山藥甘草無琥珀青黛

虎睛丸

治驚癇邪氣入心

虎睛細研　遠志薑汁浸去心　犀角鎊屑

大黃濕紙包煨　石菖蒲　麥門冬各等分

蜣螂去足翅炒三枚

右爲末米糊丸桐子大每服一二丸竹葉煎湯或金銀薄荷煎湯下

清神湯

治驚癇

犀角鎊屑　遠志薑汁焙　白鮮皮　石菖蒲

人參　甘草炒各一錢半

右爲末每服五七分麥門冬煎湯調下

密陀僧散

治心癇不語及諸驚失音

密陀僧

右爲極細末每服一匙米醋湯調下大人服一錢

熱酒下

蠍虎散

治驚癇

褐色生蠍虎一箇連血細研

右入硃砂麝香末少許同研用薄荷湯調作一服

數年者亦效蓋癇疾皆心血虛滯生蠍虎管守其血繼服二陳湯若無生蠍以帶性雄猪心血代用

入代赭石散九妙

代赭石散

治陰陽癇

代赭石煅醋淬研爲末水飛過曬乾

右爲末每服半錢以金銀煎湯和金箔銀箔調連進二服卻腦上有赤斑乃邪氣發出可治無赤斑則難治

化風丹

凉風化痰退熱定搐

牛膽南星二錢　羌活　獨活　防風　天麻

人參　川芎　荊芥　粉草各一錢　全蠍一箇

右爲末煉蜜丸皂角子大每服一錢薄荷湯化下

一方無全蠍有甘草細辛

一方加辰砂麝香

茯神湯

治膽氣虛寒頭痛目眩心神恐懼不能獨處或是驚癇

茯神　棗仁炒　黃芪炒　柏子仁炒　白芍炒

五味子炒各一兩　桂心　熟地黃自製者

人參　甘草炒五分

右每服二三錢薑水煎

酸棗仁丸

治膽氣實熱驚癇或睡臥不安驚悸怔忡

茯神　酸棗仁炒　遠志　柏子仁炒　防風

枳殼麩炒　生地杵膏各半兩　香竹茹二錢半

右各另爲末煉丸棗米大每服七八十丸白滾湯送下

定志丸

治心神虛怯所患同前或語言鬼神喜笑驚悸

人參　茯苓各一兩五錢　菖蒲　遠志各一兩

右各另爲末蜜丸如前服

養心湯

治心血虛祛驚癇或驚悸怔忡盜汗無寐發熱煩躁

黃芪　白茯苓　茯神　半夏麴　當歸　川芎
薢桂　柏子仁　棗仁　五味子　人參各三錢
甘草炒四錢

右每服一二錢薑棗水煎

妙香散

治心氣不足驚癇或精神恍惚虛煩少寐盜汗等證

辰砂三錢　麝香一錢　木香煨二錢五分
茯苓　山藥　茯神　遠志　黃芪炒各一兩
桔梗　甘草炒　人參各五錢

右各另爲末每服一錢溫酒或白湯調服

大黑龍丸（平治會芋下同）

治小兒急慢驚風神效

牛膽南星　礞石各一兩焰硝等分煅　天竺黃
青黛各半兩　蘆薈二兩五錢　硃砂三錢
殭蠶五分　蜈蚣二錢半火燒存性

右爲細末煎甘草膏丸如雞豆大每服一丸或二丸

急驚薄荷湯下

慢驚桔梗白朮湯下

神聖牛黃奪命散

檳榔半兩　木香三錢　大黃二兩麵裹煨爲末
白黑牽牛各一兩麤末俱一半生用一半炒用

右爲一處研作細末入輕粉少許每服二錢用蜜漿水調下不拘時候微利爲度

碧雲散（傷門事親）

治小兒驚風有涎

膽礬半兩　粉霜一錢　銅青　輕粉各一分

右研爲細末每服一字薄荷湯調下用之

如中風用漿水調服

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百五十卷目錄

醫部彙考四百三十

小兒驚癇門六

方二

利痰丸　安神丸　神鬼汁　導赤散
五色丸　定喘湯　青州白丸子　調元
湯　黃芪湯　金箔飲　琥珀抱龍
丸　抱龍丸　涼驚丸　至聖保命丹　神芎
丸　玉液丸　參苓白术散　辰砂青金丸　寫肺
茶苕湯　五福丸　千金小鷄丸　金箔命
丹　乳黃散　全蠍散　久痢方　脫定治驚
翻胃方　又方　安神鎮驚丸　地黃丸
滾關散　開關即聖散　省風湯　珍珠丸　龍齒
七寶流心散　開關即聖散　天竺黃丸　龍齒
散　防風通聖散　大連翹湯　調
氣散　防風通聖散　荊根湯　蟬蛻散　琥珀散　辟
桂枝湯　荊根湯　蟬蛻散　琥珀散　辟
清丹　來復丹　王氏保嬰丸　醒脾飲　大
醒脾散　來復丹　至寶丹　定命飲　四聖散　天南
星丸　至寶丹　七珍丸　四君子湯　川烏
散　金液丹　生附四君子湯　蟾酥散　白
瓔珞丸　防風散　牛黃涼驚丸　青金丹　王監京墨
蘆薈散　牛黃涼驚丸　青金丹　王監京墨
丸　生犀散　蠶脂珠砂膏　柴胡加大黃湯
參苓白术散　茯苓二陳湯　天麻鉤藤飲　合香丸
薄荷散　養生必用蛇黃丸　星蘇散　五癇丸
丹　至寶丹　開牙散　青黛
丸　至寶丹　神妙拿命丹　防風導赤散
蟬蛻鉤藤飲　寶熱飲　七寶洗心散　安神
丸　鉤藤飲　薄荷散　鉤藤飲　保命丸
乳香丸　木香丸　小續命湯　柱枝加葛根
湯　人參敗毒散　小柴胡湯　大承氣湯

禁衛典第四百五十卷

醫部彙考四百三十

小兒驚癇門六

方二

利痰丸　治痰火　安神丸　導赤散

牛膽　南星　枳殼去核　陳皮去白各一錢

大黃五錢　牽牛頭末二錢

共爲細末皂角煮水燈心煎湯吞

安神丸

黃連去根鬚　石菖蒲　遠志去心　當歸身

麥門冬去心　山梔仁炒各二錢　茯神八錢

共爲末粟米糊和猪心血爲丸硃砂爲衣燈心湯下

神鬼丹

雄黃　桑寄生　天竺黃　釣藤鉤各三錢

全蠍去足　牛膽　南星　梧桐淚　殭蠶炒

硃砂各二錢　珍珠　牛黃　琥珀各一錢

冰片少許

右爲末用粟米粉糊爲餅金箔爲衣薄荷燈心竹葉湯送下

導赤散

牛黃　木通　甘草梢　麥門冬去心　山梔仁

竹葉七片

右水煎服瀉心火之藥也

發散加防風薄荷

五色丸

黃芩　黃連各二錢　大黃三錢

不用顏色是三黃丸加顏色名五色丸共爲細末分作五分滴水爲丸一分青黛爲衣名青丸一分硃砂爲衣名紅丸一分雄黃爲衣名黃丸一分皂角燒灰存性爲衣名黑丸

定喘湯

陳皮　南星炮　梔仁　軟石膏　杏仁泥

薄荷葉　赤茯苓

右水煎入竹瀝

青州白丸子

治小兒驚風

半夏炮　川烏　白附子各五兩　南星三兩

右爲細末以生絹袋盛用井水擺盡爲度放磁器內日曬夜露一日一換水必攪數轉候如玉片再研細又用青蒙石一錢另研細以焰硝五分同石末入銅鍋內火煅通紅硝盡爲度放冷入上藥和勻以糯米爲丸以薄荷入蜜送下其痰自墜

調元湯

內經云熱淫于內以甘瀉之以酸收之此之謂也

黃芪一錢　人參　白芍各五分　炙草二分半

右水煎服

黃芪湯　治虛汗　出盜汗下同

治慢驚大便瀉青色此肝木剋脾土先實其土後瀉其木是爲神治之法

黃芪二錢　人參一錢　炙草五分

右㕮咀作一服水一大盞煎至半盞去粗食遠服

加白芍藥尤妙

此三味皆甘溫能補元氣甘能瀉火內經云熱淫

于內以甘瀉之以酸收之白芍藥酸寒寒能瀉火酸味能瀉肝而大補肺金所補得金土之位大旺火虛風木何由而來尅土然後瀉風之邪

夫益黃散理中丸養神丸之類皆治脾胃寒濕大盛神品之藥也若得脾胃中伏熱勞役不足之證及服熱藥巴豆等之類胃虛而成慢驚之證用之必傷人命夫慢驚風者皆由久瀉脾胃虛而生也錢氏以羌活膏療慢驚風悞矣脾虛者由火邪乘其土位故曰從後來者爲虛邪火旺能實其木木旺故來尅土當於心經中以甘溫補土之源更於脾土中瀉火以甘寒於脾土中補金以酸涼致脾土中金旺火衰風木自虛矣損食多進藥自愈前藥是也

益黃散

治胃中風熱

黃芪二錢　陳皮　人參各一錢　芍藥七分

生甘草　熟甘草各五分　黃連少許

右共爲細末每服二錢水一盞煎至五分食前服一方加白茯苓

補陽湯

時初冬一小兒二歲大寒證明堂青脉額上青黑腦後青絡高起舌上白滑喉鳴而喘大便微青耳尖冷目中常常淚下仍多胷中不利臥而多驚無搐則寒

吳茱萸　生地黃　地龍各五分　黃蘗　橘皮

葛根　連蔻　蠍梢　炙甘草各一分　升麻

黃芪　柴胡各二分　當歸身　麻黃各三分

右㕮咀都作一服水一大盞半煎至六分去柤乳食後熱服服藥之後添喜笑精神出氣和順乳食旺

琥珀抱龍丸萬氏育嬰家秘下同

理小兒諸驚四時感冒風寒溫痰邪熱至煩躁不寧痰嗽氣急及瘡疹欲出發搐並宜服之

眞琥珀　天竺黃　檀香細剉　人參去蘆

白茯苓去皮各一兩半　生粉草三兩去節

枳殼麩炒　枳實俱水浸去穰炒微黃各一兩

山藥去黑皮一斤剉作小塊慢火炒令熱透冷用

南星一兩剉碎用臘月雄黃牛膽釀經一夏

硃砂五兩先以磁石引去鐵屑次用水乳鉢內細杵取浮者飛過淨器內澄清去上餘水如此法一般精製見硃砂淨盡曬乾用

取見成藥末一兩同金箔百片在乳鉢內研極細仍將前末共一處和勻取新汲井水爲丸如豌豆樣大粒陰乾每服用薄荷湯化下

琥珀抱龍丸內用補益之藥人皆喜而用之然有枳殼枳實二味能散滯氣無滯氣者能損胷中至高之氣如慢驚及元氣弱者減去此二味可用當歸川芎各二兩以代之然琥珀天竺黃二味須擇眞者

王肯堂曰前十二味除硃砂金箔不入碾內餘十味檀香不過火外九味或曬或焙同研爲末和勻硃砂金箔每一兩重取新汲井水一兩重入乳鉢內略杵勻隨手丸如鷄頭子大陰乾晴霽略曬日色燥甚則折裂宜頓放當風處取其自乾治法並用葱湯無時化服或薄荷湯痰壅嗽甚淡薑湯下痘瘡見形有驚溫淨湯下心悸不安燈草湯下暑天悶迷麥門冬熱水下百日內嬰兒每丸作三次投二歲已上者止一丸或二丸其品劑修合之時但缺一味不依製度必無效矣常用瓦瓶入麝香同收毋使散泄氣味入珍珠末一兩合和名金珠散珍珠能鎮心寧肝墜痰尤效治法湯使同前

又曰抱龍之義抱者保也龍者肝也肝應東方青龍木木生火所謂生我者父母也肝爲母心爲子母安則子安心藏神肝藏魂神魂既定驚從何生故曰抱龍丸理小兒諸驚四時感冒風寒溫疫邪熱致煩躁不寧痰嗽氣急及瘡疹欲出發搐並宜可投其藥性溫平不僭不燥常服祛風化痰鎮心解熱和脾胃益精神

抱龍丸

抱者養也龍者純陽之物蓋震爲龍東方乙木也爲少陽之氣時至乎春乃萬物發生之始氣也乙者肝木也肝爲風木初生小兒純陽無陰龍之象也肝爲有餘少陽之氣壯也肝主風小兒病則有熱熱則生風上醫慮之製此方以平肝木防驚風此抱龍之名義也　小兒必用此藥所以養其陰而濟之令不太過也又青龍位肝木屬之小兒肝常有餘肺常不足故以此藥抑肝扶脾乃名抱龍治形實壯熱昏睡氣粗或痰壅嗽驚風搐搦

天竺黃　辰砂各一錢　牛黃二分　麝香半分

珍珠　琥珀　白檀香　枳殼　枳實各三分

牛膽星五錢臘月取牛膽一箇將南星去皮臍研爲

末放十膽中陰乾備用

共爲末山藥打糊爲丸如黃豆大金箔爲衣

潮熱燈心湯化下

驚風薄荷湯下

咳嗽滾白水下

涼驚丸 片玉心書下同

退五臟熱泄心肝火治急驚解胎毒如小便黃大便祕丹毒斑疹鮃血口瘡併皆治之

黃連泄心火 黃芩泄肺火 山梔仁泄肝火

黃藥各五錢泄腎火 龍膽草三錢泄膽火

大黃泄脾胃火 雄黃解毒 辰砂鐵心各二錢

右爲末水糊丸如粟米大竹葉燈心湯下

急驚薄荷湯燈心湯下

胎熱竹葉燈心湯下

鮃血茅根湯下

丹毒斑疹升麻湯下

口瘡木竹葉薄荷湯下

至聖保命丹

治急驚風夜啼常服清心安神

全蠍十四箇 麝香半分另研 辰砂水飛

天麻 膽星 防風 殭蠶炒 白附炮各一錢

蟬蛻去翅足 史君子肉煨 珍珠各五分

金箔四十張

共爲末粟米粉糊和勻印成錠子薄荷湯磨服

驚風薄荷燈心湯下

夜啼燈心燒灰溫水化下

神芎丸

治小兒上焦積熱驚風壅滯頭目赤腫兩閉大小便赤澁及痰喘之證併皆治之

大黃酒蒸乾 黃芩各一錢 黑牽牛頭末

滑石各四錢 黃連 川芎 薄荷各五錢

共爲末滴水爲丸如粟米大竹葉湯下

玉液丸

治風壅化痰利膈清頭目煩熱除咳嗽

寒水石煅水飛二兩 半夏製一兩 枯礬五錢

共爲末米糊丸如粟米大薑湯下

感風寒咳嗽桑白皮湯下

咳血茅根湯下

常咳茶湯下

咳而吐沫薑湯下

參苓白术散 萬氏幼科發揮下同

人參 白术 白茯苓 山藥各一兩五錢

扁豆去殼薑汁浸炒 甘草 桔梗 薏苡仁

蓮肉各一兩

爲細末棗湯送下

辰砂膏

下小兒痰甚妙治驚熱驚積

辰砂研水飛三錢 硼砂 馬牙硝各錢半

元明粉二錢 全蠍去毒 珍珠研各一錢

麝香一字

右另爲末和勻好油單紙包起自然成膏每用一粒許月內調塗乳頭令吮

狂躁惡叫生地黃自然汁調下

諸驚薄荷湯調下

胎驚猪乳汁和棗湯下

潮熱生甘草湯下

當歸葉黃湯

治內鈎

當歸 吳茱萸泡焙乾 小茴香炒 甘草 木香

右水煎服

五福丸 本草綱目

治小兒急驚

生蚯蚓一條研爛入五福化毒丹一丸同研

以薄荷湯少許化下

普濟方云梁國材言洋州進士李彥直家專貨此藥一服千金以糊十口粟傳其方親試屢驗不可不筆於冊以救嬰兒

千金小驚丸

治小兒驚大小便祕鈎氣

鬱金皂角水洗煮 黃連 牙硝 木香 膽草

薑香各五分 全蠍六箇去毒

末之麵糊丸用雄黃硃砂麝香金箔爲衣

鎮驚薄荷燈心湯下

大便祕枳殼大黃研煎湯化服

鈎氣鈎藤湯下量兒大小用

千金保命丹

治小兒一切痰嗽急慢驚風撮口臍風但能開口灌下無不活者

牛黃 冰片 琥珀另研各一錢 甘草二分

黃連薑汁炒 全蠍 殭蠶各三分 硃砂

明天麻麵裹煨 膽星各四分

共爲細末磁罐蠟封勿令出氣每五七釐薄荷燈心金銀煎湯不拘時溫服

乳黃散

治小兒天釣壯熱翻眼手足搐掣皆因痰滯經絡頭目反仰名曰天釣由乳母過食熱物蘊毒兼挾風邪所致但解利風熱則應手而愈

滴乳一錢另研　天竺黃一錢半　雌黃另研　臘茶　枯礬各一錢　炙甘草　荊芥穗炒　菉豆一百粒半生半炒　赤脚蜈蚣一條酒浸炙

細末之每服半錢煎人參薄荷湯調下

全蠍散

治小兒天釣潮熱

釣藤　人參各半分　全蠍　天麻各一分　犀甘草炙各半分

末之每服一錢半水半鍾煎五分溫服

久癇方 醫貫方

治小兒積癇

陳皮　黃連　白朮各五分　半夏　膽星　黃芩　棗仁　遠志去心各六分　白茯苓　麥冬各八分　甘草　枳實　柴胡　薄荷　乾葛　元參各三分

右水二鍾煎加薑汁三匙不拘時服其南星製法臘月八日取牛膽一箇將南星打碎卽以膽汁拌勻復入膽內扎口懸風處陰乾用水二鍾煎加薑汁三匙不拘時服

擬定治驚癇諸方 明醫雜著下同

治小兒肝經火旺目睛頻動痰氣上升或壯熱驚搐面色紅脈有力脾胃無傷宜瀉肝火

當歸　柴胡　橘紅　枳殼炒　天麻各六分　白茯苓　川芎　白芍藥炒各八分　甘草　黃連酒炒各四分　薄荷三分

右每服二錢薑水煎服

薛己曰愚按前證若肝經風熱而自病宜用本方若肝經血燥而自病宜用六味丸若肝木尅脾土宜用四君子湯加升麻柴胡若肺金尅肝木宜用瀉白散若腎水不能生肝木宜用六味丸若愈後驚悸不寐或寐中發搐咬牙宜用歸脾湯加茯苓五味蓋有餘者邪氣實也不足者眞氣虛也凡病有餘當認爲不足經云邪之所湊其氣必虛

又

治小兒脾經不足土敗木侮目睛微動四肢微搐或潮熱往來脾胃有傷飲食少進或泄瀉嘔吐面色黃無脈力宜補脾胃

白朮一錢三分　黃芪蜜炙　川芎　當歸酒洗　陳皮　人參　肉蔻煨　神麴　乾葛各五分　白芍一錢酒炒　黃連　甘草炙各四分　半夏　白茯苓各七分

右薑水煎服

薛己曰愚按前證若因脾胃虛弱用五味異功散補之虛寒者加木香或再加炮薑溫之若因脾氣下陷用補中益氣湯舉之作渴者用七味白朮散主之若因脾胃虛弱寒水侮土用六君子加木香炮薑溫之若因脾胃虛弱肝木侮土用補中益氣湯加苓芍半夏調之若因肝木太過脾土受制用小柴胡湯加炒山梔平之若因傷魚肉等物用六君子湯更加山楂砂仁消之若因傷生冷腹痛或瀉利清白宜六君子湯加砂仁木香炮薑溫之若因傷辛熱停滯嘔吐酸水或大便清利不快用六君子湯加黃連吳茱萸木香和之若因積去而泄瀉不止用四君子湯加肉荳蔻補骨脂木香煨薑以補脾腎若泄瀉止而飲食少思宜用白朮散以補脾胃

又

治小兒心血虛睡中驚動不安或受驚嚇而作主清心安神降痰

人參　半夏湯泡　酸棗仁炒　茯神各一錢　當歸酒洗　橘紅　赤芍各七分　五味五粒杵　炙草三分

右水煎入薑汁竹瀝少許入牛黃半分尤妙

若溫煖月心經多熱加生地黃山梔仁各五分麥門冬七分淡竹葉

若方飲食因驚而停滯者須先消飲食然後治驚驚藥內仍加白朮麥芽以理脾胃蓋驚則氣散宜收補其氣驚則痰聚宜消化其痰

薛己曰愚按前證若心血不足而心神驚悸者宜用本方若木火太過而心神不寧者宜用導赤散若木火翕合風熱相搏而病者用柴胡梔子散若肝心虛弱木火未濟而病者用六味丸若因脾胃食鬱生痰驚動不安者宜用四君子湯以健脾神麴半夏麥芽以化痰山梔芍藥以清熱若因飲食停滯肚腹膨脹或嘔吐泄瀉宜用六君子湯以健

脾用厚朴神麴以消食如有痰搐驚證仍用本方調治如見肝經之證加釣藤鉤方內赤芍藥易以白芍藥

安神鎮驚丸

驚退後調理安心神養血和平預防之劑

天竺黃另研　人參　茯神　南星薑製各五錢
酸棗仁炒　麥門冬　當歸酒洗　生地黃酒洗
赤芍藥炒各三錢　薄荷　木通　黃連薑汁炒
山梔炒　辰砂　牛黃俱另研　龍骨煅各二錢
青黛一錢另研

右爲末蜜丸菉豆大淡薑湯送下每服三五丸

薛己曰愚按前方根本之治防微杜漸之法也但內多苦寒辛散分利之味病後不宜輕用恐復傷胃氣而變生他證也若飲食停滯而見他證當消導爲主若脾胃損傷而見他證當健中氣大凡病後元氣未復或因尅伐之劑元氣復傷而見前證但用升補陽氣爲主諸證自愈若專攻其病則誤矣

地黃丸（嬰童百問下同）

王肯堂曰治小兒肝經虛熱血燥或風客淫氣而患瘰癧結核或四肢發搐眼目抽動痰涎上湧又治腎疳腦熱肢體消瘦手足如冰寒熱往來滑泄肚脹口臭乾渴齒齦潰爛爪黑面黧或遍身兩耳生瘡或耳內出水或發熱自汗盜汗便血諸血失音等證其功不能盡述

熟地黃　山茱萸　乾山藥各四錢　澤瀉
牡丹皮　白茯苓去皮各三錢

右爲末煉蜜丸如桐子大空心溫水化下三十丸

王肯堂曰八味地黃丸即六味地黃丸加附子肉桂各一兩治禀賦命門火衰不能生土以致脾土虛寒或飲食少思或食而不化臍腹疼痛夜多漩溺等證經云益火之原以消陰翳蓋謂此也或乳母命門火衰兒飲其乳致前證者子母並服之

又曰加減八味丸即地黃丸加肉桂一兩五味子四兩治禀賦腎陰不足或吐瀉久病津液虧損口乾作渴或口舌生瘡兩足發熱或痰氣上湧或手足厥冷等證

蘆薈散

治急驚慢驚昏迷不省

生半夏一錢　皂角半錢

右爲末用一豆許用管子吹入鼻立醒

開關如聖散

赤蜈蚣一條中分爲兩片各用葱汁浸一宿焙乾全蠍一箇亦中分爲兩片各記左右分兩處

右各爲末左眼翻左手搐以左藥末吹入左鼻孔右眼翻右手搐以右藥末吹入右鼻孔雙眼翻雙手搐兼之

省風湯

治驚風口噤筋脈攣急抽掣疼痛風盛痰實旋暈僵仆頭目眩暈腸煩滿恍惚不定神志昏憒

天南星生用　防風去蘆各四兩　生甘草
半夏米泔浸一宿　黃芩去粗皮各一兩

右㕮咀每服二錢生薑一片煎去滓不拘時服

珍珠丸

治小兒急驚風涎潮壯熱痰氣上壅

白附子　滑石　輕粉各一錢　全蠍半錢
巴豆十五粒去油

右爲末糊丸如小豆大三歲一丸二丸葱湯下

七寶洗心散

白朮土炒一錢半　甘草炙　當歸　荊芥穗
麻黃　芍藥　大黃麵裹煨去麵切焙各六錢
前胡　生地各四錢　薄荷少許

右爲末每服一錢水一盞入生薑一片煎服

寬熱散

枳殼以水潤之以巴豆四十九粒同炒去巴豆
大黃各一兩　砂硝　生甘草各半兩

右爲末以瓶器收之每服一字薄荷湯調下

天麻防風丸

治小兒驚風身熱喘鬬多睡驚悸手足搐搦精神昏憒

天麻　防風　人參　辰砂　雄黃　麝香
炙甘草各一分　全蠍炒　殭蠶各半兩炒
牛黃一字

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服一丸薄荷湯下

一方有贈星無麝香

龍齒散

龍齒　蟬蛻　釣藤　羌活　茯苓　人參各等分

右爲末每服半錢薄荷湯下

防風通聖散

白朮　荊芥穗　梔子各二錢半　川芎　當歸
薄荷　綿紋大黃　芍藥　麻黃　防風　連翹

硇硝各半兩　細紋石膏　黃芩　桔梗各一兩　滑石六兩　生甘草二兩

右剉每服二錢水一盞薑二片煎七分去滓服

大連翹湯

治瘧疹壯熱小便不通諸般瘡癤丹毒腸風

連翹　瞿麥　荊芥　木通　赤芍藥　當歸　防風　柴胡　滑石　蟬蛻　甘草炒各一錢　山梔仁　黃芩各半錢

右剉每服一錢加紫草煎溫服

熱甚加大黃更詳證加減爲佳

琥珀散

治小兒急慢驚風涎潮昏冒目瞪搐搦驚弔壯疼及和順痘瘡小可驚哭眠臥不安入口立效驚癇時攻發作常服末除病根

辰砂一錢半　琥珀　牛黃　天麻　殭蠶炒全蠍去毒　白附子　乳香　蟬蛻各一錢　麝半錢　代赭石煅醋淬七次一錢　片腦一字

臘星一字

共爲末三歲一錢薄荷湯下

慢驚加附子一分

調氣散

小兒慢驚之後以此調之

木香　香附　人參　橘皮　藿香　炙草各一錢

右薑棗煎服

桂枝湯

治太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒翕翕發熱鼻鳴乾嘔者

桂枝去皮　芍藥　生薑各一兩半　生甘草一兩

右剉每服三錢棗二箇水一盞煎八分服須臾啜粥一盞以助藥力溫覆令一時許遍身熱微汗出爲佳

桂枝自西北二方居人四時行之無不應驗江淮唯冬及春可行之自春末及夏至已前桂枝證可加知母石膏各半兩或加升麻一分若病人素虛寒者正用古方

葛根湯

治太陽病項強几几惡風無汗不惡寒剛痙

葛根四兩　麻黃三錢　桂一兩　生甘草芍藥各二兩

右剉每服五錢水一盞半生薑五片棗二箇煎一盞服取微汗

蟬蛾散

治方傳慢驚

全蠍七箇去尾　蟬退念一箇　炙草二錢半

南星一箇炮

右爲末每服半錢煎服

一方入薑三片棗二枚

神寶既濟丹

分陰陽平冷熱定吐瀉豁痰涎

硫黃　燄硝俱鎔汁再研　五靈脂　青皮　陳皮　半夏麴炒各等分

右爲末粟米糊丸麻子大每服三丸米飲送下

來復丹

此藥配類二氣均調陰陽奪天地冲和之氣有水火既濟之功補損扶虛妙難盡述

硝石同硫黃並爲細末微火略炒用柳篦子不住手攪令陰陽氣相入不可火太過　硫黃舶上透明太陰元精石研飛各一兩　五靈脂澄去砂石乾青皮　陳皮各二兩

右用靈脂二皮爲細末次入元精石末及前二藥末拌勻以好酢打和爲丸如豌豆大每服三十粒空心粥飲下甚者五十粒小兒三粒新產嬰兒一粒小兒慢驚風或吐痢不止變成虛風搐搦者非風也胃氣欲絕故也用五粒喫下

王氏惺惺散

治小兒吐瀉脾弱內虛生驚

人參　茯苓　木香　天麻　白扁豆　陳皮炒全蠍焙

右爲末每服半錢薑棗略煎服

一方去陳皮用陳米

醒脾散

治吐瀉脾困不食痰作驚風

全蠍焙半錢　白附子炮　天麻焙　甘草炙人參　白茯苓　石菖蒲　木香　石蓮肉　白朮各一錢

右剉每服三錢薑二片棗一箇水二小盞煎服

有熱者去木香加殭蠶或加南星半夏陳皮炒米

大醒脾散

昏困者服之

南星　白茯苓　橘紅各一錢　全蠍焙　人參甘草炙　白附子炮　石蓮子　木香各半錢

陳倉米二百粒
右剉每服三字薑棗煎服驅風醒脾兩方通用亦可釀乳小兒胃虛不消乳食尤須節約

星香散
治慢驚風已傳昏迷痰搐
南星煨二錢　木香　人參　橘紅各一錢
全蠍炙三箇　甘草炙半兩
右剉每服一錢入紫蘇薑棗濃煎旋以匙送下
有熱加防風

定命飲
半夏　茯苓　木香　生薑各一錢　白朮
甘草炙　天麻各五分
右爲末每服半錢薑棗煎湯調下

四聖散
治慢驚吹入鼻中
全蠍七箇　殭蠶十四箇　天南星七錢半
川烏二錢
右將南星爲末水調作餅裹蠶蠍川烏外用濕紙重包慢火中煨令赤色頓地上一伏時每服一字煎金銀湯點好茶清少許調下

天南星丸
天南星一斤每一箇重一兩上下者用溫湯浸洗刮去裏外浮皮酒浸一宿用桑柴蒸不住添湯令釜滿甑內氣溢更不住灑酒常令藥潤七伏時滿取出用銅刀切開一箇大者嚼少許不麻舌爲熟未即再炊以熟爲度然後用銅刀切細焙乾　麝香研
丁香　辰砂另研水飛各一兩　龍腦研兩半
右爲末煉蜜井酒丸硃砂爲衣薑湯下一豆許

靈脂丸
五靈脂　白附子焙　木香　直殭蠶炒各一分
全蠍焙去毒　大南星濕紙包火內煨各半錢
硃砂一錢
右爲末米酢煮生半夏糊丸麻子大薑湯下三丸

七珍丸
治頑痰壅盛
細辛　川靈脂　直殭蠶一錢半　白附子一錢
硃砂半錢　全蠍四箇焙
右爲末大南星煮糊爲丸麻子大薑湯下每五丸

四君子湯
治榮衛氣虛臟腑怯弱
人參去蘆　茯苓去皮　生甘草　白朮各等分

川烏散
祛風回陽
生川烏一錢　全蠍　木香各半分
右末每服三字薑三片煎取其半旋滴入口中
嘔吐加丁香

金液丹
治吐利日久脾胃虛損手足厥逆精神昏睡寒多露睛口鼻氣冷欲成慢驚風者
舶上硫黃十兩先飛揀去砂石稱研爲細末入罐內再入赤石脂封縫鹽泥固濟炭火煅三晝夜取出候冷用
右以柳木槌研爲細末每服二錢生薑湯下

生附四君子湯
助胃回陽
即前四君子湯加附子末四分之一厥冷者對加每服半錢水煎以匙送下

蠍附散
治慢脾風回陽氣豁風痰
全蠍一箇　附子炮二錢　南星炮　白附子炮
木香各一錢
右爲末每服半錢薑三片煎服

白殭蠶丸
方傳慢脾陽氣未甚脫者可用亦能截風
膽星二錢　直殭蠶炒　五靈脂　地龍乾
全蠍焙各一錢
右爲末水煮生半夏糊丸麻子大每五丸薑湯下

七寶妙砂丹
治風痰奇效慢驚慢脾通以辰砂爲主木香佐之開元通寶錢皆背後上下有兩月片者其色淡黑頗小諸錢以一箇放鐵匙于炭火內燒少頃四圍上下各出黃白珠子將出候冷傾入盞中
右作一服南木香湯送下人參湯尤妙

防風丹
治風熱痰壅大便不通
羌活　防風　枳實　川芎　大黃濕紙裹煨
甘草炒各一錢半
右剉每服三字薑棗煎服
一方或加赤芍藥

枳殼散
治小兒疳氣腹脹喘急

枳殼一兩麩炒　巴豆二十一粒同上炒黃去之
右爲末三歲小兒半錢沙糖湯調下
蘆薈散
治驚風痰盛發搐
全蠍五箇焙　巴霜一字　輕粉半錢　蘆薈
南星炮　硃砂各一錢　冰片　麝香各一字
鬱金一分皂角水煮焙
右爲末每服一字煎金銀薄荷湯調下
牛黃涼膈丸
治熱盛涎潮
牙硝　寒水石煅　石膏　生甘草各半兩
膽星二錢半　紫石英一錢　牛黃　片腦
麝香各半分
右爲末甘草膏丸菜豆大每服一丸橘皮湯調下
青金丹
疏風利痰
蘆薈　牙硝　青黛各一錢　史君子　硼砂
輕粉各半錢　蠍梢十四箇
右爲末香墨水丸麻子大每服一丸薄荷湯下
王監京墨丸
治痰熱驚積楚州王監賣此藥著名者
青黛　史君子炒熟　蘆薈　膽星各二錢
川墨二錢　臘粉　麝香半錢　冰片一字
右爲末飛麵糊丸桐子大每服一丸薄荷湯調下
揭風湯
治利下痰熱
青黛　蘆薈　全蠍各一分　硃砂一錢半
南星半兩爲末調作餅包裹煎三項煨令赤色
牙硝　輕粉各三字
右爲末每服一字煎金銀薄荷湯調下
靈脂硃砂許
治驚風痰盛
硃砂　牙硝　靈脂　蘆薈各一錢　麝香
冰片各一字
右末甘草膏丸菜豆大金箔爲衣薄荷湯下一九
柴胡加大黃湯
柴胡一兩　黃芩炙　人參　半夏如法製
生薑各三錢半　甘草炒一錢半　大黃少許
右剉散每服一錢入棗煎服
牛氣散
治諸風疏利以此調氣
丁香七分半　白朮　青皮　甘草炙　木香
人參各二錢
右爲末每服半錢沸湯點服
茯苓二陳湯
和胃氣化痰涎
半夏五錢　陳皮二錢五分　白茯苓四錢
生甘草一錢半
右剉每服三錢薑三片煎服
天麻蘇合香丸
天麻　防風　人參　辰砂　雄黃　麝香
甘草炙各一分　全蠍炒　殭蠶炒各半兩
牛黃少許　南星一錢　蘇合油一盞
右爲末煉蜜丸如桐子大每服一丸薄荷湯下
參苓白朮散
扁豆炒　人參　茯苓　白朮土炒　炙草
乾山藥各二錢　木香　縮砂仁　白蓮肉
桔梗各一錢　天麻　薯蕷各五分
右爲末每二錢棗湯下
鎮心丸
硃砂　龍齒　牛黃各一錢　鐵粉　琥珀
人參　茯苓　防風各二錢　全蠍七箇焙
右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服一丸薄荷湯下
星蘇散
治諸風口噤不語
天南星略炮剉散每服一錢
右薑四片紫蘇五葉煎取其半却入雄猪膽少許
溫和服凡不語者大小便須要疏導治慢風不語
只用南星以人參石菖蒲爲佐
五癇丸
治食癇
硃砂水飛半兩　水銀二錢半　雄黃一兩
眞珠一兩細研
右爲末煉蜜爲丸麻子大每服二丸金銀湯送下
薄荷散
薄荷葉半兩　羌活　全蠍　生甘草　麻黃
殭蠶炒去絲嘴　天竺黃　白附子各一錢半
右爲末薄荷湯下
熱極生風加竹瀝少許與服
一方有柴胡台芎桔梗茯苓無全蠍殭蠶天竺黃
白附子

養生必用蛇黃丸

蛇黃一枚煅酢淬　礞石　辰砂　雄黃各二錢
鐵鏁粉四錢研極細

右爲末蜜爲丸用金銀煎湯五歲已上吞下幼小化下如麻子大丸

散風散

治風癇先用此

牛膽南星一錢　羌活　獨活　防風　天麻
人參　荆芥　川芎　細辛各一錢

右爲末煉蜜爲丸桐子大每服二丸薄荷紫蘇湯調下

日應丹

治顛癇連年不瘥

黑錫　硫黃　水銀　鐵粉研各半兩

金銀箔三十片

右水銀鐵粉金銀箔夾和一處先將黑錫於銚內鎔開次入硫黃不住手就銚內碎攪候硫黃烟氣欲息次入餘藥就火上同攪少頃時傾出地上一宿出火毒再研細粳米飯丸麻子大硃砂爲衣每服三丸食後人參湯下

全蠍五癇丸

治小兒五癇

赤蜈蚣一條去頭足酒浸炙　南星炮二錢半
麝香一字　全蠍　防風　硃砂　遠志薑製
白附　蘆薈　延胡索各一錢　金銀箔三十片

右爲末入麝糕糊丸桐子大每服一丸菖蒲紫蘇湯調下

星硃散

定癇利痰

南星濕紙裹炮香熟一兩　硃砂一錢

右爲末帶性猪心血爲丸桐子大每服一丸防風湯調下

開牙散

細辛　天南星　矾硝各一錢　麝香五分
蠍梢七個

右爲末以少許用烏梅肉揉和擦牙兼用細辛皂角荆芥末吹入鼻中治諸風搐搦驚癇用此

青龍丸

治驚積有熱

青黛　茯苓　蘆薈　南星炮各一錢　輕粉
麝香　巴霜各一字　全蠍焙三錢

右先將巴豆研如泥吹入諸藥研極細丸如梧桐子大硃砂爲衣每服一丸薄荷湯下

至寶丹

治諸癇急驚心熱卒中客忤不得眠睡煩躁風涎搐搦及傷寒狂語伏熱嘔吐並宜治之

安息香兩半末以酒濾去沙取一兩慢火熬成膏
生犀角屑　生玳瑁屑　眞琥珀研細水飛
雄黃研細水飛各一兩　金箔五十片半爲衣
銀箔五十片　片腦研　麝香各一錢研細
牛黃半兩研

右生犀玳瑁屑揭羅爲細末研入諸藥令勻將安息香膏以重湯煮化和揑爲劑如乾卽入少熟蜜盛磁器內旋丸如桐子大二歲兒服二丸人參湯化下大小以意加減又治大人卒中不語中惡氣中諸物毒中熱暗風產後血暈死胎不下並用童子小便一合生薑自然汁三五滴同溫過化下五丸立效

神妙奪命丹

取七月青蒿節內蟲

右入硃砂麝香爲丸加片腦

防風導赤散

治小兒初驚

生地黃　木通去節　防風　生甘草各等分

右剉散每服三錢水一盞竹葉少許同煎

有熱加黃芩赤芍藥羌活

蟬蛻鈎藤飲

治肚疼驚啼

鈎藤　天麻　茯苓　川芎　白芍藥各二錢
生甘草　蟬蛻各一錢

右剉散燈心煎

一方加木通麥門冬防風羌活

寬熱飲

石膏　黃芩　生甘草　赤芍　葛根各二錢半
麻黃　柴胡各半兩

右剉散三歲兒每服二錢水一小盞生薑少許葱白三寸豉一撮

七寶洗心散

治小兒煩熱生瘡兼治驚風

生地黃　荆芥穗　防風　生甘草　黃芩
羌活　赤芍藥各等分

右爲末入辰砂減半加當歸尤妙每服一錢燈心薄荷湯下空心食前服

安神丸

人參　茯神　麥門冬　山藥各二錢　龍腦　龍齒各一錢　寒水石　生甘草　硃砂各五分　金箔二片

右爲末煉蜜爲丸如芡實大每服一錢燈心湯下

釣藤膏

治小兒腹中極痛乾啼後軀名盤腸內釣

乳香　沒藥　木香俱另研　薑黃各一錢　木鼈子去油三箇

右爲末蜜丸芡實大釣藤湯磨半丸入蜜服先用此藥定痛後服魏香散

魏香散

蓬朮五錢　阿魏二錢

右先將溫酒化阿魏浸蓬朮一晝夜焙乾爲末紫蘇米飲調下

釣藤飲

治小兒夜啼乃臟冷也陰盛於夜則令軟冷動則爲陰極發躁寒盛作疼所以夜啼不歇也釣藤飲主之

釣藤鉤　茯神　茯苓　川芎　當歸　木香　生甘草　白芍藥各一錢

右爲末每服一錢薑棗略煎服

其或心熱而煩啼必有臉紅舌白小便赤澀之證釣藤飲去木香加硃砂末一錢研和每服一錢木通湯調下或剉散煎服亦可

治驚啼加蟬退防風天麻

保命丸

治小兒胎驚內釣腹肚緊硬眠睡不安夜多啼哭及治急驚慢風眼目上視手足抽掣不省人事悉皆主之冷證用此

全蠍十四箇去毒　防風　殭蠶炒去絲嘴　天麻各二錢　南星炮　白附子　麝香五分　金箔十片　蟬蛻　硃砂各一錢

右爲末粳米糊丸每兩作四十丸常服鎮心安神化痰除一切驚風諸證湯臨時換

一方加人參白茯苓二錢

一方加琥珀二錢

有熱證加牛黃片腦硼砂

乳香丸

治驚風內釣腹疼驚啼

乳香半錢　沒藥　沉香各一錢　蝦梢十四箇　鷄心檳榔一錢半

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服二丸菖蒲釣藤湯下

木香丸

乳香　沒藥　全蠍各半錢　釣藤　舶上茴香　木香各一錢

右先將乳香沒藥另研次入諸藥末和畢取大蒜少許研細和丸桐子大每服二丸釣藤湯下

小續命湯

治中風不省人事涎鳴反張失音厥冷

麻黃　人參　黃芩　川芎　白芍藥　杏仁　防己　肉桂　生甘草各半兩　防風七錢半　附子炮二錢半

右除附子杏仁在外俱爲粗末入杏附夾和每服三錢薑三片棗一枚煎服

有熱去附子官桂減半經云諸暴强直皆屬於風故收此方非的風證勿用

桂枝加葛根湯

治頭疼項背强兀兀汗出惡風者

桂枝　芍藥　生甘草各六錢　葛根一兩二錢

右剉散每服三錢生薑棗子煎服

人參敗毒散

治傷風瘟疫風濕頭目昏眩四肢疼痛增寒壯熱項强目睛疼尋常風眩拘倦風痰及寒壅咳嗽鼻塞聲重並治之

柴胡　前胡　川芎　枳殼炒　羌活　獨活　茯苓　桔梗　人參各一兩　甘草半兩

右爲粗末每服二錢生薑薄荷煎

一方加地骨皮天麻

或剉散加蟬蛻防風

治驚熱可加芍藥乾葛黃芩

無汗加麻黃

小柴胡湯

治傷寒溫熱病身熱惡風頸項强急胷脅滿痛嘔吐噦逆煩渴寒熱往來身面皆黃小便不利大便祕澀或過經不解或潮熱不除及瘥後勞復發熱疼痛煩熱經血適來適斷寒熱如瘧

人參　甘草炙　黃芩各三錢　柴胡八錢

半夏湯泡七次焙乾二錢半
右剉散每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎去
滓溫服不拘時
王肯堂曰小柴胡湯加山梔牡丹皮名加味小柴
胡治肝膽經風熱瘧瘧寒熱往來日晡發熱潮熱
身熱不欲飲食或怒火口苦耳聾咳嗽或脅痛胃
滿小便不利或泄瀉吐酸苦水或肢體搐動脣目
抽劄並宜用之
大承氣湯
治剛痓胃滿內實口噤咬牙大熱發渴大便祕
大黃 硇硝各半兩 厚朴 枳實各一兩
右剉散每服三錢薑三片水一盞煎半盞溫服
大柴胡湯
治傷寒十餘日邪氣結在裏往來寒熱大便閉澀
腹滿脹痛譫語心中痞硬飲食不下或不大便五
六日繞臍刺痛時發煩躁及汗後如瘧日晚發熱
兼臟腑實脉有力者可服
柴胡去蘆八錢 黃芩炒 赤芍藥各三錢
半夏泡焙一錢半 枳實去穰麩炒半錢
右剉散薑棗煎加減服之
欲下加川大黃三錢

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百五十一卷目錄

醫部彙考四百三十一

小兒驚癇門七

方三 人參羌活散 惺惺散 獨活 木通散 加味導赤散 仁齋犀角湯 茅先生奪命散 三因方 驚 紅散 定搐散 順搐散 羅氏鎮肝丸 定 命丹 疏風散 散風丹 牛黃清心丸 鄭氏比金丸 太白散 防風丸 全 螺散 大府散 比金丸 利驚丸 小黑龍丸 演山青金 湯氏奪命丹 湯氏金星丸 清氏奪命丹 丸 真珠天麻丸 鄭氏驅風青 安魂散 蛇頭丸 直指天麻丸 直指銀白散 定志 丸 加味地黃丸 五苓散 五福化毒丹 百解散 木通散 三解散 牛蒡湯 防風 湯 牛夏丸 竟氣飲 五和湯 鎮驚丸 截驚丸 麻砂膏 不驚丹 參木 柴苓湯 青州白丸子 海藏返魂丹 八仙 散 釀乳方 柳朴飲 中和飲 七寶飯 油珠膏 補脾益眞湯 前朴飲 六柱散 日生湯 固眞湯 艾香 散 天麻飲 觀音金 蠟散 吉州留聲散 本事醒脾丸 入麝湯 烏蠟湯 陰陽散 梓朴散 豆參散 平肝湯 水苓 湯 生氣散 滴山觀音奎 蠟散 導命丹 鎮驚丸 辰砂丸 又 大醒脾散 實肝散 又 琥珀艷丸 又 參命飲 保生丹 天麻散 雄黃散 南星散 天 麻防風丸 七味羌活膏 全蠟散 稱錐丸 封風膏

藝術典第四百五十一卷

醫部彙考四百三十一

小兒驚癇門七

方三

參蘇飲 證治準繩下同

解驚風煩悶痰熱作搐咳嗽氣逆脾胃不和

人參去蘆 紫蘇和梗 前胡去蘆 乾葛 半夏

赤茯苓各七錢半 枳殼 陳皮 桔梗剉炒

甘草各五錢

右剉每服二錢水一鐘薑二片煎七分無時溫服

鈐方去人參加川芎

人參羌活散

治初作急驚散風邪除風熱

羌活 獨活 柴胡 川芎 人參 甘草炙

白茯苓各一兩 前胡去蘆 桔梗 地骨皮

天麻酒浸焙各半兩 枳殼一兩麩炒

右㕮咀每服一錢水半盞薑一片薄荷一葉棗半箇煎服

疹痘未發亦可服直指方每服三字末紫蘇薄荷湯調

搐掣緊急者去節麻黃煎湯調或惺惺散加荊芥

防風亦可兒得遽施腦麝

或中風體硬加麻黃乾葛薏苡仁

加蟬蛻治驚熱

惺惺散

除風熱及傷寒時氣疹痘發熱

白茯苓 細辛 桔梗 花粉 人參 甘草炙

白朮 川芎各等分

右爲末每服一錢水半盞薑一片薄荷三葉同煎

湯氏細辛減半

獨活湯

治胎驚發散風邪

羌活 獨活各一分 檳榔 天麻 麻黃去節

甘草炙各半分

右剉散每服半錢水煎

於內加天南星末蜜調可貼顖門

木通散

治小兒肝心有熱驚悸用此瀉肝風降心火利驚熱

羌活 山梔各二錢 大黃煨 木通 赤茯苓

甘草各一錢

右剉碎每服二錢入紫蘇些少用水一盞煎至五分不拘時服

巳風丹

祛風退驚

天竺黃細研 防風 釣藤各一兩 白殭蠶

乾全蠍 白附子各半兩

右爲細末煉蜜和如芡實大每服一粒至二粒麝香荊芥湯化下

加味導赤散

生地黃 木通俱上 防風 麥冬 甘草俱中

山梔子 薄荷葉俱下

入燈草竹葉水煎

仁齋犀角湯

治心驚熱盛

犀角 防風 木通 赤茯苓 桑白皮炒

炙甘草各等分

右剉細每三字水煎服

茅先生奪命散

治天釣臍風客忤卒死撮口鵝口木舌喉痹疼顫風搐吐涎後依證詞理

銅青 硃砂各二錢 臘粉半錢 麝香另研

蠍尾十四箇去針

右爲末每服半錢薄荷臘茶清調下
三因方
治陽癇驚風熱證面赤身熱發搐直視牙緊
蘆薈　白附子　生甘草各二錢　胡黃連
硃砂各一錢　臙粉　麝香各半錢　蠍梢
殭蠶炒各七箇　金箔七片　赤脚蜈蚣一條炙
右爲末二歲已上服半錢金箔薄荷湯下
睡紅散
治小兒急慢驚風手足搐搦目瞪神昏
牛黃　鵬砂　腦　眞珠　水銀砂各半錢　青黛
蠍尾炒　京墨燒　南星　半夏同上薑製一宿
蛇含石淬各一錢　金銀箔各十片　麝香一字
烏蛇尾井項下七寸酒浸一宿取出去皮骨炙一錢
右爲末三歲一字薄荷湯下
按此治風熱痰藥通關透肌骨之劑也非風邪下陷者不可輕用
定搐散
治小兒急驚定搐
赤脚蜈蚣大者一條酒浸炙　白附子　羌活
麻黃　直殭蠶炒　代赭石醋煅淬七次　南星
蠍梢　川薑黃各二錢　硃砂一錢
右爲末每服一字荊芥紫蘇煎湯調下
如搐不止加烏蛇肉
順搐散
解男右女左搐不順者
枳殼　鈎藤去鈎　荊芥　羌活　防風去蘆
甘草各半兩
右碎每服二錢水一盞順切薑二片煎七分無時
溫服或入薄荷同煎
羅氏鎮肝丸
治小兒急驚風目直上視抽搐昏亂不省人事是
肝經風熱也此方瀉青之變
天竺黃研　生地黃　當歸　竹葉　草龍膽
川芎　大黃煨　羌活　防風各二錢半
右爲細末煉蜜丸如雞頭大每服二丸沙糖水化
下先服此後服天麻散
定命丹
治急驚天弔撮口通利痰熱
全蠍七箇　天麻　南星炮　白附子各二錢半
硃砂　青黛各一錢半　輕粉　麝香各半錢
龍腦一字
右爲細末粟米糊丸菉豆大每一丸荊芥薄荷湯
調下先研半丸吹入鼻中
疏風散
治驚風痰熱四證俱盛
檳榔　陳皮去白各二錢　牽牛　大黃煨各三錢
右爲末每服半錢生蜜調下
演山加砂硝一錢
保嬰方曰大黃黑牽牛白牽牛三味各半生半熟
檳榔各半兩細末蜜湯調痰多加輕粉
截風丹
演山治四證已作八候未具
全蠍去毒炒　殭蠶炒　白附子炮　南星炮
天麻各二錢半　硃砂一錢　麝香一字
赤足蜈蚣一條酒炙
右爲末煉蜜丸梧子大每服三丸金銀薄荷湯化
下
一方有防風
定搐散
治急驚四證八候併作
天麻　白附炮各半兩　乳香一錢　蠍梢炒
白花蛇頭酒炙各二錢半　硃砂　雄黃各一錢
南星炮五錢　代赭石一兩米醋煅淬七次
赤脚蜈蚣一條酒炙　龍腦　麝香各一字
右爲細末每服半錢金銀薄荷湯下煉蜜丸調亦
佳
牛黃清心丸
治四證八候去風痰散驚熱
天南星　半夏　白附　川烏各一兩並洗
川芎金半兩
右五味爲麤末用臘月黃牛膽兩三枚取汁和藥
入膽中扎縣當風處一月乾取出入馬牙硝硃砂
雄黃鵬砂各一錢腦麝少許如膽藥一兩硝砂四
味各一錢稀麪糊丸麻子大金銀薄荷湯下一歲
十九二歲倍之
鄭氏比金丸
治急驚壯熱喘鳴痰嗽大小便不利
輕粉　滑石各錢半　南星一錢　青黛半錢
爲末稀糊丸小豆大一歲二丸薄荷湯調下
急驚頭熱足冷口噤面青痰熱加一丸桃皮湯下
名桃符丸疏流蘊積涎熱痛痘餘毒宜服

去青黛加蜈梢半錢名小青丸同治
太白散
急驚搐搦涎盛
粉霜二錢　輕粉　白牽牛炒各一錢
右爲末每服一字薄荷湯調吐痰效
防風丸
治驚風痰熱神昏驚悸
天麻　防風　人參　川芎各一兩　全蠍
甘草　殭蠶　硃砂　雄黃　牛膽　南星各二錢
五分
右爲末蜜丸鷄頭大每一丸薄荷湯下
一方無川芎南星
全蠍散
治急慢驚風發搐服之神效急慢二證加減方法
在內製法更佳
全蠍二十四箇新薄荷葉包以竹托住慢火炙乾
殭蠶半兩炒去絲嘴依前炙或乾薄荷葉酒潤用
南星末以薑片各一兩新薄荷二兩同搗作餅乾
白附子炮三錢　防風去蘆　天麻　甘草炙
硃砂水飛　川芎各半兩
右爲末一歲兒服一字二歲兒服半錢薄荷湯調
下量大小歲數加減
身熱發搐前後火府散調
慢驚吐瀉後發搐生薑湯調
急驚搐煎火府散加大黃湯調
如急驚不用南星加大黃一兩煨
若慢驚不用大黃加製南星
火府散
面赤咬牙發熱唇口乾燥小便赤澁一切虛實邪
熱並治
生地黃　木通各一兩　黃芩　甘草炙各半兩
右咬咀每服二錢水煎溫服無時
湯氏金星丸
治急驚壯熱痰塞大便不通
鬱金末　雄黃各二錢五分　膩粉半錢
巴豆七个取霜
右爲末酢糊丸黍米大一歲二丸薄荷湯下
小黑龍丸
治小兒急驚輕者
青礞石煅一兩　青黛一錢　蘆薈一錢半
膽星一兩
右爲極細末甘草湯爲丸如雞頭大每一丸薑蜜
薄荷湯下大小黑龍丸俱以礞石膽星治痰之劑
爲君痰多者宜之
謝氏奪命丹
治急驚不省人事眼定不動牙關不開脣白井黑
者
南星　半夏各四錢爲末並以薑汁和作餅曬乾
眞珠白者二錢　巴豆去油淨一錢　硃砂四錢
金箔　銀箔各十片　輕粉　麝香各半錢
右各爲末和勻飛羅麪打糊爲丸如黍米大每一
歲兒一丸燈心湯下
北金丸
治小兒風熱丹毒急慢喑驚
前奪命丹中減去金銀箔加眞膽金末三錢丸如上
法
利驚丸
前比金丸中去鬱金加腦子半錢白頭蚯蚓一條川
烏歲數百尾兩頭齊燒各用之去土共二錢丸服如
上法
按此一方導痰藥也白附子加減法
演山青金丸
治驚風痰熱壅盛
巴霜半錢七　青黛二錢半　南星半兩炮
輕粉一錢　滑石　全蠍去毒炒各二錢
右爲末稀糊丸如麻子大一歲五丸二歲七丸大
小加減薄荷茶清下以通爲度
一方加白附子
一方無輕粉
眞珠天麻丸
治驚風痰熱壅盛及弔腸鎮壯撮口絕效
南星炮　天麻　白附子炮各一錢　膩粉半錢
巴霜一字　蜣蜋炒　全蠍麪炒　滑石各一錢半
右爲末糊丸粟米大一歲五七九二歲十九大小
加減薄荷湯點茶清送下
鄭氏驅風膏
肝風筋脈拘急面紅目青眼上驚搐及胎風
辰砂　蠍尾　當歸　龍膽草　川芎　山梔仁
大黃　羌活　防風　甘草各一錢
右爲末入麝香一字煉沙糖丸雞頭大三歲三丸
薄荷竹葉蜜湯化下

安睡散
治急慢驚風潮搐不得安睡
辰砂研水飛　乳香　血竭各一錢並細研
麝香半錢研　人參　酸棗仁炒　南星炒
白附各半兩　蜈蚣一條酥炙黃酒浸一宿
全蠍二十一枚
右爲末一歲一字薄荷汁好酒煎沸調下得睡效
蛇頭丸
治急慢驚風涎搐搦來去不問陰陽二候
蛇頭一箇炙　赤足蜈蚣三條　硃砂三錢
鈆白霜　輕粉各二錢　龍腦　麝香各一錢
鐵液粉　百草霜各半兩　蛇舍石一兩酢淬
右爲末米糊丸雞頭大三歲半丸薄荷湯磨下
一方加全蠍一分
慢驚加附子半兩去皮尖血蝎一分
直指天麻丸
利驚下痰弔腸鎖肚撮口可通用
天南星炮二錢　白附炮　馬牙硝　明天麻
川鼈脂　全蠍焙各一錢　輕粉半錢　巴霜一字
右爲末稀糊丸麻子大每一丸薄荷生薑泡湯送下
右重下之劑惟上壅下閉血氣充實脉沉而有力者宜之又閻氏所謂候搐勢定下其痰熱之類是已利驚後調胃助氣定志寧神防作慢驚
直指銀白散
助胃驅風嘔吐作慢驚候者通用
蓮肉　白扁豆炒　白茯苓各一分　人參　天麻　白附子炮　全蠍炒　木香　甘草炙　藿香半分　陳米炒香三錢
右爲末每一錢薑一片入冬瓜子仁七粒同煎或陳米湯調下
一方加白朮一分醒脾散大醒脾散王氏惺惺散皆和胃助氣可通用
定志丸
治驚風已退神志未定以此調之
琥珀　茯神　遠志肉甘草製　人參　白附炮
天麻　天門冬去心　甘草炙　酸棗仁炒
右爲末煉蜜丸皂子大硃砂爲衣每服一丸燈心薄荷湯調下
御院有乳香
加味地黃丸
地黃八兩　山藥　山茱萸各四兩　澤瀉
牡丹皮　茯苓各三兩　羌活　防風各二兩
右爲末煉蜜丸如桐子大量兒大小加減
五福化毒丹
治驚熱涼心腦
生地黃　熟地黃焙各五兩　天冬去心焙
麥門冬去心焙各三兩　淨甜硝　乾黑參
甘草各二兩炙　青黛一兩半
右上六味爲細末後研入硝黛煉蜜丸如雞豆大每服半丸或一丸食後熱水化下
海藏曰五福丸治急驚風生蚯蚓一條研爛入五福化毒丹一丸再研如泥煎薄荷湯少許調化旋灌量小兒大小加減服之
右三方乃甘寒瀉火之劑爲君小兒血氣虛而急驚者宜之又潔古閻氏所謂候搐止勢減宜安神鎮心之類是已
五苓散
解傷寒溫濕暑毒霍亂分陰陽理煩渴飲水小便不利
澤瀉去麤皮二兩半　白茯苓去皮　豬苓去皮
白朮各一兩半　肉桂去麤皮七錢半不過火
右碎入桂同研爲末每服一錢溫湯調下不拘時若作哎咀用赤茯苓分兩同前每服二錢水一盞煎七分溫服
加辰砂一兩治熱驚
百解散
主和解百病虛慢陰證不宜
乾葛二兩半　升麻　赤芍各二兩　黃芩一兩
麻黃製七錢半　薄桂肉二錢半　甘草一兩半
右碎每服二錢水一盞薑二片葱一根煎七分無時溫服
有風熱盛加薄荷同煎
木通散
主上膈熱小腑閉煩躁生嗽及淋瀝諸瘡丹毒
木通去皮節　地榆蓄去老梗各半兩　大黃
甘草　赤茯苓去皮各三錢　瞿麥去幹根
滑石末　山梔仁　車前子　黃芩各二錢半
右件哎咀每服二錢水一盞燈心三莖煎七分無時溫服或入薄荷同煎
三解散

主上焦蘊熱傷風面紅目赤狂躁氣急渴水驚啼煩悶丹毒口瘡痰嗽搐搦

赤芍藥　黃芩各五錢　全蠍十五尾去尖毒粉草六錢　茯神　枳殼去穰剉炒黃各二錢防風　天麻　大黃　鬱金　白附各二錢半人參二錢五分　殭蠶五錢

右碎焙爲末每服半錢至一錢用薄荷湯無時調下或燈心湯

牛蒡湯

主傷風發熱煩躁鼻塞氣喘痰嗽驚啼及諸瘡赤紫丹毒咽喉腫痛

牛蒡子三兩略煨研碎　大黃一兩半　防風薄荷各一兩　荊芥四兩　甘草一兩一錢半

右件㕮咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

防風湯

治急驚後餘熱未退時復手足搐搦心悸不寧及風邪中入肝經兩目視人開眩不常

防風去蘆　川芎　大黃　香白芷　黃芩甘草各半兩　細辛去葉一錢　薄荷葉二錢半

右件剉焙爲末每服一錢用溫湯無時調服

半夏丸

治痰證神效若驚搐後風涎潮作服之神效

半夏生用二兩　赤茯苓　枳殼製各一兩風化硇硝二錢半

右煎三味爲末入乳鉢同硇硝杵勻用生薑自然汁煮糯米粉爲丸菉豆大每服三十丸至五十丸仍以淡薑湯食後臨睡送下兒小煮丸如粟穀大

寬氣飲

主通利關節除胷膈痞結消痰逐水進美飲食及治蓄氣而成搐傳變急慢驚風氣逆不和精神昏倦

枳殼水浸去穰麩炒微黃　枳實製同上各一兩人參　甘草炙各半兩

右剉焙爲末每服半錢至一錢淨湯無時調服

驚風發搐薑汁葱頭湯同調

熱極者入寬熱飲薄荷蜜湯調下或麥門冬湯

五和湯

主宣利臟腑積熱調和榮衛

當歸酒洗　赤茯各半兩　甘草炙　大黃枳殼水浸潤去穰剉片麩炒微黃各七錢半

右件㕮咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

茯神湯

治心氣不足虛而驚悸日常煩哭及嬰孩生下羸瘦多驚宜子母同服自然有效

茯神一兩　人參　當歸去蘆尾酒洗各半兩甘草炙二錢

右件㕮咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

有微熱煩躁入麥門冬去心同煎

鎮驚丸

主急慢二驚風痰上壅手足抽掣口眼喎斜煩躁生嘔精神昏悶常服寧心鎮驚疏風順氣

人參三錢　粉草半生半炙　茯神　殭蠶去絲枳殼同前製各五錢　白附子　南星　製白茯苓　硼砂　牙硝　硃砂水飛各二錢半

全蠍十尾去尖毒　麝香一字

右除牙硝硼砂麝香硃砂四味用乳鉢細研餘九味焙爲末入乳鉢內和勻前四味用糯米粉水煮清糊爲丸梧桐子大就帶潤以銀硃爲衣每服三丸至五九或七九

急驚用溫茶清磨化服

慢驚以生薑熟附子煎湯研化溫服薄荷湯化下或麥門冬湯

截驚丸

治驚風搐搦煩躁有熱兩目上視口禁牙關

龍膽草　防風　青黛　釣藤和鉤　淨黃連牛黃　甘草　硃砂各五錢　薄荷葉二錢半麝香半錢

右除牛黃麝香外餘八味剉炒爲末仍同前二味乳鉢內杵勻煉蜜丸如芡實大每用一丸至二丸溫湯化服或茶清

硃砂膏

主五心煩熱喉痰壅盛驚風搐搦渴飲無時睡中不寧見人煩躁口瘡糜爛

硃砂五錢　馬牙硝　硼砂　元明粉各二錢半眞麝香　金箔　銀箔各十五片　白附子枳殼麩炒微黃各三錢　川芎　粉草各四錢人參　黃芩　薄荷葉

右前七味入乳鉢細研後七味剉焙爲末仍入鉢中同前藥和勻煉蜜丸芡實大每服一丸至二丸用麥門冬熟水無時化服

不驚丹

治因驚氣而吐逆作搐痰涎壅塞手足掣縮目睛斜視常服疏風順氣自不作驚和脾胃進飲食

枳殼去穰麩炒黃一兩　淡豆豉焙乾　南星

茯神去皮根木各半兩　蠍梢五十尾去尖毒

淨蕪荑二錢半先入乳鉢內研爛極細

右除蕪荑外餘五味焙爲末再同蕪荑乳鉢內杵勻酢煮糯米粉糊爲丸周歲內與孩粟穀大每服三十丸至五十丸乳汁下三歲以上者麻仁大每服五十丸及六十丸溫米清湯下候一時得吃飲食

參术柴苓湯

治肝經風熱脾土受尅其證善怒睡中抽搐偏身作癢飲食少思

人參　白术　茯苓　陳皮各一錢　柴胡

升麻各七分　山梔炒八分　釣藤鉤一錢

甘草炒五分

每服一二錢薑棗水煎

青州白丸子

治小兒驚風

生半夏七兩　生南星三兩　生白附子二兩

生川烏半兩去皮臍

右爲末以生絹袋盛井花水擺出如未出者更以手搓出如白漿更研再入絹袋擺盡爲度於磁盆中日曬夜露至曉撇去舊水別用井花水攪又曬至來日早再換新水攪如此法春五日夏三日秋七日冬十日去水曬乾後如玉片研細以糯米粉煎粥清丸菜豆大每服三五丸薄荷湯下無時

海藏返魂丹

治小兒諸癇癲潮發爽癍口眼相引項背強直牙關緊急目直上視及諸病久虛變生虛風多睡者因荏苒不解速宜服之

烏犀屑二兩　水銀　天麻酒洗焙　檳榔

硫黃研末入水銀置磁石器內慢火炒成沙

殭蠶去絲嘴微炒各半兩　白附子炮　獨活

川烏炒通赤留煙少許入碗內以一盞子蓋上新土圍之待冷取出　乾蠍去毒炙　川芎薄炒

肉桂去麤皮　當歸酒浸焙乾炒　細辛根

防風　天南星薑汁煮軟炒黃　阿膠杵碎炒

藿香去土　羌活　烏蛇酒浸一宿炙熟去皮骨

沉香　槐膠　白花蛇酒浸一宿炙熟去皮骨

麻黃去根節　半夏薑汁浸三宿炒　羚羊角鎊

陳皮去白炒各一兩　天竺黃研　廣木香

乾薑炮　茯苓去皮　晚蠶沙微炒　人參

蔓荊子去白皮　敗龜板醋洒炙黃　藥本去土

桑螵蛸炒　白芷　何首烏米泔浸一宿煮焙

虎骨酒醋塗炙黃　砂仁　白术泔浸一宿切焙

枳殼炒去白　丁香　厚朴各三分　蟬殼炒

川芎　附子泡去皮尖　石斛去根　龍腦另研

肉豆蔻去殼炒　雄黃研飛　硃砂研飛各一兩

臘粉　麝各另研一錢　烏雞一隻去毛嘴翅足

狐肝三具二味曝月入瓦器固濟煅赤候冷研用

金箔三十片爲衣

右藥五十八味炮製如法煉蜜合和搗三五千下丸如桐子大金箔爲衣每一歲兒溫薄荷自然汁化下無時

右閻氏宗錢氏治慢驚法脈無力者宜之其法以青州白丸子兼異功散羌活膏溫白丸釣藤飲子之類服之至有往往死中得生者

湯氏曰凡吐瀉成虛風慢脾先用奪命散青州白丸子未煎如稀糊入蜜調控下涎後服祛風醒脾等藥

八仙散

風盛者服之

白天麻　白附子　花蛇肉　防風　南星

半夏　冬瓜子　全蠍各等分

右咬咀每服一錢水半盞薑二片棗半枚煎二分熱服

加薄荷尤佳

一方加川烏

釀乳方

人參　木香　藿香　沉香　橘皮　神麯

麥芽各等分　丁香減半

右咬咀每服四錢水一碗薑十片紫蘇十葉棗二枚煎至半碗乳母食後須去乳汁盡方取服之即仰臥囊時令藥入乳之絡次令兒吮數口不可過飽此良法也如嘔定一日急宜截風服八仙散兩日後宜醒脾散如前件藥俱用不拘急困可變須診太衝脈未絕者當灸百會一穴前後髮際兩耳尖折中乃是穴也方書所載但云頂上旋毛中殊不審有雙頂者又有旋毛不正者庸醫之輩習循舊本誤人多矣灸後即當控涎用青州白丸子未

再煎如稀糊入煉蜜調奪命散良久涎下細研靈砂米飲調旋抹口中漸看退證如風盛服八仙散昏困服醒脾散常令減乳母服釀乳藥如此調理無不愈者間有稟受不堅五行數短者雖神聖工巧不能奪其造化矣若涎已離膈但在喉中如鋸藥不能入又不可控當用別法撩之兼搐鼻噴嚏得出次服奪命散庶免再作

撩痰方

川烏尖　白附尖各七箇去皮生用　蠍梢七枚

石綠少許

右爲末一處和勻用雞翎蘸藥入喉中逐漸抽出頻用帕子拭之

右湯氏治慢驚法先用奪命散白丸子控涎候涎下一回用八仙醒脾等一回令乳母用釀乳法如危極者却灸百會及撩痰法但奪命用礞石氣虛者難用必與東垣益黃散相兼服之可也

陳氏曰治慢驚風先用芎蠍散用手法斡出寒痰冷涎自不凝呆次服油珠膏後服益眞湯溫壯元氣時服前朴散寬工實下

芎蠍散

治小兒腦髓受風顖顱開解皮肉筋脈急脹腦骨縫青筋起面少血色或腹中氣嚮時便青白色沫或嘔吐痰涎欲成慢驚搐足脛冷者

川芎　蓽撥各一兩　半夏酒浸一宿湯洗焙

細辛各二錢　蠍梢去毒一錢

右細末一週兒抄一銅錢用數沸湯調稍熱或用薄荷湯饑服如痰滿胸喉中眼珠斜視速與服若目上直視不轉睛者難救或痰氣壅塞不能嚥藥用一指於兒喉臍鬲中探入鼻幹去痰涎氣稍得通次用補脾益眞湯或以油珠膏選用此方累世活人多矣

油珠膏

治氣逆嘔吐風痰作搐

石亭脂硫黃中揀取如蠟者　滑石各半兩

黑附炮去皮臍　半夏酒浸一宿湯洗七次焙

南星醋浸一宿湯洗七次焙各一錢

右細末每服一錢用冷清薑汁半盞滴麻油一點如錢抄藥在油珠上須臾墜下却去薑汁與兒服之再用清薑汁三五口嚥下肚饑服服訖後一時方與乳食

補脾益眞湯

治胎弱吐乳便清而成陰癇氣逆涎潮眼珠直視四肢抽掣或因變蒸客忤及受驚誤服凉藥所作

木香　當歸　人參　黃芪　丁香　陳皮

訶子　厚朴薑製　炙草　肉荳蔻　草果

白朮　桂枝　茯苓　半夏　附子炮各半兩

全蠍炒每服加一枚

右㕮咀每服三錢水一盞半薑一片棗一枚煎六分稍熱饑服服訖令揉心腹以助藥力候一時方與乳食

渴者加茯苓人參甘草去附子丁香肉蔻

瀉者加丁香訶子肉

嘔吐加丁香半夏陳皮

腹痛者加厚朴良薑

咳嗽加前胡五味子去附子官桂草果肉蔻

足冷加附子丁香厚朴

惡風自汗加黃芪官桂

痰喘加前胡枳實赤茯去附子丁香肉蔻草果

氣逆不下加前胡枳殼檳榔去當歸附子肉蔻

腹脹加厚朴丁香前胡枳殼

前朴散

治心腹結氣或嘔噦吐瀉肚腹脹痛驚悸

前胡　白朮　人參　陳皮　良薑　藿香

甘草　厚朴各等分

右剉每服三錢水一盞煎七分稍熱空心服

冲和飲

治感冒風寒頭疼發熱肩背拘急惡心嘔吐腹痛膨脹兼寒濕相搏四肢拘急冷氣侵襲腰足痛疼

蒼朮米泔浸一宿去麤皮剉炒微黃一兩二錢

人參　前胡　桔梗炒各五錢　枳殼麩炒微黃

麻黃　白芷　半夏湯洗七次薑汁浸曬乾

陳皮　川芎　甘草各七錢半　當歸酒洗

薄桂去麤皮　白芍　赤茯苓去皮各一錢半

乾薑　厚朴去麤皮薑汁浸一宿慢火炒各一錢

右剉每服二錢水一盞薑二片葱一根煎七分無時溫服

傷冷惡心嘔吐煨薑同煎

開胃進食加棗子煎空心溫服

寒疝痛入鹽炒茱萸穰香同煎

七寶散

治時氣傷風傷寒頭昏體熱咳嗽及脾胃肺臟不

和口中腥氣異常或牙縫微有鮮血兼調理諸病後小證得中以其品味不僭不燥爲佳

紫蘇去老梗　香附各三兩　甘草　陳皮

桔梗剉炒各二兩半　川芎　白芷各一兩

右咬咀每服二錢水一盞薑二片煎七分無時溫服

痰嗽加製半夏

口腥氣入鹽煎

調理諸疾加棗子煎

六柱散

治吐利泄瀉胃虛脾慢手足俱冷六脈沉微

人參去蘆　白茯苓去皮　熟附子　南木香

肉荳蔻　白朮六味各半兩

右碎每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分不拘時溫服

日生湯

治吐瀉痢後將傳慢驚慢脾神昏脈弱飲食不進睡露揚睛晝輕夜重急宜投服

北南星一兩瓦器盛東壁土同醋煮濾乾剉焙

人參　冬瓜仁打碎各五錢

右件咬咀每服二錢水一盞半薑三片慢火煎七分候溫無時少與緩服投之急必吐

固眞湯

主吐瀉痢後胃虛脾慢四肢口鼻氣冷沉困不省人事

人參　附子炮製　白茯苓　白朮各二錢半

山藥　黃芪蜜塗炙　肉桂　甘草炙各二錢

右咬咀每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分空心溫服無時

醒脾散

主醒脾養胃止吐利進飲食及調理病後神昏目慢貪睡多困脈弱微有痰涎並宜投服

人參　白茯苓　藿香　白朮　甘草炙各五錢

大南星八錢剉作小塊紙裹水透濕炮過用

縮砂仁四十粒　丁香四十粒不見火

右碎每服二錢水一大盞薑三片冬瓜子仁五十粒搗碎慢火煎七分空心緩投服之急必吐

沉香散

治吐利後神昏倦怠飲食減少脾胃氣虛水穀不化或隨時直五心煩熱盜汗常出或開食惡心

沉香　丁香　南木香　藿香葉各一錢半

陳皮　白朮　半夏湯洗七遍薑汁製　白茯苓

肉荳蔻各五錢　粉草炙三錢

右除沉香丁香木香不過火餘七味或曬或焙仍同三味研爲細末每服半錢至一錢用紫蘇木瓜煎湯空心調服棗湯亦好

天麻飲

治諸般風搐不省人事

明天麻　川烏炮製去皮臍各七錢

右剉每服二錢水一盞薑三片慢火煎若稀糊無時勤與溫服

觀音全蠍散

治小兒外感風寒內傷脾胃致吐瀉不止遂成慢驚等證

全蠍二十一箇　天麻炮　防風　羌活各錢半

白芷　炙草　扁豆薑製　黃芪蜜炙各三錢

砂仁　赤茯苓各五錢

右爲末每服一錢用冬瓜仁煎湯不拘時調服

吉州醒脾散

治小兒慢驚神昏目慢多困有痰

人參　白朮　木香　白茯苓　白附子　天麻

全蠍炒　殭蠶炒去絲嘴各等分

右剉碎每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎至五分不拘時服

本事醒脾丸

治小兒慢脾風因吐利後虛困昏睡欲生風癇厚朴　白朮　硫黃入豆腐中煮三五沸　天麻

全蠍　防風　官桂　人參各一錢

右爲細末酒浸蒸餅和丸如雞豆大每一丸搥碎溫米飲下

蠍梢丸

治小兒胎虛氣弱吐利生風昏困嗜臥或涎搐

全蠍微炒　白附子煨製各半兩　硫黃製

半夏薑汁製焙乾各一兩

右爲末薑汁糊丸如麻子大每服三十丸荊芥湯下量兒大小加減服之

天麻湯

治小兒慢驚風身冷瘛瘲

天麻　防風　川烏　全蠍去翅足薄荷葉包煨

南星

右咬咀等分煎服

烏蠍湯

湯氏治慢驚方

眞川烏一枚去皮生用　全蠍等分

右二件㕮咀分二服水二盞薑一片煎半盞旋旋滴入口中

陰癇散

陰癇卽慢驚風此能祛風豁痰回陽正胃

黑附子生用去皮臍　生南星　半夏各二錢

白附子一錢半

右研細井水浸七日每日換水浸訖控乾入硃砂二錢磨香一錢研勻每服一字薄荷湯調下量兒加減

一方用生黑附子去皮臍爲末每服二錢以水一盞半生薑二片煎至半盞分二服量兒加減

吐者入丁香五箇同煎空心服或水浸炊餅爲丸如粟米每服二十丸生薑湯下亦可

梓朴散

厚朴　半夏湯洗七次薑汁浸半日曬乾各一錢

右米泔三升同浸一百刻水盡爲度如百刻水未盡少加火熬乾去厚朴只將半夏爲末每服五分或一字薄荷湯調下無時

豆卷散

治小兒慢驚多因藥性太溫及熱藥治之有驚未退而別生熱證者有因病愈而致熱證者有反爲急驚者甚多當問病幾日因何得之曾以何藥療之可用解毒藥無不效宜此方

大豆黃卷水浸黑豆生芽是也曬乾　管仲

枳藍根　甘草炙各一兩

右爲末每服半錢水煎服甚者三錢藥水內入油數點煎又治吐瀉服不拘時

右諸家雜治慢驚後一方辟藥太過之毒尤見憂人之切也

平肝湯

治驚而有熱

人參　茯苓　白芍藥酒炒　白朮

右入生薑煎服

暑月加黃連生甘草竹葉煎服

术苓湯

治小兒驚因脾虛肝乘之手足搐動四肢惡寒而食少

白朮二錢　茯苓一錢

右煎湯入竹瀝熱下龍膏丸三十丸保和丸二十丸

生氣散

丁香三字　白朮　青皮各二錢　甘草炙

木香　人參各一錢

右爲末每服半錢沸湯點服或用和劑方調氣散亦可

演山觀音全蠍散

因吐後傳慢驚候清神固氣補虛益脈開胃止吐

黃芪　人參各一分　木香　炙草　蓮肉炒

白扁豆炒　白茯苓　香白芷　全蠍　防風

羌活各一錢　天麻二錢

爲末每一錢棗半箇煎無時服慢脾尤宜服

湯氏醒脾散

吐瀉不止痰作驚風脾困不食

白朮　人參　甘草炙　淨陳皮　白茯苓

全蠍去毒各半兩　半夏麴　木香各一分

白附四箇炮　南星一箇炮　陳倉米二百粒

右爲末每服一錢水半盞薑二片棗半箇煎時時服

大醒脾散

治慢脾風肉虛昏悶不省

人參　茯苓　木香炮　全蠍焙　石蓮肉

白朮　陳皮　砂仁　甘草炙　丁香　白附子炮各等分　陳米一撮炒

右剉碎每服二錢用水一盞生薑三片棗一枚煎至五分不拘時服量兒大小加減與服

實脾散

治脾胃虛冷吐瀉不止乳食不進慢脾等證

人參　白茯苓　白朮　砂仁　麥芽　神麴

陳皮　石蓮肉　乾山藥　良薑炮　青皮

冬瓜仁各五錢　丁香　木香　薏苡仁炒

扁豆薑汁炒　香附炒　炙草　陳米炒各二錢

肉荳蔻二枚煨

右爲細末每服半錢或一錢用米湯不拘時調服

右皆慢脾風之主藥也

保命丹

治小兒急慢驚風四肢逆冷眼直口噤涎不止

虎睛一對安新瓦上復以瓦蓋之慢火遍乾

硃砂半兩　全蠍　麝各半錢　天麻一分

蜈蚣二條去頭尾赤脚者
右爲細末煉蜜丸如大豆大瓦罐貯之又入腦麝
窨定
急驚薄荷蜜湯化下
慢驚薄荷湯化下各三丸
鎮驚丸
琥珀　辰砂　眞珠母　青皮　甘草各二錢半
青黛　蘆薈　柴胡　青礞石硝煅各半兩
天竺黃　膽星各二兩　天麻　乳香各一兩
雄黃一錢半
右爲末甘草膏丸如雞豆大
慢驚參术湯下
急驚薄荷薑蜜湯下
辰砂丸
小兒急慢驚風
全蠍四十九箇微炒黃　辰砂半兩研極細和勻
右取蚯蚓十條洗淨入小瓶內以溫火煅蚯蚓化
爲水和丸如胡椒大每服三丸用順流水化下
又
小兒急慢驚風
蠶殭炒三條　辰砂豆大一粒　全蠍炒一箇
眞珠末一撮
右末取蓬蒿中小蟲兒每一箇研作一丸如麻子
大每一粒用乳汁下
琥珀抱龍丸
專治小兒急慢驚風發熱咳嗽作搐痰喘驚悸生
薑薄荷湯下
琥珀二錢半包在精豬肉內煨過取出研末二錢
牛膽南星一兩六錢臘月用牛膽製作成者妙
殭蠶二錢炒　雄黃研　辰砂研飛　人參
白茯苓各三錢　天竺黃五錢　眞牛黃五分
鈎藤全用鈎子一兩五錢　眞麝香一錢
右各味不可短少分釐爲極細末用粉甘草八
兩對碎以水四大碗熬膏二盞入藥末爲丸每一
丸重五分金箔爲衣外用黃蠟包之一料作二百
丸
時行瘄疹發熱嘔吐驚跳白湯下
傷風發熱咳嗽鼻塞驚哭葱湯下
因著驚發熱睡臥不寧燈心湯下
夏月發熱嘔吐麥門冬湯下
因母發熱過乳溫熱不寧甘草湯下
脾胃不和頭熱黃瘦懶食砂仁湯下
週歲小兒服一丸未及者半丸連進一二丸無不
效驗忌食魚腥生冷食乳者乳母同服
又
治病法如前
琥珀一兩半研　牛黃一錢研　人參　檀香
白茯苓各一兩半　硃砂研　珍珠各五錢研
枳殼炒　枳實　牛膽南星　天竺黃各一兩
山藥十兩　甘草三兩以上各爲細末再用
金箔四百片　蜂蜜二斤　黃蠟二十五斤
此藥一料五百丸每丸重五分專治嬰孩小兒諸
驚四時感冒瘟疫邪熱煩躁不寧痰嗽氣急癇疹
欲出發搐並皆治之其藥性溫平不寒不躁驅風
化痰鎮心解熱安魂定驚和脾健胃添益精神葱
白煎湯或薄荷湯下
痰壅咳甚生薑湯下
瘄疹見形有驚白湯下
心悸不安燈心湯下並不拘時服
初生數月者每丸作四次服或三分之一或半丸
數歲者每服一丸更量兒大小加減酌用可也
奪命散
治急慢驚風諸藥無效此藥隨手奏功
白附二錢　黑附炮去皮臍半兩急驚不用
南星炮一兩　天麻二錢　辰砂另研二錢半
防風　半夏各半兩　全蠍七枚　蜈蚣炙一條
麝香半錢　殭蠶炒慢驚不用
右爲末三歲兒半錢薄荷生薑自然汁加好酒沸
湯各少許調服
急驚加輕粉腦子各少許
保生丹
治慢驚甚驗
赤脚蜈蚣酒炙一全條　白直殭蠶炒七箇
辰砂另研一字　全蠍用薄荷葉包炙七枚
青州白丸子三十九
右爲末入麝香少許
慢驚人參麥門冬湯調下
急驚加腦子牛黃各少許金銀薄荷湯下
天麻散
治小兒急慢驚風
半夏七錢　天麻二錢半　甘草炙　茯苓

白朮各三錢
右用水一盞入磁罐內煮藥令水乾將老薑三錢同煮候乾爲細末每服一錢五分薑棗湯調下

雄黃散
主暴中急慢驚風痢骼痰涎滿口及雨侵閉汗不通或凉或熱坐臥生煩
紅亮雄黃二錢半　白芍　川烏頭炮去皮臍　草烏頭炮去皮　明天麻　川芎各半兩
右除雄黃外五味剉焙同雄黃爲末驚風痰涎每服半錢或一錢用薑汁茶清調下發汗薑葱薄荷水煎併投三服取效

南星散
治驚風墜涎
天南星一箇重一兩者換酒浸七伏時取出新瓦上炭火炙乾烈地上去火毒搗細末入硃砂二錢半
右研爲細末每服五分荊芥湯空心及午時各調下一服

天麻防風丸
治小兒驚風身熱喘麤多睡驚悸搐掣神昏痰涎不利等證
天麻　防風　人參各一兩　蝎尾去毒半兩　甘草　硃砂　雄黃　牛黃　麝香各一錢
殭蠶炒半兩
右爲末煉蜜丸如櫻桃大硃砂爲衣每服薄荷湯下一二丸

七味羌活膏
治急慢驚風壯熱
羌活　獨活　明天麻　全蝎去毒　人參　殭蠶炒各半兩　烏蛇肉酒浸一宿焙乾一兩
右爲末煉蜜和丸如皂子大每兩作五十丸每服一丸荊芥湯下

全蝎散
治小兒驚風
全蝎二錢不去頭尾用薄荷葉裹炙乾
右同研爲末作四服白湯下

褊銀丸
治小兒急慢驚風積痼
青黛三錢　水銀一皂角子大同黑鉛炒砂子　寒食麪　黃明膠炒焦爲末各二錢　腦麝少許　輕粉炒豆許　雄黃　粉霜　硃砂各一兩
巴豆二十一粒去油
右研細滴水爲丸如麻子大捏匾曝乾磁盒盛之一歲一丸隨意加減煎棗子湯送下不得化破

劫風膏
治急慢驚摘臍風撮口牙關緊閉痰涎壅盛咽喉腫痛
葳靈仙去蘆一兩半細剉焙研爲末
右用皂莢三兩去皮弦搥擲溫水一盆絹濾過慢火熬若稀糊入醇醋半兩再熬三五沸去火候冷用前藥末亭分乳鉢內杵勻丸芡實大先用鹽梅肉擦牙根次以此膏一丸或二丸溫白湯濃調抹入左右牙關內即開續進別藥熬時得丸器爲上銀器尤佳及解風痰壅盛淡薑湯調化無時少與含嚥咽喉腫痛溫茶清調下或薄荷湯

以上諸方通治急慢驚風蓋謂虛實兩見急慢互出故有通治之法合而言之急慢雖異皆本之於痰故礞石星半之屬通能治之者也分而言之礞石之屬瀉痰青黛之屬瀉木硃砂之屬瀉火皆治氣實之劑參草之屬補土天麻全蝎之屬補木烏附之屬補火又皆治氣虛之劑故補瀉兼施虛實通治之法也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百五十二卷目錄

醫部彙考四百三十二

小兒驚癇門八

方四

溫臍湯　蟬蛻鉤藤飲　清苦清心飲　寧志丸　茯神散　治要茯苓補心湯　治要茯苓丸　朱雀丸　丹溪麻砂丸　本事辰砂遠志丸　加味保神湯　辰砂丸　本事辰砂遠志丸　九味羌活湯　八物定志丸　細辛大黃湯　獨活湯　星香丸　紫河車丸　獨活湯　鎮驚丸　七寶鎮心丸　清神散　天麻丸　奪魂散　鎮蛇黃散　迫涎散　醒腦安神丸　加味保神丸　古鉗方　鉤藤飲　鎮驚丸　拔萃妙香丸　鎮心丸　神應丹　元戎二白丸　保命滾涎丸　琥珀寒星丸　前星五生丸　醫統方　又叶疾碧丹　定癎丸　又叶疾碧丹　下痰控涎丸　元戎小金丹　寶丹　雷鳴大黃湯　流香天麻湯　半黃丸　治五癎召魂湯　生熟黃連湯　古鉗方　鎮心丸　大防風湯　蜀汝井生湯　汲古　防風散　加味天麻散　加味溫膽湯　星香丸　人參生活湯　千金散　利驚丸　加味溫膽湯　小生黃丸　清心導痰丸　鎮驚丸　錢氏方　生犀丸　通關散　協和散　錢氏方　犀角丸　金箔丹　天竺黃丸　加味保神湯　犀角丸　加味木香湯　星香丸　紫河車丸　保命集　五癎丹　錢氏方　太乙紫金丹　防風通聖散　金箔鎮心丸　寧心丹　烏犀散　三味天麻散　參木散　雙金丸　備急丸　星香散　木香散　補肝益氣湯　先說　柴胡散　約藥湯　蜘蛛丸

方四

霹靂散　避治準繩下同

解急慢驚風不省人事

豬牙皂角三錢　細辛　川芎　白芷各二錢

鄧艾花一錢半

右剉驢爲末每只少許用大燈心三寸長蘸點鼻內得噴嚏爲驗前藥不可焙焙則不應

蟬蛻鉤藤飲

治肚疼驚啼

鉤藤鉤　天麻　茯苓　川芎　白芍藥各三錢　甘草　蟬蛻各一兩

右入燈心水煎服

清暑清心飲

解伏熱中暑煩躁作渴神氣不清及有驚搐名暑風證投之即效

香薷　澤瀉各一兩　白扁豆炒熟去殼研　淨黃連　羌活　猪苓　厚朴薑汁炙透炒　白朮　乾葛　赤茯苓　升麻　川芎各半兩　甘草三錢

溫臍湯

治心臍虛怯觸事易驚或夢寐不祥遂致心驚臍慉氣變生涎涎與氣搏變生諸證或短氣悸之或復白汗臍虛不能制脾則脾之水飲作矣

半夏湯洗　竹茹　枳實麩炒　橘皮各二兩　甘草　白茯苓一兩半

右每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎七分食前服

寧志丸

治心虛多驚若有痰宜吐之

人參　白茯苓　茯神　柏子仁　琥珀　當歸　酸棗仁溫酒浸半日去殼　遠志炒各半兩　乳香　硃砂　石菖蒲各三錢

右爲末蜜丸桐子大每服三十丸食後棗湯下

茯神散

治五臟氣血虛弱驚悸怔忡宜用此安神定志

茯神去木　人參　龍齒另研　遠志　桂心　防風　獨活　酸棗仁　細辛　白朮炒各三錢　乾薑炮三兩

右爲末每服四五錢水煎服蜜丸亦可

治要茯苓補心湯

治心氣不足喜悲愁怒衄血面黃五心煩熱或咽喉間痛舌本作強

茯苓四錢　桂心　甘草炒各三分　紫石英煅　人參　麥門冬去心各一錢　大棗一枚

右水煎服

治要茯苓散

治心經實熱口乾煩渴眠臥不得心神恍惚

茯神去木　麥門冬去心各一兩五錢　通草　升麻各一兩二錢半　紫菀　桂心各七錢五分　知母一兩　大棗一十二枚　淡竹茹五錢　赤石脂一兩七錢五分

右每服一兩水煎
朱雀丸
治心病怔忡不止
白茯苓二兩　沉香半兩
右爲末蜜丸小菉大每服三十丸人參煎湯下
丹溪硃砂丸
治勞役心跳
硃砂　當歸身　白芍藥　側柏葉各三錢
川芎　陳皮　甘草　黃連炒各一錢半
右用猪心血爲丸粟米大每服百丸龍眼湯下
本事辰砂遠志丸
消風化痰鎮心安神
人參　石菖蒲去毛　遠志去心　茯神各一兩
川芎　山藥　白附子　麥門冬　細辛　鐵粉
辰砂各五錢
右爲末用生薑汁入水糊丸菉豆大以硃砂爲衣
每服一二十丸臨睡生薑湯下
加味歸脾湯
去丹皮山梔卽歸脾湯治脾虛弱損健忘驚悸等
證
人參　黃芪　茯神去木　白朮炒　遠志去心
棗仁　龍眼肉　當歸　丹皮　山梔炒各一錢
甘草　木香各五分
右水煎服
王肯堂曰愚按前方若乳母憂思傷脾血虛發熱
食少體倦或肝虛不能統攝以致陰血妄行或健
忘怔忡驚悸少寐或心脾作痛自汗盜汗或肢體

腫痛大便不調或婦人經候不調脯熱內熱或口
唇流注等證致兒爲患者令子母俱服之
辰砂膽星膏
治小兒痰熱氣熱氣急喘嗽驚悸不安
辰砂　膽星各一兩　琥珀　青礞石末各一錢
天竺黃二錢　甘草五分　麝香少許
右爲細末煉蜜丸如芡實大每服半丸不拘時生
薑湯化下
木通散
治小兒肝心有熱驚悸用此藥瀉肝風降心火利
驚熱
羌活　山梔子各二錢　大黃煨　赤茯苓
木通　甘草各一錢
右剉每服二錢入紫蘇葉些少水一盞煎至五分
不拘時服
九味養脾湯
治小兒大病後面黃肌瘦目動咬牙髮少未能强
步因誤服解表瀉利傷尅諸藥而致者宜長緩調
理全復胃氣
白朮一錢二分　白芍酒炒　白茯苓各八分
人參　陳皮　川芎各六分　甘草炙　半夏
麥冬各五分　黃芪蜜炙　當歸酒洗各四分
右用薑棗水煎服
八物定志丸
補益心神安定魂魄治痰去胷中邪熱理肺腎
人參二兩　菖蒲　遠志　茯神　茯苓各一兩
硃砂研水飛二錢　白朮　麥門冬各五錢

牛黃二錢另研
右爲細末煉蜜丸如桐子大米飲湯下三十丸無
時
韃靼不足加生地黃當歸
肺氣不足加天門冬麥門冬五味子
心氣不足加上黨參茯神菖蒲
脾氣不足加白朮白芍藥益智仁
肺氣不足加天麻川芎
腎氣不足加熟地黃遠志牡丹皮
膽氣不足加細辛酸棗仁地榆
神昏不足加硃砂預知子茯神
紫河車丸
此補劑斷癇
紫河車肥厚者一箇洗淨重湯蒸爛研化入
人參　當歸各二兩爲末
右和勻爲丸如芡實大每服五七丸乳汁化下
獨活湯
治小兒風癇解表通裏
獨活　麻黃去節　川芎各一錢　熟大黃
甘草炒各半錢
右剉碎每服二錢用水一鍾生薑二片煎至四分
不拘時溫服
細辛大黃湯
治小兒風癇內熱
明天麻　防風各半兩　北細辛　大黃焙
川芎各二錢半　炙甘草一錢半
右剉碎每服二錢入犀角少許用水一鍾煎至四

分不拘時服

鎮驚丸

治小兒一切驚癇

茯神　遠志薑製焙　紫石英燒醋淬研　人參

琥珀　滑石　蛇黃煅醋淬　南星炮各二錢半

龍齒　熊膽　鐵粉各半分　輕粉三分

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大硃砂爲衣每服三五丸煎金銀湯磨化不拘時服

七寶鎮心丸

治小兒驚癇心熱

遠志薑製焙　雄黃　鐵粉　琥珀各二錢

硃砂一錢　金銀箔四片　麝香少許

右爲細末煮棗取肉爲丸如梧桐子大每服三五丸煎麥門冬湯化下不拘時服

清神散

治小兒驚癇

犀角　白鮮皮　石菖蒲　遠志去心薑製焙

半夏湯泡各二錢五分　茯神半兩　大黃焙

人參　甘草炙各一錢半

右爲末每服半錢煎麥門冬湯調不拘時服

天麻丸

治小兒食癇有痰

南星泡二錢　白附炮　天麻　牙硝　川靈脂

全蝎焙各一錢　輕粉半錢　巴豆去油二錢半

右爲末稀麪糊爲丸如麻子大每服十丸用薄荷煎湯或薑湯送下亦可不拘時服

清鎮蛇黃散

治小兒諸癇

蛇黃一箇煅醋淬七次研　礬金　雄黃各二錢

青礞石　硃砂各一錢　鐵粉篩淨細研三分

右爲末搗粳米飯爲丸如梧桐子大每服三五丸人參煎湯磨化不拘時服

地龍散

治小兒諸癇發歇無時

乾地龍半兩焙　虎睛一對炙　人參二錢半

金箔　銀箔各三十片　天竺黃　硃砂研

代赭石煅醋淬　鐵粉各二錢半　雄黃一錢半

輕粉半錢

右爲末每服半錢紫蘇湯調不拘時服

龍腦安神丸

茯苓三兩　人參　地骨皮　甘草　麥門冬

桑皮各二兩　牙硝　硃砂研飛各二錢　龍腦

麝香各三錢　眞牛黃五錢　烏犀鎊一兩

金箔三十五片

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大金箔爲衣如風癇冬月溫水化下夏月凉水化下不以時二三歲者日進二服小兒一丸分二服虛勞發熱咳嗽新汲水下

奪魂散

定癇

殭蠶去絲炒黃半兩　蛇舍石燒醋淬七八次

白附炮各二分　生銀　生金　牛黃　白茯苓

烏梢蛇頭七八寸許酒炙　明天麻各二錢

南星末一分薑汁浸焙　半夏末二錢薑汁浸焙

赤脚蜈蚣一條酒浸炙焦　犀角鎊屑二錢

腦子少許　麝香少許

右件爲末蒸棗肉爲丸如麻子大每服十九至十五九二十九煎金銀薄荷湯下硃砂爲衣

古鏡方

主驚癇邪氣小兒諸惡疾

古鏡味辛無毒

右煮取汁和諸藥煮服之彌古者尤佳

鎮癇雌黃丸

治小兒癲癇欲發眼暗熨癡聲惡嚼舌

雌黃　黃丹各一兩　麝香研一錢

右爲末拌令極勻用牛乳汁半升熬成膏入前藥末杵三五百下九如菜菪大每服三九溫熱水下一日三服此方得自名醫之家極有神效

拔萃妙香丸

安神通關辟惡氣

辰砂研九兩　龍腦　臟粉　麝香研各七錢半

牛黃半兩　金箔十九片研

右合研勻煉蜜去蠟淨入沙蜜白者七錢半同煉勻爲丸每兩作三十九米飲化下

鎮心丸

硃砂　龍腦　牛黃各一錢　鐵粉　琥珀

人參　茯神　防風　全蝎七箇炙

右爲末燈心湯調下三歲一字

神應丹

辰砂不拘多少研

右以猪心血和之得所以蒸餅裹剉蒸熟取出就

丸如桐子大每服一丸食後臨臥煎人參湯下

治癇方

治太陽陽明二經爲患

荆芥穗四兩　白礬爲細末二兩

右搗肉爲丸如桐子大每服二十丸荆芥湯下次三十丸四十丸又次五十丸俱食前

礬丹　晉礬各一兩

右升堝鑿一窠可容二兩許先安丹在下次安礬在上以炭五觔煅令炭盡取出細研以不經水豬心血爲丸如菉豆大每服十丸至二十丸橘皮湯下

元戎二白丸

白礬一塊約一兩

右用生蒸餅劑裹蒸熟去皮可丸入輕粉一字或半錢量虛實加減丸桐子大每服二三十丸生薑湯下小兒丸小

硃砂滾涎丸

治小兒五癇

硃砂　白礬生用　赤石脂　硝石各等分

右爲細末研蒜膏爲丸如菉豆大每服三十丸食後荆芥湯下

琥珀青星丸

大南星一箇掘坑火煅坑紅出炭淨入好酒一升在穴內再安南星蓋穴勿令通氣過一宿取出焙末

琥珀四兩　硃砂二兩半爲衣

右以豬心血打乾糊丸如桐子大每服五十丸煎人參湯送下

南星五生丸

南星　半夏　川烏　白附子　大荳去皮各一兩

右爲細末滴水爲丸每服一丸至五丸不過七丸薑湯下

斷癇丸

治小兒諸癇痰盛

皂角盆尺以上者三挺搥碎去皮淨用水二升浸七日收汁濾過須磁石器內桑柴慢火熬成膏

白礬煅研細一兩半　蠍梢另炒　直殭蠶炒

雄黃　硃砂俱水飛另研　白附子各半兩

麝香一錢另研　烏蛇酒浸取肉焙乾二錢半

南星濕紙裹炮二兩　赤蜈蚣一條酒炙去頭足

右爲末用水糞半夏糊和前項皂角膏爲丸如梧桐子大每服三五丸用生薑湯磨化不拘時服

定癇丸

治小兒五癇

赤脚蜈蚣去頭足一條酒浸炙　蠍梢去毒

烏蛇肉如前酒炙　生白附子　大南星末

圓白半夏末用薑汁和一宿各二錢半　熊膽

白礬新瓦上煅各一錢二分半

右爲末稀麵糊爲丸如梧桐子大硃砂爲衣每服二三丸用薄荷湯磨化不拘時服

又

治小兒驚癇

膽星二兩　全蠍去尖毒炒半兩　白附子

殭蠶炒　川芎各一兩　薄荷半兩

右爲末粥丸青黛爲衣每服一二丸薑湯下

吐痰碧霄丹

石綠研九度水飛十兩　附子尖　烏頭尖

蠍梢各五十箇

右爲末入石綠合勻麵糊丸如雞頭每服用薄荷汁半盞化下一丸更以酒半合溫服之須臾吐出痰涎然後隨證治之

下痰控涎丸

生川烏　半夏　殭蠶薑汁浸一宿各半兩

全蠍去尖七箇　鐵粉三錢　甘遂二錢半

右爲末生薑自然汁或薄糊丸如菉豆大硃砂爲衣每服十五丸薑湯下忌甘草

元戎小靈寶丹

附子炮一兩　天麻　全蠍　白殭蠶　藿香葉

南星炮　白附子炮各半兩

右爲末酒糊丸桐子大溫酒下一十五丸

當歸大黃湯

治小兒諸癇作熱利下心中惡血

大黃濕紙裹煨　炙草　當歸　赤芍藥各三錢

半夏製　川芎各二錢

爲末每服一錢或二錢水八分鍾煎四分無時服

沉香天麻湯

治小兒因驚成癇發搐痰涎壅塞日多白睛項背強急喉中有聲神思如癡先灸兩踝脈各二七壯

沉香　益智　川烏炮去皮臍各二錢　天麻

防風　半夏湯炮　附子炮去皮臍各三錢

羌活五錢　甘草炙　當歸　薑屑各一錢半

獨活四錢
右㕮咀每服五錢生薑三片水煎溫服葉南論云恐則氣下精怯而上焦閉又云從下上者引而去之以羌活獨活苦溫味之薄者陰中之陽引氣上行又入太陽之經爲引用故以爲君天麻防風辛溫以散之當歸甘草辛甘溫以補氣血之不足又養胃氣故以爲臣黑附子川烏頭益智仁大辛溫行陽退陰又治寒客傷胃腎主佐浪入脾爲涎以生薑半夏燥濕化痰十劑云重可去怯況香辛溫體重氣清去怯安神故以爲使氣味相合升陽補胃恐怯之氣自得平矣

牛黃丸
治因驚中風五癇天釣客忤潮涎薑墨
白花蛇肉　白附　全蝎　生川烏半兩者一枚
天麻　薄荷葉各半兩已上六味先爲細末次入
雄黃五兩　辰砂　牛黃各二錢　腦子半兩
麝香一錢
右爲一處和勻麻黃去根二兩酒一升煎麻黃至一盞去麻黃用酒熬藥得所勿至焦赤衆手成丸如梧實大密器盛之一丸作五服煎金銀薄荷湯磨化大能發散驚邪

治五癇得效方
露蜂房焙　石燕各一兩　桂心　遠志去心
人參各半兩　硃砂一錢
右爲末粥丸如桐子大每服二三十丸白湯下

生地黃連湯
治血脫尋衣撮空搖頭妄語

川芎　生地　當歸各七錢　赤芍　梔子
黃芩　黃連各三錢　防風一錢五分
右每服三錢水煎服

大青膏
天麻末一分　生白附末一錢半　青黛一錢研
牛膝末　烏梢蛇肉酒浸焙乾末各半錢
硃砂研
右同研細生蜜和成膏每服半皂子大至一皂子大月中兒搜米大同牛黃膏溫薄荷水化一處服之五歲已上同甘露散服之

鎮心丸
凉心經治驚熱痰盛
甜硝白者　人參去蘆取末各一兩　甘草炙
寒水石燒各一兩半　乾山藥　白茯苓各二兩
硃砂一兩　龍腦　麝香各一錢三味俱另研
右爲末熟蜜丸如雞豆大如要紅入坯子臘脂二錢溫水化下半丸至一二丸食後服

大防風湯
一方用金箔爲衣
治鶴膝風腫痛不消或潰而不斂
附子炮　牛膝酒炒各一錢　白朮　羌活
人參　防風各二錢　杜仲薑製　川芎　肉桂
黃芪炒　熟地黃自製　芍藥炒各一錢五分
甘草一錢
右每服三五錢水煎仍量兒大小用之

獨活寄生湯
獨活　桑寄生　杜仲炒　細辛　牛膝酒炒
秦艽　茯苓　白芍藥炒　桂心　川芎　防風
甘草　人參　熟地黃　當歸各等分
右每服三錢水煎空心乳母同服

防己湯
治感冒風濕之氣失於解表流注兩足疼痛至兩膝浮腫不能屈伸傳成癱瘓
麻黃去節存根功全表裏剉碎湯泡濾過焙乾用
防己去黑皮　海桂去麤皮各半兩　赤芍藥
蒼术米泔水浸一宿去麤皮薄剉片火炒至微黃
赤茯苓各一兩　甘草炙七錢半
右件咬咀每服二錢水一盞薑三片棗二片煎七分空心熱服或入薤白同煎

祛風散
治卒暴中風不能言全口眼喎斜驚癱搐掣疾寶煩躁神昏有熱睡臥不穩
防風　生南星　生甘草　半夏如前法製
黃芩各一兩
右碎每服二錢水一盞半薑三片棗二片慢火煎七分不拘時溫服

獨活湯
治驚癱鶴膝及中風濕日久致腰背手足疼痛晝輕夜重及四肢痿痹不仁
川獨活黃色如鬼眼者佳半兩　當歸酒洗
白朮　蜜黃芪　海桂　川牛膝酒洗各二錢半
甘草炙二錢
右件咬咀每服二錢水　盞薑二片蔥白一根煎七分空心熱服或無時

黑虎丹
治諸般風證
草烏去黑皮一兩生用　川烏去黑皮生用
甘草各七錢半　麻黃　甘松　熟乾地黃
雀香葉　白芷　油煙墨燒存性　豬牙皂莢
川芎　當歸　何首烏　赤小豆　南星生用
殭蠶　羌活　白膠香　木鼈子去油各半兩
右件剉碎或焙或鞕研爲細末糯米粉煮糊丸麻仁大每服三十丸或五十丸或七十丸稍空心用淡薑湯下兒小者丸作粟穀大治法如前

排風湯
治中風狂言失音不語精神昏困驚癱鶴膝等證及腫疾纔愈後偶感外風滿面遍體虛浮並宜可服
白蘞皮　白朮炒　白芍藥　薄桂　防風
川芎　當歸酒洗　炙草　杏仁去皮尖各半兩
川獨活　麻黃去根節　白茯苓各七錢半
右每服二錢水一盞薑二片煎七分無時溫服
加味天麻散（幼幼近編下同）
治小兒急驚初起悸動有痰
天麻　柴胡　殭蠶　半夏　膽星　白茯苓
白朮　黃連　鈎藤　枳實　生甘草
加味溫膽湯
半夏　枳實　茯苓　陳皮　竹茹　酸棗仁
鈎藤　生薑
人參羌活湯
治急驚散風邪除風熱
羌活　獨活　柴胡　前胡　天麻　薄荷
殭蠶　茯苓　桔梗　半夏　人參　生甘草
枳殼　木通　川芎　地骨皮

千金散
治一切痰喘驚風及急驚痰喘不乳雖至死但灌藥下喉即活
全蠍炙　白殭蠶　硃砂　黃連　明天麻
牛膽南星各四分　牛膽黃　冰片各一分
生甘草二分
每用一分薄荷燈心金銀煎湯下
一方無牛黃冰片甘草有天竺黃用竹瀝薑汁丸服

利驚丸
治急驚併膽風撮口
半夏　天南星各五錢薑製　滑石　蛤粉煅
硃砂各三錢　雄黃五錢　巴豆一錢　麝香
輕粉各三分
飯爲丸如梧桐子大薑湯下十九
加減利驚丸
治下痰甚捷
牽牛末一兩　花青五錢　巴霜二錢半
麵糊爲丸荳大湯下二三丸

抱龍丸
治驚風傷風驚駭悸動痰熱諸痰風痰驚痰等證
膽星一兩　天竺黃七錢　辰砂　雄黃各五錢
直殭蠶　全蠍去鹽　鈎藤　天麻各五錢半
牛黃　麝香各一錢　珍珠三錢
甘草膏丸芡實大薄荷湯下一丸
一方有琥珀

小牛黃丸
治急驚風痰盛
膽星　硃砂各一兩　巴霜五錢
麪糊同牙皂膏爲丸如梧子大每服三丸
清心涼膈丸
治驚搐弄舌痰喘
南星　半夏　白附各一兩　鬱金　川烏各三錢
爲末黃牛膽汁拌勻仍入膽內紮口高懸透風陰乾陳久更妙臨用每兩入青黛焰硝硼砂明礬雄黃辰砂各一錢片腦一分麵糊爲丸黍米大薑湯送下

鎮驚丸
眞琥珀　辰砂飛　青皮　生甘草　珍珠
雄黃各二錢五分　青黛　青礞石　蘆薈
柴胡各五錢　天麻　乳香各一兩　膽星
天竺黃各二兩
甘草膏爲丸
慢驚參朮湯下
急驚薄荷薑蜜湯下

保生錠
治急驚諸傷食傷風驚駭等證
蛇含石四兩醋煅七次　南星一兩湯泡薑汁炒
白附子一兩　珍珠　硃砂各五錢　麝香一錢
右米糊爲錠
礞石丸

治驚風痰盛

膽星　礞石各一兩　天竺黃　青黛各五錢

硃砂　蘆薈各三錢　蜈蚣燒存性　殭蠶各錢半

甘草膏丸芡實大

通關散

治驚風已退但聲啞無音

南星泡　石菖蒲各等分

研膽汁下即能言語

搐鼻散

半夏　細辛各一錢　荆芥七分　牙皂三錢

麝香二分半

爲細末紙條蘸藥取嚏

祛痰鎮驚丸

急驚風鎮驚寧神退熱化痰幼科去痰食聖藥妙不可言

牛膽南星一兩　竺黃　殭蠶各五錢　珍珠

全蠍去毒各一錢　琥珀二錢　硃砂二錢

麝香三分　眞金三帖

入藥蜜丸芡實大薄荷薑蜜湯下

一方有牛黃二錢

金粟丹

巴豆四十九粒每日換水浸二十一日取起入紅棗內濕紙包煨熟打爛拌前藥爲丸外用金衣一歲一分薄荷湯下

天竺丸

治小兒癇證或驚風不止

天竺黃　明天麻　鉤藤鉤各五錢　棗仁麥冬各二兩　人參　遠志　白芍藥酒洗

天冬去心各一兩　茯神一兩半　橘紅七錢

蜜丸如彈子大水飛硃砂爲衣燈心湯下每服一丸

青黛丸

白附子五錢　南星　天麻　天竺黃各一兩半

巴霜一錢半　青黛二兩

右蜜丸

異功散

治吐瀉將成慢驚

人參　白朮　茯苓　炙甘草　陳皮　木香

大棗　生薑

右水煎

一方無木香

搐加全蠍天麻蟬蛻

吐加半夏藿香

瀉加訶子升麻肉荳蔻

遍身厥冷加附子

語言不出加菖蒲

醒脾散

治吐瀉脾困欲發驚搐用此祛風醒脾

人參　白朮　蓮肉　炙甘草　茯苓　全蠍

白附子　天麻　菖蒲　木香　陳米炒黃

入薑棗同煎

加味木附湯

治慢驚吐瀉身冷或因臟寒洞泄

人參　白朮炒　茯苓　甘草炙　肉果煨　附子炮

每三錢薑棗同煎

一方加木香

加味回陽散

治慢驚面青四肢逆冷泄瀉不止

人參　白朮　山藥　茯苓　甘草　附子

赤石脂煅　殭蠶　全蠍

薑湯下二錢

星附散

治慢驚

人參　防風　全蠍　殭蠶　蘄蛇　膽星

白附子　蟬蛻　白芨　琥珀　硃砂各一分

麝香　冰片各半釐　牛黃半分

蝦蟆膽汁調藥抹口中用蚌汁灌之

回生錠

治慢驚神效

人參　白朮　山藥　茯苓各一兩　赤石脂煅

桔梗　牛膽南星各五錢　炙甘草　辰砂

礞石煅各三錢　乳香二錢　牛黃　麝香各一錢

粽搗爲錠陰乾薄荷湯下

紫河車丸

治驚

人參　天麻　炙草　犀角　遠志甘草汁浸

滑石　白芍炒各一兩　茯神　棗仁各一兩半

天竺黃　硃砂研各五錢　紫河車一具烘研

膽南星新瓦上炙焦另研三條

共研細末用釣藤汁四兩和煉蜜半斛搗和爲丸

重錢二分饑時臨臥以燈心薄荷湯化服

如治急驚前方去紫河車臍帶人參加白殭蠶蜜炙六錢全蠍六錢牛黃一錢二分琥珀一錢臘星八錢麝香三分

定魄丸 東垣實錄下同

治因驚發癇

人參 琥珀 茯神 遠志 硃砂 天麻

石菖蒲 天門冬 酸棗仁 甘草各等分

右爲末蜜丸皂子大硃砂爲衣每丸燈心薄荷煎湯化下

紫霜丸

治食癇及腹中有食積痰癖吐哯乳

代赭石煅醋淬七次 巴豆三十粒去皮油

赤石脂各一兩 杏仁五十箇去皮尖

右先將杏仁泥巴豆霜入二石末相和搗千杵若硬入少蜜貯密器中月內兒服麻子大一粒乳汁化下百日內服小豆大

一方赭石二錢巴豆二十一粒去皮油杏仁二十一個右末飯丸粟米大

食癇用此取積並不虛人凡兒有熱不欲飲乳眼睡不寧常驚悸此皆發癇患之漸卽以此藥導之減其盛勢則無驚風釣癇之患矣

五癇丹

治急驚爲癇

蜈蚣一條 牛膽南星二錢 全蠍 防風

白附 遠志 蘆薈 元胡索 辰砂各一錢

麝香一字 金銀箔各三片

右爲末糊丸梧子大金銀箔爲衣每一丸以薄荷湯化服

太乙散

治胎驚

天漿子 天南星 白附子 天麻 防風

白茯各二錢 全蠍 硃砂各一錢 麝一字

右爲末每取五分乳汁化下

保幼化風丹

治驚風四證八候去風痰驚熱

南星 半夏 川烏 白附各一兩 參拿五錢

右爲末裝入臘月黃牛膽內陰乾百日取出研爲末每一兩入雄黃硃砂硼砂焰硝各一錢片腦麝香各少許其爲末蜜丸豌豆大燈心薄荷湯研化下一二丸

靈神膏

赤茯神 硃砂水飛各一兩 麥門冬五錢

麝香二錢半

右爲末蜜和作小餅子每一餅臨睡以薄荷湯化下神效

一老醫乃三世小兒科家傳只有四五藥愈病無數如小兒驚搐多是熱證不宜便用驚風藥只以導赤散加防風竹葉同煎用二三貼導去心驚邪熱其搐便止次服靈神膏

金箔鎮心丸

治驚風鎮安心神

全蠍七箇以薄荷葉包裹慢火炙乾 赤茯苓

天麻 防風 羌活 牛黃 犀角 硃砂

麝香 甘草各一錢

右爲末糊丸梧子大金銀箔爲衣每一丸以薄荷湯化下

太乙散

治胎驚

天漿子 天南星 白附子 天麻 防風

白茯各二錢 全蠍 硃砂各一錢 麝一字

右爲末每取五分乳汁化下

保幼化風丹

治驚風四證八候去風痰驚熱

南星 半夏 川烏 白附各一兩 參拿五錢

右爲末裝入臘月黃牛膽內陰乾百日取出研爲末每一兩入雄黃硃砂硼砂焰硝各一錢片腦麝香各少許其爲末蜜丸豌豆大燈心薄荷湯研化下一二丸

靈神膏

赤茯神 硃砂水飛各一兩 麥門冬五錢

麝香二錢半

右爲末蜜和作小餅子每一餅臨睡以薄荷湯化下神效

一老醫乃三世小兒科家傳只有四五藥愈病無數如小兒驚搐多是熱證不宜便用驚風藥只以導赤散加防風竹葉同煎用二三貼導去心驚邪熱其搐便止次服靈神膏

金箔鎮心丸

治驚風鎮安心神

全蠍七箇以薄荷葉包裹慢火炙乾 赤茯苓

天麻 防風 羌活 牛黃 犀角 硃砂

麝香 甘草各一錢

右爲末蜜丸皂子大金銀箔爲衣每服一二丸薄荷湯化下

寧心膏

治小兒不定恍惚不寧恐畏多哭睡中驚悸

硃砂二錢 人參 白朮 白茯 茯神 山藥

羌活 甘草各一錢 龍腦 麝香各一字

右爲末蜜丸芡實大薄荷湯化下

防風溫膽湯

治驚風消痰疏風順氣

人參二分 半夏 枳殼 赤茯各五分 陳皮

防風各三分半 甘草一分半

右剉作一貼入生薑一片紫蘇二葉煎水調下大驚丸小驚丸服之

大驚丸

治驚風安神定驚又治心熱夜啼

酸棗仁去皮蚌粉炒 炙甘草各五錢 人參

赤茯苓 白朮 硃砂飛 麥門冬 木香

代赭石煅醋淬各二錢五分 白直殭蠶炒

桔梗各一錢二分 全蠍三箇 金銀箔各三片

右爲末蜜丸梧子大金銀箔爲衣薄荷湯化下一二丸

一名大安神丸

白朮散

治吐瀉日久不止津液枯竭煩渴引飲欲成慢驚風

葛根二錢 人參 白朮 白茯苓 木香

藿香　甘草各一錢
右粗末每二錢水煎任意服
泄瀉加山藥白扁豆肉荳蔻
已成慢驚加天麻細辛全蠍白附子
驚風泄瀉煩渴皆津液內耗也不問陰陽多煎滿意取足飲之彌多彌好
一名清寧散
烏蠍散
治慢驚純陰證吐瀉不止
四君子湯加　川烏　全蠍　南星各一錢
右剉入薑三棗二水煎服之
神效散
治慢驚風
一粒丁香一箇蠍一字辰砂一點血
右三味俱爲末男用男左手中指血女用女右手中指血蘸藥末擦兒脣上即愈
觀音散
治脾困多瀉不思乳食精神昏困四肢冷欲成慢驚
人參一錢　蓮肉　神麯各二分　白朮　黃芪
木香　白扁荳　甘草各一分　白茯苓一分半
右剉入薑二棗一藿香三葉同煎服
全蠍觀音散
治吐瀉後成慢驚風亦治慢脾風
即前方加羌活防風天麻全蠍也
三味天漿子散
治慢驚風

天漿子　白殭蠶　全蠍各三枚
右爲末每一字薄荷湯調下
補脾湯
治慢驚風
白朮一錢三分　白芍藥酒炒一錢　白茯苓
半夏各七分　陳皮　黃芪蜜水炒　人參
當歸　川芎　肉蔻煨　乾葛　神麯炒各九分
黃連炒　甘草炒三分
右剉作一貼水煎稍稍服
保生丹
治慢驚風
硃砂　天麻　白附炮　殭蠶炮　全蠍各二錢
乾薑炮　牛黃　麝香各一錢
右爲末蜜丸麻子大薄荷湯下三丸
延生丹
治同上
南星炮二錢半　硃砂　牛黃　羌活各一錢二分
麝香六分　蠍梢七枚　白殭蠶三枚
右爲末棗肉和丸菉荳大薄荷湯化兩丸服之
參朮半夏湯
治慢驚風子母俱服
人參　白朮各二錢　半夏　天麻各七分
白茯苓　陳皮各五分　北細辛　薄荷葉
甘草各二分　全蠍炒一枚
右剉作一貼薑三片水煎服
南星飲
治慢驚脾困涎盛不思乳食

大南星一箇炒　冬瓜仁　白扁荳薑汁炒各二錢
右爲末每二錢以薑二片防風少許同煎服
雙金丸
治吐瀉日久脾胃虛損手足厥冷精神昏塞多睡露睛口鼻氣冷欲成慢驚風
金液丹　青州白丸子各等分
同研生薑米飲調灌之惟多服乃效雖至危者往往死中得生十救八九
沈存中曰金液丹治慢驚再危纔服之得活須多服方驗眞小兒吐瀉之妙劑也
備急丸
治急慢驚風
五月五日取白頸蚯蚓不拘多少去泥焙乾爲末
右加硃砂等分糊丸菉豆大金箔爲衣每一丸白湯下
一法取蚯蚓以竹刀中斷之看取急跳者治急驚慢跳者治慢驚各另研爛和硃砂末作丸菉豆大入二器貯之記而用之神妙
星香散
治急慢驚風搐搦竄視潮涎
南星泡二錢半　木香　橘紅各一錢　全蠍二箇
右剉作一貼薑四片水煎頻灌大便去涎即愈
朱粉散
治急慢驚風
一粒硃砂一片雪（乳粉也）七箇殭蠶三箇蠍不問驚風與慢風服時須用生人血（乳汁也）
右先將蠶蠍微炒燥取出待冷同砂粉研爲細末

却以母乳汁調抹於兒口內立效

探生散

治急慢驚風諸藥不效用此吹鼻定其死生

雄黃　沒藥各一錢　乳香五分　麝香一字

右爲末吹少許入鼻如眼淚鼻涕俱出者可治

補脾益眞湯

治慢脾風

丁香　木香　訶子皮　陳皮　厚朴　草果　肉荳蔻　白茯　人參　白朮　桂枝　半夏　附子炮　甘草炙各二分　全蠍炒一枚

右剉入薑二棗一水煎灌服服記令採心下以助藥力

九龍控涎散

治天釣

蜈蚣一條酒炙　臘茶　雄黃　甘草各二錢　乳香　天竺黃　枯白礬　荊芥穗各一錢　菜荳半生半炒一百粒

右爲末每半錢人參薄荷湯調下

釣藤散

治同上

人參　犀角各五分　全蠍　天麻各二分　甘草一分　釣藤六分

右剉水煎服

遶丹丸

治胎驚發癇

太陰元精石　輕粉各一錢　粉霜　硼砂各五分

研細入寒食麪一錢水丸成餅再用麪裹煨黃取去麪再研細滴水和丸如米大一歲兒五丸二歲十丸溫水送下下逐物爲度

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百五十三卷目錄
醫部彙考四百三十三
小兒驚癇門九
單方
鍼灸
醫案

藝術典第四百五十三卷
醫部彙考四百三十三
小兒驚癇門九
單方

小兒慢驚虛風用平正附子去皮臍生研爲末以白頸蚯蚓於末內袞之候定刮蚓上附末丸黃米大每服十丸米飲下百一方

驚癇發熱丹參雷丸各半兩猪膏二兩同煎七上七下濾去滓盛之每以摩兒身上日三次千金方下同

小兒暴驚啼哭絕死蜀椒左顧牡蠣各六銖以酢漿水一升煑五合每灌一合

小兒驚熱天竺黃二錢雄黃牽牛各一錢研勻麪糊丸粟米大每服三五丸薄荷湯下小兒直訣下同

小兒慢驚發搐帶有陽證者白甘遂末即蚤休末一錢瓜蔞根末一錢同於慢火上炒焦黃研勻每服一字煎麝香薄荷湯調下

小兒驚竄兩眼看地不上者皂角燒灰以童尿浸刮用火烘乾研末貼其顖門即甦王氏小兒方

小兒癇疾棘枝上雀甕研其間蟲出取汁灌之聖惠方下同

小兒天弔目睛上視用壁魚兒乾者十箇濕者五箇用乳汁和研灌之

小兒天弔驚癇客忤取家桑東行根研汁服

小兒驚風內釣胡椒木鼈子仁等分爲末醋調黑豆末和杵丸菉豆大每服三四十丸荊芥湯下

小兒天弔驚風翻眼向上用乾蠍全者一箇瓦炒好硃砂三菉豆大爲末飯丸菉豆大外以硃砂少許同酒化下一丸頓愈

小兒躽啼驚癇腹滿大便青白色用柏子仁末溫水調服一錢

小兒慢脾風因吐泄後而成麻黃長五寸十箇去節白朮指面大二塊全蠍二箇生薄荷葉包煨爲末二歲以下一字三歲以上半錢薄荷湯下

驚癇發熱乾藍嗽水石等分爲末水調傅頭上

小兒急慢驚風口眼喎斜搐搦痰盛用天漿子房去皮生用三枚乾蠍生用七枚硃砂一錢研勻飯丸粟大每服二丸荊芥湯送下

小兒風癇掣瘲戴眼極者日數十發莽草雷丸各一雞子黃大化猪脂一斤煎七沸去滓摩痛處勿近目及陰日凡三四次并幸福要下同

小兒癇疾白魚酒用衣中白魚七枚竹茹一握酒一升煎二合溫服之

小兒驚風癇疾喉閉牙緊鉛白霜一字蟾酥少許爲末烏梅肉蘸藥於齦上揩之仍吹通關藥良久便開普濟方下同

小兒癇疾雞子黃和乳汁攪服不過三兩枚自定

小兒急驚遠年白田螺殼燒灰入麝香少許水調灌之

小兒癇疾羖羊角燒灰存性酒服少許

小兒慢脾驚風馬芹子丁香白殭蠶等分爲末每服一錢炙橘皮煎湯下

小兒驚風用大蒜七箇先燒紅地以蒜逐箇於地上磨成膏却以殭蠶一兩去頭足安蒜上椀覆一夜勿令洩氣只取蠶研末每用嗃鼻口內含水有效

驚癇中風壯熱掣瘲吐舌出沫用豚卵一雙切細當歸二分以醇酒三升煑一升分服

治小兒癇利痰天南星煨香一兩硃砂一錢爲末猪心血丸梧子大每防風湯下一丸

驚風煩熱愼火草煎水浴之

小兒驚啼黃芩人參等分爲末每服一字水飲下

小兒驚癇疳痢或夜啼青黛量大小水研服之歌云孩兒雜病變成疳不問强羸女與男煩熱毛焦鼻口燥皮膚枯槁四肢癱腹中時時更下痢青黃赤白總一般眼濇面黃鼻孔黑穀道開張不可看此方便是青黛散孩兒百病服之安宮氣方

小兒驚熱心肺積熱夜臥多驚鉛霜牛黃各半分鐵粉一分研勻每服一字竹瀝調下聖濟錄下同

小兒急驚搐搦丹砂半兩天南星一箇一兩重者炮製酒浸大蠍三箇爲末每服一字薄荷湯下

小兒驚癇慈石鍊水飲之

小兒癇疾水銀能壓一切熱用小豆許安盞中沉湯內煑一食頃與服勿仰兒頭恐入腦也

小兒急驚墜涎水銀半兩生南星一兩麝香半分爲末入石腦油同搗和丸綠豆大每一丸薄荷湯下

小兒癇病瘥後血氣上虛熱在皮膚身面俱腫萎蕤葵子龍膽茯苓前胡等分爲末每服一錢水煎服

小兒驚癇瘈瘲用熊膽以竹瀝化兩豆許服之去心中涎甚良 孟詵方

小兒癇疾用鼈甲炙研乳服一錢日二亦可蜜丸服 子母秘錄

小兒天弔頭目仰視痰塞內熱用金牛兒即蟬蛻以漿水煑一日曬乾爲末每用一字冷水調下 衛生易簡方

小兒驚風白殭蠶蠍梢等分天雄尖附子尖各一錢微炮爲末每服一字或半錢以薑湯調灌之甚效 袁氏衛義

小兒風癇取蠍五枚以大石榴割頭剜空納蠍於中以頭蓋之紙筋和黃泥封裹微火炙乾漸加火煅赤候冷去泥取中焦黑者細研乳汁調半錢灌之便定兒稍大以防風湯調服 薛中方

小兒驚癇用入蟄蝙蝠一箇成塊硃砂一錢在腹內以新瓦合煅存性候冷爲末空心分四服兒小分五服白湯下 醫學集成下同

小兒驚癇一百二十種用荊芥穗二兩白礬半生半枯一兩爲末糊丸黍米大硃砂爲衣每薑湯下二十丸日一服

小兒發熱眼目喎斜手足搐掣將成風痰用天麻殭蠶防風陳皮半夏石菖蒲膽星各三分荊芥羌活甘草各二分薑二片同煎 窮鄉便方

小兒急慢驚風震零丹二十粒來復丹十粒白丸子十粒三味研勻糯米糊丸菉豆大者三丸小者三丸慢驚用北棗陳皮湯吞下急驚用生薑自然汁百沸湯下 古今醫統

小兒內釣腹痛木香乳香沒藥各五分水煎服之 阮氏小兒方

小兒驚風卒死用烏骨白雞血少許抹唇上即活 鄭氏記

小兒慢脾驚風利痰奇效用開元通寶錢背後上下有兩月痕者其色淡黑頗小以一箇放鐵匙上炭火燒四圍上下各出珠子取出候冷傾入盞中作一服以南木香湯送下或人參湯亦可錢雖利痰非胃家所好須以木香佐之

小兒驚忤不語打撲驚忤血入心竅不能言語硃砂爲末以雄猪心血和丸麻子大每棗湯下七丸 頭前方下同

小兒驚後瞳斜不正者人參阿膠糯米炒成珠各一錢水一盞煎七分溫服日再服乃止效

小兒諸癇雄黃硃砂等分爲末每服一錢猪心血入蜜水調下

小兒急慢驚風弔眼撮口搐搦不定代赭石火燒醋淬十次細研水飛日乾每服一錢或半錢煎眞金湯調下連進三服兒腳脛上有赤斑即是驚氣已出病當安也無斑點者不可治

小兒截驚以芭蕉汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顖門塗四肢留手足心勿塗甚效 鄭氏家藏

小兒盤腸內釣腹中急痛乾啼用乳香沒藥木香薑黃各四錢半另研木別十二箇去殼研成膏以木別膏和四味入煉蜜少許丸櫻桃大煎釣藤湯化下次服魏香散用莪朮五錢眞阿魏一錢先以溫湯化開阿魏浸莪朮一日夜焙乾末之每服半錢紫蘇米飲空心服 身經通考方

小兒痰熱咳嗽驚悸半夏南星等分爲末半膽汁和入膽內懸風處待乾蒸餅丸菉豆大每薑湯下三五丸 摘元方

小兒內釣多啼銀硃半錢乳香煨蒜各一錢爲末研丸黍米大半歲五丸薄荷湯下 全幼心鑑下同

小兒癇後瘖不能言以天南星濕紙包煨爲末雄猪膽汁調服二字

小兒慢脾驚風白附子半兩天南星半兩黑附子一錢並炮去皮爲末每服二錢生薑五片水煎服 楊氏家藏

小兒慢驚搐搦涎壅厥逆生用烏頭去皮剜一兩全蠍十箇去尾分作三服水一盞薑七片煎服 聚珍寶鑑

小兒慢驚昏沉或搐烏藥磨水灌之 濟急方

小兒慢脾驚風久病後或吐瀉後生驚轉成慢脾用蠍梢一兩爲末以石榴一枚剜空用無灰酒調塡入蓋定坐文武火上時時攪動熬膏取出放冷每服一字金銀薄荷湯調下 本事方下同

又治吐利後昏睡生瘋癇慢脾證全蠍白朮麻黃去節等分爲末二歲以下一字三歲以上半錢薄荷湯下

小兒脾風多用人參冬瓜仁各半兩南星一兩漿水煑過爲末每用一錢溫服

小兒驚癇不知人嚼舌仰目者用犀角濃磨水服之立效爲末亦可 廣利方下同

小兒驚癇嚼舌迷悶仰目牛黃一豆許研和蜜水灌之

小兒急驚青礞石磨水服

小兒風癇瘈瘲用人參蛤粉辰砂等分爲末以猪心和血丸菜豆大每服五十丸金銀湯下十日二服大有神效

小兒急慢驚風乳香半兩甘遂半兩同研末每服半錢用乳香湯下童便亦可

小兒驚邪安息香一豆許燒之自除

慢驚瘈瘲用血竭半兩乳香二錢半同搗成劑火炙溶丸梧子大每服一丸薄荷煎湯化下定魄安神益氣夏月用人參湯

小兒慢驚曼陀羅花七朵重一字天麻一錢半全蠍炒十枚天南星炮丹砂乳香各二錢半爲末每服半錢薄荷湯調下

小兒急驚搐搦涎盛粉霜一錢白牽牛炒輕粉各一錢爲末每服一字薄荷湯下吐涎爲效

小兒急驚昏迷不醒人事石綠四兩輕粉一錢爲末薄荷汁入酒調一字服取吐

小兒驚風用蜥一箇頭尾全者以薄荷四葉裹定火炙焦同研爲末分四服白湯下

小兒驚癇瘈瘲用虎睛洲州水磨灌之良

治小兒癇用甘遂末一錢猪心一箇取三竅頭血脩和甘遂末將猪心批開入藥在內以綿紮定外濕紙包裹入文武火煨熟不可過度取藥研細

辰砂末一錢和勻分作四丸每服一丸猪心湯化下

再服另取猪心煎湯神效

小兒急慢驚風牙關緊急不可開者用皂角末水調塗牙齦上入咽即活

小兒驚風發搐天弔用天麻荊芥防風薄荷全蠍蝎蠶各八分膽星甘草各五分薑汁糊丸彈子大水磨下一丸

小兒不時驚發此肺虛不能平肝宜溫肺爲主用人參五味子肉桂若不用桂用細辛一分亦可

小兒失跌受驚肝系受風致瞳神不正視東則見西視西則見東名曰通睛用石楠一兩瓜蒂五枚爲末吹鼻一日三次內用牛黃平肝之藥

慢脾風用羊屎二十粒丁香白朮胡椒五十粒每五分陳壁土煎湯下

治急驚口右脊十兩辰砂一兩共爲末量兒大小蜜水調下

小兒內釣多啼銀朱半錢乳香煨研各一錢爲末研丸黍米大半歲五丸薄荷湯下

小兒驚熱牛黃一杏仁大竹瀝薑汁各一合和勻與服

小兒牛癇口牛屎中豆日日服之良

小兒驚風不拘急慢用蜣螂一枚去爛以水一小盞於白沸湯中溫熱去滓飲之

小兒癇疾青羊肝一具薄切水洗和五味醋食之

小兒口噤牙關不開大者一枚炭熱紙裹拌過剪作小孔透氣於穴中牙關自開也

一用生南星半兩薑汁擦之自開

小兒驚後眼上一日一夜自動金氣將絕此慢驚肝風也宜治肝用水飛代赭石末每服半錢冬瓜仁煎湯調下愈

小兒大釣驚風發歇不定鶴屎炒研半錢入牛黃麝香各半錢炒蠍五枚爲末每服五分新汲水服

小兒痙風頭及四肢皆往後以鴨涎滴之

小兒驚風叶逆作搐挾迎寒手足攣縮眼睛斜視枳殼去瓤麩炒漢豆煅等分爲末每服一字甚者半錢急驚薄荷自然汁下慢驚荊芥湯下入酒三五點日三服

小兒驚熱釣藤一兩硝石半兩甘草炙一分爲散每服半錢溫水服

驚癇發熱鐵粉水調少許服之

急驚迎潮壯熱悶亂鐵粉一錢硃砂一錢爲末每服一字薄荷湯調下

嬰孩驚風後痞不能言用無莢炒神麴炒麥芽炒黃連炒各一錢爲末猪膽汁打糊丸黍米大每服十丸木通湯下黃連能去心竅惡血

急慢驚風用青蒿蟲搗和硃砂末粉各五分丸粟粒大一歲一丸乳汁服古方不見用者係嬰集用治驚風六十不失一其詩云一味硃砂一半其功只在青蒿飾任教死去也還魂服時須用生人血

鍼灸

晉皇甫謐甲乙經曰驚癇脉五鍼手足太陰各五刺經太陽者九刺手足少陰經絡傍者一足陽明一上踝五寸刺三鍼

小兒驚癇本神及前頂顖會天柱主之如反視臨泣主之

小兒驚癇加瘈瘲脊急強目轉上插縮筋主之

小兒驚癇瘛瘲脊強互相引長強主之

小兒癇發目上插攢竹主之

小兒癇痙嘔吐泄注驚悲失精瞻視不明聾癲瘛脉及長強主之

小兒驚癇不得息顱顖主之

小兒驚癇如有見者刻缺主之并取陽明絡

小兒癇瘛手足擾目昏口噤霸黃商丘主之

小兒癇瘛遺精霸虛則病諸癇癲實則閉癵小腹中熱善寐大敦主之

小兒馬癇僕參及金門主之

風從頭至足癇瘛口閉不能開每大便腹暴滿按之不下曜悲喘崑崙主之

唐孫思邈千金方論曰小兒新生無疾慎不可逆鍼灸之如逆鍼灸則忍痛動其五脉因喜成病河洛關中土地多寒兒喜病痙其生兒三日多逆灸以防之又灸頰以防噤有噤者舌下脉急牙車筋急其土地寒肯決舌下去血灸頰以防噤也吳蜀地溫無此疾也古方既傳之今人不詳南北之殊便按方而用之是以多害於小兒也所以田舍小兒任其自然皆得無有夭橫也小兒驚啼眠中四肢掣動變蒸未解慎不可鍼灸爪之軫其百脉仍因驚成癇也惟陰癇噤痙可鍼灸爪之凡灸癇當先下兒使盡乃乘盡灸之未下有實而灸者氣逼前後不通殺人癇發平旦者在足少陽晨朝發者在足厥陰日中發者在足太陽黃昏發者在足太陰人定發者在足陽明夜半發者在足少陰

右癇發時視病所在發早晚灸其所也

肝癇之爲病面青目反視手足搖灸足少陽厥陰各三壯

心癇之爲病面赤心下有熱短氣息微數灸心下第二肋端宛宛中此爲巨闕也又灸手心主及少陰各三壯

脾癇之爲病面黃腹大喜癇灸胃管三壯俠胃管傍灸二壯足陽明太陰各二壯

肺癇之爲病面目白口沫出灸肺腧三壯又灸手陽明太陰各二壯

腎癇之爲病面黑正直視不搖如尸狀灸心下二寸二分三壯又灸肘中動脉各二壯又灸足太陽少陰各二壯

骭癇之爲病目反四肢不舉冬重夏又冷上鼻入中下脊承槃苦隨年壯

腸癇之爲病不動搖灸兩承山又灸足心兩手勞宮又灸兩耳後完骨各隨年壯又灸臍中五十壯

右九藏癇證候

六畜之癇或在四肢或在腹內當審其候隨病所在灸之雖少必瘥若失其要則爲害也

馬癇之爲病張口搖頭馬鳴欲反折灸項風府臍中三壯病在腹中燒馬蹄末服之良

牛癇之爲病目正直視腹脹灸尻尾骨及大椎各三壯燒牛蹄末服之良

羊癇之爲病喜揚目吐舌灸大椎上三壯

猪癇之爲病喜吐沫灸脊骨兩傍各一寸七壯

犬癇之爲病手足拳攣灸兩手心一壯灸足太陽一壯灸肋戶一壯

鷄癇之爲病搖頭反折喜驚自搖灸足諸陽各三壯

右六畜癇證候

小兒暴癇灸兩乳頭女兒灸乳下二分

治小兒暴癇者身軀正直如死人及腹中雷鳴灸太倉及臍中上下兩傍各一寸凡六處又灸當腹度取皆以繩繞頸下至臍中竭便轉繩向背順脊下行盡繩頭灸兩傍各一寸五壯

若面白啼聲色不變灸足陽明太陰

若目反上視眸子動當灸顖中取之法橫度口盡兩吻際又橫度鼻下亦盡兩邊折去鼻度半都合口爲度從額上髮際上行度之灸度頭一處正在顖上未合骨中隨手動者是此最要處也次灸當額上入髮二分許直望鼻爲正次灸其兩邊當目瞳子直上入髮際二分次灸頂上迴毛中次灸客主人穴在耳後際動脉是次灸兩耳門當耳開口則骨解開動脉陷是也次灸兩耳上捲耳取之當捲耳上頭是也一法大人當耳上橫二指小兒各自取其指也次灸兩耳後完骨上青脉亦可以鍼刺令血出次灸玉枕頭後高骨是也次灸兩風池在項後兩轅動助外髮際陷中是也次灸風府當項中央髮際亦可與風池二處

高下相等次灸頭兩角兩角當廻毛兩邊起骨是也

右頭部凡十九處兒生十日可灸三壯三十日可灸五壯五十日可灸七壯病重者具灸之輕者惟灸顖中風池玉枕也艾使熟炷令平正著肉火勢乃至病所也艾若生炷不平正不著肉徒灸多炷故無益也

若腹滿短氣轉鳴灸肺募在兩乳上第二肋間宛宛中懸繩取之當瞳子是次灸膻中次灸胷堂次灸臍中次灸薜息薜息在兩乳下第一肋間宛宛中是也次灸巨闕大人去鳩尾下一寸小兒去臍作六分分之去鳩尾下一寸是也幷灸兩邊次灸胃管次灸金門金門在穀道前囊之後當中央是也從陰囊下度之大孔前中分之

右腹部十二處胷堂巨闕胃管十日兒可灸三壯一月已上可五壯陰下縫中可三壯或云隨年壯

若身强反張灸大椎幷灸諸臟腧及督脊上當中從大椎數至窮骨中屈更從大椎度之灸度下頭是督脊也

右背部十二處十日兒可灸三壯一月已上可灸五壯

若手足掣瘲驚者灸尺澤次灸陽明次灸少商次灸勞宮次灸心主次灸合谷次灸　關次灸少陽

右手部十六處其要者陽明少商心主尺澤合谷少陽也壯數如上

又灸伏兎次灸三里次灸腓腸次灸鹿溪次灸陽明次灸少陽次灸然谷

右足部十四處皆要可灸壯數如上

手足陽明謂人四指凡小兒驚癇皆灸之若風病大動手足掣瘲者盡灸手足十指端又灸本節後

寶漢卿瘡瘍全書曰慢驚灸法以醬一匕塗在百會穴用艾葉如半粒黃豆大者灸五壯爲度五壯之內不拘次第嬰兒哭聲如平時無異者生其聲嘶不響亮者死累試累效百會穴在頭頂心旋毛中是穴凡嬰兒月內雖無驚病依法灸之能免一世之驚況泄瀉灸之亦妙

幼科全書曰凡急驚風發時牙關緊閉不醒者急用艾炷灸兩手中指合而灸之即醒而後施治法也

先以兩手大指相合於甲側縫處燒一二炷又以兩手中指相合於甲縫中心燒一二炷即醒若灸不知痛者則不治

古今醫統曰小兒急驚鍼小谿驚癇啼叫灸百會或鍼神門三分灸三壯

小兒慢驚灸尺澤印堂三壯尺澤在肘中約紋上屈肘橫紋筋骨罅陷中手太陰肺脉所入爲合水肺實瀉之

小兒瘈瘲鍼陽谷二分灸則三壯陽谷在手外側腕中銳骨下陷中手太陽大腸所行爲經火

小兒發癇瘈瘲鍼崑崙三分灸則三壯崑崙在足外踝後跟骨上陷中細脉動應手足太陽膀胱脉所行爲經火或鍼瘈脈一分灸三壯瘈脈一名資脉耳本後雞足青絡脉或鍼前頂一分灸則三壯前頂在顖會後一寸半骨間陷中

小兒吐嘔瀉痢無時驚恐目澀眵骨鍼瘈脈一分灸則三壯瘈脉一名資脉耳本後雞足青絡脈刺出血如豆汁不宜多出

小兒風癇角弓反張灸神關三壯禁鍼神關一名氣舍當臍中

小兒嘔吐瘈瘲發癇身熱頭痛不得臥脖耳腫及膿汁灸顱息七壯禁鍼顱息耳後間青絡脉中

小兒張口搖頭身反鍼金門一分灸則三壯金門一名梁關在外踝下申脉下一寸足太陽郄陽維別屬

小兒瘈瘲鍼長強三分灸則五壯長強一名氣之陰郄一名撅骨在脊骶骨端計三分伏地取之乃得足少陰少陽結會督脈別走任脈

小兒睡中驚掣灸足大指次指之端去爪甲如韭葉許各一壯

小兒身强角弓反張灸鼻上入髮際三分三壯次灸大椎下節間三壯

小兒急驚風灸前頂一穴三壯取法在百會前一寸若不愈再灸兩眉心及鼻下人中一穴炷如麥大

小兒風癇治不瘥灸耳上入髮際一寸五分嚼而取之

小兒睡中驚目不合灸屈肘橫紋中上三分各一壯癇病者小兒惡疾也呼吸之間不及求師致困者不少諺云世無良醫枉死者半小兒諸癇病如口穢吐清沫灸巨闕穴三壯在鳩尾下一寸陷中

王肯堂證治準繩曰小兒癲癇驚風目眩灸神庭一穴七壯在鼻柱直上入髮際五分

小兒雞癇善驚及掣目搖頭灸少陰二壯取法在掌後去腕半寸陷中

小兒驚癇者先驚叫乃發也灸頂上旋毛中三壯及

耳後青絡脈炷如小麥大

小兒驚癇灸鬼祿一穴三壯取法在上脣內中央絃上是穴

小兒食癇者先寒熱灑淅乃發也灸鳩尾穴上五分三壯

小兒牛癇目直視腹脹乃發也灸鳩尾一穴三壯取法胷蔽骨下五分陷中是穴

小兒馬癇張口搖頭身折反馬鳴也灸僕參穴各三壯取法在足跟骨下白肉際陷中拱足取之是穴

小兒羊癇目瞪吐舌羊鳴也灸第九椎下節間三五壯

按靈樞經云暴攣足不任身取天柱天柱穴足太陽也又云癲癇瘈瘲不知所苦兩蹻之下男陽女陰潔古云晝發灸陽蹻夜發灸陰蹻各二壯陽蹻起於跟中循內踝上行至咽喉交貫衝脈照海穴也

李梴醫學入門曰小兒驚風灸本神臨泣外一寸半

小兒驚癇於俠谿上一寸半陷中針三分灸三壯

身經通考曰小兒急驚灸百會穴前一寸若不瘥灸兩肩頭及人中各三壯艾小麥大

醫學綱目曰角弓反張鼻上入髮際三分灸三壯大椎下節間灸三壯

王日新小兒方曰小兒驚風大叫一聲就死者名老鴉驚以散麻纏住脇下及手心足心以燈火爆之用老鴉蒜曬乾車前子等分爲末水調貼手心仍以燈心焠手足心及肩膊眉心鼻心卽醒也

小兒驚風祕訣曰凡小兒驚風昏迷搐搦竄視諸病又頭風脹痛視頭額太陽絡脈盛處以燈心蘸麻油點燈焠之

仰向後者燈火焠其顖門兩眉際之上下

眼翻不下者焠其臍之上下

不省人事者焠其手足心心之上下

手拳不開口往上者焠其頂心兩手心

撮口出白沫者焠其口上下手足心

凡小兒驚風通身都烏者名烏紗驚急推向下將黃土一盌搗末入久醋一鍾炒熱包定熨之下引至足刺破爲妙

醫案

錢氏小兒直訣曰廣親宅七太尉方七歲潮熱數日欲愈錢謂父二大王曰七使潮熱將安八使預防驚搐王怒曰但使七使愈勿言八使病錢曰八使過來日午間卽無苦也次日午前果作搐急召錢治之三日而愈蓋預見其目直視而顋赤必肝心俱熱更坐石杌子乃欲就冷此熱甚也又肌膚素肥盛而本實其脉急促故發搐尅言午時者自寅至午皆心肝用事之時治之乃瀉心肝補腎自安矣

李司戶孫百日發搐日三五次或作胎驚治之不應卽用大青膏豆許并塗顖浴體二法三日而愈蓋嬰兒血氣未實不能勝外邪而發搐故用浴體法凡搐頻者風在表易治宜發散搐稀者風在臟難治宜補脾

朱監簿子五歲夜半發熱曉則如故用凉藥解之反多涎喜睡大便青白作渴引飲師曰此當健脾胃則諸證退遂用白朮散一兩水煎恣飲二劑稍愈三劑渴止涎消又投阿膠散二服而安

徐氏子三歲病潮熱每日酉則發搐身微熱而目微斜露睛四肢冷而喘大便微黃請錢與李同治錢問李曰病何搐也李曰有風何身熱微溫曰四肢所作何目斜睛露曰搐則目斜何肢冷曰冷厥心內熱曰何喘曰搐之甚也曰何以治之曰凉驚丸鼻中灌之必搐止錢又問曰旣謂風病溫壯搐引目斜露睛內熱肢冷及搐甚而喘併以何藥治之李曰皆此藥也錢曰不然搐者心肝實也身微熱者日西肺用事之時也肺主身溫今且熱者肺虛也目微斜露睛者肝肺相乘勝也四肢冷者脾虛也肺若虛甚則脾母亦弱木氣乘脾四肢卽冷治之當先補脾肺用益黃散阿膠散得脾虛證退然後治其心肝瀉青丸導赤散凉驚丸治之九日愈

王駙馬子五歲目直視而不欲食或以爲鬼祟用符水噴之反加發搐此肝經實火之證也用瀉青丸而愈

王氏子患吐瀉或用藥下之睡而露睛瘈瘲身冷此慢驚也卽用瓜蔞湯治之而目開身溫但二便不利

或用八正散復冷不食即用益黃散史君子丸溫補脾胃諸證悉愈後又有不語用地黃丸以補腎半月而愈

李寺丞子三歲發搐自卯至巳目右視大叫哭錢見曰此逆也男爲陽本發左視無聲則順右視有聲則逆所以然者左肝木也右肺金也逆則二臟相戰金木相擊而有聲也治宜瀉强補弱假令女發搐目左視是肺來乘肝肝不能任故叫哭也當瀉其肺後治其心續治其肝若病在秋（日酉時同）肺兼旺位當大瀉其肺若病在春（早晨時同）此肝旺之時尚不能勝肺是肺強而肝火弱也當補其肝腎大瀉其肺若男發搐目右視是肝來勝肺而叫哭當瀉其肝心若病在春夏（早晨日中時同）肝心旺時當大瀉其肝若病在秋冬（日晡時同）此肺旺之時尚不能勝肝是肝强而肺極虛也當補其肺大瀉其肝所以言目反視者乃肝主目也凡搐則是風熱相搏於內風屬肝故外見於目也今此病先瀉其肺以瀉肺湯主之二日不悶亂知病退也後用地黃丸補腎三服後用瀉青丸各二服以瀉心肝五日而愈然此證男反女故男易治於女也假令女發搐目右視肺之勝肝又病在秋即肺旺肝不能任故哭叫當大瀉其肺然後治心續肝所以言男目右視者木反侮金肝旺勝肺當瀉其肝若更病在春夏金氣極盛又當補其肺愼勿瀉也

竇漢卿瘡瘍全書曰一小兒七歲聞雷則昏倒不知人事以人參歸身麥冬少入五味盡一斤後聞雷自若

張從政儒門事親曰李氏一小兒病手足搐搦以示戴人戴人曰心火勝也勿持捉其手當從搐搦此由乳母保抱太極所致乃令掃淨地以水灑之乾令復灑之令極濕俛臥兒於地上良久渾身轉側泥涴皆滿仍以水洗之少頃而瘥矣

李東垣曰陳氏女八歲時得癇病遇陰雨則作遇驚亦作口出涎沫聲如羊鳴余視之曰此胎受驚也其病深痼調治半年病亦可安仍須淡味以佐藥力與燒丹丸繼以四物湯入黃連隨時加減半年而安

丹溪心法曰孫女因胎中受濕熱日午發搐唇黑面青每日作一次未半週難與藥且釀乳飲之用白朮陳皮半夏芍藥青皮各五分人參川芎木通各三錢黃連二錢炙草一錢分八服薑五片與乳母煎服

羅天益衛生寶鑑曰魏敬甫之子四歲一長老摩頂授記衆僧念呪因而大恐遂驚搐痰涎壅塞目多白睛項背強急喉有痰聲一時許方省後每見衣皂之人輒發多服硃砂龍腦鎮墜之藥四十餘日前證仍在又添行步動作神思如癡命余治之診其脈沉弦而急黃帝鍼經云心脈滿大癇瘈筋攣又肝脈小急癇瘈筋攣蓋小兒血氣未定神氣尚弱因而驚恐神無所依又動於肝肝主筋故癇瘈筋攣病久氣弱小兒易爲虛實多服鎮墜凉定之藥復損其氣故行步動作如癡內經云暴攣癇眩足不任身取天柱穴者是也夫柱穴乃足太陽之脈所發陽癇附而行也又云癲癇瘈瘲不知所苦兩蹻主之男陽女陰潔古老人云晝發取陽蹻申脈夜發取陰蹻照海先各灸二七壯陽蹻申脈穴在外踝下容爪甲白肉際陷中陰蹻照海穴在足內踝下陷中是也次與沉香天麻湯服三劑而全愈

萬氏幼科發揮曰英山縣大尹吳清溪子病驚風諸醫作風治之不效急差人請余余往見尹曰非風也乃因驚得之風從肝治驚從心治不識病原如何有效乃取至聖保命丹治之搐止矣尹曰名不虛傳果良醫也

一小兒驚後成癇余制一方天水散一料碾爲細末分作三劑二兩三錢入眞青黛五錢碾勻名倩魂散寅卯時煎竹葉湯調服一錢以平肝火一劑二兩三錢入硃砂水飛五錢名安神散巳午時煎燈草湯調服以鎮其神一劑二兩三錢入眞輕粉二錢研勻名定魂散申酉時煎淡薑湯服以去其痰旬日而安

一小兒十歲久得癇疾余視兩目渾白無睛光語言蹇澀舉動癡迷乃語其父曰不可治矣後請醫治之竟無成功

本縣汪前川兒驚病一月之間嘗發二三次余曰不治必成癇也求治於余乃立一方用枳實黃連半夏白茯苓各等分折半朱砂飛又折半同前研末神麴糊丸芡實大朱砂爲衣每服一丸用豬猪心一個批開入藥在內線紮定放瓦罐中煑熟取出猪心和藥食之以湯送下後竟不發名斷癇丸

舊縣張月山長子病急驚風十七日不醒待請余到舌色黑矣余嘗見父念玉函經傷寒舌黑洗不紅藥洗分明見吉凶余問曰用何藥洗之父曰薄荷湯乃依法急取薄荷湯洗之舌變紅色余曰可治也用瀉青丸二錢煎湯服之一飲而盡口燥渴已止也其夜搐止熱退而安此子不遇余幾死也

汪元津幼子七月間因傷食病瘧七日發搐余見之肝風雖甚脾未至困當瀉其肝後補其脾可也乃以瀉肝散三服而搐止後用調元湯以補其脾琥珀抱龍丸以平其肝喜睡二日不能開余思喜睡者非脾困也乃神昏欠惺惺也目屬肝兩泡屬脾合目不開者非亡魂也乃神倦也今兒目欲開欲合可知也只用前方又二日令其家中平日相與嬉戲者取其小鼓小鈸之物在房中牀前唱舞以譟之未半日日開而平復也凡十日而安

一女子五個月內發搐余以瀉青丸投之三四服搐不止轉甚余思痰壅氣鬱乃發搐也丸散頗粗與痰粘滯於咽喉之間致氣不通而搐愈甚也用竹葉煎作湯取綿紙濾去其渣滓澄清服之搐止而安其父歎曰醫之貴於變通也如是夫

有兒脾胃素弱一日病瀉以理中丸服之瀉未止口內生瘡乃謂前藥性熱助火復以冷藥投之身微熱睡則揚睛余見之曰此發慢驚風也令郎脾胃本虛瀉則益虛口中生瘡者脾虛熱也誤服冷藥則中氣益損昏睡不乳虛損之極也當急作調元湯倍加人參服之調理半月而愈

胡鳳崖有子痘瘡後傷食疳肌瘦髮穗有醫童一冊見之曰不是疳證乃血虛也其家惑之始則生一病如癇非癇晝則安靜夜則夢寐抱其乳母叫云我怕我怕如人捕之狀詢其病原此兒性不喫藥一冊來餧藥必將鍼火以恐嚇之而得斯疾也蓋胃爲戊土腎爲癸水合而化爲火腎主恐恐則傷腎此因脾胃虛弱不能生肺腎無化原亦從而虛也腎藏志腎虛則神志不寧而生驚恐寤則神棲於心寐則神棲於腎脾志往來出入之門戶也必以補脾爲主安神次之補脾肥兒丸安神錢氏安神丸調理半年而安

一小兒七月發搐無時昏睡不醒不哭不乳掐之灸之不痛嚏之鼻不嚏灌藥不入余曰此眞搐也不可治矣

本縣大尹吳子生四月病驚風搐過則昏睡不乳發搐則醒眼邪視右手搐搦請余余曰此眞搐不可治辭而退

一兒發搐痰壅有醫用白餅子下之不退凡三下病益深合目昏睡不哭不乳喉中氣鳴上氣喘促大便時下余曰五臟氣絕病不可治轉下之過也彼醫曰白餅子錢氏下痰神方也余曰盡信書不如無書錢氏小兒皆出於門人附會之事也蓋人之有痰猶木之有津時令大熱草木流津痰自熱生此明驗也痰猶水也附氣自行過額在山豈水之性哉乃搏激使之也今痰隨火上不知降火而反下之損其胃氣胃氣既攻五臟俱損故目不開者肝絕也昏睡不乳者脾絕也啼聲不出者心絕也喘促痰響者肺絕也便溺遺失者腎絕也果不可治而死

邑中有儒醫治病有奇方惟性太執不知變通時有小兒發搐余謂急驚之證當用涼瀉導赤散瀉青丸是也彼謂驚風者肝火鬱遏而成也火鬱則發之小續命湯是也人不能決兩從之余所治者一日而安彼治者死悔不信吾言無及矣

一小兒發搐先取善推法推之止向後發病益危甚余曰推法者乃針灸按摩之遺意也經曰無刺大虛人推掐之法壯實者可用之如怯弱者其氣不行推則有汗反傷元氣也其家不信余言余曰不死必成癇疾半月後果死

癸亥二月英山縣大尹前縣吳某一子發搐彼醫以二陳湯薑汁竹瀝治之不退吳初來任過羅與全有識乃差人請余比往視其外候三關青氣兩頰赤色目常直視指如撚物曰此得之外感未與發散熱入於裏錢氏曰肝有熱則目直視得心熱則發搐又曰兩頰赤而目直視必作驚風小兒肝常有餘又乘木旺之時當與瀉肝若二陳湯陳皮半夏生薑之辛皆助肝之物經曰以辛補之所以無效乃用瀉青丸以瀉肝木之有餘導赤散以瀉心之火一服而搐即止余見其胎稟素怯脾胃且弱恐後作搐便成癇疾又作琥珀丸與之常服而安

靳水沙坂徐淑道一子患驚風先取醫張姓者治之數日不效請余往痰喘正急驚搐頻發余先治其痰次治其搐以次而定唯身熱猶熾張姓者欲用解毒湯竹葉湯小柴胡湯余皆不可謂之曰小兒肝嘗有餘脾嘗不足病發于肝風木本旺脾土受傷此乃虛熱勿用寒涼致損中氣也乃用四君子湯加炙黃芪炒黑乾薑一服而安

一小兒年五歲夢中驚哭抱其母叫怕此因被驚嚇得之余製一方用人參麥門冬茯神黃連酸棗仁柏子仁炙甘草硃砂各等分一半水煎一半入地黃加炙甘草爲末山藥粉糊丸黍米大每服二十五丸燈草煎湯下未盡劑而安

余初習醫治一兒二歲發搐而死但面色未脫手足

未冷乃氣結痰壅而悶絕非眞死也取艾作小炷灸兩手中衝穴火方及肉而醒大哭遂用家傳治驚方以雄黃解毒丸十五丸利其痰涼驚丸二十五丸去其熱合之煎薄荷湯送下須臾利下黃涎搐止矣

一兒周歲發熱而搐以瀉青丸投之不效乃問其發搐之狀其母曰搐過後只好睡醒時則戲作猫兒聲見人則笑余曰醫要識證藥要對證以導赤散服之一劑而安其父問是何故余曰心臟屬火其聲爲笑火生于寅屬虎猫者虎之類也猫聲而笑卽非肝病乃火病也故以導赤散瀉其心火而安

一兒發搐因有推法暫退一月後至期復發又推之或一月一發或一月再發余曰病成癇矣推法者乃發表之意痰聚在心不得出也幸初成癇者當可治若久則爲終身痼疾不可治也因立方用黃連五錢硃砂二錢五分飛白甘遂三分膽星一錢爲末粟米糊丸猪心血杵勻丸芡實大每服一丸燈草煎湯化下夜服三日服一遂安

王綸明醫雜著曰一小兒三歲因驚抽搐發熱痰盛久用抱龍丸等藥以清風痰反致面色或赤或青余謂始因肝有實邪故宜用前藥今面色青赤乃肝經虛熱而傳心不足之象也先用六味地黃丸以滋養肝腎佐以六君子湯少加柴胡升麻以調補脾胃諸證頓退而痊

奚氏女六歲忽然發驚目動咬牙或睡中驚搐痰涎壅盛或用化痰祛風等藥益甚余曰面青而見前證乃屬肝木尅制脾土不能攝涎而上湧也當滋腎水生肝血則風自息而痰自消矣遂用六味丸而愈

一小兒患前證痰涎自流用驚風之藥其證益甚脾胃益虛視其面色痿黃口吐痰涎用六君子補中益氣湯而愈

一小兒兩目動劄手足發搐數服天麻防風丸之類以祛風化痰前證不愈其痰益甚得飲食諸證稍愈視其準頭及左頰色青黃余曰脾主涎此肝木制脾土不能統攝其涎非痰盛也遂用六君子湯加升麻柴胡釣藤二劑飲食漸進諸證漸愈又用補中益氣而安

皋人余特正子傷食發丹毒服發表之劑手足抽搐服抱龍丸目瞤氣喘痰盛余謂此脾胃虧損而變慢驚也無風可祛無痰可逐乃虛象也遂用六君子加附子一劑而安再劑而愈

一小兒病後遇驚卽痰盛咬牙抽搐搖頭作瀉卽服腦麝硃砂等劑以致慢驚而卒

一小兒七歲患急驚將愈而發熱驚悸或用祛風化痰之劑更加驚搐吐痰喘嗽腹脹少食惡寒又用抱龍等丸更加大便似痢寒熱往來殊類風證先君視之以爲脾氣虧損諸經無所資養而然用四君子湯少用升麻柴胡以升補陽氣而愈

大尹劉應昌子患瘰癧恪用化痰之劑虛證悉至殊類驚風又服祛風至寶丹小便頻數肢體抽搐或兩目連劄咬牙呵欠或作嘔懶食大便重墜或泄瀉此土傷而木勝也用補中益氣湯六味地黃丸而痊

冬官朱小溪子項間結核面色痿黃肌體消瘦咬牙抽搐頭搖目劄此肝木尅脾土也用六君子湯九味蘆薈丸而愈

憲幕顧斐齋元孫二周項結核兩臂反張索敗毒之藥余意其證屬風熱傷肝血燥筋攣未敢付藥翌早請治果係前證遂與六味丸一服侵晨灌之午後肢體如常

儒者王文遠子患瘰癧痰盛發搐服金石香燥之劑手足筋攣此肝血復傷而致急驚風也遂用加味小柴胡加釣藤山梔芎歸一劑又以六味丸料加五味麥冬煎服而安

保嬰金鏡錄曰一小兒發熱拘急或四肢瘈瘲左顋色赤此心肝二經風熱相搏先用柴胡清肝散以清心肝之熱次用六味地黃丸以生肝腎之血頓安

一小兒發搐啼叫手足指冷左顋青黑此肝脾虛弱腎水反侮脾土用六君子湯加薑桂一劑頓安又以四君子加芎歸及補肝散而愈

一小兒潮熱發搐痰涎上湧手足指冷左顋至申酉時青中隱白手足時搐此肝經虛弱肺金所勝而潮搐脾土虛弱而手足冷也用補中益氣湯以調補脾肺用六味地黃丸以滋補肝腎而愈蓋病氣有餘當認爲元氣不足若用瀉金伐肝清熱化痰則誤矣

一小兒印堂青黑至夜啼搐余謂脾土虛寒用釣藤飲而安夜因驚發搐夜啼用釣藤飲前證頓止又用異功散而愈

一小兒目內色青發搐目直上視叫哭不已或用牛黃清心丸不愈反咬牙頓悶小便自遺此肝經血氣虛甚故耳余用補中益氣湯及六味地黃丸而痊

一小兒發搐目劄屬肝膽經風熱先用柴胡清肝散以清其肝後用六味地黃丸以補其腎而痊

一小兒發熱作渴用瀉黃散大便重墜口角流涎仍欲瀉火余曰鼻準青白多而黃色少屬脾胃虛寒肝木所侮蓋口角流涎胃氣不能統攝也大便重墜脾氣不能上升也不信另用凉劑果眉脣微動四肢微搐余曰此虛極而變慢脾風也用六君子加當歸木香炮薑釣藤鉤二劑益甚意欲更劑余曰此藥力未及也設前藥不對其證禍在反掌矣仍以前藥加炮附子一片服之即安乃去附子又二劑調理而愈

一小兒瘈瘲啼叫額間青黑此驚風肝木乘脾腹中作痛也先用六君子湯加木香柴胡釣藤鉤啼叫漸緩更加當歸又二劑而安

一小兒嘔吐不食手足搐搦痰涎上湧手足指冷額黑脣青此腎水勝心火也用五味異功散加木香炮薑頓安乃去炮薑再劑而愈

一小兒煩躁驚悸熱渴飲冷額間色赤此心經實熱所致先用瀉心湯一服稍緩又用柴胡梔子散而瘥

一小兒睡臥驚悸發熱痰盛脈形如弓之向外此因驚木旺傷脾而食不消也先以天麻防風丸祛風定驚用五味異功散壯脾止搐而瘥

一小兒沉默昏倦肢冷驚悸其紋如弓之向裏此脾胃氣虛而外感寒邪也先用惺惺散以解外邪調胃氣諸證頓愈但手足逆冷又用六君子湯調補元氣數日而安

醫學綱目曰肝風搖頭諸方不載鄭都丞子患七年搖頭三年下血已服百餘方前後所服治搖頭者無非風藥止血者或作痢或作腸風百藥無效余既視其病又知其詳亦不明其標本退而思乃肝血液盛外有風熱乘之肝屬木盛則脾土爲木所尅脾與肺是子母俱爲肝所勝而血遂漬於大便故便血不止遂處一方但損肝祛風而益脾用犀角屑甘草各一分瓜蔞根半兩炙赤蛇退皮一錢防風五兩釣藤一錢去節麻黃一錢黃芪蜜炙半兩羌活五錢白芍藥五錢爲末棗肉丸食後薄荷湯下只二服作效頭搖即止便血隨愈次問服胃風湯數日頓除沈舍人子服之亦驗

保嬰撮要曰一小兒寅卯時發熱痰搐服抱龍瀉青二丸而愈後復患因自用前藥更加咳嗽氣喘不時發搐面赤或青黃或浮腫或流涎余謂咳嗽氣喘乃脾肺氣虛不時發搐乃木乘土位面青而黃赤乃肝助心脾浮腫流涎乃脾氣虛弱用益智丸以養心神補中益氣湯以養脾肺頓愈

少參王陽湖孫跌傷股骨正體科已續余視其面色青黃口角微動此肝木侮脾之證且氣血筋骨皆資脾土以生但壯脾氣則所傷自愈遂用六君釣藤當歸三十餘劑諸證悉痊

一小兒巳午時搐熱驚悸發時形氣倦怠面黃懶食流涎飲湯余謂此心火虛而不能生脾土也不信自服凉心之藥更加吐瀉睡而露睛幾成慢脾風用六君薑桂佐以地黃丸而愈

一小兒七歲驚搐發熱不已巳午未時益甚形氣殊倦熱定飲湯此心脾氣虛朝用補中益氣湯加益智仁夕用六君當歸釣藤鉤尋愈後飲食過多復作嘔瀉或治以保和丸反加寒熱發搐此脾土復傷而肝木所侮也用六君柴胡寒熱止而飲食進但午未時仍泄用補中益氣湯加茯苓半夏釣藤鉤而愈

一小兒百日內患搐痰涎自流用驚風藥益甚視面色黃中隱白乃脾虛不能攝涎也用六君子補中益氣二湯而愈後復患兼氣喘自欲表散行痰余謂此肺虛不能納氣歸源耳用五味異功散加釣藤鉤柴胡調補脾肺清理肝火而安

一小兒患前證面青黑或痿黃審其母素有鬱怒用加味逍遙散加味歸脾湯治其母而子亦愈矣

一小兒月內發搐鼻塞此乃風邪所傷以六君子湯加桔梗細辛子母俱服更以葱頭七莖生薑一片細擂攤紙上合置掌中令熱急貼子顖門少頃鼻利搐止

一兒未滿兩月發搐嘔乳腹脹作瀉此乳傷脾胃用五味異功散加漏蘆令母服之子亦服匙許遂愈

一小兒驚悸痰盛瀉乳不消此感風邪夾驚肝侮脾而氣虛先以天麻防風丸祛風定驚後用五味異功散壯脾止搐而愈

一小兒發熱拘急四肢瘈瘲左腮赤此心肝二經風熱先用柴胡清肝散次用六味地黃丸而愈

一小兒發搐啼叫手足指冷左腮青黑此脾土虛弱而腎水侮之也用六君薑桂一劑頓安又以四君芎歸及補肝散而愈

一小兒目內青色發搐目直上視叫哭不已或用牛黃清心丸更加咬牙煩悶小便自遺余謂此肝脾虛甚用補中益氣湯六味地黃丸而愈

一小兒發搐目劄屬肝膽經風熱先用柴胡清肝散以清肝後用六味地黃丸以補腎而愈

一小兒潮熱自申酉時熱至子丑時方止遍身似疥大便祕結小便赤澀熱湯飲冷此脾胃實熱而傳肺大腸也先用清凉飲四劑結熱始退又用四物加柴胡黃連數劑其瘡漸愈彼欲速效另用槐角之類諸證益甚遂請施院長治之亦同余藥惟加桃仁赤芍二味至百劑乃愈

一小兒先停滯飲食服尅伐之藥致面色痿黃體倦少食申酉時潮熱余欲用調補之藥不信更用清熱消導益加泄瀉余用六君子數劑又用補中益氣湯而愈

一小兒酉戌時熱面赤腹中作痛按之益甚服峻厲之劑下五七次發搐吐痰作渴腹痛按之卻不痛此脾胃復傷而變證也用七味白朮散補中益氣湯頓安

一小兒飲食停滯服消導之藥余曰此因脾胃虛而食停滯也當調補爲善已而申酉戌時潮熱食少作渴大便不實用四君子湯而飲食進又用補中益氣湯而諸證愈

姚儀部子每停食則身發赤暈此飲食內停不消鬱熱發外用清中解鬱湯而愈後患搖頭咬牙痰盛發搐吐出酸味伺其吐盡翌日少以七味白朮散調理脾胃遂不復患

一小兒停食服通利之劑作嘔腹脹此脾胃復傷也用補中益氣湯而愈

一小兒兩目動劄手足發搐數服天麻防風丸之類前證不愈其痰益甚得飲食稍愈視其囟頭及左頸色青黃余曰脾主涎此肝木尅脾土不能統攝其涎非痰盛也遂用六君升麻柴胡釣藤二劑飲食漸進諸證漸愈又用補中益氣湯而安

治一小兒亥子丑時發熱泄瀉用益黃散而愈後復發服前藥嗜臥露睛作潟少食大便頻黃余謂肝勝脾虛元氣下陷用補中益氣湯佐以地黃丸而愈

治一老生子周歲秋初暴冷忽發搐似痫搐過則氣息奄奄此元氣虛弱所致用補中益氣湯而安

一小兒十歲一小兒七歲各有痫證歲發二次後因出痘及飲食停滯皆發頻數並用六君子補中益氣二湯頓安

一小兒六歲忽然發痫目動咬牙或睡中驚搐口流痰沫服化痰祛風之藥益甚而面色兼青乃屬肝木尅制脾土而不能攝涎故上湧也當滋腎水生肝血則風自息痰自消矣用六味丸而愈

一小兒患痫證每發吐痰困倦半餉而甦諸藥不應年至十三而頻發用紫河車生研爛入人參當歸末丸梧子大每服三五十丸日進三五服乳下一月漸愈又佐以八珍湯全愈

一小兒七歲發驚痫每作先君令其忍飲人乳後發漸疎而輕至十四歲復發仍用人乳不應余令用肥厚紫河車研爛如泥日服二三次至數具而愈後常用加減八味丸而安至二十三歲發而手足厥冷仍用前法佐以八味丸十全大補湯而愈

一小兒十三歲因患驚痫服硃砂丸之類而愈後每發輒服前丸不應或謂風痰內積服藥下之發作日頻更服鎮驚等劑益甚余以爲心脾二經氣血虧損而痰涎留滯朝用補中益氣湯夕用斷痫丹漸愈出痘後其痫復作仍用補中益氣湯爲主佐以八珍湯及蟬蛻釣藤飲而愈

一小兒傷風鼻塞流涕服藥過重發搐呵欠煩悶汗出氣喘久不愈其母因勞役發熱余用補中益氣湯時以五七滴與兒飲之母子並愈

一小兒傷風發搐痰盛喘急余謂此脾肺氣虛腠理不密而外邪所乘用六君加柴胡升麻桑皮杏仁一劑痰喘悉退又一劑去桑杏加釣藤鉤而安乃用異功散數劑後不復發此證若不補脾胃實腠理專治痰邪鮮有不誤

一小兒停食吐瀉先用尅滯之劑更加咬牙發搐面色青白鼻準青而黑手足指冷眉唇抽動余以爲脾胃虛弱因藥復傷肝木所乘而成慢驚矣遂用六君子加木香柴胡升麻二劑頓安大凡傷食停滯雖見發搐等證且勿用藥待宿食化盡胃氣漸健而自愈設若強與飲食或誤用藥餌不惟莫其所有而且生其所無矣

舉人杜克宏子發熱抽搐口噤痰湧此肝膽經實火之證卽急驚風也先用瀉青丸一服又用六味丸二服諸證頓退乃以小柴胡湯加芍歸山梔釣藤鉤而安卽用補中益氣湯而愈

一小兒沉困發熱驚搐不乳視其脈紋如亂魚骨此風熱急驚之證也先用抱龍丸少許祛風化痰後用六君子湯加柴胡升脾平肝而愈

一小兒暑月吐瀉目睛微動面色青白手足並冷仍用玉露散余謂已變慢脾風也當溫補脾胃不信後果歿

一小兒弄舌發搐手指不冷余謂肝脾虛熱用異功散加升麻柴胡而愈後傷乳腹脹服尅滯藥作瀉弄舌手指發搐審乳母肝火與小柴胡湯加升麻自愈治之母子並愈

一小兒乳食過多患吐瀉用大劑異功散加柴胡升麻母子服之而愈後因驚服至寶丹之類發搐弄舌發至慢驚余用六君子湯加白附子服之而愈

一小兒吐舌發熱飲冷額鼻黃赤吐舌流涎余謂心脾實熱用導赤瀉黃二散而愈後復作別服清熱等藥更弄舌余用異功散加釣藤鉤而安又用六君子湯全愈

一小兒夜睡忽然驚動如搐大便酸臭而色青此飲食傷脾而肝旺也先用異功散加柴胡升麻山梔又用四味肥兒丸而愈

一小兒不時睡中驚動發搐作渴飲冷左腮青額間赤先用柴胡清肝散加釣藤鉤四劑以治肝火後用五味異功散以健脾又用地黃丸補腎肝而安

一小兒九歲因驚發熱抽搐頓悶咬牙作渴飲冷便黑面色青赤而印堂左腮赤甚此心肝二經風熱相搏乃形病俱實之證也先用瀉青丸料炒黃連一劑大便隨利熱搐頓減繼用抑青丸一服諸證悉退但面色瘵黃肢體倦怠飲食少思此病氣去而脾氣未復也用補中益氣湯及地黃丸而全安

一小兒發熱抽搐口噤痰湧此膽經實火爲驚風也先用瀉青丸一服六味丸二服諸證即退又用小柴胡湯加芎歸山梔釣藤鉤次以補中益氣湯而愈

一小兒忽然發熱目動咬牙驚搐痰盛或與祛風化痰藥益甚面色青黃乃肝木尅脾脾之液爲涎虛則涎不能攝上湧而似痰也法當生肝補脾則風自息痰自愈矣遂用六味丸及六君子湯而愈

一女子十二歲善怒睡中驚搐遍身作癢飲食少思此肝火風熱脾土受侮用參术柴苓湯以清肝火凉肝血健脾胃而愈

一小兒三歲患急驚面赤發熱作渴飲冷先君已用瀉青丸一服熱去大半翌早又自用前丸一服即吐瀉發搐面色青白手足指冷余以爲熱去而妄用致脾胃受傷用六君子湯加薑桂升麻柴胡一劑頓安前哲謂小兒易爲虛實攻伐之藥中病即止不可過劑我先君蓋守此法

一小兒潮熱發熱左腮青赤此心肝二經血虛之證也用祕旨安神丸及四物湯加防風酸棗仁治之而愈

一小兒潮熱發搐痰涎上湧手足指冷申酉時左腮青色歸白用補中益氣湯調補脾肺六味丸滋養肝腎而痊

嘉興王舉人女七歲因跌傷腿膝兩膝腫潰左腮色青左關脈無余意驚則氣散而風熱鬱滯於肝故其脈隱伏先用四君子加升麻柴胡釣藤鉤一劑其脈即至更用四物加柴胡防風釣藤生血補肝而愈

一小兒驚風後痰嗽不止睡臥不寧諸藥無效余用牛黃清心丸少許頓止後復傷風邪痰盛喘急飲食不下仍用牛黃丸少許而安再用異功散加桔梗而愈

一小兒抽搐涎痰自流或用驚風之藥益甚視其面色黃白余用六君補中益氣二湯補脾肺而愈

一小兒傷風咳嗽痰湧余謂脾虛肺弱腠理不密風邪所乘用六君桔梗桑皮杏仁治之而愈後飲食停滯作瀉腹脹用六君加山楂厚朴而安又復停食作嘔或用藥下之更加咳嗽余謂脾肺俱虛宜用調補彼以爲緩自服發表尅滯前證益甚頭項顫動余用天南星散倍加釣藤鉤及異功散而愈

一小兒口眼喎斜面色或青或赤此肝心風火乘脾也朝用柴胡清肝散夕用異功散加釣藤鉤而愈其時有患前證服祛風導痰之藥者皆不能起

一小兒痢後患前證發搐面色瘵黃肢體倦怠此元氣虛尅伐多矣余用補中益氣湯加釣藤鉤子服而漸愈後因乳母七情飲食失宜或兒乳食過多前證仍作服補中益氣湯五味異功散而愈

一小兒因乳母受驚發搐時目赤壯熱腹痛哭而曲腰用四物加柴胡防風又用加味逍遙散加熟地黃以清肝熱生肝血再用地黃丸滋腎水以生肝木母子俱安

一小兒曲腰而啼面青唇黑此寒氣所乘內釣腹痛也用五味異功散加木香乾薑一劑與母服之頓愈後因母感寒腹痛而啼用人參理中湯一劑與母服之其子亦安

一小兒曲腰乾啼手足並冷用六君子加乾薑木香服之未應又加肉桂母子俱服而安

一小兒忽乾啼作瀉睡中搐手足冷此脾土虛寒肝木侮之而作發搐乃內釣也用益黃散一劑次用四君子加升麻柴胡乳食漸進而安

一小兒乾啼面青或赤手足並熱或用清熱之劑久不愈診其乳母有肝火氣滯用加味逍遙散及越鞠丸以治乳母時灌子數滴不旬日子母並愈

一小兒患前證服魏香散而愈後復作服祛風鎮驚之藥上氣喘粗此元氣虛寒也余先用烏蠍四君子湯稍愈但倦怠殊甚用補中益氣湯及五味異功散而痊

一小兒因母每感寒腹痛飲燒酒發熱痰盛面赤手足並熱屬胃經實熱之天釣也用清胃散子母服之並愈後因傷乳吐瀉面色或青或白手足並冷屬脾氣虛寒用六君子木香乾薑而愈三歲後傷食腹痛臀黑作瀉數去後而無糞或糞少而青此元氣虛寒下陷用補中益氣湯漸愈

一小兒啼哭陰囊腫大眼目上翻赤脈流淚此肝熱內鈎用柴胡清肝散加鈎藤鈎治之諸證漸愈又用鈎藤飲而痊後復發或甲祛病根之藥致乳食日少肚中脹痛手足浮腫余先用六君子升麻柴胡數劑諸證稍愈又傷乳食吐瀉用平胃散一服即愈

一小兒因乳母懷抱鬱結腹痛發搐久而不愈用加味歸脾湯加漏蘆母子並服漸愈又母大怒發厥而甦兒遂食乳腹痛作瀉面青作嘔先用小柴胡湯二劑母子並服少愈其母又嚥酸腹脹用越鞠丸加味歸脾湯佐以加味逍遙散而愈

一小兒感冒發熱咳嗽咬牙余以謂脾肺氣虛不信乃用解散之藥果項強口噤汗出不止手足並冷遂用五味異功散加柴胡木香治之漸愈但日晡微熱睡而露睛用補中益氣湯而痊

一小兒因驚發熱誤行表散出汗面白日晡發痙先兄謂脾肺氣虛而肝膽邪盛以六君子加柴胡升麻治之乃發於寅卯時此肝邪自旺也用加味逍遙散一劑其熱頓退又用補中益氣湯六味地黃丸而愈

一小兒患瘰癧潰而發痙或寒熱作渴或手足厥冷風熱先用柴胡梔子散一劑寒熱頓止次用四物參芪白朮柴胡漸止又用補中益氣湯加芍藥茯苓而痊

一小兒頭患瘡潰而發痙或寒熱作渴或手足厥冷其脈洪大浮緩按之皆微細此元氣虛而邪氣實也用十全大補湯加柴胡山梔數劑諸證漸退而脈漸斂又十餘劑而愈

一小兒驚風服抱龍丸保生錠吐涎甚多又汗出發痙仍欲祛痰余曰此肝脾血虛而內生風耳吐痰不止脾肺氣虛不能攝涎也汗出發痙脾肺氣虛而亡陽也用六君子湯加炮薑木香頓愈又用四君子加歸芪而安

一小兒傷風發熱服解散之藥汗出不止痙證悉具其脈洪大鼓指按之微細此汗多亡陽脾肺氣虛之證也用異功散加芍歸黃芪其汗頓止又用補中益氣湯而痊

一小兒停食腹痛發熱嘔吐服峻厲之劑更吐瀉汗多手足並冷發痙不止其脈浮洪按之如絲用六君子湯加升麻炮薑痙證頓已惟寒熱往來又用四君子湯升麻柴胡而愈

少參王陽湖採女年八歲發痙服降火消導之劑其脈浮洪寒熱如瘧余用四君子加升麻柴胡炮薑鈎藤鈎及補中益氣湯間服漸愈但脅下作痛去炮薑加木香肉桂而痊

一小兒因乳母大怒發熱脅痛亦患前證兼汗出作嘔先用小柴胡湯一劑子母俱服頓愈但日晡潮熱以異功散加升麻柴胡治之並愈

一小兒因乳母發熱吐瀉一小兒因乳母食厥昏憒同患前證各治其母而子悉愈

一小兒忽腰背反張目上視面青赤曰青屬肝主風赤屬心主火此風火相搏用柴胡梔子散倍加鈎藤鈎頓安而痰如舊又用抱龍丸而愈

一小兒忽腰背反張服治驚之藥後不時舉發面色黃白肢體甚倦余用五味異功散十餘劑而愈後因貪食飲食不節不時舉發隨用前藥即愈遂日以參朮末每服五七分炮薑大棗煎湯調下服至二兩而不發已上二證元氣虛而病氣實也若用攻邪之藥皆誤矣

一小兒素患前證痰盛面色素白而兼青余謂肺氣不能平肝肝氣乘脾脾氣虛而生痰耳先用抱龍丸二服以平肝隨用六君子湯以補脾肺月餘而痊半載之後復發謂非逐痰不能全愈遂用下劑痰涎甚多而咽喉如鋸聲余曰乃脾不能攝涎也咽間鳴乃肺氣虛甚也遂用人參五錢炮薑三分水煎服而醒至第四劑後加棗二枚人參服數兩而愈後每發非獨參湯不應若執常方鮮不有誤者

王肯堂證治準繩曰東都王氏子吐瀉諸醫用藥下之至虛變慢驚其候昏睡露睛手足瘈瘲而身冷錢曰此慢驚也與瓜蔞湯其子胃氣實即開目而身溫

王疑其子不大小便令諸醫以藥利之醫留八正散等數服不利而身復冷令錢氏利小便錢曰不當利小便利之必身冷一二日果身冷矣因抱出錢曰不能食而胃中虛若利大小便則脾胃俱虛當身冷而閉目卽死今幸胎氣實而難衰也錢氏用益黃散史君子丸四服令微能飲食至日午果能飲食所以然者謂利大小便脾胃虛寒當補脾不可別攻也後又不語諸醫作失音治之錢曰旣失音何開目而能飲食又牙不緊而口不噤也諸醫不能曉以地黃補腎錢曰此因凉藥利小便致脾腎俱虛今脾已實腎尚虛故補腎必安治之半月而能言一月而痊

少時聞友人孫彭山云嘗見姻家一小兒患驚搐延專科治之諸證悉退而搖頭不止後一老醫至於常服藥中加入紫河車卽時愈按紫河車草名神農本經名蚤休唐本名金線重樓錢氏方名白甘遂主治驚癇搖頭弄舌乃本經正文古人謂遠白字療病多效不虛也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百五十四卷目錄
醫部彙考四百三十四
小兒吐瀉門一
錢乙小兒直訣 吐瀉兼變證治
劉完素六書 瀉痢
張從政儒門事親 身熱吐瀉 水瀉 久瀉不止
朱震亨幼科全書 嘔吐 西江月 泄瀉 清江引 吐瀉 西江月
魯伯嗣學嬰童百問 嘔證 吐乳證 藍吐 寒冷嘔吐噦逆 霍亂吐瀉 冷瀉 熱瀉 傷食瀉 驚瀉
薛氏保嬰撮要 霍亂吐瀉
徐春甫古今醫統 嘔吐 瀉泄 霍亂吐瀉
藝術典第四百五十四卷
醫部彙考四百三十四
小兒吐瀉門一
宋錢乙小兒直訣
吐瀉兼變證治
五月二十五日以後吐瀉壯熱此臟腑中九分熱也傷熱乳食吐而不消瀉色深黃玉露散主之
六月十五日以後吐瀉身溫臟腑六分冷也嘔吐乳食不消瀉色黃白口乾作渴者食前少服益黃散食後多服玉露散
七月七日以後吐瀉身涼三分熱七分冷也不乳多睡悶亂硬氣出氣睡臥露睛昏白多噦亦用益黃玉露二散主之
八月十五日以後吐瀉身涼不乳乾噦瀉青褐水無陽也當用益黃散吐瀉乳食不化時時下痢肌肉消瘦此脾胃虛寒也用木香九夏月不可服如有冷證則少服之其身溫壯熱或瀉痢紅黃赤黑此脾胃實熱也用黃連丸冬月不可服如有熱證則少服之
註按前法即內經用寒遠寒用熱遠熱之本旨又云有假者反之雖違其時以從其證蓋胃傷則嘔吐脾傷則泄瀉脾胃俱傷則吐瀉並作前證若傷辛熱停滯嘔吐或大便下痢者用六君子加黃連吳茱萸木香若停滯已去泄瀉不已用四君子加肉蔻骨脂若傷生冷腹痛瀉痢青白用六君子加砂仁木香炮薑若傷魚肉等物用六君子加山楂砂仁若瀉紅黃赤黑諸臟皆熱也先用香連丸後用補中益氣湯送香連丸若瀉痢青白乳食不化者用人參理中丸若吐瀉昏睡而露睛者用五味異功散睡而不露睛者用玉露散若吐而手足俱熱或喜冷飲食或睡不露睛者用瀉黃散或手足冷或惡冷飲食或睡而露睛者用六君子木香然木香黃連二丸雖能攻尅病邪不無傷損脾胃治者審之
若吐乳瀉黃傷熱乳也吐乳瀉青傷冷乳也皆當下之吐瀉昏倦睡不露睛者胃實熱也吐痰涎及綠水者胃虛冷也
註按前證若兒自受驚或乳母恚怒致兒吐瀉青色者宜用異功散加柴胡若母食厚味而乳熱者用東垣清胃散母飲酒而乳熱者用葛花解醒湯子服一二匙若飲燒酒而乳熱或子母身赤或昏憒服冷米醋三五杯多亦無妨兒服一二匙若母停滯生冷而乳冷者母服養胃湯子服調中丸若母停滯而變熱乳者母服大安丸子服五味異功散若母鬱怒傷肝脾而乳熱者用歸脾湯逍遙散若母脾虛血弱而乳熱者用六君子加芎歸若母氣血虛而乳熱者子母俱服八珍散若母勞役發熱而乳熱者子母俱服補中益氣湯若因母怒動肝火而乳熱者用五味異功散加柴胡山梔其吐痰涎及白綠水者肝木乘脾土之虛寒證也用六君子加柴胡木香大凡吐乳瀉青色者屬驚法當平肝補脾吐瀉青白色者屬寒法當溫補脾土前諸證若手足指熱者屬實手足指冷者屬虛此亦驗法也
初生十日內吐瀉壯熱不乳或乳不消或白色先用白餅子下之後用益黃散和之
初生下吐因穢惡下咽故也用木瓜散主之凡初生急須拭淨口中否則啼聲一發穢物嚥下致生諸病
註按芽兒初生之患多因乳母不愼七情不節厚味傳兒為病當審其因以調治其母前所用之藥恐臟腑脆嫩不能勝受治者審之
金劉完素六書
瀉痢
五臟皆言熱證無寒冷證亦有謂瀉痢小便青白不

瀉爲寒水穀不化而色不變吐痢腥穢澄澈清冷青白不渴身凉不渴脈遲細而微者寒證也

穀雖不化而色變非白煩渴小便黃赤而澀者爲熱證世傳小兒吐痢霍亂食乳未及消化而痢尚白便論爲寒證誤矣仲景云熱邪不化穀豈爲寒也元張從政儒門事親

身熱吐瀉

凡小兒身熱吐瀉腹滿不進飲食可急與牛黃通腸丸下過四五行則自愈矣益乳食便屬水甚則成濕以治濕法治之用燥熱之藥非也

凡小兒水泄不止可用五苓散與益元散各停用新水調下三二錢頻服不拘時候若暴速注下甚者屬火凉膈通聖等散治之用者勿輕非深於造化者未易此語

水瀉

小兒暴注水瀉不止內經曰此名暴速注瀉久而不愈者爲涌泄注下此乃火運太過之病也火注暴速故也急宜用新汲水調下甘露飲子五苓散天水散或用井花水煎此藥放冷服之病即瘥矣不可用御米殼乾薑豆豉聖散子之類縱然瀉止腸胃氣滯不通變爲腹脹此法宜分陰陽利水道乃爲治法之妙也

久瀉不止

凡小兒久瀉不止至八九月間變爲秋深冷痢泄瀉青白時時撮痛乳瓣不化可用養脾丸如黍米大每服二三十丸米飲送下日進三服則愈益黃散亦可用之

凡治小兒之法不可用極寒極熱之藥及峻補峻瀉之劑或誤用巴豆杏仁硫黃腻粉之藥若用此藥反生他病小兒易虛易實腸胃嫩弱不勝其毒若治之宜用分陰陽利水道最爲急用桂苓甘露散之類

朱震亨幼科全書

嘔吐

有物無聲曰吐有聲無物曰嘔有聲有物曰嘔吐其證有三有寒有熱有食積傷

凡寒吐者吐時少而出物多此胃家受寒也或用胃苓丸煨薑湯吞或以理中丸治之寒吐食不化不惡食

凡熱吐者吐時多而出物少此胃家有熱也以二陳湯加黃連煨乾薑治之熱吐食化不惡食

凡食積吐者要分三焦明白俱能食如食時即吐者此積在上焦胃口也宜用淡鹽湯吞下後用鵝翎毛掃口中令其吐盡舊積以二陳湯加煨乾薑神麯炒麥芽炒杏仁治之

如食下一二時而吐者此積在中焦胃下口過小腸上口處也先以丁香脾積丸通去舊積後以二陳湯加消導藥治之

如早食晚吐晚食早吐者此食在下焦小腸口下過大腸口上處也先以丁香脾積丸下之後以二陳湯加消導藥治之消導藥如神麯麥芽砂仁香附之類

如嘔吐久而諸藥不納者此胃口伏火關格之病用理中湯加童便猪膽汁仝炒煎服即止神效妙不可言

如嘔吐出蛔蟲者以理中湯加烏梅一箇附子一小片黃蘗川椒一服即止

如嘔吐後而瘦弱者只以集聖丸調之

如諸吐不納藥者此陰盛拒陽也必加童便猪膽者蓋童便味酸鹹性寒膽汁味苦性寒以和理中湯服則陰體漸消陽性乃發此內經所云伏其所主先其所因也非吾子孫不示

凡吐不止目上斜頭後仰者不治

祖傳治嘔吐只用胃苓丸煨薑湯送下不問寒熱皆效凡吐不止服藥無效更加煩悶不治

西江月

嘔吐飲食不納任從湯藥難嘗此爲陰盛隔孤陽到是時醫魔障參术煨薑熱附烏梅童便尤良猪膽仝入慢精詳此法應如影響

一等蛔蟲吐出出爲蛔厥多陰烏梅丸子效如神一服蚘安吐定又有咳而嘔者化痰順氣須明如常吐嘔只胃苓湯用煨薑作引

泄瀉

凡泄瀉皆屬濕其證有五治法以分利升提爲主不可一例混施如泄瀉青白或乳食不化腸痛四肢冷面晃白不作渴者此寒濕也其證多得於冬以五苓散作引吞化理中丸即止如寒甚不止者理中湯加附子一片即效

如泄瀉黃稠腹痛作熱面紅口渴此熱濕也其證多得於夏以五苓散加滑石甘草木通治之甚者以玉露散理中湯即效

如泄瀉不住成黃水者或渴或不渴此風濕也其證多得於夏以五苓散加防風蒼朮羌活治之

如久瀉腸滑不止者此濕傷元氣下陷也宜升提之藥四君子湯加升麻防風烏梅治之或用四君子湯吞下七味肉荳蔻丸亦效

如泄瀉酸臭腹痛面黃帶熱不喜飲食者此食積也先以丁香脾積丸推去其積後以集聖丸調之

如泄瀉久作渴不止者只以白术散多煎服之未有不效者

如泄瀉久目無神口喀張四肢冷好睡以四君子湯調之多服有效甚者加熟附子一小片煨乾薑服之

如泄瀉久身熱不退者只以調元湯治之此虛熱也不可妄用寒凉之藥甚者加煨乾薑即效

凡泄瀉後人事黃弱者只用集聖散服之

祖傳治泄瀉不問寒熱只用胃苓丸兼一粒金丹以車前子仝炒米湯治之

凡治久泄不止精神美好面赤唇紅者不治變成白痢者不治脈沉細遍身皮冷不乳食作渴不止者不治又成驚搐者不治大孔如竹筒不收閉者不治滑泄不止者不治大肉消瘦者不治

凡治泄瀉不問輕重只要乳食如常不生他證者則易愈

清江引

泄瀉五虛眞莫測六脈細欲絕腸滑魄戶開脾寒大皮折禁口飲食不下四（少氣也）醫得此疾眞妙手參芪朮羌附甘草石菖蒲訶皮鬱子粟若還見效都無妨蚵蛇補假如服藥全無效金液神丹妙附子與硫黃法製家傳奧起死回生滅些兒堪救療

西江月

夏月人多泄瀉腹痛煩渴相攻猪苓澤瀉茯苓仝甘草乾薑多用白术黃連滑石人參砂蔻溫中升麻提氣妙無窮更把烏梅煎送

夏月雨多傷濕宜利小便爲先猪苓澤瀉與黃連梔子茵陳解散羌活青皮枳實茯苓赤者相參木瓜蒼白术同煎黃蘗加些靈驗

泄瀉祕傳治法等閒不語時人如今傳授與兒孫勝似良田萬頃初次且行淡滲溫中以次施行三升四塞救孩嬰此法古今永定

泄瀉緣何發作只因水穀無分所以淡滲法先行小便長而泄定滑石車前赤茯人參白术猪苓甘草澤瀉與砂仁薑棗煎時作引

淡滲行而還泄須防穀氣中虛溫中丸散不須拘但要一時泄住白术人參砂蔻炙薑炙草依書烏梅熟附澤苓猪引用棗薑作主

溫中若猶不效中氣下陷須提人參白术與黃芪甘草乾薑炙取澤瀉猪苓赤茯升麻熟附烏梅柴胡白芍與當歸薑棗引兒休棄

以次升提未止此時腸滑難收塞因通用更何憂擊其惰歸可救參术炙薑炙草烏梅粟殼相扶升麻訶子芍歸求薑棗同煎溫服

法盡泄還仍舊其間吉少凶多假饒父母沒奈何要爾醫人休錯參术茯陳薑草砂仁荳蔻粟訶乾蟾蘆薈木香和赤石酢丸調可

泄瀉時常作渴白术散子如仙人參白术木香兼乾薑藿香葉片甘草茯苓七味烏梅加上同煎臨時更帶伏龍肝此法千金不換

泄瀉如常法治不須別用心機只將丸藥胃苓醫三服自然停息如此不能取效依前數法支持吾將心法教人知纔顯明醫三世

五六月間泄瀉其間寒少熱多理中丸子救沉疴玉露散調服可不效四苓作引用吞理中調和自然泄止不蹉跎活得多人念我

吐瀉

吐瀉之證有三有寒有熱有積治法略與泄門相似觀者詳之

凡吐瀉兩腮紅足脛熱好飲水身上熱此熱證也治法以胃苓丸一粒金丹仝車前草燈心湯送下

凡吐瀉面晃白足脛冷不作渴如有熱者此寒證也治法先以理中湯卽止不止便以益黃散治之或胃苓丸肉荳蔻丸治之

凡吐瀉惡食或不乳心腹痛吐瀉所出之物皆酸臭此食積也先去食積以感應丸推之後以胃苓丸調之或食脾積丸亦可

凡吐瀉日久漸漸瘦弱作渴作熱久不治必成壞證用加減補中湯治之

西江月

大凡男女吐瀉陰陽順逆當明男逢泄盛下無陰女子吐多不應出物多而數少此爲寒食相侵如逢物少數頻頻火盛細加體認

吐瀉若然同見此名霍亂陰陽只消一貼理中湯上吐下瀉了當服藥若還不效再加熟附煨薑烏梅作引是良方莫與俗人誇獎

吐瀉時時作渴諸般湯藥無宜飲湯飲水腹腫膨隆

手待觀死定急飲茯苓飲子時時與兒調停須與吐止火邪寧纔與理中對證

明魯伯嗣學嬰童百問

嘔證吐乳證

仲陽云初生下拭掠小兒口中穢惡不盡嚥入喉中故嘔吐及多生諸病嘔者有聲也吐者吐出乳也凡小兒乳哺不宜過飽若滿則溢故令嘔吐胃中納乳如器之盛物杯卷之小不可容巨椀之物雨驟則溢溢酒暴則厄翻理之必然乳母無知但欲速得乳兒長大更無時度或兒睡著而更嚥乳豈有厭足受病之原自此漸至日深導其胃氣之虛慢驚自此而得可不慎乎此候但令節乳爲上甚者宜令斷乳先此乳母可服調氣之劑兒服消食丸化乳壯胃爲上議曰吐乳呪乳此證有數般有冷有熱當自辨認若吐自口角出此是乳多消化不及滿而則溢此非病也常服消乳丸異功散當令乳母節乳爲上冷吐可服觀音散香朴散快脾等藥熱吐則頭額溫有黃涎而渴小便赤少此是熱吐多是傷暑熱者有此證乳母同服香薷散五苓散又有風痰吐乃是傷風不解吐乳夾痰若經久必然生風仍宜下疏風化痰藥竹茹湯去桂五苓散青州白丸子溫膽湯又當留心調治紫霜丸亦可服

熱吐

小兒秋夏伏暑多有熱吐何以別之或有黃涎頭額溫五心熱小便赤而少或唇乾而煩渴先令乳母服香薷散五苓散兒服竹茹湯五苓散熱甚者大柴胡湯去大黃服或小柴胡湯亦可熱極者可服大承氣湯其效如神玉露散亦可服

寒冷嘔吐嘔逆

小兒感受風冷或食生冷瓜果過多胃口停寒以致吐食吐乳宜用理中湯主之或醞乳法消乳丸異功散香朴散茯苓半夏湯一陳湯人參散麝沉散俱可服

霍亂吐瀉

小兒吐瀉有身溫者有身熱者有身涼者有吐瀉成驚風者有夏月傷暑吐瀉者有初生三日內吐瀉者仲景云小兒初生三日內吐瀉壯熱不思乳食大便青白乳食不消或白色是傷當下之後和胃仍用白餅子和胃用益黃散主之三日以後至十日吐瀉身溫涼不思乳食大便青白色乳食不消此上實虛下也用益黃散加減治之又傷風吐瀉身溫乍涼乍熱多氣兼大便黃白色嘔吐乳食不消時時咳嗽更有五臟兼見證當服入臟君臣藥先大青膏後益黃散主之又吐瀉身熱多睡能食乳飲水不止吐痰大便黃水皆爲胃虛熱渴吐瀉也當生胃中津液以止其渴止後用發散藥止渴多服白木散發散大青膏釣藤飲主之又吐瀉身涼吐沫瀉青白色悶亂不渴哽氣長出氣睡露睛此傷風茬苒輕怯因成吐瀉當補脾後發散補脾益黃散發散大青膏釣藤飲夏至後吐瀉身壯熱熱證也或因傷熱乳食嘔吐不消瀉深黃色玉露散主之五苓散亦佳香薷散車前子散可選而用之若面色青黃知風熱在脾髮直怕人眼不合是心中有毒涎更胃逆風搐可服定命丹

冷瀉

湯氏云此乃脾虛受冷致令水穀不化泄瀉注下仲陽云小兒不能食乳瀉褐水身冷無陽也當治脾益黃散主之古今不同當依加減法用之始爲穩當冷積瀉沒石子丸極效人參散理中湯加減服尤佳更加肉荳蔻則止來復丹不換金正氣散皆可觀音散銀白散加減調治乃平和之劑也

熱瀉

湯氏曰小兒熱瀉者大便黃而赤或有沫乃臟中有積或因乳母好飲酒或嗜熱物或生下傷溫蘊熱醫者不明但用荳蔻訶子等藥服之如水澆石既不識其證故不辨其冷熱用藥又不得其法焉得取效此證當以小便赤少口乾煩躁爲驗治法當用錢氏白木散去木香用之五苓散去桂亦可服其熱甚者四逆散大柴胡湯去大黃服之殊驗也更用黃連丸等劑亦佳調中湯去大黃加黃連枳殼如夾熱而瀉太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯嘔者加半夏也又有挾熱瀉利而小便祕澀赤甚者四順清涼飲主之

傷食瀉

湯氏云凡此瀉不宜便補先用消食藥或用紫霜丸取其蠲盡然後可補經云食瀉重當取疳虛用補虛治食瀉與香橘餅子加減觀音散調中湯散以意加減凡傷食瀉不可卽止宜節飲食當用進食丸取下食積令盡次以錢氏加減益黃散只一服可止此乃切要治法然後異功散四君子湯調理必取全安有腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之如冷積釀瀉用香朴散止之白朮散以和氣調胃調中散保安丸能

止傷食瀉感應丸沉香煎三稜煎皆可服

驚瀉

仲陽云慢驚病後或吐瀉胃虛或氣弱因驚眼白如淡墨下糞青黃此瀉合溫補至聖保命丹釣藤飲主之或乳隨糞下消乳丸進食丸主之或微渴心脾喘躁狂熱此瀉尤難治辰砂五苓散主之冷者定命飲子主之後與溫驚朱君散睡驚太乙丹

薛氏保嬰撮要

霍亂吐瀉

錢仲陽云吐瀉壯熱不食或乳不消是傷乳也宜白餅子下之後用益黃散和胃若吐瀉身熱多睡能乳吐痰大便黃水胃虛也先用白朮散生津止渴後用大青膏釣藤飲發散風邪若夏至後吐瀉身熱或吐乳瀉黃此傷熱乳也用玉露散之類凡瀉乳腹痛按之而哭者食積痛也用白餅子下之按之不哭者脾胃氣虛也用五味異功散補之手足指冷者脾氣虛寒也用異功散加木香傷風吐瀉者風木尅脾土也亦用前藥若飲熱乳而瀉黃者濕熱壅滯也用四苓散如不愈或反甚者元氣復傷也用白朮散瀉而腹中重堅者脾氣下陷也用補中益氣湯若服尅滯之劑而腹中窄狹者脾氣虛痞也用六君子湯若面黃瀉青脾虛而肝乘之也用六君柴胡升麻木香若多噫瀉黃心脾氣虛也用六君炮薑升麻牛下半月旬日內吐者止宜調治其母恐嬰兒臟腑脆弱不勝藥餌故也

徐春甫古今醫統

嘔吐

嘔者有聲也吐者吐出乳食也凡小兒乳哺不宜過飽若滿則溢故令嘔吐乳母無知但欲速得兒長更無時度或兒睡著而強乳自此受病之源漸至日深遂成嘔吐甚者宜漸斷乳先令乳母服調氣之劑兒服消食丸化乳壯胃爲上蓋吐乳嘔乳證有數般有冷吐有熱吐當審辨之若吐白口角出此是乳多不能消化滿而則溢此非病也常服消乳丸熱吐則頭額溫或有黃涎五心熱小便赤少或唇乾而煩渴多是暑月傷暑或致此證乳母服香薷散五苓散兒服香薷湯五苓散冷吐則清涎夾乳吐出小便清而多由乳母當風取涼解脫致令風冷之氣入乳令乳變敗兒飲之則冷氣入胃故嘔吐也乳母宜揀去舊宿乳服理中湯快氣助胃之劑次用釀乳法茯苓半夏湯加減觀音散快胃之藥又有風痰吐者乃是傷風不解吐乳夾痰久必生風宜服青州白丸子半夏散疏風化痰之劑

瀉泄

瀉泄乃脾胃類病凡飲食寒熱三者不調此爲內因必致瀉泄又經所論春傷風夏飧泄夏傷暑秋傷濕皆爲外因亦致泄瀉醫者當於各類求之毋徒用一止瀉之方而云藥可施治此則誤兒豈淺云耳若不治本則瀉雖暫止而復瀉轆轤誤既久脾胃益虛變生他證良醫莫救

霍亂吐瀉

脾爲中州胃爲水穀之海乳哺入胃脾能尅化然後水穀分其清濁傳變得宜則無吐瀉之患凡小兒上吐不止下瀉不住皆因內外傷飲乘以調護失常乳食不節遂使脾胃虛弱清濁相干蘊作而成有先瀉而後吐者乃脾胃虛冷其候先瀉白水吐亦不多口氣微而神色慢額前有汗六脉沉濡此爲冷也先吐而後瀉者乃脾胃有熱氣促唇紅吐來面赤脉洪而數渴飲水漿此爲熱也冷熱之分須要詳審

傷風吐瀉身溫乍寒乍熱氣多粗大便黃白色嘔吐乳食完穀不消時咳嗽更五臟兼見證宜先服釣藤散後用益黃散香朴散主之及有吐瀉身熱多睡能食乳飲水不止吐痰大便黃水皆爲胃虛熱渴瀉也當生胃中津液以止其渴後服發散止渴多服白朮散釣藤散吐瀉身涼吐沫青白色悶亂不渴氣腫露睛當補脾宜加減四君子湯藿香散銀白散主之夏月傷暑吐瀉手足厥冷者理中湯藿香正氣散五順散車前子散不換金正氣散可選而用之如吐瀉之盛有風搐欲成慢候可看慢脾方論治之

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百五十五卷目錄

醫部彙考四百三十五

小兒吐瀉門二

王肯堂證治準繩 吐瀉 夏秋治裏 冬春治表 身熱瀉黃多渴爲熱宜涼劑 肢冷瀉清不渴爲寒宜溫藥 肢溫瀉黃白似渴爲寒熱雜合病 宿食 心腹痛 禁忌 吐 寒吐 熱吐 毒氣吐 傷乳吐 瀉 冷瀉 熱瀉 傷食瀉 驚瀉 暴瀉 久瀉 喉瀉

小兒衛生總微論方 吐瀉 吐噦哽 瀉 吐瀉 傷風吐瀉 傷食吐乳 冷熱吐瀉

陳治幼幼近編 吐瀉

藝術典第四百五十五卷

醫部彙考四百三十五

小兒吐瀉門二

明王肯堂證治準繩

吐瀉

小兒吐瀉併作卽名霍亂有心痛而先吐者有腹痛而先瀉者莫不由中焦而作上焦主納而不出中焦主腐化水穀而生榮衛灌溉百骸下焦分別水穀主出而不納脾居中州胃爲水穀之海乳哺入胃脾能尅化然後水穀分（臍上一寸有分水穴）傳變得宜豈有吐瀉之患凡小兒吐瀉皆因六氣未完六淫易侵兼以調護失宜乳食不節遂致脾胃虛弱清濁相干蘊作而然有先瀉而後吐者乃脾胃虛冷其候先瀉白水吐亦不多口氣緩而神色慢額前有汗六脉沉濡此爲冷也有先吐而後瀉者乃脾胃有熱氣促脣紅吐來面赤脉洪而數渴飲水漿此爲熱也冷熱之分要須詳審

吐瀉昏睡露睛者胃虛熱白朮散和中散主之

吐瀉昏睡不露睛者胃實熱錢氏玉露散河間益元散主之

夏秋治裏

小兒初生三日內吐瀉壯熱不思乳食大便乳食不消或白色是傷寒當下之併和胃下用白餅子和胃用益黃散主之

兒生三日已上至十日吐瀉身溫涼不思乳食大便青白色乳食不消上實下虛也更有五臟兼見證

肺睡露睛喘氣

心驚悸飲水

脾困倦饒睡

肝呵欠煩悶

腎不語畏明

當先視兒兼臟證先瀉其所實者而補其虛如脾虛益黃散主之此二證多病於秋夏也

凡小兒盛暑吐瀉邪熱在下焦則瀉在上焦則吐亡津必渴用玉露散雖吐時時與啜之過三日必愈

如身熱脉大小便黃用五苓益元各半熱湯調溫服之

如身涼脉細小便青早晨益黃散午後玉露散

如過四五日困弱宜異功散和中散開胃丸

如有風而瀉用防風羌活謂吐瀉兼肝病風搐拘急也

有熱而瀉用黃連黃芩大黃謂吐瀉兼心病身熱也

有寒而瀉用附子謂吐瀉兼腎病身冷或足脛寒而逆也

有濕而瀉用白朮茯苓謂吐瀉兼本臟脾病多睡體重昏倦也

有肺病而瀉用芍藥桂心定喘麥冬人參甚者多檳榔大便不通加大黃謂吐瀉兼肺病喘嗽也

更詳看病新舊新則止之久則有腸風之患宜推陳致新法當宣風散導過後用入臟君臣藥調之宜益黃散

有小兒盛夏初秋遇夜乘風渴而飲水過餐生冷果物攻激腸胃遂乃暴吐暴瀉傳作手足俱痹筋攣而痛痛則神志不寧以驚證治之誤矣所謂筋遇寒則引縮又以陽明養宗筋屬胃與大腸因內傷生冷飲食外感風邪吐瀉交作胃氣因虛不能養其宗筋亦致攣急此證口氣溫面色慘脉沉緩再以手按兩膝腕下見筋縮而引於皮間是其候也治以理中湯加附子半生半炮水薑熱煎空心溫服更詳虛實冷熱爲治可也

有數歲小兒忽患吐瀉始自夏秋晝近極熱之地解衣乘涼夜臥當風之所致蓋先感熱後感冷陰陽相搏氣射中焦名爲霍亂活人書用香薷散調治以其

能分別水穀升降陰陽熱多欲飲水者五苓散寒多不飲水者理中丸詳此治法得非欲平中焦乎

凡暑令吐瀉手足指熱作渴飲冷者屬陽證宜清凉之劑手足指冷作渴飲熱者屬陰證宜溫補之劑凡病屬陰證誤用寒凉者死則手足青黯或遍身皆然

冬春治表

傷寒吐瀉身溫乍凉乍熱睡多氣粗大便黃白色嘔吐乳食不消時咳嗽更有五臟兼見證當煎入藏君臣藥先服大青膏後服益黃散如先曾下或無下證愼不可下此乃脾肺受寒不能入脾也

潔古云身溫吐瀉咳嗽是風木入於脾母虛其子亦弱法當煎檳榔豆蔻湯下大青膏後服益黃散

傷風吐瀉身熱多睡能食乳飲水不止吐痰大便黃水此爲胃虛熱渴吐瀉也當生胃中津液以止其渴止後用發散藥止渴多服白术散發散大青膏主之身熱而嘔者當服白术散後煎檳榔木香湯下大青膏

傷風吐瀉身凉吐沫瀉青白色悶亂不渴嗄氣長出氣睡露睛此傷風在再輕怯因成吐瀉當補脾後發散大青膏主之此二證多病於春冬也

潔古云身凉吐瀉不渴者則知爲寒煎附子桂枝湯下大青膏

小兒傷於風冷病吐瀉醫謂脾虛以溫補之不已復以凉藥治之又不能散謂之本傷風醫者亂攻之因脾寒積虛內不能散外不能解至十餘日其證多睡露睛身溫風在脾胃故大便不聚而爲瀉當去脾間風風退則痢止宜風散主之後用史君子丸補其胃亦有諸吐瀉久不瘥者則脾虛生風而成慢驚矣

吐瀉過多脾胃虛乏欲生風候者四君子加白附子減半生薑煎服

身熱瀉黃多渴爲熱宜凉劑

曾氏云先吐而後瀉者乃脾胃有熱氣促脣紅吐來面赤脉洪而數渴飲水漿此爲熱也錢氏以吐瀉身熱瀉黃多渴作熱病治在夏秋用玉露散益黃散相間服在春冬用白术散大青膏相間服

肢冷瀉青不渴爲寒宜溫藥

曾氏云先瀉而後吐者乃脾胃虛冷其候先瀉白水或白凍吐亦不多口氣緩而神色慢額前有汗六脉沉濡此爲冷也錢氏以吐瀉身凉瀉青不渴作寒病在秋以益黃散主之在冬春以益黃散大青膏相間服

吐利四肢脹逆腦門低陷四君子加藿香丁香芍藥等分煎服

肢溫瀉黃白似渴爲寒熱雜合病

錢氏治法在夏秋用玉露散益黃散相間服在冬春用益黃散大青膏相間服

宿食

錢氏云吐瀉乳不化傷食也宜下之馮承務子五歲吐瀉壯熱不思食飲錢氏見目中黑睛少而白睛多面色恍白曰此子必多病面色恍白者神怯也黑睛少者腎虛也黑睛屬水本怯而虛故多病也縱長成必肌膚不壯不耐寒暑易虛易實脾胃亦怯更不可縱恣酒慾若不保養不過壯年也面上常無精神光澤者如婦人之失血也今吐利不食壯熱者傷食也又虛怯不可下下之虛入肺則嗽入心則驚入脾則瀉入腎則益虛但宜以消積丸磨化之爲微有食也如傷甚則可下不下則成癖也若實食在內亦可下也下畢補脾必愈隨其虛實無不效者

錢氏曰吐乳瀉黃是傷熱乳吐乳瀉青是傷冷乳皆當下之此迎奪之法也不若傷熱者用五苓散以導其逆傷冷者用理中湯以溫其中自然平復

脾經積滯未除再爲飲食所傷不吐則瀉不瀉則吐宜以三稜散化積守胃散和中

心腹痛

兒冷熱不調乳哺不節使陰陽清濁之氣相干而變亂腸胃間則成霍亂而心腹痛者冷氣與眞氣相擊或上攻心下攻腹故痛

禁忌

鄭氏云小兒吐瀉因外傷風冷內傷乳食或兒啼未定氣息未調以乳飼之氣逆於上則停滯胃腸致令嘔吐氣逆於下則傷脾胃致令泄瀉上下氣逆吐瀉俱作凡小兒只吐不瀉者逆其吐必有痰發驚者十無一生若只瀉不吐或吐瀉俱發者日久不退亦變陰癇治之乃暫斷其乳輕者週時重者三日宜頻與稀粥服藥速效十全八九或者不信是言以小兒藉乳爲命不肯暫斷然乳固不可斷也殊不知因乳所傷得之者若再以傷之乳乳之如抱薪救火藥何功之有其間有不斷服藥得安者蓋輕患也亦有因輕致重夭橫者多矣

活幼心書云小兒吐瀉不止大要節乳徐徐用藥調

治必安節者撙節之義一日但三次或五次每以乳時不可過飽其吐自減及間以稀粥投之亦能和胃屢見不明此理惟欲進藥以求速效動輒斷乳三四日致餒甚而胃虛啼聲不已反激他證蓋人以食爲命後非乳不活豈容全斷其乳然乳卽血也血屬陰其性冷吐多胃弱故節之醫者切須知此乳母亦宜服和氣血調脾胃等藥愚意不若兒大能食者全斷之待其平復兒小不能飲食者但節之可也

吐

吐沫及痰或白綠水皆胃虛冷

吐稠涎及血皆肺熱

吐水不止者屬心痛胃冷

吐水心痛者蟲痛

口中吐沫水者後必蟲痛

面恍白無精光口中氣冷不思食吐水當補脾益黃散主之

冬月吐蚘多是胃虛寒而蟲作吐用錢氏白术散加丁香二粒亦可用理中湯去甘草加烏梅肉川椒

嘔吐皆主脾胃古人謂脾虛則嘔胃虛則吐是也嘔者有聲無物吐者有物無聲若手足指熱喜飲熱湯或睡而露睛皆胃氣虛弱也用異功散若手足指熱飲冷或睡不露睛屬胃經實熱也用瀉黃散若作渴少食或小便色赤胃經虛熱也用七味白术散大凡嬰兒在乳母尤當節飲食若乳母停食亦能致兒吐瀉故不可不慎也

論吐之原難以枚舉有冷吐熱吐積吐傷風噦吐傷乳吐其吐則同其證有異各述於後

冷吐乳片不消多吐而少出脈息沉微面白眼慢氣緩神昏額上汗出此因風寒入胃或食生冷或傷宿乳胃虛不納而出宜溫胃去風除宿冷用當歸散水煎薑陳皮煎服或間投冲和散理中湯及薑橘湯定吐飲如諸藥不效以參香飲治之

熱吐面赤唇紅吐次少而出多乳片消而色黃遍體熱甚或因暑氣在胃或食熱物精神不慢而多煩躁此熱吐也宜解熱毒用大順飲溫熱水空心調下井五苓散小柴胡湯並加薑汁緩服及香蘇散主之誤服熱藥先投菜豆飲解之次服止吐之劑

積吐眼泡浮面微黃足冷肚熱晝輕夜重兒大者脈沉緩此宿冷滯脾故吐黃酸水或有清痰脈實而滑爲食積所傷吐酸餿氣或宿食并出兒小者喫乳不化是也先用五苓散薑汁溫湯調下和解次以烏犀丸主之最小者投三稜散化癖丸

傷風噦吐有熱生風有風生痰痰結胃中肺氣不順連噦不止和痰吐出此爲噦吐痰壅而作乃爲實證宜去風化痰先投清肺飲次小柴胡湯爲治若噦久而肺虛土不生金故面白唇燥乾噦乾嘔而無痰可溫補爲上用茯苓厚朴湯惺惺散如意膏爲治

傷乳吐纔乳哺後卽吐或少停而吐此因乳飲無度脾氣弱不能運化故有此證譬如小器盛物滿則溢治法宜節乳投三稜散

此外又有風痰吐乃是傷風不解吐乳夾痰若多必要生風宜服青州白丸子半夏散疏風下痰之劑皆可服之

毒氣吐詳見後

夾驚吐張溪三香丹之類

癖積吐出本事方

凡雀亂吐不止者伏龍肝細末二錢以盧穀米炒黃煎湯調下立止或用白扁豆炒過煎湯調下亦好若白扁豆嫩苗更好

寒吐

小兒寒吐者由乳母當風取凉解脫致令風冷入乳變敗兒若飲之故嘔吐也乳母當食後捏去舊宿敗乳急服理中湯次用釀乳法其候是寒清痰夾乳吐出是也凡有此候服藥不效胃氣將絕藥不能下當服靈砂丸如大便通宜來復丹二藥常用驗

寒吐之證面目脹額汗出脈沉遲微寒氣停於胃故胃不納而吐出也噦逆者由胃氣虛甚過服尅伐使清氣不升濁氣不降以致氣不宣通而作也風寒在胃者用理中丸胃氣虛者六君子湯風凉所致者宜捏去敗乳急服理中丸次服釀乳法若嘔吐清涎夾乳而吐小便清利用大安丸若因乳母食厚味用東垣清胃散若乳母飲醇酒用葛花解醒湯飲燒酒服冷米酢三五杯乳母食生冷而致者用五味異功散乳母停食者母服大安丸子服異功散乳母勞役者子母俱服補中益氣湯乳母怒動肝火者用加味逍遙散乳母鬱怒傷脾者用歸脾湯乳母脾虛血弱者用六君芎歸其子亦服三五滴氣血虛而乳熱者子母俱服八珍散仍參熱吐霍亂治之

熱吐

小兒秋夏伏暑多有熱吐其吐黃涎頭額溫五心熱小便或赤而少乃熱吐也或乾嘔無物宜香薷飲

小兒熱吐者因多食甘甜炙煿之物或乳母膏粱厚味胃經積熱或夏間暑氣內伏於胃所致若肌肉瞤動煩熱作渴者暑傷胃氣也先用香薷散次用竹茹湯若吐乳色黃不能受納者胃經有熱也先用瀉黃散次用人參安胃散若吐出酸穢者乳食內停也用保和丸吐乳不消者胃氣弱也用異功散吐而少食腹痛欲按者脾氣虛也用六君子加木香凡諸證當驗其手指熱則胃熱冷則胃寒熱用瀉黃散寒用理中湯不熱不寒異功散調之

毒氣吐

巢氏云春夏以湯與兒腸胃脆弱不勝藥勢遂吐下不止藥熏藏腑煩憫頓乏爲中毒氣吐下

傷乳吐

乳下嬰兒乳哺太過或兒睡著而更嚙乳豈有脈足以致脾不能運胃不能受滿而溢故令嘔吐長此不已遂致慢驚可不慎乎此候但令節乳爲上甚者宜暫斷乳先令乳母服調氣之劑兒服消乳丸化乳消食爲上若吐自口角出即是乳多不能消化滿溢之證非病也不可妄投他治吐藥凡吐乳直出而不停留者謂之嗯乳但以炒麥芽三錢橘紅一錢丁香三分水煎服之立止

瀉

論瀉之源有冷瀉熱瀉傷食瀉水瀉積瀉驚瀉風瀉臟寒瀉疳積釀瀉種種不同各分於後

冷瀉多是白水瀉密而少腹痛而鳴眉皺目慢面帶白色額有汗多用冲和飲當歸散合和水煨薑煎服并守中湯參苓白朮散益中膏沉香檳榔丸治之

熱瀉大便黃色如筒弔水瀉過即止半日復然心煩口渴小便黃少食乳必粗先用五苓散或大順飲次以錢氏白朮散主之香薷散亦佳

傷食瀉乃脾胃素弱復爲生冷果食所傷故大便不聚而瀉或因乳母餐生冷肥膩之物自乳而過亦能作瀉面唇俱白瀉稀而少或如壞鷄子腥臭異常身形黃瘦宜先溫正胃氣次理積而後固脾冲和飲當歸散合和煨薑棗子煎服理積兒大者烏犀丸小者化癖丸三稜散固脾和中散醒脾散

水瀉謂之洞泄乃陰陽不順水穀不分瀉黃水而小便少番次密而無度是夏秋之際晝則解衣取凉夜則失蓋感冷冷熱相激清濁渾亂或因母自熱中來乳有熱氣遽以哺之令兒脾胃不和水穀交雜而下以哎咀五苓散加薏苡仁車前子半夏木薑煎服分正陰陽或先用大順飲溫白湯調下香薷散調中止補錢氏白朮散六和湯亦好

積瀉脾氣虛弱乳食入胃不能運化積滯日久再爲冷食所傷傳之大腸遂成泄瀉留連不止諸藥無效蓋以積在脾胃積既未除何由得愈宜先除積後止瀉瀉止實脾則病除矣三稜散烏犀丸續用沉香檳榔丸參苓白朮散和中散香橘餅調理

驚瀉糞青如苔稠若膠粘不可便止但鎮心抑肝和脾胃消乳食斯爲治法先投五苓散次用三稜散水薑倉米煎服或三解散神麴生薑煎湯調服及沉香檳榔丸不驚丹調治

風瀉慢驚大病後有之其糞稀黃褐色或夾食不消乳食同下此因脾虛所致或夾黑褐色者屬腎蓋脾虛爲腎水所乘故也若久不進飲食再有驚搐宜疏腎水去脾風次補脾則自愈庶無復作之患疏腎水哎咀五苓散加黑牽牛半生半炒并薏苡仁木薑煎服去脾風瀉黃散調脾氣參苓白朮散

臟寒瀉糞如青竹色不稀不稠或下青水未瀉時腹痛而鳴叫哭方瀉多是生來三五月內有此周歲則無始因斷臍帶短風冷自外遍內而成此疾先用冲和飲水葱白煎投溫中解表次以當歸散水煨薑煎服及投勻氣散理中湯

疳積釀瀉其候面色痿黃腹脹脚弱頭大項小髮稀且豎肌肉消瘦不思飲食晝凉夜熱或腹內有癥癖氣塊瀉則顏色不等其臭異常其瀉有時或一月半月旬日一番自瀉自止名爲疳積釀瀉先以當歸散加三稜陳皮水薑煎服次投烏犀丸沉香檳榔丸及化癖丸蘆薈丸沒石子丸兒最小者難下丸子止投三稜散快膈湯自然痊愈

若瀉或痢青色甚而淡黃夾白寒多熱少此陰邪勝陽宜用守中湯胃苓湯與服扶表救裏方進當歸散加陳皮紫蘇水薑糯米煎服亦宜和解理中湯清米飲空心調服溫脾去濕益氣清神寒盛者理中湯內加熟附子水薑棗煎服次投南星腹皮飲水薑煎服和脾胃去陰邪

若瀉或泄色青淡而有沫黃稠熱多寒少亦致面黃肌瘦煩躁不寧宜以哎咀五苓散加薏苡仁車前子水薑煎服解散餘邪仍用茵陳蒿梔子仁煎湯調細末五苓散溫服退黃色消陽毒及當歸散水薑棗煎投或服萬安飲四神丸

冷瀉

湯氏云冷瀉者乃脾胃虛寒水穀不化而泄錢仲陽云小兒不能食乳瀉褐色身冷無腸也當用益黃散加減治之大便青白口不煩渴冷積瀉也理中湯主之若口鼻吸風寒之氣脾胃受生冷之食而作者先用理中湯後用異功散命門火衰不能溫蒸中州之氣故脾胃虛寒者用益黃散及八味丸脾胃虛弱者五味異功散脾氣下陷者補中益氣湯脾氣虛寒者人參理中湯寒水侮土者益黃散肝木乘脾者四君柴胡散手足拘冷者加木香乾薑治者審之

丹溪云瀉青亦是寒宜用蘇合香丸平胃散各等分蜜湯調服

田氏云便青者因驚風內藏脾氣不和宜白术湯

熱瀉

薛氏云右頤色赤飲冷胃經實熱也用瀉黃散惡冷喜熱胃經虛熱也用白术散右腮及額間俱赤心脾熱也用瀉黃散加炒黑黃連若左頰右腮俱赤肝火乘脾土也用四君子湯加柴胡若兒暴傷乳食用保和丸乳母尤當忌厚味節飲食若乳母停食所傷致兒吐瀉等病當治其母大抵始病而熱者邪氣勝則實也終變爲寒者眞氣奪則虛也久病而熱者內眞寒而外假熱也久瀉元氣虛寒當參前證治之

傷食瀉

東垣云傷食則惡食小兒食瀉者因飲食傷脾脾氣不能健運故乳食不化而出若噯臭吞酸胃脘脹滿腹痛按之益痛者雖作瀉而所停滯之物尚未消也用保和丸腹痛按之不痛者乳食已消也用異功散脾氣傷而未復不思飲食者用六君子湯所傷生冷之物及喜熱者並加木香乾薑乳食已消腹痛已止瀉尚未止者脾失清升之氣也用補中益氣湯餘有別證當察各門

錢氏云黃承務子一歲病傷食而瀉粟腐與止之十餘日便青白乳食不消身涼加哽氣昏睡成慵困篤名錢錢先與益黃散補肺散各三服三日身溫而不哽氣後以白餅子微下之又與益脾散二服利止何以然利本脾虛傷食初不與下之留連十日上實下虛脾氣弱則引肺亦虛脾肺子母故也今先補脾則肺病自退卽身溫不哽氣也然後下其所傷或曰何不先下後補曰便青爲下臟冷若先下必大虛今先實脾而後下則不虛矣後更與補之乃安

驚瀉

仲陽云慢驚病後或吐瀉胃虛或氣弱因驚眼白如淡墨下糞青黃此瀉合溫補至聖保命丹釣藤飲主之或乳隨糞下消乳丸進食丸主之或微渴心脾喘燥狂熱此瀉尤難治辰砂五苓散主之冷者定命飲子治之後與溫驚朱君散睡驚太乙丹

小兒驚瀉者肝主驚肝木也盛則必傳尅於脾脾土既衰則乳食不化水道不調故泄瀉色青或兼發搐者蓋青乃肝之色搐乃肝之證也亦有因乳母脾虛受驚及怒動肝火而致者經曰怒則氣逆甚則嘔血及飧泄法當平肝補脾愼勿用峻攻之藥脾氣益虛肝邪彌甚則抽搐反張者亦肝火熾盛中州虧損之變證也凡見驚證只宜用四君六君異功散等方加白附子定風柴胡平肝引經以杜漸則必不致瀉搐而自安矣今已見吐瀉驚搐尚不知補脾平肝以保命抱龍鎮驚等藥治之其亦去生遠矣

暴瀉

巢氏云小兒卒利者由腸胃虛暴爲冷熱之氣所傷而爲卒利熱則色黃赤冷則色青白若冷熱相交則變爲赤白滯利也

久瀉

大法補虛消積

鳳髓經歌云脾中有積熱遲留致使終年瀉不休項軟見人多哽氣更兼清水鼻中流少間有似黃金色若有垂腸更不收形證又看胃膈上胃前深赤汗如油脣赤生瘡眼脈赤若不調脾命卽休

飧瀉

醫書謂之水穀瀉食不消脾胃冷故不能消化當補脾益黃散主之

乳食不消初病忽然氣出冷四肢亦冷面目無光澤精神不定此乃胃氣不和可以大溫藥治之史君子丸益黃散主之

若病泄瀉日久不瘥乳食不化是脾胃有風冷先服益黃散二服後用宣風散導之胃宜再補宜參大科飧泄門用之

小兒衛生總微論方

吐瀉

小兒吐瀉者皆由脾胃虛弱乳哺不調風寒暑濕邪干於正之所致也其證不一今條叙之

吐嘔呃

吐逆自生下便吐者此是兒初生之時拭掠口中穢

血不盡因咽入喉故也

吐逆胃脘滿悶氣急者此因兒啼哭未定氣息未勻乳母忽遽以乳飼之兒氣尚逆乳不得下停滯於胃脘之間因更飲乳前後相沓氣不宣通故氣逆而乳隨出之爲吐也宜調其氣而止吐古書亦曰大哭之後食乳者多成吐瀉也

吐逆腹脹喘息乳不化夾青水面青唇白者此因乳母胃寒取涼食冷飲寒致冷氣入乳變壞其汁而不捻去仍以飼兒或能食者因以冷物飼之其冷乳冷食入腹與氣相搏傷於脾胃則氣逆而吐也其證若此宜溫胃止吐調氣若傷重有停滯者以穩藥磨化不可缺下恐脾胃愈虛而生風也凡風冷變壞之乳當捻去之暫斷乳兒令乳母服藥溫腹然後飼兒若不捻去非只令兒吐逆腸胃虛者冷因得入亦下利也

吐逆身熱吐奶成片子者胃有熱也此因乳冒熱或因飲酒熱入其乳變壞其汁而不捻出仍以飼兒或兒乘熱哺啜致熱氣入胃與氣相搏致氣逆而吐也其證若此如久有積熱者必四肢生瘡多渴而面黃宜微下之虛者以穩藥磨化後調其氣

吐逆身熱鼻青呵欠煩悶口中氣熱夜間發躁者此傷風吐也因解脫失宜風冷襲之搏於血氣故身熱呵欠煩悶口中氣熱也氣不得順故逆而作吐也宜調氣止吐發散風冷

吐逆唇黑面黃多啼有痰吐氣臭者此脾胃有傷也宜先下之後調其氣

吐逆早晚發熱睡臥不安者此驚吐也心熱則生驚故睡臥不安而神不寧也心神不寧則氣血逆亂而吐也宜與鎮驚去熱止吐

吐逆面恍白無精光口中氣冷口頻撮不思乳食吐水者胃氣不和也宜補脾胃

吐逆痰涎色黃稠黏上壅者胃熱也若吐痰涎白涤或吐沫者胃虛冷也熱者宜微利之冷者宜溫補之

吐逆痰涎及有血者此肺熱也久則肺虛成痿昔錢乙治段齋郎子四歲身熱吐痰嗽數日而咯血他醫以桔梗湯防己圓治之不愈涎上攻吐喘不止遂請乙治乙下褊銀圓一大服復以補肺湯補脾散爲治乙曰此子咯血肺虛也肺雖咯血有熱故也久則虛痿今涎上潮而吐當下其涎若不吐涎則不甚便蓋吐涎能虛又生驚也痰實上攻亦能發搐依法只宜先下痰而後補脾肺必涎上而吐愈爲順治也若先補肺爲逆耳乙所用藥方本集載之此所謂識病之輕重先後爲治也

嘔哕者比吐逆異也吐者乃邪搏胃氣逆而上行穀不能傳化隨氣出也嘔者但氣逆而欲吐吐則穀無所出故俗謂乾嘔也哕者乃兒因吮乳汁過多胃滿而上溢出也故俗呼謂之噫妳當便與空乳令吮即定若頻久吮之亦能爲病

瀉

瀉色白者冷瀉也此由小兒腸胃虛弱因解脫風冷干之或因食寒飲冷入於腸胃冷氣相搏爲利下也其色白面白或腹痛者並宜調中若又傷風冷前後重沓冷甚則瀉不止而爲泄注也

瀉色赤者熱瀉也此由小兒腸胃本挾虛熱而風冷乘之入於腸胃之間熱氣相搏而爲利下故其色赤也宜微下之以導其熱後調其氣

瀉色乍赤乍白或水或穀者此冷熱瀉也由小兒腸胃先因有冷而復傷熱或先因有熱而復傷冷腸胃宿虛冷熱交攻而爲利下宜調其冷熱和養其氣

瀉色黃赤紅黑者皆熱也赤黑者有毒並微下之然後調氣

瀉色青發熱有時睡臥不安者此驚瀉也小兒糞黃脾胃土之本色也色青肝木爲風肝木來刑脾土宜早治之不爾則變脾風而發瘈瘲則難治也所謂糞青者須纔便下便色青是也若初下時黃良久乃青者非也小兒安者皆然不可認爲青糞也若瀉色青白穀不化者此謂冷也宜溫補脾胃發散風冷

瀉濃下色赤白腹大上青筋見髮稀饒啼或嘔泥土時有蛔蟲此疳瀉也宜止瀉退疳

瀉多日脣口及糞色皆白糞頗多者久因成冷脾胃衰困恐變脾風發痫宜防備溫養補助脾胃

瀉於暑熱時多患者謂時熱及飲食皆冷故也不傷於熱必傷於冷若傷熱伏暑而瀉者則心臟煩熱必小便不利清濁不分瀉色赤黃宜利小便解暑熱若小便快而瀉者冷瀉也色必青白穀不化宜溫脾胃止瀉

瀉者不可急以熱藥止之多變爲痢而下膿血也當審察冷熱證候詳度緩急施治也

吐瀉

吐瀉多病於春夏秋三時惟冬時絕少者蓋吐瀉皆因脾胃虛冷熱所致以冬時陽氣在內多食溫暖少

因水漿故也設有患者必因傷於乳食也若春時病吐瀉者多因於風夏時病者多因於熱秋時病者多因於冷凡治吐瀉者必當審其時候觀其形證察其溫凉寒熱如此則無誤矣

傷風吐瀉

傷風吐瀉身溫乍凉乍熱呵欠煩悶多睡口中氣粗如先已曾經下或無下證慎不可下也此由脾肺受寒不能入脾也更有五臟兼見之證發散者大青膏服之補脾者後服益黃散此錢乙所用藥也

傷風吐瀉身熱多睡能乳呵欠煩悶口中氣熱飲水不止吐痰大便黃水此爲胃虛熱渴吐瀉也當生胃中津液以止其渴錢乙用白朮煎湯服之然後發散風冷亦用大青膏又云吐瀉昏睡露睛者胃虛熱也吐瀉昏睡不露睛者胃實熱也

傷風吐瀉身凉吐沫瀉青白色呵欠悶亂不渴哽氣長出氣睡露睛此傷風荏苒輕怯因成吐瀉當先補脾錢乙先用益黃散後發散其風用大青膏此二病於春冬多也

傷食吐乳

吐瀉乳食不化其吐及糞皆有酸臭氣者此傷食吐瀉也凡吐乳瀉黃赤者傷熱乳食也若吐乳瀉青白者傷冷乳食也並宜微下之後和胃氣虛者以緩化滯藥漸磨化之

吐瀉在初生三日內壯熱不乳大便乳不消化或白色者是傷乳當微與下後和胃氣虛者以緩化滯藥漸磨化之

吐瀉在初生三日已上至十日身溫凉不思乳大便青白乳不消化此上實下虛也更有五臟兼見證瀉其所實者而補其脾胃虛者也

吐瀉有兼臟證者兼肺則睡露睛喘氣兼心則驚悸飲水兼脾則困倦饒睡（吐瀉乃脾胃之本病）兼肝則呵欠煩悶兼腎則不語畏明

冷熱吐瀉

吐瀉在五月中已後身壯熱者此熱也小兒臟腑中十分中九分熱此因傷熱乳或胃熱入內吐乳不消瀉深赤色宜與解熱錢乙用玉露散

吐瀉在六月中已後身大溫而似熱臟腑中六分熱四分冷也嘔吐乳食不消瀉色黃多白少似褐或食乳或不食乳宜少補脾而大解熱錢乙少用益黃散多用玉露散更宜審察冷熱如兒大熱瀉色赤黃者此熱多依五月中後治之

吐瀉在七月中已後身溫臟腑中三分熱七分冷也不能食乳多似睡悶亂哽氣長出氣睡露睛昏白多惋而不渴錢乙於食前令多服補脾益黃散於食後少服解熱玉露散更宜相度冷熱若身大溫瀉後黃者依六月中已後治也

吐瀉在八月中已後身冷無陽也不能食乳乾嘔瀉青褐水錢乙只用益黃散補脾不可下

吐瀉所論冷熱時月此以中原之地言今較之江浙則氣候不同今江浙之地二三月尚寒四五月溫暖六月入伏之後纔熱七月熱盛八月熱尚未退雖冬月晴多便暖雖夏月陰多便寒不可槩以中原冷熱時候便爲定論經所謂東西南北之異地溫凉寒熱之異宜況每歲寒熱自隨時令早晚難以拘定月日也候之者乘其至也謂至其熱則從熱治至其溫則從溫治至其寒則從寒治至其凉則從凉治此乃隨四時之氣各適其宜

吐瀉於夏秋大熱之時伏暑傷冷則心臟煩躁小便不利清濁不分陰陽二氣相干名曰氣亂亂於腸胃之間名曰霍亂其證乘熱傷冷氣逆而喘腹脅脹滿身熱脈亂頭痛體疼如傷寒之狀上卽大吐下卽大瀉重者四肢厥冷脚腕轉筋法當調順其氣分別清濁升降陰陽若只伏暑吐瀉者則小便不利其證雖與上證稍同而輕非霍亂比瀉色赤黃此但只名伏暑吐瀉不爲霍亂也

治霍亂吐瀉若熱多而渴者五苓散寒多不渴而心腹身體疼痛及煩躁渴不能飲者可服理中湯寒甚腹痛轉筋四肢拘急者理中湯加附子汗出惡寒手足厥冷下利清穀內寒外熱脈微欲絕者並四逆湯已上諸證病可與香薷散服之以他藥不能療此證也治伏暑吐瀉若小便不利與五苓散利小便及與香薷散解伏暑坯蓮散救生丹止吐

吐瀉不拘何時則令脾胃虛弱多致生風而爲脾風慢驚也以脾土衰而肝木來刑故爾當補脾胃不令困弱則風不生而病易愈也

吐瀉已定未定煩渴者皆津液內耗也不問新久宜煎錢乙白朮散使滿意取足飲之多卽愈好不爾卽津液內耗而引飲不止內生其熱外邪相干則證變百端以成他病漸至危困也

陳治幼幼近編

吐瀉

小兒吐瀉有熱有寒有虛有積有驚但因乳母所傷而致者爲多凡手指熱則胃熱手指冷則胃寒腹痛欲按者屬虛不可按者屬實寒者氣暖神清面白肢冷吐乳不消糞色青白宜理中湯或異功散加藿香肉果砂仁熱者食乳即吐四肢五心煩熱唇紅作渴糞沫焦黃小便赤少瀉黃散加木通滑石傷暑者藿香飲或五苓散傷乳食者昏睡噯氣不思乳食肚熱脚冷吐出酸穢瀉如敗卵腹不可按宜保和丸或平胃散加麴芽半夏丁香傷風者身溫乍熱乍寒咳嗽氣急天麻散加防風虛者睡則露睛吐乳不消瀉糞不變懶食乳食手指常冷腹痛喜按異功散白术散助胃膏驚者面色青黃乳食不化泄瀉青色宜六君子湯加柴胡鈎藤木香大抵先吐後瀉者多屬於熱先瀉後吐者多屬於虛有但吐不瀉但瀉不吐者宜於大方脉中參治又當根其致病之由而藥之不可拘於吐瀉上著力也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百五十六卷目錄

醫部彙考四百三十六

小兒吐瀉門三

方
白术圓 藿香湯 五味異功散 益黃散
人參安胃散 七味白术散 四君子湯
四物湯 八珍湯 十全大補湯 六君子湯
補中益氣湯 香砂助胃膏 人參養胃湯
四神丸 五苓散 玉露散 木瓜丸
梓朴散 二氣散 二陳湯 肉荳蔻丸 調元湯
威應丸 脾積丸 一粒丹 補眞丸
胃苓丸 一粒丹 消乳丸 又方 消食丸
觀音散 香朴散 竹茹湯 蘇合香丸
青州白丸子 溫膽湯 紫霜丸 香薷飲
理中丸 釀乳法 消乳丸 茯苓半夏湯
人參散 麝香散 白餅子 大青膏 釣藤飲
車前子散 定命飲子 不換金正氣散
二順散 釀乳法 沒石子丸 來復丹
銀白散 藿香散 大柴胡湯 黃連丸
四逆散 調中湯 黃芩湯 四顆清涼飲
香橘餅 全蠍觀音散 調中散 進食丸
生薑瀉心湯 保安丸 泥香煎 三稜丸
杏霜丸 赤痢甘草湯 至聖保命丹 釣藤散
定命飲子 朱君散 睡驚太乙丹 開胃丸
厚朴散 張漢厚朴散 萬全龍骨丸
劉氏方 香橘餅 二神丸 沒石子丸
聖惠胡黃連散 龍骨散 張漢阿膠丹 神仙玉粉丹
千金七味散 神驗方 外臺方
丁香散 聖惠黃連丸 譚氏斗門散 龍骨湯
又 黃連煎 雞骨丸 惺惺散 香礬丹
劉氏方 聖惠厚朴散 地榆散 胃風湯
三神丸 茅先生香連丸 乳香散
守中湯 張漢川椒丸 粟煎湯 溫中湯
黃芩湯 張漢清胃散 香連丸

藝術典第四百五十六卷

醫部彙考四百三十六

小兒吐瀉門三

方

白术圓 中藏經

治小兒白瀉

白术 當歸 芍藥 木香減半

右等分爲末煉蜜圓如菉豆大每服十圓十五圓不拘時候米飲下

藿香湯 千金方

治毒氣吐下腹脹逆害乳哺

藿香一兩 生薑二兩 青竹茹 甘草各半兩

右四味㕮咀以水二升煑取八合每服一合日三有熱加升麻半兩

五味異功散 小兒直訣下同

治脾胃虛弱吐瀉不食

人參 茯苓 白术 甘草炒 陳皮各等分

右爲末每服三錢薑棗水煎

一方加木香

薛己曰按前方補脾胃之聖藥也況人之一身以脾胃爲主若小兒乳食失節寒凉失宜或乳母六淫七情失調兒飲其乳諸病頓起當專以此藥治之其應如響

王肯堂曰愚按前方治脾胃虛弱吐瀉不食或驚搐痰盛或睡而露睛手足指冷或脾胃虛弱咳嗽吐痰或虛熱上攻口舌生瘡弄舌流涎若母有證致兒患此者母竝服之

益黃散

治脾土虛寒嘔吐瀉泄

青皮下食入太陰倉 丁香各二錢去脾胃中寒

訶子肉五錢能開胃消食止痢 甘草炙三錢

陳皮二錢半

右爲末每服一二錢水煎

一方去丁香用木香

薛己曰按前證若因脾土虛弱而吐瀉者用五味異功散若因肝木侮脾土而吐瀉者用六君子加柴胡如不應或手足指冷屬脾胃虛寒也更加木香炮薑若因乳母脾土虛而肝木侮亦治以前藥若乳母鬱怒致兒患前證母服加味歸脾湯

人參安胃散

治因服峻劑脾胃虧損或成慢驚泄瀉嘔吐或腸胃有熱以致前證

黃芪蜜炙二錢 生甘草 炙甘草各五分

白芍七分 白茯四分 黃連二分 人參一錢

右爲末每服二三錢水煎

七味白术散

治吐瀉或病後津液不足口乾作渴

乾葛二錢能鼓胃氣上行生津液陽明經藥也

人參 白术炒 木香 白茯苓 甘草炙

藿香葉各一錢

右爲末每服二三錢水煎

幼科全書加烏梅爲治渴之聖藥

發熱渴者去木香

吐痛加芍藥

薛己曰按胃傷則嘔脾傷則瀉故用前藥調補胃氣以化生津液如無他證只因胃氣虛而津液不足者用四君子湯尤效

四君子湯

治脾氣虛弱飲食不化腸鳴泄瀉或嘔噦吐逆

人參　白茯苓　白朮　甘草炙各五分

右水煎服

四物湯

治肝經血虛發熱日晡益甚或煩躁不寐

當歸　熟地黃各二錢　白芍藥一錢　川芎五分

右作二劑水煎服

八珍湯

治氣血俱虛或因失血過多或因勞伐元氣以致內熱發熱肢體瘦瘁

即四物四君二湯合服

十全大補湯

治氣血虛熱或因病後惡寒發熱或自汗盜汗食少體倦或發熱作渴頭痛眩暈等證

即八珍湯加黃芪肉桂

六君子湯

治脾胃虛弱體瘦面黃或久患瘧痢不思乳食或嘔吐泄瀉飲食不化或時患飲食停滯或母有前證致兒爲患

人參　白朮　茯苓各二錢　陳皮　半夏　甘草炙各一錢

右每服二三錢薑棗水煎

補中益氣湯

治中氣不足困睡發熱或元氣虛弱感冒風寒或乳母勞役發熱致兒爲患

黃芪炙　人參　白朮炒　甘草炙　當歸　陳皮各五分　升麻　柴胡各二分

右薑棗水煎

香砂助胃膏

治胃寒吐瀉乳食不化

人參　白朮炒　白茯苓各五錢　甘草炙　丁香各一錢去胃中寒　砂仁四十箇下氣消食　山藥一兩　白豆蔻十四箇寬胃暖脾進食　肉豆蔻四箇煨溫中補脾下氣運化非比香附陳皮之駛泄也

右爲末煉蜜丸芡實大每服二三丸米飲磨化

一方加木香三錢

人參養胃湯

治外感風寒內傷生冷寒熱如瘧或嘔逆惡心平胃散中用厚朴佐以蒼朮正爲泄上焦之濕平胃土不使太過而致其和耳非溫補脾胃也

人參　厚朴薑製　蒼朮製發汗　半夏湯泡　炙草二錢　草果仁虛弱不能者宜此　藿香　茯苓各五錢調胃氣　橘紅二錢五分

右每服二三錢薑三片烏梅一箇水煎

四神丸

治脾腎虛泄瀉不食或不食去後不實或乳母患此致兒爲患

肉豆蔻　北五味子各二兩　補骨脂四兩　吳茱萸一兩

右爲末用水二碗生薑八兩紅棗一百枚煮熟取棗肉和末丸麻子大每服二三十丸空心食前白湯下子母竝服

五苓散

治霍亂吐瀉躁渴飲水小便不利有辰砂名辰砂五苓散

澤瀉五錢　豬苓　官桂　赤茯　白朮各二錢

右爲末每服二錢白湯調下

幼科全書曰此乃分理陰陽之要藥

薛己曰按前證若津液偏滲於大腸大便瀉而小便少者宜用此藥分利若陰陽已分而小便短少者此脾肺氣虛而不能生水也宜用補中益氣湯加麥冬五味虛火上炎而小便赤少者此肺氣受傷而不能生水也用地黃丸加麥冬五味

玉露散

治傷熱吐瀉黃色

石膏煅幼科全書用滑石　寒水石各五錢

甘草二錢五分

右爲末每服五分白湯調下

海藏曰非腎熱相火大盛者不宜服此

薛己曰按前證若飲食如常作渴飲冷屬胃經實熱宜用此藥若食少體倦或善噫瀉黃此脾虛色陷也宜用六君子加柴胡升麻若瀉而變青更兼腹脹或善怒此脾虛肝所乘也宜用前湯更加木香

木瓜丸

治生下吐

木瓜　麝香　脳粉　木香　檳榔各等分
右爲末麪糊丸黍米大每服一二九甘草湯化下
薛己曰按前證多因妊娠胃經有熱或痰所致
當審其母而兼治之

梓朴散

小兒吐瀉胃虛及有痰驚
半夏湯泡七次用生薑汁浸半日曬乾一錢
梓州厚朴一兩
右以米泔三升同浸一百刻木盡爲度如未盡少
加火熬乾去厚朴只研半夏每服半錢或一字薄
荷湯調下

二氣散

小兒吐瀉不拘冷熱驚吐反胃一切吐利諸治不
效者又鄭氏名陰陽丸
硫黃半兩　水銀二錢半
右同研不見星每服一字至半錢生薑水調下其
吐立止或同炒結砂爲丸

二陳湯　幼科全書下同

治痰飲爲患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘不
快或發爲寒熱或因生冷傷脾
陳皮　半夏湯泡七次　白茯　甘草
薑三片煎服

如嘔吐加白朮乾薑煨此二味嘔吐必用之藥也
如夾熱而吐者加乾薑煨黃連炒同煎
凡傷食加神麯麥芽炒砂仁香附子山楂此五味
消導必用之藥也
一方加烏梅一箇

肉荳蔻丸

砂仁二錢　廣木香三錢　赤石脂七錢半
肉荳蔻麪包煨　枯礬　白龍骨　訶子肉各五錢
其爲細末水糊丸如粟米大陳米湯下此藥性溫
而濇所以止滑

調元湯

黃芪　人參　甘草
右水煎服此治虛熱之聖藥也
如熱不退加炒乾薑即效
如身熱手足冷加熟附子一片其效如神

感應丸

巴豆七粒去油皮　廣木香二錢半　肉荳蔻一箇
丁香　乾薑各一錢　杏仁七箇去皮尖研
百草霜二錢
右七味先將杏仁草霜另研爲末將銀器內酒煮
黃酢一兩放冷後用香油二錢煎油熟同酢和藥
作錠子以薄荷麥芽湯下

脾積丸

山楂青者多用　香附　烏藥　紫金皮　砂仁
甘草各等分
右爲細末楂子生用搗細曬乾米糊丸桐子大每
服五十丸飲吞

一粒丹

枯礬一兩　人參
右爲末木丸梧子大車前草燈心湯下

補眞丸

當歸　人參　橘紅　白朮各五分　白茯苓
麥門冬各三錢　黃芪蜜炙七錢　粉草二錢炙
木香　柴胡各二分
右薑棗爲引煎服

胃苓丸　片玉心書下同

分陰陽退潮熱止吐泄消浮腫黃疸調脾胃止便
濁小兒常用之藥也
蒼朮米泔水浸刮去黑皮焙乾　陳皮　厚朴炒
白朮各五錢　炙草　草果各二錢　猪苓
澤瀉　白茯各三錢　官桂一錢
共爲末水糊丸如粟米大炒米湯下

幼科全書作散無草果仁

嘔吐煨薑湯下
調胃炒米湯下
白濁鹽湯下
瀉泄炒米車前湯下
潮熱水竹葉炒米湯下
浮腫長流水煎燈心五加皮湯下
疳氣荷香湯下
黃疸加茵陳五錢燈心湯下

一粒丹

治小兒水泄
寒水石二兩　枯礬一兩
共爲末水糊丸菉豆大每服一丸米湯下

消乳丸　嬰童百問下同

治溫中快膈止嘔吐消乳食脈沉者乃傷食不化
故也
甘草炙　陳皮各半兩　縮砂仁　神麯炒

香附炒　麥芽炒各一兩
右爲末泡雪糕丸如黍米大七歲以上菜豆大三十丸食後薑湯下

又方

治百脾內嘔吐乳汁或大便青色
小婦人乳汁一盞入丁香十粒去白陳皮一錢於器內同煎三十沸
右去丁陳稍熱與兒服

消食丸

治小兒飲食乳哺取冷過度冷氣積於脾胃胃爲水穀之海脾氣磨而消之胃氣調和則乳哺消化脾傷于冷則宿食不消此藥寬中快氣消乳食正顏色
縮砂　陳皮　三稜煨　蓬朮煨　神麴炒
麥芽炒各半兩　香附炒一兩
右爲末麵糊爲丸菜豆大食後紫蘇湯下二十丸

和劑觀音散

治小兒外感風冷內傷脾胃嘔逆吐瀉不進乳食久則漸至羸瘦大抵脾虛則瀉胃虛則吐脾胃俱虛則吐瀉不已此藥大能補養脾胃進美飲食
石蓮肉　人參　神麴炒各三錢　茯苓二錢
甘草炙　木香　綿黃芪炙　白扁豆炒去皮
白朮各一錢
右剉散每服二錢水一盞棗一枚藿香三葉煎溫服

香朴散

治嘔吐泄瀉
藿香　陳皮　厚朴薑汁炒各七錢　炙草二錢
半夏湯泡七次一兩
右剉散每服三錢水一盞薑五片棗一枚煎服

如瀉甚加木香肉荳蔻

竹茹湯

治胃受邪熱心煩喜冷嘔吐不止
葛根七錢半　半夏半兩泡　生甘草二錢
右㕮咀每服三錢水一盞入竹茹棗少許生薑五片煎七分去滓取清汁微冷細細服不拘時

一方加茯苓三錢尤妙

蘇合香丸

治傳屍骨蒸諸瘕勞瘵順氣化痰卒暴心痛鬼魅瘧疾霍亂吐瀉赤白下痢小兒驚搐
丁香　青木香　白檀　沉香　薰陸　香附米
訶子肉　烏犀鎊屑　硃砂研水飛各一兩
薰陸香　片腦各五錢　麝香研七錢五分
蘇合香油五錢入安息香膏內　安息香另成末用無灰酒半升熬膏
右爲末用安息香膏入蜜和丸如芡實大空心用沸湯化下小兒一丸老人四丸酒下亦可用蠟紙裹一丸彈子大用絹袋盛當帶之一切邪神不敢近
去腦名麝香蘇合香丸治一切邪及胃脘噎塞腸中虛鳴宿食不消餘證並同

青州白丸子

治一切風痰小兒驚風
生天南星　生白附各三兩　川烏頭去臍皮
生半夏七兩
右用子花水浸次早另換新水春五日夏三日秋七日冬十日曬乾爲細末以糯米粉煎粥清爲丸如菜豆大

小兒驚風薄荷湯下和蘇合香丸服名香青丸

溫膽湯

治小兒心經虛怯夜臥不寧
枳實　陳皮　茯苓　生甘草　半夏泡各等分
竹茹少許
右剉散白水煎加薑二片棗一枚空心服

紫霜丸

治食積亦是傷寒之藥治乳哺失節宿滯不化胃腹痞滿嘔吐惡心便利不調乳食減少又治傷寒溫壯挾熱實大便酸氣食不消化或已得汗身熱不除或變蒸發熱多日不解或因食而發癇先寒後熱並宜服之
代赭石煅用醋淬七次　赤石脂煅各一兩
杏仁去皮尖五十枚　巴豆二十粒去皮膜油炒研
右先將杏仁巴豆入乳鉢內細研如膏却入代赭石脂研和勻以湯浸蒸餅丸如粟米大一歲兒五丸米飲下一二百日兒三丸亦要看肥瘦微瀉爲度大凡變蒸與傷寒調理一同此藥並治之此藥乃是瀉食積之劑要辨虛實用丸數

香蘇飲

治陰陽不順清濁相干氣射中焦名爲霍亂皆由飽食豚膾復啖乳酪海陸百品無所不食多飲寒漿眠臥冷席風冷之氣傷于脾胃諸食結而不消

陰陽二氣壅滯不得流行陽氣欲降陰氣欲升陰陽交錯變成吐利不已臟腑昏亂榮衛俱虛冷傳于筋令轉筋宜服此劑大有神效

厚朴薑汁炒　香薷　白扁豆各一兩半炒黃

右㕮咀每服三錢水　盞酒半盞同煎至七分去滓用新汲水頻頻浸換令極冷頓服之藥冷則速效也煎時不得犯鐵器慢火煎之兼治井時吐利霍亂腹中撮痛大渴煩躁四肢逆冷汗出如雨兩脚轉筋疼痛不可忍者須井中沉令極冷頓服之乃有神效

治瀉痢加黃連

治霍亂吐瀉暑月感冒傷暑之證加川芎白芷

理中丸

治脾胃不和中寒上衝胷膈心腹逆滿疞痛痰逆惡心嘔吐心下虛煩痞滿膈塞不通飲食減少短氣羸困溫中逐水止汗去濕泄瀉注下水穀不分腹中雷鳴傷寒時氣裏寒外熱霍亂吐利手足厥冷胷痹心痛逆氣短氣寒多不飲水而吐

人參去蘆　白朮　乾薑炮各三兩　甘草炒減半

右㕮咀每服三錢水一盞煎六分去滓帶熱服空心食前或研細末白湯調下

腹痛者加人參一兩半

寒多加乾薑一兩半

渴者加白朮一兩半

臍上築者腎氣動也去白朮加桂四兩

吐多者去朮加生薑三兩

下多者還用朮

悸者加茯苓二兩

或四肢拘急腹滿下利轉筋者去朮加附子一箇生用末之蜜丸如鷄子黃大名理中丸又名調中丸

治厥陰臟寒蚘上入鼻吐長蟲或胃中虛冷因發汗故吐蟲先服理中丸

或加枳實茯苓蜜丸治傷寒結胷欲絕心鼻高起實滿作痛手不得近並用熱湯化下

釀乳法

治初生嬰兒以表用藥凡有胎熱證當令乳母服藥不可求效之速治法當釀乳令兒吃漸次解之百無一失若遽以冷藥攻之必損脾胃加以嘔吐必成大患

澤瀉二兩半　猪苓　赤茯　花粉各一兩半

生地黃二兩　茵陳　生甘草各一兩

右㕮咀每服五錢水一盞煎六分食後捏去舊乳却服

消乳丸

治小兒乳哺飲食取冷過度冷氣積于脾胃胃爲水穀之海脾氣磨而消之胃氣調和則乳哺消化脾傷于冷則宿食不消脉沉爲食不化故

砂仁炒　橘皮　三稜　莪朮　神麯炒各半兩

麥芽炒　香附子炒各一兩

右爲末麵糊丸麻子大食後白湯加減下

茯苓半夏湯

治諸嘔噦心下堅痞鬲間有水痰眩悸

茯苓二兩　半夏五錢湯泡七次

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片煎六分服

人參散

治小兒臟腑冷若纔喫乳食即又吐出或因纔喫乳爲驚觸犯令小兒外證面脣青黑手足心熱口多清涎吐逆不住或作瀉候青黃紫白或鼻涕如鷄子清者並宜服之

人參　白朮炒　白茯苓　沉香　烏藥

甘草炙各半兩

右爲細末以瓶貯之遇小兒有前項形證半歲一字二三歲半錢大者一錢煎棗子米飲調下或陳紫蘇湯亦可或吐瀉並作煎丁香湯下陳皮湯尤妙

麝香散

又名沉香散生胃氣止吐瀉

茯苓二錢　沉香　丁香　木香　藿香葉

厚朴製　甘草炙各一錢　麝香一字

右爲細末每服一錢米飲調下

白餅子

治小兒夾食傷寒其證發熱嘔吐亦有肚痛者噯氣辨得分曉先用此藥一服推下食積却用半和藥發散調治如惺惺散加減參蘇飲皆可服却不可服冷藥

滑石　南星製　半夏製各一錢　輕粉半錢

巴豆二十四箇去皮膜用水一升煮乾研細

右三味搗羅爲末入巴豆霜次入輕粉又研勻却入餘藥末令勻糯米飲丸如菉豆大量小兒壯瘦虛實用藥三歲以下每服三丸至五丸紫蘇湯空

心下忌熱物若三五歲兒壯實者不以此拘加至二十丸以利爲度

大青膏

治傷風痰熱發搐百日左右并二三歲亦可服

天麻　青黛各一錢　白附子　蠍尾各半錢　硃砂　天竺黃　麝各一字　烏蛇酒浸焙乾半錢

右爲末生蜜爲丸如芡實大月中兒粳米大同牛黃膏薄荷湯化下五歲以上同甘露散服之

釣藤飲

治吐利脾胃氣虛生風慢驚

釣藤鉤三錢　蟬蛻　明天麻　防風　蠍尾　人參各半兩　殭蠶炒二錢　麻黃　甘草炙　川芎各二錢半　麝香不拘多少

右剉每服三錢水一盞食前服

寒多加附子半錢

車前子散

治暑月伏熱霍亂吐瀉煩悶引飲

白茯苓　猪苓　陳香薷　車前子各一兩　人參五錢

右末燈心湯調下

胜痛加芍藥

瀉不止加石蓮

定命飲子

治慢驚吐瀉困重欲傳慢脾風

生半夏　茯苓　木香　生薑各一兩切片曬燥

右爲末每服半錢薑棗煎湯調下

不換金正氣散

治山嵐瘴氣寒熱往來五膈氣噎霍亂吐瀉臟腑虛寒

厚朴去皮薑汁炒　藿香去土　陳皮　炙草

半夏皂莢白礬薑汁同煮　蒼术米泔浸各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片大棗二枚煎七分絞去滓食前帶熱服

二順散

治伏熱中暑霍亂吐瀉煩悶躁渴小便赤色便血胜疼

猪苓　澤瀉　茯苓　白术　甘草炙　肉桂

乾葛　杏仁去皮尖各一兩

右爲末每服半錢或一錢新汲水調下

釀乳法

治胃熱吐瀉睡中吐舌搖頭吐乳作腥氣額上汗流多驚啼哭面黃凡有此疾宜暫斷乳令胃乾饑甚用藥令乳母釀乳

人參　木香　藿香　沉香　陳皮　神麴

麥芽各一兩　丁香半兩

右㕮咀每服四錢薑三片紫蘇十葉棗二箇煎乳母食後捏去奶汁盡方服半盞奇臥少時却與兒乳

沒石子丸

治嬰孩先因冷瀉或作赤白痢候久面變作諸般異色不止一端外證曲或青或白舌乾焦手微冷渾身溫壯胜內刺痛啼叫睡臥不安

沒石子五錢　木香　黃連　當歸各一兩　青皮一錢

右五件爲末阿魏一錢酒一盞浸化入麵少許須令勻煮糊爲丸如粟米大一二歲兒服如椒目大者四五六歲兒每服五十丸

赤痢甘草湯下

白痢乾薑湯下或用五倍子湯下

一方用沒石子一箇白豆蔻五箇訶子肉二箇木香黃連各一錢爲末粳米糊丸麻子大每服十五丸米飲下

來復丹

治小兒虛寒洩利

硝石　硫黃　太陰元精石各一兩　陳皮五靈脂　青皮各二兩

右方修製及服法俱詳前

銀白散

治冷瀉藥青壯胃氣

糯米　扁豆炒各二兩　藿香　白术炒各一兩　丁香二錢　甘草炙二錢

右爲末紫蘇米飲調下

加天麻砂仁白茯苓炔胜正色

直指方加炮白附仝蠍木香石蓮肉薑一片煎

藿香散

治小兒臟腑不調作瀉青黃黑白乳食不消糞中有東如鷄子青兼暴瀉如水其證腹痛微熱面臂黃白若慢驚或偏墜紅腫內釣紫蘇湯調下三五服

陳皮　藿香　厚朴製　枳殼炒　炙草各半兩

右爲末紫蘇湯下三錢

糞中有黃白瘈子木瓜井白梅去鹽煎湯下
如痢止用棗子煎湯下大能和胃進乳食此是小兒常服之藥

大柴胡湯

治小兒挾熱瀉利

柴胡八錢　黃芩　赤芍各三錢　半夏泡錢半　枳實去瓤麩炒半錢

右剉散薑棗煎加減服之

欲下加大黃

黃連丸

治小兒挾熱瀉利

黃連半兩淨洗豬膽汁浸二夜曬乾　瓜蔞根　烏梅肉　杏仁泡去皮尖雙仁　石蓮肉各半兩

右爲末牛膽汁浸糕糊丸麻子大每十五丸煎烏梅薑蜜湯下

四逆散

治少陰病其人或咳或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重又治挾熱溏瀉尿赤

炙草　枳實炒黃　柴胡　白芍炒各一兩

如咳者加五味子乾薑各半兩

下利悸者加桂半兩

小便不利者加茯苓半兩

泄利下重先濃煎薤白湯內藥末三錢七再煮一二沸溫服

右擣篩爲細末水飲調下二錢日三服

調中湯

治夏月秋初忽有暴寒折于盛暑熱結于四肢則壯熱頭疼寒傷於胃則下痢赤白

大黃七錢半　梔子　葉本　茯苓　生甘草　葛根　黃芩　白芍藥炒　白朮各半兩

右咬咀白朮煎量大小加減服之得快氣利壯便歇

去大黃加黃連枳殼止痢尤妙或加地榆或加當歸皆可

感風加荊芥

秋宜下當用大黃疏利

黃芩湯

治下利而頭痛胃滿口苦咽乾或往來寒熱而嘔其脈浮大而弦專治協熱而利者

黃芩一兩半炒　白芍藥炒　甘草炙各一兩

右咬咀每服三錢棗子一箇水一盞煎至七分去滓溫服

嘔者加製半夏生薑汁

四順清涼飲

治小兒血脈壅實臟腑生熱煩赤多渴五心煩躁睡臥不安四肢驚掣及因乳哺不時寒溫失度令兒血氣不順腸胃不調小便少大便溏或溫壯連滯欲成伏熱或壯熱不歇欲發驚癇又治風熱結核頭面瘡癤日赤咽痛瘡疹毒一切壅滯並宜服之

赤芍藥　當歸　生甘草　大黃各一兩

右剉散三歲以上每服二錢水一盞煎至七分作兩服

治挾熱瀉不止加木香煨大黃欲利小便用赤芍藥

虛熱加甘草

不利減大黃

冒風邪加去節麻黃

中風體强眼睛上視加獨活量兒大小虛實加減

微溏利爲度

可加荊芥更有加味清涼飲子可詳證通用

香橘餅

治傷冷瀉利

木香　青皮炒　陳皮各一錢　厚朴薑汁炒神麴炒　麥芽炒各半兩

右爲末蜜丸爲餅紫蘇米飲調下

一方加砂仁

全蠍觀音散

止吐瀉截虛風

黃芪蜜炙　人參　木香　白茯苓　大粉草炙石蓮肉　扁豆炒各一兩　白芷　全蠍各七錢

羌活　防風　天麻各八錢

右剉散每服二錢水一盞煎至七分服加薑棗煎調中散

治傷食瀉凡此瀉不宜便補先用食藥或紫霜丸取其積盡然後可補經云食瀉重當取痞虛用補虛良醫明妙理何慮疾難除

人參　白茯苓　白朮炒　木香　乾薑炮　藿香　香附子炒去毛　砂仁炒　甘草炙　丁香各一兩

右爲末每服一錢薑棗湯下

肚痛白湯大小以意加減

進食丸

治乳食不消心腹脹滿壯熱喘粗嘔吐痰逆腸鳴洩瀉米穀不化或下利赤白腹痛後重及食癥乳癖痃氣痞結並皆治之小兒胃膈熱實腹內有留飲致令榮衛痞塞臟腑之氣不得宣通其病腹內氣結脹滿或壯熱是凡有此疾當疏利大便破結散氣常宜服之

巴豆霜一錢　當歸泔浸一宿麤乾炒　硃砂

代赭石煅酢淬七次　枳殼炒　木香各五錢

麝香一分

右爲末麵糊爲丸如麻子大一歲兒一丸溫米飲下更量虛實加減食後服治食積發熱羸瘦肚大青筋疳積肚疼哺露

生薑瀉心湯

治傷寒汗出解後胃中不和心下痞硬脅下有水氣腹中雷鳴下利者

黃連　炙草　人參　乾薑炮　黃芩各一兩半

半夏一兩湯泡洗

右判散每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎七分去滓溫服

保安丸

治小兒瀼瀉傷食瀉

香附子　砂仁各一兩炒　白薑炮　青皮去穰

陳皮　三稜炮　蓬朮炮　甘草炙各半兩

右爲末麥芽麪糊爲丸菉豆大每三九白湯下

沉香煎

治脾氣冷積

乳香研　沉香　丁香　杏仁炒　百草霜

木香各一錢　肉蔻一箇　巴豆十四粒去油

右爲末酒煮蠟和丸菉豆大每服三五丸淡薑湯送下凡患肚痛不止服之效以通爲度

三稜丸

治小兒停積腹脅脹滿乾嘔惡心全不入食

三稜煨　木香　神麴炒　陳皮　半夏薑製各一兩　丁香　肉桂各半兩

右爲末麵糊丸如黃米大二十丸乳食後溫生薑湯下

杏霜丸

治小兒食積作瀉並痢證

杏仁三兩去皮尖炒　巴豆一兩去油炒焦

黃臘酒煮綿濾　百草霜研用油六錢炒各二兩

右將杏仁巴豆研極細却入百草霜令勻溶蠟和丸如菉豆大

赤痢甘草湯

白痢生薑湯先進三四服

腹脹者十餘服效驗如神

至聖保命丹

治小兒胎驚內吊腹肚緊硬眠睡不安夜多啼哭及治急慢驚風眼目上視手足抽掣不省人事悉皆主之冷證用此

全蠍十四箇去毒　防風二錢　獨蒜炒去絲嘴

天麻　南星炮　蟬蛻　白附各二錢　麝五分

金箔十片　硃砂二錢

右爲末棗米糊丸每兩作四十丸常服鎮心安神化痰除一切驚風諸證湯臨時換

一方加人參白茯苓各二錢

有熱證加牛黃一分冰片一分硼砂一錢

鈎藤散

治小兒夜啼乃臟冷也陰盛于夜則冷動則爲陰極發躁寒盛作疼所以夜啼不歇也鈎藤散主之

鈎藤鉤　茯神　川芎　當歸酒洗　茯苓

木香　甘草炙　白芍藥炒各一錢

右爲末每服一錢薑棗略煎服

其或心熱而煩啼必有驗紅舌白小便赤澀之候鈎藤飲去木香加硃砂末一錢研和每服一錢木通湯調下或剉散煎服

治驚啼加蟬蛻防風天麻

定命飲子

治慢驚吐瀉困重欲傳慢脾通用

川白生半夏　茯苓　木香　老生薑切片曬乾

白朮炒各二錢　甘草炙一錢　天麻二錢半

右剉散每二錢薑棗泡湯調下

朱君散

治吐瀉後有此證並糞青者宜服之

人參　白朮炒　白茯苓　甘草炙各一兩

辰砂水飛　鈎藤各半兩　燈心三錢　麝半錢

右爲末每服一錢用白湯調下不拘時服

睡驚太乙丹

常服安神鎮驚止夜啼糞青

桔梗一兩炒　藿香　扁豆炒各半兩　白芷
川芎各三錢
右爲末煉蜜丸如芡實大辰砂麝香爲衣每服半
丸薄荷湯磨下
正氣包裹湯下
夜啼燈心釣藤湯磨下加白朮白茯白芍尤妙
開胃丸　證治準繩下同
治小兒腑臟虛弱內受風冷腹脹滿腸鳴泄痢
或青或白乳食不化又治臟冷夜啼胎寒腹痛
木香　莪朮　白朮　人參　當歸炒各半兩
麝香細研　白芍藥各一分
右件搗羅爲末都研令勻湯浸炊餅和丸如黍米
大每服十五丸溫米飲下
新生兒腹痛夜啼可服五丸並乳食前服
厚朴散
治小兒脾胃不和洞瀉下不止羸瘦食少
厚朴去外粗皮塗生薑汁炙令香熟　人參
訶梨勒煨用皮　白朮　川黃連去鬚微炒
地榆微炙各一分　炙草　乾薑炮各半分
肉豆蔻一枚去殼
右件搗細羅爲散每服以粥飲下半錢日三四服
量兒大小以意加減
張渙厚朴散
治洞瀉注下
厚朴薑汁製　訶梨勒炮取皮　肉蔻各一兩
白朮　乾薑各半兩炮
右件搗羅爲細末每服一錢水八分入生薑粟米
各少許煎五分去滓溫服
萬全龍骨丸
治小兒冷熱不調時有洞泄下利不止
龍骨　黃連　白石脂　枯白礬　乾薑炮
木香各半兩
右件藥搗羅爲末酢煮麵糊如麻子大每服以粥
飲下五丸日三四服量兒大小加減服之
劉氏方
治小兒水泄注下
黃連　石蓮各等分炒黃色
右爲末每服半錢新汲水調下
白瀉粟米飲下
香橘餅
治嬰孩過傷乳食或吐或瀉及病後虛中感積成
痢氣弱神昏面黃目慢
三稜炮三錢　木香　陳皮　青皮各二錢半
厚朴薑汁製七錢　砂仁　神麴濕紙裹煨
麥芽焙各五錢
右木香不過火餘七味剉焙仍同木香研爲細末
煉蜜作餅子如芡實大每服一餅各三餅用棗湯
化開空心溫投米清湯亦可
二神丸
補骨脂四兩　肉豆蔻二兩生用
右爲末用紅棗四十枚生薑四兩水一鍾煮乾取
棗肉和丸如桐子大每服二三十丸白滾湯下
沒石子丸
治疳積釀瀉久患疳痢
沒石子二枚　木香濕紙包煨　訶子四枚炮
淨黃連剉薑汁炒各二錢生用　肉豆蔻二枚炮
聖惠胡黃連散
治小兒冷熱氣不和忽暴下利腹內疼痛
胡黃連　母丁香　桂心　木香　肉豆蔻去殼
當歸剉微炒　麝香細研各一分　犀角屑半分
右件藥搗細羅爲散每服以粥飲調下五分日三
四服量兒大小加減服之
龍骨散
治小兒暴利
龍骨　黃連去鬚微炒各一兩　當歸剉微炒
枳殼麩炒微黃去瓤各五錢
右件藥搗粗羅爲散每服一錢以水一小盞煎至
五分去滓不計時候量兒大小加減溫服
張渙阿膠丹
治泄利身熱及暴瀉注下
眞阿膠炙熟　乾薑各一兩　芍藥　當歸洗焙
川黃連　肉豆蔻各半兩
右件藥搗羅爲細末煉蜜和丸如黍米大每服十
粒粟米飲下量兒大小加減
神仙玉粉丹
補一切虛不熱小兒冷積暴瀉見功尤速
精明礬上硫黃一斤去砂石盡打碎
右用獵豬肚七箇旋採桑根白皮三斤寸剉將豬
肚一箇淨洗以硫黃實之以麻線縫合水二斗先
將桑根白皮一斤同煮一伏時其餘豬肚亦用慢
火養之不得令冷候煮滿一伏時別以豬肚換之

又用白皮內一斤同煮再一伏時又換豬肚并豢白皮過三伏時不換白皮只換豬肚共煮七伏時水耗以熱湯添不得用冷水候滿七伏時取出用溫水淘淨研至極細候烈日中曬極乾再研煮糯米粉糊爲丸如梧桐子大每服空心米飲下十粒至十五粒大率驅除宿冷其功效無比老人經久可服

千金七味散

治利下久不瘥

龍骨煅　赤石脂　厚朴　烏梅肉各二分　黃連八分　甘草炙一分　阿膠炙三分

右治下篩漿水服二方寸匕日二小兒一錢匕

神驗方

華佗治老小下利柴立不能食入口即出命在旦夕久利

黃連末　亂髮灰　醇苦酒　蜜各半鷄子殼許

白蠟方寸匕　鷄子黃一枚

右六味于銅器中炭火上先內酒蜜蠟鷄子黃攪勻乃內黃連末髮灰又攪煎視可取出爲丸久困者一日一夜盡之

外臺方

療久利無問冷熱痢痢悉主之

棗一枚去核勿令皮破內胡粉令滿於炭火中燒如炭磁器中研之

米飲和服一歲以下分服之不過三服瘥

丁香散

聖惠治久痢赤白漸羸胃虛不食

丁香　厚朴去外粗皮塗生薑汁炙令香熟　黃連去鬚劉炒　訶梨勒煨用皮　白朮劉炒　伏龍肝各半兩　木香一分　赤石脂一兩

右件藥搗細羅爲散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大小加減

聖惠黃連丸

治小兒釀利經久不斷增減有時

黃連微炒　人參　赤石脂　龍骨　炙草　黃芩　厚朴塗生薑汁炙令香熟　白茯苓　枳殼麩炒微黃各半兩　烏梅肉一分微炒

右件藥搗羅爲末煉蜜和丸如麻子大每服以粥飲下七丸日三四服量兒大小臨時加減

譚氏斗門散

歌曰小兒瀉痢甚青黃久患時多轉滑腸下部脫肛頻努嚥朝朝焦瘦漸羸尪訶子　枳殼　地榆各等分

右爲末每服一錢米飲調下一歲以下半錢

嬰孺龍骨湯

治小兒下利不住

龍骨煅　甘草炙　川黃連各四分　當歸乾薑各一分

右以水四升煮一升二合食前溫分三服

又

治服藥下後不止

龍骨五分　甘草炙　乾薑　當歸　黃連　附子炮製去皮臍　赤石脂　前胡各三分

右以水四升煮一升二合爲五服日服至午令盡

黃連煎

治冷熱利經久不止體羸不堪治差而又發

好黃連二兩水七升蜜八合煎一升三合

右絞去滓百日兒半合二百日一歲服一合

鷄骨丸

治下利經久不斷羸瘦脾胃冷弱食不消化宿雌鷄胃前及肋骨全用一具　黃連六分　厚朴三分　神麴炒　甘草炙　白朮各四分　桔梗　麥芽炒　烏梅各二分　人參　赤石脂　黃芩　白龍骨各五分

右爲末蜜丸小豆大白飲下二十五丸日二服量兒大小與之

惺惺散

治久瀉脾困不思乳食恐作脾風

天麻　全蠍炒各半錢　木香炮　糯米　人參　白茯苓各炒微黃　白扁豆炒　乾山藥焙　甘草各一錢炙

右爲末每服嬰孺一字二三歲半錢用水一蓁注或半銀盞棗子半片煎十數沸服

香礬丹

張渙治瀉利久不瘥

南木香　枯白礬各一兩　訶梨勒皮微炮　酸石榴皮炒黑各半兩

右件搗羅爲細末煉蜜和丸如黍米大每服十粒粥飲下量兒大小加減

劉氏方

治小兒臟腑久瀉不止

人參　白朮　茯苓　甘草　陳皮　藿香
丁香　木香　肉豆蔻
右等分爲末每服二錢以藿香合糯米煮粥飲調下或薑水煎亦可

藏腑滑泄四君子加訶子五分米飲調下

聖惠厚朴散

治小兒水穀利羸瘦面黃不欲飲食
厚朴去粗皮塗生薑汁炙令香熟　龍骨　丁香
黃連去須微炒各半兩　當歸剉微炒　木香
白朮　肉豆蔻各一分
右件藥搗細羅爲散每服以粥飲下半錢日三四
服量兒大小加減

地榆散

治水穀利日夜不止
地榆炙　厚朴去粗皮塗薑汁炙令香熟各三分
黃連一兩去鬚微炒　阿膠半兩搗碎炒令黃色
右件藥搗細羅爲散不計時候以粥飲調下半錢
量兒大小加減

胃風湯

治風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下腹脅
滿腸鳴疥痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日
夜無度並宜服之
人參　白茯苓　芎藭　桂皮去粗皮　當歸
白芍藥　白朮各等分
右爲粗散每服二錢以水一大盞入粟米百粒同
煎七分去滓稍熱服空心食前服小兒量減

三神丸

養生治大小老虛之人不拘冷熱泄瀉
黃連　白芍藥並剉如豆　吳茱萸各十兩
右三味釜內慢火炒赤色放冷杵羅爲細末每服
三錢匕水一盞半煎至八九分去滓空腹食前溫
服日三四服小兒量與或以水浸蒸餅丸如桐子
大更丸一等如菉豆黃米大小兒每服十五丸至
二十丸溫米飲下若作散以沸湯或溫米飲調下
並可服病泄痢之人若不禁生冷魚肉肥臭與不
服藥同

一方有木香無芍藥酢糊丸

芎先生香連丸

治瀉痢

黃連茱萸半兩同于銚內炒令煙起取出去茱萸
木香　肉蔻　訶子炮去核各五錢　阿膠麵炒
硃砂各一錢
右爲細末軟飯爲丸如桐子大每服十丸十四丸
用飯飲吞下兒小碎之

乳香散

治一切瀉痢

乳香二錢荷葉盛火炙令鬆放地上椀蓋另研
肉豆蔻　白薑　甘草炙　草藁各一兩
右細剉用酢麪裹于熱灰內煨令赤色取出去麪
爲末入乳香拌勻每服五分或一錢陳米飲調下

守中湯

春夏相交陰濕氣重中傷脾胃致腹痛泄痢經久
不止漸傳手足浮腫飲食少思
蒼朮泔水浸一宿去粗皮濾乾剉炒微黃色
桔梗各二兩炒　白薑四錢炮　甘草六錢炙
右件剉焙爲末每服一錢空心沸湯調服咬咀水
煎亦可或用薑棗

張潔川椒丸

治小兒夏傷濕冷入腸胃泄瀉不止
川椒一兩去閉目雙者并黑子慢火炒香熟爲度
肉豆蔻五錢
右件搗羅爲細末糝米飯和圓如黍米大每服十
粒米飲下量兒大小加減

粟煎湯

治腸胃受風冷泄注不止身體壯熱
白朮炮　當歸洗焙　川芎　人參　肉桂
芍藥各一兩
右件搗羅爲細末每服一錢水一小盞入生薑三
片粟米一匙許煎至五分粟米熟去滓放溫服

溫中湯

治胃寒瀉白腹痛腸鳴孔氏治驟腑不調大便青
色
白朮　人參　茯苓各一錢　甘草炙半錢
右末一錢水一小盞煎七分溫服

黃芩湯

治下痢而頭痛胃滿口苦咽乾或往來寒熱而嘔
其脉浮大而弦者或協熱而痢者
黃芩一兩半　芍藥　甘草炙各一兩
右剉散每服三錢棗子一箇水一盞煎七分去滓
溫服
嘔者加半夏一兩二錢半生薑煎

張漢清胃散

治挾熱瀉利

川楝子　黃檗微炙　當歸洗焙　地楡炙

黃連去鬚炒各半兩

右件搗羅爲細末每服一錢水八分煎至四分去滓溫服乳食前

香連丸

黃連薑汁拌炒二兩　木香煨半兩

右爲末陳米飯丸菉豆大米飲下一二十丸亦可調六一散

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百五十七卷目錄
醫部彙考四百三十七
小兒吐瀉門四
單方
鍼灸
醫案

藝術典第四百五十七卷
醫部彙考四百三十七
小兒吐瀉門四
單方

治小兒霍亂吐利用人參一兩厚朴甘草各半兩四味㕮咀以水一升二合煑取半升六十日兒服一合百日兒分三服期歲分二服中間隔乳服之乳母忌生冷油膩等一加乾薑一分或加生薑三分千金方下同

小兒霍亂梳頭垢水服少許

治孩子霍亂已用立驗用人參蘆籜扁豆藤二兩倉米一撮四味㕮咀以水二升煑取八合分溫服

又用人參木瓜一枚倉米一撮三味㕮咀以水煎分服以意量之立效

治小兒霍亂研尿滓乳上服之

又以牛涎灌口中一合

治少小吐利用亂髮半兩燒灰鹿角六銖二味爲末米汁服一刀圭日三服

又用熱牛屎含之一作牛膝

又燒牡猪屎水浸取汁少少服之

治小兒噦用生薑汁牛乳各五合煎取五合分爲二服

又取牛乳一斤煎取五合分五服

小兒脾泄不止紅棗二十箇去核將官粉入內以陰陽瓦焙乾去棗研粉每服三分米湯下

小兒飲乳後吐逆不入腹取蘆蠹蟲二枚煑汁飲之嘔逆與哯乳不同乳飽後哯出者爲哯乳也藏器方

小兒吐瀉脾胃虛寒齊州半夏泡七次陳粟米各一錢半薑十片水盞半煎八分溫服直訣

治瀉不止用筍籜扁豆藤各半兩人參一兩共細剉分六服每水一小盞煎五分不時量分稍熱服聖惠方下同

小兒吐乳取地龍糞一兩研末空心米泔湯服效

凡小兒霍亂吐瀉用土蜂窠炙研乳汁服一錢

小兒百晬內吐乳或糞青色用年少婦人乳汁一盞入丁香十枚陳皮一錢石器煎一二十沸細細與服陳文仲小兒方

小兒吐瀉巴豆一箇針穿燈上燒過黃蠟一豆大燈上燒滴入水中同杵丸黍米大每用五七丸蓮子燈心湯下危氏得效方

寡婦藁薦草節去小兒霍亂酉陽雜俎

襁褓吐乳咳嗽久不愈石燕子爲末以蜜調少許塗脣上日三五次衛生寶鑑

小兒吐瀉芹菜切細煑汁飲之不拘多少子母秘錄

小兒嘔吐不止丁香生半夏各一錢薑汁浸一夜曬乾爲末薑汁打麪糊丸黍米大量大小用薑湯下全幼心鑑下同

小兒哯乳用鹹豉七箇去皮膩粉一錢同研丸黍大每服三五丸霍香湯下

小兒泄瀉肉荳蔻五錢乳香二錢半生薑五片同炒黑去薑研爲膏收旋丸菉豆大每量大小米飲下

治小兒吐瀉腹脹胃膈痞閉用五靈脂青皮陳皮硫黃芒硝各等分先將硝黃於銚子內以文武火鎔開用匙刮聚自然結成砂子取出研碎與前三藥同末麪糊爲丸如菉豆大小兒麻子黃米大每服二十丸量虛實加減米飲送下無時儒門事親下同

又治泄瀉用車前子不拘多少爲細末每服二錢米飲湯調下服之水穀分吐瀉止

小兒吐瀉黃疸用三稜蓬朮陳皮青皮神麴麥芽黃連甘草白朮茯苓共爲細末生薑燈心湯調服傷乳食吐瀉加山楂時氣吐瀉加滑石發熱加薄荷丹溪方下同

治小兒周歲吐乳腹瀉用白朮滑石末各三錢陳皮炙草各五分乾薑一錢共爲粗末煎服

治夏秋吐瀉好黃連一兩入虢丹一兩炒丹焦爲細末麪和丸如芥子大服二三十粒壁土薑湯吞更量數服不妨李剛中方

療霍亂心腹刺痛吐利用茯苓桔梗人參各六分白朮五分炙草炙厚朴各四分共切片用水二升煑六分令溫服外臺方

小兒吐逆不止用黃丹研末小棗肉和丸芡子大每以一丸針簽於燈上燒過研細乳汁調下一加硃砂枯礬等分謝氏小兒方

小兒吐瀉丁香橘紅等分煉蜜丸黃豆大米湯化下（劉氏小兒方）

胎寒腹痛啼哭吐乳大便瀉青狀若驚搐出冷汗薑黃一錢沒藥乳香二錢爲末蜜丸芡子大每服一丸釣藤煎湯化下（刺潢方）

小兒吐逆額併不進乳食手足心熱用紅麴年久者三錢半白术麩炒一錢半甘草炙一錢爲末每服五分煎棗子米湯下（經濟方）

小兒噦疾用鹿角粉大豆末等分和乳調塗乳上飲之（古今醫鑑）

小兒嘔吐壯熱食鼈葛粉二錢水二合調勻傾入錫鏵中重湯溫熟以麻飲和食（普濟內外經驗秘要心鏡）

小兒霍亂卒起者用白狗屎一丸絞汁服之（本草綱目下同）

小兒熱噦牛乳二合薑汁一合銀器文火煎五六沸量兒服之

小兒疳瀉赤石脂末米飲調服半錢立瘥加京芎等分更妙

小兒霍亂訶黎一枚爲末沸湯服一半未止再服

小兒吐逆不定虛風喘急白附霍香等分爲末每米飲下半錢（保幼大全）

小兒嘔吐不定用五倍子二箇一生一熟甘草一握濕紙煨過同研爲末每服半錢米泔調下立瘥（經驗方）

小兒熱瀉黃蘗削皮焙爲末用米湯和丸粟米大每服一二十丸米湯下（十全博教方）

小兒四季患泄瀉用製白术陳皮川厚朴薑汁炒各三分甘草二分有嘔吐加藿香葉四分遍身熱腹痛者加薑水炒黃連三分（翁氏便方）

小兒泄瀉用木別子一箇麵裹煨熟去殼小丁香三粒共爲末唾丸入小兒臍以舊膏藥封之（身經通考方）

小兒久瀉飲食少進身體羸瘦白术土炒白茯苓二味各等分用老米一撮煮粥止服米飲其瀉自止（醫貫）

又健脾止瀉用陳米鍋巴四兩蓮肉去心微炒四兩亨糖四兩共研細末食遠或空心調服數匙妙（青方下同）

小兒吐乳蘇葉甘草滑石各一錢水煎服（幼幼近編下同）

小兒久瀉用肉荳蔻平開入麝香一分再合劑包煨爲末米湯下瀉泄用柿餅燒熟吃立止身熱作瀉四君子湯加白芷黃芪松花五味子

小兒吐瀉用乾薑甘草各二錢炙白术一兩爲末溫湯服吐瀉不止或以白术一錢肉果丁香各五分薑湯調下余治大人吐瀉或以白芷乾薑爲末蜜丸置臍中以絹縛定用熱鞋底時時熨之

治久瀉不止白术土炒白茯苓各等分陳米一撮煮粥止服米飲

治久吐不止砂仁童便炒三四次一兩丁香一錢藿香三錢每薑湯調服一匙

治小兒吐瀉不止五倍子二枚半生半熟炙草爲末米泔水下五分

鍼灸

古今醫統曰小兒嘔吐乳汁灸中庭一穴一壯在臍中穴下一寸陷中

醫案

錢乙小兒直訣曰廣親宮五太尉病吐瀉不止米穀不化衆醫用溫藥一日而加喘吐不定錢氏曰當以凉藥治之所以然者謂傷熱在內也用石膏湯三服并服之衆醫皆言吐瀉多而米穀又不化當補脾何以用凉藥王信衆醫皆用補脾丁香散三服錢醫後至曰不可服此三日後必腹滿身熱飲水吐逆三日外果如所言所以然者謂六月熱甚伏入腹中而令引飲傷脾胃即大吐瀉也衆又行溫藥使上焦亦熱故喘而引飲三日當甚衆師不能治復召錢至見其熱證以白虎湯三服更以白餅子下之一日減藥二分二日三日又與白虎湯各二服四日用石膏湯一服及旋合門冬黃芩腦子牛黃天竺黃茯苓以硃砂爲衣服五丸竹葉湯化下熱退而安

廣親宮七太尉七歲病吐瀉是時七月其證不食而昏睡睡覺而悶亂嘔氣乾嘔大便或有或無不渴衆醫作驚治之錢曰先補脾後退熱與史君子丸補脾石膏湯退熱又以木銀硫黃末研和以薑

水調下一字錢曰凡吐瀉五月內九分下而一分補八月內九分補而一分下此者是脾虛瀉醫妄治之至於虛損下之即死即當補脾若以史君子丸恐緩已又留溫胃益脾藥治之醫者李生曰何食而噦錢曰脾虛津少即嘔逆曰何瀉青褐水曰腸胃至虛冷極故也錢治而愈

馮承務子五歲吐瀉壯熱不思飲食日睛多白面色無神師曰此腎經虛弱下之則愈虛遂以消積丸磨之漸愈太凡傷食不下則成癖下後即與補脾無不效者

儒門事親曰河間劉光濟之子纔二歲病疱後嘔吐發昏用丁香豆蔻之類不效適麻先生寄其家乃謂光濟曰今有小方無毒人皆知之公肯從乎光濟曰先生之言必中於理何敢不從麻先生曰劉河間常言凉膈散可治瘡疱張戴人用之如神況內經言少陽所至嘔涌少陽者相火也非寒也光濟欣而從之此日利二行適王德秀自外入聞其利之也乃曰瘡疱首尾不可下麻自悔其多言也業已然姑待之比至食時下黃涎一合日午間之兒已索遊於街矣

保嬰金鏡錄曰一小兒五歲食粽後咬牙欲吐項間腹脹昏憒鼻青黃赤此脾土傷而心肝所動食積發厥也先令雞翎探吐出酸物頓醒節其飲食勿藥而愈

薛氏保嬰撮要曰一小兒夏月吐乳手指發熱作渴飲冷口吐涎水余謂胃氣熱靡泉開而涎出也用瀉黃散而愈後復嘔吐另用蒯滯之劑口渴飲湯流涎不已余謂胃氣虛寒不能攝涎也用理中丸而愈

一小兒七歲嘔吐不食面白指冷此胃氣虛寒也用理中湯嘔吐頓愈又用六君子湯而痊後傷食腹痛發熱嘔吐流涎先用保和丸一服而痛嘔愈再用四君山梔而涎止

一小兒食凉粉而嘔吐酸物頭痛發熱此內傷兼外感也用人參養胃湯未二錢藿湯調服諸證皆愈惟吐酸涎用大安丸一服而止

一小兒傷食發熱嘔吐酸物手指常冷此胃氣虛寒陰盛隔陽於外虛熱所致也用保和丸未二錢濃薑湯調服而吐止再用六君子湯加山梔而安

一小兒嘔吐作渴暑月或用玉露飲子之類而愈又傷食吐酸余先用保和丸一服吐止次用五味異功散飲食漸進又用四君子湯而痊

一小兒暑月患吐瀉服香薷飲五苓散之類而止但手足並冷睡而露睛飲食不入腸鳴作嘔欲用清凉之劑余曰此始爲熱終爲寒也當捨時從證用人參理中丸以薑湯化二服病勢始定次用助胃膏漸安又用六君子湯調理而愈

一小兒食多即吐余用五味異功散愈之又腹痛嘔吐先服大安丸仍用異功散而愈後證復作另投祛逐之劑吐瀉不食腹中痛甚以手按之則止此脾氣復傷也先用補中益氣湯加茯苓半夏一劑又用六君升麻柴胡二劑飲食頓進後食生冷挾驚吐瀉手足並冷唇口搐動用六君釣藤鉤柴胡而愈

一小兒吐酸作渴飲冷腹痛發熱用人參養胃湯加黃連一劑吐熱稍定又用保和丸一服腹痛頓止後傷食復吐腹脹大便不通用紫霜丸下之尋愈又感冒咳嗽腹脹另服下藥發熱作吐腹脹手足並冷睡而露睛發搐用六君釣藤鉤而安又用四君加當歸川芎而愈後患吐瀉手足並冷用助胃膏頓痊

一小兒嘔吐發熱用瀉黃散而愈後因乳母飲酒腹脹吐瀉用葛花解醒湯子母服之漸愈大便日去五七次用五味異功散加升麻二劑日去五次乃用四君肉荳蔻而痊

一小兒吐酸發熱用保和丸漸愈又用四君山梔神麴而安後因飲食過多嘔吐復作另用下積丸更加作瀉腹脹手足發搐余以爲肝木侮脾土用五味異功散加柴胡釣藤鉤而搐止又用六君子湯飲食漸進而痊

一小兒夏間嘔吐腹痛大便不通服大黃而愈又傷食患吐發熱服瀉黃散等藥嘔吐腹痛按之即止面色青黃手足並冷此脾胃復傷而虛寒也用異功散加木香愈之後又傷食腹脹作痛或用消食丸吐瀉並作小腸重墜午後益甚余朝用補中益氣湯夕用六君子加木香而愈

一小兒嘔吐發熱腹痛面赤手熱口乾飲湯按其腹不痛此脾胃氣虛也用異功散加木香乾薑一劑而愈後傷食吐而嗳酸腹中作痛按之益甚此飲食內停也用保和丸二服而痊

一小兒因停食腹痛服疏導之藥而愈後復停食又用前藥寒熱不食腹脹後重大便頻而少此脾氣復傷而下陷也先用異功散加升麻數劑後重漸愈再加當歸數劑而全愈後因乳母恚怒致兒寒熱發搐作嘔又用六君子柴胡山梔以治其母兼灌其兒並

愈

一小兒時吐乳食診其母有鬱怒之證用加味歸脾湯加味逍遙散治之而愈

一小兒因乳母感冒風寒發熱兒患嘔吐身發赤暈用東垣人參安胃散而愈又咬牙發搐嘔吐酸腐待其吐止自安

一小兒七歲身羸瘦兼吐少食發熱面黃余謂此脾臟受傷用六君加煨薑二劑而飲食進去薑又數劑而愈

一小兒吐乳不食手足搐搦痰涎上湧手足指冷額黑唇青此腎水勝心火也用五味異功散加木香炮薑一服去薑數服而愈

一小兒不時乾嘔不乳腹膨此脾胃虛而將成疳也用四味肥兒丸以治疳四君子湯以健中而痊後傷食吐瀉完穀形氣困憊四肢微搐余曰且勿藥次日吐止但搐而瀉青黃此脾土虛而肝木勝也用六君釣藤鉤而痊

一小兒吐瀉乳食色白不化露睛氣喘此脾肺不足形病俱虛也先用異功散加柴胡桔梗頓愈再用補中益氣湯而安

一小兒吐瀉驚悸困倦腹脹此心火虛而脾土怯也用六君茯神酸棗仁而愈又用祕旨保脾湯乃痊

一小兒吐瀉驚搐項強乃脾傷而肝侮形氣虛而病氣實也用異功散加釣藤鉤補脾平肝而愈

一小兒吐瀉呵欠煩悶不語畏明屬脾肺不能生肝腎也用異功散補脾肺地黃丸補肝腎遂痊

一小兒吐瀉腹脹不乳此脾胃傷也先用香砂助胃膏而飲食進後用六君子湯而脾胃健

一小兒寒熱作嘔飲食不入按其腹則哭此飲食停滯也先用大安丸遂安但唇目抽動大便稀黃此病邪去而脾氣虛弱也用六君子湯以補脾土釣藤鉤以平肝木悉愈

一小兒未週歲氣短喘急乳食少進時或吐乳乃脾傷而食積也先用六君山楂枳實漸愈後吐瀉作渴用胃苓膏以治吐瀉白朮散以生胃氣而安

一小兒四歲每飲食失節或外驚所忤即吐瀉發搐服鎮驚化痰等藥後患益甚飲食不入藥食到口即嘔用白朮一味和土炒黃用米泔水濃煎不時灌半匙次日微嘔又一日不嘔漸加至半杯月餘而愈

一小兒停食吐瀉身熱作渴瀉下紅白或青黃色服香連丸而愈甚兼手足指冷余謂始爲實終爲虛也用補中益氣湯加木香肉果而愈

一小兒傷食吐瀉大便溏泄或青綠色睡而露睛手足指冷額黑唇青此中氣虛弱寒水侮土也用五味異功散加升麻柴胡木香附子一劑而愈後患吐瀉不已先用胃苓散後用異功散而安

一小兒寒熱嘔吐或瀉青色余以謂脾虛肝木所乘也用六君柴胡升麻治之而愈後因驚寒熱寅卯時益甚小便頻數久而不愈此肝火血虛先以小柴胡湯加白朮茯苓當歸二劑頓止又用地黃丸而愈

一小兒白睛多唇色白七月間停食吐瀉困睡驚悸久治不愈余曰驚悸爲心血虛怯困睡爲氣虛弱皆稟脾腎不足所致也用補中益氣湯及六味丸加鹿茸而愈

一小兒瀉利青白手冷面青或時吃逆余用人參理中湯更加腹痛仍以前湯加木香乾薑二劑稍緩又以五味異功散加木香漸愈又用五味異功散加升麻調理而痊

一小兒腹痛作瀉飲食不化小腹重墜用補中益氣湯加乾薑爲末每服錢許米飲調服旬餘漸愈又以四君子湯而痊

一小兒泄瀉腹痛手足並冷唇青額黑余謂寒水侮土用益黃散痛止再用六君乾薑漏蘆子母服之頓止又用人參理中湯而痊

一小兒久瀉兼脫肛小腹重墜四肢浮腫面色痿黃時或兼青諸藥到口即嘔吐審乳母憂鬱傷脾大便不實先用補中益氣湯五味異功散及四神丸調治其母不兩月子母並愈

一小兒患瀉乳食不化手足指冷服消乳丸食乳即瀉余用五味異功散加木香子母服之而愈後時發搐唇口抽動用異功散加木香釣藤鉤補脾平肝而痊

一小兒泄瀉手足發搐痰涎上湧手足指冷額黑唇青用五味異功散加木香炮薑以補心火救脾土而愈

一小兒患泄瀉小腹重墜飲食甚少先用六君子湯送四神丸數劑瀉漸止飲食稍進又用補中益氣湯數劑下墜漸愈後因勞發熱自臍而起餓則熱甚用六君炮薑治之稍安又用加味歸脾補中益氣二湯而痊

一小兒夏間食粽傷胃吐而腹痛余用保和丸彼以

爲緩另用重劑吐瀉並作腹痛益甚按其腹却不痛余曰此食已消而脾胃虛也當溫補之仍行消導昏憒發搐余用異功散加木香治之漸愈後復傷食另用去積丸吐瀉不食手足並冷睡而露睛變爲瘧疾余用六君木香炮薑治之而愈

一小兒瀉而大便熱赤小便澀少此熱蘊於內也先用四苓散加炒黃連一劑其熱頓退又用白朮散去木香二劑熱渴頓止以四君升麻調理而痊

一小兒食炙煿甘甜之物常作瀉大便熱痛小便赤澀此膏粱積熱所致用四苓散清胃散各四服諸證稍退乃用四味肥兒丸而瘥

一小兒九歲食炙煿之物作瀉飲冷諸藥不應肌體消瘦飲食少思余用黃連一兩酒拌炒焦爲末入人參末四兩粥丸小豆大每服四五十丸不拘時白湯下服訖漸愈又用五味異功散加升麻服月餘而瘥後不戒厚味患疳積消瘦少食發熱作渴用九味蘆薈丸爲主以四味肥兒丸爲佐疳證漸退却以四味肥兒丸爲主以五味異功散爲佐而痊後又不禁厚味作瀉飲冷仍服肥兒丸異功散而愈

一小兒清晨泄瀉服消疳清熱之劑不應余謂脾腎虛用二神丸治之不信仍服前藥形體骨立復求治用四神六味二丸治之尋愈停藥數日飲食漸減泄瀉仍作至十七歲畢姻瀉渴頓作用前藥治之無效乃用補中益氣湯八味丸而始愈

一小兒因母怒氣停食患泄瀉服消導之劑更加吐乳先用養胃湯加炒黑黃連一錢吳茱萸三分木香四分治其母子亦灌一二匙悉愈後母傷食患血痢腹痛其子亦然治以四君加前三味母子俱服因惑于人言但令母服子另服治痢之藥加作嘔不乳手足並令余用五味異功散加木香炮薑漏蘆母子並服而愈

一小兒患瀉身熱作渴瀉下穢氣此爲內熱而瀉也用香連丸一服而愈後患瀉服黃連香薷飲益甚余用六君木香肉果而愈

一小兒患瀉作渴飲冷手足並熱睡而露睛此爲熱瀉用黃芩湯一劑而愈又用白朮散二服而安

一小兒患瀉面赤飲冷小便赤色先用四苓散香連丸各一服而便利勢減又用異功散加木香黃連各二分吳茱萸一分二服而愈

一小兒瀉而腹痛按之不痛用異功散加升麻而愈後復瀉服消乳丸益加腹痛余謂脾氣傷也復用異功散加木香而痊

一小兒吐瀉腹痛睡而露睛小腹重墜手足並冷先用六君升麻乾薑四服而痛墜愈又用異功散加升麻木香而悉愈後又傷食腹痛別服祛逐劑虛證悉具余用理中丸六君子湯而尋愈但噫氣下氣口角流涎此脾胃虛寒也復用理中六君子二湯而愈

一小兒泄瀉不食噯腐酸氣用平胃散一服而瀉止又用五味異功散而飲食增後復傷吐瀉喘嗽手足指冷面色黃白余謂脾虛不能生肺也用六君升麻桔梗而愈

一小兒傷食作瀉發熱服寒涼藥熱甚作嘔此胃經虛熱也先用四君升麻而嘔止又用白朮散而安

一小兒乳哺失節泄瀉腹痛自用藥下之反加痰搐又服化痰止搐之藥而痰搐益甚睡而露睛手足微冷余以脾胃已虛而重傷之也用異功散加木香釣藤鉤母子並服三日而痰搐止五日而瀉痛除

一小兒傷食瀉青發搐余謂肝木勝脾也用六君木香釣藤鉤而愈後傷食腹痛別用消食丸脣額頓黑瀉益甚此脾氣虧損寒水反來侮土也用六君木香乾薑而痊

一小兒面色痿黃傷食作瀉面色頓白氣喘而痰湧余謂脾肺氣虛下陷法當升補彼不信別服清氣化痰之藥虛證蜂起余先用補中益氣湯一劑諸證頓退又用五味異功散而痊

一小兒泄瀉兩寸脉或短或伏用補中益氣治之頓愈余見患前證不服此藥而危者多矣惜哉

一小兒飲食後即瀉先用六君升麻神麴山楂而止又用五味異功散加升麻而痊後傷食吐瀉腹痛用保和丸二服又用異功散調補脾氣而安

一小兒傷食作瀉腹脹四肢浮腫小便不利先用五苓散加木香旬餘諸證漸退又用五味異功散爲主佐以加減腎氣丸又旬日二便調和飲食漸進浮腫旋消乃以異功散調理而愈

一小兒十三歲傷食作瀉服尅伐之劑胷腹膨脹手足並冷余謂當調補中氣不信後見睡而露睛脣口搐動乃用六君木香釣藤鉤至四劑搐動頓止又二劑飲食加進以五味異功散加升麻柴胡膈寬瀉止而愈

一小兒因驚久瀉面色青黃余謂肝木勝脾土也朝用補中益氣湯夕用五味異功散加木香子母俱服

而愈

一小兒泄瀉驚搐其母面青脈弦先用小柴胡湯加木香漏蘆一劑次用四君木香釣藤鉤山梔母子同服而愈

一小兒因其母被驚患瀉服藥傷胃反致吐乳余用五味異功散炒黑黃連木香治其母時灌子一二匙俱愈後母因瞋怒停食下痢嘔吐腹痛其子昏憒不食以六君子加車前黃連木香母子俱服而安

一小兒久瀉青色腸鳴厥冷余曰此驚泄也脾土既虧則肝木來侮須溫脾平肝然後可愈彼以爲迂自用治驚等藥腹脹重墜小便不利四肢浮腫始信前言重復請治余先用五味異功散加升麻柴胡數劑諸證稍可又以補中益氣湯數劑飲食少加又因傷食夾驚吐瀉發搐復用異功散加柴胡釣藤鉤四劑諸證稍退又傷風咳嗽腹脹作瀉或用發散解利之劑手足逆冷睡中發搐余謂此脾土虛而肺金受證重傷眞氣故也用異功散加紫蘇一劑以表散邪次以補中益氣湯加茯苓半夏調補眞氣而痊

一小兒因驚吐瀉腹脹先用六君木香柴胡治之稍可又以五味異功散而愈後因驚搐痰甚或用鎮驚化痰之藥倦怠不食而泄益甚先用異功散加木香釣藤鉤四劑而愈

一小兒七歲食生冷之物腹痛便祕服峻利之劑連瀉五次噫氣腹痛余謂心脾虛寒用異功散加薑桂木香治之不從反治胃火更加吃逆余仍以前藥加附子一片一服諸證頓退仍去附子又三劑而愈其時同患是證用清胃化痰者歿手足俱黯

一小兒傷食嘔吐發熱面赤服消導清熱之劑飲食已消熱亦未退余以爲胃經虛熱用六君升麻柴胡四劑而痊

一小兒傷食嘔吐服尅伐之藥嘔中見血用清熱凉血反大便下血脣色白而或青余謂脾土虧損肝木所乘令空心服補中益氣湯食遠服異功散便涎血各歸其源果愈

一小兒吐酸乳食用四君吳萸黃連木香補脾平肝而愈後口中有酸水仍用前藥隨愈後吐苦水而口亦苦用龍膽湯以清肝火四君子以補脾土而痊

一小兒吐黃水所食之物悉皆甘味用瀉黃散清其胃火而愈後因停食服尅伐之藥口甘不食形氣殊弱用補中益氣湯養其中氣而痊

一小兒傷食噯腐用平胃散一服宿滯頓化余云不必多藥但節其飲食自愈不信別用尅滯之藥更加吐瀉以致不救

一小兒傷食發熱面赤抽搐嘔吐氣喘唾痰此飲食傷脾肺氣虛弱所致用六君子湯炒黑黃連山梔各二分一劑頓愈

一沈氏子吐瀉腹痛手足並冷余謂此脾土虛弱寒水所侮先用益黃散一劑諸證頓愈手足梢冷此寒水退而脾土虛弱也用異功散少加木香一劑却去木香再劑而痊

一小兒傷食發熱吐瀉腹痛欲服益黃散余曰內有丁香良薑非其所宜前證乃脾胃受傷而無寒證不信仍服前藥其痛益甚二便不通口舌糜爛而歿

一小兒傷食吐瀉不已後便泄青色睡而露睛手足指冷額黑脣青余謂大便青色木勝土也或時瀉泄脾氣不足也額黑脣青寒水侮土也悉屬中氣虛寒用五味異功散加升麻柴胡木香附子二劑而愈

一小兒盛暑嘔吐飧泄服黃連香薷飲益甚用白虎石膏湯而腹脹作痛手足並冷余謂脾氣虛寒且夏月伏陰在內也用五味異功散加木香而愈

一小兒亥子丑時發熱泄瀉用益黃散而愈後復發服前藥嗜臥露睛作渴少食大便頻黃余謂肝勝脾虛元氣下陷用補中益氣湯佐以地黃丸而尋愈

一小兒盛暑吐瀉米穀不化或用黃連香薷飲之頰腹脹作痛手足並冷此脾氣虛而伏陰在內也用五味異功散加木香治之而愈先君嘗云凡暑令吐瀉手足指熱作渴飲冷者屬陽證宜清凉之劑若手足指冷作渴飲湯者屬陰證宜溫補之劑故大人屬陰者誤用寒凉之藥死後手足青黯甚則遍身皆然於此可驗

一小兒傷食吐瀉不已瀉色青綠或溏白睡而露睛手足指冷額黑脣青余謂瀉痢青綠肝勝脾土也或時溏白脾土虛寒也額黑脣青寒水侮土也悉屬中氣虛寒用五味異功散加升麻柴胡木香附子一劑而愈

一小兒傷食嘔吐發熱面赤服消導之劑飲食已消熱亦未退余以爲胃經虛熱用六君子加升麻柴胡各二分四劑而愈

一小兒目睛緩視大便臭穢乃飲交感時乳所致用四君子加木香藿香治之而安

一小兒吐酸乳食用四君吳茱黃連木香補脾平肝

而愈後口中有酸水仍用前藥隨愈後唾苦水口中味苦用龍膽湯清肝火佐以四君補脾土乃瘥

一小兒唾黃水或口甘所食之物悉皆甘味用瀉黃散愈後停乳食服尅伐之藥口甘不食形氣殊弱用補中益氣湯而愈

醫學入門曰黃承務子二歲病傷食而瀉衆醫與止之十餘日便青白乳食不消身凉加哽氣昏睡咸謂困篤名錢先與益黃散補肺散各三服三日身溫而不哽氣後以白餅子微下之又益脾散三服利止何以然利本脾虛傷食初不與下之留連十日上實下虛脾氣弱則引肺亦虛脾肺子母故也今先補脾則肺病自退即身溫不哽氣也然後下其所傷或曰何不先下後補曰便青爲下臟冷若先下必大虛今先實脾而後下則不虛矣後更與補之乃安

景岳全書曰余季子於丁巳正月生於燕邸及白露時甫及半週余見新凉日至虞裀褥之薄恐爲寒氣所侵每切囑眷屬保護之而眷屬不以爲意及數日後果至吐瀉大作余即用溫胃和脾之藥不效隨用理中等劑亦不效三日後加人參三錢及薑桂吳茱肉豆蔻之類亦不效至四五日則隨乳隨吐吐其半而瀉其半腹中毫無所留矣余不得已乃用人參五六錢製附子薑桂等各一二錢下咽即吐一滴不存而所下之乳則白潔無氣仍猶乳也斯時也其形氣之危已萬無生理矣余靜坐書室默測其故且度其寒氣犯胃而吐瀉不止若舍參薑桂附之屬尚何術焉技已止此窘莫甚矣思之思之忽於夜半而生意起謂其胃虛已極但藥之氣味略有不投則胃不能受隨拒而出矧附子味臊亦能致嘔必其故也因自度氣味酌其所宜似必得甘辛可口之藥庶乎胃氣可安尚有生意乃用胡椒三錢搗碎加煨薑一兩用水二鍾煎至八分另盛聽用又用人參二兩亦用水二鍾煎至一鍾另盛聽用用此二者取其氣味之甘辛純正也乃用茶匙挑合二者以配其味凡用參湯之十加椒薑湯之一其味微甘而辣正得可口之宜遂溫置熱湯中徐徐挑而與之陸續漸進經一時許皆嚥而不吐竟得獲效自後乳藥皆安但瀉仍未止也此自四鼓服起至午未間已盡二兩之參矣參盡後忽爾躁擾呻吟煩劇之甚家人皆怨謂以嬰兒嬌嫩臟腑何堪此等熱藥是必燒斷肚腸也相與抱泣余雖疑之而不爲亂仍寧神熱思之意此藥自四鼓至此若果藥有難堪何於午前相安而此時遽變若此其必數日不食胃氣新復而倉廩空虛饑甚則然也傍有預備之粥取以示之則張皇欲得其狀甚急乃與一小盞輒銜吞虎嗜又望其餘遂復與半椀猶然不足又與半椀遂寂然安臥矣至次日復加製附始得瀉止全愈嗚呼此兒之重生固有天命然原其所致之因則人之臟氣皆繫於背褥薄夜寒則寒從背愈而入內干於臟中必深矣原其所治之法則用藥雖當而氣味不投無以相入求效難矣及其因饑發躁使非神悟其機倘妄用清凉一解則全功盡棄害可言哉故余筆此以見病原之輕重氣味之相關及診治之活變有如此關係者然此特以己之見故可信心救療如是設以他人之子有同是病者於用參數錢之時見其未效不知藥未及病必且煩言吠起誘其誤治改用苦寒無不即死而仍歸罪於用參者此時黑白將焉辨之故再贅其詳用以廣人之聞見云

都閫錢旭陽長郎年及兩週季夏間以生果傷脾因致先瀉後痢旭陽善醫知其不過傷於生冷乃與參朮薑桂溫脾等藥瀉痢不愈而漸至唇口生瘡乃謀之余余曰此兒明爲生冷所傷今不利溫藥將奈之何余曰此因瀉傷陰兼之辛辣遽入而虛火上炎耳非易以附子不能使火歸原也因用二劑而唇口瘡痛咽腫倍甚外見於頭面之間而病更劇矣又謀之余曰用藥不投如此豈眞因濕熱耶余診之曰上之脈息下之所出皆非眞熱本屬陽虛今熱之不效雖屬可疑然究其所歸寒之則死必無疑也意者藥猶未及耳旭陽曰尚有一證似屬眞寒今其所用湯飲必欲極滾極熱者余等不能入口而彼則安然吞之即其喉口腫痛如此所不顧也豈其證乎余曰是矣是矣遂復增附子一錢五分及薑桂肉果人參熟地之屬其瀉漸止瀉止而喉口等證不一日而全收矣疑似之間難辨如此使非有確持之見萬無一生矣余自經此以來漸至不惑後有數見證治大同者俱得保全憶此不惑之道其要何居在知本之所在耳臨證者可無愼哉

一小兒瀉大便熱赤小便澀少此熱蘊於內也先以四苓散加炒黃連一劑其熱頓退又用七味白朮散去木香二劑熱渴頓止後以四君升麻調理而痊

余初年在京治一五歲鄰女適經藥舖見有曬晾巴豆其父誤以爲松仁以一粒與食之嚼而味辛即忙

吐出而已半粒下咽矣少頃大瀉十餘次瀉後次日即致肚腹通身悉皆腫脹絕口不食因求治於余或謂宜黃連菉豆以解毒或謂宜四苓五皮以利水余曰大攻之後豈非大虛之證乎能再堪苦寒以敗脾否大瀉之後又尚有何水之可利遂單用獨參湯及溫胃飲以培脾氣不數劑而復元如初夫既已大瀉而何以反脹若是因此一證乃知大虛大寒而致成腫脹者類多如此

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百五十八卷目錄
醫部彙考四百三十八
小兒二便門
張從政儒門事親 大小便不通 淋瀝
魯伯嗣學嬰童百問 大小便不通 大便不通 遺尿 尿
白濁 便血臟毒 脫肛 痔瘻 五淋
王綸明醫雜著 大小便 白
徐春甫古今醫統 遺尿
薛氏保嬰撮要 遺尿
王肯堂證治準繩 大小便不通 大便不通 遺尿 尿白便濁 淋
小兒衛生總微論方 大小便論 五淋論
方 地榆子湯 大黃丸 脫甲散 掩臍法 四順清涼飲 大連翹湯 柴胡散 大柴胡湯 大承氣湯 輕粉散 木通湯 凡正散 芭蕉散 梔子仁散 茯苓散 三稜散 益智散分清飲 又方 甘露飲 聚金丸 琥珀散 金砂散 立效散 犀角地黃湯 千金地黃丸 梔仁赤氣湯 黃連解毒湯 瀉腸散 丹石散 陳氏瞿李仁丸 苦參湯 又方 赤石脂散 吉氏治二便不通方 犀角丸 芍藥散 又方 握宣丸 聖惠芍藥散 錫腸散 張氏鷄腸散 五淋散 導赤散 葵子散 香芍散 清心蓮子飲 血淋神效方 又方 氣淋方 白礬丹 琥珀散 燒子散 滑石散 瀉黃散 君材丸 香砂丸 檢頭散 冬葵子散 葵石散 車前散 珠砂丹 珠砂散 猪肺散

單方

鍼灸

醫案

凡小兒大小便不通內經謂三焦約約者不行也可用長流水煎八正散時時灌之大小便利則止若不因熱藥所攻而致此者易治或因多服熱藥而燥劇至此者非惟難治不幸天耳亦可用蜜水調益元散送通腸丸

淋瀝

小兒病沙石淋及五種淋瀝閉癃井腸腹痛益元散主之以長流水調下八正散石葦散依方服用此三藥皆可加減服之

小兒病沙石淋及五種淋瀝癃閉井腸腹痛益元散主之以長流水調下蓋因熱在膀胱燥其津液故俗謂冷淋者天下之通弊也五淋散減桂加益元散名曰滲散

明魯伯嗣學嬰童百問

大小便不通

議曰調理嬰孩傷寒體熱頭目昏沉不思飲食夾驚夾食寒熱大小便閉澀不通煩躁作渴冷汗妄流夾積傷滯腸滿脹急青黃體瘦日夜大熱及療傷風傷暑驚癇客忤腎藏疳氣等熱並宜脫甲散主之亦可服大連翹湯加大黃神芎治小兒驚風積熱大小便澀滯其效尤速又掩臍法用連根葱一根不洗帶泥土生薑一片淡豆豉二十一粒鹽二匙同研爛捏餅烘熱掩臍中以綿扎定良久氣透自通不然另換一劑小便不通亦可

大便不通

議曰小兒大便祕乃是肺家有熱在裏流入大腸以致祕結不通乃實熱也當以四順清涼飲加柴胡熱甚者加山梔黃芩流利之其表裏俱熱者面黃頰赤脣燥口乾小便赤澀大便焦黃無汗者先解表以柴胡散汗之解後大便祕或肚疼者以清涼飲大柴胡湯承氣湯皆可下之積熱者神芎丸尤妙

小便不通

湯氏云凡小兒小便不通皆因心經不順或伏熱或驚起心火上攻不能降濟腎水不能上升故使心經愈熱而小腸與心合所以小便不通木通湯主之甚者八正散又小便不通臍腹脹悶心神煩熱梔子仁散主之積熱者神芎丸效

遺尿

巢氏云遺尿者此由膀胱有冷不能約于水故也腎主水腎氣下通于陰小便者水之餘也膀胱爲津液之府既冷氣衰弱不能約水故遺尿也楊氏云小兒尿牀由膀胱冷夜屬陰小便不禁睡裏自出宜破故紙散治之益智之劑亦不可闕

尿白濁

湯氏云小兒尿白者由乳哺不節過傷于脾故使清濁不分而尿白如米泔也久則成疳亦心脾伏熱兼而得之宜疏脾土消食化積通利小腑也茯苓散主之三稜散消食丸可選而用之分清飲亦可服

便血臟毒

議曰兒生七日之內大小便有血出者此由胎氣熱盛之所致也母食酒麵炙煿熱物流入心肺兒在胎內受其熱毒亦傳心肺且女子熱入心故小便有之男子熱入肺故大腸有之血出淡淡有似胚水盛則其血加鮮凡遇有此不可以他藥只以生地黃根取自然汁入蜜少許和勻溫溫與服移時自安男子皆效甘露飲宜兼與服茅根茅花煎濃湯服亦效犀角地黃湯亦可服臟毒聚金丸用之效地黃丸亦可用有瘀血者桃仁承氣湯下之

脫疘並痔證

湯氏方治脫疘大腸自糞門出宜用葱湯熏洗令軟款款送上此因瀉利得之者亦可服瀉利之藥然後用槐花等藥又有用一味五倍子煎湯入矾硝熏洗而縮者又有用真蒲黃碾極細以豬膽拌勻傳疘門上而入者全嬰方用澱腸散兼有痔證腫痛者用黃丹滑石等分井水調塗卽消並用鉛白霜半錢片腦半字好酒調傳腫處甚佳黃連解毒湯亦可服用苦參湯洗亦效亦有蜜陀僧白礬片腦末傳上更用荊芥防風等項洗之用生瓜蔞根者效

五淋

巢氏云小兒諸淋者腎與膀胱熱也膀胱與腎爲表裏俱主水水入小腸下于胞行于陰爲小便也膀胱熱則津液內涸水道不通停積于胞腎氣熱則澀故令水道不利小便淋瀝故謂之淋其狀小便出少而數其小腹急痛引臍是也又有石淋氣淋熱淋血淋寒淋五淋形證各有說焉

其石淋者淋而出砂石也腎與熱所乘則化爲石小便莖中痛尿不能卒出時自痛引膀胱裏急砂石從小便而出也

其氣淋者腎與膀胱受肺之熱氣則脹氣爲熱所乘故流入膀胱則氣壅不散小腹氣滿水不宣利故小便澀而成淋也

其熱淋者三焦有熱氣得于腎與膀胱故熱氣流入于胞而成淋也

其血淋者是熱之盛甚則尿血謂之血淋心主血其熱甚者血則散漫失其常經滲溢入胞而成血淋矣若寒淋者其病狀先寒戰然後尿是也小兒取冷過度下焦受之冷氣入胞於正氣交爭寒氣正氣相勝則戰寒氣解故得小便也

治淋之法金砂散立效五苓散木通散等劑機變用藥必可求痊導赤散亦效與大方脈相參用藥不亦可乎

王綸明醫雜著

大小便白

小兒大小便時時審看小便如米泔或澄停少頃變作泔濁此脾胃濕熱也若大便泔白色或如魚凍或帶紅或色黃黑此積滯濕熱也宜理脾消滯清中宮去濕熱節飲食若忽然變青此是變蒸也不必用藥若久不愈用補脾制肝藥一二服亦不宜多用

註按小便如泔或大便泔白宜用肥兒丸若積滯黃黑宜用四君子加黃連木香若色青日久不復或兼泄瀉或兼腹痛當用六君子加木香芍藥若肌體色黃小便不利髮黃脫落鼻下瘡瘍嗜土少食大便青褐色者須用倒子狀苓湯

徐春甫古今醫統

遺尿

小兒遺尿者此由膀胱有冷不能約於水故遺尿也又有尿來者亦由膀胱冷夜屬陰小便不禁胞裏自出謂之尿來也用破故紙散益智仁散雞腸散服

薛氏保嬰撮要

遺尿

腎主水與足太陽相爲表裏經曰膀胱者州都之官津液藏焉臥則陽氣內收腎與膀胱之氣虛寒不能約制故睡中遺出內經謂膀胱不約爲遺是也用破故紙散益智散雞腸散之類主之亦有熱客於腎干於足厥陰之經廷孔臂結而血氣不能宣通則痿痹而無所用故液滲入膀胱而漩溺遺失者用六味地黃丸虛熱亦用前丸脾肺氣虛者用補中益氣湯加補骨脂山茱萸

王肯堂證治準繩

大小便不通

翰林待詔楊大鄰問小兒大小便閉澀者爲何答曰乳食失度使之四大不調滋味有貪遂乃五臟受病甘甜聚食酸酸滯涎食滯留結於腸胃風寒濕熱於心肺氣脈不順水穀不行不壅遏於上焦卽祕結於下部小兒不知疼痛莫說因由驚啼叫以頻頻但怒脹而不乳不知孩兒痛刺連臍則面色青黃但按脉息與治若不見病源只依外變用藥安能克效

大便不通

此因乳母或兒育粱積熱及六淫七情臂火傳兒爲患者用清邪解臂之劑禀賦怯弱早近色慾大便難

而小便牽痛者用滋補肺腎之劑褚氏遺書云男子精未滿而御女以通其精則四體有不滿之處異日有難狀之疾老人陰已痿而思色以降其精則精不出而內敗精已耗而復竭之則大小便牽痛如淋今童子卽有此患益見今人所稟與古人大徑庭矣人之氣血厚薄既殊而醫之用藥療法又豈可泥執古方而無加減之變乎

小便不通

嬰兒小便不通者有陰陽二證陰閉者爲冷濕乘虛入裏因而不通名曰陰閉以白芍藥湯加南木香及用炒鹽以絹帕兜令帶熱熨臍四圍併投五苓散入靈砂末鹽湯空心調服其效尤速陽閉者因暴熱所遏濕而不通名曰陽閉又有癃閉與淋不同內經言明五氣篇曰膀胱不利爲癃蓋癃者乃內臟氣虛受熱壅滯宣化不行非濕非痛但閉不通腹脹緊滿但以咬咀五苓散加車前燈心之類及投木通散玉露飲益元散皆可用之或貼臍藍敷餅於臍上取效不拘陰陽二證悉能療之併與萬安飲尤妙

東垣云小便不利有在氣在血之異夫小便者足太陽膀胱之所主長生於申申者金也金能生水肺中伏熱水不能生是絕小便之源也治法用清燥金之正化氣薄之藥茯苓豬苓澤瀉琥珀燈心通草車前瞿麥扁蓄之類皆爲淡滲能泄肺中之熱而滋水之化源也若不渴熱在下焦是熱濕其流而溺不泄也須用氣味俱厚陰中之陰藥治之二者之病一居上焦在氣分而必渴一居下焦在血分而不渴血中有濕故不渴也二者之殊至易分別耳切謂前證若津液偏滲於腸胃大便瀉利而小便澀少者宜分利若熱邇於下焦津液燥而小便不行者宜滲泄若脾胃氣澀不能通調水道者宜順氣若乳母肝心二經有熱者用梔子清肝散肝經怒火者用柴胡梔子散若因父母曾服燥劑而致者用四物麥門甘草數而黃者用四物加山茱萸黃藥知母五味麥冬肺虛而短少者用補中益氣加山藥麥門陰挺痛瘭而頻數者用地黃丸熱結膀胱而不利者用五淋散脾肺燥不能化生者用黃芪清肺飲膀胱陰虛湯無以生而淋漓者用滋腎丸若膀胱陽虛陰無以化而淋瀝者用六味丸若因乳母厚味酒炙粘熱者用清胃散五淋散仍參諸淋覽之

遺尿

原病式云遺尿不禁者爲冷內經云不約爲遺溺仁齋曰小便者津液之餘也腎主水膀胱爲津液之腑腎與膀胱俱虛而冷氣乘之故不能拘制其水出而不禁謂之遺尿睡裏自出者謂之尿牀此皆腎與膀胱俱虛而挾冷所致也以雞腸散主之

會氏云心腎傳送失度小腸膀胱之關鍵不能約束有睡愛而遺者皆是下元虛冷所致亦因稟受陽氣不足用三因方家韭子丸治之及參苓白朮散補腎地黃丸然又當實土以存水乃免滲泄之患所謂補腎不如補脾是也平胃散倍加益智仁剉碎鹽炒燒鹽煎空心溫服

尿白便濁

全嬰方云小便初出微赤良久白濁者乃熱疳之邪也初出黃白久白濁者乃冷疳之候也冷者益黃散主之熱者牛黃丸主之冷熱者蘆薈丸主之純下白濁者厚朴丸主之諸失津液欲成疳而小便白者茯苓散主之

小便如泔或良久變白亦有脾虛食積濕熱下注者先用茯苓散五七服次用四味肥兒丸若乳食少思或肚腹脹大小便頻數此脾虛元氣下陷也朝用五味異功散夕用四味肥兒丸若體肥色黃小便不調或黃脫落鼻下瘡瘍嗜土少食大便青褐者用梔子茯苓湯仍審其乳母飲食七情治之

淋

諸淋皆腎虛所致腎與膀胱爲表裏至水下入小腸通於胞行於陰而爲溲腎氣通於陰下流之道也淋有五名曰膏曰冷曰熱曰血曰石各具于後

膏淋見小便有肥脂似膏而浮于小便之中此腎虛不能制其肥液而下行也

冷淋先戰慄而後小便此亦腎虛而下焦受冷冷氣入胞與正氣交爭故小便澀而戰慄

熱淋下焦有熱熱氣傳於腎流入於胞其溺黃多而澀間有鮮血而同來者

血淋熱之極也心者血之主外行經絡內行臟腑熱盛則失其常道心與小腸爲表裏故下流而入於胞則爲血淋

石淋腎主水水結則化爲石腎爲熱所乘遇小便則竅中痛不得流利痛引小腹則沙石從小便出甚至塞痛令人昏悶遍身有汗而後醒此痛之使然蓋五淋者難曰腎虛所致然小腸爲受盛之府氣通於膀胱膀胱爲津液之府氣通於腎餘化下流而不通皆

日腎氣不足熱入膀胱水道澀而不利出入起數膀腹急痛蘊作有時或如豆汁膏血並以局方五淋散下龍腦雞蘇丸自然平愈及香芎丸補腎地黃丸與之疏導補益爲上

夫淋有五石淋者腎熱化石內塞水道痛引膀胱氣淋者肺氣壅熱小腹脹滿小便澀滯熱淋者三焦有熱傳入腎膀胱流入于胞小便赤澀血淋者心熱血散失其常經溢滲入胞寒淋者膀胱氣冷與正氣交爭寒戰氣解是也亦有因婬母肝熱及乳母恚怒者當分五臟蓄熱治之若心臟有熱者導赤散加黃連肝臟有熱者柴胡梔子散大便不通瀉青丸脾臟有熱者瀉黃散脾氣不足者異功散脾氣下陷補中益氣湯肺臟有熱者瀉白散肺氣虛熱者異功散加炒黑山梔腎臟有熱者地黃丸或因乳母肝經熱者用梔子清肝散恚怒者用柴胡清肝散乳母厚味者用加味清胃散心小腸熱者用清心蓮子飲或兒早近色慾小便澀滯或作痛及更去後大小便牽痛者皆屬肝腎不足也用六味地黃丸補中益氣湯加牛膝車前肉桂未應當參五臟所勝不可輕用滲泄寒凉之藥大損胃氣仍參前大便不通證覽之

小兒衛生總微論方

大小便論

小兒大便有祕澀者有不通者皆由臟腑有熱乘於腸胃胃熱則津液少少則糞燥結實而大便難下則爲祕澀甚則不能便乃爲不通也小便有滴瀝者有不通者由小腸與膀胱有熱二經俱主水水入小腸傳於膀胱循水道出而小便也熱氣乘之則水耗少而行澀故滴瀝而下也甚者水道乾而不通也若熱入小大腸則壅滯不得宣利故大小便俱不通也

五淋論

淋病有五一曰熱淋即血淋二曰寒淋即膏淋三曰氣淋四曰勞淋五曰石淋五淋之中小兒有所患者惟寒熱氣之二證外勞石二者極虛所致小兒未親色慾故無患者恐兒本怯腎弱有之亦千中無一矣今並具五淋之證於下

熱淋者因熱乘小腸膀胱二經皆主水水入小腸傳於膀胱行於水道出於陰中而爲小便也故陰爲水液之路膀胱爲津液之府熱則水道燥燔水澀行澀致水道不利小便淋瀝因名曰淋其候出少而起數小腹急痛引膀連莖中痛也熱甚者溺血故亦曰血淋血得熱則流散滲入於胞隨淋溺而下也

寒淋者因寒冷干於二經而作其候先寒戰而後發之是邪氣與正氣交爭也寒氣勝則發寒戰正氣勝則寒戰解而得溺溺則出少澀滯小腹連莖中而痛寒甚者溺白如稀膏故亦曰膏淋亦如痢下熱則便血寒則便膿也痢下者寒熱搏於大腸也今淋者寒熱搏於小腸也

氣淋者小兒因怒而啼氣入二經爾溜不散邪正相搏胞內氣脹其候每溺則腰下憋脹水道澀不能下莖中相引而痛常有餘瀝也

勞淋者因腎虛精竭氣通於陰水道乾澀之所爲也腎與膀胱爲表裏今腎虛精竭則膀胱亦虛不能約制其水故水液頻數而下水道乾燥則不能通利其候尿窗竅內數起不出引小腸連莖而痛也

石淋者小者爲沙大者爲石皆云腎主水水爲熱結化而爲石其言雖近而不知其本也且腎有二臟左者爲腎右爲命門主水而爲壬聖濟經云壬者一水一石之謂歟不知一水一石之道未達生化之妙本太一精眞在上兆于水立于石是腎中本有眞之物也患者乃眞精化而眞物出焉其候沙石從水道出塞痛明絕故痊者鮮矣

方

地膚子湯千金方

治小兒熱毒入膀胱中忽患小便不通欲小便則澀痛不出出少如血須臾復出

地膚子　瞿麥　知母　黃芩　枳實　升麻　大黃十八銖　冬葵子　猪苓各六銖　通草　海藻　橘皮各三銖

右十二味㕮咀以水三升煮取一升一日至七日兒服一合爲三服八日至十五日兒一合半爲三服十六日至二十日兒二合爲三服四十日兒以此爲準五十日以上七歲以下以意加藥益水

大黃丸小兒通宜下同

治風熱便祕飲水

大黃一兩酒洗蒸曬　炙草二錢五分　川芎　黑牽牛各五錢牛生半炒

右爲末糊丸麻子大每服數丸溫蜜水下

薛已曰按前方乃內疏之峻劑審其因果屬臟內實熱方可用

脫甲散 嬰童白問下同

治大小便不通

柴胡　當歸　膽草　白茯各一錢半　知母

炙草　川芎各三錢　人參二錢

右剉散每服二錢水一小盞連鬚葱白帶土三寸煎至半盞溫服不拘時

大連翹湯

治二便閉結

連翹　瞿麥　荊芥　木通　當歸　赤芍藥

防風　蟬蛻　柴胡　活石　甘草炒各一錢

山梔子　黃芩各五分

右剉細每服一錢加紫草煎溫服

熱甚加大黃更詳證加減爲佳

神芎丸

治二陰並閉

生大黃　黃芩　生牽牛末各二兩　滑石四兩

黃連　薄荷　川芎各半兩

右爲細末滴水爲丸如桐子大每服四五十丸食後溫水下

一方加蒲黃止血證用

掩臍法

治大小便不通

海螄四十九粒　葱根七個　黑豆七個

鹽少許

右同研爛捏成一餅烘熱放臍上以帛扎定久則自通

四順清涼飲

通順大腸令無壅閉

赤芍藥　當歸　生甘草　大黃各等分

右㕮咀三歲以上每服一錢水一盞煎七分作兩服

欲利小便用赤芍藥

虛熱加甘草

不利減大黃

冒風邪加去節麻黃

中風體強眼睛上視加獨活量兒大小虛實加減微溏利爲度可加荊芥

柴胡散

治大便不通

石膏　黃芩　生甘草　赤芍藥　葛根各一分

麻黃去節　柴胡各半兩

右㕮咀三歲兒每服一錢水一小盞生薑少許葱白三寸豉二十粒煎五分去滓溫服不拘時出汗爲效

治熱嗽加杏仁五味子各二錢

大柴胡湯

治大便閉結蓄熱于內

柴胡去蘆八錢　黃芩　赤芍藥各三錢半

半夏湯泡七次切焙二錢五分　枳實麩炒半錢

右㕮咀加薑棗煎服之

欲下加大黃半兩

大承氣湯

治邪熱結於胃中及停宿積不去

大黃　硝硝各半兩　厚朴一兩　枳實二枚

右剉散每服三字煎三片煎服

輕號散

治小兒初生大便不通

輕粉一分　蜜少許

右以熱湯調開蜜糊輕粉點兒口卽通與一二次再不可與

木通湯

治小便不通小腹疼痛

木通　滑石各一兩　黑牽牛半兩 炒

右㕮咀燈心葱白煎去滓大小加減以意

八正散

治小兒小便赤澀不通熱淋血淋之證

車前子　瞿麥　滑石末　大黃濕紙裹煨

山梔　扁蓄　木通　生甘草

右剉散每二錢水一盞入燈心煎七分去柤溫服食後臨臥小兒量力少少與服

葱號散

治七日小便不通

葱白三四寸　人乳

右件同搗如泥付兒口內卽與乳下

梔子仁散

治小兒小便不通臍腹脹悶心神煩熱

梔子仁五枚　茅根　冬葵子各半兩

生甘草減半

右剉散每服二錢水一小盞煎五分去滓不拘時溫服

茯苓散

治小兒尿白如米泔因乳哺失節傷脾致使不分清濁而色白也久則成疳亦心脾伏熱兼而得之

三稜　蓬朮煨　砂仁　赤茯各半兩　青皮　陳皮　滑石　甘草微炒各二錢半

右爲末每服一錢麥門冬燈心煎湯調下

三稜散

治小兒尿白者由乳哺不節過傷于脾故使不分清濁而白也久則成疳宜疏土消食化積

三稜　蓬朮煨各一兩　益智仁研　生甘草　神麴炒　麥芽炒　橘皮各半兩

右爲末每服一錢白湯調下

分清飲

治通心氣補漏精治小便餘瀝並赤白濁

益智仁　川萆薢　菖蒲鹽炒　天台烏藥各等分

右爲細末入些子鹽空心服或燈心煎湯調下可加茯苓白芍藥

金砂散

治小便淋瀝不通

鬱金　海金砂　滑石　生甘草各等分

右爲末三歲兒一錢煎地膚子湯調下燈心木通湯亦可

一方用冬瓜汁煎最治小兒實熱小便不通淋瀝并渴

立效散

治小兒諸淋不通莖中疼痛

木通　生甘草　白孩兒花各王不留行　胡荽　滑石　海金砂　山梔　檳榔各等分

右剉散每服二錢水半盞煎三分去滓服

破故紙散

治小兒夜間尿牀由膀胱冷夜屬陰小便不禁睡裏自出

破故紙

右一味炒爲末熱湯調下

一方用黃蘗湯調下

益智散

生益智　白茯苓去皮　茯神去皮等分

右爲細末空心清茶調下亦治白濁

又方

五倍子一半生一半燒存性

右爲末雪糕爲丸每服三十粒米飲下

甘露飲

治小兒大便不調小便黃澀或時身熱並皆治之

熟地黃　麥門冬去心　枳殼去穰　炙草　茵陳　桃杷葉蜜炙　石斛　黃芩　乾地黃　天門冬去心焙各等分

右剉散每服二錢水一盞煎七分去滓食後臨臥溫服小兒一服分作二服仍量歲數加減服

聚金丸

治大便下血

黃連四兩一兩水浸曬一兩炒一兩炮一兩生用　黃芩　防風各一兩

右件爲細末煮麵糊丸桐子大每服五十丸量意加減以米泔浸枳殼水下不拘時候

夏月入大黃一兩三時不須用或枳殼爲末入前藥爲末亦效小兒丸棗豆大亦治血痢

犀角地黃湯

治大便黑

生犀角如無以升麻代之　丹皮去骨各一兩　生地黃半斤　芍藥七錢半

右剉散每服三錢水一盞煎服

千金地黃丸

治心熱腸風臟毒去血

黃連四兩粗末　生地黃半兩研取汁連滓

右二味拌勻日中曬極乾爲末蜜煉爲丸如桐子大每服三十丸食後麥門冬湯下量大小加減

桃仁承氣湯

治大便瘀積下鮮血或黑

大黃四兩　桂皮　生甘草　硝石各二兩　桃仁五十枚去皮尖雙仁諸本皆同惟外書用一百五十

右剉散每三錢水煎服以快利爲度未利再投

澀腸散

治小兒久痢大腸脫出不收

訶子炮　赤石脂　龍骨

右爲末臘茶少許和藥搽腸頭上絹帛採入又治痢米湯調

又用五倍子焙爲末入茶依前方用

丹石散

治外痔如神

黃丹　滑石各等分

右爲細末新汲水調塗日三五上

勝雪膏

治隨腸番花鼠妳等痔熱痛不可忍或已成瘡者並皆治之

片腦　鉛白霜

右件各半字用好酒少許研成膏子塗之隨手輒愈

黃連解毒湯

治痔漏下血大腸火證

黃連三錢　黃蘗半兩　梔子四個擘　黃芩一兩

右剉散每服三錢水一盞煎六分去滓服

苦參湯

治脫肛並痔

枳殼　黃連　大黃　生甘草　荊芥　苦參

赤芍藥　黃芩各等分

右剉散每用五錢以車前子茅草同煎熏洗

又方

生瓜蔞根

右研粉猪油溫煖挼入又用萆麻子貼頭頂上腸即入便去萆麻

赤石脂散 醫學綱目

治小兒因痢後努躽氣下推出肛門不入

眞赤石脂　伏龍肝各等分

右爲細末每用五分傅肛頭上頻挼入

一方加白礬

錢氏郁李仁丸 證治準繩下同

治小兒大小便不通并驚熱痰實欲得溏動者

川大黃去粗皮取實者剉酒浸半日控乾炒爲末

郁李仁去皮各一兩　滑石半兩研細

右先將郁李仁研成膏和大黃滑石丸如黍米大量大小與之以乳汁或薄荷湯下食前

犀角丸

治小兒風熱痰實面赤大小便祕溫三焦邪熱臟腑蘊毒疏導極穩

大黃二兩酒浸切片以巴豆去皮一百箇貼在大黃上紙裹飯上蒸三次炒令黃焦去巴豆不用

生犀末一分　人參去鬚切　枳實去瓤炙

檳榔各半兩　黃連一兩

右爲細末煉蜜和丸如麻子大每服一二十丸臨臥熟水下未動加丸數

芍藥散

治大小便下藥不通者

芍藥　大黃　甘草炙　當歸　砂硝各三分

右爲末每服一大錢水一盞瓦器中煎至半盞去滓服即通

吉氏治二便不通方

甘草節炮　槐花洗各一兩

右件末每服一錢茶半錢湯點下

又方

滑石一大錢　燈心一握

右以水二椀煎至一盞溫服

子母祕錄用蜂房燒末酒服一錢日再

握宣丸

治小兒便難燥結或服溫藥腹脹悶亂命在須臾可用此方不移時大小便自利

巴豆一錢半　硫黃　良薑　附子　檳榔

甘遂各等分

右爲細末粟米飯和丸如菉豆大用椒湯洗小兒男左女右手握之用綿裹定看行數多少將藥洗去不用即止

聖惠芎黃散

治小兒大便不通腹脅煩悶

大黃剉微炒　郁李仁湯浸去皮微炒各三分

川芎藭半兩

右件藥搗細羅爲散每服一錢以溫水半盞調服量大小以意分減以利爲度兼治大小便不通

雞腸散

雞腸一具男用雌女用雄燒存性　牡蠣　茯苓

桑螵蛸炒各五錢　桂　龍骨各二錢半

右爲極細末仍以鷄膍胵一具鷄腸一具燒存性研極細末每用前藥末一錢用溫酒調化食前服

張氏鷄腸散

治因膀胱有熱服冷藥過多小便不能禁止或遺尿病

鷄腸草　龍骨　麥門冬去心焙　白茯苓

桑螵蛸各半兩　牡蠣粉七錢半

右件藥搗爲麤散每服一錢水一小盞入生薑少許棗二枚煎至六分去滓溫服量兒大小加減

按此與前方蓋一方而傳寫之訛竊謂用雞腸較是而張氏婁氏薛氏皆主用草今兩存之

五淋散

赤茯苓去皮　赤芍藥炒　山梔子去殼　甘草

當歸　黃芩炒　車前子　淡竹葉　燈心
木通去皮節　滑石水飛　葵子　葶藶炒
右㕮咀用葱白一莖水煎入車前草杵擣取汁用
五苓散調化食前服或硝石末調化服
白淋白茅根燈心煎湯服
有氣淋小腹脹滿尿後有餘淋木通煎湯服
熱淋小便赤而淋瀝腰下痛新水煎服或黃芩煎
湯服
石淋莖內痛尿澀有砂石令人悶絕滑石瞞紙炒
焦爲細末葵子煎湯服
五淋散
治膀胱有熱水道不通淋瀝不出或尿如豆汁或
成砂石或如膏或熱沸便血
赤茯苓六錢　當歸　甘草各五錢　赤芍藥
山梔子各二錢
右㕮咀每服三錢水一小盞入燈心煎服
導赤散
治小兒血淋
生地黃　木通各二錢　黃芩　生甘草各一錢
右爲末每服一錢井水入燈心煎服仍以米飲調
油髮灰空心灌下
葵子散
葵子　車前子　木通　桑白皮炒　瞿麥
赤茯苓　山梔子　炙甘草各等分
右水一盞煎服
香芎散
治諸淋證若患風閉尤效
香附鹽水炒　川芎　赤茯苓去皮各半兩
海金砂　滑石　枳殼泡去瓤麩炒黃　澤瀉
石韋去老皮梗取葉　檳榔不過火各二錢半
右剉曬爲末糯米粉煮爲清糊丸麻仁大每服三
十三丸至五十五丸或七十七丸並用麥門冬熬
水空心送下若小便澀痛滴三五點者取流水用
火微溫入鹽少許調勻空心嚥下
清心蓮子飲
治小兒小便赤澀或欲成淋並宜服之
黃芩　車前　炙草　麥冬　地骨皮各半兩
黃芪蜜炙　白茯苓　蓮肉去心　人參各七錢半
右剉碎每服五錢水一盞煎至六分去滓食前服
如發熱加柴胡薄荷
血淋神效方
紫草　連翹　車前子各等分
水煎服
又方
海螵蛸　生地黃　白茯苓
右等分爲末柏葉車前草煎湯調下
氣淋方
赤芍藥一兩　檳榔一枚麵裹煨
右爲末燈心同葵子煎湯下
石燕丹
治小便淋澀痛悶
石燕燒赤醋淬細研　瞿麥　滑石各一兩
木通剉　海蛤細研各半兩
右件搗羅爲細末煉蜜和如桑米大每服十粒以
葱白湯下食前量兒大小加減
石韋散
治諸淋澀水道中痛臍下妨悶
石韋去毛一兩　葵子　木通　赤茯各半兩
車前子　瞿麥　榆白皮　滑石　甘草各二錢半
右件藥搗羅爲散每服一錢以水一小盞入葱白
五寸煎至六分去滓溫服如人行十里再服量兒
大小加減
葵子散
治腎熱水結化爲石淋甚者水道中澀痛不可忍
冬葵子一兩　石楠　榆白皮剉　石韋去毛
木通剉各半兩
右件藥搗羅爲散每服半錢以葱白湯調下日二
服量兒大小加減
滑石散
滑石　瓜蔞根　石韋去毛各等分
右件藥搗羅爲散每服半錢煎大麥飲清下日二
服量兒大小加減
蒲黃散
治膀胱熱甚血淋水道澀痛
蒲黃　冬葵子　生地黃各半兩
右件藥搗羅爲細末每服一錢以水一大盞煎至
六分去滓溫服量兒大小加減
君朴丸
治小兒小便白濁久則黃瘦不長肌肉
史君子煨去殼　厚朴製　黃連各一兩
木香三錢

右爲末蒸餅糊丸桐子大每服一二十丸米湯下

香砂丸

治嬰孩小便白濁

香附子炒一兩　縮砂去殼五錢　三稜煨

蓬莪朮煨　陳皮　麥芽炒　蘆薈各五錢

右爲極細末煮麵糊丸如黍米大用米飲鹽湯食前服

捻頭散

治小便不通

元胡索　川苦楝各等分

右同爲細末每服半錢或一錢捻頭湯調下量大小多少與之食前服捻頭湯卽沸湯中滴油數點者是

冬葵子散

治小兒腹急悶

冬葵子一兩　木通半兩

右爲末每服一錢水煎

葵石散

治小便不通悶亂者

葵根一握剉　滑石　木通各一兩　牽牛炒五錢

右件搗爲麤末每服一錢以水一大盞入燈心葱白各少許煎六分去滓放温服乳合煎

車前散

治熱盛積於小腸甚則尿血

牡蠣燒爲粉半兩　車前子　甘草炙微黃剉

川升硝各一兩

右件藥搗羅爲散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓温服不拘時量兒大小加減

硃砂丹

治臟腑有熱小便澁赤大便不通

硃砂細研水飛　續隨子各半兩　腻粉一錢

右件藥都研令勻蜜和如黍米大每服七粒以温水下量兒大小加減乳食後

硃砂散

治心神煩躁小便赤澁不通

硃砂一兩研細　滑石　犀屑各半兩　黃芩

甘草炙微赤剉　車前子各七錢半

右件藥搗羅爲散入硃砂同拌勻每服半錢煎竹葉湯調下食前

清肺散

治渴而小便閉或黃或澁

卽五苓散加入真琥珀半錢　燈心　通草

車前子炒各二錢五分　瞿麥一錢　木通

扁蓄各一兩七錢半

右爲麤末每服三錢水煎食前服

單方

治小兒淋用車前子一升水二升煮取一升分服千金方下同

又煮冬葵子汁服之

又取蜂房亂髮燒灰以水服一錢七日再

治小兒小便不通用車前草切一升小麥一升以水二升煮取一升二合去滓煮粥服日三四

又以冬葵子一升以水二升煮取一升分服入滑石末六銖

治小兒尿血燒鵲巢灰井花水服之亦治夜尿牀

治小兒遺尿用瞿麥石韋龍膽皂莢桂心各半兩雞腸草人參各一兩車前子一兩六銖八味爲末蜜丸每食後服如小豆大五丸日三加至六七丸

又用小豆葉搗汁服

又燒雞腸爲末漿水服方寸匕日三云面北斗服之

孩子淋疾槲葉三片煎湯服一雞子殼小便卽時下也

小兒石淋特牛陰頭毛燒灰漿水服一刀圭日再千金文方

小兒小便不通用延胡索苦楝子等分爲末每服半錢或一錢以微子湯食前調下如無微子滴油數點代之食氏遺訣

尿牀以羊肚盛水令滿繫兩頭煮熟開取水頓服肘後方

小兒月內糞門上忽有瘡孔此乃秤幻瘡也深難療者急用白礬燒灰摻之

小兒遺尿用紅紙剪馬四匹令小兒自安身下每夜如之

小兒尿不禁用蜜一杯車前草汁和熬夜露清晨服之

小兒睡中遺尿不自覺以桂末雄雞肝等分爲末日進三服

不小便鹽安臍中熨之

小兒祕結猪苓一兩以水少許煮雞屎白一錢調服立通外臺秘要下同

少小尿牀薔薇根五錢煎酒夜飲

小兒下血甑帶灰塗乳上飲之

小兒尿血甘草一兩二錢水六合煎二合一歲兒一日服盡 錢和衆至寶方下同

小兒尿血蜀升麻五分水五合煎一合服之一歲兒一日一服

小兒大便祕塞用枳殼煨去穰各一錢以水煎服 全幼心鑑下同

小兒虛閉葱白三根煎湯調生蜜阿膠末服仍以葱頭染蜜插入肛門少頃即通

小兒不尿乃胎熱也用大葱白切四片用乳汁半盞同煎片時分作四服即通不飲乳者服之即飲乳若臍四旁有青黑及口撮者不可救也

小兒沙淋黑豆一百二十個生甘草一寸新水煮熟入滑石末乘熱飲之良

小兒尿閉乃熱結也用大地龍數條去泥入蜜少許研傅莖卵仍燒蠶蛻紙硃砂龍腦麝香同研少許以麥門冬燈心煎湯調服

治小兒蟯蟲攻下部癢取匾竹葉一握以水一升煎取五合去渣空腹飲之蟲即下用其汁煮粥亦佳

小兒下血腸風臟毒五倍子末煉蜜丸小豆大每米飲服二十丸 鄭氏方

小兒下血或血痢黃蘗半兩赤芍藥四錢爲末飯丸麻子大每服一二十丸食前米飲下 閻孝忠集效方

治小兒遺尿薏苡仁一合去心不去殼敲碎入鹽一小撮同炒黃色用水二鍾煎至半鍾空心服之累效 初虞世方

小兒脫肛魚腥草擂如泥先以矾硝水洗過用芭蕉葉托之上坐之自入也 永類方

小兒脫肛唇白齒焦久則兩頰光眉去唇焦啼哭黃瓜蔞一个入白礬五錢在內固濟煅存性爲末糊丸梧子大每米飲下二十丸 摘元方

小兒脫肛荊芥皂角等分煎湯洗之亦治子宮脫出 經驗方

治小兒脫肛用五倍子爲末量多少摻患處以物襯手揉入切忌食發物毒物 醫學綱目下同

又用蒲黃一兩猪脂二兩煉猪脂蒲黃成膏塗腸頭上即縮入

治小兒脫肛不收用浮萍草不以多少杵爲細末乾貼患處

又用東北方陳壁泥土湯泡先洗下後熏上

小兒脫肛螺螄二三升鋪在桶內坐之少頃即愈 簡便方

治小兒二便不通用麻子以水研飲之 張銳雞峯方

小兒脫肛香附子荊芥穗等分爲末每服一匙水一大盌煎十數沸淋洗 三因方

男女遺尿枯白礬牡蠣粉等分爲末每服方寸匕溫酒下日三服 選奇方

小兒脫肛每天冷及喫冷食即暴痢不止肛則下脫久療不瘥者春間收紫堇花二斤曝乾爲散加磁毛末七兩相和研細塗肛上納入即使人噀冷水于面上即吸入腸中每日一塗藥噀面不過六七度即瘥矣或以散如半杏子許和酒空腹服之日再服忌生冷陳倉米等 天寶單方

小兒遺尿大甘草頭煎湯夜夜服之 危氏得效方

小兒大便下血用鐵鏵燒赤淬水服 時珍方下同

小兒血淋雞屎尖白如粉者炒研糊丸菉豆大每服三五丸酒下四五服效

小兒脫肛五倍子爲末先以艾絨捲倍子末成筒放便桶內以瓦盛之令病者坐於桶上以火點著使藥烟熏入肛門其肛自上隨後將白礬爲末復搽肛門其肛自緊再不復脫

小兒尿白用大甘草頭煎湯服 證治準繩

小兒遺尿用破故紙炒爲末每夜熱湯調服五分 幼幼近編下同

大便下血用荊芥槐花各二兩炒黑爲末每二錢清茶調下

小兒眠中遺尿燒燕窠中草研末水服方寸匕亦止噦嗽

小兒小便不通用琉璃炒成珠子煎湯服之愈

鍼灸

千金方曰小兒大小便不通灸兩口吻各一壯

治小兒遺尿灸臍下一寸半隨年壯又灸大敦三壯亦治尿血

小兒尿血灸第七椎兩旁各五寸隨年壯

藥性論曰小兒不尿安鹽於臍上以艾灸之

醫學綱目曰小兒脫肛瀉血秋深不痊灸龜尾一壯炷如小麥大春端穹骨也

小兒脫肛者灸臍中三壯

小兒脫肛久不瘥及風痫中風角弓反張多哭言語不擇發無時節甚即吐沫者取百會一穴灸七壯在鼻直入髮際五寸頭頂中央旋毛中可容炷如小麥大

古今醫統曰小兒遺尿鍼氣海八分灸則七壯氣海一名呼吸一名下肓在臍下一寸半宛宛中男子生氣之海

小兒脫肛瀉血每入厠臟腑撮痛不可忍灸百會一穴三壯在頂中旋毛間

小兒痢下赤白秋末脫肛灸十二椎下節間名接脊穴灸一壯

黃帝素小兒痢痢脫肛體瘦渴飲形容憔悴諸醫不效者灸足關上三寸陷中三壯岐伯云兼三伏時內用桃柳木浴孩子午丑時當日灸之後用青帛拭乘有似見疳蟲子隨汗出也此法神效

醫案

錢乙小兒直訣曰小兒脫肛半載恪服升補元氣之藥而愈

愛竹翁談載曰小兒氣淋朱尊宗爲郡王時病淋日夜凡三百起國醫罔措或舉孫琳治之琳用大蒜淡豆豉蒸餅三物搗丸令以溫水下三十丸曰今日進二服病當減三之一明日亦然三日病除已而果然賜以千緡或問其說琳曰小兒何緣有淋只是水道不利三物能通利故也

儒門事親曰酒監房善長之子年十三病沙石淋已九年矣初因疳疹疹毒不出作便血或告之令服太白散稍止後又因積熱未退變成淋閟每發則見鬼神號則驚鄰適戴人客鄧牆寺以此病請戴人曰諸醫作腎與小腸病者非也靈樞言足厥陰肝之經病遺溺閉癃閉謂小溲不行癃爲淋瀝也此乙木之病非小腸與腎也木爲所抑火來乘之故熱在膀胱下焦爲之約結成沙石如湯瓶煎煉日久熬成湯餘今夫羊豕之脬吹氣令滿常不能透豈真有沙石而能漏者邪以此知前人所說服五石丸散而致者恐未盡然內經曰木鬱則達之先以瓜蒂散越之次以八正散加湯瀹等分頓服之其沙石自化而下

又屈村張氏小兒年十四歲病約一年半矣得之麥秋發則小腸大痛至握其陰跳躍旋轉號呼不已小溲數日不能下下則成沙石大便祕澀肛門脫出一二寸諸醫莫能治聞戴人在朱葛寺避暑乃負其子而哀請戴人戴人曰今日治今日效時日在辰巳間矣以調胃承氣僅一兩加牽牛頭末三錢汲河水煎之令作三五度嚥之又服苦末丸如芥子許六十粒日方晡上涌下泄一時許出有膿有血涌瀉既覺定令飲新汲水一大盞小溲已利一二次矣是夜凡飲新水二三十遍病去九分止哭一次明日困臥如醉自晨至暮猛然起走索食於母歌笑自得頓釋所苦繼與太白散八正散等調理一日大瘥恐暑天失所養留五日而歸戴人曰此下焦約也不吐不下則下焦何以開不令飲水則小溲何以利大抵源清則流清者是也

又柏亭劉十三之子年六歲病沙石淋戴人以苦劑三涌之以益腎散三下之立愈

葛氏幼科發揮曰本府三守一女溺出如青水著肉處潰爛成瘡其母愛之守問全云莫非女之臟腑壞也答云膀胱受五臟之液以藏之是爲溺也各隨本臟之色青者肝之色也著處成瘡肝火盛也火之所灼則潰爛矣全獨治之以前治小便赤方更加黃蘗爲丸調理五日而安

醫學綱目曰湯氏云肝風搖頭諸方不載鄧都丞子患七年搖頭三年下血已服百餘方前後所服治搖頭者無非風藥止血者或作痢或作腸風百藥無效予既視其病又知其浮亦不則其標本退而思之乃肝血液盛外有風熱乘之肝屬木益則脾土爲木所尅脾與肺是子母俱爲肝所勝而血遂潰於大便故便血不止遂處一方但損肝祛風而益脾初亦一時之見只數服而愈十餘日後血止而下白瞼遂得以安

保嬰金鏡錄曰一小兒小便不利服五苓散之類不應須問及左腮色赤乃肝腎虛熱用四物湯加山梔而愈後因感冒悞用發汗小便仍前不利余用補中益氣湯加麥門五味調補脾肺而愈

一小兒小便不利及莖中澀痛或尿血石此稟父腎熱爲患先用五淋散以疏導又用滋腎丸地黃丸補其肝腎漸愈出痘色紫小便短赤頰間右腮或赤或白屬肺腎氣虛而熱也用補中益氣湯六味地黃丸而痊

保嬰撮要曰一小兒眼泡微腫咳嗽惡心小便澀白

余謂脾疳食積也用五味異功散佐以四味肥兒丸而愈後不節飲食視物不明余曰目爲五臟之精脾胃復傷須補養爲主不信乃服峻厲之劑變慢脾風竟爲不起

一小兒三歲素遺尿余視其兩頦微赤此禀父腎與膀胱二經陰虛也與六味丸服之赤色漸退而遺尿亦愈

一小兒四歲飲食少思便泄腹痛素遺尿額頦青黑雖盛暑而惡風寒余謂經云熱之不熱是無火也用八味丸治之諸證悉愈

一女子小便或黃或白復前陰作癢出水此肝經濕熱先用龍膽瀉肝湯一劑又以加味逍遙散加龍膽草而愈

一小兒兩耳後腦下各結一核小便白濁面色痿黃體倦口乾大便不調用蘆薈丸而愈後鼻外生瘡作癢小便仍白視物不明用四味肥兒丸而愈

一小兒小便不利衄血鼻色赤屬脾肺有熱也用濟生犀角地黃湯而愈後頦間常赤作渴有痰此禀賦腎氣不足用地黃丸而諸證瘥

一小兒痢後脫肛飲食少思面色青黃余謂脾土虧損肝木所勝也不信另服消導尅滯之劑腹痛膨脹倦怠作嘔余曰脾氣虛甚矣又不信恪服前藥腹益脹重墜四肢浮腫復請治之仍欲尅滯余曰腹脹重墜脾氣下陷也先用五味異功散加木香四劑更手足冷又加乾薑四劑而腹脹諸證漸愈後因飲食過多作瀉脫肛用補中益氣湯加木香及五味異功散而愈

一小兒脫肛半載侵晨便泄兩目白多用升補脾氣之劑不應余曰腎開竅於二陰此屬腎虛也用四神地黃二丸及補中益氣湯月餘而愈

一小兒痢久脫肛目睛多白面色漸黃余用補中益氣湯六味地黃丸調補脾腎而痊

一小兒小便先頻數澀滯次下痢脫肛久而不愈余以爲禀父腎虛用六味地黃丸尋愈後患泄瀉咳嗽聲瘖亦用前丸而瘥

一小兒脫肛用寒涼之藥肢體倦怠飲食少思肛門重墜此脾氣虛而中氣陷也用補中益氣湯加酒炒芍藥白朮茯苓而瘥

一小兒脫肛腫痛出血水年餘未愈忽吐血便血皆成紫塊此腸胃積熱用聖濟犀角地黃湯頓止更用金銀花甘草爲末白湯調服半載而痊

一小兒脫肛雜用除濕祛風收濇等藥面黃體倦少食便血余欲升補脾氣以攝其血反服四物槐花之類而血益甚更加作嘔余先用四君木香治之形氣漸充便血頓止又用補中益氣湯更以萆麻仁塗頂心而愈

一小兒因咳嗽服化痰等藥或作或輟服滾痰丸更吐瀉手足指冷目直發搐肛門脫出而赤余朝用補中益氣湯夕用六君子湯治之諸證漸愈但脫肛未入恪服補中益氣湯而愈

一小兒患痢脫肛色赤或痛用補中益氣湯送香連丸而愈後傷食作瀉肛復脫不入仍用前湯更以萆麻仁研塗頂門而愈

一小兒七歲食菱芡過多腹脹發熱大便不通小便下血先用消積丸大便即通小便血止又用保和丸及異功散而愈

一小兒因乳母飲酒小便出血用八正散去大黃加乾葛山梔漏蘆母子服之並愈

一小兒小便見血或咳血衄血此脾肺虛熱食後用聖濟犀角地黃湯食前用六味地黃丸頓愈後因食厚味復作用加味清胃散及六味丸而愈

一小兒禀父氣不足不時便血用六味地黃丸補中益氣湯而愈後因母飲酒炙煿復致前患母服加味清胃散子服地黃丸而愈

一小兒便血兩足發熱齒齦潰臭朝用六味地黃丸夕用異功散加蕪荑月餘漸愈乃佐以補中益氣湯而愈

一小兒禀父腎氣便血作渴足熱形瘦用六味丸尋愈後出痘第四日兩足發熱作渴飲冷以前丸料煎與恣飲三劑後足涼渴止其痘安然而靨

一小兒便血而青脅痛小便頻數此肝木侮脾土而不能統攝也用異功散加柴胡炒黑龍膽草二劑肝證頓退仍用異功散而血止

一小兒便血發熱作渴飲冷用黃連解毒湯一劑熱服諸證頓愈後因飲食過傷下血甚多發熱倦怠飲食少思先用補中益氣湯元氣復而飲食增又用四君加升麻而愈

一小兒便血作渴少食先用七味白朮散渴止食進又用補中益氣湯而瘥後食生冷腹脹便祕用保和丸二便下血或時發搐此脾氣傷而肝火動也用異功散加釣藤柴胡而搐止又加升麻木香而血止

一小兒食生冷果品腹脹作痛發熱作渴大便不利小便尿血用茯苓散加黃連二劑大便通尿血愈

一小兒尿血兩足發熱用六味地黃丸而愈後患痢久不愈復尿血作渴飲冷以前丸料煎服兼補中益氣湯而愈

一小兒尿血面青脅痛小便頻數用五味異功散加柴胡炒黑龍膽草次用地黃丸而愈

一小兒久患便血屬脾胃虛熱也諸藥不應用人參二兩炒黑黃連吳茱萸各半兩爲末米糊作丸佐以補中益氣湯頓痊

一小兒便血面黃腹脹用四味肥兒丸及補中益氣湯加吳茱萸製黃連木香蕪荑三十餘劑而愈至夏間患血痢發熱晡熱手足淨腫仍用前藥而痊

一小兒八歲腹脹臍凸大便下血如痢小便色赤似血面目皆黃兩腮色赤此食積所傷而肝侮之也蓋脾病則肺虛不能生腎故有是證當先消導積滯逐用越鞠丸加三稜蓬朮薑湯下四服二便通利又用大安丸二服下血亦止後復傷食發熱腹脹小便下血服保和丸四服而愈

一小兒十一歲因勞發熱尿血小便不利先用清心蓮子飲二劑後用補中益氣湯加山梔而痊

一小兒便血服寒藥過多腹脹小便不利其血益甚余朝用補中益氣湯夕用金匱加減腎氣丸而痊

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百五十九卷目錄
醫部彙考四百三十九
小兒心腹痛門
錢乙小兒直訣　腹痛　蟲痛
萬氏幼科發揮　腸痛
魯伯嗣學嬰童百問　腹痛　盤腸氣痛　蚘蟲痛
薛氏保嬰撮要　盤腸氣痛
王肯堂證治準繩　腹痛　寒痛　熱痛　積痛　蟲痛　鎮肚痛　盤腸釣　蟲痛　蚘蟲痛　疰痛　心痛　外治
徐春甫古今醫統　腹痛
小兒衛生總微論方　心腹痛急
方　瑞氣丸　清積丸　益黃散　當歸散　流香飲　七氣湯　香蘇飲　調香散　四順清涼飲　桔梗枳殼湯　柴胡桔梗湯　大柴胡湯　芍藥甘草湯　大承氣湯　桂枝加芍藥湯　桂枝加大黃湯　烏梅丸　鐵粉丸　化蟲丸　鳥沉湯　調中丸　蓬莪茂香丸　釣藤散　蘇合香丸　木香散　神佐芎藭湯　錢氏白朮散　史君子丸　化蟲丸　烏梅散　錢氏柳中散　錢氏靈砂散　芍藥散　金鈴散　安息香丸　黑龍丸　平胃散
單方
醫案

藝術典第四百五十九卷
醫部彙考四百三十九
小兒心腹痛門
宋錢乙小兒直訣
腹痛
小兒腹痛體瘦面色慌白目無睛光口中氣冷不思飲食或嘔利撮口此脾土虛而寒水所侮也用益黃散調中丸主之若口中氣溫面色黃白目無睛光或多睡惡食或大便酸臭此積痛也用消積丸甚者白餅子下之後以白朮散調補胃氣

註按腹痛不食口中氣冷下利撮口等證屬形病虛寒也用六君加炮薑溫服之食積多睡口中氣溫惡食面黃等證屬病氣實而元氣虛也用六君子加神麴山楂消導之劑

蟲痛
若口吐痰沫或吐清水面慌白心腹痛而有時者蟲痛也與癇相似但目不斜手不搐也用安蟲散主之

註按蟲乃濕熱所生或木氣而化有因臟腑虛弱有因胃冷胃熱爲人身之固有者其爲患往來攻痛或吐涎水肌體消瘦面無正色但當調補脾胃爲主若蟲食上部則上脣有白點蟲食下部則下脣有白點腹中之蟲朝日之後其頭向下如或用藥先以肉物近兒烹炙使聞香味蟲頭皆向上則藥易於奏效丹溪先生云冬月吐蟲多是胃氣虛寒用錢氏白朮散加丁香二粒補之可見小兒之蟲皆飲食傷脾所致患疳疥內生蟲虺者皆肝木所致也

明萬氏幼科發揮
腸痛
小兒腸痛腰胷空啼無淚此名盤腸痛證似內釣但不直視也金錠子散主之
魯伯嗣學嬰童百問
腹痛
夫腹痛者多因邪正交攻與臟氣相擊而作也挾熱而痛者必面赤或壯熱四肢煩手足心熱兒之挾冷而痛者必面色或白或青手足冷者兒之冷甚面變證則面黯脣口俱黑爪甲皆青矣熱證四順清涼飲加青皮枳殼冷證七氣湯加梓桂蘇合香丸若邪正交攻冷熱不調桔梗枳殼湯加青皮陳皮木香當歸爲妙若內釣等證則釣藤散其餘則芍藥甘草湯爲要藥也實痛有熱者大柴胡湯主之心腹痛甚有實熱者大承氣湯下之腹痛桂枝加芍藥痛甚桂枝加大黃也
盤腸氣痛
盤腸氣者痛則曲腰乾啼額上有汗是小腸爲冷氣所搏然耳其口閉脚冷上脣乾是也此是生下洗遲感受風冷或青糞不實却有此證當服釣藤脊魏香散蘇合香丸當歸散乳母服烏沉湯或沉香降氣湯便定
蚘蟲痛
巢氏云蚘蟲者九蟲之內一蟲也長一尺亦有長五六寸者或因臟腑虛弱而動或因食甘肥而動其動則腹中痛發作腫聚行往來上下痛有休止亦攻心痛口喜吐涎及清水貫傷心者則死診其脈腹中痛

其脈法當沉弱而弦反脈太則是蚘蟲也此痛因食物太早愛甜怕苦痛時便高聲啼叫只看人中上鼻頭唇口數處黑色即是此證當服史君子丸檳榔散化蟲丸藥取下便無事仲景云蚘厥者其人當吐蚘今病煩此爲藏寒烏梅丸主之其蚘蟲穿心者用薏苡根煎湯治之即安

薛氏保嬰撮要

盤腸氣痛

小兒盤腸氣者痛則曲腰乾啼額上有汗皆由肝經風邪所搏也肝腎居下故痛則曲腰乾啼者風燥其液故無淚也額上有汗者風木助心火也口閉足冷者脾氣不營也下利青糞者肝木乘脾也皆由產下澡洗受風冷所致當服釣藤膏之類若乳母及兒受寒邪者用沉香湯之類若兒額間有汗口閉脚冷乃虛寒也用當歸散或沉香降氣湯之類若面赤唇焦小便不通小腹脹痛者乃小腸熱也用人參湯送下三黃丸若痛不止煎葱湯淋採其腹就以熱葱熨臍腹間良久尿出痛止或以乳香沒藥木香少許水煎灌匙許若因乳母飲食停滯者用保和丸懷抱氣鬱者加味歸脾湯怒動肝火者加味逍遙散子母俱服並佳

王肯堂證治準繩

腹痛

小兒腹痛口中氣冷不思飲食脾土虛寒也用調中丸主之口中氣溫大便酸臭積痛也用下積丸治之面赤壯熱或手足並熱實熱也用瀉黃散瀉之面黃微熱或手足並溫虛熱也用異功散補之若作湯飲湯胃氣虛熱也用白朮散若痛連兩脅肝木乘脾也用四君子湯加柴胡芍藥若腹痛重墜脾氣下陷也用補中益氣湯加升麻若手足指冷或吃逆泄瀉寒水侮土也用六君炮薑肉桂不效急加附子若服尅滯之藥致腹作痛按之不痛脾氣復傷也用五味異功散中腕痛者屬脾少腹痛者屬腎按之痛者爲積滯不痛者爲寒虛積滯者消之裏虛者補之

婁氏分曲驟乾哭無淚者爲盤腸內釣痛面恍白不思飲食爲胃冷痛面赤唇焦便黃爲熱痛面黃白大便酸臭爲積痛口淡而沫自出爲蟲痛

曾氏又有臟寒痛鎖肚痛癥瘕痛疰痛癖痛弔腎痛偏墜痛寒疝痛各有治法臚列於後

寒痛

茅先生歌云面青面白猶自可黑色如青爪一同此是腹心生冷痛須將溫藥裹頭攻

胃虛冷面恍白色腹痛不思食當補益脾土六益黃散主之若不下利者澗中丸主之益黃散治下利而痛也澗中丸治不利而痛也

熱痛

熱痛亦啼叫不止夜發面赤唇焦小便赤黃與三黃丸人參湯下

積痛

積痛腹中陰陰而痛面黃不食兒大者口吐酸餿氣先治積滯後調脾胃其痛自止仍辨虛實和解治法見後癖積條中

蟲痛

蟲痛面恍白心腹痛口中沫及清水出發痛有時田氏云蟲痛啼哭僵仰坐臥不安自按心腹時時大叫面無正色或青或黃脅白又目無精光口吐涎沫此謂蟲痛

積痛食痛虛痛大同小異惟蟲痛者當口淡而沫自出治之隨其證用藥蟲與痛相似小兒本怯故胃虛冷則蟲動而心痛安蟲散主之

曾氏云蚘蟲動痛口吐清水涎沫或吐出蟲痛不堪忍其疾因食甘肥葷腥太早而得故胃寒蟲動作痛其蟲吐來或生或死兒小者此痛苦甚亦致危難先以理中湯加烏梅水煎服使胃暖不逆次蘆薈丸史君子丸化蟲飲主之有兒大者面恍白而間黃色肉食倍進肌體消瘦腹中時復作痛此有血蟲蚘蟲雜乎其間以二聖丸下之

又有胃受極寒極熱亦令蟲動或微痛或不痛遂然吐出法當安蟲爲上若以治蟲反傷胃氣固不可也因寒而動者用理中湯加烏梅水煎服因熱而動者用吳茱萸五苓散亦加烏梅水煎煎投

鎖肚痛

一月後嬰孩忽乳不下咽肚硬如石赤如朱撮口而哭面青唇黑手足口氣俱冷是也始因斷臍帶不緊爲風冷所乘證亦危急以白芍藥湯烏梅散一字金投之日久則難愈更參考臍風證內議論

盤腸釣痛

小兒腹痛曲腰乾哭無淚面青白唇黑肢冷爲盤腸內釣凡有此證急煎葱湯淋洗其腹採之葱熨臍腹間良久尿自痛中出其疼立止續次用乳香沒藥透明者各少許細研又用木香一塊於乳鉢內磨水一

分滾數沸調乳汋末藥只一服效

癪瘕痛

癪瘕痛乃積久所致由榮衞俱虛外則感受風寒內則過傷乳食停滯既久不能消化故邪併於陰爲癪陰則專靜凝而不移邪併於陽爲瘕假物象形動而不息若久而不治亦成脾疳積或兩脅間有塊如石按之則痛不按則輕或面黃肌瘦肚硬而脹及有青筋晝涼夜熱蒸潮無時乳食減少愛吃泥土或大便釀瀉痛則身冷如冰法當調脾養胃用醒脾散參苓白朮散磨積理疳用化癖丸三稜散木香荷朮丸治釀瀉沒石子丸沉香檳榔丸然此積滯之疾非七劑可療必須次第調理則日久自然平復

疰痛

始則腹內一小長塊其硬如臂從臍繞轉或左或右良久痛甚則兒於皮下不妨乳食其證先因有疾表解未盡遽爾下之太過氣虛寒搏鬱結而成法宜益氣理虛用參苓白朮散沉香檳榔丸木香荷朮丸爲治或間投白芍藥湯加人參茯苓水煎服

按癪瘕疰癖四證大同小異治法亦無大分別似不必項項作名亦可也

心痛

小兒心痛當於大人心痛門參用之

心痛吐水者蟲痛

心痛不吐水者冷心痛

聖惠治小兒心痛但覺兒將手數數摩心腹即啼是心痛不可忍宜服芍藥散方

茅先生治小兒心痛用金鈴散

外治

莊氏家傳小兒未能語啼哭不能辨者當以手候其腹如有實硬處即是腹痛治之方研生薑取汁煖令温調麪成糊塗紙上貼臍心立定

徐春甫古今醫統

腹痛

小兒腹痛之病誠爲急切凡初生二三箇月及一周之內多有腹痛之患無故啼哭不已或夜間啼哭之甚多是腹痛之故大都不外寒熱二因夫因於寒者面白唇青或瀉痢青白以熱繃裹腹而啼少止即是寒也因於熱者面赤唇紅得暖啼甚即是熱也一周之外能喫飲食則有傷熱腹痛或瀉或不瀉口渴而臭面黃身熱即是積痛久而不愈必致成疳如此三因之外則如內經雜痛篇云五藏卒痛寒邪客經其機不可不察也若類萃小兒等方槩言寒熱而不及熱與積是則以管窺豹未見其全斑也

按腹痛乃邪正交攻相擊而作也挾熱痛者以面赤或壯熱四肢煩手心熱見之挾冷者以面色青白見之冷甚則變證唇中黑爪甲青矣熱證黃芩芍藥湯四順清凉飲冷證理中湯指迷七氣湯加桂薰調蘇合丸錢氏云小兒積痛面黃目白無睛光多睡異食大便酸臭者當用消積丸甚者白餅子下之後和胃凡蟲痛多在心腹口吐清水安蟲散主之

小兒衞生總微論方

心腹痛論

小兒心腹痛者由藏腑虛而寒冷之氣所干邪氣與藏氣相搏上下衝擊上則爲心痛下則爲腹痛上下俱作心腹皆痛更有一證發則腹中攪痛乾啼無淚腰曲背弓上唇乾額上有汗此名盤腸內釣之痛亦由冷氣入藏所爲也

方

塌氣丸 錢氏直訣下同

治肚腹虛脹

胡椒一兩　蝟尾五錢去毒

右爲末麪糊丸粟米大每服一二十丸陳米飲下

薛己曰按前證屬脾肺虛冰氣泛而喘急浮腫必兼溫補脾土以生肺金而氣自運行矣但前藥性屬辛熱雖能祛散寒邪而恐真氣反傷不可過劑

消積丸

治食積大便酸臭發熱

丁香九箇　縮砂十二箇　巴豆二粒去皮心膜

烏梅肉三箇

右爲末麪糊丸黍米大每服五七丸溫水下

薛己曰按前證若食積既去而熱不退或作嘔少食宜用五味異功散以補胃氣或用四君子加藿香半夏以安中氣若兼泄瀉用六君子湯如不應加升麻柴胡以升補脾氣若久瀉不已宜用補中益氣湯以升補陽氣若虛寒加炮薑木香如不應

兼以四神丸以補脾腎若體瘦潮熱口渴大便不調宜用肥兒丸以消疳積

益黃散

治脾土虛寒嘔吐泄瀉

陳皮　青皮下食各一兩　丁香二錢去脾胃寒

訶肉各五錢能開胃消食止痢　炙草三錢

薛己曰按前證若因脾土虛弱而吐瀉者用五味異功散若因肝木侮脾土而吐瀉者用六君子加柴胡如不應或手足指冷屬脾胃虛寒也更加木香炮薑若因乳母脾土虛而肝木侮亦治以前藥若乳母鬱怒致兒患前證母服加味歸脾湯

當歸散

治臟寒腹痛面青手冷夜啼不乳

當歸　白芍藥　人參　甘草炙二分　桔梗

橘皮去白各一錢

右爲末水煎半盞時時少與服

沉香降氣湯

治陰陽壅滯氣不升降胷膈痞塞心腹脹滿喘促短氣乾噦煩滿咳嗽痰涎口中無味嗜臥不食此藥去邪惡氣使無瘴疫

香附二兩半　沉香　砂仁各一錢　甘草七錢半

右爲末每服一錢入鹽少許沸湯點平旦空心服

薛己曰按前方若乳母中氣鬱滯不能升降患此證致兒作痛者亦用之

養脾丸片玉心書

治小兒脾胃虛弱不思乳食傷食癖積面色黃嘔吐瀉泄腹痛膨脹併皆治之

蒼朮製　陳皮各五錢　縮砂仁　草果仁

益智仁　白茯苓各二錢　麥牙炒　厚朴

神麴炒各二錢

共爲末酒糊丸如粟米大米飲下

脾胃虛弱米湯下

嘔吐煨薑湯下

食積山楂湯下

腹痛茴香湯下

腫脹蘿蔔湯下

寒泄薑棗湯下

四順清涼飲翠壺百問下同

治小兒血脈壅實臟腑生熱頰赤多渴五心煩躁睡臥不安四肢驚掣及因乳哺不時寒溫失度令兒血氣不順腸胃不調小便少大便澀或溫壯連滯欲成伏熱或壯熱不歇欲發驚癇又治風熱結核頭面瘡癤目赤咽痛瘡疹毒一切壅滯並宜服之治挾熱瀉不止加木香大黃

赤芍藥　當歸　甘草　大黃各等分

右剉散三歲以上每服二錢水一盞煎至七分作兩服

欲利小便用赤芍藥

虛熱加甘草

不利減大黃

冒風邪加去節麻黃

中風體强眼睛上視加獨活量兒大小虛實加減微溏利爲度可加荊芥

七氣湯

治七氣所傷痰涎結積心腹亦痛不能飲食

半夏製五兩　人參　梓桂各二兩　甘草半兩

右剉每服三錢水一盞薑五片棗一枚煎六分食前服

指迷七氣煎

治七情相干陰陽不升降氣道壅滯攻衝作疼

香附子一兩半　甘草　半夏製各七錢半　青皮

陳皮　桔梗　蓬朮　梓桂　益智仁各一兩

右剉每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎七分不拘時服

異香散

治小兒諸般弔證角弓反張胷高臍凸

透明沒藥

右爲末薑湯調下一錢匕

桔梗枳殼湯

治諸氣痞結滿悶腹脅疼痛

枳殼炒　桔梗各二兩　甘草半兩炙

右剉散每服四錢水一盞薑五片煎至半盞服

釣藤散

治小兒夜啼乃臟冷也陰盛於夜則冷動冷動則爲陰極發躁寒盛作痛所以夜啼不歇也釣藤散主之

釣藤鉤　茯神　茯苓　川芎　當歸　木香

甘草　白芍藥各一錢

右爲末每服一錢薑棗略煎服

其或心熱而煩啼必有臉紅舌白小便赤澀之證釣藤飲去木香加硃砂末一錢研和每服一錢木

通湯調下或剉散煎服亦可

如驚啼加蟬蛻防風天麻

保命丸

治小兒胎驚內弔腹肚緊硬眠睡不安夜多啼哭及治急慢驚風眼目上視手足抽掣不省人事悉皆主之冷證用此

全蠍十四箇去毒　防風二錢　殭蠶炒去絲嘴　天麻各二錢　南星炮　白附子　麝香五分　金箔十片　蟬蛻　硃砂各一錢

右爲末粳米糊丸每兩作四十丸常服鎮心安神化痰除一切驚風諸證湯藥臨時換如有熱證加牛黃冰片硼砂

一方加人參白茯苓各二錢　芍藥甘草湯

治出疹肚疼腹滿小便不通

芍藥一兩　甘草二錢半

右剉散每服三錢水一盞煎至七分不拘時服

大柴胡湯

治傷寒十餘日邪氣結在裏往來寒熱大便祕澀腹滿脹痛譫語心中痞硬飲食不下或不大便五六日繞臍刺痛時發煩躁及汗後如瘧日晚發熱兼臟腑實脉有力者可服

柴胡去蘆八錢　黃芩炒　赤芍藥各三錢　半夏湯泡七次切焙一錢半　枳實麩炒一錢

右剉散薑三片棗二枚水一盞煎七分加減服之欲下加大黃半兩

桂枝加芍藥湯

治太陽病反下之因腹痛是有表復有裏宜服

桂枝一兩半　芍藥三兩半利者先煎三四沸　生薑二兩　大棗六箇　甘草炙一兩

右㕮咀水煎加減服

痛甚者加大黃大實者加一兩半羸者減之

大承氣湯

治剛痙胃滿內實口噤咬牙大熱發渴大便閉澀腹中疼痛結硬如石轉矢氣者用此湯下之

大黃　硝硝各半兩　厚朴一兩　枳實二枚

右剉散每服三錢薑三片水一大盞煎至七分不拘時或空心服以利爲度未利再投

桂枝加大黃湯

治太陽病反下之因腹滿痛屬太陰桂枝加芍藥主之大實痛者桂枝加大黃湯主之

桂枝三錢去皮　芍藥一兩半　甘草炙半兩　大黃半兩羸瘦者減半

右㕮咀薑三片棗二枚每服五錢水一大盞煎至七分溫服

史君子丸

治小兒五疳脾胃不和心腹膨脹時復疼痛不進飲食漸至羸瘦並宜服之

白芍　厚朴製　陳皮　川芎　甘草各二錢半　史君子肉湯浸去黑皮一兩

右爲末煉蜜丸如芡實大每服一丸陳米飲化下

大治小兒腹痛

檳榔散

治腎疳宣露候良方去蟲後服此

木香　檳榔　人參　黃連　甘草炙各等分

右爲末每服一錢小者五分熱水調服

化蟲丸

治小兒蟲咬心痛來去不定不思乳食

鶴虱炒　檳榔　胡粉　楝樹根皮各半兩　白礬三錢半微火煅

右爲末麪糊丸菉豆大三歲三十丸溫漿水入油三五滴吞下食前有蟲皆化爲水大蟲自下且初服甚妙

烏梅丸

治蚘厥其人當吐蚘今病者靜而復煩此爲臟寒蚘蟲上入其膈故須臾復止得食而嘔又煩者蚘聞食自出其人當自吐蚘又治久痢

烏梅七十五箇　乾薑二兩半　黃連四兩　蜀椒去目出汗　當歸各一兩　細辛　人參　附子炮去皮臍　桂枝去皮　黃蘗各一兩半

右爲末用酒浸烏梅肉一宿去核蒸飯杵成泥和藥勻丸麻子大每服十丸食後米飲下日三服忌生冷等物

釣藤鉤

釣藤膏

釣藤鉤　茯神　茯苓　川芎　當歸　木香　生甘草　白芍藥各一錢

右爲末每服一錢薑棗煎服

蘇合香丸

治傳屍骨蒸殮蝶肺癆疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣瘴癘赤白暴利瘀血月閉疰癖丁腫驚癇鬼忤中人小兒吐利

蘇合油入安息香內　黃陸香　龍腦各一兩
木香　白朮　白檀香　丁香　硃砂研水飛
沉香　香附子炒　烏犀屑　華撥　麝香
安息香爲末無灰酒煮膏　訶黎勒煨取皮各二兩
右爲細末入研藥勻用安息香膏并煉白蜜和劑
每服旋丸如梧桐子大早朝井花水溫冷任意化
服四丸老人小兒服一丸溫酒化下亦得竝空心
服用蜘蛛紙裹一丸如彈子大絹袋盛當心帶之一
切邪神不敢近去龍腦名麝香蘇合丸治一切邪
神胃膈噎塞腸中虛鳴宿飲不消餘證竝同

烏沉湯

治慢驚祛風助胃

天麻二錢　人參　生川烏　木香　全蠍焙
南星炮　沉香各一錢　甘草半錢
右剉散每服二錢薑三片慢火煎取其半用之
調中丸　證治準繩下同

白朮　人參　甘草炒各半兩　乾薑炮四錢
右爲細末蜜丸如菉豆大每服五七丸至十五丸
食前溫水下

海藏曰仲景理中倒也

茯苓丸

治小兒腹痛天斜不能乳哺

茯苓　黃連各一兩
右爲末用蜜爲丸如大豆大飲下

湯氏三稜散

治積氣肚痛

砂仁　甘草　益智炒去殼　三稜　蓬朮
青皮炒各等分
右爲末白湯點下

張漢寬中湯

治心腹疼痛不可忍者

高良薑　木香各半兩　丁香　青橘皮炒黃
梔子　甘草炙各一分
右件搗羅爲細末每服半錢溫酒調下

蓬莪朮丹

蓬莪朮炮製乘熱剉碎　當歸酒洗焙乾各一兩
木香　人參　桂心各半兩　黑牽牛炒黃一分
右件搗羅爲末細白麪糊和丸如黍米大每服十
粒煎生薑湯下量兒大小加減

溫胃丹

治腹痛啼哭不止

人參　白朮炮各一兩　五味子　當歸洗焙乾
高良薑各半兩　木香一兩
右件搗爲細末白麪糊和丸如黍米大每服十粒
米飲下

橘香散

青橘皮炒　吳茱萸　木香　當歸洗焙各一兩
乾薑炮　丁香各半兩
右搗羅爲末每服一錢水八分一盞入生薑二片
煎五分去滓放溫熱服食前

曾氏茴香湯

和脾胃進飲食理腹痛散邪氣

茴香炒　良薑剉碎用東壁土炒各一兩五錢
蒼朮泔水浸一宿去麤皮濾乾剉炒至微黃二兩
炙甘草一兩
右剉焙爲末每服一錢燒鹽湯空心調下

錢氏安蟲散

治小兒蟲痛

胡粉炒黃　鶴虱炒黃　川楝子去皮核淨
白蘜枯二錢半
右爲細末每服一字大者五分米飲調下痛時服

又

治蟲痛極不可忍

乾漆半兩　檳榔一枚生用　窑老一塊再煅細研
右窑老恐窑中煅過泥物也三件一處爲末空心
熱酒調良久取下蟲立愈

又

乾漆一兩搗碎炒令烟盡出
右用新汲水入生麻油空心調服

又

治上中二焦虛或胃寒蟲動及痛

乾漆炒烟盡二分　雄黃一分　巴豆霜一錢
右爲細末糊丸如黍米大量兒大小服之取東引
石榴根煎湯下或苦楝根或蕪荑湯下五七丸至
二三十丸發時服

蕪荑散

主治同前凡小兒痛時便高聲啼叫人中上鼻頭
脣口一時黑色脈法當沉弱而弦今反脈大是蟲
證也

白蕪荑　乾漆炒各等分
右爲細末每服一字或五分或一錢米飲調下發

時服
史君子丸
治腹內諸蟲作痛口吐清水
史君肉薄切焙　檳榔　石榴東向根皮剉焙
大黃半生半炮各七錢半
右除檳榔剉曬不過火餘三味再焙同檳榔爲末
沙糖水煮麵糊丸麻仁大每服三十丸至五十丸
淡猪肉汁空心下或雞肉汁亦好
化蟲飲
消化蟲毒在腹作痛
檳榔　石榴根皮焙乾各一兩　紅丹煅過
雷丸　貫衆鷄頭者佳　史君肉切焙各二錢半
炙草　枳殼去瓤麩炒微黃　大黃各五錢
右爲細末用清油煎雞子一枚如春餅樣候冷抄
藥末一錢於上攤勻空心捲而食之兒小者用糯
米粉水煮糊丸如粟穀每服十五粒至三十丸以
淡猪肉汁空心下雞肉汁亦好
二聖丸
治腹內諸蟲及消穀逐水下氣去風
檳榔一兩　巴豆十五粒去殼膜心大好者存油
右檳榔剉曬爲末巴豆碎切在乳鉢內極細杵仍
入檳榔末同再杵勻麵糊丸菜豆大每服七十七
丸至九十九丸用溫茶清五更初空心止一投藥
見蟲下盡進以稀粥自安
烏梅散
治腹疼及初生嬰孩臍下冷痛疝氣等疾
烏梅去核　元胡索　粉草半生半炙各五錢
乳香　沒藥　釣藤各二錢半
右件咬咀每服二錢水一盞煎七分空心溫服
釣藤膏
治小兒腹中極痛乾啼後臞名盤腸內釣
乳香研　沒藥研　廣木香　薑黃各四錢
木鼈子仁二十一箇
右先將後三味同爲細末次研入上二味煉蜜和
成劑收貯一歲兒可服半皂子大餘以意加減煎
釣藤湯化下無時次用魏香散
魏香散
蓬术半兩　阿魏一錢
右先用溫水化阿魏浸蓬术一晝夜焙乾爲細末
每服一字或半錢煎紫蘇米飲空心調下
蒜乳丸
治冷證腹痛夜啼
大蒜一顆慢火煨香熟研爛　乳香另研五分
右研爲丸如芥菜子大每服七粒乳汁送下
聖惠人參散
治小兒卒吐下腹痛不止
人參　當歸剉微炒各半兩　甘草炙微赤剉
乾薑炮裂剉　黃芪剉各一分　細辛一分
右件藥搗粗羅爲散每服一錢以水一小盞煎至
五分去滓稍熱服量兒大小以意加減頻服
錢氏和中散
和胃氣止吐瀉定煩渴治腹痛思食
人參　白茯苓　白朮　甘草剉炒　乾葛剉
黃芪　白扁豆炒　藿香葉各等分
右爲細末每服三錢水一盞乾棗二個去核薑五
片煎至八分食前溫服
錢氏靈犀散
治小兒蟲咬心痛欲絕
五靈脂二錢　白礬火飛半錢
右同研每服一二錢水一鍾煎至五分溫服無時
當吐出蟲
芍藥散
赤芍藥　人參　白朮　黃芩　川大黃微炒剉
當歸各一分
右搗羅爲粗散每服一錢以水一盞煎至五分去
滓不計時候量兒大小加減溫服
金鈴散
金鈴子炮去皮核　蓬莪朮炮各一兩　茴香
木香炮　荊三稜炮各半兩
右爲末每服一錢或半錢溫酒調下
安息香丸 至幼心鑑
治小兒肚痛曲脚而啼
安息香酒蒸成膏　沉香　丁香　藿香葉
茴香各三錢　香附　縮砂仁　炙草各五錢
右爲末以膏和煉蜜丸芡實大每服一丸紫蘇湯
化下
黑龍丸 幼幼近編
治小兒腹痛
生甘草　乾薑各二錢　伏龍肝一兩　人參
茯苓　百草霜　白朮各五錢
右爲末粟粳丸梧子大每服五丸陳皮湯下

平胃散局方
治脾胃不和不思飲食心腹脹痛口苦短氣惡心噯氣吞酸面黃體瘦嗜臥體痛霍亂吐瀉等證
厚朴薑汁製五兩　陳皮　甘草炙各一兩
蒼朮米泔浸焙乾八兩
右爲末每服二錢薑棗水煎沸湯點服亦得常服調氣暖胃化宿食消痰飲辟四時不正之氣
按前證若乳食停滯噯腐吞酸嘔噦惡心者宜服是方若飲食既消脾胃虛弱嘔吐惡心者則宜四君子湯

單方

小兒胎寒腹痛汗出用衣中白魚二七枚綿包於兒腹上回轉摩之以愈爲度聖惠方
食積腹痛必用紫蘇菜葅子之類丹溪方
治小兒好吃粽成肚腹痛用黃連白酒藥等分爲丸服初虞世方
小兒心痛白烏骨雞屎五錢曬研松脂五錢爲末葱頭汁和丸梧子大黃丹爲衣每醋湯服五丸忌生冷硬物三四日立效袖珍方

小兒盤腸氣痛延胡索茴香等分炒研空心米飲量兒大小與服初生方
小兒盤腸內釣腹痛用葱湯洗兒腹仍以炒葱搗貼臍上良久尿出痛止湯氏家抄寶鑑
小兒盤腸氣痛沒藥乳香等分爲末以木香磨水煎沸調一錢服立效
小兒氣痛蓬莪朮炮熟爲末熱酒服一大錢十全博救方
小兒盤腸內釣腹痛不止用阿魏爲末大蒜半瓣炮熟研爛和丸麻子大每艾湯服五丸總微論方下同
小兒盤腸內釣以蓬莪朮半兩用阿魏一錢化水浸一日夜焙研每服一字紫蘇湯下
絞腸沙痛馬蘭根葉細嚼咽汁立安幼幼近編
小兒盤腸氣痛用蘿蔔子炒黃研末乳香湯服半錢楊仁齋直指方
小兒蟲痛胃寒危惡證與癇相似者乾漆燒烟盡白蕪荑等分爲末飲服一字至一錢杜壬方
小兒蚘蟲心腹痛鶴虱研末以肥肉油汁下之五歲一服二分蟲出即止也

醫案

錢乙小兒直訣曰辛氏女子五歲病蟲痛諸醫以巴豆乾漆硇砂之屬治之不效至五日外多哭而俛仰睡臥不安自按心腹時大叫面無正色或青或黃或白或黑目無光而慢脣白吐沫至六日間高而臥轉不安召錢至錢詳視之用蕪荑散三服見目不除青色大驚曰此病大困若更加瀉則爲逆矣至次日辛見錢曰夜來三更果瀉錢於瀉盆中看如藥汁以杖攪之見有丸藥錢曰此子胞厚當氣實今證反虛不可治也辛曰何以然錢曰脾虛胃冷則蟲動而今反目青此肝乘脾又更加瀉其氣極虛也而丸藥隨糞下卽脾胃已脫兼形病不相應故知死病後五日昏篤七日而死

一小兒傷食發熱吐瀉腹痛欲服益黃散余曰內有丁香良薑非其所宜前證乃脾胃受傷而無寒證不信仍服前藥其痛益甚二便不通口舌糜爛而殁羅謙甫曰一小兒五月間因食傷冷粉腹中作痛遂與市藥鋪中買得神芎丸服之臍腹漸加冷疼時發時止踰七八年不已因思古人云寒者熱之治寒以熱良醫不能廢其繩墨而更其道也據所傷之物寒也所攻之藥亦寒也重寒傷胃其爲冷痛可知矣凡人之脾胃喜溫而惡冷況小兒血氣尚弱不任其寒故陽氣潛伏寒毒留連久而不除治病必先其本當用和中養氣之藥以救前失服之月餘方愈嗚呼庸子饋藥孔子拜而受之以未達不敢嘗此保生之重者也奈何常人拱默而令切脈以爲能知病否且脈者人之血氣附行經絡之間熱勝則脈疾寒勝則脈遲實則有力虛則無力至於所傷何物豈能別其形象乎醫者不可不審其病源而主家亦不可不說其病源且此子之父不以病源告醫而求藥於市鋪中發藥者亦不審病源而以藥付之以致七八年之病皆緣此理也孫眞人云未診先問最爲有準東坡云只圖愈疾不欲困醫二公之語其有功於世大矣薛氏保嬰撮要曰一小兒手足常冷腹中作痛飲食難化余謂胃氣虛寒也先用益黃散二服痛止次用六君子湯數劑卽愈

一小兒酉戌時熱面赤腹中作痛按之益甚服峻厲之劑下五七次發搐吐痰作渴腹痛按之不痛此脾胃復傷而變證也用七味白术散補中益氣湯頓安

一小兒每停食腹痛面赤發暈用清中解鬱湯而愈後患搖頭咬牙痰盛發搐又吐酸腐待其吐盡翊日少以七味白术散次日又以參苓白术散調理脾胃遂不復患大抵吐後兒安不必更服他藥恐復傷元氣也

一小兒五歲停食腹痛發熱面赤或用養胃湯枳實黃連更加腹脹午後熱甚按其腹不痛余以爲脾虛而藥傷用六君子湯數劑而痊

一小兒素嗜肉食腹中作痛大便不調半載之後肚腹膨脹右脅內結一塊不時轉移又三月左脅內亦結一塊胃腹亦脹齦潰作渴小便赤濇或澄白大便色穢不一又半載頷下結核三五枚服消塊行滯等藥元氣益虛其塊益甚余用四味肥兒丸五味異功散之類隨證進退治之熱渴漸止又月餘腹脹漸消更佐以九味蘆薈丸之類而痊

一小兒飲食不節或作瀉或腹痛或腹脹腹中一塊大便不調作渴發熱齦爛口臭專服消導尅滯前證益甚形體益瘦余曰面色黃中隱青脾土虧損而肝木所侮也法當調補中氣平肝木則脾氣自旺虛火自退諸證自愈遂用冲和湯大蕪荑湯之類果愈

一小兒蟲動心腹痛先服蕪荑散下之更加作嘔食少口渴飲湯右顋鼻準白中兼黃此脾肺氣虛也余用異功散二服少愈仍加炮薑一服而安

一小兒曲腰啼叫右顋青黑此臍腹內痛即盤腸內釣因脾土虛寒肝木乘之也用六君子加木香釣藤鉤即愈

一小兒因乳母大怒亦患前證面赤而啼小便不利用加味逍遙散加木通車前子母子服之並愈

一小兒啼叫面赤手足不冷用釣藤飲隨愈後因其母飲酒厚味仍作啼手足發熱又用前藥加生地黃而愈後又面青手冷啼叫吐瀉其糞腥穢用助胃膏一服而安

一小兒患前證曲腰而啼額間出汗足冷唇青糞青先用釣藤膏治之愈後復患仍用釣藤鉤膏而痛減半又煎葱湯熨洗其腹腹痛遂安

一小兒唇青足冷啼聲不絕用助胃膏一服稍安又食生冷之物前證仍作更泄瀉不止先用六君子加木香乾薑一劑乃去木香乾薑又二劑其瀉頓止又用四君子少加升麻四劑飲食加進

一小兒十四歲腹痛吐瀉手足常冷肌體瘦弱余謂稟命門火虛也用六君子湯八味丸漸愈畢姻後因房勞勤讀感冒發汗繼以飲食勞倦朝涼暮熱飲食不思用六君子十全大補二湯尋愈後不慎飲食起居午前臍下熱起則遍身如炙午後自足寒至腰如冰熱時脈洪大按之如無兩尺微甚寒時則六脈微細如絕湯粥稍離火食之即腹中覺冷此亦稟命門火衰之證也用補中益氣湯八味丸各百餘服漸愈後大吐血別悞服犀角地黃丸一劑病益甚飲食頓減面色恍白手足厥冷或時發熱寒時脈微細而短者陽氣虛微也熱時脈洪大而虛者陰火虛旺也余用十全大補及八珍湯六君子之類但能扶持而血不止復因勞役吐血甚多脈洪大鼓指按之如無而兩寸脈短此陽氣大虛也用人參一兩附子一錢佐以補中益氣湯數劑諸證漸退乃減附子五分又各數劑脈證悉退乃每服用人參五錢炮薑五分月餘始愈

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百六十卷目錄
醫部彙考四百四十
小兒腫脹門
錢乙小兒直訣 腹脹
張從政儒門事親 小兒風水 通身浮腫
魯伯嗣學嬰童百問 虛實腫脹
樓英醫學綱目 腫病
徐春甫古今醫統 濕證 水腫不治證 腹脹 潔古論 腹脹虛實 水腫 曾氏治法 演山治法 薛氏治法
小兒衛生總微論方 腫病論 水腫
陳治幼幼近編 腹脹
方 塌氣丸 加減腎氣丸 升陽益血湯 厚腸丸 褐丸子 紫霜丸 白餅子 塌氣丸 三稜煎丸 大承氣湯 五苓散 大柴胡湯 下積丸 五珍丸 分氣飲 五疳保童丸 楊氏塌氣散 塌氣散 三稜丸 眞珠天麻丸 大茱連丸 下蟲丸 沉香煎 推氣丸 遇仙丹 訶梨勒丸 張氏補脾散 本事調中丸 三因肥兒丸 六神丸 胡黃連丸 阿魏丸 又 小阿魏丸 中滿分消丸 消痞丸 麻黃升麻湯 南星腹皮散 香陸胃苓丸 赤蒼飲 三白散 商陸丸 濟川丸 梨蘆飲子 分氣飲子 大效神功救生丹 退腫散氣方 分氣飲 補脾飲 塌氣丸 參苓散 除濕湯
單方
鍼灸
醫案

藝術典第四百六十卷

醫部彙考四百四十

小兒腫脹門

宋錢乙小兒直訣

腹脹

腹脹而悶亂喘滿者實也用紫霜丸白餅子若不悶亂喘滿者脾虛也誤下之以致目胞腮面四肢浮腫肚腹愈脹以塌氣丸主之因下而喘脾氣益虛也脾虛不能勝腎水隨肺氣行於四肢如水狀若侵浮於肺卽大喘也

註 按腹脹喘滿脾肺虛而氣不歸源者用補中益氣湯若因下脾肺氣虛而面目四肢浮腫等證者用金匱加減腎氣丸況此證有因乳母脾胃宿積飲食傷脾所致其白餅子紫霜丸必形病俱實方可用塌氣丸亦非調補之劑宜審用之

若腎熱傳於膀胱熱甚逆於脾肺脾胃虛而不能制腎水流走四肢而身面皆腫若上勝則形於肺故令喘也

註 按肺主氣腎主水前證因稟賦不足或因大病後或誤行汗下致脾虛不能制水而溢皮膚肺虛不能攝氣而氣上逆宜用六味丸補中益氣湯治之如小便不利用金匱加減腎氣丸腎經虛火上炎肺熱作喘者用六味地黃丸心火熾盛肺熱作喘者用人參平肺散凡此皆屬腎經陰虛熱證用六味丸壯水爲主若用清熱分利之藥則誤矣

元張從政儒門事親

小兒風水

鄙之營兵秋家小兒病風水諸醫用銀粉粉霜之藥小溲反澀飲食不進頭腫如腹四肢皆滿狀若水晶家人乃爲勉强求治於戴人戴人曰此證不與壯年同壯年病水者或因留飲及房室此小兒纔七歲乃風水證也宜出汗乃置燠室以屏帳遍遮之不令見火若內火見外火必昏憒也使大服胃風湯而浴之浴訖以布單重覆之凡三五重其汗如水腫乃減五分隔一二日乃依前治之汗出腫減七分乃二汗而全減尚未能食以檳榔丸調之兒已喜笑如常日矣

通身浮腫

小兒通身浮腫是水氣腫也小便不利者通小便則愈內經曰三焦閉塞水道不行水滿皮膚身體否腫是風乘濕之證也可用長流水加燈心煎五苓散時時灌之更於不透風暖處頻治汗出則腫消腫消則自愈一汗減半再汗減七八分三汗消盡內外兼治故也

明魯伯嗣學嬰童百問

虛實腫脹

議曰腫脹二證此由虛中有積久患失治日漸傳變證候多端隨輕重察盛衰審表裏以主治先固其本後正其標斯無恙矣有濕腫有毒氣腫傷寒虛腫瀉痢虛腫氣血虛腫有疳脹氣脹癥積脹鎖肚脹脘膈脹食膨脹蛔蚘脹虛冷積脹以上腫脹虛積竝當下之各有其法其受濕於脾胃久不尅化氣浮四肢頭面皆腫由食毒氣傷於脾胃冷積毒氣停留於脘膈致虛入腹作腫傷寒下之太蚤乘虛入腹作腫瀉利之人脾氣亦虛是以致腫以上宜平調胃氣補臟充

實方可去腫其氣血虛腫皆由榮衛不順臟腑怯弱
壅滯三焦流注百脈表裏俱虛邪正相亂以致四肢
浮腫腹肚膨滿以上先調榮衛之順次服分氣以散
之其疳氣積脹宜先與保童兼塌氣以去之褐丸子
亦可治其痞癖氣脹癥脹宜三稜以消痞其鎖肚脹
宜與珍珠天麻丸以通之其上膈中脘食傷膨脹宜
三稜塌氣大棄連丸以消磨之其蛔蚘脹宜下蟲丸
以化之其虛冷積脹宜沉香煎以溫之以上諸證宜
調和胃氣消磨通利腫脹必然平復矣如有熱者必
以葶藶牽牛等輩以治之推氣丸劑亦可服有實熱
脹滿者大承氣湯主之一法用五苓散吞紫霜丸量
虛實用丸數亦妙熱輕者大柴胡湯治之

王肯堂曰按百問分證雖詳而偏于攻下若無錢
張活法薛氏補法以主之鮮不殺人愼之

樓英醫學綱目

腫病

腫病腎熱傳於膀胱熱盛逆於脾胃脾虛而不能制
腎水反尅脾土脾隨水行脾主四肢故流走而身面
皆腫也若加喘者重也何以然腎水勝而尅退脾土
反勝心火心又勝肺肺爲心尅故喘或問曰心刑肺
肺本見虛今何喘實曰此有二一者肺大喘此五臟
逆二者腎水氣上行傍侵肺故令大喘此皆難治

徐春甫古今醫統

濕證候

巢氏曰濕者水氣也活人書云風雨襲虛山澤蒸氣
豈止大人中濕小兒亦有受濕者綠小兒入夏以來
脾胃虛弱腠理開疏或因連日陰雨或地蒸濕小兒
坐臥於上便受熱氣脈見沉緩身體煩痛發熱惡寒
或多汗惡風精神昏悶或小便不利大便溏瀉若久
不愈則手足垂弛入臟則瘖啞不言治法大要疏利
小水其濕自除不可發汗及峻攻之

水腫不治證

凡水腫先起於四肢而後歸於腹者不治大便滑泄
與夫唇黑缺盆平臍突足平背平或肉硬或手掌平
或男從脚下腫而上女從身上腫而下竝皆不治

王肯堂證治準繩

腹脹

腹脹由脾胃虛而氣攻所作也實者悶亂喘滿可下
之用紫霜丸白餅子

此言未下而喘者爲實故可下若誤下而喘者爲
虛氣附肺不可下也

不喘者虛也不可下若誤下之則脾虛氣上附肺而
行肺與脾子母皆虛肺主目胞腮之類脾主四肢毋
氣虛甚卽目胞腮腫四肢黃色治之用塌氣丸漸消
之未愈漸加丸數不可以丁香木香橘皮豆蔻大溫
散藥治之何以然脾虛氣未出故雖腹脹而不喘可
以溫散藥治之使上下分消其氣則愈矣若虛而氣
已出附肺而行卽脾胃內弱每生虛氣入於四肢面
目矣小兒易爲虛實脾虛則不受寒溫服寒則生冷
服溫則生熱當識此勿誤也胃久虛熱多生疳病或
引飲不止脾虛不能勝腎隨肺之氣上行於四肢面
目腫若水狀腎氣浸浮於肺卽大喘也此當用塌氣
丸漸加丸數病愈後面未紅者虛衰未復故也

此下後喘故宜塌氣丸若未下而喘宜下之
治腹脹者譬如行兵戰寇於林寇未出林以兵攻之
必可獲寇若出林不可急攻攻則必有失當以意漸
收之卽順也

寇未出林謂虛氣未出而不喘不目胞腮腫故可
用丁香木香大溫散藥上下分消其氣而愈也寇
已出林謂虛氣已出爲喘爲目腮腫須用塌氣丸
漸漸消之

治小兒虛腹脹先服塌氣丸不愈腹中有食積結糞
小便黃時微喘脈伏而實時飲水能食者可下之蓋
脾初虛而後有積所治宜先補脾然後下之後又補
脾卽愈也若不先補脾而便下之則大虛矣不可補
肺恐生虛喘

潔古論腹脹虛實

凡久病吐瀉之後虛則其脈微細肺主目胞及腮脾
主四肢若色淡黃目腮虛腫手足冷先服塌氣丸後
服異功散和中丸四君子湯益黃散之類用諸溫藥
養眞氣

實則脈洪實不因吐瀉久病後亦不因痢下腹脹而
喘急悶亂更有痰有熱及有宿食不化而腹脹者宜
服白餅子大黃丸解毒丸下之兼須詳認大小便如
都不通先利小便後利大便

雲岐云小兒熱結於內腹脹壯熱大便赤黃躁悶煩
亂者宜瀉青丸

東垣云寒脹多熱脹少皆主於脾胃虛者宜用六君
子湯若喘而氣短者脾肺氣虛也用異功散補之若
服尅伐之類而喘脹益甚者脾肺之氣復傷也用前
湯加半夏升麻若旣下而不喘則邪氣去而肺氣寧

也不必用藥或病久小便不利或四肢浮腫者脾肺之氣虛不能通調水道也用金匱加減腎氣丸主之或手足逆冷睡而露睛脾胃虛寒也用六君子加炮薑手足不冷睡而露睛脾胃虛弱也用六君子湯若面色青木尅土也用六君木香柴胡更當調治乳母節其飲食恐藥餌過劑復傷胃氣故也

水腫

演山云腫脹二證此由虛中有積久患失治日漸傳變證候多端隨輕重察盛衰審表裏以主治先固其本後正其標斯無恙矣

會氏治法

原腫病之由標本之疾腎主元氣天一之水生焉肺主冲化地四之金屬焉腎爲本而肺爲標皆至陰以積水其爲病也腎者胃之關鍵關鍵不利樞機不轉水乃不行滲於脉絡皮膚而爲浮腫當推究內外所因而爲施治兒大者憑脈以明虛實古方有十種論證短氣不得臥爲心水兩脅緊痛爲肝水大便鴨溏爲肺水四肢苦重爲脾水腰痛足冷爲腎水口苦咽乾爲膽水乍虛乍實爲大腸水腹急肢瘦爲膀胱水小便閉澀爲胃水小腹急滿爲小腸水然脈浮爲風爲虛沉伏爲水病沉則脈絡虛伏則小便難卽爲正水脾脉虛大多作脾腫因循不治乃成水腫蓋脾屬土喜燥而惡濕常感濕氣濕喜傷脾血化爲水土敗不能制水則停蓄不行留滯皮膚故作浮腫初得病時見眼泡早晨浮突至午後稍消以羌活散疏解次醒脾湯主之及間投南星腹皮散其脾冷困則燥以草果縮砂之類然此證夏與秋冬治之頗易惟春不然蓋四時之水無如春水泛溢兼肝木旺而脾土受尅不能受水所以難療進退不常須徐徐調理取效若脾熱而困又有熱藥燥之雖火能生土亦可勝水奈何燥之太過土不敵火則熱愈甚而不食發熱煩渴醫者又進之以燥劑由此而面目轉浮致脾敗而手足背皆腫蓋手足背與臍凸卽脾之外候有未經發表遽用下藥以瀉之則一瀉而腫消乃曰得瀉之力殊不知脾愈瀉而愈虛不逾旬月其腫如初此世人卽知瀉腫爲最而不求其十補勿一瀉之論法當隨四時用藥解表通利小便春以七寶散加麻黃桂枝赤茯苓水薑葱煎服夏以五苓散加麻黃車前子薏苡仁秋以清肺飲加羌活細辛商陸冬以冲和飲加白朮生川烏赤小豆以上三藥並用水薑葱煎次投滋潤救脾導水湯劑滲泄之乃爲良法更以商陸胃苓丸赤蒼飲頓服自然獲安蓋內經云開鬼門潔淨府平治權衡以平爲期此之謂也

有初中便覺痰嗽氣喘小水不通正屬肺腎所主先服解表散次以三白散爲治餘證輕者投商陸丸故經曰其高者因而越之卽湧吐之義也下者引而竭之卽滲瀉之義也凡得此病非一朝一夕之故不可以孟浪之藥求其速效以致虛脫如愈後再感外風滿面虛浮用排風湯和解仍服前救脾湯劑免致反覆飲食之忌惟鹽醬虀酢濕麵皆味鹹能溢水者幷其他生冷毒物亦宜戒之重則半載輕則三月須脾胃平復腫消氣實然後於飲食中旋以燒鹽少投則其疾自不再作故劉氏曰治腫非易補養尤難所忌者切須詳審有經久不消者下濬川丸卽效

演山治法

受濕腫脚手面目虛浮

食毒氣腫腹肚腎蠱脹急

傷寒虛氣入腹腫

瀉痢虛氣入腹腫

此四種所患病不相同皆由虛而得之受濕謂脾胃受濕冷久不尅化氣浮四肢頭面皆腫食毒氣由脾胃傷之冷積毒氣停留胃脘致虛入腹作腫傷寒由下之太早乘虛入腹作腫瀉痢之久脾氣亦虛是以致腫以上宜平調胃氣補臟充實方可去腫先服四味理中乾薑減半加白朮桑白皮同煎傷寒虛腫加枳實作喘加淡豆豉瀉痢虛腫服正氣調胃胃氣既壯以救生丹利之其腫卽退再調補臟腑用觀音散卽平復矣

氣虛腫亦名氣蠱

血虛腫亦名血蠱

榮衛俱虛腫亦名氣血蠱

小兒所患腫脹一門最爲要急前人少有究竟然腫脹之作皆由榮衛不順臟腑怯弱壅滯三焦流注百脈表裏俱虛邪正相亂所以致受四大浮盛腹肚膨滿多由食毒得之飲食得之癥傷得之飢飽得之積久不化故成斯病病由虛得或則妄爲通下因虛致虛根不得去疾加已甚是爲壞證危候智者怯而爲辭庸者暴以攻擊二醫不同誠屬難治智者商之良者審之疑者塌之（疑其病甚不可利只與塌其氣）明者調之（正榮衛也）先調榮衛之順次服分氣飲子以散其滯斯病去矣

薛氏治法

經日至陰者腎水也少陰者冬脈也其本在腎其末在肺皆積水也又曰腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類也上下溢於皮膚故附腫腹大上爲喘呼不得臥者標本俱病也丹溪云惟腎虛不能行水脾虛不能制水胃與脾合又胃爲水穀之海因虛而不能傳化腎水泛濫反得以浸漬脾土於是三焦停滯經絡壅塞水滲於皮膚注於肌肉而發腫也其狀目泡上下微起肢體重著喘嗽恠忡股間清冷小便澀黃皮薄而光手按成窟舉手卽滿是也有受濕氣者由脾胃之氣敦阜四肢頭面皆腫也食毒者脾傷積毒停留於胃也傷寒下早者邪氣乘虛而入也瀉利後者脾氣虛也皆宜先調胃氣次可治腫其患七脹皆由血氣不足臟腑怯弱表裏俱虛邪正相亂以致四肢浮腫腹肚膨滿亦當先調榮衛分別陰陽治法宜補中行濕利小便凡有熱者水氣在表也可汗之身無熱者水氣在裏也宜下之腰已下腫宜利小便腰已上腫宜發汗此仲景之法也若遍身腫煩渴小便赤澀大便祕結此屬陽水遍身腫不渴大便溏瀉小便清利此屬陰水陽水兼陽證者脈必浮數陰水兼陰證者脈必沉遲氣若陷下宜用二陳加升提之藥如腹脹少加木香調之若朝寬暮急屬陰虛朝用四物湯加參朮夕用加減腎氣丸朝急暮寬屬陽虛朝用六君子湯夕用加減腎氣丸朝暮皆急陰陽俱虛也用八珍湯主之眞陽虛者朝用八味地黃丸夕用補中益氣湯若肚腹痞滿肢體腫脹手足竝冷飲食難化或大便泄瀉呼吸氣冷此眞陽衰敗脾肺腎虛寒不能司攝而水泛行也急用加減腎氣丸否則不治惟調補脾土多有生者

小兒衞生總微論方

腫病論

小兒腫病有二一者氣腫因脾胃虛而氣攻腹腹脹誤行轉藥下之致虛氣上附於肺行入四肢面目而作腫也痎氣亦然二者水腫因上焦煩渴飲水無度脾胃虛而不能約制其水腎反乘脾土隨水行上附於肺主皮膚脾主四肢故水流走於四肢皮膚而作腫也甚則腎水浸浮於肺則生大喘爲難治也

水腫

水腫之證脾土受虧不能制水腎水泛溢浸漬脾土水滲皮膚肌肉發腫面腫曰風脚腫曰水手按成窟舉手卽滿唇黑傷肝心平傷心臍突傷脾足平傷腎背平傷肺水氣身熱在表可汗水氣身涼在裏可下通利小便順氣和脾證雖可下不可峻攻肚上青筋腹滿滑泄名爲蠱脹腫先起腹後散四肢順候可下先腫四肢後歸肚腹逆候難醫男足腫上女足腫下肉硬掌平卽不可治秋春頗易冬夏難治重者半載輕者三月治腫非易補養尤難腰以下腫當利二便腰以上腫須當發汗

陳治幼幼近編

腹脹

小兒腹脹有虛有實小便不利悶亂喘急者此邪氣之實也宜分氣飲塌氣丸小便自利不喘面目四肢浮腫者此正氣之虛也或瘧痢經久或飲食傷脾虛氣妄行並宜補脾飲或理中湯加草果砂仁萄子

方

塌氣丸（錢乙小兒直訣）

治小兒虛脹

胡椒一兩　蠍尾半兩

右爲末麵糊爲丸粟米大每服五七丸陳米飲下

一加木香一錢一加萊菔子半兩

薛己曰二味惟錢氏潔古用之後有牽牛者須愼

加減腎氣丸（金匱）

治脾腎虛腰重腳腫小便不利或肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已成蠱者此證多因脾胃虛弱治失其宜元氣復傷而變者非此藥不救

白茯苓三兩　附子炮五錢　川牛膝　肉桂　澤瀉　車前　山萸　山藥　丹皮各一兩

熟地黃四兩搗碎酒拌杵膏

右爲末和地黃膏加煉蜜杵丸桐子大每服一二十丸空心米湯下

升陽益血湯（脾胃論藏下同）

二月間有一小兒未滿一百日病腹脹二日大便一度瘦弱身黃色宜升陽氣滋血益血補血利大便

蠍梢二分　神麯末　升麻各三分　當歸　厚朴各一錢　桃仁十個

右都作一服水一大盞煎至半盞去粗食遠熱服

厚朴丸

治小兒失乳以食飼之未有食腸不能尅化或生腹脹四肢瘦弱或痢色無常

厚朴　青皮各二分　橘紅　半夏　蒼朮

人參各三分　枳實　麥芽　神麴各五分
右爲極細末水煑麵糊爲丸如麻子大每服二十丸溫水送下食前忌飽食

褐丸子 嬰童百問下同

治小兒疳積腫脹
蘿蔔子一兩微炒研　陳皮　青皮　檳榔
五靈脂　蓬莪朮麵裹煨　赤茯苓各半兩
黑牽牛取淨末半生半炒　木香各二錢半
右爲末麵糊丸如菉豆大每服十五丸蘇葉泡湯送下

紫霜丸

治變蒸發熱不解幷傷寒溫壯汗後不歇胷中有痰癖乳哺不進乳則吐哯先寒後熱者又治食積乳哺失節宿滯不化或因食而發癇大便酸臭並宜服之
代赭石煅醋淬七次　赤石脂同上製各一錢
杏仁五十枚去皮尖　巴豆三十枚去皮膜心油
先將杏仁巴霜入乳鉢內細研如膏却入代赭石脂末研勻以湯浸蒸餅爲丸如粟米大一歲服五丸米飲吞下一二百日內兒三丸乳汁下更宜量其虛實加減微利爲度此藥兼治驚痰諸疾雖下不致虛人

白餅子

治小兒夾食傷寒其證發熱嘔吐亦有肚疼者噯氣辨得分曉先用此藥一服推下食積却用平和藥發散調治如惺惺散加減參蘇散皆可服却不可服冷藥

滑石　天南星　半夏各一錢　輕粉五分
巴豆二十四個去皮膜用水一升煑乾研細
右三味搗羅爲末入巴豆霜次入輕粉又研勻卻入餘藥末令勻糯米飲丸如菉豆大量小兒壯瘦虛實用藥三歲已下每服三丸至五丸紫蘇湯空心下忌熱物若二五歲兒壯實者不以此拘加至二十丸以利爲度

塌氣丸

治小兒疳氣腹脹喘急幷面目浮腫
丁香　胡椒各一錢　蘿蔔子　生白牽牛各三錢
右爲末麵糊丸如小豆大三歲三十丸米湯下

三稜煎丸

治嬰孩食傷生冷甜膩毒熱等物脾胃積滯久不尅化令兒腹熱脚冷痞癖寒熱及療瘕瘕中脘不和膨脹上膈氣壅心腹不得宣通所以作疾此藥溫涼但是諸積滯食不化並宜與服
京三稜　蓬朮各半兩煑　芫花二錢半醋炒
川當歸　鼈甲醋炙各半兩　巴豆二十一粒
淡豉二錢　杏仁去皮尖炒三錢
右將三稜蓬朮芫花鼈甲醋煑令乾炒剉碎爲細末次入當歸末又入杏仁巴豆淡豆豉和勻水煑白麪爲丸麻子大每服二十丸生薑湯下大小加減服之

大承氣湯

治剛痓胷滿內實口噤咬牙大熱發渴大便澀
大黃　芒硝各半兩　厚朴一兩　枳實二枚
右剉散每服三錢薑三片水一盞煎七分溫服

五苓散

治傷寒溫熱病表裏未解頭痛發熱口燥咽乾煩渴飲水或水入卽吐或小便不利及汗出表解煩渴不止又治霍亂吐利躁渴飲水不徹
澤瀉二兩半　猪苓　白朮　茯苓各一兩半
肉桂一兩
右爲細末每服二錢熱湯調下不拘時服乞多飲熱湯有汗出卽愈
又治瘀熱在裏身發黃疸濃煎茵陳湯下食前服疸病發汗發渴及中暑引飲亦可用水調服小兒加白朮末少許
如發虛加綿黃芪人參末少許

大柴胡湯

治傷寒十餘日邪氣結在裏往來寒熱大便祕澀腹滿脹痛譫語心中痞硬飲食不下或不大便五六日繞臍刺痛時發煩躁及汗後如瘧日晚發熱兼臟腑實脈有力者可服
柴胡八錢　黃芩　赤芍三錢　枳實炒各一錢
半夏湯泡七次切焙一錢半
右剉散薑棗煎加減服之
欲下加大黃半兩

下積丸

治乳食傷積心腹脹滿氣粗壯熱或瀉或嘔
丁香　砂仁各二十粒　史君五個　烏梅三個
巴豆三粒不去油
右爲末爛飯丸麻子大每服三丸陳皮湯下

五珍丸

治酒食積通用

青皮　乾薑燒存性　蓬朮　五靈脂各一兩

巴豆肉去半油一錢

右爲末粳米飯丸麻子大每服三五丸米湯下

分氣飲

治小兒腫脹喘急而氣短

桔梗　赤茯苓　陳皮　桑白皮　大腹皮

枳殼炒　半夏麴　白蘇子微炒　紫蘇梗

炙草各二錢　草菓仁一錢

右剉散每服一錢半薑棗煎服

五疳保童丸

治五種疳疾

生五倍　青黛　夜明砂布裹洗　苦練根皮

蘆薈　熊膽研　黃連去毛　龍膽草生用

乾蟾酥炙去骨皮　麝香另研　蕪荑取仁

蟬退去土各等分

右爲末粟米糊丸麻子大一歲兒二十丸飯飲下

二三服

楊氏塌氣散

治小兒腹脹氣喘體腫而浮

青皮去穰巴豆二十一粒炒黃色去巴豆用

炙甘草各半兩　黑牽牛二錢半半生半炒

肉豆蔻二三個煨香　陳皮一合炒

右末半錢米飲調下加檳榔一個

塌氣散

治小兒腹脹氣粗并疳疾相攻面目浮腫

青皮五錢巴豆三十粒同炒豆黃色去巴豆用

木香一錢

右爲末三歲半錢米湯下食前連進即效

三稜丸

治小兒停積腹腸脹滿乾噦惡心全不入食

三稜　木香　神麴　陳皮　半夏薑製各一兩

丁香　肉桂各五錢

右爲末麴和丸如粟米大每二十丸乳食後溫生薑湯下

眞珠天麻丸

治急驚風清暈用之以通爲度此方仍治弔腸鎖肚撮口至妙丸如麻子大初生患者三日三丸五日五丸七日七丸加青黛名青黛丸

南星炮　天麻　白附炮各二錢半　膩粉半錢

巴霜一字　全蠍　蕪荑炒　滑石各二錢半

右爲末煮麪糊丸如麻子大一歲每服五丸二歲十丸大小加減薄荷湯點茶清送下

大茱連丸

治小兒飲食過度胷膈膨脹上下氣不宣通鬱滯迷悶情思少樂大則作喘飲食不化作渴煩躁坐臥不任肢體倦怠腹脇疼痛

莪朮　京三稜各二錢半醋煮　乾薑炮　陳皮

木香　丁香各三錢　巴豆二十一粒去膜心油

綠細小茱萸二錢

右爲末醋和爲丸麻子大每服七丸至十丸大者加棗子生薑湯下

一方有青皮

下蟲丸

治疳蛔諸蟲

苦楝根皮酒浸焙　綠色貫衆　木香　蕪荑焙

桃仁去皮焙　檳榔各二兩　鶴虱炒　輕粉各錢半　乾蝦蟆炙三錢　史君子五十個煨取肉

右爲末飛麪糊丸麻子大每服二十丸天明清肉汁下

內加當歸川黃連各二錢半治積疳兼疳勞之證

沉香煎

治脾氣冷積

乳香　沉香　丁香　百草霜　木香各一錢

肉豆蔻一個煨　杏仁　巴豆各十四粒出油如霜

右爲末酒煮蠟和丸菉豆大每服三五丸淡生薑湯送下患肚痛不止者服之效常服以通爲度

推氣丸

治三焦痞塞氣不升降大便祕澀

大黃　陳皮　檳榔　枳實炒去穰　黃芩

黑牽牛各等分生用

右爲細末煉蜜丸菉豆大每服二三十丸臨臥溫水下量虛實加減

遇仙丹

治諸蟲取諸積

牽牛三觔　大腹子二觔　大黃　雷丸各四兩

錫灰炙乾爲末　青木香　鶴蝨　乾漆各二兩

皂角四條

右後三味煎水用粟米煮粥初用牽牛末次用大腹末三用錫灰四用大黃五用雷丸六用青木香和劑丸如梧桐子大每服五七丸用薑湯熟水送

下

此藥專治男子婦人蟲積氣塊五勞七傷赤白痢疾便血注下皮黃水腫十般氣十一般惡蟲又進飲食除病悅顏色不與他藥相反四季可服細末三四錢量大小加減服時不喫晚飯二更用清茶下大早桶子內蟲積及米粒盡方可洗面溫粥補之傷寒孕婦不可服

王肯堂曰東垣治脹不犯上下二焦用素問中滿者瀉之於內之法實者分氣消積虛者升陽滋血治者當帥其意而活用之勝前所用排擊諸方遠矣

訶梨勒丸（證治準繩下同）

訶梨勒用皮　厚朴去粗皮薑汁炙令黃熟　陳橘皮湯浸焙各半兩　乾薑炮裂　炙草　木香　白朮　人參各一分

右件藥搗羅爲末煉蜜和丸如麻子大每服以粥飲下五丸日三四服量兒大小加減服之

張氏補脾散

治脾胃虛損腹脇虛脹乳食不進困倦無力

訶子肉　人參各七錢　白朮　木香　枯梗　白茯苓　藿香葉　陳皮　黃芪炒各五錢　甘草炙二錢五分

右每服二三錢薑棗水煎

本事調中丸

治小兒久傷脾胃腹脹

乾薑　橘紅　白朮　茯苓　木香　砂仁　官桂　良薑各等分

右細末和丸如麻子大每服二三十丸食後熟水下

三因肥兒丸

治小兒病多因缺乳吃食太早所致或久患臟腑胃虛蟲動日漸羸瘦腹大不能行髮豎發熱無精神

黃連　神麴各一兩　麥芽炒半兩　木香二錢　檳榔三箇　史君子　肉豆蔻煨裹煨各半兩

右爲末糊爲丸如桐子大每服二三十丸量兒加減熟水吞下

六神丸

治如前證

丁香　青木香　肉豆蔻用麵裹煨各五錢　訶子煨去核半兩　史君子　蘆薈研各一兩

右爲末以粟肉和丸如麻子大每服五丸至七丸溫米飲食前下

胡黃連丸

治小兒疳病或腹大

眞阿魏一兩五錢去肉積　胡黃連去果積　神麴去食積　黃連各二錢去熱積　麝四釐

右爲末每服十二粒白朮湯下

阿魏丸

治小兒食積腹如蜘蛛狀腹痛小便白濁

阿魏醋浸一宿研如泥　黃連炒　連翹各半兩　皂角水浸各一兩

右爲末炒神麴和丸如萄子大每服二十丸空心米飲下

吃果子多者加胡黃連

米食多者加神麴山楂

肉食多者加阿魏

又

阿魏一兩　黃連酒蒸六兩

右爲末醋浸阿魏一宿研如泥湯浸蒸餅丸如元氣不足加人參

小阿魏丸

山楂肉三兩　鹼三錢　半夏一兩

右爲末阿魏半兩醋浸和丸白湯下

中滿分消丸

黃連　枳實　厚朴各五錢　乾薑　薑黃　豬苓　砂仁　澤瀉　茯苓各三分　陳皮　白朮　甘草各一分　半夏四分　黃芩一兩二錢

右爲細末蒸餅和丸如黍米大每服三十丸溫酒送下

消痞丸

快利之劑

黃連半兩　枳實　黃芩　甘草　人參各三錢　厚朴七分　乾薑四分　橘皮一錢　薑黃五分

右爲細末蒸餅爲丸如黍米大每服三十九隨乳下

麻黃升麻湯

治小兒面色痿黃腹脹食不下正月四月小兒服之神效

麻黃二分　桂皮　杏仁　吳茱萸　草豆蔻　厚朴　麵末　羌活　白茯苓　升麻根　蒼朮

澤瀉　猪苓　陳皮　黃蘗各一分　柴胡根　白朮　青皮　黃連各五分
右㕮咀作一服水一大盞煎七分去滓食前熱服

南星腹皮散
主腫疾欲愈未愈之間脾胃虛慢氣促痰喘腹脹胃滿飲食減精神困小便不利面色痿黃
南星製一兩　大腹皮洗焙　薑皮　陳皮　青皮　桑白皮剉炒　甘草　扁豆炒去殼各半兩
右碎每服二錢水一盞薑二片煎七分無時溫服

香陸胃苓丸
治腫疾日久不愈此藥大能實脾導水多服取效
丁香　商陸　赤小豆　陳皮　炙草各二兩　蒼术米泔水浸一宿去粗濾乾剉片炒微黃色　澤瀉各二兩半　赤茯　猪苓　白朮各一兩半　肉桂一兩　厚朴用生薑汁炙令香熟二兩
右除丁香肉桂不過火餘藥剉焙同二味爲末用麪微炒水浸透煮和丸菉豆大每服三十丸至五十丸或七十七丸空心溫湯下兒小者丸作粟殼大吞服之粒數引子竝如前法

赤苓飲
主脾胃因虛受濕面貌浮黃或遍身作腫飲食減少氣不升降小便赤色肚膨脹咳嗽有痰及腫常服神效加草果仁炮過木鼈裹煎投
赤茯苓　蒼术泔浸一宿濾乾剉炒各一兩半　枳殼製一兩　藿香和根　半夏湯煮透剉焙乾　淨香附　紫蘇和梗　厚朴去粗皮薑汁炙香熟　陳皮去白各半兩　炙草一兩二錢

右剉每服二錢水一盞薑二片煎七分無時溫服

三白散
解初中腫疾四肢膚囊浮脹大小便不利皆由膀胱蘊熱風濕相乘
白牽牛半生半炒杵碎　桑白皮剉炒　白朮　木通去皮節　陳皮　甘草各半兩
右碎每服二錢水一盞煎七分無時服

商陸丸
治水腫小便不通勿拘遠近
商陸一兩　淨黃連半兩
右焙爲末薑汁煮麪和丸菉豆大每服三十丸至五十丸用溫紫蘇熟水空心下或溫葱湯

瀉川丸
治水腫及單腹脹氣促食減遍身面浮
大戟　芫花醋炒　沉香　檀香　木香　檳榔　蓬莪朮　大腹皮洗焙乾　桑白皮剉炒各半兩　黑白牽牛末一兩　巴豆去殼膜心存油三十五粒
右除牽牛末巴豆外前九味內有沉香檳香木香檳榔不過火餘五味焙乾同沉香等爲末就加牽牛末和勻巴豆碎切在乳鉢內極細杵入前藥末同再研勻水煮麪和丸麻仁大每服十七丸濃煎葱湯候溫五更初空心下去水未盡停一日減用十三丸次減作九丸再減至七丸湯使下法如前證退即止仍投南星腹皮散
如單腹腫甚能飲食氣壯者加甘遂末同丸取效仍忌有甘草藥餌相反

槃衛飲子
調補嬰孩氣血俱虛榮衛不順四肢頭面手足俱浮腫以致喘急者竝宜服之
川當歸　熟乾地黃淨洗　人參　白茯苓　川芎　白朮　炙草　白芍　枳殼炒別製　黃芪蜜炙　陳皮
右件等分㕮咀每服二錢七水一小盞煎至半盞去滓通口不拘時候議曰榮者血溫流行於脉衛者氣順調和於絡是故榮行脉中衛行脉外陰陽相安循環無止自幼至長不離呼吸無少滯礙其脉方調其氣乃順呼吸之間脉不應息氣有違滯流注絡隱伏臟腑百病皆由茲始此方最良雖兒幼小竝可與服以壯其根使血榮氣衛順且和矣腑寒臟虛溫且壯矣盈虧自然而平怯弱自然而正陰陽調勻氣脉充實何病之有

分氣飲子
調理小兒腫脹作喘氣短促急坐臥不任四體浮腫飲食嘔逆神困喜睡
五味子　桔梗　白茯苓　甘草炙　陳橘皮　桑皮　草果肉　大腹皮　白朮　枳殼炒　川當歸　紫蘇　蘇子　半夏麴
右等分㕮咀每服二大錢七水一小盞生薑二小片棗子半個煎至半盞去滓通口不拘時候兼入味理中丸煎服
議曰清濁無混邪止不干上焦得之清凉下部受之溫暖氣滯則少升降血虛則多流注雖是乳子呼吸一息其脉之至徐徐應指不違其數者亦同大人流行但隨小大受之短淺而已若亦留滯其

脉遲數卽太過不及而病生焉善療治者鬱則分之逆則順之停則利之滯則降之調理之法先宜順氣大抵嬰孩氣順則易治此方分氣與分水穀之分者不同明者察之

大效神功救生丹

治小兒氣虛喘急四肢浮腫肚腹脹急衝滿脅肋乍熱乍寒或瀉或祕皆因久停虛積榮衛不順宜用推去其惡毒之氣

雄黃另研　朱砂各一分　巴豆二十一粒

乾薑二錢

右件用米醋一盞以巴薑就煑令乾去薑不用將巴豆出油和雄朱研勻雪糕丸如麻子大每一歲三丸並用酒浸赤芍藥以少許送下

退腫散氣方

赤小豆　陳皮　蘿蔔子　炙甘草各半兩

木香炮七分

右爲粗末薑棗煎服大小加減

分氣飲（幼幼近編下同）

治肚腹膨脹喘急煩悶

桔梗　茯苓　陳皮　桑皮　大腹皮　枳殼

草果　蘿蔔子　蘇子　蒼朮　厚朴　木通

半夏　木香

小便不利加澤瀉

傷食加神麴麥芽砂仁

補脾飲

治脾虛肚腹膨脹四肢面目浮腫

人參　白朮　半夏麴　蘿蔔子　茯苓　砂仁

木香　陳皮　蒼朮　神麴　車前子　大腹皮

塌氣丸

蘿蔔子　木香　陳皮　莪朮　五靈脂　牽牛

神麴

打麪糊爲丸一歲十丸

參苓散（幼幼類集下同）

治小兒受溫身痛面浮發熱惡風多汗作嘔小便不利

人參　白朮　猪苓　澤瀉　乾薑炮各一錢

赤茯苓　木通各二錢

右咀入燈心十莖車前一撮水煎食前服

除濕湯

治小兒寒溫所傷手足軟弱吐瀉不能擡舉疼痛

人參　白朮　蒼朮　茯苓　半夏　陳皮

厚朴薑炒　藿香　大腹皮洗　甘草炙各等分

右咀水煎不拘時服

單方

治小兒下痢腹大且堅以故衣帶垢者切一升水三升煑取一升分三服（千金方下同）

又方腹上摩衣中白魚亦治陰腫

治少小腹脹滿燒父母指甲灰乳頭上飲之

又方車轂中脂和輪下土如彈丸吞之立愈

小兒腹脹用蘿蔔子紫蘇梗陳皮乾薑各等分甘草減半食減者加白朮煎服（平治會萃）

黃瘦腹脹乾雞糞一兩丁香末一錢蒸餅丸小豆大每服二十丸米湯下（儒門事親）

小兒腹脹半夏末少許酒和丸粟米大每服二丸薑湯下不瘥加之或以火炮研末薑汁調貼臍亦佳（子母秘錄下同）

小兒煩滿欲死雞子殼燒灰酒服方寸匕

小兒腹脹韭根擣汁和猪脂煎服一合間日一服卽愈

小兒腹脹或腹皮青色不速治須臾死胡粉鹽熬色變以摩腹上

小兒浮腫天羅燈草葱白等分煎濃汁服并洗之（普濟方下同）

用絲瓜燈草葱白等分煎濃汁服并洗之

小兒腹脹水氣流腫膀胱實熱小便赤澁牽牛生研一錢青皮湯空心下一加木香減半丸服（鄭氏小兒方）

小兒虛腫頭面陰囊俱浮用史君子一兩去殼蜜五錢炙爲末每食後米湯服一錢（簡便方）

小兒腫病大小便不利黑牽牛各二兩炒取頭末井華水和丸菜豆大每服二十丸蘿蔔子煎湯下（聖濟總錄）

小兒疳利肚脹用鷄子一個開孔入巴豆一粒輕粉一錢用紙五十重裹於飯上蒸三度放冷去殼研入麝香少許糊丸米粒大食後溫湯下二丸至三丸（經驗方）

退腫散氣用白朮炒木香炮甘草炙茴香炮青皮各半兩巴豆三十粒去膜同青皮炒去巴豆不用共爲末米飲調下（證治準繩下同）

又用錢氏益黃散加木香去丁香加蘿蔔子去訶子爲末大小加減米飲調下

小兒傷乳腹脹煩悶欲睡大麥麵生用水調一錢服白麪微炒亦可（衛生總微下同）

小兒傷乳腹脹煩悶欲睡燒鼠二枚爲末日服二錢湯下

鍼灸

古今醫統曰小兒水腫腹大灸臍上一寸三壯大分水穴

醫案

丹溪曰白文舉兒五歲身面皆腫尿多用炒山梔炒桑皮各一錢黃芩二錢半白朮蘇梗各一錢半㕮咀作三帖水一盞半煎至半盞食前溫服

保嬰金鏡錄曰一小兒發熱吐瀉腹脹不乳其紋如流珠此脾胃氣傷先用香砂助胃膏後用六君子湯全愈

一小兒寒熱作嘔飲食不入按其腹乃哭脉紋如長珠此飲食停滯也先用大安丸吐瀉宿滯遂安但脣目抽動大便稀黃此病邪去而虛熱所迫也用六君子湯加釣藤鉤而愈

一小兒胷腹膨脹發熱煩悶脉紋如環珠以手按腹即哭此屬脾胃虛而飲食停滯也先用保和丸一服前證如失更加煩渴按其腹不哭矣此宿食去而脾胃復傷也用五味異功散加柴胡治之頓瘳

一小兒不時乾嘔乳食不進肚腹膨脹其形如來蛇此脾胃虛而成疳也用四味肥兒丸治疳佐以四君加蕪荑健中而痊後傷食吐瀉完穀形氣甚困四肢微搐視其紋如去蛇余曰且不用藥次日吐止但搐而瀉青黃此脾土虛而肝木勝也用六君子加釣藤鉤而瘥

一小兒四肢消瘦肚腹脹大行步不能狀如蜘蛛頗能飲食作渴發熱去後臭穢此脾臟傷也以十全丹數服漸愈又用異功散肥兒丸調理肢體如常

一小兒停食發熱服芩連三稜厚朴等劑飲食日少胷腹膨脹其紋透至指甲用補中益氣湯加木香釣藤鉤溫補脾氣制肝木數劑漸效又用六君子湯加炮薑治之而安其間泛用金石腦麝祛逐之劑變驚而歿者不能枚舉惜哉

一小兒八歲腹腫脹臍凸出大便下血糞亦似痢小水短少面目皆黃兩腮兼赤此食積傷脾又兼肝木所侮脾土蓋脾病則肺氣虛而不能生腎水矣故有是證當先消導其積滯遂用越鞠丸末加三稜蓬朮三錢以淡薑湯調和入酒二匙服之腹中鳴動二便頓利再服二錢腹臍頓消却用大安丸末二錢腹臍全消便血亦止自進薄粥杯許腹中頓痞惡心吐痰不出此脾虛不能腐化而成痰滯也用六君子末二錢以薑湯和服調補胃氣飲食漸進但日晡熱倦腹中覺脹此脾虛故陰分而作用補中益氣湯而愈後復傷食發熱腹脹小便下血保和丸四服而愈

一小兒傷食腹脹嘔吐發熱面赤服消導清熱之劑飲食已消熱赤未退用六君子加升麻柴胡各二分升補胃氣四劑而愈

一小兒稟父腎熱小便赤澀服五苓散之類後患停食服尅伐之藥四肢面目浮腫小便不利漸至氣喘此誤行滲利脾肺氣虛不能攝水而患腫脾腎虛寒不能制水而氣喘用六味丸加牛膝車前及補中益氣湯而愈

一小兒數歲每停食輒服峻厲之藥後肚腹膨脹嘔吐泄瀉先用六君子湯諸證漸愈又用補中益氣湯而安

一小兒肚腹脹飲食即瀉手足逆冷此脾氣虛寒也先用人參理中丸後用六君子湯而愈

一小兒傷食腹脹胷滿有痰用異功散而痊後復傷食腹脹兼痛或用下劑痛雖止而脹益甚更加氣喘此脾益傷而肺益虛也用六君子湯加桔梗調補而愈

一小兒腹脹惡食發熱惡心殊類外感余曰此飲食所傷脾肺虛熱也用保和丸一服諸證頓退但腹仍脹用異功散而痊

一小兒傷食腹脹服尅伐之劑小便濇滯又服五苓散之類飲食漸減小便不通四肢頓腫余朝用金匱加減腎氣丸夕用異功散而愈

一小兒腹脹面赤痰喘大便秘壯熱飲冷此形病俱實用紫霜丸一服諸證俱甚面色頓白飲湯不絕余以爲邪氣退而眞氣復傷故面白而喜湯用白朮散大劑煎湯令恣飲良久而睡翼日頓安

一小兒腹脹大便青白腹左一塊面色痿黃齒齦赤爛食少滯頤余用異功散調補中氣爲主佐以大蕪荑湯清疳治熱月餘諸證稍愈仍用異功散及蚵蠐丸外貼阿魏膏兩日塊消左脅微痛用四君子湯九味蘆薈丸而愈

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百六十一卷目錄
醫部彙考四百四十一
小兒食癖門一
錢乙小兒直訣 癖
張從政儒門事親 小兒肌熱
朱震亨平治會萃 食積
魯伯嗣學嬰童百問 腹中有癖 痞結 積痛 積滯 食積冷熱 胃氣不和虛冷
陶華六書 傷食
薛氏保嬰撮要 不乳食
龔信古今醫鑑 癖疾論
徐春甫古今醫統 積滯
王肯堂證治準繩 脾 脾弱多困 宿食 食積寒熱 食積痢 積病可 醫者丸 不可醫者六 積 乳積 食積 氣積 脾中積 驚積 虛中積 實積 痃癖 痞結
小兒衛生總微論方 食氣積癖論
方一 雙紫圓 充悅圓 牛黃圓 芒硝紫圓 八歲湯 十五歲湯 牛黃雙圓 牛黃鼈甲圓 芫花圓 眞珠圓 鼈甲圓 鼈頭圓 甘草圓 桂心橘皮湯 地黃圓 半夏圓 馬通粟圓 清中解鬱湯 丁香化癖散 塌氣退黃湯 中滿分消丸 消痞丸 堆黃解毒丸 養脾丸 肥兒丸 木香丸 取癖丸 按癖丸 檳榔丸 北柴胡散 褐丸 子 七香丸 聖惠甘遂破結散 進食丸 消積丸 白餅子 白朮散 小沉香丸 芍藥甘草湯 觀音散 銀白散 木香檳榔丸 神芎丸 是癖推氣丸 檳榔丸 消食丸 快膈消食丸 香穀丸 五珍丸

藝術典第四百六十一卷
醫部彙考四百四十一
小兒食癖門一
宋錢乙小兒直訣
癖
若腹中有癖不食但飲乳是也當漸用白餅子下之蓋小兒病此良由乳食不消伏于腹中乍冷乍熱飲水過多即蕩滌腸胃亡失津液脾胃虛弱不能傳化水穀以致四肢羸瘦肚腹漸大而成疳矣
註按前證或因小兒乳食過多致傷脾胃或乳食起居七情六淫失宜所致必先調補元氣爲主佐以消散之劑若除之不以漸則必有顛覆之患常治食積既去而熱不退或作嘔吐少食用五味異功散脅脹少食善怒瀉青用六君子湯加升麻柴胡少食體倦瀉黃用補中益氣湯手足冷加炮薑木香如不應佐用四神丸體瘦潮熱口乾大便不調用肥兒丸若兼頸項結核口齒腐爛當參前疳條主之
元張從政儒門事親
小兒肌熱
小兒身瘦肌熱面黃腹大或吐瀉腹有青筋兩脅結硬如椀之狀名乳癰癖俗呼曰妳癖是也乳癰得之綿帛太厚乳食傷多太熱則病生肌太飽則必傷於腸胃生於肌表者赤眼丹瘤疥癬癰癤痱煉赤白口瘡牙疳宣爛及寒熱往來此乳母抱不下懷積熱熏蒸之故兩手脉浮而數也傷於腸胃者吐瀉驚疳哽氣腹脹肌瘦面黃肚大筋青喜食泥土揉鼻竅頭髮作穗乳癰不化此皆太飽之致然也久而不愈則成乳癰兩手脉沉而緊此其辨也已上諸證皆乳母懷抱奉養過度之罪癖之疾可以丁香化癖散取過數服牛黃通膈丸甘露散益黃散等藥磨之如不愈者有揉癖一法
呪曰日精月華助吾手法勑斬減消驅毒勑攝
右用法之人每念一遍望日取氣一口吹在手心自揉之如小兒病在左壁上用法之人亦左手揉之在右壁上以右手揉之亦吹在乳癖上令母揉之男孩兒用單日女孩兒用雙日大忌風雨陰晦產婦孝子見之用法之時宜于日中前晴明好日色則可矣
朱震亨平治會萃
食積
小兒食積痰熱傷乳爲病大槩肝與脾病多肝只是有餘腎只是不足
明魯伯嗣學嬰童百問
腹中有癖
癖者血膜包水側僻于脅旁時時作痛也惟癖爲能發潮爲能生寒熱故瘧家多蓄黃水日久而復結癖于中脘寒熱不已有是疾者以此小兒臟腑和平榮衛調暢則津液自然流通縱使多飲木漿不能爲病惟失哺失調三焦關格以致水飲停滯腸胃不能宣通如冷氣搏之則結聚而成癖輕者用積滯木香丸重者用取癖丸仲陽云腹中有癖不食但飲乳是也當漸用白餅子下之如不早治則不能食脾胃虛弱四肢不舉諸邪遂生羸瘦而成疳矣

痞結

痞者塞也結者實也熱氣蘊於胃腸之間喜飲聚於腹脅之內於是榮衛不能流行臟腑不能宣通由脹滿而致痞結勢使然耳此實熱之證也時或發爲壯熱聖惠甘遂散主之此藥治小兒痞結雖服湯藥時暫得利而滯實不去心下堅脹按之卽痛內有伏熱諸候併成此疾宜疏利大便破結散氣後宜常服進食丸

積痛

仲陽云積痛口中氣溫面色黃白目無精光或白睛多及多睡畏食或大便酸臭者當磨積而痛自除宜消積丸甚者白餅子下之後胃氣不和用白朮散小沉香丸感應丸治之又有食積肚痛有熱者芍藥甘草湯加乾葛吐者加半夏生薑或加枳實亦效

積滯

小兒有積滯面目黃腫肚熱脹痛覆睡多困酷啼不食或大瀉閉澀小便如油或便利無禁糞白酸臭此皆積滯也然有乳積食積須當明辨之吐乳瀉乳其氣酸臭此由啼叫未已便用乳兒停滯不化而得之是爲乳積肚硬帶熱瀉或嘔此由飲食無度多食飽過飽後卽睡得之是爲食積腹痛啼叫利如蟹渤此由觸忤其氣榮衛不和淹延日久得之是爲氣積合用木香丸主之檳榔丸亦可用大小便閉者神芎丸妙甚是齋推氣亦佳冷證下積五珍丸亦可用

食積冷熱

巢氏云夫宿食不消者脾胃冷故也小兒乳哺飲食取冷過度冷氣積於脾胃爲水穀之海脾氣磨而消之胃氣調和則乳哺消化脾傷於冷則宿食不消脉沉者傷食不化故也亦有傷乳傷食而身熱者惟肚腹之熱尤甚人之傷積肚熱糞極臭酸而夜間有熱傷積之明驗人所未曉也冷者消食丸木香丸夜間有熱天明復涼乃是傷寒夾食失解故也當服白餅子先與微利次與參蘇飲發熱也竹皮飲泰芄散退熱而安有實熱者大柴胡湯去大黃亦可服傷寒論人病有宿食何以別之師曰寸口脉浮而大按之反澀故知有宿食當下之宜大承氣湯其端而發熱者紫霜丸主之冷證用進食丸尤佳亦治食厥乃四肢逆冷面色青黑是也或當吐而甦有痰者溫膽湯加減服痰定而嘔自痊冷證丁香丸可服白餅子下痰亦可

胃氣不和虛冷

仲陽云胃氣不和面光白無精光口中氣冷不思食吐水肌瘦虛弱腹痛當補脾益黃散主之凡人以胃氣爲本惟治病亦然胃氣有實有虛實者則有痞滿內熱之證虛則有嘔吐不食之證虛者益之實者損之欲得其平則可矣平胃散觀音散銀白散壯胃之劑不可缺也

明陶華六書

傷食

海藏云傷食宜以藥下之者當詳其所傷何物生硬寒熱不等不可遽用巴豆之類大毒之藥下之升麻葛根湯太陽陽明也甚悍散風熱咽不利脾不和少陽渴小便不利也小柴胡湯往來寒熱胃脘微痛少陽也然欲知其經當以脉別之

薛氏保嬰撮要

不乳食

經曰胃爲水穀之海六腑之大源也人身氣血腑臟俱由胃氣而生故東垣之法一以脾胃爲主所謂補腎不若補脾止此意也在小兒雖得乳食水穀之氣未全尤使胃氣胃氣一虛則四臟俱失所養矣故丹溪謂小兒多肝脾之疾也若面色晃白目無精光口中氣冷不食吐水肌瘦腹疼此胃氣虛寒之證用五味異功散或六君子湯主之若大便不實兼脾虛也加乾薑溫之中滿不利脾不運也加木香開之喜冷使秘胃實熱也用瀉黃散涼之命門火衰不能生土者用八味丸補之桌賦胃氣不足亦用此丸蓋下焦眞陽充盛則上生脾元自能溫蒸水穀矣

龔信古今醫鑑

癖疾論

天地氣運固有南北之殊小兒病患亦有彼此之異北方小兒患癖疾者十恆八九南方小兒患癖疾者百無二三是何謂而致之蓋南方水土薄弱飲食柔軟易於尅化厥疾少矣北方水土厚實麵食堅硬難於運動厥疾生焉亦由脾胃之不和也故東垣以脾胃爲人之主脾胃和一疾不生虧則百病生焉小兒脾胃本自柔脆臟腑尚且嬌嫩爲之母者多不知調護之法惟務姑息之愛不問醎酸甘肥之味瓜菓生冷之物及糍粽濕麪油膩煎炙之類諸般稠粘乾硬難化之物縱其所欲食之過多損傷脾胃脾胃既傷則不能消化水穀水穀不化則停滯而痰發發熱既久則耗傷元氣元氣虛則不能運動其血血遂不行

而停滯不散留於脅肋之間遂成血塊居於皮裏膜外不能動移始則有如錢大發熱則日漸長其形如龜如蛇如猪肝肺者長短大小之不一也內有血孔貫通外有血筋盤固其筋直通背脊之下與臍相對之間有動脉之處乃癖疾之根夫人身之血脉則晝夜循環無端一週流及此其血則貫入筋內由筋入孔由孔入癖蓋癖得血養而漸長邪得血助而漸盛於是正氣愈虛而血愈枯矣發爲潮熱以致諸疾或頭出虛汗或胃前項下跳動或肚大青筋毛焦髮豎或面黃肌瘦四肢乾枯淹延日久則毒氣發出變生諸證有變爲牙疳口臭宣露出血者有變爲頭面腫大口鼻潰爛者有變爲一切瘡毒流膿出血者有變爲肢體浮腫腹脹氣喘者有變爲寒熱往來似瘧非瘧者有變爲痰嗽喘熱嘔吐下血者有變爲嘔吐瀉痢脫肛下墜者有變爲心腹疼痛痞氣偏墜者皆癖毒攻出之所致也變證多端難以悉舉乃九死一生之病非一方一法所能愈也

治之先宜針灸之法以斷其根使血不貫入筋內則癖無血所養癖卽自敗矣外以膏藥貼之內以湯丸攻之大抵宜補脾養氣以治其本清熱消塊以治其標標本兼濟又當執其權衡以量兒之壯弱病之輕重若壯而輕者則治標之藥多於治本之劑若弱而重者則治本之劑多於治標之藥大槩肥兒丸烏金丸阿魏丸千金保童丸之類乃半攻半補平和之劑宜對證選用於針灸之後可收十全之功也醫斯疾者宜詳究之

徐春甫古今醫統

積滯

活幼心書云小兒所患之證皆因乳哺不節過食生冷堅硬之物脾胃不能尅化停積中脘外爲風寒所傷或因夜臥失蓋致頭疼面黃身熱眼泡微腫腹痛膨脹足冷肚熱喜睡神昏不思飲食或嘔噦噫氣吞酸大便腥臭此爲陳積所傷但有時時泄下清水如生草汁是受驚而後有積煩悶啾唧常似生嘔名爲驚積小兒醫者亦惟因其輕重虛實而治之可也

王肯堂治驗準繩

脾

脾主困

實則困睡身熱飲水

虛則吐瀉生風

脾病困睡泄瀉不思飲食

脾胃虛寒則面晃白目無精光口鼻氣冷肌體瘦弱吐水腹痛不思乳食用益黃散下利用調中丸

傷風手足冷者脾臟怯也先用益黃散補脾後用大青膏發散

脾病見四季皆放餘四臟治之順者易治逆者難治

脾怯當面赤目黃五臟相反隨證治之

脾主濕自病則泄瀉多睡體重昏倦脾苦濕急食苦以燥之

實則泄瀉赤黃睡不露睛瀉黃散主之

虛則泄瀉色白睡露睛白术散主之

肝乘脾賊邪風瀉而嘔茯苓半夏湯主之

心乘脾虛邪壯熱體重而瀉羌活黃芩蒼术甘草湯主之

肺乘脾實邪能食不大便而嘔吐嗽煎檳榔大黃湯下葶藶丸

腎乘脾微邪惡寒泄瀉理中丸之類主之

凡脾之得病必先察肝心兩臟之虛實根其源之所起然後救療蓋肝是脾之鬼心是脾之母肝氣盛則鬼氣勝心氣虧則脾家生氣不足當用平肝氣益心氣盛者抑之則退虧者益之不乏所以有抑脾氣益心氣兩藥診其脉肝心兩臟俱和則是脾自生之疾察其虛實而治之

前證實者病氣實而形氣虛也若面色晃白吐瀉腹痛口鼻氣冷屬寒水侮土宜用益黃散若面青脣黯吐瀉手足並冷此脾土虛寒用乾薑理中湯若面色痿黃手足不冷此脾土虛弱用人參理中湯若傷風手足並冷吐痰咳嗽吐瀉腹脹此脾肺氣虛用五味異功散實脾氣加防風升麻散外邪若發于寅卯之時用六君柴胡升麻補脾土平肝木然面黃者脾之本色也面赤者火生土爲順面青者木尅土爲逆當平其所勝以補元氣爲善

脾苦濕急食苦以燥之白术

脾欲緩急食甘以緩之甘草

以甘補之人參

以苦瀉之黃連

脾虛以甘草大棗之類補之如無他證以錢氏益黃散補之虛則補其母心乃肺之母以炒鹽補心

脾實以枳實瀉之如無他證以錢氏瀉黃散瀉之實則瀉其子肺乃脾之子以桑皮瀉肺

脾弱多困

脾具坤靜之德而有乾健之運夫胃陽也主氣脾陰也主血胃司納受脾司運化一納一運化生精氣清氣上升糟粕下降納五穀化津液其清者爲榮濁者爲衛陰陽得此謂之橐籥故東垣以脾胃爲五臟之根本也脾氣既弱則健運之令不行化生之功已失職而嗜臥多困所由生焉法當溫補其脾脾氣既旺則腑臟清陽之氣升舉易于運行又何困倦之有海藏用四君子加木香砂仁半夏白术倍之薑棗煎服誠良法也若脾虛好睡多驚則是心血虛而火動之宜安神養血若因心脾氣虛有痰者宜用人參五味子茯苓以補心氣當歸芍藥酸棗仁以養心血橘紅半夏以開痰若因脾肺氣虛胃腸有痰用補中益氣湯以健脾胃膽星天竺丸以化痰涎若因飲食停滯而作用四君子湯以益脾土山楂神麴以消飲食若因脾虛而好睡用五味異功散以補脾氣當歸芍藥以生脾血芍藥須用酒拌炒黃不則酸寒傷脾此假熱以對假寒也若乳母飲酒致兒昏醉好睡者以乾薑陳皮煎湯解之不應用異功散加乾葛卽愈矣

脾胃不和四君子加白术一倍薑棗煎

脾困四君子加木香砂仁人參各半錢煎

脾胃虛弱生氣多困四君子加炒半夏麴炙石子等分爲末入冬瓜子少許同煎

宿食

傷寒同一發熱而傷食者惟肚腹之熱爲甚且糞極酸臭夜間潮熱尤傷積之明驗也

小兒宿食不消者胃納水穀而脾化之兒幼不知撙節胃之所納脾氣不足以勝之故不消也神麴麥芽之屬皆腐化之物昔賢已謂能傷胃中生發之氣矣況進而三稜莪朮乎況又進而牽牛大黃巴豆乎脾氣一受傷於食再受傷於藥至於下之而氣已脫矣所存幾何故夫尅食之藥不可多用下積之藥尤不可不審其證之可下與不得不下而後用也

錢氏論食不消脾胃冷故不能消化當補脾益黃散主之

食積寒熱

小兒食積者因脾胃虛寒乳食不化久而成積其證至夜發熱天明復凉腹痛膨脹嘔吐吞酸足冷肚熱喜睡神昏大便酸臭是也有前證而兼寒熱者名曰食積寒熱若食在胃之上口者吐之胃之下口者消之腹痛痞脹按之益痛者下之下後仍痛按之則止者補之夾食傷寒者先散之用紫蘇飲熱甚便祕者先利之用大柴胡湯如無外感但只傷食不至於甚保和丸調之蓋脾爲至陰之臟也故凡脾病者至夜必熱熱而兼寒則又見所勝者侮所不勝矣食未消者消之則寒熱自止食既消者補之則寒熱自痊若手足並冷喜熱飲食此中州虛寒也宜溫之大便欲去不去脾氣下陷也宜升之若夜間或侵晨泄瀉者脾腎俱虛也用四神丸手足並熱作渴飲水者脾胃實熱也用瀉黃散大便祕結用大柴胡湯手足雖熱口不作渴大便不實者用白术散仍參腹痛腹脹積痛積滯治之

食積痢

有食飽傷脾脾氣稍虛物難消化留而成積積敗爲痢腹肚微痛先調胃氣次理積却止痢則病根自除和中散理虛養胃三稜散烏犀丸助脾化積沉香檳榔丸守中湯進食止痢仍忌生冷粘膩等物不致復作

積病可醫者九

面上虛腫是積積者是脾之所係脾主身之肌肉故應面故知是脾積其脾係土土無止形故早晚浮腫不定多則早浮其睡則脾不磨上面作腫若病後此證則是虛中積宜用調脾消積行氣等藥

面合地臥是積何以合地其受積在脾是冷積何以知之其脾好土故知在脾其冷者屬陰故知傷冷硬食得之宜下熱積氣藥耳

腹脹是積其積在肺何以知之其肺主於氣氣當受積其氣便冷腹脹滿急故知在肺如腹脹先宜調氣後轉轉後更宜調氣

小便如油是積其積在小腸何以知之其積受於脾脾當傳心心不受觸則入小腸小腸是心之腑故知在小腸則節其水道小便如米泔油相似也

髮黃是積是積氣傷心心主血脉榮遍身毛髮被積氣所干則髮黃故知是積傷心宜下空心散及取積藥此人必時復發熱也

赤白痢是積其積在肺受傳大腸及有外傷冷而得何以知之其肺主西方庚辛金其色白後赤則是外邪故知肺傳大腸則爲赤白痢也宜取後調氣

兩眼黃赤睛青是積其積在肝何以知之肝主東方甲乙木色青却被積氣所干卽黃赤睛青者眼屬五藏肝是其主脾若受積故令眼睛青是肝受積若傳膽其人口苦不要喫物宜凉藥退之

遍身虛腫是積其積不在臟只在腑何以知之爲其積曾取後被藥發動即不在臟故出皮膚之間爲腫也只宜下取虛中積藥然後補之

多瀉白糞是積是受冷積在脾何以知之脾主化受冷積在脾冷滑而瀉白糞故知在脾宜先轉後熱藥補之

不可醫者六

喘急是肺積肺主氣其喘急則肺絕其人當面白全無血色故不可醫也

面黑是腎積其人面黑者是腎絕也人當不辨好惡眼直無光只得一日而死也

吐熱氣是榮積其不醫者是血絕不可治也血主心心不能管故出熱氣不止耳

手脚心生瘡是衛積衛者氣也胃氣不生故手足生瘡若衛絕則氣不回只得半日也

惡心吐乾嘔是胃積何以不醫胃主化食其胃熱則惡吐故不治其人必食乳不化不食亦乾吐嘔面色青黃無血色也

瀉久住又瀉是積咳脾爛何以知其脾爛其人當瀉白糞爲食不消住了却放糞亦黑而死即知脾爛不可治

積

小兒五積爲臟氣不行蓄積一處不動故曰積夫心爲伏梁在臍上上攻其心下攻胃口脾爲痞氣在胃口上橫之肝爲肥氣在臍之左邊肺爲息賁在臍之右畔腎爲賁豚在臍下各有趨動非食之所成乃氣積也臟屬陰故在一處而不動也

聚謂六腑之氣留聚也腑屬陽陽氣運轉不停故其聚不定一處發而腹痛積聚之候皆面黃瘦劣嗞嘬不生肌肉髮立或肌體浮腫腹急多因多爲水氣

虛中積候凡驚中虛積者謂因驚取復驚發動是也所下糞青穢凡虛中有積者因傷食而瀉又吐如此漸虛其病未瘥故曰虛積也又虛中之積有積而頻頻取轉却取轉不著致其積尚伏故亦曰虛中積若驚積取下則糞靣驚青如是食積即糞成塊子凡疳中虛積者因疳病轉瀉虛而疳不退故虛中爾所取下糞裹白色也

凡嬰孩所患積證如覺一二日先以百傷飲發表次當歸散水薑煎服溫動積滯方下烏犀丸六聖丸重與寬利後用勻氣散調補

凡有積滯須辨虛實兒孩兒虛瘦長短黑白南北古今不同不可一槩論也予今之法實者可服進食丸虛而微白及疳瘦者宜服肥兒丸

初患元氣未損之時或腹脹作痛大小便不利者先用白餅子或木香檳榔丸下之下後以白朮散或五味異功散和之渴加乾葛吐加半夏下而熱不退或作嘔作瀉飲食不思此脾胃俱傷也用六君子湯手足指冷喜飲熱湯此脾胃虛寒也前方加炮薑木香面色黃白日無精光脾肺俱虛也用四君子加柴胡升麻腹痛泄痢下重或小便不利者用四逆散淡熱晡熱或瀉未已脾氣下陷也潮熱口渴大便不調欲變疳證也並用補中益氣湯佐以肥兒丸經云邪之所湊其氣必虛留而不去其病乃實必以調脾爲主而以消導佐之古人所謂養正積自除正此意也

乳積

其候但是吐下乳來有餿臭氣因啼叫未已遽與乳哺停滯不化而得茅先生先用丁香散調胃後下牛黃丸取下妳積後下勻氣散常服健脾散即愈

乳癖之候面色青黃發瀉壯熱吐乳多睡口內生瘡漸漸黃瘦腹內結塊不散由乳母食飲無常醉飽過度便即乳兒或乳母偏臥一向乳兒不能迴轉兒亦睡著乳滯偏於脅下因茲結聚成塊而痛者是也

食積

肚硬而熱手他處或瀉或嘔因飲食過飽即睡而得茅先生用牛黃丸取積後用勻氣散調理常服萬靈丸即愈

氣積

其候面色黃白不進食腹痛天矯啼叫痢如蟹渤此因榮衛不和二氣乖忤日久得之

茅先生用萬靈丸勻氣散醒脾散健脾散之類相夾調理

祕錄云治小兒氣癖取三稜針作糞粥以米粉爲之與乳母食之治小兒十歲以下及新生百日無問痼熱無辜疰癖等皆理之妙不可言

脾中積

面黃如土色或面帶虛浮騎上微痛肚皮熱飲食減小纔食便言臍上及腹中痛所食不化頭微熱此因先食硬物或冷物所傷在脾治之先下青金丸取下脾中積後用勻氣散醒脾散調理常服健脾散萬靈丸即愈

驚積

有時時瀉清水如生米汁是受傷而復有積煩悶啾唧常以生嘔名爲驚積先解驚後理積解驚五苓散或百解散理積三稜散或烏犀丸及三解散炒神麴生薑煎湯調服醒脾散沉香檳榔丸寧驚化積壯氣和胃仍節冷乳自然平治

虛中積

其候渾身微熱不思飲食昏昧神緩抱著一似睡未覺肚熱足冷者多因吐瀉大病及攻擊之後而得此候茅先生先用青金丸取積後用勻氣醒脾散調理常服萬靈丸保童丸即愈

實積

其候大便不通風毒瘡癤喉閉咋腮咽中涎響茅先生先用奪命散吐下熱涎後用勻氣散醒脾散調理常服牛黃膏天竺黃散鎮心丸即愈

疳癖

茅先生論小兒生下五箇月日上至七歲有結癖在腹成塊如梅核大來去或如卵大常叫疼痛者亦分數類在左脅下痛者名痞氣在右脅下痛者名癖氣下逢我術散夾健脾飲與服即愈如見面黑眼直視瀉黑血鼻口冷手足冷不進食者死

錢氏論小兒病癖由乳食不消伏在腹中乍凉乍熱飲水或喘嗽與潮熱相類不早治必成疳以其有癖故令兒不食致脾胃虛而熱發故引飲過多即瀉滌腸胃亡失津液胃不能傳化水穀其脉沉細益不食脾胃虛衰四肢不舉諸邪遂生鮮不瘦而成疳矣

仁齋曰癖者血膜包水側僻于脅旁時時作痛也惟癖爲能發潮爲能生寒熱故瘧家中脘多蓄黃水日久而復結癖寒熱不已有是疾者以此小兒臟腑和平榮衛調暢則津液自然流通縱使多飲水漿不能爲病惟乳哺失調二焦鬲隔以致水飲停滯腸胃不能宣通如冷氣搏之則結聚而成癖輕者用導滯木香丸重者用取癖丸

會氏曰嬰兒始生稟賦未完失於襁保之不謹乳哺之不節外爲六淫侵襲內因五臟氣虛冷積久停於脾不能剋化結成癖塊突于脅下或左或右其疾皆因積滯蘊作致有寒熱或腹肚疼痛或晝涼夜熱治療之法氣實者亦須溫正胃氣後用烏犀丸或水晶丹下之如過二三次即以稀粥略止候所作形證消盡方投補益之劑氣虛者先與調脾胃固眞元神色稍正飲食進多如前法下之若太虛甚用二稜散化癖丸漸消之順適陰陽以平爲期然先補後瀉行迎奪之法則取去陳寒冷積若面黃唇白髮竪肌瘦乃爲虛極不可輕下但徐徐用藥消化調理爲上若兒小者更令乳母常服藿香飲使藥從乳過亦少助也

痞結

此痞在腹內與心下之痞不同宜常服進食丸按進食丸有巴豆豈宜常服甘遂有大毒瀉水如決江河非十分壯實十分危急十分水氣三者俱備未可輕用今以爲痞結主方謬矣

痞癖既久飲食減少脾氣必虛久而不愈必先以固胃氣爲主使養正則積自除若欲直攻其結不惟不能善消抑亦損其脾土脾土既虧必變證百出矣當參各類及隨見證而主治之

小兒衛生總微論方

食氣積癖論

小兒積聚癖癥者其證不同積聚乃氣之所致不可輕治脾胃既虛冷飲食先已不化乳哺再稽失其宜便乃成傷也其候身體壯熱口中氣溫面黃腹脹日無精光或白睛多喜睡四肢垂瘦畏食壯熱大便酸臭或爲吐瀉水穀不消須宜穩藥剋化不可便行駃藥取轉小兒氣實脾胃壯者化之有漸若氣怯脾胃弱者但稍失調養便成傷也

方一

雙紫圓千金方下同

治小兒身熱頭痛飲食不消腹中脹滿或小腹絞痛大小便不利或重下數起小兒無異疾惟飲食過度不知自止哺乳失節或驚悸寒熱惟此丸治之不瘥更可重服小兒欲下是其蒸候哺食減少氣息不快夜啼不眠是腹內不調悉宜用此丸不用他藥數用神驗千金不傳今詳序例中凡云服紫丸者即前變蒸篇中四味者是也云服紫丸不下者服赤丸赤丸差駃病重者當用之方中並無赤丸而此用硃砂又力緊於紫丸疑此即是赤丸也

巴豆霜　棗核仁各十八銖　麥門冬十銖　甘草五銖　甘遂　硃砂飛各二銖　牡蠣燒各八銖

右八味以熟湯洗巴豆研新布絞去油別搗甘草甘遂牡蠣麥門冬下篩訖研棗核仁令極熟乃內散更搗二千杵藥燥不能相丸更入少蜜足之半

歲兒服如荏子一雙一歲二歲兒服如半麻子一雙三四歲者服如麻子二九五六歲者服如大麻子二九七歲八歲服如小豆二九九歲十歲微大於小豆二九常以鷄鳴時服至日出時不下者熱粥飲數合即下丸皆雙出也下甚者飲以冷粥即止

充悅圓

治小兒胎中宿熱母飲食粗惡辛苦乳汁不起兒乳哺不爲肌膚心腹痞滿萎黃瘦瘠四肢疼煩繚戾服之可令充悅

芍藥　柴胡各二兩　大黃　人參各一兩　乾薑如熱以枳實代　甘草各半兩　鼈甲　茯苓各一兩半

右八味爲末蜜丸如大豆服一丸一歲已上乳服三丸七歲兒服十九日二

牛黃圓

治小兒宿乳不消腹痛驚啼

眞牛黃三銖　附子二枚　眞珠　巴豆霜　杏仁各一兩

右五味擣附子眞珠爲末下篩別擣巴豆杏仁令如泥內藥及牛黃擣一千二百杵藥成若乾入少蜜足之百日兒服如粟米一丸三歲兒服如麻子一丸五六歲兒服如胡豆一丸日二先乳哺了服之腑上下悉當微轉藥完出者病愈散出者更服以藥完出爲度

硇硝紫圓

治小兒宿食癖氣痰飲往來寒熱不欲食消瘦

硇硝　大黃各四兩　半夏　甘遂各二兩　代赭一兩　巴豆二百枚　杏仁一百二十枚

右七味爲末別擣巴豆杏仁治如膏旋內藥末擣三千杵令相和合强者內少蜜百日兒服如胡豆一丸過百日至一歲服二丸隨兒大小以意節度當候兒大便中藥出爲愈若不出更服如初

八歲湯

治八歲已上兒熱結痰實不能食自下

白芍藥　梔子仁　知母　生大黃各二兩　柴胡二兩六銖　升麻　黃芩　黃連各二兩半　竹葉切一升半　桔梗一兩半　細辛十五銖

右十一味㕮咀以水六升煮取一升八合去滓分四服十歲兒爲三服

一方有枳實杏仁各一兩半無桔梗黃連

十五歲湯

治小兒十五已下熱結多痰飲食減

大黃　柴胡　黃芩各三兩　枳實一兩十八銖　川升麻　赤芍藥　知母　梔子仁各二兩半　生薑十八銖　杏仁二兩　竹葉切一升半

右十一味㕮咀以水六升半煮取二升十歲至十五者分三服

牛黃雙圓

治小兒結實乳食不消心腹痛

牛黃　太山甘遂各半兩　眞珍六銖　杏仁　芍藥　黃芩各一兩　巴豆十八銖

右七味爲末蜜丸一歲兒飲服如麻子二丸但隨兒大小加減之

牛黃鼈甲圓

治小兒癖實壯熱食不消化中惡忤氣

牛黃　厚朴　桂心　芍藥　乾薑各半兩　茯苓　麥蘗　柴胡　大黃　鼈甲　枳實　芍藥各一兩

右十二味爲末如小豆大日三服以意量之

芫花圓

治小兒心下痞痰癖結聚腹大脹滿身體壯熱不欲哺乳

芫花　黃芩各一兩　大黃　雄黃各二半兩

右四味爲末蜜和更擣一千杵三歲兒至一歲已下服如粟米一丸欲服丸內兒喉中令母與乳若長服消病者當以意消息與服之與乳哺相避

眞珠圓

治小兒痰實結聚宿癖羸露不能飲食

眞珠半兩　麥門冬一兩　棗核仁二百枚　巴豆四十枚

右四味爲末蜜丸期歲兒服二丸如小豆大二百日兒服如麻子二丸漸增以知爲度當下赤黃白黑葵汁勿絕藥病盡下自止久服使小兒肥白已試驗

鼈甲圓

治少小腹中結堅脅下有疹手足煩熱

鼈甲　芍藥　大黃各三十銖　茯苓　柴胡　乾薑各二十四銖　桂心六銖　蜚蠊瓦炙　蠐螬各二十枚

右九味爲末蜜和服如梧子七丸漸漸加之以知

爲度

鼈頭圓

治小兒痞氣脅下腹中有積聚堅痛

鼈頭炙一枚　甘皮半兩　蝱蟲　䗪蟲俱炙

桃仁各十八銖

右五味爲末蜜丸服如小豆大二丸日三大便不利加大黃十八銖以知爲度

甘草圓

治小兒羸瘦惙惙宜常服不妨乳

甘草五兩

右爲末蜜丸一歲兒如小豆十丸日三服盡即更合

桂心橘皮湯

治小兒五六日不食氣逆

桂心　人參各半兩　橘皮　薤　黍米

右五味㕮咀以水七升先煑藥煎取二升次下薤米米熟藥成稍稍服之

地黃圓

治少小胃氣不調不嗜食生肌肉

乾地黃　大黃各一兩六銖　茯苓十八銖

當歸　柴胡　杏仁各半兩

右六味爲末以蜜丸如麻子大服五丸日三

半夏圓

治小兒暴腹滿欲死

半夏隨多少微火炮之

擣末酒和服如粟米粒大五丸日三立愈

馬通粟圓

治少小脅下有氣內痛喘逆氣息難往來寒熱羸瘦不食

馬通中粟十八銖　杏仁　紫蘇　細辛各半兩

五味子　石膏　秦艽　半夏　茯苓各六銖

右九味爲末蜜丸服如小豆十丸日三不知加至二十丸

清中解鬱湯 直訣方

治脾氣虛弱飲食停滯鬱熱生痰或身發赤暈

白朮炒　茯苓　陳皮　山梔仁炒　山楂

神麯炒　麥芽炒　川芎　桔梗　炙草各五分

右每服二三錢水煎

丁香化癖散 儒門事親

治小兒乳癖

白丁香　密陀僧　舶上硫黃已上各二錢

硇砂半錢　輕粉少許

右研細末每兒一歲服半錢男病女乳調女病男乳調出下黑糞爲度後用通膈丸泄之

塌氣退黃湯 蘭室秘藏下同

一名茯苓滲濕湯治小兒面色痿黃腹滿脹食不能下

白朮　柴胡各半分　川升麻一分　桂枝

麻黃炒　吳茱萸　厚朴　羌活　草豆蔻

神麯　蒼朮　澤瀉　白茯苓　猪苓　黃蘗

橘紅各二分　青皮　黃連各五分　杏仁二個

右都作一服水二大盞煎至一盞去渣食前溫服

中滿分消丸

枳實　黃連　原朴各五分　生薑　薑黃

猪苓各一錢　橘皮　甘草　白朮各一錢半

砂仁　澤瀉　茯苓各三錢　半夏麴四錢

黃芩一兩二錢

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如黍米大每服三五十丸溫水下

消痞丸

黃連五錢　黃芩二錢　厚朴七分　薑黃五分

乾生薑　人參各四分　甘草三分　枳實二分

橘皮一分

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如黍米大每服三十丸隨乳下

雄黃解毒丸 片玉心書下同

下痰去熱追蟲打積

雄黃一錢另研　鬱金三錢　巴豆霜二錢

共爲末米糊丸如粟米大

痰涎壅甚竹葉湯下

積痛茴香湯下

纏喉風滾白水化開吐痰

蟲痛苦楝子根白皮湯下先以雞卵油煎空心時令兒聞之然後服藥必要上半月謂其蟲之頭向上故也

養脾丸

治小兒脾胃虛弱不思乳食傷食癖積面色黃嘔吐瀉泄腹痛膨脹併皆治之

蒼朮製　陳皮各五錢　縮砂仁　草果仁

益智仁各二錢　厚朴　神麯　麥芽炒各三錢

共爲末酒糊丸如粟米大米飲下

脾胃虛弱米湯下
嘔吐煨薑湯下
食積山楂湯下
腹痛茴香湯下
腫脹蘿蔔湯下
寒泄薑棗湯下

肥兒丸 有嬰家祕下同

小兒脾胃素弱食少而瘦或素強健偶因傷食成積而瘦或因火病之后而瘦者宜服之

人參　白朮各二錢　陳皮　茯苓各錢半
甘草炙　木香　縮砂仁　青皮　神麴炒
史君子肉各一錢　山藥　蓮肉去心各二錢
桔梗一錢

共爲細末荷葉浸湯煮粳米粉爲丸米飲下此參苓白朮散加減以治疳病將成之聖藥也

腹中有癖者加三稜莪朮各煨丸肋鼈甲醋炙各一錢半

有熱者加北柴胡二錢黃芩黃連蘆薈乾燒存性各一錢半

瘦太甚者加當歸川芎各二錢

泄瀉者加肉豆蔻麵包煨訶子肉各一錢

疳瘦食少者去麥芽神麴

木香丸 嬰童百問下同

治吐乳瀉乳其氣酸臭由啼叫不已以乳與兒停滯不化是爲乳積肚硬熱渴吐瀉由飲食無度過飽即睡是爲食積腹痛啼叫利如蟹勃由觸忤其氣榮衛不和淹延日久是爲氣積瘧後肚內結癖成塊

木香　蓬朮　砂仁　青皮去穰　硃砂研細
代赭石　大丁香各一錢　巴豆去油二錢

右爲細末和勻飛白麵糊和丸麻子大每服二三丸乳傷乳汁下食傷米飲下

取癖丸

治小兒癖塊大痛用之如應

甘遂　芫花俱微炒　黑牽牛半炒半生取末
薜桂　蓬朮　青皮去穰　木香　桃仁炒
五靈脂各二錢　巴豆去油一錢

右爲末研和十分細嫩飛白麪糊丸麻子大每服一二丸薑蜜煎湯灌下洩後冷粥補仍和胃

挨癖丸

治乳癖穀癥腹中塊痛

青皮　木香　代赭石火煅酢淬研極細末
蓬朮　生地黃各三錢　巴豆壓去油一錢

右爲細末酢麵糊丸麻子大每服二丸食後薑湯下

檳榔丸

治小兒傷食得之痛刺脅肋心胷煩悶飲食不下吐逆惡心久不醫治漸成痞癖

青皮五錢去穰巴豆三十粒去殼同炒去巴豆
陳米半合炒法亦用巴豆同青皮　檳榔五錢
木香麵裹煨三錢

右爲細末蒸餅丸如黍米大用米飲食前服丸數多少量兒大小虛實加減

北柴胡散

治小兒因傷血得之胷膈鬱悶痛引小腹時或攻築上搶心胷漸成瘕結之證

人參　北柴胡　廣木香　枳殼　京三稜
檳榔各三錢

右爲細末陳皮煎湯調食遠服

褐丸子

治小兒因傷氣得之心腹膨脹肚大脅痛面黃肌瘦倦怠無力久而不治漸成痞塊

陳皮　青皮　三稜　蘿蔔子炒　莪朮各五錢
木香　胡椒各一錢　黑丑炒取頭末三錢

右爲細末麪糊丸如黍米大生薑三片泡湯送下二三十丸

七香丸

治小兒因傷積得之其證如腸澼之疾便利無度滑不成糞似痢非痢結成癖塊

丁香　木香　大茴炒各一錢半　枳殼　三稜
青皮　莪朮同巴豆七粒炒赤色去巴豆各一錢

右爲細末煮糊丸如黍米大每用三十丸米飲空心服

聖惠甘遂破結散

治小兒心胷痞結蘊聚痰水雖服湯藥暫利而滯實不去心下堅脹按之輒啼內有伏熱所結

甘遂麵裹煨令黃色二錢半　青皮　黃芩
川大黃煨各半兩

右爲粗末每服一錢水一盞煎至六分去滓溫和服量大小加減得通利即止後以冷粥補之

進食丸

治乳食不消心腹脹滿壯熱喘粗嘔吐痰逆腹鳴泄瀉米穀不化或下痢赤白腹痛後重及食癥乳癖痎氣痞結並皆治之小兒胃腸熱實腹內有留飲飲令藥衛痞塞臟腑之氣不得宣通其病腹內氣結脹滿或壯熱凡有此疾當疏利大便破結散氣宜常服之

巴豆霜一錢　朱砂飛五錢　煆殼炒五錢

當歸泔浸炒　代赭石煅醋淬七次各三錢

木香五錢　麝少許

右爲末麵糊爲丸如麻子大一歲兒一丸米飲下更量虛實加減食後服治食積發熱羸瘦壯大青筋疳積壯疼哺露

消積丸

治乳食傷積心腹脹滿氣粗壯熱或瀉或嘔

丁香二十粒　砂仁二十粒　史君子五箇

烏梅三箇

右爲末爛飯丸麻子大加巴豆三粒去盡油同丸每服三丸陳皮湯下

白餅子

治小兒夾食傷寒其證發熱嘔吐亦有壯疼者噯氣辨得分曉先用此藥一服推下食積却用平和藥發散調治如惺惺散加減參蘇飲皆可服却不可服冷藥

滑石　天南星　半夏各一錢　輕粉五分

巴豆二十四粒去皮膜用水一升煮乾研細如泥

右三味搗羅爲末入巴豆霜次入輕粉又研勻却入餘藥末令勻糯米飲丸如菉豆大量小兒壯瘦虛實用藥三歲已下每服三丸至五丸紫蘇湯空心下忌熱物若三五歲兒壯實者不以此拘加至二十丸汎利爲度

一方加白附子一錢

白术散

治瀉渴兼吐瀉

人參一錢半　白茯苓　白术　藿香葉各半兩

木香二錢　甘草一錢　乾葛半兩渴者加一兩

右剉散水煎

發熱甚渴者去木香

肚痛加白芍藥

小沉香丸

和中順氣嗜食消痰

砂仁煨　蓬术煨各四錢　香附米炒一兩

眞沉香六錢　甘松三兩六錢　益智仁炒

炙草各一兩半　舶上丁香皮二兩四錢

右爲細末湯浸蒸餅丸如梧桐子大每服三十丸或四十丸食後溫生薑湯下或嚼破更妙

芍藥甘草湯

治傷寒脈浮自汗出小便煩數微惡寒脚攣急拘疼及治肚腹臍旁大痛

白芍藥炒五兩　甘草一兩

右剉散每服三錢水二盞煎至八分不拘時服

觀音散

石蓮肉　人參　神麯炒各三錢　白茯苓二錢

甘草炙　木香　綿黃芪炙　白扁豆炒去皮

白术各一錢

右剉散每服二錢水一盞棗一枚藿香三葉煎空心溫服

銀白散

止吐瀉壯胃氣治糞青

糯米　扁豆各二兩　藿香　白术土炒各一兩

丁香二錢　甘草炙一錢

右爲末紫蘇米飲調下加天麻砂仁白茯苓

快脾正邑加炮白附全蠍木香石蓮薑煎服

木香檳榔丸

疏導三焦寬利胷膈破痰逐飲通潤大腸

郁李仁　皂角醋炙　半夏麴　枳殼麩炒

青皮　杏仁麵炒　木香不見火　檳榔各一錢

右爲細末別用皂角四兩用漿一碗搓揉熬膏更入熟蜜少許丸如梧桐子大每服十丸小兒服可丸如菉豆大食後生薑湯送下

神芎丸

治風熱壅滯頭目昏眩口舌生瘡牙齒疳蝕或遍身瘡疥咬牙驚惕怔忡煩躁多渴或大小便澀滯或積熱腹滿驚風潮搐並皆治之

生大黃　黃芩各二兩　生牽牛頭末三兩

滑石四兩　黃連　薄荷葉　川芎各半兩

右爲細末滴水丸桐子大每服四五十丸食後溫水下

一方加蒲黃止血證亦用

是齋推氣丸

治三焦痞塞氣不升降胷膈脹滿大便閉澀小便赤少

大黃　陳皮　檳榔　枳實小者去穰　黃芩
黑牽牛各等分
右爲細末煉蜜丸如菉豆大臨臥溫熟水下二三
十丸量虛實加減

檳榔丸
治小兒疳氣腹脹胷膈痞悶喘急不安
青皮去穰同巴豆十粒炒去巴豆　蘿蔔子
香附子炒　木香各一兩　黑牽牛半兩微炒
右爲末生薑自然汁煑麵糊丸黍米大每服十丸
米飲下

消食丸
常服寬中快氣消乳食正顏色
縮砂　陳皮　三稜　蓬朮　神麴炒　麥芽炒
香附泔浸一宿炒　枳殼　檳榔　烏梅各五錢
丁香二錢五分
右爲末麵糊丸如菉豆大食後紫蘇湯送下二三
十丸

快膈消食丸
治小兒宿食停滯腹脹疼痛
三稜煨　蓬莪朮煨　揀縮砂去殼　橘皮去白
神麴炒　麥芽炒各五錢　香附子炒一錢
右爲細末蒸餅丸如黍米大生薑煎湯或白湯或
將餅子磨食遠服
一方加製枳殼

香稜丸
治小兒積氣發熱肚腹膨脹肢體瘦弱飲食不滋
肌膚
木香　丁香　檳榔去臍　枳殼炒　甘松
史君子去殼　神麴炒　麥芽炒各二錢半
三稜煨　莪朮　青皮　陳皮　香附炒各五錢
胡黃連一錢
右爲細末蒸餅丸如黍米大用米飲食遠服

五珍丸
治酒食積通用
青皮　乾薑燒存性　蓬朮　五靈脂各一兩
巴豆去半油一錢
右爲末粳米飯丸麻子大每服三五丸米湯下

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百六十二卷目錄

醫部彙考四百四十二

小兒食癖門二

方二 理中清熱湯 人參安胃散 益黃散 錢氏用黃散 平胃散 調中丸 人參散 藿香散 四君子散 參苓白朮散 健脾飲 茅先生勻氣散 醒脾湯 健脾散 調中飲子 寶童散 神朮散 聖惠前胡散 張渙集香煎 調中散 益胃丹 丁香黃芪散 鱉甲湯 保和丸 木香大安丸 消食丸 七聖丸 三稜散 莪朮丸 丁香脾 楂丸 三黃枳朮丸 聖惠訶梨勒散 朱氏木香丸 朱氏洗心散 養脾丸 聖惠三稜散 張渙三稜散 聖惠化癖丸 茅先生千金丹 萬靈丸 紫霜丸 眞珠丸 消堅丸 張渙萬靈丹 五色丸子 六聖丸 烏犀丸 木晶丹 聚寶聖餅子 吉氏追魂散 沈香檳榔丸 集驗蓬朮丸 青礞石丸 玉訣銀白散 張氏方 董氏方 孔氏方 譚氏殊聖方 莊氏紫金丸 莊氏軟金丸 劉氏桃紅散 王先生靈砂丹 良方妙香丸 少飲子 茅先生蓬朮散 聖惠鱉甲散 曾氏化癖丸 外臺必效方 聖惠前胡丸 茯苓湯 朱氏知母丸 柴胡飲 枳朮丸 枳實理中丸 快膈湯 參朮陷胃湯 四季肥兒丸 猪肚補脾丸 七味保嬰湯 八反膏

單方

鍼灸

醫案

藝術典第四百六十二卷

醫部彙考四百四十二

小兒食癖門二

方二

理中清熱湯 明醫雜著

治小兒食積鬱熱發于肌表潮熱往來主理中清陽明之熱

白朮炒 山楂 白芍藥炒各一錢 黃連炒

枳實麩炒 川芎 香附米炒 升麻各七分

葛根一錢二分 甘草 炙草各三分

右用薑水煎服

若食積去後潮熱未除減山楂枳實香附川芎加人參黃芪陳皮各五分再加白朮二三分

有痰加半夏六分

薛己曰按前證若食積去而熱不退用五味異功散以補胃氣若作嘔少食用四君子加藿香半夏以安中氣若泄瀉不食宜用六君子湯加升麻柴胡以升補脾氣若久瀉不已宜用補中益氣湯以升補陽氣若虛寒加炮薑木香如不應佐以四神丸以補脾腎若體瘦潮熱口渴大便不調宜用肥兒丸以消疳積若不分脾氣虛實有無食積槩用尅伐消導寒涼清熱之劑復傷脾胃生氣反爲難治之證

人參安胃散 保嬰撮要下同

治脾胃虛弱傷熱乳食嘔吐瀉痢

人參一錢 黃芪二錢 生甘草 炙草各五分

白芍藥酒炒七分 白茯苓四分 陳皮三分

黃連炒二分

右爲末每服二錢水煎

薛己曰愚按東垣云益黃散內有丁香青皮之辛熱蓋爲寒水侮土而設也若因熱藥巴豆之類損其脾胃或因暑熱傷乳食而成吐瀉口鼻氣熱而致慢驚者宜用前方

益黃散

治脾虛吐瀉不食米穀不化困倦力少滑腸夜起併疳虛盜汗涎流口角

陳皮一兩 丁香二錢 訶子炮去皮 青皮

甘草炙各半兩

右爲末每服一錢水煎服

薛己曰愚按前證若脾土虛寒或寒水侮土而嘔吐泄瀉手足並冷或痰涎上湧睡而露睛不思乳食宜用此方若因脾土虛弱吐瀉者用六君子湯加柴胡如不應或手足俱冷屬虛寒也更加木香炮薑若因乳母脾虛肝侮必治以前藥若乳母鬱怒致兒患前證母服加味歸脾湯

王肯堂曰東垣云閻孝忠編集錢氏方以益黃散補土又言風旺必克脾土當先寔其脾昧者不審脾中寒熱一例用補脾藥又不審藥中有丁香青皮辛熱大瀉肺金脾虛之證豈可反瀉其子爲寒水反來侮土中寒嘔吐腹痛瀉痢青白口鼻中氣冷益黃散神治之藥也如因服熱藥巴豆之類過劑損其脾胃或因暑天傷熱積熱損其脾胃而成吐瀉口鼻中氣熱而成慢驚者不可服之故立人參安胃散

錢氏瀉黃散

一名瀉脾散治脾熱吐舌

藿香葉　甘草各七錢五分　山梔仁一兩

石膏五錢　防風二兩

右用蜜酒微炒爲末每服一二錢水煎

薛己曰愚按前證若作渴飲冷臥不露睛手足熱甚或遍身發黃屬胃經實熱宜用瀉黃散若作渴飲湯臥而露睛手足並冷屬胃經虛熱宜用異功散若面青搐搦乳食少思肝乘脾也用祕旨補脾湯若面赤驚悸身熱昏睡心乘脾也用祕旨安神丸若面白喘嗽肢體倦怠肺乘脾也用補中益氣湯若脣黑泄瀉手足指冷腎乘脾也用益黃散病後津液不足口乾作渴宜用七味白朮散若乳母膏粱厚味七情鬱火所致當審其因而治其母

平胃散（證治準繩下同）

治脾胃不和不思飲食心腹脅肋脹滿刺痛口苦無味胷滿短氣嘔噦惡心噯氣吞酸面黃肌瘦嗜臥體痛霍亂吐瀉等證

厚朴薑汁製五兩　陳皮　甘草炙各一兩

蒼朮米泔浸焙八兩

右爲末每服二錢薑棗水煎沸湯點服亦可常服調氣煖胃化宿食消痰飲辟四時不正之氣

愚按前證若乳食停滯噯腐吞酸嘔吐惡心者宜服是方若飲食既消脾胃虛弱嘔吐惡心者則宜四君子湯

調中丸

治脾胃虛寒

白朮　人參　甘草炒各五分

右加八味地黃丸即六味地黃丸加肉桂附子各一兩治稟賦命門火衰不能生土以致脾土虛寒或飲食少思及食而不化腹臍疼痛多漩溺等證內經謂益火之源以消陰翳正此藥也

人參散

治脾風多困

南星切片用漿水薑汁煑存性一兩　人參

冬瓜仁各半兩

右爲細末每服一錢水半盞煎二三分溫服

藿香散

理虛化痰及治脾胃不和飲食少進正氣除邪

人參　半夏湯煑透濾剉片焙乾　赤茯苓

炙草各一兩　蒼朮米泔浸一宿濾剉炒黃二兩

陳皮　藿香各七錢五分　厚朴製一兩半

右件㕮咀每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分空心溫服或入燒鹽同煎

四君子散

治小兒脾胃虛弱飲食少進

人參　白朮　茯苓　甘草各等分

右爲末每服一錢鹽湯點服

一方加陳皮縮砂

參苓白朮散

主脾胃虛弱飲食不進多困少氣中滿痞結噫嘔吐逆此藥不寒不熱性味和平常服調脾悅色順正去邪

人參　白茯苓　粉草　白朮　白扁豆炒去殼

乾山藥　縮砂仁　薏苡仁　桔梗剉炒各一兩

蓮子肉

右剉焙爲末每服半錢至一錢用棗湯空心調服或溫米湯亦可

健脾飲

健脾養胃理嘔吐治瀉利及諸病後氣色虛弱有痰惡心腹中微痛飲食減精神慢宜服之

厚朴剉薑汁浸一宿炒乾入醇酢焠透仍炒之

人參各一兩　白茯　肉蔻　半夏湯煑透剉焙

益智　香附　良薑壁土炒　訶子肉各二錢

炙草五錢

右剉每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分無時服

茅先生勻氣散

桔梗五兩　炙草二兩　白薑一分　砂仁

陳橘皮　茴香洗各一兩

右爲末半錢或一錢霜木瓜煎湯調服紫蘇鹽湯亦得

寶童多厚朴蒼朮良薑肉桂烏梅名養脾湯

醒脾湯

調理諸病

木香　白朮並濕紙裹煨　人參　白茯苓

草蔻仁　炙草　陳橘皮　厚朴硇砂水煑

紫蘇子

右等分爲末一錢水六分薑一片棗半箇煎四分通口服

健脾散

治小兒胃氣
白茯苓　人參各一兩　厚朴二兩薑汁炙　蒼术泔浸一宿四兩　橘皮五兩　草菓子　甘草各二兩
右件爲末每服一錢薑棗同煎隨大小分減服　調中飲子
治小兒諸病
肉豆蔻　白术炮　人參　陳橘皮　茴香　訶子炮去核　炙草　砂仁各半兩　藿香　桂心　檳榔各三錢
右爲末每服半錢或一錢用薑棗煎水隨兒大小五分四分煎通口服　寶童散
壯脾去積進食
京三稜　蓬莪朮醋紙裹煨　益智仁各四兩　甘草炙四兩半　陳皮　青皮各二兩
右爲末湯點一錢不時服薑棗煎亦得　神朮散
治患後脾胃虛弱煩熱恍惚睡中多驚氣急煩亂溫養脾胃消進奶食勻氣清神調和臟腑
白朮　人參　白茯苓　石蓮肉　鷰粟米　白扁豆　藿香　甘草炙
右等分細末小半盞棗湯調空心日午服
漢東觀音散少白朮粟米炙神麴白芷木香黃芪　聖惠前胡散
治脾胃不和見食欲嘔心胷壅悶
前胡　蘆根各三分　桂心一分　人參　白朮　赤茯　枇杷葉去毛炙　炙草　厚朴各半兩
粗羅一錢水一盞薑少許煎五分不時量溫服　張渙集香煎
治脾胃虛不欲食羸瘦
藿香葉　厚朴薑製　丁香　沉香　木香各一兩　白茯苓　白豆蔻　白朮炮各半兩
右爲細末入麝香一錢水一升棗半斤大棗三十枚薑二十片銀石器中慢火煎成膏去諸棗通風處陰乾每皂子大乳前米飲下　調中散
治小兒冷熱不調致脾胃不和
木香　人參　白朮　白茯苓　丁香　大腹皮　甘草　青橘皮湯浸去白焙乾各一兩
右件揭羅爲細末每服一錢水一小盞入生薑三片煎五分去滓溫服　益胃丹
調冷熱和脾胃
當歸洗焙乾　木香　白朮　沉香各一兩　白芍藥　人參　蓬莪朮　縮砂仁各半兩
右件揭羅爲細末納糊丸如黍米大每服十粒至十五粒點麝香湯下量兒大小加減　丁香黃芪散
治小兒脾胃虛弱不能飲食已漸傷損榮衛致令肌體羸瘦時時下痢面色青白
丁香　綿黃芪　人參　白朮　當歸洗焙乾　龜甲酥炙黃去裙各一兩　胡連　炙草各半兩
右揭羅爲細末每服一錢水一盞入生薑二片棗二枚同煎至五分去滓溫服食前　龜甲湯
治三七歲兒不食或嘔或頭熱或下痢或渴或手脚熱有時冷每日一劑便能食
龜甲一兩　當歸　炙草　升麻各二錢五分　椒五十粒出汗
右切水一升煮八合爲三服相去八行六七里再服覺身上潤衣蓋取汗微汗勿深　保和丸
治飲食停滯胃脘痞滿噯氣吞酸或吐瀉腹痛加
白朮　兩即大安丸
神麴炒　山楂　半夏　茯苓各一兩　陳皮　連翹　蘿蔔子炒各五錢
右爲末粥丸桐子大每服三十丸白湯送下
愚按前方行氣尅滯之劑若元氣無虧暴停乳食而致斯證者宜用此消導之若元氣虛弱而乳食所傷者必調補胃氣爲主而佐以消導若乳食已消而作嘔者乃胃氣被傷當用異功散補之不宜仍用前藥重損胃氣用者審之　木香大安丸
木香二錢　黃連　陳皮　白朮各三錢　枳實　山楂肉　萊菔子炒　連翹　神麴炒　麥芽炒　砂仁各一錢半
右爲末神麴糊爲丸陳廩米湯下　消食丸
又名消乳丸治宿食不消
砂仁　陳皮　三稜　神麴　麥芽各半兩

香附一兩
右末麪糊丸如麻子大食後白湯送下量兒大小加減

七聖丸

三稜　蓬朮　川楝　青皮　陳皮　芫花　杏仁
右件等分先用醋浸芫花一宿炒漸乾次入蓬稜同炒赤色又入陳楝等再同炒一處令微焦取出爲末前藥如各半兩杏仁亦用半兩湯浸去皮尖雙仁不用研細入巴豆二十粒去油和勻醋糊丸如黍米大一歲兒常服二九臨臥溫熱湯送下使日間所飡之物一夜而化永無痞疾能使黃瘦子頓作化生兒今之小兒可去巴豆只入杏仁名七聖丸是也

三稜散

主諸般停滯痞積發熱瀉痢酸餿水穀不化常服和脾胃進飲食長肌肉益神氣

人參七錢半　三稜炮製　淨香附各一兩半　青皮　益智仁　陳皮　穀芽　枳殼麩炒　神麴炒　半夏製　莪朮醋煮透濾乾製焙
大黃半生半炮　紫蘇各半兩　甘草一兩二錢
右碎每服二錢水一盞薑三片倉米百粒煎七分無時溫服
氣虛者加白茯苓一兩

莪朮丸

和脾益胃進飲消食寬腸快氣悅色滴神
莪朮　三稜　香附各四兩醋浸七日焙焙
檳榔薄劑　生牽牛末各一兩另研　清木香　穀芽洗淨焙乾　青皮各半兩　蓽澄茄　丁香　南木香各四錢
右除檳榔丁香木香不過火及牽牛末餘七味製焙仍同檳榔丁香木香爲末臨入牽牛末和勻水煮麪糊丸菜豆大每服三十九至五十九無時用淡薑湯下溫茶溫酒皆好兒小者九粟米大數粒下法如前

丁香脾積丸

三稜煨去皮毛　莪朮炒　神麴炒各七錢
青皮　巴豆霜　小茴香炒　陳皮各五錢
丁香　木香各三錢
右爲細末醋調神麴糊爲丸如菜豆大每服五七丸生薑湯下

三黃枳朮丸

治傷肉濕麵辛辣味厚之物致塡塞悶亂不快
枳實麩炒　黃芩各五錢　川黃連酒浸炒
大黃濕紙裹煨　白朮各一兩
右爲末湯浸蒸餅爲丸如菜豆大每服五十九白湯下臨時量所傷多少加減服之

聖惠訶梨勒散

治小兒宿食不化少欲飲食四肢消瘦腹脅多脹
訶梨勒皮三分　人參　白朮　麥芽炒令微黃
陳橘皮　檳榔各半錢　炙草一分
右件藥搗粗羅爲散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓量兒大小分減溫服日四五服

朱氏木香丸

治小兒氣開胃進食　三稜一兩炮　木香　人參　白茯苓　青皮　陳皮　肉豆蔻各一分
右爲末麵糊丸麻子大每服十九薑湯下

朱氏洗心散

治小兒乳食傷心作壯熱喘息不調咳嗽多睡
皂角半兩入沙糖酥炙于盆下蓋良久出火毒
生甘草一錢　麥門冬一分半
右爛杵不羅每服二錢水一盞煎至八分作五服時時喫

養脾丸

人參　白朮　當歸　川芎各一錢　木香
青皮　黃連　陳皮各一錢　砂仁　山楂肉
神麴炒　麥芽炒各五分
右爲細末水調神麴糊丸如麻子大每服三五十丸陳倉米飲下

聖惠三稜散

治乳癖結實或有滯惡停積不化令兒日漸羸瘦面色痿黃春夏多發不欲乳食
三稜　大黃微炒　檳榔　鼈甲　赤茯苓各半兩
枳殼麩炒微黃各二錢半
右搗羅爲散每服一錢水一小盞煎至五分去滓分爲二服日三四服逐下惡物爲度

張澳三稜散

治小兒乳癖結實不痊
三稜　赤茯　當歸　鼈甲醋炙黃去裙各一兩
枳殼麩炒　木香　白朮各半兩
右搗羅細末每服一錢水一盞入生薑七片煎至

五分去滓放溫時時與服

聖惠化癖丸

治乳癖結磈久不消化諸藥無效

巴豆霜半兩　臙粉　硃砂各一錢研　硇砂

雄雀糞各一字　黃鷹糞二錢半

右件都研如粉用糯米飯和丸如黍米大一歲兒每服空心煎皂莢仁湯下二丸取下惡物爲度

茅先生千金丹

小兒諸積病悉主之

滑石末　白丁香羅過　天南星　輕粉各二錢

水銀秤二錢先以錫二錢于銅銚內鎔化更下水銀拌和勻傾在于地冷用　青黛飛羅過半錢

巴豆去皮心膜七十二箇無缺損者井華水浸一宿

懸當風處吹乾爛研

右前件藥同拌合用輭飯爲丸如小菉豆大巴豆不出油依形證用湯使下

傷寒後取積痰煎葱湯吞下

取疳蟲用牛肉炙汁下

驚風肚中緊硬面青黑金銀箔薄荷葱湯吞下

因傷看肚中及腹皮上微熱肚脹夜間作熱似疳又不是疳面青黃色眼微黃此腹中有積用皂角子二七粒灰火煨過用水一盞煎至半盞下

有積作瀉魚鮮湯下

氣積炒茴香湯下

凡下此藥周歲十四丸三歲十八丸七歲二十四丸量兒大小加減下須是四更初下至天明通下積來盡時依形證候下藥稍之臨嚥此藥恐先吐下些小涎來亦不妨

萬靈丸

治小兒諸積依形證用之

木香　川黃連　蓬莪朮各半分　陳橘皮

青橘皮各去瓤一分　檳榔一錢半重者一枚

右爲末每七藥一錢巴豆一粒去心膜用酥炙巴豆一枚煮藥令巴豆紫色用杏仁一枚去皮尖用燈火煅留性二味都研用酢糊糊爲丸如小菉豆大每服五丸七丸十丸薄荷薑湯吞下

紫霜丸

消積聚

巴豆去油心膜　杏仁去皮尖各二十一箇

代赭石一錢另研水飛

右爲細末飯丸如粟米大每服三五丸至十丸煎皂角仁湯下無時兒小者減之

眞珠丸

取小兒虛中一切積聚驚涎宿食乳癖治大小便澀滯療腹脹行滯氣

木香　眞白丁香　輕粉各半錢留少許爲衣

巴豆十四粒水浸一宿研極細　丁香末

滑石末二錢

右爲末研勻濕紙裹燒熟米飯丸麻子大一歲一丸八九歲以上至十五歲服八丸炮皂子煎湯放冷下

挾風熱難動者先服涼藥一服

乳癖者減丸數隔日臨臥一服

消暈丸

消乳癖及下交妳又治痰熱腦實取積

硇砂　巴霜　輕粉各一錢　黃明膠五錢

細嚼少許　水銀沙子兩皂子大

右同研細末少入麵糊爲丸如麻子大倒流水下一歲兒服一丸食後

張澳萬靈丹

治小兒脾胃久不和挾積服溫熱藥皆不效此藥神妙

肉桂　川黃連　莪朮各一兩　肉豆蔻仁

檳榔　陳橘皮去白焙乾　廣木香不犯見火

丁香各半兩已上爲細末次用　巴豆去皮心膜杏仁麩炒去皮尖二件並燈上燒灰存性各二七箇

右件同再搗拌勻滴水丸黍米大每服未周晬者一粒量兒大小加添粒數用生薑湯放冷下食後服久積或乳癖並當常服

五色丸子

治小兒一切所傷痰涎壅塞胃腦不利乳食不消變生癖積當助魂梗按之疼痛及治一切急慢驚風發搐痰涎壅塞

青黛別研　南星薑汁製各半兩　巴霜半錢

以上青丸子

硃砂水飛　半夏薑製各半兩　巴霜半錢

以上紅丸子

煨大黃　川鬱金各半兩　巴霜半錢

以上黃丸子

生白附子　寒水石煅各半兩　巴霜半錢

以上白丸子

五靈脂炒　全蠍炒各半兩　巴霜半錢
以上黑丸子
右前五色藥各另研爲細末入巴霜半錢研勻麪糊丸粟米大一歲服五丸乳汁送下量大小加減或薑湯下
急驚金銀薄荷湯
慢驚生薑全蠍湯
六聖丸 曾氏方下同
治諸積和胃大能主氣厚腸消疳快膈
莪朮炮　淨黃連　陳皮　白薑炮各五錢
南木香二錢半
右除木香不見火餘四味剉焙同木香爲末每一錢巴豆三粒去殼膜心存油碎切入乳鉢內細研同前藥再研勻酢煮麪糊丸麻仁大每服十五粒至二十五粒或三十五粒五更空心淡薑湯下利三五行勻氣散止補此藥常服助脾化積進食消疳臨睡以淨湯或湯酒下三粒及五粒每次止丸藥末三錢淨巴豆九粒爲則不可多合久則味散
烏犀丸
主諸積滯夾驚夾風溫胃調脾消進飲食吐逆酢餿氣面黃肌瘦不拘孩兒生後歲月遠近並宜可投
烏犀卽皂角剉三寸長煨灰火中見青煙起爲度取出地上瓦盌蓋定存性冷用七錢　舶硫黃
白薑各三錢半　陳皮　川烏炮去皮臍各五錢
巴豆去殼膜心存油七十七粒
右先研硫黃細除巴豆外餘四味同焙爲末却薄切巴豆細研同前五味藥末搗勻用粳米飯包作一大粽子小瓦瓶盛水熟煮候冷取出沙鉢內爛杵細布兜緊絞出如稠糊安在別器內以藥末停分同杵細軟丸粟米大取諸積每服十五丸或五丸或二十一丸至三十三丸並用淡薑湯泡冷飯取汁小盞五更初空心送下通利三五行以勻氣散止補治積滯有酢餿氣每服三丸至五丸用淡薑湯入米酢少許候溫空心下
水晶丹
治驚積食積蟲積腹脹煩啼惡心食減面黃並宜通利此藥有頑積驚重風緊涎多熱極乃可服非常用之劑及急驚後風痰未盡免生癡疾宜再投
南星剉小塊湯煑片時　半夏湯泡去滑各三錢
滑石四錢　輕粉五十貼　淨蕪荑二百片
巴豆五十粒去殼湯泡七次又去心膜作兩半水煑少時曬乾碎切
右前三味焙爲末拌和輕粉外蕪荑巴豆同碎切在乳鉢內細杵入前藥末再拌勻如烏犀丸內製糊丸麻仁大每服十五丸至二十五丸或三十五丸糯米湯泡葱白取汁小盞五更初空心下過三五行進勻氣散調補下風痰淡薑湯空心服
聚寶聖餅子
取一切積及虛中積下風涎藥取病甚穩全不搜攪
輕粉　粉霜各四錢　石燕子大者二枚爲細末
延胡索大者二十八箇爲末
右四味同研勻滴水和丸如大碁子大仍放候陰乾每服一餅先用熱水浸軟冷漿水調下臨臥更深服後急漱口此藥只取積滯並不損氣更臨時加減
若下驚積則每料更入硃砂生龍腦各一錢小兒一餅作四服或便捏成小餅子
吉氏追魂散
治菓子傷積
白丁香　輕粉　官桂去粗皮各三錢
右爲末冷水調下半錢睡時服來日取下所傷物用異功散煎紫蘇木瓜湯調三服和氣
沉香檳榔丸
和脾助胃進食清神寬胷快膈順氣調中悅顏色壯筋骨理面帶痿黃肌膚瘦弱過食生果停寒在裏乳癖腹脹作疼及吐利瘧腫瘥後諸疳蟲積
眞沉香　檳榔　白檀香　南木香　丁皮
京三稜炮剉　神麴　莪朮炮　麥芽洗炒
厚朴刮去粗皮薑汁炙　蒼朮泔浸剉炒黃
史君肉剉瓦上焙乾　青皮　陳皮各去白
縮砂仁　益智仁　淨香附　枳殼麩炒燥
良薑製各半兩　甘草炙一兩半
右除前五味不見火餘十五味剉焙仍同沉香等爲末水煑麪糊丸麻仁大每服三十丸至五十丸溫米湯無時送下小兒不能吞嚥煉蜜丸如芡實大每以一丸至二丸溫湯化下
集驗蓬朮丸
治乳食不化心腹脹滿一切所傷
三稜　莪朮並煨　陳皮　香附　蘿蔔子各半兩

砂仁　青皮　枳殼　胡黃連　蘆薈各三錢

胡椒二錢半

右爲細末糊丸黃米大每服三十丸加至五十丸溫米飲下日二三服忌生冷硬物

青礞石丸

治證同前

硫黃三錢　礞石　五靈脂　鍋底墨各一錢半

白丁香一錢去土

爲末米飯丸菜豆大捻餅子每服二十餅溫水下

玉訣銀白散

生胃氣取下後宜服此方

人參　茯苓　甘草炙　白朮麥麵炒　藿香葉

白扁豆去皮

右各等分末一錢紫蘇湯調下

張氏方

治小兒妳癖

芫花一兩醋浸三日淨洗　大黃半兩

右爲末入蒜一斤同藥末研爛勻男左女右用藥塗在乳母手心熨擦癖上如聞得患人口中出藥氣即時取了立效

董氏方

治小兒妳癖極效

紫河車二兩　寒食麵三兩

右同爲細末每用一匙許水調塗足心病在左塗左病在右塗右塗于紅帛上縛之良久其病大便中下去救人多矣大便盡洗去

孔氏方

治小兒妳癖

蜜陀僧不拘多少研極細

右以大蒜自然汁調稀稠得所塗于有妳癖處據其大小周遍又不可塗之太過須臾候兒口中有蒜氣息即是藥透仔細以手摩之覺妳癖似消及五六分即用溫漿水洗去切須量度不可令消盡恐藥毒損氣也如未消藥先乾即以溫水潤之

譚氏殊聖方

治月裏孩兒乳癖

紫河車草　人參各等分

右爲末用好苗調拍成餅子如大錢大如左畔有癖者藥貼左畔脚心用綿帛紮乾後見效左右一般使藥

莊氏紫金丸

治小兒因驚積聚黏滯毒物在脾胃累曾用藥取不下變成虛中積體熱閉重目閉不開用黃連甘草桃仁薄荷湯化下賦粉一字許下一歲上三歲下三丸小兒只可一丸二丸

蝎梢三七箇　犀角末　銀末　硃砂各一錢

右研極細末用水麵糊爲丸菜豆大依前湯使

莊氏軟金丸

治驚痃下積聚

青黛飛　臘粉研　胡黃連　麝香各二錢半

寒食麵三錢　史君子三箇　天漿子三七箇

右七味研勻滴水丸梧桐子大每服一丸用金銀薄荷湯化下

劉氏桃紅散

治小兒驚積痃積常服進食面如桃花

馬牙硝　硃砂　茯苓　人參各等分

右末之二歲服一字一歲一字三歲亦二字四五歲三字新汲水入少蜜調下蜜水約盡內三分許

王先生靈砂丹

下虛中積臟腑虛滑泄瀉久經取轉裏急後重久積惡痢暴瀉久不止神效

通明硇砂一錢　辰砂通明有將望者二錢半

右二味聚研極細用黃蠟半兩先於盞內鎔化入去皮尖巴豆三七粒煎候巴豆紫色爲度漉豆出細研入前二味再研勻于黃蠟內三分取一二鎔成汁傾藥入內急攪令勻刮入磁合收之每服暴瀉惡痢麻勢三丸如菜豆大濃煎艾湯先呷二五口然後吞下水瀉令水吞下如取積每服三丸如梧桐子大濃煎甘草湯放冷吞下臨臥服其久積藥隨積下其小可不動便安

按既是虛卽不宜用峻劑取積仍須用四君子益黃散之類相兼服之

良方妙香丸

治小兒虛中積潮發寒熱心腹脹滿疼痛

辰砂一兩　牛黃　生龍腦　麝香各二錢半

金箔十四片　粉霜　臘粉各一錢　黃蠟二兩

巴豆肥者一百二十粒

右九如彈子大量虛實加減龍腦漿水下夜半後服臟虛卽以龍腦米飲下每服三丸如小豆欲藥勢緩卽按令扁疾堅者加至十九皆以針刺作數孔以行藥力小兒取積丸如菜豆治小兒吐逆尤

效此藥最下胷中煩及虛積

少飲子

小兒自下後得寒熱血結成癖氣在左脅下或寒飲或冷食積聚氣動胷心留熱不下食飲闇瘦宜先服少飲子散氣下食後服紫霜丸去宿食自充溢也

柴胡　白茯苓　人參　鼈甲酢塗炙令香熟

白朮各半兩

右切如豆大水二升煑五合空心分溫三四服相去如人行一二里久再服食粥將息

茅先生蓬朮散

主小兒痃氣一切氣疾

蓬莪朮　青橘皮　益智各半兩　木香二錢半

糯米一兩

右爲末每服一大錢用陳米飲調下日進四服

聖惠鼈甲散

鼈甲一枚塗酢炙令黃去裙襴

右搗羅爲末每服一錢以童子小便一小盞煎至五分量兒大小分加減服之日三服神效

曾氏化癖丸

主癖結氣塊在脅之間日久不化乍寒乍熱腑臟不調米穀不消哽氣喘促胷腹滿悶及理丁奚哺露

南木香　陳皮去白　莪朮炮剉　三稜炮剉

青皮用巴豆九粒去皮膜心微炒熟去巴豆

枳殼去瓤麩炒　檳榔七味各半兩　白朮

丁香二味各二錢　細辛燒存性四錢

右除木香檳榔丁香不過火餘七味焙同前三味爲末麵糊丸作麻仁大每服十五丸至二十一丸清水湯空心下

有寒熱往來以柴胡飲間服忌油膩生冷

外臺必效方

療小兒癖

車下李仁微湯退去皮及雙仁與乾麵相半搗之

右爲餅如猶乾和淡水如常搜麵大小一如病人手掌爲兩餅微炙使黃勿令至熟空肚食一枚當快利如不利更食一枚或飲熱粥汁即利以快利爲度至午後利不止即以酢飯止之利後當虛病未盡者量力一二日更盡一服以病盡爲限小兒亦以意量之不得食酪及牛馬肉無不效但病重者李仁與麪相半輕者以意減之亦須量力頻試無不差神效

聖惠前胡丸

治小兒癖氣腹痛

前胡　桔梗各去蘆　赤芍　赤茯　枳殼

川大黃　當歸　郁李仁去皮微炒各半兩

鼈甲一兩炙令黃

右件搗羅爲末煉蜜爲丸如菉豆大三歲兒每服空心以粥飲化破五丸服量兒大小加減

一方無桔梗亦作散服

茯苓湯

治小兒閃癖身體壯熱頻服冷藥冷氣漫心成癖下焦又冷腸結大便難

茯苓　川芎　鼈甲炙　枳殼炙　芍藥各二分

柴胡四分

右剉以水一大升三合煎至三合空心爲二服去如人行五六里再服忌莧子

朱氏知母丸

治小兒腹痛不調兼癖氣

知母六分　鼈甲炙四分　牡蠣　枳殼各三分

大黃一錢二分紙裹煨熟

右件爲末蜜丸如菉豆大米飲下五丸大小量兒分減服

柴胡飲

治小兒七八歲多睡或時壯熱日加羸瘦身雖不痛有時痢膿嘔逆不食是癖氣之候其疾似瘧疾人多不識此患

柴胡　黃芩各一分　枳殼炒兩片　甘草

知母　芍藥各二分　大訶梨勒煨取皮一箇

右件爲末水一盞煎服

枳朮丸

白朮四兩　枳實二兩

右爲末荷葉包煨爛飯爲丸桐子大每服四五十丸空心白滾湯下

枳實理中丸

枳實十六片麩炒　白茯苓　人參　白朮

乾薑炮　甘草炙各二兩

右末煉蜜和丸如龍眼大每服一丸熱湯化下連進二三服胷中豁然

渴者加瓜蔞根一兩

自汗者加牡蠣二兩煅過下利亦加

快膈湯

理胷膈不快飲食少進亦能順氣和中消導宿滯

人參　青皮　砂仁　烏藥　良薑製　香附

炙草各一兩

右細末每一錢溫鹽湯空心調服

參朮陷胷湯

人參　白朮　茯苓　橘紅　半夏各一錢

瓜蔞全用細切帶濕三錢　黃連　甘草各五分

右用水一鍾半生薑三片棗一箇煎七分溫服

潔古云飲食不進四君子加薑棗煎

四季肥兒丸 第一卷便方下同

治小兒脾弱不拘四時服之妙

山藥　山楂　史君子　神麴　白茯各三錢

苡仁米四錢　白朮土炒一錢　白蓮肉五錢

粉草二錢　訶皮末一兩

右爲末早糯米糊爲丸量兒大小加減米湯吞下

猪肚補脾丸

豶猪肚一箇洗淨去油膜用蓮肉四兩去皮心入肚內縫之用水煑令極熟　黃連四兩薑汁炒爲末

右前物共搗爛爲丸如蘿蔔子大每服五分米湯吞下

七味保嬰湯

治小兒脾胃虛弱此方妙甚無忽

老倉米主清胃　炒黃土養脾　苦竹葉去熱

蘿蔔子去食積　燈草去夜啼　麥芽和脾胃

薄荷葉去驚熱

右隨證所主者多用餘次之每服不過三錢袋盛煑湯任意渴飲或加蜜少許

八反膏 身經通考方

治小兒積塊發熱

硼砂五錢　山梔子　皮硝　胠油各二兩

鷄子一箇　白蘿蔔皮一兩　葱白五枝連鬚用

蜂蜜一酒鍾紙攤貼布絹纏定

單方

小兒乳癖胷腹高喘急吐乳以不入倉黑豆七粒去皮研極細滴水七徧和成作七丸以青黛末袞之令徧用白麵和作皮裹藥慢火煨熟去麵再研細別入膩粉生腦子麝香各少許再滴水丸作七丸每服一丸臨臥溫水送下兒子小嚼破無妨極效 中藏經下同

小兒妳癖以白芥子不拘多少研成膏攤紙花子上貼痛硬處坐中效

小兒癥病用麝肉二兩切焙蜀椒三百枚炒搗末鷄子白和丸小豆大每服二三丸湯下以知爲度 范汪方

治小兒食不知饑飽用鼠屎二七枚燒爲末服之 千金方下同

治小兒食土取肉一斤繩繫曳地行數里勿洗火炙與食

小兒閃癖取苦瓠未破者煑令熟解開熨之 陳藏器本草

又以巴豆一粒同枳殼一枚切作二片去穰內巴豆以麻繫合不拘多少水煑令枳殼軟爛即去巴豆焙乾枳殼爲末麪糊丸如桐子大食後熟水下十五丸老人小兒皆可服之 退齋雅聞錄

小兒喫土用乾黃土一塊研末濃煎黃連湯調下 救急方

小兒痞積急性子水紅花大黃各一兩俱生研末每味取五錢外用皮硝一兩拌勻將白鵓鴿一箇或白鴨亦可去毛屎剖腹勿犯水以布拭淨將末裝入內用綿紮定沙鍋內用水三碗重重紙封以小火煑乾將鴿鴨翻調焙黃色冷定早晨食之日西時疾軟三日大便下血病去矣忌冷物百日 孫天仁集效方

小兒痞塊腹大肌瘦面黃漸成疳疾史君子仁三錢木鼈子仁五錢爲末水丸龍眼大每以一丸用鷄子一箇破頂入藥在內飯上蒸熟空心食之 楊氏簡便方

小兒脾癖疳積錦紋大黃三兩爲末酢一盞沙鍋內文武火熬成膏傾瓦上日曬夜露三日再研用舶上硫黃一兩形如琥珀者官粉一兩同研勻十歲以下小兒半錢米飲下忌一切生冷魚肉只食白粥半月前一服不愈半月之後再服若不忌口不如勿服 聖濟總錄

小兒癖疾蒼朮四兩爲末羊肝一具竹刀批開撒朮末線縛入沙鍋內煑熟搗作丸服 生生編

小兒諸果成積傷脾作脹氣急用麝香一錢生桂末一兩飯和丸菉豆大大人十五丸小兒七丸白湯下蓋果得麝則落木得桂則枯故也 濟生方

小兒癥瘕用老鼠肉煑汁作粥食之 旋和衆方

小兒閃癖頭髮稀黃瘰癧瘦弱者乾林檎脯研末和酢傅之 子母秘錄下同

小兒氣癖三稜煑汁作羹粥與奶母食日亦以棗許

與兒食小兒新生百日及十歲以下無問癇熱痃癖等皆理之祕妙不可具言大效

治小兒喫泥土及臟肚用膩粉一分沙糖和丸麻子大空心米飲下一丸瀉出土卽瘥 綱目方

小兒食土取好土濃煎黃連取清汁和日乾與服卽止 同春方

治胃虛氣逆吮乳不食人參一錢丁香藿香葉各半錢水半盞煎熟入乳汁少許煎服

治胃弱吐逆手足心熱不進乳食陳紅麴三錢半白朮一錢半麩炒甘草炙一錢爲末每服半錢薑棗米飲下 準繩方下同

治脾胃不和嘔逆惡心乳食不進厚朴薑製一錢白朮半錢乾薑炮甘草炙各三分水一盞薑二片煎空心熱服

治宿食傷脾消食快膈縮砂仁三稜莪朮神麴麥芽各半兩香附子一兩各炒爲末麪和丸如麻子大食後白湯下隨大小加減丸數

小兒癖積用糞中蛆洗淨曬乾爲末入甘草末少許米糊丸梧子大每服五七丸米飲下甚妙 總微方

小兒疳積有痰用南星一兩半夏五錢水泡七次切片用薑一兩搗汁浸以不麻爲度甘草白附子各五錢水滴爲丸紫蘇湯下五分 幼幼近編下同

一小兒喫粽成腹痛用黃連白酒藥爲末服之愈

鍼灸

晉皇甫謐甲乙經曰小兒食晦頭痛譫語主之

小兒口中腥臭胷脅搘滿勞宮主之

小兒嗽而泄不欲食者商丘主之

小兒腹滿不能食飲懸鐘主之

千金方曰治小兒癖灸兩乳下一寸各三壯

古今醫統曰小兒癖氣灸章門脊中積聚瀉泄痃癖於十一椎下兩旁相去各一寸五分灸七壯

王肯堂證治準繩曰小兒癖氣久不瘥者灸中脘一穴章門二穴各七壯章門在大橫外直臍季脅肋端側臥曲上足伸下足舉臂取之中脘在上脘下一寸臍上四寸居心蔽骨與臍之中從髑骬下取病人四指定穴併灸臍後脊骨中二七壯無不驗

古今醫鑑曰灸癖法穴在小兒背脊中自尾骶骨將手揣摸脊骨兩傍有血筋發動處兩穴每一穴用銅錢三文壓在穴上用艾烟安錢孔中各灸七壯此是癖之根貫血之所灸之瘡卽發卽可見效灸不著血筋則瘡不發而不效矣

醫案

錢乙小兒直訣曰曹宣德子三歲面黃時發寒熱不欲食而飲水及乳不止衆醫以爲潮熱用牛黃丸麝香丸不愈及以止渴乾葛散服之反吐錢曰當下白餅子後補脾乃以消積丸磨之此乃癖也後果愈何以故不食但飲水者食伏于管內不能消致令發寒熱服止渴藥吐者以藥衝脾故也下之卽愈

羅天益衛生寶鑑曰眞定總管董公長孫年十一歲病癖積左脅下硬如覆手肚大青筋發熱肌熱咳嗽自汗日晡尤甚牙疳臭惡宣露出血四肢困倦飲食減少病甚危篤名太醫劉仲安先生治之約百日可愈先與沉香海金沙丸一服下穢物兩三行次日合塌氣丸服之十日復以沉香海金沙丸導利之又令服塌氣丸如此互換服至月餘其癖減半未及百日良愈近年多有此疾愈之者多錄之以救將來之病者

湯氏小兒方曰戶部張侍郎小娘子患此蘊積結聚已經年矣其候腹滿壯熱大小便閉不食諸醫皆作虛熱潮熱或作胃寒不食治然既不食大小便自然少又欲作疳熱治百藥俱試而無一中勢已窘迫招予視之問曰合服何藥答曰當服甘遂大黃張驚駭曰前諸醫者皆用補劑此女不進飲食久矣不宜利動腸胃予答曰信我者生逆我者死張曰更有無甘遂而次於此藥方者可否予令卽服太承氣湯二服而愈次日診之尚有餘滯積實其證必過數日而復閉須服前藥始可除根數日後果再閉腹滿痞結再投此藥一服而痊

保嬰金鏡錄曰一小兒人中青黃噯腐酸氣用平胃散一服宿滯頓化余云不必多藥但節其飲食自愈不信復傷食而噯腐另用尅滯之藥更加吐瀉以致不救惜夫

一小兒傷食嘔吐服尅伐之藥嘔中見血用清熱凉血之藥又大便下血脣色白而或青問其故於余余曰此脾土虧損肝本所乘而然也令空心服補中益氣湯食遠用異功散以調補中氣使涎血各歸其源而愈

體仁彙編曰昔有一人從貴州來得瘧夫婦相繼而死存二子歸皆病腹中有塊如瓜其苦欲死用大黃酒洗草撥微炙等分爲細末蜜丸桐子大每服五十丸空心麝香水送下方十服氣塊皆消此方小兒倣小丸用大人大丸初服五十丸以後只逐日二十丸或服三十丸不可太多病去八分止服以俟自消盡也

薛氏醫案曰一小兒傷食發熱唇動或用養胃湯枳實黃連山楂之類更加腹脹午後發熱按其腹不痛余以爲服前藥飲食雖化而脾胃復傷也用六君子湯數劑而痊

一小兒傷食風熱嘔吐唇口蠕動服消導清熱之劑飲食已消熱猶如故余曰此胃經虛熱耳用四君子升麻柴胡四劑而愈

一小兒素面白忽然目唇微動時面色黃青良久其唇口手足亦微動此脾虛而肝侮之也用五味異功散加釣藤鉤白附子一劑而面青少退再二劑唇口動亦止又用異功散加升麻柴胡四劑而痊

治一小兒腹中痞塞却服二陳枳實黃連其痞益甚余謂屬脾經血虛用六君子加當歸數劑胃氣漸復乃朝用異功散加升麻夕用異功散加當歸而愈

一小兒未及週歲氣短喘急乳食少進時或吐乳視其形如去蛇乃脾傷而食積先用六君子加山楂枳實漸愈後乳食復傷吐瀉作渴候二日不止先與胃苓膏以治吐瀉繼以七味白术散生胃氣而愈

一小兒患痞服耗滯之藥余謂形氣有餘病氣有餘者當瀉不當補形氣不足病氣不足者當補不當瀉前證屬形病俱虛非調補中氣不愈不信仍行耗伐元氣虧損虛火上炎齒齦蝕爛頷下結核余用大蕪荑湯及異功散之類漸愈

一小兒停食發熱服苓連三稜等劑飲食日少胃腹膨脹皮體羸瘦余謂脾虛飲食停滯元氣復傷先用補中益氣湯加木香釣藤鉤數劑漸愈又用六君炮薑調理而安

一小兒素嗜肉食腹中作痛大便不調半載之後肚腹膨脹右脅內結一塊不時轉移又三月左脅內亦結一塊胃腹亦脹齦潰作渴小便赤濇或澄白大便色穢不一又半載頷下結核三五枚服消塊行滯等藥元氣益虛其塊益甚余用四味肥兒丸五味異功散之類隨證進退治之熱渴漸止又月餘腹脹漸消更佐以九味薑黃丸齒齦漸愈乃用四君子湯爲主佐以蕪荑丸之類而痊

一小兒飲食不節或作瀉或腹痛或腹脹腹中一塊大便不調作渴發熱齦爛口臭專服消導耗滯前證益甚形體益瘦余曰面色黃中隱青脾土虧損而肝木所侮也法當調補中氣平肝木則脾氣自旺虛火自退諸證自愈遂用冲和湯大蕪荑湯之類果愈

一小兒小腹脹墜小便澀滯午前爲甚以補中益氣湯加木香與朝服以五味異功散加升麻柴胡與夕服兩月餘而愈後飲食失節腹脹嘈酸用五味異功散四味茱萸丸而痊畢姻後復患如前更惡寒腹冷小便青頻大便不實手足並冷用補中益氣湯八味地黃丸而尋愈

一小兒傷食腹脹胃滿有痰余用異功散而痊後復傷食腹脹作痛或用藥下之痛雖止而脹益甚更加喘粗此脾氣傷而及於肺也用六君桔梗調補而愈

一小兒腹脹惡食寒熱惡心證類外感余曰氣口脈大於人迎此飲食停滯也用保和丸一服諸證頓退但腹脹未已用異功散而痊

一小兒傷風咳嗽痰湧用六君桔梗桑皮杏仁而愈後飲食停滯腹瀉脹痛又用六君加山楂厚朴而安復停食作嘔或用藥下之更加咳嗽余謂此脾肺益虛欲行調補彼以爲緩乃服發表耗滯之藥前證益甚更加搖頭余用天麻散倍加釣藤鉤及異功散而愈

一小兒胃腹脹痛寒熱煩悶以手按腹即哭此飲食停滯也先用保和丸一服前證即愈更加煩渴按其腹不哭此宿食去而脾氣未復也用五味異功散加柴胡治之而痊

一小兒飲食停滯服消導之劑飲食既消熱尚未退此胃經虛熱用六君子加升麻柴胡四劑而愈

一小兒先因飲食停滯服耗伐之劑更加腹痛按之則止余用六君子湯而愈後復傷食用保和丸及三稜橫梗之類更加腹重善噫此脾氣虛而下陷也仍用前湯加升麻柴胡木香而愈

一小兒面色青白飲食難化大便頻泄或用消積化痰等藥久不愈余謂脾胃虛弱也用六君子湯漸愈或以爲食積宜驅逐之遂反作瀉痰喘發搐余謂脾氣復傷不能生肺肺虛不能平肝而作是證先用六君子加釣藤鉤飲食少進又用五味異功散加升麻而愈

一小兒患前證腹痛服攻下之劑發熱不已大便不化按其腹不痛與冷水不飲此食積去而脾氣虛也用五味異功散加當歸升麻而愈

一小兒患痞癖服檳榔蓬朮枳實黃連之類痞益甚余曰此脾經血虛痞也不可尅伐遂用六君子加當歸數劑胃氣漸復諸證漸愈乃朝用異功散加升麻柴胡夕用異功散加當歸芍藥而愈

一小兒患痞結久而四肢消瘦肚腹漸大寒熱嗜臥作渴引飲用白朮散爲主佐以四味肥兒丸月餘諸證漸愈

一小兒患痞結身熱如火病狀多端不可盡述朝用五味異功散夕用四味肥兒丸月餘諸證稍愈佐以地黃丸自能行立遂朝用地黃丸夕用異功散及蝦蟆丸數服而愈

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百六十三卷目錄

醫部彙考四百四十三

小兒諸疳門一

錢乙小兒直訣 五臟內外疳證主治

倪維德原機啓微 深疳爲害之病

張從政儒門事親 疳眼 牙疳

方賢奇效良方 蟲

魯伯嗣學嬰童百問 疳證 疳傷 虛羸

虞摶醫學正傳 諸疳證

張三錫準繩六要 疳眼

龔信古今醫鑑 諸疳

薛氏保嬰撮要 疳 疳傷 蟲

王肯堂證治準繩 疳 莊氏二十四候 諸雜證 肝疳 心疳 脾疳 肺疳 腎疳 冷熱疳 無辜疳 蟲 蛔疳 乾疳 內疳 外疳 五疳 疳熱 疳勞 疳積 疳瀉 虛羸 丁奚 哺露

樓英醫學綱目 十二無辜疾證 五疳

小兒衛生總微論方 五疳 諸蟲 虛羸

藝術典第四百六十三卷

醫部彙考四百四十三

小兒諸疳門一

朱錢乙小兒直訣

五臟內外疳證主治

凡小兒疳在內目腫腹脹瀉利青白體漸瘦弱疳在外鼻下赤爛頻揉鼻耳或肢體生瘡鼻瘡用蘭香散諸瘡用白粉散

肝疳一名筋疳白膜遮睛或瀉血而瘦用地黃丸

心疳面黃頰赤身體壯熱用安神丸

脾疳一名肥疳體黃瘦削皮膚乾澀而有瘡疥腹大嗜土用益黃散

腎疳一名骨疳肢體瘦削遍身生瘡疥喜臥濕地用地黃丸

肺疳一名氣疳喘嗽氣促口鼻生瘡用益黃散

若患潮熱當先補肝後瀉心若妄以硝黃諸藥利之若患癖當消磨若誤以巴豆硼砂下之又傷寒悞下皆能成疳其初病者爲熱疳用黃連丸久病者爲冷疳用木香丸冷熱相兼者用如聖丸津液短少者用白朮散凡此因大病脾胃虧損內亡津液所致當固脾胃爲主而早爲施治則不變敗證也

註 按疳證或哺食太早或嗜食甘肥或服峻厲之藥重亡津液虛火熾盛或因稟賦或乳母厚味七情致之各當調治其內

若口舌蝕爛身體壯熱顋脣赤色或作腫痛腹膈煩悶或掌熱咽乾作渴飲水便赤盜汗嚙齒虛驚此心經內外疳也用安神丸之類主之

若鼻外生瘡眼目赤爛肢體似癬兩耳前後項側缺盆兩腋結核或小腹內股玉莖陰囊睪丸腫潰小便不調或出白津或咬指甲搖頭側目白膜遮睛羞明畏日肚大青筋口乾下血此肝經內外疳也用地黃蘆薈二丸主之

若頭不生髮或生瘡痂或髮成穗或人中口吻赤爛腹痛吐逆乳食不化口乾嗜土瀉下酸臭小便白濁或合目昏睡惡聞木音此脾經內外疳也用肥兒丸主之

若鼻外生瘡咽喉不利頸腫齒痛咳嗽寒熱皮膚皺錯欠伸少氣鼻癢出涕衄血目黃小便頻數此肺經內外疳也用地黃清肺飲主之

若腦熱吐痰手足逆冷寒熱往來滑泄肚痛口臭作渴齒齦潰爛爪黑面黧身耳生瘡或耳出水或食自髮此腎經內外疳也用地黃丸主之凡疳熱上攻或痘毒上升爲患甚速名爲走馬疳急敷雄黃散服蟾蜍丸輕則牙齦腐爛脣吻腫痛可治重則牙齦蝕落腮頰透爛不治

世傳方又云有無辜等疳一十二證

金倪維德原機啓微

深疳爲害之病

衛氣少而寒氣乘之也元氣微而飲食傷之也外乘內傷釀而成之也父母以其純陽耶故深冬不爲裳父母以其惡風耶故盛夏不解衣父母以其數饑耶故飼後强食之父母以其或渴耶故乳後更飲之有愚戇而爲父母者又不審其寒暑飲食也故寒而不爲暖暑而不能涼飲而不至渴食而不及饑而小兒幽元銜默抱疾而不能自言故外乘內傷因循積漸釀而成疳也渴而易饑能食而瘦腹脹下利作誓誓聲日遠不治遂生目病其病生瞖睫閉不能開眵淚如糊久而膿流竟枯爾目何則爲陽氣下走也爲陰氣反上也治法當如陰陽應象大論曰清陽出上竅濁陰出下竅清陽發腠理濁陰走五臟清陽實四肢濁陰歸六腑各還其原不反其常是其治也當作升陽降陰之劑茯苓瀉濕湯主之升麻龍膽草飲子主之此藥非專於目并治已上數證然勿後後則危也

爲父母者其審諸

元張從政儒門事親

疳眼

凡小兒疳濕眼數日不開皆風熱所致可服凉膈散瀉肝經風熱鬱甚鬱結散而自開也

牙疳

凡小兒牙疳齒齦者是齒齦腐爛也下牙屬手陽明大腸之經燥金爲主上牙屬足陽明胃經濕土上下是腸胃二經也或積熱於內或因服銀粉巴豆大毒之藥入於腸胃乳食不能勝其毒毒氣循經而至於齒齦牙縫齦溝之分反爲害也可以麝香玉線子治之乳母臨臥當服黃連解毒湯一服牙病自愈

明方賢奇效良方

蟲

兒童疳蟲昏睡煩躁鼻爛汁臭齒斷生瘡下利黑血蟲食下部爲狐下唇有瘡蟲食其臟爲惑上唇有瘡三蟲者謂長蟲赤蟲蟯蟲也乃有九種而蟯蟲及寸白人多病之寸白從食牛肉飲白酒所成相連一尺則殺人服藥下之須結裹潰然出盡乃佳若斷者相生未已更宜速除之蟯蟲多是小兒患之大人亦有其病令人心痛清朝口吐汁煩躁則是也其餘各種種不利人人胃無不有者宜服九蟲丸以除之

魯伯嗣學嬰童百問

疳證

諸疳皆脾胃之病內亡津液之所作也因大病或吐瀉後以藥吐下致脾胃虛弱內亡津液且小兒病疳皆庸醫所壞病如潮熱是脾臟虛一臟實而內發虛熱也法當補母而瀉本臟則愈假令日中發潮熱是心虛熱也肝爲心母則宜先補肝肝實而後瀉心心得母氣則內平而潮熱愈也醫見潮熱妄謂其實乃以大黃牙硝輩諸冷藥利之既利多矣不能禁約而津液內亡即成疳也又有病癖其疾發作寒熱飲水脅下有形硬痛治癖之法當漸消磨醫反以巴豆硇砂輩下之小兒易虛易實下之既過胃中津液耗損漸以疳瘦

小兒臟腑嬌嫩飽則易傷乳哺飲食一或失常不爲疳者鮮矣則疳以傷得恣食甘肥粘膩生冷鹹酸以滯中脘則疳因積成或乳母寒暄失理飲食乖常喜怒房勞即與兒乳則疳因母患傳氣而入此非病家不能調適之過乎疳之爲候頭皮光急毛髮焦稀肥縮鼻乾口饑脣白兩眼昏爛揉鼻撦眉脊發體黃齦牙咬甲焦瀉白汗尿白瀉酸肚脹腸鳴癖結潮熱酷嗜瓜菓鹹酸炭米泥土而欲水飲者皆其候也

夫疳曰五疳病關乎五臟以別之

心疳即驚疳外證身體壯熱臉赤脣紅口舌生瘡胃脘煩悶小便赤澀五心煩熱盜汗發渴咬牙虛驚是也

肝疳即風疳外證搖頭揉目白膜遮睛眼青多淚頭焦髮立筋青腦熱躁渴汗多下利瘡癖是也

腎疳即急疳外證腦熱肌削手足如冰寒熱時來滑泄肚痛口鼻乾渴齒齦生瘡爪黑面黧身多瘡疥是也

肺疳即氣疳亦名疳蟲外證咳嗽喘逆壯熱惡寒皮膚粟生鼻瘡流涕咽喉不利頤爛唇紅氣脹毛焦泄利頻併是也

脾疳即食疳亦名妳疳外證身面俱黃肚大腳細吐逆中滿水穀不化泄下酸臭合面困睡減食吃泥是也

諸疳宜大蘆薈丸肥兒丸胡黃連丸地黃丸生熟地黃湯皆要藥也集聖丸慶疳散脂連丸五疳良方至聖丸通神丸天麻丸地黃清肺飲化蟲丸靈脂丸下蟲丸龍膽丸黃連丸香蔻丸木香丸褐丸子黃芪湯髓血煎蚵蚾丸厚朴丸等劑對證詳明施治

疳傷

五疳出蟲五臟疳也其餘曰蛔疳曰肴疳曰腦疳曰乾疳曰疳渴曰疳瀉曰疳痢曰疳腫脹曰疳勞曰無辜疳曰丁奚曰哺露其狀非一不可不撮其要而條析之

五疳出蟲者疳傷之源雖起于乳哺不調然臟腑停積已久莫不化而爲蟲其蟲或如絲髮或如馬尾多出于頭項腹背之間黃白或赤者可治青黑者難療也

蛔疳者失乳飯蚤食肉太蚤或傷胃停蓄甜膩化爲蛔蟲皺眉多啼嘔吐青沫腹中作痛肚脹青筋脣口紫黑頭搖齒齆是也從口鼻出者難治

肴疳者蟲食肴膂身熱羸黃積中生熱煩渴下利拍背如鼓鳴肴骨如鋸齒或十指皆疳頻嚙爪甲是也

腦疳者胎中素挾風熱生下乳哺越常頭皮光急滿頭皺疳腦熱如火髮結如穗遍身多汗頸腫顱高是也

乾疳者瘦悴少血舌乾其病在心目不轉睛乾帝少

淚其病在肝身熱尿乾手足清冷其病在腎身焦皮燥大便乾結其病在肺搭口癡眠胷脘乾渴其病在脾總爲五疳也

疳渴者臟中夙有疳氣加之乳母恣食五辛酒麪炙煿使兒心肺壅熱日則煩渴飲水乳食不進夜則渴止是也

疳瀉者毛焦脣白額上青紋肚脹腸鳴泄下糟粕是也勿用熱藥止之

疳痢者挾受風寒暑濕或冷熱不調或停積宿滯水穀不聚頻下惡物是也

疳腫脹者虛中有積其毒氣交併故令肚腹腫脹由是脾復受濕故令頭面脚手虛浮是也法當磨積調氣

疳勞者潮熱往來五心煩熱手足心及胷前熱而發瘡盜汗骨蒸嗽喘枯悴是也或渴而復瀉飲水惡食肚硬如石面色如銀斷不可治

無辜疳者腦後項邊有核如彈丸按之轉動軟而不疼其間有蟲如米粉不速破之則蟲隨熱氣流散淫食臟腑以致肢體癰瘡便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高是也針刺破用膏藥貼或澣濯兒衣露于簷下爲鳩鳥落羽所汚兒著此衣蟲入皮毛亦致無辜之疾兒衣已曬須微火烘之其若手足極細項小骨高尻削體痿腹大臍突號哭胷陷或生穀癥是爲丁奚虛熱往來頭骨分開翻食吐蟲煩渴嘔噦是爲哺露皆因脾胃久虛不能消化水穀以致精神減損無以榮其血氣故肌肉銷爍腎氣不足復爲風冷所傷使形骨枯露亦有胎中受毒臟腑血少致之此皆無辜疳傷種類之疾病而至此不幾殆哉宜肥兒丸大蘆薈丸五疳丸胡黃連丸至聖丸茯苓丸天麻丸地黃丸十全丹香蔻丸褐丸子消食丸鼈甲丸下蟲丸集聖丸黃鷄煎丸等藥及早治之方爲全美

又有疳傷久利腸胃受濕得之狀如狐惑傷寒齒蝕之證或以走馬命名蓋齒屬腎腎虛纔受熱邪疳氣直奔上焦故以走馬爲喻初作口氣名曰臭息次第齒黑盛則齦爛熱血迸出曰宣露甚者齒皆脫落治之之法用銅綠生蜘蛛細研入麝少許合和擦齒如無蜘蛛用其殼亦可

虛羸

仲陽云虛羸者脾胃不和不能乳食致使肌膚瘦弱亦因大病或吐瀉後脾胃尚弱不能傳化穀氣也有冷者時時下利脣口青白有熱者身熱溫壯肌肉微黃此冷熱虛羸也冷者木香丸主之夏月不可服如有此證則少服之熱者胡黃連主之冬月不可服如有此證則少服之傷寒後虛羸者竹葉湯主之常服四君子湯異功散參苓白朮散之劑皆可服也橘連丸久服充肥兼服肥兒丸

虞摶醫學正傳

諸疳證

內經曰數食肥令人內熱數食甘令人中滿蓋其病因肥甘所致故命名曰疳若夫襁褓中之乳子與四五歲之孩提乳哺未息胃氣未全而穀氣尚未充也父母不能調助惟務姑息舐犢之愛遂令恣食肥甘與夫瓜果生冷及一切烹飪調和之味朝飧暮食漸成積滯膠固以致身熱體瘦面色痿黃或肚大青筋蟲痛瀉利而諸疳之證作矣錢仲陽曰小兒病疳多因大病後或吐瀉後以藥下之致脾胃虛損亡津液而成蓋此證實由愚醫之所害耳斯言也持一端耳未可悉以爲然其所謂大病吐瀉豈非飲食之所致與夫仲陽爲兒醫之祖豈有誤耶其所論諸疳形證治法班班可考學者不可不審如疳在肝則膜遮睛法當補肝地黃丸主之疳在心則面頰赤身體壯熱法當補心安神丸主之疳在脾則體黃腹大好食泥土法當補脾益黃散主之疳在肺則氣喘口鼻生瘡亦當補脾益黃散主之此虛者隨其母也疳在腎則極瘦而身生瘡疥法當補腎地黃丸主之骨疳喜臥冷地當服補腎地黃丸內疳則目腫腹脹利色無常或沫青白漸而瘦弱此冷證也宜服木香丸外疳鼻下赤爛自揉鼻頭有瘡不結痂遶目而生當用治瘡爛蘭香散白粉散等藥法曰諸疳皆因本臟而補其母則子自安假令日中潮熱是心經虛熱也肝爲心之母宜先補肝肝實而後瀉心心得母氣則內平而潮熱愈矣餘皆倣此大抵疳病當辨冷熱肥瘦而治其初病者爲肥熱疳久病者爲瘦冷疳冷則用木香丸熱則當用胡黃連丸冷熱疳並宜用至聖丸之類惟小兒之臟腑柔弱不可痛擊大下必亡津液而成疳證爲兒醫者當以幼幼之心爲心而善調之毋縱巨膽妄爲施治以絕人之嗣續幸甚

張三錫準繩六要

疳眼

小兒肥甘恣意寒暑不適生冷油膩傷脾糖麪熱物助火因循積漸釀成疳疾渴而易飢善食而瘦髮豎

下泄腹脹鼻乾作瞽瞽聲久久不治脾弱肝強肝火自燎其窠遂成目眚多生腎膜睫閉不能開眵淚如糊久而膿流乃中州弱而清陽不升肝火盛而濁陰不降所致當升清降濁以白术人參先補脾胃爲君柴胡枳殼輔上藥理脾爲臣者术茯苓澤瀉滲濕降濁爲佐羌活蔓荊升麻川芎薄荷諸風藥勝濕爲使乃正治妙法

小兒過用甜物口臭牙痛眼腫氣口脉洪數屬胃火瀉黃散妙

小兒肝經濕熱內甚上攻於目眼胞腹脹九味蘆薈丸妙兼脾虛瘀黃瘦弱不食者間肥兒丸稟來陰弱有相火證者心虛少與六味地黃丸

龔信古今醫鑑

諸疳

夫諸疳者謂肥甘飲食之所致也治宜理脾胃消積化蟲清熱止瀉住痢以肥兒丸疳積餅爲主此二方不問諸疳冷熱服之最效大抵疳之爲病皆因過養飲食於脾家一臟有積不治傳之餘臟而成五疳之疾何謂五疳心肝脾肺腎也如疳在心則面赤口乾咬牙舌口舌生瘡身熱體瘦以安神丸主之疳在肝則面青瞖膜遮睛搖頭揉目多淚頭焦髮豎筋青腐熱瘦弱以補肝湯主之疳在脾則面黃身熱腹脹肚大好食泥土水穀不消泄下酸臭困睡減食肌瘦以益黃散主之疳在肺則面白咳嗽喘逆口鼻生瘡咽喉不利肚熱惡寒鼻流清涕以清肺湯主之疳在腎則面黑肌肉瘦而體生瘡身熱尿澀手足冰冷口鼻乾渴以地黃丸主之

薛氏保嬰撮要

疳

小兒諸疳皆因病後脾胃虧損或用藥過傷不能傳化乳食內亡津液虛火妄動或乳母六淫七情飲食起居失宜致兒爲患五臟之疳不同當各分辨其證雖多要不出於五臟治法肝疳用地黃丸以生腎心疳用安神丸以治心異功散以補脾脾疳用四味肥兒丸以治疳五味異功散以生土土肺疳用清肺飲以治肺益氣湯以生金腦疳亦用地黃丸無辜疳用大蕪荑湯蟾蜍丸丁奚哺露用肥兒丸大蘆薈丸走馬疳敷雄黃散服蟾蜍丸若作瀉瀉痢腫脹勞瘵等類當詳參方論而治之蓋疳者乾也因脾胃津液乾涸而患在小兒爲五疳在大人爲五勞總以調補胃氣爲主

疳傷

大抵多因乳哺失節脾氣有傷元氣下陷或乳母飲食七情所致小便如泔或大便泔白者用四味肥兒丸積滯黃黑者用四君子湯加黃連木香芍青日久不復或兼泄瀉或腹痛者用六君子湯加木香芍藥若小便不利大便褐色髮黃脫落鼻下瘡瘍用梔子茯苓湯乳食少思胃腹膨脹大便頻數用四味肥兒丸仍審乳母飲食七情主之

蟲

蚘蟲者九蟲之一也長尺許或五六寸者因臟腑虛弱及食甘肥而動其動則腹中攻痛或作或輟口吐涎水貫心則死用使君子丸之頰下之錢仲陽云吐木不心痛者胃冷也吐沫心痛者蟲痛也與癇相似但目不斜手不搐耳安蟲散主之田氏云蟲痛者啼哭倦仰坐臥不安自按心腹時時大叫面色青黃唇色兼白目無精光口吐涎沫也若因胃冷卽吐用理中湯加炒川椒五粒檳榔五分煎下烏梅丸古云蟲蝕上部則上唇有白點蟲蝕下部則下唇有白點腹中諸蟲墾前其頭向上墾後其頭向下如欲用藥先以猪肝油炙香令兒聞其香味使蟲頭向上則藥易入若中氣虛而蟲不安者但調補脾胃自安丹溪先生云冬月吐蟲多是胃氣虛寒用錢氏白术散加丁香二粒主之

王肯堂證治準繩

疳

疳有病傷寒五六日間有下證以冷藥下之太過致脾胃虛而津液少卽便引飲不止而生熱也然氣內耗肌肉外消他邪相干證變諸端亦成疳病又有吐瀉久病或醫妄下之其虛益甚津液煩躁亦能成疳也

小兒病癖由乳食不消伏在腹中乍凉乍熱飲水不止或喘而嗽與潮熱相類若不早治必成勞疳以其有癖癥則令兒不食致脾胃虛而發熱故引飲也飲多卽瀉癖脾胃亡失津液不能傳化水穀其脉沉細蓋不能飲食致脾胃虛衰四肢不舉諸邪遂生羸瘦而成疳矣

兒童二十歲以下其病爲疳二十歲以上其病爲癆疳與癆皆氣血虛憊腸胃受傷致之同出而異名也何者小兒臟腑嬌嫩飽則易傷乳哺飲食一或失常不爲疳者鮮矣疳皆乳食不調甘肥無節而作也或

嬰幼闕乳粥飯太早耗傷形氣則疳之根生或三兩晬後乳食稍多過飽無度則疳以傷得或恣食甘肥粘膩生冷鹹酢以滯中脘則疳因積成或乳母寒暄失理飲食乖常喜怒房勞即與兒乳則疳因母患傳氣而入此非病家不能調適之過乎疳皆脾胃受病內無津液而作也有因吐瀉之後妄施吐下津液虛竭得之者有因潮熱大下利無禁約胃中焦燥得之者有因傷寒裏證冷駃太過渴引水漿變而生熱熱氣未散復於他邪得之者又有病癖寒熱脅下痛硬或者不能漸與消磨遽以硇巴峻決津液暴傷得之者此非醫家輕藥壞病之過乎

肝疳亦名風肝亦名筋疳其證白膜遮睛筋疳瀉血而瘦眼白青眼睛澀癢搖頭揉目流汗遍身合面而臥面色青黃髮疎頭焦筋青腦熱渾身瘡癬腹中積聚下痢頻多久而不痊轉甚羸瘦目生眵糞髮際左臉多青或白睛微黃瀉利夾水或如苔色

心疳亦名驚疳面黃頰赤身壯熱口內生瘡渾身壯熱吐利無常頰赤面黃胷膈煩滿鼻乾心躁口舌生瘡痢久不痊多下膿血有時盜汗或乃虛驚小便赤澀五心皆熱咬牙舒舌愛飲冷水喜伏眠于地

脾疳亦名食疳其證脾疳食不消胃疳多吐腹多筋脈喘促氣粗乳食不多心腹脹滿多啼欬逆面色痿黃骨立毛焦形枯力劣胷膈壅悶水穀不消口鼻常乾情意不悅愛暗憎明腸胃不和利多酸臭愛食冷物引飲無度身面俱黃髮稀作穗頭大項小腹脹脚弱間或釀瀉肌瘦目慢晝凉夜熱不思乳食錢氏云肥疳即脾疳也身瘦虛黃乾而有瘡其候不一種種異端今略舉之目澀或生白膜唇赤身乾黃或黑喜臥冷地或食泥土身有瘡疥瀉青白黃沫水痢色變易腹滿身耳鼻皆有瘡髮鬢作穗頭大項細極瘦飲水皆其證也

此言脾疳證候多與餘疳相濫蓋疳爲脾經本病固應兼之

肺疳亦名氣疳其證氣喘口鼻生瘡咳嗽氣逆皮毛乾焦饒涕多啼咽喉不利揉鼻咬甲壯熱憎寒唇邊赤癢腹內氣脹乳食漸稀大腸不調頻頻泄利糞中米出皮上粟生鼻下赤爛手足枯細口有腥氣右腮晃白

腎疳亦名急疳又名骨疳其證腎疳極瘦身有瘡疥骨疳喜臥冷地齒爪黑肌骨消瘦齒齦生瘡寒熱作時口鼻乾燥腦熱如火脚冷如冰吐逆既增乳食減少瀉利頻併下部開張肛門不收疳瘡癢痛兩耳內外生瘡脚如鶴膝頭縫不合或未能行牙齒生遲其縫臭爛傳作走馬疳之類又有小兒久患腎疳內虛不食甚者天柱骨倒治法當用錢氏地黃丸加驅疳等劑仍與貼項强筋若不識證謂之五軟非也天柱骨倒凡有三種有吐瀉日久羸弱成者有肝膽伏熱面赤唇紅忽變此者有傷寒不及發表成者是皆風邪入肝以致筋絡舒弛吐瀉者當調胃氣肝熱者隨輕重以凉肝並與强筋貼項惟傷寒天柱骨倒者難療

莊氏二十四候

第一候瀉膿血日漸瘦是冷熱疳

第二候脚細肚高胷前骨生愛吃泥土酸鹹日久通身黃時時吐逆下痢腹內疼痛是脾疳

第三候鼻下赤爛愛揉眼兼血痢是肺疳乃因喫著熱物或病妳所損心肺加之咳嗽更以服凉冷藥過多便上熱下冷漸漸昏沉日夜煩哭

第四候皮虛皺面無顏色身上燥癢心煩

第五候毛髮稀疎鼻生瘡是肺疳

第六候頭生瘡毛髮稀焦是肝疳

第七候牙變黃赤不定是腎疳

第八候頭髮焦乾鼻下瘡生是肺疳

第九候咬指甲毛髮作穗四肢沉重是心疳

第十候肚上筋生齒蟲蝕是骨槽疳

第十一候齒齗臭爛面無顏色心不思食是脾疳又名口疳

第十二候吐逆腹脹是胃疳又名妳疳

第十三候愛合面臥多睡如醉腹脹氣急蓋是因曾喫生肉如此腹內有蟲是心脾疳

第十四候鼻內乾痛口中臭氣齒根有鮮血是肝肺疳

第十五候脚細肚高併肚上有青脉是脾疳

第十六候非時生瘡愛喫冷水是熱疳

第十七候皮膚上生粟子糞中米出是脾冷疳

第十八候氣滿腹脹及口乾是心胃疳

第十九候愛餐生米麪炭甎瓦是脾胃疳

第二十候揉鼻揩眼及咬指甲愛飲水是肝渴疳

第二十一候多寒熱愛臥不起是骨熱疳

第二十二候愛飲水眼目不開是肝疳

第二十三候肌體或熱或凉發渴無時是急疳

第二十四候齒斷黑脣懶開開則赤是心疳積熱
凡小兒疳在內眼澀腹脹痢色無常或如泔淀日漸羸瘦此候可療若鼻下赤爛自揉鼻頭上有瘡生痂痛癢漸漸流引遶於兩耳時時目赤頭髮稀疎腦皮光緊頭大項細肌體羸瘦亦可治也若脣口被蝕齒斷作五色或盡崎黑舌下有白瘡上齗有竅子口中時有臭氣齒斷漸染欲爛亦可治也若下部開張有時赤爛癢不可忍下痢無常亦可治也若疳蝕昏瞀十指皆癢自咬指甲頭髮作穗脊骨如鋸有時腹脹有時下痢若急治之無不差也
凡小兒肝臟疳若目睛帶青脈左脅下硬多吐涎沫眼角左右有黑氣所衝不可治也心臟疳若每驚啼常好飲水便食辛味耳邊有脈舌上有黑醫者不可治也脾臟疳若肚大脣無血色人中平滿下痢無度水穀不消好喫泥土皮枯骨齒不可治也肺臟疳若欬逆氣促多瀉白沫身上有斑生如粟米大色若黑者不可治也腎臟疳若愛食酸鹹飲水無度小便如乳牙齒青黑耳腦乾燥肩竦骨枯不可治也又五疳有五絕候一視著脚中指底不覺痛二抱著手足垂軃無力三病未退遍身不煖四臟腑瀉青涎及沫不止五項筋舒展無力如此之候皆不可治也凡醫用藥切在審詳也
疳者小兒病癖或久吐瀉醫者妄投轉過之藥小兒易爲虛實致令胃虛而亡津液內發虛熱外消肌肉一臟虛則諸臟皆弱其病日胞腫腹脹痢色無常漸加瘦削久不痊可是腸胃有風積法當宣風散導之後各依本臟補其母

諸雜證

熱者凉之冷者温之冷熱者温凉之此其要也熱疳病多在外鼻下赤爛頭瘡濕癬五心煩熱掀衣氣粗渴飲冷水煩躁臥地肚熱脚冷潮熱往來皆熱疳也冷疳病多在內利色無常其沫青白肢體軟弱目腫面黧又有躁渴臥地似有熱狀惟飲食不進滑泄無已亦冷疳也其有瀉多膿血日加瘦弱此則謂之冷熱疳大抵疳之受病皆虛使然熱者虛中之熱冷者虛中之冷治熱不可妄表過凉治冷不可峻温驟補故錢氏又曰小兒易爲虛實脾虛不受寒温服寒則生冷服温則生熱當識此而勿誤是豈非幼幼之綱領乎上醫處此消積和胃滋血調氣隨順藥餌以扶之淡薄飲食以養之榮衛調和臟腑自然充實一或過焉君子未保其往也取積之法又當權衡積者疳之母由積而虛謂之疳極諸有積者無不肚熱脚冷須酌量虛實而取之若積而虛甚則先與扶胃使胃氣內充然後爲之徹利若積勝乎虛則先與利導纔得一泄急以和胃之劑爲之扶虛然取積雖當疏利如白荳蔻蘿蔔子縮砂蓬朮消積等藥亦不可無脅間癖痛亦虛中之積也先寒後熱飲水不食或因飲水以致喘嗽錢氏有癖爲潮熱之說治法解散寒熱即與下癖合是而觀發作不同療治不一又可無權度於此哉
大抵疳之爲病皆因過餐飲食於脾家一臟有積不治傳之餘臟而成五疳之疾若脾家病去則餘臟皆安苟失其治日久必有傳變然脾家病宜蕩薈丸沉香檳榔丸或水晶丹烏犀丸更察虛實療之有蟲者

投史君子丸化蟲飲如心腹痛吐清水蟲自下多投二聖丸諸疳證皆宜用局方五疳保童丸或萬應丸常服化積治疳仍各投本臟調理之劑寧心用茯神湯調肝用芫歸湯調脾用參苓白朮散補肺用補肺散補腎用調元散庶各得其宜則前證不致再作
積是疳之母所以有積不治乃成疳候又有治積不下其積存而臟虛成疳尤重大抵小兒所患疳證泄瀉無時不作風候者何惟疳瀉名熱瀉其臟腑轉動有限所以不成風候雖瀉不風亦轉他證作渴虛熱煩躁下痢腫滿喘急皆疳候虛證古云疳虛用補虛是知疳之爲疾不可更利動臟腑發作之初名曰疳氣腹大脹急名曰疳虛瀉痢頻併名曰疳積五心虛煩名曰疳熱毛焦髮穗肚大青筋好吃異物名曰疳極（受病傳臟已極）熱發往來形體枯槁面無神采血色名曰疳勞手足細小項長露骨尻臀無肉肚脹騰突名曰丁奚食加嘔噦頭骨分開作渴引飲蟲從口出名曰哺露此皆疳候又因多食生冷甘粘肥膩積滯中脘不化久亦成疳治疳之法量候輕重理其臟腑和其中脘順其三焦使胃氣温而納食益脾壯元以消化則臟腑自然調貼令血脈與氣脈相參筋力與骨力俱健神清氣爽疳消蟲化漸次安愈若以藥攻之五臟疎却腸胃下去積毒取出蟲子雖曰醫療即非治法蓋小兒臟腑虛則生蟲虛則積滯虛則疳羸虛則脹滿何更利下若更轉動腸胃致虛由虛成疳疳虛證候乃作無辜之孩難救矣
若證候龐雜不能名爲何等疳者即於通治諸疳方內檢之若證候的與五疳等條下證候對者即檢本

疳方分寒熱虛實擇而用之常須識此勿令誤也

肝疳

肝疳者由乳食不調肝臟受熱所致也若乳母寒溫不調滋味不節或外感風寒內傷喜怒邪氣未散遽以乳兒多成風疳肝者眼之候上膈伏熱痰涎壅滯以致肝風入眼赤腫臀生眵淚爛眶痛癢揉擦昏暗雀盲甚至經月合眼亦名疳眼外證搖頭揉目白膜遮睛眼青淚多頭焦髮豎筋青腦熱甲癢筋攣燥渴汗多下痢瘡癬是也錢氏以地黃丸主之楊氏以天麻丸生熟地黃湯主之曾氏調肝用芪歸湯

心疳

由乳食不調心臟受熱所致也蓋其血氣未定乳哺有傷易生壅滯內有滯熱未得疏通故心神驚鬱而作驚疳之候外證身體壯熱臉赤唇紅口舌生瘡胷膈煩悶小便赤澀五心皆熱盜汗發渴齧齒虛驚是也錢氏安神丸主之薛氏用安神丸以治心異功散以補脾楊氏以茯苓丸錢氏安神丸主之曾氏寧心用茯神湯

脾疳

由乳食不節脾胃受傷所致也或乳母恣食生冷肥膩或乳兒過傷或飯後與乳致吐或乳多眠久則變爲乳癖腹脅結塊亦爲妳疳外證面黃身熱肚大脚弱吐逆中滿乏力叫啼水穀不消泄下酸臭合面困睡減食吃泥是也錢氏益黃散主之楊氏以靈脂丸同益黃散主之薛氏用四味肥兒丸以治疳五味異功散以生土曾氏調脾用參苓白朮散

肺疳

由乳食不調壅熱傷肺所致肺主乎氣鼻乃肺所通其氣不和則風濕乘虛客於皮毛入於血脈故鼻下兩傍赤癢瘡濕名爲鼻疳其瘡不痛汁所流處隨即生瘡亦名疳䘌外證咳嗽喘逆壯熱惡寒皮膚粟生鼻瘡流涕咽喉不利頤爛吐紅氣脹毛焦瀉痢頻併是也錢氏主補脾生肺以益黃散主之楊氏以清肺飲化䘌丸錢氏阿膠散主之薛氏用清肺飲以治肺益氣湯以生金曾氏用補肺散

腎疳

由乳食不調臟腑伏熱所致也凡甘味入於脾而動蟲蟲動則侵蝕臟腑遂使孩提心下擾悶若上食齒齗則口瘡出血齒色紫黑下蝕腸胃則下痢肛爛濕癢生瘡療治不早精髓消耗難以有瘳蟲者䘌也目爲濕䘌多因疳傷久痢腸胃受濕得之狀如狐惑傷寒齒蝕之證或以走馬命名蓋齒屬腎腎主虛纔受熱邪疳氣直奔上焦故以走馬爲喻初作口氣名曰臭息次第齒黑名曰崩砂盛則齗爛名曰潰槽熱血迸出名曰宣露甚者齒皆脫落名曰腐根其根既腐縱得全活齒不復生外證腦熱肌削手足如冰寒熱時來滑泄肚痛口臭乾渴齒齗生瘡爪黑面黧身多瘡疥是也錢氏地黃丸主之仍當於生脈散中多加黃芪以補肺曾氏用調元散

冷熱疳

疳之新者爲熱疳面黃臉赤骨熱盜汗鼻乾口臭脣焦煩渴心躁驚悸情意不樂若疳之久者爲冷疳目腫腹脹便痢不定瀉糞肥膩或似油珠煩渴黃瘦熱疳病多在外冷疳病多在內又有冷熱二證交互非新非久不內不外者

無辜疳

兒面黃髮直時壯熱飲食不生肌膚積經日月遂致死者謂之無辜言天上有鳥名無辜晝伏夜遊洗濯小兒衣席露之經宿此鳥即飛從上過而取此衣與小兒著井席與小兒臥便令兒生此病

小兒無辜腦後有核如彈丸捏之反下轉是也凡小兒有此物如禽獸舌下有禁蟲若不速去常殞其命此核初生軟而不痛中有蟲如米粉得熱氣漸長大大則筋結定定則蟲隨血氣流散所有停留子母相生侵蝕臟腑肌肉作瘡或大便泄膿血致使小兒漸漸黃瘦頭大髮立手足細弱從茲夭折也

夫小兒無辜疳痢者大腹泄痢膿血毛髮皮膚枯槁肌體日漸羸瘦腸胃既虛痢無時節故名無辜疳痢也

漢東王先生云小兒無辜疾者古云天上有一鳥名無辜因驪小兒衣物失取過夜遇此鳥過尿之令兒啼叫諸病雜生日漸黃瘦者非也此蓋是八邪所傷得之其八邪者飢飽勞役風驚暑積謂之八邪久則令人日漸黃瘦吃食不長肌肉夜則啼哭身上或發微微壯熱多渴吃食不知飢飽或生瘡癬是也

朱氏八片錦歌孩子無辜氣多因母作爲若人能慎護安得見尪羸驚薄成風疾暄寒作氣痿須交除病乳莫更著重衣吃食無令早能言不怕遲論中八不許胷起力頻微頭皮光哲哲毛髮薄離離肝壅侵雙眼脾黃入四肢渾身生癮疹遍體是瘡痍瀉痢無休歇增寒少定時繡毬全不顧竹馬豈能騎白暈眸中

現情涎口畔垂鬬牙須咬甲舉手要撐眉夜夜餐瓜果朝朝食土泥胃傷腸肚脹肺盛喘何疑飲食無休歇耽眠似醉迷

蟲

五疳久而不差則腹內有蟲肌體黃瘦下痢不止宜服藥出之則疳氣漸退也

蛔疳

玉訣歌惡哭痰青蛔敲心涎生積冷痛難任每餐甜物并時果致得蟲生病轉深先用史君子散蘆薈丸取蛔後溫脾胃

乾疳

身體壯熱或時增寒舌澀口乾睡多盜汗皮膚枯燥髮立毛焦乳食雖多肌肉消瘦四肢無力好睡昏昏日往月來轉加尪瘁是其候也

內疳

小兒乳食不消心腹虛脹眼目澀癢體熱皮枯腸胃不調痢下五色漸漸羸瘦蟲蝕肛腸日月彌深痢轉不止故號內疳此冷證也宜史君子丸

外疳

疳在外則鼻下赤爛自揉鼻頭上有瘡不著痂漸遶耳生瘡今分走馬疳口齒疳鼻疳眼疳等臚列如左

走馬疳疳蝕之極也乃五臟蒸熱上攻甚即徧沿作崩砂候牙邊肉腫爛口內氣臭身微有潮熱吃食不得齒縫出鮮血常動搖似欲脫肉爛自落治之先以淡淡鹽湯洗口內即下紫金散摻之一日三次揩殺牙邊肉內蟲如大段甚即下秋霜散摻之然後將硃砂膏牛黃膏天竺黃散夾調理此茅先生法或以天竺黃散夾地黃膏亦好此惠眼法如此調理即安如調理不退先落齒一兩三箇即死不治相次面光發顋漏見骨而殂

形證論先與退脾肺風熱宜吃檳榔散五七服後用此藥貼斷上以大棗一箇砒少許去棗核入砒在內燒灰存性臨臥時貼斷上數次效

凡得此候多因氣虛受寒及有宿滯留而不去積溫成熱虛熱之氣上蒸或食甘酸鹹膩之物而脾雖喜甘積滯日久蘊熱上熏於口致齒焦黑爛間出清血血聚成膿膿臭成蟲侵蝕口齒甚至顋頰穿破乳食不便面色光浮氣喘熱作名走馬疳治之之法先去積熱用當歸散合三稜散水薑棗煎服次投蘆薈丸玉露飲及以溫鹽水灌漱或軟鷄翎蘸鹽水拂洗略拭乾仍以燒鹽散內金散蜜陀僧散傅之若經久不愈者傳於脣之上下及成崩砂證或穴發漏腮齒落骨露飲食減少氣促痰鳴必致危矣

口齒疳其候脣口癢痛牙齒峭黑舌上生瘡腦中乾熱斷肉赤爛頰腫齒疼熱毒熏蒸口多臭氣

此乃走馬疳之輕而慢者聖惠形容似太過治法宜清胃散甘露飲內服外用炒黑五倍子綠礬燒紅人中白等分入冰片少許揩牙或加檳榔末殺蟲亦得

鼻疳之候小兒乳食不調上焦壅滯令疳蟲上蝕於鼻也其候鼻中赤癢壯熱多啼皮毛乾焦肌膚消瘦咳嗽上氣下利無常鼻下連脣生瘡赤爛故曰鼻疳也

疳濕之病多因久利脾胃虛弱腸胃之間蟲動侵蝕五臟使人心煩懊悶其上蝕者則口鼻齒斷生瘡其下蝕者則肛門傷爛皆難治或因久痢或因臟熱嗜眠或好食甘美之食並令蟲動致生此病也

小兒嗜食甘味多動腸胃間諸蟲致令侵蝕臟腑此猶是蠱也凡食五味之物皆入於胃其氣隨其臟腑之味而歸之脾與胃爲表裏俱象土其味甘而甘味柔潤於脾胃脾胃潤則蟲動蟲動則侵蝕成疳也但蟲因甘而動故名之爲疳也若蟲蝕下部則肛門生瘡爛開急者數日便死宜速療之

凡小兒乳食不節冷熱相乖傷於臟腑致疳氣也若脾胃虛弱則哺乳不消大腸虛寒遂變泄痢因其久痢不止腸胃俱虛爲水濕所乘腹內蟲動侵蝕下部故名疳痢濕蠱也

夫小兒疳瘡生於面鼻上不癢不痛常有汁出汁所流處隨即成瘡亦生身上小兒多患之亦是風濕搏於血氣所以不癢不痛故名疳瘡也

五疳

銅壁山人曰凡治疳不必細分五疳但虛則補之熱則清之冷則溫之吐則治吐利則治利積則治積蟲則治蟲不出集聖丸一方加減用之屢試屢驗

疳熱

漢東王先生論小兒發熱形瘦多渴吃食不長肌肉者謂之疳熱凡疳熱當服進食丸磨積仍間服化蟲丸後服鼈甲散退熱次服肥兒丸

疳勞

即疳熱而骨蒸兼諸咳嗽盜汗等證是也湯氏鼈甲

散猪肚丸皆對證之藥

疳積

其候面帶青黃色身瘦肚膨脈萇體身熱肚中微痛此因疳盛而傳為此候治之先用匀氣散醒脾散調理二日後下青金丹取下疳積再下匀氣醒脾散補之常服保童丸即愈

玉訣云疳氣腹脹潮熱先與調胃氣後與取虛積藥次服疳藥

疳瀉

先用青金丹取下疳積後用匀氣散香連散乳香散調理瀉止常服保童丸

石壁經云疳瀉因不愼飲食或食乳致然腹中有片子或如鷄子又加三二指大所以作瀉糞如糟毛髮硬面無光或青黃色目多仄視當分水穀乃須溫和藥和氣即癒若藥熱則作腫而死

瀉而多食為蟲疳宜殺蟲藥瀉而少食為冷疳宜溫藥

虛羸

母氣不足則羸瘦肉極

小兒羸瘦不生肌膚皆為脾胃不和不能飲食故血氣衰弱不能榮於肌膚也挾熱者即溫壯身熱肌肉微黃其挾冷者即時時下痢唇口青白

小兒經諸大病或驚癇或傷寒或溫壯而服藥或吐利發汗病癒之後氣血尚虛脾胃猶弱不能傳化穀氣以榮身體故虛羸也

更當審其形色察其見證如面赤多啼心之虛羸也面青目劄肝之虛羸也耳前後或耳下結核肝經虛火也頸間肉裏結核食積虛熱也面黃痞滿脾之虛羸也面白氣喘肺之虛羸也目睛多白腎之虛羸也仍審相勝而藥之又寒熱二虛不可不辨若腹痛瀉利清白不渴喜熱此屬寒證雖在夏月宜木香丸身熱煩躁瀉利焦黃作渴喜冷此屬熱證雖在冬月宜胡黃連丸皆拾時從證之治法也

丁奚

小兒丁奚病者由哺食過度而脾胃尚弱不能磨消故也哺食不消則水穀之精滅損無以榮其氣血致肌肉消瘠其病腹大頸小黃瘦是也若久不差則變成穀癥傷飽哺露病一名丁奚三種大體相似輕重立名也

凡小兒或因吐而瀉久不差或病退不能行膝大腳小號曰丁奚七歲以下號鼓槌風十五以下名鶴膝風蓋此竝是風冷傷於腎所致腎主骨故也

疳腹丁奚辨證云小兒腹大如有青筋見即曰疳腹如無青筋乃名丁奚是因過飽傷食而得之

丁奚者亦久積成疳之證皆因飲食過傷於脾胃脾胃虛不能磨化飲食飲食漸減無以生其氣血面白色慘潮熱往來腹大而多青筋手足如筒顱顖開解頸項小而身黃瘦先投萬應丸次參苓白术散早晨一服與養胃氣及醒酲散進食食後下烏犀丸三粒至五粒助脾化食此即用迎奪之法間投醒脾散沉香檳榔丸木香枝术丸次第調理有渴瀉腹痛千金膏亦好若脾氣稍和飲食漸進再以化癖丸快活丸常服或用烏犀丸略下二三行勻氣散止補有寒熱往來柴胡飲主之腹脹按南星腹皮散有餘熱麥芽柳枝煎湯調三解散有蟲下史君子丸斯疾得之非一朝一夕然施治之法亦須漸漸令其平復欲求速效則難矣凡鷄酒羊麪魚鮮甘甜生冷毒物宜忌之

哺露

哺露者因乳哺不消脾胃衰弱漸不能食血氣減損肌肉不榮柴骨羸露咳吸苦熱謂之哺露也宜麝香進食丸

哺露者亦由乳哺不節損於脾胃脾胃損而飲食減形容羸瘦則臟腑之氣不能宣通若間有熱謂之哺露此候與丁奚相去不遠但食多吐逆臟氣虛冷而泄瀉無度糞中有蟲治法同前丁奚藥惟加養臟湯服之

樓英醫學綱目

十二無辜疾證

天弔　鵝口　水舌　惡癉　重齒　馮係噤

臍風　撮口　重舌　乳漏　龜胃　著噤

五疳

心疳者苦要驚啼常只喫水少食字味耳邊有青脈舌上有焦點者不治

肝疳者目帶青左脅下硬多吐沫服頭黑者不治

脾疳者肚大青筋脅口無血色人中平下痢不止者不治

肺疳者咳逆氣急瀉白水身上黑斑者不治

腎疳者要喫醎酸喫水不住小便如粉汁齒黑有瘡骨出耳乾腦焦不治

小兒衛生總微論方

五疳

小兒疳病諸論叢雜唯五疳之說爲當其證候外則傳變不同內則悉屬五臟一曰肝疳其候搖頭揉目白膜遮睛遍身多汗喜覆面而臥眼中瀝瘡色澤青黃髮豎頭焦筋青腦熱腹中積聚下痢頻多日漸羸瘦二曰心疳其候渾身壯熱頰赤面黃心胃腦脘煩躁滿悶口舌生瘡盜汗多驚下痢膿血神彩衰耗三曰脾疳其候腹大如鼓上多筋脈喘促氣粗心腹壅脹多啼咳逆水穀不消唇口乾燥好食泥土情意不樂憎明好暗痢多酸臭肌肉內消形枯力劣甚則大肉陷下四曰肺疳其候咳嗽氣逆皮毛焦落咽喉不利揉鼻咬甲口鼻生瘡腹內氣脹乳食不進大腸不調泄痢不常憎寒體慄黃中米出洞下白沫五曰腎疳其候上熱下冷寒熱時作齒齗生瘡耳焦腦熱手足逆冷吐逆滑泄下部生蟲脫肛不收夜啼饒哭漸成困重甚則高骨乃敗小兒疳疾乃與大人勞瘵相似故亦名疳勞大人勞者因腎臟虛損精髓衰枯小兒疳者因脾臟虛損津液消亡病久相傳至五臟皆損也大人勞瘵骨削而氣耗小兒疳疾腹鼓而神羸以其病之始也其臟之傳受不同故也至於傳入五臟皆損則一也故五損者經言一損於皮毛皮聚毛落肺也二損於肌肉肌肉消瘦飲食不爲肌肉脾也三損於血脈血脈虛少不能榮於臟腑心也四損於筋筋緩不能自收持肝也五損於骨骨痿不能起於牀腎也病極則大肉陷下高骨敗壞以至死矣凡小兒有疾多是上下所壞小兒臟腑嬌軟易虛易實一切於諸病候行轉下攻脾胃虛弱津液內耗皆能成疳且如潮熱日中時發者是脾臟虛心臟實[illegible]之而內發其熱法當先補其肝母[illegible]肝實而後瀉心心得母氣則平而潮熱乃愈醫見潮熱妄謂其實便以大黃牙硝等冷藥利之利既多而不能禁則津液內亡漸成疳也又如癖病發作寒熱伏水脅下有形而硬痛法當用藥漸消磨之醫見有癖便以巴豆硇砂輩驟下之下既多而津液耗則漸成疳也又如傷寒五六日之後有下證因以冷藥下之太過致脾胃虛而津液耗即便引飲不止而熱生如此則熱氣內耗於津液肌肉外消而羸瘦他邪相干證變百端亦因成疳也又如吐瀉病久津液耗亡亦能成疳又如小兒食肥甘物多因傷爲積則蘊蒸發熱津液內耗亦能作甘故甘即疳也聖濟經云肥甘之過積爲疳黃乃謂是矣故諸病皆能成疳也凡疳之候眼濇多困或生白膜唇口淡白身色黃黑食泥土生米喜臥冷地疥癬頭瘡洞泄青白黃沫下痢膿血腹滿喘咳耳鼻生瘡髮稀作穗頭大項細肚大青筋脚手垂攣瘦瘠飲水筋瘠骨重形劣廷羸皆其證也本因脾虛津耗久則傳變而成傳緩者則爲慢疳傳緊者則爲急疳又當辨認冷熱肥瘦其肥熱疳者乃因食肥甘積聚生熱而作故多病於初也治用黃連丸其瘦冷疳者乃因轉下瀉痢生冷而作故多病於久也用木香丸通治冷熱疳者用如聖丸凡治小兒之病必量虛實冷熱不可妄行轉下恐變生疳也若病初之脾虛津少發渴欲飲者當生胃中津液前錢氏白朮散與服

諸蟲

經言人臟腑中有九蟲內三蟲偏能發動爲病人臟腑實強則不能爲害若臟腑虛弱則蟲所動而生焉故經亦別立三蟲之名一曰蚘蟲又曰長蟲居胃脘之間動則令兒吐青白沫或吐清水心腹刺痛若蟲貫心者即死二曰蟯蟲居洞腸之間多則發動爲痔瘻蟲蝕瘡疥癩三曰寸白蟲居腸胃之間動則損人精氣令腰脚痛弱更有一蟲形若細絲或如馬尾故俗呼馬尾蟲此蟲不在九蟲之數或云飲食中誤嚥油髮所變亦居胃中動則令兒腹中攪刺發痛不可忍受小兒蟲動者多病於諸病之外蓋因藏腑虛弱故也患疳勞吐瀉者尤甚治法用藥唯每於月初四五日間在五更時服之至日午前蟲即盡下矣後以平調藥一兩服和之不可多也

虛羸

小兒虛羸者由諸病之後或誤行轉藥或吐而利致脾胃虛弱不能傳化穀氣飲食不入肌膚消瘦乃成虛羸也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百六十四卷目錄

醫部彙考四百四十四

小兒諸疳門二

方一

藝術典第四百六十四卷

醫部彙考四百四十四

小兒諸疳門二

方一

木香　沉香　青皮去白各一錢　韋牛二錢炒肉豆蔻一箇麪裹煨

右爲細末酢麪糊圓如麻大二三歲兒服三粒五六歲服五七粒濃煎蘿蔔湯下

上村杖散

治小兒疳瘦

黃芪　人參　白茯苓

右等分爲末每服一錢水一盞煎至六分呷之不拘時

疏治潭繩加白朮

肥兒丸

治食積五疳頸項結核髮搐成穗發熱作渴無度等證

川黃連炒　神麯炒　廣木香各一兩五錢

檳榔二十箇　肉豆蔻二兩泡　史君子酒浸

麥芽各四兩

右爲末麵糊丸麻子大每服二五十丸米飲下食久用五味異功散一服以助胃氣

九味蘆薈丸

治小兒肝脾疳積體瘦熱渴大便不調或瘰癧結核耳內生瘡等證

蘆薈　胡黃連　黃連　木香　蕪荑炒　青皮

白雷丸　鶴虱草各一兩　麝香三錢

右爲末蒸餅糊丸麻子大每服一二錢空心白湯下

王肯堂曰愚按前方肝脾疳積食積發熱日生雲腎或疳熱頸項結核或耳內生瘡肌體消瘦發熱作渴飲食少思肚腹膨脹或牙齦蝕落頰顋腐爛或陰囊玉莖生瘡或臍脅小腹作痛並效內青皮以龍膽草代之麝香不用尤效

黃連丸

治疳勞疳渴乾疳

川黃連五錢膽汁浸曬　瓜蔞根　烏梅肉

杏仁浸去皮焙　石蓮各二錢

右爲末牛膽汁浸糊丸麻子大每服一二十丸煎烏梅薑蜜湯下

木香丸

治冷疳

木香　青黛　檳榔　肉豆蔻　麝香各一錢半

縮隨子一兩去油　蝦蟆三箇燒存性

右爲末蜜丸菉豆大每服三五丸薄荷湯下

湯氏曰小兒冷疳多渴喜臥冷地煩躁啼叫飲食不進漸成羸瘦其候難治有若熱證但大便滑泄百藥不效是也因一女子百藥俱試而無偶中者竟與錢氏木香丸不數服而愈自後凡有此證無不獲驗

薛己曰前方消疳清熱逐水破氣之劑然云冷疳者乃陽氣虛而脾胃冷也其檳榔縮隨子恐導損眞陰尅伐陽氣治當審之

胡黃連丸

治熱疳

胡黃連　黃連各五錢　硃砂二錢另研

右爲末塡入豬膽內以線扎定再用杖懸掛銚中淡漿水煮數沸取出研爛入蘆薈麝香各二錢飯糊丸麻子大每服一二十丸米飲下

一方加蝦蟆半兩不燒

薛己曰愚按前證當以本方爲主佐以四君子加蕪荑脾胃虛甚者以四君子加蕪荑爲主以前九爲佐

如聖丸

治冷熱疳瀉

胡黃連　川黃連　白蕪荑炒各二兩五錢　眞麝香五分另研　乾蝦蟆五箇酒煮杵膏

史君子肉一兩

右爲末以蝦蟆膏杵丸麻子大每服一二十丸煎人參湯下

薛己曰愚按疳之爲患乃肝脾虛熱津液乾涸之證前方乃專於治疳清熱之劑若脾胃虛弱者當佐以六君子湯調補脾胃使邪氣退庶可收全功也

蘭香散

治鼻疳赤爛

蘭香葉二錢燒灰　銅青　輕粉各五分

右爲末乾貼

白粉散

治諸疳瘡

海螵蛸三分　白芨二分　輕粉一分

右爲末先用漿水洗拭乾貼

薛己曰按前二方治表之藥如未愈用四味肥兒丸以治其內

四味肥兒丸

治嘔吐不食腹脹成疳或作瀉不止食積脾疳目生雲翳口舌生瘡牙根腐爛發熱瘦怯遍身生瘡小便澄白腹大青筋一切疳證

黃連炒　蕪荑炒　神麯　麥芽炒各等分

右爲末水糊丸桐子大每服一二十丸空心白滾湯下

蟾蜍丸

治無辜疳證一服虛熱退二服煩渴止三服瀉痢愈

蟾蜍一枚夏月溝渠中取腹大不跳不鳴身多癩者

右取糞甕一枚置桶中以尿浸之却將蟾蜍跌死投與蛆食一晝夜用布袋盛蛆置急流中一宿取出瓦上焙乾爲末入麝香一字粳米飯丸麻子大每服二三十丸米飲下其效如神

蕪荑散

治蟲動口內流涎

白蕪荑　乾漆炒各等分

右爲末每服五六分米飲下

安蟲散

治蟲動心痛

胡粉炒黃　檳榔　川楝子　鶴虱各三錢

枯白礬二錢五分

右爲末每服五六分痛時米飲調下

薛己曰按蟲動之因多爲胃氣虛弱或聞飲食氣味而動前二方乃化蟲之劑若因脾胃虛弱者須當調補中氣

大蕪荑湯

治小兒脾疳少食發熱作渴大便不調髮黃脫落面黑便青鼻下生瘡能乳嗜土等證

蕪荑　山梔各五分　黃蘗　甘草　黃連

防風各二分　麻黃　羌活　柴胡各三分

白朮　茯苓　當歸各四分

右作二劑水煎

王肯堂曰前方治黃疸土色爲熱爲濕當小便不利今反利者知黃色爲脾胃經中大熱髮黃脫落知膀胱腎俱受土邪乃濕熱之證鼻下作瘡者土逆行營氣伏火也能乳者胃中有熱故也喜食土者胃氣不足也面色黑者爲寒爲痹大便青屬寒褐色血黑色熱蓄血中間黃色腸胃有熱治法當滋營潤燥內除寒熱外致津液

祕旨補脾湯

治久病面黃肌瘦咳牙目斜頭髮稀少誤藥所致

人參　白朮各一錢　白芍酒炒　白茯各八分

陳皮　川芎各六分　炙甘草　黃芪蜜炙

當歸各四分酒洗

右每服二三錢薑水煎

大黃煎（崔知悌方）

治小兒無辜閃癖癥瘕或煩乾黃聳或乍痢乍瘥諸狀多者

大黃九兩錦紋新實者若微朽即不中用削去皮搗篩爲散以好米醋三升和置瓦盆中於大鍋內浮湯上炭火慢煮候至成膏可丸乃貯器中

右三歲兒一服七丸梧子大日再服以下出青赤膿爲度若不下或下少稍稍加丸若下多又須減之病重者七八劑方盡根此藥惟下宿膿不令兒利也須禁食毒物乳母亦禁之一加木香一兩半

猪肚黃連丸 直指方

小兒疳熱流注遍身瘡蝕或潮熱肚脹作渴

猪肚一箇洗淨宣黃連五兩切碎水和納入肚中縫定放在五升粳米上蒸爛

右石臼搗千杵或入少飯同杵丸菉豆大每服二十丸米飲下仍服調血清心之藥佐之蓋小兒之病不出於疳則出於熱常須識此

天麻丸 原機啓微下同

治小兒肝疳風疳疳眼

青黛　黃連　天麻　五靈脂去石　夜明砂炒

川芎藭　蘆薈各一錢　龍膽草酒拌炒焦

防風　蟬蛻各一錢半　全蠍三箇　麝香少許

乾蟾頭二錢炙焦

爲末猪膽汁浸糕丸如麻子大每服十丸薄荷湯下

二草散

治小兒疳眼睛疼并赤眼腫痛

甘草　龍膽草酒炒　當歸　細辛各一錢

爲末三歲兒一錢水半盞砂糖少許煎三分食後服

生熟地黃散

治小兒疳蝕眼患閉合不開羞明畏日或生內障

生地黃一兩　熟地黃一兩　麥門冬去心半兩

當歸　枳殼米泔洗炒　防風　杏仁　甘草

赤芍藥各二錢半

爲末每服三二錢黑豆七粒煎豆熟去柤服之

茯苓燥濕湯

治小兒易饑而渴瘦瘠腹脹不利作響響聲目病生瞖睫閉不開眵淚如糊久而膿流俗謂之疳毒眼

人參一分　柴胡四分　白朮　茯苓　薄荷

炙草　蔓荊子　枳殼各二分　澤瀉分半

前胡　蒼朮　獨活　川芎三分　羌活三分半

作一服水一盞煎至七分去滓稍熱服

右方爲小兒寒暑不調而釀成此證夫寒暑飲食不節皆能傷動脾胃脾胃陰陽之會元也故清陽下而不升滯陰上而不降今以白朮人參先補脾胃爲君柴胡甘草枳殼輔上藥補脾胃爲臣蒼朮燥濕茯苓澤瀉導濁陰下降爲佐然後以羌活獨活防風蔓荊子前胡川芎薄荷諸主風藥以勝濕引清陽上升爲使此正治神效之方也

升麻龍膽草飲子

治小兒疳眼流膿生瞖濕熱爲病

升麻二錢　麻黃一錢半　炙草　穀精草

蛇退　鬱金各半錢　黃芩　羌活　龍膽草

青蛤粉各三錢

爲細末每服二錢熱茶清濃調服

右方君以升麻足陽明胃足太陰脾也臣以羌活麻黃風能勝濕也佐以甘草承和上下穀精草明目退瞖蛇退主小兒驚疳等疾使以青蛤粉治疳止利川鬱金補血龍膽草療眼中諸疾黃芩除上熱目內赤腫火炒者妙龍膽草性已苦寒恐重之則又過於寒也

胡黃連丸 平治會萃

治疳病

胡黃連半錢去果積　阿魏一錢半酢煮去肉積

神麯炒去食積　黃連各二錢半炒去熱積

麝香四釐

右爲末猪膽汁丸如黍米大每服二十丸白朮湯下

大肥兒丸 癘瘍機要

治脾疳飲食少思肌肉消瘦肚大頸細髮稀成穗項間結核發熱作渴精神倦怠便去酸臭愛食泥土或口鼻頭瘡或肚見青筋嚙齒下痢便白五疳即四味肥兒丸加乾蟾一兩蕪荑五錢

雄黃解毒丸 片玉心書

下痰去熱追蟲打積

雄黃一錢另研　鬱金三錢　巴豆霜二錢

共爲末米糊丸如粟大

痰涎壅甚竹葉湯下

積痛茴香湯下

纏喉風白水化開吐痰

蟲痛苦楝子根白皮湯下

蠍虎丹 奇效良方

治一切疳瘦下痢證候全備及無辜疳毒如邪病者

乾雄蠍虎一箇微炒　蝸牛殼　蘭香根　靛花

雄黃　麝香各一分　龍腦半分

右各爲末米醋煮糊丸黍米大每用脂麻湯下十丸日三服取效

肥兒丸 嬰童百問下同

治疳多因缺乳食肉太早或患臟腑胃虛療諸般疳化蟲治黃瘦肚急消疳可常服之退疳熱

黃連局方加肉豆蔻　陳皮去白局方用木香

神麯局方有史君子　麥芽各一兩局方加稜术

白蕪荑半兩局方用檳榔　川楝子一兩去核炒

右爲末神麯糊丸麻子大每服三十丸空心米飲吞下

又

三稜　蓬术　川楝子　龍膽　黃連各四錢

柴胡　地骨皮各半兩　枳殼麩炒　麥芽

當歸各三錢　白蕪荑二錢　蘆薈　木香各一錢

右爲末神麯糊丸麻子大每服三十丸米飲下

胡黃連丸

治嬰兒一切疳疾及一切虛痢他藥無功此藥極效

胡黃連　川黃連　蘆薈　肉豆蔻煨　桂心

人參　硃砂　麝香　史君子　木香　釣藤

龍齒　白茯苓各等分

右爲末取獖猪膽兩枚裂汁和末令勻却入袋內盛之以繩扎定湯煮半日取出切破袋子更入莨菪子二錢微炒黃丹一錢二味別研如粉入前藥和勻搗五百杵爲丸如菉豆大但是疳與痢用粥飲下五七丸幼者三丸不喫粥飲乳頭令吻能治一十二種疳痢及無辜疳之證功效非常

吳希亮疳方

治一切疳

三稜煨　蓬术煨　神麯炒　麥芽炒各半兩

青皮　陳皮　烏梅肉　蕪荑仁　胡黃連

百草霜　雷丸各三錢　元胡索　甘草各二錢

巴豆五十粒

右爲末合了先用一兩入巴豆五十粒丸麻子大每服五七丸米湯下大小以意增減加川楝子史君子亦可

地黃丸

治腎疳

熟地黃八錢　赤茯苓　山茱萸肉　當歸

川楝肉　丹皮　山藥　澤瀉　史君子各三錢

右爲末蜜丸如桐子大每服三丸溫水化下

生熟地黃湯

治疳眼閉合不開內有濛霧

生地黃　熟地黃各半兩　川芎　赤茯苓

枳殼炒　杏仁水浸去皮　川黃連　半夏麯

天麻　地骨皮　甘草炙　當歸各二錢半

右剉碎每服二錢薑三片黑豆十五粒水一盞煎至六分空心溫服

脾積丸

治疳極妙

山楂子青者多用　香附子　烏藥　紫金皮

砂仁　生甘草各等分

右爲末山楂子生用搗碎成末米糊丸桐子大米飲下三五十丸大人小兒皆可服

嚏疳散

治疳

蘆薈　川黃連各一錢　瓜蔕　猪牙皂角

蝦蟆灰各半兩　麝香少許

右末吹入鼻內嚏出可療

脂連丸

治五疳潮熱肚脹髮焦

胡黃連　五靈脂

右爲末獖猪膽汁丸麻子大每服十五丸米飲下

五疳潮熱愼勿用大黃黃芩

五疳良方

川黃連　蕪荑仁　神麯炒　麥芽炒　陳皮

木香　蝦蟆灰各一兩　史君子三十個煨去殼

生肉豆蔻二箇　雞心檳榔二箇　麝香一字

右爲細末雄猪膽二個取汁入好酒打清麵糊丸芥子大每服十五丸米飲下

茯苓丸

治心疳與驚疳

茯苓　蘆薈　琥珀研　黃連淨　赤茯苓

釣藤皮　遠志肉薑製焙乾　蝦蟆灰各二錢

石菖蒲一錢　麝香少許

右爲末粟米丸麻子大每服十丸薄荷湯下

神效換肌丸

治小兒脾疳肌瘦潮熱盜汗飲食易傷臟腑不調泄瀉糟粕不化頭大腹急

川黃連炒　鼈甲酒炙　肉豆蔻煨　史君子

神麯炒　麥芽炒各半兩　眞麝香另研半錢

訶子肉一錢半

右爲末麵糊丸如芥子大米湯下量大小加減

地黃清肺湯

治肺熱疳蟲咳嗽氣逆多啼壯熱惡寒

桑白皮炒半兩　紫蘇　前胡　防風　赤茯苓　黃芩　天門冬去心　當歸　連翹　桔梗　生地黃　炙甘草各二錢五分

右剉每服二錢水煎食後服

靈脂丸

治脾疳食疳

白豆蔻　麥芽炒　五靈脂　縮砂仁　蓬木煨　青皮　史君子　橘紅　蝦蟆炙焦各二錢

右爲末米糊丸麻子大每服十丸米湯下

下蟲丸

治疳蝕諸蟲

苦楝根皮酒浸焙　綠色貫衆　木香　蕪荑焙　桃仁　檳榔各二錢　鶴虱炒　輕粉各半錢　乾蝦蟆炙焦三錢　史君子五十箇煨取肉

右爲末飛麵糊丸麻子大每服二十丸天明清肉汁下

治脊疳兼疳勞加當歸川黃連各二錢半

龍膽丸

治腦疳腦熱餅瘡

龍膽草　川升麻　苦楝根皮　赤茯苓　蘆薈　防風　油髮灰各二錢　青黛　黃連淨各三錢

右爲末猪膽汁浸糕丸麻子大每服二十丸薄荷湯下食後仍以蘆薈末入鼻

香蔻丸

治疳瀉

黃連三錢炒　生肉豆蔻　木香　訶子煨　砂仁　茯苓各二錢

右爲末粳飯丸麻子大每十五丸食前米飲下

木香丸

治疳痢冷熱不調五色雜下裹急後重

黃連淨三錢　木香　紫厚朴薑汁炒　砂仁　夜明砂隔紙炒各二錢　訶子肉一錢半

右爲末粳米飯丸麻子大每服十五丸乾艾葉生薑煎湯食前溫服

褐丸子

治疳腫脹

萊菔子炒一兩　陳皮　青皮去白　檳榔　黑牽牛取淨半生半炒　五靈脂　赤茯苓

蓬木煨各半兩　木香二錢半

右爲末麵糊丸如菉豆大每服十五丸紫蘇葉白湯送下

黃芪湯

治疳勞咳嗽不定虛汗骨蒸渴而復瀉乳食遲進而不尅化

黃芪蜜炙　當歸　川芎　白芍藥　生地黃　蝦蟆去足炙焦　鼈甲酢炙焦各三錢　人參　白茯苓　陳皮　半夏麴　柴胡　史君子　甘草炙各一錢

右剉散每服二錢薑棗煎食前服

鼈血煎

治疳勞

白蕪荑　柴胡　川芎各一兩　人參半兩　史君子二十一箇　胡黃連　川黃連各一兩

右用鼈血一盞吳茱萸一兩拌和二黃連淹一宿次早炒乾揀出茱萸竝血只用二連同餘藥末粟米飯糊丸麻子大每二十丸食前服

蚵蛾丸

治無辜諸疳一服虛熱退二服煩渴止三服瀉痢住

蟾蜍一枚夏月溝渠中取腹大不跳不鳴其身上多癩磊者　胡黃連三錢

右取糞蟲一杓置桶中以尿浸之桶上要乾不與蟲走却將蟾蜍打死頓在蟲中任與蟲食一日一夜次以新布袋包繫定置之急流水中浸一宿取出瓦上焙乾共爲末入麝一字研勻採飯糊丸麻子大每二三十丸米飲下（本集胡黃連一名蚵蛾丸一名蟾蜍丸）

君朴丸

治小兒諸疳小便白濁久則黃瘦不長肌肉

史君子煨　厚朴製　黃連各一兩　木香三錢

右爲末糊丸如小豆大三歲三十丸米湯下三五服效

紫霜丸

治小兒因母復胎致有寒熱羸瘦曰繼病

代赭石煅醋淬七次　赤石脂研末各一兩　杏仁去皮尖　巴霜去油各五十枚

右先將杏仁巴霜入乳鉢內細研如膏却入代赭石脂末研勻以湯浸蒸餅爲丸如粟米大一歲服五丸米飲吞下一二百日內兒三九乳汁下更宜量其虛實加減微利爲度此藥兼治驚疫諸疾雖下不致虛人

益黃散
治小兒吐瀉脾虛不食米穀不化困倦力少滑腸夜起并疳虛盜汗并治涎唾流出
陳皮一兩　丁香二錢一用木香　訶子炮去核　青皮去穰　甘草炙各半兩
右爲末每服二錢水一盞煎三分食前服

消乳丸
砂仁　橘皮　三稜炒　蓬术炒　神麯炒　麥芽炒各半兩　香附子炒一兩
右爲末麵糊丸麻子大食後白湯送下

龍膽湯
治小兒因乳母復受胎孕令兒漸漸消瘦骨立毛竪竟成瘵疾名曰慰病此方大效
龍膽草　釣藤鉤　柴胡　黃芩　白芍藥　茯苓　生甘草各半兩　蜣螂二枚去翅足炙
大黃煨二錢半
右剉散每服二錢水一盞煎半盞服之以漸加服得利卽止

直指方加防風麥門冬以導心熱黃芩減半北棗煎服去蜣螂亦可

十全丹
治丁奚哺露
青皮　陳皮　川芎　五靈脂　蓬术　白豆蔻　檳榔　蘆薈各半兩　史君子焙　蝦蟆灰
木香各三錢
右爲末猪膽汁浸糕糊丸麻子大每二十丸米飲下

有熱薄荷湯下

又
治丁奚哺露
檳榔　枳殼麩炒　青皮　陳皮　三稜煨　蓬术煨　砂仁炒各半兩　丁香二錢五分　木香二錢　香附一兩炒
右爲末神麯糊丸黍米大空心食前下一百丸

消食丸
治小兒乳哺飲食取冷過度冷氣積於脾胃胃爲水穀之海脾氣磨而消之胃氣調和則乳哺消化脾傷於冷則宿食不消此藥寬中快氣消乳食正顏容
縮砂仁　橘皮　三稜煨　蓬术煨　神麯炒　麥芽炒各五錢　香附炒一兩
右爲末麪糊丸菉豆大食後紫蘇湯下二十丸

龜甲丸
治小兒無辜疳腹中毒氣四肢瘦弱
龜甲酢塗炙令黃去裙襴　黃連　枳殼麩炒
夜明沙微炒各一兩　訶黎勒二枚一生一熟　麝香一字　蝟皮一枚微炙
右爲末煉蜜丸如菉豆大每以粥飲下五九日三服量兒大小加減服之

蒸雞丸
治小兒疳勞骨蒸潮熱盜汗瘦扇腹急而黃食不生肌肉日夜啼多渴少食
黃連二兩　鷄虱　薤黃各半兩　柴胡　秦艽　知母　丹參　史君子去殼一兩
右爲末黃雄鷄一隻約斤餘籠之專以火麻子飼之至五日後去毛令淨於背上開孔去腸肚淨拭乾令前藥入雞腹內以線縫之小甑先以黑豆鋪甑底厚三寸安雞在甑中四旁將黑豆圍裹上以黑豆蓋之自日出蒸至晚候溫冷取鷄淨肉研和得所如硬入酒麪糊同藥末爲丸如小豆大二歲二十丸以意加減米湯下無時如十五歲以溫酒送下忌食猪肉雌鷄肉

黃雞煎丸
柴胡　知母　秦艽　川楝肉炒　宣連各一兩　胡連　蘆薈　鷄虱　蕪荑　檳榔　丹參　川芎　神麯　麥芽炒　青皮　五靈脂各半兩　史君子肉一兩半　水銀粉一錢　麻子五兩　黑豆五升
右藥依前方修合

梅肉丸
治小兒諸疳煩渴飲水不止
龍膽草　定粉　烏梅肉炒　黃連蒸各等分
右爲末煉蜜丸黍米大每服二十丸溫水送下

竹葉湯
治傷寒裏俱虛及諸煩不安
石膏二兩　半夏四錢　人參　甘草各二錢　麥門冬六錢
右剉散每服二錢水一盞青竹葉生薑各四片粳米七十粒同煎

嘔加竹葉生薑

四君子湯

治榮衛俱虛臟腑怯弱不食瀉痢

人參　茯苓　白朮　甘草各等分

右爲末每服二錢水一盞煎七分通口服不拘時

鹽少許白湯點服溫和脾胃進飲食辟寒邪障霧氣

參苓白朮散

治脾胃虛弱飲食不進多困少力煩滿痞噎心忪氣喘嘔吐泄瀉及傷寒咳嗽此藥中和不熱久服養氣育神醒脾悅色順正辟邪

白扁豆斤半薑汁浸去皮微炒　人參　白茯苓　白朮　甘草炙　山藥各二斤　蓮肉　桔梗　薏苡仁　砂仁各一斤

右爲末每服二錢棗湯調下小兒量大小加減

橘連丸

治瘦久服消食和氣長肌肉

廣陳皮　黃連各一兩去鬚

右爲末別研入麝半錢用猪膽七箇分藥入膽內將水煮候臨熟以鍼微劃破以熟爲度取出以粟米粥和丸如菉豆大每服二三十丸米飲下量大小與之無時

快活丸

治脾胃虛弱雖進乳食則遲化而中滿嘔吐肚急面黃肚疼臟腑不調寬中快膈亦治大人十噎五隔並宜服之

檀香　益智仁　蓬朮各五錢　三稜一兩　砂仁　薑黃　甘松　白豆蔻　甘草各一兩半　陳皮七錢　香附子三兩

右爲末滴水丸麻子大每服三五十丸薑湯白湯任下

全胃湯　明醫雜著下同

治小兒大病後面黃肌瘦目時動齒微咬髮稀少未能大行因誤服解表瀉利傷尅諸藥而致者宜長緩調理復全胃氣

白朮一錢二分　白芍藥酒炒　白茯苓各八分　人參　陳皮　川芎各六分　炙草　黃芪蜜炙當歸酒洗各四分　半夏　山楂各六分

右用薑棗水煎服

白朮湯

治小兒大便色泔白及小便濁或澄之如米泔者此疳病也

白朮　黃連薑汁炒　白茯苓　澤瀉　山楂　白芍藥炒各一錢　青皮四分　甘草三分

右薑水煎服

薛己曰按前證若因脾氣虛而兼濕熱者宜用四味肥兒丸若兼泄瀉當以白朮湯間服

治疳丸

小兒要藥

胡黃連　蘆薈　史君子　黃連炒各五錢　神麯炒一兩　真阿魏　青黛淨二錢另研　麝香少許另研

右爲末稀糊丸黍米大每服十九清湯下

薛己曰按前方乃肝脾疳證之藥也或內疳或疳發於外亦效蓋疳乾也或因喘食太早或因恣食甘肥或因峻劑重亡津液虛火上炎或因乳母飲食起居七情勞役所致

清中解鬱湯

治小兒脾弱飲食停滯鬱熱生痰或身發赤暈

白朮　茯苓　陳皮　山梔炒　山楂　神麯炒　麥芽炒　川芎　桔梗　甘草炒各五分

右每服二錢水煎

芫蜂湯　證治準繩下同

治小兒稟弱疳瘡出不快者及肝虛目視不明

黃芪一兩蜜水塗炙　當歸酒洗焙乾　白芍藥　川芎各半兩　甘草各三錢炙

右件㕮咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

熊膽天麻丹

治風疳羸瘦搖頭揉目百脈拘急

天麻　羌活　真熊膽　蟬殼　史君子去殼　胡黃連各一兩　蘆薈　乾蟾酥炙黃各半兩

右件搗羅爲細末粳米飯和如黍米大每服十粒煎荊芥湯下量兒大小加減

人參散

補虛調胃氣進乳食止吐瀉

人參　白茯苓　白蓮子肉去心炒各一分　黃芪半兩搥蜜炙　炙草二錢

右爲末每服嬰孩一字二三歲半錢四五歲一錢以水一蓼注或半銀盞入棗子半片煎十數沸服

肝疳方

莊氏第六候頭面生瘡毛髮稀焦

肉豆蔻　蝟灰全者各一箇　桔梗　茯苓煨　大黃煨各一兩　龍腦　麝香各一錢

右爲末軟飯丸麻子大粟米飲下三丸只可兩服

通神丸

治小兒手足動眼目不開有時自笑或即嗔怒兼多驚手指甲青狀形似死人妄稱天釣

茯苓　龍齒煅半兩　鉛丹　胡黃連各一分

銀箔五片　麝香一錢　釣藤一兩煅

右爲末煉蜜丸麻子大每十丸米飲下莊氏第二十二候用此方

金箔茯苓散

第三風疳小兒手足拘攣眼目不開有時自笑或嗔怒驚叫手爪甲青狀似鬼形又似天釣須服此

金箔五片　茯苓　牛膝　胡黃連各一兩

龍骨一分　木香　麝香各一錢

右件爲末每服一字米飲下日二服忌油膩

硃砂安神丸

治心疳怔忡胷中痞悶

硃砂四錢　黃連　生地各半兩　甘草二錢半

蘭香葉二錢燒灰　銅青　輕粉各五分

右爲末乾敷上

茯神湯

治心氣不足虛而驚悸日常煩哭及嬰孩生下羸瘦多驚宜子母同服自然有效

茯神一兩　人參　當歸酒洗各半兩　炙草二錢

右件㕮咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

有微熱煩躁入麥門冬去心同煎

張澐參黃丹

治驚疳挾熱夜臥驚悸

乾蝎二十一箇微炒　天漿子一十四箇乾者微炒

人參　胡連各一兩　天竺黃半兩俱爲末次入

青黛　硃砂各一分　龍腦一錢並細研

右件一處拌勻煉蜜和如黍米大每服十粒人參湯下量兒大小加減

天竺黃丹

天竺黃一兩細研　晚蠶蛾微炒　白殭蠶微炒

川黃連各半兩已上搗羅爲細末次用　青黛

硃砂　麝香各一分並細研

右件拌勻粳米飯和如黍米大每服七粒至十粒煎人參湯下量兒大小加減

硃砂丸

仙人水鑑治小兒驚疳五歲至十五歲並宜服之

硃砂研飛三錢　青黛研淨一兩　川黃連

鬱金爲末　夜明砂炒焦黑各半兩　麝香

熊膽用冷水一雞子多浸一宿各一錢

右同研如粉次入浸熊膽水和爲丸如菉豆大空心臨臥金銀箔薄荷湯下三丸至五丸切忌生冷油膩神效

眞珠散

治小兒心疳體熱黃瘦

眞珠製末　麥門冬去心各半兩　天竺黃

金銀箔各研五十片臨和加入諸藥末內　牛黃

麝香各細研　胡黃連　甘草炙　羚羊角屑

川大黃炒　當歸微炒　硃砂　雄黃　茯神

犀角屑各一分

右搗羅爲散每服以茵陳湯調半錢量兒大小服之

驚疳方

朱氏治小兒肚大項小

釣藤　甘草各二分　人參　瓜蔞各一分

右件爲末以水一茶椀入藥二錢煎取六合去滓重煎溫服

蘆薈丸

治五疳八痢心臟熱

蘆薈半兩　輕粉　青黛　墨　飛羅各一錢

史君子肉一個　蝸牛五箇和肉炒焦細研

麝香五分

右爲末細研滴水爲丸芥子大生地黃汁化下一丸至二丸薄荷湯下亦得莊氏第九候用此方

麝香丸

治小兒一切驚疳等病

龍膽草　胡連各半兩　木香　蟬脫各一錢

瓜蒂　龍腦　麝香　牛黃各一錢並細研

右猪膽爲丸如桐子及菉豆大驚疳或祕或瀉清米飲送下小兒五七粒至一二十粒

眼疳猪肝湯下

疳渴蠱猪湯下猪肉湯下亦得

驚風發搐眼上竄薄荷湯下一丸更水研一丸滴鼻中

牙疳瘡口瘡研貼

蟲痛苦楝根湯或白蘇煮湯送下

百日內小兒大小便不通木研封臍中

有蟲候乾漆麝香各少許并入生油一兩煎溫水

化下一大丸

慢驚勿服

睡驚丸

治小兒一切驚疳食積風癇之證

史君子五十箇燒　墨衆大一塊　金銀箔各七片

臘粉二錢

右先將史君子存性同墨研細次入金銀箔乳鉢內研次入臘粉并麝香少許研令極細稀糊丸如桐子大陰乾每服一丸薄荷湯磨下一歲以下半丸一名青金丹極效

妳疳方

治小兒因喫著患熱病妳次腹痛并及驚風毒奶便乃下痢吐逆

桃仁去皮尖炒　胡黃連炒各半兩　沉香

硃砂別研各一分　金箔五片

右爲末軟飯丸麻子大米飲下五九妳汁下亦得

莊氏第十一候用此方

進食方

治小兒胃疳

胡黃連　蘆薈各一分　肉豆蔻一箇　檳榔

乾蝦蟆炙各半箇　夜明砂半分炒　硃砂

麝香各半錢

右爲末煉蜜九菜豆大一歲一丸米飲下乳亦得如是疳盛次加二丸至三丸取下蟲屎爲驗五日一服

桃花丸

治小兒心臟積食熱生疳

寒水石一兩用炭火燒熟研　硃砂半錢細研

右合和如桃花色爲末浸蒸餅丸如粟米大冷水下三五丸服旬日自然安妙莊氏二十四候用此方

張渙木香煎

治食疳不知饑飽積滯內停腹大脚細痢下無度

木香剉　肉豆蔻去殼各一兩　乾蟾二箇酥炙

胡連　史君子肉　五靈脂各一兩已上末次用

巴豆七粒去油　麝香一分

右件藥同拌勻滴水於石臼中搗一二百下和如黍米大每服二粒至三粒溫生薑湯下乳食後看兒大小加減

檳榔丹

能食不生肌肉宜常服

檳榔劈裏煨麵乾爲度　木香　胡黃連各一兩

代赭石一分研已上羅末次用　麝香研一分

香墨燒存性細研一分

右件逼拌勻糯米飯丸如黍米大每服十粒煎橘皮湯下食後量小兒大小加減

肉豆蔻丹

肌瘦挾積常服尤佳

肉豆蔻去殼　史君子肉　青橘皮炒黃各一兩

牽牛子炒黃一分已上搗羅次入　蘆薈一分研

麝香一錢研

右件一處拌勻用糯米飯丸如黍米大每服十粒生薑湯下食後量兒大小加減

聖惠木香丸

治小兒食疳腹中多痛大腸或痢鼻瘡乾瘦時有體熱

木香　胡黃連　蟾頭炙令焦黃　麝香　蘆薈

青黛　雄黃各細研　香墨　熊膽各一分

史君子半兩

右件藥搗羅爲末煉蜜和丸如菜豆大每服以粥飲下五丸量兒大小以意加減

訶梨勒丸

治小兒食疳水穀不消心腹脹滿好喫泥土肌體瘦扇

訶梨勒皮三分　肉豆蔻一枚去殼　青黛

麝香　蘆薈　硃砂各細研　熊膽研入各一分

右件藥搗羅爲末都研令勻用酒煮粳米飯和丸如黍粒大每服以粥飲下三丸日二服量兒大小加減服之

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百六十五卷目錄

醫部彙考四百四十五

小兒諸疳門三

方二　桃花散　孔氏家傳方　大胡黃連丸　脾疳方　又　又　黃芪散　丹溪　小兒喫泥方　又　蘆薈丸　虎睛丸　褊蝉　散　張渙麝香丸　雄砂丹　五靈脂丹　胡黃連丸　張國材腸疳方　腸疳方　大蝟丸　張渙麝　腸散　德麟脊　立聖膏二　金散　腎疳方　五疳保童丸　曾氏蘆薈丸　腎疳方　濟至聖青金丹　雄黃丸　張渙夜明丹　莊氏五疳丸　王氏保童丸　趙氏家傳方　又　聖惠鱉甲散　吳氏黃芪飲　王粉散　二膚丹　梅肉散　芸葉湯　香甲丸　丹　溫脾湯　朴附丹　人中白散　珠砂　又方　外臺備急方　烏頭煎　蘆薈丸　田螺丸　乾蟾丸　聖惠方　嘉荷蟾丸　熊膽丸　麝香丸　定命散　青黛丸　胡黃連麝香丸　張渙三根散　史君子散　蘆薈丸　豬肚丸　桃柳湯　苦楝丸　聖惠金蟬散　地骨皮丸　蔻香丸　青黛丸　砂　又方　疳疹方　仙人水鑑方　龍腦丸　吹鼻　龍腦散　聖惠天竺黃散　莊氏追蟲方　安息丸　仙人水鑑方　又方　青黛丸　牛黃丸　胡黃連丸　青黛散　史君子丸　東垣厚腸丸　青黛散　張渙金粟丹　本事芍朴丸　消食散　聖惠木香丸　蘆薈丸　麝香散　胡粉丸　譚氏珠聖保命丹

醫部彙考四百四十五

小兒諸疳門三

方二

桃花散（證治準繩下同）

治小兒食疳腹脹

桃花一分　乾蟾塗酥炙令黃　肉豆蔻去殼　青黛細研　赤芍藥　紫笋茶各半兩

右件藥搗細羅爲散每服以溫粥飲調下半錢看兒大小臨時加減

孔氏家傳方

治小兒脾疳

胡黃連　史君子　五味子　檳榔各一錢　南木香半錢

右爲末粟飯丸如菉豆大飯後與五七丸日三服

大胡黃連丸

治一切驚疳腹脹蟲動好喫泥土生米不思飲食多瞘吼哇臟腑或瀉或祕肌膚黃瘦毛焦髮黃飲水五心煩熱能殺蟲進食兼治疳癬常服不瀉痢

胡黃連　川黃連去鬚　苦楝子肉各一兩　白蕪荑半兩秋初三錢　乾蟾頭燒存性研一分　麝另研一錢　青黛研一錢半　蘆薈另研一分

右先將前四味爲細末猪膽汁和爲劑每一丸如胡桃大入巴豆仁一枚置其中用油單紙一重裹之同米一升許蒸米熟爲度入後四味入麪少許糊丸如麻子大與十丸或十五丸清米飲下食後臨臥日三服

脾疳方

治小兒脾疳面黃多睡手足浮腫

桑白皮　漢防己　人參　茯苓　胡黃連　麝香各一分

右爲末煉蜜爲丸如麻子大用米飲下五丸一日二服莊氏第十候用此方

又

莊氏第二候脚細肚高胃前骨生愛喫泥土酸醎日久通身黃時時吐逆下痢腹內疼痛是脾疳宜服

虎睛一對焙　牛黃　硃砂　麝香各一分　桔梗半兩焙

右爲末煉蜜丸生薑湯下三九至五九

又

治小兒脾疳瀉血肚大氣喘

桑白皮　漢防己　人參　茯苓　胡黃連　丁香　白朮土炒　龍腦　乾蟾　胡黃連　夜明砂炒各一分

右爲末軟飯丸米粒大蕉荑湯下

又

治小兒通身黃瘦大小便結澀脾所召也

漢防己炒　甘草炙各一兩　桑白皮　木通　木香各半兩　檳榔一箇　胡黃連一分

右爲末每服一錢水七分盡生薑少許煎至五六分分溫二服莊氏第十五候用此方

黃芪散

治小兒疳氣進飲食

黃芪　五味子　厚朴薑汁炙　白朮　蒼朮

芍藥　甘草炙　陳橘皮　乾薑煨　乾蠍
當歸各一兩　木瓜二兩
右爲末每服半錢米飲調下
丹溪小兒喫泥方
石膏　黃芩　陳皮　茯苓　甘草　白朮
右爲散薑服
又
治小兒喫泥及臌肚
臙粉一分
沙糖和丸如麻子大空心米飲下一丸瀉出土瘥
蘆薈丸
治小兒驚風五疳莊氏第十九候愛餐生米甎炭
甎瓦是脾胃疳
蘆薈　胡黃連　牛黃　天竺黃　龍膽草
茯苓各半兩　龍腦　麝香　人參　川大黃
雄黃各一分　生犀角屑二分
右爲末煉蜜丸如菉豆大每服三丸薄荷湯下溫
酒亦得化下無妨
虎睛丸
小兒脾疳膏喫泥土日久遍身通黃醫人不識或
呼爲陰黃宜服此
虎睛一箇　眞牛膽黃二錢　桔梗　麝香
胡黃連各一錢
右件爲末煉蜜爲丸麻子大每服三丸食前米飲
下日二服
補肺散
治久患咳嗽肺虛氣促有痰惡心
阿膠一兩半剉炒　白茯苓　馬兜鈴去老梗
粳米各半兩　杏仁二十一粒湯泡去皮尖
甘草四錢炙
右剉每服二錢水一盞煎七分無時溫服
張溪麝香丹
治小兒肺疳皮毛枯燥咳嗽上氣
胡連一兩　半夏半兩湯洗七遍　紫蘇子微炒
五味各一分　乾蟾一枚酥炙黃已上羅末入
麝香　蘆薈　硃砂各細研一分
右件一處拌勻以棗肉和黍米大每服五粒至七
粒米飲下量兒大小加減
靈砂丹
因嗽成疳最宜服之
人參半兩去蘆　甜葶藶炒研　孕五靈脂
胡黃連各一分已上搗羅爲末入　辰砂半兩
蘆薈　麝香各研細　杏仁麩炒去皮尖各一分
右件一處拌勻以粳米飯和如黍米大每服十粒
煎人參湯下量兒大小加減
五靈脂丹
久嗽恐成疳常服尤佳
五靈脂半兩　蟾頭一枚酥炙黃　蟬殼微炒
款冬花各半兩已上搗羅爲細末次用　青黛
雄黃各細研一分
右件藥一處拌勻糯米飯和如黍米大每服十粒
煎人參湯下不拘時服量兒大小加減
胡黃連丸
治小兒肺疳不欲乳食時復腹痛
胡黃連　當歸炒　訶梨勒皮　木香各半兩
青皮　酥子　杏仁去皮尖麩炒微黃各一分
麝香一錢研
右件搗羅爲末用粟米飯和丸菜豆大每服三丸
以粥飲下量兒大小加減
張國材肺疳方
眞珠七十粒　辰砂半錢　人參　甘草各二錢
麝香半字　輕粉五錢　白附子一箇
右件先將人參甘草剉碎炒熟白附子炮爛末次
研入眞珠辰砂麝香輕粉勻舉每服半錢或一字
用金銀薄荷煎湯調服日進一服食後只三服肺
疳立愈
肺疳方
莊氏第三候鼻下赤爛愛揉眼衆血病是肺疳乃
因喫著乘熱物或病妳所損心肺之咳嗽更以
服涼冷藥過多便上熱下冷漸漸昏沉日夜煩哭
龍腦　硃砂各一分　釣藤　元參各一兩
胡黃連炮半兩　麝香一錢
右爲末煉蜜丸如黃米大米飲下三丸至五丸
大蟾丸
治小兒頭項細心腹脹滿皮膚乾皺毛髮焦黃鼻
下赤爛口舌生瘡瀉痢不止日漸羸瘦
大蟾一箇去四足劈開腹去肚腸入胡黃連一兩和
在內線縫合以濕紙三重裹用泥固濟四面令乾微
火出陰氣更用炭三斤燒令通赤即焦候冷淨去泥
土細研如粉入　麝香　熊膽　蘆薈各半兩
右一處細研如泥麵糊丸如麻子大米飲下三丸

乳汁亦得三歲以上加丸

諸疳方

理小兒五疳八痢腹脹羸瘦頭髮焦乾口鼻生瘡夜明沙用水淘五次焙　白蕪荑與黃連同炒焦　黃連各一兩

右爲末豶猪膽汁和丸如菉豆大三丸至五丸不計時候麥門冬熟水下如久患疳氣服藥無效或腹脹氣促不能飲食米飲下取出疳蟲卽瘥莊氏第八候用此方

調元散

主稟受元氣不足顱顖開解肌肉消瘦腹大如腫致語遲行遲齒生遲神色昏慢服之效

乾山藥五錢　人參　白茯苓　茯神　白朮　白芍　熟地　當歸酒洗　黃芪蜜炙各二錢半　川芎　甘草炙各三錢　石膏

右碎每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分無時溫服如嬰孩幼嫩乳母同服

九味地黃丸

治腎疳

熟地四錢五分　赤茯　山茱萸肉　川楝子　當歸　川芎　牡丹皮　山藥　史君子肉二錢

右爲末蜜丸桐子大每服八十丸空心溫酒下

張渙熊膽散

治急疳蟲傷臟腑上蝕口齒生瘡赤爛世呼爲走馬疳

莨菪子炒令微黑　蝦蟆灰　白礬各半兩　生硫黃一分已上搗末入　熊膽半兩細研　麝香　雄黃　蘆薈各一分並細研

右件藥一處拌勻爲細末每服一字煎荊芥湯調下如有瘡處宜薄敷之如鼻癢卽取少許逐日吹鼻中日三兩上

熊膽膏

截急疳病

熊膽半兩研　蚺蛇膽　蘆薈　牛黃各一分　龍腦　麝香各一錢並細研

右件藥都細研以井華水一小盞攪和勻以磁器盛重湯慢火熬成膏每服一豆大薄荷湯化下兼塗患處

一方加黃礬

立聖膏

治急疳侵蝕

人乳汁半合　黃礬一粟大　白礬一棗大　石膽一豆大

右件藥都研細以綿裹內乳汁中浸經一宿看汁有味慢火熬成膏每服少許塗於口裏如鼻中有瘡滴入少許若有腫處卽以三稜針刺破除去血然後卽塗此藥

二金散

治急疳盛毒

砒霜一分　麝香半兩

右件藥先將砒霜去紙上炒過後入麝香同研令細每用一字用雞羽掠在瘡上日使三兩度隨時展去藥無令嚥津

腎疳方

治小兒腎疳並疝氣偏墜寒熱

沒藥炮　甘草各二分　石硫黃　南木香　胡連各一分

右爲末用蒸棗肉丸如麻子大蓯蓉湯下三丸可兩服莊氏第七候用此方

五疳保童丸

治小兒乳食不擇冷熱好食肥膩恣食甘鹹臟腑不和生疳

青黛　苦楝根皮　夜明砂　五倍子　蘆薈　黃連　膽草　蕪荑　乾蟾各一分　麝少許　蟬殼去嘴爪一分　猪膽大者五箇拌諸藥焙

右件粟米煮糊丸如麻子大一歲兒三丸不拘時米飲下日三服忌猪肉

曾氏蘆薈丸

主五疳八痢蚘蟲臟腑虛弱身體瘦悴頭髮焦疎腹脹青筋小便白濁渴飲無度洞泄不時穀食難化遍身瘡疥神色乾燥此藥大能養胃壯氣止痢除蟲長肌

南木香　丁香各二錢半　訶子去核取肉　肉豆蔻各半兩　史君子肉　蘆薈各四錢　棗子肉一兩薄切用瓦盛慢火焙乾

右除史君子肉薄切於乳鉢內極細搗仍將前南木香等四味濕麪裹煨至香熟取出地上候冷去麵剉焙用棗肉蘆薈爲細末再入乳鉢同史君子肉杵勻煉蜜丸作麻仁大每服三十丸至五十五丸溫米湯送須是空心服之兒小米湯化服

萬應丸

治諸疳蝕胃口有蟲飲食不進頭髮作穗面色萎黃

五倍子去內蟲屑　胡連　青皮　陳皮　黃檗　神麴　麥芽淨洗焙乾　三稜　莪朮炮剉　蕪荑　檳榔　膽草　川薑肉　史君子各一兩

右除檳榔不過火麥芽二味外餘十二味剉碎炒令微焦色候冷同前檳榔麥芽研爲細末水煮麵糊丸麻仁大每服三十丸至五十丸或七十丸溫米清湯無時送下或空心兒小者丸粟殼大粒數下法同前

博濟至聖青金丹

治小兒一十五種風疾五般疳氣變蒸寒熱便利褰花養脚細肚脹肚上青筋頭髮稀疎多喫泥土搏眉毛咬指甲四肢羸瘦疳蛔咬心瀉痢頻併饒驚多欵疳蝕口鼻赤白疳瘡疳眼崔目悉皆能治

青黛二分良方三分　雄黃二分良方二兩　龍腦少許局方一字　硃砂一分良方一錢　麝粉一分良方一錢　胡黃連二分良方二兩　熊膽一分用溫水化入藥良方一錢　麝半分　白附二枚良方局方二錢　蘆薈一分良方一錢　蟾酥一皂子大局方一字　鉛霜少許局方一字　水銀一皂子大局方一錢同麝粉研不見星

右件一十三味細研杵羅爲末後再都入乳鉢內細研令勻用猿猪膽一枚取汁熬過浸蒸餅少許爲丸如黃米大暴乾於瓷器內收密封或要旋取每服二丸各依湯使如後

小兒患鷺風天弔戴上眼睛手足搐搦狀候多端但取藥一丸用溫水化破滴入鼻中令噴嚏三五遍後眼睛自然放下搐搦亦定更用薄荷湯下二丸

小兒久患五疳四肢瘦小肚高搏眉喫土咬指甲髮稀疎肚上青筋潮飲下二丸

小兒變蒸寒熱薄荷湯下二丸化破服

小兒久患瀉痢米飲下二丸

小兒久患疳蛔咬心苦楝子煎湯下二丸

小兒患鼻下赤爛口齒疳蟲并口瘡等用初胎婦乳汁研二丸塗在患處

小兒患疳眼崔目用白羊子肝一枚以竹刀批開內藥二丸在肝內以麻纏纏定用淘米泔水內煮令熟空腹喫仍令乳母常忌毒魚大蒜雞鴨猪肉等

此藥若小兒常隔兩三日喫一服永無百病不染橫夭之疾凡有患但與服必有效

靈苑紅丸子

治五疳肥孩兒

郁李仁一百粒溫水浸去皮尖　坯子臍脂一分　麝香半錢別研

右先研郁李仁細爛次入胭脂麝香同研用粳米飯爲丸如麻子大每服三丸至五丸一日三服用薄荷湯下量兒大小臨時加減丸數

薛氏蝦蟆丸

治五疳羸瘦毛髮疎稀揉鼻咬甲好食泥土腹大頸細痢如泔淀乳食不消小便白濁

綠礬半斤爲末　棗一升半去核右先用酢五升并礬煮棗熟浸入黃連四兩訶子去核二兩史君子二兩夜明砂二兩乾蝦蟆四箇燒灰存性同搗碎入前藥內攪勻直到乾焦爲度再杵羅爲末棗肉丸如黍米大三四歲每服三十丸米飲下乳食前

張漢夜明丹

治五疳腹脹目澀多睡

夜明砂一兩炒　胡連　膽草　苦楝根各半兩

乾蝦蟆五箇燒存性並爲細末入　蘆荟　青黛　麝香各細研一分

右件一處拌勻粳米飯和丸如黍米大每服十粒米飲下不拘時候量兒大小加減

劉氏金蟾丸

治小兒五疳羸瘦合面臥地筋青腦熱吐瀉無度渾身壯熱口舌生瘡病下膿血心腹脹滿喘促氣急乳食全少多啼嘔逆飲食不化或時增寒多涕咳嗽鼻下赤爛十指皆癢蝕於脣齒生瘡出血肛門不收毛髮焦黃但是疳疾神效

乾蝦蟆五箇燒灰　胡黃連　宣連　鶴蝨　肉豆蔻　苦楝根白皮　雷丸　蘆荟　蕪荑　雄黃一分飛過

右爲末麪糊爲丸菜豆大雄黃爲衣每服十五九飯飲下

張氏香蟾丸

治五疳殺蟲消肚膨上痛住瀉痢生肌膚

乾蟾酥炙黃　大黃連洗去鬚　蕪荑仁　蘆荟

右件等分爲末豬膽麪糊爲丸如桐子大每服四

十粒用飯飲吞下不拘時一日二服至三服忌生冷宿食毒物

莊氏五疳丸

熊膽　蕪荑各一錢　麝一字　胡連一分

大乾蟾用上截去腳剉碎入在瓶內鹽泥固濟以炭火燒通赤取出停一夜取藥碎爲細末稱一分

右件先將蕪荑研極細次入麝香次入胡黃連蟾研末令勻傾出却研熊膽以沸湯鎔化再入前四味更研令勻糊爲丸如菜豆大每服三四歲十丸四五歲十五丸米飲下食前服

王氏保童丸

治五疳消化宿滯進飲食長肌肥孩兒

胡黃連　龍膽草末炒紫色各半兩　史君子

木香　蘆薈細研各一錢　川苦楝一分炒紫色

大麥芽半兩巴豆三七箇去皮心同麥芽炒令芽紫色去豆不用以芽爲末

右爲細末同研令細用酢糊爲丸如菜豆大每服十粒至十五粒米飲下不計時候此藥大治小兒疳腹脹

吳氏黃芪飲

治小兒五疳或傷脾腹脹髮黃時時壯熱頭上虛汗日漸黃瘦或泄瀉

黃芪一兩　人參　陳皮微炒不去白　白茯苓

白檳榔極大者　炙草各半兩　肉豆蔻一箇小者

右爲麤末每服三錢水一大盞慢火煎至七分濾去滓時時與服溫喫

趙氏家傳方

治小兒五疳退黃榮肌膚解積熱壓驚消飲進食

史君子二十一箇　胡黃連半兩　五靈脂

蝟頭炙令焦各一分　麝香半錢研　蘆薈

熊膽各研二錢

右爲末粟米飯爲丸菜豆大每服二十丸米飲下又

治小兒五疳面色黃瘦身體壯熱喫乳食不能消化眼目澀痛及胃腸痰涎愛食酸醎常多瀉痢

胡連　母丁香　黃連炒　蘆薈　熊膽各半兩

麝香一分細研　蝟頭一枚塗酥炙焦黃

右爲末用牛膽和丸菜豆大莊氏第四候用此方

如患心臟疳煎蕪荑甘草湯下三丸

食疳瀉血或赤白痢新汲水下三丸

吐逆不止及水瀉生薑湯下

眼疳羊子肝血與酒和看多少微煎下三丸

聖惠鼈甲散

治小兒無辜疳項細肚大毛髮乾立作穗

鼈甲三分酥炙黃去裙襴　檳榔三箇　沉香

瀝蘆　牛蒡微炒　史君子　赤芍　訶梨勒皮

炙草各半兩

右件搗羅爲散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

香甲湯

截疳辟邪

瀝蘆一兩　沉香剉　牛蒡炒　阿梨勒皮微炮

安息香　鼈甲塗酥炙黃去裙襴　乳香研各半兩

右件搗羅爲細末每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫時時與服

入人參少許煎四分去滓放溫熱服量兒大小加減

玉粉散

定痢截疳

胡粉一兩　白龍骨　水磨雄黃各研微炒

楮根白皮　瀝蘆　白馬夜眼洗拏焙乾各半兩

右件搗羅爲細末都拌勻每服一字至半錢以雞卵清調下乳食前

二肝丹

治無辜疳痢不止

地膽草　菖蒲一寸九節者　瀝蘆各一兩

胡黃連　地榆各半兩已上搗羅爲細末次用

雞肝　豬肝俱薄切入鹽少許同諸藥煮熟各一兩

右件同於石臼中搗一二百下成膏和丸如黍米大每服十粒麝香湯下食前量兒大小加減

梅肉散

治無辜疳渴痢不止眼出障翳身體浮腫

烏梅肉炒乾　綿黃芪　乾葛各一兩　川黃連

瓜蔞根　乾薑炮　甘草炙各半兩

右件搗羅爲細末每服一錢水一盞煎至六分去滓放溫時時與服

藍葉湯

治無辜疳血痢不斷

藍葉一兩　地龍　人參　烏梅肉　冬瓜仁

黃連　赤茯苓　蝸牛殼微炒各半兩

右件搗羅爲細末每服一錢水一小盞煎至六分去滓溫服乳食前

天靈丹
治無辜疳痢久不差
天靈蓋　乾蟾蜍燒灰存性各一箇　胡黃連　黃芩子淘去浮者炒令黑色半兩　麝香一分
枇霜一分同天靈蓋濕紙裹三五重膠泥固濟於大炭火上燒令通赤取出候冷
右件都搗羅爲細末拌勻軟飯和丸如黍米大每服五粒乳汁下量兒大小加減服之

溫臟湯
治小兒無辜疳痢久不止手足逆冷
肉豆蔻去殼　乾薑炮各一兩　龍骨　當歸
厚朴去粗皮剉塗生薑汁炙令香熟各半兩
附子一枚重半兩炮去皮臍　茅香半分剉
右件搗羅爲細末每服一錢水八分一盞入生薑三片煎至五分去滓溫服乳食前

朴附丹
治無辜疳痢赤白相雜
厚朴塗薑汁炙令熟　訶梨勒皮麪裹煨各一兩
附子一枚炮去皮臍　龍骨煅研　烏梅肉
赤石脂各半兩
右件搗羅爲細末煉蜜和丸如黍米大每服十粒米飲下乳食前

人中白散
治小兒無辜疳痢氣寒熱積滯不化肚腹脹痛
人中白一分　麝香半分　蝦蟆塗酥炙炒
蘆薈各半兩
右件藥細研爲散每日空心及晚後用熟水調下半錢服後當下惡物量兒大小加減服之

殊砂丸
治小兒一切無辜疳黃瘦腹痛或痢有蟲冷之與熱悉主之
硃砂一分細研一方三分　菖蒲　漏蘆各一兩
雄黃一分細研一方三分　乾蟾一枚酢炙令黃
麝香一兩細研一方一分萬全方亦一分
右件藥搗羅爲末都研令勻用粟米飯和丸如麻子大每服以粥飲化下二九空心午後各一服隨兒大小以意加減

決明子丸
治小兒冷熱無辜疳或時驚熱或時夜啼大便青黃白汁頭熱身熱頭髮作穗四肢黃瘦不多食物
馬蹄決明子二兩搗羅爲末
右蜜和丸如麻子大每於食後以熟水下三九更量兒大小加減服之

漏蘆散
治小兒無辜疳肚脹或時瀉痢冷熱不調
漏蘆一兩搗細羅爲散
右每以猪肝一兩散子一錢鹽少許斟酌以水煮熟空心頓服粥飲下

漏蘆丸
治小兒無辜疳痢羸弱不欲飲食及腹內蟲動作多吐清水
漏蘆二兩　猪肝燸乾　楮根白皮剉各一兩
右件藥搗羅爲末煉蜜和搗一二百杵丸如彈子大每服以溫水研一丸不計時候量兒大小加減

聖惠方
地膽子一兩搗細羅爲末
右每服一錢以猪肝一兩入鹽少許煮熟無時量兒大小加減食之

又方
治小兒無辜疳痢不止
沒石子二枚炒令赤黑色搗細羅爲散以麪半字和作餅子燸熟
右研爲末不計時候以粥飲調下半錢量兒大小加減服之

外臺備急方
治小兒無辜疳痢
當歸　龍骨煅　川黃連　人參　沒石子
炙草各一兩
右六味搗散蜜丸服三九日再以瘥爲度大小增減量之

顯顏經硃砂丸
治孩子疳痢辨蟲顏色定吉凶
硃砂　阿魏俱如半石蓮大　蝙蝠血三兩點
蟾酥少許
右細和少許口津調先桃柳枝煎湯浴兒後看兒大小以菜豆大填兒臍中後用紙可臍中貼之用青衣蓋兒看蟲出來黃色輕青黑色重

聖惠乾蟾丸
治小兒五疳及驚風出蟲定生死
乾蟾一枚五月五日者良　蛇脫皮一條火煅
穀精草二兩同前藥入罐鹽泥固濟乾煅赤研

胡黃連　瓜蒂　母丁香三味同爲末　牛黃　硃砂　雄黃　蘆薈　天竺黃　龍腦　麝各一分　青黛半兩

右件藥都入乳鉢內研令極細用猪膽汁煎麪糊和丸如菜豆大一二歲兒以溫米泔半合化下五丸服藥後以桃柳湯浴兒著青衣蓋疳蟲多出衣上及眉毛髮邊如細麩片子或如糝面塵毒黑色者難治黃白色易治仍宜粥飲下二丸日三服甚者半月內差

麝香丸

治小兒五疳瘦弱毛髮乾焦口鼻多瘡有蟲

麝　蘆薈　粉霜　朱砂各一分　蟾酥豆許

皂莢三寸燒灰　蛇脫皮五寸燒灰

右用蝙蝠三箇取血拌藥細研以油餘蠟和丸如小豆大先以桃柳湯洗兒後用藥一丸塗於臍中上以酢麪封之良久卽蟲出黃白赤者易治黑者難療

蘆薈丸

治小兒五疳四肢乾瘦腹脹氣粗頻揉鼻眼宜服此出蟲

蘆薈　牛黃　蟬殼各一分　腻粉　粉霜

硫黃　麝香各一錢　田父一枚燒煙似絕使住

青黛半兩　巴豆十粒爲霜　蛇脫皮一條燒灰

右爲極細末令勻以粳米飯丸如菜豆大每服以溫水下二丸良久煎桃柳水浴兒後以青衣蓋遍身當有蟲出白黃色者可治青黑者難治

出蟲丸

治小兒五疳久不差羸瘦極甚

硃砂　麝香　牛黃　蝸牛子炒　夜明沙炒

熊膽各一分　蟾酥半錢

右件藥都細研以麪糊和丸如菜豆大每服以溫水下三丸更別以水研一丸滴向鼻中得嚏五七聲良久當有蟲隨汗出立效

乾蟾丸

治小兒五疳出蟲

乾蟾一枚燒灰　天靈蓋灰半兩　麝香半分

蟬殼去足炒　鼈甲酥炙黃焦去裙襴各一分

右件藥爲細末每用燒飯丸如菜豆大二歲以下以蛤粉湯下一丸三歲已上至五歲二丸服藥後積以桃柳湯浴兒後用青衣蓋之當有蟲出赤白者輕黑者重

熊膽丸

治小兒五疳出蟲

眞熊膽　硃砂　麝香　蚺蛇膽　蜣螂炒

瓜蒂各半兩

右件爲極細末再研勻用猪膽汁和丸如菜豆大先用桃柳湯浴兒了用粥飲下三丸以青衣蓋當有蟲出也

定命散

治五疳有蟲

乾蝦蟆一枚燒灰　蛇蛻皮炒　蟬殼各一分

右件爲極細末入麝香末半錢研勻但是一切疳效

青黛丸

治五疳體熱乾瘦髮立鼻癢有蟲不欲飲乳

青黛　蘆薈　人中白各半兩　牙皂　蟬殼

麝香各一分　胡連三分　蟾涎　人乳各少許

右件爲末五月五日午時修合以粽子肉棗肉及蟾涎乳汁丸如黍米大以桃柳湯浴兒後以米飲下三丸後用青衣裹兒看身上有蟲出青黑者不治黃白赤者易瘥

錢乙胡黃連麝香丸

治疳氣羸瘦白蟲作

胡黃連　白蕪荑各一兩半　麝香一錢　黃連木香各半兩　辰砂一分

右末麵糊丸如菜豆大米飲下五七丸至三五歲可十五丸無時

錢乙楡仁丸

治疳熱瘦悴有蟲久服充肥

楡仁　黃連各一兩

右爲末用猪膽七枚破取汁與藥同和入碗內甑上蒸九日每日一次候日數足入研麝香半錢湯浸蒸餅和丸菜豆大每服五七九至一二十九米飲下

史君子散

治小兒蛔疳

史君子十箇瓦上炒爲末　甘草猪膽汁浸白蕪荑各一分　苦楝子五箇炮去核

右末之每服一錢水煎服

蘆薈丸

治小兒蛔疳

蘆薈　安息香　胡黃連　枳殼麩炒各一錢

史君子三十箇炒　蕪荑一分　定粉一錢半

麝香少許

右末豬膽糊丸如菉豆大五七丸米飲吞下

張澐三根散

治蛔疳蟲動啼叫不止每至月初間尤甚狀如神祟

貫衆根　蒴梨根　石榴根各一兩　粟刺

故綿　乾漆各半兩

右六味並燒灰存性搗羅爲細末每服一錢用水八分煎四分去滓放溫服不拘時

除毒丹

治蛔疳不差傳染兄弟姊妹

鬼臼一兩去毛　苦參　青葙子　瞻草各半兩

硫黃　緋絹　乾蝦蟆　白礬各一分

右件藥並燒灰存性搗羅爲細末煉蜜和如麻子大每服十粒磨沉香湯下量兒大小加減

猪肚丸

治小兒疳瘦盜汗多倦少力大便有蟲會經大效

川黃連揀淨　胡黃連　木香各一兩　羌活

蘆薈　肉豆蔻煨取肉　龍甲酥炙去裙襴

白蕪荑各半兩

右件搗羅爲細末用猪猪肚一箇洗刮令淨先以好香白芷二兩內肚中蒸極熟去白芷不用却入諸藥縫合再蒸如泥取出同猪肚搗二三百下成膏丸如黍粟大每服十粒米飲下不拘時候量兒大小加減

穀精丹

治諸病下蟲如絲髮或如馬尾甚者便至天傷

穀精草三兩入瓶鹽泥固濟慢火煅赤爲度取出

乾蟾三枚五月五日取酥炙黃　皂莢三寸燒灰

胡連　瓜蒂　母丁香各半兩已上搗爲末次入

粉霜　蘆薈　麝香各一分並細研

右件都拌勻用猪膽汁和如黍米大每服十粒米

泔放溫下量兒大小加減

桃柳湯

服諸藥後用此法助之

桃枝　柳枝各二兩

右件並剉碎以水兩大碗煎數沸浴兒甚佳浴兒畢用一青衣服蓋之疳蟲自出爲驗

苦楝丸

治小兒合地面無顏色啼聲乍高狀似心痛往往口乾發動有時醫人不識妄呼見鬼不知小兒曾喫生肉肉化爲蟲此方大效

苦楝根　鶴蝨　硃砂各一兩　檳榔三箇

麝香一錢

右末麪糊丸如小豆大每服二丸白湯下日三服忌毒物

聖惠金蟾散

治小兒脊疳頭大項細四肢黃瘦肚大胃高毛髮乾立

蟾一枚大者塗酥炙黃　夜明砂微炒　桃白皮　樗根白皮　地榆　黃蘗　阿梨勒煨用皮各一兩

百合　白蕪荑微炒　人參　川大黃微炒

黃連去鬚各三分　胡粉三錢　丁香三七粒

檳榔一分

右件藥搗細羅爲散每服用粥飲調下半錢日三服

地骨皮丸

治小兒脊疳漸漸黃瘦以手指擊之背如鼓響脊骨高是也此因坎熱所致

地骨皮　紫參　黃耆剉　川大黃剉碎微炒

郁李仁湯浸去皮尖微炒各半兩　龍膽草

子芩　枳殼麩炒微黃　木香　猪苓去黑皮

海蛤細研各一分

右件藥搗羅爲末煉蜜和丸如菉豆大每服以溫水研下五九日三服量兒大小加減服之常得微利爲效

殺疳丸

治小兒脊疳日漸羸瘦腹中有蟲

沒石子　瓜蒂　鶴蝨各半兩　蟾頭炙令焦黃

蘆薈　青黛各半兩　麝香　腻粉各一分

右件藥搗羅爲末以糯米飯和丸如黍米大每服以粥飲下五九日三服量兒大小加減

蘆薈丸

治小兒脊疳腹內有蟲上攻背脊脊骨漸高肌體羸瘦

蘆薈　青黛　硃砂　麝香各細研　熊膽

胡連　貫衆　地龍微炒　黃連　蟬殼炒去足

雷丸各半兩　蝦蟆一枚塗酥炙令焦黃
右件藥搗羅爲末用蝸牛肉研和丸如麻子大每服以粥飲下五丸日二服量兒大小增減服之

青黛丸
治小兒脊疳四肢瘦弱腹脹壯熱頭髮乾疎時時煩渴脊骨如鋸
青黛　硃砂　夜明砂微炒　定粉各一分
蟾酥　熊膽　羱羊角屑　犀角屑各半分
黃連半兩　麝香一錢細研
右件藥搗羅爲末用軟飯和丸如菉豆大每一歲以粥飲下二丸

硃砂丸
治脊疳十指爪甲瘡痛頭髮焦乾肚腹虛鳴脊骨如鋸時時下痢狀如青淀或膿或血
天靈蓋炙一箇　柴胡　白朮　麝香各一錢
檳榔一箇
右件藥肉爲丸如麻子大每服三丸米飲棗湯下

脊疳方
朱氏治小兒脊疳瀉血不止
定粉　好蠟十箇搗碎　頭髮少許剪碎
右件爲團磚襯火煅通赤細研米飲下半錢

歷脊疳方
莊氏治小兒久下血不止
穿山甲米醋浸炙爲末
右每服一錢米飲調下空心服

仙人水鑑方
小兒三歲已下多睡臥合面在地者便是腦中疳氣宜服此方
黃葵花　菊花　釜下墨　硝石　柏葉各等分
右爲散吹入鼻中永不合面臥地也吹鼻中有惡物似泥泄數條卽便是腦中疳氣此是殺人之本

腦疳方
小兒腦疳乳母宜服此
柏葉　松葉　黃葵花　鼓子花　鼈甲　虎骨
檳榔　大黃各二錢
右並生爲末與醋三升煎膏丸如菉豆大每日空心飲下三丸效

又
藥性論治小兒腦疳
蘆薈不以多少
右爲細末每用少許吹鼻中殺腦疳鼻中瘡

聖惠牛黃丸
治小兒腦疳身熱髮枯
牛黃　蘆薈各細研　熊膽研入　胡黃連
木香　犀角各一分　龍腦　麝香各細研
蟾酥研入各半分　青黛細研半兩
右件藥搗羅爲末都研令勻以麪糊和丸如黃米大每服以溫水下五丸日三服量兒大小以意加減

龍腦丸
治小兒腦疳羸瘦煩熱
龍腦　麝香　雄黃各一錢　胡黃連末　牛黃
硃砂　熊膽　蘆薈　乾蝦蟆灰各一分
右件藥都研令如粉以水化熊膽和丸如麻子大若硬更入糯米飯同丸每服用薄荷湯下三九日三服量兒大小以意加減

吹鼻龍腦散
治小兒腦疳鼻塞頭痛眼目昏暗羞明怕日
龍腦　麝香各細研少許　蝸牛殼炒令黃
蝦蟆灰　瓜蒂　黃連　細辛各一分
右件藥搗細羅爲散入瓷合內貯之每取少許吹於鼻中每日兩上用之

莊氏追蟲方
治小兒合面臥地多睡或氣急面黃哭聲高叫或心痛口乾蓋是因食噢生肉如此腹內有蟲
鶴蝨炒二分　茯苓一兩嚼　南木香一分
苦楝根三兩　檜株根半兩
右先將二味根用水一斗煎成膏然後將三味爲末搗和成丸黍粒大每服三五丸米飲下莊氏第十二候用此方

安息丸
治腦疳鼻下赤爛身心煩躁鼻內生瘡頭髮自落日夜痛無休歇狀似鬼形
安息香　丁香　胡黃連　麝香　雄黃各一錢
肉豆蔻　金銀箔各五片
右末煉蜜丸如麻子大每服三九米湯下

仙人水鑑方
治乾疳
天靈蓋　生鼈甲　波斯青黛　北海黃鹽各一分
右並同研令細日服一字空心熟水下若是溫疳不治乾疳治之不過三服神效

聖惠天竺黃散

治小兒乾疳心臟煩熱眼目赤澁皮膚乾燥夜多盜汗羸瘦不能乳食

天竺黃半兩　牛黃　雄黃　硃砂　蘆薈　麝香各細研　蟾頭炙黃　胡連　犀角屑　木香　炙草　鈎藤各一分　龍腦一錢細研

右件藥搗細羅爲散都研令勻每服以溫水調半錢日三服量兒大小以意加減

又方

治小兒乾疳體瘦煩熱眠臥不安

牛黃　雄黃　蘆薈　青黛各細研　丁香　黃連　熊膽　蛇脫皮灰　天竺黃　天漿子炒　犀角屑各一分　胡黃連半兩　蟾酥半錢研入　麝香一錢細研

右件藥搗羅爲末更研令勻以煉蜜和丸如菜豆大每服以粥飲下三丸量兒大小以意加減

青黛丸

治小兒乾疳肌體羸瘦皮毛乾焦寒熱發喝昏昏多睡

青黛三分細研　牛黃　蘆薈　硃砂　麝香　雄黃各細研　胡黃連　蛇脫皮灰　龍膽草　蟬殼微炒各一分　蟾一枚塗酥炙焦黃

右件藥搗羅爲末都研令勻用麪糊和丸如黍米大每服以粥飲下三丸日三服量兒大小臨時以意加減

牛黃丸

治小兒乾疳煩渴壯熱皮膚焦燥日漸羸瘦

牛黃半錢細研　雄黃細研　黃連　蘆薈　天竺黃各一分　龍腦　麝香一錢俱細研　炙草半分

右件藥搗羅爲末都研令勻用糯米飯和丸如菜豆大每一歲以粥飲下一丸

胡黃連丸

治小兒乾疳瘦弱不能乳食髮立腦乾肌體柴瘦

胡黃連半兩　硃砂　波斯青黛　蘆薈各三分　麝香一分　蛇脫皮一條燒灰　蟾酥一杏仁大

右件藥都研爲末用猪膽一枚取法酒一盞和藥末都於銚子內熬如膏丸如菜豆大五歲至七歲以粥飲下五丸日三服三歲以下三丸

青黛散

治小兒乾疳日久不差骨立形枯諸治無效者

青黛　硃砂　蘆薈　地龍　夜明砂各微炒　乾蝦蟆各一分灰　麝香二分

右件藥都細研爲散每服半錢空心以粥飲調下更用少許藥吹入鼻中後以桃枝湯看冷熱浴兒衣蓋有蟲子出爲效也

牛黃丸

治小兒乾疳體熱羸瘦心神煩躁少得眠臥

牛黃細研　硃砂細研　子芩　犀角屑各半兩　麝香一分細研

右件藥搗羅爲末都研令勻以糯米飯和丸如麻子大每服以粥飲下三丸量兒大小增減服之

按乾疳既是五臟之涸則當以人參白朮散加減八味丸之類補而濡之若專恃以上諸丸藥恐無補理

史君子丸

治臟腑滑及疳瘦下痢腹脹服滿不思乳食常服安蟲補胃消疳肥肌

厚朴薑汁塗炙　訶子半生半煨各半兩　史君子一兩麪裹煨　陳皮一分　炙草　青黛各半兩

右爲細末煉蜜和丸如小鷄豆大每服一丸米飲化下兒生百日已上三歲已下服半丸乳汁化下元方無青黛是兼驚及帶熱渴者宜此加止臟腑不調不用青黛

東垣厚腸丸

治小兒失乳以食飼之不能消化或生腹脹四肢瘦弱或利色無常

陳皮　半夏　蒼朮　人參各三分　麥芽　枳殼　麵末各五分　青皮　厚朴各二分

右爲細末煉蜜和丸如麻子大每服二十丸溫湯送下忌飽食

張潔古粟丹

治腹大疳瘦好喫泥土泄利不調

乾蟾五枚酥炙焦黃　川連夏用二兩冬用一兩　母丁香忌火　厚朴薑汁製　龍膽草各一兩　夜明砂　蟬殼　訶子皮炮各半兩已上搗末入好硃砂細研水飛　青黛研各一兩　麝半兩

右件一處拌勻用煉蜜一半白麪糊一半和如黍米大每服十粒米飲下不拘時候量兒大小加減本事芎朴丸

治小兒疳瘦瀉白水腹脹

芎藭　厚朴各一兩　白朮半兩

右爲細末煉蜜丸如小彈子大每服一丸米飲化下三歲已下半丸

消食散

小兒腹大泄瀉水穀不化嘔食不知饑飽累效

神麯炒　麥芽炒　三稜　青皮　香附　山楂　厚朴　甘草　藿香　枳實　地黃　砂仁　黃連　棗子各等分

右爲末白湯調下量兒加減

聖惠木香丸

治小兒內疳乳食不調心腹脹滿肌膚羸瘦下痢無常

南木香　蟬殼炒去足　麝香細研　川黃連　黃丹炒　熊膽　夜明砂炒　乾蟾酥炙各一分　赤石脂半兩　肉豆蔻一枚　田父半兩炙黃

右件藥擣羅爲末用水煮蒸餅丸如麻子大每服以溫粥飲下二丸量兒大小以意加減

蘆薈丸

治小兒內疳四肢羸瘦腹脹鼻痿皮膚乾燥下痢不常

蘆薈　雄黃各細研　沒石子　蟬殼微炒去足　蛇脫皮灰　丁香　熊膽研入各一分　麝香　蟾酥各一錢　黃連半兩

右件藥擣羅爲末煉蜜和丸如黃米粒大每服以粥飲下三丸日三服別研一丸吹入鼻中量兒大小以意加減聖惠又以治疳痢

麝香散

治小兒內疳下痢不止肌膚消瘦諸治未差

麝香　蘆薈各細研　蛇脫皮灰　夜明砂微炒　蝸牛殼　黃連微炒　沒石子各一分　黃丹　定粉各一兩　訶梨勒半兩煨用皮

右件藥擣細羅爲末都研令勻每服以粥飲調下半錢早晨午後各一服看兒大小以意加減服之

胡粉丸

治小兒內疳下痢不止昏沉多睡

胡粉微炒　青黛各半兩　黃連末一兩微炒　麝香一錢

右件藥同研令細以猪膽一枚取汁和丸如黃米粒大不計時候以粥飲下五丸量兒大小以意加減

譚氏殊聖保命丹

治內疳

猪牙皂角一兩炙令焦黑色去皮爲末三分　巴豆二七箇去心膜細研新瓦上出油了用之　雄雀兒糞二錢

右細末以粟米飯丸菉豆大空心溫水下三丸

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百六十六卷目錄
醫部彙考四百四十六
小兒諸疳門四
方三 紫金散 秋霜散 惠眼秋霜散 乳香 茅先生小兒崩砂方 定命散 螺灰散 聖散子 生金散 麝香散 黑神散 孔氏蝟皮散 王氏手集方 安脫拘走馬疳藥 曾氏蜘蛛散 內金散 蜜陀僧散 紅鉛散 滴滴金 山藭香散 傅囟立效散 獨活飲子 三奇散 人參散 檳榔散 黃芪散 地骨皮散 茅先生牛黃膏 天竺黃 三解牛黃散 檳榔散 茅先生小兒崩砂方 潞氏殊聖方
黃參散 安脫拘走馬疳方 劉氏家傳方 莊氏家傳方 又 治青腹 又 秘方 急治方 五福化毒丹 滌瀉散 吉氏家傳方 朱氏家傳方 清金散 五福化毒丹 滌瀉散 吉氏家傳方 朱氏家傳方 清金散
蟬蛻散 白粉散 龍木發痘散 退翳丸 熊膽丸 羊角丸 玉訣瀉肺散 盧薈丸 鉤藤散 珠黃退雲散 張渙井泉石散 猪膽丸 黃連散 杏仁湯 決明散 除熱結腸丸 蠶蛻湯
又方 張渙桃白散 如聖丹 錢乙金華散 又方 錢乙金華散 又方 張渙四珍丹 珠黃方 又方 張渙四珍丹 珠黃方
茅先生小兒崩砂方 茅先生牛黃膏 天竺黃 茅先生小兒崩砂方 茅先生牛黃膏 天竺黃
西京丁左藏螺螄丸 張氏神麝散 莊氏方 治小兒一切疳方 又方 定命丹 又方
濱山史君槟榔丸 化蟲丸 胡黃連丸 肥肌丸 三因龍腦 濱山史君槟榔丸 化蟲丸 胡黃連丸 肥肌丸 三因龍腦
茅先生柴胡散 六物黃芩湯 莊氏青黛丸 茅先生柴胡散 六物黃芩湯 莊氏青黛丸
先王氏史君子散 柴胡飲 乾地黃煎 王生羅肉煎丸 張氏三和飲子 犀角散 王氏家傳方 張氏三和飲子 犀角散
龍血散 胡黃連散 天竺黃散 又方 五膿丸 胡黃連散 黃連丸 又方 五膿丸 胡黃連散 黃連丸 又方
粉丸 清香丸 又方 莊氏方 又方 吉氏家傳方 又方 嘉瑞防己丸 溫肺散 杏仁散 牛黃丸 張渙補丸子 揀骨丹 莊氏參苓散

方三

紫金散 羅治華 餘下同

茅先生名黑鉛散治小兒走馬疳

黃丹 蛇牀子炒令黑 地龍炒令黑各半兩

青礬一分煅過

右末每服一字揩牙斷上一日揩三次

秋霜散

治小兒崩砂

好砒半兩 白礬四分

右用水三分一盞先煎水令蟹眼沸來便下砒煅水乾爲度即下白礬末同煅乾爲末取出入好麝香少許好坯子少許同拌合爲末每使一字用鵝毛點拂牙斷上一日三四遍拂即愈

惠眼秋霜散

治崩砂齒斷欲落

粉霜 砒霜 白礬各一錢

右爲末用北艾一大團裹定上件藥末以石灰摻艾上後用碗盛發火燒盡細研以手捻少許揩齒上用鹽湯漱口燒時以盞子蓋定恐走了藥氣

乳香丸

治走馬牙疳如神

乳香 輕粉 砒霜研各五分 麝香少許

右先將乳香研細入輕粉麝砒共再研勻薄紙一韭葉闊去藥內按過裹紙少許丸如黃米大臨臥

將藥填在患處至明則愈忌食醬醋鹽等物

龍骨散

治口疳瘡走馬疳

砒霜 蟾酥各一分 粉霜半錢 龍骨一錢

定粉一錢半 龍腦半字

右先研砒粉極細次入龍骨再研次入定粉等同研每用少許傳之

右方皆犯砒非極不可用

走馬疳方

仙人水鑑治小兒走馬疳蟲透損骨者

天南星一枚當心剜作竅子安好雄黃一塊在內用大麥麵裹候雄黃鎔作汁以盞子合定出火毒一宿去麵

研爲末入好麝香少許摻在瘡上驗

集驗方

治小兒走馬疳

蠶退紙不計多少燒灰存性

右入麝香少許貼患處佳

茅先生小兒崩砂方

雞內金 蘆薈 白礬火煅 乳香 地龍 麝香

右各少許爲末候小兒睡著以藥末摻牙斷上

定命散

治小兒走馬疳

白礬 綠礬各等分抄一大錢

右同研勻用大麥麪五錢葱一寸研爛將麵同搗和軟硬得所爲餅子將研勻藥裹在中心用文武火燒存性於地坑內出火毒一宿又研如粉入鉛

霜二錢同研令細每用少許揩牙上一二遍自差

蟾灰散

治小兒走馬疳

乾蝦蟆一箇大者燒灰存性　五倍子一錢

麝香少許

右同研蜜水調塗齒根上未止更用之

聖散子

治小兒走馬疳

膽礬　龍膽草各一兩

右同於瓦瓶中煅烟盡略存性貼瘡上

生金散

治小兒走馬疳

天南星一箇重一兩者　綠礬一兩

右先安排南星在乾地上用礬與南星同處四邊以炭火燒烟盡爲度取出研如粉入當門子一粒先含漿水洗貼之

麝香散

治小兒走馬急疳口臭牙齒損爛及攻蝕脣鼻頰頰累治未效者可用此方

麝香一錢　黃蘗一兩杵末　青黛半兩上好者

雄黃一分飛過研

右件杵研極細如有患者先以綿纏筯擦齒上蝕損死肌以軟帛拭去惡血量瘡大小乾摻日夜五次用之

或血盛併多不定者加定粉半兩同研用如前法

黑神散

龍膽草剉　青膽礬

右等分用甘鍋子一個先入膽礬在內次入龍膽草用鹽泥固濟留一眼子周迴用炭火燒至眼子上煙斷爲度放冷取出研細入麝香少許如有患人看瘡內大小乾摻貼之立效牙痛乾擦牙根有鮮血出并腫爛牙擦之卽愈

孔氏無比散

治小兒走馬疳

麝香一分別研　眞蟾酥　綠礬各半分　膽礬沒藥各半分

右四味用大甎一口鑿中心作竅穴子勿令透地便安四味藥在穴中周迴用紅著炭二斤燒過取出同麝香再研勻如有患者以雞翎微濕沾藥末掃於小兒齒上立效

王氏手集方

治小兒走馬疳口鼻生瘡牙斷腫爛諸藥不能治者

槲葉十片乾者　麝香少許

右以薑膏爲末水調塗葉上炙乾又塗又炙凡塗炙數遍爲末瘡濕乾摻

安師傳走馬疳藥

治疳齒中不住血出多

鼠退紙燒灰

右止血時間令住若用地骨皮中嫩處爲末貼之便永止

曾氏燒鹽散

治走馬疳牙根肉潰爛黑臭

橡斗子不拘多少

右每用大者兩箇入鹽滿殼蓋作一合或五六箇至十數箇安在火內和鹽燒透取出地上以瓦盆蓋定存性候冷入麝香少許乳鉢內極細研勻每以半錢塗摻患處常收用小瓦合盛貯勿使紙裹恐常作潤也

內金散

治牙根肉臭爛黑色有蟲作痛

雞內金卽雞胵內粗皮陰乾一兩　香白芷

銅青各半兩　麝香一字

右前三味剉曬或焙爲末仍以麝香乳鉢內同杵勻每用一字或半錢乾摻患處先用溫鹽水灌漱後敷藥

蜜陀僧散

治走馬疳牙焦黑爛

蜜陀僧一兩　輕粉五十貼　麝香一字

右件爲細末同輕粉麝香乳鉢內杵勻每用半錢摻患處

紅鉛散

治走馬疳

綠礬不以多少色鮮明者入乾鍋用炭火燒鍋赤傾出以好酒灑拌再入鍋如此數遍色紅研細末入麝香少許

右先以溫漿水洗漱淨用指蘸藥有疳處搽之

演山蘭香散

治小兒走馬疳牙齒潰爛以至崩沙出血齒落者

輕粉一錢　蘭香子一錢末　蜜陀僧半兩醋淬末

右研如粉傳齒及齦上立效

議曰嬰孩受病證候多端良由氣鬱三焦疳分五臟內有腎經常虛得疳名之曰急以馬走爲喻治療頗難此等一證初作口氣名曰臭息次則齒黑名曰崩沙盛則齦爛名曰潰槽又盛血出名曰宣露重則齒自脫落名曰腐根其根既腐何由理之今將祕方具述於後

傅齒立效散

鴉嘴膽礬一錢匙上煅紅研　麝香少許

右研勻每以少許傳牙齒齦上

一方用蟾酥一字加麝和勻傳之

議曰血之流行者榮也氣之循環者衛也變蒸足後飲食之間漯恐有傷於榮衛而作衆疾其或氣傷於毒血傷於熱熱毒攻之虛臟所受何臟爲虛小兒腎之一臟常主虛不可令受熱毒攻及腎臟傷於筋骨惟齒受骨之餘氣故先作疾名曰走馬非徐徐而作所宜服藥甘露飲地黃膏化毒丹消毒飲其外證以前件立效散及麝酥膏傳之切忌與食熱毒之物此疳不同常證乃係無辜之證醫者宜深究保全爲上若用常方難擬愈活

獨活飲子

治腎疳臭息候

天麻　木香　獨活　防風　麝香少許爲細末

右等分爲末每服一錢匕小者半錢麥冬湯調下

三黃散

治腎疳崩砂候

牛黃　大黃　生地黃　木香　青黛

右等分爲末每服一錢匕熟水調服

人參散

治腎疳潰槽候

肉豆蔻炮　胡黃連　人參　杏仁炒　甘草炙

右件各等分爲末每服一錢匕小者只半錢溫熟水調服

檳榔散

治腎疳宣露候

木香　檳榔　人參　黃連　甘草炙

右等分爲末每服一錢小者半錢熟水調下

黃芪散

治腎疳腐根候

黃芪蜜炙　牛黃　人參　天麻　全蠍炒

杏仁炒　白茯苓　川當歸　生地黃酒洗

熟地黃酒洗

右等分爲末每服一錢小者半錢煎天門冬熟水調服麥門冬亦得

地骨皮散

治腎疳齦齶牙齒肉爛腐臭鮮血常出

生地黃半兩　地骨皮　五倍子炒令焦二錢

細辛一錢

右件爲細末每用少許傳之

茅先生硃砂膏

治小兒驚積驚熱

硃砂半兩　硼砂　牙硝各三錢　眞珠末一錢

元明粉二錢並別研　龍腦　麝香各一字

右爲末於一處拌和合用好單角起不久其藥自成膏

如小兒諸般驚用藥一黃豆大常用金銀薄荷湯少許化開下

如遍身潮熱用甘草煎湯下

狂躁惡叫用生地龍自然汁化下

一臟及一月內小兒不通下藥可用藥使乳調塗在妳上令兒喫妳吮下

茅先生牛黃膏

治小兒腦熱及諸熱鎮心解毒

馬牙硝　甘草炙各半兩　硃砂一錢　硼砂

寒水石各一分　龍腦　麝香二味隨意入

川鬱金半兩用皂角二寸巴豆七粒水一碗銚內煮乾不用皂角巴豆

右件爲末煉蜜爲膏炙熟大每服一丸麥門冬熟水化下

天竺黃散

治小兒諸熱

天竺黃　川鬱金用皂角水煮乾　白茯苓

麥門冬各半兩　蟬蛻去足　全蠍去絲嘴

殭蠶各十四箇　甘草一兩炙　硃砂一分

龍腦　麝香少許

右件各淨洗研羅爲末每服半錢一錢用蜜熟水調下

三解牛黃散

治小兒潮熱實熱

白殭蠶　全蠍炙　防風　白附子　川黃芩

桔梗　川大黃　甘草炙　白茯苓　人參

川鬱金用皂角水煮乾

右前件各等分爲末每服半錢一錢用薄荷蜜熟水調下

檳榔散

檳榔　大黃蒸　青皮各二錢半　黑牽牛一錢

木香少許

爲細末薄荷蜜水調下一錢

譚氏殊聖方

治小兒牙疳諸惡瘡

黃丹飛　乳香　白礬飛　輕粉　胭脂各一錢

麝香少許

右件爲細末看瘡大小臨時用藥先用漿水洗瘡淨上藥乾摻

黃礬散

治小兒齒斷宣露骨槽風及急疳牙斷肉臭爛惡腫痛

黃礬一兩研入甘鍋燒赤　生地黃　梧桐淚

川升麻各半兩　乾蝦蟆頭二枚炙焦

右五味爲末每用半錢乾貼良久吐津甘草水漱口一兩服立效

一方用熟乾地黃及蟾頭燒灰

劉氏家傳方

治小兒口中疳瘡及下部有蟲

燒大麻子煙熏之

莊氏家傳方

治小兒牙疳壞爛

百藥煎　坯子胭脂

右各等分爲細末羅過貼患處

青霞散

治小兒口齒疳

蝦蟆一箇燒灰　甘草炙　青黛各一分

右研爲細末更入眞麝少許或兒滿口有瘡臭爛落下牙齒者以雞翎掃上立效凡用先以鹽湯漱口了拭乾用

安師傳方

治小兒口齒幷喉齶疳瘡如白膜

輕粉　黃丹等分

右乳汁和塗瘡上卽時如殼退下

又

治小兒疳蝕動脣齒及生瘡

蟾頭一箇大者燒灰　麝香半錢

右研勻如粉摻於瘡上立效

又

治小兒脣口及齒根宣露牙斷生瘡臭爛

蕘蔗炒　胡黃連各二錢　黃丹半兩

右爲末每半錢於牙斷上貼之不得嚥津莊氏第十二候用此

祕方

治牙疳腐爛及下疳瘡

海巴白者二箇赤者一箇　銀硃　輕粉各五分

海螵硝一分　眞珠二分　龍骨二分

右爲細末用冷茶漱淨將藥敷上

急治方

治小兒鼻下赤爛心煩躁鼻中生瘡漸漸轉多及身上焦躁日夜痛疼

訶子二箇　豆蔻三箇　黃連三分　防風半兩

硃砂一分

右爲末飯丸麻子大每服荊芥湯下三丸

五福化毒丹

治膿鼻清腦凉血

元參　桔梗各一兩　赤茯苓　人參　馬牙硝

青黛　甘草各一分　麝香五分

右除麝香牙硝另研一處爲末次和青黛等煉蜜丸如芡實大金銀箔爲衣薄荷湯下

瘡疼餘毒磨生犀角水下

上焦熱壅口齒鮮血宣露臭氣用生地黃汁化下食後

一方有龍腦五分

澤瀉散

治小兒肺積鼻內生瘡及鼻下赤爛

澤瀉　生川鬱金　炙草　梔仁炒各一分

右爲末每服嬰孩一字二三歲半錢五七歲一錢甘草湯調下一日二服宜再用青金散敷之

枇杷葉散

治鼻疳赤爛

枇杷葉去毛陰乾一兩　山梔子半兩　百部

檳榔各二錢半

右爲細末每服三錢兒小者二錢更小一錢白湯調下

青金散

銅青　生白礬各一錢

右爲末每用少許傳鼻下

張渙石膽散

治鼻疳疳蟲上蝕於鼻赤癢及連脣生瘡赤爛

石膽一兩　地龍一分洗淨　亂頭髮燒灰

莨菪子生用各半兩

右件搗羅爲細末入麝香一錢同研勻每服一字貼於瘡上

吉氏家傳方

治鼻下赤爛疳

青黛一錢　麝香少許　熊膽末半錢

右末睡時貼少許在鼻下

朱氏家傳方

治小兒鼻下濕癢疳瘡

大棗一枚去核以白礬一塊內棗中文武火煅存性

右細研塗瘡如瘡乾以麻油調塗

蟬殼散

治小兒鼻疳癢吹鼻

蟬殼微炒　青黛細研　蛇蛻皮灰　滑石

麝香細研各等分

右件藥搗細羅爲散都研令勻每用菉豆大吹入鼻中日三用之疳蟲盡出

白粉散

治諸瘡

烏賊魚骨末三分　白芨末二分　輕粉一分

右末先用清漿水洗拭過貼之

龍木殺疳散

防風　龍腦　牡蠣　白芷　細辛　五味各二兩

右爲末每服一錢食後粥飲調下

退瞖丸

黑參　川防風各一兩　北細辛　石決明

車前子各半兩　桔梗　黃芩各一兩半

右爲末煉蜜爲丸梧桐子大空心茶下十丸

玉訣瀉肝散

木賊　威靈仙　紫參　家菊花　羌活　蟬蛻

生大黃　炙草　石決明各等分　腦子少許

右爲末每用藥二錢猪肝一兩批開去膜摻藥在內線纏米泔煮熟嚼下

蕤仁膏

蕤仁四十九粒去皮出油　腦子少許

右研成膏用燈心點少許

靈苑羺羊角丸

治肝肺壅熱眼生努肉赤脈澀痛及赤眼障瞖睛疼癢痛羞明及小兒風疳爍陽眼神妙

羺羊角屑曬乾爲末　生甘草　白何首烏

瓦松以紗絹內洗去土各一兩　生地黃洗

鬱金炮過用地上去火氣各二兩

右件六味並細剉曝乾搗羅爲細末煉蜜爲丸如梧桐大每服十五丸用濃煎淡竹葉黑豆湯冷下食後臨臥服小兒丸如菉豆大每服七丸至十丸

殊聖退雲散

治小兒疳眼嗞啀啼叫不住

草決明　土瓜根　大黃炮　元參各半兩

甘草　宣連　砱砱石卽井泉石研各一分

右細爲散每服一錢水一盞同煎至七分五度與喫

張渙井泉石散

治眼疳邪熱攻於眼目漸生瞖障致損睛瞳

井泉石一兩　晚蠶砂　夜明砂各炒　石決明

甘菊花　黃連各半兩

右件搗羅爲細末每服一錢用米泔一盞入生猪肝少許煎五分肝爛爲度放溫時時服乳食後

猪膽黃連散

治小兒疳瘦大治肝疳作眼疾白膜遮睛諸藥不拴者

胡黃連　雄黃細研　夜明砂細研各等分

猪膽數箇　麝香少許不入膽煮

右爲末以猪膽汁調藥稀稠得所却入原膽皮內以線緊繫口米泔水煮五七沸取出放冷先以麝香於乳鉢內研細却入藥一處同研不用膽皮只取出藥候細用軟飯爲丸如麻子大每服十丸大者加至十五丸米飲吞下

如疳氣盛須用陳米飲下

決明散

治小兒肝臟風熱眼中不見物及有汗

石決明　乳香各一分　膽草二分　大黃半兩煨

右爲末每服兩錢用薄荷溫水調下莊氏第十六候用此方

除熱結腸丸

斷小兒熱下黃赤汁沫及魚腦雜血肛中瘡爛坐蠱生蟲

黃連　蘗皮　苦參　鬼臼　獨活　橘皮

芍藥　阿膠各半兩

右八味末之以藍汁及蜜丸如小豆日服五丸至十九冬無藍汁可用藍子一合舂蜜和丸

蘆蜜湯

治濕蟲

生蘆汁五合　白蜜三合　黃連三兩

右三味以水二升別煮黃連取一升去滓內蘆蜜更煎取一升二合五歲兒平旦空腹服四合日二

杏仁湯

治蟲

杏仁五十枚　苦酒二升　鹽一合

右三味和煮取五合頓服之小兒以意量服

又方

治蟲蝕下部

胡粉　雄黃

右二味各等分末著穀道中亦治小兒

張渙桃白散

治腸胃俱虛腹內蟲動侵蝕下部疳瘡濕蟲

桃木白皮　黃蘗蜜炙　黃連去鬚炒各一兩

凈蛇脫皮半兩燒灰　蝸牛乾者一分燒灰

青州棗五十枚去核燒灰

右件同搗羅爲細末入定粉麝香各一分同研勻每服一字粥飲調下乳食前

如聖丹

乾蟾蜍七枚燒灰　蟬殼去土半兩　蚺蛇膽大棗去核燒灰各一分已上搗羅爲細末次用

黃丹　定粉　麝香並細研各一分

右件同拌勻用好醋一大盞都搗一二百下成膏如黍米大每服五粒至七粒米飲下量兒大小加減或化三兩粒塗患處若蟲出乃愈

錢乙金華散

治小兒一切濕瘡癬疳

黃蘗　黃連各半兩並爲細末　黃丹一兩火飛

輕粉一錢　麝香一字別研

右同研勻先以溫水洗後貼之

化蟲丸

治諸疳生蟲不時啼哭嘔吐清水肚腹脹痛唇口紫黑腸頭濕蟲

蕪荑　蘆薈　青黛　川芎　白芷梢　胡連

川連　蝦蟆灰各等分

右爲末猪膽汁浸糕糊丸麻子大每服二十丸食後臨臥杏仁煎湯下其鼻常用熊膽煎湯小筆蘸洗候前藥各進數服却用青黛當歸赤小豆瓜蒂地榆黃連蘆薈雄黃爲末入鼻斂瘡

張渙四珍丹

治諸疳羸瘦毛髮焦黃口鼻生瘡

乾大蟾一枚去四足劈開腹入胡黃連半兩在內以線縫合用濕紙三兩重裹以泥四面固濟用炭火燒令通赤爲度放冷去泥搗爲細末　蘆薈半兩研

麝香一分研

右件都拌勻再研令細以白麪糊和如黍米大每服五粒至七粒粥飲下量兒大小加減

又方

治小兒一切疳毒有瘡

苦楝皮五斤　七姑葉半兩　甘草　礬各二兩

葱白十莖

右粗搗令勻用水五斗煮五七沸旋旋添洗瘡處如久患只兩服立效

殊聖方

治小兒疳肥瘡多生頭上浸淫久不差及耳瘡等悉皆治之

石綠　白芷各等分

右以生甘草水洗瘡數藥自愈

集聖丸

蘆薈　五靈脂　夜明砂炒　砂仁　橘紅

木香　莪朮煨　史君子肉各二錢　川連

川芎　乾蟾灰各三錢　當歸　青皮各一錢半

因於虛者加人參二錢白朮三錢去莪朮青皮

因於熱者加龍膽草三錢去砂仁莪朮

因於吐瀉下利者加白朮二錢煨肉果訶肉各一錢五分去青皮莪朮

因於積痛者加煨三稜川楝子肉小茴香各二錢去當歸川芎

因於瘧者加鼈甲醋炙三錢

因於蟲者加白蕪荑一錢五分川楝子肉二錢去當歸川芎

因於渴者加人參白朮各二錢去莪朮砂仁

右爲細末用雄猪膽汁二箇和麪糊爲丸看大小服米飲送下

疳積散

治慢乳病乳夾乳夾食大病之後飲食失調平居飲食過飽傷脾致成疳積面黃腹大小便色如米

泄大便瀉黃酸臭頭皮乾枯毛髮焦穗甚至目澀羞明睛生雲翳形體骨立夜熱晝涼丁奚哺露等證並用主之

厚朴厚而紫色有油者佳去粗皮切片生薑自然汁炒熟爲末淨一兩　廣陳皮去白爲末八錢

粉甘草去皮淨爲末　眞蘆薈淨末各七錢

蕪荑眞孔林大而多白衣者去白衣殼淨末五錢

青黛取顏料鋪淨碎如佛頭青色者研淨末三錢

百草霜乃山莊人家鍋底墨也淨末　錢研

旋覆花淨末一錢半

右件勻和成劑用每一歲藥一分用燈心湯早上空心時調服服後病卽愈當再用肥兒丸調理

如脾氣未實用啓脾丸或大健脾丸

如疳氣未盡用陳皮一兩白朮木香三錢白茯苓五錢加好半胃散三錢陳米粥湯調服

神效丹

治小兒疳氣不可療

綠礬用火煆通赤取出用醋淬過復煆如此三次

右細研用棗肉和丸如菜豆大溫水下日進二三服

麝香丸

主小兒疳瘦面黃髮穗骨立減食肌熱驚癎疳蟲

麝香研　蘆薈研　黃連末

右等分研勻滴水丸黃米大一歲三丸三歲五丸至七丸人參湯下日三服無比奇效

一方胡黃連四分餘二物各二分療疳痢溫瘧無比尤驗一名聖丸疳藥百數無如此者小兒癲癎驚風五疳三蟲服之立見功效蚘蟲作疾枯瘁久疳不住熟藥調護最難得法唯以四味飲散紫圓至聖散五加皮治不能行蜀脂飲幷此麝香圓七方謂之育嬰七寶紫陽道士亦名保子七聖至寶方專爲一書者此是也

靈苑千金丸

治小兒一切疳久服令兒肥壯無疾

川楝子肉　川芎各等分

右同爲末猪膽汁和杵爲丸如麻子大量兒大小加減丸數每以飯飲吞下日二服常服三九至五丸

張氏家傳丸如菜豆大分五分用硃砂青黛定粉光墨蜜陀僧名爲五色丸非時進米飲下

孔氏家傳治疳熱下蟲方同用臘月乾猪膽膏爲丸如乾湯化動丸菜豆大十丸十五丸肉湯下疳蟲如髮便看卽見稍遲卽化

太醫局蘆薈丸

治疳氣羸瘦面色痿黃腹脅脹滿頭髮作穗搔鼻咬甲好喫泥土痢色無定寒熱往來目澀口臭齒齦爛黑常服長肌退黃殺疳蟲進乳食

乾蝦蟆　大皂二味等分同燒存性末每一兩入青黛二錢半　蘆薈　麝香　硃砂各一錢

右蒸餅爲丸每服二十丸米飲下量兒大小加減

錢氏膽礬丸

治疳消癖進食止瀉和胃道蟲

膽礬眞者一錢　綠礬眞者二兩俱爲粗末

大棗十四箇　好醋一升

已上四物同熬令黧爛和後藥

史君子二兩去殼　枳實去穰炒三兩　黃連

訶勒皮各一兩並爲粗末　巴豆二七枚去皮破之

已上五物同炒令黑約三分乾入後藥

夜明砂一兩　蝦蟆灰一兩　苦楝根皮末半兩

已上三物再同炒候乾同前四物杵羅爲末却同前膏和入臼中杵千下如未成更旋入熟棗肉亦不可多恐服之難化太稠卽入溫水下不拘時

西京丁左藏蝦蟆丸

肥筏兒常服得效

乾大蝦蟆一枚浄浸三宿去腸肚頭爪淨酥炙香

陳皮二錢半　胡連一兩　鬱金　蕪荑仁各半兩

右爲末於陶器內用豬猪膽汁和令稀稠得所於飯上蒸熟爲度取出半日丸如菜豆大常服五七丸陳米飲下

張氏神麴散

治小兒諸般疳

神麴　陳橘皮不去白　川大黃濕紙裹炮熟

芍藥各一錢二分　桔梗　川芎　厚朴薑汁製

枳殼麩炒　白茯苓各二錢半　人參一錢五分

甘草五錢炙

右爲細末每服一錢入盞一片煎服無時

莊氏方

治小兒一切疳肌膚消瘦瀉痢不止口鼻生瘡水穀不化

蝦蟆灰　礬　烏賊魚骨炙　蜜陀僧各二錢半

麝香一錢二分半

右爲末煉蜜丸如菜豆大溫水下三九聖惠方同
但麝香用半兩莊氏第五候用此方
治小兒一切疳方
蟾頭一箇炙　膩粉　豉　蕪荑　黃連各二錢半
右爲末軟粟米飯爲丸麻子大早晚米飲下三九
又方
莊氏第十七候用此方及香連丸
蘆薈　胡黃連　硃砂　青黛　麝香各二錢半
蟾酥少許
右爲末飯和丸如芥子大每服空心臨臥溫熱水下五七九
定命丹
洪州張道人傳治小兒一十二種疳肝疳急疳風疳肉疳脊疳口疳腦疳食疳蛔疳脾疳腎疳心疳定生死有此候者取得蟲青者死黃者可治
木香　夜明砂　麝香各一分　蟬蛻三分
胡黃連二錢　金箔　銀箔各五片
右件爲末米飯丸如麻子大空心米飲下三九日三服忌醯酸油膩
又方
第一肝疳小兒雖飲乳漸喜食肉尤愛酸醎只服定命丹欠服此藥
肉豆蔻煨二箇　枳殼炒七錢半　白茯苓
胡連各半兩　大黃　甘草　丁香　麝香各二錢
右爲末每服一字米飲下日二服久者五服效
演山史君檳榔丸
治小兒食肉太早傷及脾胃水穀不分積滯不化疾作疳痢等候並宜服之
肉豆蔻一箇　生檳榔一箇　宣連　胡黃連
陳皮　青皮　川楝肉炒　蕪荑炒去皮　神麴
麥芽並炒　木香　夜明砂淘淨炒　蘆薈
川芎各一錢　麝一字
右件爲末猪膽汁薄荷汁爲丸如麻子大每服三五十丸溫飯飲下
胡黃連丸
治一切疳候及一切虛瘌他藥無功此藥極效
胡黃連　蘆薈　黃連　肉豆蔻炮　桂心
人參　硃砂　史君子去殼　木香　釣藤
龍齒　白茯苓以上各一錢　麝香一字
右件各生用爲細末取猪膽二枚梨汁和末令勻却入袋內盛之用線紮定湯煮半日取出切破袋子加良薑子二錢黃丹一錢二味另研如粉入前藥和勻搗五百杵丸如菜豆大但是疳與痢用粥飲下五七丸子幼者三丸不喫粥飲乳頭令吮能治一十二種痢及無辜者功效非常
肥肌丸
治小兒一切疳氣肌瘦體弱神困力乏常服殺蟲消疳開胃進食
黃連去鬚　川楝肉炒　川芎各半兩　陳皮
木香二錢　香附子各二錢半酒煮炒乾
右件爲末水煮細麵糊爲丸如麻子大每服三五十丸溫飯飲下
湯氏鼈甲散
治小兒食肉太早傷及脾胃水穀不分積滯不化疾作疳痢等候並宜服之
鼈甲九肋者湯浸用童便塗炙　黃芪蜜炙
白芍藥各一兩　生地黃　熟地黃　地骨皮
當歸　人參各半兩
右㕮咀每服二錢水半盞煎服
化蟲丸
治疳熱
白蕪荑　黃連　神麴　麥芽各炒等分
右末糊丸如黍米大空心米飲下猪膽汁九佳
猪肚丸
治骨蒸疳勞肌體黃瘦
木香半兩　黃連　生地　鼈甲九肋者童便炙
銀柴胡　青皮各一兩
右爲末猪肚一枚入藥於內以線繩之於沙罐內懸肚煮熟取出細研猪肚爲丸如麻子大米飲送下量大小加減不拘時服
三因龍膽丸
治疳病發熱
龍膽草　黃連　史君子肉　青皮各等分
右爲末猪膽汁和丸如桐子大每服三十丸臨臥熟水下量兒加減
二丁丸
治乳癖食癖疳熱
丁香　蜜陀僧各一兩　韶粉一錢　硫黃三錢
白丁香半兩
右爲細末糊丸如小豆大三歲兒十丸日晡時米飲下飲乳者乳汁下次日當取下惡物熱即鼈退
加黃鶯屎一錢尤妙

譚氏殊聖金瓜丸

治小兒疳熱身多壯熱黃瘦久服令肥

黃連　黃蘗　甘草微炮　青皮各等分

右爲末入麝香少許用豬膽一枚入藥膽內線紮定入石器中煮水煮五七沸取出風弔一宿丸如菉豆大每服五七丸米飲下量兒大小加減

玉訣方同外以硃砂爲衣仍治疳疳博濟方同劉氏家傳方亦同

或添胡黃連

若早晨服史君子丸晚服金瓜丸永無疾消食長肌肉

莊氏家傳方同仍加夜明砂一味等分趙氏方亦同名良疳藥長沙朱司理以爲有神效

蘆薈丸

治小兒驚熱疳不思食

蘆薈　熊膽　硃砂各二錢半　青黛七錢半

訶勒皮煨取肉三錢　麝一錢

右爲末糯米飯爲丸如麻子大空心隨歲數與之用砂糖水嚥下五七丸

茅先生柴胡散

治小兒疳熱四肢如柴不能起止

柴胡　知母　貝母去心　茯苓　茯神　乾葛　甘草炙各等分

右爲末每服用小麥一匙頭藥一匙頭水一盞同煎六分去滓服

六物黃芩湯

治小兒腹大短氣熱有進退不安穀爲之不化

黃芩　大青　炙草　麥冬　石膏碎各半兩

桂皮二錢

右每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服

莊氏青黛丸

治疳熱

青黛研一兩　胡連　宣連　天竺黃研各半兩

朱砂水飛二錢半　麝香研一錢　肉豆蔻二箇

乾蟾一枚端午日取者酒浸洗去肚腸塗酥炙黃

牛黃半錢研

右件除研藥外爲末再同研勻菉豆粉煮糊丸如芥子大每服空心夜後熱水下三丸忍菉豆粉雞和圓菉豆麪作糊亦得

王氏史君子散

治疳熱

史君子不拘多少

曝乾爲末空心米飲下大者一錢小者半錢取蟲出爲度

柴胡飲

治骨蒸疳氣五心煩熱日晡轉盛口乾無味渴多身瘦胃滿痰緊小便黃色食減神昏

北柴胡　人參　當歸酒洗　黃芩　赤芍藥　炙草各一兩　生大黃　桔梗炒　北五味半夏湯煮透去滑各半兩

右藥每服二錢水一盞烏梅一箇薑二片煎七分無時溫服

乾地黃煎

治小兒疳勞肺氣熱咳嗽四肢漸瘦心脈乾生地黃汁五兩　酥　生薑汁　蜜各一兩

鹿角膠半兩

右先以地黃汁入鐺內慢火煎手不住攪約五六沸下酥又五六沸下蜜次下膠又下薑汁慢火煎後如稀餳即住火每食後兩度共與一匙頭忌諸毒物

王先生雞肉煎丸

治小兒十歲以上疳勞壯熱形瘦

宣連二兩　銀柴胡　秦艽　知母　史君子肉子芩各一兩　蕪荑去衣　川鶴虱各半兩

右爲末以黃雄雞一隻重一斤許龍之專以大麻子飼之至五日後宰去毛令淨於臀後開孔去腸肚淨洗拭乾入藥末於雞腹內以線縫之取小甑先以黑豆鋪甑底厚三寸安雞在甑中四旁以黑豆圍裹上亦以黑豆蓋之自日出蒸至晚候溫冷取雞去腹中藥及筋頭麴以淨肉研勻和得所如乾入酒麪糊爲丸如大麻子及小菉豆大每服十丸十五二十丸以意加減空心臨臥麥門冬熟水吞下如小兒疳勞骨熱十五歲以上溫酒下忌豬肉

張氏三和飲子

治三焦膈塞五臟澀滯氣逆痰涎米食後惡涎太陽昏痛及治山嵐瘴氣吐逆不美飲食面色浮黃指甲青黑小兒疳勞吐乳及久病乍安神氣未復寒熱往來並皆救療

紫圓人參三兩半洗剉　甘草一兩半炙剉

綿黃芪五兩酒浸一宿洗淨剉

右件三味同入木臼內用木杵擣爲粗散每服三大錢生薑三片水二盞棗二枚同煎八分去滓服不拘時候

犀角散

治小兒骨熱解毒

銀柴胡　川大黃　甘草炙　川芎　茯苓　芍藥　乾葛　桑白皮　地骨皮　山梔仁　黃芩　貝母各半兩

右爲末每服一大錢水一盞入青蒿一枝小麥十粒煎七分溫溫服之

大段有患更入麝黃連蔥二味與前藥等分爲末煎服之效莊氏第二十一候用此方

龍血煎

治勞疳

蕪荑　銀柴胡　川芎各一兩　人參半兩

史君子二十一枚去殼　胡黃連　宣黃連各七錢

右用龍血一盞吳茱萸一兩和二黃連淹一宿次早炒乾去茱萸并血用二連入餘藥末粟米粉糊丸麻子大食前熟水下

黃連丸

治疳勞

黃連半兩爭猪膽汁浸曬　石蓮子　瓜蔞根

杏仁湯浸去皮焙　烏梅肉各二錢

右爲末牛膽汁浸糕糊丸麻子大煎烏梅薑蜜湯下

天竺黃散

治小兒疳多渴體熱煩躁少得睡臥

天竺黃細研　黃連去鬚　馬牙硝　梔子仁　葛根剉各半兩　甘草炙微赤剉　牛黃細研　款冬花　紫苑　犀角屑　土瓜根各二錢半

右件藥搗細羅爲散都研令勻不拘時候以蜜水調下半錢量兒大小加減服

又方

治小兒疳熱煩渴不止

乾蠐螬頭二枚酥炙焦黃　蝸牛殼微炒　胡黃連　瓜蔞根各半兩

右件藥搗羅爲散每服以竹葉湯調下半錢不計時候量兒大小臨時加減服之

五膽丸

治小兒渴疳

猪膽　狗膽　牛膽　鯽魚膽　蝟膽已上各一枚

右件藥四膽汁並入牛膽內在龍北後懸候稍乾可丸即丸如黍米大每服以新汲水下二九以飲水足爲度空心午後各一服更量兒大小加減

胡黃連散

治小兒疳熱渴乾瘦

胡黃連　犀角屑各二錢半　生地黃汁一合　蜜半合　羊子肝一具研取汁　麝香半錢細研

右件藥搗胡黃連犀角細羅爲散入麝香研勻以羊肝汁地黃汁蜜等調令勻每服煎竹葉湯調下

藥汁一茶匙量兒大小加減服之

黃連丸

治小兒疳熱煩渴

黃連　天竺黃　牛黃各細研　炙草　梔仁　款冬花　葛根　紫苑　犀角屑各二錢半　川朴硝半兩　竹瀝二合

右件藥搗羅爲末先用竹瀝拌和更入熟蜜和丸如菉豆大每服以新汲水研破五丸服之日四五服量兒大小加減

又方

蝸牛三十五枚爭盞內以物蓋令行即有似銀泥處右以臘粉和搭取使丸之如黍米大不拘時候以溫湯下二九

又方

杏仁湯浸去皮尖雙仁二錢半　臘粉一錢

右件藥研杏仁如膏入臘粉相和令勻用麪糊和丸菉豆大空心以粥飲下三丸

龍粉丸

治疳渴

草龍膽　定粉微炒　烏梅肉焙秤　黃連各二分

右爲細末煉蜜和麻子大米飲下一二十丸無時清香丸

治小兒疳渴引飲不休肌體羸劣

胡黃連　青黛　朱砂　鶴虱各等分

右爲末豬膽汁和丸菉豆大每服三丸米飲下

劉氏方

治小兒疳渴

豬胞一箇大者　甘草一兩寸斷劈破入胞內

右以水一斗煮至三升去甘草將胞焙乾末之每服二錢或三錢熟水調下

莊氏方

治小兒疳渴

蛤粉取生大鮎魚一尾以粉塗頂上刮下涎入粉

右同研丸雞豆大每服一丸更用活小鮎魚一尾水半盞浸涎水一藥注子化下一丸立止便與和氣散一二服補之

又方

治疳渴不止

井泉石又名石甘遂　太陰元精石　馬牙硝

右各等分爲末入生硫黃少許每服半錢以生米泔水調下

吉氏家傳方

乾葛　胡黃連　炙草　黑參　麥冬各等分

右件爲末每服一錢水半盞薑一片煎四分服

又方

治小兒疳渴常服五疳不生

乾蝦蟆二枚長流水內刮去肚腸以法酒三升甑內煑令爛去骨研如粉　黃連淨四兩別爲末

硃砂一錢半　麝香一錢研

右先將蝦蟆膏與黃連末同研後更與麝香硃砂等研勻作丸如菉豆大每服十丸陳米飲下如患疳用黃蠟茶清下如難丸入些酒麪糊不妨

又方

治小兒一切疳熱渴

蚧蝦蟆大者兩枝　蝸牛蟲半升用水淘淨爲度然後用新瓦罐入二物在內用鹽泥固濟不得透風更進火燒令通赤候冷取出二物不用罐子入

大黃　黃連各半兩　麝香二錢半

右爲末麵糊丸如芥子大每服三丸至五丸米飲下莊氏第十六候用此方

又方

治小兒疳渴

人參　乾葛　黃芩　柴胡　甘草炮各二錢半

右爲末每服一錢水一盞煎五分去滓候冷分爲五服每吃藥時更點鉛白霜寒水石共研一字服之莊氏第二十候先用此止渴

惠眼防己丸

治疳嗽不止

漢防己　牽牛子　馬兜鈴炒　甜葶藶研各等分

右爲末煑棗肉爲丸如菉豆大每服十丸煎糯米飲下與溫肺散相間服

溫肺散

瓜蔞根半兩　甘草炙二錢半

右爲末每服一錢蜂蜜熟水調下

杏仁散

治小兒肺疳多是吃著熱米食及病妳傷損心肺便生喘嗽愚醫不辨冷熱以藥攻之變成黃腫漸覺昏沉宜服

杏仁十四粒　甘草　款冬花各二錢　麝香

胡黃連各一錢　半夏湯泡九次半兩

右件爲末每服一字棗湯調下日進二服

牛黃丸

治小兒疳積

雄黃研水飛　天竺黃各二錢　牽牛末一錢

右同再研麪糊爲丸粟米大每服三丸至五丸食後薄荷湯下兼治疳消積常服尤佳大者加丸數

張渙褐丸子

治小兒疳氣腹脹如鼓及妳癖食癖

蔔子一兩半炒　黑牽牛一兩炒　胡椒二錢半

木香　莪朮濕紙裹煨切作片子各半兩

右爲細末麪糊爲丸黍米大每服二十丸煎仙人骨湯下

換骨丹

陳粟米一合　橘皮　青皮　黑牽牛各半兩

巴豆去殼二錢半

右件一處同炒令焦黃色揀去巴豆不用却入木香半兩爲細末麪糊爲丸黍米大每服十丸橘皮湯下

莊氏參苓散

治小兒因積成疳久致脾胃虛弱不思飲食

人參　茯苓　川芎各一兩　甘草　芍藥

黃芪各半兩　青皮去白二錢半

右爲細末每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百六十七卷目錄
醫部彙考四百四十七
小兒諸疳門五
方四香甲丸　趙氏青蒿丸　五疳傷積方
青金膏　豆蔻散　胡黃連飲子　神效散　經驗檳榔
丸　粉霜丸　胡黃連丸　錢氏沒石子丸　聚寶黃龍
丸　吉氏蘆薈丸　良方吳婆散　斗門方　穀
莊氏家傳方　又方　孟詵方　青蒿散
痢丸　白龍骨丸　肉豆蔻丸　乳香丸　聖惠方連翹
蘗丸　八香丸　又方　吉氏家
傳方　胡黃連丸　疳腫服方　又方　地黃丸　補
散　御藥方　勻氣散　烏金膏
中盆案湯　錢氏異功散　元戎方　聖惠方
蔡氏九　姚黃瓜丸　大
黃丸　檳牡丸　香甲丸　聖惠訶黎勒散
溫脾散　五香煎　蘆薈丸　露星膏　二聖
丸　香連丸　神孔氏醉聖丸　豬肚
丸　趙氏香連丸　蘆薈丸　吉氏經見丸
經方肥兒丸　朱氏家傳方　聖惠方
醍醐散　快意丸　聖惠方　藥丸
藥丸　保命集方　勞者丸
單方
鍼灸
醫案
藝術典第四百六十七卷
醫部彙考四百四十七
小兒諸疳門五
方四
香甲丸
治小兒積疳潮熱盜汗羸瘦煩渴手足心熱服之皆效輕骨長肌
木香二錢五分　鼈甲去裙醋炙　檳榔
史君子肉　柴胡　黃連各半兩
右爲末猪膽汁和丸菜豆大每服二十丸臨臥米飲下久發潮熱多汗無力者服之卽效
趙氏青蒿丸
療小兒久積疳氣日漸羸瘦面黃頭髮作穗好食土咬指甲捻鼻兼治骨蒸勞熱及取疳蟲退諸臟積熱小兒常服遍身香爲效
檳榔一枚　白蕪荑四十九箇　黃連十四莖
夜明砂淘淨二錢半已上爲末　太陰元精石
麝香　小葱子炒　朱砂飛各半錢　蘆薈
天竺黃　青黛各一錢
右將後七味同研細與前四味一處再研勻令極細取青蒿自然汁慢火熬濃仍用猪膽一枚取汁同搗丸如粟大每服五丸至七丸並用米飲下
醯醋湯亦得取疳蟲煎酸石榴湯下二十服取盡蟲
五疳傷積方
蕪荑　黃連各一兩　史君子連殼十四箇
鶴虱少許　神麴半兩
末之猪膽調麪糊爲丸菜豆大每服十丸米飲下
青金膏
治疳積
青黛　朱砂　蘆薈　蟾酥各一錢　麝香半錢
蜣螂一枚　蛇皮頂後四寸
右末水化酥丸粟大每服兩丸倒流水送下又水化一丸注於鼻中須臾眉上白蟲出便安青雞治
豆蔻散
治疳積或冷利腹大腳小身熱面無顏色
肉蔻二箇　胡連一錢　史君子四枚　青黛
楝根　蕪荑　厚朴薑汁炙　炙草各半兩
麝香少許　夜明砂一錢半別研
右末每服一錢或半錢蜜水或粥飲調下
知母散
治諸般疳積肚脹無時瀉痢或時壯熱狀如癆疾
知母　青皮焙乾　柴胡各二錢　甘草炙
紫參各三錢　訶子肉煨熟三枚
右爲細末每服一錢水五分煎至三分溫服有熱則退有痢則除有結則通
經驗檳榔丸
治小兒疳病積氣成塊腹大有蟲等證其效如神
檳榔一兩　三稜醋炙　莪朮醋炒　青皮麩炒
陳皮　雷丸　乾漆炒煙盡　麥芽　神麴炒
山楂肉各半兩　鶴虱炒　木香不見火　炙草
胡連各三錢　蕪荑二錢半　貝母土炒一錢
砂仁一錢
右爲細末醋糊爲丸如菜豆大每服三五十丸空心淡薑湯下
粉霜丸
治小兒疳一切瀉
粉霜　白丁香各一錢　巴豆二枚不出油
右末爛飯爲丸如小菜豆大每服井華水下二丸
二聖丸
治小兒臟腑瀉久不愈羸瘦成疳宜常服此方
川黃連　黃蘗去粗皮各一兩
右爲細末將藥末入猪膽內湯煮熟丸如菜豆大

每服二三十丸米飲下量兒大小加減頻服無時

胡黃連飲子

治小兒疳熱作瀉少食面黃體黑日漸瘦悴

胡黃連　黃蘗子　人參　炙甘草　白朮微炒　秦艽　柴胡各等分

右各咬用淨咬咀每服二錢匕水一盞嫩桃柳枝各七寸烏梅少許同煎八分去滓分作兩分早食後少空一服臨臥再服以小便深赤爲驗候小便清住藥便生肌膚進食大抵小兒羸瘦並宜服此

黃連丸

治疳瀉疳痢

淨黃連爲末　大蕪荑仁乳鉢研細各等分

右二末一處和勻糯粟米相和煮稀粥爲丸小菉豆大量兒大小三歲七丸至十九三歲以上十五丸至二十九空心陳米飲下日進三服

胡黃連丸

治小兒疳疾瀉痢

胡黃連　丁香　蜜陀僧各半兩　肉豆蔻一箇　檳榔一枚　紅雪一兩　訶子二枚一煨一生用

右七味研細入麝香二錢半和勻入菜豆末少許水和丸如麻子大三歲以下一丸三歲以上五丸

孩子腦疳鼻瘡及赤爛黃連湯下

脾虛羸瘦泄痢四肢虛腫青州棗湯下

肝疳眼澀生瘡甘草湯下

骨疳冷地臥愛食土紫蘇茶湯下常服米飲下

肺疳上氣急喘橘皮湯下

筋疳瀉血鹽湯下

疳蟲及瀉無定生薑湯下

錢氏沒石子丸

治泄瀉白濁及疳痢滑兒腹痛者

木香　黃連各二錢半　沒石子　豆蔻各一箇　訶子肉三箇

右爲細末飯丸麻子大米飲下食前量兒加減

聚寶黃龍丸

定小兒疳冷瀉

朱砂研一錢　龍腦半字研　舶硫黃一兩　雄黃二錢半

右用甘鍋子上炭火燒甘鍋其藥飛在盞底上刮與朱砂雄黃同研入腦子糯米粥丸如黃米大每服三丸食前椒湯下

吉氏薑膏丸

治疳瀉不止不思飲食腹脹

丁香　肉豆蔻去皮　木香剉各半兩

右三味用麪裹慢火中煨熟爲度取出去麪入薑膏一兩史君子肉半兩同爲細末稀糊爲丸如黍米大每服十九至二十九米飲下

良方吳婆散

治小兒疳瀉不止日夜不計遍數漸漸羸瘦

楝根白皮一錢半　桃根白皮　黃蘗蜜炙　蕪荑　黃連微炒已上各二錢半　厚朴薑汁炙　木香　檳榔　丁香各一錢　沒石子一錢半

右爲末每服一字三歲以上半錢五六歲一錢用紫蘇木瓜米飲調下乳食前一日三服

張三錫曰此藥若是疳瀉無不驗者藥性小溫暴熱瀉者或不相當

斗門方

治小兒疳瀉

赤石脂

右杵羅爲末極細如粉以粥飲調半錢服立差或以京芎等分同服更妙

莊氏家傳方

治疳瀉久不瘥

赤石脂　綠礬　石灰各二兩　硫黃半兩

右研勻入罐子內燒令焰碧去火放冷取研每服一字或半錢煎小黃米飲放冷調下食前服

又方

史君子炮　五倍子炙上炒黃　沒石子各等分

右爲末每服半錢陳米飲調下

孟詵方

療小兒疳痢

樗木根取白皮一握　倉粳米五十粒　豉二合

炙草二寸　蔥白一握

右以水一升煮取半升以意服枝葉與皮勿用

青黛散

治小兒疳痢不止下部痒

青黛　蠣灰　胡粉微炒　黃連去鬚微炒　麝研各二錢半　赤石脂半兩　訶梨勒皮一兩煨

右件搗羅爲散每以乳汁調下半錢日三四服

殺疳丸

治疳痢不止

雄黃　麝香　牛黃　蕪荑　朱砂各研細

龍骨燒赤　蜜陀僧燒紅　胡黃連各二錢半
青黛半兩　金箔十片　肉豆蔻二枚去殼
蟾酥一錢二分半熟水化如泥
右件藥搗羅爲末入研藥及蟾酥研令勻湯浸蒸餅和丸如黃米大每以溫水下三丸煎黃連苦參湯洗身上用青衣蓋出蟲瘡

白龍骨丸

治疳痢不止
白龍骨　白石脂　爐燒令汁盡　黃連微炒
胡粉微炒　白茯苓　阿膠搗碎炒黃各半兩
右爲末煉蜜圓麻子大每粥飲下五九日三四服

肉豆蔻丸

治小兒疳痢不喫乳食四肢瘦弱
肉蔻去殼一枚　木香半兩　人參　訶子肉煨
朱砂　麝香並細研各二錢半
右搗羅爲末都研令勻用軟飯和丸如麻子大每服以米飲化下三丸日三四服量兒加減

聖惠黃連散

治小兒疳痢久不瘥肌肉消瘦面黃髮焦啼叫不常
胡黃連末　白礬燒令汁盡　白龍骨末各半兩
胡粉微炒二錢半
右件藥同細研爲散一歲兒每服以米飲調下一字二歲每服半錢隨兒大小量病輕重加減

蕪荑丸

治小兒久疳痢不瘥
蕪荑末半兩　羊子肝一具
右先以子肝切作片子以蕪荑末摻在肝內線纏合米泔中煮令熟搗爛糯米飯和丸如麻子大每以粥飲下五九早晨晚後各一服量兒加減

八香丸

莊氏第一候瀉膿血日漸瘦是冷熱疳宜服此
胡連一錢　麝　麝各半錢　牛黃一錢二分半
蘆薈一錢五分　蟾酥五捻子作塊者亦得
白花蛇半兩酒浸去骨　蠍梢二錢半
右爲細末猪膽丸如黃米大每服五九米飲下
如患甚仍用生米泔調作散服半錢日三服

又方

治小兒腸鳴瀉痢口鼻乾常有鮮血日夜疼
白朮炮　硫黃各二錢半　枳殼炒　胡黃連
當歸各半兩
右爲末每服半錢熟水調下

沉香丸

治小兒疳痢下赤色膿血下部脫肛
沉香　人參　蠍　胡黃連　乳香各一分
龍骨　甘草各二分
右件爲肉丸麻子大每服三九米飲下日二服久患七服效

白朮散

治小兒疳痢腹脹疼痛日夜三二十行
白朮一兩微炒　當歸　地榆並剉微炒　木香
赤芍藥　甘草炙半兩
右件藥搗粗末爲散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分減
胡黃連丸

治小兒疳痢腹痛不止
胡黃連半兩　沒藥　木香各二錢半
右件藥搗羅爲末糯米飯和丸如菉豆大每服粥飲下五九日三四服量兒大小加減

疳癰脹方

治小兒五疳八痢及髮焦黃肚脹手足瘦細肚上筋脈起揩眼鼻涕垂至口咬指甲或下部生瘡及大小便不通宜此療之
蘆薈　夜明砂炒　蛇脫灰　黃牛角屑各一分
蟾酥少許
右爲末入麝香少許煉蜜丸菉豆大每服三九甲米飲下間用桃柳葉湯浴兒將青衣蓋之更用藥一二九安兒臍中醋調糊青帛貼之候蟲出爲度如無蟲但汗出爲妙服藥三日後宜減一九

又方

治小兒疳氣腹腫有似水氣
肉豆蔻一箇　木香炮　麝香　硇砂各一分
胡黃連半兩煨
右末飯丸麻子大米飲下三五丸莊氏第十八候用此方

吉氏家傳方

治疳肚如鼓
蜜陀僧　風化灰各一錢　黃丹半錢
右爲末以猪肉炙一片用藥半錢蘸上與喫如不會喫乳母嚼與

御苑勻氣散

治脾肺氣逆喘咳面浮胷膈痞悶小便不利
桑白皮二兩　陳皮一兩半　桔梗炒　炙草
赤茯各一兩　藿香半兩　木通四兩
薑水煎服

烏金膏
治小兒疳氣灌入陰黃亮色
通草　黃皮　大黃各二錢半燒
右各燒存性爲末每用一錢猪膽調成膏於陰上
塗如未退煎蛇牀子湯洗後再調塗之

地黃丸
治腎疳腦熱消瘦手足厥冷寒熱往來滑瀉肚脹
齒齦潰爛爪黑面黧遍身兩耳生瘡出水
熟地黃八錢　赤茯苓　山茱萸肉　牡丹皮
山藥　澤瀉各三錢
右爲末丸如梧子大每服三丸溫水化下
加肉桂一兩名加減八味丸

補中益氣湯
治中氣虛弱體疲食少或發熱煩渴等證
人參　黃芪各一錢　白朮土炒　炙甘草
陳皮各五分　升麻　柴胡各二分　當歸八分
右薑棗水煎空心午前服

錢氏異功散
治吐瀉不食凡虛冷證先與數服以正胃氣
人參　白朮炒　白茯苓　炙甘草　橘紅
木香各一兩
右剉散每服二錢薑棗煎服
一方去木香

充悅方
外臺小品療四五歲兒因食及在胎中宿熱乳母
飲食粗惡辛苦乳汁不起兒哺不爲肌膚心腹痞
滿痿黃瘦脊四肢痿躄繚戾
芍藥一錢炙黃　黃芪　鼈甲炙　人參各四分
柴胡八分　茯苓六分　甘草炙　乾薑各二分
右八味搗篩蜜和爲丸如大豆服五丸日二
千金有大黃無黃芪
如熱去乾薑用枳實

聖惠黃芪丸
治小兒羸瘦體熱面色痿黃不欲乳食
黃芪剉　赤芍藥　人參　甘草炙微赤剉
胡連各半兩　麥門冬　鼈甲醋炙微黃各一兩
柴胡三分
右件藥搗羅爲末煉蜜和丸如麻子大不拘時候
以粥飲下五丸量兒大小以意加減

秦艽丸
治小兒羸瘦體熱心神煩悶小便赤黃
秦艽　桑根白皮　枳殼麩炒微黃　地骨皮
黃芪　人參　赤茯苓　炙草　犀角屑各半兩
龍膽一分　柴胡三分
右件藥搗羅爲末煉蜜和丸如菉豆大不計時候
用粥飲下五丸更隨兒大小加減

麥門冬丸
治小兒雖食不著肌膚羸瘦骨熱小便赤黃
麥門冬一兩　人參　黃芪　青蒿子　黃連
桑根白皮　枳殼麩炒微黃　地骨皮各半兩
柴胡三分
右件藥搗羅爲末煉蜜和丸如菉豆大不計時候
以熟水研五丸服量兒大小以意加減

燒黃瓜丸
治小兒羸瘦體熱乳食全少
黃瓜大者一枚　陳橘皮焙　黃連各半兩
鼈甲童便浸三宿炙黃　胡連　柴胡各一兩
右件藥搗細羅爲散以黃瓜切開頭去瓤內藥末
令滿以切下蓋子蓋之用香麥麪和搗固濟可厚
三分於糖灰火內燒麪焦黃取出去麪放冷入麝
一錢都研和丸如菉豆大每服食前米飲下七丸

大黃丸
治小兒胃氣不調不嗜食不生肌肉
大黃　乾地黃　茯苓　當歸　柴胡　杏仁
右各三錢爲末蜜丸麻子大飲下五丸日進三服

猪肚丸
解小兒肌熱時泄瀉及積滯不思飲食肌肉消瘦
鼈甲一兩同童便并醋共一升熱浸炙盡爲度
白朮　薯蕷各一兩　胡黃連　人參　青橘皮
紫菀　桃仁去皮尖　木香　炙草各半兩
柴胡一兩
右末入淨猪肚內繫定煑令極爛與藥同杵令黏
丸如桐子大每服二十丸不計時候溫水飲下

香甲丸
治童男室女氣血虛疎肌膚消瘦百節疼潮作溫
五心煩熱四肢逆冷不思飲食中滿氣滯健脾胃
暢神氣充肌膚澤顏色

柴胡　生乾地黃　三稜各三分　鼈甲醋炙黃
神麴　杏仁　熟乾地黃　麥芽炒各一兩
牛膝　木香　薑黃　當歸各半兩　白朮
川芎各一分
右爲細末白麪糊丸如梧桐子大每服十丸空心
茶清下或米飲亦得
右八方挾熱者宜之

聖惠訶梨勒散

治小兒羸瘦脾胃氣弱挾宿食不乳食四肢不和
訶梨勒皮　陳橘皮焙各半兩　黃芪　人參
白朮　藿香　桂心　白茯各一分　炙草半分
右件藥搗粗羅爲散每服一錢以水一小盞入生
薑少許棗一枚煎至五分去滓溫服日三四服量
兒大小以意加減

溫脾散

治小兒脾氣不和食少無力肌膚羸瘦
訶梨勒皮　人參各三分　白朮　木香　黃芪
白茯苓　藿香　陳橘皮焙　桔梗各半兩
炙草一分
右件藥搗粗羅爲散每服一錢以水一小盞入生
薑少許棗一枚煎至五分去滓不計時候溫服

五香煎

治小兒脾胃久虛吃食減少四肢羸瘦
丁香　沉香　木香　藿香　白朮各一兩
麝三錢　白茯苓　陳橘皮焙　黃芪各一兩
訶梨勒皮　炙草半兩
右件藥搗篩爲散以水五升慢火煎至一升以布
絞汁入鍋內煎麝香及蜜二合生薑汁半合棗肉
二十枚慢火熬成膏每服以粥飲調下半茶匙
右三方挾冷者宜之

蘆薈丸

湯氏云小兒疳積其狀漸黃瘦拍背如鼓鳴脊骨
如鋸乃積而成熱成疳也宜服此
蕪荑去皮先炒黃色次入後二味一處炒赤色
龍膽草　黃連各一兩
右爲末另入蘆薈一分和勻爛飯丸如黍米大三
歲兒服三十丸空心米飲送下

露星膏

黃芪蜜水炙　胡黃連　地骨皮　柴胡各等分
右爲末煉蜜丸如芡實大隔宿酒浸露一宿次日
澄去酒薄荷湯煖服之

二聖丸

治小兒臟腑或好或瀉久不愈羸瘦宜常服
黃連　黃蘗去粗皮各一兩
右爲細末入猪膽內重湯煮熟丸如菉豆大每服
二三十丸米飲下量兒加減頻服無妨

香蠚丹

治肌瘦面黃胃高脚細
乾蠚五枚浸去骨用瓦藏瓶一枚入蠚瓶內鹽泥固
濟炭火燒留一竅子以烟息爲度取出存性
胡黃連二兩　蛇蛻一兩燒灰　地龍半兩微炒
天竺黃　蟬殼各一分並爲細末入　硃砂半兩
麝香一分
右件都一處研勻糯米飯和如黍米大每服十粒
米飲下不拘時候量兒大小加減

雷丸丹

萬全云治小兒一切疳肚大脚細眼目口鼻生瘡
身體壯熱痢下泔淀日漸羸瘦面無光澤
生雷丸　生鶴虱　生史君子去殼　胡黃連
蘆薈各半兩　蠚一枚酒浸炙熟去皮足骨焙
木香　肉豆蔻各一分　蕪荑一兩微炒研入
硃砂二錢研留少許爲衣　麝香半錢
右爲末研合令勻用豬豬膽一箇取汁傾入瓷盞
中外以重湯煮過和杵爲丸如桐子大每服五九
至七九麥門冬熟水下早晨日午空心臨臥服

孔氏神聖丸

治小兒疳常服永無腸臟之疾
胡黃連　宣連　白蕪荑　木香　蘆薈各一錢
史君子二十枚
右除蘆薈一味外五味銀器內用猪膽汁熬成膏
後入蘆薈同丸如菉豆大每服五七粒空心日午
臨臥米湯下神效

猪肚丸

治小兒疳熱而瘦
蕪荑二兩用瓦煨乾取肉別爲末臨時入用
柴胡　黃連　秦艽各一兩
右用猪肚一箇中庸者破開洗淨入柴胡秦艽黃
連末于內以酒半斛童便一升煮乾舂令得所放
蕪荑末又舂勻丸如桐子大每服二十丸飲下

趙氏芩樞丸

治小兒疳久服肥白

蘆薈　熊膽各一錢　乾蝦蟆一枚　白礬
膽礬　綠礬各半兩四味同入罐內燒礬枯爲度
京三稜　石三稜　雞爪二稜　萆薢　鶴虱
雷丸　淡蕪荑　黑狗脊　南木香各半兩
沒石子三枚　史君子十枚
右爲末醋煮乾棗取肉爛研入少麪糊和藥極熟
丸如菉豆大每服七丸米飲下

蘆薈丸

治小兒諸疳羸瘦不生肌肉
蘆薈另研　南木香　紅芍藥　沒石子半兩
史君子去殼　胡黃連各二錢半　肉豆蔻二錢
人參一錢
右爲細末入麝香半錢別研令細與藥拌勻蜜水
打麪糊爲丸每服十五丸米飲下空心食前服

吉氏益兒丸

治小兒一切疳瘦夜多盜汗肌肉熱
人參　白朮　茯苓　柴胡　炙甘草　陳皮
鼈甲醋炙去裙襴　京三稜濕紙裹煨香各等分
右末煉蜜圓雞頭實大每一丸米飲化食前日三

祕方肥兒丸

消疳進食
黃連五錢　木香一錢　神麴　麥芽各一兩炒
白朮一兩　史君子肉煨　白豆蔻煨各五錢
檳榔一枚　蝦蟆一箇
右爲末麪糊丸如粟米大空心米飲下量兒加減

朱氏家傳方

治小兒脾疹疳瘦驚積
黃蘊蘊一箇去瓤用黃連末塡滿蒸爛取出用砂硝
末一錢蓋頭臨夜方取露一宿
右研爛爲丸如小菉豆大每服五丸熟水下

聖惠人參丸

治小兒哺露失衣當風腹大時痢或寒熱如瘧不
欲食縱食不生肌肉或不消化四肢羸瘦
人參　麥門冬去心焙　半夏湯洗七遍去滑
黃芪　大黃微炒　白茯　柴胡　黃芩各三分
訶梨勒皮　炙草　鼈甲酢炙黃去裙襴各一兩
芎藭半兩
右件藥搗羅爲末煉蜜丸如麻子大一二歲兒以
粥飲下三丸四五歲五丸日三服量兒大小加減

醍醐散

治吐瀉後調和脾胃消進飲食及丁奚哺露虛熱
煩渴氣逆惡心
陳皮　砂仁　厚朴薑汁浸一宿慢火焙乾
麥芽洗淨焙　烏梅各五錢　良薑剉東壁土炒
乾葛　烏藥各二錢半　草果仁炮二錢
炙草三錢
右碎每服二錢水一盞薑二片棗一枚鹽少許煎
七分空心溫服

快活丸

治丁奚疳皮膚瘦削骨露如柴肚大青筋小便白
濁睡臥煩躁神氣昏沉常服健脾化積進食肥肌
蒸餅一兩去頂剜空入青礬半錢仍以碎餅屑緊塞
上用水紙封定灰火中炮透取出候冷用之
右件剉焙爲末別以肥棗用米泔水浸經一宿飯
上蒸少時去皮核用乳鉢爛杵如糊同前餅末停
分再杵勻丸麻仁大每服三十丸至五十丸溫米
清湯無時送下兒小者亦以米湯化服其蒸餅不
拘箇數大約以一兩入青礬半錢重爲定下常如
前法製半觔作一料後人切勿以見方不重藥爲
誤余嘗屢試屢驗其餅如南饅頭樣是也

聖惠赤芍藥丸

治小兒丁奚雖食不生肌肉腹大食不消化
赤芍藥　川大黃微炒　鼈甲醋炙黃各三分
桂心　赤茯苓　柴胡各四分
右件藥搗羅爲末煉蜜和丸如麻子大每服煎蜜
湯下五丸日三服

嬰孺芍藥丸

治小兒寒熱腹大食不消化不生肌肉痿痹
芍藥　白茯苓　大黃各五分　柴胡四分
鼈甲三分炙　桂心二分　人參一分一方二分
右爲末蜜丸三歲以下服三小豆大不知加之七
八歲三桐子大不知加之
若腹堅大者加鼈甲一分
渴者加蘊蘊二分
病甚者服二十日效已試大良
一方有杏仁二兩人參三分

張渙大麝香丹

治小兒羸瘦腹大見青筋及丁奚等病
麝香研　硃砂細研水飛　粉霜研各半兩
五靈脂　肉豆蔻仁　乾蟾塗酥炙各一兩
夜明砂　白礬灰各半兩　乾地龍炒一分

乾蜣蜋七箇去翅炙令黃熟
右件搗羅爲末與硃砂等同研勻細煉蜜和如黍米大每服三粒至五粒溫水下量兒大小加減服

單方

小兒羸瘦甘草三兩炙焦爲末蜜丸菉豆大每溫水下五丸日二服金匱玉函
小兒疳痢地榆煑汁熬如飴糖與服便已肘後方下同
治哺露搗生薤根以猪脂煎服或炙鼠肉哺之
治小兒疳濕瘡用鐵衣著下部即瘥千金方下同
治小兒疳瘡以猪脂和胡粉傅之日五六度
又嚼麻子傅之日五六度
又羊膽二枚和醬汁於下部灌之猪脂亦佳
治小兒魃病炙伏翼熟嚼哺之
又燒伏翼末飲服之
小兒魃病寒熱如疳用冬瓜仁扁蓄各四兩水二升煎湯洗之
小兒蚘病羸瘦猪膏服之一云治蟯蟲
小兒疳痢頻數用生薔薇根洗切煎濃汁細飲
治小兒蚘蟲削楝木上蒼皮以水煑取汁飲之量大小多少爲之此有小毒或爲末米飲服二錢
治小兒羸瘦有蚘蟲以藿蘆二兩水一升米二合煑取米熟去滓與服
又用扁蓄三兩水一升煑取四合分服或搗汁服
又以桃白皮三兩東引吳茱萸根白皮四兩二味㕮咀以酒一升二合漬之一宿漸與服取瘥
又搗槐子內下部中自瘥
又楝實一枚內孔中
治白蟲以東行石榴皮一把水一升煑取三合分服
又擣桃葉絞取汁服之
治小兒三蟲以雷丸芎藭等分爲末服一錢日二
小兒疳瘦久服消食和氣長肌肉用陳橘皮一兩黃連以米泔水浸一日一兩半研末入麝三分猪膽盛藥以漿水煑熟取出用粟米飯和丸菉豆大每服一二十丸米飲下錢氏小兒方下同
小兒疳熱有蟲瘦瘁用榆仁一兩黃連一兩爲末猪膽汁七枚和入椀內飯上蒸之一日蒸一次丸蒸乃入麝香半錢湯浸蒸餅和丸菉豆大每服五七丸至一二十丸米飲下久服充肥
小兒脾疳史君子蘆薈等分爲末米飲一錢儒門事親
小兒疳瀉吐利白藥子一兩甘草半兩爲末猪肝一具批開摻末五錢煑熟食之直指方下同
小兒魃病以紅紗袋盛夜明砂佩之
小兒疳痢薤白生搗如泥以粳米粉和蜜作餅炙熟與食不過三兩服楊氏產孔
解小兒疳熱疳痢殺蟲用青黛不以多少水研服宮氣方
療小兒瘦頭乾無辜兼痢用馬齒莧搗絞汁服三合以瘥止外臺方下同
治疳痢曉夜無度者取樗根濃汁及粟米泔各一雞子殼許以竹筒吹入下部再度差
治疳痢大孔開痢不止以黃連末入麝香少許和勻以竹筒吹入
小兒疳瘡生嚼栗子傅之
小兒疳痢困重者用樗皮白擣粉以水和作羹棗大如飩子日曬少時又拌如此三遍以水煑熟空肚吞七枚重者不過七服忌油膩熱麪毒物
小兒一切疳疾用白死蝸殼七枚皮薄色黃白者洗淨不得少有塵滓日乾內酥蜜于殼中以瓷盞盛之紙糊盞面置炊飯上蒸之下甑時即坐甑中仍裝飯候蒸飯熟取出研如水淀漸漸與吃一日令盡取效止聖惠方下同
五疳下痢兔屎炒半兩乾蝦蟆一枚燒灰爲末綿裹如蓮子大納下部日三易之
小兒諸疳棘鍼瓜蔕等研爲末吹入鼻中日三次
小兒急疳瘡水調蚺蛇膽傅之
小兒吃泥及肚脹用膩粉一分沙糖和丸麻子大空心米飲下一丸良久泄出泥土瘥經驗方下同
走馬牙疳用雞肫黃皮不落水者五枚枯礬五錢研搽立愈
治小兒無辜痢赤白兼成疳用胡粉熟蒸熬令色變以飲服之子母晨錄下同
治一歲至二歲無辜病用夜明砂熬搗爲散任意拌飯并喫食與喫三歲號乾無辜
小兒疳疾椿白皮日乾二兩爲末以粟米淘淨研汁和丸梧子大十歲三四丸米飲下量大小加減仍以

一丸納竹筒中吹入鼻內三度良
小兒閃癖頭髮豎黃瘦病瘦弱者乾林檎腦研末和醋傅之
小兒冷疳面黃腹大食卽吐者母丁香七枚爲末乳汁和蒸三次薑湯服之衛生易簡方
小兒嗜土買市中羊肉一斛令人以繩繫於地上拽至家洗淨炒炙食或羹汁亦可錢乙小兒方下同
小兒好食土取好黃土煎黃連汁和之曬乾與食
小兒一切疳疾六月取糞坑中蛆淘浸入竹筒中封之待乾研末每服一二錢入麝香米飲下聖濟總錄下同
又用蛆蛻米泔逐日換浸五日再以清水換浸三日曬焙爲末入黃連末等分每半兩入麝香五分以豬猪膽汁和丸黍米大每服三四十丸米飲下神效
口鼻疳蝕穿脣透頰用銀屑一兩水三升銅器煎一升日洗三四次
小兒蟲病胃寒蟲上危惡證與癇相似者乾漆搗燒烟盡白蕪荑等分爲末米飲服一字至一錢杜仁方
小兒疳瀉赤石脂末米飲調服半錢立瘥加京芎等分更妙斗門方
小兒蛔痛五靈脂末二錢靈犀火飛半錢每服一錢水一盞煎五分溫服當吐蟲聞孝忠集效方
小兒疳痢垂死者益母草嫩葉同米煮粥食之取足以瘥爲度甚佳飲汁亦可廣利方
小兒疳氣不可療者綠礬煅赤醋淬三次爲末棗肉和丸菉豆大每服十丸溫水下日三集驗方
小兒疳氣浮腫常服自消黑牽牛白牽牛各半生半炒取末陳皮青皮等分爲末糊丸菉豆大每服三歲兒服二十丸米湯下鄧氏小兒方下同
小兒疳氣攻臂耳蕈陰腫牽牛末一錢猪腰子半箇去膜薄切摻入內加少鹽濕紙包煨空心服
小兒蛔蟲口流涎沫史君子仁爲末米飲五更調服一錢全幼心鑑
胃氣熱吃泥用石膏生地黃白朮茯苓丹溪方下同
小兒蛔蟲棟樹根爲君佐以二陳湯煎服
小兒吃枯炭瓦片泥土等積宜訶子白朮各一兩史君子肉炒甘草各二錢麥芽炒半勿隨其素所好食之物半斤共爲細末入白糖調食局方
小兒疳疾木鼈子仁史君子仁等分搗泥米飲丸芥子大每服五分米飲下孫天仁集效方
小兒疳疾土裏蛲蝦煅熟與食之韓氏醫通
小兒諸疳羸瘦用熊膽史君子末等分研勻磁器蒸溶蒸餅丸麻子大每米飲下二十丸保幼大全下同
小兒疳瀉冷熱不調胡黃連半兩綿薑一兩炮爲末每服半錢甘草節湯下
小兒疳以水珠子甘遂炒青橘皮等分爲末三歲用一錢以麥芽湯下以利爲度忌酸鹹三五日
小兒疳以天南竺煎湯飲效幼幼近編下同
治吃泥以獭粉砂糖丸麻子大空心米飲下一二丸
疳蟲食土及生物以皂礬煅猪膽汁爲丸米飲下二三十丸
疳痢垂死新羊屎一升水一升浸一夜絞汁頓服日午乃食
疳積金眼蝦蟆一箇去頭足腸肚蛆一升俱入新瓦中以鐵線繫定兩頭泥固慢火炙脆加瓦壺子煅過穀精草等分吐瀉加木香橘皮爲末白湯下五分
小兒疳積腹大黃瘦骨立頭生疳結如麥穗用立秋後大蝦蟆去首足腸以清油塗之陰陽瓦炙熟食之積藏自下連服五六形容改變妙不可言本草綱目下同
小兒熱疳尿如泔大便不調賣蛆燒灰雜物與食
小兒繼病者母有娠乳兒兒病如瘧痢他日相繼腹大或瘥或發他人有娠相近亦能相繼也宜取伯勞鳥毛與兒帶之
小兒蛔蟲用楝根皮同雞卵煮熟空心服次日蟲下
又用苦楝皮二兩蕪荑半兩爲末每服一錢水煎走馬牙疳乾薑白礬等分燒焦存性爲末敷患處
尿桶中白焰乾爲末入冰片少許揩牙立效
治走馬牙疳用滷桶中白垢火煅過每一錢入銅綠三分麝香一分半研之立愈
治走馬牙疳用鯽魚一箇去腸入砒一分生地黃一兩紙包燒存性入枯礬麝香少許爲末摻之效
小兒鼻齆鼻下兩道赤色有疳以米泔洗淨用黃連末敷之三四次
小兒口瘡以人中白煅黃蘗炙焦爲末等分入冰片少許以青布拭淨摻之累效陸氏方
治小兒口瘡用天南星一箇去皮爲末好醋調攤在紙上男左女右貼在脚心底以帛繫定三日外取了以溫水洗盡脚下藥
治小兒牙疳煉信青黛輕粉各一錢麝香五分同爲細末用麻油調薄攤紙上用木鎚鎚實收起每用臨臥以漿水洗淨印乾可瘡口大小以藥紙封之至曉去藥紙漱淨勿令嚥下大者不過三上必效

小兒諸疳遍身及面上生瘡爛成臼如大人楊梅瘡者用蒸糯米甑蓬四邊滴下氣水以盤承取掃瘡上不數日即效百藥不效者用之神效（集簡方下同）

牙疳口瘡孩兒茶硼砂等分爲末搽之

治走馬牙疳用孩兒茶雄黃貝母等分爲末米泔漱淨搽之

治走馬牙疳以銅青滑石杏仁等分爲末擦之（經驗方）

口鼻疳瘡銅青枯礬等分研傅之

又用人中白一錢銅綠三分研傅之

口疳齦爛氣臭血出不拘大人小兒鉛白霜銅綠各二錢白礬豆許爲末掃之（宜明方）

走馬牙疳臭爛出血雄黃豆大七粒每粒以淮棗去核包之鐵線穿於燈上燒化爲末每以少許摻之去涎以愈爲度（全幼心鑑）

小兒牙疳雄黃一錢銅綠二錢爲末貼之（陳氏小兒方）

疳蟲蝕鼻雄黃葶藶等分研末用臘猪膽和用槐枝點之

走馬牙疳北棗一枚去核入鴨嘴膽礬紙包煅赤出火毒研末傅之（簡便方）

小兒齒疳蝕爛膽礬燒煙盡研末摻之一二日愈

小兒齒疳鴨嘴膽礬一錢匙上煅紅麝香少許研勻傅齦上立效（活幼心鑑下同）

走馬牙疳砒霜石銅綠等分爲末攤紙上貼之其效如神

走馬牙疳綠礬入鍋內炭火煅紅以醋拌勻如此三次爲末入麝香少許溫漿漱淨按之（試效方）

小兒口疳黃連蘆薈等分爲末每蜜湯服五分走馬疳入蟾灰等分青黛減半麝香少許（簡便方）

治小兒疳熱肚脹潮熱髮焦切不可用大黃黃芩傷胃之藥恐生別證止以胡黃連五錢五靈脂一兩爲末以雄猪膽汁和丸如菉豆大每服米飲下一二十丸

小兒肥熱疳疾用胡黃連黃連各半兩硃砂二錢爲末入猪膽內扎定以杖子釣懸於沙鍋內不可著底用漿水煮一炊久取出研爛入蘆薈麝香各一分飯和丸麻子大每服五七丸至一二十丸米飲下（錢乙小兒方）

小兒肝疳病肚脹或時泄痢暖熱不調以漏蘆一兩杵爲散每服一錢以猪肝一兩入鹽少許同煮熟空心頓食之（聖惠方）

治小兒疳䘌蝕口及蝕下部用飛廉蒿燒灰搗篩以兩錢匕著痛處甚痛則忍之若不痛便非疳也下部蟲如馬尾大其相纏處無數用此十日瘥二十日平復（千金翼方）

小兒疳疾及諸病後天柱骨倒乃體虛所致宜木鼈子六箇去殼蓖麻子六十粒去殼研勻先用包頭擦項上令熱以津調藥貼之

小兒走馬牙疳侵蝕透骨穿腮用生南星一箇當心剜空入雄黃一塊麵裹燒候雄黃作汁以盞子合定出火毒去麪爲末入麝香少許拂瘡上甚驗（醫驗方）

小兒走馬牙疳用橡斗殼入鹽塡滿合定燒透出火毒研末入麝香少許先以米泔漱過後用塗之神效（全幼心鑑）

走馬牙疳胡桐鹼黃丹等分爲末摻之（醫林集要）

小兒口疳蔗皮燒研摻之（簡便方）

小兒五疳川楝子肉川芎等分爲末猪膽汁丸米飲下（楠元方）

小兒疳勞潮熱往來五心煩躁盜汗咳嗽用黃連胡黃連各二兩以鼈血一盞吳茱萸一兩同入內浸過一夜炒乾去茱血研末入柴胡川芎蕪荑各一兩人參半兩史君子仁二十箇爲末煮粟米粉糊和爲丸如黍米大每用熟水量大小日三（全幼心鑑）

小兒疳蝕口鼻數日欲盡以文蛤燒灰用臘猪脂和塗之（千金翼）

五疳八痢面黃肌瘦好食泥土不思乳食用大乾蟾蜍一枚燒存性皂角去皮弦一錢燒存性蛤粉水飛三錢麝香一錢爲末糊丸粟米大每空心米飲下三四十丸日二服（全嬰方）

小兒疳泄下痢用蝦蟆燒灰存性研米飲服方寸匕（子母秘錄）

走馬牙疳侵蝕口鼻用乾蚵蚾黃泥裹固煅過黃連各二錢半青黛一錢爲末入麝香少許和研傅之（鄭氏小兒方）

治疳瘡顋穿牙落以抱退雞子軟白皮包活土狗一箇放入大蝦蟆口內草縛泥固煅過取出研末貼之以愈爲度（普濟方）

一切疳䘌無問去處皆能治之蝦蟆燒灰醋和傅一日三五度（痢疾方）

一切口瘡雞內金燒灰傅之立效（活幼心書）

治小兒腹大項小四肢瘦者用黑骨雞子一箇破頂入蜘蛛一枚於內外以濕紙糊竅仍裹數層用文武

火將雞子煨熟剝去蜘蛛食其雞子累效然必數枚

方愈初學世方

鍼灸

千金方曰小兒疳濕瘡灸第十五椎夾脊兩傍七壯未瘥加七壯

原機啓微曰小兒疳服灸合谷二穴各一壯灶如小麥大手大指次指兩骨間陷者中

田氏曰小兒疳瘦於胃下骨尖上灸三壯次於脊下端尾翠骨尾上灸三壯

小兒疳瘦脫肛體瘦渴飲形容瘦悴諸方不瘥者取尾翠骨上三寸骨陷中灸三壯

小兒身羸瘦貪豚腹腫四肢懈惰肩背不舉章門二穴各灸七壯

醫學綱目曰疳蝕斷斷臭穢衝人者灸勞宮一壯

古今醫統曰小兒多疳者是腦門被拍著及肺寒也灸顖會一穴二壯在上星上一寸直鼻上

小兒羸瘦飲食少進不生肌肉灸胃俞二穴各一壯在十二椎下兩傍各開一寸半陷中

醫案

錢氏論用藥識證曰鄭人齊郎中者家好收藥散施人其子忽臟熱齊自取青金膏二服併一服而餌之服畢至三更瀉五行其子困睡齊言子睡多因驚又與青金膏一服又瀉二行加口乾而身熱齊言尚有微熱未盡又與青金膏其妻曰用藥十餘行未安莫生病否召錢氏曰已成虛羸先多煎白朮散時時服之後用香瓜丸十三日愈

醫學綱目曰一富家子年十四歲面黃善啖易飢非肉不飽泄瀉一月來求治脈之兩手皆大怪不甚瘦倦以爲濕熱當脾困而食少今反形健而食多且不渴余意其疾必疳蟲作痢也取大便視之果蚘蟲所爲遂往他處有一小兒醫在側教其用治蟲藥治之禁其勿用去積藥約回途當爲一看診而止痢也偶勿果至次年春夏之交其瀉復作腹不痛而口乾此去年治蟲而不治疳故也遂以去疳熱之藥濃煎白朮湯下三日而瀉止半月後偶過其家見其子甚瘦余教以白朮爲君芍藥爲臣川芎陳皮黃連胡黃連入少蘆薈爲丸白朮湯服之半月而止禁其勿食肉與甜物三年當自愈

保嬰金鏡錄曰一小兒眼泡微腫欬嗽惡心小便泔白余謂脾疳食積脾氣虛甚也以五味異功散爲主佐以四味肥兒丸而愈後不禁飲食視物不明余曰此脾胃復傷須補養爲主不信乃服峻厲之劑後變風證竟爲不起

一小兒四肢消瘦肚腹漸大寒熱嗜臥作渴引飲余曰證屬肝脾名爲丁奚哺露也以白朮散爲主佐以徐氏十全丹月餘諸證漸愈乃以異功散加當歸及六味丸又月餘尋愈

一小兒患前證諸疳悉具熱如火炙病狀不能盡述朝用異功散夕用四味肥兒丸月餘諸證稍愈佐以地黃丸自能行立遂朝以地黃丸夕以異功散及蝦蟇丸數服而全愈

一小兒言步未能牙髮猶少體瘦骨立面赤作渴服肥兒丸不應余謂此腎虛疳證乃禀父精氣不足故也蓋肥兒丸脾胃經之藥也久服則腎益虛而疳益甚不信果牙髮漸落余用六味地黃丸加鹿茸五味子半載元氣健而諸證愈

一小兒十歲患瘧疳久不愈肌體羸瘦寒熱時作腦熱足冷滑瀉肚痛瞼爛口臭乾渴爪黑而黧此腎疳也服六味地黃丸更採解毒散而愈

一小兒項結一核堅硬如癰面色痿黃飲食不甘服托裏藥不應此無辜疳毒也余以蟾蜍丸治之而愈若數服不消按之轉動軟而不痛者內有蝨如粉宜急鍼去之若不速去則蟲隨氣走內蝕臟腑不治

外科心法曰一小兒眉皺多啼嘔吐清沫腹中作痛肚脹筋青唇口紫黑肛門作瘡名曰蚘疳以大蘆薈丸治之而愈

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第四百六十八卷目錄
醫部彙考四百四十八
小兒痢門一
劉完素六書寓痢
張從政儒門事親痢
朱震亨幼科全書痢疾　酉江月
魯伯嗣學嬰童百問痢痢　諸色痢
樓英醫學綱目痢疾赤白痢　純血痢　噤口痢　脫肛
白膿痢　膿血相雜痢　五色痢　蠱痢　瀉痢痢疾　虛痩　浮腫
小兒衛生總微論方八痢論
方一錢匙大黃湯　黃連湯　治中結腸圓
桃子丸　藥蓋圓　四物湯　木瓜湯　訶黃
大黃湯　牛金牛黃湯　藿香湯　茱萸丸　二
枳實散　聖圓　除熱訶黎勒圓　香連丸
益黃散　香連丸　竹葉方　良薑丸　二
木瓜湯　三黃丸　大承氣湯　保和丸　清位
丸　固腸丸　和中丸　二柳丸　參苓散　神
參苓白术散　又方　香連丸　金鈴散　神
仙枚苦散　駐車丸　香連丸　訶山湯　四逆
苓散　車前子散　勝金丸　香連丸　黃連香薷
散　石蓮散　香蘇散　香連丸　黃連香薷
飲　茅花湯　頓止丹　敗毒散　地榆散
芍藥湯　皮丸　寶腸丸　芍藥丸　芍藥
神芎丸　黃連解毒湯　湯氏黃芩湯　芍藥湯　風
湯　地榆飲　升陽益胃湯　芍藥湯　木瓜湯
丹　寶腸丸　地榆散　川芎散　木瓜湯
急方　錢氏黃連丸　烏梅散　開胃散　黃蠟湯　聖
子仁散　烏梅散　開胃散　黃蠟湯　聖
方　罌粟方　雄朱散　玉脂散　艾
臟湯　香連丸　吉氏香連丸　葛氏雞子餌　脂
連香連丸　吉氏香連丸　葛氏雞子餌　脂
附丸　朱氏家傳方　附子散　血痢方　又
方　又方　馬齒莧汁粥　必效
水蓼丹　兩根湯　腸丹　吉氏地榆散　白
頭翁丸　又方　占氏地榆散　又方　附
吳監散　又方　附子散　又方　附
黃連阿膠丸　槟榔皮散　人參散　理氣散　五
丹　婦髮散　五倍子散　吉氏地榆散

藝術典第四百六十八卷
醫部彙考四百四十八
小兒痢門一
金劉完素六書
瀉痢
小兒脾疳瀉痢者皆熱甚急驚瀉痢色多青爲熱證明矣痢色黃者何爲火甚則水妄而脾土肚故痢色黃也痢色紅赤者爲心火熱甚深也痢色黑者爲火熱過極則反兼水化制之故色黑也
元張從政儒門事親
痢
凡小兒久瀉不止至八九月間變爲秋深冷痢泄瀉青白者時時擬痛乳癖不化可用養脾丸如黍米大每服二三十丸米飲送下日進二服則愈益黃亦可用之
朱震亨幼科全書
痢疾
凡痢不論赤白皆屬濕熱或謂白爲寒者非也亦有食積而成者其治有補有瀉赤白濕熱皆有但熱證腹痛濕證腹不痛耳
凡赤痢者濕熱傷在血分從小腸中而來也治法以四物湯加黃連黃芩黃檗治之
凡白痢者濕熱傷在氣分從大腸中而來也以四君子湯加黃連蒼术治之
凡赤白相雜者此血氣俱傷也以八物湯加黃連黃芩黃檗滑石蒼术治之
以上三證後重者俱加檳榔枳殼
凡治痢疾不問赤白初起之時裏急後重腹中脹痛者先用三黃丸下之大者承氣湯下之後用香連丸補之
凡痢赤白日久人事虛弱原未經下者若下之則人事虛空不可損其不足若不下則其積不去而難愈只用保和丸連服數次以腹痛愈爲度後用香連丸調之
凡治痢者通藥中切不可妄用巴豆牽牛等藥只用三黃丸爲是
凡痢下鮮血者治法用清血丸車前草陳米炒煎湯吞下神效
凡痢下白涎久不止者用固腸丸陳米飲送下神效
凡痢下赤白日久不止者用二根丸陳米飲送下即效
凡暑月下痢純赤者以益元散炒過滑石加紅麵爲丸陳米飲送下
凡赤白痢脫肛者此氣下陷也宜升提之用和中丸以升麻湯下
凡赤白痢作渴者用白术散主之
凡赤白痢嘔吐不食者此名噤口痢用木香則失之溫用山藥則失之閉只以參苓白术散加石菖蒲末以陳米飲調下胃次一開自然思食
一海上方用初生小兒胎糞將小磁罐盛之入麝香一分水銀一錢攪勻收之如小兒噤口痢將此藥點入眼內二三次神效
凡痢止後身熱不退或人事瘦弱者只以集聖丸調之

凡病疾日久大熱大渴不退者不治六脈洪數面赤身弱者不治嘔吐不食服藥無效者不治日久不止下紫血成塊者不治下黑水如屋漏塵木者不治痢久轉作鶩溏者不治痢後變作泄瀉雖飲食如常者不治日久作渴不止飲食漸減者不治手足消瘦大肉折者不治脫肛一寸不收者不治

以上俱痢疾日久犯此者不救

祖傳治痢不問赤白先以解毒丸下之後以香連丸調之

西江月

痢疾古名滯下食積濕熱相參腸鳴疼痛不能安裹急後重無偏赤乃小腸火盛白乃大腸邪傳愚醫以白作寒看辛熱亂行丸散

治痢初無二法河間秘訣流傳行氣和血衛中先管取于全無變氣行後重自止血行下痢須安寒凉淡滲禁辛甘不怕年深日遠

凡痢先行通藥黃連枳殼檳榔當加酒蒸過大黃甘草芒硝相傍若還赤白日久人事虛弱彷徨保和丸子是仙方最要認病的當

下後痛除裏急再將赤白猜詳赤痢無過芍紅方白痢固腸穩當赤白相兼不愈香連丸子高強明醫四海把名揚尊取錦纏頭上

若遇時行痢疾排門一樣無差頭疼身熱慢吁嗟疫癘時行須怕先用人參敗毒次將承氣推車然須察脈再減加虛實分明方罷

痢久前方不止氣陷腸滑無停急將良藥與提升固澀兼行甚穩參木升麻葛芍烏梅粟殼蓮芡乾薑訶子赤茯苓粳米陳皮作引

記取痢家藥品解毒梔子連芩硝黃二味可推陳木香青皮痛定枳殼檳榔後重升麻柴胡提升固腸粟殼訶梅薑澤瀉豬苓水煎

痢疾不治數證脈如洪大須防噤口不食吐水漿大熱渴煩腹脹大孔不收魂戶糞如塵黑瓜穰面紅唇赤陷眉脏氣急悶亂死樣

魯伯嗣學嬰童百問

瀉痢

小兒春秋月晨夕中暴冷冷氣折其四肢熱不得泄則壯熱冷氣入胃變下痢或赤白滯起數去小兒腹脹痛極壯熱氣脈洪大或急數熱者宜調中湯下之熱便歇痢亦瘥也但壯熱不吐下者亦宜服之又夏月秋初急有暴寒折於盛熱無可發散客搏肌中發於外則爲瘧發於內則爲痢內外俱發則瘧痢俱作皆由榮衛不和腸胃虛弱冷熱之氣乘虛客於腸胃又因飲食所傷冷熱不調夾冷則白夾熱則赤冷熱交攻則膿血相雜亦因沉積所作赤痢積熱白痢積冷赤白相雜冷熱之積若脾胃氣盛不能消化水穀則糟粕不聚或春間解脫風冷所傷腸胃虛弱卒被風寒所折便爲下痢多矣經云春傷於風夏必飧泄故也調中湯去大黃加枳殼更痢不止則加黃連治之其暴下痢者車前子末之米飲調下亦效暑月用五苓散車前子散燈心湯調服發火散加減服太陽陽明合病者必下痢葛根湯主之嘔者加半夏四逆散亦可服

諸色痢

小兒痢候皆因飲食無節或餐果食肉物不知厭足乃脾胃尚弱不能尅化停積于腸故成痢也熱搏則赤屬寒之氣入于腸胃致令津液凝滯則成白痢或夾青者有驚積或如魚腦肚中疼甚者大抵八痢但冷熱赤白藥性雖有不同治法不相遠矣又有赤白相雜者當先去其熱積須用大黃枳實砂硝之劑以去其熱毒然後以黃連黃芩黃檗解其熱痢自止疼自定此妙法也如痢不止則用地榆熟艾等劑調理自然平復脾虛者不可輕用粟殼澀滯等劑必致危困須用沒石子黃連阿膠地榆以止之方爲盡善其枳殼芍藥皆要藥也噤口痢不能食者石蓮散主之香脯散亦可冷痢如豆汁肚疼者胃風湯主之脾毒痢臟熱常服香連丸黃連香薷飲去柱五苓散茅根湯當歸芍藥枳殼地榆川芎等劑先與解毒退熱却與開胃進食分利水穀寬腸定痛先與水煎丹敗毒散地榆飲寬腸枳殼散有熱而痢不止者三黃熟艾湯主之積滯不通者神芎亦可用熱甚煩躁者黃連解毒湯解之潛火散亦效

樓英醫學綱目

痢疾

小兒痢疾大抵多由脾胃不和飲食過傷停滯不能尅化又爲乳母恣食生冷熱毒厚味以傳之又爲風溫濕熱之邪以干之故有此疾有裏急窘迫急痛者火性急速而能燥物故也或夏末秋初忽有暴寒折於內無所發散客搏肌膚之中發於外則爲瘧內外俱發則爲瘧痢凡痢久則令腫滿下焦偏冷上焦熱結則爲上實下虛若脾胃濕熱之毒熏蒸清道而上

以致胃口閉塞而成噤口之證又有一方一家之內上下傳染長幼相似是疫毒痢也當先推其歲運以平其外察鬱結以調其內審其所傷別其虛實冷熱以治之條然明白不致妄投也

赤白痢

赤白之痢世人莫不曰赤爲陽爲熱白爲陰爲冷或曰無積不成痢至於調治若以冷熱之劑互進或投去積之藥必難取效不究其原何由可療且四時八風之中人五運六氣之相勝夏秋人多痢疾內經曰春傷于風夏生飧泄至眞要大論曰少陽在泉火淫所勝民病注泄赤白其可拘於無積不成痢之說若專以積爲論豈一歲之中獨於夏秋人皆有積春冬不然蓋風邪入胃木能勝土不爲暴下則成痢疾赤白交雜此爲陰陽不分法當分正陰陽五苓散以導其逆理中湯以溫其胃使色歸一然後施治若一分之後仍赤白同下則當究其所患之因若先白後赤乃內傷生冷失于蓋覆由元氣感于暑熱治法先救其裏次解暑毒若先赤後白乃先傷熱而後失蓋感冷先宜解熱後治其痢

有挾熱而痢者則下純鮮血此風能動血宜冷服黃連香薷散川草散及當歸散加酢炒蒸柏葉水薑煎服或羌活散加三和湯水薑倉米煎

有挾冷而痢者則下純白凍或白上有粉紅色或似猪肝瘀血皆爲陰證蓋血得寒則寒澀故也先用㕮咀五苓散加守中湯煎投次以附子理中湯帶凉服或固眞湯倘不辨其虛實冷熱妄行施治以致脾胃愈虛不能乳食或噤口痢者則難療矣又有裏急後重蓋裏急爲陽後重爲陰未圊前腹痛爲裏急已圊後腹痛爲後重故裏急者大腸澀也先以大順飲加寬氣飲和解及羌活散水薑倉米煎服次以寬腸丸後重爲氣虛用五苓散加人參生薑煎服並投香連丸若二證俱作前二丸子竝進或雙金飲金粟丸亦佳然瀉痢二字自是二證糞夾水來多而順者曰瀉帶血凍白凍來三五點而痛者曰痢輕重陰陽由此而分斯爲治法有膿血交雜經久不止晝輕夜重或晝夜頻數食減痛多並用萬金散神效散主之

有五色痢者乃因五臟蘊熱日久不散故有是證蓋五臟受熱榮衛不調五穀不化熏腐臟腑神氣昏沉此候已危最是腹中刺痛兒小者無治法蓋五色者乃五臟之色皆見於外兒大者可用局方三神丸或小來復丹以五苓散送下或者可療若投藥如故不可爲也

又有風痢多是黃褐色與疳瀉頗同但不臭爲異耳此風毒停滯於脾宜去脾經風毒瀉黃散主之若見赤白同下久而不禁小便少澀痛熱並作脣裂眼赤氣促心煩坐臥不安狂渴飲水穀道傾陷時復面容如糚飲食不進者難治

瀉痢黃赤黑皆熱也瀉痢青白米穀不化皆冷也東垣云白者濕熱傷於氣分赤者濕熱傷於血分赤白相雜氣血俱傷也海藏用四君芎歸治虛弱之痢四君乾薑治虛寒之痢愚常治手足指熱飲冷者爲實熱用香連丸手足指冷飲熱者爲虛寒用異功散送香連丸若兼體重肢痛濕熱傷脾也用升陽益胃湯小便不利陰陽不分也用五苓散若濕熱退而久痢不愈者脾氣下陷也用補中益氣湯倍加升麻柴胡瀉痢兼嘔或腹中作痛者脾胃虛寒也用異功散加炮薑木香或變而爲瘧者肝尅脾也用六君柴胡釣藤鉤若積滯已去痢仍不止者脾氣虛也用四君子送下香連丸若因乳母膏粱厚味六淫七情致兒爲患者當各推其因仍兼治其母并參冷熱瀉及積滯腹痛等證覽之若挾表證宜發表

治痢之法若欲取積只用官局進食丸甚穩取積又能治痢萬無一失積已下急以四君子湯加豆蔻訶子補之次服厚腸香連丸得效

熱痢用凉藥

海藏治赤痢用四君子加赤芍藥當歸入粟米少許同煎

純血痢

巢氏云小兒痢如膏血者此是赤痢腸虛極腸間脂與血俱下故也

聖惠云夫小兒血痢者由熱毒折於血血入大腸故也血隨氣循環經絡通行臟腑常無停滯若爲毒熱所乘遇腸虛血滲入於腸則成血痢也

寶鑑云小兒腸熱卽痢下鮮血一如腸風

冷痢用溫熱藥

海藏治白痢用四君子等分加乾薑減半入粟米少許同煎

白膿痢

嬰童寶鑑論小兒腸寒卽下白膿腹痛

膿血相雜痢

聖惠云夫小兒膿血痢者由毒氣在臟血得熱則流

盜滲入大腸與腸間津液相搏積熱蘊結血化爲膿腹虛則泄故成膿血痢也

葛氏肘後云小兒臟毒滯下如魚腦

五色痢

形證論歌曰五色之痢最多端見此方知有五般青色只有驚積聚黃多食積在脾間白色冷虛腸胃患赤爲積熱最難安雞肝隱積多成片黑血相和不易安臀搐胃高兼露齒臉紅筋出每居前急安臟腑和湯散醫者留心按古賢

又歌曰五色之痢莫言奇四歲之前始有之青色只因驚積聚黃因食積毒於脾赤黑已知心腎病白多殘害是脾爲三七以前無變動休令多睡飲餐遲此疾且須和五臟補榮衞方漸漸安愈如目腫不進飲食只與平胃散補之

蠱痢

巢氏病源云小兒蠱毒痢歲時寒暑不調而有毒厲之氣小兒解脫爲其所傷邪與血氣相搏入於腸胃毒氣蘊積值大腸虛者則變痢血其痢狀血色蘊瘀如雞鴨肝片隨痢下此是毒氣盛熱食於人臟狀如中蠱故謂之蠱毒痢也

石壁經脾毒痢歌曰脾間有毒號純陽本爲醫人熱藥傷致使大腸多結澀多饒枯血在枯腸如風腹閉難開眼身熱頭溫脚轉凉舌赤胷高爲此候多啼喘急更如狂先須解熱并開胃便是明醫用藥良

此脾受熱積失治則伏毒治當凉脾次去其積若胷前骨忽然高者更加喘急則不治也

鳳髓經注云宜與金華散香連丸

形證論風毒痢歌凡痢之中風轉難形如青草汁多般毒風豆汁添邪熱胃敗鷄肝片片全加積不須先下積閉眸食絕不堪看若歸白痢還須下臟腑頻溫得本原

瀉痢兼證

巢氏病源云小兒痢兼瀉候此是水穀痢津液枯竭臟腑虛燥則引飲若小便快者痢斷渴則止若小便澀水不行於小腸滲入腸胃渴亦不止痢亦不斷凡如此者皆身體浮腫脾氣虛不能尅水故也亦必眼痛生障小兒上焦本熱今又痢下焦虛上焦熱氣轉盛熱氣熹肝故也

茅先生以爲食傷脾胃所致先用醒脾散勻氣散調一日後下調中飲夾乳香散龍涎膏調理即愈或單搗冬瓜汁飲之

羸瘦

巢氏云小兒腸胃虛弱受風冷則下痢痢斷後脾胃尚虛穀氣猶少不能榮血氣故羸瘦

浮腫

惠濟論小兒痢瘥後遍身腫候歌云冷痢日久失醫治遍身浮腫却如吹脈洪是氣化爲水沉實還因積有之順氣腫消爲上法氣平兩日定多尿莫交食飽還憂滯此疾元因積損脾

脫肛

肺與大腸爲表裏肛者大腸之門肺實熱則閉結不通肺虛寒則腸頭出露有因痢久裏急後重努力肛開爲外風所吹或伏暑作瀉腸滑不禁或禀賦怯弱易於感冷亦致大腸虛脫凡小兒所患瀉痢皆因暑濕風熱乘脾胃虛而得蓋風屬木木勝則制土土主脾胃虛而受制又濕喜傷脾用虛受濕不能分別清濁水穀交雜則爲洞泄洞泄既久大腸亦虛大腸乃手陽明燥金而土虛不能生金金氣既虛則傳送之道亦虛又爲風冷所襲故肛門脫而不收法宜補脾温胃使金得受母之益而氣實宜藿香飲勻氣散平胃散主之次則內投固腸之劑用健脾飲養臟湯服餌外以敷貼之法用伏龍肝散傅之及蒴麻膏貼顖門使引氣上令其自收如收盡仍以水洗其膏及有邪熱積滯於大腸未經疏滌亦成此疾其肛門色紅而軟肺脈浮數右手指紋紫見身微有熱時或煩躁先投清肺飲疏解次用薄荷散蟠龍散爲治急服萬安飲亦佳

巢氏云實熱則大便祕結虛寒則肛門脫出此多因吐瀉脾氣虛肺無所養故大腸之氣虛脫而下陷也用補中益氣或四君子爲主若脫出緋赤或作痛者血虛而有熱也用補中益氣湯佐以四君牡丹皮大凡紅或作痛者氣虛而有熱也佐以四物牡丹皮微

手足指熱者屬胃氣熱手足指寒者屬胃氣寒

湯氏方治脫肛大腸自糞門出宜用葱湯熏洗令軟款款送上此因瀉利得之者亦可服瀉利之藥然後用槐花等藥又有用一味五倍子煎湯入矾硝熏洗而縮者又有用眞蒲黃碾極細以猪肝拌勻傅肛門上而入者全嬰方用澀腸散兼有痔證腫痛者用黃丹滑石等分井水調塗即消并用鉛白霜半錢片腦半字好酒調傅腫處甚佳黃連解毒湯亦可服用苦參湯洗亦效亦有用蜜陀僧白礬腦子末之傅上更

用荆芥防風等項洗之用生瓜蔞根者亦效

小兒衛生總微論方

八痢論

小兒氣血怯嫩臟腑軟弱因觸冒風寒飲食冷熱以邪干正致脾胃不和凝滯停積蘊毒結作或水穀不聚或膿血純雜變而爲痢其候有八一曰水穀痢謂便下糞稀薄而不聚駛利出易水穀不化也然雖是瀉便特亦覺裏急後重故爲痢也二曰冷痢謂便下純白膿也三曰熱痢謂便下純赤血也四曰滯痢謂便下膿血相雜也五曰積痢謂有積傷爲痢浸久或差而復發也六曰疳痢謂患疳積而下痢也七曰蟲痢謂如蟲毒下紫黑血或如赤豆汁或如鷄鴨肝片也八曰休惜痢謂下血黑黯中有白物如腸中之脂或如爛魚腸之狀此腸胃潰傷患者更休愛惜故以名之亦名休息者謂患即無休息而至死也凡痢若粥藥不能進者此便爲死候也

方一

經驗大黃湯（千金方下同）

治小兒暴冷水穀下或乳冷下青結不消或冷實吐下乾嘔煩悶及冷滯赤白下者良若已服諸利湯去實胃中虛冷下如水乾嘔眼陷煩擾不宜利者可除大黃若中乳乳母洗浴水氣未消飲兒遂爲霍亂者但用大黃小兒諸霍亂宜利者便用大黃不須利宜溫和者除之

大黃六分　桂心　厚朴　甘草　乾薑各一分

人參　茯苓　白朮　當歸各二分　桔梗三分

右十味以水三升半煮取八合凡兒三十日至六十日一服二合七十日至一百日一服二合半二百日以來一服三合

黃藥湯

治小兒夏月傷暴寒寒折大熱熱入胃下赤白滯如魚腦壯熱頭痛身熱手足煩此太陽之氣外傷寒使熱氣便入胃服此方良若誤以利藥下之或以溫脾湯下之則熱劇以利藥下之便數去赤汁如爛肉者或下之不瘥宜以澀熱藥斷之下既不止倍增壯熱者服之即效或是溫病熱盛復遇暴寒折之熱入腹中下血如魚腦者服之良

黃藥　黃連　升麻　當歸　白頭翁一作白斂　牡蠣　石榴皮　黃芩　寄生　甘草各二分　犀角　艾葉各一分

右十二味㕮咀以水三升煮取一升二合百日兒至二百日一服三合半

治中結腸圓

治小兒濕冷滯下赤白青色如魚腦肛脫出積日腹痛經時不斷者

赤石脂五分　吳茱萸三分　乾薑　附子　當歸　厚朴　白朮　木蘭皮　白頭翁　黃連　石榴皮　黃藥各二分

右十二味爲末蜜丸如大豆二歲兒五丸三歲已上服十丸十歲已上二十丸暴下者服少許便瘥積下者盡一劑更合

梔子九

治少小熱痢不止

梔子七枚　大棗四枚炙黑　川黃連五分

礬石四分　黃藥三分

右五味爲末蜜丸如小豆大服五丸日三夜二服不知稍至十丸

梨蘆圓

治少小泄清痢

梨蘆二分　黃連三分　附子一分

右三味爲末蜜和丸如麻子大以粥飲下二丸立愈

四物粱米湯

治少小泄注

粱米　稻米　黍米各二升　蠟如彈子大

右四味以水五升東向竈煮粱米三沸去滓復以汁煮稻米三沸去滓以汁煮黍米三沸去滓以蠟內汁中和之蠟消取以飲之數試有驗

龍骨湯

治小少壯熱引飲下痢

龍骨　甘草　大黃　赤石脂　石膏　寒水石　瓜蔞根　桂心各二兩

右八味治下篩以酒水各五合煮散二合二沸去滓量兒大小服之

大黃湯

治少小下痢苦熱不食傷飽不乳

大黃　甘草　麥門冬各一兩

右三味㕮咀以水二升煮取一升二三歲兒分三四服

生金牛黃湯

治少小積下不止因發痢

生金二錄一方用六錄無生金用熟金亦得法應作屑今方盛用成器者　牛黃三錄　麻黃二分　黃連　乾薑　人參　甘草各一分　細辛半分

右八味㕮咀以水一升六合煮取八合去滓臨服研牛黃以煮湯中嫌兒熱者用生薑代乾薑今世乏生金但用成器亦善二三兩皆得用之

澤漆菜黃湯

治小兒夏月暴寒寒入胃則暴下如水四肢被寒所折則壯熱經日不除經月許日變通身虛滿腹痛其脈微細服此湯一劑得漸漸安神

澤瀉　青木香　海藻各二分　吳茱萸　茯苓　白朮　桔梗　芍藥　當歸各三分　大黃一分

右十味㕮咀以水四升煮取一升半二百日至一歲兒一服二合半一歲已上至二歲一服四合

枳實散

治少小久痢淋瀝水穀不調形羸不堪宜此

枳實二兩

治下餘三歲已上飲服方寸匕若兒小以意斟酌日三服

鼈頭圓

治小兒積冷久不瘥後餘脫肛不瘥腹中冷肛中疼痛不得入者

死鼈頭二枚炙令焦　磁石四兩　桂心三兩　小蝎皮一枚炙令焦

右四味爲末蜜丸如大豆兒三歲至五歲服五丸至十丸日三兒年大以意加之

除熱結腸圓

斷小兒熱下黃赤汁沫及魚腦雜血肛中疼爛坐蛆生蟲

黃連　蘗皮　苦參　鬼臼　獨活　橘皮　芍藥　阿膠各半兩

右八味爲末以藍汁及蜜丸如小豆日服五丸至十丸多無藍汁可用藍子一合皆蜜和爲丸

香連丸（道士方）

治赤白痢疾幷水瀉暑瀉

黃連淨二十兩　吳茱萸去梗十兩

右先將二味用熱水拌和入磁器內置熱湯中頓一日同炒至黃連紫黃色去茱用連爲末每末入木香末一兩淡酢米飲爲丸如麻子大

益黃散（普門寺救下同）

治小兒痢

陳皮一兩　青皮　訶子肉　甘草各半兩　丁香二錢

右爲細末每服二錢水煎食前服之

香連丸

木香　訶子肉麵炒　黃連炒各半兩　龍骨一錢

右爲細末飯丸如黍米大每服二十丸米飲湯下

丹溪方（平治會萃下同）

治食積痢疾

黃芩　黃連　陳皮　甘草

煎服

赤痢加紅花桃仁　白痢加滑石末

一方去陳皮加大黃

食積痢方

炒黃　蒼朮　滑石　芍藥　黃芩　白朮　甘草　陳皮　茯苓

右㕮咀煎下保和丸

二朮湯

治小兒八歲下痢純血以食積治

蒼朮　白朮　黃芩　白芍　滑石　茯苓　甘草　陳皮　神麴炒

右煎下保和丸

三黃丸（幼科全書下同）

黃連　黃芩　大黃

右共爲末神麴糊丸以木香檳榔湯下

大承氣湯

枳殼　厚朴　大黃　芒硝　甘草　檳榔

右作一服此通腸去積之藥也

保和丸

南山楂肉二兩　神麴炒　半夏　白茯苓　白朮各一兩　蘿蔔子　連翹　陳皮各五錢

右爲末粥丸如黍米大飲吞下蓋小兒食積脾虛以補藥下之者此也

清血丸

槐子炒　荊芥穗煨　側柏葉炒

右爲末醋糊丸陳米湯吞下

固腸丸

樗根白皮不拘多少細切略炒

右爲末糊丸如黍子大陳米湯吞下

和中丸

黃連炒　陳皮各五分　澤瀉　車前子　白茯

山藥　人參　乾薑各二錢

右爲末酢糊丸陳米湯吞

脫肛用升麻湯送下

二根丸

紅椿木根皮　白椿木根皮卽樗根

右爲末米糊丸陳米飲下

益元散

滑石炒一兩　甘草二錢五分　紅麴去殼炒五錢

右爲末米糊丸陳米飲下

參苓白朮散

此藥性平凡脾胃虛弱飲食不進及大病後助補脾胃必用之藥也

人參　白朮　白茯　山藥　甘草　桔梗

苡仁　蓮肉　石菖蒲　白扁豆薑汁製各一兩

右爲細末陳米飲下

又方

治痢疾

陳細茶　生薑等分

無根水濃煎露一宿溫服

香連丸 片玉心書

治赤白痢相雜裏急後重

黃連吳茱萸同炒五錢去茱萸　木香五錢

石蓮肉三錢

共爲末酢糊丸如粟米大陳米湯送下

久痢不止者加肉豆蔻麪包煨去油五錢

金鎖散 全幼心鑑下同

治小兒久痢赤白

桂去皮薑汁炙紫　黃連以茱萸炒過

右等分爲末紫蘇木瓜煎湯服之

神仙救苦散

治小兒赤白痢下日夜百行不止

御罌粟殼醋炒爲末去筋淨再以銅器炒過

檳榔炒赤研末各收

右每用等分

赤痢蜜湯下

白痢砂糖下忌口味

駐車丸

治小兒積痢

百草霜二錢　巴豆煨去油一錢

右研勻以飛羅麪糊和丸菉豆大每服三五丸

赤痢甘草湯下

白痢米飲下

紅白薑湯下

香連丸 窮鄉便方

宜黃連一兩去蘆鬚用吳茱萸浸水拌蒸不用茱萸

以黃連炒乾爲細末　小茴香微炒地上存性

元胡索各五錢酒拌蒸

俱爲細末用早米糊爲丸如粟米大米湯送下量

兒大小大每服一錢小者五分

調中湯 嬰童百問下同

治夏末秋初忽暴折于盛暑熱結于四肢則壯熱

頭疼傷寒於胃則下痢赤白

大黃七錢半　桔梗　藁本　茯苓　甘草炙

乾葛　黃芩炒　芍藥炒　白朮炒各半兩

右㕮咀白水煎量大小加減服

得快氣利壯熱便歇去大黃加黃連枳殼止利尤

妙或加地榆或加當歸皆可

感風加荊芥

五苓散

治傷寒溫熱病發熱口燥咽乾煩渴飲水或水入

卽吐或小便不利及治吐瀉下痢

澤瀉二兩半　猪苓　白朮炒　白茯各一兩半

肉桂一兩

右爲細末每服二錢白湯調下不拘時服訖多飲

熱湯有汗出卽愈

車前子散

治暑月伏熱霍亂吐瀉煩悶引飲

白茯苓　猪苓　陳香薷　車前子各一兩

人參半兩

右爲細末每服一錢燈心泡湯調下

腹痛加芍藥

瀉不止加石蓮

潑火散

治中暑煩躁發渴口乾及治血痢

青皮　赤芍藥　黃連去鬚　地榆各一兩

右爲細末冷水調下一錢

如血熱妄行加甘草

葛根湯

治太陽病項強几几惡風無汗不惡寒
葛根四兩　麻黃三兩　肉桂　生甘草各一兩
白芍藥二兩炒
右剉散每服五錢水一盞生薑三片棗子二枚同煎至七分去滓服取微汗

四逆散

治少陰病其人或咳或悸或小便不利或腹中痛或泄痢下重者
甘草炙　枳實炒　柴胡　白芍藥炒各一兩
右搗篩爲細末水飲調下二錢日進三服

如咳者加五味子乾薑各半兩
下利悸者加桂半兩
小便不利者加茯苓半兩
泄利下重先濃煎薤白湯內藥末三錢匕再煎一二沸溫服

石蓮散

治小兒噤口痢嘔逆不食止而復作
蓮肉去心炒
右爲末米飲下一錢
一方用山藥爲末米飲調服亦妙

香脯散

治小兒刮腸下痢噤口不食閉眼合口危急之證
精猪肉一兩薄批一片　臘粉一錢
右將肉於炭火上慢炙旋鋪臘粉炙令成脯每以少許與喫如未知喫且放鼻間自然要吃此方治胃口有毒至奇至妙

香連丸

治濃積瀉亦治痢
黃連　吳茱萸各一兩炒去茱萸　木香二錢半
訶子半兩
右爲末粳糊丸如麻子大空心米飲下三十丸

黃連香薷飲

治暑熱所傷下痢赤色
扁豆炒　厚朴薑炒各半兩　黃連薑汁炒香薷各一兩
右剉散每服三錢水薑煎服

茅花湯

治鼻衄不止吐血下血
茅花一大把
右用水三盞煎濃汁一盞分二服即瘥無花根梗代之亦治血痢黑痢

頓止丹

治瀉利先鋒之藥
黃丹一兩　巴豆四十九箇　乳香二錢
右用麻油二錢蠟半兩溶化和丸

冷證加木香二錢半

敗毒散

治傷寒時氣頭痛項強壯熱惡寒身體煩疼及寒壅咳嗽鼻塞聲重
人參　茯苓　生甘草　前胡　川芎　薄荷　羌活　獨活　桔梗　柴胡　枳殼麩炒黃各一兩
右剉散每服二錢水一盞生薑薄荷各少許

止瀉痢用陳倉米煎粳米亦可

地榆散

治瀉痢血痢
地榆　訶子　生甘草各一兩
右爲末滴水丸如小豆大每服二三十丸白湯下

一方加枳殼

寬腸枳殼散

順氣止痢
甘草六錢炙　枳殼炒二兩四錢
右爲細末每服一錢空心沸湯點服

三黃熟艾湯

治下痢赤白及治傷寒四五日而大下熱痢時作諸藥不效宜服此湯
黃芩　黃連　黃蘗各七錢半　熟艾半鷄子大
右剉散每服三錢水一盞煎六分去滓服

神芎丸

治小兒痢
生大黃　黃芩各二兩　生犀牛頭末一兩
滑石四兩　黃連　薄荷葉　川芎各半兩
右末滴水丸桐子大每服五十丸溫水下食後服

一方加蒲黃止血證用

黃連解毒湯

治熱痢如神之劑
黃連三錢　黃蘗半兩　梔子四個　黃芩一兩

右剉散每服三錢水煎服
湯氏異功丸
治渴止瀉消暑毒生津液夏月出路含化免吃水妙
澤瀉一兩二錢　猪苓去皮七錢　肉桂三錢半
茯苓　人參　白朮　辰砂各半兩
右末蜜丸芡實大燈心竹葉湯下二三十丸
一方加陳皮
胃風湯（保嬰撮要下同）
治風冷客於腸胃乳食不化泄瀉腸鳴腹滿而痛或下如豆汁或瘀血日夜無度
白芍藥　白朮　肉桂　人參　當歸　川芎
茯苓
右爲末每服二錢入粟米水煎空心熱服
地榆飲
治冷熱痢腹痛下痢赤白頻併
地榆三分　甘草　赤芍藥炒　枳殼各二分
右水煎服
升陽益胃湯
止渴消暑生津液
黃芪二錢　半夏　人參　甘草炙　白朮
川黃連各一錢　川獨活　防風　白芍藥
羌活各五分　陳皮　茯苓　柴胡　澤瀉各三分
右水二鍾薑三片棗二枚煎四分食遠服
羌活散（治準繩下同）
治傷風時氣頭痛發熱身體煩疼痰壅咳嗽失音鼻塞聲重及解時行痢赤白

人參　羌活　赤茯苓　柴胡　前胡　川芎
獨活　桔梗　枳殼麩炒微黃色去麩不用
蒼朮米泔水浸一宿去粗皮薄乾剉片炒微黃色
甘草各一兩
右剉每服二錢水一盞薑三片薄荷三葉煎七分無時溫服
發散風邪入葱白同煎
痢證薑倉米煎
水浸丹
治瀉痢先鋒之藥
黃丹研細一兩　大巴豆二十五箇去皮膜研出油
右研勻用黃蠟半兩鎔作汁拌勻量大小旋丸水浸吞下臨病隨意用
一方黃丹二兩半
寬腸丸
治痢後裹急大腑閉澀不通
枳殼炒微黃仍用清油浸透一兩焙乾五錢
麻仁去殼　木通去皮節　大黃半生半炮
檳榔　大腹皮洗淨焙乾各二錢半
右除麻仁用乳鉢極細研外五味檳榔不過火餘焙同研成末入乳鉢中與麻仁再杵勻煉蜜丸棗豆大每服三十丸至五十丸仍以枳殼甘草煎湯空心送下一二歲嬰孩溫蜜湯下
地榆散
地榆　訶子　厚朴薑製各等分
右剉散每服二錢水一盞薑棗煎服
又方

地榆　烏梅　葉皮　甘草　當歸各等分
右剉散每服二錢水煎服
川草散
治腹痛下痢赤白不拘遠近
川芎　白芷　甘草半生半炙各七錢　赤芍當歸酒洗　黃連各五錢
右剉焙爲末每服半錢至一錢
白痢白薑湯調
赤痢甘草湯調
赤白痢溫米清湯調並空心服
備急方
治熱痢
蠟茶　蜜磨生薑
右用井花水調渴則飲之
錢氏黃蘗丸
治小兒熱痢下血
黃蘗去皮半兩　赤芍藥四錢
右爲末飯和丸如麻子大每服一二十丸食前米飲下量兒加減
外臺子苓湯
治小兒熱痢
子苓十二分　知母　女萎各六分　竹葉八分
黃蘗　甘草炙各四分
右六味切以水二升煮取一升分服甚妙
聖惠梔子仁散
治小兒熱痢腹痛心煩口乾小便赤黃不欲飲食
梔子仁　當歸酒洗剉微炒各半兩　黃蘗

地榆微炙各三分　黃連一兩去鬚微炒

右件藥搗細羅爲散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大小加減

烏梅散

治小兒熱痢但壯熱多渴而痢不止

烏梅肉二枚微炒　黃連微炒　藍葉各一分

犀角屑　阿膠搗碎炒令黃燥　炙草各半

右件藥搗粗羅爲散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓放溫不計時候量兒大小分減服之

開胃散

治赤痢

白朮　茯苓　人參各半錢　石蓮子肉十個

右爲末薑香湯下半錢

養臟湯

主生津益氣溫腸止痢

人參　炙草各二錢半　白芍藥　白朮各半兩

南木香　肉桂去粗皮各一錢　肉豆蔻煨

罌粟殼去蒂蜜水炒　訶子肉各一錢半

右件㕮咀每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分空心溫服或入倉米同煎

廣濟方

療客冷白痢

人參六分　厚朴炙　甘草炙四分　茯苓

桔梗各五分　梁州橘皮八分炙

右六味切以水三升煮取一升量大小可一合爲度以瘥止忌如常法

罌粟方

治五六歲兒冷痢

當歸　黃連　龍骨各四分　赤石脂　厚朴炙

乾薑　酸石榴皮各二分

右切以水三升半煮一升六合爲四服相去一炊久服

雄朱散

治小兒腸胃虛冷下痢頻併日夜疼痛不可忍

雄黃一分研飛　乳香細研　白礬煅各一錢

右爲末每服罌孩一字二三歲半錢陳米湯調下一日三服

玉脂散

治冷痢大便青色甚則有膿

白石脂　當歸洗焙乾　丁香　白朮炮各一兩

草豆蔻去皮　厚朴生薑汁製各半兩

右件搗羅爲細末每服半錢以粥飲調下量兒大小加減

艾湯

治白痢

艾葉微炒　當歸各一兩　乾薑炮　木香

訶梨勒皮炮各半兩

右件搗羅爲細末每服一錢水八分一盞入粟米少許煎至五分去滓食前溫服

養臟湯

治白痢頻併

當歸洗焙　烏梅肉　乾薑　黃芪　白朮炮

龍骨各一兩

右搗羅爲細末每服一錢水一小盞生薑粟米各少許煎至五分去滓溫服乳食前量大小加減

香連丸

治赤白下痢頻渴作痛

淨黃連一兩剉用吳茱萸同炒黃仍去茱萸

烏梅肉二錢半薄切片用新瓦上慢火焙乾

南木香半兩不過火

右爲末用阿膠半兩剉碎炒脹水化爲糊候冷入乳鉢內同前藥末停分杵勻丸作麻仁大

赤痢每服三十三丸至五十五丸或七十七丸甘草湯空心下

白痢丸散同前白薑湯空心下

赤白交作溫米清湯空心服

金粟丸

治下痢赤白水穀不化

淨黃連一兩　川芎　枳殼製　穀芽洗焙

赤茯苓　白芷　木香各半兩

右除木香別剉不過火餘六味焙入木香同爲末用神麴末一兩煮糊丸粟米大每服七十丸至百丸空心溫米清飲湯下或不拘時

白附香連丸

治腸胃暴傷乳哺冷熱相雜痢痢赤白裏急後重腹痛扭攪晝夜頻併乳食減少

黃連　木香各一錢　白附尖二箇

右末飯丸如粟米大每服十丸至二十二十丸米飲下食前日夜各四五服

豆蔻香連丸

治瀉泄不拘寒熱赤白陰陽不調腹痛腸鳴切痛

立效如神

黃連炒三錢　肉豆蔻　木香各一錢

右爲細末粟米飯丸米粒大每服十九至三十九日夜各四服食前米飲下

吉氏香連丸

治赤白痢

黃連　木香　訶子皮各一兩　肉豆蔻二個

子冬半兩

右末蜜丸菜豆大空心酢漿湯下小兒五丸空心日午再服煎薑蜜湯下

葛氏鷄子餅

療小兒秋夏暴冷痢腹脹乍寒乍熱白滯下

鷄子一枚　胡粉一丸碎絹篩

右合鷄子黃白調熬令熟如常鷄子餅兒年一歲一食半餅日再不過二餅即瘥兒大倍作凡羸弱不堪與藥宜與此餅

脂附丸

王氏手集治小兒純膿白痢其效如神

大附子一枚

右先用楮膏攪成油半盞許醮前件附子令裂擗出放冷削去皮臍研爲細末以棗肉和丸如菜豆大每服五七丸至十五二十丸米飲送下空心食前服

朱氏家傳方

治小兒白膿冷痢臍下絞痛

訶子皮　青木香各等分

右爲末以粳米飯丸如菜豆大米飲下五丸

附子散

長沙醫者丁時發傳治小兒疳痢多有白膿腹內疼痛

附子炮去皮尖一枚　龍骨　赤石脂各半兩

蜜陀僧　黃丹　胡粉炒　烏賊魚骨燒灰

赤芍藥各一分

右件爲末每服半錢米飲下一日三服

血痢方

治小兒熱毒

犀角十分　地榆六分　蜜三分　地麥草五合

右四味切以水三升煮取二升去滓量兒大小服

又方

葱白三兩　香豉三合　梔子七枚　黃連一兩

右四味切以水三升煮取九合去滓分服

又方

外臺劉氏療小兒血痢

地榆　酒黃蘗　川黃連　酒黃芩各六分

馬蘭子二分　茜根一兩　生薑三分

右七味切以水二升煮取一升分服大小量之與一合至二合爲度

又方

食醫心鑑治小兒血痢

生馬齒莧絞汁一合

右和蜜一匙七空心用之

黃連散

聖惠治小兒血痢煩熱口乾腹痛

黃連去鬚微炒　犀角屑　白蘘荷根　黃芩

蔓青根　吳藍各一兩　白頭翁三分　炙草當歸剉微炒各半兩

右件藥搗粗羅爲散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分減服之

馬齒菜汁粥

聖惠治小兒血痢不瘥

馬齒菜汁一合　蜜半合　粟米一合

右以水一大盞煮作粥後入二味和調食前服之

水蓼丹

治血痢疳瘦

蛇蛻皮燒灰　雞豆殼燒灰各一兩　胡黃連

水蓼各半兩各搗羅爲細末次用　朱砂半兩

眞蕪荑　牛黃　粉霜各細研一分

右件都拌勻再研細軟飯和黍米大每服五粒至七粒麝香湯下量兒大小加減

茜根湯

治血痢不瘥

茜根剉　地榆剉　黃連去鬚　赤石脂煅

阿膠炙熟各一兩　甘草炙　黃蘗各半兩

右件藥搗羅爲細末每服一錢水八分煎至五分去滓放溫服

厚腸丹

治血痢腸虛

黃連　川楝子各一兩　木香　阿膠蛤粉炒

吳茱萸微炒　當歸洗焙各半兩

右件搗羅爲細末飯和丸黍米大每服十粒米飲下乳食前量兒大小加減

聖效散
治血痢久不瘥
赤石脂燒赤　白龍骨煆　阿膠炙各一兩
訶梨勒皮　木香　炮薑　黃連　炙草各半兩
右件搗羅爲細末每服半錢煎粟米飲調下食前服

必效丹
治血痢煩併
川黃連去鬚二兩　大棗半升　乾薑一兩
白礬半兩
右件用瓦器盛鹽泥固濟留一竅子以木炭火燒烟息爲度取出搗羅爲末白麵糊和丸黍米大每服十粒米飲下量兒大小加減

又方
治小兒熱痢下血
黃蘗去皮半兩　赤芍藥四錢
右同爲細末飯和丸麻子大每服一二十丸食前米飲送下大者加丸數

又方
吉氏家傳治小兒血痢
宣連爲末
右以雞子搥作餅子炭火煆令赤便蓋著勿令泄氣候冷細研空心米飲下半錢以意加減服

又方
好醬金末半錢
右用熱水調下
吉氏地榆散
治小兒血痢日久不瘥
地榆一分炒　訶子五個炮去皮　陳槐炒黃連各一錢炒
右爲細末每服半錢或一錢陳米飲下

白頭翁丸
白頭翁三分　黃連六分研　石榴皮三分
右三物以水二升煮取八合兒生四十日以五合爲三服大者則加藥

一方去石榴皮用犀角屑三分

肘後乳母方
扁豆莖一升炙乾切　人參三兩
右以水三升煎取一升半去滓取汁煮粟米粥與乳母食之良

肘後近效方
療小兒三歲即患痢初患膿少血多四日膿多血少日夜四十餘行
生地黃汁五小合　羊腎脂一小合
右先溫腎脂令煖分三四服立效乳母須禁服并有乳母方在前

聖惠吳藍散
治小兒膿血痢如魚腦腹痛
吳藍　川升麻　赤芍藥　龍骨煆各一兩
梔子仁半兩
右件藥搗粗羅爲散每服一錢水一盞入豉三七粒煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

樗根皮散
治小兒膿血痢如魚腦困重
臭樗根皮一分剉炒微黃　枳殼去瓤麩炒
黃連去鬚微炒　蕪荑微炒　赤芍藥各半兩
右件藥搗粗羅爲散每服一錢以水一小盞入豉三十粒葱白一莖煎至六分去滓不計時候量兒大小分減溫服

人參散
治小兒膿血痢多時不瘥腹痛羸瘦不欲飲食
人參　當歸微炒　地榆　阿膠搗碎炒令黃燥
黃連　子芩　黃蘗炙　赤芍　白蕪荑微炒
厚朴去粗皮生薑汁炙令香熟各半兩
右件藥搗粗羅爲散每服一錢以水一小盞入薤白一莖豉五十粒煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

雞屎礬丸
治小兒膿血痢不瘥漸加瘦弱
雞屎礬燒灰　龍骨　阿膠搗碎炒令黃燥
黃連去鬚微炒各一兩　胡粉一分炒微黃
右件藥搗羅爲末煮醲酢爲膏和丸如菉豆大每服以煖漿水下七丸日三四服量兒大小以意加減

黃連阿膠丸
治小兒熱痢下重膿血疼痛腹中痛不可忍
眞川黃連去鬚一兩半　白茯苓　白芍藥炒
阿膠杵碎慢火炒如珠子白色別杵爲細末各半兩
右上三味爲細末斟酌米醋多少熬膠得所和勻入臼杵萬下衆手丸如菉豆大每服自二十丸爲始至於五十丸食前溫米飲下日二三以知爲度

未知加藥更丸一等如黃米大與小兒服

燔髮散

治腸澼下膿血

白石脂一分　髮灰　甘草炙各二分

右爲末米汁和二刀圭日二服

張涣健胃丹

治泄痢羸瘠膿血日漸羸瘦

黃連一兩去鬚微炒　枯白礬一分　烏梅肉炒

龍骨　白石脂　神麴炒　乾薑各半兩

右件搗羅爲細末醋煮麪糊和丸黍米大每服十粒米飲下量兒大小加減

青橘丹

治冷熱相交赤白相雜膿血

青橘皮湯浸去白焙　當歸酒洗焙　黃連

乾薑各一兩　厚朴生薑製　肉豆蔻各半兩

右件搗羅爲細末白麵和丸黍米大每服十粒米飲下食前